









Digitized by the Internet Archive  
in 2014



LAZARI  
RIVERII  
OPERA MEDICA  
OMNIA.





# LAZARI RIVERII

CONSILIARII, MEDICI

AC PROFESSORIS REGII,

Necnon Regiorum in Universitate Monspeliensi Medicinæ  
Professorum Decani.

OPERA MEDICA UNIVERSA;

QUIBUS CONTINENTUR,

I. Institutionum Medicarum Libri quinque.

II. Praxeos Medicæ Libri septemdecim.

III. Observationum Medicarum Centuriæ quatuor.

QUIBUS ACCEDUNT OBSERVATIONES

variæ ab aliis communicatæ :

*Itémque OBSERVATIONES infrequentium Morborum. Ac denique ipsissima  
ARCANA Riverii plenè revelata.*

Omnia non tantùm ab ipsomet Authore ultimò revisa, emaculata, locupletata ; sed etiam à  
JOANNE DANIELE HORSTIO adornata, necnon à JOH. JACOBO DOEBELIO recensita :  
Nunc verò singula peculiaribus suis Indicibus Illustrata.

EDITIO NOVISSIMA ; CUI PRÆTER JACOBI GRANDII

*in RIVERII Opera Prefationem ; Joann. Daniel. HORSTII, ad Joh. Otton. filium, Admonitionem super  
eorum lectione ; & Anonymi Animadversiones in Præcognita in universam Medicinam ; prius ultimò adjectas ;  
Jam superadditis est, Præclariss. FERD. CAROLI WEINHARDI, MEDICUS OFFICIOSUS ;  
cujus utilitas, compendiò, in Prefatiunculâ, ipsi, propriò locò præmissâ, enarrabitur.*



GENEVÆ,

Sumptibus FRATRUM DE TOURNES.

M. DCC. XXXVII.



MASSACHUSETTS

RAVENS

CONSISTENT MEDICAL

AT THE CORNER OF

STREET AND RAILROAD AVENUE  
BOSTON, MASS.

OTHER MEDICAL

STREET AND RAILROAD AVENUE

STREET AND RAILROAD AVENUE  
BOSTON, MASS.

STREET AND RAILROAD AVENUE

STREET AND RAILROAD AVENUE  
BOSTON, MASS.

STREET AND RAILROAD AVENUE  
BOSTON, MASS.

STREET AND RAILROAD AVENUE  
BOSTON, MASS.

STREET AND RAILROAD AVENUE  
BOSTON, MASS.

STREET AND RAILROAD AVENUE  
BOSTON, MASS.


STREET AND RAILROAD AVENUE  
BOSTON, MASS.

Crawford

STREET AND RAILROAD AVENUE  
BOSTON, MASS.

STREET AND RAILROAD AVENUE  
BOSTON, MASS.





# JACOBI GRANDII

## IN UNIVERSA RIVERII OPERA

### P R Æ F A T I O.



INTER Authores, qui scriptis, & observationibus Artem Medicam locupletarunt, plurimi quidem omni ævo, quâ Græci, quâ Latini, quâ Arabes, cum universam Medicinam, tum aliquas ejus partes editis voluminibus explicarunt. Antiquissimis usque temporibus Apollo, seu Serapis, Chiron, Æsculapius, Bacchus, Pæon, quod primi laboriosæ mortalitati præsidia adversus morbos communicarunt, à posteris tantam gratiam inivêre, ut pro Diis habiti, & excultri fuerint. Secundum ab his locum tenuerunt Podalirius, atque Machaon Homeri versibus celebrati; à quibus longò intervallò floruerunt Democedes, & Melampus, uterque scientiæ famâ clarissimus, ille propter Regem Persarum à pedis luxatione sanatum, ejusque Uxorem serpente mamillarum ulcere liberatam; hic ob Preti filias à furore melancholico, dimidia Regni parte, curatas. Hos secutus magnus Hippocrates divinò ingeniò sparsas medendi regulas ordinavit, scientiâ altis Philosophiæ Principiis innixâ in hæreditatem posteris relictâ; Jecit fundamenta medendi, traditâ scriptis immortalibus morborum omnium curatione; & signatis remediorum viis. Errores etiam, quibus deceptus confessus, & ne quid Artis perfectioni deesset, remediorum formulas peculiari volumine exaravit, cui Medicamentarii nomen indidit: qui liber magnò humani generis detrimentò, injuria temporis intercidit.

Coævus Hippocrati fuit Democritus, illius testimoniò optimus Naturæ, & Mundi interpres, ut inquit Plinius, qui, tradente Arbitro, omnium herbarum succos expressit, & ne lapidum, virgultorumque vis lateret, ætatem inter experimenta consumpsit. Græcorum primus Chymicâ Arte Metalla resolvit, quam longis ad Ægyptios, Gymnosophistas, Magos, peregrinationibus didicerat, plus sexcentis aureorum millibus in experimenta consumptis; unde arcanis remediis Artem Medicam ditavit. Verùm Scripta tanti Philosophi luctuosò mortalitatis fatò omnia perierunt. Subsequentibus sæculis Artem illustravit Herophilus, herbarum cognitione, pulsuum notitiâ, & Anatomies peritiâ incomparabilis: qui miranda arte Arteriarum pulsus in nodulos certos, legesque metricas descripsit: & scribente Tertullianò, ut Naturam scrutaretur, septingentos homines exsecuit; nonnullosque etiam vivos, ut interna liquidò exploraret, morte non simplici, sed ipsa inter artificia exsectionis errante Artifice.

Ab hoc sua singuli tempora decorarunt plurimi Medicinæ, & Philosophiæ connubiò insignes, Aristoteles, Erasistratus, Theophrastus, Serapion, Asclepiades, Themison, Dioscorides, Archigenes, Theffalus, Andromachus, Aretæus, Theon, Ruphus, Soranus; & inter Latinos Celsus, Macer, Scribonius, & Plinius.

Successit postea Galenus, maximum Medicinæ decus, & Medicorum Princeps, cujus doctrinam fama canit, & doctissima, quæ extant, scripta testantur. Cedrò digna sunt Opera ejus, sed quæ de Usu partium, Anatomicis administrationibus, Locis affectis, & Compositione medicamentorum conscripsit, nimium quantum cæteris antecellunt.

Auctum tantis Authoribus medendi scientiam potuerunt Cælius Aurelianus, Oribasius, Paulus Ægineta, Aëtius, Marcellus, Alexander Trallianus, Actuarius, Myrepsus.

Hos excepit sequioribus sæculis Arabum schola, Græcis, & Latinis Musis ab Europâ barbarie obsitâ fugatis, Medicinam invadentium; quorum Illusterrimus Avicenna, sive Abensina, universam Artem medendi à Græcis Scriptoribus mutuata patriò sermone complexus est. Scripsere & Averrhoes, Avenzoar, Rhasis, Albucasis, Mesue, Isaac, & Halyabas; quorum libris, licet rudibus, & omnis litteraturæ expertibus, non deest doctrina, non deest ingenium; ex illisque, quod de Ennii Annalibus dixit olim Virgilius, velut aurum de stercore colligi potest.



Tandem Europâ exuente barbariem, florûere multi, præsertim Trufianus, & Petrus Aponensis, ille plusquam Commentatoris, hic Conciliatoris cognomento notissimus. Sed Arnaldus Villanovanus, ingenio, & scriptis, & experienciâ medendi, nulli Medicorum secundus est. Doctè quoque scripserunt præ aliis Constantinus Aphricanus, Jo. Arculanus, Savonarola, Gordonius, Valefcus de Tarranta, Campegius, Carpenfis, quibus eruditiores Marsilius Ficinus, Linacrus, Leoniceus, Manardus, Ruellius, Montanus, Landus, Vidius, Trincavellius cultiorem Scholis Medicinam invexerunt.

Sed Joannes Fernelius, Gallus, ingeniô, eloquentiâ, felicitate, & sermonis elegantiâ, omnes à Galenô illustrem in medendi scientiâ famam consecutos, superavit. Ipse interfuit gloriæ suæ, & quod nemini mortalium contigit unquam, vivens vidit in Academiis Galliæ opera sua publicè prælegi, atque explicari.

Enim verò Fernelii seculum, si quod aliud, magnorum Medicorum feracissimum fuit, quos enim, ut quamplurimos taceam, proferent alia secula Vesalio, Fallopio, Vallesio, Ingrassiæ, Mercuriali, Capi-Vaccio, Argenterio, Rondeletio, Jouberto, Lemnio, Junio, Dodonæo, Fabricio ab Aquapendente, Guilandino, Hollerio, Andernaco, Massariæ, Saxonix, comparandos.

Quid de nostro seculo dicam, in quo clara fulserunt, adhucque fulgent Capita Medicorum, qui pari cum veteribus passû consecuti sunt immortalitatem, nempe Willis, Boylæus, Zwelferus, Charleton, Van der Linden, Blasius, Mœbius, & alii doctissimi Professores, quos futura nominabit ætas.

Veruntamen eorum, qui Praxim docendo, & medendo juvère Philiatros, optimè de humano genere meritus est LAZARUS RIVERIUS Medicus Monspelienfis, & FRANCISCUS DE LE BOE SYLVIUS Batavus; si tamen hic, ut ille, incœptam, favente Apolline, Praxim absolvisset.

Quippe post Hippocratem, qui obscuritate, & brevitate sermonis, oraculi instar, non omnibus, sed solis Naturæ Mystis Artem aperuisse videtur, Medicina omnis in varias sectas, & factiones divisa est pro ingeniô, & libidine Professorum; Hinc magnô ægrotantium malô orta illa nomina, & turbæ Jatralepticorum, Empiricorum, Herophileorum, Asclepiadeorum, Theffaleorum, Galenistarum, Rationalium, Methodicorum, Dogmaticorum, Chymicorum: & tot immania dissidia, & contrariæ medendi rationes; aliis fame & siti, imperiosâque inediâ, aliis cibô, & largiore potû, aliis sudoribus, aliis purgantibus medicamentis, aliis copiosâ, & crebrâ missione sanguinis, aliis ad syderum observationem collectis herbis, aliis per vomitoria, aliis per quæ non alia remedia, subtiliori, & penitiori ratione à metallis, & mineralibus elicita, confessâ audaciâ morbos omnes aggredientibus? Unde justa querela Plinii, nullam Artium Medicinâ inconstantiorē fuisse, cum sit fructuosior nulla. Sanè supra Avorum nostrorum memoriam Theophrastus Paracelsus, ut olim Theffalus, cuncta Medicorum placita delevit, & rabie quadam in omnes Artis scriptores debacchatus est, celebri famâ ob sanatos feliciter ægrotos arcanô remediô à Chimiâ petito, Ejus dogmata secutus Helmontius cautiore ingeniô alia principia rimatus, novum condidit Medicinæ progressum, scriptaque edidit profutura mortalibus.

Illud in primis sciendum est, quòd ante Harvæum quotusquisque Artem exercuit, si Hippocratem, & Hærophilum excipias, circulationem sanguinis per totum corpus ignoravit. Ignoravit etiam maxima pars Authorum principia Chymica, & efficacissima pharmaca, quæ ea Arte parantur maximo salutis hominum compendiô. Insuper per inscitiam putaverunt cum Galeno massam sanguinis ex quatuor humoribus componi, vitalibus & nutritiis succis excrementorum nomina tribuentes. Denique eos latuerunt Chyli viæ per mesenterium, ductusque Thoracicos, vasa lymphatica, succus pancreaticus, ejusque cum bile mixtio, usus, modusque nutritionis.

Propterea cum in tantâ Scriptorum varietate, & confusione hæreant ingenia studentium, ac deterreantur longitudine Artis, & immensitate voluminum, varia, & contraria inter se dogmata complectentium, viam certam, ac regiam hoc volumine præstatum ivit RIVERIUS, quâ vera Medicinæ scientia, ex veterum, & recentium Professorum placitis comparari possit.

Praxim medicam facturis, non inutilem rudiori seculo navarunt operam insigniores Valefcus, Gordonius, Savonarola, Gariopontus. At Ædepol, quàm crassâ Minervâ? quàm jejunâ scriptione? Utilius & doctius rem perfecerunt Weckerus, Mercurialis, Platerus, Bruelos, Beverovicus, Zacutus, Horstius, Blasius, M. A. Severinus, Massaria, Saxonia, & Centonariorum Coryphæus, Sennertus. Verùm Hollerii, & Cæsalpini Practicæ, frequentius cæteris elegantiorum Medicorum manus triverunt; Donec RIVERII opus absolutissimum, studentium necessitatem, & vota docentium interceptit. Hujus commentariorum lectioni, si studentes conjunxerint ANTONII MENIOTII Pathologicas dissertationes doctissimas quidem, & eruditissimas; GUALTERI CHARLETON ex-citationes Physico-Anatomicas totius Oeconomix Animalis Systema complectentes, nec non quæ de Urinis, & Pulsibus clarâ & hætenus desideratâ methodô nuper edidit LAURENTIUS BELLINUS, absolutissimam Medicæ praxeos Ideam comparabunt, eamque stabiliùs ornabunt; si MARCELLI MALPIGHII Anatomicorû oculatissimi, & FRANCISCI REDI naturalium experimentorum consultissimi, scripta perlegerint. Neque hoc loco silendum est practicas Rhapsodias concinnius in ordinem non pœnitendô labore digessisse THEOPHILUM BONETUM, PAULUM DESORBAIT, & THOMAM BURNET Viros experientissimos, ac veteris & novæ Medicinæ ornamenta.


Et quoniam Scholasticorum morbus, quibus garrulitate disputandi instructis, mos est Artibus, & Scientiis, inutiles subtilitates prætere, corripuit etiam Medicos, arcanis Naturæ reli-

ctis,



etis, Logicas, & Metaphysicas tricas sectantes, in eorum gratiam sobriè quædam attingit Author in præcognitis ad universam Medicinam.

Mirum, & indignum protinùs subit, tam multa multos disputare, ut quærant Medicina sit né Ars, an verò Scientia? ceu magni esset momenti ista indagatio, & ab eâ Medici laus, & perfectio dependeret! ceu idem non sit, ac urente domo, locò aquam flammis injiciendi, contentiosè perquirere, an ignis ex Atomis Democriti, an verò ex forma substantiali Aristotelis componatur. Mavult Author Scientias propiùs, quàm Artes, Nobilissimam Artium collocare. Hæc tamen leviora sunt, quàm ut iis distineri velit diutiùs Medicinæ studiosos. Libri Praxeos, Libri Observationum sunt qui requirunt studentis diligentiam, & ingenium: ii sunt qui nocturnâ, sunt qui diurna manû versandi sunt: In illis qualis fuerit medicus, quantum cæteris præstiterit RIVERIUS, Philiatrî, qui legerint & didicerint, nullo opinionum præjudicio occupati judicabunt.



FILIO JOH. OTTONI

In Academia Giessensi studiis operam locanti

JOH. DANIEL HORSTIUS

S. P.



UM non ita pridem Tibi commendarem RIVERIUM, & hujus rei gratiâ illum partim interpolarem, atque aliquot novis notatû dignis, variisque Pharmacis, RIVERO olim usualibus, augerem, opportunè accidit, ut Bibliopola ZUBRODIUS novam editionem RIVERII meditaretur, atque à me peteret exemplar LUGDUNENSE, in tuum usum, ut dixi, horis succisivis pro tenuitate meâ, meorumque laborum ratione, ex parte politum: Nolui autem deesse illius precibus, quòd hòc pactò non tantùm tuis, sed, & aliorum studiis aliqualem opellam ferre valerem. Commisi itaque ZUBRODIO huic RIVERIUM in tuum commodum adornatum, eundemque jam typis exscriptum, & recusum, tibi etiam atque etiam commendo, ut diligenter illum volvas, & evolvas. Ipse enim RIVERIUS Autor doctus, expertus, candidus, & perspicuus, quem feliciter sequi possis, & cum tempore imitari, modò quoad dosin PURGANTIUM, maximè SCAMMONIATORUM, his in oris, RIVERO in Prax. & Obs. aliquando largiori, parcior sis, nec ultra pondus in ipsius RIVERII Institutionibus designatum, ascendas. Evolve itaque hoc volumen penitiùs, non perfunctoriè, AVIQUE Tui, & JOELIS scripta, laboreque VESLINGII, & BARTOLINI, p.t. huic adjuuge, ut legas aliquando majorum tuorum vestigia. FRATER Tuus, Tuusque Patruus GREGORIUS invitant Te ad Anatomica. Avus Tuus GREGORIUS ad Praxin. Hujus Patruus JAGOBUS cum Filio HENRICO ADOLPHO, senexque GISBERTUS lucernam præbent pedibus tuis, modò ores, & labores. Labores inquam, & diligenter studiis lites, DEO confisus, cujus protectioni Te commendo.

FRANCOFURTI Kal. Augst. 1668.



# LECTORI BENEVOLO, ET MEDICINÆ STUDIOSO,

Anonymus. S.



REFARI necessum est mihi, & veluti colloqui cum Lectore, ut præmonitus, nisi probare velit, æquiori saltem animò in Animadversiones hæc meas animadvertat, & rectò judiciò æstimet supplementa. Moneo itaque me Tyronibus, Alumnisque meis hæc qualiacunque scripsisse, ut cum, quorum gratiâ scripserim, intellexerit, intelligat quoque causam, quâ ejusmodi scribendi rationem inierim. Hi enim, quibus est indoles, & ingenium ad bonas artes, & medicam præsertim effectum, illudque prætereà excolunt studiò, & sese exercentes medendo, cum hoc opus Riverii, quod tanquam probatum omnibus diurnâ, nocturnâque manu pervolvunt, novis typis excuderetur, coegerunt me multis precibus, ut vellem pro eò, quò sum in eorum studia propensus ardore, quæ se se in eòdem authore desiderare, sufficerem, falsò verò dicta, si quæ sint, detergerem, & emendarem: & quæ tandem obscura viderentur, exponerem. Hæc quidem sunt bonò animò, & sine ambitione quæsita: at quod ad me attinet, imparia valdè homini occupatissimo. Accedit prætereà esse nimiae fiduciæ, & libertatis, in aliena scripta manum immittere, & receptum ab omnibus, gravemque authorem ad examen revocare. Longè tamen mei nominis curam, ac dignitatem posthabeo profectui discipulorum, eorumque multitudine, & consuetudine me defendo, quibus licuit semper, nec injuriâ, aliorum opera examinare. Cum enim nemo tanti sit, ut simul valeat invenire, & perficere; nec ita ad amissum singula scribere, in re potissimum medicâ, in abditò positâ, & tot, tantisque difficultatibus implicata, quin aliquis, vel insciò Authore, irrepit interdum error, jure licet, ne latius serpat, & teneris adhuc discentium animis inhærescat, expungere, & unius auctoris offensæ (quæ tamen nulla esse potest) præferre posterorum utilitatem. Hoc nobili studiò, & inter cætera perquam utili usi sunt hætenus omnes, & cæteri deinceps utentur, ex quò magnum provenit scientiis, & artibus incrementum. Nisi Hippocrates Antiquorum scripta acri judiciò recensuisset, nisi item addidisset plurima; nisi Galenus, & alii Hippocratem elimâissent; nisi denique cæteri succedentium temporum, & imprimis neoterici Galenum ipsum, & quæ ante se repererunt edita, severiori limæ subjecerint, quot nobis adhuc imponderentur falsa, & immania, quot careremus bonis, nisi rejectis antecedentium erroribus, plurima, & longè potiora substituerent? Propterea dolenda sunt meritò rudia Antiquitatis inventa, & quemadmodum sculpsentes efficiunt, quâ detrahendo, quâ addendo in bonam justis operis speciem reformanda; Ita ergo ab aliorum censura tutus utor stylò consuetò, & eâ quam subinet exemplo docuit Hippocrates 1. de diætæ moderatione. Non enim ego, ut nec ille, quæ non rectè dicta sunt, & cognita redarguere institui, sed qualia esse debeant ostendere. Ideò in Præcognitis multum immoratus sum, & fusiùs plura, quæ Alumni desiderabant, adjeci. Et si enim quæ de naturâ medicinæ dicuntur, provectioribus fortè videantur levia; ad instituendos tamen maximè pertinent, qui artem suam debent nosse priùs, quàm eam familiariter tractantes exercent, rectèque instituti operis ratio postulat, ut ea, quæ de re, quam agimus, dicenda sunt, quàm optimè etiam dicamus. Laxiori autem, molliorque oratione conscripsi, quia delicatulis, needum validis coquendo solidiorem, cibis ideò offerendus benè tritus, & fermentatus. Post hæc autem in cæteros institutionum libros paulò altiùs inquisivi: cum ut Alumni, qui pluribus medicorum hætenus hærent, errores agnoscerent: tum etiam ut mentem ad sublimiores contemplationes paulatim assuescant attollere, eorum quodammodo ingenia acrioribus stimulis urgeo, præbendo materiam contemplandi. Eò verò potissimum consiliò nonnullas sententias fortiùs exagitavi, non quòd tantummodò videantur falsæ, sed quia adeò situm contraxerint, ut nulla amplius supersit detergendi spes: & quod maximè dolendum, incuriâ, & negligentia Professorum discentibus affiguntur. Velim denique, ut Lector intelligat, quare aliquot duntaxat institutionum capita, eaque veluti punctim attigerim, cum antea circa Præcognita latius evagatus sim: nimirum delectum habui graviorum, in quibus ingenium sese potest exercere cum laude: stupiditatem verò Professorum ostendi, & medelam simul adhibui, quâ se se excitent à lethargò, si velint deinceps ultra corticem sapere: atque adeò Animadversiones, non justum opus, quod aliàs polliceor me editurum esse, confeci. Lector ergo non nescius consilii mei hæc qualiacunque modò liberè judicet, dum ego post tabulam positus judicia, utcunque fuerint, libens excipiam: interim ut ex bonis me doctum, ita ex malis nequicquam offensum iri, professus.





# ANIMADVERSIONES IN PRÆCOGNITA IN UNIVERSAM MEDICINAM.



**L**APSUS videtur author in constituen-  
do juxta & probando genere medici-  
næ. Dicit enim, medicinam esse scien-  
tiam, & multis probat: deinde, ne vi-  
deatur nimis suæ opinionis assertor,  
concludit. *Attamen, ne nimis rigide*

*sententiam nostram tueri videamur, di-*  
*cimus medicinam scientiam appellari latiori paululum signi-*  
*ficatione, quæ proponitur ab Arist. 1. Metaph. cap. 2. prout*  
*scientias speculativas, & factivas comprehendit.* Tum hîc  
ego, ergo fallitur; quia si medicina latiori significatione  
est scientia, propriè est ars: atque adeo primùm ars dicen-  
da est; deinde verò analogicè scientia, quemadmodum  
docet Arist. locò citatò. Ibi enim nonnullas artium acti-  
varum quodammodò scientias appellat, quia instar scien-  
tiarum operis faciendi causam, rationemque cognoscunt;  
ideòque architectonicæ sunt, quæ docendo præfidentiis,  
qui, ut inquit idem, *nescientes manibus operantur*, qua-  
les sunt vulgò manuales appellati, & merè empirici.

Lapsus est etiam in probando, dum inquit. *At verò*  
*cum sua habeat principia, axiomata, & demonstrationes ex*  
*naturæ demonstratione petitas: imò nonnullas ipsius physi-*  
*cæ demonstrationibus certiores, ut potè à sensuum fide de-*  
*ductas: cum unicum habeat subiectum reale, per se exi-*  
*stens, ac præstantissimum: nempe corpus humanum illiusque*  
*proprietates doceat, inter scientiarum numerum videtur*  
*potius referenda.* Lapsus inquam est, quia nondum certò  
constant hujusmodi principia, & axiomata medicinæ.  
Etenim si talia forent, non esset ars in tot sectas diducta,  
nec tot difficultatibus obnoxia, & si aliqua axiomata  
forent videntur inculcata, & certa: ea tamen practica  
sunt, & artificem ad opus ducentia: cujusmodi circum-  
feruntur illa, *contraria contrariis curantur, morbos quos*  
*repletio facit curat evacuatio, & è contra.* Quibus etiam  
vel artes mechanicæ minimè carent. Sed esto talia sint,  
qualia Riverius admittit: non ideò tamen medicina ab  
iis obtinet nomen scientiæ; à fine enim, ut docet idem  
Arist. artes, & scientiæ constituuntur; quippe scientiæ fi-  
nis est veritas, seu mera subiectæ materiæ contemplatio:  
artium verò est opus. Medicina ergò, quantumcunque  
suorum principiorum, & axiomatum certa foret, nihi-  
lomius, ars dicenda est, quia non in contemplatione,  
sed in efficiendo opere tandem versatur, & quiescit.

Hinc, quod de demonstrationibus addit, nec omnino  
constat, & si constaret; adhuc tamen minimè probat: vel  
enim demonstrationes universales sunt, vel particulariter  
concludunt: si universales, omnino physicæ habentur, &  
ideò nec certiores physicis: si particulares, quales medi-  
cinæ conveniunt, (omnis enim ars, quæ ratiocinio de  
agendo deliberat, utitur majori propositione universali,  
& minori particulari, undè particulariter concludit) mi-  
nor hujusmodi demonstrationum semper de errore peri-  
clitatur, quia singulare tantummodo cognoscitur expe-  
rientia: propterea non est omnino libera à suspitione  
falsitatis: tales potissimum sunt demonstrationes, quibus  
vel quantitatem remedii, vel tempus adhibendi conclu-

Laz. Riverii Opera.

dimus: quæ duo in arte quàm difficillima cognitû sint,  
& ferè incomprehensa, nemo non novit, ut jure di-  
cat Hipp. 1. Aph. 1. *experimentum fallax, & judi-*  
*cium esse difficile.* Hæc ergò cum ita sint, quis audeat  
unquam asserere ejusmodi demonstrationes medicinam  
ad scientiæ fastigium evehere? tantò magis, quòd  
ad operationem, non ad contemplationem factæ  
sunt.

Nec minùs improbabilis est altera, quam subjicit, ratio,  
inquiens. *Cui opinioni nos magis assentimur; artes enim*  
*ex frequenti tantùm operatione comparantur, & totæ in*  
*operatione versantur; at medicina habitus comparatur,*  
*ex frequenti librorum inspectione, & doctorum insti-*  
*tutione, quemadmodum veræ scientiæ.* Falsum est enim,  
medicinam hac ratione fuisse acquisitam, & nunc etiam  
acquiri; ea enim fit, quemadmodum cæteræ artes,  
experientiâ: experientia verò cum in singularibus oc-  
cupetur, in exercitatione tota est: ideò qui ex libris eva-  
dunt medici, nec singularia norunt, nec hilum que-  
unt agere. Hinc docto medico in agendo longè præ-  
stat expertus, & Celsus appositè dicit, *nec agricolam*  
*quidem, aut gubernatorem disputatione, sed usu fieri,*  
& de medicina speciatim scribens ait, *sapientiæ studio-*  
*fos maximos medicos esse si ratiocinatio hos faceret: nunc*  
*illis verba superesse deesse medendi scientiam.* Et infra  
clariùs, *ne inter initia quidem ab istis quæstionibus de-*  
*ductam esse medicinam, sed ab experimentis.* Hac de  
re plura dicta sunt ab Hipp. & Gal. & dicuntur etiam  
à posteris, dicentque præterea ii, quicumque medicû  
futuri sunt. Quòd si medicina ideò scientia est, quia  
ex libris, & doctore potest addisci; eòdem prorsùs  
modò quæcunque artes scientiæ forent; quia & tradi  
possunt à docente, & qui valet ingenio, per se potest  
ex aliorum scriptis addiscere. Idcirco hæc ratio inanis  
est, inutilis, & nihili omnino facienda. Quæcunque  
enim, vel scripta sunt, vel à magistris traduntur, or-  
tum habent ab experientiâ, & in eam pariter resol-  
vantur, ut inferiùs ostendam ex Hipp. *lib. præceptio-*  
*num, & de arte veteri, & de diæta.* ubi inquit, *magis*  
*credere oportet oculis, quam opinioni, & tandem lib. de*  
*elegantia.*

Item falsum est, corpus humanum esse subiectum;  
cujus passiones, & proprietates considerat: hæc enim  
consideratio universim accepta physica est, non medi-  
ca: deinde medicina est magis contracta, & medicus  
non quascunque causas, & passiones corporis humani  
cognoscit, sed tot, & tales, à quibus scilicet vel sanum  
est, vel ægrum, quod in supplementis ex Hipp. lucu-  
lenter exponam.

Hinc patet non corpus humanum, sed hominem  
esse medicinæ subiectum; præterea enim animi passio-  
nes medicus contemplatur, amorem, iram, timorem,  
& cætera hujusmodi, quæ influunt in corpus, illud-  
que vi sua à naturali statu sæpè dejiciunt. Cum ergò  
ejusmodi passiones non solius corporis, nec animi, sed  
conjuncti, ut inquit Arist. communes sint, non cor-



pus humanum, sed homo jure medicinæ subjectus est, hinc medici in potentiarum animalium, quatenus ad rem suam facit, cognitione versantur.

Nec minus abest à verò, quòd postremò dicit his verbis. *Finis denique, ad quem dirigitur ab illius doctrina, & tractationis modo distinguitur, & ut certè adnotavit Alexander Aphrodisæus. Medicina enim dupliciter considerari potest, vel primariò, quatenus docetur ex certis firmis, & indubitatis principiis &c.* Abest inquam à verò, quia Aphrodisæus eò loci annotat discrimen inter facultates conjecturales, & eas, quas ipse definitas appellat; quippè indefinitis idem est finis, & opus: in conjecturalibus verò opus à fine distinguitur, & ostendit exemplo Rethoricæ; opus enim rhetoris quod dicitur etiam officium, est aptè dicere ad persuadendum: finis verò est persuasio; at quia non semper Rethor aptè dicendo persuadet; ideò hæc duo ab invicem distinguuntur. Idem accidit medicinæ. Opus, sive officium medici est omnia facere appositè ad sanandum; at quia medicus etiam benè medendo aliquando minimè sanat; *rectè enim, inquit Aristotel. curamus etiam insanabiles*, ideò aliud est officium medici, aliud finis. Hinc tamen non deducit Aphrodisæus, medicinam esse scientiam, si consideretur primariò, quemadmodum Riverius affirmat, eò enim pacto factiva est; neque secundariò, ut idem falsò putat ad suum hominum revocatur; sed ex naturâ suâ humanæ sanitatis causa comparata est, & inventa, ut egregiè Hippoc. notat lib. de veteri medicina, inquires. *Porro huic invento quodnam justius, magisque aptum nomen quis imposuerit* (loquitur de humanæ dietæ, & victus institutione) *quam medicinæ? quandoquidem gratia sanitatis humana, nutritæque ac salutis inventum est.* Imò ex eòdem authore hætenus dicta confirmantur: ille enim oblitus sui, suæque sententiæ, asserit, *sanitatem esse finem medicinæ, ad quam omnia medici opera diriguntur, quæve adepta medicus conquiescit*: ergò si sanitas est ejusmodi, medicina primariò, non secundariò ad usum hominum comparatur; siquidem omnia opera huc dirigit, factiva est, non activa, ac contemplativa; atque adeò tandem est ars, non scientia; sed de his in supplementis.

#### S U P P L E M E N T A.

**E**X dictis constat, medicinam non esse scientiam, modò paucis, esse artem, ostendo. Facile autem demonstratur, si recolantur ea, quæ docet Aristot. 3. ethic. ubi discrimen, quod artem, & scientiam intercedit, optimè tradit. Differunt ergò ars, & scientia fine, materiâ, modò, & agendi principiò. Materiâ differunt, quia scientia circa universalia, & necessaria versatur: ars verò circa singularia & contingentia. Fine, quoniam ars efficiendo aliquid, quærit bonum extra se, & in externò subjectò: scientia verò contendit ad bonum ejus, qui sciens est, sive ad perfectionem intellectus scientis; ideòque sibi tanquam finem proponit contemplationem, & veritatem: è contra ars effectiorem, & opus: ac tandem ars non est in eò, quod efficitur, sed in efficiente. Hinc patet, quod superius probandum suscepimus, medicinam, scilicet esse artem, quæ versatur circa materiam contingentem, & singularem; non enim sanat hominem, sed Socratem, & Calliam, contenditque ad bonum ejus, quem sanat: est in medico curante, dum utitur regulis, & instrumentis, ut opus rectè fiat, iisque malè usa aliquandò non rectè facit: at ubi alia rectè, alia non rectè fiunt, ut inquit Hip. lib. de arte, ibi ars est: quo circa antiquiores omnes Arist. & Galen. medicinam artem semper appellant. Et hæc satis dicta sint tanquam de re notâ, & ab omnibus ferè receptâ.

Cum superius in animadversionibus judicaverim ex Arist. 1. Topic. artes bisariam dici, scilicet, alias esse definitas, alias verò appellari facultates; præstat hic intelligere, cujus generis sit medicina. Artes de-

finitæ dicuntur, quarum ita sunt certa, ac determinata media, ut, iis positis, sequatur opus, quod propterea idem est etiam finis: nec pendet à fortunâ, & à casu, v. g. Architecturæ ita certæ sunt regulæ, ita media determinata, ut, iis positis, domus fiat semper, & eodem modo; ideoque non distinguitur opus à fine, sed eadem domus opus est, & finis architecti. Facultates verò duobus etiam modis dicuntur: vel enim facultas ejusmodi est, quia contraria possit, & faciat: v. gr. orator potest defendere Milonem, & accusare: medicus sanare, & occidere: vel dicitur etiam facultas, quia cum conjecturalis sit, nec in aliquò determinatò posita, opus habet consiliò & ratione, ut de agendi modo de instrumentis & tempore ratiocinando decernat. Propterea, quemadmodum in artibus definitis, quia media certa sunt, non distinguitur opus à fine: è contra in hujusmodi artium genere, quia peractis omnibus, quæ ex artis institutò facienda erant finis tamen non consequitur aliquando: aliud est opus artificis, aliud finis. Medicina igitur non dicitur facultas primò modò, quia scilicet contraria possit, & faciat, sicuti dialecticus & orator; sed altero, quia utitur consiliò, & ratione pervestigandi causas, & media & tempus, & modum utendi, &c. ut peregre notat Aphrodisæus con. 1. Topic. cujus ideò verba refert huc adducere; at ita loquentem audire. *His duabus artibus* (scilicet dialecticæ, & oratoriæ) *commune est simile modò potentiis suis uti ad utraque contrariorum. At qui in scientiis versantur, licet habeant contrariorum cognitionem, tamen scopus, quem illa scientia sibi proposuerunt, est ut alteram partem contrariorum quæ melior est, definitè consequantur: medicus, ut sancti aliptes, ut firmam corporis constitutionem luceatur, & ceteri alterum contrariorum, quod melius est propositum habent, in quo se exercent. Nam cognitio contrariorum, quam essequeuntur, non est apud eas principalis, sed ex cognitione unius sequitur alterius cognitio; quemadmodum ex scientia eorum, quæ sanitatem inducunt sequitur etiam cognitio eorum, quæ morbos gignunt.* Quibus ostendit Aphrodisæus, medicinam non esse facultatem priori modò superius propositò. Pergit deinde ostendere, quo pacto medicina facultas dicenda sit: nimirum quia, cum sit conjecturalis, non est in aliquò determinatò, sed opus habet propriâ intelligentiâ ad coaptanda accidentia, & ordinanda ea, quæ fiunt, ut ita ordinata utilia sint: quare cum medicina talis facultas sit, indicat quale etiam sit ejus opus inquires: *ideò medici opus est, omnia facere, quæ ad corpus pertinent, non sanare. Quod si hoc ad medicum spectaret, certè, & non medicus erit medicus, & medicus non erit medicus, quia & illi qui, medici non sunt, plerumque agrotos sanant, cum aliquid salutare adhibent: & medici plerumque non sanant, quod faciunt, quando malum majus est, quàm auxilium medicum; id est qui non medici sunt, & sanant, faciunt opus medicum non medicè, seu non ex habitu medicinæ, quo carent, sed casu, vel aliorum consiliò, &c. qui autem medici sunt, faciunt opus medicum medicè, ex arte nimirum, non fortuitò, vel alienâ ope; quæ duo valde differunt, & medicum à non medico apprimè distinguunt; quemadmodum dicebat Arist. 3. ethic. de iustis, quod aliud est facere opus justum justè, aliud opus justum non justè.*

Cæterum, ne videatur hoc discrimen nullius esse usus, & allatum frustra, ac ut explicentur uberius, quæ antea indicata sunt, addo etiam, quæ hæc de re scribit Aphrodisæus, nimirum ex his sequi, *in hujusmodi artibus non fieri judicium ab advenientibus finibus, ut fit in arte domus edificandæ, aut tela texendæ, & in aliis artibus factivis, in quibus per quasdam vias definitas, & ordinatas procediunt, & actio fit in omnibus pari modò, & eorum opus non potest fieri à fortunâ. In his autem finis est, propositum opus sequi ex iis, quæ ejus causâ facta sunt. Quocirca cum benè, & artificiosè fiant, quæ ante ipsa sunt opus ipsam declarant. In artibus*



artibus autem conjecturalibus non omnino cum iis, quæ arte sunt, conveniunt ea, quorum causâ illa sunt. Causa est, quia in his aliqua sunt à fortunâ, & non sunt determinata ea, ex quibus sunt illa, quæ sunt eis subiecta. Quamobrem id, quod fit ab iis artibus, non est illarum artium finis, ut fit in iis, in quibus, cum sint aliqua definitæ, aliquid efficitur, & sine illis, nihil fieret; at in his opus est finis & signum, omnia ex arte esse facta; neque enim aliter esset factum. In conjecturalibus verò opus non est finis; quia non semper sequitur finis ex iis, quæ gratiâ ejus fiunt: ideo Aphrodisæus rectè distinguit finem ab officio medici, inquit, *medici officium est ut omnia agat, quæ possit, quo ægroti corpus sanet; finis verò sanatio, cujus gratiâ illa facit, eò quod indiget aliis quibusdam præter ea, quæ facta sunt, ut secundum medicinam sit.* In definitis enim simili modò se habet, finis in ipsis, ut facere secundum artem: in conjecturalibus non est finis in artifice, ut neque beari in probis hominibus, si non solum bonum, & honestum sit. Sic in medicò non est sanare, & ideo curare secundum artem, & sanare distincta sunt.

Dispicimus modò, quanti sit hæc nosse, quantum referat medicum, quantum ægros. Medicum quidem, quia antea monitus, officium à fine esse distinctum, nec idem esse mederi, & sanare, polliceatur, tantummodo suum se præstiturum officium quàm diligenter, non sanitatem, quæ in eo non est, & ab aliis etiam extrinsecus pendet, refert etiam ægrum, quia operam medici, quæ ab eò solum est, non sanitatem debet exigere, nec propterea artem, & artificem calumniari, quoties eventus improspere cadit, dummodò non defuerit officio suo.

Non videtur abs re hîc ampliùs examinare sententiam quorundam magni nominis medicorum, dicentium, medicinam, vel esse prudentiam, vel non sine prudentiâ. Legi jamdiù apud Hofmannum dictum à Scherbio: audivi etiam Patavii ex primò suggestu professorem theoricæ medicinæ affirmantem, medicinam esse prudentiam: ac denique ea est omnium vox, medico opus esse prudentiâ: idcirco accuratè discutendum est, an simpliciter, vel quadantenus ejusmodi sententia recipienda sit, hinc enim nonnulla ab Hipp. præclare dicta intellegimus: aliaque medicinæ tribuimus, quæ integrè, & luculenter ejusdem naturam omninò circumscribunt.

Ut igitur, quæ proposita sunt, faciliè absolvam, adnoto prudentiam bifariam accipi, nimirum simpliciter, & secundum quid. Prudentia simpliciter est unus ex habitibus intellectus, quos in eth. enumerat Arist. à cæteris longè diversus, cujus propterea materia subiecta distincta est, & finis pariter alius. Materia prudentiæ sunt actiones humanæ, & quæcunque agi possunt ab homine: finis verò est felicitas hominis in quantum homo est. Medicina non est prudentia hac ratione, & simpliciter explicata, versatur enim circa hominem, quatenus, à causis externis, & internis à sanitate ad morbum, & à morbo ad sanitatem mutatur. Hinc finis medicinæ non est bonum principalissimum hominis, ut homo est, sed particulare, id est sanitas. Hinc etiam prudentia, & medicina circa eundem hominem diverso modo versantur; prudentia enim versatur agendo, medicina faciendo: actio autem, & factio differunt; quòd factio tendit ad finem, & bonum rei factæ, & principium faciendi est in eo, quod facit, non in eò, quod fit, ut dixi etiam superius: v. g. principium artificiale sanandi est in medico, non in eò, qui sanatur, & sanitas quoque est in homine sanò, non in medicò sanante. Actio è contra non est semper à fine distincta, sed ipsa plerumque est finis: & principium actionis est in eo, qui agit, quemadmodum contemplatio veritatis est finis contemplantis, & principium contemplationis est in eò, qui contemplatur.

Prudentia secundum quid ea est, quæ circa aliquam singularem materiam alicujus facultatis occupata, bonum

ejus particulare, quoad fieri potest, acquirendum sibi proponit; & hîc pactò medicina aptè dicitur prudentia secundum quid, quòd tota est in facienda sanitate, quæ est bonum hominis particulare. Si prudentiam ergò secundum quid citati doctores accommodent medicinæ, admittendi sunt, eorumque sententiam sic emendatam recipio: qua ratione Arist. etiam errorem Socratis, dicentis, *virtutes morales esse prudentiam*, emendavit inquit, *cas non esse prudentiam*, hoc est simpliciter, sed non sine prudentia, sive secundum quid. Cum igitur medicina aliquam prudentiæ speciem præ se ferat; ea etiam, quæ prudentiæ propria sunt, quodammodo sibi vindicat. Quocirca non est ab hac tractatione remotum, medicinam cum prudentia comparando, ejusmodi similitudinem latè prosequi: hoc enim plurimum facit ad naturam ejus, ac dignitatem illustrandam, ac ostendendum etiam, quanti sit verum esse medicum; hoc est quot, & qualia sint ea, quibus futurum medicum oportet esse institutum.

Quemadmodum ergò prudentia consultat de iis, quæ felicitatis gratiâ agenda sunt, quoniam agibilia habere se aliter possunt: sic medicina consultat circa factibilia contingentia; quoniam sanitatis instrumenta non sunt definita, ac certa: sicuti prudentia ex pluribus mediis eligit consultando, quæ efficaciora sunt, & citò, ac tutò ad finem perducunt: ita medicina per consultationem eligit, ex remediis, quæ facilia sunt; tutiora, & minùs molesta comparandæ causæ sanitatis; atque adeò in utraque facultate eadem est ratio consultandi. *Consultatio enim est quadam rectitudo consilii per media congrua fini, & tempore convenienti*: in prudentiâ quidem gratiâ boni simpliciter; in medicinâ verò causâ boni particularis, id est sanitatis.

Ampliùs sicuti de materiâ prudentiæ non est cujuslibet consultare; sed viri longo rerum usu periti, qui mores hominum multorum vidit, & urbes, quod de Ulyssæ canebat Homerus; quique ex memoriâ præteritorum, & cognitione præsentium futuris prospiciat: sic etiam in medicinâ non est cujuslibet consultando deliberare, at senioris, plurimâ rerum experienciâ à multo tempore instructi, qui præterita cum præsentibus componendo, non solum quid hîc, & nunc fieri opus sit, sed quoque quid faciendum in posterum rectè decernat.

Tandem similitudo inter prudentiam, & medicinam maximè cognoscitur ex virtutibus, quæ prudentiæ conjunctæ sunt, eadem enim etiam medicinæ conveniunt, ut clarè patet singulas recensenti. Virtutes ergò annexæ prudentiæ sunt, Synesis græcè, latinè Sagacitas, vel Perspicacia; altera verò, quæ græcè dicitur Gnome, latinè Sententia vocatur.

Synesis seu perspicacia est vis quædam benè judicandi quid rectè, & opportunè fieri possit ad finem comparandum; ideo hujusmodi virtute præditi perspicaces appellari solent, & perspicaciæ contraria est hebetudo; quia mente hebetes nequeunt benè judicare faciendâ.

Gnome, vel sententia est vis quædam cognoscitiva; quâ quis rectè indicat, quæ præter ordinem causarum inferiorum eveniunt, & quid agere conveniat, dum casus aliqui insueti contingunt, vel ubi consueta media non conferunt; quod exemplo singulari faciliè declaratur. Sicuti præter justitiam legalem, quâ quid faciendum, & non faciendum constitutum est, datur æquitas, per quam in quibusdam casibus, & circumstantiis, vel facimus adversus legem, vel corrigimus, si non expediat, & congruat; vel addimus, si deficiat: undè definitur judicium æqui, ac boni viri, quo judicat quid sit faciendum, & addit ubi lex deficit, aut corrigit, vel benignè interpretatur, ubi non congruit tempori, & circumstantiis: sic Gnome utitur prudens qua judicat quid hîc, & nunc agere conveniat, vel in casibus non antea visis, vel ubi non eadem circumstantiæ, & accidentia concurrunt. Hinc nemo est, qui non videat, vel ex sola ejusmodi virtutum explicatione, quo jure eas quoque medicinæ



tribuat, & proinde quanta sit inter utramque facultatem analogia. Primò itaque medico necessaria est perspicacia, quâ judicet, & cognoscat non facienda tantummodo: sed etiam opportunitatem faciendi. Secundò solertia quædam, quâ citò non solum quidquid sensibus occurrat apprehendit, sed ex sensibilibus obscura coniectat, unum ex aliò colligit, & hinc festinè convolat ad inventionem remedii. Solertas enim, ut benè definit Arist. *est inventio, in non perfectò tempore medii*. Tertiò necessaria est Gnome, vel sententia; nisi enim medicus benè sentiat de rebus suis, si quid accidit, præter consuetudinem, nec ampliùs visum, de quo nulla extet lex medica, vel si adest, non sit tamen apta tempori, & circumstantiis, nec ex tempore consulere, nec remedium invenire, nec ad causas effectus revocare subitò valet, sed rei faciendæ, ac deliberandæ inscius est, & incertus, nisi mente valeat, & judicio. Quamobrem tunc medico maximè convenit æquitas, quâ sicuti iurisprudentes in justitia civili, sic in re suâ aliquando secus, ac præceptum est, medetur, vel præceptis addit, vel corrigit, vel moderatur; nulla enim lex, nullumque præceptum adeò commune est, ut omnia singularia comprehendat, quæ cum infinita sint, & multiplicium accidentium concursû varia, nec à legis conditore, nec ab omnibus simul acceptis hætenus cognita sunt. Ideò quò magis hoc arduum est, sic opus est medico perspicaci, benè sentiente, & boni, æquique judicii, qui rem præsentem intimè cognoscat, & quantum, & quomodo differat, vel conveniat cum iis, quæ ipse, & alii observarunt, & olim, prudenter æstimet, & quod maximum est, ex tempore valeat discernere, quæ circa hoc singulare, hîc & nunc facere magis expediat. Hanc ob causam Arist. 3. Polit. improbat ægyptios, qui rata, stataque lege præcipientibus medico, *ne moveret ante tertiam diem*; siquidem ex vario accidentium concursû sæpè fit, ut aliquandò antè, aliquando multò post tertiam diem, nonnunquam etiam nulla movere medico liceat; undè divus Tho. in commento scitè dicit, *non esse semper tutum, & certum ex scripto mederi*.

Cæterum ejusmodi virtutes maximè pendent ab imaginatione, quam Arist. ideò appellat intellectum singularem; quemadmodum enim est intellectus, qui fingit, & componit universalia, ita etiam in facultatibus practicis est intellectus, qui singularia cognoscit, invicem comparat, & distinguit, de quo egregiè Arist. multa tradit 3. *& hîc*. Necessitatis autem ratio ea est, quia facultates practicæ utuntur syllogismo, qui constat duplici propositione, prima universali, & altera particulari. Universale cognoscitur intellectu, particulare verò imaginatione, seu intellectu practico particulari, ut idem eodem loco fusè.

Ex dictis nonnulla Hipp. loca modò facilè intelliguntur. Primò cum lib. de lege ait, *ad artem medicam comparandam maximè omnium opus esse naturam; cum enim natura ad optima viam demonstrat, artis doctrina facile contingit*: & lib. de elegantia, *principalissimum omnium esse naturam; nam si hæc affuerit iis, qui animum applicant, per omnia penetrare poterunt*. Et tandem lib. de arte eos medicos posse morbos in profundò corporis latentes cognoscere, *quibus natura non infelix liberaliter accessu*: cum hæc, inquam, dicit Hipp. constat, nomine naturæ non intelligere partem illam hominis, quæ circa alimenta occupatur, & vel dormientibus nobis, semper in actu est: sed alteram longè superiorem, nimirum cognoscitivam, quâ apprehendimus primo res, quales sunt in se, deindè invicem comparando, an convenient vel differant sine errore discernimus, & ex similibus universale componimus. Denique ex cognitis ad ignota, & obscura discurremus; atque adeò ea est hujusmodi natura, quâ medicus sagax, perspicax, solers, & justus rerum æstimator evadit. Hinc fit, ut hujusmodi facultates dicantur esse à naturâ quia, ut docet Arist. non comparantur usu, sed ex naturali organorum institutione resultant, deinde

exercitatione perficiuntur.

Supereft, ut aliqua ampliùs, quæ spectant naturam medicinæ, dicamus, ut hujusmodi supplementa omninò sint absoluta, nimirum de officio, & fine medicinæ, quandoquidem hæc duo ab invicem antea sejunximus: de subjectò, de partibus, seu divisione, de ordine, & instrumentis & alia addamus etiam, quæ ad rem nostram facere videbuntur.

De officio medici, & medicinæ cum plura superius dicta sint, pauca hîc, repetendo potiùs, dicemus. Officium ergò medici primùm est, morbum, quoad licet, cognoscere; ex hac cognitione deinde procedere ad inventionem remedii, inventio autem, quæ methodo, & ratione perficitur, ut inquit Gal. 1. meth. med. constet qualitate, quantitate remedii, & utendi opportunitate; ubi hæc invenerit, fecit satis officio suo, & remedia, alioquin per se indifferentia, medici industria salutaria fiunt. Hæc de re extat aurea Gal. doctrina com. in 6. epid. quam propterea huc asserre non dedecet: docet ergò ibi, aliud esse materiam medicam, aliud præsidium. Materia medica est v. g. venæ sectio, cucurbitulæ, frictions, purgantia, clysteres, &c. hujusmodi. Auxilia medica sunt hæc eadem, non absolute, & quæ talia, sed auxilia fiunt à medico, cum iisdem utitur opportunè, inquit enim *quæ est igitur causa generationis auxilii; qui tempus reperit*. Quod verè maximè est officium medici, & medicinæ: Sanitas deindè sita extrâ medici potestatem.

Officio succedit finis, quem facilè statuo, esse sanitatem, & eadem facilitate quoque demonstro; nam acquisita sanitate, cessat actio medentis, suppositâ verò impossibili, nemo de agendis cogitat; at in hoc posita est ratio finis, ergò sanitas est finis. Ampliùs ex præcognitâ sanitate, quæ faciendæ sunt medicus investigat: undè tota medicinæ institutio ab hac cognitione pendet; & Arist. 7. metaph. disertè ait, *ex sanitate fieri sanitatem*, seu ex sanitate à medico præcognita fieri sanitatem in ægris; & in eth. finem esse mensuram, & regulam cæterorum ideòque ejusmodi sententia sancita est, præeunte Hipp. lib. præcept. ubi aperte dicit, *rectè autem, & convenienter agrorum cura suscipitur sanitatis causa: at sanorum, ut sine morbis vivant: quin etiam elegantia ergò*. Quibus indicat non solum communissimum medicinæ finem, sed etiam medicinæ partes, quæ ad eundem, non eadem, non tamen viâ perveniunt; nimirum conservatricem, quæ tuendo naturalem partium constitutionem, sanitatem conservat: curatricem, quæ depellendo morbos, recuperat: & Cosmetice, quæ ornatum corporis naturalem, vel redintegrat, vel tuetur.

Hofmannus, quia timet, ne unicus sit finis, atque adeò ne periclitetur unitas medicinæ, si diversâ procedamus viâ, asserit sanitatem unicum esse finem, quia ad illam eodem modò contendimus. Sive enim sanos tueamur, sive curemus ægros, semper procedimus corrigendo, emendando, & detrahendo, iisdemque propterea utimur instrumentis, venæ sectione, purgatione &c. verum in sanis corrigimus leviores lapsus in ægris verò graviores; quippè ea est latitudo sanitatis, ut corpus adhuc sanum sit, quamvis deflectat ab integrâ, & omnino perfectâ corporis constitutione, tunc autem ægrotat, cum ille recessus sic intenditur, ut erectum stare, & agere quæ sani agunt, minimè possit. Hæc quidem vera sunt & doctè, ac subtiliter dicta, quia verè semper etiam conservando adhibemus contraria, licet minora, & vacuamus pariter, vel purgando, vel mittendo sanguinem, quemadmodum facere, ægros curando, solemus. Nihilominus, etsi diversa verè sit ratio medendi in utrâque parte conservatrice, & curatrice: finis tamen semper est idem; sanitas enim sive conservata, sive recuperata, semper est eadem, ut patet; ideòque ars in universum est una, licet ex diversis partibus conflata: quemadmodum corpus est unum, quamvis partes diversæ sint, quæ diversis funguntur officiis, quoniam agunt gratiâ totius, &



& à communi principio moventur.

Hic quæret aliquis, quid nomine sanitatis intelligatur, an forma illa, quæ ex optimâ partium, & corporis constitutione resultat, vel ipsamet corporis constitutio. Brevi dico, sanitatem hic non intelligi formam illam superinductam corpori benè constituto, sed eandemmet constitutionem: siquidem finis ille verè dicitur, qui agendo acquiritur; at ad sanitatem, ut inquit Arist. in phys. non est motus, nec à sanitate, ut relatio est, accipimus rationem agendi: è contra à corporis constitutione deducimus inventionem remedii, & per eadem remedia, vel corporis constitutionem servamus, vel restituimus, quo, ubi ventum est, ab agendo cessamus. Hinc rejicimus eorum sententiam, qui putant integritatem, & robur actionum esse finem; hæc enim resultant; cum enim corpus benè constitutum est, integra, & perfecta vis agendi consequitur, & propterea nullam nobis præbent utilem indicationem medendi, sed tota ab ea, quæ physicè, & verè sanitas est, corporis constitutione dependet.

Sanitati ergò rectè subjectum conjungitur, de quò aliqua dicit Riverius, sed communia, nimirum, *esse reale, per se existens, cujus passiones, & proprietates medicina considerat*: sed omittit potiora, & magis necessaria. Verè enim corpus humanum reale est, & per se existens, passionibus & proprietatibus præditum: at cum sit aliis etiam facultatibus subjectum, præsertim utrique philosophiæ, naturali, & morali, erat amplius explicandum, quâ ratione spectet ad medicinam: ut enim dixi superius ex Arist. medicatur non simpliciter oculum, sed usque ad aliquid contemplatur. Nobis ergò supplenda sunt, quæ Riverius inconsultò prætermittit. Quocirca, ut quæ à me dicenda sunt, clarè, & facile percipiantur.

Dico, unamquamque artium mutuari subjectum suum à naturâ: statuarius ex. g. accipit marmor, faber ferum, & æs, architectus ligna, lapides, & cæmenta; illi tamen non considerant ea, ut omnino cognoscibilia sunt, sed quatenus apta nata ad suscipiendam formam artificialem, & ideo cognoscunt, ut agant; & quamvis subjecta realia sint, & per se existant, &c. nunquam tamen eas nomine scientiæ donamus. Ita medicina circa corpus humanum versatur, quatenus sanabile est, seu quatenus capax sanitatis ope suâ inducendæ, & conservandæ. Quare afferenda est particularis ea cognoscendi corporis ratio, quæ apprimè pertinet ad medicinam, quæque insinuet intentiones medendi.

Multi hæc de re multa dixerunt, sed nemo, nisi me ipsum fallo, corporis humani considerationem attingit; nam qui dicunt corpus, ut sanabile, vel ut subjectum sanitatis, & ægritudinis tradi medicinæ considerandum, afferunt physicam considerationem, non medicam: physicus enim contemplatur etiam sanitatem, & morbum quæ sunt passiones corporis naturalis, ut naturale est. Ideò missis, quæ dicuntur ab illis Hip. optimè omnium, & clarissimè docet quousque sit homo à medicò cognoscendus; inquit enim lib. de vet. med. refellens primò nonnullos ejus temporis medicos; *cæterum & medici & sophistæ quidam aiunt, quòd non potius sit medicinam cognoscere eum, cui exploratum non sit, quid sit homo, & quomodo primùm factus, & consociatus sit. Ego verò hæc, quæ ita de naturâ, dicuntur, aut scribuntur, sive à sophista, sive à medico, minus consentanea medicæ arti existimo, quam pictoriæ.* Verè enim nihil interest, medicum scire ex quibus principiis atomis ne, aut aliâ quâpiam materiâ compositus sit: undè Gal. in lib. meth. ait inanem esse hujusmodi pervestigationem, quia ex atomis nulla nobis indicatur ad medendum via. Item neque refert cognoscere, qui sit opifex corporis, quâ arte lineamenta ducat, & partium formam effingat, & alia hujusmodi, quæ merè physica sunt, & nulli sunt usui medenti. His refutatis, pergit Hipp. definiendo legem, ac modum, quo medicum oportet hominem nosse,

inquirens. *Verùm miki maximè, medici esse videtur, ut is in naturæ rebus exercitatus sit* ( in iis scilicet, quæ hominem afficiendo ab uno ad alterum statum sanitatis, vel ægritudinis mutant ) *utque omni studio annitatur* ( *si quid, quod facto opus est, præstabit* ) *ut percipiat, quid sit homo, collatione facta ad ea, quæ eduntur, & bibuntur, & quid à singulis cuique eveniturum sit; nec ita absolute putare, quod malum edulium sit caseus, verum etiam explorandum, quodnam incommodum afferat, & quamobrem, & cui humani corporis parti incommodus habeatur*; & post multa in eundem sensum scripta addit etiam. *Cæterum præter hæc necesse fuerit, ut rectè dignoscat quanam passiones dimanent ex succorum exsuperantibus qualitatibus, & viribus: quæ item ex figuris eveniant.* Præclare quidem his verbis nobis Hipp. indicat medicam hominis, quæ differt à physica, considerationem: quippè physicus in universum tantummodo cognoscit hominem, ut sanabilem, & ægrotabilem hanc ob causam, quia ab insitò principio mobilis est ad utrumque: at medicus cognoscit hominem à causis singularibus internis, & externis sanari, & ægrotare: item cognoscit singularem morbi speciem, & partem quoque cui talis morbus infligitur; ut patet exemplis ab eodem propositis. Unde physicus hominem absolute, medicus verò comparatè ad particulares causas afficientes, & alterantes cognoscit. Hinc intelligimus, cur medicus crassus, & sensatus artifex appelletur; quia nimirum non in abstractis, & à sensibus longè remotis, at in sensibilibus, & materialibus, totus esse debet; & propterea nimia subtilitas, quâ ab illis distrahimur, vel inanis est, vel obeat.

Illud notatū dignum superest, quod de hujusmodi subjecto dicamus, nimirum quò differat à subjectis artium cæterarum. Discrimen itaque est hujusmodi quòd aliarum artium subjecta merè passivè se habent ad operationem artificis: at homo non tantummodo passivus est, sed coagit: imò principaliter agit. Sanatio enim est naturalis affectio, quæ per se, & primùm est à natura, à medicò verò per accidens; ut inquit Arist. 2. phys. Hic dicta egregiè multa sunt ab Hip. scilicet *naturæ morborum medici*, quia propria cujusque natura, non autem communis aliqua singulis medetur. Item *natura sibi ipsi vias invenit, non ex intellectu, cum enim à nemine docta sit, nec quidquam didicerit, tamen facit, quod debet*; aliaque præterea à Gal. & ab aliis dicuntur, quæ tædio foret singula recensere. Cæterum, quæ sit ista natura, variè explicatur: aliqui enim temperamentum, alii calidum innatum intelligunt; mihi verò alia mens est, quam fusè aliò in opere patefaciam.

Hic etiam multa intelliguntur, primò cur medicus sit imitator, 2. contemplator, & 3. auxiliator naturæ. Est enim imitator, quia natura est primum agens, quod per se sanat, medicus verò per accidens, ergò sequi debet nutus ejus, & motum, & attentè observare, quò it natura, cum sui juris est, & dominetur morbo, non autem vel immaturâ medicinâ exasperare, vel aliorsum impellere; destinatæ enim sunt naturæ viæ, & tempus alterationum fatale. Quare nec ab iis declinare licet, nec intempestivè movere, & excitare. Hæc de causâ Hipp. propositis exemplis docet, quando naturam debet medicus imitari; inquit enim 1. Aphor. 2. *In perturbationibus ventris, & vomitibus spontaneis, &c.* (quid est naturæ rectè operantis deinde deducit imitationem, addens. *Sic & vasorum inanitio si talis fiat* (hoc est à medicò) *confert*, &c. eadem etiam sectione Aphor. 21. *Quò natura vergit, eò ducere oportet* &c. simul enim proponitur exemplum, & imitatio; & Aphor. sequenti ait, *concocta medicari atque movere cruda, &c.* sic enim agere natura solet, quæ ex Arist. ubique servat ordinem constantissimum; nimirum primùm coquit humores, deinde præcipitando separat excrementa, & tandem excernit; ideo sic etiam medicus, & peracta coctione vacuare debet:



Hinc intelligitur etiam dictum Hip. lib. de flatibus *medicinam maxime esse secundam naturam*, quoniam observat leges naturæ, & illud facit, quod per se, si posset natura faceret; quod alias rectè, & non impedita fecit. Et jure quidem medicus naturam sequitur, ac imitatur, cum enim sanatio sit motus naturalis, sanandi ratio accipienda est à natura, quæ per se sanat. Quò locò monendi sunt ii, qui novas excogitant medelas, & insolentem curandi modum longè diversum ab eò, quem dogmatica medicina, præmonstrante natura, confecit. Et hæc spectant ad medicum imitantem.

Spectator amplius medicus est, cum natura per se rectè operatur, & integrè sanat: tunc enim non est opus medicò, cum per se sufficit agens principale. Huc spectat Aphor. 20. ejusdem sectionis. *Quæ indicantur, & judicata sunt integrè, neque movere, neque novare sed sinere*, &c. ne tamen sit medicus vel eò tempore spectator otiosus; spectare enim debet naturæ motus, ut discat imitari aliquando, cum nequit eos per se impedita peragere.

Postremo medicus est auxiliator naturæ, cum ab insolentis materiæ vel oppressa, vel exagitata, vel quod movendum est minimè movet, vel secus movet, ac expedit movere. In hanc rem optimè cadit Aphor. 29. secundæ sectionis, *incipientibus morbis, si quid movendum videatur, move*, in quò multa attentè perpendenda sunt.

Primò Hipp. non absolute pronuntiat, sed hypotheticè, quòd scilicet versetur medicus circa materiam contingentem, & singularibus circumstantiis personæ, loci, temporis, ætatis, sexus, aliorumque symptomatum circumscriptam, quæ prorsus comprehendendi non possunt, quod benè idem significavit lib. de eleg. inquiring, *usus seu particularis exercitatio; non docetur*: & ideò quamcumque deliberationem medici prudentiæ relinquit, ita scribens, *si quid videtur movendum, move*, &c. & propterea superius dixi præter cæteras virtutes prudentiæ conjunctas, opus esse æquitate, seu boni, æquique viri judiciò, qui hîc, & nunc æstimet, an, deinde quid, quomodo, & quantum movendum.

Secundò dicit, *in principiis*, quia tunc temporis natura ab humorum copiâ laborans, velut onere pressa, nequit peragere motus suos, vel humor irregulariter motus naturam extimulat, & ad movendum, quò non decet impellit: ideò à principio naturæ laboranti farcina detrahenda, & aberrans reducenda est in viam, antequàm materia commota in aliquam partem decumbat, cui jam affixa, nullâ arte, vel difficillimè evocatur. Quamobrem Hipp. 1. Aphor. humores turgentes purgare jubet; & lib. de rat. vic. in ac. monet, ut vacuemus sanguinem in pleuritide, *antequam fixa sint omnia, quæ contristant*, & paulò inferius *donec elevati fuerint spiritus*, quia ubi ille fixus est, & omnino impeditus, nequit ducere humores, quantumcumque impulsus, & excitatus.

Postremo inquit, *augeſcentibus morbis, & in vigore quiescere melius est*; quoniam eò tempore natura mollior coctionem: coctio autem quiete fit, & à medicamento, vel quâcumque alia operatione, commotis humoribus, impeditur. Et hæc spectant ad medicum auxiliantem naturæ.

Alia etiam sequuntur ex eò, quòd natura primum sit sanitatis efficiens; quando enim à morbò victa est, non sunt admovenda remedia, quæ illâ, vel repugnante, vel minimè agente, irrita fiunt: deinde neque vulgus exigit à medico, ut citò curet, ne criminetur, si lentè, & tardè curatio contingat; in morbis enim jam factis, naturæ ductum sequi oportet; ordinemque quo illa procedere solet, imitari. Hâc de causâ Celsus lib. 3. de re med. non admittit sententiam Asclepiadis afferentis, officium esse medici, *ut tuto, ut celeriter, ut jucundè curet; ferè enim periculosa esse* (subdit ille) *nimia & festinatio, & voluptas solet*. In

aliis autem artibus quarum subiecta passiva sunt, spectatur tarditas artificis, ut celeritas, ex quibus prout opus ceſſerit, laudem sibi comparat, vel calumniam, quoniam in ejusdem potestate situm est, ut tardè, vel festinanter, benè, vel malè rem suam ipse conficiat: in medicò verò quidquid solum opportunè sit, commendatur; hujusmodi autem opportunitas cum celeritate, ut in acutis, aliquandò cum tarditate, ut in chronicis juncta est. Quare nec illos lentè, nec istos celeriter curare oportet.

De medicinæ divisione non est hîc quidquam dicendum; illa enim, quam affert auctor, vulgatissima est, & recepta communiter: tantummodo adnoto, partem Semioticam non videri ab aliis distinctam. Physiologia enim, & Pathologia cum nequeant in materiam propriam tutò penetrare, nisi præeuntibus signis, non videtur aptè alia pars, quæ de signis agit, distinctim ab istis esse ponenda. Dicendum tamen, signa particularia rerum secundum naturam, & præter naturam propria ad easdem medicinæ partes spectare, quibus ipsæmet res, de quibus agunt, subiectæ sunt: Ars autem inveniendi signa distincta est, & à cæteris separatim, tractanda: eam propterea appello topicam medicam, quia nimirum ostendit locos, & fontes, undè hauriuntur signa diagnostica, & prognostica singularibus undè subiectis, utriusque partis theoricæ, & therapeuticæ tandem applicanda. Et eodem prorsus modò se habet hæc pars Semiotica quemadmodum methodus medendi. Sicut enim alia est methodus universalis, quæ generatim docet rectam medendi per indicationes viam: alia particularis, quæ propriam cujusque morbi curationem instituit: ita quoque præter singulares morborum notas, & rerum naturalium signa, alia est ars, quæ docet in universum inveniendi modum; eaque in diagnostica, & prognostica distinguit, & rursus dividit in propria, & communia, aliasque differentias tradit, quas Riverius infra luculenter enumerat. Itaque ars inveniendi signa, sive topica medica, est pars medicinæ distincta, quâ multo ante informandus est medicus, ne cum ad singulares materias accedit, eadem repetere sæpè cogatur, quod accidit iis, ut monet Arist. qui prætermisiss communibus, à singularibus primùm ordiuntur.

De ordine, quò inventa est, quo traditur, & quò exercetur medicina dicamus; nimirum an sit resolutivus, vel compositivus: at quid uterque sit, primò dicendum.

Ordo compositivus definitur ab Arist. à *primis, seu principiis*: quoniam ab iis capientes initium ad principia proximè componentia, ac tandem contendimus ad ultimas species compositas, vel quod idem est, à causis ad effectus, & à simplicibus ad composita. Ejusmodi ordine ab Aristot. tradita est philosophia naturalis, quæ à communissimis principiis ad minùs communia, & per hæc ad proxima, & postremo ad ultimas corporum naturalium species accedit.

Resolutivus è contrà definitur, *ad prima*; vel quia compositum primùm confusè cognoscitur, deinde in partes dividitur, donec perveniamus ad prima, sive principia simplicia: unde quemadmodum compositivus est à simplicibus ad composita; ita resolutivus est à compositis ad simplicia. Vel dicitur, *ad prima*, quia incipit ab eo, quod primò quæritur, & definit in idem probatum, & cognitum, quemadmodum mathematici solent. Quare ejusmodi resolutivi ordinis rationem libentiùs accipio, accommodo medicinæ. Siquidem, ut inquit Blancanus, vera resolutionis ratio ex penitiori mathematicorum eruditione petenda est, penes quos resolutio est via à quæsito, tanquam concessio, per ea, quæ ex ipso consequuntur, ad aliquod certum, & concessum; quod sic ab eodem auctore optimè declaratur. In resolutione id, quod quærimus, tanquam verum primò supponimus: deinde quid ex hoc sequitur, consideramus, donec incidamus in ali-



quid jam cognitum, quod prius erat ignotum; idcirco mathematici huiusmodi processum appellant resolutivum: & hic etiam medicinarum, tum constituendarum, tum exercendarum mihi videtur esse maximè accommodatus, quemadmodum duplici exemplò demonstrabo.

Exemplum ordinis resolutivi in medicina constituenda est huiusmodi. Primum supponimus, sanitatem esse corporis affectionem, quæ homo bene valens ritè obit munia sibi à naturâ concessa: tum consideramus consequenter bonum quid esse: ex hac cognitione sequitur desiderium conservandi, cum adest, & quando abest, recuperandi, & ideò constituendi artem, quæ utrumque faciat. Cum verò neutrum possit unquam fieri, si ignoremus, quid illa sit, primum naturam sanitatis investigamus: ab hac ad morborum investigationem procedimus: & ex utrâque cognitione sanitatis, & morbi invenimus remedia: tandem, inventis remediis, redimus ad eandem sanitatem, vel conservandam, vel recuperandam. Quocirca ejusmodi ordo resolutivus est ab eodem in idem, ab eodem supposito in idem, vel demonstratum, vel factum: demonstratum in scientiis factum verò in artibus: in medicina enim à sanitate ad sanitatem procedimus, à sanitate primum supposita, deinde cognita, ad sanitatem conservatam, vel recuperatam.

Hinc patet ex ordine resolutivò, necessariò sequi compositivum. Postquam enim per resolutionem invenimus, quæ faciendæ sunt, & quibus, aut quomodò faciendum, mediis ipsis inventis, veluti componendo, facimus, quod primum inquirebamus: in scientiis autem speculativis, principiis per resolutionem inventis, ostendimus conclusionem, componendo demonstrationem. Quare mathematici investigationem principii, & medii appellant resolutionem, compositionem verò discursum, sive conclusionis demonstrationem.

Alterum methodi resolutivæ exemplum in exercendo medicinam, tale sit. Laboret quis febre, v. gr. febris verò, quia mala est, statim excitat intentionem curandi, & expellendi: cum autem expulsio fiat per contraria, accedit altera, scilicet inveniendi remedia: remedia verò quia inveniri non possunt, nisi præcognitâ febris natura; ideò in huius primum inquisitione medicus occupatur; & à symptomatis, ac formâ dignoscit, febrem esse passionem calidam: deinde verò, quoniam hic calor ex sanguine ab aliquò succò turbatò, & commotò resultat, qualis sit hic humor, & ubinam hospitetur, sedulus investigat. His igitur primò cognitis, statim occurrit remedium, & quid agendum sit, invenitur: & hic est terminus methodi resolutivæ, nimirum inventio remedii per resolutionem; ideò consultatio, quæ resolutione huiusmodi uti solet, definitur ab Arist. 3. eth. *medii idonei ad finem in rebus agendis inquisitio*. Tandem applicando remedium ad id, quod primò propositum fuit, ordine compositivò procedimus.

Cum ex dictis manifestè pateat, præcipuum medentis officium in investigatione positum esse, par est, ut instrumenta quoque critica, sive judicatoria, quibus medicus inquirendo utitur, proponamus, & explicemus: In primis itaque statuo quandoquidem medicinam dogmaticam profiteamur, esse duo, rationem, & experientiam, quibus longò intervallò distamus ab empiricis, qui solâ experientiâ nituntur. Verum cum experientia ratione sit naturâ prior, de ea primò multa dicenda sunt: primum scilicet ostendenda experientiae necessitas, 2. modus, quo fit 3. quàm difficilis, & unde oritur difficultas. 4. quid sit, 5. quomodò sola experientia conferat ad agendum: quò locò comparabo breviter empiricum cum dogmaticò, & experientiam cum arte.

Quod primum spectat, experientiae necessitas constat ex eo, quòd sicuti nec imaginari, nec intelligere quidquam possumus, nisi sensibus primum sensibilia exteriora cognoscamus, ita nec artes, nec scientias

condimus, nisi præeunte experientiâ; artes enim, & scientiæ, ut inquit Arist. 1. metaph. 1. *sunt, cum ex multis experimentalibus conceptionibus una de similibus opinio fit*. Hinc natura ea arte organa sensuum externorum composuit, ut vel invitis nobis à sensibilibus pulsantur, & afficiantur: idcirco Hipp. lib. præcept. sci-tè ait, *statuendum est, naturam à plurimis, ac omnigenis rebus moveri, & doceri necessitate quâdam*; sensibilia enim præsentia non possunt non movere, & afficere sensus; hi autem moti, & affecti docentur quodammodo, dum species ab objectis impressas ad interiores potentias tanquam semina futurarum cognitionum transmittunt.

Hinc sequitur modus, quo experientia fit, clarè traditus & explicatus ab Hipp. primum, deinde ab Arist. 2. poster. & 1. metaph. 1. qui propterea visus est à Francisco Patritio ab eodem Hipp. suppresso tamen nomine acceptus fuisse. Docet ergo Hipp. loco citato, rationem, sive iudicium simplex, aut discursivum, memoriam quandam esse, non formaliter; est enim ratio quiddam majus, & memoriâ superius: sed quia ex memoriâ sumit materiam judicandi, & discurrendi: idcirco addit, *componere ea, quæ sensû suere percepta*. Memoria autem fit, cum ab imaginatione suscipit rerum species; imaginatio verò à sensibus externis; unde hic est ejusmodi cognitionum ordo. Sensus externus *primam perceptionem externam sustinet*, seu primum à sensibilibus afficitur. Deinde verò *veluti delegator species rerum, quæ sensui subjiciuntur ad imaginationem traducit*; hæc verò *receptas species diu retinens, & conservans evadit memoria: quæ tandem utitur intellectu*: tunc enim, ut inquit idem, *si ex iisdem sensibilibus ratiocinatio, vel intellectus initium duxerit, in ejusdem potestate est, discurrere, & judicare, & ad veritatem perducere, rectè discurrendo, & judicando*. Verum minimè sufficit semel, & bis eadem sensibilia percipere, ut veram experientiam assequamur: sed ampliùs necesse est eadem sapissimè cognovisse, & omninò similia secundum speciem, & circumstantias temporis, modi, & alias huiusmodi; observareque diligenter inter se comparando ut similia à dissimilibus segregemus, quibus denique in penû memoriæ propositis, & asservatis, fit experientia, quæ suggerit intellectui materiam judicandi, & discurrendi. Idem ferè, compendiò, tamen repetit Arist. 2. poster. & 1. metaph. citato, ubi ait; *ex plurimis ejusdem rei memoriis experientiam unam confici*; cum enim intellectus per experientiam conficiat universale, quod est unum, & omnibus singularibus commune; necesse est prius ab iisdem singularibus similibus fuisse deductum; cum ipsa similitudo sit causa unitatis, & communitatis.

Hinc constat veram rationem, cum ortum habeat ab experientiâ, experientiæ quoque jungendam esse; *fit enim non ex sensibus comperitâ observatione*, inquit Hipp. *sed solum ex probabili rationis figmento profisciscatur, frequenter gravem, & tristem diathesin affert*, quoniam *viam inviam ingrediuntur*: (loquitur enim de medicis imperitis) ideòque lib. de eleg. in eundem sensum re-ctissimè scribit, *pulchra, ac decora est ex opere, quod quis usû, hoc est experientiâ, didicit, manans oratio*; quidquid enim artificiosè actum est, ex ratione perfectum est: quod verò artificiosè dictum est, at non ita factum, methodi ab arte alienæ symbolam existit; nam putare quidem non autem facere, ignorantie, & imperitiæ argumentum est. Cum enim ratio ab experientiâ sejungitur, *opinio quædam est: quæ maximè in medicinâ in crimen vertitur iis, qui ea utuntur; in calamitatem verò iis, qui ejus operâ fruuntur*. Hinc fit, ut ratio desinat quoque in experientiam, hoc est, ut discursus, & judicia rationis eo ipso probentur vera, quòd experientiæ congruant, & singularibus convenient; quocirca pergit Hippoc. & pulcherrimo exemplo demonstrat, *nam cum ob scientiam sermonum universalium sibi ipsis persuadeant, sese ipsam etiam artis opus*

singu-



*singulare novisse, non aliter, ac aurum adulterinum ab igne examinatur; ita eorum ignorantia hac professione arguitur.* Concludamus itaque rationem per experientiam sua sibi conficere universalia, eademque ad experientiam collocata probare. Idem etiam sentit Gal. 5. meth. inquit, *experientia rationi attestatur; quod idem sonat, ac experientiam rationi jungendam esse; nisi enim quod ratio dicat, ac docet experimento verum esse deprehendimus, ratio ipsa falsa est, ac nulla.*

Tertium ex propositis facile declaratur: nimirum difficillimum esse perfectam experientiam conficere ex qua subinde intellectus componat universale.

Experientia pendet à tribus ab homine, à tempore, & à rebus, quorum unum si desit, vel alterum, experientia nulla comparatur. Homo quidem requiritur, qui per sensus externos, & internos sensibilia cognoscens, est causa efficiens, & veluti experientiae architectus. Verum quia experientia est plurimarum similium cognitionum collectio, hinc unus homo non sufficit; imò nec plures, sed omnes simul consentire debent; at impossibile est, ut omnes simul consentiant; idè difficillimum quoque est, ut perfectam habeamus ab hominibus experientiam. Ad cognoscendum enim necessaria est quaedam proportio, & dispositio cognoscentis ad cognoscibile; sed omnes homines non sunt aequè dispositi, vel naturâ suâ, vel ob consuetudinem: naturâ quidem suâ, quia non est eadem in singulis hominibus organorum aptitudo; hinc non fit eadem in singulis objecti impressio, nec propterea idem omnium iudicium; eâ enim ratione homines de rebus judicant, quâ primum organa affecta sunt. Patet exemplò visus, & gustus: prout enim oculus affectus est, ita de visibilibus sentimus, & sæpè fit, ut plures homines circa idem visibile, non idem tamen sentiant, & judicent. Idem accidit in gustu; sicut enim lingua affecta est, ita iudicamus sapores; unde sæpè accidit, ut qui uni dulcis est, aliis videatur amarus, & è contra. Hinc Arist. optimè 2. metaph. dicebat, *difficultatis cognoscendi causam in rebus aliquando, aliquando verò in nobis ipsis inesse. Quemadmodum enim vesperilionum oculi ad lumen dici se habent; ita, & intellectus animæ nostræ ad ea quæ manifestissima omnium sunt.*

Consuetudine etiam homines non sunt aequè affecti ad idem eodem modò iudicandum; quemadmodum enim, inquit Arist. *consuevimus, ita iudicamus dici debere, & quæ præter hæc nobis accidunt, non apparent similia, sed quia non consuevimus, ignotiora, & magis peregrina videntur esse; quantam verò vim consuetudo habeat subdit idem leges declarant, in quibus fabulosa, ac puerilia plùs possunt propter consuetudinem, quàm si cognosceremus ea: ex quibus conflatur ratio; quia unusquisque iudicat magis verum, quod est sibi magis proportionatum; eò nempe pacto, quò propter variam affectionem gustuum, quibus proportionati sunt varii sapores, unusquisque saporem iudicat, eodem modò, & unum admittit, cæteros respuit.*

Hinc patet homines alicui sectæ addictos, & præoccupatos ineptos prorsus esse ad veritatem ab aliis, vel etiam per se ipsos addiscendam; & propterea qui sunt bonarum artium, & scientiarum cupidi, huiusmodi præiudiciis mentem exuant, necesse est.

Ex his patet experientiam à tempore etiam pendere; cum enim experientia vera ex sensibilibus, quæ nobis occurrunt, observatione tota sit; nec res omnes, effectusque sensibiles unò, eodemque tempore nobis se se offerant, opus est longâ die, annisque seris, quibus non semel, sed iterum, iterumque noscantur. Hinc dicitur tempus sapientissimum, & juvenes inexpertos esse; experientiam verò senum esse propriam, qui multa quidem viderunt, multa item audierunt; unde Euripides scribit, *non omnia adesse senectutis mala, sed hæc præcipuò bonò frui, quòd ob experientiam senes sapientius juvenibus loqui possunt: & eadem ex causâ, cum de agibilibus, contingenti-*

bus deliberandum est, senes, non juvenes consuluntur.

Postremò difficultas pendet etiam à rebus ipsis; quippe experientia cum sit multarum, ne dicam omnium, similium notionum per sensus exteriores in phantasiâ, & memoriâ collectio; necesse est, ut res eadem omnino nobis occurrant: at non semper eadem omnino nobis occurrunt: at non est semper eadem omnium species, & facies; quòd non est, quoque semper idem concursus temporis, loci, subjecti, circumstantiarum, & accidentium; adeò ut, si unum, vel alterum ex his muteatur, accadat, ut effectus, qui sæpè visus est, aliquando tamen non respondeat. Imò quæ quandoque videntur similia, à causâ tamen contraria proveniunt; unde Hippocr. scitè dixit, *similitudinem esse errorum causam, & Galen. similitudines, vel peritos decipere.* Quamobrem ubi, vel similia occurrunt, non idè statim fides habenda est, sed si illa vel à contrariâ causâ provenire soleant, causa ipsa introspectienda: tum verò, an verè similia sint, iudicandum, ex. g. Colicus dolor, & à calidis, & à frigidis excitatur; propterea si aliquod remedium uni profuit, vel etiam pluries, ubi novus accidat dolor, non est protinus ad simile remedium confugiendum: sed despiciendum primò diligenter, an à simili quoque causâ nascatur. Quare constat empiricam veram non sine aliquò rationis usû constare, atque adeò arduum esse, experientiam componere, quæ tandem viam muniat intellectui ad scientias, & artes constituendas.

Quartò, experientiae definitio, quæ superius quartò locò proposita est, planè conficitur. Ea verò mihi videtur aptissimè allata à Sexto Empirico his verbis: *Experientia est diuturnus quidam usus, & operans absque arte, & ratione positus in solâ observatione, & exercitatione: licet enim non sit verè usus, qui transit: attamen est habitus quidam permanens usû diuturnò comparatus; quoniam ut inquit Gal. 3. meth. Experientia longò usû opus est; Ideoque additur, positus in solâ observatione, & exercitatione.* Hinc enim gignitur experientia, cum circa singularia versantes, & pluries, ac pluries observantes similia, eorum tandem omnium meminimus: ex memoriâ autem stabili, ac firmâ demùm resultat habitus experientiae, qui propterea inest imaginationi, non intellectui. Dicitur autem operans, quia experientia, ut inferius ostendam, maxime facit ad agendum: Additur, *absque arte & ratione* quia, ut verè docuit Gal. 1. meth. *nec arte ulla, nec ratione nititur experientia: imò unius fortunæ favorem ad ea, quæ quarit, inveniendâ, requirit.* Ars autem, & ratio ab universalibus ad minus universalia, & usque ad particularia discurrit, nec quòd sit res, sed propter quid sit, causasque demonstrat.

Potest etiam ex his ita definiri. *Experientia est habitus imaginationis relictus ex plurimis memoriis singularium similium, quorum dum recordamur, procedimus ad iudicandum, quid hîc, & nunc sit agendum.* Unde constat, qui verè expertus est, plurimum valere memoriâ. Deinde experientiam non esse sine discursu à singulari ad singulare, qui vocatur ratio particularis, quotiescunque enim facimus aliquid, solâ experientiâ freti, à singularibus ad singulare discurrimus, dicendo, hoc hîc, & nunc facimus: quoniam in simili occursum aliàs eodem modò fecimus.

Postremò constat, quanti sit usus experientiae. Primò enim facit ad condendas scientias, & artes, quatenus intellectus per experientiam efformat universale, quod artis est, sicuti singulare est experientiae. Ex. g. *quod ex bile laboranti huic homini profit rhabarbarum, quod similiter alteri, & aliis sigillatim, experientia est: quando verò dicimus, quod omnibus confert, hoc est artis proprium.*

Confert etiam experientia ad agendum, ut enim agamus optimè, opus est cognoscere subjectum particulare circa quod, & præterea instrumentum, quò agimus; actiones enim sunt circa singularia, hæc verò solâ



solâ experienciâ noscuntur. Hinc fit, ut experientiam cum arte, & empiricum cum dogmatico comparemus.

Ars, ut docet Arist. 1. metaph. citato, excellentior est experientia, si tantummodo cognitionem spectemus, & modum, quo ad agendum illa procedit: quippè, inquit ille, & cognoscere magis inest arti, quam experientiæ. Ideo qui arte præditi sunt, sapientiores putamus iis qui solum experientiam habent. Artifices enim propter quid, & causam cognoscunt; experti vero sciunt quidem quod est, propter quid autem ignorant. Ratione etiam modi ars differt ab experientiâ; quoniam hæc à singulari simili ad simile, illa verò à principiò universalì, & causa ad agendum differt.

Verùm si referamus experientiam ad operationem, non differt ab arte, ut indicat idem philosophus: imò magis valet experientia, quam ars. Ideo fit ut medicus practicus, & empiricus aptior sit ad medendum, quam merè theoreticus, & dogmaticus; siquidem huic ille præstat, quia singularia, circa quæ actiones versantur, magis cognoscit empiricus, quam dogmaticus; adeo ut tandem constet empiricam multi esse faciendam, tanquam primam, ac magnam rationalis medicinæ partem. Dico, primam, quia, ut paulò ante explicavi, scientiis, & artibus universalium principiorum materiam suppeditat. Dixi etiam, magnam, quia multò plura sunt experientiâ cognita, quam ratione: & sæpè sapiùs nobis ad medendum viam magis aperit experientia, quam ratio. Verumque est ex Celfo, ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre, quam experientiam. Propterea Hipp. multa de empiricis præclare dicit lib. præcept. quæ huc afferre operis pretium duco: inquit enim, non esse cum empiricis ineundum de medendi ratione consilium, quia verè non utuntur ratione in medendo: sed solum confidenter petendum, ut remedia sua proferant. Hujus autem dicti causam quam pulcherrimam subjicit ipse his verbis. *Inquisitionis enim elegantis scientia apud hos dispensa reperitur. Et quamvis hi necessario sint indocti: assero tamen, exercitationem horum utilem esse posteaquam præceptorum cognitione fraudantur. Quis enim præceptorum multitudine varietatem se indagare posse speret, citra exercitationis constantiam; Quibus planè demonstrat, quòdusque nobis utilis sit empirica, qualis pariter esse debeat exercitatio, quæ ad usum artis traducenda est, & quâ demum ratione agendum nobis sit cum Empiricis. Utilis ergo est Empirica, quia dispersas nobis offert singularium observationes, ex quibus nobis est ampla ad comparandam artem via; cum è singularibus universales præceptiones, & axiomata elicere valeamus; quibus carent empirici, qui minimè utuntur ratione, sed experientiâ: ideò Hipp. prudenter adnotat, hujusmodi observationes, per quas ad universalia conscendimus, necessariò esse constantes seu pluries factas, & æquales; hoc est oportet, quæ dispersæ sunt apud empiricos ad universale revocare, similia à dissimilibus segregando, quod nequeunt facere empirici, qui solis singularibus hærent. Propterea concludit. Quare hoc monco dicentibus quidem istis auscultandum esse; at operantibus resistendum; hoc est accipiendæ sunt ab ipsis observationes, non autem permittendum, ut agant, quia nec ex observationibus ipsi suis præcepta constituunt, iisdem utendo, carent.*

Galen. verò non tantummodo fatetur experientiam utilem esse, & empiricos aliquid conferre, quod medicinam locupletet, & juvet, quemadmodum superiori sententiâ docuit Hipp. sed amplius tanti facit, ut hortetur eos, qui minus ingenio pollent, ut solâ experientiâ contenti sint, per quam possunt evadere in bonos medicos: ait enim 2. meth. c. 6. *licere ex empiricorum institutione bonis esse medicis; & si enim ratio semper querenda sit, eaque experientiam ornet, vel corrumpatur; eum tamen eam semper assequi nequeamus, (concludit) consulo igitur his omnibus experientiæ animum intendant: eum non leve instet periculum iis, qui supra vires aliquid moluntur, ne, & id non consequantur, & quæ intelligere aliàs possent, omnino*

Laz. Riverii Opera.

amittant. Et hæc de experientia, & empirica scripta satis. Qui plura desiderat Galen. adeat & ex recentioribus Verulamium, & Boyle, qui de experientia, & experiendi ratione quam præclare multa, & subtiliter docent.

Alterum cognoscendi, & judicandi instrumentum est ratio: hæc autem ex Hipp. 1. aph. 1. difficilis est: ideò ante omnia, cum sit opus mentis, & intellectus; quænam illa sit, deinde quænam sit causa difficultatis, ostendam, ut eam tandem discamus evincere, & enodare.

Cum ergo triplex sit mentis operatio, simplex nimirum apprehensio: secunda judicium simplex, quò res apprehensas, vel jungimus affirmando, vel negando sejungimus: tertia discursus, quo unum ex alio ratiocinando deducimus: Ratio magis in secunda, maxime verò in tertia consistit, hac enim potissimum, & effectuum sensibilibus causas, & medendi rationem investigamus: quippè ex præcognitis morborum, & symptomatum causis, remedia, & methodum utendi cognoscimus, unde intelligitur illud Hipp. lib. de art. pronuntiatum: *medicus siquidem suffecerit ad cognoscendum, sufficiet ad sanandum.* Verum non est eadem semper in omnibus cognoscendi difficultas: imò aliqua facile, & certò, alia difficulter, aliqua nullò unquam modò capiuntur: propterea Hippoc. optimè dividit morbos eos, qui in superficie, & alios qui in profundo corporis latent. Qui in superficie sunt, sese manifestè produnt, quoniam sensibus, maxime verò tactu, & visu deprehenduntur: quales præsertim à chirurgis tractari solent: ideò lib. de mediò idem ait, *turpe est non contingere à chirurgiâ, quod velis:* quippè cum tales existant, curatio facilis, ac tuta contingit. E contra se habent alii, cum enim sint à sensibus longè remoti, vix, & rarò longâ investigatione, & ratiociniò attinguntur. Quocirca Hipp. præter ea, quæ lib. de art. dicit, lib. de flat. etiam addit, *de non apparentibus, & difficillimis ægritudinibus opinio magis, quam ars judicat.* Causam autem difficultatis affert idem lib. de arte citatò; quoniam morbi intrinsecus latentes signis tantummodo deprehenduntur. Signa autem hæc non sunt propria, quæ per sese primò rem manifestent, sed plerumque communia, vel extranea: cum aliis item confusa, nec eadem perpetuò facie occurrentia: unde aliquando cum ad diversâ comparata, diversâ etiam demonstrent, serò ad morborum cognitionem pervenimus, & interim per longas investigationis moras tempus ad medendum opportunum elabitur: quod Hipp. his verbis complexus est. *Alia itaque ad alia & alia per alia sunt, tum quæ corpus pervadunt, tum quæ judicanti, ut proinde non mirum sit, & cognitioni multum temporis impendi, & actioni multum temporis decedere; quandoquidem tam peregrinis, & obliquis probationibus ad medendi scientiam medici perveniunt.*

Cæterum ut adversus hæc impedimenta aliquod sibi auxilium medicus paret, nonnulla hîc adnoto breviter, & quæ maximè tyronibus usui futura esse cognosco.

Primum ergo multum sese exerceant oportet: exercitatio autem utilis est cum attentione perpetuâ, observatione attentâ, & reflexione continuâ, quæ præsertim comparent effectus sensibiles, quos sæpè vident, & observant, non solum inter se, sed etiam cum subjectis ipsis, in quibus apparent, & occasionebus, à quibus proveniunt, & referant tandem ad ea quæ ex his consequuntur; quando enim vel in diversis subjectis, ab eadem tamen occasione producti, idem semper afferunt, habebimus loco signi genuini: at è contrâ, si vel in eodem subjecto sæpè appareant, vel in diversis, & ab eadem etiam occasione sint, non tamen idem semper sequatur malum, signa prorsus communia censentur: ideò sicuti ex propriis certò nobis ratiocinari; ita minimè ex communibus licet. Quamobrem communia cum aliis jungenda sunt, & ex

†††

plurimum



plurium concursu facta syndrome, ut sæpe medentibus accidit, poterunt, aut verum, aut verosimile saltem attingere. Ideò in duo genera ex Hipp. dividuntur signa; alia enim dicuntur *Τεμνύρια*, sive indicia: alia *σπεύζα*, sive simpliciter signa.

*Τεμνύρια*, certa sunt, & per se eodem perpetuò significant; aliqua autem ex his sunt bona, alia mala: quæ bona, semper & ubique bona sunt: quæ verò mala, semper, & ubique mala, ut inquit Hippoc. in prognost. Semper bona sunt signa coctionis: semper autem mala sunt signa cruditatis. Alia sunt signa communia, quæ quandoque bonis, quandoque malis junguntur. E. g. rigor aliquando malignus est: aliquando criticus: malignus est lethalis; agrò existente jam debili, ut ait Hippocrat. in Aphor. criticus ex eòdem febrem ardentem solvit. Itaque ex primis folis tutò; ex aliis non nisi conjunctim, & in syndromem collectis probabiliter ratiocinamur. Itaque Tyro, vel quicumque sit, diligenter observet quid in quo, quod ex quò, & quid cum quò appareat, & consequatur. Verum, quoniam aliquando unum magis, vel minùs significat; vel plures interdicit aliquandò ejusdem effectus causæ, ut cum v. g. in eòdem morbo vel plura apparent indicia, vel multa adhibentur remedia (quorum, dicebant empirici interpretantes Hipp. ex Galeno. 1. Aphor. 11. judicium esse difficile) ut certò internoscamus quodnam ex illis morbum evicerit, & ex signis qualem magis significet, utendum hâc arte: nimirum observanda attentè sunt separatim eadem remedia, & signa; hinc enim eorum vis clariùs apparet, eaque quanti valeant certius cognoscimus. At quia nemo sibi satis est, ut antea dixi cum de experienciâ tractarem, legat amplius oportet probatos authores, quia experimenta multa, & observationes suas redegerunt in commentarios, perpetuò tamen sive per se observando, sive aliorum observationes legendo recogitet, & utatur comparatione. Hoc enim potissimum est quod judicium in rebus medicis sæpè fallit ac reddit incertum; cum nihil eorum quæ agimus absolutum sit, sed ad aliquid; Hippocr. lib. de alim. scilicet evariat respectu corporum, ætatum, sexus, &c. & præsertim Idiosyncrasiæ. Sic etiam Avicen. lib. 1. can. fen. 1. &c. docet alimentum, & medicamentum esse ad aliquid, quod idem Hippocr. etiam singulari exemplò indicavit lib. de vet. med. inquit, *non esse absolutè putandum quòd malum edulium sit caseus; quia non omnibus hominibus injurius est, sed sunt, qui eò planè nihil, & ne tantillum quidem incommodi sentiunt, imò tenuibus mirum in modum conferre animadversum est; sunt iterum alii, qui agrè ejus defunguntur molestiis*; & hinc propterea fit, ut nonnisi multò labore, & tempore ad qualemcumque rei medicæ cognitionem proveniamus & nemo tam validæ mentis sit, & fortis judicii, ut in tanta varietate, semel, & bis, ne dicam pluries deceptus, alios etiam malè judicando non fallat.

Alterum rationis adversus impedimenta, & difficultates auxilium est Analogia; quotiescumque enim, vel in physicis insolens aliquod phænomenon, vel in medicis incidit novum aliquod morbi genus, tunc ratio incerta judicii ad analogiam sese recipit, seu à simili ad simile transitum. Eam in primis in usu habuit Hippocr. & docuit amplius lib. de diæta, quàm apta sit ad cognoscendum. In eâ Democritus plurimus fuit, Arist. etiam passim usus est in physicis, eth. & polit. Neoterici tandem nihil potius habent analogiâ; cui propterea Keplerus nobilis mathematicus multa se debere ultrò professus est. De ejus usû in rebus medicis aliqua non contemnenda tradidit Dominicus Sala professor olim medicinæ theoricæ Patavinus libr. de arte med. Hic ergo, & ego indico tantum methodum, quâ benè potest institui, & quâ quisque per se commodè utatur in praxi.

Primò medicus observet attentè effectus, & passiones, quæ ex morbo accidunt corpori humano, occasionem,

unde, & modum, quò fiunt, sæpe enim effectuum, occasionis, & modi similitudo, causæ quoque similitudinem arguit. Item consideret exitum, & rationem, qua morbus, vel solvitur, vel occidit; hinc enim non tantummodò causa mali, sed remedium etiam apparere solet.

Secundò operationes artium mechanicarum, & modum, quo illæ operantur, spectare oportet, ex quorum similitudine sæpe quoque opera naturæ cognoscimus, ideò sæpè Aristot. & neoterici frequentissimè exemplò artificialium, quæ à naturâ sunt & fiunt, minime inconcinne, & ineptè declarant: ea autem est hujusmodi analogiæ ratio, quia ars, ut inquit philosoph. 2. physicor. imitatur naturam. Quidni ergo ex operibus artis, quæ imitando naturam fiunt, licet de naturalibus etiam ratiocinari? Lege Hippocr. lib. de diæta, ex quo habebis primùm elegantissimam hujus analogiæ causam, & plurima artium exempla quibus medicas operationes demonstrat.

Pestremum, & omnium, maximè ab experimentalis philosophiâ analogia petenda est, quæ lucem plurimam medico, & ad cognoscendum, & ad agendum accendit, ut infra latè monstrabo. Verum quia similitudines sæpe decipiunt, ut superius indicavi; ideò non est cujusque analogiâ, & similitudine uti: sed opus est virò peritò, & exercitatò qui præsertim combinationem, & comparisonem calleat, quibus si fortè caret, nunquam se posse speret ex analogiâ, tutò, ac certò ratiocinari; non enim perpetuò securus est usus analogiæ: nec tamen semper inanis, ut optimè Celsus, locò citatò in præmiò inquit: *neque semper similitudo aliquid confert, & si quando confert, tamen id ipsum rationabile est inter multa similia genera, & morborum, & remedium cogitare, quò potissimum medicamento sit utendum.*

#### DE CERTITUDINE MEDICINÆ.

**A**rist. 1. eth. dicit non esse perpetuò exquisitam omnino in singulis facultatibus certitudinem expectandam, solummodo eam, qualem patitur subiecta materia; ideò 2. metaph. docet diversos esse gradus certitudinis, & unamquamque facultatem habere suam, non autem eundem, & omnino æqualem; propterea non est abs re hîc diligenter æstimare, & veluti ponderando metiri certitudinem medicinæ. At quærenti fortè, quorsum hæc inquisitio? Respondeo, gratia Tyronum, quibus hæc potissimum scribo, ut antea commoniti, quanti debeant rem medicam æstimare, ne plus, quàm par est confidentes omnia arti tribuant, & suprâ vires moliantur: nec vanis pollicitationibus spem erigant ægrotantis: vel è contrâ ne omnia pro incertis habentes omnino desperent. Est enim sua medicinæ vis, & sæpè mirabiles successus habet, quibus suam hominibus facultatem ostentat: ideò seduli studiis incumbant multò labore, & diligentia continuâ, ut difficillimam alioquin artem, quoad licet, adipiscantur.

Primùm ergo, ut rem propositam absolvamus, distinguendus est triplex gradus certitudinis: alia enim est certitudo moralis: alia physica: alia mathematica. Certitudo moralis omnium minima est, ut egregiè docet, & explicat Arist. 1. eth. 3. cum enim primùm ostenderit, non esse exactam in singulis disciplinis certitudinem, se propterea moralem minimè exquisitè tractaturum, indicat his verbis. *Contenti igitur erimus, si nos, cum de talibus, & ex talibus differamus pingui quâdam minerva, atque adumbratâfiguratione verum ostendamus; cumque de iis, quæ plerumque eveniunt, atque ex iis ratiocinemur similia etiam concluderimus*: quod idem est, ac si diceret, materia moralis solum capax est certitudinis imperfectæ; quia res morales variantur secundum circumstantias particulares; illæ enim actiones, quæ in aliquibus circumstantiis sunt honestæ, ac justæ, in aliis sunt inhonestæ, atque injustæ; adeò ut de honestis, ac justis, de bonis, ac malis apud varias sectas, & nationes tanta sit opinionum diversitas, ut quidam putaverint,



putaverint, nihil esse honestum, vel inhonestum, justum vel injustum ex naturâ rei, sed solum ex lege, per quam quædam fuerunt prohibita, alia verò præcepta. Physica major est, sed, mathematica minor: res enim physica non perpetuò, sed plerumque certæ sunt. Mathematica tandem omnium maxima est: ideò explicemus utramque ut noscamus tandem, utri certitudo medica accedat.

Aristot. locò citatò docet, res physicas non esse perpetuò veras, & certas, quia sunt in materiâ, mathematicas verò, quia abstrahunt à materia, semper esse easdem omninò. Ratio discriminis est, quia materia variè afficitur, & mutatur; unde non respondet semper agenti eòdem modò disposita, ac parata, ut ex eâ perpetuò similem producat effectum. Amplius, cum efficiens versetur inter contraria, aliquando à fortiori ita impeditur, ut nequeat, in materiam, quantumcunque benè dispositam, similiter agere. Hinc fit ut aliquando aliter, & præter naturam eveniat, ac sæpè soleat accidere. E. g. ex institutò naturæ nascitur homo, quoties semen virile in uterum projectum recipitur, & fovetur: aliquando tamen oritur monstrum, vel quia malè uterus sit affectus, aut sanguis maternus inquinatus: vel tandem quoniam, his etiam benè se habentibus, spiritus gignitivus aliquâ ex causâ impotens fiat, adeò ut non sit perpetuò verum, ex femine virili, & maternò sanguine permixtis in uterò hominem nasci. Idem dicendum de reliquis, quoniam commune est omnibus corporibus naturalibus, ut passionibus non competant eis præcisè ratione essentia, sed amplius pendeant à materiâ, & moventibus, ac efficientibus causis. Secus autem se res habet in mathematicis; passionibus enim subjectis mathematicis conveniunt ratione essentia, & independenter à motu; ideò necessariò, & perpetuò conveniunt.

Modò constat ex his, medicinam; cum sit genus quoddam physica, eandem quoque certitudinem habere communem; nullumque propterea cujusvis authoris, vel etiam Hipp. pronuntiatum adeò firmum, ac sanctum esse, ut aliquando successu non careat suò. Medicus enim (quod superius etiam de physico diximus) versatur circa materiam, utiturque materialibus instrumentis; pendet amplius à tempore, & à circumstantiis loci, tempestatum anni, ætatis, & sexus, quæ omnia ita mutantur, & varia sunt; ut nequeat idem semper, & eòdem modò de singularibus subjectis sentire, & prædicere, ac etiam agere: nec eadem remedia ubique sunt in singulis æquè salutaria, & efficacia: quoniam efficiens sanitatis, sive principale, cujusmodi est natura, sive artificiale, qualis est medicina, sæpè impedita non idem, quod alioquin facerent, semper, & similiter faciunt.

Quod hætenus, & in universum, sumptis ab ipsa rei naturâ argumentis, & de certitudine medica disseruimus. Hippocr. mirum in modum confirmat iniquiens libr. de locis in homine. *Medicina ciud addisci nequit, propterea quod stata, ac certa, doctrina in ipsa tradi non potest v. g. qui scribere didicit eòdem modò quò omnes docent, omnia novit, & qui sciunt omnes, simpliciter noverunt.* Addit rationem elegantissimam; propterea quod idem est, & similiter fit, & nunc, & non nunc: neque contrarium fieri potest, sed semper, & jure quid simile est, neque indiget occasione: medicina verò, & nunc, & paulo post non idem facit & in eòdem contraria facit, & hæc etiam sibi ipsi contraria. Primum alvum subducentia non semper hoc faciunt, & alvum subducentia utrumque faciunt &c. Ratiocinatio itaque Hipp. est hujusmodi. In aliis artibus, ut in scriptoriâ v. g. doctrina certa est, ac firma, quia subjectum, nempe papyrus, vel id genus alia materia semper eadem est, & ratio quoque scribendi eadem: nec ad scribendum expectamus tempus idoneum. Quamobrem qui semel didicit artem scribendi, semper, & eòdem modò scribit. At secus se res habet in medicinâ, cujus subjectum, sive corpus humanum non est semper idem, ac agendi etiam ratio non est ab-

Laz. Riverii opera,

soluta, sed cum exerceatur in singularibus, & pendeat à tempore, est alligata occasione: occasio autem quam brevissima est, ut ait idem locò citatò: *& qui hoc novit, illi stata, ac certa est ars; fecit enim quæ similia sunt; quæ dissimilia, in quibus cognoscendis occasio medica consistit: at hæc nosse, subijcio ego, semel, aut bis, ac ne vix quidem exactè, nulli ferè concessum.*

Inquiet verò aliquis. Idem Hipp. locò citatò ait, *medicina mihi jam tota inventa esse videtur ita se habens, ut doceat singulas, & consuetudines, & occasiones, &c.* & libr. de vet. med. *medicinæ autem jam cuncta ab antiquo insunt, & ejus principium, & via inventa est, per quam, & multa, & vitæ utilissima longa die deprehensa sunt, & reliqua deinceps invenientur, si modò quis aptus fuerit, & inventorum gnarus, hinc ad reliqua pervestiganda proficiat. Quicumque verò omnibus his rejectis, ac reprobatis, aliâ viâ aliâque formâ investigare conatur, & quid invenisse se glorietur, fallit, & fallitur; fieri enim nequit, &c.*

Respondeo hæc quidem esse verissima: iis tamen non probari unquam medicinam esse omninò certam: Hippocr. enim tantum demonstrat, medicinam ex ratione, & experientiâ, quæ sunt duo comparandarum artium instrumenta fuisse constructam, quia ex singularibus observationibus sæpè sæpius factis universalia principia, & axiomata composita sunt: propterea addit, quicumque aliam viam ineuntes, se artem composituros esse præsumunt, & fallere, & falli: quemadmodum imperitè satis nonnulli ejus tempestatis sophistæ putabant, hypotheses malas sibi proponentes, quibus medicinam inædificabant, ut eò loci videre est. Hinc tamen non sequitur: ergo medicina perpetuò certa est: solum modo ejus est certitudinis, qualem dare potest subjecta eidem materia. Eòdem quoque modò moralis, & prudentia habitus quidam est, è suis ipsè principiis compositus, & formatus, non ideò tamen omninò certus. Recole dicta superius, quæ præsentia plenè ac plenè confirmant.

Replicabit fortè etiam; Aphor. Hipp. quibus innixa est medicina, certissimi sunt, & nemine contradicente, veluti oracula admittimus: ideòque eorum author tantum habitus, & habetur ab omnibus, ut eis repugnare nullus unquam audeat. Quod si Hippocr. autoritatis suspecta est, & incerta doctrina, de arte medicâ actum esse videtur, cum authore careat suò, & principiis parum tutis, & nutantibus innitatur.

Hoc argumentum imperitorum est, qui nequeunt res medicas & physicas æstimare ignorantque intellectus humani naturam, qui cum sit imbecillimus, nec semper certus, non possunt non ejus etiam opera, cujusmodi sunt artes, & scientiæ, aliquò vitiò laborare. Ideò paulò fufius respondebo, ut antea moniti deinceps melius sentiant, & boni rerum medicarum judices fiant. Aphorismi itaque ut de iis primò dicam, certi quidem sunt; ac certitudine physica, eosque propterea plerumque ut inquit Scaliger, ad assensionem nostram non admittimus, quòd aliquando frustrantur votò suò. Ne verò gratis à me dictum esse videatur, unò, & alterò exemplo confirmo. *Mulier gravida*, inquit Hipp. *venâ sectâ abortit* 4. Aphor. at tamen pluries detrahimus sanguinem gravidis, non modò laborantibus morbo, sed etiam abortum impediendi causâ; præcavetur abortus, & gravidæ calamitatibus liberantur. Item *mulier, ni menstrua defecerint, & eunuchi quoque podagra non capiuntur*: nihilo tamen minus, & mulieres, & eunuchos podagra conceptos vidi, & ex iis unum podagra tandem obisse convulsus. Idem de singulis omninò dicendum; quoniam aphorismi sunt propositiones physica, quarum veritas, cum non pendeat omninò, & præcisè ab essentia rei, quemadmodum mathematicæ, sed ab efficiente, & materiâ, suò sæpè destituuntur eventû.

Quod spectat autoritatem, dico, eam duplicem esse divinam, & humanam. Divina infallibilis prorsus est, quia Deus nec falli potest, nec fallit: è contrâ autem humana,



quoniam est ab homine, *cujus oculi*, ut dicebat Arist. *instar vesperilionum, vel ad manifestissima naturæ se habent*: propterea, & fallit, & fallitur. Hinc argumentum ab autoritate humanâ ductum probabile tantum est, & omnium probabilium infirmissimum: Hippoc. ergo autoritas cum humana sit, non est semper expertis erroris, & ideò, & ipse se deceptum fuisse ingenuè professus est, aliisque ejusdem authoris errata, notarunt, correxerunt, aut interpretamentis suis, gratiâ tanti viri, ad bonum sensum revocare conati sunt. Parvi ne igitur, dicet aliquis, faciemus Hippoc. minimè ego; sed magni, imò maximi, & ubi non repugnat ratio, vel experientia omnibus antefereendus; ut enim inquit Arist. 3. eth. *in praxicis non minus habenda est ratio de opinionibus prudentum, & expertorum, quàm de demonstrationibus; quia prudentes, & experti adepti sunt firmam de principiis agibilibus cognitionem, adeoque de agendis*. Hippocr. verò ejusmodi fuit, qualem nobis Vetulus lib. hist. vitæ, ac mortis præclare commendat: nimirum *medicus insignis, qui artem suam tam longâ vitâ comprobavit, & honestavit Vir cum prudentiâ quâdam doctus: in experientia, & observatione multus: non verbò aut methòdo captans, sed nervos tantùm scientiæ separans, & proponens*. Cæterum quantumcunque hæc vera sit, non præstat tamen ad ejus semper autoritatem nosmet recipere, quamvis enim medicinæ veram inveniendæ, confirmandæ, & perficiendæ methòdum scitissimè nobis tradiderit, plura item invenerit; non omnia tamen ipse novit, nec potuit ex naturæ obscuritate veritatem omnem eruere, sed plurima posteris invenienda reliquit; dummodò methòdi à se traditæ gnari sint; & observatores egregii, locò citatò de vet. med. imò non solum modo multa ignoravit, sed etiam (quod commune hominum vitium est) erravit aliquando, & declinavit à vero. Hic ergo velim, homines intelligere, quod fieri non possit unum, & invenire, & perficere, atque adeò novisse omnia ejus facultatis, *cujus author habetur*. Eorum omnium, quæ sunt, alia à naturâ sunt, alia verò ab arte: quæ sunt à naturâ ea tota semel, & perfectè fiunt; quoniam author est Deus, ut inquit Galen. 1. de usu part. optimus, sapientissimus, & potentissimus: quæ verò ab arte sunt, imperfectè primum ab unò, deindè paulatim, accedentibus studiis, augentur, donec progressibus multis tandem perficiantur, non tamen omninò; nulla enim ars adeò suis numeris absoluta est, ut nihil addi, nihilve unquam detrahi possit. Idèò non tantum facere debemus eos, qui nos præceperint, ut nihil nobis relictum esse putemus ideoque velimus ultrò amittere potestatem judicii: at cum homines pariter simus, nemini serviamus, sed utamur eadem intellectus facultate, & libertate: nam ut ab hac rem apposuit Seneca epist. 27. *non sumus sub rege, quisque sibi se vindicat*. Hujus autem sententiæ ea est potissima ratio, quod artes, & scientiæ duobus maxime instrumentis fiunt, experientia, & judiciò; experientia verò fallax est, & judicium difficile; quare ut eis invenimus, ita istem quoque & fallimur, & fallimus: propterea opus est tempore, nec uno, sed pluribus qui experiantur, & judicent, & ut supra latè probavi, & ideò disciplinæ omnes filie temporis appellantur; cum enim, ut idem Senec. *natura nobis semina scientiæ dederit, scientiam non dederit*, semina hæc multo tempore facta ferò postremò partus emittunt. Quæ hæcenus dicta sunt eleganter ostendit Arist. 2. metaph. 1. qui probat à signò speculationem de veritate esse difficilem, quia neque satis eam aliquis consequitur, neque aberrant omnes ab eâ, sed quisque aliquid de naturâ dicit, & singuli quidem nil, aut parum ei addunt: ex omnibus verò collectis aliqua magnitudo fit. Itaque nemo per se solum potest veritatem rerum investigare, sed parum de suo addere scientiis, & artibus, ut tandem ex omnibus simul magnam proveniat incrementum. Propterea idem Aristot. paulò infra dicit, *non solum illis agendas esse gratias; quorum opinionibus quis acquiescet, sed illis, qui superficie tenus dixerunt, conscrunt enim aliquid etiam isti, habuimus namque nostrum excercuerunt, & fuerunt in causâ, ut quam ipsi non potuerunt assequi, posteriores veritatem assequerentur*. Ut ergo eò redeamus, quod superius demonstrandum suscepimus, Hippoc. non tamquam dominum, sed ducem sequamur, veneremurque ut inquit Gal. tamquam authorem bonorum omnium, non absolutè, sed eorum quæ ab antiquitate profecta sunt. Ipse enim primus, ut inquit Celsus in præmiò de re medicâ, *ex omnibus memoriâ dignis ab studio sapientiæ disciplinam hanc separavit vir, & arte, & facundiâ insignis. Vel ex Plinio lib. 29. medicinam revocavit in lucem, cum multò antea in nocte densissimâ latuisset*; ut jure plurimum illa, & nos quoque debeamus Hippoc. qui omnium optime viam, qua ad medicinam eundum est, præmonstravit; solidissimæque superstruendæ arti fundamenta jecit. Nihilò tamen minus pro ea, quâ præditi sumus ingenii vi, & libertate exercere licet studia nostra, addendo si fieri potest, quæ adhuc inter desiderata sunt; & si quos errores offendimus, corrigendo, & emendando.

Instabis tandem Gal. 1. meth. cap. 4. docet medicinam instar mathematicarum scientiarum procedere, & in his omnibus, quæ in eadem monstrantur, ad primas, & indemonstrabiles propositiones, & quæ ex se fidem faciant, omnia esse perducenda. Ergo, nisi Gal. nos fallit, non solum medicina certa est, sed plus, quàm physica, certa.

Resp. Galen. medicinam cum mathematicis comparare, non quoad certitudinem subjectæ materiæ, sed quoad ordinem procedendi. Debet enim medicus suas conclusiones usque ad primas propositiones per alias medias interpositas, probatas & demonstratas revocare: alioquin, nisi aliquid sit primum quoquo modo certum, & firmum, non est, quò medica conclusio nitetur. Cæterum hæc nunquam demonstratur ea certitudine, & evidentiâ, ac mathematicæ demonstrari solent: nec primæ propositiones medicæ, multò minus intermediæ, adeò certæ sunt, & inconcussæ, quemadmodum mathematicæ.

Etenim si forent hujusmodi, eadem reciperentur ab omnibus, nec adhuc nobis illud inculcarent ex Celsò in præmiò; nimirum, *incomprehensibilem esse naturam. Non posse verò comprehendendi patere ex eorum, qui de his disputarunt, discordiâ: cum de ista re neque inter sapientiæ professores, neque inter ipsos medicos conveniat. Cur enim potius aliquis Hipp. credat, quàm Erophiolo? cur huic potius, quàm Asclepiadi? si rationes sequi velit, omnium posse videri non improbabiles: si curationes, ab omnibus his agro perductos esse ad sanitatem. Itaque neque authoritati cujusquam fidem derogari oportuisse &c.*

Hinc licet ostendere, medicinam esse conjecturalem; cur enim res medica non omninò certa sit, id potissimum evenit, quòd eam non certâ scientiâ, sed conjecturâ comprehendimus. Idèò quotupliciter conjecturalis evadat, dicamus.

Primum ergo conjecturalis est circa morbos, eorum causas internas, quorum cum medicina inspectione sensatâ privata sit, ut docet Hipp. lib. de art. (*quod ipsum apud omnes in confesso est*) alias tamen facultates coadjutrices invenit, nimirum syllogisticam ex signis: signa autem sunt peregrina, & obliqua; ideòque non certam nobis pariunt scientiam, sed conjecturam.

Secundò conjecturalis est circa particularia remedia, quæ sunt instrumenta medendi; nemo enim unquam medicamentorum vires perfectè cognovit, quorum cum sæpè observemus effectus, causam nihilominus ignoramus.

Tertiò quantitas etiam remedii efficit artem conjecturalem; hæc enim bifariam æstimanda est, & quæ morbo v. gr. conveniat, & quam vires ægri perferre queant: ac tandem etiam quanta moles medicamenti esse debeat, ex quâ exquisita ejusdem quantitas virtutis habetur. Singula autem sciri impossibilia sunt, unde Gal. dicere solebat, si exactam quantitatem remedii nosse posset, se talem futurum esse, qualem fuisse ferunt Æsculapium. De hujusmodi etiam quantitate egregiè nonnulla tradit Hipp. quæ ut referam è re nostrâ maxime esse videtur. Inquit ergo lib. de vet. med. cum duo præcipua sint medendi remedia, nimirum repletio, & vacuatio, addit tamen adeò esse difficile exactam cognitionem habere; quin medicus in neutram partem, magis, vel minus replendo, aut vacuando, declinet; propterea hujus mensuræ regulam sensum corporis, seu bonam ægotantis tolerantiam constituit; eumque medicum laudat, non qui minimè peccet, sed qui minus: unde ait, *debet enim dimensionem aliquam (intellige repletionis, & vacuationis) collineare; dimensionem autem nullam aliam reveries, neque pondus, neque mensuram, cujus intuitu exacta diatæ instituende scientia haberi queat, quam corporis sensum. Qua propter negotiosum est, id iâ accurate cognoscere, ut tantum tenuiter in alteram partem delinquas. Certè cum ego medicum vehementer laudavim, qui leviter delinquat. Quod enim exactè absolutum est, raro videre contingit.*

Quartò conjecturalis est ob occasionem, seu tempus medendi opportunum, quoniam hoc fluens est, & breve, ideoque vix, ac ne vix quidem comprehenditur, & opus est medicò, inquit Gal. lib. ad Glauc. peritò, & in arte plurimum exercitatò.

Postremò Idiosyncrasiâ, seu singularis cujusque individui natura omnium maxime conjecturalem, & incertam efficit medicinam, cujus quidem affectus varii, & mirabiles nobis occurrunt; origo tamen in adito semper est. Quis enim unquam novit, cur huic v. g. vinum infernum sit, & vel oluscum syncopem afferat, quò ferè universum genus hominum oblectatur? cur alius abhorreat à cascò, quod plurimis cedit in alimentum? Idcirco Hipp. & Gal. cum præceperint, ut utramque naturam universalem, & particularem cognosceremus, hujus difficultate perterriti, communis tantummodò cognitione contenti sunt. Et hæc de ratione conjecturæ medicinalis satis dicta sint, quæ nihil artis dignitati, & necessitati, nec medentibus, nec agentibus medicinâ fidem, & spem ullo modo detrahunt. Audiant propterea Celsum lib. 2. de remed. hæc de re disertè, & verè loquentem; nimirum, *conjecturalem artem esse medicinam, rationemque conjecturæ talem esse, ut cum sapius aliquando responderit, interdum tamen fallat. Non itaque si quid vix millefimo in corpore aliquem decipit; id scitem non habet, cum per innumerabiles homines respondeat. Idque non in his tantum, quæ pestifera sunt dico: sed in his quoque, quæ salutaria. Siquidem etiam interdum frustratur, & moritur aliquis, de quò medicus securus primo fuit. Quæque medendi causa reperta sunt, nonnumquam in pejus aliquibus vertunt. Neque id evitare humana imbecillitas in tamâ varietate corporum potest. Sed est tamen medicinæ fides, quâ multò sæpius, perque multò plures agros prodest.*

Hæc sunt, quæ adjicienda videbantur PRÆCOGNITIS RIVERII, ut planè constaret  
Alumnis Medicinæ natura.

I N D E X



# INDEX

## LIBRORUM ET CAPITUM IN HOC VOLUMINE contentorum.

*Præcognita in universam Medicinam.* pag. 1

### LIBER PRIMUS,

Physiologiam continens.

*PROOEMIUM.*

#### SECTIO PRIMA.

*De Elementis.*

- CAP. I. **D**E elementorum natura. pag. 2  
2. De numero elementorum. ibid.  
3. De qualitatibus elementorum. 3  
4. De mixtione elementorum. 4

#### Physiologiæ Sectio II.

*De Temperamentis.*

- CAP. I. **D**E temperamentorum natura. pag. 4  
2. De temperamentorum differentiis. 5  
3. De *εὐκρατῶ* temperamento. ibid.  
4. De temperamentorum *κρίτηρις*. ibid.  
5. De ætatum temperamentis. 6  
6. De sexuum temperamento. 7  
7. De temporum anni temperamentis. ibid.

#### Physiologiæ Sectio III.

*De Humoribus.*

- CAP. I. **D**E humorum natura. pag. 7  
2. De humorum differentiis. 8  
3. De sanguine propriè dicto. ibid.  
4. De pituita alimentaria. 9  
5. De bile alimentaria. ibid.  
6. De melancholia alimentaria. ibid.  
7. De humoribus secundariis. 10  
8. De bile excrementitia. ibid.  
9. De melancholia excrementitia. 11  
10. De fero. ibid.  
11. De pituita excrementitia. 12

#### Physiologiæ Sectio IV.

*De spiritibus & calido innato.*

- CAP. I. **D**E spirituum natura. pag. 13  
2. De spirituum differentiis. ibid.  
3. De calido innato. 14

#### Physiologiæ Sectio V.

*De Partibus.*

- CAP. I. **D**E partium natura. pag. 16  
2. De partium differentiis ac primùm de partibus similaribus. ibid.  
3. De partibus dissimilaribus & organicis. ibid.

#### Physiologiæ Sectio VI.

*De facultatibus & functionibus.*

- CAP. I. **D**E facultatum, & functionum natura. pag. 17  
2. De facultatum & functionum differentiis. 18  
3. De facultate, & functione naturali, ejusque speciebus, ac primùm de nutritione. ibid.  
4. De auctrice facultate, & de accretione. 20  
5. De generatrice facultate, & de generatione. ibid.  
6. De facultate vitali. 21  
7. De facultate, & functione animali, ac primùm de principalibus facultatibus. ibid.  
8. De somno, & vigilia. 22  
9. De infomniis. ibid.  
10. De facultatibus minùs principibus. 23

#### Physiologiæ Sectio VII.

*De hominis procreatione.*

- CAP. I. **D**E femine utriusque sexus. pag. 23  
2. De sanguine menstruuo. 24  
3. De conceptione. ibid.  
4. De singularum partium delineatione, earumque perfectione. ibid.  
5. De partu. 25  
6. De similitudine cum Parentibus. ibid.

Institutionum Medicarum

### LIBER SECUNDUS,

Pathologiam continens.

*Præcognita in Pathologiam.*

#### PATHOLOGIAE SECTIO I.

*De morbi natura & differentiis.*

- CAP. I. **D**E morbi natura. pag. 26  
2. De morbi generibus, & differentiis. 27  
3. De speciebus morbi similis. 28  
4. De speciebus morbi organici. 29  
5. De morbi communis seu solutionis continui differentiis. 31  
6. De differentiis accidentalibus morborum. ibid.

#### Pathologiæ Sectio II.

*De mutationibus morborum, & præcipuè de crisi.*

- CAP. I. **D**E mutationibus, quæ in morbis contingunt. pag. 32  
2. Quæ natura crisis. 33  
3. De crisi differentiis. ibid.  
4. De signis crisi. 35  
5. De diebus criticis. ibid.  
6. De causis crisi, & dierum criticorum. 38

#### Pathologiæ Sectio III.

*De morborum causis.*

- CAP. I. **D**E causæ morbificæ natura. pag. 39  
2. De causarum differentiis. ibid.  
3. De causis morborum similium. 40  
4. De causis morborum organicorum. 41  
5. De causis morborum communium. 42  
6. De causis & differentia accidentariorum morborum. ibid.

#### Pathologiæ Sectio IV.

*De symptomatum natura, differentiis, & causis.*

- CAP. I. **D**E symptomatum natura. pag. 42  
2. De symptomatum differentiis. ibid.  
3. De actionis læsæ differentiis. ibid.  
4. De excrementorum differentiis. 43  
5. De qualitatibus mutatis differentiis. ibid.  
6. De symptomatum causis in genere. ibid.  
7. De causis actionum læsarum. ibid.  
8. De causis symptomatum, quæ sunt in excrementis. 47  
9. De causis qualitatibus mutatis. ibid.

Institutionum Medicarum

### LIBER TERTIUS,

Semeioticem continens.

*Præfatio.*

#### SECTIO PRIMA.

*De signis in genere.*

- CAP. I. **D**E signi natura, & definitione. pag. 44  
2. De signorum differentiis. 45  
3. De



# Index Librorum, & Capitum.

3. De fontibus signorum generalibus, à quibus omnia  
signa defumuntur. pag. 45

## Semeioticæ Sectio II.

*De signis diagnosticis.*

- CAP. I. **D**E signis biliosi humoris in corpore prædominantis. pag. 47.
2. De signis humoris pituitosi in corpore prædominantis. ibid.
3. De signis sanguinis in corpore prædominantis. 48
4. De signis melancholiæ in corpore prædominantis. 49
5. De signis partis affectæ. ibid.
6. De signis partis primariæ, & per consensum laborantis. 51
7. De signis speciei morbi. 52
8. De signis morbi magni, & parvi. 54
9. De signis morbi maligni, & benigni. 55
10. De signis morbi acuti, vel chronici. 56
11. De signis causarum morbificarum, ac primò de signis bilis præternaturalis. 57
12. De signis pituitæ præternaturalis. ibid.
13. De signis feri redundantis. ibid.
14. De signis flatuum. 58
15. De signis temporum morborum. ibid.

## Semeioticæ Sectio III.

*De signis prognosticis.*

- CAP. I. **D**E signis morbi longi aut brevis futuri. p. 60
2. De signis morbi salutaris, & lethalis. 61
3. De modo quo finietur morbus, an scilicet per crisin, vel paulatinam solutionem. 91
4. De tempore quo finietur morbus, ubi dies & hora futuræ criseos prænuntiantur. ibid.
5. De loco per quem futura est crisis. Ac primò de signis futuræ criseos per vomitum. 92
6. De signis futuræ criseos per alvi fluxum. ibid.
7. De signis futuræ criseos per sudores. ibid.
8. De signis futuræ criseos per urinas. 93
9. De signis futuræ criseos per hæmorrhagiam. ibid.
10. De signis futuræ criseos per menses aut hæmorrhoidas. ibid.
11. De signis futuri abscessus. 94
12. De signis eorum quæ superventura sunt in his qui jam ægrotant, vel in morbos prolabuntur. Ac primò de signis futuri delirii. ibid.
13. De signis futuræ convulsionis. 95
14. De signis futuræ recidivæ. ibid.

## Institutionum Medicarum LIBER QUARTUS.

Qui est de ὕγιεινῃ seu de conservanda  
valetudine.

*PROOEMIUM.*

- CAP. I. **D**E cibo, & potu, seu de alimentis. pag. 96
2. De alimentorum substantia. ibid.
3. De alimentorum quantitate. 97
4. De qualitate alimentorum. 98
5. De ordine alimentorum. 99
6. De tempore, & hora sumendi alimenti. ibid.
7. De præparatione alimentorum. 101
8. De consuetudine, & delectatione in alimentorum usu. ibid.
9. De victu singulis ætatibus congruo. 102
10. De victu singulis anni temporibus idoneo. 103
11. De pane. ibid.
12. De hordeo, oryza, avena, fabis, pis, ciceribus, & lenibus. 104
13. De oleribus usitatoribus, eorumque facultatibus. 105
14. De radicibus esculentis. 106
15. De fructibus esculentis usitatoribus. ibid.
16. De cibus, qui ex animalibus petuntur. Ac primò de carnibus in genere. 108

17. De carnibus quadrupedum. pag. 108
18. De interaneis, & extremitatibus animalium. 109
19. De alimentis, quæ in partibus quadrupedum continentur. ibid.
20. De cibus ex volatilibus desumptis. 110
21. De piscibus. 111
22. De condimentis. ibid.
23. De melle. ibid.
24. De potu, & materia potulenta. 112
25. De aëre. 115
26. De temporibus anni. ibid.
27. De motu, & quiete. 117
28. De fomno, & vigilia. 118
29. De excretis, & retentis. ibid.
30. De animi pathematis. 119

## Institutionum Medicarum LIBER QUINTUS,

*Θεραπευτικὴν continens.*

*Præfatio.*

## Therapeutices PARS PRIMA.

De methodo generali medendi.

*Proœmium.*

## SECTIO PRIMA.

*De methodo medendi, & indicationibus.*

- CAP. I. **Q**uid methodus medendi, quid curatio, & quæ illius condiciones. pag. 120
2. De indicationibus, & illarum differentiis. ibid.
3. De indicantibus. 121
4. De coindicantibus, contraindicantibus, & contrapugnantibus. 122
5. De indicatis. ibid.
6. De primo, & generalissimo curationis principio. 123
7. De inventione remediorum. 125

## SECTIO II.

*De indicationibus à causa.*

- CAP. I. **D**E evacuatione in genere, illius differentiis. pag. 125
2. De revulsione, derivatione, & particulari evacuatione. ibid.
3. De sanguinis missione. 127
4. De purgatione. 129
5. De humorum præparatione, & concoctione. 132
6. De evacuatione per urinas. ibid.
7. De evacuatione per sudores. ibid.

## SECTIO III.

*De indicationibus in morbo.*

- CAP. I. **D**E indicationibus à morbo similari. p. 132
2. De indicationibus à morbo organico. 133
3. De indicationibus à morbo communi, seu solutione continui. ibid.

## SECTIO IV.

*De indicationibus à viribus.*

- CAP. I. **Q**uid diætam in ægris indicet, aut coindicet. pag. 133
2. Quæ ad diætam, seu victus rationem spectent. ibid.
3. Quænam sunt diætæ species, & quibus morbis convenient. 134
4. De quantitate victus. ibid.
5. De tempore victus exhibendi. ibid.
- Thera-



# Index Librorum, & Capitem.

Therapeutices

## P A R S S E C U N D A.

De Instrumentis Medicis.

*Præfatio.*

Therapeutices Partis secundæ

Seçtio prima.

*De materiâ medicâ.*

Proœmium, quid medicamentum, quæ illius differentiæ,  
& sectionis divisio.

Sectionis primæ particula .I.

*De materia medica interna.*

P R Æ F A T I O.

CAP. I. **D**E medicamentis bilem refrigerantibus, &  
attenuantibus. pag. 135

2. De medicamentis bilem refrigerantibus, & incrassantibus. 136

3. De medicamentis pituitam alterantibus. ibid.

4. De medicamentis melancholiam alterantibus. 137

5. De medicamentis atram bilem alterantibus. ibid.

6. De medicamentis aperientibus. ibid.

7. De medicamentis purgantibus. 138

8. Cholagoga medicamenta. ibid.

9. Phlegmagoga medicamenta. ibid.

10. Melanagoga medicamenta. 139

11. Hydragoga medicamenta. ibid.

12. De vomitoriis medicamentis. ibid.

13. De sudorificis medicamentis. 140

14. De diureticis medicamentis. ibid.

15. De errhinis medicamentis. 141

16. De sternutatoriis. ibid.

17. De masticatoriis. ibid.

18. De Cephalicis medicamentis. ibid.

19. De ophthalmicis medicamentis. 142

20. De thoracicis medicamentis. ibid.

21. De cardiacis medicamentis. 143

22. De hepaticis medicamentis. ibid.

23. De stomachicis medicamentis. ibid.

24. De Splenicis medicamentis. 144

25. De nephriticis medicamentis. ibid.

26. De hysteris medicamentis. 145

27. De arthriticis medicamentis. 146

28. De medicamentis lac generantibus idemque mimentibus. ibid.

29. De medicamentis semen generantibus, idemque extinguentibus. ibid.

30. De medicamentis flatu discutientibus. ibid.

31. De astringentibus medicamentis. ibid.

32. De medicamentis lumbricos enecantibus. ibid.

33. De vulnerariis medicamentis. 147

Sectionis primæ Particula II.

*De materia medica externa.*

CAP. I. **D**E refrigerantibus & repellentibus medicamentis. pag. 147

2. De Emplasticis medicamentis. ibid.

3. De anodynis medicamentis. 148

4. De narcoticis medicamentis. ibid.

5. De emollientibus medicamentis. ibid.

6. De resolventibus medicamentis. ibid.

7. De epispasticis, seu attrahentibus medicamentis. ibid.

8. De suppurantibus medicamentis. 149

9. De medicamentis detergentibus. ibid.

10. De farcoticis medicamentis. ibid.

11. De epuloticis, seu cicatricem inducentibus medicamentis. pag. 149

12. De medicamentis sanguinem sistentibus. 150

13. De glutinantibus medicamentis. ibid.

14. De vesicantibus medicamentis. ibid.

15. De cathareticis, seu exedentibus medicamentis. ibid.

16. De causticis medicamentis. ibid.

Therapeutices

## P A R T I S S E C U N D Æ

Seçtio secunda.

*De compositione medicamentorum.*

Sectionis secundæ proœmium, & divisio in  
tres articulos.

A R T I C U L U S P R I M U S.

*De compositione medicamentorum internorum.*

CAP. I. **D**E Apozemate alterante. pag. 151

2. De Apozemate purgante. ibid.

3. De Potione purgante. 152

4. De Potione corroborante. ibid.

5. De Julepis. ibid.

6. De Syrupis ac primùm de alterante. 153

7. De Syrupo purgante magistrali. ibid.

8. De Vomitoriis. ibid.

9. De emulsione. ibid.

10. De lacte. ibid.

11. De fero lactis. 154

12. De decoctis sudorificis. ibid.

13. De decocto galli veteris. ibid.

14. De Jusculis. ibid.

15. De Bolo. 155

16. De Opiata. ibid.

17. De Conditis. ibid.

18. De Eclegmate seu Looch. ibid.

19. De Tabellis. ibid.

20. De Pilulis. ibid.

21. De Trochiscis. 156

22. De Pulveribus. ibid.

A R T I C U L U S S E C U N D U S.

*De compositione medicamentorum mediorum.*

CAP. I. **D**E suppositoriis. pag. 156

2. De Clystere. ibid.

3. De injectionibus. ibid.

4. De pessariis. ibid.

5. De Errhinis. 157.

6. De sternutatoriis. ibid.

7. De gargarisinate. ibid.

8. De masticatoriis. ibid.

9. De collyriis. ibid.

A R T I C U L U S T E R T I U S.

*De compositione medicamentorum externorum.*

CAP. I. **D**E Epithemate. pag. 157

2. De fomento. 158

3. De balneo. ibid.

4. De semicupio. ibid.

5. De oleis. ibid.

6. De linimentis. ibid.

7. De unguentis. ibid.

8. De emplastris. 159

9. De cataplasmate. ibid.

10. De vesicatorio. ibid.

11. De sacculis. ibid.

12. De cucupha. ibid.

13. De frontali. ibid.

## I N D E X Librorum, & Capitem Praxeos Medicæ.

### L I B E R P R I M U S.

*De affectibus capitis.*

CAP. I. **D**E frigida cerebri intemperie. pag. 160

2. De affectibus soporosis comate, lethargo, caro, & apoplexia. 164

3. De comate vigiliis. 168

4. De catoche seu catalepsi. ibid.

5. De Paralyfi. 169

6. De convulsione. 172

7. De Epilepsia. 175

8. De epilepsia puerorum. 178

9. De Vertigine. 179

10. De tremore. 181

11. De phrenitide. ibid.

12. De Cerebri abscessu, & sphacelo. 184

13. De Mania. 185

14. De melancholia. 187

15. De catharro. 189

16. De



# Index Librorum, & Capitem.

16. De dolore capitis.	pag. 193	9. De lumbricis.	pag. 308
<b>LIBER II.</b> <i>De affectibus oculorum.</i>		10. De hæmorrhoidum fluxu.	312
CAP. I. <b>D</b> E gutta serena.	pag. 196	11. De dolore hæmorrhoidum.	304
2. De humoris vitrei affectibus.	198	<b>LIBER XI.</b> <i>De affectibus hepatis.</i>	
3. De humoris crystallini affectibus.	ibid.	CAP. I. <b>D</b> E calida hepatis intemperie.	pag. 316
4. De humoris aquei affectibus ac præcipuè de suffusione.	199	2. De hepatis inflammatione, & abscessu, & ulcere.	318
5. De dilatatione pupillæ.	202	3. De obstructione hepatis.	320
6. De angustia pupillæ.	203	4. De Ictero.	324
7. De albugine seu macula, & aliis corneæ coloribus mutatis.	204	5. De scirrho hepatis.	325
8. De ophthalmia.	205	6. De hydropo.	326
9. De hypopyo, seu pure sub cornea.	210	<b>LIBER XII.</b> <i>De affectibus lienis.</i>	
10. De phlyctenitis.	ibid.	CAP. I. <b>D</b> E inflammatione lienis.	pag. 332
11. De corneæ & adnatæ, ulceribus.	ibid.	2. De dolore lienis.	ibid.
12. De corneæ cancro.	211	3. De obstructione & tumore, seu inflammatione lienis.	ibid.
13. De ruptura corneæ.	ibid.	4. De scirrho lienis.	333
14. De Uvæ procidentia.	212	5. De melancholia hypochondriaca.	334
15. De Ægylope & fistula lacrymali.	ibid.	6. De scorbutica affectione.	338
16. De Rhyade & Encanthide.	213	<b>LIBER XIII.</b> <i>De affectibus mesenterii, pancreatis, &amp; omentii.</i>	
17. De epiphora.	ibid.	CAP. I. <b>D</b> E obstructione mesenterii.	pag. 342
18. De pterygio lingue oculorum.	214	2. De inflammatione mesenterii.	ibid.
<b>LIBER III.</b> <i>De affectibus aurium.</i>		3. De abscessu, ulcere, & scirrho mesenterii.	ibid.
CAP. I. <b>D</b> E furditate, & gravi auditu.	pag. 215	4. De morbis pancreatis.	343
2. De sonitu aurium.	217	5. De affectibus omentii.	344
3. De dolore aurium.	219	<b>LIBER XIV.</b> <i>De affectibus renum &amp; vesicæ.</i>	
4. De exeuntibus præter naturam, ab aurium cavitatibus.	222	CAP. I. <b>D</b> E dolore nephritico, & calculo renum.	pag. 344
<b>LIBER IV.</b> <i>De affectibus narium.</i>		2. De calculo vesicæ.	352
CAP. I. <b>D</b> E narium ulcere & Ozæna.	pag. 223	3. De inflammatione renum & vesicæ.	355
2. De Sarcomate & polypo.	ibid.	4. De mictu sanguineo.	357
3. De læso olfactu.	224	5. De ulcere renum & vesicæ.	358
4. De foetore narium.	225	6. De diabete.	360
5. De coryza.	ibid.	7. De urinæ incontinentia.	362
6. De sternutatione.	ibid.	8. De Ischuria & stranguria.	363
7. De hæmorrhagia narium.	226	9. De dysuria, seu ardore urinæ.	365
<b>LIBER V.</b> <i>De affectibus linguae.</i>		<b>LIBER XV.</b> <i>De morbis mulierum.</i>	
CAP. I. <b>D</b> E linguae inflammatione, aliisque ejusdem tumorbibus.	pag. 231	CAP. I. <b>D</b> E chlorosi, seu pallidis virginum coloribus.	pag. 367
2. De ranula sub lingua.	232	2. De suppressione mensium.	368
3. De gustatu læso.	233	3. De fluxu mensium immodico.	372
4. De paralyfi linguae, ejusque motu læso.	234	4. De fluore muliebri.	374
<b>LIBER VI.</b> <i>De affectibus dentium, gingivarum, faucium, uvula, &amp; laryngis.</i>		5. De furore uterino.	377
CAP. I. <b>D</b> E dolore dentium.	pag. 235	6. De hysterica passione.	378
2. De dentium nigredine & erosione.	238	7. De uteri inflammatione.	384
3. De gingivarum erosione & exulceratione.	ibid.	8. De ulcere uteri.	386
4. De fluxu sanguinis ex gingivis.	ibid.	9. De scirrho uteri.	388
5. De oris, & faucium ulceribus.	239	10. De cancro uteri.	389
6. De uvulae relaxatione.	240	11. De uteri gangræna & sphacelo.	ibid.
7. De angina.	ibid.	12. De uteri inflatione & hydropo.	390
<b>LIBER VII.</b> <i>De morbis thoracis.</i>		13. De uteri procidentia.	392
CAP. I. <b>D</b> E asthma.	pag. 245	14. De uteri clausura.	394
2. De pleuritide.	248	15. De sterilitate.	395
3. De peripneumonia.	252	16. De morbis acutis & chronicis prægnantium.	398
4. De empyemate.	254	17. De abortu.	400
5. De hydropo pectoris.	255	18. De partu difficili.	403
6. De hæmoptysi, seu sanguinis sputo.	256	19. De foetu mortuo.	404
7. De phthisi.	259	20. De secundina retenta.	405
<b>LIBER VIII.</b> <i>De affectibus cordis.</i>		21. De fluxu lochiorum immodico.	ibid.
CAP. I. <b>D</b> E syncope.	pag. 265	22. De suppressione lochiorum.	406
2. De palpitatione cordis.	267	23. De torminibus à partu.	407
3. De imbecillitate virium.	269	24. De morbis acutis puerperarum.	408
<b>LIBER IX.</b> <i>De affectibus Ventriculi.</i>		<b>LIBER XVI.</b> <i>De affectibus articularum &amp; Rheumatismo.</i>	
CAP. I. <b>D</b> E inappetentia & cibi fastidio.	pag. 271	CAP. I. <b>D</b> E arthritide.	pag. 410
2. De fame canina.	274	2. De dolore Ischiadico.	417
3. De pica & malacia.	276	3. De rheumatismo.	418
4. De siti morbofa.	277	<b>LIBER XVII.</b> <i>De Febris.</i>	
5. De ventriculi concoctione læsa.	278	<b>SECTIO I.</b> <i>De febris simplicibus.</i>	
6. De singultu.	280	CAP. I. <b>D</b> E febre Ephemera.	pag. 421
7. De nausea & vomitu.	282	2. De syncho simplici.	422
8. De vomitu sanguinis.	284	3. De febre hectica.	423
9. De cholera morbo.	286	<b>SECTIO II.</b> <i>De febris putridis.</i>	
10. De dolore ventriculi.	287	CAP. I. <b>D</b> E febris putridis continuis.	pag. 426
11. De inflammatione, abscessu, & ulcere ventriculi.	289	2. De symptomatis febres putridas comitantibus.	434
<b>LIBER X.</b> <i>De affectibus intestinorum.</i>		3. De febre tertiana intermittente.	436
CAP. I. <b>D</b> E dolore colico.	pag. 291	4. De febre quotidiana intermittente.	439
2. De Iliaco affectu.	294	5. De febre quartana intermittente.	440
3. De adstrictione alvi.	296	6. De febris compositis seu complicatis, & de hemetritæo.	444
4. De henteria & coeliaca passione.	297	<b>SECTIO III.</b> <i>De febris pestilentibus.</i>	
5. De diarrhoea.	298	CAP. I. <b>D</b> E febre pestilenti.	pag. 445
6. De dysenteria.	300	2. De variolis & morbillis.	461
7. De tenesmo.	306		
8. De fluxu hepatico.	307		





# LAZARI RIVERII,

## DOCTORIS MEDICI,

## INSTITUTIONES

## MEDICÆ.

PRÆCOGNITA IN UNIVERSAM MEDICINAM.

*Medicina est scientia, quâ humani corporis dispositiones cognoscuntur, ut sanitas præsens conservetur, & amissa recuperetur.*



MAGNA perpetuò fuit inter Authores disceptatio in Medicinæ genere constituendo. Cum enim ea magna ex parte conjecturalis sit, & ad certum finem dirigatur, sanitatem nempe acquirendam, vel conservandam; inter artes omninò videtur recensenda. At verò, cum sua habeat principia, axio-

mata, & demonstrationes, ex naturæ demonstratione repetitas, immò nonnullas ipsius Physicæ demonstrationibus certiores, utpote à sensuum fide repetitas; cum unicum habeat subiectum reale per se existens, ac præstantissimum; nempe corpus humanum, illiusque proprietates doceat, inter scientiarum numerum videtur potius referenda. Cui opinioni nos magis assentimur; artes enim ex frequenti tantum operatione comparantur, & totæ in operatione versantur: at Medicinæ habitus comparatur ex frequenti librorum inspectione, & Doctorum institutione, sicut veræ scientiæ. Neque ulla pars potest reperiri, quæ subiecti sui passiones & proprietates per axiomata & principia demonstret, sicut Medicina. Licet autem aliqua ex parte conjecturalis sit, & aliqua tradat præcepta non omninò certa; hoc tamen non efficit, ut ad artes debeat referri, hac enim ratione ipsa Physica ad artes etiam esset referenda, cum multa probet per conjecturas tantum, ex eo quod veræ causæ non sint perfectè cognitæ. Finis denique ad quem dirigitur, ab illius doctrina & tractationis modo distinguitur, ut rectè annotavit Al. Aphrodisæus. Medicina enim dupliciter considerari potest: Vel *primariò*, quatenus docetur ex certis, firmis, & indubitatis principiis; & tunc Scientia haberi debet, non minus quàm Astrologia, Geometria, aut Arithmetica, seipsâ, sui que cognitione contenta: Vel *secundariò*, quatenus ad usus hominum revocatur, ut Astrologia, ad horarum constitutionem; Geometria, ad terras dimetiendas; Arithmetica, ad numeros computandos. Et hoc modo accepta Medicina habet finem omnium præstantissimum & utilissimum. Attamen ne nimis rigidè sententiam nostram tueri videamur, dicimus Me-

Laz. Riverii Opera.

dicinam scientiam appellari latiori paululum significatione, quæ proponitur ab Aristotele, 2. *Metaph. cap. 2.* prout scientias speculativas & factivas comprehendit; ita tamen, ut scientiæ factivæ à veris & illiberalibus artibus distinguantur.

*Subiectum illius est corpus humanum, quatenus est sanabile.*

In omni Scientiarum subiecto quatuor requiruntur conditiones, duæ scilicet ex parte ipsius subiecti, & duæ ex parte scientiæ. Ex parte subiecti primò requiritur, ut contineat ea omnia, quæ tractantur in ea scientia: secundò, ut det unitatem & speciem scientiæ, & per illud scientia definiri possit. Ex parte verò scientiæ requiritur, ut nihil scientia consideret, quod non sit obiectum, vel ad illud referatur: Deindè, ut tradat causas sui subiecti, ac passiones & proprietates ejusdem, ut probat Aristoteles 4. *Metaph. cap. 1.* Quæ omnia in corpore humano tam manifestè reperiuntur, ut verum Medicinæ subiectum, absque dubio dici mereatur.

Dices, non solum corpus humanum in Medicina considerari, sed etiam res naturales, nonnaturales, & præternaturales, atque ita res omnes ferè creatas, plantas, animalia, mineralia, & quæcumque universo mundi ambitu continentur, subiecta Medicinæ dici posse. Respondeo: Medicum ea omnia considerare non per se & simpliciter, sed quatenus ad corpus humanum referuntur, prout videlicet ei commodum aliquod vel incommodum asferre possunt: & res illæ *subiectum contemplationis* appellantur; corpus verò humanum, *subiectum reductionis*, ad quod videlicet reliqua omnia reducuntur.

*Finis verò est Sanitas.*

Finem appellat Galenus eum, quo acquisito conquiescit artifex, quia in nulla actione datur progressus in infinitum, sed ad aliquam tandem perfectionem pervenitur, in qua agens conquiescit, quamque perpetuò acquirere intendit, & ad quam omnes præviæ actiones diriguntur, & illa perfectio finis appellatur, qui in Medicina est Sanitas; illa enim est, ad quam omnia Medici opera diriguntur, quæve adeptâ Medicus conquiescit.

A

Dices,



## 2 Institutiones Medicæ, Lib. I. Sect. I.

*Dices, cum Medicina sit de genere scientiarum factivarum, illarum autem finis sit actio, sicut speculativarum contemplatio, non debere finem Medicinæ in quiete consistui. Respondeo, Unicum dari finem ultimum, ad quem reliqua ordinantur; plures verò dari intermedios, qui quidem actiones sunt præviæ ad ultimum illud finem acquirendum: & de illis audiendum est cum actio dicitur finis scientiarum factivarum.*

*Partes Medicinæ sunt quinque φυσιολογική, παθολογική, σημειωτική, ὑγιατική, καὶ θεραπευτική.*

Prima & generalis Medicinæ divisio bimembris tantum est, unam Medicinæ partem *theoricam* constituens, alteram *practicam*. In theorica præcepta quædam traduntur & theoremata, quæ in cognitione tantum versantur; & ab actione sunt valde remota, suijecti naturam

considerant, ejusque constitutionem & passiones varias, quatenus scilicet mutatur sanitas in morbum, & contra: vel etiam ostendunt signa quibus variæ illæ dispositiones à Medico percipi possint. Undè tres emergunt Medicinæ theoricæ partes, *Physiologia, Pathologia, & Semeiotica*. At verò, quoniam hæc omnia speculamur in Medicina, ut Sanitas præsens conservetur, vel amissa recuperetur, duæ aliæ constituuntur partes ad practicam pertinentes, quibus operationem ratio & modus traditur, nimirum *ὑγιατική* ad sanitatem conservandam, & *θεραπευτική* ad morbos expellendos. Totum igitur Institutionum opus in quinque libros dividetur, omnes Medicinæ partes continentes. Quinque hæ partes respiciunt *prolegomena* & *Præcepta*, uti in *Manuduct.* fusiùs expositum.

# INSTITUTIONUM MEDICARUM

## LIBER PRIMUS,

### PHYSIOLOGIAM CONTINENS.

#### PROOEMIUM.

*In Physiologia considerantur ea omnia, quæ ad corporis humani constitutionem naturaliter concurrunt.*

**C**UM subiectum Medicinæ sit corpus humanum, primò illius natura accuratè est consideranda, ut postmodum affectus præternaturales, qui illi solent contingere, faciliè intelligantur, ac tandem via inveniatur, quâ illos possimus profligare, & naturalem statum conservare. Ideò in prima ista parte traduntur ea omnia, quæ ad corporis humani constitutionem concurrunt, & ad omnes illius functiones obeundas sunt necessaria.

*Ea in septem sectiones distribuitur, quarum prima est de Elementis: secunda, de temperamentis: tertia, de humoribus: quarta, de spiritibus & calido innato: quinta de partibus: sexta, de facultatibus & functionibus: septima, de hominis generatione.*

Prima principia sensibilia, ex quibus corpus humanum constituitur sunt prima rerum elementa, ex quorum varia permixtione varia exurgunt temperamenta; ex temperamentis autem varii humores dependent, & ex humoribus spiritus, qui calidum innatum reficiunt & conservant: Ex humoribus, & spiritibus, & calido innato, partes omnes producuntur & substinentur; quæ omnia fieri non possunt sine animæ ministerio, quæ multis prædita facultatibus, istas omnes perficit operationes, primumque agens est in totius hominis conservatione, & prima illius generatione: Atque hic ordo est, quem servat Physiologia in rebus naturalibus edocendis, qui verè *compositus* est, à primis principiis ad ea, quæ inde oriuntur, sigillatim procedens, donec totum illud naturæ opificium perfectum & absolutum repræsentet.

principia existunt, corpora tamen non sunt. Ideò elementa sunt prima corpora simplicia, ex quibus reliqua omnia componuntur; nullum etiam corpus perfectè mixtum potest reperiri, quod quatuor elementorum substantiam in se non contineat, quod in corporibus nostris manifestè apparet, quæ componuntur ex quatuor humoribus, ad quatuor elementorum naturam maximè accedentibus. Sed multò clarius illud apparet ex inixtorum dissolutione, quæ in elementa denuò resolvuntur, ut propositum est in definitione. Nam in combustionem ligni, v. g. pars in aërem convertitur, ut per fumum apparet, qui ab eo magnâ copiâ exhalat, & in aërem commutatur; pars in aquam transit, quæ à ligni extremitatibus resudat, pars verò in terram abit per cineres, qui terreæ sunt naturæ; pars denique in ignem, ex carbonibus & flammâ maximè conspicuum. Licet verò multa corpora in sui corruptione non statim & immediatè in elementa convertantur, sed in alias substantias vicissitudine quadam commutentur; at tamen ipsa tandem in ultima resolutione, in elementa, ex quibus constant resolvuntur; ut patet in alimentis, quæ in corpore humano priùs in chylum commutantur, deinde in sanguinem, ac tandem corporis substantiam, quæ post animalis interitum in elementa resolvitur: portio verò alimentorum in excrementa degenerat, quæ partim terream naturam repræsentant in fæcibus; partim aqueam in sudore & urina; partim verò igneam & aëream, in fuliginibus, quæ per habitum corporis in insensibilem transpiratum quotidie abire solent.

#### CAPUT II.

De Numero Elementorum.

*Elementa quatuor sunt, Terra, Aqua, Aër, & Ignis.*

**Q**uidam ex Antiquis Philosophis infinita voluerunt esse elementa, quod refutat Aristoteles 1. *de celo*: alii unicum tantum constituiebant, quos refellit Hipp. *lib. de natura humana*, hac ratione solidissimâ: *Si homo (inquit) ex unico elemento constaret, non doleret.* Cujus consequentiæ ratio est, quia quæ dolent, sensu participant, & alterabilia sunt; omnis autem alteratio fit à contrario. Si ergo unicum tantum esset elementum, nullum daretur contrarium, quia nihil sibi ipsi contrarium est; & quidquid patitur, ab alio patitur.

Quod autem quatuor præcisè dentur elementa ostenditur primò ex qualitatibus primis, quæ quatuor sunt, maximè invicem distinctæ, nempe caliditas, frigiditas, humiditas,

#### LIBRI PRIMII SECTIO PRIMAA.

De Elementis.

#### CAPUT PRIMUM.

De Elementorum Natura.

*Elementa sunt corpora simplicia ex quibus reliqua omnia componuntur, & in quæ ultimo resolvuntur.*

**E**lementa corpora simplicia dicuntur, quia ex aliis corporibus specie diversis non componuntur, sed tantum ex materia & forma; quæ prima rerum omnium



## Cap. III. De Qualitatibus Elementorum. 3

tas, & siccitas, quæ cum sint accidentia, suum unaquæque subiectum primum, distinctum, & separatim habere debet. Nec dicas inde tantum concludi, duo esse elementa, quia caliditas cum siccitate in uno eodemque corpore est conjuncta, & humiditas cum frigiditate: Nam si inde duo colligantur elementa, cum etiam caliditas cum humiditate jungatur, & frigiditas cum siccitate, duo alia colliguntur. Deinde quaternarius ille elementorum numerus sensibiliter probatur ex corporum mixtorum dissolutione, quæ in quatuor illa prima corpora resolvuntur, ut superiori capite ostensum est.

### CAPUT III.

#### De Qualitatibus Elementorum.

*Elementorum qualitates sunt vel primæ, vel secundæ.*

*Primæ qualitates sunt, quæ primò elementis insunt, & à quibus reliquæ dependent.*

*Suntque Activæ, vel Passivæ.*

*Activæ sunt, quæ in ipsa elementorum mutua alteratione, tum etiam in mixti constitutione principalem obtinent efficaciam.*

**A**ctivæ appellantur, non simpliciter & absolute, ut voluerunt quidam, quod nimirum solæ agant, reliquæ verò sint purè passivæ: sed comparatè tantum, quod scilicet magis efficaciter agant, quam reliquæ. Passivæ nuncupantur, quòd magis patiantur, quam agant, licet agendi vi non sint omninò destitutæ: humiditas enim agit in siccitatem, & siccitas in humiditatem.

*Et illæ sunt caliditas & frigiditas.*

*Caliditas est qualitas prima activa, cujus effectus est congregare homogenea, & disgregare heterogenea. Aristoteles 2. de generat.*

Homogenea apud Logicos dicuntur ea, quæ sunt ejusdem naturæ & speciei: heterogenea verò, quæ sunt diversarum specierum, quæ non sunt hoc modo hîc accipienda. Nam in generatione mixti calor non solum homogenea, sed etiam heterogenea congregat, nimirum humidum cum sicco, quæ sunt diversæ speciei. Sic etiam diversi generis alimenta in ventriculum ingesta, à calore simul congregantur, ex iisque chylus efficitur. Dicendum ergo, per homogenea hîc intelligi ea, quæ illam habent inter se similitudinem, ut apta sint rem ejusdem naturæ constituere, in eamque converti. Atque in humidum & siccum simul unita ad generationem mixti, homogenea dicuntur. Sic etiam in coctione, alimenta specie etiam distincta, sunt homogenea: illa verò quæ in chylum mutari non sunt idonea, ut excrementa, sunt verè heterogenea, ac proinde secernuntur.

*Sunt & aliæ caloris proprietates, nempe resolvere, aperire, incidere, maturare, & attenuare.*

Harum exempla infinita habentur in rerum natura, sed magis illustria in medicamentorum materia, quæ vires illas possident efficacissimas. Vide Schroderi Pharm.

*Frigiditas est qualitas prima activa, quæ homogenea & heterogenea simul congregat.*

Sic aquam cum aqua, ceram cum cera, & quæcunque in illis contenta, stipulas scilicet, lapillos, ligna, arenam, paleas, & reliqua, congelando cogit, donec à calore, coagulationem solvente segregentur.

*Illius officium est calorem temperare, ne nimia caliditate mixtum dissolvatur.*

*Et non solum homogenea cum heterogeneis congregat, sed etiam adstringit, condensat, obstruit, & incrassat.*

Cum frigus calori sit contrarium, necesse est contrarios producere effectus. Nec recipienda est Cardani sententia, qui putat frigus esse meram caloris absentiam & privationem, non autem aliquid positivum, quod voluisse videtur Avicenna, qui dicit frigus non ingredi opus naturæ. Sed utique doctissime respondet Scaliger Exercit. 22. & ante ipsum Averroës, qui ostendit duplici ratione frigus ingredi opus naturæ, primò temperando calorem, deinde conciliando rebus consistentiam, sive partium coherentiam, Laz. Riverii Opera.

quæ sanè non est à calore, cujus proprium est dissolvere.

*Et hæc de activis qualitatibus.*

*Passivæ sunt, quæ minus agunt, atque adeo activis in mixtione corporum subserviunt. Suntque humiditas & siccitas. Humiditas est qualitas passiva, faciens ut res suo termino difficulter, alieno facillime includantur. Aristoteles 2. de generat.*

Sic aqua, vinum, oleum, & alia corpora humida, undequaque diffundunt, & non nisi intra vasorum terminos possunt cohiberi.

*Siccitas est qualitas passiva, faciens ut res suo termino facile, alieno difficulter includantur.*

Sic ligna, lapides, & alia hujusmodi propriam figuram pertinaciter servant, nec alienam facile recipiunt.

*Dices ex Telestio, ignem, qui siccissimus est proprio termino non coerceri, sed potius, alieno, quod etiam de pulvere & cineribus est asserendum. Respondeo, In igne hoc contingere non per se, sed per accidens, scilicet, propter substantiæ tenuitatem, quæ difficilè suis terminis potest cohiberi, aliqua enim substantiæ crassities cum siccitate conjungi debet, ut ei descriptio hæc competere possit. Pulvis verò & cineres propriam retinent figuram, quando coacervantur: Non sunt enim unum continuum, sed minutissimarum terræ partium congeries, quæ propter exiguitatem quævis spatia occupant.*

*Quatuor istæ qualitates primæ in elementis reperiuntur secundum quatuor combinationes possibiles: Caliditas nempe & siccitas in igne: Caliditas & humiditas in aëre: frigiditas & humiditas in aqua: frigiditas & siccitas in terra.*

Hæc primarum qualitatum inhærentiæ & combinationes, fuscè controversæ, & variis opinionibus exagitatæ, habentur apud Hippocr. de Vet. Med. tit. 1. de Diæt. confert Gregorium Horstium in Phys. & alios Physicæ Professores, ad quos lectorem relegamus, brevitatî causâ.

*Hactenus de qualitatibus primis.*

*Secundæ sunt, quæ à primarum qualitatum temperie & mixtione immediate oriuntur.*

Hæc descriptione à secundarum qualitatum sensu remouentur colores, odores & sapes, quæ non immediate à primis oriuntur, nec modo ita manifesto, sed magis remotè & obscurè ab iis dependent: Ideoque nonnulli eas ad tertium qualitatum ordinem referunt, non parum appositè. Illarum autem expositio ad doctrinam sensuum referri debet, quòd sine illorum intelligentia rectè percipi nequeant.

*Et sunt quatuordecim, nempe raritas, & densitas; gravitas, & levitas; durities, & molliities; subtilitas, & crassities; ariditas, & lubricitas: friabilitas & lentor; asperitas & levitas.*

*Raritas est qualitas secunda, à calore potissimum orta, per quam res extenuantur & dissipabiles sunt.*

Sic aqua, calore Solis attenuata, rara est & dissipabilis: sic nubes, per quas facilè transeunt, radii solares, raræ dici solent. Nota, duplicem esse raritatem, unam scilicet, quæ consistit in tenuitate substantiæ: Et hæc propriè est in categoria qualitatîs, & calorem sequitur tanquam effectus illius, atque ita aër rarus dicitur, & terra densa: alteram quæ non in tenuitate substantiæ consistit, sed in distantia partium inter se; quemadmodum, spongiam raram dicimus, quia partes habet invicem distantes, per vacuum spatium interpositum, in quo aër est inclusus: & hæc raritas est in categoria situs, & magis improprie raritas appellatur, licet magis hominibus cognita.

*Densitas est qualitas secunda, à frigore orta, per quam res sunt compactiones & firmiores minusque dissipabiles.*

Sic aqua frigore congelata, lapides, & metalla densæ appellantur.

*Gravitas est qualitas à frigore & densitate orta, per quam res deorsum feruntur, lapis v. g.*

*Levitas est qualitas orta à calore & raritate, per quam res sursum feruntur, ut vapores.*

*Durities est qualitas à siccitate orta, per quam res tactui difficilè cedunt, ut terra.*

*Molliities est qualitas ab humiditate orta, per quam res*



## 4 Institutiones Medicæ, Liber I. Sect. II.

*taclui facile cedunt, ut cera.*

*Subtilitas est qualitas orta à calore, siccitate, & raritate, per quam res sunt admodum tenues, & penetrantes, ut Spiritus.*

Differt à raritate tanquam effectus à sua causa; nam ex raritate oritur subtilitas. Et non omnia rara subtilia; nam omnis aer rarus est, sed non subtilis, quidam enim dicitur crassus: sic in multorum morborum therapia aerem crassum fugiendum esse consuevimus.

*Crassities est qualitas orta à frigore & densitate, per quam res sunt solidiores, & minus penetrantes, ut Aurum.*

Differt etiam crassities à densitate, tanquam effectus à sua causa; non enim omne densum statim crassum dici potest.

*Ariditas est qualitas orta à siccitate, per quam res sunt humoris fere expertes, ut arena.*

*Lubricitas est qualitas orta ab humiditate, per quam res sunt tactum effugientes, & elabentes.*

Sic anguilla lubrica dicitur, & via glacie obsita.

*Friabilitas est qualitas ex siccitate orta, per quam res sunt parum coherentes, & attritu faciles.*

Sic sal & saccharum friabilia dicuntur.

*Lentor est qualitas ab humiditate orta, per quam res sunt tenaces & glutinosæ.*

Sic pix, gluten, & alia hujusmodi, lenta appellantur.

*Asperitas est qualitas ex siccitate orta, per quam res sunt in superficie prominentes, & tactum offendentes.*

Sic cortices arborum, & pumices asperitatem præ se ferunt.

*Lavitas est qualitas orta ab humiditate, per quam res sunt in superficie æquales, & tactum oblectantes.*

Hæc qualitas non solum ex humiditate, sed etiam ab arte produci potest, dum scilicet res solidæ, & densæ poliuntur & dedolantur, ut Vitrum, Marmor. (Conf. Lind. Meletem. III. §. 20. 38.)

### CAPUT IV.

#### De Mixtione Elementorum.

*Mixtio est miscibilium alteratorum unio. Aristoteles I. de generat. cap. 10.*

**P**ER miscibilia intelligit elementa, quæ naturalem illam habent dispositionem, ut simul misceri possint, sese prius invicem alterando, & ad talem temperiem reducendo, ut ex his unum quid fieri possit. Ex qua unione nova forma oritur, quæ forma mixti appellatur. Et illa unio, mixtio verè & propriè dici debet. Nam cum semina, verbi gratiâ, diversarum plantarum inter se commiscuntur, ut iterum separari possint, *oppositio* dicitur; cum verò vinum & aqua, aut alia hujusmodi miscuntur, quæ separari rursus nequeunt, sed tamen novam formam non producant, *confusio* appellatur: Et utraque, mixtio impropriè dicta nuncupatur.

*Ad mixtionem autem efficiendam quatuor requiruntur conditiones.*

1. *Miscibilia contrariis qualitatibus debent esse prædita, ut in se invicem agere, & à se invicem pati queant.*

Si ea quæ miscuntur, in se invicem non agerent, non possent ad moderatam temperiem reduci, ex qua oritur mixtio, eaque ita in eodem statu remanerent.

2. *Certa miscibilium debet esse proportio, tam in quantitate, quam in qualitate.*

Si enim unum ex his reliqua quantitate, vel qualitate nimis superet, illa prorsus interimet, & in suam naturam convertet, atque ita fiet unius generatio, & corruptio aliorum, non autem mixtio.

3. *Elementa dum miscuntur, in minutissimas particulas dividi debent, ut quælibet mixti particula quatuor elementa in se contineat.*

Illam conjunctionem à natura fit, quæ elementa reddit penetrabilia, & apta ut se mutuò subeant, atque hoc modo melius transmutari possint.

4. *Elementa formaliter in mixto remanere debent.*

In hoc differt generatio à mixtione, quòd in generatione, adveniente novâ formâ, priores corrumpantur; in mixtione verò etiam si nova mixti forma producatur, formæ tamen eorum ex quibus constitutum est, simul remaneant. Quod verissimum indè comprobatur, quòd omnis actio sit à forma, pugna autem quæ in mixtis sit inter contrarias qualitates, unde illorum destructio tandem sequitur, non possit fieri à forma mixti, alioqui sui ipsius destructionem moliretur, quod adversatur veræ Philosophiæ. Ergo necesse est à formis Elementorum dependere, atque adeò elementa esse formaliter in mixto.

Sed dices, si plures formæ remaneant in mixto, mixtum non erit unum ens per se; nam ex pluribus entibus in actu, non potest fieri unum ens per se, ex Aristotele 2. *Metaph.* sed tantum aggregatum per accidens: unumquodque autem est actu per suam formam. Respondeo, hoc verum esse, si omnes formæ sint æquè nobiles, & nulla reliquis prædominetur, sed in mixto est una forma nobilior, nempe forma ipsius mixti, cui formæ elementorum succiuntur tanquam imperfectiores, & illius imperio parent, atque ita ad illam se habent instar materiæ, licet respectu materiæ ipsorum elementorum sint veræ formæ. Quod ut facilius intelligatur, sciendum est, Elementa ad duo referri posse, vel ad materiam primam, ex qua componuntur, unâ cum propriis formis; vel ad ipsum corpus, cujus ipsa sunt materia. Ratione materiæ primæ, dicuntur esse in actu, ratione verò mixti tantum in potentia.

Quemadmodum enim in prædicatione logica, genus intermedium respectu inferiorum dicitur genus & respectu superiorum species, ita in ipsa rerum essentia sunt actus quidam medii, qui respectu materiæ anterioris dicuntur actus, respectu verò perfectioris compositi, dicuntur potentia. Licet igitur elementorum formæ respectu formæ mixti se habeant instar materiæ, & sint tantum in potentia, tamen respectu materiæ, ex qua elementa componuntur, sunt semper in actu, eamque continuo conantur alterare, ut ad pristinam naturam revertantur, & sui juris omnino efficiantur; illarum tamen actionem frænât & cohibet forma mixti, quantum potest, ad sui conservationem, donec illæ à causis externis variè adjunctæ, nobilioris illius formæ jugum excutiant, & corporis mixti distinctionem efficiant. Multo plura dicenda forent pro difficillimi hujus, & valdè intricati theorematis expositione, quam in pauca hæc contraximus, ex eo quòd ad rem medicam parum faciat, ut ipse Galenus affirmat I. de Elementis. Hic igitur primæ hujus sectionis finis esto.

### PHYSIOLOGIÆ SECTIO II.

#### DE TEMPERAMENTIS.

### CAPUT I.

#### De Temperamentorum Natura.

*Temperamentum est proportio quatuor qualitatum principalium, ex elementorum mixtione orta, ad functiones rite obeundas.*

**T**EMPERAMENTUM à mixtione dependet tanquam effectus à sua causa, oritur enim ex mutua illa qualitatum primarum contemperatione, quæ proportionem illam efficit actionibus obeundis necessariam. Vocatur autem *proportio*, quæ est relatio, quam habent qualitates inter se hoc modo contemperatæ; non autem qualitas à quatuor illis primis diversâ, ut voluit Avicenna, cujus opinionem fusè confutat Fernelius.

Dices, Si temperamentum est relatio, actiones ab eo non dependebunt, quia relatio nullam habet agendi vim, neque temperamentum poterit dici unum alteri contrarium, quia relata non habent contrarium. Respondeo, Temperamentum non agere ratione proportionis, quæ relatio est, sed ratione fundamenti, cui relatio illa inhæret; qualitates enim primæ sunt fundamentum illius proportionis, & ab illis actiones essentialiter dependent: non enim tota tempe-



temperamenti essentia in ipsa proportionis relatione consistit, sed huiusmodi relationem quasi connotatam necessario importat, ac si diceremus, temperamentum esse primas qualitates sub certa proportionem.

## CAPUT II.

### De Temperamentorum Differentiis.

*Novem sunt temperamenta, quatuor simplicia, calidum, frigidum, humidum, & siccum: quatuor composita, calidum humidum, calidum siccum, frigidum humidum, frigidum siccum: & unum moderatum, quod eumprator appellatur.*

**C**orpora quæ ita sunt temperata, ut una qualitas reliquas excedat, simplici temperamento prædita esse dicuntur: cum vero duæ qualitates æqualiter superant, compositum habent temperamentum, cum denique nullus in iis est qualitatum excessus perfectè temperata judicantur.

*Dices, priores octo temperamentorum differentias fieri ab aliquo elemento prædominante, vel saltem in corporibus nostris ab aliquo humore prædominante, unde biliosum dicitur temperamentum, vel pituitosum, & ita de cæteris. At unumquodque elementum duabus pollet qualitatibus, quæ illo excedente, necessario excedent, humores etiam duas habent qualitates prædominantes. Ergo nullum dari poterit simplex temperamentum, sed omnia erunt composita.*

*Respondeo. In mixtione aut alteratione elementa ita posse concurrere, ut una qualitas retundatur, altera remanente in excessu, verbi gratiâ, si aer & ignis excedant, humiditas unius, alterius siccitatem temperabit. Sed cum ambo sint calida, excessum in calore efficient. Idem dicendum est de humoribus, bilis enim siccitas sanguinis humiditatem temperabit; sed uterque calidus cum sit, calidam efficiet intemperiem.*

*Illam autem temperamenta talia dicuntur, vel absolutè, vel comparatè.*

*Absolutè talia dicuntur, cum unam vel duas habent qualitates verè prædominantes, à quibus accipiunt denominationem.*

Sic ignis calidus dicitur absolutè, & aqua frigida; sic etiam omnia perfectæ animalia, calida absolutè dicuntur, quia caloris habent prædominium, vita enim est à calido.

*Comparatè talia dicuntur, cum qualitates istas habent magis vel minus excedentes, quàm ea, cum quibus comparantur.*

Sic homo dicitur calidus respectu piscis, frigidus verò respectu leonis: cerebrum dicitur frigidum respectu cordis: unde patet unum & idem dici frigidum comparatè, quod tamen absolutè est calidum.

*Et illa comparatio tripliciter potest fieri, vel ad genus, vel ad speciem, vel ad individuum.*

*Comparatio ad genus illa dicitur quæ fit inter res diversi generis.*

Ut cum temperiem animantis cum plantæ vel mineralis temperie conferimus.

*Comparatio ad speciem illa est, quæ fit inter res diversæ speciei.*

Ut cum hominis temperiem cum leonis vel canis temperie comparamus.

*Comparatio ad individuum est, cum individua ejusdem speciei inter se comparantur.*

Ut cum Socratis temperamentum cum Platonis temperamento conferimus, & alterum altero calidiorem, vel frigidiorē pronuntiamus.

Varia etiam fiunt comparationes temperamenti in ipso individuo cum seipso comparato, eoque vel integro, ut cum Socrate senex cum se ipso juvene comparatur; vel cum illius partes conferuntur invicem; ut quando temperamentum hepatis cum ventriculi temperamento confertur, & alia huiusmodi, quæ per se facile innotescunt.

## CAPUT III.

### De eumprato Temperamento.

*Temperamentum eumprator seu moderatum duplex statuitur, unum ad pondus, alterum ad justitiam.*

*Moderatum ad pondus illud dicitur, in quo primæ elementorum qualitates ad tam exactam proportionem sunt redactæ, ut nulla alteri dominetur.*

**Q**uidam corpus temperatum ad pondus appellant, in quo non solum qualitatum, sed etiam elementorum æqualis mensura reperitur, quod non solum in rerum natura dari nequit, sed ne cognitione quidem concipi potest, quia esset prorsus immobile, cum omne mixtum ad modum elementi prædominantis moveatur; neque etiam proprium locum inveniret, unumquodque enim eo in loco sistitur naturaliter, qui elemento vincenti proprius existit. Ergo de solis qualitatibus æqualiter permixtis est audiendum, quod etiam non dari in rerum natura multi contendunt, sed ab Authoribus fuisse constitutum, tanquam ideam perfecti temperamenti, & normam ac regulam reliquorum ad quam illa referri possent, eorumque excessus melius judicari, quemadmodum Plato perfectam Rempublicam, Cicero Oratorem, & Stoici Sapientem descripserunt, quales nunquam extiterunt. Et Gal. ipse 1. de sanit. tuend. c. 5. tale medium vix reperiri ait: Et si inveniatur, ne momento quidem subsistere, propter varias mutationes. Quare imaginatione potius concipiendum est quàm revera subsistat: præsertim, cum ad actiones varias perfectè exercendas non sit tam utile, ac illud, quod ad justitiam appellatur, ut inferius patebit.

Dicitur temperamentum ad pondus, quod ex æquali elementorum mensura, & veluti pondere constituatur, quod hac ratione non valde aptè ita denominatur. Philosophi illud vocant *temperamentum proportionis Arithmetica*, quia ut in proportionem Arithmetica est paritas numerorum, sive intervallorum in numeris, ita ut non majus sit intervallum à 2. ad 3. quàm à 3. ad 4. sic in hoc temperamento est paritas quædam in qualitatibus, ut nulla alias excedat.

*Moderatum ad justitiam illud est, in quo primæ elementorum qualitates ad eam proportionem sunt redactæ, quæ propriis ejusque rei in sua specie functionibus obeundis est necessaria.*

Cum res diversæ speciei diversas habeant functiones, & omnes rerum omnium functiones pendeant à temperamento, necesse fuit eas pro diversis suis functionibus obeundis diversa obtinuisse temperamenta: ita ut in hac calidum frigidum, in illa humidum sicco prædominetur; alia enim temperies homini necessaria est ad proprias functiones obeundas alia leoni, alia equo & ita de cæteris. Et illa temperies dicitur ad justitiam, quia quemadmodum justitia poenas & præmia non omnibus pariter, æquabiliterque distribuit, sed unicuique largitur quod ex ratione promeretur, aliis plus, aliis minus, in hac tamen inæquali distributione summa elucet æqualitas: sic iusta natura diversis rerum speciebus diversa temperamenta adhibuit, quorum ope omnibus muniis ad quæ fuerant destinata, integrè & perfectè fungerentur. A Philosophis vocatur hoc *temperamentum proportionis Geometricæ*, quia quemadmodum in Geometrica portione non respicitur ad differentiarum, sed tantum ad rationum æqualitatem: ita in hoc temperamento non consideratur qualitatum ad pondus & æquilibrium æqualitas, sed potius talis qualitatum inter se consensio, ut uniuscujusque speciei naturæ optimè congruat. Optimum autem judicat Hipp. 1. de Diet. in quo ignis & aqua prævalent. Confer. Lindan. Melct. I. §. 107.

## CAPUT IV.

### De Temperamentis.

*Omnis Temperamentorum differentia tactu dignoscuntur.*

**O**mnes illæ differentia pendent ab excessu primarum qualitatum, quæ sunt objectum Tactus, sicut calores Visus, saporis Gustus, & odores Olfactus.



## 6 Institutiones Medicæ, Liber I. Sect. II.

*Illius autem instrumentum est Cutis, potissimum ea, quæ extremis manuum digitis inest.*

Instrumentum quod omnium qualitatum excessum debuit percipere, ex omnium qualitatum mediocritate constitui oportuit, neque potius in unam, quam in alteram partem inclinare. Ejusmodi est cutis hominis temperati, quæ ex æquali feminis & sanguinis portione conflata, moderatum ideo obtinuit temperamentum, cum partes omnino carnosæ sint calidæ & humidæ, spermaticæ, frigidæ & siccæ. Ut autem cutis qualitatum excessus percipere possit, in naturali temperamento debet constitui, omnis alienæ qualitatis expertus; si enim à frigore v. g. sit verè congelata, non unus illud obire nequit. Ex omnibus verò partibus cutis manuum est omnium aptissima, non ea, quæ tegit volam, illi enim durus tendo subest, & attritu continuo densatur, & callosa evadit; sed illa quæ digitorum extremitatibus inest, naturalem suam constitutionem magis retinere solet.

*Cutis verò temperamenta inæqualia & excedentia percipit positivè, æquale verò & moderatum privativè.*

Omnis sensus passione fit, & omnis passio à contrario: temperamenta autem exsuperantia respectu moderati, habent rationem contrarii, atque ita cutem quæ temperata est, verè & positivè afficiunt: temperamentum verò moderatum quia nullum habet qualitatum excessum, ideo tactum non afficit, sed cognoscitur tantum privativè. Quæcumque enim neque calida, neque frigida, neque humida, neque sicca sentiuntur, ita ut nullo modo tactum afficiant, propter similitudinem quam cum illo habent, temperata judicantur.

### COROLLARIUM.

Circa judicium Temperamentorum.

Licet tactus temperamentorum iudex statuatur, non tamen ita absolute, quin aliqua egeat restrictione. Galenus enim *lib. de temperamentis*, asserit tactum esse quidem calidi & frigidi iudicem absolute, humidi verò & sicci non simpliciter, sed cum ratione conjunctum: quia humidum non nisi per molliem, & siccum per duritiem cognosci potest: at multa tactui dura occurrunt, quæ sicca non sunt, & plurima mollia, quæ minimè humida. Durum enim trifariam dicitur, ex Gal. 5. *de simpl. medic. facult. c. 4.* siccitate, ut in ossibus apparet: concretionem, ut in glacie, & reliquis rebus frigoris vi condensatis: & repletionem, ut in utero, & ventre hydropicorum. Unde patet multa dura esse, non tamen sicca. Sic etiam multa naturâ sicca, ut plumbum, dum liquantur, mollia apparent. Unde pater qualitates istas tactui imponere posse, nisi ratio in consilium vocetur.

Verum *objici* potest, de caliditate & frigiditate idem dici posse; ex rebus enim calidis vel frigidis aliæ per accidens temperatæ aliter sunt, ut piper potentiâ calidissimum est, tamen aëri hyberno expositum frigidum ad tactum apparebit; & aqua, quæ per se frigida est, si calefacta fuerit, calida æstimabitur, quia talis tactui apparet: unde non minores errores poterunt contingere in istis judicandis, nisi convocata ratione secernantur, & naturalis cujusque constitutio exploretur. *Respondeo*, dum dicimus solum tactum esse iudicem frigoris & caloris, hoc esse potissimum intelligendum de temperamento totius corporis, & sine ulla comparatione, quæ propriè ad rationem pertinet. Item de iis quæ talia sunt per se, non per accidens; actu, non potentiâ: semper enim in omnibus istis verum est dicere, tactum esse verum iudicem frigoris & caloris, prout jam in præsentibus, ipsumque afficiunt: quod in humido & sicco non contingit, quia non per se & immediate, sed per alias qualitates, molliem scilicet & duritiem, tactui sese repræsentant.

### CAPUT V.

De Ætatum Temperamentis.

*Ætas est spatium vite, quo actione caloris nativi in humidum primigenium corporis constitutio manifestè mutatur.*

**V**ita nostra à calore nativo conservatur, qui humido primogenio utitur, tanquam pabulo, idque sensim depopulatur, & ipse etiam agendo repatiens, sensim debilitatur, & ad humidi diminutionem, etiam minuitur: ita ut corpora nostra in vitæ primordiis calida valdè humidaque sint, & temporis progressu frigida siccaque eva-

dant, atque spatium illud temporis, per quod mutationes illæ fiunt, & quod vitæ nostræ circulum mensurat, Ætas non inatur.

*Illius principales differentiæ quatuor sunt, 1. Pueritia, 2. Juventus, 3. Conflans ætas, 4. Senectus.*

In toto illo vitæ spatio quatuor insignes mutationes contingunt, sicut in omnibus rebus conspicimus, principium, incrementum, statum, & declinationem, ideo tota hominis ætas in quatuor partes fuit ab Hippocrate distributa, ut numero elementorum, anni temporatum & corporis nostri humorum, eorumque temperamento responderet: quod usui Medico maximè est commodum. Licet enim Juræconsulti, & Astrologi ad suarum scientiarum præcepta magis accommodati, ætates aliter diviserint, hoc parum moramur, quamvis apud nostros Authores, quædam quatuor illarum ætatum subdivisiones reperiantur, ut postea monebimus. Vide Paul Zacch. q. Med. legal.

*Pueritia à primo ortu ad 25. annum extenditur, estque calida & humida.*

Hæc Veri assimilatur, & ex humoribus sanguini: utrumque enim calidum & humidum censemus.

*Et in quatuor partes rursus distribuitur, quarum prima dicitur Infantia, ad annum quartum, vel nonnullis, ad septimum: secunda, Pueritia, ad annum decimum quartum: tertia, Pubertas, ad annum decimum octavum: & quarta Adolescentia, ad vigesimum quintum se extendens.*

In illo spatio, quod ad vigesimum quintum annum extenditur, magna fit humidi consumptio, ideo pro majore vel minore illius copia, hæ subdivisiones fuerunt institutæ: Magis tamen insignis mutatio fit in pubertate, quam in reliquis differentiis, tunc enim pubes lanugine exornatur, unde illa ætas suum nomen accepit, mammae virginibus intumescunt, menses efferri incipiunt, & maribus vox plenior, & asperior efficitur, unde *εκλαμψον* id est *hircire*, Hippocrati dicuntur, qui etiam tum temporis Venerem agnoscere incipiunt; quæ omnia ita contingunt propter caloris *πρᾶξις* quæ tunc maximè apparet, & antea humoris copiâ obruebatur.

*Juventus ad trigessimum quintum vel quadragessimum annum extenditur, estque calida & sicca.*

Ætati & humori bilioso assimilatur, caliditas enim tunc temporis maximè viget, & maximâ suâ vehementiâ humidum absorbet, unde siccitas oritur.

Hic *queri* solet, an juvenes pueris sint calidiores. *Respondetur*. Pueros esse calidiores extensivè, juvenes verò intensivè, vel pueros esse calidiores ratione quantitatis, juvenes verò ratione qualitatis. Cum enim calor hic, seu calidum potius, de substantia simul & qualitate intelligatur, ex parte quantitatis, seu copiosioris substantiæ, major calidi copia reperitur in puero, quam in juvene: quia quò propius accedimus ad vitæ nostræ principia, eò magis calido, humidoque abundamus. Ex parte verò qualitatis, certissimum est, juvenibus calorem esse intensiorem propter siccitatem: quæ est lima caloris, unde calor puerorum est mitis, blandus, & halituosus, utpotè multo humido naturali perfusus; juvenum verò mordax, acer, & insuavis, propter acres vapores, qui ex sicciore corpore elevantur.

*Consistens ætas ad quadragessimum quintum, vel quinquagesimum annum extenditur, estque frigida & sicca.*

Consistens appellatur, quia etsi virum robur paululum minui incipiat, illa tamen mutatio in habitu vel actionibus non est evidens, sed qui sunt in ea ætate, in eodem statu consistere videntur. Autumno hæc ætas comparatur, & humori melancholico, quia etiam in ea abundat, quia bilis in juventute exarsata, in melancholiam vertitur.

*Senectus ad extremum vitæ extenditur, estque frigida & humida.*

Senum temperies dupliciter consideratur, vel secundum partium solidarum temperiem, vel secundum excrementorum proventum. Ratione partium solidarum sunt frigidi & sicci, quia in illis humidum primigenium est valdè depopulatum, unde magna partium siccitas exsurgit. Ratione verò excrementorum, quæ propter caloris inopiam magnâ copiâ in iis cumulantur, & frigida humidaque



daque existunt, frigidi & humidi dicuntur, qui respectu potius retinetur, ut illa ætatum ad anni tempora & humores analogia fervetur, atque ita senectus hyemi assimilatur. & etiam pituitæ, quâ maximè abundat.

*Et illa in tres partes subdividitur, quarum prima dicitur prima senectus, ab anno quinquagesimo ad sexagesimum; secunda, ætas ingravescens, à sexagesimo anno ad septuagesimum; Tertia dicitur decrepitudine, ab anno septuagesimo usque ad finem vitæ.*

In prima senectate constituti, corpore sunt adhuc satis valido, & civilia munia obire possunt. In ingravescente, imbecilliores sunt, & delicatiori vitæ genere indigent, non tamen omnimoda quiesce. In decrepita denique, viribus omninò destituti, ab omni opere cessare debent, & genio tantum, ac quieti indulgere, & de futura vita cogitare. *Notandum est*, has omnes ætates magnam habere latitudinem, pro robustiore, vel imbecilliore hominum constitutione, ita ut quidam seniores sint anno quinquagesimo, quàm alii sexagesimo, vel ultra. *Conf. Meletem. I. p. 69.*

## CAPUT VI.

### De Sexuum Temperamento.

*Mares in universum sunt calidiores & sicciores: Fœmina frigidiores & humidiores.*

**H**Ujus theorematis veritas facillè demonstratur ex signis calidioris & siccioris temperaturam indicantibus, quæ ex causis & effectibus desumuntur. Ac primum, quod ad causas spectat, semen, (quod efficientis & materis rationem obtinet in generatione,) ex quo mares generantur, calidius est eo ex quo fœmellæ producuntur. *Mares*, inquit Hippocrates, *in dextris, & à dextris oriuntur.* Ut patet ex anatome, vas dextrum quod materiam feminalem suppeditat, à trunco venæ cavæ exoriri, unde semen calidius; sinistrum verò non ab ipso trunco, sed ab emulgente ramo, qui serum ad renem deferit; unde semen frigidius, & magis serosum.

Inter effectus recensentur actiones, excrementa, & quæ in habitu contingunt.

Actiones autem animales, mares esse calidiores, facillè demonstrant, cum illi robustiores multò sint, & laboribus ferendis aptiores; mulieres verò segnes, & otiosæ, ac non nisi vitæ umbratili delectentur. Quod ad vitales spectat, certum est, pulsus & respirationem maribus vehementiores, vocem graviores, & intensiorem, majorem arguere caliditatem. Naturales etiam functiones meliùs exercent, quod ab excrementis innotescit.

Excrementa autem pauca quantitate generari solent in maribus: in fœminis verò copiosa, ut in menstruis purgationibus apparet, quæ idè fiunt, quoniam calor non est satis efficax, ut totum illum sanguinem discutere possit, qui generatur: in mare verò ita omnia digeruntur, ut nihil superflui remaneat.

Ex habitu denique corporis manifestè elucet; mares esse multò calidiores, illi enim hirsuti sunt, non solum barbâ, sed etiam toto corpore; duram & asperam habent cutem, venas latas & amplas, ac musculos firmos & compactos. Illæ verò sunt omninò glabræ & debiles, cutem habent mollem & laxam, atque etiam musculos & vasa angustiora.

*Nota*, in theoremate dictum esse, *mares in universum esse calidiores*, quia sexus hi universaliter sunt considerandi, audiendumque est, mares ex majori parte esse calidiores; quædam enim inveniuntur mulieres calido admodum temperamento præditæ quibusdam viris valdè frigidis calidiores. Sed quia utrique extra ordinariam sui sexus constitutiones sunt positi, idè assertio nostra non infringitur. *Hipp. quoque l. 2. de morbis mulier.* loquitur de sanguine tantum, non de toto. (*conf. Melet. Lind. I. §. 70.*)

## CAPUT VII.

### De Temporibus Anni Temperamentis.

*Quatuor sunt anni tempestates, Ver, Æstas, Autumnus, & Hyems.*

**H**Arum tempestatum causa potissima est Sol, qui anno suo motu varias in aëre efficit mutationes. Duo

autem motus in sole observantur, unus *diurnus*, qui raptu primi mobilis fit ab ortu ad occasum spatio viginti quatuor horarum, quo diem naturalem describit. Alter *proprius*, qui fit ab occasu ad ortum spatio 365. dierum, quo duodecim Zodiaci signa peragrat, & annum integrum describit: & quia propter Zodiaci obliquitatem varie versus nostrum Zenith accedit, varieque ab eo recedit, ideo varias efficit mutationes frigoris & caloris, quibus tempora anni notantur.

*Ver est calidum & humidum.*

Tunc incipit, cum Sol Arietis signum ingreditur, & aërem mediocriter calefacere incipit, quia calor mediocris nondum destruit humiditatem à prægressa hyeme relictam eam tamen sensim domat, ita ut ver in sui medio ferè temperatum existat. Symbolum habet cum aëre, & temperamento sanguineo, ac ferè temperamento. Omnium tempestatum saluberrima, ex Hipp. atque etiam fœcundissima quia rerum omnium vigor, & fœcunditas in calore & humiditate consistit. Quamvis enim Hipp. III. *Aphorism. 20.* multos, eosque perniciosos morbos recenscat, qui veris tempore solent contingere, non tamen idè salubritas illius tollitur, quoniam hoc per accidens contingit in corporibus cacoehymis, magnam pravorum humorum copiam per hyemem colligentibus qui succedente veris tempore funduntur, & aliquando putrescunt: Salubria autem & bene constituta corpora nihil est quod magis conservet, & in propria retineat temperie, quàm vernum tempus illis simillimum.

*Æstas est calida & sicca.*

Illius initium est, cum sol ingreditur signum Cancræ, qui tunc maximè ad nos accedit, ac radios habet valdè directos, dieque sunt longissimi, unde ingens æstus producit, à quo humiditas, ex vere relictâ, consumitur, & siccitas magna introducit. Symbolum habet cum elemento ignis, & humore bilioso.

*Autumnus est frigidus & siccus.*

Tunc vigere incipit, cum Sol ingreditur signum Libræ, ubi fit *æquinoctium*, quod idè *autumnale* appellatur, sicut initium veris *æquinoctium vernum*; tantum enim sol à nobis recessit, ut noctes diebus sint æquales, illosque longitudine superare incipiant; unde propter illum solis recessum frigiditas in aërem introducit, quæ juncta siccitati à prægressa æstate relictâ, frigidum & siccum temperamentum inducit, unde autumnus elemento terræ & humori melancholico dicitur analogus. Quia tamen Sol vires suas adhuc mediocriter exercet; idè, dum est in suo vigore, scilicet in meridie, aërem calefacit, quo fit ut illa tempestas circa meridiem sit satis calida mane autem & serò frigida, dum scilicet Sol non exercet suas vires, imò in eodem die non rarò tunc temporis frigus & calorem satis intensum percipimus, quod fit propter siccitatem, quæ est lima primarum qualitatum; illa verò aëris inæqualitas graves morbos & perniciosos solet inducere ex Hipp. III. *Aphorism. 22.*

*Hyems est frigida & humida.*

Illâ die sumit initium, quâ Sol ingreditur signum Capricorni, tuncque contingit *solstitium hybernium*, sicut in principio æstatis *solstitium æstivum*: tantus enim est Solis recessus à nobis, ut per radios valde obliquos nos intueatur, & dies sint brevissimi, noctes vero longissimæ, unde magna frigiditas contingit, quæ sibi comitem accersit humiditatem, ex eo quod vapores elevati non dissipantur: sed à frigore coguntur in nubes, pluvias, & nives: unde hyems elemento aquæ, & humori pituitoso assimilatur. *Atque hætenus de temperamentis.*

## PHYSIOLOGIÆ SECTIO III. DE HUMORIBUS.

## CAPUT PRIMUM.

### De Humoribus Natura.

*Humor est corpus fluidum, quod ex alimenti coctione fit in nobis nutritionis causâ, vel ad alia corporis commoda.*

**H**umoris nomen dupliciter usurpatur: primò quidem communiter, & generatim pro omni re, quæ suis



fuis terminis difficilè cohibetur, sed tantum alienis, sive in corpore nostro generetur, sive non, atque ita liquores omnes sub illa acceptione continentur. *Secundò* verò sumitur magis propriè, & strictè apud Medicos, pro corporibus liquidis, quæ ex secunda & tertia coctione oriuntur, ut ex definitione patet: in qua primum humor dicitur *corpus fluidum*, quia instar aliorum liquorum facillè diffunditur, & propriis terminis non continetur. Dicitur etiam *fieri in nobis ex alimentis coctione*, ut excludantur aliæ humiditates, quæ in corpus nostrum irrumpere per varios meatus possunt, absque ulla alteratione aut mutatione; & ut ostendatur, quomodo humores illi in corpore nostro generentur. Natura enim, animantium, & hominis potissimum, conservationis sollicita, varia produxit alimenta variis qualitatibus prædita, quibus nutrimentum, & incrementum capefferet, non quidem immediatè, sed præcedentibus multis mutationibus; atque ita prius in ore atteruntur, mox in ventriculum ingesta permiscuntur, concoquuntur, & in substantiam quandam convertuntur cremori similem, quæ chylus appellatur: qui quidem chylus in ventriculo optimè elaboratus in intestina destruitur, ibidemque utilis illius portio separatur à materia terrena & inutili, ex qua fæces generantur; substantia verò illa purior ab hepate per venas mesaraicas, attrahitur, in quo denuò concoquitur & immutatur, undè massa sanguinaria exsurgit; in qua variæ humorum differentiarum continentur, secundum communem veterum opinionem, à recentioribus aliis atque aliis novis inventis illustratam, qua de re *Deinius*, & alii de nuit. (*Melet. I. 120. &c.*)

## CAPUT II.

## De humorum differentiis.

*Omnes humores dividuntur in alibiles & excrementitios.*

*Alibiles dicuntur illi, qui apti sunt in corporis nostri substantiam facessere.*

*Et rursus duplices statuuntur; primarii, & secundarii.*

*Primarii dicuntur illi, qui in venis continentur, & formam in hepate receptam adhuc retinent, nullique membro peculiariter sunt addicti.*

**P**rimarii dicuntur, quia ex illis generantur alii. qui *Secundarii* appellantur: tum, quia statim ac geniti sunt in hepate, tunc primò humorum nomen sortiri incipiunt: chylus enim apud Medicos humoris nomine nunquam donatur. Quamdiù autem humores illi in venis continentur, formam in hepate receptam, idemque nomen semper retinent, donec ad singulas partes delati, ab iis immutari incipiant; tunc enim alias formas, aliaque nomina recipiunt, ut suo loco dicetur.

*Et quatuor sunt, sanguis, pituita, bilis, & melancholia.* Purior chyli portio ad hepar per venas mesaraicas delata, calore illius concoquitur & immutatur, ejusque naturam quodammodò sortitur; non solum enim rubedinem, sed etiam temperiem, hepatis temperaturæ quodammodò similem acquirit: Illa autem substantia, ita ab hepate immutata, *massa sanguinaria* appellatur, quòd sanguine plurimum abundet, non quòd eo solo constet. Cum enim omne agens, licèt eodem modo semper agat, varios tamen producat effectus, pro varia dispositione patientis, sicut Sol eodem calore linteum dealbat, & cutim denigrat; lutum indurat, & ceram emollit. Ita, cum alimenta quævis quatuor constent elementis; calor hepatis, qui est causa efficiens à qua humores generantur, aëream alimentorum portionem in sanguinem commutat, igneam in bilem, aqueam in pituitam, & terream in melancholiam. Licèt negandum non sit, efficientem etiam multum conferre ad majorem hujus vel illius humoris copiam generandam. A calidiori enim hepate ex iisdem alimentis multo major bilis ejusque calidioris, copia produceretur, quàm à frigidiorè; quod contrà frigidius majorem pituitæ copiam generabit. Attamen tantus nunquam excessus dari potest, quin ex quovis alimento quatuor humores perpetuò gignantur, licèt non servatà debità proportionè, quæ talis debet esse

naturaliter, ut major sit sanguinis copia, minor pituitæ, minor adhuc melancholiæ, omnium minima bilis portio existat. Quòd autem quatuor illi humores in massa sanguinaria contineantur, satis apparet ex partium corporis nostri varietate, quæ diversis temperamentis præditæ cum sint, non possunt omnes uno eodemque humore nutriri; simile enim à simili tantum nutritur. Atque ita ex sola partium consideratione facillè judicamus, lienis, v. g. substantiam melancholico humori simillimam, pulmonum bilioso; hepatis, sanguineo; & cerebri, pituitoso, ex iisque nutriri. Confer. *Manuduct.*

## CAPUT III.

## De Sanguine propriè dicto.

*Sanguis propriè dictus, est portio totius massæ sanguinariæ, magis temperata, ad calidum & humidum vergens, & colore rubro perfusa.*

**P**ortio chyli magis temperata, & in substantia mediocris, in sanguinem propriè dictum convertitur, qui ad hepatis naturam & temperiem maximè accedit; quod quidem cum sit calidum & humidum: similem etiam substantiæ sibi analogæ tribuit temperiem; & non solum hanc, sed etiam calorem, qui ruber est, isque reliquorum humorum in massa permixtorum colorem superat, undè tota massa humorum rubra conspicitur, & sanguinis ipsius nomen absolutè sortitur. Illius proventum faciunt alimenta temperata, & boni succi, ætas florens, verna tempestas, & calida humida jecoris temperies.

Licèt ex omni alimento sanguis generetur, ex his tamen majori copia, ex aliis minori: Ideò causis hisce omnibus simul concurrentibus sanguineum efficitur temperamentum, ex magno scilicet sanguinis prædominio.

Illius usus est, in partium carnosarum alimoniam facere: hujusmodi sunt carnes omnium musculorum, & viscerum, quæ sanguine propriè dicto nutriuntur. Ejusdem verò effectus est, reddere homines hilares, & jucundos, ad risum & amorem propensos, ac florido colore perfusos, quia maximâ caloris temperati copiam abundant, undè jucunda illa pathemata exsurgunt: hinc videmus omnia animalia in prima ætate eximia hilaritate perfundi, quia tunc calore nativo plurimum abundant.

*Sanguis autem quicumque in venis continetur, fibris quam plurimis est perfusus, quarum beneficio concrevit, & partibus assimilatur.*

*Fibræ* illæ, quæ magnâ copiam in sanguine continentur, manifestè apparent, dum sanguis multâ aquâ diluitur, vel dum manu agitur, ut in sanguine suillo solet fieri quâ agitatione fibræ omnes auferantur, ut impediatur concretio: tanta enim est harum fibrarum vis ut sanguinem è venis emissum statim coagulent, quibus alioquin ablati nunquam coagulatur, ut in exemplo proposito apparet. Atque harum beneficio sanguis dum ad varias partes deferretur, nutritionis ergò condensatur, & solidior efficitur, ut facillè queat partibus assimilari; alioqui fibris illis destitutus liquidior permaneret: Non est enim credibile quod Aristoteles asserit, cervos, damas, & camelos illis carere; sed potius intelligendum est, paucissimas habere fibras, quæ tamen ad mediocrem concretionem sufficiant. *Fibræ* autem illæ albæ omninò sunt & nerveam substantiam referentes; undè arbitrandum est, eas non in jecore fuisse genitas, sed potius in ventriculo, qui totus nervosus est, & substantiæ suæ naturam chylo quodammodò impertit. (*V. Melet. I. 50 71. 140. 7.*)

*Sanguis verò duplex est, venosus & arteriosus.*

*Venosus crassior est, frigidior, rubicundior, & substantiæ partium solidæ nutriendæ destinatus.*

*Arteriosus verò tenuior est, calidior, subflavior, & substantiæ partium spirituosæ nutriendæ destinatus.*

Qui in venis est sanguis, ab hepate immediatè proficitur, illiusque naturam & temperiem omninò refert; atque adeò arterioso frigidior, qui in corde elaboratur, ubi tenuior evadit, coloremque subflavum adipiscitur propter aëream



aëream portionem, quæ cum eo in sinistro cordis ventriculo permiscetur, coloremque illum saturatum diluit: Tantò ergo est calidior venoso, quanto cordis temperies jecur caliditate superat.

## COROLLARIUM.

Quidam negare ausi sunt, dari sanguinem propriè dictum, sed totam humorum massam ex bile, pituita, & melancholia tantum constitui voluerunt, illosque tres humores, simul mixtos, sanguinis nomine donari, quod demonstrare conantur exemplo lactis, quod ex sanguine immediatè producitur: in eo enim tres tantum substantiæ homogeneæ reperiuntur; nimirum butyrosa, serosa, & caseosa, quæ tribus illis humoribus respondent. Verùm hæc opinio refutatur inde, quòd massa humorum ruborum aliunde quàm à sanguine vero fortiri nequeat: Bilis enim flava est, pituita alba, & melancholia nigra. Deinde partes carnosæ, quæ maximâ copiâ sunt in corpore nostro, colore & temperie sanguini analogæ, peculiariter demonstrant, hunc adesse humorem, ex quo illæ nutriuntur. Ad lactis verò exemplum *Respondemus*, non esse necesse res omnes easdem habere partes ac illæ ex quibus fuerunt genitæ: nam semen quod ex sanguine generatur, duas tantum habet partes, scilicet spiritus & crassamentum. Adde, exemplum illud potius adversus bilem, quam adversus sanguinem concludere: butyrum enim est sanguini analogum, puta calidum & humidum, sicut caseus melancholiæ, serum vero non omnino etiam pituitæ respondet, sed potius ichoribus qui per urinas & sudores excludi solent, & ipsum feri nomen obtinuerunt.

Maximè autem advertendum est, axioma illud, quo fertur, rem in ea resolvi, ex quibus componitur, intelligendum esse tantum de ultima resolutione, quæ fit in elementa. Res enim in ea tandem resolvuntur, ex quibus primò fuerunt genitæ. Elementa autem sunt prima corpora, ex quibus omnia mixta componuntur, atque adeò in illa ultimo resolvuntur, sed nunquam in ea, ex quibus secundariò producuntur: verbi gratia, caro & ossa resolvuntur quidem in elementa post animantis interitum non autem in panem & alia alimenta, ex quibus per nutritionem producuntur; aut in semen & sanguinem, ex quibus fuerunt genita in conceptione.

## CAPUT IV.

### De Pituita Alimentaria.

*Pituita alimentaria est sanguinis crudi portio, frigida & humida, ac serè insipida, aut subdulcis.*

**P**ortio massæ sanguinariæ frigidior & humidior, Pituita appellatur, quæ ex crudiori chyli portione generatur: unde sanguis crudus vel semicoctus à Galeno appellatur, qui & asserit, per inedias in sanguinem propriè dictum ulteriori coctione facessere idque in ipsis venis per vim αἷμα τοποιτικὴν illis ab hepate communicatam.

*Magnum illius proventum solent efficere frigida & humida alimenta, ætas senilis, hybernium tempus, & frigida humidaque jecoris temperies.*

De tempore hyberno est difficultas, quia cùm ventres sunt hyeme calidiores, ex Hipp. propter concentrationem caloris nativi, quæ fit tunc temporis, ineliùs fieri debent concoctiones, atque adeò pauca humoris crudi copia generari. *Respondetur*, magnam pituitæ copiam hyeme generari, non ratione efficientis, sed materiæ, scilicet alimenti: alimenta enim tunc temporis sunt frigida, & compacta, & concoctu difficiliora. Adde tunc temporis plurimum vigere appetentiam, & magna quantitate assumi alimenta, ita ut præ nimia copia non possint perfectè elaborari; sed crudior chylus remaneat, unde crudior sanguinis; nam primæ coctionis vitium non corrigit secunda, ex Galeno.

*Illius usus est partes frigidiores & humidiores nutrire.*

Cerebrum & spinalis medulla magnam habent cum pituita analogiam, illa ideo nutriuntur, ut apparet in excrementis quæ à cerebro quotidie manant. Illa pituita alibilis vulgò dicitur sanguis pituitosus, sicut bilis &

*Laz. Riverii Opera.*

melancholia, sanguis biliosus, vel melancholicus; quod sedulò advertendum, ne error contingat in authorum lectione, dum asserunt, omnes partes sanguine nutriri.

*Effectus verò illius est reddere homines, in quibus dominatur, stupidos, segnes, & somnolentos, toto corpore molles, & albescentes.*

Frigiditas cum humiditate conjuncta reddit spiritus crassos, & parum mobiles, unde hæc accidentia contingunt.

## CAPUT V.

### De Bile Alimentaria.

*Bilis alimentaria est tenuior sanguinis portio calida & sicca, nonnihil amara & flavescens.*

**S**icut quatuor humores quatuor elementis respondent, sic bilis igneæ naturæ, ex calidiore & siccior chylis portione genita, aliquo amarore prædita, non tamen insigni, sicut bilis excrementitia, alioqui non esset ad alendum idonea. Certum enim est, amara non nutrire, quæ scilicet sunt vehementer talia. Nam hyssopus, cichorium, & alia multa, levem habent amarorem, tamen nutriunt. Sic etiam bilis alimentaria leviter tantum amara est, ita scilicet, ut partes illum amarorem non averfentur. Dicitur etiam sicca, potestate, non actu, quia omnes humores fluidi sunt, & actu humidi, potestate tamen exsiccat, sicut aqua maris, vel maria sicca dicuntur.

*Magnum illius proventum faciunt calida & sicca alimenta, pingua & oleosa, ætas virilis, tempus æstivum, & calida siccaque hepatis temperies.*

Non videtur rationi consonum, pingua, & oleosa in bilem converti, cùm illa sint calida & humida, atque ita sanguini producendo potius apta. *Respondetur*, Ista quidem ex sua temperie sanguini potius gignendo esse apta; sed quia substantiam habent valde inflammabilem, ideo in corporibus præparatis ac dispositis ad biliosi succi generationem, in eum faciliè converti. Unde pervulgatum est apud Medicos: dulcia faciliè bilefcere, quod semper intelligendum est ita fieri in corporibus calidis & biliosis, in aliis enim frigidioribus, vel temperamentis, sanguis potius producitur, quod in melle & lacte manifestè apparet; mel enim Senibus, & lac Pueris accommodatissimum est ad alimoniam, utramque verò in ætate florentibus aut calidioribus faciliè bilefcit.

*Illius usus est, partes consimiles nutrire, & sanguini esse instar salis, & condimenti, cujus beneficio partes sanguinem avidius attrahunt.*

Inter partes, quæ à sanguine bilioso nutriuntur pulmo præcipuè recensetur, qui substantiam habet valde raram, ut faciliè ingredientem aërem recipere possit, ideo tenui sanguine debuit nutriri.

Levi autem bilis amarore cum reliquorum humorum dulcedine permixto, gratus sapor toti massæ conciliatur, unde partes alimentum avidius prolestant.

*Ejusdem verò effectus est, reddere homines, in quibus redundat, promptos, iracundos & macilentos.*

Hi omnes sunt caliditatis & siccitatis effectus. (*Melet. I. 113.*)

## CAPUT VI.

### De Melancholia Alimentaria.

*Melancholia alimentaria est crassior sanguinis portio, frigida & sicca, sapore acerbo, & nigro colore prædita.*

**C**rassior chyli portio in melancholiam convertitur, quæ est limosa & veluti sæculenta sanguinis pars, sæcibus vini similis, quæ in dolii fundo residere solent, ideo elemento terræ assimilatur. (*v. Melet. I. 112.*)

*Magnam ejus copiam congerunt crassa & terrena alimenta, consistens ætas, autumnus, & mæiores diuturni.*

*Usus verò illius est, partibus consimili temperamento præditis nutrimentum præbere.*

Hujus naturæ potissimum est lien, deinde ossa, quæ licet colore

B

colore



# 10 Institutiones Medicæ, Lib. I. Sect. III.

colore contrario sint; simile tamen habent temperamentum, albedinem autem acquirunt ulteriori coctione.

*Illius denique effectus est, homines in quibus dominatur, efficiere timidos, mæstos, asperis moribus, & coloris nigricantis.*

Quia Melancholici spiritus habent obscuros & tenebriosos, ideo tristitia phantasmata menti repræsentant, illamque reddunt obtusiores.

Neque obstat dictum illud Aristotelis, apud Medicos etiam valde pervulgatum: melancholicos esse ingeniosos. Non est enim intelligendum de iis melancholicis, qui tales *natura* sunt, ac frigido siccoque temperamento præditi, sed de illis qui *per accidens* tales evadunt, fueruntque à nativo temperamento sanguinei, vel biliosi, ac progressu temporis portio quadam tenuioris sanguinis exurit & crassescit, & naturalis melancholiæ conditiones æmulatur: sed calidior, multò & lucidior, quia sanguis ex se est valde lucidus: unde, cum ex illo humore spiritus lucidi & satis calidi generentur, iique sint satis crassi, & constantes utpote ex crasso humore geniti, aptissimi sunt ad prudentiam efficiendam: hic igitur est humor melancholicus, qui homines ingeniosos facit, artium & scientiarum inventores, & cultores egregios: non autem naturalis illa melancholia frigida & sicca, quæ bardos & stolidos reddit homines, unde *melancholia asinina* vulgò appellatur.

## CAPUT VII.

### De Humoribus Secundariis.

*Hactenus de humoribus alimentariis primariis, sequuntur secundarii. Illi autem dicuntur secundarii, quod à primariis immediatè oriuntur, & alicui membro peculiari sint inserti.*

**H**umores primarii, qui in venis continentur, & sanguinis nomine donantur, ad singulas partes deferuntur; ut in illarum nutrimentum faceant: dum autem à singulis partibus immutari incipiunt, secundarii appellantur. Multi humiditates eos potius quam humores malunt appellare ex eo quod eorum pars ad substantiæ partium naturam potius, quam humorum accedat; atque quatuor partium siccitatibus, à Galeno propositis, opponantur: quod non est à ratione alienum. Possunt tamen nominari humores, cum primariis humoribus immediatè succedant, nec adhuc sint veræ partes.

*Et quatuor sunt, primus dicitur humor innominatus, sive insitus, secundus ros, tertius gluten, quartus cambium.*

Quatuor istorum humorum secundariorum autor fuit Avic. *fen. 1. primi canon. doct. 4. cap. 1.* quos elicit ex Gal. qui *lib. 7. meth. c. 6.* quatuor siccitates enumerat, quæ partibus corporis nostri solent contingere, propter quatuor diversarum humiditatum consumptionem: quæ quidem humiditates ex sanguine generantur, dum ut dictum est, ille in partium substantiam faceffit; & antequam sit omnino conversus, quatuor insignes subit mutationes, quarum unaquæque peculiare obtinuit nomen.

*Humor innominatus sive insitus est ille, qui in exilium venarum extremitatibus continetur, & levem à particularibus membris mutationem suscipere incipit.*

Sanguis simul atque è vasis amplioribus deferitur in angustiora, quæ unicuique parti naturaliter sunt infixæ, particulæ illius qualitibus sensim perfunduntur, eaque commutatione partibus naturam assumere incipiens, fit primus humor ex quatuor secundariis, cui nullum nomen fuit impositum, ideo *Innominatus* appellatur, recentiores tamen nonnulli *insitum* nominarunt.

*Ros verò tunc appellatur, cum prima illa humiditas ab extremitatibus vasorum excidit, & in membrorum substantiam dispersa est.*

Ideo Ros appellatur, quod roris instar partium substantiam irriget, & in tenuibus earum spatiis excipiat. Fit ex humore innominato, sed multò magis alteratus est, & ad partis naturam magis accedit.

*Gluten tunc dicitur, cum roridus ille humor partibus unitur, & agglutinatur.*

*Cambium denique, cum gluten illud in partis substantiam omnino convertitur, & assimilatur.*

Harum duarum postremarum humiditatum discrimen innotescit ex differentia, quæ inter unionem & assimilationem intercedit. Illa autem luculentissimis exemplis demonstratur. Nam in scabie, elephantiasi, & similibus, appositio quidem fit seu agglutinatio copiosi humoris, qui tamen non assimilatur, sed propter pravas qualitates quæ ei insunt, corrumpitur; unde patet unionem valde differre ab assimilatione.

## CAPUT VIII.

### De Humoribus Excrementitiis, ac primum de Bile Excrementitia.

*Hactenus de humoribus alimentariis. Excrementitii dicuntur illi, qui nullam habent corpori alendo aptitudinem, sed à corpore expelluntur & separantur.*

*Et quatuor sunt, 1. bilis, 2. melancholia, 3. serum, 4. pituita. Bilis excrementitia est excrementum tenue secundæ coctionis, calidum & siccum, colore flavum, & sapore amarum quod ad vesiculam felleam expurgatur.*

**O**mnes coctiones sua habent excrementa, quoniam non omnes alimenti partes sunt nutritioni aptæ: ideo portio inutilis ab utili separatur, & foras excluditur. Sic primæ coctionis excrementa sunt fæces, quæ per alvum deturbantur. Secundæ verò, excrementa tria sunt, quæ quoniam ad humores referuntur, jam à nobis veniunt exponenda.

Primum igitur secundæ coctionis excrementum, est tenuis quidam humor, calidus & siccus, valdè amarus, ideo nutritioni ineptus, qui ad vesiculam felleam deferitur, partim jecoris expultrice, partim vesiculæ illius attractrice, quæ idcirco familiaritate quadam & sympathiâ cum humore illo fuit à natura donata, ut eo gauderet, & oblectaretur. Vid. Lauremb.

*Illius usus est, expultricem intestinorum facultatem ad suum officium impellere & pituitam lentam intestinorum tunicis adhaerentem detergere.*

Postquam vesicula fellea bilem ad se attraxit, eâ aliquandiu fruitur, & gaudet, donec per moram aerior facta, cystidem illam irriter ad sui expulsionem: tunc enim à cystide propellitur ad duodenum intestinum, per meatum quendam huic rei destinatum, qui potus cholidochus appellatur. Bilis autem ad intestina delata, acrimonia sua irritat, & facultatem eorum expultricem movet; unde fæces commodius excluduntur; quæ ut plurimum flavo vel rufo colore tinctæ apparent, propter bilis permutationem. Quia verò intestina pituita multa viscida & lentâ abundare solent, hoc etiam commodum bilis præstat, quod scilicet pituitam illam incidat & detergat, illiusque exclusionem juvet.

*Differentiæ verò illius dupliciter constituuntur, vel quatenus in naturali constitutione sita est, vel quatenus naturæ limites excedit.*

*In naturali constitutione sita duplex est, flava & pallida. Flava est illa, quæ in cystide continetur pura & impermixta, quæ jam fuit commemorata.*

*Pallida verò fit, cum serosus quidam humor flavæ permiscetur. Serum bili permixtum, flavum illius colorem diluit, & pallidiorem reddit, nec non frigidior & humidior.*

*Dum autem naturæ linimentis excedit, quatuor illius sunt, species, vitellina, porracea, eruginosa & glastea.*

*Vitellina bilis colore & consistentia crudos ovorum vitellos refert, flavâ multò calidior, ac ea quæ fit, calore vehementiori alterata & incrassata.*

Dum caloris præternaturalis acrimoniâ bilis naturalis torretur, partes illius tenuiores dissipantur, unde crassior evadit, & colorem acquirit magis saturatum, caloremque intensiorem. Non enim audientibus Avic. qui vult bilem flavam in vitellinam transire per admixtionem pituitæ, nam hoc modo pallidior evaderet & frigidior.

*Porracea bilis porri colorem referens, vitellina calidior est,*



*& in ventriculo ut plurimum ex pravis alimentis producitur.*

Viridis illa est instar porri, talisque sæpè efficitur ex pravis alimentis, qualia sunt allia, cepæ, porrum, nasturtium, brassica, & similia; quæ dum in ventriculo concoqui non possunt, & in chyli naturam converti, exuruntur, colorem tamen suum magna ex parte retinent; unde porracea illa bilis generatur. Notandum tamen est, hoc non fieri nisi in ventriculis calidissimis. Fit etiam interdum in aliis corporis nostri partibus ex bile vitellina à calore exurente magis calefactâ, unde illius color in viridem convertitur.

*Æruginosa bilis, æruginis colorem referens, fit ex porracea, majori aduisione.*

Dum bilis porracea diutius commoratur in ventriculo, calore præternaturali eoque intensiore facta, magis aduritur, & in æruginosam mutatur. Interdum etiam in venis fit à calore valde intenso, superiores bilis species torrefaciente: estque valde acris & maligna, unde apud Hipp. defectiones æruginosæ lethales æstimantur. (*Progn. X. 3. ad 10. Coac. 330.*)

*Glasæa bilis, Isatidis seu glasti colorem referens, ex reliquis fit majori incendio, iisque omnibus deterior.*

Hæc ad bilis atræ naturam accedit, & colore magis fusco & obscuro quàm reliquæ, quam torrefactione majore acquirit, ideo illis deterior est magis perniciofa.

## COROLLARIUM.

Galenus *lib. de atra bile*, bilem rubram commemorat, unde plures species videntur referendæ; at illa non est propriè bilis, sed serum sanguinis, ut ipse Galenus explicat, *comment. 5. in 9. Epid.*

## CAPUT IX.

De Melancholia excrementitia.

*Melancholia excrementitia est excrementum crassum secundæ coctionis, frigidum & siccum, colore nigro, sapore acido præditum, quod ad lienem expurgatur.*

**P**ortio chyli crassior & magis sæculenta, quæ in substantiam alibilem non potuit ab hepate commutari, à massa sanguinea separatur, ut illa omnis impuritatis expers remanere possit: quæ quidem materia crassa & terrena, melancholia excrementitia nominatur, atque ut commodè expurgari possit, peculiaris pars fuit constructa, maximam cum illo humore habens similitudinem, quem ideo ad se illicit; & intra substantiam suam mollem & laxam recondit, interea tamen sanguinem melancholicum ei permixtum ad sui nutritionem separat, sibi que assimilat.

*Illius usus est, ventriculi coctionem adjuvare, & naturalem in illo excitare appetentiam.*

Postquam lien humorem illum aliquandiu retinuit, ejusdem onere gravatus, ad ventriculum eum expellit per meatum, qui ad fundum illius terminatur, & vas breve appellatur. Inutilis autem omnino non est, sed coctionem & retentionem ventriculi juvat, ex Galeno *5. de usu part.* Ventriculum enim contrahit, & cogit cibos ad unguem complecti, & retinere quousque fuerint concocti, levi enim adstrictione præditus est iste humor. Addit Avicenna naturalem appetentiam excitare propter levem aciditatem, quam præ se ferre solet; quemadmodum acida omnia illud idem præstant; unde usu ordinario venit in mensarum principii acetaria apponere, ad provocandum appetitum. Hinc fit ut melancholici omnes famelici esse soleant, propter copiam hujus humoris, qui in ventriculum effunditur.

Hæc etiam opinio ex Galeno colligi potest, qui *1. de sympt. causis*, vult caninam appetentiam fieri, cum succorum acidorum copia in ipso ventriculo gignitur, aut in ejus os aliunde influit. Si igitur succus melancholicus, qui acidus est, nimiam copiam & præter naturam congestus, facit famem præter naturam, non est dubium, quin modicus ille, & secundum naturam se habens, naturalem famem possit excitare.

*Dices*, pituitam acidam excitare etiam appetentiam caninam, non minùs quàm melancholiam: posse igitur in medica quantitate famem naturalem efficere. *Respondet*, non sequi, propterea quòd pituita acida est perpetuò

*Laz. Riverii Opera.*

præternaturalis, & à morbo fit; melancholia verò naturalis est, & secundum naturam singulis diebus in ventriculum ejicitur, ideo affectum naturalem producere potest, non autem acida pituita, nec melancholia illa redundans ac morbofa, quæ præternaturales sunt, & famem tantum præternaturalem producere possunt. Alio etiam modo humor melancholicus ciborum appetentiam & coctionem juvat, prout nimirum eorum dissolutionem promovet, sicut videmus acida omnia, ut acetum, succum limonum, lapides dissolvere, & spiritus vitrioli, nitri, sulphuris, durissima metalla. De his plura diximus in *Praxi medica nostra, cap. de concoctione læsa.*

*Dum verò melancholia excrementitia præter naturam se habet, atra bilis appellatur, quæ ferventissima & acerrima.*

Omnium humorum perniciosissimus est atra bilis, quæ perpetuò præter naturam se habet, & omnibus corporis nostri partibus infestissima, ac summè exitialis propter maximam acrimoniam, quæ partes, quibus adhæret, rodit, ulcerat, & exurit, immò in terram effusus, instar acetii acerrimi, vel potius aquæ fortis, eam fermentat, & bullas fervendo producit. Fit à calidissima partium intemperie, quæ contentos succos extorret & incinerat, vel è putredinoso calore in humoribus introducto, cujus vi consumptis tenuioribus & humidioribus partibus, crassiores remanent, tanquam sæces exustæ & incineratæ. Illa tamen incineratio tanta fieri nequit in humoribus, quin adhuc fluidam consistentiam, & propriam humoris formam retineant.

*Illius verò atra bilis quatuor enumerantur differentie, à causarum differentiis desumptæ, quatenus scilicet ex melancholia, bile, sanguine, vel pituita falsâ generatur.*

*Prima* atræ bilis species fit ex melancholia naturali putrefacta & exusta, ab eaque differt, ut sæx usta à non usta, pruna à carbone, ferrum candens à non candente. *Secunda* fit ex flava bile valdè adusta, ut enim minori unctione fit vitellina, porracea, æruginosa, & glasæa; sic majori tandem fit atra omnium perniciosissima, quæ illa verè est, quæ muscas abigit, & terram fermentat. *Tertia* fit ex sanguine supra modum putrescente aut exusto; tunc enim pars illius subtilior in bilem flavam, crassior verò in atram commutatur, si quidem magna fuerit aduasio; alioqui tetri illius humoris naturam nequit assumere, sed tantum in melancholiam frigidam & siccam transibit. Cum verò ita caloris incendio torretur, ut Empyreuma retineat, veram atræ bilis naturam possidet. Mitior tamen est reliquis, cum pristinam naturam perpetuò aliquantulum redolet. Esse tamen atram bilem, patet in tumoribus carbunculosis, quia crassiori sanguine & fervidiori contingunt, sæpeque in veros canculos degenerant. *Quarta* & ultima fit ex falsa pituita, quæ longiori unctione tam mordax & infesta evadit, ut ad confinium atræ bilis proximè accedere videatur; licet rarissima sit ista atræ bilis species, immò multi illam nullo modo dari firmiter asseverant. Cum enim pituita alba sit, in nigrum colorem transire nequit, nisi per alios medios, ut flavum, viridem, & reliquos. Deinde, si pituita exuratur, partes illius tenuiores resolvuntur, crassior verò in gypseam mutatur, quæ suam etiam albedinem retinere solet. Existimamus tamen pituitam falsam, ubi vehementius exurit, tantam malitiam, & erodendi vim acquirere, ut quoad qualitates spectat, nihil ab atra bile differat; quoad colorem verò album, non est absurdum affirmare, illum in nigrum posse commutari aliquando violentâ & inæquali unctione, per fumos & fuligines, quæ cum illa permiscuntur, quemadmodum videmus ligna candidissima in carbones immediate commutari: quando verò sensim & æqualiter concoquitur, ut dum gypsea fit, propriam albedinem non amittere.

## CAPUT X.

De Sero.

*Serum est excrementum tenue & aquosum secundæ coctionis, quod partim per urinas, partim per sudores expurgatur.*

**A**limentorum coctiones elixatione fiunt, ideo quemadmodum in artificiosis elixationibus magna humiditas



## 12 Institutiones Medicæ, Lib. I. Sect. III.

humiditate opus est, ne res potius assentur, quam elixentur, sic in naturalibus coctionibus magna humiditatis copia cum alimentis debet permisceri, quæ illa est, quam largo potu circa passus assumimus, & illa materia potulenta cum cibis in ventriculo ita miscetur, ut una veluti substantia fiat, eaque adeo tenuis, ut lactis vel cremoris speciem repræsentet, chylus, id est succus ideo appellata: quod quidem ita fieri necessum fuit, ut alimenta in illa prima coctione præparata, angustas illas venas pervadere possint, per quas ad hepar ferri solent tum etiam venulas illas, quæ per substantiam hepatis disperguntur. Postquam verò hæmatosis in hepate peracta est, non tantâ amplius opus est humiditate, ideo majorem illius partem natura secernit, quæ à renibus attrahitur, & inde ad vesicam amandatur, ubi urinæ nomen sortitur: prius vero dum in venis continetur, serum appellatur. Portio verò feri, quæ in venis adhuc remanet cum sanguinea massa permixta est, ut si humorum vehiculum; iique tenuiores facti & magis fluxibiles, ad singulas corporis nostri particulas facilius ferri possint; postquam verò hæc feri portio officio suo omnino perfuncta est, partim ad renes remeat, & cum reliqua urina permiscetur: partim verò ad habitum corporis fertur, & per sudores expurgatur. (v. Melet. I. 23. 116.)

*Illius usus est, esse vehiculo humorum alibilium, ut facile per corpus transferantur.*

Hunc usum præstat, quandiu in venis continetur: postquam enim ab eis excidit, nullum habet usum in corpore, sicut bilis, & melancholia.

*Ejusdem differentie quatuor sunt, nimirum sanguineum biliosum, pituitosum, & melancholicum.*

Unusquisque humor proprium & peculiare serum habere æstimatur, naturæ & temperiei propriæ analogum. Sic serum sanguinis calidum & humidum, & subrubrum censetur: serum bilis calidum & siccum, & subflavum, serum pituitæ frigidum & humidum, & albicans: serum denique melancholiæ frigidum & siccum, ac fusco colore præditum.

### CAPUT XI.

#### De Pituita Excrementitia.

*Pituita excrementitia est excrementum tertiæ concoctionis frigidum & humidum, colore album, sapore insipidum vel subdulce, quod in variis partibus, cerebro potissimum generatur.*

**P**artes frigido humidoque temperamento donatæ, sanguine pituitoso nutriuntur, unde multa excrementa producuntur, tum propter ipsius partis frigiditatem, quæ perfectam concoctionem præstare nequit, tum etiam propter humorem ipsum, qui cum sit crudior sanguinis portio, difficilius concoquitur, & magna ejus pars in excrementum commutatur, quod in cerebro valde est manifestum. Illud enim magnam pituitæ excrementitiæ copiam continuò solet colligere, quæ per os & nares expurgatur. Cerebrum autem pituitam illam colligit, non solum per concoctionem proprii alimenti, sed etiam propter situm sublimem, cujus ratione multi vapores à ventriculo, hepate, & aliis visceribus sursum ad caput feruntur, & à frigiditate cerebri condensantur in aqueam materiam, quæ hujusmodi pituitam constituit. Hinc propter magnam illam pituitæ copiam quæ duobus hisce modis in cerebro colligitur, Hipp. aliique Medici cerebrum *Metropolim pituitæ, omniumque fluxionum* auctorem appellarunt.

*Illius differentie ex sapore & consistentia desumuntur.*

*Ratione saporis quadruplex statuitur: insipida, dulcis, acida, & salsa.*

Hæc maximè naturalis est, talisque in corporibus bene dispositis per sputum quotidie rejicitur.

*Dulcis ex insipida fit, à calore nonnihil alteratâ.*

Quando insipida à calore moderato concoquitur, dulcis evadit: dulcedo enim à calore: non est tamen inde colligendum, pituitam dulcem esse calidam, quia dulcedo

quidem intensa caliditatem arguit, non autem levis & moderata: sic poma frigido temperamento sunt prædita sicut & lac, attamen quavis pituita multo dulciora.

*Acida fit à frigiditate intensiori, aciditatem inducente.*

Cum exiguus pituitæ calor extinguitur, vel dissipatur, tunc illa necessariò acefcit: non secus ac multorum fructuum succi, qui exiguo calore præditi, posteaquam deferbuerint facillimè acefcunt, quod calidioribus non contingit, qui diutius in integritate sua permanere solent, ut de vino generoso patet.

*Salsu pituita fit vel ex putredine, vel ex permixtione falsa humiditatis serosæ. Ex Gal. lib. 2. de diff. febr. cap. 9.*

Ob putredinem salsa fit, quoniam cum per putredinem siccum ab humido separetur, & siccum illud à calore putredinoso exassetur, dum humidæ substantiæ denuò permiscetur, salsum inducit saporem. Fit verò ex permixtione salsæ humiditatis serosæ, dum illa à calore intenso falsedinem adepta, dulci pituitæ permiscetur: humiditas autem serosa falsedinem acquirit, dum calor in illam agens, exustos vapores producit, qui ei permixti falsedinem efficiunt.

Nota, duas istas pituitæ species, scilicet acidam & salsam, præter naturam se habere: dulcem verò & insipidam secundum naturam.

*Ratione consistentiæ quadruplex etiam statuitur: tenuis, crassa, vitrea, & gypsea.*

*Tenuis est, quæ aquam sortitur consistentiam, fluidaque valde est, & facile in varias partes illabitur.*

Talis est ea, quam videmus per nares stillare è cerebro, & ex ore profluere: tum etiam in plurimas partes, per media musculorum intervalla effundi.

*Crassa est, cum tenuis illa crassitiem quandam & lentorem à calore acquisivit.*

Calor tenuiores partes resolvendo increffat, unde pituita illa, lentorem adepta, *mucus* propriè appellatur.

*Vitrea pituita crassa etiamnum est, sed pellucida, instar vitri liquefacti, aut albuminis crudi ovi.*

Dubium valde est, nec ab auctore ullo, quod sciam, resolutum, cur cum *pituita vitrea*, & ea quæ *crassa* appellatur, similem ferè crassitiem habeant, una tamen sit valdè pellucida & diaphana, altera verò opaca. Putarem verò illud fieri propter diversitatem causæ efficientis, quòd scilicet crassa pituita fit à calore, vitrea verò à frigiditate: in crassa calor resolvit partes tenuiores, magisque aéreas & aqueas, quæ diaphaneitatem efficiunt; unde remanet opaca: in vitrea verò, quia illa à frigore increffatur, nihil resolvitur, sed partes diaphanæ remanent, unde pellucida apparet: quod in glacie est manifestum.

Verùm *Dices*, Pituitam in corpore nostro tantam acquirere non posse frigiditatem, ut illius vi densior crassiorque evadat, cum omnia sint actu calida in corpore nostro: quidquid enim frigidum est, à parte, in qua continetur, calefieri est necesse. *Respondeo*, Pituitam illam, ex qua vitrea producitur, summam obtinere cruditatem, ita ut à natura nequeat edomari, ideo à regimine illius destituitur, tanquam indomita & insuperabilis, tuncque ad propriam naturam redit, nimirum frigiditatem, quam ab aqua participat, & quæ non potest vinci exiguo calore partium, in quibus continetur, qualia sunt intestina in quibus potissimum vitrea illa pituita colligitur, & acerbissimos dolores colicos non raro solet excitare, quia lentore suo intestinis adhæret, & frigiditate sua vellicat & mordet, frigidum enim mordax, ex Hipp. tanta autem frigiditate pollet, ut actu frigida excernatur, quod ipse Gal. in seipso expertus testatur 4. de loc. affl.

*Gypsea pituita ex crassa fit, ad gypsi vel lapidis ferè crassitiem indurata.*

Hæc humoris naturam non amplius retinet, quas in solidam substantiam concrevit, ideo inter humores in propriè recensetur. Fit autem à calore omnes partes humidæ absumente, ita ut partes tantum terrestres remaneant, & indurentur in tephaceam materiam, gypso ferè similem: talis sæpè deprehenditur in articulis, in quibus podagram efficit nodosam.



## PHYSIOLOGIÆ SECTIO IV.

De Spiritibus & Calido Innato.

### CAPUT I.

De Spirituum Natura.

*Hactenus de humoribus: consequens est, ut de spiritibus agamus, qui ex illis, sanguine potissimum, generantur.*

**Q**uia corporis nostri spiritus tam tenuem substantiam obtinuerunt, ut sensuum aciem effugiant, atque adeo illorum existentia ratione tantum possit confirmari: idcirco conveniens est ostendere, illos corporibus nostris adesse antequam eorumdem naturam & essentiam proponamus.

*Primò*, igitur luculentissimus est contextus Hippocratis, VI. *Epidemiorum*. VIII. 25. ubi ait, tria esse quæ corporis nostri compositionem constituunt, nimirum *continentia*, *contenta*, & *impetum facientia*. Per *continentia*, Partes intelligit: Per *contenta*, Humores: & per *impetum facientia*, Spiritus: Galeno ipso explicante. Tanta enim est spirituum tenuitas, mobilitas tanta, ut celerrimè quoquo versum ferantur, & in omnia corporis membra sese insinuant.

*Secundò*, ex Platoniciis spirituum necessitas ita demonstratur: natura non solet duo contraria, vel plurimum inter se distantia conjungere, nisi per medium: sed anima & corpus toto genere dissident; illa enim est incorporea & immortalis; hoc verò corporeum, caducum & mortale: non possunt ergo naturæ tam discrepantes uniri, nisi per medium quoddam & vinculum, quod mediam quodammodo naturam inter illa duo obtineret; quales sunt spiritus, qui materiales quidem sunt, sed tanta tenuitate præditi, ut rerum immaterialium naturam æmulentur.

*Tertiò*, idem ostendit semen prolificum, quod totum spumofum est, spiritibusque turgidum apparet, quibus evanescentibus, remanet quidam liquor aquosus & infœcundus.

*Quartò*. Ex iisdem nutrimur, quibus constamus; sed ad nostri conservationem necessaria est spiritus sive aëris attractio: ergo talis aliqua substantia in nobis continetur.

*Denique*. Idem patefaciunt magnæ illæ cavitates, quæ in ventriculis cerebri & arteriis vacuæ reperiuntur in demortuis: in viventibus verò distinctæ & palpitantes conspiciuntur: quod indicat illas non potuisse alia re impleri, quàm huiusmodi spiritibus.

*Est autem Spiritus substantia tenuis, lucida, & ætherca, ab exhalatione sanguinis benignioris & aëris inspiratu genita, ad universas corporis functiones obeundas necessaria.*

Dicitur *substantia tenuis*; quia subtilitate maximâ & celeritate incredibili totam molem corpoream penetrat & pervadit, ac minutissimos particularum poros & interstitia musculorum subit. Dicitur *lucida* & illustris, non ex opinione vulgi, ut putat Argenterius, sed quia splendoris, & perspicuitatis maximè est particeps, quæ luculenter apparet in oculi pupilla admodum lucida, & probari potest ex eo, quod ubi vapores quidam humoris melancholici aut ingestæ crapulæ in ebriis dominantur, accedat statim mentis perturbatio, ex obscuritate ejusmodi halituum spiritibus permixtorum. Hujus etiam rei luculentum dat signum Avicenna, propterea quòd, inquit, anima nostra, quæ omnes suas actiones per spiritus exercet, gaudeat luce, non tenebris, & spiritus longè sint alacriores die serena quam nubilosa. Unde patet à simili suscitari. Dicitur etiam *substantia ætherca*, quia spirituum materia per longam elaborationem ita depuratur, ut superioris illius elementi naturam æmuletur, quod cœlestibus corporibus est propinquius, & elementum ignis sive æther appellatur.

Quod autem ex sanguinis & aëria permixtione producatur, in differentiarum explicatione patebit.

Ufus denique spirituum in fine exprimitur; non potest enim anima ullam operationem in corpore exercere sine spirituum adminiculo, quia sunt prima & immediata illius instrumenta. (*Melet. I. 51. 59. 96. 104. 140.*)

### CAPUT II.

De Spirituum Differentiis.

*Spiritus duplex est, insitus & influens. Insitus est, qui in singulis partibus ex primis principiis relictus est.*

**D**icitur & ingenitus, innatus, seu implantatus, Græcis *ἐνφυετός*: dum autem ex primis generationis nostræ principiis, semine scilicet & sanguine, partes componuntur; spirituosam substantiam, quæ in semine continetur, insitum illum spiritum constituit. Illum autem singulis partibus adesse, hac ratione demonstratur, quod sine illius opera influens non possit generari, cum simile à simili producat. Tum etiam semen prolificum, quòd ex singulis partibus derivatur, satis ostendit, materiam quandam spirituosam ex singulis partibus derivari, & à sanis sanam, à morbofis morbidam, quæ illarum dispositiones in prole repræsentat.

*Influens est, qui aliunde manat & immittitur, insitumque fovet ac conservat.*

Insitus spiritus, dum in partium functionibus obeundis perpetuò occupatur, facillè dissiparetur, ni continuo influentis adventu conservaretur, & restauraretur, ideò natura quasdam partes produxit, in quibus magna spirituum copia generatur, ut per vias destinatas, in omnes corporis partes influeret, ad spiritus insiti tutelam.

*Et triplex est: Naturalis, Vitalis, & Animalis. Naturalis in jecore producitur ex tenuiore sanguinis portione, cum paucò aëre permixta, & per venas insluit in totum corpus, ut naturales facultates debite exerceantur, cui addendus Genitalis, ratione speciei conservandæ.*

Magna apud authores disceptatio reperitur de spiritu isto naturali, ex eo quod multi eum non dari asseverant, multis rationibus commoti.

*Primò*, quod Galenus de eo dubitaverit, libro 12. *method. c. 5.* ubi sic loquitur: *Quòd si spiritus aliquis, naturalis est, utique is in jecore tanquam in fonte, & venis tanquam instrumentis continetur; & primo de locis affectis, cap. ultimo, naturales facultates ab animalibus distinguit, quod naturales partibus sint insitæ, animales verò à principio influant in illas, tanquam lumen à sole; unde fit, ut actiones animales in partibus non rarò pereant, licet illæ non lædantur, sed tantum læso principio; naturales verò nunquam lædantur, ipsis partibus illæsis.*

*Secundò*, Aër est omnium spirituum materia: ex eo enim & benigniore sanguinis exhalatione spiritus generantur. At nullæ sunt viæ, per quas aër ad hepar ferri possit: Ergo spiritus in hepate non potest generari.

*Tertiò*, Spiritus ab Hippocrate dicuntur impetum facientes, ergo venæ deberent pulsare, si spiritum continerent, non secus ac arteriæ.

Dari tamen spiritum naturalem hac ratione potissimum conficitur. Tres in corpore nostro actiones exercentur specie distinctæ, nimirum Animalis, Vitalis, & Naturalis. At omnis actio per spiritus exercetur, ut Galenus affirmat mille in locis. Ergo tres etiam dabuntur spiritus specie distincti, nimirum Animalis, Vitalis, & Naturalis. Si dicas, actiones naturales à spiritu insito exerceri: *Respondeo*, insitum indigere influente ut conservetur, qui consimilis naturæ sit, & is ab hepate prodire debet.

Ad *Primam* ergo rationem, in contrarium illatam, quæ Galeni auctoritatibus nititur, *respondeo*, Galenum aliquando de hoc spiritu dubitasse, quoniam rudis ille est, nec adeo purus & manifestus, ut vitalis, sed caliginosus & magis terrestris, actionique, cui inservit, proportionatus. Licet verò facultates partibus sint insitæ, indigent tamen spirituum influxu, ut commodè possint exerceri, & insiti spiritus dissipatio impediatur.

Ad *secundam Respondeo*, spiritum naturalem paucò aëre indigere, qui per insensibilem transpirationem, per arterias venas hepatis conjunctas, & per continuam dia-



# 14 Institutiones Medicæ, Lib. I. Sect. IV.

phragmatis ventilationem hepatis faciliè communicatur.

Ad *tertiam* Respondeo, pulsationem arteriarum à spiritibus non dependere; sed à virtute pulsificâ, illis à corde communicatâ. Cum autem talis facultas in hepate non sit; venæ quæ ab illo dependent, pulsus non edunt; qui etiam non fuit necessarius, quoniam sanguis & spiritus naturalis tanta non indigent ventilatione, sed solâ transpiratione satis conservantur.

*Vitalis in corde generatur ex spiritu naturali & aëre, inspiratione attracto, & per arterias influit in universum corpus, ad calorem nativum conservandum, vitamque tuendam.*

Magis rationi est consonum, spiritum vitalem, qui tenuissimus est, ex spirituosâ illa substantiâ, in hepate præparatâ & attenuatâ generari, quàm ex solo sanguine venoso, spiritibus destituto: quemadmodum enim ex vitali animalis producitur; sic etiam ex naturali vitalem generari, est credendum. Naturalis igitur ille spiritus, ad finistrum cordis sinum cum puriori sanguinis portione delatus, cum aëre permiscetur, qui à pulmone ad eundem sinum inspiratione defertur per arteriam venosam, unde insitâ cordis vi & calore innato, jugi elaboratione vitalis spiritus generatur, qui postmodum in arterias delatus, per totum corpus transmittitur, ut suo calore vivifico totum corpus foveat & conservet.

*Animalis in cerebro generatur ex spiritu vitali, & aëre per os & nares attracto, & per nervos influit in universum corpus ad functiones animales exercendas.*

Spiritus vitalis portio ad cerebrum defertur per carotidas arterias, quæ per cervicem decurrunt, & in ventriculis ejus permiscetur cum aëre, qui ad cerebrum attrahitur per patentes oris & narium ductus, ibique per cerebri idiosyncrasiam commutatur, novamque formam adipiscitur, fitque spiritus animalis, actionibus animalibus obeundis idoneus. Dum enim in ipso cerebro adhuc continetur, principes actiones exercet, estque proximum illarum instrumentum. Dum verò per nervos in varias corporis partes influit, motus sensuumque perfectionem complet. Revera autem unicus est spiritus, qui pro subjecti diversitate diversimodè agit, & virtutem naturalem, vitalem, animale, genitalem exercet. (*Melet. I. 53. 54. 59. 142.*)

## C O R O L L A R I U M.

Spiritum animale non dari, sequentibus rationibus confici potest.

*Primò.* In cerebri substantia frigida & humida spiritus, qui calidi sunt & tenues, non possunt generari, cum simile non nisi à simili producat.

*Secundò.* Vapores omnes, qui ad cerebrum feruntur, à frigidity illius & densitate concrefcunt, & in aquam convertuntur: Ergo si spiritus, qui sunt hujusmodi naturæ, in cerebro continerentur, eodem modo concrefcere.

*Tertiò.* Si talis spiritus daretur, potissimum in cerebri ventriculis reperiretur: sed hoc esse non potest, illi enim ventriculi excrementis perpetuò scatent, quorum expurgationi sunt dicati, iisque spiritus inficerentur.

*Quartò.* Si spiritus in ventriculis illis cerebri continerentur, faciliè evanescerent per meatus illos, per quos excrementa expurgantur.

*Quintò.* Si spiritus ille in cerebro contineretur, perpetuè fierent sensationes, & cognitiones, quia animæ facultates semper adsunt, quæ semper operantur, quamdiu suppetunt instrumenta.

Ad *primum* respondeo, Non esse tantam frigiditatem in cerebro, quin actu illud calidum existat, quæ caliditas sufficit ad spiritus animales generandos, qui non simpliciter è calore producantur, sed ab ipsius cerebri *idiosyncrasia*, quæ ad frigiditatem vergere debuit, ut vitalium spirituum fervor reprimeretur, cogitationibusque, & sensationibus nostris firmatas quædam & constantia compararetur, quæ alioqui, præ nimio spirituum calore, deliræ forent, ac furibundæ, quales sunt phreneticorum.

Ad *secundam* respondeo, Non concrefcere spiritus in cerebro, ut vapores, quia non sunt aqueæ naturæ participes, sed potius aëreæ, aut æthereæ.

Ad *tertiam* respondeo, cum Aristotele 2. *de Anima*, c. 8. Naturam ad plura munera eadem re uti posse: ut linguâ ad

gustum primariò, & secundariò ad locutionem: naribus primariò ad odoratum, & aëris inspirationem, secundariò verò ad mucosæ pituitæ expurgationem. Sic cerebri ventriculi primariò ad spirituum generationem, secundariò ad excrementorum expurgationem facti sunt. Cum verò illa excrementa continuò effluant expurgenturque, non possunt inficere spiritus animales, quamdiu cerebrum secundum naturam se habet.

Ad *quartam* respondeo, per meatus illos spiritus non evolare, per quos excrementa effluunt, quia ab amica partis natura & familiaritate substantiæ retinentur.

Ad *quintam* respondeo, ad cogitationem efficiendam tria concurrere: facultatem, instrumentum, & objecta, quæ omnia quamdiu suppetunt, nunquam cessant mentis operationes. Non solum enim vigilantes, sed etiam dormientes non raro cogitationes exercemus, quia licet objecta sensuum externorum deficiant, suppetunt tamen objecta sensuum internorum. Utrisque verò deficientibus, cessant cogitationes: sicut etiam propter defectum instrumenti, scilicet spiritus animalis, qui propter multas operationes exsolvitur, inde provida natura animantibus somnum concessit, cujus beneficio, veluti factis induciis, actiones animales feriantur, spiritusque identidem reparantur.

## C A P U T III.

### De Calido Innato.

*Calidum innatum est humidum primigenium, per omnes corporis partes sparsum, spiritu insito & calore nativo undique perfusum.*

**C**alidi nomen concretum est, quod non solum accidens denotat, sed etiam subjectum, cui illud inhæret: Tria igitur concurrunt ad calidi innati constitutionem; nimirum Humidum primigenium, spiritus insitus, & Calor nativus. In spiritu est calor perpetuò, spiritus autem insitus cum humido primigenio perpetuò junctus est, eique permixtus. Ex his itaque unitis calidum innatum constituitur: Hisce igitur tribus ritè intellectis, calidi innati natura faciliè innotescet. Sed cum spiritus insitus satis suprâque fuerit explicatus, superest tantum, ut de humido primigenio & calore nativo agamus.

*Humidum primigenium est substantia humida, pinguis, oleosa, per omne corpus effusa, qua calor nativus tanquam proprio pabulo conservatur.*

Vita Aristoteli definitur permansio caloris nativi in certo humido. Ut igitur calor ille, vitæ author & conservator, in partibus diu perdurare possit, certo indiget pabulo, non secus ac ignis noster continuo indiget fomento, ut conservetur. Cum autem humidum duplex sit in corpore nostro, unum aqueum, aliud vero pingue & aëreum, non potest calor ille vivificus in humido aqueo sustentari, sed pingui & aëreo. Quemadmodum ellychnium vel candela accensa non liquore aqueo sustentatur, sed oleo vel pinguedine, aut alia hujusmodi substantia: sic arbores & reliquæ plantæ, quæ multum sunt hujus substantiæ pinguis participes, longissimæ sunt durationis, & ignem præbent luculentum, dum comburuntur: Contrà vero ligna viridia, quæ plurimum habent lacteæ humiditatis, vel nimis vetusta, quæ humidum istud pingue amiserunt, vix comburi possunt. Cum autem oleosam & pinguem substantiam dicimus; non audimus adipem vel sebum, quæ frequentissimè in mulierculis aut iis, qui multo otio fruuntur, circa cutem & membranas colliguntur, ossium vero nervorumque substantiam vix attingunt: hæc enim non sunt vitalis caloris subjectum, vel potius impedimentum actionum, ubi nimium excrefcunt. Nativus vero ille & genitilis humor, quanto magis abundat, tanto utilior est, & commodior ad omnes functiones exercendas, vitamque producendam.

*Illius origo est à primis generationis nostræ principiis, semine nimirum & sanguine materno.*

Prima generationis nostræ principia humido illo radicali plurimum abundant, unde cum in illam partium corporis nostri substantiam transeant, fit ut totum corpus in primo vitæ exordio, humido isto plurimum abundet, quod post-



postmodum, caloris nativi continuâ actione, sensum atatum decursu absumitur & exsiccat, donec ad ultimum exsiccationis terminum pervenerit, unde extremum senium & mors naturalis contingunt.

*Conservatio verò à pingui & oleosa alimentorum humiditate.*

Dum humidum illud continuam caloris actionem patitur, citissime absumeretur, ni novo adveniente pabulo illud quod deperditum est, repararetur. Illa autem reparatio fit ex alimentis idoneis, variis coctionibus præparatis, in quibus duplex humiditas reperitur, una quidem pinguis & aërea, quæ ad humidi primigenii naturam proximè accedit, illiusque jacturam refarcit; alia verò aquosa, quæ communem partium humiditatem sustentat, & impedit, ne caloris vis tam citò depopuletur humidum illud pingue & aëreum; quemadmodum videmus in saccharo, melle, oleo, dum coquuntur, permixtam aquam externi ignis vim excipere, & absumi, illis integris permanentibus, aut parum imminutis. Licet verò quod à calore absumitur, alimenti appulsu continuo reparetur; tamen illud, quod reponitur in locum deperditi, multò deterius est, magisque impurum; atque adeò in quantitate & qualitate deficiens, alioqui vita in æternum posset prorogari: sed cum sensim minuatur humidum illud primigenium, & impossibile sit quibusvis alimentis æquale reponere illi, quod antea fuit deperditum, absolutam moriendi necessitatem adfert.

*Calor nativus est qualitas omnibus animalibus propria & familiaris, cujus beneficio vivunt & actiones suas exercent.*

Duplex in corporibus nostris calor reperitur: unus, qui primam corporis & partium mixtionem sequitur, quive adhuc remanet post interitum animantis, quamdiu mixtio adhuc remanet, quæ est ex quatuor elementis suis qualitatibus stipatis; alter, qui animantibus tantum proprius est, vivificus appellatur, quia illo nutrimur, augemur, conservamur, & vivimus, quamdiu præfens est: unde vita Aristoteli definitur, ut dictum est, conservatio illius caloris in certo humido.

*Illius origo est à primis principiis, sicut & humidi primigenii.*

Prima generationis principia, semen potissimum, multis spiritibus, multoque calore referta sunt; unde calor ille in prima conceptione partes omnes delineat, easque postmodum auget & conservat, quamdiu in corpore perdurat.

*Conservatio verò ab humido primigenio, aëre ambiente, calore influente.*

Humidum primigenium est caloris nativi subjectum & pabulum ordinarium, quod hic continuo absumit, ut se ipsum tueatur, quemadmodum lucerna oleo perpetuo indiget ut conservetur, & igni, continuâ lignorum appositione. Et quemadmodum ignis augeri solet, aucta lignorum copiâ, & minui illâ imminutâ; sic calor nativus, aucto vel imminuto humido primigenio, augetur, vel imminuitur. Cum autem humidum primigenium nunquam augeatur, ut diximus, sed ab ipso vitæ exordio sensim minuatur, fit ut calor etiam continuam sui patiatur imminutionem, usque ad extremum vitæ. Quemadmodum etiam ignis noster non solum lignis indiget, ut sustentetur, sed etiam aëre ambiente, quo reficitur ac fovetur: in angusto enim conclavi coërcitus, licet sufficientem habeat pabuli materiam, statim suffocatur, ut in medicis cucurbitulis est manifestum: sic calor noster nativus continuo indiget aëris appulsu, ut commodè ventiletur. Ille autem aër per pulmones deferitur ad cor, quod est præcipuus caloris focus: ad alias verò partes per insensibilem transpirationem, quibus deficientibus statim calor suffocatur, ut in suspensis apparet.

Quia verò calor ille nativus exiguus est in plurimis partibus corporis nostri, ideoque facile in illis extingueretur; fecit provida natura, ut à calore influente continuo foveretur, & sustentaretur. Unde duplex calor à Medicis constituitur, insitus scilicet, & influens. Influens autem ille à duobus caloribus fontibus influit, corde scilicet ac hepate; idque cum sanguine & spiritibus.

#### C O R O L L A R I U M.

Doctissimus Fernelius caloris istius nativi effectus præstantissimos admiratus, eo commotus fuit ut crederet, eum

non esse ex numero qualitatum elementarium; sed sublimiorem quandam habere originem, esseque prorsus divinum ac cœlestem: quod ne impræmeditatus effutire videatur, sequentibus rationibus evincere contendit.

*Prima.* Omnis actio pendet à qualitate prædominante: sed dantur multæ plantæ, ut papaver, cicuta, mandragora; & animalia, ut salamandra, quæ frigida in quarto gradu censentur, & tamen vivunt, vita autem est à calore; necesse ergo est alium calorem ab elementari (qui in illis perexiguus est) diversum esse, cujus beneficio vivant, & actiones suas exercent.

*Secunda.* Si calor elementaris esset autor vitæ sulphur, arsenicum, aliaque hujusmodi, quæ intensum habent hunc calorem, potissimum viverent: sed non vivunt, quia cœlesti illo calore, & vivifico destituuntur, cadavera etiam habent adhuc calorem illum elementarem, nullam tamen vitam.

*Tertia.* Si calor noster esset elementaris, non haberet contrarium calorem elementarem, febrilem putà, qui eum maximè dissolvit.

*Quarta.* Idem confirmat Fernelius autoritate Aristotelis lib. 2. de generat. animal. cap. 3. ubi ait, calorem nativum nullo modo igneum esse, sed aliquid divinius, proportionem respondens elemento stellarum.

Verum licet summa ingenii vim agnoque artificio inventa sit hæc opinio, illi tamen non possumus acquiescere. Non sunt enim qualitatum corporis nostri species sine necessitate multiplicandæ, sed exillimamus caloris nativi naturam esse prorsus elementarem, quod sequentibus probamus.

*Primò,* corpora cœlestia non habent qualitates primas, quia essent corruptibilia. Omnis enim corruptio à qualitatibus dependet, & sic probant Philosophi, cœlos esse incorruptibiles, quia non habent qualitates: Solem etiam probant calorem non in se habere, sed eum producere in hæc inferiora *ἐνερτυαὶς* & virtualiter, motu scilicet, lumine, influentiâ.

*Secundò,* Si calor nativus esset cœlestis, non haberet contrarium, ut ipse vult Fernelius: Sed habet contrarium frigus elementare, à summo enim frigore aliquando intereunt homines, ob caloris nativi extinctionem: Ergo, non est cœlestis.

*Tertiò,* Si esset cœlestis, non indigeret pabulo, & licet indigeret, non haberet in corpore nostro sibi proportionatum; cœlestis enim ab elementari foveri nequit. Ad hoc respondent, calorem illum, licet cœlestis sit propter communionem, quam habet cum elementaribus, fieri quodammodo elementarem, aut saltem se habere elementari modo; quod non videtur sufficiens, quia cœlestia, cum nullo modo patiantur ab elementaribus, non potest eorum natura ita immutari, ut redoleat rerum elementarium conditiones. *Quartò,* Calor nativus ex semine ducit originem. Semen autem à sanguine ortum ducit & spiritibus, qui etiam à sanguine generantur; sanguis autem est elementaris: ergo & nativus calor.

Argumenta verò Fernelii, licet quandam veri speciem præ se ferant, à nobis tamen ita resolvi possunt.

Ad *primum Respondeo*, calorem in corpore vivente esse duplicem: unum quatenus mixtum est; alterum quatenus vivens. Quatenus mixtum, habet quatuor qualitates primas invicem contemperatas, atque adeò calorem, qui tantum est in potentia, cum mixta inanimata ad tactum calida non sentiantur. Quatenus vivens, habet calorem actualem, cujus beneficio vitæ functiones exercet. Et ille calor licet mixtionem non ingrediatur, & operationes exercent, à caloris mixti operationibus diversas; ab illo tamen specie non differt, sed numero tantum: quemadmodum si piper in igne calefiat, calor ille actualis quem acquirit, erit diversus à calore illo, quem habet à mixtione: tamen uterque est elementaris.

Ad *secundum Respondeo*. Sulphur, arsenicum & alia non vivere defectu animæ, quæ vera & principalis est vitæ causa, calor verò est tantum illius instrumentum: causa autem instrumentalis per se nihil agit, sed pro arbitrio causæ principalis, licet calor ille mixti non concurrat ad operationes vitæ, ut diximus, sed tantum calor viventis, quo etiam destituuntur. Cadaverata etiam neque animam habent,



habent, neque calorem illum actuslem, immò nuperrimè mortua calorem illum servant per aliquod tempus, tamen non vivunt defectu animæ. Sic semen calore illo nativo copiosè abundat, & si non vivit, hoc fit defectu animæ: quanquam Neoterici doctiores censeant esse animatum, de quo suo loco dicetur.

Ad tertium Respondeo, Calorem febrilem esse contrarium nativo, quatenus intensior est. Eiusdem enim qualitatis gradus intensus, cum remisso collatus, habet rationem contrarii, quia illum destruit, intensiorem efficiendo. Deinde calor febrilis est contrarius nativo, ratione qualitatis passivæ sibi adjunctæ: febrilis enim siccus est, nativus verò humidus.

Denique ad auctoritatem Aristotelis respondemus, eum ad effectus caloris nativi respexisse, non autem ad naturam illius. Effectus autem huius caloris, divini ferè sunt, qui tamen animæ potius & illius facultatibus sunt adscribendi. Licet calor etiam noster igneus, artificiosè temperatus, effectus prodat admirabiles in arte chymica, immò & in culinaria, quemadmodum & in Ægypto (sicut narrat Scaliger) ova excludi solent in quibusdam furnis ea arte constructis, ut ignis calor in illis maximè temperetur, & idoneus reddatur generationi efficiendæ.



## PHYSIOLOGIÆ SECTIO V. DE PARTIBUS.

### CAPUT I.

#### De Partium Natura.

*Pars est corpus totum coherens, communicare vitam conjunctum, & ad illius functionem usumque comparatum.*

**H**ÆC partis definitio à Fernelio ingeniosissimè constructa, à doctissimis viris postmodum fuit comprobata. Partem enim statuit id, quod sanitatis vel morbi capax. Vultque ea omnia partis nomen non mereri, quæ licet ad corporis constitutionem concurrant, in iis tamen morbi non possunt contingere. Ab hac igitur definitione excluduntur humores & spiritus, quia totum non coherant, nec communi vitam fruuntur (conf. in Lind. Melet. I. 50. 51.) Excluduntur etiam pili, ungues, adeps, & medulla ossium: quia licet toti cohereant, communi tamen vitam non fruuntur, neque verè nutriuntur, sed augentur tantum per juxta positionem. Ea etiam, quæ corpori præter naturam adnascuntur, ut tophi, calli, verrucæ, licet toti adhæreant, vitam tamen non fruuntur. Immo neque carnosæ excrescentiæ partes sunt, licet toti cohereant, & communi vitam fruuntur, quia ad nullam actionem, nullumve usum sunt destinatæ.

Dices, Galenum & Aristotelem pilos, ungues, adipem & medullam non rarò partes appellare. Respondeo, Eos tunc temporis nomen partis late accipere, prout significat ea omnia quæ ad corporis constitutionem concurrunt; nos verò strictè hinc accipimus, pro iis tantum quæ animata sunt, & sunt morborum subjecta.

Non levis tamen est dubitatio de pilis, & unguibus, quos inter partes viventes enumerant Neoterici non pauci: de qua controversia videatur Tardinus in tractatu de pilis elegantissimo, & Plempius.

### CAPUT II.

#### De Partium Differentiis, ac primùm de Partibus Similibus.

*Omnes partes dividuntur in similes & dissimiles. Partes similes sunt, quæ in partes ejusdem naturæ & speciei non differentes dividuntur.*

**H**Æc divisio ex partium materiâ sumitur. Cum enim pars aliqua eandem & undique similem habet materiam, Similares appellatur: si verò materia sit diversa, Dissimilares erit æstimanda. Similem autem undique materiam dicimus habere, quæ scilicet talis ad sensum primo intuitu appareat, qualis nervi substantia est, quæ ad sensum

omninò similis apparet. Attamen subtiliùs inquirenti partes quadam dissimiles in eo reperiuntur; substantia enim illius interior mollis & medullosa: interna verò durior & membranosa. Illa tamen differentia tanta non est nec adeo conspicua, quin ad similiarium partium ordinem nervus referatur. Avicenna partem similem definit, *cujus partes idem nomen, eandemque definitionem retineant cum toto*. Sic quælibet pars ossis os est, quælibet pars nervi nervus. Intellige autem perpetuò de partium materia tantum hinc sermonem haberi, non autem de figura, aut usu: Nam, horum respectu, quælibet earum particula totius definitionem non retinet, V. g. nervus definitur pars similis alba, à cerebro, vel spinali medulla orta, ad motum & sensum toti corpori communicandum comparata: quæ definitio cuilibet illius particulæ non convenit.

*Et illæ sunt duplices: Spermaticæ, & carnosæ.*

*Spermaticæ ex seminis crassamento sunt in prima corporis conformatione.*

Duo sunt principia generationis nostræ, Semen scilicet & Sanguis menstruus, ex quibus omnes corporis nostri partes efformantur. Ex semine enim constituuntur prima illa stamina, quæ sunt totius corporis veluti fundamenta nimirum ossa, ligamenta, tendines, membranæ, & alia hujusmodi.

*Carnosæ verò ex sanguine componuntur.*

Partes carnosæ a spermaticis facillè distinguuntur, quòd illæ rubræ sint & molles, hæ verò albæ, atque ut plurimum solidæ & duræ: quia verò sanguis calidus est & humidus, idè partes carnosæ calidam etiam & humidam temperiem obtinuerunt. Non perinde tamen se habet de spermaticis, quæ licet semen sit calidum & humidum, sunt tamen frigida & siccæ, quia seminis caliditas à spiritibus illius dependet, qui non mutantur in substantiam partis, habent enim tantum nomen efficientis in generatione, humiditas verò seminis absorbitur, ut partes ex eo genitæ siccæ & duræ evadant: unde cum calor in humido consistat, eo absumpto, ille etiam imminuitur. (conf. Melet. I. 79. 80. 81.)

*Caro autem partium similiarium triplex est musculorum, viscerum, & caro propriè dicta.*

Maxima omnium quantitas est carnis musculosæ. Tota enim ferè corporis moles ex musculis componitur, eorumque substantia caro vulgo simpliciter appellatur. Viserum verò substantia caro etiam appellatur, & major quidem eorum pars ex sanguine solo componitur; nonnulla tamen ex semine etiam cum sanguine permixto constituuntur: qualis est substantia ventriculi, intestinorum, uteri & similium.

*Ad partium similiarium actiones ritè exercendas, una tantum requiritur conditio: Earum nempe debita temperies.*

Partes similes, quatenus similes sunt, & ab organicis distinguuntur, unicam tantum actionem habent, nempe nutritionem, cujus gratiâ proprium & conveniens alimentum attrahunt, retinent, & sibi assimilant, quod non nisi per temperiem fieri potest; prout enim pars aliqua variè temperata est, varium poscit alimentum, idque variè immutat: unde similis actio definitur, quæ à sola partis temperie inchoatur, ab eadem perficitur, & à qualibet partis portiuncula integra & perfecta editur.

### CAPUT III.

#### De Partibus Dissimilibus, & Organicis.

*Partes dissimiles sunt, quæ in partes dissimilis naturæ & diversæ speciei dividuntur.*

**S**ic cor, hepar, renes, & reliquæ partes dissimiles appellantur: quia ex multis similibus, scilicet membranis, venis, arteriis, nervis, & parenchymate componuntur. Sic manus & brachium ex ossibus, nervis, carne musculorum, cute, & reliquis constituuntur.

*Omnis pars dissimilares est organica, sed non omnis pars organica est dissimilares.*

Multi dissimilares cum organico confunduntur, ita ut perinde esse existiment, partes dividere in similes & organicas, ac in similes & dissimilares. Falsò tamen, cum multæ partes



## Cap. III. De Partibus Dissimilaribus, &c. 17

partes similes sint etiam organicae. Ossa enim, venae, & arteriae, sunt partes similes; cum tamen sint variè conformatae, & actiones organicas exerceant, organicae etiam, dici solent: atque ita *similes* sunt ratione materiae, & organicae ratione formae & figurae.

*Pars autem organica ea est, quae determinatam edit actionem, vi propriae conformationis.*

Si partes similes simpliciter consideremus & strictè, quatenus ex unica tantum materia constant, quatenus unicam tantum edunt actionem, nempe nutritionem; tunc organicis rectè apponi possunt: hinc enim omnes corporis nostri actiones in similes & organicas passim dividi solent. Et licet unica tantum sit actio similis, ut dictum est, organicae tamen penè infinitae: ut prout variae sunt, earumque unaquaeque organo indiget variè conformato, sic quamplures instrumentarias partes constitui necessarium fuit. Hinc ortus est ingens ille partium numerus tanto artificio constructarum, ut admiranda corporis nostri compages inde oriatur.

*Ad partium organicarum actiones exercendas, tres requiruntur conditiones, magnitudo, numerus & conjunctio.*

*Conformationis nomine quatuor comprehenduntur, figura, meatus, cavitas, asperitas & laevitas.*

Non potest pars organica actionem suam ritè exercere, nisi primò debitè sit conformata, atque ad eò debitam in primis figuram nanciscatur. Sic enim caput v. g. debuit esse rotundum, brachium oblongum, & ita de aliis. Deinde partes ad sua officia exercenda certos meatus & certas cavitates habere debuerunt. Sic venae & arteriae suos habent meatus: ventriculi meatus est oesophagus, cavitas verò totum illud spatium, quo alimenta comprehendit. Tertiò, nonnullae partes ut commodè operentur, laeves esse debent, ut aspera arteria, quae interiori superficie laevis est & polita, ad vocem suaviter modulandam: *aspera* enim non appellatur, quòd inaequalis sit & rugosa (ut nos hinc asperi nomen accipimus) sed quòd inaequali constet substantia, cartilaginea subiecta membranosa: Nonnullae verò partes asperae & rugosae esse debuerunt qualis est ventriculus interiori sua superficie, ut cibos melius contineret.

*Magnitudo etiam certa & determinata unicuique parti tributa est, quae actioni suae exercendae sit necessaria.*

Sic jecur majus est corde, cerebrum oculo, & ita de aliis.

*Certae verò actiones unicà tantum ejusdem generis parte indigent, aliae verò pluribus.*

Sic ad loquelam unica lingua sufficit, ad comprehensionem verò plures digiti desiderantur.

*Conjunctionis nomine duo comprehenduntur, situs scilicet & connexio.*

Sic jecur in dextro hypochondrio situm est, lien verò in sinistro, intestina in medio abdomine, uterus inter vesicam & intestinum rectum. Sic ossa ad motum efficiendum in articularibus invicem connectuntur: contrà verò labra & palpebrae ad sua munia exercenda connecti simul non debuerunt, sed disjuncta, & separata relinqui.

*Duplices autem sunt partes organicae principes, & ignobiles.*

*Principes sunt, quae ad individui conservationem absolute sunt necessariae, & toti corpori facultatè & spiritus largiuntur.*

*Et illae sunt tres, Cerebrum, Cor, & Hepar.*

Tres sunt facultates in corpore nostro, ut infra docebitur, animalis, vitalis, & naturalis: & unaquaeque facultas peculiarem sedem obtinuit in peculiari membro in quo clarius elucet, & à quo universum corpus cum spiritus influit, qui etiam in ea generantur: inde partes illae principes fuerunt appellatae. Haec est antiqua & in scholis trita Medicorum doctrina, quam in gratiam tyronum proponimus, ab eaque in schola medica nefas est recessisse: licet cum Peripateticorum dogmatibus nequeat consistere, qui volunt animam cum suis omnibus facultatibus esse totà in toto & totam in qualibet parte, unde non opus videtur facultates influere, cum in qualibet parte sint, & ubique operentur, si convenientia naturae fuerint instrumenta, unde Aristoteles, si oculus esset in pede, pes videret. [Melet. l. 57. &c.]

*Ignobiles sunt, à quibus facultates & spiritus non promanant, quæve principalibus inserviunt, & famulantur.*

Sic sensuum organa solius cerebri gratia sunt constructa. Laz. Riverii Opera.

ta: sic pulmo, diaphragma, & arteriae. soli cordi temperando, expurgandoque dicatae sunt: sic ventriculus, intestina, lien, renes, utraque vesica, propter hepar sunt condita. Uno verbo omnes totius corporis partes *ignobiles* dicuntur, exceptis tribus principibus nuper enumeratis. Gal. tamen *arte parva*. Telles inter principes partes enumerat, quia ad speciei conservationem sunt necessarii. Distinguamus ergo, esse partes principes *ratione speciei*, non autem *ratione individui*.

### COROLLARIUM.

Quae de singularum partium nomine, substantia, temperamento, figura, situ, connexione, usu, aliisque jam dicenda forent, tam accuratè & perspicuè docentur à doctissimo Laurentio in sua *Hist. Anatom.* & Gregor. Hortio de nat. hom. ut eandem cramben denuò recoquere superfluum nimis videretur. Coniungi tamen debent quoad vasa salivaria lymphatica, lactea, sanguinis circuli. & alia nuper demonstrata, *Anatomici* recentiores maxime Barthol. Vesslingius, & Charleton. (Melet. l. 83. ad 89.)

## PHYSIOLOGIÆ SECTIO VI.

### De Facultatibus & Functionibus.

#### CAPUT PRIMUM.

##### De Facultatum & Functionum Natura.

*Quia Facultates & Functiones ab anima dependent, tanquam primà causà, idè quid illa sit, prius est dicendum.*

*Anima igitur est forma substantialis corporis viventis, per quam vivimus, sentimus, nutrimur, intelligimus, & loco movemur.*

**E**Am definit Aristoteles *ἐντελέχεια* corporis organici, *potestate vitam habentis*, quae definitio terminis obscuris concepta est, & exquiritur indiget explicatione. Nos idè hanc nostram magis perspicuam, & ad rei cognitionem magis accommodatam aestimamus, quia cum homo constet materià & formà sicut corpora omnia physica, & materia illius sint omnes partes, jam anima debet esse illius forma. Cum enim actiones omnes dependant à forma, & anima sit causà, & principium omnium actionum corporis viventis, anima forma illius debet constitui. Hinc, absente animà, nulla actio in corpore potest exerceri. Unde illa per actiones tantum dignoscitur, quia substantiae immateriales non nisi per affectus dignosci possunt. Variæ autem illae actiones ab anima exercentur per potentias & proprietates diversas, quae illius essentiam proximè sequuntur, ab eaque immediatè dependent, & illae proprietates facultates appellantur, de quibus nunc agendum.

*Facultas est accidens proprium, & inseparabile ab anima, per quod certas functiones in corpore exercet.*

Facultates sunt accidentia, quae ad secundam qualitatis speciem referuntur. Earum subiectum est anima, cui inhaerent, non tanquam accidentia communia, sed tanquam propria & inseparabilia: unde male Fernelius illas ab anima separari posse affirmat, quod tamen conatur ostendere exemplo auctricis facultatis quam aboleri vult, post ætatis vigorem. Attamen facultas illa nunquam aboletur, sed feriatur tantum propter defectum instrumentorum: totum enim alimentum absorbitur in nutritione, quia corpus grandius factum amplius vult nutrirè; & calidum innatum debilius non potest incumbere accretioni, quam etiam natura negligit, dum ad justam proportionem corpus perduxit: non tamen perit illa facultas, sicut nec facultas procreandi in puero deperdita est; sed quiescit tantum usque ad pubertatem, donec semen elaboratum inveniatur, functioni suae exercendae idoneum.

*Functionio est motus activus, seu affectus facultatis in aliqua corporis parte.*

Quemadmodum facultas formam seu animam immediatè sequitur, ita functiones à facultatibus dependent, tanquam effectus à suis causis. In hoc autem actiones à facultatibus distinguuntur, quòd facultates animae sint propriae, functiones verò toti compositae. Proinde ut actio exercentur, non solum debet adesse anima suis facultatibus stipata, sed etiam recta organi ad agendum dispositio, quâ malè constitutæ actiones etiam malè vel nullo modo exercentur.

C

Notandum



# 18 Institutiones Medicæ, Lib. I. Sect. VI.

*Notandum* autem est, in partibus, præter actionem propriè dictam, duo alia spectari, nempe *opus*, & *usum*. Opus est actionis effectus, cum scilicet illa objectum habeat reale & permanens. Verbi gratia, chylus in ventriculo, qui ex illius concoctione fit, opus nominatur: item & sanguis in hepate. Usus verò partis est cum pars actionem ex se non edit, sed alterius actionem adjuvat, eique commoditatem affert, ut mesenterium, quod est tantum venarum meseraicarum fulcimentum. Sic Epiploon seu Omentum ventriculi calorem fovet, eumque contegit, tanquam vestimentum. Itaque *usus* ab *actione* distinguitur, quod hæc in perpetuo motu consistat, nec sine eo concipi possit; ille verò in otio partis sit constitutus; imò in mortuis aliquando permanet, ut patet usu cutis, qui est ad tangendum totum corpus, & de usu calvariae ad cerebrum continendum. (*Melet. I. 66. ad 60. 5. ad 98.*)

## CAPUT II.

### De Facultatibus & Functionibus Differentiis.

*Facultates & functiones sunt triplices, naturalis, vitalis, & animalis.*

**T**res spirituum differentiae supra fuerunt institutae, quorum unusquisque in peculiari parte producit, ab eaque influit in universum corpus, unde tres etiam partes fuerunt enumeratae, illorum spirituum officinae. Superest jam, tres etiam facultates constituantur, quae in illis partibus præcipuam sedem habeant propter instrumentorum dispositionem, in iisque potissimum actiones suas exercent. Hæ actiones totidem esse debent, quot facultates, cum earum sint effectus, imò cum facultates nonnisi per functiones innotescant, ut dictum est, triplex earum numerus inde fuit constitutus, quod tria actionum genera invicem maximè distincta in corpore appareant, quorum unumquodque in suas etiam species subdividitur, ut infra apparebit.

Quod autem tres istae functiones atque adeo facultates omnino inter se distinguantur, multis experientiis patet.

*Primò* enim animalem facultatem à naturali distingui satis ex eo conspicuum est, quod multae partes, ut ossa & cartilagineae, sensu motuque privatae sint, & tamen vivant & nutrantur.

*Deinde* vitalem ab animali distinctam esse, hoc indicat, quod nobis dormientibus, aut ab omni opere cessantibus, cor tamen pulsatur cum arteriis, neque sequitur ullo modo imperium voluntatis. *Denique*, vitalem à naturali distingui ostendit pars atrophica laborans, aut totum corpus in marasmo, quod jam alimenti defectu contabuit, vivit tamen per facultatem à corde, quae illud tuetur & conservat.

*Obijciat* aliquis, Galenum in *libris de symptomatum differentiis* duas tantum facultates constituere, nempe animalem & naturalem, vitali omisâ. *Respondeo*, Galenum ibi naturalis nomen latè accipere, pro eo omni, quod non est voluntarium, atque ita facultatem vitalem sub naturali includere: respicit enim ibi accuratam dividendi legem, quae fit per opposita membra, ita ut hoc modo voluntarium involuntario opponatur. Cum autem functio animalis voluntaria sit, vitalis verò & naturalis involuntaria, & utraque vi naturae tantum perficiatur, ideo sub nomine naturalis ibi utramque expressit, quamvis alibi distinguat multis in locis.

## CAPUT III.

### De Facultate & Functione naturali, ejusque speciebus, ac primùm de Nutritione.

*Facultas naturalis est illa animae vis, quæ corpus per calorem nativum nutrit, augeat, & simile secundum speciem generat.*

*Et triplex est, nutritrix, auctrix & generatrix.*

*Illinc triplex est functio, nutritio, auctio, & generatio.*

**I**N animatis corporibus tria maximè sunt necessaria: conservatio individui, ejusdem quantitas idonea, &

conservatio speciei. Substantia individui variis ex causis tam internis quam externis, continuo dissipatur, deque ea semper aliquid decedit: quod nisi reparetur alimento, animal citò interiret. Ut itaque illud corpus aliquo temporis intervallo conservetur, prima facultas quæ *Nutrix* dicitur, est necessaria. Quoniam autem natura rebus singulis certam definit magnitudinem, ut sua munera obire posset, secundo loco *Auctrix* facultas erat necessaria, cujus beneficio corpus animatum ad illum terminum perducitur: unde hæc potentia non formæ in materia conservationem, sed ad viventis opera veluti finem respicit. Tandem cum animata sint caduca, corruptionibus obnoxia, nec illorum species deficerent, *Procreatrix* erat necessaria, qua species ipsa conservatur, licet individua corrumpantur.

*Nutrix facultas est illa animae vis, quæ alimentum vi caloris innati in corporis substantiam convertitur, ut reparetur id quod absumitur.*

*Illius actio dicitur nutritio, quæ est deperditæ corporis nostri substantiæ instauratio.*

Calor nativus nunquam in corpore otiosus manere solet, ut supra fuit propositum, sed continuo in humidum agit, illudque absumit & dissolvit. Ne igitur contabescat animal & intereat, quod deperditum est, debet instaurari: unde ex sententia Hippocratis, homo ultra septem dies vivere non potest sine alimento. Atque ita nutritio solis viventibus erit propria: licet enim ignis ab ipso Aristotele nutriri dicatur & augeri materia combustibili, non est tamen vera nutritio, sed tantum improprie dicta. Ad veram enim nutritionem & accretionem tria requiruntur ex Aristotele. *Primò*, ut ex materia extrinsecus accedente res nutriatur & augeatur; *Secundò*, ut idem numero servetur id quod augetur; *Tertio*, ut non solum toti, sed singulis etiam particulis facta sit accessio magnitudinis. Jam verò in ignis nutritione non manet idem numero ignis, sed ratione materiae, quæ comburitur, fit alius atque alius: neque omnibus ejus particulis fit additio magnitudinis, ut propterea vera & propria nutritio igni non competat; sed per analogiam tantum nutritio dicatur.

*Dices*: si in nutritione alimentum convertitur in substantiam partium, nutritio non differt à generatione. *Respondeo*, non re quidem distingui, sed ratione tantum, scilicet secundum diversitatem totius & partis. Nutritio enim est partis substantiæ generatio, exiguae portionis carnis jam consumptæ, generatio verò totius carnis & totius substantiæ. Ideoque illa *adgeneratio partium*, hæc verò simpliciter *generatio* à Philosophis appellatur.

*Nutrici facultati quatuor alia subserviunt, attrahens, retinens, concoctrix, & expultrix.*

*Earum verò actiones sunt attractio, & retentio, concoctio, & expulsio.*

*Illarum unaquæque duplex est: Officialis & privata.*

*Officialis est, quæ non solum partis, in qua exercetur, sed etiam totius corporis nutritioni inservit. Privata verò, quæ partis tantum in qua exercetur, nutritioni inservit.*

Partes, quæ actiones edunt officiales, publicum munus habere dicuntur, reliquæ verò privatum. Sic ventriculus & hepar actionem edunt officialem, quia non sibi solum, sed & toti corpori alendo alimentum attrahunt, retinent, concoquunt, & expellunt. Os verò caro, & similia privatam actionem edunt, quia alimentum tantum attrahunt, quod sufficit ad sui nutritionem.

*Attrahens facultas est ea vis animæ, per quam partes familiare attrahunt alimentum.*

Quia omnes partes non unâ eademque substantiâ sunt præditæ, neque temperamento eodem: ideo quodvis alimentum illis nutriendis non est æquè aptum, sed unaquæque pars ad se attrahit illud, quod magis sibi est familiare per facultatē illam nutriticis famulā, quæ auctrix appellatur.

*Attrahens privata per calorem & siccitatem fit.*

*Officialis verò tum per illas quantitates, tum etiam per fibras rectas.*

Omnes actiones naturales sunt à temperie, non tamen eadem omnes; sed prout diversa sunt, diverso gaudent temperamento. Certum tamen est, omnes à calore adjuvari, sed



## Cap. III. De Facult. & Funct. Natur. &c. 19

sed nunc cum humiditate, nunc cum siccitate junctas. Atque ita attractio partium singularum calore & siccitate adjuvatur, & per eas solas perficitur, quod de tractione privata est audiendum. Officiales enim actiones non solâ temperie perficiuntur, sed organis etiam indigent certo modo dispositis. Et sic attractio officialis non modò per dictas qualitates, sed etiam per fibras rectas exercetur, quæ dum sese contrahunt, alimentum alliciunt.

*Retentrix facultas est ea vis animæ, per quam partes attractum retinent alimentum.*

Partes alimentum attrahunt, tanquam sibi familiare & amicum, illudque ideo attrahunt, ut eo fruantur. Non possunt autem eo frui, nisi aliquandiu retineant: ideo alia necessaria fuit facultas, cujus beneficio alimentum in singulis partibus retineatur.

*Retentio privata à caliditate & siccitate adjuvatur, sicut & attractio.*

*Officialis verò non solum illis qualitatibus, sed etiam fibris obliquis exercetur.*

Partes naturales, quæ officialem actionem exercent, tribus fibrarum generibus intertextæ sunt, rectis, obliquis, & transversis. Rectarum beneficio fit attractio, obliquorum retentio, transversarum expulsio, ut mox dicitur. Illæ enim omnes fibræ illa munera exercent sese contrahendo: sicut omnes muscoli, dum partes variis motibus agitant, sese contrahendo versus suum principium, illud præstare solent.

*Concoctrix facultas est illa animæ vis, per quam partes alimentum immutant, sibi que assimilant.*

Sic cibum tum dicimus concoctum esse in ventriculo, hepate, & aliis partibus, quando in colore, odore, sapore, & primis qualitatibus, tum etiam in substantia, partibus est assimilatus. Quod ipse Galenus voluit lib. 8. de compositione medicamentorum, ubi concoctionem vocat alterationem, quæ eò usque procedit, donec alimentum in partis similitudinem sit transmutatum. Ubi etiam docet quomodo differat concoctio à nutritione, nam concoctio est assimilatio: nutritio verò unio illius quod assimilatum est. Aristoteles concoctionem definivit perfectionem à calore naturali & proprio ex opposito passivis: quæ nimis philosophica est, & nimis lata, nec coctionum naturam, quæ in corporibus nostris fiunt, proximè declarat.

*Concoctio quælibet, corporis nostri calore humiditate perfici solet.*

Tres apud Philosophos proponuntur concoctionis species: *Maturatio*, quæ est concoctio, quæ fit in fructibus, *Assatio*, quæ fit ab igneo calore; & *Elixatio*, quæ fit à calido & humido. Concoctio quæ fit in corpore nostro, est elixatio quædam, vel alteratio elixationi similis. Fit enim à nativo nostro calore, qui multo humore est temperatus: tum etiam alimenta, ut bene concoquantur, multo humore perfusa esse debent.

*Nota*, concoctionem officialem ab his qualitatibus tantum perfici, nec ullis fibris indigere, quemadmodum reliquæ tres actiones nutritioni subservientes.

*Triplex autem fit concoctio in corpore nostro, nimirum chylosis, hæmatosis, & œmulsio. Chylosis fit in ventriculo; hæmatosis in hepate, œmulsio in singulis partibus.*

Harum coctionum modus, earumque excrementa, in sectione de humoribus fuerunt proposita. Si quis tamen pleniorẽ earum expositionem desideret, & controversias quæ circa illas excitari solent, consulat Andream Laurentium in *Historia anatomica*, ubi hæc omnia fusè & perspicuè more suo exponit.

*De concoctione in genere hoc peculiare notetur Theorema, à Philosophis & Medicis concessum, quod scilicet omnis concoctio fiat incrassando.*

In laudabili concoctione humidum cum sicco permiscetur, & partes humidæ, ad alendum magis aptæ, cum terreis alimentariis uniuntur; portio verò humida tenuior magisque dissipabilis, actione caloris absumitur, unde coctio procedit incrassando.

Verum sequentia contraria videntur demonstrare. *Primo* enim chylus ex pane confectus, eo tenuior est, sanguis chylo, spiritus sanguine, qui ex iis consequenter generantur.

*Laz. Riverii Opera.*

*Deinde*, urinæ crudæ appellantur, si tenuiores sunt vel crassiores: ergo coctio in certa substantiæ moderatione consistit, non autem in crassitie.

*Ad Primum respondeo*, in singulis coctionibus crassa excrementa secerni, quæ reliquam massæ alimentariæ partem relinquunt tenuiorem. Illa tamen, ex se & ab excrementis distincta, crassior evadit: & hæc etiam sola dicitur concocta, reliqua verò secreta ut inutilis. Illa enim quæ secernuntur, non sunt propriè materia coctionis subiecta, sed illud tantum coctionis subiectum dici debet, quod secretis excrementis idoneum est ad concoctionem, à quo facta omni excrementorum secretionẽ, constat aliquid necessario toto tempore coctionis vi caloris actum effluere, atque ita rem ipsam, quæ coquitur, crassescere.

*Ad secundum respondeo*, urinas illas, quæ ob nimiam crassitiem crudæ appellantur, crassitiem illam non habere ex propria substantia, sed ex alterius rei crassæ permutatione, quæ non potuit separari propter defectum concoctionis, quæ beneficio caloris heterogenea separare solet.

*Facultas expultrix ea est, per quam partes post concoctionem res sibi inutiles expellunt.*

Quidquid à partibus suis attractum, in illarum substantiam totum transmutari nequit, sed semper alienum remanet quippiam, quod concoctionem accipere non potest: ideo tanquam alienum & superfluum expelli debet, quod *Excrementum* hac ratione appellatur. Necessaria idcirco fuit illa facultas, qua aliena foras expelluntur, ne quid naturæ noceant. Imò partes officiales non solum excrementa, sed etiam substantia utiles expellunt dum scilicet totum alimentum non possunt in suam naturam convertere, postquam illud aliquandiu retinuerunt, eoque oblectatæ sunt, tanquam onus superfluum, & inutile pondus ad alias partes deponunt. Et hac ideo ratione ipsæ substantiæ alimentariæ excrementa utilia appellantur, ratione partium, quæ eas expellunt, quia quodcumque expellitur vel excernitur, excrementum communi vocabulo solet nuncupari.

*Expulsio privata per calorem & siccitatem fit.*

*Officialis verò tum per illas qualitates, tum etiam per fibras transversas.*

Nulli debet esse mirum, cur attractio, retentio, & expulsio, cum sint actiones valde diversæ, ab iisdem qualitatibus perficiantur, nempe calore & siccitate; nam hoc peculiariter demonstrat, superiorem actionum causam esse agnoscendam, quàm temperiem; quæ est tantum instrumentum formæ. Sic uno & eodem instrumento artifex diversa admodum opera perficere solet, licet negandum non sit, diversos caloris vel siccitatis gradus ad hanc vel illam actionem magis requiri, qui tamen nobis sunt incogniti.

Fibræ verò transversæ expulsionem officialem valde juvant, quia illæ potissimum dum contrahuntur, partim comprimunt. Per compressionem autem fit expulsio.

### C O R O L L A R I U M.

Facultatum & functionum nutritioni ministrantium numerus mancus & deficiens quamplurimis videtur, quæ præter functiones jam illatas multæ aliæ proponuntur à Galeno & aliis auctoribus: at quot functiones reperiuntur, tot etiam facultates earum causæ erunt agnoscendæ.

*Primo* igitur Galenus appetentiam in ventriculo constituit, non solum animalem, quæ sensu percipitur, & fames appellatur; sed etiam naturalem, qua conveniens alimentum naturali appetitu desiderat, qua etiam prædictæ sunt singulæ corporis partes.

*Secundo*, idem Galenus, præter jam dictas facultates, secretivam & distributivam enumerat. *Primo* enim de facult. nat. cum docuisset concoctricem in venis & partibus adesse: addit, opus esse secretrice, ut ea quæ superflua vel inutilia sunt, ab utilibus separentur, deinde expellantur, & 5. de symptomatum causis, symptomata recenset, quæ secretionis & distributionis vitio contingunt. Icterus enim secretionis defectu fit, atrophia verò distributionis.



## 20 Institutiones Medicæ, Lib. I. Sect. VI.

*Tertiò*, appositio & assimilatio à reliquis prædictis differunt : ergo plures sunt constituendæ.

Ad *primum respondeo*, Appetentiam ab attractione non differre reipsa, sed tantum ratione. Est enim insita illa attrahendi vis non promiscuè, sed cum delectu : illius scilicet, quod partibus familiare existit.

Ad *secundum respondeo*, distributionem & secretionem non esse distinctas facultates, sed potius mixtas, quæ ad aliarum operationes consequuntur. Distributio enim alimenti per corpus universum fit, aliis partibus expellentibus, in quibus humor redundat, aliis verò trahentibus, in quibus deficit, ut ipse Galenus testatur. Atque ita partim ab attractrice, partim verò ab expultrice dependet. Sic etiam secretio tum solet fieri, cum retentrix partium facultas illud, quod sibi utile est, servat : expultrix verò inutile expellit.

Ad *tertium respondeo*, appositionem & assimilationem non esse ab aliqua facultate peculiari, sed varios tantum esse concoctionis gradus, ita ut à primo alterationis motu usque ad perfectam *ὑποίωσιν*, per intermedia progrediatur.

Quod autem à Galeno ista omnia propriis ac distinctis nominibus doceantur, hoc factum est clarioris doctrinæ gratiâ non autem, quod sint vera distinctæ ab aliis actionibus.

### CAPUT IV.

De Auëtrice facultate, & de Accretione.

*Auëtrix facultas est illa vis animæ, qua corpus ex alimento in suam substantiam converso, in omnem dimensionem extenditur, & justam magnitudinem consequitur, ad actiones convenientes exercendas.*

*Hinc Auëctio, sive Accretio est corporis in quamvis dimensionem, scilicet longum, latum, & profundum, ampliatio.*

**H**inc distinguitur accretio naturalis ab ea, quæ arte fit. Illa enim, quæ artificiosè augentur extenduntur, tantum amittunt in longitudine, v. g. quantum illis accedit in latitudine, & contrà. Distinguitur etiam hoc modo vera accretio à pinguefactione, quia pinguefactio non fit secundum omnes dimensiones, sed maximè tantum secundum profunditatem. Distinguitur etiam ab accretione lapidum & metallorum, quæ fit per *juxta positionem*, non autem per internam partium amplificationem, ex alimento per nutritionem converso. Eadem enim viâ procedit ac nutritio, eademque materia partes augentur qua nutriuntur.

*Licet accretio fiat per viam nutritionis, ab ea tamen realiter distinguitur.*

Auëtrix ista facultas ita conjuncta est nutriti, ut citra illius opem nequeat compleri. Unde multi unam eandemque facultatem esse asseruerunt, propterea auëtrici nulla est propria actio, diversa à nutrice. Sed quando tantum reparatur ex alimento confecto, quantum quotidiano effluvio perierat, tunc corpus simpliciter nutriri dicitur : quando verò plus reponitur, tunc augetur & accrescit. Sed magis & minus non variant actionis species, quare facultas auëtrix à nutrice non erit diversa, cum unum & idem habeat objectum, nempe nutrimentum.

Certum tamen est, has duas facultates plurimum inter se differre, idque multis modis : *Primò* enim fine inter se differunt. Nutricis enim finis est instauratio partium consumptarum; Auëtrici verò, justæ magnitudinis acquisitio. *Secundò* differunt formâ. Nutritionis enim forma est unio alimenti, accretionis verò motus extensionis. *Tertiò* differunt modo mutationis. In nutritione enim nulla fit mutatio corporis secundum locum ; at quod augetur locum mutat : quod enim augetur, majorem occupat locum. *Quartò* differunt ratione temporis, nutritio enim omni tempore fit, accretio verò definitum habet durationis tempus.

Accretionem autem non fieri ex redundantia alimenti, peracta scilicet nutritione, inde patet, quòd crescere & augeri videantur, qui paucâ admodum utuntur nutritione, ut patet in pueris & adolescentibus morbo detentis, qui licet valde emaciati, continuò tamen crescunt, propterea quod auëtrix facultas eâ potissimum ætate operatur, & ita potens est, ut ipsi nutriti alimentum subripiat, ad partes solidas agendas : Accretio enim fit circa solidas

partes potissimum, ossa nimirum, ad quorum extensionem totum corpus extenditur. Ideò auëtrici vi alimentum ad illas partes rapitur, & carnosæ debito suo nutrimento defraudantur : unde qui crescunt, ut plurimum macilentum apparent. Contrà verò multi conspiciuntur pingues & bene saburrati, atque opiparè viventes, qui tamen debita & decentem corporis proceritatem non attingunt.

Licet autem auëtrix facultas & nutritiva idem habeant objectum, scilicet nutrimentum : eo tamen utuntur diverso respectu. Nutritiva enim facultas eo utitur, quatenus substantiam partis conservat simpliciter. Auëtrix verò quatenus substantiæ magnitudinem & justam quantitatem intendit. Nam quamvis substantia, quæ nutritione acquiritur, quanta sit ; quoniam materialis substantia absque quantitate consistere nequit : nutritio tamen substantiam non respicit, quatenus habet quantitatem, sed tantum, quatenus est substantia. Accretio verò eam substantiam respicit, quatenus est substantia, sed quatenus habet quantitatem. Sic quatenus mutatur sanguis in carnem, verbi gratia, eatenus est nutritio, quæ solam carnis respicit substantiam : quatenus verò mutatur in carnem majorem, eatenus est accretio, quæ non respicit substantiam carnis, sed tantum illius quantitatem.

*Terminus accretionis non est continuus usque ad finem vitæ, sed usplurimum ad vigesimum quintum, vel trigessimum ætatis annum extenditur.*

Unicuique corpori viventi certus magnitudinis terminus est à natura constitutus : ideoque tamdiu crescit corpus vivens, quamdiu ad terminum illum non pervenit. Cum verò debitam suam magnitudinem assecutum est, ex præscripto naturæ in ea acquiescit, neque ulterius in crescendo progreditur. Deinde, cum accretio pendeat immediatè ab extensione solidarum partium secundum trinam dimensionem : sequitur, corpus tandiu crescere, quandiu singulæ illius partes possunt hoc modo extendi. Jam autem progressu ætatis ob continuam humidi primigenii consumptionem ita tandem indurantur & exsiccantur, ut amplius non sint idoneæ ad extensionem.

Quamvis autem post dictum tempus auëtrix facultas non amplius operetur, non tamen corrumpi, aut otiosam manere dicendum est, ut voluerunt quidam ; quia non est necesse animæ facultates semper esse in actu secundo, & operari : non enim semper intelligimus, actu generamus, aut loco movemur, & propterea quoque non est necesse nos semper augeri, sed facultates seriantur, cum finem propositum sunt adeptæ. Sic etiam auëtrix cessat adepto fine, nimirum justo magnitudinis termino. Deinde est impedita, quia non habet subiectum dispositum, scilicet corpus extensioni aptum. Est igitur duplex causa : una à fine, altera à subiecto desumpta.

### COROLLARIUM.

Hinc sese offert problema scitu dignum : cur omnes homines ad eandem magnitudinem non perveniant, sed quidam sint aliis multò procerioris, quidam verò brevioris staturæ ? *Respondeo*, triplicem esse hujus rei causam : *prima* desumitur ex diversa corporum dispositione : quòd enim corpora sunt humidiora & calidiora, eò sunt aptiora ad extensionem, magisque & citius crescunt quàm frigida & sicca ; quorum partes non ita sunt extensioni aptæ. *Secunda* sumitur ex nutritione : quo enim perfectius & copiosius nutritur corpus, eo etiam magis & velocius crescit, & quò imperfectius & parcius, eò minus & tardius. *Tertia* sumitur à similitudine parentum : ex proceris enim parentibus filii proceri, ex parvis parvi oriuntur, quia semen omnium partium ideam, omnesque earum condiciones transfert à parentibus.

### CAPUT V.

De Generatrice facultate, & de generatione.

*Generatrix facultas est ea vis animæ, quâ homo sibi simile producit, ad perpetuam speciei conservationem. Generatio est sui similis productio.*

**G**eneratio apud Philosophos duplex est, univoca & gæquivoca. Univoca dicitur ea, in qua unumquodque sibi



sibi simile generare solet : talis est generatio omnium animalium perfectorum. *Æquivoca* verò est, in qua res diversæ & dissimilis naturæ generatur : talis est generatio animalium imperfectorum quæ ex putredine oriuntur : Ergo perfectis animalibus potissimum competit generatio univoca : unde nulli & eunuchi non sunt apti ad generandum. Hinc patet, generationis nomen non ita latè usurpari apud Medicos, quemadmodum apud Philosophos, qui omnem formæ in materiam introductionem, generationem appellant : hîc verò tantum sumitur pro sui similis productione, & *procreatio* appellatur.

*Generatrici facultati duæ aliæ subserviunt : alteratrix & conformatrix.*

*Alteratrix est, quæ subjectam generationis materiam alterat & immutat.*

Subjecta generationis materia est semen, quod in variorum partium naturam transire nequit, nisi prius omnes illius qualitates, tam primæ quam secundæ, variè immutentur : ideo tributa est animæ peculiaris facultas, quæ munus istud perficiat, alteratrix seu immutatrix ideo appellata.

*Conformatrix est, quæ toti corpori & singulis ejus partibus debitam formam & figuram largitur.*

Seminalem materiam alteratam & præparatam excipit facultas conformatrix, ex eaque omnes corporis partes effingit, & unicuique harum debitam magnitudinem, figuram, situm, connexionem, & alia omnia commodè assignat, quæ ad cujusque peculiares actiones commodè exercendas requiruntur.

## COROLLARIUM.

Reliqua omnia quæ à facultate generante dependent, fusiùs exponuntur in *sequenti sectione*, in qua de hominis procreatione agetur.

## CAPUT VI.

### De Facultate Vitali.

*Facultas Vitalis est ea vis animæ, per quam spiritus vitales in corde generantur, & vita in toto corpore conservatur.*

**P**eculiarem esse in corde facultatem à reliquis distinctam, indicant spiritus, qui magnâ copîa à corde influunt in arterias. Omnis autem spiritus est alicujus facultatis instrumentum. Facultas autem illa spiritus vitales generat in corde, qui spiritus sunt subjectum caloris influentis, quæ duo in singulas corporis partes diffunduntur, earumque calorem & spiritum insitum conservant. Cum autem in calore insito vita constituatur, illius conservatio erit vitæ conservatio; unde hæc facultas Vitalis seu vitam conservans, rectè appellatur. Atque adeo vita erit actio ab illa facultate, tanquam effectus à sua causa, dependens.

*Vitali facultati ministrant pulsus, & respiratio.*

Malè asserunt quidam, pulsus esse præcipuam actionem vitalem, eamque à facultate vitali dependere immediatè; nam vita, ut diximus, ab illa proximè dependet; pulsus verò est tantum actio illi ministrans, oriturque à facultate pulsifica, cujus tantum vis est, cor & arterias dilatare & constringere : quo modo facultati vitali inservit.

*Pulsus est functio cordis & arteriarum, composita ex systole & diastole, cum intermedia quiete, orta à facultate pulsifica cordis, ad spirituum vitalium generationem adjuvandam, eorumque distributionem per totum corpus efficiendam.*

Pulsus cordis arteriarum, ex tribus partibus componitur : diastole nimirum, systole, & intermediâ quiete. Per *Diastolen* cor & arteriæ implentur. Cor quidem dum dilatatur, aërem attrahit pulmonibus per arteriam venosam & sanguinem à vena cava, ut ex illis in sinistro sinu commixtis, spiritus generetur. Arteriæ verò dum dilatantur, spiritus attrahunt à corde, iisque implentur, tum etiam aërem externum per orificia, quæ ad cutem definunt. Et hoc modo fit *transpiratio*, quæ aëris externi intromissione calorem internum temperat & fovet; omne enim calidum frigido moderato conservatur, ex Hippocrate.

Per *systolen*, sive constrictionem, cor fuliginosa excrementa, ex spirituum generatione orta, per arteriam venosam,

ad pulmonem expellit. Arteriæ etiam fuliginosos vapores in ipsis contentos per insensibilem transpirationem expellunt, & spiritus ad partes majori copia amandant.

Denique inter *systolen* & *diastolen* *intermedia* quies contingit, quia non potest fieri transitus ab uno contrario ad aliud, nisi per medium.

*Dubium* esse potest, quo feratur sanguis & spiritus in corde contentus, dum illud constringitur? *Respondeo*, duas esse auriculas in corde, unam scilicet in dextro sinu, alteram verò in sinistro : illæ autem dilatantur, dum cor constringitur, atque ita implentur, dextra nimirum sanguine in dextro sinu contento; sinistra verò spiritibus, qui in sinu sinistro continentur.

*Ad pulsus autem efficiendum tria requiruntur : facultas, instrumenta, & usus.*

Primò requiritur facultas pulsifica, quæ est primum agens & principale. Secundò instrumenta requiruntur pulsui apta, nimirum cor & arteriæ, quæ à facultate illa commoventur. Tertiò denique requiritur usus & necessitas, facultatem ad agendum impellens, nimirum spirituum generatio, calorisque nativi conservatio.

*Respiratio est actio partim animalis, partim naturalis, qua per os ducitur aër ad pulmones, disento thorace, & vapor fumidus excluditur eodem contracto ad nativi caloris conservationem, & spiritus vitalis generationem.*

Respirationis sicut & pulsus tres sunt partes, *inspiratio*, *expiratio*, & *intermedia quies*. Inspiratione thorax dilatatur per musculos huic rei destinatos, & ad thoracis dilatationem pulmo etiam dilatatur, ne vacuum detur in illa cavitate, atque pulmò aëre impletur, tanquam folliis, eoque aëre inspirato cordis æstus temperatur, & spiritus vitales generantur, ut dictum est. Expiratione verò thorax & pulmo contrahuntur; seseque contrahendo, aërem calidum & fuliginosos vapores à corde emissos, foras excludunt.

*Ad respirationem etiam efficiendam tria concurrunt : facultas, instrumentum & usus.*

Primò, concurrunt facultas animalis, musculos thoracis movens, tum etiam naturalis insita, quæ pulmonem impellit ad motum, ut cordi auxilietur.

Secundò, concurrunt instrumenta, seu partes omnes respirationi dicatæ, Ac denique usus, seu necessitas respirandi, ad calorem cordis ventilandum. [*conf. Melet. l. 103. & c.*]

## COROLLARIUM.

Maximè controvertitur, an respiratio sit purè animalis an verò mixta, scilicet partim animalis, partim naturalis. Cujus rei elegantem disputationem vide apud Laurentium quæ 20. lib. 9. Horstium de natur. human.

## CAPUT VII.

De Facultate & Functione animali, ac primùm de principibus facultatibus.

*Facultas animalis est ea vis animæ, per quam homo sensum motus, & principes animi functiones exercet.*

*Principes sunt tres, imaginatio, ratiocinatio & memoria. Imaginatio est illa actio animæ, qua omnium objectorum species, quæ sensibus externis offeruntur, percipiuntur, & à se invicem discernuntur.*

**U**nusquisque sensus proprium & peculiare habet objectum, (ut infra apparebit) cujus speciem recipit in proprio organo : eum tamen non dijudicat; hoc enim pertinet ad solam imaginationem, ad quam feruntur species per spiritus; qui à cerebro influunt per nervos, ad sensuum instrumenta. Cum igitur cerebrum sit sedes principum facultatum, dum sensuum diversorum objecta illi communicantur, primo illa in imaginatione repræsentantur, & à se invicem distinguuntur, quod sensus peculiare nequeunt præstare : visui enim, v. g. lactis albedo sola repræsentatur, non autem dulcedo; gustui verò contrà dulcedo, & non albedo. At imaginatio utrumque simul percipit, & rectè distinguit cujus sensus sint objecta. Præterea imaginatio non solum res præsentis; sicut sensus, sed etiam absentes percipit, & in animo repræsentat, multaque inde componit; quæ sæpe nunquam extiterunt, ex analogia tamen eorum, quæ sensibus sunt conspicua.



## 22 Institutiones Medicæ, Lib. I. Sect. VI.

Philosophi eas animi operationes, quas nos sub imaginatione, cum Galeno complectimur, in duas species distinguunt, scilicet in sensum communem, & phantasiâ, sive imaginationem; voluntque sensum communem species tantum percipere objectorum presentium, imaginationem verò etiam res absentes sibi proponere, ac si præsentes essent, nec non res quæ non sunt, quæ etiam sunt impossibiles, sibi proponere. Cum autem hæc tantum differant modo operandi, non est necesse à facultatibus specie diversis dependere.

*Ratiocinatio est illa animæ actio, per quam homo discit, intelligit, & ratiocinatur.*

Hæc homini est peculiaris, cum reliquæ sint etiam brutis communes. Illa autem species rerum ab imaginatione recipit, easque dividit ac componit, earumque naturam & essentiam investigat, discursus beneficio, nec non bona à malis, & vera à falsis distinguit, ex iisque multa elicit, quæ sub sensum non cadunt, quæ tamen vera esse mens certò cognoscit. Hinc ortæ sunt omnes scientiæ, quæ adhuc sublimioris hujus facultatis vi adisci, & edoceri solent.

*Memoria est illa animæ operatio, quæ receptas rerum species retinet & conservat.*

Rerum species semel in animo receptæ, diu conservantur: ita ut longo etiam tempore, postquam à sensibus sunt perceptæ, menti & imaginationi repræsententur. Ideò constituta est tertia facultas, à reliquis distincta, quæ omnes illas species conservet, tanquam horreum quoddam, ex quo illæ depromantur, quando opus fuerit.

Philosophi aliam operationem constituunt, distinctam à memoria, scilicet *reminiscentiam*, qua illa reducit quæ memoria exciderunt, ea colligendo ex iis quæ adhuc retinentur. Putamus tamen, cum Galeno, reminiscentiam esse opus memoriæ, cum se reflectit in se ipsam. Memoriæ enim opus non est, rerum species solum retinere, ut multi putant: (ita enim non esset potentia cognoscens, sed servans tantum species) sed memoriæ est recordari rerum absentium, ut res sunt actæ: atque ita *reminisci* est memoriæ ulterior quidam motus, non actio diversa. [conf. Meli. I. 131. 132.]

### COROLLARIUM.

Celebris quæstio inter Medicos solet agitari, an facultates principes in cerebro locis distinguantur: quam vide apud Laurentium *quæst. 2. lib. 10.* egregiè pertractatam.

### CAPUT VIII.

#### De Somno & Vigiliis.

*Ad functiones cerebri internas referuntur Somnus & Vigilia: de iis ergo nunc agendum.*

**O**Mnes Philosophi Somnum, & Vigiliam referunt ad sensum communem. Volunt enim somnum esse illius, atque adeò sensuum exteriorum cessationem: vigiliam verò actum & exercitationem eorundem: Unde, cum nos sensum communem sub imaginatione complectamur, cum & insomnia (de quibus acturi sumus) ad imaginationem spectent, etiam strictè sumptam, ideòque aptius hîc erit de his agendi locus.

*Est autem somnus quies, sive cessatio sensuum interiorum & exteriorum, ad corporis recreationem instituta.*

*Vigilia verò nihil aliud est, quàm eorundem sensuum liberum exercitium.*

Per sensus interiores hîc intelligimus potissimum actionem illam internam, per quam fit receptio specierum, quæ à sensibus externis feruntur ad imaginationem: illa enim operatio per somnum cessare solet, non autem imaginandi actio, ratiocinandi, aut memorandi, quæ inter dormiendum non raro exercetur. Immo ipsorum sensuum non est omnimoda cessatio: dormientes enim violenta percipiunt objecta, ut clamores, concussiones, & alia hujusmodi, atque ita licet somnus dicatur privatio, Vigilia verò habitus; non est tamen privatio totalis, sed hujusmodi, ut ab ea ad habitum facilis sit regressus, atque ita veræ privationis essentiam non complet.

*Causa somni proxima & immediata est spirituum detentio & prohibitio, ne influant in organa sensus & motus.*

*Prohibetur autem influxus spirituum à vaporibus cerebri opplentibus, illiusque meatus obsrumentibus.*

Somnum naturalis & quietus tunc solet fieri, quando vapor benignus & veluti roridus ex alimentis in cerebrum fertur, ejusque ventriculos & meatus perfundit, ut spiritus retineantur, & animales actiones consopiantur. Quod autem ex hujusmodi vaporibus in cerebrum delatis somnus excitetur, inde patet, quod ex copioso cibo & potu, meri potissimum, somnus longus & profundus excitetur, at ex his multi vapores ad cerebrum feruntur. Qui verò sobrii valde sunt, aut in edias patiuntur, parum dormiunt: quia pauci vapores ad cerebrum feruntur, qui citò dissipantur. Tunc enim somnus cessare solet, postquam vapores illi à calore nativo fuerunt resoluti.

*Prohibent etiam spirituum influxum ea, quæ illos multum dissipant vel obtundunt, aut alio quocvis modo sistunt.*

Præcipua somni causa, spirituum influxum prohibens, est vaporum copia ad cerebrum delata. Sunt tamen multæ aliæ, quæ minus efficaciter, aut saltem minus naturaliter idem præstare solent. Verbi gratiâ, quando spiritus animales sunt ita exsoluti per diuturnos labores, intensiores animi cogitationes, studia & curas, ut non suppetat sufficiens eorum copia ad influxum ordinarium efficiendum, sed natura eos retineat, & calorem influentem, ad deperditorum reparationem. Sic etiam à rebus frigidis assumptis, vel admotis spiritus quasi congelati subsistunt & intercipiuntur. Sistuntur etiam non raro spiritus ab iis, quæ animum demulcent, & in quiete constituunt, qualia sunt suavis cantus, strepitus aquarum, cessatio cogitationum, animi securitas, & alia hujusmodi.

*Finis denique somni est virium animalium & totius corporis instauratio.*

Per somnum vires animales primariò instaurantur, quia illæ longa & multiplici sensatione defatigatæ, somni beneficio resituuntur, & spiritus per vigilias exhausti instaurantur, membraque motu defatigata, ad pristinam naturam & functiones redeunt. Deinde somnus quoque conducit secundariò ad actiones naturales felicius perficiendas, quæ per animales operationes in vigilia quodammodo impediuntur: Tempore enim somni, calore intus se recipiente, coctiones melius fiunt, novaque materia spiritibus gignendis suggeritur, excrementa mitigantur & minuuntur, meliusque concoquuntur (Meli. I. 242.)

### CAPUT IX.

#### De Insomniis.

*Insomnium est phantasma rei alicujus sensibilis, animal inter dormiendum occurrens.*

**D**Um animal vigilat, & exercet sensus exteriores, deferuntur ab objectis sensibilibus simulachra ad cerebrum, & vi spiritus animalis impressa, ibi conservantur. Quando igitur idem animal dormit, & cessat à sensibus exterioribus, tunc simulachra illa, nisi impuritate aut turbulento motu spiritus animales obscurantur & obliarentur, rursus animali in somno occurrunt & apparent: quo fit, ut animal judicet, se reverà sensibus externis res illas cognoscere, quæ à simulacro repræsentantur.

Contingunt autem ut plurimum insomnia horis matutinis, quia manè peractâ digestionem, purior est spiritus animalis, propter vaporum crassorum resolutionem & absorptionem à calore nativo: ideoque tunc clarius & perfectius species rerum imaginationis offeruntur & repræsentantur. Quemadmodum enim in aqua turbata nulla penitus effigies, aut valde deformis repræsentatur; ita in cerebro magna halituum copia detento, aut nulla penitus insomnia formantur, aut valde indistincta, & minimè coherentia.

*Insomnia autem sunt vel supernaturalia, vel naturalia.*

*Supernaturalia sunt vel Divina, vel diabolica.*

De his agere non est locus, sed ea ad Metaphysicos, vel Theologos relegamus.

Natu.



## Cap. X. De Facultatibus minus Principibus. 23

*Naturalia sunt, vel ex relictis vestigiis imaginum, interdum formatarum, vel ex certa quadam corporis dispositione.*

Pleraque somnia oriuntur ex imaginibus earum actionum, quas interdum exercuimus: illæ enim, quia nuper in spiritus animales impressæ sunt, ideo etiam firmius hærent, & per operationem imaginationis nocturnæ, facilius renovantur.

Fiunt etiam ut plurimum ex varia corporum dispositione, varioque eorum temperamento. Sanguineis enim colores rubri, convivia, musici concentus, nuptiæ, oscula, res venereæ, horti, & id genus alia, ad voluptatem pertinentia, per somnum repræsentari solent: Biliofis colores flavi, rixæ, bella, homicidia, incendia, volatus, & similia: Pituitosis, colores albi, aquæ, navigationes, nationes, submersiones, pisces, & alia hujusmodi: Melancholicis colores nigri, tenebræ, cadavera, sepulchra, & spectra diabolica.

Nota tamen, astrorum influxum non rarò concurrere cum corporis dispositione ab insomniis efficienda, & illa potissimum aliquam habere solent significationem. [Meletem. l. 144.]

### CAPUT X.

#### De Facultatibus minus Principibus.

*Facultates minus principes duæ sunt: Sentiens & movens. Sentiens facultas est ea vis animæ, per quam objecta externa, per medium idoneum delata, in propriis organis percipiuntur.*

*Illius verò actio Sensus, sive Sensatio appellatur.*

**A**D sensum autem efficiendum quatuor requiruntur: primum, instrumentum bene dispositum; secundum, objectum proportionatum; tertium, medium per quod fit multiplicatio specierum à re sentibili: quartum, conveniens distantia inter objectum & sensum, ut recta illius perceptio fieri possit.

Ejus species sunt quinque, visus, auditus, olfactus, gustus, & tactus.

Visus est sensus, quo homo objectum visibile, per medium diaphanum actu illuminatum oculis percipit.

Auditus est sensus, quo homo objectum visibile, per medium *sonus* id est, sonis descendis aptum, auribus percipit.

Olfactus est sensus, quo homo objectum olfactibile per medium *σναιον* naribus percipit.

Gustus est sensus, quo homo objectum gustabile, per medium *διδυμον*, lingua percipit.

Tactus est sensus, quo homo objectum tactile, per medium *σφίς*, quavis corporis parte carnosâ & nervosâ percipit.

Facultas movens est illa animæ vis, quâ homo virtute propria se movet localiter.

Hæ omnes facultates & functiones minus principes tam exactè edocentur in Physicis, ut in iis tempus non esse terendum existimemus. (Melet. l. 121. &c.)

### PHYSIOLOGIÆ SECTIO VII.

#### De Hominis Procreatione.

### CAPUT I.

#### De Semine utriusque Sexus.

*Ad hominis procreationem duo sexus requiruntur, mas nimirum & femina: ex quorum mutuo congressu semen prolificum ab utroque effunditur, ex quo, in uteri sinu recepto, prima fetus rudimenta componuntur.*

*Est autem semen humanum substantia humida, & spirituosâ, in testibus elaborata, ex residuo tertiæ coctionis alimento, hominis formam potestate continens & ad fetus partes producendas, non solum virtualiter, sed & materialiter concurrens.*

**M**ulti solent asserere semen ex solo sanguine, in hepate confecto generari: ex eo commoti, quodd videantur vasa spermatica deferentia sanguine turgida, sicut aliæ venæ; & per nimios coitus sanguis soleat effluere. Verum cum illa materia vim & ideam totius cor-

poris referre debeat, ita ut similitudinem liberorum cum parentibus illi potissimum adscribere soleamus; satius esse ducimus asserere, illam à singulis partibus derivari, ex residuo scilicet alimenti tertiæ concoctionis, quod, quia à partibus non fuit valdè immutatum, non est mirum, illud ideam sanguinis adhuc retinere. Non est tamen existimandum, ex minimis quibusvis particulis, quæ cogitatione potius quàm sensu possunt comprehendere, materiam istam derivari, sed ex singulis partibus similaribus, quæ sensibilia corporis nostri elementa vocantur, potissimum verò à principiis, quæ spiritus illos vivificos, totius ideam & characterem referentes, suppeditare possunt.

Ad id verò, quod *objiciunt*, sanguinem per nimios coitus excerni: *Respondeo*, materiam feminalem, antequam in testibus elaboretur, sanguinis ideam referre, quia ex illo facta est, in partibus tamen aliquatenus immutato, & quandam in iis elaborationem adeptò.

*In semine sunt partes, Spiritus & Crassamentum.*

Spirituum beneficio semen turget & spumescit. Turget quidem, quia spiritus sunt valdè mobiles, & impetum facientes: spumescit verò, quia ab iisdem spiritibus tanquam aère impletur, & eorum motu agitur. In materia autem illa spirituosâ residet formatrix illa facultas, per quam homo sibi simile generare potest. Crassamentum verò est substantia humida & aquea, quæ talis manifestè apparet, cum ex semine spiritus evanuerunt, tunc enim illud spumositatem, & albedinem suam amittit, & illa humida substantia est omnium partium solidarum materia, primumque earum rudimentum.

*Et in parte spirituosâ est causa generationis efficiens; in crassamento verò materialis.*

Philosophi *objiciunt*, unum & idem non posse esse agens & patiens, efficiens & materiam, atque adeò in semine utramque causam non posse reperiri. *Respondeo*, illud verum fore, si seminis substantia esset omnino homogenea, sed cum in illo sint diversæ partes, non esse inconveniens, diversa munera præstare: quatenus enim spirituosum est, agit & informat humidiorē illam & crassiorem substantiam, quæ illi pro materia & quasi subiecto admota est, ut videre est in seminibus plantarum, & in ovis, in quibus post susceptum à terra vel incubante gallina calorem, spiritus ille prolificus sulcitur, qui in ejusdem seminis aut ovi materiam agens, partium conformationem aggredditur & perficit. In arte factis quidem efficiens vel opifex non ingreditur rem factam, seu opus, quia extrinseca tantum attingit; natura verò uniuscujusque rei, intus posita, interiora & exteriora perficit, totamque operis sui substantiam pervadit, in eaque consistit, tanquam proprio domicilio: ac proinde nihil impedit, quin semen tum efficiens, tum materiam generando præstet.

*Licet verò semen ex se fetus generationem præstet, non est tamen actu animatum, sed tantum potentia.*

Quidam existimarunt, semen esse actu animatum, & formam illam habere, quæ deinceps compositum organizatum est informatura. Nos verò existimamus, potestate tantum semen humanum hominis formam continere. Nam, cum hominis anima extrinsecus ipsi adveniat, non possumus dicere, semen animam humanam habere, nisi potentiâ, quatenus aptum natum est eas dispositiones inducere, quæ ad suscipiendum nobilioris formæ adventum sunt necessariae: immò neque in aliis animantibus semen esse actu animatum est arbitrandum, sed tantum potentia, quia eam habet vim conformatricem in spiritu positam, quam simile producit animatum, ubi semen in convenientem locum projectum, subiectamque materiam nactum fuerit. Illam autem vim seminis formæ insitam esse, quæ tamen non sit anima, nihil est absurdum: cum etiam in multis inanimatis, ut magnete, rhabbarbo & similibus, multæ eaque insignes facultates absque anima reperiantur. Hæc tamen doctrina insignes patitur difficultates, quas apud Sennertum in *hypomnematis physicis* videre est.

Corrumpitur itaque seminis forma, ubi primum anima advenit corpori jam disposito & delineato: & vitam plantæ vivere dicitur, quamdiu simpliciter nutritur. Ubi verò organa sensus & motus fuerint perfecta, animalem vitam,

seu



## 24 Institutiones Medicæ, Lib. I. Sect. VII.

seu sensitivam agit; ac tandem rationalis animæ opera exercet, postquam recta cerebri temperies & spirituum dispositio fuerit comparata.

### COROLLARIUM.

Antiqua est controversia inter Medicos & Peripateticos, an scilicet mulieres semen prolificum emittant: Medici enim omnes, post Hippocratem, partem affirmantem defendunt: ad cuius tutelam primò communem afferunt mulierum experientiam, quæ referunt, se aliquid majori cum voluptate emisisse in coïtu, quo conceperunt. Quod etiam confirmatur ex partium muliebrium structura, quæ testibus valdè conspicuis sunt à natura donatæ, ad seminis elaborationem, quo albicante & bene concocto sæpè refertæ in dissectionibus inveniuntur. Unde concludere licet, ex virilis & muliebris seminis commixtione fieri aliquid tertium, quod aptum est foetui generando.

Peripatetici verò cum Aristotele putant semen muliebre per analogiam tantum & homonymicè semen appellari, illudque non ad foetus generationem concurrere, sed tantum irritando coïtui; aut, irrigandis uteri lateribus invivire, quod validis rationibus confirmare videntur.

*Primò.* Si mulier semen haberet prolificum, sola sine viri congressu posset generare: semen enim, ac sanguinem menstruum haberet, quæ tantum duo ad foetus generationem requiruntur. *Secundà,* ex duobus entibus in actu, non potest geri unum ens per se, sed tantum aggregatum per accidens. Ergo ex duobus feminibus foetus produci nequit.

Quibus objectionibus, & aliis quæ eodem recidunt, *respondendo*, utrumque semen tum maris, tum foeminae, licet sit prolificum, esse tamen insufficiens, ut ex se solo foetus generetur; sed requiri debitam utriusque commixtionem in utero, ex qua foetus delineatio perficitur: atque ita ex pluribus entibus completis non fit unum ens per se, ex variis tamen entibus incompletis unum fieri ens completum, nihil habet absurdi. Conjungenda hinc Harvei Com. de Generat. [Melet. I. 52. 55. 71. 141. 146. 147. 149.]

### CAPUT II.

#### De Sanguine Menstruo.

*Non solum semen ad foetus generationem concurrat, sed etiam sanguis menstruus, qui est alterum principium, idque materiale tantum, non efficiens, sicut semen.*

**I**N sanguine materno nulli aut paucissimi sunt spiritus, idèò nullam habet efficiendi vim, sed tantum materiam suppeditat, ex qua omnes partes carneæ componuntur, sicut ex semine spermaticæ. Sanguis autem ille *menstruus* appellatur, quia in mulieribus bene affectis, quæ nec gravidæ sunt, nec lactantes, singulis mensibus solet effluere.

*Est autem sanguis menstruus excrementum ultimi alimenti partium carnosarum, quod certis temporibus & statis periodis, moderatâ quantitate per uterum expurgatur, ad foetus generationem & nutritionem.*

Hinc patet, menstruum sanguinem esse excrementum, idque utile secundum substantiam, cum in foetus partes, earumque nutritionem convertatur. In mulieribus autem sanguis iste redundare consuevit, tum ob debilem earum calorem, qui totum sanguinem in hepate confectum, nequit digerere, tum ob mollem & humidam earum temperiem, quæ humorum copiam solet acervare: unde fit ut sanguis iste, quantitate nimia luxurians, à carnibus jam expletis & quasi saturatis in venas majores refundatur, & ab his per uteri venas excernatur.

*Tempus, quo sanguis iste excernitur, duplex est, universale & particulare.*

*Tempus universale est à decimo secundo, vel decimo quarto ætatis anno, ad quinquagesimum, vel quinquagesimum quintum.*

Ante decimum secundum, vel decimum quartum annum, mulierum vasa angustiora sunt, & calor humoris copiam penè obrutus, reliquias pellere nequit; immodò ante illam ætatem maxima sanguinis copia ad corporis augmentum absorbitur. Postea verò à decimo secundo, vel

decimo quarto anno calor incipit effulgere, vasa amplificantur, mammae turgent, corpus libidine titillatur, & nova lanugine insperguntur genitalia. Contra verò post quinquagesimum, vel quinquagesimum quintum annu cessant menstrua, propterea quòd calor debilitatus tantam sanguinis copiam non amplius generat; ut quædam reliquæ superint; vel ea, si adsint, commodè expellere non potest.

*Tempus particulare uno mense definitur, idque trium vel quatuor dierum spatio.*

Hæc sanguinis menstrui vacuatio singulis mensibus contingere, quod omnes tribuunt motui Lunæ, quæ humoribus dominatur, & docet experientia, junioribus hanc purgationem ut plurimum contingere circa novilunium, senioribus verò circa plenilunium: unde pervulgatus ille versiculus.

*Luna vetus vetulas, juvenes nova luna repurgat.*

### COROLLARIUM.

Hinc celebris quæstio solet agitari, an sanguis menstruus sit qualitate noxius? Quam vide apud Laurentium q. 8. l. 8. *sua Anatomia*, diligenter excussam [conf. Melet. I. 147. &c.]

### CAPUT III.

#### De Conceptione.

*Tunc dicitur fieri conceptio, quando semina utriusque sexus in uteri cavitate simul permiscantur & soventur, eorumque virius formatrix in actum deducitur.*

**M**AS & foemina, dum suscipiendæ prolis gratiâ, rei venereæ incumbunt; simul & eodem tempore semina sua effundunt, mas quidem in cervicem uteri; foemina verò in proprium uteri sinum: qui quidem uterus mirâ proprietate præditus est seminis virilis attrahendi: illud idèò statim ac è pene virili emissum est, avidè allicit & in proprium sinum recondit: Ibique duo illa semina exquisitè uniuntur & permiscantur: & ab ipso utero arctissimè comprehenduntur, ita ut totum uteri corpus conflingatur, & corrugetur, illiusque orificium internum tam exquisitè claudatur, ut ne specilli apicem admittere queat. Tunc semina illa à calore uteri soventur, eorumque calor & spiritus suscitantur, ac divina illa virtus plastica in actum reducitur, unde foetus partes incipiunt delineari.

*Conceptionis signa potissima hæc sunt.*

*Primum,* levis totius corporis horror statim à coïtu.

*Quia tunc temporis uterus contrahitur, & sese contrahendo horrorem illum parit.*

*Secundum,* Seminis retentio, & pudendi muliebris ficitas.

*Si post coïtum semen non excidat, signum est mulierem concepisse.*

*Tertium,* uteri osculi exquisita oclusio.

*Quartum,* mensium suppressio.

*Quintum,* mammarum tumor, dolor, & durities.

*Sextum,* languidus Veneris appetitus.

*Septimum,* cibi fastidium. Non sunt tamen hæc ultima vera σημεία: cum hæc & alia gravidationis signa suppressio mensium non rarò quoque excitare soleat.

### CAPUT IV.

#### De singularum partium Delineatione, earumque perfectione.

*Prima partium spermaticarum rudimenta septimo conceptionis die incipiunt apparere.*

**V**IRTUS formatrix, à calore uteri suscitata totam feminis materiam duabus tunicis contegit, quas ex ipso semine efformat, & illæ tunicae chorion & amnios appellantur, quarum usus vide apud anatomicos. Reliqua verò feminis materia in partes spermaticas mutatur, illarumque prima lineamenta apparere incipiunt die septimo. Si enim genitura post septimum diem emissa, in aquam conjiciatur, in ea apparebunt tres bullæ, quæ sunt partium principum rudimenta, & infinita penè filamenta, quæ sunt reliquarum partium spermaticarum stamina.

*Omnes*



*Omnes autem partes spermaticæ in maribus triginta diebus, fœminis verò quadraginta perficiuntur.*

Cum mares sint calidiores & sicciores, ideò citiùs conformantur. Minor enim fœmellarum calor tardius concoquit, & major humiditas majori indiget tempore, ut condensetur in partium solidarum consistentiam.

*Partes verò carnosæ tertio mense perficiuntur in maribus; in fœminis verò quarto, & moveri incipiunt.*

Postquam omnes partes spermaticæ fuerunt conformatæ, sanguis menstruus in eas influit, earumque omnia spatia intermedia implet, unde virtus formatrix omnes partes carnosas producit, quæ tunc absolutæ sunt, cum fœtus incipit moveri: indicat enim hos musculos, à quibus motus fit, esse absolutos.

## CAPUT V.

## De Partu.

*Partus est fœtus in utero perfecti & absoluti debito tempore facta exclusio.*

Postquam fœtus in utero debitam conformationem, nutritionem, & accretionem acquisivit: sufficiens alimentum non recipiens, & calorem habens majorem, qui aëris inspiratu indigeat, ut ventiletur, liberiores locum quærere incipit, & calcitrando membranas quibus includitur, disrumpit, uterumque distendit; unde ille irritatus, onus, sibi molestum excludere nititur. Hinc duplex motus, unus ipsius fœtus exire intendentis, alter verò uteri fœtum excludere conantis. Partus verò *naturalis* est cum infans in caput ruit, eoque priùs foras incipit prominere, reliqui verò sunt præternaturales.

*Tempora verò, in quibus partus possunt contingere, sunt mensis septimus, nonus, & undecimus.*

Excluditur octavus, quia septimo mense perpetuò fœtus solet conatum aliquem edere: & si robustus satis sit, foras egreditur; si verò sit imbecillior, diutius ibi manet, est tamen ab illo conatu valde debilitatus, ita ut duobus egeat mensibus ad vires fractas restaurandas. Si igitur septimo mense excludatur, novo illo labore prorsus labe factatur, unde mors necessariò contingit. Astrologi causam hujus rei referunt ad infelicem Saturni influxum, quem volunt octavo mense dominari: de qua opinione, & reliquis ad partus varia tempora spectantibus, consule Laurentium quæst. 19. lib. 8. Anat. Zacchiam, Carranzam, (Melet. I. 151. &c.)

## CAPUT VI.

## De Similitudine Natorum cum Parentibus.

*Similitudo triplex est apud Medicos: Speciei Sextus & Individui.*

*Similitudo speciei est, dum res genita est ejusdem speciei cum generante.*

Sic homo hominem generat, canis canem, & ita de reliquis.

*Similitudo sexus est, cum res genita est ejusdem sexus cum altero parente.*

Sic infans masculus patri quoad sexum similis est, fœmella verò matri.

*Illam autem similitudinem sexus pendet à feminis masculi vel fœminæ prædominio.*

Vult Hippocrates semen quod à dextris partibus, tam maris, quam fœminæ decidit, esse validius & maribus generandis aptius: unde si semen illud masculinum à dextris decisum prædominetur, mas generabitur, si verò fœmineum in partibus sinistris genitum magis abundet, fœmella generatur.

*Similitudo individui est, cum natus aliquod aliud ejusdem speciei individuum secundum corporis cōformationem repræsentat.*

Sic natus aliàs patris, aliàs patris, aliàs avi, aliàs alterius cujusvis effigiem repræsentat.

*Et ita similitudo pendet non solum à virtute formatricæ, semini insita, sed etiam interdum ab imaginatione.*

Virtus formatrix, cum omnes corporis partes effingat, eisque formam illam largiatur, quæ semini est insita, quæ nimirum à singulis parentis partibus ei fuit impressa; necesse est, ut illis etiam secundum effigiem similis evadat; patri quidem, si paternum semen superet; matri verò, si maternum prædominetur. Quia verò in semine parentum latet non rarò quædam avorum aut proavorum facultas, quæ illorum partibus fuerat impressa; sit interdum, ut illa in nepotibus suscitetur, illosque avis aut aliis consanguineis similes efficiat: Unde putatur hæc vis ad quartam generationem extendi.

Denique imaginationis vis plurimum potest ad similitudinem inferendam. Si enim fœmina dum concipit, intentam habeat imaginationem ad alicujus effigiem, huic similem edet fœtum. Sic fœmina quædam Æthiopis effigiem in cubiculo habebat, & filium peperit nigro colore præditum. Sic multæ prægnantes, dum aliquid avidè expetunt, illius effigiem fœtui imprimunt, quia à summo illo desiderio conturbatur imaginatio, & rei appetitæ effigies spiritibus imprimitur, qui quidem spiritus illam effigiem tenello fœtui facillimè inurant. Fusiùs hæc explicatur à Gr. Horstio de simil. & dissim. natorum.

# INSTITUTIONUM MEDICARUM

## LIBER SECUNDUS,

### PATHOLOGIAM CONTINENS.

## PRÆCOGNITA

in Pathologiam.

*In Pathologiam consideratur corpus humanum præter naturam se habens, & in morbofo statu constitutum.*

**D**uplex est Natura apud Philosophos: universalis, & particularis. Universalis naturæ leges postulant, ut fiant in corporibus generationes, corruptiones, & alterationes variæ, quæ idcirco secundum illam naturam universalem se habet. At verò natura particularis, humana v.g. peculiare habet suæ constitutionis leges, easque à naturæ universalis legibus diversas, quæ si excedantur, præter naturam se habere homo æstimabitur.

Laz. Riverii Opera.

tur, scilicet præter naturam illam particularem. Sic corporis humani constitutio sita est in certa primarum qualitatum symmetria, debita partium conformatione, unionem earumdem, in quibus quoties vitium aliquod contingit, corpus præter naturam se habet, ut infra latius exponeatur. Nota, nonnullos (inter quos præcipuus est Fernellius,) res præter naturam distinguere ab iis quæ sunt contra naturam, ita ut illud præter naturam sit, quod tamen ex naturæ præscripto non est, illi tamen nullam vim infert, ut faciei lentigines, & color ille, qui ex Solis ardore contrahitur: contra naturam verò quod vim infert, ejusque actiones manifestè lædit. Attamen hæc duo apud Medicos vulgò confunduntur, & pro uno & eodem usurpantur.

D.

Cor-




*Corporis humani status triplex est, salubris, insalubris, & neuter.*

Divisionem istam non agnoscunt Philosophi, asserentes, inter morbum, & sanitatem, nullum dari medium: at Medici insalubrem seu morbosum statum appellant, cum nonnullæ corporis actiones sunt manifestè læsæ: salubrem, quando sunt omnino integræ, neutrum verò quando nec manifestè læsæ, nec omnino integræ apparent. Talis dispositio manifestè conspicitur in iis, qui in morbos labi incipiunt, vel ab iis convalescunt. Nec esse namque fuit, tres istas constitutiones in artem Medicam invehere, duabus potissimum de causis. *Prima* desumpta est ex operationibus medicis, & diætæ modo unicuique instituendo. *Ægris* namque debetur curatio, sanis conservatio, neutris verò corporibus, si sint decidua versus morbum, præservatio, & convalescentibus à morbo, refectio seu restauratio. *Secunda* causa deducta est à diebus decretoriis, qui non sunt computandi à principio cujusvis infirmioris valetudinis, sed ab eo tempore, quo ægrotans manifestas & satis insignes passus est actionum læsiones, ita ut decumbere fuerit coactus, quod non posset ita distinguere, ni status neuter ab insalubri distingueretur. Possumus tamen Philosophos cum Medicis, consiliare, si dixerimus, Philosophos lata significatione Morbi & Sanitatis nomen usurpare, quo modo etiam ea accepit aliquando Galenus, ut neutrum etiam statum comprehendat; Medicos verò strictius, prout ad artis usum necessarium. Trium horum statuum fusiolem explicationem vide apud Galenum in *Arte parva*. (Melet. II. 13.)

*De insalubri statu jam agere incumbit, & ratione illius tria veniunt considerata: 1. Morbus. 2. Causa morbi. 3. Symptoma.*

Tota ista tractatio versatur circa illam corporis dispositionem, quæ Morbus appellatur. Ut enim perfecta illius notitia habeatur, primò natura illius est proponenda, mox omnes illius differentię inquirendæ, deinde causæ, quæ illos morbos producant invelligandæ, ac denique effectus contemplandi, qui ab illis producantur: effectus enim morborum symptomata apud Medicos appellantur. Illorum ratione universa Pathologia in tres *sectiones* vulgò distribuitur, in quarum *prima*, morbi natura, ejusque differentię; in *secunda*, causæ morborum; in *tertia* verò symptomata explicantur. Sed quia crismus consideratio nullibi melius quàm in Pathologia collocari potest, cum per mutationem in morbo factam definiantur; ideò nos *quartam* sectionem Pathologiæ nostræ addere decrevimus, quæ totam crismus, & dierum criticorum doctrinam contineat, eamque ordine secundam faciemus, ita ut *prima* morbi naturam, & differentias: *secunda*, mutationes quæ in morbis contingunt, quarum præcipuæ sunt crismus; *tertia* causas morborum; & *quarta* denique symptomata contineat. (Melet. II. 3. 142. 143.)



## PATHOLOGICÆ SECTIO I,

### De Morbi Natura, & Differentiis.

#### CAPUT I.

##### De Morbi Natura.

*Morbus est dispositio corporis præter naturam, primo & per se actiones lædens.*

**G**alenus *primo methodi medendi, & lib. de differ. morb.* pulcherrimâ & valde dilucidâ methodo morbi naturam investigavit, quam nos hîc paucis imitabitur. Primò igitur actio ipsa venit considerata, quæ si læsa sit in humano corpore, illud dicimus ægrotare; si verò integra & illæsa, sanum esse. Actionem læsam dico, quæ manifestè talis & sensibiliter apparet; nam minimæ, & sensibus occultæ actionum noxæ, nullum hîc debent habere locum. Præterea, cum actio sit motus,

& essentiam non habeat permanentem, quia tantisper est, dum sit ac celebratur; ideò causam aliquam habeat necessesse est constantem & permanentem. Illa autem causa est instrumentum corporum, quod actionem exercet, purâ oculus videt, ventriculus concoquit. Cum autem unum & idem instrumentum non uno & eodem semper modo suas exerceat operationes, sed nunc illæsas, & secundum naturam: nunc læsas, & præter naturam: vario se se habeat modo, & variè sit dispositum necesse est. Unde si illius dispositio sit secundum naturam, corpus erit naturaliter dispositum, & actiones edet secundum naturam; si verò dispositio sit præter naturam, corpus erit præter naturam dispositum, & actiones edet præternaturales. Si igitur sanitas est, quando corpus naturaliter dispositum, integras actiones profert; morbus erit, quando corpus præter naturam dispositum edit actiones, atque ita actionum læsio à dispositione illa præter naturam dependebit. Hæc igitur definitio morbi rem perfectè declarat, & suis numeris est absoluta, cum genere, subjecto, & causa sit prædita, imò etiam effectu. Genus est dispositio, quæ nulla differentiâ restricta, non solum de morbo, causa morbi, & symptomate prædicatur, sed etiam de sanitate. Subjectum est corpus humanum; causa morbum efficiens, est partium corporis ametria, seu excessus à propria & naturali constitutione, quod per illud, *præter naturam*, designatur. Denique effectus morbi immediatus definitioni additur, qui est actionum læsio, quæ morbum perpetuò consequitur, & sensibus nostris obvia, illum nobis manifestat, qui alioqui non rarò sensuum aciem refugit. Hac positâ definitione, morbi naturam sequentia theoremata clariùs illustrabunt. (Melet. II. 3. &c.)

*Morbus in prædicamento qualitatis collocatur, & prima illius specie.*

Prima species qualitatis est habitus & dispositio. Licet enim morborum *dispositionis* nomine enuntiemus, quæ quidem fugax est qualitas, & facilè mobilis à subjecto, secundum Aristotelem; eam tamen hic latiori paulò significatu usurpamus, ut habitum etiam, atque adeò totam illam primam qualitatis speciem comprehendat.

Verum *objici* potest, morbum in diversis categoriis debere collocari: nam magnitudo aucta ad quantitatem videtur referenda, calculus & lumbricus ad substantiam & ita de reliquis: At hæc omnia morbi appellantur ab ipso Galeno. Ad hoc *respondetur*, morbos omnes formaliter in prædicamento qualitatis collocari: fundamentaliter verò ad alia reduci posse, quatenus scilicet à causis, illis propinquis, quæ sub aliis categoriis continentur, (cujusmodi sunt calculus, lumbrici, magnitudo aucta, numerus excedens vel deficiens, aliaque ejusmodi, quæ sunt morborum veluti fundamenta,) introducitur quædam dispositio, quæ veram morbi formam constituit: at ex forma sumitur ratio categoriæ.

Illam enim quæ sub aliis categoriis continentur, nimirum calculus, lumbrici, &c. morbi à Galeno, & reliquis clarioris doctrinæ gratiâ appellantur, & quia non suppetunt nomina, quibus istas dispositiones significare possint: tum etiam, quia sufficiebat Medico curationem instituenti naturam illius rei tenere, ex cujus sublatione tota dispositio præter naturam & noxa functionum tollebatur; non quòd accuratè philosophantibus veri morbi esse videantur, sed potius causæ, quia sæpe in nobis sunt, absque ulla manifesta functionum læsione, & non prius calculi, lumbrici, & similia, actionibus vim inferre possunt, quàm aliquam dispositionem, ut obstructionem, aut divulsionem in nostris corporibus excitarint.

Rursum *objici* potest, Morbum in prædicamento relationis collocari debere, quod colligitur ex Galeni dictis in *principio libri, de morb. different.* ubi Sanitas (inquit) *symmetria quadam est, & morbus ametria*: symmetria autem & ametria meras dicunt relationes: quod & apertè confirmare videtur Aristoteles 7. *Physic. capite tertio*, ubi morbum & sanitatem ad aliquid esse dicit. Ad id *Respondeo*, quòd licet morbus ametria, seu immoderatio appelletur; hinc tamen non probatur, esse relationem. Nam quemadmodum deformitas est



est quædam partium improprio, tamen pulchritudo & deformitas veræ sunt qualitates : ita morbus est improprio calidorum, frigidorum, humidorum aut siccorum aut partium, relatio tamen non est, sed qualitas quædam, aut dispositio, quâ male afficitur totum corpus. Si tamen aliquam in morbis reperiri relationem est fatendum, ut demus aliquid dictis Aristotelis, dicimus illud fieri, quatenus qualitates illæ, nimirum sanitas, & morbus, habent quandam inter se comparisonem, prout ad mediocritatem accedunt, vel ab ea recedunt, qualis respectus reperitur inter colores extremos, & inter virtutes & vitia quæ tamen nemo dixerit esse simplices relationes, quæ subiectis accidere possunt sine ulla eorum mutatione. (*Met. II. 9. 10.*)

*Omnis morbus habet permanentiam in parte, & permanentia est essentia morbi.*

Morbus per diathesin, seu dispositionem definitur, quo nomine quandam innuit essentia suæ seu partium positionem, sive constantiam in corpore, quâ distinguitur à simplici affectione, quæ patibilis qualitas appellatur, & est tertia species qualitatis. Et hæc constantia permanentia appellatur, dispositio scilicet ita impressa in partem, ut essentiam suam habeat à causa eam producente diversam & separatam, ab eaque independentem; & illæ res, quæ habent permanentiam, dicuntur à Medicis esse factæ, sive in facto esse; quæ verò non habent permanentiam, esse in fieri.

Verum *objici* potest, febrem ephemeram, aliosque leviores affectus, imò & graviores nonnullos, ut epilepsiam, & apoplexiam, exiguo tempore in corpore permanere, atque ita non videri habere permanentiam. *Resp.* permanentiæ nomen ad duo referri posse, vel *ad tempus*, quod durationem significat; atque ita non est de essentia morbi, quia morbi quamplurimi exiguam habent durationem; vel referri *ad existentiam* firmam & stabilem, quæ innuit quandam essentia, & partium positionem, quam habent in corpore omnes morbi, licet nonnulli exiguo tempore perdurent.

Rursus *objicitur*, Morbi per consensum sunt in fieri, & à simplici humorum vel vaporum communicatione suam habent existentiam, quâ cessante statim cessant; at illi inter veros morbos à Galeno recensentur: ergo non omnes morbi habent permanentiam. *Respondeo*, morbos per consensum non posse diu perdurare, quin ab eorum causis idiopathia parti inferatur, quæ, vel exigua, habet semper aliquid facti, quod est sufficiens verum morbum constituere. Si tamen adhuc tam levis sit sympathicus effectus, ut nullam habeat in parte consistentiam, neque ullam peculiarem possulet curationem, sed primario morbo sublato statim omnino auferatur, certè tunc à vera morbi ratione excluditur ab ipso Galeno.

*Objicitur* denuò, morbos ex omnium Medicorum consensu, quatuor habere tempora, quæ perpetuò decurrunt; nimirum principium, augmentum, statum, & declinationem. Cum ergo sunt in perpetuo motu, non poterunt habere permanentiam. *Respondeo*, ætates seu tempora morborum respicere eorum motum, & varias constitutiones, non autem generationem & essentiam, quæ fixa & stabilis permanet: sicut hominis natura eadem perpetuò conservatur, licet ille per diversas ætates varias subeat mutationes; sic morbi, jam facti & geniti, sua percurrunt tempora, in quibus variè afficiuntur.

Denique sic *arguitur*: habere permanentiam & esse in facto, idem est apud Medicos, ut supra admonuimus: At inter omnes febres sola hæctica est in facto, hac enim conditione distinguitur à reliquis, quæ in fieri tantum esse dicuntur: Ergo reliquæ febres non habent permanentiam. *Respondeo*, in omnibus morbis esse aliquid, per quod morbi illi tales sunt, & generationem suam adipiscuntur. Sed quoniam causa morifica, v. g. humor putridus in febribus perpetuò agit, & multiplicat qualitatem illam morbosam, ideo dicuntur in fieri, donec in hæcticam evadant, causa scilicet agere cessante, propter introductam æqualem intemperiem, & tunc facti simpliciter appellantur; reliqui verò, partim facti, partim fientes.

*Omnem morbum necessariò sequitur actio læsa per se, & immediatè.*

Laz. Riverii Opera.

Morbi non raro sensibus sunt incogniti, omnes tamen per symptomata innotescunt, quæ sunt illorum effectus, & potissimum per actionem læsam, quæ à morbo dependeat immediatè & per se, atque ita essentialiter, ut posita actione læsa, necessariò ponatur morbus à quo illa dependet.

Verum hîc *objici* potest, ab ipsis causis morbificis sæpè læditur actio immediatè, nimia enim alimenti copia ingesta ventriculi concoctionem lædit, nullo intercedente morbo: Ergo non omnis actio læsa dependet à morbo.

*Respondeo*, concoctionem ventriculi non esse idcirco læsam, quod magnam alimenti copiam nequeat concoquere; cum enim certa inter agens & passum debeat esse proportio, ut actio rectè exerceatur, si alimentum quantitate nimia exsuperet, vel sit qualitate molestum, ventriculi actio non dicitur læsa, etiamsi illud nequeat subigere; sicut non dicitur laborare, etiamsi ferrum nequeat concoquere. Dicimus igitur, vitium dependere ab objecti improprietate.

Rursus sic *objicitur*: Quædam symptomata possunt primò & per se lædere actionem; ut qualitas mutata in oculo, color scilicet flavus corneæ tunicae ictericorum, à flavæ bilis in illam effusione contractus, qui visionem immediatè lædit; illis enim omnia apparent flava, at nullus potest accusari morbus qui visionem hoc modo lædere queat. Ergo color ille qui symptoma est, actionem lædit immediatè. *Respondeo*, in oculo peculiariter colorem præternaturalem posse dici morbum; oculus enim naturaliter constitutus debet esse omnis coloris expertus, ut objectorum species puras & impermixtas, eorumque colores varios recipere possit: color enim ille oculi referri potest ad morbos innumeros, quia auctus est numerus qualitarum, quæ naturaliter in oculo esse debent. Idem dicendum videtur de sapore extraneo in lingua, & sono in aure, quia scilicet impediunt, ne sapes & soni ab iis ritè percipiantur; unde patet in peculiaribus illis sensoriis, peculiari constitutione donatis, peculiarem etiam morbi rationem esse admittendam.

Denuò hic *objicitur*. In affectibus sympathicis actiones partium læduntur absque ullo morbo: nam si in partibus per sympathiam laborantibus esset morbus, illis remedia adhiberentur, quod tamen non venit: neque dum obstructo cerebro nervorum actio læditur, possumus dicere morbum esse in nervis, sed in cerebro tantum. *Respondeo* affectus sympathicos in censu morborum non reponi à Medicis therapeuticis; quia illis remedia non adhibentur: si quis tamen attentè consideret, illos ad aliquod morbi genus referri posse reperiet. V. g. obstructo cerebro non influit in nervos spiritus animalis, ex cujus defectu moratus & sensus abolentur. At defectus ille inter morbos in numero deficientes potest recenseri, & ita de aliis quamplurimis est dicendum.

## CAPUT II.

### De Morbi Generibus, & Differentiis.

*Hactenus de morbi natura: consequens est, ut de illius differentiis agamus.*

**G**ENERA, species, & differentia morborum confunduntur à Galeno, 2. *methodi*, & pro uno & eodem usurpantur: non enim solet exactam illam & logicam considerationem consecrari, licet diverso respectu utrumque verè dici possit: ratione nimirum ipsius morbi, qui genus summum est, species seu differentia debent appellari: & ratione specierum inferiorum, in quas dividuntur, genera dici possunt.

*Sunt autem morborum differentia alia essentielles, alia accidentales.*

*Essentiales sunt quæ ab ipsa morbi essentia desumuntur, & aliter specificæ appellantur, quia ex iis genera, & species constituuntur.*

*Illæ autem sunt tres, nimirum similis, organica, & communis.*

Tota essentia accidentium à subiectis dependet, ideo eorum essentielles differentia à subiectorum differentiis sumi debent: morborum autem subiecta sunt corporis nostri



noſtri partes, quæ propriè tales appellantur, quæ nimirum toti cohærent, communique vitâ fruuntur: nam quamvis ab Hipp. partes dividantur in *continentes*, *contentas*, & *impetum facientes*, ubi per continentis partes viventes & actionibus exercendis destinatas intelligit, per contentas, humores, & per impetum facientes, spiritus; nunc latiffimè accipiunt nomen partis, neque humores, aut spiritus morborum subjecta esse possunt, nec communi vitâ fruuntur, sed causæ potius sunt morborum, dum qualitate, vel quantitate peccant. Cum igitur partes istæ viventes sub duplici contineantur differentiâ, simularium scilicet & organicarum, morbi etiam in similes & organicos dividuntur: sed quia in utrisque dictis partibus, communis alia requiritur dispositio, præter debitam temperiem & conformationem, ut secundum naturam se habere dicantur, naturalis scilicet illarum partium continuitas seu unio; ideò, dum illa solvitur, alia oritur species morbi, quæ communis appellatur. (*Melet. II. 12. 14. &c.*)

## CAPUT III.

## De Speciebus Morbi Similaris.

*Omnis morbus similis intemperies appellatur.*

**P**artes similes ex elementis tantum componuntur, & earum actiones à quatuor primarum qualitatum symmetria & debita cum moderatione perficiuntur. Partes enim similes, quæ similes sunt, nullam edunt actionem præter nutritionem, propter quam conveniens alimentum ad se attractum retinent, concoquunt, & superflua expellunt, quæ omnia à sola temperie in iis absolvuntur. Igitur quamdiu partes similes debitam servant temperiem, secundum naturam se habent. Dum verò intemperatæ sunt, in morboſo statu sunt constitutæ, atque ita omnis morbus partes similes efficiens, erit intemperies.

*Intemperies autem in alias differentias subdividitur, quarum nonnullæ sunt essentielles, reliquæ verò accidentales.*

*Essentiales rursum alia sunt simplices, alia compositæ. Simplices sunt quatuor, 1. Calida. 2. Frigida. 3. Humida. 4. Sicca.*

*Compositæ sunt totidem, 1. Sicca & humida. 2. Calida & frigida. 3. Frigida & humida. 4. Frigida & sicca.*

Illæ temperies morboſæ appellantur, quoties tantus est earum excessus, ut manifestam inferant actionum læsionem, alioqui intra sanitatis limites erunt constitutæ. V. g. licet quis bilioso temperamento donatus, calidior sicciorque existat, quàm par sit ad justam temperamenti moderationem efficiendam; quamdiu tamen actiones suas secundum innati sui temperamenti conditionem exercet, intemperie morboſa affectus non dicetur, donec proprios sanitatis limites excedens, in febrem, v. g. aliumve calidum affectum inciderit.

*Accidentales intemperierum differentia desumuntur à causa, vel à subjecto.*

Licet accidentales morborum differentias ad finem huius sectionis remiserimus tractandas; quia tamen hæc ad intemperiem solam peculiariter spectant, ideò de illis hinc agere non erit inconveniens.

*Ratione causæ alia intemperies dicitur materialis, alia immaterialis.*

Materialis intemperies ea est, cui conjungitur interna quædam causa, humor scilicet, vapor aut flatus: ut in febribus humoralibus, partium inflammationibus, & infinitis aliis contingit, & illa à Galeno appellantur intemperies cum humoris affluxu. Immaterialis verò, quæ nuda intemperies etiam appellatur, ea dicitur, quæ ab exteriori tantum causa profecta est sine interioris concursu. Hæc minùs frequens est quàm superior, & rarò admodum contingit, eam tamen videre est in marasmo summa partium refrigeratione, in aqua gelida, vel sub Aquilone gelidissimo contracta, in cephalalgia à vehementi æstu contracta, & similibus.

*Ratione subjecti alia intemperies est in habitu, alia in habitudine.*

Intemperies quæ est in habitu, seu quæ habitum contraxit & confirmata est, *hectica* etiam appellatur, quæ tam

firmiter inhæret, ut sit indelebilis, & dicitur etiam omnino facta: huius generis sunt febris hectica, & elephantiasis. Ea verò quæ est in habitudine, seu dispositione, est tantum *inchoata*, & adhuc in fieri, aut saltem partim fiens, & partim facta, aut facillè delebilis, ut febres vulgares, & alii morbi curatu faciles.

*Ratione etiam subjecti, alia est intemperies æqualis, alia inæqualis.*

*Æqualis* intemperies est, quæ in singulas corporis nostri partes est æqualiter dispersa: sic febris hectica est æqualis intemperies, quia idem caloris gradus in omnes partes est introductus. *Inæqualis* verò intemperies est, quæ partibus corporis nostri non est æqualiter insita: sic febres putridas inæquales morbos appellamus, quòd in iis partes solidæ non sunt planè calefactæ, sicut humores quos calor penitus occupavit: sic febres epialæ & lypiriæ inæquales intemperies appellantur; quoniam in epiala calor & frigus simul in toto corpore perſentitur, in lypiria verò exteriora rigent, & interiora uruntur. (*Melet. II. 18. &c.*)

## COROLLARIUM CIRCA

## Morboſos Similares.

Objicitur *primò*, non dari posse simplicem intemperiem, quia illa vel esset cum materia, vel sine materia. Non cum materia, quia talis intemperies ab aliquo humore pendet: at unusquisque humor duplici præditus qualitate. Immaterialis verò à causis externis excitatur, illæ autem vel sunt elementa, quorum unumquodque duas habet qualitates; vel mixta, quæ duas etiam habent qualitates ab elemento prædominante. *Respondeo*, unicam tantum qualitatem posse excedere, reliquis bene temperatis, cum duæ causæ internæ vel externæ conjunguntur quæ in una qualitate conveniant, in alia sint contrariæ. Ut dum ex sanguine & bile morbus generatur, siccitas bilis retunditur à sanguinis humiditate, & ibi nullus est excessus, sed utriusque caliditas, simul juncta, efficit calidam intemperiem. Idem evenit in causis externis: si enim aer sit temperatus, ad calidam humidamque temperiem, & alimenta frigida & humida, frigiditas ipsi cum alterius caliditate contemperationem efficient, sed humiditas utriusque humidam pariet intemperiem.

Objicitur denuò, calidam & humidam intemperiem non dari, quod caliditas & humiditas sint vitæ nostræ principia, ac proinde simul juncta non possint esse morboſa. Deinde, quod caliditas debeat esse valde intensa, ut morboſa esse possit; at calor intensus potenter absumit humiditatem, & citissimè sibi comitem accersit siccitatem, atque ita intemperies calida & humida non poterunt simul subsistere. Idem dicas de frigida intemperie, quæ magnas generans cruditates, copiosas cumulat in corpore humiditates: unde non videtur posse cum siccitate reperiri. Ad hæc *Respondeo*, caliditatem & humiditatem esse quidem vitæ nostræ principiis consentaneas, si tamen ita redundant, ut humores non possint à natura gubernari, nec commodè ventilari, necessariò putredinem concipient, unde calor præter naturam introducit, qui nimia humiditati junctus, calidam & humidam intemperiem efficit. Deinde, calor excedens absumit quidem humiditatem, sed non illico ac proinde illud temporis spatium sufficit ad morborum etiam saviſsimorum generationem, ut patet in febribus sanguineis, in quibus maxima initio humiditas luxuriat, si tamen diutius perdurent, siccam intemperiem accersunt. Eodem prorsus modo frigida & sicca intemperies diutius persistit, antequam per cruditates humida acquiratur. Imò etiam si copiosa cumulentur excrementa, partes tamen solidæ sic eam servant intemperiem, ut in senibus apparet. Propositas morborum differentias, easque solas tota recipit antiquitas, omnesque ferè neoterici, præter Fernelium, & alios nonnullos illius sequaces. Fernelius enim nova duo morborum genera commentus est, quorum unus vocat materiæ, alterum verò formæ, seu totius substantiæ. Cum enim (inquit) in partibus similibus tria spectentur, materia, forma, & temperamentum, quorum naturalis constitutio sanitas est, sic uniuscujusque immoderatio erit morbus. Atque

hinc



hinc tres morborum differentiae exorientur, nimirum intemperies ex primarum qualitarum excessu; materiae immoderatio; dum pars mollior aut durior, laxior aut astrictior, tenuior aut crassior, rarior aut densior evadit; & formae corruptela, dum vel à morbis manifestis, ut à putredine, vel ab occultis, venenatis scilicet, contagiosis, & pestilentibus tota corporis symmetria corrumpitur.

Hanc suam opinionem nudè proposuit Fernelius lib. 1. *suae Pathologiae*, cap. 7. quam longa tamen disputatione confirmavit, 2. *de abduis rerum causis*, cap. 9. & quia celebris valde est propter tanti viri auctoritatem, multosque non mediocriter exercuit; illam idcirco brevi disputatione discutimus. Rationes igitur, quae à Fernelio afferuntur pro sua opinione confirmanda, quatuor sequentibus possunt comprehendi.

*Primò.* Morbi in iis esse solent, à quibus actiones perficiuntur: sed tria sunt in parte similari quae actiones illius perficiunt, materia scilicet, forma & temperamentum: ergò & circa illa erit morbus.

*Secundò.* Idipsum confirmatur ex varia actionum laesione, in una eademque parte. Ventriculus enim, ut pars similis, saepe laborat imbecillitate, à qua imminuitur concoctio; sed illa imbecillitas nunc fit ab immodicè refrigerantibus, ut nimio aquae potu, lactucarum, & similium usu: nunc à relaxantibus, ut olei, tepentium, & similium haustu; nunc denique ab extraneis quibusdam & venenatis qualitatibus, à quibus formae suae robur deicitur. Ergò tria erunt morbi genera distincta.

*Tertiò.* Ab ipsis remediis hoc etiam evinci posse videtur. Tria enim sunt remedium genera ab ipso Galeno constituta: alia nimirum quae primis tantum qualitatibus alterant, & haec in morbis intemperiei locum habent; alia verò quae adstringunt, relaxant, attenuant, incrassant, & haec morbis in materia medentur; alia denique sunt, quae agunt à tota substantia & occulta proprietate, & haec in morborum totius substantiae curatione usurpentur.

*Quartò.* Denique in gangraena, elephantiasi, & ulceribus malignis, tota partium substantia corrumpitur. Ergò non possunt negari morbi totius substantiae.

Nos verò existimamus rationes istas non esse tanti momenti, ut nos cogere valeant antiquas morborum similarium differentias multiplicare. Decimus ergò illam Fernelii opinionem esse rejiciendam: atque antequam allatis objectionibus satisfaciamus, sequentibus erit confutanda.

*Primò.* Morbus est affectus totius partis similis, quatenus talis est: ergò materia & forma non possunt dici affici morbo, sed totum compositum, sola enim intemperies est affectus totius partis similis.

*Secundò.* Omnis actio partis similis est naturalis: sed actiones naturales quatuor tantum sunt, attractio, retentio, concoctio, & expulsio, quae à temperie sola dependent: Ergò unicus tantum erit morbus partis similis, nimirum intemperies.

*Tertiò.* Morbus omnis habet agendi vim, nimirum actionem laedendi. At materiae nulla est actio; est enim principium passivum & potentiale: ergò nullus dabitur morbus materiae.

*Quartò.* Si daretur morbus formae, malè ab omnibus, tum veteribus, tum neotericis definiretur morbus, quem volunt esse corporis dispositionem: At forma est incorporea. Ergò non potest pati morbos.

*Quintò.* Si darentur morbi formae, infinita sequerentur absurda, formam scilicet per se pati posse, generari & corrumpi magis & minus recipere, & habere contrarium, quae abhorrent à philosophia.

*Denique.* Si formae, vel totius substantiae corruptela sit morbus; considerata erit, vel interminò & absoluta, vel in via, & in fieri. Si absoluta, nihil aliud est, quàm animantis interitus, & integra perniciēs: si verò sit in fieri, & in motu, erit tantum alteratio corruptioni praevia, ac proinde qualitas in temperie constituta.

Atque ita satis manet confutata haec Fernelii opinio. Ad rationes in illius subsidium allatas, ita respondemus. Ad primam dicimus: Materiam & formam non concurrere ad perfectionem actionum, sed tantum ad compositi con-

stitutionem; actiones enim sunt compositorum, non componentium: compositum autem operatur secundum dispositionem, quae in illo reperitur: haec autem dispositio in parte similari est sola temperies.

Ad secundam respondeo, actionem ventriculi non esse purè similem, sed fieri partim à temperie, partim à conformatione & structura illius, alteratio enim & coctio alimentorum rectè perfici non possunt, quin debitè illa contineantur & coarctentur à ventriculo. Retentio verò illa, sive complexus dependet à ventriculo, hoc, vel illo modo conformato. Quoties igitur refrigeratur ventriculus, ut non possit concoquere, est intemperies seu morbus similis: dum verò ita relaxatur, ut non possit continere est morbus organicus: cum denique actio ventriculi deicitur à rebus venenatis, est quaedam intemperies, quia corrumpitur temperamentum insitum illius partis, & illa intemperies maligna seu venenata appellatur, ut infra dicitur.

Ad tertiam respondeo, qualitates illas secundas à primis immediatè dependere. Sic adstringentia frigida sunt & sicca, relaxantia calida & humida, & ita de cæteris: quae verò à tota substantia operari dicuntur, id præstare per qualitates occultas, quae ad temperiem referuntur.

Ad ultimam respondeo, intemperiem esse duplicem, vulgarem unam, alteram malignam, ut in differentiis accidentalibus ostenditur: propositi autem affectus ad intemperiem malignam facillimè referri possunt.

An dentur morbi totius substantiae, & an Fernelius rectè eos describat, & quid de Riverii sententia statuendum sit, discere licet ex Gr. Horst. oper. T. 1. pag. 239.

## CAPUT IV.

### De Morbi Organici Speciebus.

Morbi organici species quatuor sunt, 1. In conformatione. 2. In magnitudine. 3. In numero. 4. In conjunctione.

Quemadmodum à partibus similaribus actiones similes, ita ab organicis organicae exercentur, quae ut secundum naturam se habeant, quatuor desiderant conditiones, debitam nempe conformationem, magnitudinem, numerum, & conjunctionem, à quibus si fiat recessus; morbi statim oriuntur: unde totidem morbi organici differentiae refurgunt.

Conformationis morbi rursus tres habent species. 1. In figura. 2. In asperitate & levitate. 3. In meatu & cavitate.

Morbus in figura est, cum naturalis partium figura ita immutatur, ut inde actionum lesio contingat.

Multis modis partium figura potest immutari, dum scilicet quae rectae naturae esse debent, incurvantur; curvae eriguntur, aliae inflectuntur, distorquentur, rotundae quadratae fiunt, & ita de cæteris.

Morbus in asperitate & levitate est, cum partes quae naturaliter asperae aut rugosae esse solent, leviores evadunt, vel contra leves asperiores.

V. g. Cum ventriculus & intestina mucosa pituita obducta lienteriam patiuntur, fit morbus in levitate; cum verò trachea arteria à distillatione è cerebro exasperata contrahit raucitatem, est morbus in asperitate.

Morbus in meatu & cavitate est, cum naturalis meatuum & cavitatum constitutio evertitur.

Ejus rursus tres sunt species, 1. adstrictio, 2. obstructio, 3. dilatatio.

Adstrictio fit, cum meatus, vel cavitas ab externa causa comprimitur, & angustior evadit.

Sic dum oesophagus & aspera arteria coarctantur ex angina, & vesica comprimitur ex grândiore foetu in utero concluso, morbus ille fit, qui adstrictio appellatur.

Obstructio fit, cum materia aliqua praternaturalis internas cavitates occupat; vel meatus occludit.

Sic calculus in vesica; materia crassa, viscida, & lenta hepatis, lienis, aliarumque partium venas interiores, liberumque humorum comneatum impediens, & reliqua hujusmodi, obstructionem pariunt.

Dilatatio fit, quando cavitates & meatus nimis ampli & patentes efficiuntur.



# 30 Institutiones Medicæ, Lib. II. Sect. I.

Dilatatio est adstrictioni & obstructioni contraria: illius exemplum habemus in dilatatione pupillæ, & varicibus, tum etiam in venarum anastomosi & diapedesi. Anastomosis enim fit quando orificia vasorum nimis dilatantur, diapedesis verò quando tunica eorum nimis relaxantur & rarefunt, ut humores effluant. Ad dilatationem etiam referuntur nimia ventriculi laxitas, ut non possit commodè amplecti alimentum, quam perperam Fernellius ad morbos materiæ supra revocabat.

*Magnitudinis morbi vel sunt in magnitudine aucta, vel imminuta.*

*Utrique vel in toto corpore, vel in aliqua ejus parte. In toto corpore est magnitudo aucta, vel imminuta, dum tota illius moles præter modum augetur, vel imminuitur.*

Magnitudinis auctæ in toto corpore exemplum affert Galenus de quodam Nicomacho Smyrnæo, qui præ nimia crassitie sese non poterat commovere. Eadem verò imminuta satis apparet in atrophia & febris hectica, in quibus totum corpus macie contabescit.

*In aliqua parte magnitudo augetur, vel imminuitur, dum naturaliter sibi constitutas dimensiones excedit, vel ab iisdem recedit.*

Sic tumor præter naturam in parte est magnitudo aucta: sic etiam partis defectus in longitudine, latitudine, vel profunditate, ut linguae, nasi, digiti, testis, vel alterius partis parvitas insignis, est magnitudo imminuta. Illa enim parvitas contingit vel ab ipsa generatione, ex defectu materiæ, vel post generationem, idque rursus dupliciter; defectu scilicet alimenti, unde partis atrophia & consumptio, vel ablatione substantiæ partium, ut cum portio nasi, linguae, vel digiti amputatur.

*Morbi in numero sunt vel in numero excedente, vel in deficiente.*

Ad partes organicas constituendas certus similarium numerus requiritur, & in majoribus, magisque compositis, certus minorum organorum, & minus compositorum numerus concurrat. Quomodocunque autem ista redundant vel deficient, vitium faciunt, quod numeri aucti, vel imminuti appellatur.

*Numerus excedens vel est eorum, quæ sunt secundum naturam, vel toto genere præter naturam.*

Secundum naturam dicuntur, ratione substantiæ, ex qua componuntur, quæ naturalis: & peccant tantum in eo, quod non sint necessaria ad membri functiones exercendas; imò illas impediunt, ut sextus digitus, carnis excrescentia in ulcere, & similia. At verò toto genere præter naturam sunt ea, quæ ex substantia omnino præternaturali componuntur, ut lumbrici, calculi, &c. quæ ad morbos in numero referuntur, quatenus res præter naturam superadditæ, organi structuram vitiantes, & functiones illius suæ præsentia impediunt. Alioquin si actiones non lædant quatenus numero redundant, sed obstructionem, aut similem affectum producant, causæ morbi potius censebuntur, ut supra annotavimus.

*Numerus deficiens perpetuò in rebus naturalibus, sive corporis partibus consistit, isque vel ab ipso uero, vel post exitum ab eo est contractus.*

Morbus in numero deficiente ab ipso ortu contractus dicitur, cum quis v. g. pede, manu, oculo, teste, aut alia quavis parte mancus in lucem procedit: post ortum verò, quando pars aliqua amputatur: ut cum pes, vel brachium gangrena laborans, amputantur, testis in hernia eximitur, dens cariosus evellitur, & sic de cæteris.

*Morbi in conjunctione sunt duplices: in situ, & in connexionione.*

*Morbi in situ sunt, quando partes quæ simul coherere debent, à propriis sedibus recedunt.*

Hujusmodi morbos videre est in hernia, cum intestinum, vel omentum in scrotum descendit; item in procidentia ani, uteri, & similia.

*Morbi in connexionione sunt, quando partes quæ debent simul coherere, non coalescunt: vel contra, quæ coherere non debent, simul coalescunt.*

Tales affectus apparent in luxationibus, quando ossum connexio pervertitur, & in imperforatis, necnon dum

oculorum palpebræ, vel oris labra coalescunt, quæ naturaliter debent esse disjuncta.

## COROLLARIUM circa morbos Organicos.

*Objicitur primò.* Deficientem esse morborum organicorum numerum jam allatum, quia eorum differentia non desumuntur ab iis omnibus, quæ necessaria sunt ad actiones organicas obeundas. Sed præter jam dicta alia multa concurrunt: partes enim instrumentariæ indigent calido à corde influente, nimirum sanguine, & spiritibus bene affectis, quandoquidem iis læsis, aut absentibus, totius corporis actiones offendantur: syncope, tremore, rigore, &c. Ergò ab illis quædam morbi organici species erit constituenda. *Respondeo,* In propria cujusque partis constitutione distinguenda esse communia instrumenta, quæ in omnibus actionibus, tum similarium, tum organicarum partium sunt necessaria: illa enim in neutris peculiarem obtinent considerationem, sed tanquam vaga & fluxa in partium corporis viventis numero non habentur. Vel certè dicendum, affectus, qui ab horum vitio contingunt, non esse idiopathicos, sed debere tantum referri ad sympathiam negatæ materiæ vel facultatis.

*Objicitur secundò,* præter adductas condiciones ad partium organicarum constitutionem requiri symmetriam; si enim pes v. g. vel manus ossibus, nervis, & ligamentis, constare debeant, tota sint ossea vel carnea; mala redditur illarum partium structura, quamvis rectè se habeant superius numerata. *Respondeo:* si pars organica, quæ pluribus instrumentis constare debet, ex unico tantum sit conflata, esse tunc morbum in numero deficiente, nec aliud genus diversum esse inquirendum.

*Objicitur denique,* ab ipsis qualitatibus, tam primis quam secundis, actiones partium organicarum lædi: partes enim verbi gratia duriores vel molliores, crassiores aut tenuiores, ad sensum vel motum redduntur ineptiores, sicut Galenus cerebri crassitie ad ingenii acumen plurimum obesse existimat, tenuitatem verò prodesse; sic ventriculus laxior male concoquit, cornea oculi tunica rarior aut densior visui officit: & ita de reliquis. Unde patet, istas etiam qualitates inter morbos organicos debere recenseri. *Respondeo,* morbos illos, qui sequuntur mutationes qualitatum, non posse tribui partibus organicis; quatenus sunt organicæ, sed quatenus ex similaribus tanquam materia quadam componuntur: ad partis enim instrumentariæ constitutionem debita partium similarium symmetria, earumque temperies, tam in primis quam secundis qualitatibus est supponenda; non igitur earum improprio parti organicæ est adscribenda, quamvis illius actiones lædat, quia id fit ex accidenti; sicut domus corruit, ubi ligna vel lapides sunt putrida vel cariosa, quamvis illa non ad domum spectent, si formalem illius rationem intueamur.

Contra istam responsionem denuò objici potest, secundas illas qualitates, duritiem, molliem, & reliquas, non minus debere ad partium organicarum morbos referri, quam asperitatem & lævitatem, quæ etiam inter qualitates secundas numerantur, & à nobis inter conformationis morbos recensitæ fuerunt. *Respondeo,* non esse eandem rationem, quandoquidem durities, molities, & reliquæ non mutantur, nisi per ipsam temperiem simul immutatam, asperitas verò & lævitas, quæ sunt affectus superficiæ tantum, ita dependent à formatrice facultate, ut sine ulla temperamenti diversitate quasdam læves & æquales, alias asperas & inæquales producat, ut patet in ossibus, quæ siccissima sunt, & tamen maximè æqualia in sua superficie: & in ventriculo, qui superficie sua externa est æqualis, interna asper & rugosus: & sic de cæteris. [Melet. II. 37. ad 60.]



# Cap.V. De Morb. Commun. Differentiis. 31

## CAPUT V.

De Morbi Communis, seu Solutionis Continui Differentiis.

*Morbi communis seu solutionis continui differentiae desumuntur à causa, vel à subiecto.*

*Causae continuum solventes quatuor sunt: ad primam referuntur ea quae sunt tenuia, & ad secundum idonea; ad secundam, acris & erodentia: ad tertiam gravia, dura, & obtusa: ad quartam, rumpentia, & divellentia.*

*Quae à tenuibus & secantibus fit solutio continui, sectio appellatur.*

**S**ub hac comprehenduntur omnes solutiones continui, quae fiunt ab externis causis incidentibus, sive punctim, sive caesim, in quavis corporis parte.

*Quae ab acribus & erodentibus fit solutio continui, erosio nuncupatur.*

Ut plurimum fit erosio in corporis partibus à causis internis, ut acribus, & mordacibus succis, ulcera efficientibus. Aliquando etiam fit ab externis admotis, vel actu exurentibus, ut igne, candente ferro; vel potentia, ut causticis medicamentis & similibus.

*Quae à gravibus, duris, & obtusis fit solutio continui, contusio appellatur.*

Haec solutio continui ut plurimum manifesta non est, sed occulta; in ea enim partes colliduntur, & violenter comprimuntur, ex qua compressione occulta fit continui solutio.

*Quae à rumpentibus & divellentibus fit solutio, ruptio seu divulsio appellatur.*

Haec saepissimè contingit in tortura in qua digiti pedum vel manuum ita divelluntur, ut eos ab aliis partibus omnino separari contingat: ex nimio etiam conatu peritonaeum dirumpi solet, unde hernia solet exoriri. Aliquando etiam ex nimia plethora venarum tunica dirumpuntur, unde, copiosae haemorrhagiae producuntur.

*Ratione subiecti, seu corporis nostri partium, variae solutionis continui differentiae constituuntur, & varia illis nomina adscribuntur.*

*In carne enim facta incisio, vulnus appellatur, erosio vero ulcus.*

*In osse facta incisio transversa, fractura: recta, fissura dicitur; erosio vero, caries.*

*In venis, arteriis, nervis, & cartilaginibus facta incisio transversa, idem incisionis retinet nomen; & recta fissura.*

*Peculiares solutionis species, punctura dicta, nervis potissimum attribuitur; membranarum vero ruptura.*

Apud Chirurgicos auctores omnes istae solutionis differentiae sub vulnere, ulcere, & luxationum nomine comprehenduntur, & pulchrè exponuntur à Joële & Senerto. (Melet. II. 26. 51. 58.)

## CAPUT VI.

De Differentiis Accidentalibus Morborum.

*Accidentales morborum differentiae sunt, quae genera & species morborum non constituunt, sed tantum nonnullas eorum proprietates declarant.*

**I**nfinite propemodum ab auctoribus proponuntur accidentales differentiae, quas omnes persequi nimis longum, & forsitan minus utile futurum arbitramur. Nos igitur eas tantum hic proponemus, quae ad usum artis magis sunt necessariae, & frequentius occurrunt in morborum tractatione.

*Illae autem desumuntur vel à morborum essentia, seu proprietatibus eam comitantibus, vel à causis morborum.*

Ab ipsa morbi essentia essentiales illius differentiae desumuntur, ut supra demonstratum fuit: accidentales vero differentiae à nonnullis proprietatibus, essentiam morbi comitantibus, tum etiam à causis & effectibus. Nos tamen, reliquis omissis, ut per se notissimis, vel minus uti-

libus, eas tantum hic proponimus, quae ab essentia & causis desumuntur.

*Proprietates morborum essentiam comitantes, sunt prima, magnitudo; secunda, motus; tertia, mos; quarta, eventus.*

**1. Ratione magnitudinis, morbus dicitur magnus, vel parvus.**

*Morbus magnus is dicitur, qui intensus valde est, & magnà vi corpus nostrum affligit.*

*Parvus vero, qui à naturali constitutione parum recedit, & vires nostras parum labefactat.*

Galenus tribus de causis morbus magnum dici debere affirmat. *Primò* ratione partis, si nimirum partem principalem afficiat, vel ad vitam necessariam: *Secundò* ratione causarum; si nimirum illae sint admodum vehementes, & magno impetu saeviant: *Tertiò*, ratione symptomatum, si nimirum illa violentia & atrocitate corpus valdè molestant.

**2. Ratione motus considerentur quatuor tempora morborum. Principium, augmentum, status, & declinatio.**

*Principium morbi est, quando eundem tenorem servat, quem à principio accepit, nulla aëctione insigni adveniente.*

*Augmentum est, cum morbus sensibiliter increfcit.*

*Status est, cum morbus non amplius increfcit, eademque retinet vehementiam à summo incremento relictam.*

*Declinatio denique est, cum morbus manifestam suae vehementiae patitur diminutionem.*

Divisio temporum morborum non solum ab essentia ipsius morbi desumitur à Galeno, sed etiam à causis, & symptomatibus, cum scilicet illa vehementiora sunt à principio ad statum, & in declinatione mitescent, ac potissimum ab excrementis, quae in principio omnino cruda statuuntur, in augmento quoddam coëctionis rudimentum præ se ferre, in statu maxima coëctionis indicia ostendere, & in declinatione absolutam concoëctionem, suique in melius commutationem.

*Tempora autem morborum vel sunt universalialia, vel particularialia.*

*Tempora universalialia sunt partes totius morbi, à principio ad finem considerati.*

*Tempora vero particularialia sunt partes paroxysmorum, qui in morbis intermittentibus apparere solent.*

Sic unusquisque morbi paroxysmus habet principium, augmentum, & declinationem; sicut universus morbus in toto sui decursu consideratus.

Nota non omnes morbos habere quatuor tempora, sed tantum salutares, lethales enim ante declinationem perpetuo interimunt.

*In motu consideratur quantitas & modus.*

*Ratione quantitatis motus, sed durationis, alius morbus dicitur longus, alius brevis.*

Sic febris ephemera est morbus brevis, quia citissimè finitur: hydrops vero longus, quia diutissimè perdurat.

*Ratione etiam quantitatis motus seu durationis, alius morbus dicitur, alius chronicus.*

*Acutus morbus est, qui cum brevitate junctam habet magnitudinem.*

Ideo celeriter movetur cum vehementia & periculo. Huic vulgò chronicus opponitur: licet illi non sit omnimodè contrarius. Chronicus enim & longus idem est, talisque appellatur ex eo solum, quod diuturnus sit, licet plerumque magnus existat: ut paralysis, hydrops, & similia, quibus verè & propriè breves opponuntur.

*Nota, nonnullos morbos chronicos esse ratione propriae essentiae, & acutos ratione paroxysmi, ut epilepsia, quae morbus est longissimus, & paroxysmos habet acutissimos.*

*Morbus acutus triplex est, primus peracutus, secundus acutus simpliciter, tertius est acutus in metamorphosis, seu ex declinatione.*

*Peracutus rursus dividitur in extremè peracutum, & simpliciter peracutum.*

*Extremè peracutus est, qui tam vehementer, & velociter movetur, ut tertio vel quarto die ad salutem vel ad mortem terminetur.*

*Peracutus simpliciter ad septimum diem terminatur.*

*Acutus*







absolutè & simpliciter solvuntur, sine alterius morbi interventu.

*Commutatio unius morbi in alium frequenter apparet, dum apoplexia in paralyfin degenerat; febris tertiana in quartanam; quartana, hepatis, aut lienis tumor, & alii quamplurimi affectus in hydropem degenerant.*

*Absolutè simpliciter solvuntur morbi, dum sine alterius morbi interventu, ad salutem, vel mortem terminantur.*

*Terminantur verò ad salutem vel mortem dupliciter: Sensim videlicet atque paulatim; aut subito & derepente.*

*Dum sensim & paulatim terminantur ad mortem, marasmus nominantur: dum verò sensim terminantur ad salutem, solutio simpliciter, λόγος Græcis nominatur.*

*Dum subito, crisis nominatur, quæ hys vulgò apponitur, cum passim autores dicunt, omnes morbos terminari per crisis aut lysin.*

## CAPUT II.

### De Natura Crisis.

*Crisis est subita & repentina mutatio in morbo, ad salutem, vel ad mortem.*

**C**RISIS nomen multis modis usurpatur apud Hippocratem & Galenum. Interdum etiam per crisis nihil aliud quàm humorum secretionem significant, quemadmodum Galenus *Comment. in aph. 13. sect. 2.* Fit, inquit, *crisis natura secernente humores noxios à bonis, & ad excretionem preparante.* Interdum verò Crisis ipsam excretionem significare volunt, quòd optima crisis excretionem perficiatur. Sic Hippocrates *lib. in arte*, corrupti ossis excretionem crisis nominat. Vel denique pro certamine accipitur, quod instante crisi inter morbum & naturam solet accidere. Sed magis frequens & usitata est illius acceptio pro iudicio, quæ ab ipsius Galeni temporibus ad nos usque fuit à plurimis recepta. Galenus enim *comment. in 1. progn.* iudicationem in morbis factam è foro judiciali derivatam, & in artem medicam translatam fuisse attestatur, nec quidem admodum improprie: licet enim res, à quibus translationes desumuntur non sint omninò consimiles, attamen iudicium quod fit in morbis, cum iudicio forensi non exiguum habet similitudinem. In foro enim judiciali, dum capitalis causa agitur, concurrunt primò actor & reus, actor cum reo dimicat, eumque pertinaciter accusat, testes profert, eique mortem vel supplicium intentat: Reus verò, si insons accusationis fuerit, se strenuè defendit, & in actorem ipsum pœnam rejicit; si verò contra accusatoris vim sistere non possit, succumbere cogitur. Hæc omnia aguntur coram Iudice, qui res omnes perpendi, ac tandem certâ die universaliter iudicium profert. Pari quadam ratione in crisis morbus actoris partes agit, natura verò rei: causa morbifica naturam laceffit, eamque funditus evertere conatur. Hujus invasionis testes sunt symptomata, quæ totius certaminis progressum patefaciunt. Natura verò, quæ rei quodammodo rationem habet, adversus actorem suum, morbum videlicet, sese pro virili defendit: & si viribus illa constet, morbi conatus eludit, eumque tanquam iniquum actorem rejicit, & foras excludit: si verò imbecilla sit, illius actioni succumbit. Hæc omnia accuratè rimatur Medicus; & utriusque partis pensitatis viribus, tanquam Iudex sententiam profert, diemque notat iudicii, in quo futura est vel morbi, vel naturæ victoria. Patet igitur hinc non omninò absurdum atque rejiciendam esse crisis cum iudicio comparisonem.

Ut verò ad ipsam Crisis definitionem propiùs accedamus, cum illa per mutationem definiatur, sciendum est, in omni motu, secundùm Philosophos, multa considerari, terminum à quo, terminum ad quem, medium per quod fit motus, movens, & mobile. Hæc omnia in crisi perpetuò reperiuntur. *Movens* enim est ipsa natura, quæ coctiones perficit, humores secernit, ac tandem die critico expellit. *Mobile* sunt causa morbifica & humores præternaturales, in quos tantum potest cadere crisis. *Terminus à quo* incipit crisis, est morbi augmentum: fit enim crisis in morbo; & pro varia morbi natura, tardiores, vel celeriores

*Laz. Riverii Opera.*

crises exercentur: Acuti enim morbi celerius, longi tardius judicantur.

*Terminus ad quem* definit crisis, est sanitas, vel mors, vel status illis proximus, aut transitus ad aliam morbi speciem. *Medicus* verò per quod, est totum illud spatium, quod à morbi augmento ad solutionem usque extenditur; & in quo natura concoctioni, secretioni, & excretioni incumbit.

Motus autem ille crisis simplex non est, sed compositus: idque dupliciter, ex locali scilicet & alterativo, & ex naturali & violento. *Localis motus* in crisis fit ratione causæ morbificæ, quæ à natura commovetur & agitur, ac per vias consuetas excernitur. *Alterativus* verò motus fit ratione corporis patientis, sive *corruptivus* ille sit, ut apparet in crisi lethali, sive *perfectus*, ut in salutari est manifestum. Secundò motus ille est *naturalis*, ratione naturæ, quæ internum est principium & movens, crisis primò & per se efficiens: *violentus* verò ratione certaminis, perturbationis, & velocioris illius mutationis. Optimè igitur crisis dicitur mutatio, eaque velox & repentina, ut hoc modo distinguatur à coctione, certamine, & secretionem, tum etiam à solutione lenta & paulatina diuturnorum affectuum. Unde velocitas illa propriæ & peculiaris differentiarum rationem habet. Reliquæ verò definitionis partes tam per se sunt manifestæ, ut nulla indigeant explicatione.

## CAPUT III.

### De Crisium Differentiis.

*Crisis alia est perfecta, alia imperfecta.*

*Perfecta est, quæ agrum perfecte & integrè à morbo liberat. Estque vel salutaris, vel lethalis.*

*Ut crisis perfecta sit & salutaris, sex requiruntur conditiones. Debet enim esse, Primò, optimis signis indicata. Secundò, manifesta. Tertiò, die critico contingere. Quarto, fida. Quintò, secura. Sextò, conveniens morbo & ærotantis naturæ.*

**P**rimò igitur crisis perfecta salutaris concoctionis signis die indice debet præmonstrari. Unusquisque enim dies criticus suum habet indicem, quartus videlicet est index septimi, undecimus decimi quarti, & decimus septimus vigesimi. In illis, inquam, diebus apparere debent concoctionis signa, ut crisis perfecta & salutaris consequatur. Secundò debet esse manifesta, id est, cum insigni aliqua evacuatione conjuncta, scilicet excretionem vel abscessu. *Quæ enim sine manifesta excretionem levant, recidivæ facere solent,* (inquit Hippocrates in *prognosticis*) id ipsum confirmat idem Hippocrates quamplurimis historiis in *epidemiis*, è quibus insignis hæc instar omnium erit. *Sect. 7. lib. 3. Epid. Ægr. 2.* Hermocrates decimoquarto die liberatur à febre, non sudavit, decimoseptimo rursus febre corripitur, vigesimo febris expers non sudavit, vigesimo quarto die rursus febricitavit, tandem vigesimo septimo die moritur. Si enim sine causis criticis solvatur morbus, periculo non vacat; & si cum insigni excretionem vel abscessu terminetur, salutaris crisis censenda est. Tertiò, die critico debet contingere: in illis enim diebus solet natura, dum commodè operatur, humores noxios ἀφύσως & confestim expellere, utilesque moliri excretionem, quæ si alio die contingant, signum est naturam esse conturbatam & tumultuariè operari. Quarto, debet esse fida, atque ita nullas morbi reliquias post se relinquere, unde recidivæ periculum superesse possit. Quintò, debet esse secura, id est, cum facili ægrî tolerantia, & sine ullis periculosis symptomatis. Deniq; talis crisis esse debet, speciei conveniens & ærotantis naturæ, atque adeò illius ætati, & temperiei congener. Acuti morbi per excretionem, diuturni per abscessum judicari solent. Febris ardens in juvene hæmorrhagia, in sene alvi fluxu ut plurimum judicatur.

*Crisis perfecta lethalis, contrarias habet conditiones ei, quæ salutaris est.*

Conditiones illas ex supra dictis eruere facile est, si nimirum eas, quæ pro salutari crisi propositæ sunt in contrarium



rium, usurpemus. Ex his autem prima inter reliquas maximi momenti est; cum ea crisis lethalis maximè censenda sit, quam non præcesserunt concoctionis signa. Si enim, nulla apparente concoctione, aliqua fiat perturbatio, & humorum evacuatio, certissimum est indicium naturæ irritatæ, & ab humorum malignitate lacescitæ. Unde sit, ut citius properet ad statum, quam coctionis gradus ferre queat, & tunc temporis crism minimè tutam fore, audacter pronuntiandum: idque eò magis, quo morbus naturâ fuerit periculosior. In morbo salutari, & minùs periculoso, tunc etiam verendum est, ne diminutè judicetur, & cum gravioribus periculosisque symptomatis morbus deinceps revertatur, vel tandem diuturnior factus, in mortem degeneret. *Coctiones enim (inquit Hippocrates) celeritatem judicii, & morbi securitatem ostendunt: cruda vero & incocta, atque in malos abscessus conversa, dolores, aut diuturnitatem, aut acrisias, aut mortem, aut recidivam.* Hæc enim mala evenire solent, dum crisis nullo modo antea indicatur, unde ostenditur, naturæ conditiones & consuetudines esse funditus everfas atque labefactatas à vi morbi, neque illam in crisi morbum esse debellaturam, siquidem in pugna nullum præstitit specimen victoria, quod perpetuò evenire solet in iis, qui invicem pugnant. Ille enim, qui adversus suam antagonistam victoriam est reportaturus, omnibus motibus statim ostendit, se inferiorem habere inimicum, licet ipse aliquid ab inimico repartiat. Verum nullum ostendere roboris potentioris signum, necessariò significat collapsam ruere facultatem.

*Crisis imperfecta est, in qua morbus perfectè non judicatur, sed tantum secundum partem; & alterius crisis futura locum post se relinquit.*

*Eaq; duplex est, altera ad melius, altera verò ad deterius.*

*Ad melius ea est, quæ non omnino tollit morbum, sed facit, ut eum æger alacrius ferat.*

*Ad deterius est, quæ morbum facit vehementiorem, & magis periculosum.*

#### COROLLARIUM.

Propositæ crism differentia aliquas patiuntur difficultates, quæ hic paucis diluendæ sunt. *Primò* enim non dari posse crism perfectam, salutarem, aut lethalem, sequentibus argumentis probari potest.

*Primum.* Si daretur crisis perfecta salutari, eâ absolutâ statim perfecta sanitas succederet: sed post crism languida admodum est sanitas, & imperfecta; omnesque actiones debiles & infirmæ, morbosam potius indicant constitutionem, quam sanitatem.

*Secundum.* Non potest fieri transitus ab uno extremo ad aliud nisi per medium. Sed medium inter morbum & sanitatem, est status neuter. Ergo in quavis crisi fiet mutatio ad statum illum neutrum, non autem ad perfectam sanitatem.

*Tertium.* Convalescentes, qui ex morbo per crism evaserunt, eodem modo ut ægri conservantur. At illud non fieret, si crisis perfecta fuisset & salutari.

*Quartum.* Crisis etiam lethali perfecta dici non potest, cum mors illi succedens destructio mera sit, & perfectionis contraria.

*Quintum.* Omnis crisis à natura perficitur. At omnes naturæ actiones ad bonum perpetuò diriguntur. Ergo nulla crisis poterit esse lethali.

*Ad primum, secundum, & tertium,* dicendum est, crism perfectam salutarem appellari, cum ab ea nulla portio materiæ morbificæ relinquitur in corpore, quæ morbum constituere possit. Licet verò statim per crism non sit perfecta sanitas, sed tantum status neuter convalescentiæ; ille tamen à præternaturali materia nullo modo dependet, sed tantum à partium languore & imbecillitate, quæ à prægressi morbi violentia necessariò fuit introducta. Ideò dicere possumus, perfectam tunc temporis esse sanitatem, saltem ratione causæ morbificæ, quæ tota fuit vacuata. Et hoc sufficit, ut crisis dicatur perfecta.

*Ad quartum* dicimus, in crisi lethali fieri destructionem ratione individui, & corporis ægrotantis; hoc tamen non impedire, quin aliqua in iis sit perfectio ratione ipsius crisis, quæ quamvis lethaliter exerceatur, tamen dum integrè absolvitur perfecta quodammodo dici potest.

*Ad quintum* respondeo, naturam perpetuò sibi finem optimum proponere, ab eo tamen sæpius aberrare, cum debilis admodum est, ut præ nimia virium exsolutione intentum assequi non possit, & oneri succumbere cogatur.

*Secundò*, adversus primam conditionem crisis perfectæ salutari objici possunt duæ Hippocratis historiæ, quarum prima habetur 1. *Epid. sect. 3.* ubi refert, Metonem absque concoctionis signis, perfectè ad salutem fuisse judicatum. Altera habetur 3. *Epid. sect. 3.* ubi etiam affirmat, Larissæam virginem sine coctionis signis perfectè judicatum. Verum huic objectioni duplex *responsio* satis facit. *Primò* enim dicimus cum Galeno, historias illas ratas esse, & extra ordinem naturæ, atque ideò ab Hippocrate observatas. Miratur enim Galenus in *commentario*, illas crises nullam sequutam fuisse recidivam, cum præter naturæ consuetudinem, & præter leges ordinarias salutari criseos apparuerint. *Secundò* dicimus, illas crises fuisse salutares, propterea quod in principio multæ præcesserant evacuationes, eæque satis laudabiles, multæque crism fuerant consequutæ, ut ex historiis apparet. Licet autem illæ symptomaticæ quodammodo fuerint, ex eo quod in principio prodierint sine coctionis signis, tamen criticæ quodammodo censendæ sunt, quia vi naturæ oppressæ factæ fuerunt, & materiâ turgente. Vel saltem dicamus, illas fuisse mixtas, partim scilicet criticas, partim symptomaticas, quæ tamen materiam morbificam minuendo, potuerunt efficere, ut crisis postea superveniens, ad salutem fuerit terminata; cum eam præsertim aliæ subsequutæ fuerint evacuationes. Metoni enim post judicium crebrò sanguis à naribus exiit. Larissææ verò virgini menstrua post judicium prodierunt, quæ nunquam apparuerant, & ideo nulla subsequuta est recidiva.

Objici etiam potest, naturam humores noxios, dum turgent, sine coctionis signis posse criticè vacuare, cum Medico liceat, ex divini senis præcepto, purgationes celebrare, turgente materia, nulla expectata concoctione. *Respondendum* est, in principiis morborum naturam oppressam à materia turgente, mixtas saltem evacuationes celebrasse posse, partim scilicet criticas, & partim symptomaticas: perfectas crises non posse, propter concoctionis defectum.

*Tertiò*, adversus quintam conditionem salutari criseos quod scilicet debeat esse securi, nempe cum facili ægri tolerantia, & sine periculosis symptomatis, *opponi* potest auctoritas, ratio, & experientia. Nam Hipp. *Aph. 13. sect. 2.* noctem difficilem & gravem, imminens crism præcedere testatur, & Galenus *cap. 7. lib. 3. de crisibus*, varia symptomata, eaque acerbissima, ut perturbationem, delirium, difficultates respirationis, jactationis, pulsus inæqualitates, criticas vacationes antecedere affirmat.

*Deinde*, non potest accidere crisis, nisi post certamen naturæ cum morbo; & contentio illa non potest fieri sine symptomatum exacerbatione. Natura enim & morbus agunt invicem & patiuntur: unde ægrotantis corpus necessariò affligitur: *Denique* ostendit experientia, nullam crism (quantumvis salutari illa sit,) sine symptomatum vehementia & summa ægrorum agitatione exerceri. Ad hæc *Respondemus*, in crisi quidem multa apparere symptomata, sed illa non esse periculosa. Ubi enim vires sunt validæ & robustæ, symptomata, quæ in crisi salutari sunt perpetuò mitiora, nullum possunt afferre periculum. Nam quando illa sunt admodum vehementia, lethalem crism portant, vel saltem imperfectam, quæ ad deterius vergit.

*Quartò*, adversus ultimam conditionem sanitatis Criseos, quod scilicet debeat esse conveniens morbo, & ægrotantis naturæ, ita ut acuti morbi per excretionem, longi per abscessum judicentur; Febris ardens in juvene per hæmorrhagiam, in sene per almi fluxum terminetur, hæc *objici* possunt: quod morbi acuti per excretiones, aut per abscessus judicantur, ex Galē. *cap. 7. lib. 3. de Crisibus*. Deinde Febres pestilentes, quæ sunt extremè peracutæ, per bubones & carbunculos solvuntur. Morbi etiam longi non solum per abscessus, sed etiam per excretiones sæpe judicantur. Neque crises illæ ægrotantis naturam sequi solent, febres enim acutæ juvenibus, non solum per hæmorrhagiam, sed etiam per sudores, urinas, & alvi fluxum terminantur, quod etiam in senibus absque ullo discrimine contin-



git. His omnibus Respondendum est, propositam conditionem veram quidem esse, non perpetuò & necessariò, sed ut plurimum; habet enim natura suos motus ordinariorum quos aliquando immutat, pro varia materiæ conditione & dispositione ejusdem; ita ut materia, quam natura in tali ætate per hæmorrhagiam vacuare est consueta, si non in partibus inferioribus sit sita, commodius per urinas, aut alvi fluxum vacuetur.

CAPUT IV.

De Signis Crisium.

Signa Critica in tres classes dividuntur, quorum alia antecedentia, alia concomitantia, alia denique subsequencia nominantur.

Antecedentia rursum duorum sunt generum, alia tempus crisis prænuntiant, alia speciem significant.

Tempus futuræ criseos ex duobus innotescit, acuti morbi, & concoctionis signis; quæ à nobis exposita sunt, sect. 3. Semeiotices, cap. 4.

Speciem crisis significant ea signa, quæ ostendunt, per quem locum crisis adventura sit, videlicet per vomitum, alvi fluxum, sudores, urinas, hæmorrhagiam, menses, hæmorrhoidas, vel abscessum. Quæ omnia fuerunt à nobis exposita sect. 3. Semeioticæ, c. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Signa crisis comitantia sunt, quæ cum ipsa specie crisis simul apparent, crisisque ipsam dum sit bonam sit, an mala; perfecta, an imperfecta, indicant.

Suntque ipsæmet causæ, & species critica quæ duo omnino sunt, excretio & abscessus.

Excretio ea salutaris & bona dici debet, quæ commodè fit. Ut autem commodè fiat, quatuor requiruntur, qualitas laudabilis, quantitas moderata, tempus opportunum, & excernendi modus naturæ familiaris.

Qualitas humoris qui excernitur, laudabilis est, si peccans, & coctus humor vacuetur.

Quantitas moderata est, quæ neque exigua, sed sufficiens, neque immodica est. Nam exigua damnatur, & suspecta est, qualis est substillum sanguinis, sudatiuncula, vomitus exigui: immodica periculo non vacat.

Tempus opportunum est dies criticus, quæ enim excretionibus aliis diebus contingunt, suspectæ sunt.

Excernendi modus est naturæ familiaris, si excretionibus primùm fiant confertim, non sensim & paulatim, deinde si fiant per loca conferentia, & legi naturæ commoda.

Ut verò per loca convenientia fiat evacuatio, tria sunt necessaria. Primùm, ut locus non sit loco morbi dignior; Deinde, ut habeat rectitudinem; Postremò, ut transitus patentes habeat.

Abscessus ut legitimus sit, tria spectanda, quò, unde, & propter quid.

Quò, partem denotat, in quam decumbit, quæ debet esse inferior, ignobilior, remota ab affecta parte, & totius materiæ morbigica capax, alioqui periculum est refluxus.

Unde, partem denotat ex qua, dextrane an sinistra: debet enim fieri decubitus secundum rectitudinem.

Propter quid, causam designat, ob quam oritur abscessus, id est, num à natura cocto morbo, aut à materia cogente, & divexante adhuc humore crudo. Nam si crudo existente morbo fiat, parvus erit abscessus, & morbum perfectè non judicabit.

Hæc omnia speciatim à nobis exponentur Sect. 3. Semeiotices, cap. 2. dum signa examinabimus, quæ desumuntur ab excrementis per varias corporis partes profluentibus.

Signa crisis consequentia, ostendunt an crisis perfecta fuerit, & an inde perfecta sanitas expectanda sit; an verò fuerit imperfecta, & metus sit recidivæ. Illa autem desumuntur ab actionibus, excrementis, & qualitatibus corporis, quæ si ad statum naturalem plurimum accedant, salutaris fuit excretio: si verò ab eo valde recedant, fuit imperfecta crisis, & periculum est recidivæ. Hæc etiam erunt à nobis explicanda cap. ultimo partis prognosticæ, in quo agitur de signis futuræ recidivæ in convalescentibus.

CAPUT V.

De Diebus Criticis.

Dies critici illi dicuntur, in quibus crises solent contingere. Eorum tres sunt differentie: Alii dicuntur verè & perfectè critici, alii indices, alii intercedentes.

Perfectè critici, principes, aut radicales appellantur: quoniam quæ his diebus contingunt crises, omnes perfectæ criseos notas habent: ejusmodi sunt septenarii tres, nimirum septimus, decimus quartus, & vigesimus.

Hisce diebus frequentius perfectæ ac salutare crises solent contingere, quia natura in illis, præcipuè quando utiliter operatur, & absolutum supra morbum dominium obtinet, singulare adversus causam morbigicam certamen aggreditur, eamque per ductus convenientes excludit. Illi autem sunt septenarii tres, quia natura septenario numero gaudet. Nam septimo mense foetus vitales edit, septimo ætatis anno dentes prodeunt, decimo quarto menses erumpunt, & per singulos annorum septenarios, magnæ mutationes in hominibus contingunt. Horum primus est septimus, non solum ordine, sed etiam potestate & viribus, ut testatur Gal. I. de dieb. decret. cap. 4. Eumque cum Rege clementissimo confert, qui multos à pœna liberat, eosque salvos dimittit; ut plurimum enim quæ illis diebus contingunt crises, bonæ & salutare sunt. Si verò quædam malæ contingant, non perniciose sunt, quemadmodum futuræ essent, si alio die contingerent.

Secundus est decimusquartus, in quo judicantur morbi, qui septimo judicari nequiverunt, modum satis concoctæ materiæ; at si ante decimumquartum crisis contingat, non est perfectæ; sed sit, natura irritatâ, aut copia, aut qualitate materiæ. Cum enim dies critici per septimanas numerentur, decimusquartus est finis secundæ septimanæ, unde factum est, ut ab Hippocrate appelletur impar; quandoquidem non consideratur à primo die morbi, sed à primo die secundæ septimanæ. Est porro terminus morborum acutorum, ut testatur Hipp. aph. 23. sect. 2. Acuti morbi in quatuordecim diebus judicantur. Quod etiam confirmat in Coacis: Ardentem febricitantes judicant quatuordecim dies, vel ad interitum, vel ad salutem. Cujus tamen sententiæ veritatem labefactare videntur plures historiæ, quæ habentur in Epid. eorum, qui cum acutè febricitarent, ultra decimumquartum producti sunt. Herophon decimo septimo judicatur; uxor Philini vigesimo interiit; Chæriorion vigesimo judicatus est: hi autem omnes acutâ febre correpti. Cui objectioni Respondendum est; acutos morbos verè dici ex Hipp. & Galeni doctrina, qui celeriter, continenter & vehementer moventur, neque acutorum nomen obtinere, donec vehementiam sumpserint; licet igitur quidam morbi judicentur decimoseptimo, & vigesimo, quoad morbi initium, semper tamen judicantur decimoquarto, quoad morbi vehementiam, & impetum. Nam hujusmodi morbi, decimoseptimo & vigesimo judicati, non statim à principio sumunt impetum & vehementiam, sed paulò post. Sic qui in fine quaternarii vehementiam ceperunt, licet decimoseptimo finiantur, procul dubio decimoquarto suæ vehementiæ judicati sunt: & qui septimo vehementiores apparuerunt, vigesimo judicati, decimoquarto suæ vehementiæ solvantur. Unde Galenus commentario in prædictum Aphorismum: Nullus inquit, inventus est usquam, qui ab initio velociter movetur hunc transgredi terminum, qui aliquam ex dictis non acceperit mutationem.

Quamvis enim aliquando decimoseptimo, aut vigesimo desinat morbus acutus: tamen intra suum decimumquartum judicatum esse comperimus, si computationem incipiamus ab eo die, quo citior, & vehementior morbus fieri incipit. Quod patet ex Hippocr. historia adolescentis in Melibœa, qui decima die deliravit, vigesimâ valde insanivit, & vigesima quarta obiit: quo constat, decimoquarto vehementiæ obiisse, quandoquidem illa incepit tantum die decimâ morbi. Quamvis autem apud Hippocratem quidam morbi acuti nominentur, qui ad quadragesimum aut sexagesimum diem extendun-



tur, tamen illi verè & propriè acuti non sunt, quia non habent vehementiam & impetum: sed lentè progrediuntur, ideoque acuti ex decidentia vulgò nominantur, quandoquidem ex acutis producti sunt per crism imperfectam judicatis vel inæqualiter procedunt, ob inæqualem vicissitudinem remissionis, & exacerbationis.

*Tertius ex diebus principibus est vigesimus, qui septimus est à decimoquarto, quandoquidem decimusquartus bis numeratur; est enim ultimus secundæ septimanæ, & primus tertiæ, ut docuit Hipp. Aph. 25. sect. 2. ubi dies indices præcipuè observat.* Contemplabilis, inquit, est decimus septimus; est enim quartus à decimoquarto. Unde necessario sequitur, vigesimum esse septimum decimoquarto.

Idipsum confirmat idem Hipp. pluribus historiis in *Epidemiis*, ut Ctiæronis, uxoris Philini, filię Euryanætis qui judicati sunt die vigesimo. In aliis verò, qui judicati sunt post vigesimum, contigerunt crises in quaternioribus & septimanis, computando à vigesimo. Sic Abderitana virgo vigesimoquarto judicata: Anaxium verò vigesimo quarto.

Attamen, adversus hanc doctrinam *opponi* potest, quod idem Hippocrates *aph. 36. sect. 4.* vigesimum primum inter decretorios enumerat, omisso vigesimo, *Sudores*, inquit, *febricitantibus boni, qui manare cæperunt die tertio, quinto, septimo, non undecimo, decimoquarto, decimo septimo, vigesimo primo.* Quod etiam confirmat in *epid. & libello de diebus decretoriis*, in quibus vigesimum primum refert, omisso vigesimo.

Cui difficultati Respondendum est, crises, quæ in tertia septimana contingunt, ut plurimum partim vigesimi & vigesimiprimi occupare: unde fit, ut aliquando ab Hipp. crisis ad vigesimum, aliquando verò ad vigesimum primum referatur. Fuit tamen magis consentaneum, criticum appellare diem à quo incipit, quàm quo finitur crisis.

*Indices, qui contemplabiles & internuntii nominantur, sunt qui crism septenario futurum indicant: suntque numero tres, quartus, undecimus, septimus.*

Contemplabiles appellantur, quòd ex eorum contemplatione crisis futura soleat prævideri: ideoque etiam internuntii nominantur, & frequentius indices, quòd indicent & prænuntient diem futuræ criseos: idque fit per concoctionis signa, quæ in urinis præcipuè apparent. Unde Hippoc. in *prognosticis & aphorismis*: Urina, quæ quarto die hypostasim habet albam, lævem & æqualem, solutionem morbi septimo fieri ostendit. Ex principibus autem diebus unusquisque suum habet indicem: quartus nimirum est index septimi, undecimus decimi quarti, & decimus septimus vigesimi. Ipsi verò dies inter criticos etiam recensentur, quòd non simpliciter indices sunt, sed quòd in iis etiam non rarò crises soleant contingere, quanquam minùs perfectæ.

Horum igitur primus est dies quartus, qui primò & per se, & ex sui natura index est septimi, ut diligenter annotavit Gal. *cap. 11. lib. 2. de diebus decretoriis*, ubi docet, crism quarto indicatam per signa concoctionis die septimo contingere, si nihil impediat. Multa etenim possunt naturæ motum inhibere, non solùm in septimo, sed etiam in omni die critico, ex parte scilicet vel ægri ipsius, vel Medici; vel astantium, à quibus multi errores committi possunt. Ut si Medicus die septimo catharticum exhibeat, si æger aut astantes Medico non obsequantur, & legitimum tum remediorum, tum rerum non naturalium usum pervertant. Est autem quartus dies inter decretorios collocandus, indicat enim morbos extremè peracutos, ut testatur Hippocrates in *prognosticis*. *Mitissima*, inquit, *febres & signis firmata securissimis, quarto die aut citius desinunt; malignissima verò, & horrendis comitata symptomatis, quarto die, aut citius interimunt.* Sic in *Epidemiis*, Pericles quarto die prorupto universali sudore, acutissima febre defunctus est. Calvo Larissæo femur dextrum doluit, quarto die circa meridiem mortuus est celerrimè & acutissimè. Attamen rarissimæ sunt illæ crises, quæ in quartum diem incidunt: frequentius enim tertio aut quinto die contingunt, quia acutorum morborum exacerbationes diebus fiunt imparibus. At iisdem diebus indicantur morbi; quibus exacerbantur, ut docuit Hippoc. in *Epid.* ac proinde

testatur Galenus, se semel tantum, Archigenem verò bis crism die quarto observasse.

Secundus ex Indicibus est undecimus qui tamen non tam perfectè decimumquartum indicat, ut quartus septimum. Quemadmodum enim dierum perfectè judicantium vis sensim minuitur: ita & indicantia, quandoquidem quo citius crises perficiuntur, eo majorem ostendunt naturæ potentiam supra causam morbificam: & quo magis protrahuntur, eo majorem ostendunt imbecillitatem, aut saltem materiæ contumaciam, ut ideo non tam firmiter & ordinatè judicia obeantur. Non solùm autem indicat dies undecimus, sed etiam judicat; At non tam perfectè & frequenter, quemadmodum verè critici: plurima tamen exempla apud Hippocratem referuntur in *Epidemiis*, eorum, qui undecimo die judicati sunt. Et Gal. *Cap. 7. lib. 1. de diebus decretoriis*, se uno, autumno omnes dies undecimo observasse scribit.

Tertius ex indicibus est decimus septimus, qui non tam firmiter indicat quemadmodum quartus & undecimus, sed potentiùs multò decernit, & inter criticos validiores à Galeno, aliisque authoribus numeratur. Attamen Archigenes, & alii, qui integros dies numerant, atque adeo, vigesimum primum, non vigesimum, verè criticum statuunt, decimumoctavum proinde admittunt, non decimum septimum, quos Gal. prolixè impugnat *2. de diebus decretoriis, cap. 4.*

*Intercidentes, qui & intercalares seu irrepentes, vel provocatorii nominantur, sunt qui inter principes & indices intercidunt, crisesque imperfectas moliantur, suntque tertius, quintus, nonus, decimus tertius, & decimus nonus.*

*Provocatorii* dicuntur, quòd naturam interdum provocent ad excretionem, unde crisis in illis aliquando contingit sed imperfecta, quia fit naturâ irritata ante tempus sibi ordinarium & maximè consentaneum. Unaquæque septimana habet dies suos intercidentes. Prima enim habet duos, tertium & quintum: Secunda habet itidem duos nonum, & decimum tertium. Tertia verò septimana unicum tantum habet, nimirum decimumnonum. Sunt autem illi dies quodammodo critici; quia impares. At morbi acuti diebus imparibus exacerbantur, & in illis exacerbationibus solent contingere crises, quia tunc temporibus natura irritatur ad excretionem. Attamen illæ crises, quæ fiunt ab irritatione, imperfectæ sunt, ut antea dictum est.

*Reliqui verò dies, qui neque principes sunt neque indices, neque intercidentes, vacui & medicinales nominantur. Suntque sextus, octavus, decimus, duodecimus, decimus sextus & decimus octavus.*

*Vacui* dicuntur; quia nec decernunt, nec indicant, nec provocant, neque modo ullo critici sunt: & si quando crisis in illis contingat, mala est. *Medicinales* verò appellantur, quia in illis omnia medicamentorum genera, atque adeò purgantia tutò exhiberi possunt, quod ducit Hipp. *quarto de morbis*, insigni contextu; *Quicumque*, inquit, *febre continua correpti, cathartico diebus paribus usi sunt, hi nimium purgati sunt nunquam: At qui diebus imparibus cathartico sunt usi, nimium sunt purgati, & multi perierunt.* Decretorii etiam quodammodo dici possunt, non simpliciter, sed cum adjectione ut scilicet mali sint decretorii, nunquam enim salutariter indicant, sed pessimè, infidè, & periculosè: quoniam quæ in illis diebus contingunt crises, à morbi malignitate simpliciter fiunt, non à natura aut vincente aut saltem irritatâ, quemadmodum in provocatoriis contingit. Horum pessimus est sextus, qui tyrannus à Galeno nuncupatur, septimo purè contrarius, qui Rex ab eodem vocatur. Ideò quæcunque crises in sextum diem incidunt pessimæ censendæ sunt. *Sudores sexto die manantes, pessimi*, inquit Hipp. in *Coac. & in Aphorismis, icterus sexto die letalis est.* In *Epidemiis* verò quamplurimæ historiarum reperiuntur, ut Dromeadæ conjugis, Hermocratis, Philisci, & aliorum, quibus die sexto infelices crises contigerunt. Verùm *objici* potest ex *sect. 3. lib. 3. Epid.* Larissam virginem die sexto salutariter fuisse judicatam. Respondemus cum Galeno rarissimum esse istum casum, & præter naturæ consuetudinem accidisse, neque enim die critico accidit hæc crisis, neque signis concoctionis fuerat præmonstrata, ut antea dictum est.

Sed



Sed causa salutaris criseos referenda est ad ratum & extraordinarium naturæ conatum, quæ triplicem in hac virgine evacuationem molita est, scilicet per menstruam purgationem, largam hæmorrhagiam, & copiosum sudorem. Idem ferè aliquorum dierum parium, qui, usque ad vigesimum inveniuntur, esto iudicium. Quanquam enim quidam Neoterici censuerint, morbos sanguineos diebus paribus judicari, quia paribus moventur; tamen rarissime illud fit, tum quia in febribus acutis, quæ ex sanguine fiunt, sanguis facillè in bilem degenerat, aut saltem ea illius portio, quæ putredinem contrahit: tum quia crises non simpliciter exacerbationes sequuntur, sed multò magis causam superiorem, quæ capite de causis fusiùs illustrabitur.

*Critici etiam dies nuncupantur à vigesimo ad quadragesimum per septenarios, vigesimus septimus, trigessimus quartus, & quadragesimus. A quadragesimo ad centesimum & vigesimum per vicenarios, sexagesimus, octuagesimus, centesimus & vigesimus; post hunc verò perit dierum criticorum vis, & crises mensibus annisque fieri dicuntur.*

Dies critici præcipui & magis ordinarii sunt illi, qui in morbis acutis solent contingere. Illi autem morbi acuti, si ab initio sumant vehementiam, decimoquarto die, aut citius judicantur. Si verò non incipiant moveri celeriter & vehementer, nisi in fine primæ septimanæ ad vigesimum extenduntur, quia ea ratione terminus est morborum acutorum. Morbi verò, qui ultra vigesimum extenduntur, acuti ex decidentia nominantur, & in illis crises solent contingere, sed minus frequenter, atque adeò non antea per quaternarios, sed tantum per septenarios numerantur usque ad quadragesimum, in quo perit eorum vis, & dies per vicenarios tantum numerantur usque ad centesimum & vigesimum, & in quo etiam crises tum salutares, tum lethales contigisse legimus apud Hipp. *Epid. sect. 3.* ubi Heropytus centesimo vigesimo perfectè & salutariter iudicatus est. Et Pacius in Thaso centesimo & vigesimo moritur. Ultra illud tempus vis dierum criticorum non extenditur, sed postea mensibus & annis crises, vel potius corporum mutationes contingunt, ut testatur Hipp. *aph. 28. sect. 3.* *Plurimi, inquit, morbi puerulis judicantur, nonnulli quidem in quadraginta diebus, nonnulli in septem mensibus, quidam verò jam ad pubem accedentibus.*

*Dierum Criticorum computatio debet fieri ab ea hora, in qua æger percipit manifestam actionum læsionem.*

Nulla potest fieri dierum criticorum computatio, quin certò statuatur totius morbi principium, & ipsa notetur hora, quâ patiens cœpit ægrotare. Ab illa enim horâ ad similem sequentis diei, primus dies computatur, & sic consequenter. Sed admodum difficile est, horam illam statuere, & in eo multi errores sæpe committi solent, quandoquidem vulgares Medici principium morbi computare solent ab hora decubitus, quod quidem potest locum habere in delicatulis & mollioribus hominibus, qui ex leviori affectu statim solent decumbere: at in robustioribus & laboribus assuetis fallacissimum esse consuevit, quandoquidem illi plerumque morbum adhuc incipientem, neque tantopere gravem, erecti etiam per plures dies aliquando ferre consueverunt; neque in lecto retinentur, donec à morbi vehementia ferè opprimantur. Vere igitur computatio debet institui ab ea hora, quâ in ægro primùm percepta est sensibilis actionum læsio, quâ videlicet vel non potuit prandere, vel cœnare, vel consueto modo ambulare, & soluta officia exercere: uno verbo ab eo tempore, quo febricitare cœpit, si febris sit primaria, & non symptomatice. Sed quia febris rarò ab ægro vel astantibus dignoscitur, ideo Medicus ex symptomatum relatione, primaque eorum invasione, facillè ipsam febrem ipsiusque principium conjicit. Unicum tamen indicium verum & facile febris incipientis sæpissimè occurrat, quodd videlicet morbi acuti frequenter cum rigore vel horrore incipiant. Si igitur æger Medico referat, se dum cœperit malè habere, frigus aut horrorem tali horâ percipisse, illa certè hora erit morbi principium, à quo dies critici debent computari.

*In puerpera muliere, fibre acuta laborante, si partus naturalis fuerit, computatio dierum Criticorum debet fieri à febre, & non à partu: si verò partus fuerit præternaturalis, computatio facienda est à partu, non autem à febre.*

Hoc Theorema difficillimam quæstionem continet admodum intricatam, utpote quæ ipsum Hippocratem habet sibi ipsi repugnantem, & rationum momenta utrinque gravissima patitur. Hippocrates 3. *progn. aph. 12. pari modo*, inquit, *in vulneribus judicationes fiunt à partu*. Et Gal. in *comment.* ejus loci, eandem sententiam confirmat, his verbis: *Principium enumerationis tibi fiat, non quo die cœperint febricitare, sed quo pepererint: in quibusdam igitur circa secundum aut tertium incipiunt diem à partu, ex quo multi numerant futuram judicationem; sed res non ita se habet, eam ex quo pepererint, numerationem oportet fieri dierum.* Quod quidem præceptum in praxim revocavit idem Hip. 3. *Epid. sect. 2. Ægr. 10. 11. & 12. & sect. 3. ejusdem libri. Ægr. 14.* In quibus locis proponit historias diversarum mulierum enixarum, acuto morbo laborantium, in quibus dies computantur ab ipso partus die. Id ipsum confirmari potest ratione validissima. Ab eo enim die numerandum videtur morbi principium, quo incipit moveri humor: At in die partus humor moveri incipit: sit enim maxima naturæ contentio, & humorum agitatio, ergo ab illa humorum exagitatione debet fieri computatio. Contra verò idem Hipp. 1. *Epid. Ægr. 4.* in uxore Philini, quæ die à partu decimoquarto febre correpta est, dies computat à die febris, non à die partus. Item *Ægr. 5. sequenti*, in Epicratis uxore, quæ secundo à partu die febricitare cœpit, computationem instituit à febre, non à partu. Tum etiam *Ægr. 11. ejusdem libri*, in Dromeadæ conjuge, quæ secundo à partu die rigore & febre acuta correpta est, eandem computationem facit à die febris, non à die partus. Ratio etiam pro hac sententia efficaciter militat. Si enim aliqua ratione computatio deberet fieri à die partus; esset maximè propter motionem materiæ, quæ in partu fit; sed hæc motio non est causa sufficiens, quantumcumque enim materia ante febrem ex occasione aliqua moveatur, computatio nihilominus incipit ab ipsa febre non à commotione: Sic in vehementissima corporis exercitatione, ex qua febris oritur, non fit commotio; sed febre tantum, quæ postea subsequuta est. Hæc controversia proposito Theoremate resolvitur. Partus enim vel naturalis est vel præternaturalis. Differunt inter se symptomatum gravitate, & levitate, ac præcipuè expurgatione quæ in naturali ritè procedit, in præternaturali verò supprimitur. Si igitur naturalis fuerit partus, non potest scœmina intra terminum expurgationis, nisi fortè ex aliqua procatactica causa, febre corripì, ut quæ ab omnibus excrementis ritè expurgatur. Si verò partus præternaturalis sit, constat ipsum morbi naturam induere, cum satis multas operationes lædat; atque ita febris, quæ huic morbofo partui succedit, ex ipso partu censenda est pendere, atque ita rationem habet febris symptomaticæ, & computatio dierum cum debeat fieri à principio morbi, facienda erit à partu, qui morbosus est. Hoc observavit Hippocrates in ægrotis suprâ propositis. Mulieres quarum fit mentio *hystor. 10. 11. & 12. sect. 2. lib. 3. Epid.* partum habuere præternaturalem: duæ enim priores abortum passæ sunt. Tertia verò laboriosè peperit, tum illa, quæ habetur *hyst. 14. sect. 3.* cum difficultate peperit, & non valde purgata est. Ideo in illis quatuor Hippocrates computationem instituit à die partus, in aliis verò quæ continentur *hyst. 4. 5. & 11. lib. 1.* partus fuit naturalis. Uxor enim Philini femellam pepererat, secundum naturam facta purgatione, & alioqui leviter degebat: Uxor Epicratis pepererat filiam, & alia omnia secundum rationem prodibant. Et Dromeadæ conjux filiam etiam pepererat, alioqui omnia secundum rationem fiebant. Ideo Hippocrates in illis computationem instituit à die febris, non à die partus. Unde liquidò constat, computationem in partu naturali debere fieri à die febris, & in partu præternaturali ab ipso partus die. Verum adversus hanc decisionem insurgit Amatus Lusitanus, author alioqui gravissimus, in *scholio obser.*



obser. 34. centur. 1. Reverà, inquit, hoc responsum ad Hippocratis mentem ficulneum est, & nullius valoris: idque ostendere nititur ex hist. 2. sect. 3. lib. 3. Epid. quæ est de muliere, quæ cum filiam peperisset, & purgata non esset, eam febris acuta horrida tertiâ die corripuit. In ea autem existimat Amatus, computationem fieri à die febris; cum tamen constet, partum fuisse præternaturalem, quandoquidem purgata non fuerat. Hanc autem computationem à die febris colligit ex sequentibus Hippocratis verbis, quæ in historia continentur. Postquam autem riguisset, febres continuæ, &c. Ut ex iis, inquit, Lector intelligat, à tertiâ die post partum connumerationes fecisse. Sed bonus ille vir male interpretatur verba Hippocratis, ex quibus nihil aliud colligi potest, nisi quod febris continua à tertiâ die partus consequuta est, & symptomata illam comitantia. Imò verò ex toto historiæ discursu satis liquet, computationem fieri à die partus, non à die febris: quemadmodum Valesius & Mercurialis, gravissimi librorum Epidemicon Interpretes, id ipsum apertè asserunt. Et ita proposita distinctio, quæstionis decisionem continens, Hippocratis doctrinæ erit consentanea. Sed unus adhuc remanet scrupulus, ubi scilicet absolutè Hipp. 3. progn. velut regulam generalem proponens, præcipit simpliciter à die partus esse computandum. Respondendum est, Hippocratem in lib. Epid. varia annotasse experimenta, & multos casus observasse, prout eveniebant, ex quibus deinde regulas & canones concinnavit, qui in libris Prognosticon, & Aphorismorum continentur, ut docet Gal. lib. 1. de diebus decretoriis, c. 3. Canones autem illi ex iis deprompti sunt, quæ ut plurimum eveniunt, fit autem ut plurimum, ut febris, quæ partum proximè sequitur, ab ipso partus vitio dependeat; ideo etiam ut plurimum à partu computatio instituenda est. Rarò autem fit, ut partu naturali existente, febris exoriatur, quæ tunc temporis non potest aliunde, quàm à causa procatartica & externa provenire.

In vulneribus capitis & aliis quibuscunque, computatio dierum criticorum debet institui à die vulneris, non à die febris. Eadem est ratio vulneris, quæ partus præternaturalis: febris enim quæ ei supervenit, symptomata est; vulnus verò est morbus primarius, à quo dierum criticorum numerus eliciendus est.

In morborum recidivis debet fieri computatio dierum criticorum ab initio ipsius morbi, non à recidiva.

Recidiva fit ex reliquiis prioris morbi, quæ non fuerunt integrè vacuata, atque ita idem morbus censendus est, cum sit eadem materia, in quo contingit quidem remissio febris inter radicem & recidivam, sed non vera intermissio, ut ostendunt symptomata ab Hippocrate annotata, dum inquit, si quid ejus quod effunditur, intus relinquitur, sitis intus relicta, oris exsiccatio, & insuavitas, eadem ratione, quæ omnia morbi non integrè soluti sunt indicia. Quia igitur is, cui supervenit recidiva, nondum erat planè liberatus ab illis accidentibus computatio debet esse unica, ex eo, quod prior affectus non erat verè solutus, sed tantum ex aliqua sui parte. Sic Hipp. in Epid. perpetuo dies numerat à priori morbo, nunquam autem à recidiva, ut videre est in historiis Hermocratis, Anaxionis, Herophontis, Cleanactidis, uxoris Epicratis & aliorum.

## CAPUT VI.

### De Causis Crisium, & Dierum Criticorum.

Crisis quoddam quasi compositum est, conturbationem, evacuationem, & subitam mutationem ad salutem continens. Conturbatio est congeries criticorum symptomatum, quæ ex agitatione materiæ morbificæ oriuntur. Illa autem agitatio fit vel à causa externa, qualis cæli astrorum motus & influxus: vel interna, scilicet natura ipsa.

Quomodo influxus syderum motiones criticas efficiant inferius explicabitur. Jam verò natura in conturbatione critica humores morbificos exagitat: quia dum illi secreti sunt à laudabili & benigniori materiâ, magis naturam irritant: ideoque illa ad expulsionem accingitur. Licet enim humores illi concocti sint, tamen acrimoniâ

& maligna quadam qualitate naturam molestant, eamque ad excretionem impellunt.

Evacuationis causa est facultas expultrix, quæ vel copia, vel qualitate materiæ irritata, id quod molestum est, criticè expellit.

Facultas expultrix una est ex iis, quæ naturales subservientes nominantur, suumque opus exercet beneficio caloris nativi & spirituum, tum per fibras singulis partibus ingentis.

Cur verò crisis, seu critica evacuatio, in septenariis potius & quaternariis diebus contingat, quàm aliis temporibus, id quidem à motu Lunæ tanquam causa principali dependet.

Causa criseos, & causa dierum criticorum omnino distinguendæ sunt, cum sint res toto genere diversæ. Nam causa criseos est facultas expultrix, quæ quod molestum est expellit. At causas dierum criticorum investigare, non est quærere quid humores vitiosos è corpore expellat, sed cur facultas expultrix non in omnibus, sed certis quibusdam diebus, quæ sibi molesta sunt, frequentius & facilius soleat expellere: id autem à motu Lunæ pendet, quæ variis suis aspectibus has motiones efficere solet.

Luna maximum habet dominium in hæc inferiora, præsertim in corpora humida, in iisque insignes efficit mutationes, præcipue in conjunctionibus, oppositionibus, & quadraturis, in quibus etiam crises solent contingere.

Quas Luna variis suis aspectibus in hoc inferiori mundo mutationes efficiat, & quomodo hinc venti & tempestates mutantur, fata felicius vel infelicius crescant, cancri & conchyliæ nunc plena sint, nunc vacua, satis compertum est nautis, agricolis, & ipsis mulierculis. Præcipuum autem hinc plaueta dominium in corpora humida obtinet, unde non mirum est, si eam in humores nostri corporis potestatem habeat, ut eos certis diebus commovere, & inde crisin excitare valeat. Id autem maximè præstare solet in suis aspectibus, ad quorum rationem dies critici numerantur. Primus enim Lunæ aspectus à conjunctione est sextilis, seu hexagonus sinister, qui quarto die contingit. Secundus, quadratus, seu tetragonus sinister, die septimo. Tertius, trigonus sinister appellatus, die undecimo. Quartus, qui oppositus, seu diameter dicitur, die decimo quarto. Quintus trigonus dexter, die decimo septimo. Sextus tetragonus seu quadratus dexter, die vigesimo. Septimus, sextilis seu hexagonus dexter, die vigesimoquarto. Octavus, in conjunctione, die vigesimo-septimo. Isti autem dies aliquam habent latitudinem, ut infra docebitur: sufficit nunc annotare, aspectuum Lunæ computationem eandem esse cum dierum criticorum computatione, quæ cap. superiori fuit proposita.

Motus dierum criticorum non pendent ab aspectibus, quos habet Luna cum Sole; sed ab aspectibus quos habet cum signo Zodiaci & loco cæli, in quo erat in principio morbi.

Si crises moverentur à phasibus Lunæ cum Sole, nulla esset dierum criticorum ratio, quia omnes ægroti, quocunque die ægrotare cæperint, uno eodemque crisin paterentur. Verbi gratia, in principio plenilunii, ubi fit oppositio Lunæ cum Sole; vel in novilunio, ubi fit conjunctio, vel in quaternariis. Ideo existimandum est, crises ab hujusmodi aspectibus non dependere; sed potius ab aspectibus Lunæ ad illud signum, & ad eum locum Zodiaci, in quo erat in principio morbi, & sic septimo die morbi luna est in quadrato aspectu ad eum locum, & decimoquarto est in opposito, atque ita de cæteris.

Computatio dierum criticorum non est instituenda juxta mensem synodicum, qui & conjunctionis appellatur, neque juxta mensem apparitionis, seu illuminationis; nec juxta mensem medicinale: sed juxta mensem periodicum, seu peragrationsis.

Mensis Synodicus est illud tempus, quod inter unam atque alteram Solis & Lunæ conjunctionem intercedit, estque dierum 29. hor. 13. atque ita tres septimanæ non viginti, sed viginti duos dies, & horas tres constituunt, ideoque juxta illum mensem non potest fieri computatio dierum criticorum. Mensis illuminationis, seu apparitionis, est intervallum à primo Lunæ novæ conspectu ad diem usque evanescentis, estque dierum 26. hor. 12. neque juxta illum mensem potest fieri computatio, quia tres septimanæ sunt



sunt tantum dierum 19. hor. 12. Mensis *periodicus* seu *peragrations* est illud tempus, quo Luna totum zodiacum peragrat, & ab uno puncto profecta ad idem redire solet, estque dierum 27 & hor. 8. Atque ita tres septimanæ dies viginti, & horas duodecim efficiunt. Hunc etiam noluit Galenus, ordinem dierum criticorum posse constituere, ideo novum mensem commentus est, quem *medicinalem* appellavit, ex mense periodico, & illuminationis compositum, qui duo si jungatur, faciunt dies 53. & horas 20. cujus summæ dimidium facit dies 26. horas 22. & illud dimidium constituit mensem medicinale Galeni, cujus tres septimanæ faciunt dies viginti, & 4. horas. Sed hunc Galeni mensem omnes, tum Medici, tum Astrologi, tanquam commentitium, portentosum, & ab omni veritate alienum rejiciunt ac contemnunt. Quorum rationes brevitate causâ omitimus, quia notissimæ sunt. Sufficiat monuisse, dies decretorios à vero Lunæ motu desumendos esse, qui mensem *peragrations* constituit, & à quo prædicti aspectus constituuntur. Ille autem mensis *peragrations*, ut antea dictum est, constat diebus 27 & hor. 8 ac si in quatuor septimanas dividatur, prima finietur diebus 6. hor. 20. Secunda, diebus tredecim, horis sexdecim Tertia, diebus 20. hor. 12. Neque mensis iste periodicus negligendus est eâ ratione, quæ Gal. impulit ad mensem medicinale comminiscendum, quin potius eo magis retinendus est, quod ex eo ratio reddi potest, cur vigesimus & vigesimus primus inter criticos numerentur. Licet enim vigesimus frequentius decernat, tamen vigesimus primus plane rejiciendus non est. Atque ea de causa Archigenes & Diocles, qui ipsius Galeni testimonio, lib. 1. de diebus decretoriis, cap. 2. in operibus artis erant versatissimi, vigesimum primum inter criticos retulerunt. Causa autem, ut uterque dies sit criticus, hæc est, quod ambo dies ad absolvendam tertiam septimanam concurrunt, cujus ultimus dies duodecim horas mutuatur à vigesimo, & totidem à vigesimo primo. In vigesimo tamen frequentiores crises accidunt, quia Natura, transacto acuti morbi termino, oneris diuturnioris quasi pertæsa, in ipso diei critici principio certamen cum morbo aggreditur, crisinque molitur. Illud autem diei critici principium est in medio diei vigesimi, quemadmodum finis ejusdem incidit in medium seu horam duodecimam vigesimiprimi. Annotandum etiam est, Lunæ motum nunc tardiores, nunc velociorem existere, & prout velocior est, crisin citius contingere, prout verò tardior, tardius crisin apparere, atque adeò non potest assignari certus horarum numerus, in quo crisis contingat, sed latâ determinatione dies septimus, decimus quartus, & vigesimus annotandi sunt. Quemadmodum innuere voluit Hipp. in 6. Epid. ubi dierum numero propositionem circa addidit, scilicet circa vigesimum, circa quadragesimum, & ita de aliis. Deinde, non semper crisis uno eodemque die incipit ac desinit, interdum enim ad plures dies extenditur, & perturbatio vigesimo incipit, crisis verò vigesimoprimum desinit: At tota duratio perturbationis, pugnæ & excretionis, tempus crisis solet appellari.

Præter causam principalem, quæ est motus Lunæ, duæ aliæ dierum Criticorum causæ minus principales agnoscendæ sunt, nimirum motus & dispositio humorum; tum etiam ipsius ægrotantis natura.

Quamvis Lunæ in diebus criticis constituendis vis maxima sit, sola tamen non sufficit, alioquin in omnibus ægrotantibus eadem crises eodem dierum numero contingerent: Secus tamen accidit, cum alii die septimo, alii decimoquarto, alii aliis diebus crisin peti soleant, & quidem aliis bona, aliis mala crisis contingat. Itaque aliæ causæ adjunctæ sunt, diversitatem illam efficientes. Primum enim motus & dispositio humorum in causa est, ut crisis nunc citius, nunc tardius, aliquando etiam intercalariis diebus, aut indicibus accidat. Si enim humorum concoctio celerius vel tardius absolvatur, humoresque benignam vel malignam qualitatem acquisierint, naturam celerius vel tardius irritare potuerunt. Tum etiam, si hoc vel illo die moveantur, unde febrium exacerbationes oriuntur, in quibus plerumque crisis solet contingere

re quæma motum Hipp. Epid. Morbi acuti, inquit, eadem diebus judicantur, quibus exacerbantur. Postremò natura corporis ægrotantis, quæ ut antea dictum est, causa principalis est ipsius crisis, seu criticæ excretionis, est etiam causa dierum criticorum minus principalis, prout enim robusta est, vel debilis citius, vel tardius materiam morbificam concoquit, & ex celeri tardaue coctione crisis tarditas vel celeritas dependet. Sic quando materia morbifica non est concocta die septimo, crisis differtur ad decimumquartum, vel vigesimum Movet enim Luna humores singulis diebus crisis. & naturam ad excretionem excitat: sed illa frustra commovetur, neque excretionem molitur, si non inveniat materiam præparatam, & evacuationi dispositam nisi id aliquando ex maxima irritatione contingat ob materiæ malignitatem, quam natura totis viribus etiam adhuc crudam, interdum expellere nititur. Sed infelix est illa crisis, quia ordinarias naturæ leges prætergreditur. Atque hæc de crisin & dierum criticorum causis dicta sufficiant. (conf. Melle. II. 143. &c.)

## PATHOLOGICÆ SECTIO III.

### De Morborum Causis.

#### CAPUT I.

##### De Causæ Morbificæ Natura.

Causa morbi est, quæ quocumque modo aliquid morbi confert.

Generalissima est hæc causæ morbificæ definitio, vel potius explicatio, quæ alia esse non potuit, ut omnes causas amplecteretur, quæ in Medicina considerantur: eo enim causarum nomine donantur ea omnia, quæ aliquid ad morbi generationem conferunt, quomodocumque sit, sive per se, sive per accidens, mediata, vel immediata; tum quæ morbum conservando, augendo, aut alio quovis modo aliquid præstant, ut differentis apparebit.

Omnes morborum causæ ad efficientem referuntur.

Omnes rerum causæ sub quaternario numero à Philosopho comprehenduntur, sub formali nimirum, materiali, efficiente, & finali: ad quarum seriem causæ omnes morbificæ sunt referendæ. Non tamen quatuor illa causarum genera possumus hic investigare: propterea quod primò causa formalis nihil aliud est, quam propria cujusque rei essentia: at morborum naturam & essentiam satis abundè superius exposuimus. Deinde causa materialis in morbis non datur: cum enim morbus sit accidens, non habet materia ex qua fiat, sed tantum in qua existat, quæ nihil aliud est, quam illius subjectum, seu corporis nostri partes: Quod ad causam finalem attinet, quamvis actionis læsio talis quodammodo dici possit, id tamen fit per accidens; quatenus illa morbi generationem sequitur, sed nullam habens morbi causam finalem propriè, & per se; sicut nec ea omnia, quæ in imperfectiione quadam sunt constituta. Superest igitur sola efficiens causa hîc à nobis consideranda, quæ non tantum hîc sumitur, ut à Philosopho, pro eo, à quo primò producitur effectus, sed latiori significato, ut ex nostra descriptione patet, pro eo omni, quod quocumque modo ad morbi generationem confert.

#### CAPUT II.

##### De Causarum Differentiis.

Causa morbi alia est per se, alia per accidens.

Causa per se est, cum propria & insitâ vi, nullius alterius interveni, id præstat.

Causa verò per accidens est, quando aliquid aliud excitatur cujus interveni dispositio morbosa producit.

Sic aqua frigida, corpori nostro affusa, per se & ex natura sua refrigerat; per accidens verò, densatâ cute, & coercitis intus vaporibus, calefacit. Sic scammonium, medicamen-



medicamentum calidissimum, viscera impense calefacit per se; sed quia a bilem calidosque humores potenter expurgat, ex accidente refrigerat, & febrem tollit.

*Est & causa morbi alia principalis, alia adjuvans, alia sine qua non.*

*Causa principalis est, quæ vel dedit primum affectui motum, vel solo illum excitare valet.*

*Causa adjuvans est, quæ sola affectum non producit, sed principali auxiliatur.*

*Causa sine qua non ea est, quæ affectionem ipsam non præstat, nec quicquam efficit, sed sine qua actio fieri non potest.*

Harum trium causarum exemplum dari potest in arthritide. Frigida enim aëris constitutio & humorum excrementiorum copia est causa principalis fluxionis in articulos; causa adjuvans est humorum tenuitas, causa verò sine qua non, est articularum imbecillitas & meatuum laxitas.

*Est & causa morbi alia remota, alia proxima.*

*Remota, est inter quam & morbum alia intercedunt.*

*Proxima verò est, quæ immediate morbum parit.*

Propositæ causarum differentię in arte Medica sunt valde frequentes & usitatę: frequentes tamen usitatissimę, & majoris momenti in omnium morborum explicatione, ideo iis paulò attentius immorabimur.

*Causę morborum alię sunt externę, alię internę.*

*Causę externę sunt, quę vel exterius posite, vel à rebus corpus nostrum constituentibus diversę morbos solent efficere.*

Causę externę nomen non videtur omnino appositum, quia somnus, vigilia, & animi pathemata sub illis comprehenduntur, quę tamen inter res internas videntur contineri: tamen quia receptissimum est apud Medicos, ideo nos etiam illud admittimus, dicentes causas illas externas dici, quòd plurimę earum sint exterius posite, ut aër, cibus, potus, &c. reliquę verò, ut somnus, vigilia & animi pathemata ita sint manifesta, ut quasi exterius posite sine ulla ratiocinatione percipiantur. Ideò Celsus evidentes illas appellavit nomine valde appposito. Alii procatasticas, prægressas, & primitivas, quòd ab illis prima morborum origo soleat emanare. Vide Bartholin. quęst.

*Earum autem alię sunt necessarię, alię non necessarię.*

*Necessarię sunt, quę necessariò nos afficiunt, & quas evitare non possumus.*

Licet necessariò nos afficiant, non tamen necessariò morbos inferunt, sed indifferentes sunt ad sanitatem, vel ad morbum: nam legitimo earum usu sanitas conservatur, abusu verò & immoderato earum regimine destruitur.

*Illę autem sunt sex. 1. aër. 2. cibus & potus. 3. motus & quies. 4. excreta & retenta. 5. somnus & vigilia. 6. animi pathemata.*

Vulgò sex res non naturales appellantur, quia per se nec secundum, nec præter naturam humani corporis sunt; sed naturę utiles aut noxię efficiuntur, pro bene vel malè utentium ratione. Earum peculiaris tractatio habetur in ea Medicinę parte, quę diætam instituit, eamque ideo hinc omittimus. Vid. Bacmeisterum.

*Non necessarię sunt, quę fortuitò contingunt, & ad ordinarium vitę usum non concurrunt.*

Sub his continentur res omnes fortuitę, ut gladiatorum vel lapidis ictus, ferarum morsus, &c.

*Causę internę sunt, quę intra corpus latent, & non sensibus, sed artificiosâ conjecturâ cognoscuntur.*

Sic humores, spiritus, excrementa, flatus, vapores, ipsarum partium particulę, & quidquid in illis continetur aut adnascitur, causę internę morbificę naturam subire possunt.

*Illę autem vel sunt antecedentes, vel conjunctę.*

*Causa antecedens est, quę conjuncta prior est, eamque movet, ac mediata per eam morbum efficit.*

Sic in continuis febribus causa antecedens dicitur materia, quę apta est ad concipiendam putredinem, conjuncta, quę actualiter putrescit. Sic in tumoribus, qui ab humore fiunt; humor fluens, causę antecedentis: fluxus conjunctę rationem habet.

*Causa conjuncta est, quę immediate & per se morbum producit.*

Illius exempla proximè sunt proposita in antecedentis causę explicatione.

Notandum tamen, causas etiam externas aliquando esse conjunctas, ut gladius, qui immediatè vulnus efficit, & ideo non rarò causę omnes dividuntur in procatasticas, antecedentes, & conjunctas, omissa internarum & externarum consideratione.

*Causa conjuncta rursus vel est conjuncta simpliciter, vel continens.*

*Conjuncta simpliciter est, quę posita ponitur morbus, sed ea sublata morbus non aufertur.*

Sic posito actu vulnerante, ponitur vulnus: sed eo sublato, non tollitur.

*Continens causa est, quę posita ponitur morbus, & sublata tollitur.*

Sic, posito calculo, aut aliâ materiâ obstructionem pariente, ponitur obstructio; & sublatis iis, illa etiam aufertur. Sic etiam, sublato sexto digito numerum excedentem efficiente, vitium quod ex illo pendebat, protinus aufertur.

Ex his patet, non omnes morbos habere causam continentem, sed nonnullos tantum; reliquos verò omnes conjunctam necessariò habere (conf. Melet. II. 84. ad 94.)

### CAPUT III.

#### De Causis Morborum Similarium.

*Hætenus de morborum causis in genere, jam de iis in specie est agendum.*

*Calidę intemperaturę causę quinque statuuntur. 1. Motus. 2. Putredo. 3. rei calidę vicinia. 4. Constipatio. 5. Cibus potusque calidior. Galenus cap. 2. lib. 2. de causis morborum. Primò, motus, humores & spiritus attenuando & violenter commovendo, corpus calefacit.*

**M**otus non solum animata, sed etiam inanimata calefacit, ex Aristotele 2. Meteor. cap. 3. Inanimata quidem per rarefactionem, quia illa prævia est ad calorem dispositio, quę scilicet materiam ultimo disponit, ut ex illius potentia calor educatur. Animata verò facilius motu incalescunt, non solum propter illam attenuationem, sed etiam quia spiritus & calor qui illis actu inest, per totum corpus expanditur, & ad illius superficiem fertur. Unde si motus immoderatus sit, calidam producit intemperiem. Ad motum etiam referuntur ira, vigilię, & alia omnia, quę humores & spiritus possunt commovere.

*Secundo, putredo corpus calefacit, propter calorem externum, qui sub ea semper introducitur.*

Putredo ab Aristotele definitur, corruptio caloris nativi in unoquoque humido à calore extraneo. Necessè est calorem illum extraneum esse valde vehementem in corporibus nostris, ut calidam producat intemperiem.

*Tertio, vicinia rerum calidarum corpus calefacit per contactum physicum & mathematicum.*

Sic ab igne vel Sole æstivo corpus calefit per contactum physicum: è rebus calidis admotis, emplastris, balneis, &c. per contactum mathematicum.

*Quarto, constipatio calidam intemperiem inducit per accidens, propter scilicet impeditam transpirationem.*

Eam potissimum creant natatio in aqua aluminosa, emplastica medicamenta & obturantia admota: & reliqua, quę per antiperistasin calorem augent, dum illius impediunt dissipationem.

*Quinto, alimenta calida, humores calidos in corpore producendo, illud calefaciunt.*

Ut ceparum, alliorum, aromatum, & cæterorum usus.

*Frigidę temperaturę causę sex statuuntur. 1. Vicinia corporum frigidorum. 2. Assumptorum qualitas & quantitas. 3. Constipatio. 4. Raritas. 5. Oium immodicum. 6. Motus immoderatus. Gal. cap. 3. de morb. causis.*

*Primò, à frigido externo corpus refrigeratur, si patientis dispositio, &c. concurrant.*

Sic in hyeme ob nimiam frigiditatem sæpe corpus congelatur: sic balneum aquę frigidę totum corpus refrigerat.

*Secundò*



# Cap. III. De Causis Morborum Similiarium. 41

*Secundò, alimentorum excessus, defectus, & aliena qualitas, frigidam intemperiem inferre possunt.*

Excessus alimentorum calorem nativum suffocat, unde frigida intemperies excitatur: sic à crapula frequenti excitatur epilepsia, vel apoplexia.

Defectus alimentorum efficit, ut caliditas partium dissipetur, quòd non habent sufficiens pabulum ad eam conservandam.

Quæcumque naturâ frigidiora assumuntur, ut lactuca, papaver, mandragora, & reliqua, per se corpus maximè refrigerant.

*Tertiò constipatio maxima calorem nativum suffocat, unde frigida intemperies.*

Constipatio levis calidam intemperiem efficit, impediendo caloris dissipationem; maxima verò & immodica contrariam affectionem inducit, calorem suffocando.

*Quartò, raritas calorem dissipat & resolvit, unde per accidens frigiditatem inducit.*

Quintò, otium corpus refrigerat, ex eo quòd languescit calor nativus defectu exercitationis.

Sextò, à motu immoderato calor nativus dissipatur, unde per accidens refrigerat.

*Siccæ intemperaturæ duæ sunt causæ: 1. Alteratio. 2. Retentio.*

Primò, alteratione exsiccant, quæcumque exsiccandi vi præstant.

Sic alimenta & medicamenta exsiccantia, sicca aëris constitutio, corpus exsiccare solent.

*Secundò, resolutione corpus exsiccant, quæcumque efficiunt, ut corporis nostri humidum plus dissipetur, quam restauretur.*

Sic exercitatio violenta, æstus nimius aëris ambientis vigilæ immoderate, humiditatem corporis resolvunt. Sic humiditas dissipatur, cum debita reparatio illius impeditur, quod fit à curis & sollicitudinibus, inedia, usu alimentorum parum nutrientium, qualia sunt valde excrementosa, & adstringentia, quia impediunt humoris alibilis per membra distributionem.

*Humidæ intemperaturæ duæ sunt causæ: 1. Alteratio. 2. Retentio humorum.*

Primò, alterationi humidam intemperiem inducunt, quæcumque plurimum corpus humectare valent.

Sic ciborum humidorum usus immodicus, largus aquæ potus, aëris consuetudo humida, balneum aquæ tepidæ, & reliqua, quæ humidam intemperiem inferre solent.

*Secundò, retentione humorum intemperies humida dicitur introduci, cum vacuatio aliqua confecta supprimitur.*

Inter vacationes consuetas recensemus non solum eas, quæ sensibilibus fiunt, sed etiam, quæ insensibilibus scilicet per insensibilem transpirationem.

*Et hæc sunt causæ simplicium intemperierum.*

Compositarum verò intemperierum causæ faciliè colligi possunt ex superioribus, corrigendo scilicet causas omnes, quæ duas qualitates peccantes producere possunt.

Causæ tamen immediatæ compositarum intemperierum sunt ut plurimum humores peccantes, & illæ intemperaturæ humori peccanti similes fiunt. Nam calida & sicca à bile inducitur, frigida & humida à pituita, & ita de cæteris,

*Humores autem illi in partibus duobus modis cumulantur. 1. per fluxionem. 2. per congestionem.*

Fluxio duobus modis fit, vel dum humores à partibus mittentibus expelluntur, vel à recipientibus attrahuntur.

Influxione quæ fit per expulsionem, duæ requiruntur conditiones, scilicet partis mittentis robur, & recipientis imbecillitas.

Sic hepar humores præternaturales robore suo ad inguina vel cutem (partes naturaliter debiles) expellit, in iisque tumores scabiem, aliosque affectus producit.

*In fluxione, quæ fit per attractionem, duæ potissimum concurrunt conditiones, partis scilicet attrahentis calor, vel dolor.*

Calidi proprium est attrahere, ideò partes calidæ potenter attrahunt, dolore verò afflictæ suppetias quærunt, ideò humores & spiritus attrahunt ad sui tutelam, quos postmodum, quantitate nimia laborantes, commodè regere nequeunt, unde varii affectus oriuntur.

*Secundò, per congestionem humores in partibus cumulantur ex vitio nutritionis earundem.*

Laz. Riverii Opera.

Sic dum in aliqua parte non bene fit alimenti assimilatio, vel expulsio excrementorum, quæ in eam generantur, tunc in ea superfluitas per congestionem cumulantur.

## CAPUT IV.

### De Causis Morborum Organicorum.

*Naturalis partium figura pervertitur, aut in prima generatione, aut post ipsam.*

*In prima generatione, cum virtus formatrix singulas partes rectè nequit effingere, quod à tribus causis contingit.*

1. Propter virtutis formatricis imbecillitatem. 2. Propter materiæ vitium. 3. Propter dispositionem hereditariam.

Primò propter virtutis formatricis vitium partes male figurantur, cum quis à parentibus debili admodum natura præditus est oriundus.

*Secundò, propter materiæ vitium, cum scilicet peccat quantitate, vel qualitate.*

*Quantitate peccat, cum redundans est, vel deficiens.*

*Qualitate peccat, cum siccior est, vel humidior, &c.*

*Tertiò, propter dispositionem hereditariam, cum quis à parentibus male figuratus est oriundus.*

*Et ita in prima generatione fiunt morbi in figura.*

*Post primam generationem contingunt vel in partu, vel post partum.*

*In partu, dum præpostere sese commovet, vel non bene educitur.*

**V**erbi g. Dum infans ab utero exiens pedem unum vel brachium exerit, vel latera ostendit, dum ob sui crassitiem nimiam vel partium obscoenarum angustiam diutius in exitu laborat, vel ab imperita obstetrice imperitè tractatur.

*Post partum leditur partium figura à causis externis & internis quamplurimis.*

Causæ externæ figuram vitiant; cum molliores adhuc infantes congruè fasciis non excipiuntur, vel alio quovis modo temere coarctantur: cum si fracta vel luxata membra male à Chirurgo deligentur, vel reponantur, aut si ipsius ægri errore bene restituta distorqueantur; si denique casu, percussione, motu, & agitatione nimia invertantur.

Ab internis verò causis vitatur figura, dum humores copiosè in partibus colliguntur, ut in tumoribus præter naturam, elephantiacorum facie, hydropicorum ventre, & aliis huiusmodi est manifestum.

*Adstrictio, obstructio, & dilatio, ab infinitis penè causis producuntur, quæ meatus vel cavitates coarctandi, obstruendi, vel dilatandi vim habent, quas sigillatim enumerare est ferè impossibile.*

*Asperitas & lævitas à quamplurimis causis internis vel externis producitur.*

V. g. ossa vulnerata, fracta, vel erosa naturalem lævitatem amittunt, asperæ arteriæ pars interna inæqualis redditur, vocemque raucam & clangosam efficit, imbuta humore nimio, exsiccata, deterisa, vel ulcerata, quod de aliis etiam eadem ratione dici potest. Partibus verò natura asperis aut rugosis lævitatem inferunt humores viscosi & glutinosi, tunicis interioribus impacti, ut in lienteria; tum etiam vulnerantia & erodentia per accidens, dum ulcere curato inducitur cicatrix: quia interna illa superficies lævior redditur, & ad continendum minus apta.

*Magnitudo augetur in toto corpore propter nimiam sanguinis & adipis copiam.*

*In parte augetur magnitudo, vel affluxu sanguinis laudabilis, vel humore vitioso per fluxionem aut congestionem collecto.*

Sic in nonnullis mulieribus, omentum valde pinguescit à copioso sanguis affluxu, & in tantam molem accrescit, ut uteri os comprimendo, sterilitatem inducat. Sic ex vitiosis humoribus varia tumorum genera oriuntur.

*Magnitudo in toto corpore ob alimenti defectum diminuitur.*

*Ut in phthisi, marasmo, insigni macie.*

*In parte magnitudo imminuitur, cum alimentum conveniens non suscipit vel non conficit.*

*Numerus partium augetur in ortu, vel post ortum. In ortu, ex redundantiâ materiæ seminalis.*

F

Ut



Ut quando sex digiti, aut tres testes generantur.

*Post ortum, ex vitiosa materia.*

Ut apparet in verrucis, pterygio, &c.

*Numerus imminuitur in ortu, ex defectu materiae; post ortum, ab iis omnibus, quæ partem aliquam amputare, vel aliter perdere valent.*

*Situs partium immutatur vel vitio earumdem, vel partium continentium eas, vel ligamentorum connectionum.*

*Ipsarum partium vitio situs immutatur ob earum crassitatem, vel gravitatem nimiam.*

Sic omentum, vel intestina, crassiora vel pinguiora redita, suo pondere rumpunt aut dilatant peritonæum, & in scrotum devolvuntur.

*Parti in continentium vitio situs immutatur, cum illa ruptæ vel laxatæ debent continere nequeunt.*

Sic dum peritonæum ab aliqua causa rumpitur, vel laxatur, partes contentas nequit suo loco cohibere.

*Ligamentorum defectu situs immutatur, quoties laxiora vel infirmiora efficiuntur, ita ut connexas sibi partes in naturali statu nequeant cohibere.*

Sic uterus, rectum intestinum, aliæque partes procidere solent, præ extensione nimia, aut imbecillitate suorum vinculorum.

*Connexio partium pervertitur à multis causis internis & externis.*

*In articulationibus peculiariter connexis immutatur tribus de causis: 1. Defectu excipientis, scilicet acetabuli. 2. Defectu ossis, quod excipitur. 3. Vinculi, quod articulationem continet & firmat.*

*Primo, in excipiente vitium est, vel cum cavitas illa excipientis est nimis lata, vel superficiaria, vel cum supercilia auferuntur, aut margines labefactantur.*

*Secundo, in osse, quod excipitur, vitium est, quando majus vel minus est quam par sit, vel alio quocumque modo male figuratur.*

*Tertio, in ligamenti vitium est, cum illa sunt laxiora vel infirmiora.*

Ex his omnibus causis luxationes solent exoriri, quibus addantur motus violenti & inordinati.

#### CAPUT V.

##### De Causis Morborum Communium.

**C**ausæ morborum communium propositæ fuerunt in eorum differentiis recensendis, quia hæ ab illis desumebantur: idè ne hîc frustra repetantur, ex c. 5. primæ sectionis erunt desumendæ.

#### CAPUT VI.

##### De Causis Differentiarum Accidentalium Morborum.

**E**dem causæ, quæ morbos similes, organicos, & communes excitare solent, sunt etiam causæ differentiarum accidentalium, prout variis conditionibus sunt præditæ: si nimirum intensæ vel remissæ, leves vel contumaces, benignæ vel malignæ, aut alio quovis modo affectæ fuerint, morbos magnos vel parvos, acutos vel chronicos benignos vel malignos, & alios hujusmodi producent.

### PATHOLOGIÆ SECTIO IV.

#### De Symptomatum Natura, Differentiis & Causis.

#### CAPUT PRIMUM.

##### De Symptomatum Natura.

*Symptoma est affectus præter naturam, qui morbum, velut effectus suam causam sequitur, & sine eo subsistere nequit.*

**A**ffectus nomen hîc paulò largiore significatione sumitur, quam in definitione morbi, quandoquidem non omnia symptomata habent permanentiam, aut partium positionem in subiecto, sed maxima eorum pars essentiam habet positam in fieri: actiones enim sive inte-

græ, sive laxæ, in motu partium consistunt, & sientes perpetuò sunt. Excreta & retenta tamdiu sunt, quamdiu fiunt, si formalem eorum rationem spectes. Qualitates verò simplices, seu patibiles, fixæ aliquando sunt, & permanentes. Dicuntur etiam symptomata morborum sequi, quia ab eo (ut diximus) efficiuntur, effectus verò posterior est sua causa, unde etiam patet à causa differre, quia causa morbum præcedit, symptoma verò sequitur. Ad clariorem verò symptomatum naturæ intelligentiam sequentia theoremata proponantur.

*Omne symptoma à morbo dependet mediâtè vel immediâtè.*

Præcipuum symptoma est actio læsa, à morbo immediâtè dependens; quod quidem aliud excitare potest in excretis & retentis, & illa etiam qualitates mutatas inducere possunt; quæ tam à morbo dependent tanquam à vera causa, alia quidem mediâtè, alia immediâtè, ut dictum est.

*Symptomata causarum rationem habere possunt, nunquam morborum.*

Sic læsa nutritio est causa consumptionis partium marcoris: Sic retenta excrementa in corpore febres generant, obstructions, tumores, & alia hujusmodi, atque ita symptomata fiunt causæ morborum nunquam verò morbi naturam possunt assumere, quia actiones per se lædere non possunt. Licet enim quidam morbi symptomati appellantur, quod alios consequantur: ut febris, quæ pleuritidem sequitur, aut aliam quamvis inflammationem, quæ in se verè morbus est, ratione tamen morbi, à quo dependet, symptoma appellatur; attamen certum est, eos morbos improprie symptomata appellari, quia alios morbos quidem instar symptomatum consequuntur, non tamen immediâtè ab iis generantur, sed mediâtè per quædam vera symptomata, per humorem, v. g. aut vaporem, quæ posteriores morbi causæ fiunt.

#### CAPUT II.

##### De Symptomatum Differentiis.

*Tria symptomatum genera: actio læsa, excrementorum vitium, & qualitas mutata.*

**A**ctio læsa primum est & præcipuum symptoma, quod morbum sequitur immediâtè, & à quo reliqua dependent & generantur. Excretorum vitium sequitur læsionem actionum naturalium, quæ pravè conficiuntur alimenta, corrumpuntur, aut aliam pravam obtinent qualitatem, vel denique diversam quandam & corpori infestam obtinent naturam. Excrementorum autem nomine hîc intelligimus non solum vera excrementa, sed etiam ea omnia, quæ præter naturam è corpore educi solent, ut arenulæ, partium ipsarum excrementa, &c. Qualitas verò mutata prædicta sequitur symptomata, & sub illa continentur omnes qualitates patibiles, quæ à sensibus percipiuntur, & ipsi corpori, vel alicui parti inhaerent: ut colores, sapes, & aliæ, quæ omnia fusiùs suis locis exponentur.

#### CAPUT III.

##### De Actionis Læsæ Differentiis.

*Actionis læsæ differentiæ desumuntur vel à læsionum differentiis, vel ab ipsarum divisionibus.*

*A læsionum differentiis actio læsa triplex statuitur: 1. Abolita. 2. Imminuta. 3. Depravata.*

*1. Actio abolita dicitur, quæ nullo modo amplius fit, vel fieri potest.*

**U**t visio cæcitate, & auditus in surditate aboleri dicuntur, quia nullo modo possunt exerceri. Attamen dicitur etiam actio abolita, quantum sensus potest judicare ut motus & sensus in apoplexia, & uterina suffocatione.

*2. Imminuta actio dicitur, quæ debilis est, & vix fit, longiorque indiget tempore, ut perficiatur, aut nunquam debitam assequitur perfectionem.*

Sic



## Cap. IV. De Excrementorum Differentiis. 43

Sic debilis concoctio ventriculi, aut cujuscvis partis functio, quæ imperfectè exercetur, imminuta appellatur.

3. *Depravata actio dicitur, vel quoties corrupta est, vel quoties non exercetur, ut debet.*

Corrupta dicitur actio, quando objectum in alienam qualitatem transmutat, ut quando ventriculus alimenta convertit in nidorosos succos, aut bilem porraceam, aut omnino putridam materiam. Non exercetur, ut debet, in rigore, palpitatione, singultu, &c. quia in iis affectibus partes perperam agitantur, vel nimis violenter ab objecto præternaturali irritantur.

Ab actionum differentiis actio læsa triplex statuitur: 1. *Animalis*, 2. *Vitalis*, 3. *Naturalis*.

Illarum rursus tot differentie, quæ actionum animalium, vitalium, & naturalium differentie proponuntur in Physiologia.

Actiones animales in Physiologia dividuntur in sensitivas, motivas, & principes. Sensitivæ actiones sunt quinque, Visus, auditus, gustus, olfactus, & tactus. Hæ omnes, ut dictum est, abolentur, imminuuntur, & depravantur. Visus aboletur in cæcitate; imminuitur in visus obtusione & hebetudine, depravatur in hallucinatione ejusdem. Auditus aboletur in surditate; imminuitur in gravi auditu, depravatur in aurium tinnitu. Et ita de aliorum sensuum symptomatis facile est conjectari. Motus aboletur in paralyti; imminuitur in stupore; depravatur in convulsione, tremore, rigore, &c. Sic actiones principes, ratiocinatio, & memoria abolentur in caro & apoplexia; imminuuntur in stultitia & lethargo, depravantur in phrenitide & mania.

Vitales actiones impulsibus consistunt, qui etiam frequenter abolentur, imminuuntur, vel depravantur.

Actiones denique naturales, concoctio, retentio, attractio, & expulsio, tot symptomatis afficiuntur. Concoctio ventriculi aboletur in *ἀπεψία*, imminuitur in *βραδυπέψια*, & depravatur in *δυσπεψία*. Sic de aliis actionum differentiis est judicandum, quæ omnes tot læsionum differentias patiuntur, quarum multæ propria nomina nondum obtinuerunt.

### COROLLARIUM CIRCA actionis læsæ differentias.

Inter actiones læsas recensetur ea, quæ præter naturam aucta dicitur, qualis est canina appetentia, sitis maxima, &c. At dubium est, sub qua specie collocetur? Respondetur vulgò sub depravata contineri: quia perperam, & perversè exercetur, quæ est conditio actionis depravatæ. Sed objicitur, secundum hoc decretum actionem imminutam sub depravata debere etiam collocari, cum actio aucta & imminuta sint contrariæ, atque adeò sub eodem genere debeant collocari. Respondetur, in ratione morborum & symptomatum Medicos non considerare Logicas contrarietates, sed tantum diversitates, quibus corpora nostra præter naturam afficiuntur: atque ita, cum actio aucta diversissima sit ab imminuta, tum ratione modi operandi, cum, ut diximus, perperam & perversè exerceatur, jure sub depravata continetur, & distinguitur toto genere ab imminuto, Medicè eas considerando.

## CAPUT IV.

### De Excrementorum Differentiis.

*Excrementa quatuor modis peccare possunt: 1. In substantia. 2. In quantitate. 3. In qualitate. 4. In excernendi modo.*

*Primo, in substantia peccant excrementa, cum substantiam habent à vulgari excrementorum substantia omnino alienam.*

ET illa dicuntur esse totò genere præter naturam.

*Eaque sunt duplicia, vel scilicet omnino aliena, vel ex rebus naturalibus constantia.*

A natura omnino aliena sunt calculus, lumbricus, &c. Ex rebus naturalibus constant excrementa; cum sanguis, adeps, caruncula, aut quidvis simile excernitur, quod nullo modo debeat excerni.

*Secundo, in quantitate peccant excrementa, ratione excessus vel defectus.*

*Laz. Riverii Opera.*

Cum scilicet vel nimis copiosè effluunt, ut in diarrhœa, dysenteria, diabete, sudore copioso, & hæmorrhagia profusiori; vel parcius quàm par sit, aut nullo modo evacuatur, ut in constipatione alvi, urinæ suppressione, &c.

*Tertiò, in qualitate peccant excrementa, vel prima, vel secunda, vel tertia.*

*In prima, dum sunt calidiora, frigidiora, humidiora vel sicciora.*

*In secunda, dum sunt tenuia vel crassa, dura vel liquida, viscida vel spumosa.*

*In tertia, dum sunt alieno colore, odore, vel sapore prædita.*

*Quartò, in excernendi modo peccant excrementa, quando non excernuntur debito tempore, vel per partes consuetas, aut cum nimis subito, vel paulatim vacuantur.*

## CAPUT V.

### De Qualitatis Mutatæ Differentiis.

*Qualitates corporis mutatae vel sunt primæ, vel secundæ, vel tertiæ.*

ILLæ autem ut symptomata dicantur, ab aliquo modo debent dependere.

*Primæ qualitates sunt caliditas, frigiditas, humiditas, & siccitas.*

*Secundæ, durities, mollities, gravitas, levitas, raritas, densitas, laxitas, asperitas, & reliquæ.*

*Tertiæ sunt colores, odores, sapor, & soni.*

### COROLLARIUM CIRCA qualitates mutatas.

Inter qualitates mutatas collocamus caliditatem, frigiditatem, humiditatem, & siccitatem, quæ ad morbos similes fuerunt supra relatæ. Unde gravis oritur difficultas, quam nos ita diluimus, dicentes, leves intemperies, quæ sunt tantum in fieri, & nullam habent in parte permanentiam, inter morbos non posse censerì, sed potius symptomata appellari, & qualitates mutatas, quæ ab aliqua partium vicinarum, aut sympathiam habentium intemperie facta & morbosa generentur & foveantur.

Deinde, asperitas & laxitas inter qualitates mutatas recensentur, quæ ad morbos organicos fuerunt relatæ. Respondetur, asperitatem & laxitatem, si sint valdè insignes, ita ut partium, quas occupant, actiones lædant manifeste, esse veros morbos: si verò tam leves sint, ut nullo modo actionibus incommodent, à causa tamen præternaturali producantur, intemperie putà humida vel sicca, certissimum est, veri symptomatis rationem obtinere.

## CAPUT VI.

### De Symptomatum Causis in Genere.

*Omne symptoma ab aliquo morbo dependet, tanquam à propria.*

Hoc primò demonstratur in actione læsa, quæ est effectus morbi immediatus, ut ex ipsius definitione patet. Deinde, qualitates mutatas certum est à prioribus proficisci, quæ temperamentum constituunt, quod secundum naturam existens, non potest efficere qualitates secundum naturam mutatas, quas patet ab intemperie perpetuò proficisci. Denique, cum in excrementis vitium non contingat, nisi aut concoctrix, aut expultrix, aut retentrix fuerint vitiatæ, certissimum est, illa perpetuò ab aliquo morbo proficisci.

Causæ autem symptomatum in specie, & singulorum morborum historia in *Patbol. particular. cap. 7.* exactè proponuntur. Nos tantum hîc quædam exempla ad clariorem doctrinam proponemus.

## CAPUT VII.

### De Causis Actionum Læsarum.

*Actiones animales à variis intempericrum differentiis, morbis organicis, & continuis solutionibus lædi solent.*

Scilicet à frigida & humida cerebri intemperie excedenti actiones animales abolentur, ut patet in amentia & obli-



vione; & à remissiori imminuuntur, ut in satuitate, & stupiditate: tum à calida intemperie nonnumquam simplici, aliàs cum siccitate juncta, depravantur, ut in phrenitide & mania. Læduntur etiam actiones istæ ali quando à morbis organicis, ut obstructionibus, & tumoribus variis, & à continui solutionibus, ut ab insignibus capitis vulneribus.

*Actiones vitales, quæ in pulsibus consistunt, ab intemperie calida & frigida, potissimum obstructione & solutione continui abolentur, depravantur, vel imminuuntur, pro varia causarum intensione vel remissione.*

Sic in febribus pulsus depravatur, in syncope aboletur, & in lipothymia imminuitur.

*Actiones naturales privatæ à morbis similaribus tantum læduntur, officiales verò etiam ab organicis.*

Actiones naturales privatæ, quæ ad nutritionem spectant, nimirum attractrix, retentrix, & expultrix à sola temperie perficiuntur, ergo sola intemperies eas poterit lædere: officiales verò varia etiam indigent partium à quibus exercentur, conformatione, ideo à morbis organicis etiam læduntur. Sic ventriculi, hepatis, alteriusque instrumenti actio, ab erysipellate phlegmone, aliisque tumoribus præter naturam interdum pervertitur, hincque depravata, aut imminuta fit concoctio. Sic etiam attractio officialis læditur, dum à tuberculo carnosio, vel alio quovis tumore in gula suborto, cibus via præcluditur, vel saltem eorum difficillimè in ventriculum fit attractio. Retentio pariter ex causis similibus & flatuum copia impeditur: Ac denique expulsio ex viarum angustia & obstructione impeditur; vel etiam ex dilatatione, aut partis vellicatione nimium irritatur & acceleratur.

#### CAPUT VIII.

De Causis Symptomatum, quæ sunt in Excrementis.

*Excrementorum vitia perpetuò à morbis dependent, sed ut plurimum mediatè, per actionum lesiones: Eo modo, Nimia excrementi quantitas vel dependet à partis à qua fit excretio, retentrice imbecilli, vel expultrix, irritata à prava aliqua humoris qualitate, vel quantitate nimia.*

**S**ic ab acris & biliosis humoribus diarrhœæ contingunt, tum etiam à nimia cujusvis humoris copia naturam aggravante.

*Fit etiam nimia excrementorum vacuatio ob continens partis vitium, propter quod illa nequit continere.*

Hoc evenit quando vasa aperiuntur in suis orificiis, vel produntur à causâ interna vel externa, vel debilitantur tantum, ut patet in sanguinis excretionem, quæ fit per venarum *διαστομωσιν, διαρροωσιν, & σιχαμίδην*.

*Excrementorum quantitas minuitur, quoties illa parcius generantur, vel cum facultas retentrix robustior evasit, aut expultrix imbecillior, vel ob viarum angustiam & obstructionem.*

Parcius generantur excrementa, vel ob alimentorum paucitatem, crassitiem, siccitatem, vel ob evacuationes contrarias, quæ consuetas impedire solent, vel ob totius corporis nimiam resolutionem.

*Aliarum causarum ratio satis est manifesta.*

#### CAPUT IX.

De Causis Qualitatis Mutatæ.

*Symptomata, quæ in primis qualitatibus consistunt, sunt à partium vicinarum, vel sympathiam habentium intemperie, ut dictum est.*

*Quæ verò ad secundas qualitates spectant, à vario humorum vitio aut partium intemperie dependent.*

**S**ic durities à siccitate, tensione, congelatione oritur; molliæ ab humiditate, & ita de cæteris.

*Tertiarum denique qualitatum hæ sunt causæ.*

*Color in parte immutatur, vel ob intemperiem, vel propter humorem quendam ad ejus superficiem delatum.*

Sic ab intemperie calida partes rubescunt, à frigida livescunt: sic à bile in corpus effusa, color flavus ictericorum.

*Odores pravi ab humorum vel partium putredine oriuntur. Sapores alieni ab excrementis linguam imbuentibus. Soni praternaturales à flatu sunt; in aliqua parte incluso, pro varia illius agitatione, partium angustia, amplitudine, & caloris elevantis potentia, vel impotentia.*

Hi ad excrementorum qualitates videntur referendi, qui tamen ita distinguuntur, ut scilicet eæ qualitates, quæ ad hoc simplicis affectus genus referuntur, in ipsis partibus esse debeant, & ab iis dependere; quæ verò ad excretorum genus referuntur, in ipsis excrementis tanquam subiecto proprio esse debeant, & ab ipsis omnino dependere, ut qualitas, quantitas, & substantia eorum.

## INSTITUTIONUM MEDICARUM LIBER TERTIUS.

### SEMEIOTICEN CONTINENS.

#### P R Æ F A T I O.

**I**N legitima & rationali affectuum præter naturam curatione hac methodo semper procedere debet Medicus: Primò morbi propositi natura causæ, & situs seu pars affecta accuratè investiganda. Secundò, diligenter inquirendum, an illius morbi curationem sperare debeamus, an verò sit incurabilis, ut inde moneamur, vel debita remedia nobis esse usurpanda ad pollicitam salutem acquirendam, vel in desperata ab iis abstinendum; ne temerè infamentur ea, quæ multis fuere saluti quæ tamen cum falis grano accipienda.

Necessaria ergo est Signorum doctrina, quæ summum illud nobis confert beneficium, ut præsentis corporis dispositiones cognoscere, & futuros earum eventus prævidere valeamus. Semeiosin universam in tres sectiones dividemus, quarum prima de signis in genere: Secunda, de signis diagnosticis: Tertia verò, de signis prognosticis erit.

#### S E C T I O P R I M A.

De Signis in Genere.

#### CAPUT I.

De Signi Natura & Definitione.

*Signum apud Medicos definitur, quod sensibus obviatum aliquid aliud in corpore nostro latens significat.*

**U**bi notandum est, hîc signi nomen latius quàm apud Aristotelem usurpari. Ille enim ea tantum signa appellanda esse docet, quæ ab effectis desumuntur. Nos verò ea omnia, quæ aliquid ex iis, quæ in corpore nostro fiunt, indicare possunt, signi nomine donamus: quæ quidem ad certa quædam genera, seu fontes signorum generales sunt referenda, si prius communes quasdam eorum differentiationes paucis tradiderimus.

CAPUT



CAPUT II.

De Signorum Differentiis.

*Omnia Signa medica à Galeno dividuntur in Arte parva, in salubria, insalubria, & neutra.*

**D**E Signis salubribus paucissima sumus acturi, cum ex bona corporis temperie, recta partium conformatione, unione earundem, atque ex actionum omnium integritate, quæ ex illis resultat, salubris status facile innotescat; cum etiam ex insalubri, tanquam contrarii cognitione satis elucescat. Neutra verò dispositio, tanquam inter salubrem & insalubrem media, per cognitionem extremorum facile innotescet.

*In signis ergo insalubribus potissimum nobis est insistendum.*

*Illa autem dividuntur in παθγνωμονικά & συνδεδειγμένα.*

*Pathognomonica, seu passionem significantia ea sunt, quæ morbum perpetuò comitantur, & cum eodem incipiunt & desinunt: ac pro magnitudine morbi augentur & minuantur, propriamque morbi essentiam consequuntur.*

Sic in pleuritide dolor lateris pungitivus, difficultas spirandi, tussis, sputum cruentum, & febris assidua signa pathognomonica nominantur.

*Συνδεδειγμένα seu assidentia ea sunt, quæ necessariò morbis non coherent, nec eorum essentiam indicant, sed alia, quæ accidentariò iis eveniunt, ut magnitudinem, mortem, aut eventum morbi.*

*Et ea ratione illa triplicia statuuntur: Alia scilicet quæ coctionem & cruditatem indicant: Alia, quæ salutem & mortem: Alia denique, quæ crasin & solutionem morbi.*

*Illa autem signa plerumque non ab initio morbi prodeunt, sed paulò post incipiunt apparere. Et hac ratione ὡφθαλμικά, id est, post apparentia, nuncupantur, vel etiam ὡγενήματα, id est, post genita: licet hæc duo nomina apud autores non rarò distinguantur.*

*Rursus ex his omnibus signis, alia præsentem corporis statum indicant, & diagnostica, seu demonstrativa appellantur; alia futura prænuntiant; & prognostica dicuntur; alia denique præterita commemorant, & ἀναμνηστικά, seu commemorativa nuncupantur.*

Quia verò præterita ideò in memoriam revocantur, ut vel præsentis dispositiones melius innotescant, vel futuri earum eventus prævideantur: commodè idcirco signa commemorativa sub diagnosticis & prognosticis comprehenduntur. (*conf. Melet. III. 22. 23.*)

CAPUT III.

*De fontibus signorum generalibus, à quibus omnia signa desumuntur.*

**U**T methodo facillimà signa omnia medica elicere valeamus, stabiliendi primò sunt fontes quidam generales, ad quos omnia signa de qualibet re proposita poterunt revocari, & à quibus eadem artificiosè deducuntur.

Cum igitur essentia & natura uniuscujusque rei, quocunque modo fuerit perspecta, non solum quid re ipsa sit, sed & multa alia, quæ ad rem ipsam pertinent, nobis patefaciat, primum signorum genus à naturà rei, de qua agitur, erit desumendum. Deinde cum duobus modis ad rei cujuslibet cognitionem deveniamus, uno scilicet à priori, id est per causam, altero verò à posteriori, scilicet per effectum, duo alia signorum genera proponere necesse est, unum à causis, alterum ab effectibus.

*Tres igitur in universum debent constitui signorum fontes: Essentia scilicet, causæ, & effectus.*

Essentiam hic Medicè ac latè accipimus, & illius nomine non solum rei ipsius formam, sed etiam genera, differentias, partes, & proprietates usurpamus, sive essentielles illæ sint, sive accidentales.

Causarum verò nomine omnia causarum genera, quæ in Medicina considerantur.

Effectus verò varii sunt pro varietate causarum.

Qui omnes signorum fontes minutim excutientur in particulari signorum inquisitione, prout eorum usus postulabit. (*conf. Melet. III. 7. &c.*)

Notandum autem hic est *Primò*, in singulis rebus dignoscendis ab omnibus fontibus signa capi non posse. Non rarò enim essentia rei est incognita: causæ verò aliquando non exquisitè indicant, aliàs effectus sunt confusi. Sed tamen ex propositis signorum capitibus semper invenies, quod rem quam investigamus, quantum Medicina præstare potest, certò demonstret, ita ut nunc ex solis effectibus signa necessaria desumamus, nunc à causis, nunc ab omnibus, quod ipsa exercitatio statim patefaciet.

*Nota secundo*, perpetuò ferè ab effectis multò plura & certiora signa desumi, quàm à reliquis duobus fontibus.

*Nota tertio*, ex signis, quæ proponuntur, alia magis, alia minùs efficaciter judicare, sed tamen ex omnium collectione rem, quam inquiremus, certò demonstrari.

*Nota quarto*, ut à propositis fontibus vera signa desumi possint, eorum omnium, quæ corpori nostro insunt, vel ei possunt contingere, naturam, causas, & effectus optimè debere innotescere. Atque adeo Physiologiæ & Pathologiæ præcepta ita ad manum haberi debere, ut illa hîc in usum facillè possimus revocare: Alioqui hæc Semeioticæ præcepta, licet prolixiùs multò fuerint pertractata, forent inutilia.



A. Tabula fontes omnes continens, à quibus signa humorum in corpore prædominantium desumuntur.





## SEMEIOTICÆ SECTIO II.

### DE SIGNIS DIAGNOSTICIS.

#### CAPUT PRIMUM.

*De Signis biliosi humoris in toto corpore prædominantis.*

**C**ognitio temperamenti & humoris in toto corpore prædominantis, necessaria est ad affectus speciem dignoscendam, & causam illum producentem. Ideò antequam de illis differamus, primò nobis proponenda sunt signa humoris in corpore prædominantis, à bile sumpto exordio.

Notandum tamen prius est, duos tantum esse fontes ex quibus humorum signa desumuntur, nempe causas & effectus; essentia enim hac in re nihil præstat.

Ut igitur duos hosce signorum fontes penitus exhaurire valeamus, illorum genera & species ordine sunt prosequendæ: omnes saltem illæ, quæ ad humorum notitiam aliquid præstare possunt, quæ ad faciliorem memoriam in præcedentem tabulam sunt relata.

Huc refer tabulam notatam littera A.

Hunc igitur ordinem observando, bilem in corpore dominantem indicabunt.

#### *Causæ materiales.*

**Alimentorum qualitas.** Usus ciborum calidiorum & siccorum, vini generosi aut meri potio, quæ facile convertentur in bilem.

**Quantitas.** Defectus alimentorum, ut inedia, victus valde tenuis & parvus.

**Odor.** Dulcia in fine mensæ assumpta, quia longiori coctione in bilem vertuntur; sicut experientia patet illa in diuturna coctione artificiali amarefcere.

**Medicamenta.** Usus medicamentorum calidiorum, & aromatum, &c. quæ in bilem degenerant.

**Retentia.** Bilis evacuatio consueta per alvum, urinas, vomitum, vel sudores, sponte, vel per medicamenta suppressa, vel intermissa.

#### *Causæ efficientes.*

**Partes.** Calida & sicca temperies ventriculi, hepatis & cordis. Quia hæ partes corpus universum afficere valent.

**Hereditas.** Parentes bilioso præditi temperamento.

**Ætas.** Ætas juvenilis, qualis potissimum ab anno decimo octavo ad trigésimum quintum

**Sexus.** Sexus virilis. Illi enim biliosi magis, sicut foeminae pituitosæ censentur.

**Regio.** Regio calida & sicca.

**Tempus.** Tempus æstivum.

**Alimentum.** Cibi & potus calefacientes & exsiccantes, ut allia, cepæ; salsa omnia & piperata, quæ hepar plus æquo calefaciendo faciunt, ut nimiam bilis copiam progeneret.

**Exercitatio.** Vita laboriosa, & multis exercitationibus dedita.

**Venus.** Nimius ad venerem impetus, quo totum corpus incandescit.

**Vigilia.** Vigiliæ nimia, quibus sanguis & spiritus inflammantur

**Animi pathemata.** Iræ, curæ, & omnes vehementes animi commotiones.

Juvantur à frigidis & humidis, læduntur à calidis, siccis, & jejuniis.

#### E F F E C T U S.

#### *Actiones animales.*

**Ingenium.** Ingenium acre, & solers, promptum & expeditum.

**Animi passiones.** Iracundia, furor, audacia, jactatio, appetitus vindictæ.

Somnus paucus admodum & levis, ac vigiliæ maximè.

Insomnia ignium, incendiorum, rixarum, & tumultus.

Sensus vegeti, acuti, veloces, expediti, audius potissimum, qui maximè juvatur à siccitate.

#### *Actiones vitales.*

Pulsus magnus, frequens, & durus.

#### *Actiones naturales.*

Inappetentia, & cibi fastidium, æstate potissimum.

Frigidorum appetitus.

Inediæ difficilis tollerantia.

Sitis magna, & potus frequens.

Accretio cita & prompta, ac matura senectus, quia humidum radicale promptè absumitur.

Ad venerem proclivitas maxima, propter seminis acrimoniam.

A venere cita exsolutio, quia biliosorum spiritus sunt valde dissipabiles propter tenuitatem.

#### *Passiones.*

Morbis biliosis proclivis dispositio, ut febribus ardentibus & tertianis, phrenitidi, pleuritidi, vomitui bilioso, diarrhæis, erysipelati, herpetibus, pustulis faciei, &c.

#### *Excrementa.*

Vomitum humoris tenuis, pallidi, vel flavi, & amari, aut sapor amarus in lingua.

Aurium excrementa copiosa & valde rufa.

Fæces maximè flavescences.

Urina tenuis & rufa, vel etiam rubra & flammea.

Purgamenta uteri subflava, aut citrina.

#### *Habitus corporis.*

Cutis ad tactum calida & sicca, & calor illius acris & mordax, in manibus potissimum.

Cutis dura & aspera.

Color cutis, faciei potissimum & oculorum, pallidus & subflavus.

Capillorum paucitas, à pororum raritate, quæ materiam pilorum effluere permittit.

Capilli flavi: bilis colorem referentes, aut subnigri, à majore exustione, & nonnunquam cripi, propter siccitatem, quæ pilos intorquet, ac calvi fiunt, propter cutis siccitatem, & materiæ pilorum consumptionem.

Pili citò oriuntur, & citò decidunt.

Latitudo vasorum. Calidi enim proprium est dilatare: & venæ in oculis conspicuæ.

Habitus corporis gracilis & macilentus.

#### CAPUT II.

*De signis humoris pituitosi in corpore prædominantis.*

**P**ituitam in corpore dominantem indicant.

#### *Causæ materiales.*

Usus consuetus alimentorum frigidorum & humidorum, ut fructuum, olerum, piscium, lactici niorum, aquæ potio, &c. Illa enim facile in pituitam abeunt.

Nimia alimentorum quantitas, quæ calorem nativum obruit & cruditates gignit.

Cibi assumpti statim à somno, vel ante somnum, aut antequam priores sint concocti.

Diuturnior usus medicamentorum frigidorum & humidorum, quæ ut alimenta in pituitam degenerant.

Omissa naturalis consuetudo pituitam evacuandi per vomitum vel secessum, vel artificialis per exercitationes, aut usum aquarum thermalium, laconicorum, vel medicamentorum purgantium, aut diureticorum ex quorum intermissione pituitæ copia cumulatur.

#### *Causæ*



# 48 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. II.

## Cause efficientes.

**Partes.** Frigida humidaque temperies ventriculi, hepatis, cordis, & cerebri.

**Hæreditas.** Ortus ex parentibus pituitoso temperamento prædiis.

**Ætas.** Ætas senilis, quæ propter caloris inopiam multam coacervat pituitam, tum etiam puerilis, propter ingluviem & incautam vivendi rationem.

**Sexus.** Sexus muliebris.

**Regio.** Regio frigida & humida, quales sunt quæ stagnis, paludibus, aut majoribus fluminibus sunt vicinæ, aut Boreæ, nivibus, imbribusque expositæ, & quæ sunt magis septentrionales, unde fit, ut Germani omnes ferè pituitosi sint.

**Tempus Cibi & potus.** Tempus hyemale.

Cibi & potus refrigerantes humectantes ut lactucæ, portulacæ, & fructuum horarum usus, & aquæ potio, quæ ventriculum & hepar refrigerando faciunt, ut multam pituitæ copiam producant.

**Quies.** Vita otiosa & sedentaria.

**Somnus.** Somni longi & profundi, præsertim à cibo.

**Pathemata.** Vita sine curis, studio, mœrore, aut cum his valde excedentibus, quia calorem nativum dissipando corpus refrigerant.

Ufu calidorum & siccorum juvantur, & frigidis & humidis læduntur.

## E F F E C T U S.

### Actiões animales.

**Imaginatio.** Imaginatio satis bona, ac facilior rerum perceptio, sed prompta oblivio, quia in rebus humidis facile fiunt impressiones, sed promptè delentur.

Mens torpida & hebes, ingenium tardum & obtusum.

**Somnus.** Ira remissa & facile placabilis.

**Insomnia.** Maxima ad somnum propensio.

Insomnia frigoris aquarum pluviarum, nivium, submersionis, fluminum, stagnorum, marium, & rerum albarum.

**Sensus.** Sensuum hebetudo.

**Motus.** Motus tarditas, sed in eo duratio, quia spiritus crassiores minùs dissolvuntur.

### Actiões vitales.

**Pulsus.** Pulsus parvus tardus & mollis.

**Fames.** Appetentia dejecta, unde apud Hipp. senes facile jejunium ferunt.

**Sitis.** Sitis nulla, aut saltem perexigua.

Tardè adolefcunt, quia nonnisi longo tempore calor debilis, multam humiditatem potest edomare.

**Accretio.** Ad venerem tardi.

**Venus.** Ex moderato illius usu juvantur, calore pituita concoquitur, & temperatius corpus evadit. At frequentiori illius usu corpus redditur frigidius.

### Passiones.

Cœlo sereno melius habent, frigido & pluvioso pejùs.

Morborum frigidorum frequens occurfus, ut catarrhi, hydropis, cachexiæ pituitosæ, lethargi, paralysis, & similia.

### Excrementa.

**Per os & nares.** Humor crassus, albicans, & insipidi excretio per os & nares.

**Alvum.** Fæces albicantes & mucosæ.

**Vesicam.** Urina alba, vel pallida, eaque tenuis, si adsint obstructions; alioqui turbida & crassa, cum copioso sedimento.

Alba uteri profluvia in mulieribus.

**Habitus corporis.** Cutis ad tactum frigida, pedes potissimum & manus frigidissimæ hyemis tempore.

**Cutis.** Cutis mollis & levis.

**Qualit.** Color ejusdem albus.

**Primæ.** Pili molles & leves, ac tenues ab initio.

**Secunda.** Ruffi capilli, quia pituita ulteriori coctione talem

colorem adipiscitur.

Capilli recti, quia cum in cute nulla sit siccitas, faciles in ea sunt meatus, quos excrementa liberè permeare possunt.

Pili tardè oriuntur & nunquam calvescunt.

Vasorum angustia, & nullæ venæ in oculis apparent.

Habitus corporis mollis & obesus, non tamen carnosus.

Qualit.  
Secunda  
Tertia.  
Figura.

Passio-  
nes.  
Vasa.

Fames.

## C A P U T III.

### De Signis Sanguinis in Corpore Prædominantis.

Sanguinem in corpore prædominantem indicant.

### Cause materiales.

Ufus ciborum euchymorum & eupeptorum, quales sunt panis recens albissimus & probè coctus, ovæ tremula, carnes juniorum animalium, & laudabilis alimenti, ut gallinarum, perdicum, phasianorum, vitulorum, hædorum, &c. Aqua purior fontana, vinum generosum salubriter dilutum.

Suppressiones evacuationum solitarum; ut hæmorrhagiæ in junioribus, hæmorrhoidum in ætate provectis, aut mulieribus.

### Cause efficientes.

Calida & humida hepatis & cordis temperies.

Ortus ex parentibus sanguineis.

Ætas à pueritia usque ab pubertatem.

Regio meridionalis, & austrinis ventis perflata.

Verna tempestas.

Otium vel levis exercitatio, quæ appetitum intendat, & corpus non resolvat.

Veneris usus rarus.

Somnus dulcis & moderatus.

Vita sine curis, gaudio & lætitia plena, ac deliciis affluens.

Juuantur ex larga sanguinis missione, vel spontanea ejusdem profusione, iisque omnibus, quæ sanguinis copiam minuere valent.

Partes.

Hæreditas.  
Ætas.  
Regio.

Tempus.  
Exercitatio.

Venus.  
Somnus.

Pathemata.  
Juvantes.

## E F F E C T U S.

### Actiões animales.

Felix imaginatio & rerum comprehensio, quia in humido promptæ fiunt impressiones.

Mentis hebetudo & stoliditas, ad risum profusio, impudentia, continentia in valde sanguineis.

In aliis jucunditas animi & hilaritas, cum discursu facili & libero: ac magna ad amorem propensio.

Memoria parum debilis.

Somnus profundus, minùs tamen quàm in pituitosis.

Imaginatio.  
Ratiocinatio.

Memo-  
ria.  
Insomnia.

Motus.

Insomnia rerum rubrarum & jucundarum, amœnitatum, nuptiarum, hortorum, musicorum concentuum, Regum, Principum & Magnatum.

Motus quidem moderati, sed graves & lassitudinibus pleni.

### Actiões vitales.

Pulsus magnus, tardus, plenus.

**Actiões naturales.** Appetitus mediocris, nisi adsit multitudo humoris, quæ satietatem pariat.

Sitis etiam mediocris.

Propensio ad Venerem, sed non tanta ut in biliosis.

Facilis Veneris tolerantia propter copiam feminilis materiæ.

Pulsus.

Fames.

Sitis.  
Venus.

### Passiones.

Facilis lapsus in febres synochas, phlegmonas, furunculos, &c.

### Excrementa.

Frequentes aut copiosæ sanguinis excretiones per nares, uterum, hæmorrhoides.

Pervarias partes.

Urinæ



# Cap. IV. De Signis Melancholiæ. 49

*Per ve-* Urinæ copioſæ, laudabili colore & conſiſtentia prædita, & contentorum multitudine aliquando refertæ.

*Album.* Fæces ſubruſæ, & conſiſtentia mediocres.

*Habitus corporis.*

*Quali-* Cutis ad tactum calida & mollis perſentitur.

*tates.* Color faciei floridus, & rubicundus.

*Secun-* Pilorum copia mediocris, color ſubſſavus, & prompta eorum generatio.

*da. Ter-* Vaſorum amplitudo mediocris.

*tia.* Habitus corporis carnoſus, & bene compactus.

*Pili.* COROLLARIUM.

*Vafa.* Vera plethora, & cacochymia expers, iisdem ferè ſignis indicatur, ſi vaſorum tensionem addas & laſſitudinem ſpontaneam.

Infomnia rerum nigrarum, horrendarum, cada-  
verum, ſepulchrorum, dæmonum, &c.

Senſuum hebetudo, aſpectus inconfans, triſtis  
& horridus.

Motus tardus, gravis, & compeſitus.

*Actiones vitales.*

Pulſus tardus & durus.

*Actiones naturales.*

Voracitas maxima propter aciditatem melan-  
choliæ, quæ excitat appetentiam; interdum deje-  
cta appetentia.

Sitis exigua propter ſeri & ſalivæ abundantiam, quæ in melancholicis redundat.

Ructus acidi, qui à cruditatibus excitantur, quibus melancholici abundant.

Tarda accretio, & cita ſeneſtus.

Tardè ad Venerem excitantur, & illius uſu plu-  
rimùm læduntur, ad eam tamen promptiores ſunt  
ii melancholici, qui plurimis flatibus abundant;  
neque his perinde inimica eſt Venus, cùm ſæpius  
ſemen emittant, utpote ex flatu ad coëundum  
excitati.

*Paſſiones.*

Frequens morborum melancholicorum incurſus,  
quales ſunt quartana, tumor lienis, & durities,  
lepra, ſœda ſcabies, varices, hæmorrhoides, &c.

*Excrementa.*

Humoris melancholici vomitio frequens.

Frequens ſputio, & copioſa ſalivæ ejeſtio, unde melancholici ſputatores dicuntur.

Alvus ut plurimùm ſicca, & conſtipata, deje-  
ctiones nigricantes.

Sanguinis atri excretio per hæmorrhoides.

Urina tenuis & alba, interdum craſſa & livida.

*Habitus corporis.*

Cutis ad tactum frigida, ſicca, dura & aſpera.

Calor faciei ſuſcus, plumbeus, aut nigricans.

Capilli multi duri & aſperi, craſſi, nigri, tardè  
oriundi, & citò caneſcentes.

Venæ anguſtæ.

Habitus gracilis & macilentus.

Atque hæc de ſignis humorum in toto corpore  
prædominantium.

COROLLARIUM.

Hac protinus methodo, & iisdem omnino ſig-  
nis, ſingularum partium temperiem inveniemus,  
ea ſcilicet eodem modo illis partibus applicando,  
earumque potiſſimùm actiones & excrementa con-  
templando.

## CAPUT V.

*De Signis Partis Affectæ.*

Naturali corporis diſpoſitione ritè perſpecta  
ad ea, quæ præter naturam corpori inſunt,  
eſt deveniendum. Primò igitur jam partis affectæ  
indicia inquiremus. Deinde ſpeciem affectus, qui  
illam partem occupat, ac tandem cauſas, à quibus  
affectus ille dependet. Partis affectæ ſigna à tribus  
fontibus deſumi poſſunt: eſſentiâ, cauſis, & effe-  
ctibus, quorum ſeries propoſita eſt in tabula no-  
tata litterâ B.

Ergo ſecundùm illam ſeriem partem affectam  
indicat.

## CAPUT IV.

*De Signis Melancholiæ in Corpore Prædominantis.*

Melancholicum humorem in corpore redun-  
dantem monſtrant.

*Cauſæ materiales.*

*Alimen-* Uſus alimentorum craſſiorum, duriorum & ter-  
*ta.* ream ſubſtantiam poſſidentium, qualia ſunt panis  
ater & ſurfuraceus, vinum nigrum & craſſum,  
aquæ turbidæ & limoſæ, legumina, caſeus anti-  
quus, carnes bubulæ, leporinæ, ſuillæ, avium pa-  
luſtrium; præcipuè ſalitæ, aut fumo induratae,  
piſces cetacei, duri, & falſi, braſſicæ, paſtinacæ,  
&c.

*Reten-* Retenta melancholicæ vacuatio conſueta, ſpon-  
*ta.* te, vel artefacta per hæmorrhoides, alvum, vari-  
ces, ſcabiem, &c.

*Cauſæ efficientes.*

*Partes.* Hepatis & cordis temperies frigida & ſicca cum  
lienis imbecillitate vel obſtructione, ob quam non  
potest humorem melancholicum attrahere, & con-  
venienter ſecernere.

*Hære-* Ortus ex parentibus melancholicis.

*ditas.* Ætas conſiſtens, à quadageſimo ad ſexageſi-  
*Ætas.* mum.

*Regio.* Regio, in qua inæquales ſiunt aëris conſtitu-  
tiones.

*Tempus.* Tempus autumnale.

*Vigilia.* Vigiliæ immenſæ, quia corpus exſiccant, & ca-  
lorem nativum diſſolvunt.

*Parhe-* Vita ſtudiis, curis, ſollicitudinibus, & mœrore  
*mata.* plena.

*Juvan-* Juvantur calidis & humidis, tum etiam tempe-  
*tes, &* ratis: læduntur frigidis & ſiccis, ut aceto.

*ludentes.* EFFECTUS.

*Actiones animales.*

*Imagi-* Timor & mœſtitia ſine cauſa manifeſta in valde  
*natio.* melancholicis. Ii verò, qui ex levi ſanguinis adu-  
ſſione ſiunt melancholici, ſunt aſtuti, cauti, pru-  
dentes, conſtantes, ingenioſi.

Atrabilarii verò, ubi melancholia eſt aduſta,  
oſores, proditores.

Melancholici difficulter ad iram excitantur, ſed  
poſtea difficulter placentur.

Rerum perceptio difficilis.

Memoria firma propter ſiccitatem.

*Memo-* Vigiliæ maximæ, & ſomni turbulenti inter-  
*ria.* rupti.

*Infom-*

*nia.*

*Senſum.*

*Motus.*

*Pulſus.*

*Fauces.*

*Sitis.*

*Expul-*

*ſio.*

*Accre-*

*tio.*

*Venus.*

*Per os.*

*Alvum.*

*Hæmor-*

*rhoides.*

*Vefcam.*

*Cutis.*

*Qualit.*

*Primæ.*

*Secundæ.*

*Pili.*

*Vafa.*

*Carnes.*



B. *Tabula Signorum Partis Affectæ.*





# Cap. VI. De Signis Partis laborantis. § I

## Essentia.

Qualitates.

Temperies partis ; si enim illam præter modum calidam , frigidam , humidam , aut siccam percipiamus , præter naturam affectam esse judicabimus.

Secunda.

Durities & mollities ; si enim in hypochondriis v. g. duritiem & renitentiam percipiamus , partes illis subiectas , hepar , aut lienem obstructum vel inflammatum esse judicabimus : Sic nimia alicujus partis mollities , eam œdematoso aliquo affectu laborare , est indicium.

Magnitudo æstus.

Tumor præter naturam , isque vel externus , qui visu percipitur , vel internus , qui tactu percipitur , quales sunt tumores ventriculi , hepatis lienis , vesicæ , &c.

Maxima partium consumptio & atrophia.

Imminuta Sitis.

Situs partis , qui maximi est hac in re momenti : si enim ex anatome nobis constet , quem unaquæque pars in corpore nostro sortiatur locum , facile ex humore , intemperie , aut quovis alio sensibili affectu illum locum occupante , eam partem laborare conjiçiemus.

Figura.

Figura partes in eodem loco sitas à se invicem discernit. Sic tumor in dextro hypochondrio lunarem obtinens figuram , gibbam hepatis partem affectam esse indicat ; si verò oblongam habeat figuram , & externus magis sit , musculos abdominis rectos affectos esse ostendit.

## Causæ internæ.

Externæ causæ aliquid indicare valent ; si quis enim v. g. cantharides assumpserit , vesicam laborare conjiçiemus , quòd illæ peculiarem habeant vim vesicam alterandi. Sic si quis ab insolatione laboraret , caput affectum indicatur , quòd eam partem præ cæteris sol afficere consuevit ; tum & si ab immodica venere prodit affectus , spirituosam substantiam nervosâque partes malè habere arbitrandum , quod illis partibus sit inimica venus.

## Causæ externæ.

Inter causas internas affectus ipsos possumus recensere : siquidem ubi tertiana infestat , hepar affectum indicat ; quotidiana ventriculum ; & quartana lienem ; quia earum causæ in his partibus cumulari solent.

Nota , in usu practico dum partem affectam inquirimus , ab essentia & causis non esse incipiendum , sed prius ab actionibus , excrementis , & qualitatibus mutatis signa esse desumenda , ac tandem ab essentia & causis.

## E F F E C T U S.

### Actiones.

Actionis læsio partem affectam indicat , à qua dependet , v. g.

Anima-les. Principes. Sensus privatus. Dolor punitivus , sensus , Gravativus.

Delirium & vigilia , sensus & motus abolitio , cerebrum affectum significant.

Sensus particularis læsio , ut visus , vel auditus , illius organum indicat.

Dolor punitivus indicat membranam affectam , potissimum à materia acri , & erodente. Tensivus autem fit aliquando in membranis à flatibus , & in venis à nimia repletione.

Dolor gravativus significat parenchyma alicujus visceris affici , omnia enim parenchymata obtusum habent sensum : Sic dum calculus renum substantiam comprimit , dolor fit gravativus ; dum verò in caput ureteris fertur , dolorem efficit punitivum. Sic etiam in pleuritide , materiâ membranâ succingentem occupante , fit dolor punctorius , dum verò fit metastasis in pulmonem , mutatur in gravativum.

Pulsatorius.

Dolor pulsatorius affectam arteriam indicat , aut partem ei vicinam ; idè in omnibus inflammationibus partium arterias possidentium fit dolor pulsatorius.

### Excrementa.

Illa verò , quæ per corporis partes excernuntur , partem affectam indicare solent hoc modo ,

Laz. Riverii Opera.

Substantia cartilaginosa per tussim excreta asperam arteriam affectam indicat , vel bronchia pulmonum ; carnis verò fungosæ frustulum excretum , pulmonem ipsum affectum indicat ; crassa verò ex crassis educitur.

De substantia partium.

Si cibus , aut urina , aut fæces per vulnus excernuntur , ventriculum , vesicam , aut intestina vulnerata pronuntiamus.

Naturaliter contenta.

Si lapilli , vel arenulæ per urinam excernuntur , renes vel vesica laborant.

Lumbrici per os aut anum excreti intestina affecta indicant.

Præter naturam contenta.

Aër calidior expiratione emissus , cor vel pulmonem indicat calidiorem , frigidior verò cor valde refrigeratum , & morti proximum.

Qualitates excrementorum.

Sanguis calidior , tenuior , flavior , ac cum quodam salu exsiliens ; arteriam indicat vulneratam.

Primæ secundæ , tertie.

Tenuis alvi dejectiones , rubentes , ac loturæ carniû similes , hepatis indicant imbecillitatem.

Tenuitas , & color , Spumosis & modus.

Spumosa sanguinis excretiones , ac tussiendo rejectæ , pulmonem affectum indicant.

Quibus in alvi profluviiis excrementa spumosa sunt , iis ex capite pituita defluit. Aph. 20. sect. 7. Pituita enim è cerebro defluens , & cum flatibus permixta in intestinis , spumosa efficitur.

Sapor.

Ructus acidus ostendit ventriculum cruditate laborare.

Si sanguis tussiendo expuatur magnâ quantitate , vasa pulmonis affecta esse oportet ; cum ea , quæ sunt in aspera arteria , angustiora existant , quam ut possint multum sanguinis effundere.

Sanguis meiendo excretus si paucus sit , ex vesica proficisci est conjiçendum , si multus , ex renibus aut superioribus partibus , ubi majori copia continetur.

Quantitas.

Excrementa spuendo rejecta , os affectum significant ; screando fauces ; tussiendo pulmones , vel asperam arteriam ; vomendo ventriculum.

Si pus mingitur ante urinam , in pene ipso ulcus est ; si post , in vesica aut renibus.

Modus.

In dysenteria , si pus aut sanguis affluat purus ante fæces , credibile est rectum intestinum esse potius ulceratum quàm reliqua : si verò post fæces , aut illis valde permixtus ; superiora , vel media intestina affecta esse indicat.

Ordo.

### Qualitates Mutatæ.

Qualitates mutatæ aliquando partem affectam indicant. V. g. quâ parte corporis calor aut frigus est , ibi morbus est. Aph. 39. sect. 4.

Plumbeus aut livescens totius corporis color , hepar indicat refrigeratum , citrinus cystidem felleam esse obstructam ; nigricans lienem obstructum.

Color.

Rubor pertinax & saturatus in genis , pulmonem indicat inflammatum.

Amarus sapor in lingua , bilem in ventriculo redundare significat.

Salsus verò , pituitam saltem à cerebro fluere. Tinnitus & Sibilus aurium eas affectas indicat.

Borborygmus in ventre significat flatus in intestinis. ( Melet. III. 14. &c. )

## C A P U T VI.

De Signis partis primariò , vel per consensum laborantis.

IN omni præternaturali dispositione perpetuo ferè solet evenire , ut plures partes afficiantur , quòd scilicet ea quæ primariò afficitur , alias omnes cum quibus aliquam habet communionem , trahat in consensum , ubi acri Medici solertiâ opus est , ut affectus sympathici ab idiopathicis distinguantur.

Ad hoc autem præstandum ex prædictis fontibus signa desumentur , ex quibus alia levem tantum conjecturam afferunt alia verò certior : omnium tamen collectio rem certissimè indicabit.


Horum ergo Signorum fontes ex sequenti tabulâ , notata littera C desumentur.

G 2

C. Tabu-



C. *Tabula Signorum partem primariò, vel per consensum affici indicantium.*





# Cap. VII. De Signis speciei Morbi. 53

*Causæ.*

Causæ omnes, quæ humores in corpore prædominantes significant, possunt etiam morbi speciem indicare, illæ enim quæ bilem generant, morbos etiam calidos & siccos solent producere, quæ pituitam, frigidos & humidos, & ita de cæteris; & hæ ratione morborum similiarum, à priori Tabula notata A, erunt desumendæ.

Quibus tamen humorum periodi erunt adjiciendæ, in hunc modum.

Humores qui tertio quoque die moventur, febrem tertianam indicant: qui singulis diebus,

quotidianam; qui quarto quoque die, quartanam.


Illæ verò causæ, quæ morbos organicos aut communes indicare valent, in hunc modum se habent.

Ufus alimentorum & medicamentorum astringentium internos meatus & cavitates solent astringere, & morbum in astrictione fuisse genitum suspicionem afferunt.

Alimenta vel medicamenta incrassantia multas obstructions solent generare.

Alimenta & medicamenta valde detergentia asperitates solent producere in lingua, œsophago, aspera arteria, ventriculo, & intestinis.

## D Tabula Signorum affectus speciem indicantium.





# 54 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. II.

Alimenta pingua si oleoginosa, lævitates intestinorum, & hienterias generant.

Medicamenta acra & erodentia assumpta, partes internas erodunt & exulcerant.

*Dispositio parvis.* Hepar & lien sapissime tentantur obstructionibus, idcirco si illæ partes afficiantur, de obstructionibus erit suspicio.

Trachea arteria à fluxionibus sapissime exasperatur, vel lævior efficitur; ideoque si in ea sit affectus, de asperitate, aut lævitate conjiciendum.

In intestinis lumbrici passim producuntur. Ergo intestinis affectis lumbricorum erit suspicio.

*Temperies parvium.* Qui frigidum habent ventriculum, & hepar calidum, obstructionibus sunt obnoxii; quia hepar cruda attrahit alimenta, ex quibus obstructiones generantur.

Qui ventriculum habent frigidum, & renes calidos, calculos in renibus generare solent, quia pituita in ventriculo frigido genita, à calore renum induratur, & in lapidem convertitur.

*Mare-ditas.* Nati à parentibus lienosis, nephriticis, podagricis, etiam talibus affectibus sunt obnoxii.

Exercitatio statim à pastu obstructiones generat, quia alimenta à ventriculo deturbat, antequam sint concocta.

*Venus.* Venus immodica calculosam efficit dispositionem, quia renes debilitat.

## EFFECTUS.

### Actiones animales.

*Principes.* Delirium cum furore calidam indicat cerebri intemperiem.

Delirium cum timore, aut tristitia, & fatuitas frigidam indicant cerebri intemperiem.

*Somnus.* Somni immodici frigidam & humidam cerebri intemperiem significant.

*Vigilia.* Vigiliæ immoderate calidam & siccam indicant intemperiem.

*Sensus & motus.* Omnimoda sensus motusque abolitio, qualis in apoplexia apparet, omnimodam indicat ventriculorum cerebri obstructionem, secundum veterum opinionem.

Motus omnium partium depravatus, qualis in epilepsia apparet, dimidiatam indicat ventriculorum cerebri obstructionem.

Motus privatio in aliqua parte, significat nervorum, qui ad illam partem feruntur, obstructionem, resolutionem, aut incisionem.

*Dolor.* Dolor pulsatorius inflammationem indicat in parte dolente.

Dolor stupidus frigidam indicat intemperiem.

Dolor acer & erodens exulcerationem indicat.

### Actiones vitales.

Pulsus magnus & frequens calidam indicat intemperiem; parvus & rarus frigidam.

### Actiones naturales.

*Attrahitio.* Dejecta appetentia, & sitis maxima, calidam indicant intemperiem.

*Expulsio.* Appetentia maxima, sitis exigua, frigidam arguit intemperiem.

Ructus nidorofus calidam intemperiem significat; acidus verò frigidam.

Vomitus frequens, & fæcum excretio impedi-

ta, obstructionem indicat in intestinis.

Deperdita coeundi libido frigidam intemperiem significat.

Ardens coeundi desiderium, cum erectione perpetua & dolorifica, affectum indicat inflammatorium.

### Excrementa.

Sanguis copiosus per os assatim tussiendo rejectus, vasis ruptionem indicat; paucus verò & cum pure permixtus, exulcerationem.

Ramenta per alvum ejecta, exulcerationem indicant in intestinis.

Urinæ rubram & arenosam hypostasim habentes, calculum indicant, aut saltem calidam renum intemperiem humores exurentem.

Sudatiunculæ, & rigoris crebra vicissitudo, empyema significant, 10. Coac. 1. Ex puris acrimonia partes internæ vellicantur, unde horror; sudatiunculæ verò ex facultate debili.

Alimenta eodem modo excreta, quo assumpta sunt, hienteriam significant. Potus, si per urinam emittatur non immutatus, diabetem significat.

Bilis flava in principio paroxysmi excreta, tertianam febrem significat.

Sanguis copiosè fluens è naribus in principio febris synochum indicat.

Sanguis ex quacunque parte confertim fluens, venarum ruptionem vel anastomosin significat, sensim verò resudans, diapedesin.

### Qualitas mutata.

Rubor intensus in aliqua parte phlegmonosam indicat inflammationem. Sic rubedo in genis peripneumoniam significat.

Flavescens color erysipelatosam indicat affectionem; sic in exquisita pleuritide oculi saepe croceo colore apparent infecti; sic febribus biliosis icterus non raro supervenit.

Color flavus totius corporis, sine febre, vesiculam felleam indicat obstructam.

Cutis totius corporis subnigro colore præter naturam infecta, lienem indicat obstructum.


## CAPUT VIII.

### De Signis Morbi Magni & Parvi.

**N**on sufficit Medico morborum curam aggredienti eorum differentias essentielles per propria signa cognovisse, nam differentia etiam accidentales sunt investigandæ ut certum de illis iudicium ferre queat. Nos ideo hîc præcipuarum signa proponemus, earum scilicet, quæ magis ad usum artis sunt accommodatæ, ratione quarum omnis morbus dicitur magnus vel parvus, benignus vel malignus, acutus vel tardus, & ita de cæteris.

Magnum morbum appellamus eum, qui intensus valde est, & magna vi corpus nostrum affligit. Illius signa à tribus prædictis fontibus desumuntur; siquidem morbum illum magnum judicamus, qui essentia magnus est, à causis magnis & intensis fuit productus; ac magna habet & vehementia symptomata, quæ omnia clarioris doctrinæ gratiâ ordine sunt persequenda, juxta sequentem tabulam literâ E notatam.

## E Tabula Signorum magnum vel parvum morbum indicantium.



Ut



# Cap. IX. De Signis Morbi Maligni, &c. 55

Ut igitur secundum tabulæ istius seriem signa morbi magni proponamus, sequentia instituentur theoremata.

## Essentia.

Magnæ intemperies, aut inflammationes, tumores magni, magnæ obstructions, magna vulnera aut ulcera in longum, latum, aut profundum protracta, magnos ostendunt morbos.

## Causæ.

**Externa.** Quæcunque causæ externæ maximam vim obtinent corpus nostrum afficiendi, magnos morbos solent producere, eosque indicare. Sic diuturna & violenta exercitatio, in aëre calidissimo habita, magnam febrem excitare solet.

**Interna.** Humores ii, qui in corpore nostro continentur, quique ordinariæ sunt omnium ferè morborum causæ, si quantitate, vel qualitate maximè peccent, morbos magnos efficiunt, eosque indicant. Sic sanguis, magnâ quantitate luxurians, aut fermentissimus, bilis utraque copiosa, acris, vel putrefacta, magnum morbum indicat.

Quibus morbis nulla, vel pauca profunt remedia, multa verò nocent, magnus judicetur.

**Juvenes, & lædentes.** Quicunque morbi partes principes, vel publicum munus obtinentes afficiunt, ratione illarum partium magni judicantur, si modò aliquod aliud signum magnitudinis habuerint conjunctum. Sic vulnus licet exiguum ex se, si cordi, hepati, pulmone, aliisque partibus fuerit inflictum, magnum censetur propter partem affectam, & quia etiam propter eandem partem affectam magna symptomata producit.

## E F F E C T U S.

### Actiones animales.

In quocunque morbo delirium, sopor ingens, vigiliæ maximæ, sensus aut motus privatio, vel



Hujus ergo tabulæ seriem sequentes, hæc proponimus theoremata.

## Essentia.

Quidam morbi sua naturâ perpetuò maligni sunt, ut cancer, elephantiasis, lues venerea, carbunculus, pestis; alii perpetuò benigni, nisi in pestilenti accendant constitutione, ut tertiana febris, ephamera, synochus simplex, & similes.

## Causæ materiales.

Ufus ciborum cacochymorum, aut corruptorum, potus aquarum palustrum, turbidarum, aut corruptarum, malignos morbos solent producere.

Medicamenta venenata, & deleteriâ qualitate prædita, assumpta malignos morbos generant.

dolor vehementissimus extiterit, magnum morbum judicato.

## Actiones vitales.

Quotiescunque in aliquo ægrotante respiratio, magna, frequens, vel difficilis, pulsus magnus frequens, vel admodum exiguus percipitur, hunc magno detineri morbo pronuntiato.

## Actiones naturales.

Anorexia, aut apoplexia, vel contrà fames canina, aut sitis inexhausta, apepsia, vel alvi fluxus diuturnus, & urinæ suppressio, aut diuturna & copiosa illius profusio, magnum morbum significant.

## Excrementa.

Excrementorum nimia quantitas, vel omnimoda suppressio, vel pravus color, aut odor foetidissimus, & substantia, à naturali valde remota, magnum indicant morbum.

## Qualitates mutatae.

Color in corpore valde ruber, flavus, vel lividus; aut sapor amarus in lingua, color illius niger, & siccitas maxima, magnum morbum declarant.

## COROLLARIUM.

Ex his, quæ jam allata fuerunt, satis apparet, quantam morbi parvi dici mereantur, ii scilicet omnes in quibus dicta signa non reperiuntur. (conf. Melet. A. 62. III. 50.)

## C A P U T IX.

### De signis Morbi maligni & benigni.

**M**alignos morbos appellamus eos, qui malignam quandam, & venenatam qualitatem adjunctam habent: atque eorum signa ex iisdem fontibus desumi possunt.

Quæ omnia in sequenti tabula notata F. ordine proponuntur.

In corporibus cacochymis & male affectis, maligni ut plurimum morbi generantur.

## Causæ efficientes.

Aër pestilens & corruptus malignos morbos solet efficere.

Venus cum impuro scorto inita, morbum inde ortum malignum attestatur.

Vulnera à gladiis intoxicatis inflicta, vel morsus venenatorum animalium, venenatos pariunt affectus, eosque indicant.

Sanguis & pituita benignos morbos generant: bilis verò atra, porracea, æruginosa, & interdum flava, malignos solet producere.

Quicunque ægrotantes à nullis causis salutaribus



## 56 Institutiones Medicæ, Lib.III. Sect.II.

ribus juvantur, five illæ à natura procedant, ut vacuationes spontaneæ; five ab arte, in recta remediorum administratione, & ab iis tantum, quæ alexipharmacâ vi præstant, sublevantur; à reliquis autem omnibus ferè læduntur, morbo maligno laborant.

### *Actiones Animales.*

Delirium, & maxima mentis perturbatio, vigiliæ, inquietudines, sine vehementi febre, morbum malignum indicant.

### *Actiones Vitales.*

Subita pulsuum & virium dejectio, animi deliquia & syncope, malignum morbum testantur.

### *Actiones Naturales.*

Sitis magna sine vehementi febre, vel abolita cibi potusque appetentia, malignum morbum significant.

### *Excrementa.*

Si per vomitum, alvum, aut urinas, livida, nigra, æruginosa, aut aliam qualitatem à naturali valde remotam possidentia excernantur, malignum morbum significant.

In febre fati insigni, & pravis comitata symptomatis, urina sanorum similes, morbi malignitatem indicant.

Ostendit enim talis urina morbum à vulgari putredine minimè generari, sed ab intensiori; profundiori, & occulta seu maligna qualitate, quæ in urinis non apparet.

Sudores pauci & frequentes, per frontem tantum, & cervicem emanantes, morbi malignitatem ostendunt.

G

Essentia, seu specie morbi.

Causis internis, seu humoribus morbum comitantibus.

Signa morbum acutum vel chronicum indicantia, desumuntur vel ab

Actiones, { Animales, Vitales, Naturales.

Effectibus, seu symptomatis quæ sunt vel

Excrementa quæ rejiciuntur per { Alvum, Vesicam.

Qualitates mutatae.

Hujus autem tabulæ seriem sequentia theorematum clarius patefacient.

### *Essentia.*

Omnes partium interiorum inflammationes, febres ardentes & continuæ, propriâ naturâ perpetuò acutæ esse solent. Sic ubi quempiam phrenitide, pleuritide, aut simili affectu laborare conspiciamus; acuto morbo affligi pronuntiamus.

### *Causa.*

Quicumque morbi à sanguine, bile flavâ, vel atrâ producantur, acuti esse consueverunt. Atque ita cognito humore morbum efficiente, facillè cognoscimus, an inter acutos sit numerandus.

### *EFFECTUS.*

#### *Actiones Animales.*

Delirium, sensus, motusque abolitio, vel dolor vehementissimus in aliqua parte, morbum acutum indicant.

### *Qualitates mutatae.*

Color lividus in facie, aut aliis partibus per febres, malignitatem earum significat.

Color niger in lingua, siti non infestante, malignum morbum indicat.

### *Accidentia propria.*

Quibus in febribus exanthemata, pustulae variae, carbunculi, bubones in alis & inguinibus, parotides, & similia superveniunt, maligna judicantur.

Ulcera circum glabra, maligna. *Aphor. 40. sect. 6.*

### COROLLARIUM.

In quibus morbis prædicta malignitatis signa non reperiuntur, benigni censentur. (*conf. Melet. II. 63. III. 50.*)

## CAPUT X.

### *De Signis Morbi Acuti, & Chronici.*

Quicumque morbi breves sunt, ac celeriter moventur, conjunctamque habent brevitati magnitudinem; acuti appellantur & vehementes: quibus apud Medicos chronici vulgò opponuntur licet iis non sint omnimodè contrarii. Chronici enim, seu longi morbi appellantur ex eo solum, quod diuturni sint, licet plerumque magni existant, quales sunt paralyfis, hydrops, & similes quibus verè & propriè opponuntur ii, qui breves simpliciter appellantur, ut febris ephemera.

Morborum ergo acutorum signa ex superioribus fontibus desumentur, secundum ordinem tabulæ sequentis notatae litera G.

### *Actiones Naturales.*

Sitis ingens, magnus alvi fluxus, aut omnimoda alvi vel urinae suppressio, morbum acutum significant.

### *Excrementa.*

Alvi excrementa flavissima, porracea, æruginosa, livida, aut nigra, morbum acutum significant.

Urinae rubrae, virides, aut æruginosae, morbum acutum indicant.

### *Qualitates Mutatae.*

Rubor in vultu ægrotantis æstus in toto corpore, nigredo & sapor amarus in lingua, morbum acutum significant.

### COROLLARIUM.

Signa differentiarum morborum acutorum summes ex *cap. 4. sect. 3.* quæ est de signis prognosticis. (*Melet. II. 64. 72. III. 50.*)

Morbi verò chronici facillè dignoscuntur prædictorum signorum absentia, & præsentia contrariorum, ut non sit opus illa hic recensere.

CAP.



# Cap. XI. De Signis Causarum Morbific. 57

## CAPUT XI.

De Signis Causarum Morbificarum.

### ACPRIMO

De Signis Bilis Præternaturalis.

**M**Orbi ferè omnes à variis humoribus, naturalem conditionem non servantibus, producuntur. Solent autem morbos efficere humores ii, qui in toto corpore, vel parte affecta prædominantur; atque ita, si probè noverimus humorem redundantem, causa etiam morbi simul innotescet. Repetenda ergo erunt huiusce sectionis capita priora quatuor. Et quoniam humores ibi consideramus in statu naturali constitutos, ideò quatuor tantum primas humorum differentias proposuimus: jam verò aliæ nonnullæ quæ præternaturales omninò sunt, breviter veniunt proponendæ, atque eadem operâ nonnullæ aliæ morborum causæ, ab humoribus oriundæ, erunt inquirendæ, ne quid tractatui huic nostro deesse videatur.

Ut igitur à Bile exordiamur, naturalem eam diximus, quæ flava, vel pallida appellatur, licet eadem non rarò præter naturam se habeat, & multorum morborum causa existat. Eadem tamen signa perpetuò illam indicare valent, si hoc unum tantum ei, quæ præter naturam se habet, & putredinem quandam adepta est, addiderimus, quòd nimirum illa tertio quoque die moveatur, ut in tertianæ febris paroxysmis luculenter apparet.

Aliæ autem sunt bilis species, quæ perpetuò præternaturales sunt, & quoties in corpore cumulantur, morbos solent producere. Illæ autem sunt vitellina, porracea, æruginosa, glastea, & atra.

Vitellina ex flava producit à calore præternaturali, qui partes tenuiores dissipando, crassiorem illam efficit, ut consistentia & colore vitellos ovorum repræsentet.

Ea non aliis signis indicatur, quàm flava: nisi quod excrementorum color vitellinum illum colorem referat, aut quòd materia illa vitellina per vomitum aut secessum in morbis excernatur.

Porracea, æruginosa, & glastea duobus modis generantur: uno quidem ex pravis alimentis, & vitioso succo prædiis, qualia sunt allia, cepæ, porrum, nasturtium, & similia: Altero, ex bile vitellina, calore vehementiori exusta, cujus vivarios acquirit colores, pro vario exustionis gradu. Porracea enim ex minori adustione fit, æruginosa majori, & glastea adhuc intensiori, prout enim color magis ad nigrum accedit, eò majorem arguit adustionem.

Illarum igitur bilis specierum signa erunt, omnia ea quæ bilem flavam indicant, & multò intensiora: ac præter illa, hæc duo potissimum, nimirum alimentorum pravorum supra enumeratorum usus diuturnus, & excretiones illis coloribus infectæ.

Bilis atra ex superioribus bilis speciebus majori

exustione producit. Cognoscitur ex causis prægressis, humores exurentibus & torrescentibus: tum etiam præcipuè ex effectis. Illa enim dum excernitur, atro calore & summâ acrimoniâ dignoscitur, partes quas attingit exulcerat, & in terram effusa, eam fermentat.

Accidentia denique nonnulla solet producere, ut cancrasos tumores, scabiem malignam, fœda ulcera & similia. Fit etiam nonnunquam atra bilis ex melancholia putrefacta, sed paulò mitior supra dicta & eadem parit, sed minùs vehementia symptomata.

### COROLLARIUM.

Sanguinis nullæ sunt species: sed dum à naturali conditione deficit, & à calore nimium alteratur, in bilis varias species commutatur. Sic etiam melancholia exusta, vel putrefacta, in atram bilem degenerat, atque adeò de illis non est ulterius inquirendum.

## CAPUT XII.

De Signis Pituitæ Præternaturalis.

**N**aturalis pituita dulcis, vel insipida solet appellari, ex qua tamen quantitate, motu, aut alio quovis modo naturæ limites excedente, multi affectus solent generari.

Aliæ verò illius sunt species quæ perpetuo præter naturam se habent: & illæ sunt salsa, vitrea, gypsea.

Salsa pituita duobus modis fit, secundum Gal. lib. 2. de differentiis februm, cap. 6. uno ex putredine, altero, ex permixtione salsæ humiditatis ferrosæ. Illa autem his signis dignoscitur, nimirum usu diuturno salforum eduliorum, siti maxima, dysenteria cum excrementis pituitosis, scabie fœda & pruritu immenso, ac potissimum sapore salso, ex catarrho in os delabente percepto.


Vitrea verò pituita in intestinis tantum colligitur, & propter intensam frigiditatē, mordens admodum censetur, ita ut colicos dolores non raro efficiat qui hoc signo distinguitur ab iis qui à statu ducunt originem, quòd scilicet à pituita vitrea dolores fixi, & terebræ instar perforantes generentur; à flatibus verò vagi, aut loco mutabiles producantur.

Gypsea denique pituita est illa, quæ in duritiem ferè lapideam concrevit, & in tophis seu nodositatibus podagricorum apparet, aut etiam aliquando è pulmonibus grandinis instar per validam vim rejicitur.

## CAPUT XIII.

De Signis Seri Redundantis.

**S**erosus humor multos, eosque non leves affectus solet producere, quales sunt destillationes in varias partes, hydropes, & similes; ideoque illius indicia breviter sunt proponenda, quæ quidem ex duobus fontibus desumuntur, causis scilicet & effectibus, juxta tabulam sequentem.





# 58 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. II.

Cujus ordinem sequendo, serum in corpore redundans sequentibus theorematibus demonstrabitur.

## Causæ Materiales.

Ciborum humidorum usus frequens, ut fructuum horariorum atque olerum, magnam aquosi humoris copiam solet acervare, eumque in corpore redundare, suspicionem affert.

Larga & frequens aquæ potio magnam feri copiam cumulare solet.

Urinæ vacuatio consueta suppressa, vel sudores intermissi, serum intra corpus cumulari significant.

## Causæ Efficientes.

Frigida & humida ventriculi & hepatis temperies, serosi humoris copiam solet producere.

Qui melancholico temperamento sunt præditi, plurimo abundant sero.

Obstructiones hepatis, lienis, & renum magnam feri copiam in corpore coacervant, quod nimirum illud liberum non habeat effluxum, viis solitis obferatis.



Hujus autem tabulæ seriem observando, hæc proponi possunt theoremata.

Castaneæ, napi, rapæ, fabæ, pisæ, & omnia ferè leguminum genera, flatus copiosos producant.

Qui obstructum habent lienem, aut melancholico temperamento præditi sunt, flatibus ut plurimum abundant.

Insomnia rerum levium & celeriter moventium, flatus in corpore abundare significant.

Dolor tensivus & mobilis, sine gravitatis sensu, à flatibus excitatur.

Tinnitus aurium à flatibus per aures erumpentibus producit.

Palpitatio & concussio partium, oscitatio, & pandiculatio, flatuum copiam indicant.

Ructus & crepitus ventris flatuum copiam significant.

Rugitus ventri & borborygmi, tum sonus, qui tumidum abdomen percutiendi editur, flatus abundare demonstrant.

## CAPUT XV.

### De Signis Temporum Morborum.

Morborum tempora nunc partes morborum, nunc ætates, nunc motiones, causæ morbi- ficæ a Galeno appellantur, unde patet eorum noti-

## EFFECTUS.

### Actiones Animales.

Sudores frequentes, & madores totius corporis; feri copiam attestantur.

Quicumque sero abundant, ii salivæ copiam per sputum solent excernere.

Quorum sanguis per phlebotomiam eductus majori parte in serum commutatur, totam sanguinis massam eo significat esse refertam.

### Accidentia.

Quicumque macilenti tumidum habent abdomen, his feri copia cumulatur.

## CAPUT XIV.

### De Signis Flatuum.

Flatuum copia solet generari ex materia cruda & crassa, à calore debili alteratâ. Illorum signa à duobus fontibus defumentur, causis nimirum & effectibus, quorum seriem sequens tabula indicabit.

tiam cum rerum præternaturalium diagnosi esse proponendam, quæ ex prædictis fontibus facile elicitur, ut ex sequentibus theorematibus apparebit.

Quorum morborum natura sub sensum cadit, eorum etiam tempora sensibus facile dignoscuntur. Sic febrem cognoscimus esse in principio, cum calorem per totum corpus effusum, eum tenorem servare percipimus, quem à principio accepit, nullâ auctione insigni adveniente. In augmento verò esse, cum calor evidenter crescit. In statu, cum calor eandem retinet vehementiam, à summo incremento relictam: Et denique in declinatione, cum remissior fit calida intemperies.

In morborum principio leviores sunt actionum noxæ, in augmento deteriores, in statu deterri- mæ, & diu tales perseverant, in declinatione denique meliores actiones efficiuntur.

Excrementa omnino cruda, quæ nullum coctionis rudimentum acceperunt, morbum esse in principio significant, cum autem coctionis principium in iis apparet, morbus est in augmento: & cum maxima sunt coctionis indicia, morbus est in statu.

Ac denique absoluta concoctio, & excrementorum in melius commutatio, declinationem significant.



# Cap. XV. De Signis tempor. morbor. 59

K. *Tabula Signorum morbum brevem vel longum futurum significantium.*





# 60 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

## SEMEIOTICÆ SECTIO III. DE SIGNIS PROGNOSTICIS.

### CAPUT PRIMUM.

*De Signis Morbi longi aut brevis futuri.*

**M**orborum brevitās & longitudo multis indiciis potest prævideri, quæ ex iisdem fontibus eadem methodo desumuntur, juxta præcedentem tabulam, notatam literâ K.

Cujus tabulæ seriem observando, sequentia constituentur theoremata.

*Essentia.*

*Morbi calidi breviores perpetuò esse solent, nisi contraxerint, frigidi verò longiores.*

*In morbis, qui accessiones habent, quanto illæ longiores fuerint, eo longiorem morbum prænuntiant, breviores verò, breviorē.*

*Tempus.* Quæcunque morborum accessiones celerrimè perficiuntur, citò desituum morbum significant, ut ait Gal. lib. de Crisibus cap. 4. quia vehemens ille motus crisis brevi futuram portendit.

Quæcunque accessionem unam vel duas horas anticipant, morbum citò finitum iri significant.

Anticipationem enim illa à materiæ tenuitate atque mobilitate exoritur. Advertendum tamen est, anticipationem illam, ut morbi brevitatem significet, non debere esse ordinatam, ut scilicet eodem temporis spatio singulis diebus anticipet, nimirum una horâ aut duabus. Ordo enim ille firmitatem morbi, & materiæ morbificæ contumaciam significat. Sed tempus anticipationum debet esse inæquale; ut inde pateat, materiam non esse stabilem, & facile à natura posse edomari. Melius in tertiana, v. g. si paroxysmi non anticipent, sed seriùs ingruant.

Quæ tardius redeunt accessiones, morbi longitudinem prænuntiant.

Inde enim ostenditur, materiam morbificam incrassari, & contumaciorem fieri. Aliquando tamen id fit ab ejusdem materiæ imminutione, quando sensim consumitur: quod ex symptomatum remissione etiam facile innotescet.

Quibuscunque accessiones sunt, quæcunque horâ febris dimiserit, si eadem cras occupaverit, judicium habet difficile. Aph. 30. sect. 41.

Dum enim paroxysmi eadem hora constanter redeunt, materiam firmam & stabilem significant, ut nonnisi longo tempore possit edomari: quia ordo in rebus omnibus significat fixitatem & potentiam causarum, atque adeò difficilem solutionem. Sic quotidianâ apparet experienciâ, febrium quartanarum paroxysmos ut plurimum eadem hora recurrere, quia causam habent admodum firmam, & stabilem; unde etiam fit, ut longiores contumacioresque sint.

Difficultatem etiam significat, non solum si eadem horâ semper accidat paroxysmus, sed etiam, si paribus semper horis, eademque proportionē anticipet aut retardet.

Ut si hodie hora primâ, cras secundâ, mox terciâ accidat paroxysmus: in his enim non est minor ordo quàm in præcedentibus, qui ordo perpetuò ex materiæ fixitate & contumacia dependet.

Quicunque morbi tertio quoque die exacerbantur, breviores sunt, quàm qui quotidie: longissimi, qui quarto quoque die.

Tertiana enim febris quæ à bile generatur, humore nempe tenuiori, faciliùs dissolvitur. Quotidiana verò à pituita generatur, quæ media est inter bilem & melancholiam, ratione crassitie & contumaciæ. Quamvis autem tertianæ duplices quotidiana

næ habeant paroxysmos; tamen propter materiæ copiam, quæ major multò in iis est, quàm in tertiana simplici, fit ut illis longiores esse consueverint. De causis periodor. febr. vide problem. Greg. Horstii, decis. 1.

Qui morbi circa meridiem exacerbantur, breviores sunt, quàm qui matutino tempore.

Omnium longissimi | qui circa vesperam, aut de nocte suas habent exacerbationes.

Quatuor enim humores in quatuor diei partibus commoveri solent, videlicet sanguis manè, bilis meridie, melancholia circa vesperam, & de nocte pituita. Cum igitur hora exacerbationis in febribus continuis dominium ostendat, eadem etiam morbi longitudinem aut brevitatem, quæ ab humoris natura dependet, poterit significare.

Qui morbi per excretionem solvuntur, citius finiuntur, quàm qui per abscessum.

Quia tenues humores per excretionem vacuantur, crassi verò per abscessum.

*Causa.*

Regio, anni tempus, & prægressa vitæ conditio calida, breves morbos prænuntiant, frigida verò diuturnos.

Quicunque morbi à sanguine, bile flava, & quovis humore tenui & pauco fiunt, breviores sunt: à pituita verò, melancholia, & atra bile, ac quovis humore multo & crasso, longiores.

In ætate juvenili breves ut plurimum fiunt morbi, in senili verò diuturni, in aliis mediocres.

Qui calido sunt temperamento, brevibus morbis afficiuntur, qui frigido, diuturnis.

In corporibus bene affectis breviores fiunt ægritudines; in malè affectis, longiores.

In Partibus durioribus & densioribus morbi fiunt diuturniores, tum etiam in mollioribus, & laxioribus; breviores autem in his, quæ mediocrem habent consistentiam.

Sic affectus ossium & nervorum diuturni sunt: sic etiam affectus articularum & similium diuturni sunt: Partium verò carnosarum affectus breves ut plurimum existunt.

**E F F E C T U S.**

*Actiones.*

Magnæ actionum læsiones longitudinem morbi significant.

Propterea quòd tantus à naturali statu recessus nonnisi longo tempore ad pristinum statum possit revocari.

*Excrementa.*

Quantum temporis intercedit à principio morbi usque ad manifesta signa coctionis, tantum etiam temporis consumitur ad omnimodam morbi solutionem.

Juxta legitimam morborum constitutionem, morbi principium æquale est duobus subsequenti- bus temporibus: at principium augmenti computatur à die, qua incipiunt apparere signa manifestæ coctionis. Hujusmodi autem eventus exempla leguntur apud Hipp. ut 1. Epid. cap. 3. Ægr. 3. ubi dicit, illum fuisse judicatum 17. die, qui manifestæ coctionis signa habuit in nono, & lib. cap. 3. Epicratis uxor 27. fuit judicata, & hæc habuit decimo quarto, signa manifestæ coctionis: & Cleonactides 40. habuit signa manifestæ coctionis & 80. fuit liberatus: 3. Epid. Anaxion 17. coepit concocta exspuere, & 34. fuit liberatus à febre & pleuritide. Multa etiam hujus rei exempla se vidisse refert Epiphanius histor. 86.

In quibus morbis coctiones ab initio in excrementis apparent, illorum brevitatem prænuntiant; ubi verò tardè sese produnt, longitudinem significant.

Excrementorum coctiones, quæ in die inclinante apparent, brevem morbum prænuntiant: longiorem verò si alio die apparuerint.

In



# Cap. I. De Signis Morbi longi, &c. 61

**Cœlionis incrementum.**

In quibus morbis magnæ excrementorum mutationes sunt, & magnum cœlionis incrementum, breviores illos æstimaio: longos verò, si parvæ, & paulatim fiunt.

**Cœlionis duratio.**

In quibus morbis cœliones diu perseverant, citò finituros arbitrandum; tardè verò si postquam apparuerint rursus delitescant.

**Excrementorum qualitates. Primæ, Secundæ.**

Calida excrementa, & quacunque parte emissæ, brevitatē morbi significant; frigida verò longitudinem.

Excrementa tenuia morbi brevitatē significant, crassa verò longitudinem: si tamen à cœlione crassa evaserint, brevitatē etiam prænuunt.

Adverte tamen hoc non esse perpetuum, quia in quibusdam morbis tenuitas excrementorum melior est; in aliis verò crassities. Sic

Urina tenuis decolor, morbi longitudinem significat.

Urina valdè tenuis, & nullum, aut valdè tenue sedimentum habens, evanescensque modò in melius, modò in deterius, diuturnitatē morbi significat.

**Tertia Color.**

Quæ unicum habent colorem excrementa, breviorē morbum significant; quæ verò plures referunt, longiorē. Illi enim varias ostendunt dispositiones, quæ difficilius vincuntur.

**Fætor.**

Maximus excrementorum fætor morbi longitudinem significat, quoniam ea à statu naturali recedunt.

**Sapor.**

In distillationibus humor à capite destilans vehementer salsus, diu rnam indicat destillationem, quoniam ea à gravissima sit temperie.

In quo morbo excrementa pauca & paulatim emittuntur longitudinem significant; multa verò & confertim emissæ, brevitatē.

**Excrementorum quantitas & modus.**

Excretiones, quæ cum fieri cœperint, sistuntur, ut cum sudores retrocedunt, si non mortem, saltem morbi longitudinem prænuunt.

Quæ cum vehementi strepitu emittuntur excrementa morbi longitudinem significant.

Ut sputum, quod tussis molestâ excluditur, quia magnam arguit difficultatē, quæ longitudinem parit.

Morbi omnes longiores sunt, qui per abscessum solvuntur: breviores, qui per excretionem.

**Loca. Apertio.**

Excretiones quæ per loca conferentia fiunt, & partibus affectis expurgandis idonea, brevem morbum efficiunt.

Sic caput per nares & palatum expurgatur, partes ventris inferiores per alvum & vesicam.

**Reclinatio.**

Partes per vias rectitudines habentes, facilius expurgantur, & morbum breviorē efficiunt.

**Latitudo.**

Quæ per latiores meatus fiunt excretiones, brevius morbos finiunt quàm per angustiores.

Sic capitis affectus citius per palatum & nares solvuntur, quàm per aures. Sic febres citius per alvum finiuntur, quàm per vesicam.

**Tempus excretionis.**

Quæ in morbis acutis die critico fiunt excretiones, morbi brevitatē indicant: quæ verò alio die, longitudinem.

Quibus febricitantibus in urinis bullæ apparent longum significat morbum.

**Contenta in excrementis.**

Bullæ enim, ut ait Galenus in comm. fiunt circumtenso humore spiritui flatuoso: solet autem hoc magis accidere, quando humor aliquid tenacitatis habet; tunc enim bullæ ipsæ sunt stabiles, & difficulter solubiles. Cum igitur spiritus flatuosus unà cum urinis excluditur, signum est frigida ægritudinis renum; hæc enim aggregat spiritum flatuosum, atque idè ait ægritudinem fore longam. Frigidum enim omne est difficulter solubile, & vix excretionem admittit, atque adè diu durat.

Quibuscunque febricitantibus fiunt in urinis sedimenta, veluti farina crassior, longam ægritudinem fore significant. Aph. 31. sect. 7.

Significat enim febrem fieri ab humoribus crassiss, qui nonnisi longo tempore possunt concoqui & edomari. Sic apud eundem Hipp. 3. Epid. sect. 2. Ægr. 5. qui decubebat in horio Dealcis, febri magnâ laborans, urinas habebat tenues, enæorema habentes minurum instar farinae crassioris, & quadragesimâ die judicatus est. Hac tan en sententia ita intelligenda est, ut talis urina morbi longitudinem significet, si æger ab eo evaturus sit: nam aliquando lethalis esse solet, & cum ea plurimi morte præripiuntur, antequam ægritudo diutius protrahatur, ut apud eundem Hipp. videre est, lib. 1. Epid. Ægr. 2. ubi Silenus qui habitabat in Platamone prope filios Evalcidis, ex lassitudinibus, & potibus, & exercitationibus intempestivis, febri magnâ correptus est, decimâ minxit acervatim subcrassum in materia depositum, subsidentia farinacea, extrema rursus frigida: undecimâ interiit. Dicendum igitur est cum Gal. hujusmodi sedimentum vel mortem, vel morbi longitudinem significare.

Ubi in toto corpore mutationes fiunt, si corpus refrigeretur, vel rursus calefiat, vel color alius ex alio oriatur longitudinem morbi significat. Aph. 40. sect. 4.

Illæ enim mutationes multos & varios humores in corpore abundare significant, qui varias dispositiones efficiunt: Natura autem longo indiget tempore, ut multas conficiat dispositiones.

Frigidi sudores cum acuta quidem febre, mortem; cum mitiori autem, longitudinem morbi significant. Aph. 37. sect. 4.

Nam frigidi sudores, ut docet Gal in comm. à parte aliqua frigida, & ab humore frigido oriuntur: cum autem propriè ab ipsa cute prodeant, necesse est, ut ea in omni frigido sudore frigida sit, & frigidos humores in se contineat, aut partibus sibi subjectis. Cum autem putredo febrium acutarum sit intra majora vasa, contingit interdum, ut incendium magnum, existens in partibus intimioribus, calorem nativum depopuletur in cute & partibus ei subjectis existentem: atque adè cum illæ partes unà cum humoribus sibi inexistentibus refrigerentur, non est mirum, si sudores per ipsas transeuntes, frigidos reddant, qui tamen ex frequentissimis humoribus intus conclusis fuscitentur. Est igitur sudor frigidus lethale signum in acutis febribus, quia ostendit calorem nativum frigidis illis humoribus dominari non posse, atque adè oneri succumbere. In mitioribus verò febribus longitudinem significat, quia febris exigua non ita dissolvit vires ut mortem afferre valeat; attamen humores frigidi copiosi nonnisi longo tempore concoqui & edomari possunt.

Summa totius corporis extenuatio longum morbum significat.

Si ei, qui non omnino leviter febricitat, permanet, nec extenuatur corpus, longus morbus significatur, Aph. 8. sect. 2.

Permanere enim & non extenuari, ex densitate cutis & crassitie humorum dependet, & propterea longitudo morbi significatur.

Corpus vehementer pallidum, aut citrium, morbi longitudinem prænuunt.

Ille enim color maximum ostendit à statu naturali recessum, qui non nisi longo tempore potest revocari. (conf. Melet. III 65. &c.)

## CAPUT II.

### De Signis Morbi Salutaris & Lethalis.

Salutaris morbus appellatur, qui nullum inferre vitæ periculum: lethalis verò, qui mortem ægro minatur. Illorum signa prognostica è tribus fontibus sumuntur, essentiâ nempe, causis, & effectibus; juxta tabulam sequentem, notatam litera L.

H 3

L. Tabula


Qualitates, prima.

Secunda.



# 62 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

## L. Tabula Signorum Salutis & Mortis.





## Cap. II. De Causis Morbi Salut &c. 63

Cujus tabulæ seriem observando morbum salutarem aut lethalem patefacient sequentia theoremata.

### Essentia.

*Febres ephemeræ, & omnes verè intermittentes salutes sunt, & omni carent periculo.*

*Apoplexiam fortem solvere est impossibile; levem verò non facile.* Aph. 42. sect. 2.

Fortis Apoplexia vocatur ea, quæ omnimodam habet sensus & motus privationem cum maxima respirationis læsione: Levis verò, in qua non est omnimoda sensus & motus deperditio, aut respiratio non est tam vehementer læsa.

In forti tanta est cerebri oppressio, ut non possit ullo modo ab ea se eximere; imo neque in levi, nisi maxima cum difficultate, ita ut perpetuò, cum solvitur, in paralyfin degeneret, ob naturæ impotentiam, nequeuntis materiam morbosicam longius expellere.

*Quicumque tetano corripuntur, intra quatuor dies moriuntur, si verò hos effugerint, sani sunt.* Aph. 6. sect. 5.

Tetanus, ex Gal. in comm. est morbus compositus ex emprosthotono & opisthotono, in quo corpus adeò rigidum manet & immobile prorsus, ut solum pectus aegrè moveatur. Cum igitur sit morbus adeò violentus, primo quatrinduo hominem interimit: quod si superaverit, signum est morbum esse remissum, alioqui non fuisset ferendo.

*Qui frequenter ac fortiter absq; causa manifesta deficiunt animo, derepentè moriuntur,* Aph. 41. sect. 2.

Magnam enim significat virtutis vitalis imbecillitatem, vel oppressionem, propter quam natura subito succumbit.

*Omnes ferè hydrops ex sua natura lethalis est.*

Quia hepatis & lienis temperies vehementer læsa non videtur reparabilis.

*Omnes febres continuæ & ardentes, tum partium internarum inflammationes, ut phrenitides, anginae, pleuritides, peripneumoniae, hepatitides, & similes, sunt suâ naturâ periculose.*

Non tamen omnino lethales, sed pro varia ægrotantis conditione nunc ad salutem, nunc ad interitum terminantur. Neque Medico licet in affectum istorum principio de salute aut morte ægrotantis pronuntiare, sed expectandi sunt dies critici, qui nobis commodè solent demonstrare, an morbus ad salutem, vel interitum tendat.

*Dum febris in periculoso morbo citra manifestam causam cessat, mors, non salus expectanda est.*

*Febres quæcunque non intermittentes, tertia die fortiores sunt, magis periculose. Quocunque autem modo intermiserint, periculum abesse significant.* Aph. 43. sect. 4.

Febres continuæ vel semper manent in eodem statu, vel augentur, vel minuuntur. Quæ augentur & exacerbantur, deteriores sunt iis, quæ non exacerbantur, quia malum in exacerbatione multò deterius fit, & magis affligit ægrotantem: At verò exacerbantur vel singulis diebus, vel tertio quoque die. Illæ verò quæ tertio quoque die exacerbantur, periculosiores sunt, quia fiunt è succis biliosis, atque adeo calidioribus, quorum proprium est tertio quoque die moveri. Hujus generis sunt febres ardentes, & hemitritæ, quæ periculosissimæ esse solent.

Illæ verò febres quæ intermittunt, carent periculo: quia, ut ait Gal. in comment. non ex inflammatione aliqua, neque ex maligna putredine occasionem habent; neutra enim harum ad quietem pervenit febre vacantem. Constat tamen experientiâ, in his saltem regionibus, febres tertianas intermittentes apparuisse summæ malignitatis participes, quæ tertio aut quarto paroxysmo ægrotantes de medio tollebant. Dicendum igitur est, hanc sen-

tentiam esse de iis, quæ ut plurimum non verò perpetuò contingunt, vel possumus dicere; ad Hippoc. & Galen. defensionem, tertianas illas intermittentes non habere perfectam apyrexiam, & tempore intermissionis aliquid febris, quamvis obscure, semper latitare; & malignas esse.

*Quicumque ex asthmate vel tussi gibbi fiunt, ante pubertatem moriuntur.* Aph. 46. sect. 6.

Cum enim cor atque pulmones adhuc augeantur, nec locus ipsorum possit secundum proportionem augeri, quia thorax à gibbositate impeditus est, fit ut viscera augefcentia non possint diu angustiori loco contineri, ita ut brevi post gibbositatem interitum inducant: non quòd necessarium sit statim perire ægrotantes; sed quòd longè ab eo vitæ spatio, quod alioqui attingerent, recedant.

*Hydrops febri conjunctus, aut illi superveniens, lethalis esse consuevit, ex Hipp. 2. progn.*

Quia febre non solvit, sed caloris nativi resolutionem significat. Distinguendus autem Hydrops à tumore abdominis, post febres sæpe familiaris.

*Quartanæ intermittentes, in continuas conversæ, ut plurimum lethales.*

Ostendunt enim humorum incinerationem, quæ propemodum irreparabilis est.

*Asthmati pleuritidis aut peripneumonia superveniens, lethalis est.*

Quia repletis pulmonum bronchiis ab humore pituitoso, & pulmonibus debilitatis, nulla fieri potest anacatharsis: & respiratio ab utroque affectu ita impeditur, ut ægrotantem perire sit necesse. Si tamen anacatharsis facilè fiat, & alia symptomata non sint vehementiora, curari potest.

*A pleuritide peripneumonia, malum.* Aph. 11. sect. 7.

Hæc sententia nititur generali axiomate, proposito ab Hippocr. lib. de morbis, quod nimirum malum signum sit, morbum morbo adjungi. Pejus verò est, ubi morbus qui adjungitur, est priore deterius; pessimum, ubi id fit viribus jam fractis. Cum igitur peripneumonia sit pleuritide multò deterius, & quando illa huic supervenit, jam vires sint admodum attritæ ab antecedente gravi morbo, pessimum id esse solet, atque ut plurimum lethale. Ideoque cum Hipp. in Aph. in casibus minus periculosis soleat dicere, *malum*: & in maxime periculosis, *lethale*: hic certè lethalis nomine usus esse debuerat, ut non immeritò dubitet Gal. an verbum istud, *malum*, fuerit ab Hippocr. positum, cum in quibusdam codicibus, ut ipse testatur, non reperitur.

*Lues venerea in elephantiaco difficillimè curatur.*

Quia remediis exsiccantibus, qualia sunt sudorifica, elephantiasis valde exacerbatur, & deterius multò efficitur.

### Causæ.

*Morbi qui à sanguine oriuntur, salutes sunt nisi malignitatem acquirant, aut summam putredinem.* Efficientiæ.

*Bilis vitellina, porracea, æruginosa, & atra, lethales morbos inferre solent.*

*In corporibus bene habitis, & laudabili temperamento donatis, morbi salutes ut plurimum generantur.* Materialæ.

*Vesica discissa, aut cerebello, aut corde, aut præcordiis, aut aliquo ex tenuioribus intestinis, aut ventriculo, aut jecore, lethale.* Aph. 17. sect. 6.

Discissas vocat partes, quæ magnum & profundum vulnus acceperunt. Sic tota vesicæ tunica divisa usque ad spatium interius, non potest coalescere; neque tale vulnus, magnum scilicet ac profundum, in partibus præcordiorum nervosis, aut in tenuibus intestinis. In ventriculo verò aliquando ut vult Gal. sed rarò sanatur. Horum autem ratio est, quia vesica nervosa est, quia tenuis, & expans-



## 64 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

guis, unde fit ut in cervice ejus vulnera sanentur quia carnosa est. Hepatis verò vulnera, propter magnam sanguinis profusionem, lethalia sunt, si modò venæ ejusdem dividantur; alioqui vulnera in summa hepatis superficie sanabilia sunt. Sic cerebri vulnera non admodum profunda interdum sanantur; si verò ad ventriculos aliquatenus pervenerint, lethalia sunt. Vid. Galandrop. Sennert.

*Quibus morbis nulla profunt remedia, lethales arbitrandi; & contrà, quibus multa profunt, salutare.*

*Effectus. Actiones Animales.*

*In quovis morbo mente constare, & bene se habere ad ea quæ offeruntur, bonum; contra verò se habere, malum.* Aph. 33. sect. 2.

Nam mente integra existente, signum est, bene se habere cerebrum, ejusdem membranas, & spinalem medullam, totumque nervosum genus; & maxime, quod ipsi cerebro est proximum. Sic quando æger bene se habet ad cibum & potum & reliqua quæ ipsi offeruntur, signum est, ventriculum, hepar, & reliquas partes naturales commodè se habere. Contrà verò agro quovis modo delirare, seu non rectè secundum consuetudinem sapere, malum signum cerebri perpetuò esse solet. Sic apud Hipp. 1. Epid. sect. 3. Ægr. 1. Philiscus tertiâ die in omnibus deliravit & sexta die obiit. Item Ægr. 2. ejusdem sect. Silenus secunda die aliquantulum deliravit. Tertia nocte nihil dormivit, sermones multi, risus, cantus continere non poterat: undecima interiit. Sic etiam Ægr. 4. ejusdem sectionis, in Thaso uxorem Philini, cum femellam peperisset, secundum naturam, facta purgatione, & alioqui leviter degentem in decima quarta existentem post partum, febris magna cepit cum rigore; sexta die ad noctem deliravit multum, & rursus sapiebat: octava, multa obloquebatur, exsurrexit; decima, parum intelligebat: undecima dormivit, omnium recordata est, celeriter autem rursus deliravit. Decima quarta palpitantes per totum corpus, sermones multi, parum intelligebat, celeriter autem rursus deliravit. Circa verò decimam septimam existens, voce privata est: vigesima obiit. Ita & Ægr. 8. ejusdem sectionis. Erasimum, qui habitabat ad Bootæ torrentem, febris magna corripuit post cœnam, noctem turbulentius transiegit, diem primam quietè, noctem laboriosè. Secunda omnia sunt exacerbata, in noctem deliravit. Tertia, laboriosè deliravit multa. Quinta manè recreatus est, & intelligebat omnia, multum autem ad meridiem furore agitato est; continere se non poterat, extrema frigida sublivida; urina substiterunt: interiit circa Solis occasum. Similes casus videre est in Ægr. 12. ejusdem sect. & Ægr. 13. sect. 3. lib. 3. Ex quibus tamen colligere non licet, delirium in omnibus ægrotis esse necessariò lethale; dixit enim tantum Hipp. in prædicto Aph. esse malum, id est, vitæ periculum inferre, quamvis multi ex eo frequenter evadant, ut apud eundem Hipp. videre est in 1. Epid. sect. 3. Ægr. 3. ubi Herophon febris acuta laborans, quinta die mente motus est: sexta deliravit, in noctem sudor, refrigeratio, delirium perseverabat: septima desipuit, nocte ad mentem rediit, dormivit: nona sudavit, judicatus est, intermisit.

Quinta post die reversus est, judicatus est decima septima, neque deliravit in recidiva, & in Ægr. 5. ejusdem sect. ubi Epicratis uxorem, quæ decumbebat apud Archigenem, secunda post partum die corripuit febris acuta: sexta deliravit: septima omnia sunt exacerbata: vigil. deliravit: decima sexta exacerbata ad noctem, & molestè habuit, non dormivit, deliravit. Decima octava siticulosa, lingua exusta est, non dormivit, deliravit multa. Judicata est perfectè absque febre, octuagesima. Similes historias videre est lib. 3. Epid. sect. 1. Ægr. 3. & sect. Ægr. 7. Ideoque quamvis delirium perpetuò malum

fit, ex eo tamen agrotantis interitus non est perpetuò prædicendus, nisi cum eo alia signa mala & lethalia concurrant: ut ex sequentibus theorematibus clariùs apparebit.

*Ubi febre non intermittente difficultas spirandi & delirium acciderint, lethale est.* Aph. 50. sect. 4.

Fit utrumque symptoma interdum ex læsione cerebri, & tunc apparet spiritus, ut ait idem Hipp. in progn. magnus, & ex multo intervallo, hoc est, magnus & rarus. Fit etiam difficultas spirandi ex affectu partium spiritualium, aut pleuritide, peripneumonia, & similibus. Hæc autem omnia sunt valdè periculosa.

*A profluvio sanguinis, ileo, pleuritide, vel peripneumonia delirium, malum.* Aph. 9. 10. 11. & 12. sect. 7.

Cum autem profluvio sanguinis succedit, ab inactione fit, quæ est admodum periculosa, dum partes principes tantopere debilitat. In aliis verò affectibus, quando cerebrum trahitur in consensum, gravissimus affectus & periculosus significatur.

*Si quis ea faciat, quorum sit insolens, gravissimum habet malum.* 1. Coac. Aph. 50.

Indicat enim mentem non constare, & est species delirii.

*A prudenti viro ferox responsum, atque à feroce modestum, & garrulitas in taciturno, atque taciturnitas in garrulo, malum.* Hippoc. in Prorrhæ.

Significant enim hæc summam judicii eversionem.

*Plangere vel lachrymari involuntariè, species delirii est, & mortis periculum invidit.*

Significat enim humoris atrabilarii dominatum: sic apud Hipp. 1. Epid. sect. 13. Ægr. 1. Silenus inter alia symptomata, quæ ibi recensentur, mœrebat cum dolore die octavâ, & undecimâ interiit.

*Deliria, quæ circa initium morbi apparent, magis periculosa.*

Inde enim ostenditur morbi vehementia, qui primo congressu, & natura adhuc valida existente, tanta symptomata producit.

*Delirium cum notabili oblivione, ignavia & stupiditate apparens, exitii est indicium.* 2. Prorrhæ.

Quod enim non cognoscant familiares, neque recordentur, ex cerebri refrigeratione fit. Illa autem refrigeratio, quæ calorem sequitur, est perniciofa. Si verò cum his rigeant ægroti, & frigescent, inevitabile fatum judicatur, ex Gal. 2. Prorrhæ.

*Quæ circa res necessarias versantur deliria pessima, indeque si ingravescent, mortifera.* 1. Coac. Aph. 103.

Ut si quis cibum & potum averfatur, in maximo est periculo: quemadmodum in 1. epid. sect. 1. Ægr. 2. videre est: ubi is, qui potum decimâ die respuebat, undecimâ interiit.

*Desipientiæ, quæ cum risu fiunt, securiores, quæ verò cum studio, periculosiores.* Aphorif. 53. sect. 6.

Phrenitis enim, quæ cum risu fit, à sanguine producitur; cum studio verò & furore à bile. Utraque autem periculosa est, sed quæ à sanguine multò minùs. Non tamen statim, delirio cum risu apparente, salus prædicenda est; nam & per se phrenitis à sanguine non caret periculo, & perseverante morbo sanguis ille exurit, atque ita atræ bilis naturam induit, quod ex symptomatibus supervenientibus ostenditur, & ex risu in furem & mœstitiam converfio; quemadmodum videre est in 1. epid. sect. 1. Ægr. 2. ubi Silenus secunda morbi die aliquantulum deliravit: tertia sermones multi, risus, cantus continere nequibat: octava mœrebat cum dolore. Jam igitur ille humor, qui tertia die sanguinis naturam retinebat, & risum, atque cantum efficiebat, octava in atrabilarium conversus est, nam mœror cum dolore fit ab atra bile. Ideoque undecima interiit. Igitur dicendum est, deliria cum

risu

Juvenes, & ledentes.

Principes.

Dellium.



rifu quandam securitatem polliceri, si toto morbi decursu perseverent.

*Qui cum silentio è potestate mentis exeunt, nec voce sunt capiti: mortiferum habent malum. Lib. 1. Coac. Aph. 79.*

Illa enim exstasis melancholica producit ab humore atrabilario, cerebri substantiæ infixio, & furori sæpissime succedit: tuncque fit pro clamore silentium; pro jactatione, quies; pro vigiliis coma & cataphora veteriosa. Sic in 3. *Epid. sect. 2. aeg. 6.* Euryanactis filia febre magna laborans, à qua interiit, toto morbi decursu, inquit Hippocrates, abhorrebat omnes cibos, sine siti, silens nihil loquebatur, mœror & desperatio statim ipsam habuit. Sic etiam *sect. 3. ejusdem libri*, in Thaso Dealcis uxorem, quæ decumbebat in plano, febris horrida, acuta, ex tristitia corripuit: à principio autem contegebatur, & usque in finem semper taciturna manibus palpabat, evellebat, scalpebat, floccos legebat, lachrymæ, & denuò risus; nonâ, multa obloquebatur, & rursus quievit silens: vigesima prima interiit. Erant huic usque in finem spiritus magnus & rarus; insensibilitas omnium habebat; semper contegebatur, vel sermones multi, vel taciturna usque in finem, phrenitis.

*In phrenitide subitanea resipiscencia, febre acuta perseverante, & nulla crisi prægressa, mortem in propinquo esse significat.*

Accidit enim aliquando, phreneticos ita resipiscere, ut adstantes de rebus seriis & gravissimis admoneant, & quæ iis eventura sunt, prævideant, & repente moriantur, prostrato scilicet jam calore nativo cerebri, & ultimos conatus exerente, sicut lucerna, dum extinctioni est proxima, majores subinde flammæ videtur eructare.

*In delirio memoriæ abolitio funesta.*

Ea inde manifestatur, cum matulam ægri petunt, & postea mingere obliviscuntur, aut aquam flagitantes oblato poculo non bibunt, aut primis tantum labris degustant.

*Ex delirio ea minus mala censenda, quæ mitia deviaque sunt, & non perpetuò ægros tenent, sed parvo tempore, atque cum bonis signis: vel saltem non lethalibus perdurant.*

Hujusmodi deliria contingunt frequentissimè in febrium biliosarum paroxysmis, vel exacerbationibus, quibus commota bilis & exagitata calidos vapores ad cerebrum transmittit, delirium excitantes, qui tamen faciliè & brevi discutiuntur, neque ullum vitæ periculum minantur, nisi alia signa lethalia simul apparuerint. Mitia autem & levia esse oportet hujusmodi deliria: nam quæ cum ferocitate conjuncta sunt, quamvis levia existant, mala esse consueverunt, quemadmodum dicit Hippoc. 1. *Prorrh. aphor. 25. Quæ parvo tempore feroces sunt desipientiæ, ferinum.* Et Galen. eandem sententiam exponens: *Cum videris quempiam cum ferocitate desipientem, etsi paulò post sedetur, cognosces mentem ejus non febris ratione lasam esse, sed phreneticam subali affectionem, quæ post adacta, ferina tibi videtur.*

*Phrenitis lethargo succedens salutaris, quia materiam concoctam esse significat.*

*Delirium die critico cum virium robore & aliis bonis signis contingens, minimè periculosum.*

Denotat enim instantem crisin, quæ morbus solvi consuevit. Sic apud Hipp. 3. *Epid.* in muliere morosa, tertia die convulsiones conquieverunt, coma & in somnum inclinatio, rursusque vigiliæ excitaverunt eam, continere se non potuit, multum deliravit, febris acuta, sub hanc noctem sudor multus toto corpore, & calidus prorupit, libera febre dormivit, planè mente constitit.

*Somnus & vigilia, utraque si modum exceßerint, malum, Aph. 3. sect. 2.*

*Lazar. Riverii Opera.*

Significant enim recessum à statu naturali & dispositionem morbosam in parte principe, quæ perpetuò mente consistit.

*In quolibet morbo, si somnus & vigilia eodem modo se habeant, quo antea consueverant, cum æger bene valeret, bonum.*

Impossibile enim videtur, hominem ex morbo aliquo interire, qui somno & vigilia inculpatis, & nullatenus immutatis utatur.

*Vigilia in morbi augmento vel statu, cum signis concoctionis apparentes, bona.*

Crisin enim instare significant, quam præcedunt vigiliæ, aliaque symptomata ex perturbatione critica oriunda, quæ tamen apparentibus concoctionis signis, tanquam salutaris crisis prodromis, minimè pertimiscenda sunt.

*Vigilia immoderata in juvenibus magis periculosa, somni verò in senibus.*

Quia major fit recessus à statu naturali. Juvenes enim naturaliter plus dormiunt, quia copiosiori humido abundant, senes verò sicciores, ideoque naturaliter vigiles.

*Quicumque ægrotantes noctu neque interdiu dormire possunt, valde periclitantur. Hipp. 2. progn.*

Illæ enim continuæ vigiliæ maximam cerebri intemperiem calidam & siccam significant, tum etiam vires vehementer dissolvunt, cruditates ingeminant, calore nativo resoluta, & tandem deliria conversionesque accerunt.

*Somnus comatosus in febre acuta perniciosus.*

Sic apud Hipp. *Epid. sect. 1. aeg. 2.* Hermocratem, qui decumbebat prope novum murum, febris magna corripuit, & post varia symptomata, undecima die comate laborare incepit, quod insequentibus perseveravit, ac tandem vigesima septima mortuus est. Ratio autem, cur affectio comatosa in morbis acutis sit adeò perniciofa, desumitur ex Gal. *Commentario in prædictam historiam*; ubi sic habet: *Reliquum ergo est, perfrigerationem insignem cerebri, aut facultatis imbecillitatem Hermocrati coma induxisse die undecimo, utrum autem sit horum, extremè est perniciosum, nam demonstratum est, insanabilia ea esse frigora, cum calidis morbis & siccis succedunt.* Sed quod virium imbecillitas facit, exitium proximum notat; quando verò hujusmodi coma diuturnis vigiliis succedit, magis perniciosum est, significat enim omnimodam caloris nativi extinctionem. Sic quando phrenitici comatosi evadunt, jam morti sunt proximi.

*In quo morbo somnus laborem facit, mortale: si verò juvat non mortale. Aph. 1. sect. 2.*

Non existimandum est, quemcumque laborem à somno esse lethalem. Si enim levis sit, ut quando ægroti à somno fuscitati, anxii & magis inquieti fiunt, malum quidem illud, at non necessariò lethale: Sed si à somno gravissima symptomata adveniant, ut delirium, convulsio, virium imbecillitas, frigus extremorum, & similia, tunc certè lethale affectum esse censendum est.

*Ubi somnus delirium sedat, bonum. Aph. 2. sect. 2.*

Significat enim, vaporum & humorum, delirium efficientium, calorem & acrimoniam mitigari per somnum, & ad quandam mediocritatem reduci.

*Quibus, incidente rigore nocturna exacerbatio somni vacuitatem affert, periculosum. lib. 1. Coac. aph. 20.*

Significat enim materiæ anadromen ad cerebrum.

*Si quis in laboriosa febre obtupefcat, & veluti catoche afficiatur, morbo laborat pessimo. 1. Coac. Aph. 47.*

Sicut antea diximus, coma in febribus acutis esse periculosum; sic catoche multò periculosior est, quæ fit à translatione materiæ siccioris in

I cere-



## 66 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

cerebrum & nervos, unde contentio nervorum. Atque ideo, qui hac affectione laborant, eodem in statu manent, & apertis atque inconviventibus oculis stupidi consistunt, & ita à comatosi differunt, qui perpetuò clausos oculos habent.

*Excitationes à somno, quæ cum pavore sunt & turbulencia, periculose.*

Significant enim humoris atrabilarii copiam, quæ hujusmodi pathemata producit.

*Si per somnum candidæ partis oculorum dimissis palpebris aliquid apparet, nec alvi fluor, nec inedia in causa est, nec ita æger dormire consuevit, vitiosum indicium, lethaleque admodum est. Gal. in 1. progn.*

Illud enim facultatis, palpebras moventis, extinctionem significat.

*Quæ in phrenitide memorantur insomnia, bonum denuntiant. 1. Coac. Aph. 95.*

Nihil optabilius est in phrenitico, quàm ut somnum ineat, suaviterque dormiat. At suavis somni indicia sunt insomnia, non illa quidem turbulenta ac tumultuosa, sed placida atque tranquilla, quæ postea ab ægrotante memorantur; hoc enim ostendit mentem ad se redire; & cerebrum ad moderatam intemperiem revocari.

*In eo, qui periculose ægrotat, insomnia mortuorum, sepulchrorum, & sacerdotum, futuram mortem prænuntiant.*

In morituris aliquando anima suam à corpore separationem præsentit, eamque corpori per insomnia repræsentat, per species eorum, quæ mortem significare valent, sed non semper.

*Oculi caligantes, vel lucem fugientes, in morbis acutis periculum minantur.*

Magnam enim indicant spirituum dissipationem.

*In febre non intermittente, si æger non videat, vel non audiat, jam debili existente corpore, mors in propinquo est. Aph. 49. sect. 4.*

Significat enim virtutis sensibilis summam debilitatem, & maximam spirituum exsolutionem.

*Surditas, quæ ex critica perturbatione procedit, aliisque signis decretoriis comitata est, salutaris esse consuevit.*

Signa decretoria, quæ surditatem comitari debent, ut salutaris dici possit, sunt præcipue concoctionis signa, quæ in excrementis apparere solent, & bona perpetuò esse consueverunt. Sic 3. epid. 3. sect. 2. ægr. 7. de virgine Abderitana, quæ ab octavo die usque ad 12. in quo multum sanguinis è naribus fluxit, surditate affecta est, quæ sequentibus etiam diebus perseverans, priorem crisin imperfectam denotabat, aliamque pro morbo resolvendo futuram prænuntiabat, quæ iteratâ sanguinis eruptione, sudore, & humoris translatione ad pedes, postea die 20. est subsecuta: Quibus evacuationibus cum morbus non fuerit penitus sublatus, die 24. rediit surditas cum aliis symptomatis, quæ crisis absolutissimæ die 27. futuræ fuit prænuntia, quod ex ipsius historiæ contextu clariùs innotescit. Septima die, inquit, urinae tenues quidem, sed boni coloris: quæ ad alvum pertinent, non turbabant. Octava surditas, febris acuta, vigil., anxiosa, horrida, mente constabat, urinae similes. Nota per eadem: & sequentibus, sic surditas perseverabat. Decima septima è naribus fluxit multum, surditas parum remissa, at sequentibus surditas inerat & delirium. Vigesima pedum dolor, surditas, delirium, fluxit sanguis parum è naribus, sudavit sine febre. Vigesima quartâ febris revertitur, surditas iterum, pedum dolor perseveravit, mentis alienatio, vigesima septima sudavit multum sine febre, surditas defecit, pedum submanebat dolor, in aliis autem perfectè judicata est.

*Surditas morbi acuti turbulentique succedanea, grave malum. 2. Coac. cap. 3. Aph. 2.*

Quemadmodum surditas, cum bonis signis juncta, bona est; ita cum malis mala esse consuevit, ideo si morbus acutus sit atque turbulentus, id est: cum delirio & gravibus aliis symptomatis conjunctus, surditas ei superveniens mortis periculum minatur. Sic apud Hipp. lib. 3. epid. sect. 1. ægr. 2. Hermocratem, qui decumbebat prope novum murum, febris magna corripuit, incepit autem dolere capite & lumbis, hypochondrii tensio molliter, lingua verò incipienti exusta est, surditas statim, somni non aderant, siticulosus non valde, urinae crassæ, rubræ, sepositæ non subsidebant, ab alvo autem non pauca combusta egrediebantur. Quinta minxit tenuia, habebat enæorema, non subsidebant, ad noctem deliravit, septima & vigesima mortuus est. Huic surditas usque in finem permanebat: Sic etiam Ægr. 4. ejusdem sectionis, in Thaso Philistes, prima die vomuit biliosa, pauca, flava primum, postea æruginosa, multa ab alvo autem stercorea prodierunt, nocte molestè. Secundâ, surditas. Quintâ manè extinctus est. Advertendum tamen est, surditatem, etiam cum pravis signis conjunctam, non esse perpetuò lethalem, sed tantum periculosam, & cum ea nonnullos evadere. Ut apud eundem Hippoc. videre est in 1. Epid. sect. 1. ægr. 3. ubi Herophonti febris acuta, ab alvo pauca, qualia in tenebris secundum principia. Post hæc autem tenuia prodibant, biliosa, subcontinua, somni non aderant, urinae nigræ, tenues. Quintâ manè surditas, exacerbata sunt omnia, lien intumuit, hypochondrii contentio, ab alvo pauca nigra exierunt, mente motus est: nona, sudavit, judicatus est, intermisit: quintâ post die reversus est, statim autem lien elevatus est, febris acuta surditas rursus. Post recidivam autem tertia lien fuit imminutus, surditas minus, crura dolorosa, nocte sudavit, judicatus est decima septima, neque deliravit in recidiva.

*Si post phrenitidem, aut gravem alium capitis morbum surditas succedat, priori morbo cessante aut allevato, & facultate non debilitata, bonum.*

Quia fit, abscedente materia ab interno cerebro ad externas ejus partes, expectabunturque tunc temporis à surditate parotides.

*Bombus in acutis & sonitus aurium, est lethalis. 1. Coac. cap. 3. Aph. 5.*

Aurium tinnitus, & aliæ sonorum species, quæ ab ægrotantibus percipiuntur in morbis acutis, difficillimum & periculosissimum morbum ostendunt; propterea quod à flatibus crassioribus producuntur, qui pariter à crassiori materia elevantur. Et cum illa materia contumax sit atque rebellis, neque in exiguo morbi acuti spatio possit edomari; fit ut natura priùs onere oppressa concidat, & ita æger ad interitum perducatur.

*Cibos & potus atque medicamenta oblata putria atque graveolentia videri, malum.*

Denotat enim summè putridos & graveolentes humores in corpore abundare, quandoquidem odoratus ac gustus vaporibus à variis humoribus putridis ad linguam & nares seu cerebrum exhalantibus, vitatur; intusque quod est vel odoris, vel saporis prohibet extraneum, ut Philosophi docent, ejusque receptionem impedit. Hinc fit, ut cum nares & lingua à putridis vaporibus, ex inferioribus partibus elevatis inficiuntur, omnia quæ tum odorantur, tum gustantur, putrida videantur.

*Dolores partes ignobiles, & à visceribus longè remotas occupantes, easque diu exercentes, apparentibus concoctionis signis & qui præcipue decretorio die cæperint, salutares.*

Significant enim naturam præcipua membra exonerare, atque noxios humores procul à se depellere. Partes autem ignobiles, & à visceribus longè remotæ sunt, inguina, crura, genua, tibiæ & pedes, nec



nec non brachia & manus. Advertendum tamen est, per huiusmodi dolores morbos perpetuò non perfectè judicari, sed interdum imperfectè ut postea recidiva succedat. Perfectè autem discutiuntur morbi, si huiusmodi doloribus convenientes evacuationes succedunt, v. g. per sudores, alvi fluxum & similes, quæ universam materiam morbificam exhauriunt. Si verò nullæ evacuationes huiusmodi doloribus adjungantur, aut sufficientes, imperfecta fit morbi solutio, & recidivæ obnoxia propterea, quòd causa morbifica universa in partem ignobilem detrudi minimè possit, ideoque necesse est, ut per alias evacuationes morbus tandem finiatur, ut videre est apud Hipp. 3. *epid. sect. 3. agr. 9.* ut Heropytus, gravi & contumaci morbo laborans; post varia symptomata, imò & hæmorrhagiam, quæ morbum quidem imminuit, non tamen solvere potuit: doloribus inferiorum partium afflic- tus est, & denique per alvi fluxum omninò liberatus. Hipp. verba hæc sunt: *Quadragesima die à naribus sanguis fluxit multum, & sapiebat magis, surditas intererat quidem; minus autè febres remiserunt, sanguis fluxit sequentibus, sæpe & paulatim, Circa verò sexagesimam sanguinis quidem fluxiones cessarunt, coxæ autem dextræ dolor fortis, & febres intendebantur, non multo autem tempore post, dolores inferiorum omnium: contingit autem vel febres esse majores & surditatem multam; vel hæc quidem remittere & allevari, inferiorum autem circa coxas majores esse dolores. Circa verò centesimam alvus multis biliosis super turbata est, & procedebant tempore non exiguo multa talia; & rursus dysenteria cum dolore, aliorum autem commodus status, in totum verò & febres defecerunt, & surditas cessavit. In centesima perfectè judicatus est.* Sic etiam *agr. 7. ejusdem sectionis*, Abderitanæ Virgini decima septimâ è naribus fluxit multum, vigesima pedum dolor, surditas delirium, fluxit sanguinis parum è naribus, sudavit, sine febre; vigesima quartâ febris revertitur, surditas iterum, pedum dolor perseveravit, mentis alienatio; vigesima septimâ sudavit multum, sine febre, pedum submanebat dolor, in aliis autem perfectè judicata est.

*Dolores à partibus superioribus ad inferiores descendentes, salutare.*

Ostendunt enim materiam morbificam à partibus præcipuis ad ignobiliores deferri, quemadmodum voluit Hipp. 3. *prorrhet.* Dolores, inquit, si ad infernas dilabuntur partes, facile ab his feruntur: & confirmatur historiâ Herophontis, quæ habetur in 1. *Epid. sect. 1. agr. 3.* Huic quintâ die lien intumuit cum hypochondrii tensione, octavâ lien imminutus est, doluit secundum inguen, tumor primùm lienis secundum rectitudinem; deinde dolebat secundum utraque crura, noctem facilliter, urinæ coloratior, subsidentiam habebant paucam. Nonâ sudavit, judicatus est, intermisit. Quinta reversus est, statim autem lien elevatus est, febris acuta, surditas rursus: post recidivam autem tertia lien fuit imminutus, surditas minùs; crura dolorosa, nocte sudavit, judicatus est decima septima.

*Capitis dolores vehementes & continui cum febre acuta, alioque signo difficili, lethale. 3. progn.*

Quando enim vehementes sunt & continui, ostenditur eos non fieri à vaporibus sublatis à partibus inferioribus, neque à perturbatione critica, sed ab intemperie calidissima, meningibus impressa, tensione & gravitate in iisdem, producta à materia morbifica, cerebrum ipsum occupante, quæ si febrem acutam pariat, biliosa est & mordax partique admodum molesta; & talis etiam significatur, si cum doloribus, & febre acuta alia signa mala & periculosa appareant, ut vigilæ, deliria, difficultates spirandi; urinæ tenues aut confusæ,

*Lazar. Riverii Opera.*

& similia quæ eò periculosiorem morbum ostendunt, quòd plura ex iis apparuerint.

*Dolores capitis, post sudores criticos evenientes, mortem ut plurimum præsagunt.*

*Cervicis dolores, in principio vel augmento morbi affligentes, mali.*

Significant enim humorum copiam in posteriori parte capitis abundantem, & in spinalem medullam, aut illius membranas ex parte diffusam, quæ à natura dissolvi aut concoqui nequeat. Sic in 1. *epid. agr. 2.* Silenus statim ab initio cœpit dolere lumbos, & caput habuit gravitans, colli aderat contentio, vigesima interiit. Sic etiam 3. *epid. sect. 3. agr. 4.* Phreneticus, cui prima die capitis & colli gravitas aderat cum dolore, quarta die mortuus est. Sic etiam *agr. 14. ejusdem sectionis*, in Cyzico mulieri filias enixæ gemellas, & quæ difficulter pepererat, & non admodum purgata fuerat, primùm quidem contigit febris horrida acuta, capitis & colli gravitas cum dolore: decima septima mortua est. Advertendum tamen est, ex hoc signo mortem absolutè non esse prædicendam, quia nonnulli cum eo solent evadere, ut videre est 1. *Ep. sect. 3. agr. 5.* ubi Epicratis uxorem secunda die capitis & colli lumborum dolor affligebat, & multis gravibusque symptomatis divexata est: usque ad octuagesimam, in qua perfectè judicata est. Et *agr. 14. ejusdem sectionis*, Melidiæ, quæ decumbebat apud Junonis templum, incœpit capitis & colli & pectoris dolor fortis, cum aliis symptomatis, & judicata est perfectè die undecima. Ubi igitur hoc signum in morbi principio apparet, possumus ex eo morbum gravissimum & valde periculosum pronuntiare, ex eoque ægrotum aut moriturum, aut periculosissimè laboraturum, ut patet ex Historiis supra citatis eorum qui evaserunt, cum gravibus tamen symptomatis, maximo vitæ periculo.

*Auris acutus dolor cum febre continua & vehemènti, gravis est.*

Periculum enim est, ne homo desipiat & moriatur. Hipp. 3. *progn.* Cum ab ipso Hipp. signum hoc fallax censeatur, accuratè distinguendum est: Meatus auditorio vicina est dura meninx, ita ut vitium unius in alterum transferri valeat; sed ita inter se differunt, ut si affecto cerebro dolor prædicto meatus superveniat, non erit delirii aut mortis signum, sed utriusque præsidium, ostendit enim materiam morbificam à partibus interioribus ad exteriores transferri. At si dolor in febre acuta citra cerebri affectionem exoritur signum est humorem per eam partem in cerebrum irruere, phrenitidem, & inde mortem effecturum maxime, si vehemens ac difficilis fuerit. Moriuntur autem ex tali morbo (ut docet Hippoc. *loco citato*) juniores homines, septimo die aut citius; seniores verò multò tardiùs. Febres enim & deliria minùs ipsis accidunt, atque adeò aures possunt suppurari. Verùm his ætatibus recidivæ accidentes plurimos interimunt; Juniores autem, antequam aures suppuraretur, moriuntur. Si autem fluat pus album ex aure junioris, spes est eum supervicturum, si aliud etiam optimum signum ipsi accadat.

*Fauces dolorificæ in acuta febre periculose. Hipp. in Coacis.*

Hic faucium dolor in febribus malignis & pestilentibus sæpissimè contingit, & est unum ex signis demonstrativis illius affectus, sitque vel ex defluxione tenui & maligna, è cerebro in fauces irruente; vel à malignis vaporibus è partibus inferioribus elevatis, & partes illius vellicantibus.

*Dolor affixus pectori cum torpore, pestiferus: superveniente acutâ febre, crudeliter moriuntur. 2. Prorrhet. text. 36.*

Significat enim sanguinis biliosi copiam in pectus effusam,



## 68 Institutiones Medicæ, Lib. II. Sect. III.

effusam, quæ dolorem & febrem acutam pariat: his si torpor & veluti totius corporis exsolutio adjuncta sit, ostenditur jam collabi facultatem animalem, cerebro per consensum graviter affecto.

*In acutis febribus convulsiones, & circa viscera dolores fortes, malum.* Aph. 66. sect. 4.

Quemadmodum convulsiones in febribus acutis fiunt à calida & sicca intemperie nervos exsiccante & distendente: Sic etiam in eodem affectu dolores fiunt intra viscera propter incendii vehementiam atque siccitatem. Et quò fortiores sunt hujusmodi dolores, eò impensius causæ magnitudinem ostendunt, atque adeo majus periculum. Fiunt etiam dolores intra viscera, propter inflammationem, vel erysipelas, vel fortem obstructionem, vel abscessum. Sed de his non loquitur Hippoc. *hoc Aphor.* Quamquam non minus sit in iis periculum, sed non habent necessariò comitem convulsionem, & agitur hîc de febribus primariis, non de symptomaticis; quæ dictos affectus comitari solent. Hujusmodi dolorum exemplum habetur 1. *Epid. sect. 1. Ægr. 11.* Ubi Dromeadæ conjux febre acuta laborans, primâ die cœpit dolere circa hypochondrium. Tertiâ super meridiem supperriguit, febris acuta, urinæ subtiles, hypochondrii dolor, sexta verò interiit.

*Quæ ex dolore dorsi principia morborum ducuntur, difficilia sunt.* 1. Coac. cap. 12. Aph. 5.

Nam in febribus plerumque lumborum dolores atque gravitates fiunt ex pondere peccantis materiæ, illabentis in venam cavam, quæ dorso & lumbis adjacet, eaque materia succensa, dolores & ardores lumborum excitantur, qui periculosum morbum ostendunt, tum propter materiæ morbificæ copiam vel acrimoniam, tum etiam propterea, quod facilis sit materiæ morbificæ recursus ab illis locis ad partes principes. Adde quod calor hepatis & renibus propter viciniam communicatus, varia symptomata producat.

*Dolores partium ignobilium, in principio apparentes, aut cum aliis malis signis, lethales.*

Quemadmodum antea dictum est, hujusmodi dolores esse salutes, cum die critico contingunt, & signis concoctionis, propterea quod significant naturam sese exonerare ad partes ignobiles; sic contrâ, si in principio contingant, in quo nulla potest fieri à natura expulsio, salutaris aut etiam aliis temporibus cum aliis malis signis, mortis periculum minantur. Sic apud Hipp. 1. *Coac. Aph. 13.* manuum ac pedum labores terrifici, nec à genuum dolore levatio ulla sperabilis. Hæc sententia confirmatur historia luculenta, quæ habetur 3. *Epid. sect. 3. Ægr. 5.* in Lariffa Calvo femur dextrum caluit repente, eorum autem, quæ adhibebantur nihil juvabat, perseveravit dolor usque ad tertiam, & quarta extinctus est.

*Dolores, qui primò à longinqua parte incipientes postea ad viscera ascendunt, mali.*

Ostendunt enim humores ad nobilia membra transfluere, quod confirmavit Hipp. 3. *prog. Dolores*, inquit, *qui cum febre fiunt circa lumbos & inferas sedes, si præcordia attigerint, inferas relinquentes sedes, exitiales admodum sunt.* Et 1. *Coac. 1. Aph. 23.* *Terrifica etiam est doloris à femore sursum irruptio.* Et *Aph. 76. ejusdem capituli: doloris acerbitas paulisper in jugulo fixa si ad superiora vertatur, mortiferum affert malum.*

*Dolores ignobilium partium, qui citò evanescent, atque occultantur sine causa manifesta, periculosi.*

Sine causa manifesta occultari dicuntur, cum sine Medici auxilio, evacuatione vel abscessu, subito desinunt. Vel enim significant mentem ægrotare, quæ dolorem non sentiat, vel materiæ metastasin ad interiora; vel partis corruptionem, in qua sensus perierit. Sic in prædicta Calvi historia, dolor femoris die tertia occultatus est propter metastasin

materiæ ad cerebrum; vel etiam propter delirium dolorem non sentiebat, hæc sunt verba Hippocratis, *Tertia die femoris quidem dolor cessavit, alienatio verò mentis, & turbatio, & multa jactatio: Quarta circa meridiem extinctus est.*

*In quocvis morbo si æger facile surgat, & erigat se, si de latere in latus facile convertatur, salutare; si contra vix sese commovere possit, malum.* Morus.

Quemadmodum cujuslibet functionis integritas leviores morbum ostendit, sic inter animales ea, quæ motum voluntarium spectat, si parum læsa sit, bene sperandum est contrâ verò, si valde labefacta sit, ut vix ægri sese commovere valeant, non caret periculo.

*Multa corporis jactatio, anxietas, & inquietudo in febre acuta, mala.*

Ostendit enim humorum feritatem & turgescentiam, qui cum tenues sint, valde mobiles & vehementer in corpore agitentur; sit ut maximum immineat periculum, ne in partes principes irruant, & perniciosum aliquem affectum producant. Sic apud Hipp. 3. *Epid. sect. 2. Ægr. 12.* Mulier, quæ decumbibat in medio foro, statim incipiens siticulosa anxiosa. Septimâ supperriguit, febris acuta, itis, multa jactatio. Octava; circa meridiem siticulosa, comatosa, anxiosa. Decimaquarta mortua est.

*Illam demum ratio decumbendi est optima, quam unusquisque servat, dum valet bene.* Hipp. 3. *Coac. tract. 1. Aph. 9.* Decumbens.

Ille autem decubitus sanorum similis describitur ab eodem Hipp. 1. *progn.* his verbis: *Deprehendendus est æger decubens in latus dextrum; vel sinistrum, brachiis, cervice, & cruribus paululū reductis, & reliquū corpus molliter jacens.* In hoc enim corporis situ omnibus membris quies comparatur, & omnes muscoli relaxantur, tum respiratio liberior efficitur atque somnus placidior obtinetur. Si igitur æger, morbo acuto laborans, talem decubitum observet, signum est insigne vegetæ facultatis: quæ alacriter & sine calore corporis onus portat, & facillimè gubernat.

*Gravitas totius corporis, manuum item ac pedum, pestifera.* Hipp. 3. *Coac. tract. 1. Aph. 3.*

Totius corporis gravitas cognoscitur ex eo, quod æger in lecto vix se commovere queat, & ad latera convertere, & quando à ministris movetur, plumbeam molem atque sarcinam repræsentet. Manuum verò ac pedum gravitas ex eo facile apparet, quod ad cibum potumque capiendum, aut alia quævis opera manus ægrè attollere valeat; aut si, cum ægre tolluntur, contremiscant, vel si à Medico sublata sursum deinde demissæ, lapidis instar decendant. Pedum verò gravitas cognoscitur, quando extensi, & minimè reflexi, ad extremam spondam delabuntur. Hæc omnia indicia sunt maximè debilitatæ, ac penè emorientis facultatis.

*Supinum autem jacere extensis cruribus, manibus, & cervice, malum.* Hipp. 3. *Coac. tract. 1. Aph. 10. & 1. progn. text. 2.*

Magnam enim significat facultatis animalis imbecillitatem, quæ non possit corpus in alio situ continere. Ille autem decubitus supra spinam tum fit, quando corpus proprio pondere collabitur, ut in moribundis apparet, qui perpetuò supini jacere consueverunt: idque magis confirmatur ex membrorum extensione, quæ ab eorum gravitate procedit.

*Si seipsum æger continere non valens, subinde ad pedes delabatur, funestum.* Hipp. li. 3. *Coac. tr. 1. aph. 11.*

Significat enim virtutem animale esse propemodum extinctam, ut non possit corporis pondus regere aut sustinere, sed illud gravitate propriâ ad inferiora prolabatur.

*Si æger, acuto morbo laborans, hiante ore dormiat, funestum.* Hipp. 1. *progn. text. 20. & 3. Coac. tract. 1. Aph. 11.*

Fit enim oris hiatus, vel propter facultatis, maxillam moventis, imbecillitatem & exsolutionem; vel propter



## Cap. IV. De Signis Morbi Salut. &c. 69

propter ingens cordis & aliarum partium incendium : unde tam copiosi vapores effunduntur, ut ad continuam eorum exclusionem ægri hianti ore dormire cogantur. Fit autem illud præcipue in somno, quia tunc temporis calor partium interiorum intenditur, unde major fuliginum copia elevatur. Si autem æger non solum in somno ; sed etiam in vigilia hianti ore consistat, multò magis funestum est. Adverte tamen, quosdam ex consuetudine, etiam in sanitate, hianti ore dormire, quod si Medico innotescat, nullum inde prognosticum elicere oportet.

*In ventrem cubare, qui non est solitus ita dormire, malum. Hipp. 2. Prorrh. text. 9. & 3. Coac. tr. Aph. 13.* Nam præposterus ille decubitus, aut delirium & errorem mentis aut gravem aliquam circa ventris sedes affectionem significat.

*Sin autem nudis pedibus, nec adeò calentiùs deprehendatur jacens, tum manibus & cervice, & cruribus item disjectis inæqualiter, atque nudis, pestiferum : anxietudinem enim denuntiat. Hipp. 3. Coac. tract. 3. Aph. 14.*

Quando ægri in summo exacerbationis febris rigore, toto corpore valde incalescentes, corpus aut membra denudant ad captandum frigus, nihil est sinistri iudicii. At si nulla cogente necessitate, & corpore satis temperato existente, membra denudaverint, & totum corpus hinc inde agitaverint valde periculosum est. *Alysimon enim*, inquit Hipp. seu anxietudinem significat. Illius autem *ἀλυσμὸς* duplex omnino causa est ; una quidem stomachi proritatio atque morsus, à feritate humoris cum æstu ; altera autem, virtutis oppressio à corporis gravitate, ut nulla locatio in ea anxietudine sit gratiosa. Causæ utriusque signa sunt syllogistica prioris quidem nausea & vomendi appetitus, alterius autem crebra jactatio, moræ impatiens, sine nausea. Attamen præcipua jactationis causa est virtus languida & oppressa, nudandi verò corporis febris ardens & lipyria.

*Perniciosum etiam est, pervolvere se ad margines lecti, ac primum pedes excludere, deinde corpus erigere, & nisi cohibeatur vel excidere, vel surgere.*

Obscurum enim delirium ostendit, & adeò funestum, ut testetur Holerius in suo ad Coacas prænotiones commentario, se ex hoc signo, qui convalesceret, vidisse neminem.

*Quicumque ægrotantes erecti & sedentes manere desiderant in morbi acuti vigore, & potissimè in peripneumonia, periclitantur. Hipp. 3. Coac. tract. 1. Aph. 16.*

Illud enim vel instantem phrenitidem minatur, propter quam ira exsiliunt, vel inconditè jactantur & sine fructu ; vel indicat magnum cordis incendium, quod hoc modo per liberiores aëris inspiratum sedare cupiunt ; vel denique magnam partium spiritalium oppressionem, ab ingenti inflammatione easdem occupantem, ut ægerimè respiratio exerceri valeat, nec nisi corpore erecto.

*Quicumque ægrotantes manus in vanum jactant, festucas carpunt, floccos à vestibulis aut paleas à parietibus evellunt, lecti stragula quasi sarcinas colligunt lethale. Hipp. 1. progn. text. 23.*

Sunt enim hæc symptomata imaginationis læsæ & phrenitidis indicia maximè lethalis. Sic apud eundem Hipp. 3. *Epid. sect. 3. agr. 15.* in Thaso Dealcis uxor principio contegebatur, & usque in finem semper taciturna, manibus palpabat, evellebat, scalpebat, floccos legebat ; vigesima prima interiit. Sed dubium est, quomodo Hipp. symptomata lethalia pronuntiaverit, cum Gall. 4. *de locis affect. c. 2.* de se ipso narret ; cum laboraret febre ardente, animadvertisse, se festucas colligere, & floccos evellere, amicisque præcepisse, ut curarent, ne in phrenitidem laberetur ; à quo tamen morbo ipse convaleuit. Dicendum est, hujusmodi symptomata vel fieri in

vera phrenitide, & cerebro essentialiter affecto ; vel per consensum à vaporibus ad cerebrum elevatis, à quibus paraphrenitis solet generari : Si primo modo lethale est ; si secundo, minimè, licet sit indicium futuri majoris mali.

*Quibuscunque morbo jam fractis atque extenuatis tremores accidunt, funestum. Hipp. 3. Coac. tract. 2. cap. 4. Aph. 63.*

Tremor perpetuò fit, docente Gal. *lib. de tremore, Tremor rigore, palpitatione & convulsione*, à virtutis animalis imbecillitate, quæ vel fit ab oppensione, vel ab exsolutione. Quæ ab oppensione fit, etiam si periculum minetur, non tamen lethalis est, quia oppressio illa, quæ fit ab humorum multitudine, vacationibus auferri potest. At tremores, qui in principio morbi contingunt, ab oppensione plerumque fiunt ideoque non semper lethales sunt, ut patet exemplo Pythonis apud Hipp. 3. *Epid. 3. sect. 1.* Ægr. qui ab initio morbi tremorem in manibus patiebatur, ab eo tamen liberatus est. Cum verò tremor in morbi progressu contingit, ægro jam debili & extenuato existente, non est dubium quin ab exsolutione procedat : ideo proximam mortem significat.

*Febrem convulsioni supervenire melius est, quam febre convulsionem. Aph. 29. sect. 2.*

*Convulsio*, ex eodem Hipp. aut ex repletione aut ex inanitione fit. Cum igitur aliquem sanum contigerit repente convelli, hujusmodi convulsionem fieri ex repletione est necessarium : tunc enim nervi replentur frigidis & glutinosis humoribus, unde convulsionem patiuntur. Hisce igitur febris superveniens, magna ex parte solita est calefacere, extenuare, & digerere, atque adeò solvere convulsionem. Si verò in febribus convulsio contingat, ut plurimum ea fit ab inanitione & siccitate, quæ à febre ardente, & exurente producitur : quod quidem maximum est malum ac penè insanabile, quoniam longum tempus exigitur ad siccitatem nervorum removendam ; morbi autem acerbitas tempus non expectat, quin citò vires dissolvit & exitum affert.

*Convulsionem, quæ in principiis morborum acutorum apparent, minus periculosa, quàm quæ in statu contingunt.*

Non omnis convulsio, quæ febribus superveniet, lethalis est ; sed interdum minus periculosa, si in principio contingat : tunc enim multitudinem humorum significat, quæ partes nervosæ contunduntur seu convelluntur. Et multò etiam minus periculosa esse solet, si non diu perseveret : quia à stabili causa tunc minimè producitur, ostenditque interdum translationem materiæ morbificæ à genere venoso in habitum corporis factam per concussionem & violentam corporis commotionem, quæ in convulsione fit. Sic apud Hip. 3. *Ep. sect. 3. Agr. 11.* in Thaso mulier morosa, ex mœrore cum occasione excitata degens, evasit vigil. & cibum averfians & sitibunda erat, & anxiosa : prima inchoante nocte timores, sermones multi, ægritudo animi, febricula tenuis ; manè convulsionem multæ obloquebatur, obscœna dicebat, multi dolores, magni, continui : secunda die per eadem, nihil dormivit, febris acutior. Tertiâ convulsionem quidem defecerunt, sopor autem & delatio in somnum, & rursum expergefacta exsiliit, continere se non poterat, obloquebatur multa, febris acuta, ad noctem verò hanc sudavit multa calida per totum, sine febre dormivit : omnia intelligebat, judicata est. Circa judicationem verò muliebria multa descenderunt.

Ex hac historia colligitur, convulsionem in principio apparentem fuisse ex repletione, non solum Galeni sententia, in *commentario hujus loci*, ubi dicit hanc mulierem passam esse suppressionem mensium sed etiam ex vacationibus, per quas liberata est, nimirum per sudores copiosos & universales,



nec non per copiosum mensum profluvium, iuxta hoc commune axioma: *Morbi, qui ex repletione fiunt, inanitione sanantur.* At verò si in statu morbi appareat convulsio, magis periculosa est; vel enim à siccitate fit per febrilem adustionem: introducta, vel à transmutatione humoris morbifici ad partes nervosas.

Quæ à siccitate fiunt, omnino perniciosæ & lethales habendæ sunt; quæ verò à permutatione, sunt aliquando sanabiles, ut quæ ex moribus oris ventriculi proveniunt, & in hysteris scæminis, & quæ criticè accidunt. Attamen perpetuò difficiles esse solent, & valde periculosæ, ut videre est in historiis, quæ proponuntur apud Hipp. in Epidem. Nam in 1. *Epid. sect. 1. ægr. 4.* in Thaso uxor Philini febre acuta laborans, post varia symptomata, octava die superriguit, convulsiones multæ cum dolore: non à convulsiones, undecimâ urinam reddidit cum convulsionibus affatim multam. Circa verò decimam septimam existens, voce privata est. Vigesima interiit. Item *ægr. 8. ejusdem sect.* Erasinus, qui habitabat ad Bootæ torrentem, ex gravi morbo quinta die interiit, circa solis occasum. Huic autem, inquit Hipp. *convulsiones mulie cum sudore circa mortem contigerunt.* Item *ægr. 11. ejusdem sect.* Dromeadæ conjux, post varia symptomata, sexta die manè superriguit, velociter autem incaluit, sudavit per totum, extrema frigida, deliravit. Respiratio magna, rara, paulò post convulsiones à capite incœperunt, & celeriter interiit.

Denique 3. *Epid. sect. 2. ægr. 4.* in Thaso Philistes febre acutissima laborans, quarta die convulsiones passus est, quinta manè extinctus est.

*In febribus acutis convulsiones, & circa viscera dolores fortes, malum.* Aph. 66. sect. 4.

Convulsionem in febre acuta esse malam, supra ostensum est in expositione *Aph. 26. sect. 2.* At si dolores fortes viscerum ipsi conjungantur, pessima sine dubio est. Fiunt enim illi dolores, aut ob ingentes in illis partibus inflammationes, aut ob calidam siccamque intemperiem ab ardore febrili impressam, quæ maxima esse debet, ut tam insignes dolores possit concitare, atque adeò interitum ægro minari: ut videre est in historiis supra propositis uxoris Philini, Erasini, & Dromeadæ conjugis, illi enim ægotantes non solum convulsiones, sed etiam hypochondriorum dolores patiebantur, & de medio sublati sunt.

*Quæ in phreniticis convulsiones fiunt, proximum exitum significant.*

Gal. 12. *meth. cap. ult.* se nullum horum convulsorum sanatum vidisse testatur, neque alium quempiam narrantem idipsum audivisse. Etenim ab inflammatione cerebri, siccatis nervis, hujusmodi convulsio exoritur, quæ idcirco incurabilis est.

*In pueris convulsiones minus periculosæ, quàm in adultis.*

Quia, ut refert Gal. *comm. in 3. Aphor.* pueri magis abundant crudis humoribus, unde fit convulsio à repletionem, quæ minus periculosa est illa, quæ fit ab inanitione, qua adultiores frequenter laborant, tum quia pueri infirmas habent partes nervosas; ideoque à leviori causa convulsione afficiuntur.

*Quicumque tetano corripuntur, quatuor diebus pereunt: si verò hos effugerint, sani fiunt.* Aph. 6. sect. 5.

Tetanus fit ex emprosthotono, id est, ad anteriora tensione, & opisthotono, id est, extensione ad posteriora. In eo enim fit musculorum antagonistarum æqualis convulsio, quæ ideo naturam tam vehementer affligit, ut eos labores diu tolerare nequeat, præcipuè quando totum corpus, & maxime cervix obripuit. Tunc enim præter dolores acerbissimos, quibus vires citissime dissolvuntur, diaphragma etiam per consensum afficitur: quandoquidem à quarta vertebra cervicis producuntur nervi ad diaphragma; sicque cervice convulsionem

patientem, respiratio impeditur, & suffocati moriuntur intra quatuor dies. Si verò hos effugerint, mitescens morbo, & dissoluto per judicationem, quæ quarto die contingit in morbis extremè peracutis, à gravi illo morbo liberantur.

*Convulsio ex vulnere lethalis est.* Aph. 2. sect. 5.

Convulsio vulnere succedit propter quatuor causas. *Primò*, quando vulnus in magnas incidit venas & arterias, & sequitur magna hæmorrhagia, à qua convulsio & animi deliquium; sed ab hac convulsione & syncope non moriuntur. *Secundò*, quando vulnus infligitur in nervosum genus, cujus vulneris ratione sequitur convulsio partium nervosarum, qui dicitur spasmus. *Tertiò*, quando in vulnere fit inflammatio, quæ si ad nervos extendatur, fit convulsio. *Quartò*, quando non bene purgatur ulcus, aut cum ante tempus clauditur: aut vulneris orificium nimis angustum est, ut in punctura nervi; tunc enim sanies acris retenta vellicat nervos, & convulsionem excitat. Lethalis autem est hæc convulsio, quia cerebrum in consensum trahitur, nervis vehementer affectis, & quia putris sanies, in vulnere retenta, interdum transmittitur in partes nobiles. Lethalis etiam est hæc convulsio, inquit Gal. *in comm. hujus aph.* non tanquam ex necessitate, ac semper mortem afferens, sed tanquam admodum crebrò. Quod ipse Hipp. agnovisse visus est, qui in *Coacis prænotionibus*, eandem sententiam proponens, loco *θανάσιμον*, scripsit *κακόν*.

Confer Sennert. de vulnere lethali.

*A copioso sanguinis fluxu convulsio, aut singultus, malum.* Aph. 3. sect. 5.

Convulsio ad immodicam sanguinis evacuationem sequitur, vel quòd venæ & arteriæ cum moderata sanguinis, quem continent, proportionem destitutæ depleantur, depletæ contrahantur, & contractæ contrahant nervos; vel quòd venæ exhaustæ à vicinis partibus trahunt, & velut mutuum beneficium reposcunt, indeque exsiccatae longâ profusione sanguinis, à nervis alimentum repetunt: quo fit, ut nervi siccati ac contracti, ad suum principium, quasi suppetias petentes, convellantur. Vel quia venæ & arteriæ immodicè exhaustæ, totum spiritum, nedum sanguinem ab extremis partibus intrò rapiunt, unde refrigeratio nervis subito accidit, ac proinde convulsio extemporanea est, non diuturna, non à causa præter naturam, sed potius orta ab agente natura, & noxam ex inanitione depellente: ideoque supra dictum est, convulsionem ex hæmorrhagia non esse perpetuò lethalem, quamvis tamen periculosa sit, cum nulla convulsio ab inanitione facta careat periculo.

*Superpurgationi convulsio aut singultus superveniens, malum.* Aph. 4. sect. 5.

In superpurgatione humores non solum inutiles, sed etiam utiles vacuantur, ideoque convulsio quæ illi supervenit, ab inanitione est; atque adeo periculosa. Ita *Aph. ejusdem sect.* *Convulsio ab helleboro lethalis est*, propter nimiam purgationem, quæ assumpto helleboro succedit.

*Ex vigiliis convulsio & desipientia, malum.* Aph. 18. sect. 7.

Vigiliæ, inquit Gal. *in comm.* ex iis sunt quæ maxime evacuant & exsiccant, atque adeo convulsionem ex siccitate faciunt: ac præterea, quia in longis vigiliis biliosior redditur sanguis, & per consequens aptior stimulis partibus nervosis.

*Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur.* Aph. 63. sect. 4.

Non solum in quotidianis, sed etiam in tertianis & quartanis circuitibus verum est, febres solvi præcedente rigore; indeque colligitur, rigores febrium intermittentium carere periculo, & non esse pertimescendos.

*Rigores in febribus continuis supervenientes die critico,*



*tritico, cum præcedentibus coctionis signis & insigni evacuatione subsequente, salutare.*

Bonæ evacuationes, ejusmodi rigores subsequentes, sunt sudores copiosi, aut vomitiones, aut dejectiones, aut hæmorrhagiæ, ex quibus febres aut prorsus tolluntur, aut maximè minuuntur. De quibus Hipp. *Aph. 58. sect. 4. A febre ardente habito, rigore superveniente, fit solutio.* Quod ita intelligendum est, si nimirum cum prædictis conditionibus contingat. Ita apud Hip. 3. *Epid. sect. 2. Agr. 5.* Chæriónem, qui decumbebat apud Demænetum, ex portione febris magna corripuit: tertiâ die febris acuta, capitis tremor maximè verò labii inferioris, paulò post autem rigor, convulsiones, in omnibus deliravit, nocte molestè. Quartâ quiete, modicum dormivit, obloquebatur. Quintâ laboriosè, omnia exacerbata sunt, delirium, nocte molestè, non dormivit. Sextâ per eadem. Septimâ, superriguit, febris acuta, sudavit per totum, judicatus est; huic usque in finem ab alvo dejectiones biliosæ, paucae, sinceræ; urinæ tenues, boni coloris enæorema nebulosum habentes. Circa octavam minxit melius, magis colorata, habentia sedimentum album, exiguum: mente constabat, sine febre, intermisit. Circa verò decimam quartam febris acuta, sudavit. Decima sextâ superriguit, febris acuta, sudavit, sine febre judicatus est. Urinæ post recidivam & crisin melioris coloris, sedimentum habentes, neque deliravit in recidiva. Decima octavâ calefactus est parum, sitivit, urinæ tenues, enæorema nebulosum, parum mente motus est. Circa decimam nonam sine febre, collum dolorosè habebat, in urinis sedimentum, perfectè judicatus vigesimâ. In hoc ægrotante rigor primum accidit die tertia sine fructu, tum quia illa dies rarò decretoria est, tum quia nulla tunc apparebant signa concoctionis, neque ulla sequuta est excretio: atque ita omnes conditiones boni rigoris supra propositæ defecerunt. At qui septimo die contigit rigor, fuit salutaris, qui die critico apparuit, & præcedentibus coctionis signis: urinæ enim erant quidem tenues, sed boni coloris, enæorema nebulosum habentes, & cum evacuatione copiosa, sudavit enim per totum; ideò die octavâ, quæ crisin consequuta est, fuit sine febre, attamen morbus non omninò sublatus est, sed valdè imminutus: Diximus enim supra, per hujusmodi rigores febres vel auferri, vel maximè imminui; & non sublata ex toto causâ morbificâ, per dictum sudorem: contigit recidiva, quam rigor denuò subsequutus est die decima septimâ, dictis conditionibus stipatus, nimirum sudoribus, & urinis concoctis; ideò febris expers iterum evasit, & vigesima die perfectè judicatus est. In hac etiam historia advertendum est, quod notatur ab Hippocrate, in utroque rigore, qui septimo & decimo septimo die contingit, febrem incanduisse: dicit enim utrobique, *superriguit, febris acuta*; quandoquidem in omni rigore critico quantò magis corpus incalescit, tantò melius perfectiusque judicium sequitur; ostendit enim naturam esse robustam, ac potenter insurgere ad materiæ morbificæ exclusionem.

*Rigores, à quibus corpora minimè aut parum incalescunt, mali.*

Naturam enim prælanguidam significant, & adversus causam morbificam insurgere nequeuntem, unde Hipp. in 1. *prorrh. A rigore refrigeratio non recalescens, malum.* Id enim, ut scribit Gal. in *comm.* caloris extinctionem significat. Quod idem Hipp. observavit in 3. *Epid. sect. 2. Agr. 12.* ubi mulier, quæ decumbebat in mendacium foro, die septima superriguit, febris acuta, sitis multa, jactatio, circa vespertam sudavit, per totum frigida; refrigeratio extremorum, non amplius recalescebat, & rursus ad noctem superriguit, extrema non recalescebant. Decima quarta mortua est.

*Si rigori aut horrori, die critico venienti, coma superveniat, mors expectanda.*

*Rigores, qui die critico non contingunt, aut quos nulla, vel mala sequitur evacuatio, perniciosi.*

Sic in prædicta muliere, quæ in mendacium foro habitabat, rigor sæpè apparuit; vel diebus non criticis sine ulla excretionem, vel cum rigido sudore, quæ mala est evacuatio. Sic etiam *historia undecima, sect. 1. lib. 1. Epid.* Dromedæ uxor tertio die superriguit cum sudore universali, sed frigidus. Sexto iterum superriguit cum sudore universali, quem tamen sequuta sunt extremorum frigiditas, delirium, convulsiones: & eodem die interiit, quia ille rigor die critico non contigit, sed sexto, qui tyrannus appellatur à Galen. ut meritò dixerit Hipp. *Aph. 29. sect. 4. Quibus febricitantibus sexto die rigores sunt, difficile judicium sequitur.* Obijci tamen potest, Larissæam virginem, cujus historia describitur in 3. *Epid. sect. 3. Agr. 12.* die sexta, adveniente rigore, quem copiosa hæmorrhagia & sudor universalis calidus exceperunt, perfectè fuisse judicatum. Cui respondendum est cum Gal. in *commentar.* hoc esse ex miris exemplis, quibus observavit Hippoc. diebus imparibus fieri interdum judicationes, quod quidem tam rarò contingit, ut communem bonarum crismum regulam infringere non debeat. Adde quod menstrua, tum primum ei profluentia, solutionem morbi quamplurimum adjuvarunt.

*Si rigor incidat, febre non intermittente, ægro jam debili, lethale est.* *Aph. 46. sect. 4.*

Gal. in *comment.* dicit non idem esse, si quis dixerit, si inciderit, & si incidat: verbum enim *inciderit*, unum significat rigoris insultum; *incidat* verò plures: Semel igitur rigore incidente, nunc bonum nunc malum esse potest, ut ex præcedentibus theorematis apparet; sæpius verò fieri rigorem, febre non deficiente, cum alioqui bonum non sit, in virium imbecillitate est perniciosum. Nam si aliqua evacuatio rigorem subsequatur, quæ nullam faciat intermissionem, propter utrumque dissolvi hominem par est, tunc quia vis imbecillis ferre non potest rigoris agitationem, tum quia ab evacuatione dissolvitur. Si verò solus accidat rigor, nulla evacuatione subsequente, utroque modo casus caret bonitate: nam tanquam mala causâ vires hominis tentat, & malum signum erit, illarum indicans imbecillitatem, quæ solita erant noxios humores in rigoribus evacuare, nunc verò hoc non possunt efficere.

*Rigores in morbo diuturno sæpe advenientes, vel potius horrores sine ordine & typo, suppurationem internam sæpe significant.* Hipp. in *Coac.* Vel significare possunt humorum pravorum copiam, à quibus vapores acres excitari solent. Vide Hippoc. 1. *Coac.* *Aph. 10. 13. 16.*

*Horrores, qui in principio febrium acutarum frequenter apparent, mali.*

Maximam enim humorum pravitatem ostendunt partes sensibiles vellicantem, & naturæ infirmitatem, humores movere frustra tentantis. Hujusmodi horrores apparere solent plerumque in principiis febrium malignarum & pestilentium.

*Crebri ex lumbis horrores cum cita caloris vicissitudine, calamitosi: nam acerbissima urinæ suppressio denuntiatur, atque his exsudare, pestiferum.* 1. *Coac.* *Aph. 8.*

Significat enim inflammationem spinalis medullæ, aut membranarum ejus, quæ partes vi caloris præternaturalis exardent, nativi autem caloris paupertate refrigerantur, quemadmodum fit in repentina & frequenti partium extremarum in utrumque mutatione: In empyemate etiam hoc non rarò contingit. Succedit verò urinæ suppressio, quia à frequenti rigore calor vesicæ natus extinguitur, atque ita virtus illius expultrix labefactatur, & sensus irritationis adimitur.



## 72 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

*A sudore horror non bonum. Aph. 4. sect. 7.*

Judicatoria, quæ non judicant, mala sunt. Sic sudor die critico erumpens, si ægrum non juverit, sed inde horror sequutus sit, malum est signum. Significat enim, vel humores tantum utiles vacuatos esse per sudores, & inutiles ac noxios intus manere; vel portionem tantum hujusmodi pravorum humorum per sudorem esse vacuatam; reliquum vero intro recurrere, ac partes sensiles vellicare, horroremque efficere. Indicatur itaque vel naturam esse debilem, quæ non possit materiam morbificam excutere, vel humores esse contumaces; qui naturæ conatum eludant.

*Sternu-  
ratio.*

*Observatum est si ægrotans vir semel duntaxat sternutet, quod is morbi ferocia succubiturus sit; si vero bis sternutet, profligato morbo revaliturus. Contra in feminis, si quæ graviter habens bis sternutat, funestum & exitiale; si semel sternutat, salubre signum existit. Forest. observ. 487.*

*Coryzas & sternutamenta in morbis pulmonum præcessisse, vel subsequi, malum. In aliis vero morbis etiam exitialibus, & sternutamenta spem solutionis adferunt. Hipp. in prognost.*

In phthisi, pleuritide, & peripneumonia, ex concussione ista sternutantis cerebri, lacerantur & violenter divelluntur partes thoracicæ, unde inflammatio valde augetur, & nulla propterea fit materiæ morbificæ vacuatio. In aliis vero morbis causa morbifica potest dissipari & excuti vi naturæ adversus eam motu illo violento insurgentis; ideoque sternutamentum significat naturam jam vires resumere & ad expellendum excitari, unde convalescentiæ initium conjectari licet, Gal. in comm. hujus loci, sternutationem sine rheumate in declinatione, vel postquam præcessit ægritudo, semper esse bonum signum, etsi ægritudo sit periculosa, affirmat.

*Mulier, quæ hysterici tenetur passionibus, aut difficulter parit, superveniens sternutatio bonum. Aphorism. 35.*

Sternutamentum in hysterici suffocationibus, partu difficili, & secundinis, retentis convenientissimum est, ut signum, & ut causa. Ut signum, quia naturam ostendit propriarum meminisse motionum, & quæ prius torpebat, excitari & reviviscere, quandoquidem aliquam ejicit superfluitatem. Ut causa: quia vehementiore concussu atque fervore partim quidem naturam excitat, partim vero excernit quæ partibus corporis infixæ adhærent.

*Bona & facilis respiratio maximam habet vim ad salutem in morbis acutis. Hipp. in progn.*

Nam, ut docet Gal. in commen. bona respiratio thoracem, cor, pulmones, pleuram diaphragma, & denique omnes partes respirationi inservientes bene valere significat. Iis autem bene valentibus, nullum ex morbo acuto debet timeri periculum; nisi ille magnus sit & pestilens. Febres enim hujusmodi ita sæpe per insidias corpus ingrediuntur, ut nulla in respiratione læsio appareat, quamvis in progressu lethaliter afficiant.

*Ubi febre non intermittente difficultas spirandi & delirium acciderit, lethale. Aph. 50. sect. 4.*

Quia duo vitæ principia scilicet Cor, & Cerebrum, vehementer læsa sunt, & ad interitum consentiunt. Utraque autem passio, nimirum delirium & difficultas spirandi, diu durare debent, ut lethalia dici possint: nam in perturbatione critica utrumque salutariter interdum contingit.

*Respiratio magna & rara cum febre acuta pessima est.*

Delirium enim vel præsens, vel imminens ostendit. Mens siquidem valde occupata à multitudine specierum, quæ in delirio repræsentantur, facultatem musculos thoracis moventem alio avertit, ita ut non fiat respiratio, nisi maximâ cogente necessitate, unde rara efficitur, sed raritas illa magnitudine

compensatur. Eadem etiam ratione melancholici & amentes habent non raro hujusmodi respirationem magnam & raram, quia in profundis cogitationibus defixi, obliviscuntur respirare. Hujus autem respirationis magnæ & raræ periculum, in morbis acutis, colligere licet ex Hipp. 1. Epid. sect. 1. ægr. 2. Ubi Silenus, qui undecima die interiit, habebat à principio & per totum spiritum magnum & rarum. Item Ægr. 11. ejusdem sect. Dromeada conjux prima die circa hypochondrium anxiosa, horrida, inquieta, & sequentibus non dormivit, spiratio rara, magna, statim restricta. Sexta manè superperriguit, velociter autem incaluit, sudavit per totum, extrema frigida, deliravit, respiratio magna, rara. Paulò post convulsiones à capite inceperunt, & celeriter interiit.

*Magna & frequens respiratio periculosa.*

Magnum enim incendium significat & putredinem cordi partibusque vicinis proximam, quæ multa indigens ventilatione, magnam & frequentem respirationem efficit.

*Prava & frequens respiratio periculosa.*

Significat enim, teste Hipp. in Epidemiis, organi alicujus dolorem, quod animalis facultas, dolori providens, nolit partes illas, quæ sunt supra septum transversum, & respirationi inserviunt, plurimum dilatare quo minus doleant, ac motu violento. Idèò parvam efficit respirationem. Sed quia parva illa respiratio non sufficit incendio intus concepto ventilando, natura idcirco compensare cogitur quòd à magnitudine detrahit. Ille autem dolor, talem respirationem efficiens producitur ab inflammatione, abscessu, ulcere vel à copiosis, crudisque humoribus, quæ omnia periculum minantur.

*In febribus spiritus offendens, malum, convulsionem enim significat. Aph. 68. sect. 4.*

Per spiritum offendentem intelligit respirationem interruptam seu intercisam, quæ in medio suo subsistit. Idque potest contingere tum in inspiratione, & vocatur ab Hipp. duplex intrò revocatio, veluti super inspiratio, ut frequenter pueris plorantibus contingit: tum in expiratione, sed rarius, & vocatur ab Hipp. spiritus offendens, cum ad exteriora fertur. De utroque intelligendus est hic aphorismus, quod scilicet in febribus convulsionem significet, quòd nimirum muscoli ac nervi jam convulsioni parati, ita moveant thoracem qua dispositione insuper aucta, & plures occupante partes, manifesta convulsio hominem apprehendit.

*In acutis passionibus, quæ cum febre fiunt, luctuosa suspiria, mala. Aph. 54. sect. 6.*

Hic aphorismus superiori similis est in eo, quod per suspiria intelligenda sit illa respiratio interrupta & reduplicata, quæ supra fuit exposita: Nunc verò pejor & lethalis ut plurimum efficitur hujusmodi respiratio, quando luctuosa est, id est, cum luctu & gemitu quodam editur. Significat enim quandam dolorosam dispositionem, vel potius humoris atrabilarii copiam, in mœrorem quandam inducens, hujusmodi etiam luctus, nolentibus ægris exprimere solet.

*Nocturna dyspnœa in chronico morbo hydropem minatur Plater.*

*Respiratio, quæ maximè naribus editur, in quæ pinna narium moveri videntur, exitiosa.*

Significat enim omnimodam virium infirmitatem. Nam progressu jam morbo, & non sufficiente ad respirationem diaphragmate, veniunt in subsidium muscoli intercostales; ac si ne hi quidem suffecerint usui, cartilagine illæ à natura deducuntur, plus aëris attrahere conante: sed frustra fit ille conatus, haud secus quàm hiatus, ut in morientibus fit.

*Frigida spiratio in morbis acutis proximam mortem significat.*

Ostendit

*Actio-  
nes vi-  
tales.  
Respi-  
ratio.*



## Cap. II. De Signis Morbi Salut. &c. 73

Ostendit enim caloris innati extinctionis, & humidi primigenii consumptionem, ab urente calore.

*Pulsus magnus, vehemens, & æqualis, in quovis morbo salutaris esse consuevit.*

Significat enim facultatis vitalis robur, à qua reliquæ fulciuntur, ut causa morbifica facile devinci queat.

*Pulsus inconstans inæqualis, & languidus, pessimum eventum prænuntiat.*

Significat enim magnam pravorum humorum copiam, quæ naturam valde conturbet, unde illa inconstantia & inæqualitas in pulsu. Quod si virium infirmitas adsit, qui ex languido pulsu colligitur, non poterit grave illud onus excutere.

*Pulsu minutus & frequens, qualis est formicans aut præpós lethalis.*

Vires enim paulatim deficere, & in proximam ruinam delabi significant.

*Pulsus intermittens seu intercidens, perniciosus.*

Gal. 2. de prælag. ex pulsibus dicit, cum pulsu intermittente multos senes & pueros evadere. Juvenem verò ab eo incolumem se vidisse neminem: Et ratio hujus rei est; quia in juvenibus maximum à statu salubri recessum declarant: illi enim ob validum virium robur non nisi à fortissima causa in tales affectus incidunt, quæ difficile superari queat, imò potius ægrotantem obruat. At senes & pueri ob invalidum robur à leviori causa magis afficiuntur, quæ tamen facilius eliminari queat. Experientia tamen Gal. sententiæ refragari videtur, cum nullus ferè Medicorum reperitur, qui non viderit etiam juvenes nonnullos, cum pulsu intermittente liberatos. Ut autem Gal. autoritas defendatur; dicimus, pulsum intermittentem dupliciter fieri, vel cum æqualiter intermitte, ut scilicet inter duas intermissiones idem perpetuò sit pulsationum numerus; & ille pulsus intermittens est perpetuò lethalis, de quo Gal. sententia intelligenda est. Vel cum intermitte inæqualiter, & tunc ægri possunt liberari. Pulsus intermittens æqualiter significat constantiam causæ morbificæ, ejusque victoriam suprà naturam.

*In febribus pulsus, sanorum pulsibus similes periculosi.*

Nam febrem malignam & pestilentem significant, in qua sæpissime solent contingere, ut præter experientiam docuit Gal. 3. de prælag. ex pulsib. & tales pulsus fieri vult, quod in hujusmodi febribus præcipuè malignioribus, vel cordis substantia calidior fiat, humores autem contenti frigidiores, vel contra cordis substantia frigidior sit, humores autem calidiores; ex quibus contrarietatibus quædam veluti symmetria in pulsu exsurgit. Vel certè dicamus, in principio potissimum febris malignæ & pestilentis pulsus ferè connaturales apparere, quia cor magis afficitur à veneno, quàm à calida intemperie, quæ solet efficere insignes illas in pulsibus mutationes: cum tamen in progressu morbi pulsus frequens, parvus, debilis, ac diversus apparere soleat. Vide Horstium in observat. de peste.

### COROLLARIUM.

Reliqua repetantur ex Gal. luculentissime conscripta in lib. de prælagitione ex pulsibus. Sufficiat hic præcipuè & in praxi frequentiores pulsuum differentias annotasse.

*Bona & laudabilis in morbis appetentia, salutaris.*

Illà appetentia bona & laudabilis censenda est, quæ ad bene valentium appetentiam accedit, eique maximè est similis, quæ quidem optima est, juxta sententiam Hippoc. Aph. 3. sect. 2. In quibus morbo mente constare, & bene se habere ad ea, quæ offeruntur, bonum. Hinc enim facultatem naturalem, & partes illi servientes, ac præcipuè ventriculum bene valere colligitur.

Laz. Rinerii Opera,

*Dejecta omnino in morbis appetentia valde periculosa.*

Magnam enim à statu naturali perversionem significat, oriturque, ut docet Gal. in comment. in 3. Epid. aut à pravis malignisque humoribus, ventriculi orificium occupantibus, aut ab ipsius facultatis extinctione, cujus munus erat alimenti indigentiam sentire, idque consequenter appetere. Sic Hipp. in 1. Epid. de tabidis, in epidemica constitutione mortuis, ait: *Cibos quosvis perpetuo fastidiebant non sivebant.* Sic etiam Gal. in comment. in 3. Epid. multos se vidisse affirmat in quadam pestilenti constitutione, qui nihil quicquam ciborum assumebant & de medio tollebantur: quidam tamen, ut ipse ait, fortiores quippe, qui vim sibi ipsis afferentes cibum oblatum assumpserunt, superstites fuerunt. Ita apud Hipp. 3. Epid. sect. 1. Aegr. 2. Hermocrates, qui die 27. mortuus est, cibum aversebatur toto morbi tempore, & ultimis diebus ne degustare quidem poterat. Et sect. 2. ejusdem lib. Aegr. 6. Eurianaëtis filia abhorrebat omnes cibos toto tempore, neque appetebat quicquam sine siti, neque aliquid bibebat effatu dignum, ex quo morbo interiit post diem duodecimam.

*In morbo diuturno fastidium cibi, & dejectiones sinceræ, malum.* Hipp. Aph. 6. sect. 7.

Cibi fastidium per se ipsum pravum est signum in morbis diuturnis: (nam in iis, qui à talibus morbis sunt evasuri, contrarius affectus solet accidere vehemens scilicet ciborum appetentia) sed dejectiones sinceræ iis supervenientes deterius multò prælagium efficiunt, quandoquidem per sinceræ dejectiones intelligit Hipp. impermixtas aquosæ humiditati, quando solus humor suo sero destitutus ejicitur, sive is biliosus sit sive melancholicus: nam dejectiones hujusmodi exustam esse omnem naturam humiditatem à calore febrili demonstrant.

*In longis difficultatibus intestinorum cibi fastidium, malum: & cum febre, pejus.* Aph. 3. sect. 6.

Dysenteria fit ab humoribus acribus intestina exulcerantibus, primùm quidem summa superficie abrasa, progressu autem temporis profundiora omninò habent & putrida ulcera, quo maximè tempore etiam ventriculus, ipsis compatiens, non bene concoquit: qua offensione, magis ac magis ad superiora perveniente, quando os ventriculi unà afficitur, tum ægrotantes cibi fastidio laborant. Sunt quidem ab initio nonnunquam cibum fastidientes propter malos humores fluentes ab hepate, à quibus abraduntur intestina, præsertim cum hujusmodi humores biliosam naturam obtinent: nam pars eorum superflua ad os ventriculi effertur. In longis verò difficultatibus intestinorum, cum hic casus evenerit, mortem quandam ipsi advenisse ventriculo, compatiendi ratione significat, in quo omnino interiit appetentia, opus ad vitam necessarium. Si verò unà cum inappetentia febris adveniat difficultati intestinorum, est vel putredo aliqua circa ulcera, vel magna inflammatio, quorum utrumque admodum est exitiosum.

*Fames intensa, ac bulimia in morbis, mala.*

Vel enim appetitus ille depravatus sequitur evacuationes insignes, quas frustra magis illis repletionibus refarcire conatur; vel acrimoniam caloris immensi, velut fornacis, quæ omnia alimenta subito absorbit, & quasi in favillas convertit, ut in multis hæcticis macilentis videre est, in quibus etiam sæpe contingit hæc bulimia, propter insignes obstructions venarum mesaraicarum, quæ impediunt chylum commeatum ad hepar, unde nulla vel exigua fieri potest nutritio, quandoquidem illa chylola materia, cum non possit præterfluere ad hepar, in intestinis corrumpitur, & per alvum excernitur, unde fit ut hæctici hujusmodi perpetuò

K

&



## 74 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

& immedicabili alvi fluxu teneantur. Ideò partes suo genio defraudatæ, perpetuò trahunt alimentum ab hepate, hepar verò à ventriculo, ex qua tractione fit continuò in ventriculo, & præcipue in orificio illius superiori illa divulsio, quam fames necessario consequitur. Vel etiam appetitus ille intensus dependet ab humoribus acidis, ventriculi orificio affixis, qui perpetuò vellicant illam partem exquisitori sensu præditam. Hæc igitur fames immensa, ut est rara & portentosa in morbis, sic nihil boni indicare potest, ut est *Aph. 4. sect. 2. Non satietas, non fames, non aliud quicquam, quod modum naturæ excefferit, bonum.* Nam perpetuo nimia illa ciborum ingestio causa existit pessimorum excrementorum quæ in ægrotantibus colliguntur, ut est *Aphor. 17. sect. 2. Ubi cibus præter naturam ingestus est, ibi morbum facit.* Et ut habetur *Aph. 8. & 11. sect. Comedentes, & nihil proficientes, malo sunt loco.*

*Depravata appetentia, quæ pica seu malacia dicitur, in morbis chronicis, mala.*

Hujusmodi appetitus qui ad absurda aut aliena fertur, gravidis familiaris est, ob suppressionem mensium, quæ pravorum excrementorum multitudinem colligit, eorumque refluxum ad ventriculum parit; & in his non est valdè periculosus, quia partu omnia illa recrementa expurgantur. At in morbis chronicis pessimus habetur, tam ratione causæ quam signi; dum enim se ingurgitant cacochymis istis cibus, causæ morbificæ multiplicantur, & denotat eversionem temperamenti partium & humorum, propter quam similia illi expetere solent. Sapienter itaque dixit Hipp. *Aph. 28. sect. 2. paulò quidem deteriorem cibum, valdè expetitur, ægro quandoque concedendum, sed cum ea moderatione, ut non possit ratione quantitatis aut qualitatis graviolem illi noxam asferre.*

*Sitis præter rationem soluta in morbis acutis, malum.* Hipp. 1. prorrh.

Si enim non sit causa aliqua sitim sedans, ut fluxio pituitosa à capite, quæ ventriculum irriget: vel caloris nativi extinctionem significat, vel errorem mentis. Non minùs enim iis, qui sitiunt, & sitim non sentiunt, qui dolent & dolorem non sentiunt, mens ægrotare solet. Hoc theorema confirmatur historiis supra propositis, in dejectæ appetentiæ explicatione.

*Sitis inexhausta, quæ nullo potu expleri potest, mala.*

Summam enim indicat dyscrasiam, & intensissimum partium internarum incendium, aut humidi primigenii consumptionem. Sic apud Hipp. *in 2. Epid. Ægr. 1. Philiscus inter alia symptomata valdè siticulosus erat, & sextâ die obiit.* Ita & 3. *Epid. sect. 3. Ægr. 3. Pythion toto morbi decursu ingenti siti torquebatur, & decimâ interiit.*

*Depravata admodum sitis, quæ circa liquores absurdos & potui minimè idoneos versatur, mala.*

Nonnulli ægrotantes reperiuntur, qui neque aqua, neque syrupo, aut vino diluto, vel simili liquore consueto recreantur, sed alienam potionem expetunt, quæ parum naturæ & morbo consentanea est. V. g. qui acetum, aut succum limonum, aut aquam vitæ, aut alium quempiam liquorem potui parum idoneum bibere desiderant. At qui ita affecti sunt, in magno versantur vitæ periculo, quia natura tantum jam à suo limite recessit, ut non possit deinceps ad convenientem statum revocari.

*Si quis in laboriosa febre singultiat, morbo laborat pessimo.* 1. Coac. Aph. 47.

Fit enim ille singultus ab humoribus acribus & malignis, tunicam stomachi interiorem vellicantibus, & facultatem illius expultricem stimulantibus. Et dicit Vallesius se nullum vidisse servatum in extenuatis, aut febre ardente, vel maligna correptis, cui singultus supervenerit. Sic apud Hipp. 1. *Epid. sect. Ægr. 11. mulier, quæ in mendacium foro*

habitabat, die duodecima frequentes singultus patiebatur, & decima quarta interiit. Observavit Platerus, in febribus ardentibus supervenientem singultum, & perseverantem, plerumque mortis esse prænuntium: at in semitertiana febre eundem vidit non lethalem, Idem in dysenteria lethalem esse observavit.

*A vomitu singultus, & oculorum rubor, malum.* Aph. 3. sect. 7.

Duo hæc signa si vomitui superveniant in morbis acutis, & ad aliquod tempus perseverent; ideò lethalia habenda sunt, quia inflammationem cerebri vel ventriculi denuntiant: quæ inflammatio non modo ipsius singultus ac ruboris oculorum causa fit, sed & vomitus. Si enim vomitus cieretur ab acribus humoribus, os ventriculi ejusque tunicas mordentibus, expulsis per vomitum illis humoribus, cessaret vomitus & singultus, nec à vomitu ullus vapor acer ad oculos deferretur, qui oculos rubros efficeret. At cum vomitus non solum non profuerit, sed etiam post se singultum & oculorum ruborem invexerit, certissimum est, illa tria, vomitum, singultum, & oculorum ruborem pendere ab inflammatione cerebri, vel ventriculi. Cerebrum enim inflammatum sanguinem ad oculorum venulas exprimit præ copia, & effundit in extimam tunicam oculi, quam adnatam vocant; unde oculorum rubor: cui ventriculus consentiens per nervos qui à sexta conjugatione in ejus os feruntur, ab ea cerebri inflammatione facilè in vomitum ac singultum impellitur. Ventriculus quoque inflammatus vomitum, & à vomitu singultum, & una cum singultu ruborem oculorum invehit, facto concursu sanguinis fervidioris ad oculos propter maximum consensum, qui inter istas partes intercedit, quem facilè ostendunt suffusionum initia, imaginum ante oculos apparitiones, quæ plerumque vitiato ventriculo contingunt. Unde meritò Hip. *in libro de locis in homine, dixit à vomitu oculos maximè lædi.* Hujus singultus vomitui succedentis exemplum habemus in historia supra citata mulieris, quæ in mendacium foro habitabat, in qua ventriculi inflammationem ex pravorum humorum affluxu in illam partem fuisse genitam, verisimile est: nam octava die vomuit biliosa, exigua, subflava: nona vomuit exigua biliosa: undecima vomuit virulenta biliosa, superriguit non multo post, extrema frigida, ad vesperam sudor, rigor; vomuit multa; noctem laboriosè. Duodecima vomuit multa nigra, graveolentia, singultus multus, sitis, laboriosè: decimaquarta mortua est.

*A jecoris inflammatione singultus, malum.* Aph. 17. sect. 7.

Singultus tum jecoris inflammationi supervenit, ut docet Galen. *in comm. hujus aphorismi*, quando inflammatio auctior & deterior evasit. Tunc enim magna inflammatio in hepate eò usque accrevit, ut vehementer superiori ventriculo incumbat, ac singultum inducat. Inrò verò affluente materia nonnunquam inflammatio, aut erysipelas in ventriculo gignitur; sin minùs, ab ea ventriculi tunicis imbibita, morsus excitatur.

*In diuturnis levitatibus intestinorum superveniens Ructus acidus, qui priùs non erat, signum bonum.* Aph. 1. sect. 6.

Lienteria fit ut plurimum à frigida ventriculi intemperie, qua coctio ventriculi aboletur, & alimenta neque colore, neque odore, neque alia quavis qualitate mutata celeriter excernuntur. Si verò in hujusmodi lienteria jamdiu contracta ructus acidus superveniat, qui priùs non extiterit, bonum erit signum. Hinc enim apparebit, intemperiem jam incipere restitui, caloremque nativum iterum excitari, qui per talem lienteriam adeò debilitatus erat, ut ne tentaret quidem alimentum mutare. Licet enim ructus acidus



acidus insignem significet ventriculi refrigerationem; tamen flatus aliquos etfi acidus elevare, minoris perfrigerationis est, quam omnino nihil.

*Excrementa per oculos.* Quibus in febribus, aut aliis morbis voluntarie illachrymant oculi nihil absurdi est; quibus vero non voluntarie, absurdus. Aph. 52. sect. 4.

Lacrymæ voluntariæ dicuntur quæ à causa manifesta & externa, puta tristitia & mœrore, imò interdum latitiâ excitantur, & in iis nihil periculi. Involuntariæ verò vel fiunt ab inflammatione oculorum, aut acri in eisdem fluxione, & in iis etiam nihil est periculi: vel fiunt à perturbatione critica, & crisi per hæmorrhagiam præcipuè præfagiunt, quæ etiam nullum minantur periculum, & tales cognoscuntur ex præcedentibus concoctionis signis, & pravorum symptomatum carentia: vel denique oriuntur ex resoluta virtute retentrice, quæ est in cantho, & cæteris oculis partibus, & illæ sunt exitiosæ, de quibus loquitur Hipp. in hoc Aphor. & à reliquis discernuntur ex oculorum cavitate & extenuatione, aliisque symptomatis, quæ ipsa necessario comitantur.

*Per aures.* In gravi capitis affectu, si pus ex naribus effluat, solutio fit.

Hoc theorema desumptum est ab Hipp. Aph. 10. sect. 6. Dolenti capite & valde sonanti, pus aut aqua, aut sanguis fluens per aures, aut per os, aut per nares, solvit morbum. Hi enim sunt ductus & meatus ordinarii, per quos cerebrum sese exonerare solet. At præcipua atque gravissima cerebri affectio est inflammatio, quæ si ad suppurationem veniat, & pus per aures, quæ magis ordinaria in hoc casu via est, vacuatur, fit morbi solutio.

In puerulis humiditates per aures diu effluentes, salutes.

Hujusmodi humiditates pueris familiares sunt, Aphor. 24. sect. 2. & salutes: qui in illa ætate cerebrum humidissimum & excrementis scatens, salutariter sese non solum per aures sed etiam per alios ductus expurgat.

Aurium sordes, quæ natura sua flavæ, & amaræ existunt, dulcescere, aut colorem mutare, pessimum. Hipp. 6. Epid.

Galen. in comment. dicit, illud accidere per colliquationem cerebri in febre acuta. Vel dicere possumus, quod debilitato valde calore nativo, profluant aquosæ illæ humiditates, quæ in cerebro continebantur, fordibusque istis permixtæ, illarum saporem & colorem immutent.

Sanguis bene ac largiter fluens è naribus die critico salutaris.

Fit enim tunc temporis illa evacuatio à natura bene operante, & causam morbificam expellente. Sed diligenter advertendum est, utrum præcesserint signa concoctionis, & nulla in morbo lateat malignitas: siquidem in morbis malignis hujusmodi hæmorrhagia sæpe solet inutiliter contingere.

Hæmorrhagiæ nimis copiosæ & vehementes, pessimæ: nam ad convulsionem deferunt.

Fit enim aliquando, ut natura copiâ sanguinis gravata, & ad excretionem concitata, modum tenere nequeat, & supercrisin efficiat: quam Medici sæpè cohibere coguntur.

Hæmorrhagia in principio morbi, mala.

Quia in principio morbi nulla evacuatio potest esse critica, sed merè symptomata est: non tamen idcirco lethalis est, sed tantum inutilis & nihil ægro conferens, quemadmodum contigit Pericli in 3. Epid. sect. 2. Ægr. 6. cui prima die sanguis fluxit ex sinistro, postea verò febris multum intensata est, & perseveravit usque ad quartum diem, in quo per copiosum calidum sudorem judicatus est.

Hæmorrhagia, quæ è directo partis affectæ accidit bona: contra verò, mala.

Laz. Riverii Opera.

In hepatis inflammatione hæmorrhagia critica salutaris est, sed hanc debet habere conditionem, ut per dextram narem sanguis evacuetur; si enim per sinistram effluat, non servabit rectitudinem tantopere laudatam ab Hippocrate, & ostendit naturam perturbatam præpostere operari. Sic in lienis inflammatione sanguis per sinistram narem debet fluere, non verò per dextram.

Stille sanguinis pauca per nares effluentes, mala.

Significant enim naturæ imbecillitatem, & malignitatem morbi. Omnis siquidem excretio in morbis acutis, quæ inchoatur tantum, & non perficitur maximè damnatur ab Hip. quia major est securitas in febribus in quibus natura nihil excernit, quam in quibus pauca & inutilia: siquidem coctioni esse intentam tunc temporis arguitur. Adde quod nulla apparente stillâ, materiæ benignitas eluceat, quæ inepta est ante tempus naturam irritare. Sic apud Hipp. 1. Epid. Ægr. 1. Philisco quinta die parum è naribus stillavit, sincerum, & sexta die obiit Ægr. undecima ejusdem sectionis. Dromeadae conjugii quarta die distillarunt pauca è naribus, sexta verò interiit. Non tamen ea hoc signo mors absolutè conjicienda est, nam in 3. Epid. sect. 1. Ægr. 3. in eo qui decumbebat in Dealcis horro, secundâ die ex nare sinistra paucus sincerus effluxit sanguis, quadragesima die judicatus est. Attamen gravissimo morbo confectus est; ut ex tota historia apparet, ideoque si non mortem, saltem maximum vitæ periculum portendit hujusmodi stilla sanguinis, si aliis pravis symptomatis adjungatur. Nam hoc etiam advertendum est, quod videlicet exigua sanguinis excretio die judice apparens, sine gravioribus signis vel antecedentibus, vel subsequentibus, tantum abest, ut periculosa sit, quin potius crisi per eandem vitam adfuturam denuntiet: ut Metoni accidit 1. in Epid. sect. 1. Ægr. 7. cui quarta die, non prægressis gravioribus symptomatis fluxit è dextra nari sanguis bis, parum: quinta fluxit largius ex sinistra, sincerum, sudavit judicatus est, & cum recidivam passus est, sanguine iterum ac sæpe profluente, liberatus est.

Sputa alba, lævia, æqualia, non admodum tenacia, vel crassa, quæve promptè facileque excernuntur, & sine dolore ullo vehementi aut multa tussi salutaria. *Per os Sputum, & ex- creatis.*

Significant enim, naturam materiæ morbificæ dominari; eamque laudabiliter concoquere, & concoctam sufficienter excernere. Dictæ enim qualitates in sputo apparentes, optimæ concoctionis indicia sunt.

Sputum statim initio morbi pectoris aut pulmonis, apparens, bonum. Aph. 12. sect. 1.

Significat enim concoctionis rudimentum; quod si statim ab initio morbi fiat, sperandum est, brevi tempore morbum solutum iri.

Sputum leviter rubescens ex sanguine & pituitæ permixtione, salutare.

In pleuritide hæc sputa rejiciuntur, cum natura materiam morbificam aggreditur: hanc etenim paulatim attenuat & liquat, ac proinde laxatis viis, quo vapor exhalet, tenuior pars & vicina vaporis, per raritatem pororum elabitur in interna ac vicina spatia, ac pituitæ permiscetur, unde tussi sublata, & sputo excusso, vitium coctionis demonstratur, ac proinde Gal. comment. in 6. Epid. has mitissimas pleuritides esse statuit.

Sputum flavum pauco permixtum sanguine, in pectoris aut pulmonis inflammationibus, ineunte morbo editum, salutare est; multumque confert; septimum verò diem agentis, aut propecloribus, securitatis minus est. Hipp. in Coac. & prognost.

In inflammationibus, quæ à bile & sanguine producuntur, hujusmodi sputa solent contingere: quæ si ab initio morbi appareant, ostendunt naturam partem



## 76 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

oneris deponere, unde laxitas in parte & doloris remissio exoritur, ac proinde sanationis initium. At si provecto jam morbo, id est, septimo vel undecimo die tantum hoc sputum appareat, minus securitatis est; quandoquidem facultates ad anacatharsin necessariæ à morbo magis opprimuntur, quo minus laudabiles operationes ex iis sperare possimus: tum materia morbifica magis rebellis est, cujus ne tenuior quidem pars, & magis obediens primis diebus potuit educi: tum mora diuturniori in partis substantiam penitus defixa est, ut ægrius multo possit eradicari.

*Omnia sputa mala sunt, quæ dolorem non sedant. Hipp. in prognost.*

Omnes evacuationes bonæ vel malæ censentur ex conferentia, quæ ex iis ægrotanti accidit. Si ergo ex anacatharsi nullum doloris levamen accidat, mala sine dubio censenda est. Aut enim materia, quæ morbum immediatè producit, non ejicitur, aut si quædam portio illius evacuetur nova aliunde suppetit, quæ morbi imminutionem impedit.

*Sputa pauca etsi concocta, si non pro ratione morbi excernantur, mala.*

Quia nihil paulum criticum est, nec aliquod levamen afferre potest. Ideò ab hujusmodi sputis timendum esse in peripneumonia nos docuit Hipp. in *Coac.* qualia fuere in uxore Euxeni ab Hipp. observata 7. *Epid.* quæ ex eo morbo interiit.

*Nihil omnino exspuere in pleuritide aut peripneumonia, progresso jam morbo, exitiosum.*

Quamvis in principio nihil excernatur, non adeò periculosum est; sed si in augmento vel statu sputum non appareat, summam morbi cruditatem significat, & inflammationem contumacem ac concoctam difficilem ostendit. Hinc Hippocrates in *Coac.* siccas pleuritides, in quibus nihil expuitur, merito fecit periculosissimas: & Gal. 2. de *Crisibus*, c. 1. *Cum passio, inquit, exquisitè angusta fuerit, & veluti alligans in sese universum fluxum cohibuerit, tum facit morbos lethales.* Et in libro de totius morbi temporibus, nihil omnino exspuere cum ingenti dolore, & spirandi difficultate, esse exitiale statuit.

*Si sputum, postquam apparuerit, supprimatur, & plenus pulmo fervecat in gutture, ac stertorem, ebullitionemque patiatur; omnino lethale.*

Vel enim significat maximam inflammationem, quæ sputum exurendo tam viscidum efficiat, ut nequeat expectorari; sed bronchiis pulmonum adhærens, eaque obstruens, suffocationem inducat; vel ostendit virium exsolutionem quæ non possit anacatharsin promovere, unde fit, ut omnes, qui ex pleuritide vel peripneumonia moriuntur, jam morti proximi hujusmodi stertorem patiantur. Hujusmodi stertorem observavit Hipp. 7. *Epid.* in Metone, de quo ait, *Arteria subsilicbat cum stertore:* & de uxore Theodori: *Arteriæ & pectoris stridula quædam asperitas, strepitus, & fluctuatio puris:* & de uxore Polychratis: *intus circa arteriam & fauces sibilus erat, & ῥιππος;* vel ut tradunt interpretes, *asperitas rancia.* In quibus & multis aliis, qui in eodem libro recensentur, illud symptoma partim in naturæ impotentiam, partim in multitudinem aut lentorem puris, pituitæ, aut alterius humoris fuerat referendum. At licet perpetuò quidem malum sit, & summoperè timendum; summe tamen perniciosum est post morbi principium, prælanguidis viribus redditis. Id enim ostendit, præ imbecillitate naturam quicquam non posse excernere, sed suffocari; quod etiam indicabunt alia signa exitialia, quæ cum isto copulata necessario apparebunt.

In principio verò nonnumquam fit, ut præ copia humoris, & lentore ejusdem, serveat in gutture, quo humore postea concocto, & per sputum purgato, cessat illa ebullitio. Tale verò non esse perniciosum ex eo dignoscitur, quod unà adsint alia

signa bona, & nullum perniciosum, ut in Pisistrato contigit, de quo ait Hipp. 7. *Epid.* stertorosum in faucibus, bene autem ferebat morbum mente constabat, calor remisit, simulque excretio, & stertor evasit. Denique asthmaticorum paroxysmis hujusmodi stertor, isque valde intensus cum sibilo solet contingere sine ullo periculo: quod diligenter annotandum est, ne in prognostico decipiamur.

*Sputa alba & cretè pituitosa in pleuritide & peripneumonia, mala.*

Hujusmodi sputa incautos Medicos possunt decipere, quandoquidem in iis, quæ in statu naturali excernuntur, admodum similia cum sint salutem prima fronte videntur polliceri. Attamen admodum mala sunt, quia ostendunt, nihil humoris, inflammationem facientis, expurgari: propterea & morbum crudissimum, & summè perniciosum demonstrant. Quod Hipp. observavit 7. *Epid.* in uxore Euxeni, quæ pleuritica obiit; ea enim per sputum pauca candida & tenuia excernebat.

*Sputa flava, pallida, aut rufa in sanis apparentia, sive amara illa sint: sive dulcia phthisin adfuturam, & inde mortem prænuntiat.*

Hujusmodi enim colores bilem in pulmonibus delitescentem significant, quæ quidem in sputo amarorem magnā ex parte interdum deposuit, sed ob pituitæ permixtionem & dulcedinem ejus acrimonia retunditur. In quo medicos errare ac decipi facile est, qui biliosum humorem intus in pulmone delitescentem non agnoscunt ex eo, quod sputa, etsi flava, vel pallida, vel rufa appareant, minimè acria, vel amara observent. In iistamen ægrotantibus exefis pulmonibus, cruenta sputa vel purulenta postea redduntur, atque inde tabes. De his loquitur Gal. 4. de *loc. affect.* cap. 9. insigni contextu & ita ad hanc rem conducente, ut illius verba huc merito transferenda sint. *Quidam, inquit, humorem repente exspuit, liquidæ bili in colore perquam similem medium videlicet inter flavum ac pallidum, ac nullā acredine infectum, atque ita quotidie majorem ejus quantitatem expuit; deinde brevi oboritur febricula, tabescere incipit, adeò ut purulenta screaret.* Postea tractu temporis, quatuor videlicet mensium, exiguum cum pure cruorem rejecit atque sic acuta febre magis consumebatur: ac iterum atque iterum plus exspuebat, adeò ut magnum sputi quantitatem redderet: quocirca magis crescente febre, ac resolutis viribus, eorum qui tabe marcescunt, exemplo mortem obiit. Deinde aliam vidi eodem ferè morbo sex mensibus, ac alium quoque diutius laborantem. Igitur qui primus nobis occurrit, initio quidem nihil mali habere, sed tandem pessimè affici visus est. Alterum verò cum conspiceremus, ei st. tim ab initio cognito malo, præsentī medicamento succurrere tentavimus, ac multo magis etiam tertio. Ad quamvis multo negotio utrumque liberare conaremur, nihilominus neque horum ullus: neque alius post alios servari potuit, cum enim jam morti proximi essent, pulmonis ipsius putres quasdam partes expuebant. Hæc Gal. Caterum mirum est cur sputis flavis aut pallidis apparentibus, acri, amaro, aut falso sapore vacantibus, homines ad tabem ducantur. Hoc verò fit, quod pituitosi humoris mixtione in ipsis sapor facilius quàm calor occultetur, quæ quidem pituita in bronchiis pulmonum continetur, ibidemque cum bile permiscetur: at bilis in pulmonibus colligitur tam acris & copiosa, ut eos exedat, putrefaciat, & ad tabem perducatur.

*A sanguinis sputo puris sputum, à puris sputo tabes: cum verò sputum supprimitur, moriuntur, Aph. 15. & 16. sect. 7.*

Non ab omni sanguinis sputo puris sputum consequitur; nam & è cerebro, & è gingivis, & è gutture sanguis educitur sine noxa. Imò nec à sputo sanguini-



sanguinis, quod in pleuritide & peripneumonia contingit, puris sputum necessario generatur; sed de illo tantum sputo sanguinis intelligendus est hic aphorismus, quod à pulmone procedit, per erosionem illius partis, aut ruptionem alicujus venæ per illius substantiam dispersæ. Huic enim sanguinis sputo puris sputum, & tabes, & mors necessario succedunt. Hujusmodi autem sputum, quod in puris sputum degenerat, à prædictis distinguitur, quod in eo spumofus ac valde floridus sanguis per tussim excernatur; quæ conditiones omnes in aliis non reperiuntur.

*Sputa virida, æruginosa, livida, nigra, sincera, vel fætida, mala.*

Viridia & æruginosa magnum caloris incendium, & bilis æruginosæ copiam significant. Livida, aut ab atra bile, aut à caloris extinctione fiunt. Nigra fiunt ab iisdem causis, sed multò potentioribus; nam & major adustio, & refrigeratio, seu caloris extinctio, ex livore nigredinem conciliat. Sincera sputa ea dicuntur quæ fiunt ab initio humore puro & impermixto, suoque sero destituto, quod serum à calore consumptum est. Fætida ingentem putredinem in partibus spiritalibus conceptam significant. Illa igitur omnia sputorum genera esse valde mala, eorum causæ jam recensitæ satis superque indicant.

*Sputa admodum crassa, viscida, & glutinosa, in pleuritide vel peripneumonia, mala.*

Quia significant magnum incendium & ardorem intus delitescentem, qui materiam instam valdè incrassat, & viscidam reddit, ut difficillimè possit purgari, necnon cum tussi molesta & laboriosa excreatione; quæ plus affert detrimenti, quàm emolumenti.

*Sputa viscida & glutinosa cum raucedine, pessima.*  
1. Coac. cap. 16.

Simpliciter viscida & glutinosa mala sunt, ut in præcedenti theoremate dictum est. At si hujusmodi sputa raucitatem inducant: ostenditur visciditati junctam esse acrimoniam, quæ materiam exasperando hujusmodi raucitatem inducat. Quanto igitur deterior est materia, tanto deteriorem affectum producit: atque adeò quicumque pleuritici & peripneumonici hujusmodi sputum cum raucedine emittunt, lethaliter laborant. In aliis verò qui hisce affectibus non tenentur, talia sputa cum raucedine glutinosa & falguginosa phthisin prænuntiant.

*Sputum rotundum, aut grandinis formam referens exitiosum.*

Primum enim sputum rotundum necessario crassum & viscidum est, atque ea ratione vitiosum, ut jam annotavimus. Imò verò incoctibilem arguit materiam, quæ ad usionem deducta, crassior & viscosior reddita, hanc figuram nacta est. Ideò quicumque pleuritici, vel peripneumonici hujusmodi sputa rejiciunt, brevi moriuntur. Tum etiam sine morbo præsentis tale sputum phthisin prænuntiat, ut testatur Gal. comm. in 6. Epid. ubi refert, se hujusmodi sputum in quibusdam febre vacantibus vidisse, qui per longum temporis intervallum nihil mali pati videbantur: attamen isti omnes postea phthisici contabuerunt. Illa verò sputa, quæ grandinis granis similia sunt, quia rotundis solidiorem consistentiam nanciscuntur, ideò à majori pulmonis calore fiunt, & certius phthisin prænuntiant. Ita Gal. 4, de locis affectis, cap. 9. Historiâ luculentâ hujusmodi sputorum periculum ostendit his verbis: *Præterea alium hujusmodi affectum in pulmone notavi. Quidam diuturna tussi vexatus, & exiguum, lentumque pus expuens frustum quoddam parvo grandinis grano haud absimile excreavit, ac deferens illud mihi ostendit, atque rursus non adeò multò post aliud quoque attulit; unde conjeci lentum illum humorem, & quem antea expuere solebat, sic-*

*cum induratumque ad hujusmodi substantiam pervenisse. Quamobrem medicamentum ei in potu dedi, quod asthmaticis ancillatur atque ita factum est, ut minorem expueret grandinem atque longiori quàm antea intervallo; neque pluribus deinceps annis adeo mitigari potuit affectus, quin tandem moreretur. Cæterum grandines ipsæ magna ex parte erui magnitudinem æquabant, quamvis interdum majores esse, interdum minores viderentur. Atque alios quoque similiter quidem expuere, sed nihilominus multos in annos vitam extendere vidimus, quorum alii aliam ob causam; alii verò ob spiritalium instrumentorum affectum mortui sunt, quamvis nihil cruoris excrearent.*

*Qui suffocantur & à vita deficiunt, nondum tamen mortui sunt, non referuntur in vitam, quibus spuma* *Spuma*  
*circa os apparet. Aph. 43. sect. 3.*

Spuma generatur vel à vehementi calore, multos vapores excitante, eosque cum saliva permiscente, ut videre est in iis, quæ igni apposita fervent, & bulliendo spumam emittunt; vel fit à motu violento, qui eodem modo flatus cum aquosa substantia permiscet, ut patet in albumine ovi diutius agitato, & in mari ventris vehementer commoto. Quia igitur ex vehementi ira, aut cursu, vel exercitatione violenta incandescunt, iis possunt habere spumam in ore sine periculo; quia excitatur à causa procatarctica. Ita etiam epileptici circa finem accessionis spumam emittunt ex ore, ob motum illum violentum & convulsorium, quia attenuat exagitando, dissolvitque materiam illam pituitosam in cerebro contentam, à qua paroxysmus ille excitabatur: ideò nullum etiam in ea periculum, quia fit materiæ morbificæ exclusione. At in iis, qui suffocantur, sive illud laqueo fiat, sive demersione in aqua, à gravi angina, vel apoplexia, spuma in ore apparens pessimum est signum, & proximam mortem ostendit; significat enim extremum naturæ conatum, fuligines in pulmone contentas magna vi excludere conantis, cum quibus etiam aliquid propriæ ipsius pulmonis humiditatis exprimit, & cum dictis fuliginibus permiscet. Cum his confer. Theatrum Tabidorum Bennetti.

*Vomitum ex bile flava & pituitâ mixtum; qui nec valde crassus est, nec admodum copiosus, & qui duo* *Per vis-*  
*mitum*  
*Substans*  
*tia.*  
*istos humores habet exquisitè permixtos, bonus.*

Talis enim vomitus non solum in substantia, sed etiam in quantitate & qualitate laudabilis est. Ex omnibus enim humoribus excrementitiis pituita & flava bilis sunt omnium mitissimi: Si autem quantitate & consistentiâ mediocri, ac bene invicem permixti per vomitum efferantur, omnes laudabilis vomitus conditiones obtinebunt.

*Vomitum biliosi aut pituitosi die critico erumpentes, boni.*

Non solum vomitus permixti ex utroque humore boni sunt; sed etiam qui fiunt seorsim ex alterutro humore, si talis humor morbum committat, quo æger detinetur. Sic in biliosis febribus bilis criticè erumpens, aut pituita, in pituitosis, morbi solutionem afferunt, aut saltem maximam salutis spem pollicentur.

*Longo alvi profluvio laboranti spontaneus vomitus superveniens, morbum solvit. Aph. 15. sect. 6.*

Fit enim revulsio materiæ morbificæ in contrariam partem, & illa revulsio ostendit naturam refici, ac vires resumere. Ut enim Medicus facit, eorum quæ in partem aliquam fluunt, retractionem; ita natura facit, cum prævalere incipit, repulsionem: ut cum ex surditate facit dejectiones biliosas, ita etiam ex profluvio ventris vomitum. Nimirum cum intestina laborarent fluxione, potentis naturæ indicium est, id quod in intestina malè affecturum influebat, aliam in partem repellere.

*Sanguinem superne efferri, qualiscunque sit, malum, Aph. 25. sect. 4.*



## 78 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

Sanguis, qui per vomitum rejicitur, à ventriculo vel hepate proficiscitur, alicujus venæ apertionem, ruptionem, aut erosionem in iisdem partibus significat. Ideò talis vomitus malus censendus est. Et de eo loquitur Hippoc. in hoc Alph. Tum etiam de sanguine, qui rejicitur per tussim, & à thorace vel pulmone educitur. *Advertendum* tamen est, cruentam vomitionem aliquando bonam salubremque existere, si nimirum criticè perficiatur, quamvis hoc valdè rarò contingat. Hoc tamen testatur Gal. 7. meth. c. 11. 3. de sympt. caus. cap. 2. & 5. de locis affectis. cap. 7. & nos vidimus aliquando pleuritidem, in juvene robusto, per sanguinis vomitum die septimo perfectè & salubriter judicatam. Alium etiam vidimus, qui longo morbo detentus, & velut tabe confectus, cum difficultate spirandi, oborto repente vomitu copioso sanguinis atri, fuit liberatus. Hic igitur aphorismus ita distinguendus est, quod videlicet sanguinis vomitus perseverans & frequenter repetens, malus sit: si verò semel tantum accadat, nec iterum revertatur, eumque morbi alicujus solutio consequatur, bonus sine dubio sit censendus.

*Quantitas.* Vomitus paucus & laboriosus in acuta febre, malus.

Nihil enim eorum, quæ decretoria sunt, exiguè secerni convenit, sed quæ ita vacuantur omnia, significant aut materiæ copiam, quam natura tolerare nequeat; sed ex ea aliquid symptomaticè effundat; vel naturæ imbecillitatem quæ superflua expellere frustra nitatur.

*Qualitas.* Vomitus variegati, ex multis humoribus constantes, mali.

Significant enim varios humores in corpore latitare, qui eo majus negotium naturæ faceffunt, quo difficilius est pluribus inimicis resistere. Si enim adversus varia alimenta pugnare gravissimum efficitur; quantò difficilius erit, & periculo plenius, tentare varios humores, præter naturæ modum existentes, concoquere & edomare; Præcipuè in morbis acutis, in quibus breve est tempus pugnae, quod deberet esse longissimum, ut major spes victoriæ ex parte naturæ haberi posset.

Vomitum porraceum, æruginosum, lividum, nigrum, aut fetidum, lethale.

Significant enim hujusmodi vomitus bilem porraceam, æruginosam, aut atram in corpore redundare. At hæ omnes bilis species malignos morbos atque lethales solent producere: his verò si foetor adjunctus sit, insignem humorum corruptelam significat, cum qua natura non possit diu consistere. Vomitus æruginosi exemplum habetur apud Hipp. 3. Epid. sect. 2. Ægr. 4. ubi Philistes primâ die vomuit biliosam, pauca, flava primum, postea æruginosa, multa. Quintâ manè extinctus est. Tum etiam sect. 3. ejusdem libri, Ægr. 4. ubi phreniticus, qui primâ decubuit, vomuit æruginosam multa, tenuia: quartâ mortuus est. Nigræ verò vomitionis exemplum habemus in 1. Epid. Ægr. 12. qui die octava circa vespem evomit nigra, pauca, biliosa, & undecimâ obiit. Attamen objici potest, anceps esse hujusmodi signum, quia Epicratis-uxor, ut habetur in 1. Epid. Ægr. 5. vigesima die vomuit biliosa, pauca, nigra, & judicata est perfectè sine febre, octuagesima. Respondendum est, eum morbum fuisse adeò gravem, & adeò fævis comitatum symptomatis, ut mirum sit, quomodo ex eo ægrotans potuerit evadere, cum octuaginta dies eam occupaverit. At interdum contingit, ut quidam morbi etiam lethalissimi præter Medicorum spem feliciter terminentur, qui tamen judicia artis nequaquam debilitant, sed censenda sunt ex iis, quæ ut plurimum contingunt, non autem semper aut necessariò. Præterea hoc etiam annotandum est, pravos hujusmodi humores criticè interdum excerni, quamvis rarissimè hoc contin-

gat. Denique foetidi vomitus cum aliis pravis qualitatibus conjuncti, exemplum habemus in 1. Epid. sect. 2. Ægr. 12. Ubi mulier, quæ decumbebat in mendacium foro, die octava & nonâ vomuit exigua biliosa; undecima vomuit virulenta biliosa: duodecima & decima tertia vomuit multa, nigra, graveolentia; decima quarta mortua est.

Vomitum sinceri & impermixti in acutis febribus mali. 11. Prorrhæ.

Nam humor sincerus non solum crudus est, sed etiam incoctilis, quippe qui excludat, tum actum coctionis, tum potestatem. Hippocr. εὔπυρον vocat humorem omnem mixtionis expertem, vel omne excrementum fervidum & crudum, quod suo sero dilutum non est. Cujus generatio vel partis alicujus vitio fit, vel fervore & incendio febrili exhaustâ aquosa & serosa parte, ideoque in acuta febre magnum intus incendium latere ostendit, plerumque à natura nostra invincibile.

Morbis quibuscumque incipientibus, si atra bilis vel supernè vel infernè exierit, lethale. Aph. 22. sect. 4.

Talis excretio lethalis est, ut signum, & ut causa. Nihil enim ineunte morbo salutariter potest excerni, malaque est cujusvis humoris à corpore evacuatio, quæ sit ante coctionis signa. Indicium enim est, causam valde movere aut gravare, aut omnino facultatem languere: cum naturæ œconomia hoc modo conturbetur, quæ primum concoquit, deinde secernit ac separat inutilia ab utilibus, postremo excernit. At cum materia peccans & hoc modo natura conturbans deterrima est, lethaliter affici ægrotantem arbitrandum est. Verum si in progressu morbi atra bilis excernatur, poterit aliquando bona esse illius evacuatio, si nimirum coctionis signa simul apparuerint.

Quibuscumque per morbos acutos, vel diuturnos, aut vulnera, aut quovis alium modum extenuatis, atra bilis, aut veluti sanguis niger per inferiora subsederit postmodum moriuntur. Aph. 23. sect. 4.

Extenuatio magna debilitatem, significat; talis dejectio magnum morbum, qui ægrum valde debilem citò interimit. Quando igitur ita extenuatis talis vacuatio contingit, significat naturam omnino prostratam humores illos amplius continere non posse, & veluti laxatis habenis, per inferiora demittere.

Dejectiones sinceræ in morbis acutis, pessimæ.

Sinceras dejectiones appellavit Hippocr. (ut docet Gal. in Aph. 6. sect. 7.) quæ impermixtæ sunt aquosæ humiditati, quando solus humor, qui vacuentur, dejectur; sive sit biliosus, sive melancholicus, sive porri colorem præ se ferat, sive bilis, quæ æruginosa nominantur. Nam dejectiones hujusmodi exustam esse omnem nativam humiditatem à calore febrili demonstrant: unde maximum imminet vitæ periculum. Sic apud Hipp. Epid. Ægr. 1. Sileno primâ die biliosa, sincera, spumosa, saturata multa prodierunt: quinta dejectiones sinceræ, biliosæ, læves, pingues: undecimâ interiit. Ejusmodi etiam sinceræ dejectiones in Eurynactis filia, Pario Pytione, & aliis contigerunt, qui lethalibus morbis conflictabantur.

Pingues & viscosæ dejectiones, lethales.

Pingues in acutis dejectiones fiunt, ut docet Gal. comm. in text. 22. lib. 2. prorrh. quoties pinguedo ab igneo calore absumitur. At ubi etiam viscosæ sunt, significant non solum pinguedinem colligari, sed etiam solidas corporis partes, unde necessariò contabescunt. At verò quia dejectiones pingues & viscosæ interdum generantur ex alimentis pinguibus & lentis, tum etiam à pituita multo calore viscida reddita: ita invicem distinguendæ sunt, ut nimirum quæ alimentis aut pituita, copiosiores sint, & minimè foetidæ: quæ verò à colliquis



colliquatione, paucae sint & graveolentes. Et graveolentia imprimis, ut Gal. docet, colliquationis indicium est. Hæ igitur pingues dejectiones magnum incendium significant, & certum exitum, si aliquod ex pravis indiciis simul illuxerit, atque adeo si morbus magnus, vehementer fuerit, veluti in mitiori morbo longitudinem pro exitio præmonstrabunt, cujusmodi in eo, qui in Dealcis horto habitabat, Hipp. observavit, de quo ait, sexto die dejectiones fuisse nigras, pingues, spumosas, viscosas, graveolentes, qui die tantum quadragesimo fuit judicatus. Verum hæ non colliquatione partium solidarum factæ fuerunt, sed à pinguedine, & ab humoribus viscidis putrefactis, quandoquidem eæ multæ extiterunt. Quæ verò etiam solidâ partium substantiâ tabescente fiunt, prorsus exitiales existunt, quales in Sileno observavit Hippoc. & nos in præcedenti theoremate notavimus.

*Spumosa dejectiones in febribus acutis, malæ.*

Illæ enim aut caloris incendium significant, quo excrementa fervescunt spumam contrahunt, ut in lebe præ copia caloris fit; aut flatuosum spiritum humori commixtum, ut videre est in spumis maris incurrentibus ventis. Utrumque autem malum est, quia illud calorem arguit colliquantem, hoc verò inæqualem perturbationem. Pejores tamen sunt, quæ caloris incendium colliquans denotant, & cognoscuntur ex acuta febre; & ab excrementis calidioribus spumosis redditis, tum etiam quod sincera spectentur. De his legitur 2. *Prorrhæ.* In biliosis sincerisque dejectionibus spumosa efflorescentia, malæ. Quæ verò ex spiritus flatuosi commixtione fiunt, malæ etiam sunt, quia in excrementis cruditatem significant.

*In morbis acutis, si ea, quæ assumuntur, inalterata rejiciantur, lethale est.*

Hujusmodi lenteria abolitas in ventriculo functiones naturales ostendit, propter maximam caloris nativi exsolutionem, quæ proximam mortem denuntiat: ut videre est apud Hippoc. in 3. *Epid. sect. 3. Aegr. 15.* Dealcis uxore, cui accidit die decima septimâ ab alvo irritatio turbulenta, deinde ipsæ potiones exhibant: & vigesima primâ interiit.

*Lumbrici.* In morborum principio vermes prodire, malum, tam vivos, quàm mortuos: potissimum si soli & sine stercore excant.

Vivi enim summam cruditatem, aut alimenti penuriam significant, mortui verò magnam putredinem, à qua enecantur.

*Lumbrici in declinatione morbi cum excrementis exeuntes; & jam coctione apparente, bonum.*

Ostenditur enim tunc naturam excrementis dominari, sitque sapius post dysenteriam.

*Quantitas.* Copiosior alvi dejectio in quolibet morbo, malæ. At si cum ventre subtumido & crescente efferatur, pessima.

Alvi fluxus copiosior vires maximè resolvit, & naturam prosternit, ut in 2. *progn.* Hipp. habet. At si universim & sæpè deiciatur, periculum imminet animæ defectionis: quod etiam confirmat in *Coacis prænot.* his verbis: *Liquida dejectio, & confertim semelque effluens, paulatim, malæ: altera enim vigilat, & altera exsolutionem invehit.* At verò si copiosa dejectio cum ventre tumido conjuncta sit, significat magnam caloris nativi exsolutionem, unde cruditates & flatus multi generantur, quibus venter intumescit.

*Paucae dejectiones, vel quæ statim ubi incæperint, sistuntur, malæ.*

Omnes excretiones pocas inutiles esse, alibi demonstratum est, tum quòd ad morbi causam tollendam non sufficiant: nam etiam, quod vel

humorum multitudinem vires opprimentem, vel earundem imbecillitatem significant. At si alvi fluxus statim ubi incæperit, cohibeatur, significat pravos humores, qui per intestina ferebantur, aliò esse conversos, ubi gravem noxam inferre possint. De his loquitur Hippocrates in 7. *Epid.* his verbis: *Ventres, etsi fortè humectati essent, statim maligno modo sistebantur.* Hinc non abiunili ratione diarrhœæ & dysenteriae, quæ subito cohibentur, maximum vitæ periculum ægris asserre solent.

*Liquida dejectio, quæ cum morbo acuto incipit, & Qualitas. cum eodem perseverat, malæ.*

Significat enim magnam materiæ morbificæ copiam, vel malignam qualitatem, quæ naturam coëgit ad præcoccem istam diarrhœam. Sic apud Hipp. 3. *Epid. sect. 2. Aegr. 8.* in adolescente, qui decumbabat in mendacium foro, cui prima die venter turbatus est biliosis, tenuibus multis; secunda dejectiones plures, intemperatiores septimâ mortuus est. *Aegr. 10. ejusdem sect.* Mulieri, quæ circa Pantimedem, primâ die alvus turbata tenuibus multis, crudis: secundâ ab alvo multa, septimâ obiit: alvus semper humida dejectionibus multis tenuibus, crudis.

*Pleuritide & peripneumonia correpto, alvi profluvium adveniens, malum.* Aph. 16. sect. 7.

Cum instrumenta respirationi inservientia vehementer afficiuntur, hepar & ventriculus in consensum trahuntur, eisque labefactis contingit alvi fluxus, qui eâ ratione lethalis esse consuevit. Ideò ut verum sit hoc prognosticum, pleuritis aut peripneumonia debet esse gravissima. Quod innuit Hipp. (docente Gal. in *comm. hujus Aphor.*) cum non simpliciter dixit, in pleuritide aut peripneumonia alvum turbatam esse, malum signum; sed adjecit, *correpto*, ac si dixerit detento atque vexato homini à talibus passionibus, profluvium alvi superveniens, malum esse signum, quoniam ita se habentibus profluvium alvi solet advenire, non potente hepate ad se trahere alimentum, neque convertere in sanguinem; & quandoque ventriculo idem alimentum corrumpente: in mediocri autem pleuritide aut peripneumonia profluvium alvi superveniens prodesse potius, ratione evacuationis, præcipuè si morbus non sit gravis & nullum timeatur ex eo periculum; tum etiam concoctionis signa in sputis & urinis apparuerunt. Interdum etiam in recenti pleuritide & peripneumonia diveritur materia antecedens ad intestina, & utilem salubremque alvi fluxum producit.

*Ophthalmia laborantem alvi profluvio corripit, bonum.* Aph. 17. sect. 6.

Nam per hujusmodi alvi fluxum fit revulsio ad distantissima opposita, & à superioribus ad inferiora, quæ omnium efficacissima atque utilissima est.

*Alvi excrementa liquida, quæ in progressu morbi crassescunt, bona.*

Omnis concoctio incrassando progreditur, & quæ concoquantur, crassiora evadunt; ideò excrementa, tenuia liquida, quæ seu sensim crassescunt, virtutem naturæ bene operantis significant.

*Albæ dejectiones, in morbis quibuslibet apparentes, malæ.*

Vel enim albæ dejectiones sunt ex cibis ingestis, utpote pane puro, lacte, pitana, alica, amigdalibus, aliisque, aut ut Gal. docet in *progn.* cum bilis nullo modo pervenit ad intestina, idque vel obstructo canali, per quem à vesica fellis ad intestina fertur, ut in ictero contingit, vel eadem fursum cum sanguine in caput inflammatum attracta: aut denique fiunt albæ dejectiones à colliquatione pinguedinis mollis & recentis. At hæ paucae, viscidæ, & valde foetidæ existunt.

Quo-



## 80 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

Quocunque autem modo fiant, exceptis iis, quæ à cibis albescunt, in acutis morbis non parum damnantur, omniumque maximè, quæ cerebro inflammato, contingunt, de quibus Hipp. in prorrh. *In phreniticis alba dejectio, malum*: quandoquidem universa bilis in cerebrum attrahitur. Propterea in biliosis febribus albæ dejectiones malæ etiam sunt, quia excrementa causæ morbificæ respondere debent; ideoque vel canalis obstructionem significat, quo bilis ad intestina deferri consuevit, quæ obstructio affectum plerumque etiam in non febrientibus lethalem facit, de quo Hipp. in Coac. *Regio morbo admodum fœdatis, moriuntur, & his alba dejectio præcedit*; vel cerebri, aut convexæ jecoris partis superioris incendium, quod bilem universam ad se proliciat. Denique albas paucas, viscidas, & malè olentes dejectiones, malas esse, supra ostendimus, quod malignam colliquationem denotent.

*Alvi dejectiones vitellinæ, virides, æruginosæ, lividæ, nigrae, variegatæ, aut valde fœtidæ, malæ.* 2. progn.

Hæ omnes dejectiones malæ, sunt propter easdem rationes, quas de simili vomitu supra retulimus. Aliquando tamen possunt criticè & utiliter affundi, si antea signa concoctionis in urinis apparuerint, ut videre est apud Hipp. in 1. Epid. sect. 1. *Ægr. 14.* Ubi Melidiæ, quæ decumbebat apud Junonis templum, incipit capitis & colli & pectoris dolor fortis, statim autem febris acuta corripuit, sextâ die comatosa, anxiosa, horrida, rubor in gena, parum deliravit: septimâ sudavit, febris defecit, dolores permanebant, rediit: somni parvi, urinæ usque in finem bene coloratæ quidem, sed tennes. Dejectiones tennes, biliosæ, mordaces, valde paucæ, nigrae, fœtidæ prodierant, urinis subsidentia alba, levis; sudavit, judicata est perfectè undecima.

*Fluida alvi excrementa cum dolore & dysenteria, aut laboriosa & frequenti dejectione, mala.*

Significant enim maximam humorum acrimoniam, quæ intestina vehementer vellicet, pungat, & erodat. Quod observavit Hipp. in 1. epid. in multis, qui ex febribus malignis interibant, de quibus ait: *alvi turbatae erant, biliosis paucis, sinceris tenuibus, mordacibusque & frequenter desidebant*: & paulò post, *quæ hos infestabant, hæc erant: dysenteria, tenesmi, lienteria, & fluxiones alvi.* Quod etiam observavit in 3. Ep. sect. 2. *ægr. 6.* in Euryanactis filia cui die duodecima alvus turbata est biliosis, paucis & sinceris, tenuibus, mordacibus, crebrò desidebat, ex quo morbo interiit. Interdum tamen quidam morbi difficiles per dysenteriam judicantur, ut docuit Hipp. Aph. 48. sect. 6. *Lienosis difficultas intestinorum superveniens, bonum*: Quod ita intelligendum est, modò illa dysenteria diuturna admodum non sit, alioqui erit mala, juxta Aph. 43. *eiusdem sectionis, qui lienosi difficultate intestinorum corripuntur, iis supervenientem longam difficultatem intestinorum, aqua inter cutem, aut intestinorum levitas excigit, & moriuntur.* Alii etiam morbi per fluxum dysentericum finiuntur, ut videre est in 2. epid. sect. 1. *Ægr. 10.* ubi Hipp. de Clazomenio ita scribit: *Circa diem trigessimam primam fluxus alvi multis aquosis cum dysentericis: & quadragesima die à morbo liberatus.* Hæ autem dejectiones quando salutares sunt, nulla perniciofa signa cum iis apparent, plerumque verò hæmorrhagia bona, aut copiosus fœdor, aut aliquod aliud bonum signum simul contingit.

*Liquida dejectio, quæ non sentientibus effertur, valde mala.*

Aut enim errorem mentis & delirium significat: aut caloris nativi exsolutionem, quam sensus abolitio consequuta est.

*Alvi fluxus, qui cum facili tolerantia contingit & ex quo æger levamen aliquod percipit, bonus.*

Ostendit enim naturam noxios humores excernere, unde solutio morbi speranda est.

*Urina illa optima est, quæ in substantia est medio Per uris, quantitate assumptæ potioni respondens, colore sicam. subrufo aut subflavo cum hypostasi alba, lævi & æquali.* Gal. 1. de Cris. cap. 22.

Ut omnia urinæ vitia facilius innotescerent, de- cuit ab initio omnes bonæ urinæ conditiones simul exponere, ut hoc theorema sit veluti regula, ad quam sequentia omnia revocari queant. Urina igitur laudabilis debet esse substantiâ, seu consistentiâ mediocris, id est, media inter tenuem & crassam, colore subrufo aut subflavo, quia in multis urinæ sunt coloratiores, in aliis minùs coloratæ, & nihilominus optimè concoctæ, quod à diversis corporum dispositionibus solet dependere; nimirum à temperamento hepatis & aliorum viscerum præcipuorum, ætate, sexus, victus ratione, & vitæ instituto. Corpora etenim calidiora coloratiores urinas habent, & frigida pallidiores. Juvenes urinas habent pueris tenuiores & coloratiores, pueri crassiores, senes tenuiores & minùs coloratas. Mulieres urinas habent viris crassiores & minùs coloratas, cum multis contentis, & qui crapulis indulgent, mingunt urinas cum multo sedimento crudo; & qui inediâ usi sunt, vigiliis aut laboribus, habent urinas coloratiores cum paucò sedimento. Contrà qui in otio vitam agunt urinas habent minùs coloratas cum multo sedimento. In temperatis verò corporibus urina optima erit, ut docet Gal. colore modicè croceo, ad quam reliquæ differentia quò magis accedunt, eò meliores censendæ sunt. Sufficit tamen in morbis, ad salutem prædicendam, ut urina maxime accedat ad eas conditiones, quas habere solebat, dum æger optima fruebatur valetudine. Ideò optimum esset, illius urinam, dum bene valebat, sæpe conspexisse ut quantum à statu naturali recesserit, faciliè dignosci queat. Sedimentum denique seu hypostasis esse debet alba, lævis, & æqualis, quod confirmat Hipp. 2. progn. text. 26. additque huiusmodi hypostasin debere consistere per omne tempus, donec morbus judicetur; si enim intermittat, & interdum urinas sedimenti expers effundatur, morbus diuturnior futurus est, ac minùs securus. Hic verò annotandum est Hippocratem loco citato solam hypostasin attendere, quâ concoctio denotetur, non autem consistentiam, aut colorem, quia illa ut antea dictum est, maximè variant in variis individuis; tum etiam quia urina optimum habens sedimentum, & optimum colorem, & substantiam medicam habeat necesse est. Illud igitur sedimentum, quod in fundo matulæ residet, album, læve & æquale, puri optimè concocto simile; est perfectæ concoctionis indicium. Enæorema verò, sive suspensum, seu sublimamentum, quod in medio matulæ suspenditur, minùs bonum censendum est, & imperfectiorem concoctionem significat. Nebula verò, quæ in summo urinæ innatat, adhuc minùs bona est. Quanquam, ut docet Gal. in 3. epid. aliquando bonum enæorema, & aliquando bona nebula fat sit ad salutem prædicendam, quod deserte expressit Hipp. Aph. 71. sect. 4. *Quibus septimo die fit crisis, iis nubecula rubea quarto die in urina apparet, & alia ex ratione.* At verò inquit Gal. in comm. non solum rubra aliqua nubes apparens, antea non visa judicationem significat, sed & alba multò magis quàm ipsa; adhuc autem magis & enæorema album, æquale, atque consistens.

*Urinæ tennes cum bono colore in morbis acutis salutares.*

De his loquitur Gal. comm. in 1. epid. his verbis: *Planum ergo est tennes, sed boni coloris urinas, coloris*

Exer-  
nendi  
modus.

Urinæ  
liquor  
eiusque  
qualitas.



## Cap. II. De Signis Morbi Salut. &c. 81

coloris bonitate promittere salutem; quatenus verò erant tennes, hæc tennus tempus requirebant concoctionis. Hæc quidem urinæ salutem prænuntiant, sed longioris tempore futuram, quod observavit Hipp. in 1. *epid. sect. 1. Ægr. 6.* qui Cleonactides appellatur. Huic die sexagesima urinæ tennes quidem, ut boni coloris apparuerunt: Octuagesima perfectè judicatus est. Item *Ægr. 10. ejusdem sect.* Clazomenio ab initio usque ad decimam sextam urinæ erant tennes quidem, at boni coloris, & multum habebant enæorema dispersum, non subsidebant, & quadragesima liberatus est. Ita & 3. *Epid. sect. 2. Ægr. 5.* Chæroini usque in finem urinæ erant tennes, boni coloris, enæorema nebulosum habentes: & die vigesima perfectè judicatus est.

*Urinæ tennes, albæ, & aquosæ in morbo difficili, exitiosa.*

Velenim hujusmodi urinæ significant biliosum humorem sursum in caput ferri, unde Phrenitis & delirium exoritur, de quibus Hippoc. *Aph. 72. sect. 4. Quibus urinæ albæ, perspicuæ, malæ, præsertim si in phreniticis appareant.* Gal verò in *comm.* dicit, se nullum phreniticum servatum vidisse, in qua talis urina apparuisset. Vel significant summam cruditatem, quæ aut mortem, aut morbi longitudinem portendit; longo enim tempore natura indiget ad illam summam cruditatem tollendam; idcirco si febris non admodum sit vehemens & acuta, & vires validæ sint, aliquando salus, longo tamen tempore succedit. In vehementi verò morbo, cum viribus prælanguidis, prorsus exitiales existunt. At multò certius perniciem denotant, quæ post principium inceperunt, & diu perseverant, quales fuerunt, quæ in muliere apud frigidam aquam decumbente apparuerunt; nam undecima die habuit urinas tennes aquosas, quæ tales usque ad diem quadragessimam perseverarunt. Si verò post crisin peractam diu talis urina reddatur, recidivæ certissimum est signum. In aliis denique morbis, ut febribus intermittentibus, aut mitioribus, & diuturnis, urina tenuis designat magnas lienis, hepatis, mesenterii, & similium partium obstructions, per quas urina veluti percolata tenuitatem adipiscitur.

*Quibus urinæ crassæ, grumosæ, paucae, non sine febre multitudo veniens ex his tenuis, juvat: maxime verò tales veniunt, quibus ab initio vel celeriter sedimentum inest, Aph. 69. sect. 4.*

Per crassas urinas oportet intelligere eas, quæ sunt valdè tales, quæve semper sunt perturbatæ; per grumosas, quæ multos continent grumos. Tales urinæ sunt incipientibus febribus pituitosis; nam crassities fit ex multitudine crassorum humorum: grumi fiunt ex frustulis quibusdam pituitæ, calore febris exsiccat. Hæc tunc temporis paucae fiunt; quia natura est conversa ad retinendum: cum verò jam coctus est humor, urina apparet facta tenuior, cessante videlicet perturbatione; & multa excernitur, natura conversa ad evacuandum; & quo copiosius prodit, eo plus juvat, sicut in omnibus criticis evacuationibus. Ergo hoc loco tenuis urina dicitur, non quæ revera talis est, ea enim non juvat; sed quæ turbationem concoctione deposuit: hæc maximè fiunt in pituitosis febribus, in quibus etiam solent urinæ in principio habere sedimentum quoddam fallax, quod non fit concoctione, sed descendentibus succis crudis.

*Quæ urina crassa, & turbida, & confusa mingitur; deinde per se ipsam clara evadit, limpida, bona.*

Ostendit enim victoriam naturæ heterogenea fecernentis, & quod sibi noxium est expellentis: idque magis, si post hujusmodi separationem crassior pars in fundo subsideat alba, levis, & æqualis.

*Urina, quæ clara mingitur primum, deinde verò post aliquod tempus conturbatur, bona.*

*Laz. Riverii Opera.*

Significat enim naturam jam inchoasse concoctionem, & illius ingne rudimentum edidisse.

*Urina crassa, turbida, talisque permanens, ut igni opposita clarescere non possit, mala.*

Talis enim urina, ut docet Gal. in *Aph. 70. sect.* si vires affuerint, longum fere morbum ostendit, si imbecillitas adsit, ægri mortem prænuntiat. Fit enim ex multitudine crudorum & crassorum humorum, quos multi flatus iis permixti conturbant & exagitant: atque ita si vires sint debiles, periculum est, ne ab hujusmodi humorum copia suffocentur. Si verò validiores sint, longo indigent tempore, quo materia illa concoquatur & edometur. Hujus urinæ exemplum habetur apud Hipp. 1. *Epid. sect. 3. Ægr. 4.* in uxore Philini, quæ die undecima urinam reddidit cum convulsionibus affatim multam, illis qui assidebant parum admonentibus, crassam, albam qualis fit in subsidentibus, quando sepositæ multo tempore turbantur, non subsidebat, color & crassities qualis jumentorum, vigesima interiit. Item *Ægr. 11. ejusdem sectionis*, in Dromeadæ conjuge secunda die urinæ erant crassæ, albæ, turbidæ, quales sunt ex subsidentiam habentibus, quando conturbantur, sepositæ multo tempore, non subsidebant: sexta die interiit. Ita & in Hermocrate & in eo, qui calefscens coenavit & potavit largius, eadem urinæ turbidæ non residentes fuerunt observatæ.

*Urinæ quæ turbide minguntur, & tales permanentes cum fæore insigni, pessimæ.*

Gangrænam enim in vesica, aut partibus vicinis significant.

*Urina, rubra, vel rufa & tenuis, talis diu perseverans, mala.*

Significat enim magnum caloris incendium & inflammatoriam quandam dispositionem in hepate, aut ventriculo, aut septo transverso residere, à qua nulla concoctio, sed adustio potius in humores introducatur. Ideoque talis urina diutius perseverans cum virium imbecillitate, mortem; cum robore verò illarum, morbi longitudinem, vel abscessum in partibus inferioribus prænuntiat.

*Nigræ urinæ in morbo acuto apparentes, perniciosæ.*

Significant enim insignem humorum torrefactionem, quæ in atræ bilis naturam eos degenerare faciat, unde lethales effectus producuntur, quem admodum videre est in Philisco, 1. *Epid. sect. 3. Ægr. 1.* qui tertia & quinta die nigra minxit, sexta verò obiit. Item in Erasino, *Ægr. 8. ejusdem sect.* qui quinta die obiit: Huic, inquit Hipp. febre per totum cum sudore, hypochondria elevata, contentio cum dolore; urinæ autem nigræ, habentes enæoremota rotunda non subsidebant. Item in Pythionæ, 3. *Epid. sect. 3. Ægr. 3.* in quo prima & quarta die urinæ nigræ notantur, & decima extinctus est. At verò si urinæ nigræ tennes etiam extiterint, deteriores censendæ sunt, quia majorem cruditatem significant. Hinc Hippoc. in 1. *Epid.* tennes, nigras & paucas urinas, quæ in principio febrium ardentium apparebant, unum ex signis fuisse, quæ annuntiare solebant, quibus exitium impenderet: At verò si multæ, si paucæ exierint urinæ, tennes & nigræ, perpetuò lethales sunt. Tum etiam quæ cum initio nigræ apparuerint, postea in tennes & aquosas mutantur: quod confirmatur historia Sileni, in 1. *Epid.* in quo urinæ usque ad quartum diem nigræ cum fuerint, quinta tennes & transparentes exire incœperunt. Et *hist. 2. sect. 3. lib. 3.* mulieris, quæ prope frigidam aquam decumbat, quæque octuagesima die interiit. Huic die undecima urinæ erant multæ tennes, & nigræ, vigesima verò urinæ aquosæ multæ. Quod Gal. in *comm.* annotavit: videlicet urinas nigras in aquosas veras, esse lethales. Denique pessimæ omnium sunt nigræ cum nigro sedimento, de quibus Gal. 1. *de*



## 82 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

de Cris. cap. 12. ita habet : *Pessima igitur est tota urina denigrata, adeo ut neminem unquam servatum viderim ex iis, qui talem urinam minxerunt. Minus verò perniciofa, si solum id, quod subsidet, nigrum fuerit, atque adhuc minus, si solum id, quod in medio jacet; & multò minus etiam, si nebula.* Advertendum tamen diligentèr est, nigras urinas non esse perpetuò malas. *Vid. Zacut.* Nam primo, in melancholicis tales possunt criticè excerni, quemadmodum Gal. *comm. in 3. Epid. sect. 3. text. 74.* dicit, se novisse quandam mulierem, quæ his urinis magna copia evacuatis, plurimum fuit juvata. *Secundò*, in lienosis urinæ nigræ salutariter excerni possunt, quando nimirum lien se per illam regionem exonerat; quemadmodum Herophonti contingit, in *1. Epid. sect. 3. Ægr. 3.* cui febre acuta detento, ab initio usque ad quintam diem urinæ fuerunt nigræ & tenues, quinta lien intumuit, octava lien imminutus est, urinæ colorationes, subsidentiam habebat paucam, decima septima judicatus est. *Tertiò* cum hæmorrhagia conjunctæ hujusmodi urinæ minimè periculosæ sunt, quia tenuior & calidior pars sanguinis, ex qua periculum impendebat, per hæmorrhagiam vacuatur, ut videre est in *1. Epid. sect. 3. Ægr. 7.* ubi Metoni magna febre correpto, quarta die fluxit è dextra nare sanguis bis, parum urinas subnigras habuit, enæorema subnigrum existens, dispersum non subsidebat, quinta fluxit largiùs ex sinistra sincerum, sudavit, judicatus est : post crisin vigil. obloquebatur, urinæ tenues, subnigræ, dormivit, resipuit, huc non rediit, sed sanguis sæpè & post crisin. *Quartò* denique, ex suppressione mensium urinæ nigræ apparentes, copioso eorundem mensium fluxu superveniente, morbi solutio fit : ut videre est in *Epid. sect. 3. Ægr. 12.* ubi mulier morosa, quæ tertia die judicata est, urinas tenues & nigras emittebat, circa judicationem verò muliebria multa descendebant.

Quælibet  
tas.

*Urinæ multæ & concoctæ, decretorio die apparent bonæ.*

Significant enim materiam morbificam devictam esse à natura, & convenienter expelli per loca consentanea. Tales urinas in Nicodemo observavit Hippoc. de quo ait : *Die vigesimo quarto multam urinam & albam reddidit, in qua multa subsidebant, & cum sudore fuit judicatus.* Et de Pericle ait idem Hippoc. *Tertio febris emollita fuit, urinæ multæ concoctæ, in quibus multa subsidebant.* Tum etiam Chærionem ait multis urinis biliosis fuisse servatum.

*Urinæ multæ, tenues, aquosæ, sine contentis, nihil juvantes malæ.*

Sequuntur enim humoris excrementitii & crudi multitudinem, ut renum calidiorem intemperiem, quæ existimatur diabetem parere, aut totius corporis colliquationem, unde summa caloris nativi exolutio consequitur. Sic *3. Epid. sect. 2. Ægr. 12.* mulier, quæ in mendacium foro decumbebat, octava die multam urinam sine fructu reddidit, decima quarta mortua est.

*Urinæ paucae & tenues & assumpto potui non respondent, quolibet in morbo, malæ.*

Vel enim significant secreticis & excreticis facultatis imbecillitatem, vel calorem intensum humiditates corporis exurentem, quales apparuerunt in uxore Dromeadæ, & in adolescente Melibœo, & in Euryanactis filia, & in illa muliere, quæ apud Tisamenum, & in ea, quæ apud Pantimedem decumbebat, qui omnes ægroti urinas paucas & tenues emittebant, & paulò post obierunt.

*Urinæ subsistentes in morbis acutis, perniciosæ.*

Fit enim urinæ suppressio in acutis, ut Gal. docet *comm. in 3. Epid.* vel ab igneo calore serum sanguinis prorsus absumente, vel ab extinctione fun-

ctionum naturalium, ut Sileno contigit, cui sexto die urinæ restiterunt, atque die septimo nihil minxit, undecimo interiit. Item in muliere Cyzici anginosa, apud Bironem agente, atque adolescente Melibœo, paulò ante interitum urinæ restiterunt. At deterrima etiam est urinæ suppressio, quæ rigorem consequitur, ut docet Hipp. *1. Coac. sect. 1. Aph. 5. Ex frigore,* inquit *pestifera est urinæ suppressio, quæ rigorem præcedit* : quandoquidem signum est evacuationis criticæ, quæ præsertim per sudorem futura est. Ita contra, cum rigorem subsequitur, pessima omninò est, quia significat destructam omninò fuisse vesicæ actionem, & calorem illius extinctum ab illa perfrigeratione.

*Urinæ, quæ nullum aut sedimentum, aut enæorema, aut nubeculam habent, malæ.*

Illæ urinæ, contentis carentes, malæ sunt, si id non dependeat ab inedia, laboribus aut vigiliis, aut nephritica renum dispositione, aut corpora non fuerint admodum biliosa. Significant enim magnam humorum cruditatem, aut corruptionem, aut viscerum debilitatem, aut inflammationem, aut obstructions vehementes.

*Urinæ paucam subsidentiam habentes, malæ.*

Minus quidem malæ sunt, quàm quæ contentis omninò carent, quandoquidem fiunt quidem ab iisdem causis, sed paulò minoribus. De his loquitur Hippoc. *Epid. Urinæ tenues & incoctæ, decolores, paucae, aut crassitiem habentes, parvam subsidentiam, malæ.*

*Farinacea in urinis sedimenta, mala; his sunt deteriora laminea; his autem sunt deteriora fursurea.* Hippoc. *2. progn.*

Hujusmodi sedimenta secundum Gal. *1. de Crisib. cap. 12.* fiunt à calore immenso, liquante & exurente pinguedinem, & ipsam carnis substantiam. Ubi autem calor adurens agit in partes solidas, primum pinguedinem molliorem & recenter concretam aggreditur, mox solidiorem, & ubi omnis pinguedo est colliquata & consumpta, tum aggreditur primò carnem teneriorem & recenter concretam; postremo carnem solidiorem, & tandem partes solidas. Ex pinguedine itaque recenti, ab ingenti febris calore colliquata; urinæ fiunt oleagineæ. Ex pinguedine verò solidiori colliquata, necnon à carnis inæqualiter liquatis aut ex assato sanguine crasso, ut docet Gal. *in comm. hujus prognostici,* fiunt farinaceæ. Ex solidis denique inæqualiter eliquatis fiunt lamineæ, tunc etiam fursureæ à calore intensius adurente. Unde facile videre est, sedimenta laminea esse farinaceis deteriora, fursurea verò lamineis. Quantum verò perniciofa sint illa sedimenta, satis liquebit ex Gal. judicio, de farinaceo reliquis minùs malo, quod ab eo prolatum est *comm. in Aph. 31. sect. 7.* ubi sic habet : *Tales urinæ exitiales sunt, sicuti etiam in prognostico dictum est, & plurimi morte præripiuntur, antequam ægritudo diutius protrahatur, & quicumque ex ipsis sunt liberati, iis omnibus in longum producta est ægritudo, cum dispositio multam requireret colliationem, in qua talis urina mingitur.* Ita Hipp. *in epid. Ægr. 2.* inquit : *Minxit affatim, crassum erat quod subsiderat, sedimentum instar farinæ crassioris album, extrema rursus frigida, undecima mortuus est.* At in *3. epid. sect. 1. Ægr. 3.* de eo, qui in Dealcis horto decumbebat, urinæ, inquit, *tenues, variæ, habentes sublimamenta varia instar farinæ crassioris* : hunc autem dicit quadragesimo die fuisse judicatum. Liqueat igitur ex his exemplis, quod quicumque mingunt urinam similem farinæ crassiori, si salvari debeant, tardè liberentur; quicumque verò exitialiter se habent, contingat hos quam citò interiire. Urinæ farinaceæ sunt, quando hypostasis apparet in fundo urinæ instar puris; & sunt valde exitiales, ut ego expertus sum.

*Sedimen-*



## Cap. II. De Signis Morbi Salut. &c. 83

*Sedimentum in urinis divulsum & inaequale, malum.*

Cruditatem enim significat, quæ si in eodem statu perseverat, neque sedimentum in progressu morbi ad melius mutetur, ostendit naturam non posse materiam morbificam superare; si verò corrigatur in dies, solutionis spes est, sed tardiùs accessuræ.

*Sed mentum tenue, initio morbi apparens, & in dies sensim crassescens, bonum.*

Significat enim naturam ab initio coctionem agredi, eamque in dies ulteriùs perficere.

*Sedimentum crassum in quovis morbi tempore apparens malum.*

Fiunt sedimenta, crassis & crudis humoribus, qui cum urina permixti, ab ejusdem liquore separantur, & gravitate suâ matulæ fundum petunt. Cum igitur crassi illi humores & crudi difficile admodum à natura vincantur; ideò periculum minantur, præcipue quando vires sunt debiles: Si verò cum virium robore appareant, saltem morbi longitudinem significant. Possunt autem hujusmodi humores crudi & crassi, matulæ fundum petentes, junioribus Medicis imponere, ut pro vera & laudabili hypostasi accipiantur, ab illa igitur exactè distinguendi sunt. Ac primum humores illi crudi plerumque in principio morbi apparere solent; bona verò hypostasis nonnisi in statu aut declinatione. Et contingit plerumque, ut post principium morbi, attenuato illo humore crudo nullum ampliùs appareat in fundo sedimentum; sed illius loco aut nebula, aut enæorema quod progrediente concoctione à superioribus matulæ partibus ad inferiores in dies prolabitur, quæ est vera ratio bonæ concoctionis, ut scilicet ex nebula fiat enæorema, & ex enæoremate sedimentum. At contra quando ex sedimento sit nebula aut enæorema, sedimentum illud non erat laudabile, sed crudus humor & crassus, qui postea concoctione attenuatus est. Secundò, crudus humor sibi ipsi non cohæret; neque omnino levis & æqualis est, sed viscidus & nimis crassus. At laudabile sedimentum læve & æquale est, & moderatè crassum. Denique crudus humor gravior est, & in matulæ fundo omninò subsidet. At bona hypostasis non residet, sed potiùs subsidet in fundo, ab eoque tantillum sublevatur, & globosam quodammodo figuram obtinet: quod non facit humor crudus, qui magis diffusus est. Cum quis morbo defunctus videatur, urinas tamen reddit decolores, cum sedimento valdè albo inflar nivis, ex recidiva moriuntur, ut observavit ter aut quater D. Pachecus.

*Urinæ sedimenta livida aut nigra, pessima.*

Idque propter rationes, quæ in urinæ liquore nigro fuerunt propositæ.

*Enæorema divulsum, inaequale, aut nigrum, malum.*

Sedimentum hisce conditionibus præditum, malum esse, supra ostensum est; reliqua verò contenta propter easdem rationes etiam mala sunt, sed minùs mala quàm sedimentum.

*Nebula, juxta urinæ superficiem, circuli modo elevata, in morbis acutis pessima.*

Instantem enim phrenitidem, & ex ea mortem significat.

*Urina oleosa, & cui pingua araneorum telis similia innatant, mala. Hipp. in progn.*

Significant enim calorem immensum, pinguedinem colliquantem, quæ est in renibus, aut in toto corpore. Quomodo autem distinguatur, an hujusmodi colliquatio procedat à renibus, an verò à toto corpore, docuit Hippoc. Aph. 35. sect. 7. his verbis: *Quibus autem summum est pingue & confertum, his renum malum acutum significatur.* Per acutum malum calidam intemperiem significat, quæ facit

Laz. Riverii Opera.

mixtum acervatum pinguedini, quia adjacet renibus multa acervataque pinguedo, & est ab eo loco brevis expeditaque via urinæ, ut quod liquatum est, minùs viis hæreat. Itaque si acervatim excernitur pingue, est ex malo acuto renum, sed si non acervatim, sed telis araneorum similia exeant, ex consumptione communi est. Hujusmodi urinæ oleosæ exemplum habetur apud Hipp. 1. epid. Ægr. 12. in Dromeadæ conjugæ, in qua quarta die urinæ apparuerunt tenues, oleosæ; quinta urinæ similes: sexta verò interiit. Ita & 3. Epid. sect. 3. Ægr. 1. in filio Parionis qui septima die minxit oleosum, centesima vigesima mortuus est, & in eo sine dubiò tales urinæ diu perseverarunt, quod videtur innuere Hipp. his verbis: *urinæ usque in finem mala.* Ita & Ægr. 16. ejusdem sect. Melibœæ adolescens ab initio morbi minxit oleosum, vigesima quarta interiit. Quamvis autem hujusmodi urinæ oleosæ pessimæ sint; tamen farinaceæ, lamineæ, & furfuraceæ adhuc multò deteriores sunt, ut supra ostensum est.

*Urinæ, quæ insciis ægrotis, & non recordantibus minguntur, pessimæ.*

Hæc sententia habetur apud Hipp. in 1. prorrh. text. 28. his verbis: *urinæ excretio in recordantibus perniciofa.* Denotat namque aut cerebrum valde læsum, & ingenti delirio ægrotantem affici, aut extinctum esse partium naturalium robur, ut functiones suas ampliùs exercere nequeat.

*Urinæ in febribus malignis atque pestilentibus; substantia, colore, & contentis urinæ sanorum similes, exitiosæ.*

Hoc innuere videtur Hipp. in Coacis dum ait: *urina repente & extra rationem coctæ, prava, & quidquid in urinis præter rationem coctum, pessimum.*

Morbi autem maligni & pestilentes à venenata quadam qualitate producuntur, quæ ipsi cordi, & spiritibus bellum peculiariter indixit, quorum integritas subito destrui potest ab hoste illo potentissimo, quantumcumque bene se habeat reliqua naturalis œconomia. Vel etiam hujusmodi urinæ, apparenter laudabiles in morbis acutis, & pravis symptomatis stipatis, ostendunt bilem, qua alias colorasset, aut cerebrum, aut aliquod aliud viscus invasisse nihilque succorum noxiorum cum urinis externi, quod summè perniciosum est. Vid. Tom. 1. Oper. Horst.

*Ne te decipiat si vesica vel renes, morbum habentes, vitiosas urinas reddiderint, non enim totius corporis signum est, sed tantum illarum partium. Hipp. 2. progn.*

Hoc inde dignoscitur, quia si urina pravis contentis referta, & bene cocta fuerit, constat ex malo peculiari renum aut vesicæ esse; nam si ex febre urente esset, urina non esset bene cocta. Hoc innuit Hippocrates Aphorism. sect. Quibus cum urina crassa caruncula parva, aut veluti capilli una exeunt, iis è renibus excernitur. Et Aphorism. 77. ejusdem sect. Quibus cum urina crassa fursurea quædam simul exeunt, iis vesica scabiè laborat. In his Aphorismis urinam bene coctam appellat Hippocrates crassam, ut testatur Galen. in comment. quod est peculiare indicium, contenta illa à renibus aut vesica provenire.

*Sudores, qui cum manifestæ concoctionis signis die critico, & rigore præcedente, ex toto corpore, calidi, copiosi, stillantes, & cum vapore erumpunt, & quibus febris vel perfectè solvitur vel admodum immittitur, boni.*

Libuit omnes boni sudoris conditiones hîc simul congerere, tum ut ille faciliùs internosci queat, tum ut omnes mali sudoris differentiæ, ad hanc veluti regulam collatæ meliùs innotescant. Sex igitur conditiones requiruntur, ut sudor aliquis bonus dici mereatur, quarum prima est ex Gal. 1. de Cris.

L 2

cap.



## 84 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

cap. 2. quod ante sudoris eruptionem concoctionis signa debeant apparere. *Coctiones* enim, ut inquit Hippoc. 1. epid. *crisis celeritatem, salutisque securitatem significant. Cruda verò & incocta, & in multos abscessus conversa, dolores, longitudinem, acrisias, mortem, vel recidivas. Secunda conditio est, ut boni sudores die critico erumpant, quod testatur Hipp. Aphor. 36. sect. 4. qui sic habet: Sudores febricitantibus si inceperint, boni, & tertio die, & quinto, & septimo, & nono, & undecimo, & decimoquarto, & decimoseptimo, & vigesimo, & vigesimoprimo, & vigesimoseptimo, & trigesimoprimo, & trigesimoquarto. Hi enim sudores judicant morbos: qui verò non ita fiunt, laborem significant, morbi longitudinem, & recidivam.* Notandum obiter in hunc Aphorismum, quod Gal. in comm. anxie inquit, cur quartus dies in eo omissus sit, cum tamen sit primus judicatorius? Resp. verò, hunc diem vel esse prætermittum ab ipso Hippoc. vel ab eo, qui primus librum transcripsit. Si autem, inquit, omnino Hippoc. illum præterit, hanc ob causam existimo illum fecisse, quoniam morbi plurimi peracuti, qui cum sudore judicantur, tertio & quinto die magis quam quarto judicium suscipiunt. Rariores enim sunt, qui die quarto judicantur, & hoc à me fuit inventum per experientiam, ob hoc ipsum plurimum quærente, cur dies quartus fuerat ab Hippoc. in Aphorismo prætermittus. Hoc deinde dicit accidere, quoniam morbi peracuti diebus imparibus moventur, & crises iisdem diebus solent accidere, quibus morbi exacerbantur: atque ita tertio vel quinto die potius crisis contingit quam quarto, quia morbi, qui diebus paribus moventur, tardius solent judicari. Tertia conditio est, quod boni sudores criticum aliquem rigorem sequantur; natura siquidem cum è venis tenues acutofque humores detrudit, & in ambitum corporis propellit, vellicatis partibus sensibilibus, quas illi humores prætergrediuntur, rigorem concitat, cum extremarum partium refrigeratione, rigorem verò & refrigerationem, si natura robusta satis fuerit, calores foras erumpens, febris acuta & magna consequitur, cujus calore humores extenuati, in sudorem copiosum resolvuntur: unde Hippoc. Aph. 58. sect. 4. *febre ardente laboranti, rigore superveniente, solutio fit.* Ita & 3. epid. sect. 2. *Æg. 5. loquens de Chærione ait: decima septimâ superripuit febris acuta, sudavit, sine febre, judicatus est.* Quarta conditio est, ut sudores copiosi sint & calidi, atque ex toto corpore prorumpant. Tunc enim facultatem robustam denotant, cum æquè per omnes partes corporis ea calorem diffundit, ipsosque superfluos humores in sudorem digerit, & æquè per omnes partes resolvit; quod ei quidem prælanguidæ non succedit, aut cum maligno morbo laborat. Sudores enim tunc inæqualiter vacuantur, in quibusdam partibus plus, in quibusdam parum, vel nihil. Multa talis sudoris exempla proposuit Hipp. in epid. ut in Pericle, de quo ait: *Quarta circa meridiem sudor prorupit toto corpore multus, & calidus, sine febre, judicatus est, neque rediit.* Et de Nicodemo: *sudor ei toto corpore copiosè calidus emanavit, sine febre, judicatus est.* Et de muliere morosa: *sub hanc noctem sudor multus toto corpore, & calidus prorupit, liberata febre, dormivit.* Et de Virgine Larissæ: *Inhorruit, & mox sudavit toto corpore multum & calidum sine febre, est judicata.* Quinta conditio est, ut sudor stillans effluat, & cum vapore, quemadmodum proposuit Hipp. 1. progn. cap. 8. Illa autem ostendit naturam pravis humoribus dominari, eosque validè ad superficiem expellere. Sexta & ultima conditio est, ut ex eo sudore morbus tollatur, aut admodum minuatur. Ideo Hipp. in Epid. optimos sudores proponens, qui morbos integrè sustulerint, sæpius dixit, *febre liber, aut febris*

*cessavit, aut sine febre, judicatus est.* Eos verò, quibus morbus tantum imminutus est, proposuit in historia illius, qui in Dealcis horto decumbebat, de quo ait: *decimo septimo extrema frigida, cooperiebatur, acuta febris, toto corpore sudavit, allevatus est, melius sapiebat, non tamen febre liber, & vigesimo dormivit, planè mente constabat, sudavit, liber erat à febre, non sitiebat, quæ postea rediit. Et nonnisi die quadragesimo cum alvi subcrebra pituitosaque dejectione, cum multo sudore ex toto corpore absolute est judicatus.*

*Sudor multus in febre acuta apparens, eamque non imminuens, malus.*

Ostendit enim humorum multitudinem, quam natura difficilè superare queat, & nonnisi longo tempore, quod in morbis acutis non conceditur; ideo periculum est, ne natura succumbat, antequam coctionem perficere possit. Unde Hippoc. Aph. 42. sect. 4. *Sudor multus calidus vel frigidus, semper fluens, frigidus graviolem, calidus minorem morbum significat.* Quia, ut inquit Gal. in comment. *uterque copiam humorum significat, quippe frigidus frigidorum, quæ est pejor; calidus calidorum, qui priore minus est periculosa.* Hi autem neque febrem solvunt, neque imminuunt, crudoque morbo erumpunt; ideò longitudinem saltem recidivas, atque laborem significant.

*Sudores assidui, sive modici illi sint, sive copiosi, in febre acuta mali.*

Significant enim naturæ imbecillitatem, quæ non possit humores retinere, donec per concoctionem ad excretionem præparati fuerint. Ideò qui continenter sudant, sed modicè, si evaserint, diu saltem ægrotare solent. At si crebrò magnam sudoris copiam profundant, palam est, non multò post eorum virtutem resolutam iri. Adde quod sudores, quicunque per plures dies perseverant, symptomatici sint, quia critici intra unum absolvuntur.

*Sudatiuncula omnis, præcipue quæ circa caput & cervicem apparet, mala.*

Contingit enim plerumque hæc sudatiuncula, quam *ὑπερσυστολή* Hippoc. nominat, ob magnam virium imbecillitatem, quæ humores circa cutem existentes continere nequit: ut videre est in syncope, ubi sudor exiguus circa caput, collum aut pectus emanat; aut etiam in moribundis talis sudor sæpe numero contingit, qui *diaphoreticus* vulgò solet nominari. Sic apud Hip. 1. epid. sed. 1. *Æg. 1. Si lenus circa caput modicum sudavit, undecima interiit.* Ita & 3. epid. sect. 2. *æg. 11. mulier, quæ post abortum febre magna tenebatur, quarta die sudavit circa caput exiguo frigido; septima interiit.*

*Sudor, qui cum caperit erumpere statim desinit, malus.*

Significat enim naturam excretionem moliri, & præ imbecillitate non possit opus absolvere.

*Sudatiunculæ, & rigoris crebra vicissitudo, funesta, 1. Coac. Aph. 10.*

Dicit Hipp. hanc sudatiunculam, cum rigore frequenti, empyema significare. Et certè humores in vasis contenti hæc non possunt producere, quandoquidem tum sudatiuncula in capite tantum & thorace solet apparere. Sed ex concepto empyemate fit vellicatio partium thoracicarum à puris acrimonia, unde levis ille rigor, quem sudatiuncula sequitur, facultatis infirmitate, ob quam succi alibilis resolutio fit.

*Frigidi sudores cum acuta quidem febre mortem, cum mitiori autem, morbi longitudinem significant. Aph. 37. sect. 4.*

In febribus putridis humores putrescunt interdum in vasis solis, interdum verò in toto corpore, ita ut in partium substantia, & juxta cutem, atque adeo in toto habitu corporis humores noxii contineantur,



neantur, cum verò hæc duo contigerint, tum humores, qui sunt in vasis; putrescere tum etiam calorem nativum vel extinguere omnino in habitu corporis vel proximum esse extinctioni; quæ quidem ex his partibus evacuantur, frigida sentiuntur. Eam verò, quæ fit ex putredine in vasis caliditatem nihil prohibet vehementissimam esse, atque adeò signum exitiale, offendens in hominis corpore humorum multitudinem, tantam habentium frigiditatem ut neque à calore nativo, neque à febre illi calefiant. Si igitur in febre acuta frigidi sudores contingant, mortem prænuntiant, quando quidem illa humorum crudorum & frigidorum multitudo non potest tam exiguo tempore concoqui, calore admodum debili existente. At si cum mitiori febre contingant, non quidem mortem, sed morbi longitudinem prænuntiant, quia non tantopere vires labefactantur à mitiori febre, & eo longius tempus protrahitur, in quo natura potest illam humorum multitudinem concoquere. Hæc est doctrina Gal. in comm. hujus Aphor. Attamen fiunt etiam frigidi sudores, vel ob summam inflammationem, vel ob simplicem caloris nativi exsolutionem. Cum enim summa aliqua inest internis partibus inflammatio, universus calor exteriorum partium retrahitur ad interiora, unde externæ partes manent omnino refrigeratæ. Atque ita fit, ut cum ex interno illo incendio magna fiat effusio, vapores illi in cute condensentur, & in sudorem abeant, eumque frigidum, quia à cute refrigerata refrigerantur, ut in lypyria febre solet evenire. Cum etiam in morituris calor natus sit valde exsolutus, cogitur ille præ nimia paucitate totus in corde colligi & partibus interioribus, unde externæ partes manent refrigeratæ. Calor autem ille conclusus aliquam adhuc efficit evaporationem, quæ tota in sudorem concrevit, eumque frigidum, propter dictam partium externarum frigiditatem. Quocumque autem horum duorum modorum contingat hujusmodi sudor, lethalis procul dubio censendus est. Multa sudorum frigidorum exempla proponuntur ab Hippoc. in Epid. quæ hujus prognostici veritatem luculenter patefaciunt, v. g. in Epid. sect. 1. Ægr. 1. Philiscus die quintâ sudavit frigidum: sextâ verò obiit. Et Ægr. 1. ejusdem sect. Silenus octavâ die sudavit per totum frigidum: undecima interiit. Idem & 3. sect. 2. Ægr. 11. mulier, quæ ex abortu febre magna correpta est, quarta die sudavit circa caput exiguo frigido: septima interiit. Et Ægr. 12. ejusdem sect. mulier, quæ in mendacium foro decubebat septima sudavit per totum frigida, decima quarta mortua est.

*Frigidi sudores in morbo acuto pessimi.*

Summam enim humorum putredinem significant, quæ naturalem corporis œconomiam destruit & evertit.

*Si inter sudandum horror vel rigor sæpius recurrit, malum.*

Quia novus iste naturæ conatus magnam indicat illius perturbationem, quæ non potest propositam evacuationem perficere convenienter, sed denuò insurgit cum magno virium & vitæ periculo. Unde Hipp. Aph. 4. sect. 7. à sudore horror non bonum.

*Sudor, qui non effluit, sed instar granorum milii in cute apparet, malus.*

Hujusmodi sudor in capite aut cervice tantum solet apparere per syncopas, aut alias virium exsolutiones, quæ non possunt copiosum sudorem effundere, sed exiguum tantum, qui in tales globulos granis milii similes efformatur.

*Sudores qui die non critico contingunt, mali.*

Symptomatici enim sunt & à vi morbi concitati. Qui enim fiunt à naturæ moru bene operantis, diebus tantum criticis contingunt. Sic apud

Hip. Epid. sect. 1. agr. 11. Dromedæ conjux sexta die sudavit per totum, & eadem die interiit. Et 3. Epid. sect. 3. Ægr. 3. Pythioni decima die multus sudor accidit, & eadem die interiit.

*Sudores in principio morbi apparentes, mali.*

Quia in principio omnia sunt cruda, & nihil potest salutariter excerni, nisi prius debite concoctum sit. Idcirco verum est hoc theoremate de omni evacuationum genere, quæ in principio morbi nunquam possunt esse salutares. Ita Philiscus die prima sudavit: tertia circa vesperam febris acuta cum sudore: sexta die obiit. Ita & Dromedæ conjux tertia die sudavit per totum, sextâ verò interiit. Et phreneticus, cujus historia habetur 3. Epid. sect. 3. Ægr. 4. prima die multum sudorem per totum effudit, secunda sudavit, quarta mortuus est.

*Quicumque abscessus post signa concoctionis apparent, & secundum reformationem partis affectæ & in loco ab illa valde remoto, declivi & capaci, non valde exquisito sensu donato, & qui citissime ad suppurationem perveniunt, salutares, qui contrario modo se habent periculosi.*

Loca abscessui recipiendo maximè idonea sunt crura, tibiæ, brachia, inguina, axillæ & articuli. Sunt enim à partibus internis remota, aut saltem earum excrementis recipiendis idonea & satis capacia, ac calore nativo prædita, ut materia in illis contenta faciliè concoqui valeat; si verò fiant in abdomine, periculosissimi.

*Quicumque abscessus foras vertuntur, optimi sunt qui parvi, & maximè egrediuntur, atque ad exteriora eminent, & in acumen elevantur. Qui verò majores sunt, plani & omni acumine destituti, mali; tum etiam quicumque ad interiora vergunt, vel intro rumpuntur.*

*Optimi sunt, qui interioribus partibus nihil communicant, sed sunt adducti, & parum doloris inferunt, & cutis colorem non mutant. Hippoc. Prognost. cap. 10.*

Abscessuum bonitas vel malitia ex triplici sumitur differentia, scilicet loci in quem erumpunt, figuræ, quam retinent, & loci in quem rumpuntur. Quod ad primam spectat, quo magis abscessus aliquis vertitur ad exteriora, eo melior est, cum ut signum, quia robustiorem facultatem expultricem significant; tum ut causa, quia minus lædit partes interiores. Quod attinet ad figuram, qui parvi sunt, inquit Hipp. meliores quod non intelligendum est simpliciter de quantitate abscessus, quandoquidem abscessuum magnitudo quantitati materiæ respondere debet; sed de magnitudine secundum basin, scilicet qui minorem habent in basi circumferentiam, sunt meliores, tum etiam qui maximè egrediuntur, surguntque in acutam. Nam robur expultricis facultatis significant. Qui verò magni sunt secundum basin, hoc est lati, & minimè acuti, contrariis de causis mali sunt. Quod rupturam attinet, omnium optimi sunt, qui rumpuntur extra solum, quia ita fit ulcus magis idoneum ad curationem, & commodius multo est pus extra erumpere, quam ad interna membra labi. Optimi denique sunt, qui partibus internis nulum dolorem, aut inflammationem, aut aliam quamvis malam dispositionem communicant, tum & ipsi exiguum dolorem inferunt, & colorem cutis naturalem parum immutant, quia significant, partes circa ulcus bene temperatas, atque adeò curationem sui se promptè promovere.

*Omnis abscessus, qui ad suppurationem venit, si pus effundat laudabile, salutaris est; si non laudabile, periculosus.*

Dictum fuit antea, pus laudabile, esse debere album, læve, & æquale, & minimè foetidum. Quod contrarias habet conditiones, malum est; significat



## 86 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

enim potius materiæ putredinem, quam veram concoctionem.

*Si abscessu in aliqua parte apparente æger non sublevetur, sed eadem symptomata perseverent, lethale.*

Significatur enim, hunc abscessum fieri potius ex decubitu materiæ in illam partem, quam ex critica expulsionem, ex qua perpetuò æger melius habere solet.

*Abscessus in principio morbi apparens, pestifer.*

Nulla evacuatio, quæ fit morbo crudo existente, potest esse utilis: sed in abscessibus præsertim hoc peculiariter observandum est, quod morbi, in quorum principio contingunt, ut plurimum maligni sint atque pestilentes, unde maximum vitæ periculum præfigere licet.

*Abscessus minores vel majores, quam par sit apparentes, mali.*

Minores non recipiunt sufficientem materiæ morbificæ copiam, qua morbus solvi, aut multum imminui possit, ideoque inutiles. Majores verò nimiam humoris morbifici copia denotant, unde periculum est, ne natura oneri succumbat, tum etiam, ne præter cutem & musculos pars aliqua interna, aut ex principibus, aut ex necessariis obfideatur.

*Quicumque abscessus, postquam apparuerint, citò recurrunt & occulantur, funesti.*

Significant enim naturam esse prælanguidam excretionem quidem aggredientem, sed eam præ imbecillitate perficere nequeunt. Hoc tamen ita intelligendum est, modò illa retractio non fiat ab aliqua evacuatione, ab arte, vel à natura procurata.

*Quæ dolenter ad aures assurgunt, pestifera. 2. Coac. cap. 4.*

Omnes parotides à præstantioribus Medicis semper ferè suspectæ haberi solent, propter loci angustiam, qui non est capax totam suscipere materiam: tum etiam propter viciniam cerebri, ad quod fit refluxus materiæ morbificæ. Sic verò parotides gravem dolorem inferant, magis periculosa sunt, quia significant humorum multitudinem, quæ tensionem parit, ex qua dolor concitatur. Attamen si parotidum eruptionem copiosus sequatur alvi fluxus, vel multa profluat urina, solent ægri liberari, ut Clazomenio contigit in 1. epid. sect. 2. ægr. 10. in quo die decimaseptima, propè ambas aures facta est elevatio cum dolore: & vigesima-septima tumores circa aures magis elevati sunt, neque subliterunt, neque suppurati sunt. Trigesima prima fluxus alvi, multi, aquosi, cum dysenteria: urinas crassas minxit, subliterunt quæ circa aures, & ad quadagesimam secundam à morbo liberatus est.

*Parotides, quæ cum urina cruda apparent, malæ.*

Ostendunt enim naturam non potuisse superare causam morbificam, & ad convenientem evacuationem disponere.

*Parotides, quæ fraëlis jam viribus contingunt, mortificæ.*

Maximè enim tunc temporis natura viribus opus habet ad expellendam materiam morbificam, & parotidum suppurationem moliendam: si igitur & illo motu deficiant, nulla salutis spes superesse potest.

*Parotides, quæ non suppurentur, malæ nisi larga hæmorrhagia, aut copiosus alvi fluxus succedat, aut urina crasse & concoctæ profundantur.*

Non tamen omnis alvi fluxus parotides dissipat, nam in febre pestilenti sæpè cum parotidibus ægros de medio tollit: sed oportet alvi fluxum esse criticum, & laudabilem, quod ex signis supra de alvi fluxu propositis facillè innotescet. Hinc Hippoc. in

*Coac. diutius hypochondrio afflicto, & alvo graviter olente abscessus ad aures, interfecit.*

*Parotides, quæ magnitudine moderata, sine dolore, integris viribus aliquo die critico, & antegressis collionis signis erumpunt, bonæ.*

Quamvis parotides ut plurimum suspectæ esse soleant, ut antea dictum est; tamen utiliter aliquando erumpunt; si nimirum dictis conditionibus appareant, ex quibus dignoscitur naturæ dominium supra causam morbificam. Sic in Clazomenio, cujus historia supra relata est, urinae toto morbi decursu tenues quidem, sed bene coloratæ apparuerunt: & die decima septima, quæ critica est, parotides apparuerunt.

*Pustula in principio morborum acetorum, toto corpore, aut nonnullis partibus apparentes, periculosa.*

Apparere solent plerumque hujusmodi pustulae in morbis malignis & pestilentibus, & eorum sunt indicia, atque vitæ periculum minantur: præcipuè verò si in principio morbi erumpant, quod majorem malignitatem significat, quæ naturam irriter ante ullam concoctionem ad exclusionem ichorum acrium & venenatorum, à quibus hujusmodi pustulae produci solent. Unde Hipp. in Coac. quibus in febribus pustulae per totum corpus erumpant, lethale, nisi purulentus abscessus illis succedat. Et alibi: Qui circa artus rotundas in superficie pustulas habent, insuperque rigorem, illis tandem circa inguina & ventrem rubores & nigredines exoriuntur & intereunt. Quod etiam confirmat idem Hippocr. in 1. Epid. exemplo Sileni, in quo die octava exanthemata cum sudore rubra, rotunda, parva, veluti vari prodierunt, & undecima interiit. Quamvis autem variolæ & morbilli, qui in pueris frequenter apparere solent, ex hoc genere esse videantur; solent tamen non rarò salutariter erumpere, si nimirum fiant simpliciter ab ebullitione & motu naturæ secernentis purum ab impuro. Quando verò à maligno & venenato aëris contagio dependent, tunc magnum periculum invehunt, & magnam sæpè puerorum stragem efficere solent.

*Pustulae admodum rubentes, vel præcipuè liventes aut nigricantes, exitiosæ.*

Valde rubrae intus humorum fervorem significant, quales in Sileno apparuerunt. Livida aut nigra humorum adustionem significant, & maximam malignitatem, unde pestulae carbunculosa naturam nanciscuntur. Sic in variolis & morbillis, quibuscunque exanthemata livida aut nigra apparent, omnes moriuntur.

*Calor in febribus optimus est, temperatus, suavis, Qualis aequalis in omnibus corporis partibus cum quodam tate humido, qui maximè nativo calori sit similis, & corporis quali totius corporis mollitie.*

Primò, bonus iste calor per humiditatem, quam habet comitem, ab igneo distinguitur qui siccus esse consuevit. Secundò, per mollitiem in toto corpore æqualem distinguitur ab eo calore, qui in febribus malignis reperiri solet, qui Medicos plerumque fallere solet; blandus enim & mitis est, calori naturali simillimus, intus nimirum concluso calore intensiori, nec foras liberè diffuso. Quamobrem bono illi calori corporis unà totius æqualem mollitiem conjungi oportet, ut docet Hipp. 2. prog. Optimum, inquit, est si corpus omne æquale calidum, molleque est, æqualis enim totius corporis mollities distinguit bonum calorem ab aliis, qui boni non sunt. Atque ita calor mitis & blandus, qui in febre maligna reperitur, dignosci poterit ex inæquali totius corporis mollitie, quod videlicet hypochondria dura ut plurimum & tensa appareant. Aut saltem illa caliditas in toto corpore æqualis non erit, quòd nimirum partes extremæ minus calidae



lida sentiantur, at circa ventrem intensior caliditas percipiatur. Ita caliditas temperata æqualiter in toto corpore, cum æquali quoque mollitie, semper bonum signum erit; siquidem fieri non potest, quod corpus tali caliditate & mollitie præditum exitiosè ægrotet: id enim certò demonstrabit, viscera inflammatione, obstructionibus, & insigni putredine carere.

*Flammans cum sudore facies in febre acuta, mala. 2. Prorrh. text. 33.*

Intensa enim illa caliditas internam cerebri inflammationem significat, & sudor pariter eandem partem laborare ostendit, quandoquidem ut testatur Hippocrates in *Aphorismis*, ubi sudor, ibi morbus est.

*In febribus circa ventrem fortis æstus, & morsus oris ventriculi, malum. Aph. 65. sect. 3.*

Significat enim magnam inflammationem, vel multam bilem, eamque acerrimam circa ventriculum ebullientem aut putrescentem, quæ interni erysipelatis faciat.

*In morbis acutis frigus partium extremarum, malum, Aph. 1. sect. 7.*

Fit enim illa refrigeratio extremorum in morbis acutis; vel ob internam inflammationem, cujus calor adeò vehemens est, ut ad se trahat totum sanguinem instar cucurbitulæ; unde fit ut iis, qui ita se habent, viscera perurantur, extremæ autem partes frigescent, propter defectum sanguinis ad viscera se recipientis. Confirmavit idem Hip. *Aph. 48. sect. 4. In febribus non intermittentibus si partes exteriores sint frigida, interiores verò urantur, & sitim habeant, lethale est.* Hæ autem febres, in quibus exteriora frigent & interiora uruntur, Lipyriæ nominantur, suntque præcipuè ex inflammatione partium nervosarum, veluti ventriculi & intestinorum, suntque perpetuò lethales, & paucis diebus interimunt. Vel fit illa refrigeratio extremorum ex maxima exsolutione caloris nativi cujus reliquæ perexiguæ, in corde & præcipuis visceribus collectæ, non possunt usque ad partes exteriores exporrigi. Idcirco qui ita refrigerati sunt maxima laborant imbecillitate virium, nec amplius recalescunt, & morti sunt proximi, quod testatur Hip. in *Prorrh. Quoties à rigore refrigeratur quis, nec denuò incalescit, malo est loco.* Et confirmatur in *epid. sect. 2. Ægr. 1.* ubi Philiscus quinta die habuit extrema undique frigida, & non amplius recalescentia: sexta die obiit. Ita & *Ægr. 2. ejusdem sect.* Silenus sexta die extrema habuit frigida, livida; septima extrema, non amplius recalescebant: undecima interiit. Ita & *Ægr. 8. ejusdem sect.* Erasinus quinta die circa meridiem extrema habuit frigida, sublivida, & eadem die interiit circa solis occasum. Ita & *3. Epid. sect. 2. Ægr. 11.* mulier, quæ ex abortu febre magna correpta est, habuit extrema frigida à quarta die usque ad septimam, qua interiit. Attamen interdum extremorum frigiditas non perseverans, nec frequenter revertens, bona esse consuevit; crisin etiam advenientem significat, in qua calor retrahitur ad interiora, ad excludendam materiam morbificam: ut contigit illi, qui decumbebat in Dealcis horto, *3. epid. sect. 1. Ægr. 3.* qui die decima septima habuit extrema frigida, postea febrem acutam, & sudavit per totum, & allevatus est.

*Frigiditas narium perseverans toto ferè morbi decursu in puerulis, lethalis.*

*Frigiditas linguæ per aliquot dies perseverans, lethalis: ut in tribus ægotantibus animadversum fuit, in quibus alia symptomata gravia non apparebant, præter quandam virium languorem.*

*Qui frequenter refrigerantur, & vicissim incalescunt, sunt in periculo. 2. Prorrh. text. 32.*

Significatur enim materiæ morbificæ multitudo vel malignitas, adversus quam natura certamen frustra aggrediat, unde caloris nativi exsolutione, mors tandem consequitur, ut annotavit Hipp. in *3. Epid. sect. 1. Ægr. 12.* Ubi mulier, quæ decumbebat in mendacium foro, septima die subriguit, febris acuta, circa vespere refrigeratio extremorum, non amplius recalescebat, & rursus ad noctem superriguit, extrema non recalescebant. Decima extrema recaluerunt. Undecima rursus extrema frigida. Decima quarta mortua est. Ita & *3. epid. sect. 3.* Pythio die secunda habuit refrigerationem extremorum, & post multum tempus recaluit. Tertia subrefrigeratus est parum. Quarta iterum refrigeratio, & recaluit post tempus. Octava manè refrigeratio, serò autem rursus recaluit. Decima multa refrigeratio, febris acuta, multus sudor, interiit.

*Cutis faciei & aliarum partium dura, scabra aut squallida, mala.* Secunda da Diarrities.

In morbis enim acutis magnam indicat exsiccationem à calore febrili factam. In diuturnis verò magnam humidi primigenii consumptionem, ut in febribus hecticis. Sic *3. Epid. sect. 3. Ægr. 3.* in Dealcis uxore, die decimaseptima, erat cutis circumtenso arida: & vigesima prima obiit. Et *Ægr. 19. ejusdem sect.* in Melibæo adolescente, die decima cutis fuit arida & circumtenso, & vigesima quarta interiit.

*Summa totius corporis mollities in quolibet morbo, mala.*

In morbis enim acutis insignem quandam putredinem significat, propter quam partes corporis nostri flaccescunt, ut patet in cadaveribus pestilenti febre peremptis. In chronicis verò magnam pituitæ copiam, in universum corpus diffusam, ut in leucophlegmatia contingit.

*Rubor faciei intensus cum mæstitia, malus. 1. Prorrh.*

Faciei rubor simpliciter consideratus non perpetuò malus est: significat enim interdum crisin instantem per hæmorrhagiam, quemadmodum Galen. in Romano juvene coram aliis Medicis ex hoc signo prædixit. Et tunc signa concoctis simul debent apparere: si verò crudo morbo existente facies valde rubra appareat, timenda erit capitis inflammatio, & cerebri præsertim; cum hoc signo demonstretur sanguinem sursum in caput agi, ipsumque inflammare; unde fit, ut tristitia phrenitidem præcedat, quia ille sanguis à nimio calore adustus est, & ad bilis atræ naturam vergit, ut docet Galen. in *comm. hujus sententiæ*; his verbis: *Cum itaque florida quidem apparuerit facies, æger autem valde tristis fuerit, quædam in cerebro valde calida affectio esse videtur, quæ sanguinem exurit, ob eamque causam bilem atram, ut demonstratum est, gignit.*

*Rubores intensi, & quasi erysipelatodes in manibus & pedibus apparentes, per morbos acutos cum bonis signis boni, cum malis mali esse consueverunt.*

Si enim cum bonis signis appareant significant naturam fortem esse longius humores noxios ad ignobiles partes propellere; unde bona illa metastasis censenda est, quam allevatio ægri necessariò consequitur. Si verò cum malis signis appareant hujusmodi rubores, & nullum ex iis levamen ægrotanti succedat, censendum est per epigenesin eos excitari, videlicet per multiplicationem qualitatis illius phlegmonosæ, quæ jam viscera firmiter occupavit.

*Pallor ingens, in facie potissimum, malus.*

Quia significat vel retractionem caloris violentam ad interiora, vel ejusdem extinctionem, aut sanguinis



## 88 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

sanguinis inopiam : unde fit, ut ille color in demortuis soleat apparere.

*Lividitas & nigrities totius corporis, faciei, vel partium extremarum, mala.*

Fit enim propter caloris extinctionem in illis partibus, ut docuit Hippoc. 2. *progn.* Si corpus adeo grave est, ut ungues ac digiti lividi sint, expectanda continuo mors est. Illa autem lividitas cum frigiditate extremorum perpetuo conjuncta est, ut videre licet in exemplis Philisci, Sileni, & aliis, ubi de frigiditate extremorum supra agebatur, propositis.

*In osse ægrotante caro livida, malum. Aphorism. sect. 7.*

Per os ægrotans, intelligit Hippoc. quod vulnere vel ulcere seu carie affectum est. At livescit caro in vulneribus aut ulceribus, vel ob caloris extinctionem, vel ob gangrænam seu syderationem, ex inflammationis magnitudine vel ob contusionem. Si ergo in osse corrupto aut violato livescat caro, nullaque adsit contusio aut syderatio, certissimum signum erit, pravam subesse putredinem, quæ calorem nativum extinguit : proinde illud os excindendum est aut eximendum.

*Calorem subinde mutare in morbis acutis, malum.*

Corpora colorem mutare dicimus, cum ex proprio colore nativo in pallidum, aut album, aut flavum, aut æruginosum, aut viridem, aut plumbeum aut denique nigrum mutantur. Hæc autem colorum mutatio frequens significat naturam valde opprimi, & magnam adesse pravorum humorum redundantiam.

*Quibus in febribus morbus regius ante diem septimum accidit, malus. Si verò septimo, vel nono : vel undecimo, vel decimo quarto supervenerit, bonum : nisi dextrum hypochondrium induruerit Aphorism. 62. & 54. sect. 4.*

Hæc verba Hippoc. non sic superficie tenus intelligenda sunt, cum plures visi sint ante septimum regio morbo affecti, sani & liberi evasisse. Intellige igitur ante septimum, id est, ante materiæ morbiificæ concoctionem, quam si aurigo antevertat, malum est, ut inquit Hippoc. quia motus ille est symptomatikus. At si ante septimum materiam morbiificam concoqui & edomari contingat, quam postea natura ad cutim propellat, unde morbus regius fit, bonis ægri rebus id fieri necesse est. Quod ipse confirmavit Hippoc. 4. *de ratione victus in morbis acutis* : In biliosa, inquit, febre morbus regius cum rigore ante septimum diem enatus, solvit morbum ; si verò absque rigore præter occasionem evenit, lethale. Sciendum tamen est, ideo Hippocratem septimum diem annotasse, tanquam primum terminum boni icteri ; quia raro admodum contingit, ut febrium biliosarum materia ante septimum diem bene concocta sit, cum præsertim ad cutem expellitur & iterum facit ; hinc enim ostenditur, bilem esse crassiolem, quæ non potuit per sudores vacuari. Tradit igitur Hippoc. in hoc Aphorism. id quod frequentius accidit, quamvis aliter interdum possit contingere. At verò icterus, qui septimo, nono, undecimo, aut decimo-quarto die, videlicet critico contingit, bonus est ; quia tunc bonæ concoctioni succedit ; signum autem ostendens icterum in illis diebus laudabili concoctioni succedentem, etsi nulla durities sit in hypochondrio dextro : nam durities illa ostendit tumorem in hepate, qui vasa bilem expurgantia comprimit, vel obruit ; unde fit transfluxus humoris biliosi ad habitum corporis. Si verò nullus adsit tumor in hepate, icterus fit per expulsionem bilis febrem efficientis ad habitum corporis. Huic denuo signo sequentia adjungenda sunt, quod in ictero critico urinæ non sint coloratæ, ut

lintea croceo colore inficiant, neque fæces candidæ appareant, ut in ictero morbofo : tum etiam quod ex eo febris soluta, aut saltem admodum imminuta sit.

*Fætor intensus ab ægrotantis corpore exhalans, malus.*

Magnum enim significat humorum corruptelam, Oder. quæ tetros vapores undequaque expirat.

*Quando æger in morbis acutis odores non consuetos sentit, odorabili re nulla præsentente, qualis est odor piscium, luti, butyri, aut similibus, mala signa adsunt, mors in propinquo est, teste Avicenna.*

*Stertor in acutis, qui & dormientibus & vigilantibus inter respirandum fit, lethalis est.*

Stertor seu stertorosus spiritus fit, quando inter respirandum sentitur in gutture quædam veluti ebullitio & fervor, seu strepitus, cujusmodi in stertentibus. Et ille in omnibus ferè morituris ex morbo acuto apparere solet per unum aut alterum diem ante obitum, præcipuè in iis, qui ex pleuritide aut peripneumonia intereunt. Significat enim extinctam omnino facultatem, quæ non valeat excrementa ab aspera arteria & faucibus expellere. Quicumque igitur morbo ingravescente hunc stertorem patiuntur, morti sunt proximi. At verò interdum contingit hujusmodi stertor in principio morborum, v.g. pleuritidis, peripneumonix & febris catharrhalis, ob humorum defluxum ad pulmonem & asperam arteriam ; & tunc non est necessario lethalis, quia in progressu morbi ille humor potest excerni vel dissipari, ut in asthmaticis fit, qui hunc stertorem sine ullo vitæ periculo frequenter patiuntur. Et quia hujusmodi stertor in principio apparens, interdum lethalis est, interdum verò minimè, ita distingendum est : quod videlicet qui minimè lethalis est angescente morbo sensim minuatur & tandem prorsus desinat ; humore aut per tussim excreto, aut à calore febrili resoluta ; ille verò, qui lethalis est, pertinaciter perseveret & sensim intendatur : quod ostendit naturam à multitudine humorum opprimi, eosque non posse excerni, sed ab iisdem ægrotantem suffocari.

*Quibus cum strepitu alimenta in ventriculum descendunt, ut in puteum projici videantur, malum.*

Significant enim fibras œsophagi esse resolutas, ut descendencia alimenta continere nequeat, & ad ventriculum veluti manu ducere, ut in naturali deglutitione fit : fitque frequentius in puerulis agonizantibus.

*Dolores ex hypochondriis, & tumores si sint recentes, & sine plegmone solvit murmur factum in hypochondrio, maxime erumpens cum stercore & urina & flatu : si verò non effluat confert etiam si devolvatur ad inferna. 2. Prognost.*

Inflammationes hypochondriorum, quæ sæpe cum morbis acutis jungi solent, si recentes & absque plegmone sint, (phlegmone autem ex partis ardore & pulsu innotescit,) à flatibus producuntur, & contumaciam quidem ostendunt, si dolorem habeant firmum instar fixi pali ; sed maximum tamen jamjam futuræ salutis signum exhibent, cum homo incipit sursum aut deorsum in ructu & per sedem, cum dejectione & sine ea, & cum urina flatum emittere. Flatum autem cum urina emitti, ostendit spuma illi supernatans. Licet verò flatum non emittatur, si tamen cum murmure incipiat deorsum repere, bonum est ; principium siquidem salutis esse solet, quia calor membri jam incipit flatum dissipare, & membra non sunt jam adeo extensa, sed constringuntur ad flatum expellendum, unde principium est victoriæ.

*Facies*



## Cap. II. De Signis Morbi Salut. &c. 89

*Acrida* Facies cadaverosa morifera, sed ea minus tamen, quæ ob vigilas aut ventris solutionem ejusmodi est. *propterea* Atque talis corruptio his de causis orta, uno die finitur. 2. Coac. cap. 5.

*Essentia.* Hæc facies, quam Hippoc. vocat *cadaverosam*, quod similis sit ei, quæ apparet in cadaveribus, & iis, qui morti sunt proximi, vulgò vocatur *facies Hippocratica*, quia ad amulsum, & veluti penicillo describitur ab Hippocrate 2. Coac. & in 1. prognost. his verbis: *Fuerit autem sanè facies hujusmodi, oculi concavi, nares acutæ, collapsa tempora, aures frigide & contractæ, cutis in fronte dura, lenis & arida, color pallidus vel niger, lividus aut plumbeus*, quæ omnia ex pessimis causis solent contingere. Partes enim faciei, aut revera gracilescent, consumptæ earum substantiæ; aut gracilitate quadam apparenti magis quam vera, quam facit subtractio spirituum & sanguinis: hi enim tribuunt particulis vividum colorem, & medio-crem humorem, qui concidit illis subtractis; acceditque tunc frigus externum particulas comprimens, majoris extenuationis causa. Ut consumatur subjecta cuti caro, facit calor qui malignus est, aut intensissimus. Ut verò sanguis & spiritus ab iis particulis subtrahantur, facit aut debilitas tanta innati calidi, ut non possit emergere, aut tantum interius incendium, ut trahatur intrò velut à cucurbitula. Omnes igitur causæ extenuationis maximæ, quæ in facie apparent, pessimæ sunt: illæ autem particulæ quæ ab Hipp. enumerantur, sunt maximè extenuationis capaces. Oculi enim multà pinguedine referti sunt, & copiosis spiritibus abundant, qui tumere & promovere eos faciunt. Si igitur pinguedo illa consumatur, aut spiritus exhauriantur, oculos subidere, & locum quem antea occupant, vacuum majori ex parte fieri necesse est, unde oculi concavi apparent. In naso sola illa particula est crassiuscula, quæ est extrema, ac veluti quædam cuspis; nam reliqua sunt ossa, cartilagines & cutis sine carne: In solis pinnulis sunt fibræ quædam carnosæ, tenues, ex musculis buccas moventibus productæ: ergo meritò ea in parte nasi apparet magis ex morbo facta extenuatio. Temporum cavitates musculis valde humidis plenæ sunt, unde fit, ut canities plerumque à temporibus incipiat, quæ humiditas facile absimitur à causis supra dictis. Aures meritò refrigerantur per debilitatem, aut retractionem caloris nativi, tum quod extremæ sint à caloris fonte, longeque remotæ, tum etiam quod excarnes; ex sola enim cute & cartilagine compositæ sunt. Contractæ etiam fiunt earum pinnulæ, & cutis frontis intenta, dura & arida per exsiccationem, ex consumptione humidarum partium, ut coria, quæ exsiccata contrahuntur & contorquentur. Color denique pallidus, niger, aut lividus, ex caloris nativi & spirituum retractione aut exsolutione dependet, unde illæ partes refrigeratæ talem colorem nanciscuntur. Postremò *advertendum est*, faciem cadaverosam, quæ signis propositis innotescit, esse perniciosam, si à causis internis jam recensitis producat: nam si à causis procatartæcis talis reddita sit minus periculosa est, ut notat Hipp. in hoc theoremate, ubi tantum vigilas & alvi fluxum enumerat. Sed his addere etiam possumus alias causas procatartæcas, ut defectum alimenti, mœrores, & timores. Et faciliè cognoscetur, cum ab hujusmodi causis procatartæcis dependet, quia uno die finitur, & postea æger ad pristinum statum revertitur.

*Vitales.* *Pulsus.* Oportet verò considerare oculorum in dormientibus suspensiones. Nam si quid album commissis palpebris subinspiciatur, neque alvi præsilio aut medicamenti potione istud contingat, malum est signum & lethale valde. Aphor. 52. sect. 6.

*Excrementa.* Cum Ægri semiapertis oculis dormiunt, ut album Laz. Riverii Opera.

subappareat, maxima imbecillitas facultatis animalis significatur. Cum enim oculi ex minima facultate claudantur, si in somno claudi nequeant, summam spirituum animalium depauperationem denuntiant. Signum igitur lethale est, si vi morbi talis resolutio producta sit. At verò si ab evacuatione vel spontanea, vel arte facta, aut aliqua alia causâ procatartæcâ talis spirituum resolutio producta sit, reparabilis illa est, ideoque conniventia oculorum ab ea producta non tam periculosa. Addit etiam Hipp. aliam cautionem, in 1. prog. Si nimirum æger hoc modo dormire non assueverit: Sunt enim quidam qui oculis semiapertis dormire consueverunt. Habet autem maximam vim hoc prognosticum in acutis capitis morbis, siue cum febre conjuncti sint, siue sine febre; quia oculi cerebro proximi sunt, & veluti conjuncti; illius ideoque passionibus certissimè declarant: ex aliis verò morbis non tam certum periculum denuntiant. Nam puerili vermiculosis sæpè non omnino claudunt oculos inter dormiendum; & faciliè liberantur. Non solum autem ab exsolutione virium hæc conniventia producitur, sed etiam interdum à convulsionibus oculos moventium musculorum, ut docet Gal. in comm. hujus Aphorismi.

*Si in morbo acuto oculus unus altero minor fiat, lethale est. Hipp. 1. prog.*

Fit enim tunc temporis ob facultatis regentis imbecillitatem, quæ illum oculum incipit deserre. Gravius quidem ambos oculos extenuari, ob ejusdem facultatis imbecillitatem; sed illa extenuatio apparere incipit in alterutro oculorum, quippe rarum est, utrumque esse simul eodem omnino apparatu. Nam & atrophia, quæ est afflictura totum corpus, ab uno vel duobus membris solet incipere, illincque ad alia serpere, rursusque ad alia, prout magis vel minus disposita sunt. *Advertendum* tamen est an non hujusmodi oculi extenuatio à peculiari morbo dependeat, non ab imbecillitate facultatis: tunc enim ex eo nullum imminet periculum.

*Si in morbo acuto album oculi rubrum appareat, periculosum. Hipp. in progn.*

Significat enim sanguinem aut bilem transferri ad cerebrum; unde inflammatio, indeque phrenitis expectanda est, quæ magnum vitæ periculum minatur. Cum autem tunica adnata, quæ album oculi constituit à meningibus cerebri exoriatur, faciliè fit, ut earum inflammatio ipsi communicetur.

*Si in morbo acuto venæ oculorum lividæ aut nigræ apparuerint, lethale est. Progn.*

Vel enim significant humores adustos & atrabilarios abundare in cerebro, vel caloris nativi extinctionem, unde sanguis nativum suum calorem amiserit, & concretionem aliquam acquisiverit.

*Si in morbo acuto oculi pervertantur, malum 1. pr.*

Oculi *perverti* dicuntur, quando indecorè moventur, id est, vel magis sursum quam deberent vel deorsum, vel in obliquum: tum etiam si unus sursum; alter deorsum: unus in unum, alter in alterum angulum torqueatur. Quæ quidem oculorum perversiones fiunt ob convulsionem musculorum oculos moventium: quemadmodum fieri solet in epilepsia, in qua quidem periculosæ non sunt. At convulsionibus quæ fiunt in morbis acutis, sunt maximè periculosæ.

*Oculi tenebrofi, turbidi, squallidi, ac minimè splendentes, mali.*

Tales enim fiunt ex defectu atque extinctione spirituum animalium, qui splendidi sunt, & luciditate oculis conciliant: tum etiam ex rarefactione tunicarum oculos componentium, & corneæ potissimum, ut docet Gal. 1. de sympt. caus.

*Si autem perversa fiat, aut livida, aut pallida naris palpebra, aut labrum, aut nasus, cum aliquo alio-*

*In palpebris, naris, & labris.*



# 90 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

rum signorum, si re oportet, morti proximum esse. Leihale etiam est labra resoluta & pendentia, & frigida & alba esse reddita. Hippocrates in prognost.

Eandem ferè sententiam habet idem Hipp. Aph. 49. sect. 4. his verbis: In febre non intermittente, si labrum, aut palpebra, aut supercilium, aut oculus, aut nasus pervertatur, aut non videat, aut non audiat æger, jam debili existente corpore, mors proxima est. Fiunt autem omnes istæ perversiones ex musculorum has partes moventium convulsionibus, quæ in morbis acutis lethales sunt, ut sæpè inculcatum est. At lividæ aut pallidæ palpebræ fiunt ab extinctione calidi innati. Labia verò pendentia, & resoluta & frigida, & alba manifestè indicant facultatis moventis imbecillitatem, & extinctionem calidi innati.

Nares præter modum dilatatae in morbo acuto, periculum portendunt.

Significant enim magnam facultatis animalis imbecillitatem, quæ cum nequeat thoracem sufficienter dilatare, ad summum incendium temperandum dilatatis naribus conatur compensare, ut per illas aër copiosior attrahatur.

*In dentibus.* Dentibus stridere in febribus, quibus non est assuetum à pueritia, furibundum & mortale. Hipp. in prognost.

Hanc eandem sententiam repetit Hipp. in 2. prorrh. his verbis: Dentium stridor perniciosus, quibus non est sanitatis tempore consuetus. Galenus verò in 1. prog. Stridere, inquit, dentibus, quibus ab initio non erat consuetum, futuri delirii accedens est; si verò interdum ægrum offendas utrumque perpeti, delirare & stridere dentibus, hunc jam esse prope mortem arbitrare. Fit autem stridor dentium musculis, qui maxillas movent, convulsivos motus patientibus, aut facultate movente admodum debilitatâ. Quodcunque horum sit, per morbos acutos multum pati cerebrum, suspicionem facit: magnæ cerebri læsioni dementia succedere verisimile est, cum dementia sit facultatis, quæ in cerebro viget, actio læsa, qua partis principis læsione plurimum aucta, mortem fieri necesse est. Magis autem succedere solet furor illi stridori, qui cum maximo dentium sonitu fit quàm qui cum exiguo; hic enim fieri potest ob debilitatem, quæ sine dementia asferre potest mortem; ille verò fit ob motus convulsivos, qui excitantur à malignis fuliginibus, quales ex atra bile sunt cerebrum & nervosas partes impetentibus.

Quibus in febribus lentores & nigredines circa dentes apparent, periculosum.

Significant enim maximam crudorum & crassorum humorum copiam; & maximum febris incendium, quod humores illos crassos exsiccat & exurat.

*In lingua.* Lingua nigra cum siccitate, scabritie, scissuris, & ustione, leihalis.

Hæc enim omnia à febre ardente & valde exurente ducunt originem, cujus vi lingua impensè exarescit, & adustas fuligines à viscerum incendio elevatas recipiens, camini instar, nigredine illa tingitur. A minori quidem ustione siccitas & scabrities efficiuntur: à vehementiori verò scissuræ producuntur, quemadmodum terra valde exsiccata æstatis tempore, rimas undique & fissuras patitur. Lingua ab initio exusta significat visceris alicujus inflammationem, quæ ex hypochondriorum dolore, duritie, tumore, aut calore dignoscitur.

Lingua tremula in acutis, mortifera.

Significat enim maximam animalis facultatis imbecillitatem, & summam cerebri læsionem, ideò phreniticis, jam morti proximis, lingua hoc modo solet contreniscere. Quod dilucidè exponit Galenus in 1. prorrh. textu 19. his verbis: Tremor igitur linguae accidit, debilitata propter siccam

intemperiem animali facultate. Convulsionem vero siccitatem musculorum ipsius, unà cum capite affectorum, consequuntur: sicut & vox obremiscit propter infirmitatem, quæ ab horum intemperie contracta est. Prædicta autem hæc omnia symptomata, quæ à siccitate capitis intentiore fiunt, mentis motionem fieri quoque indicant.

Fauces exulcerari cum febre, malum; verum si aliud signum superveniat eorum, quæ diximus pessima esse, prædicere oportet, cum periculo esse hominem. Hippocrat. in prognost.

Fauces exulcerari solent, vel ab acri destillatione à capite desluente, vel cum totum corpus laborat magna cacoehymia, in febre ardente aut maligna. Quo fit, ut plerisque eorum, qui lue venerea aut elephantiasi tenentur, in faucibus ulcuscula fiant. At in morbis acutis, de quibus hîc tantum agimus ut plurimum mali sedes est aut in thorace, aut in hypochondriis. Cum ergo fauces incumbant viæ quæ venit à pulmone, & quæ venit à ventriculo, excipiunt fumos omnes, qui ab illis locis adscendunt, qui si acres ac erodentes sint, eas exulcerant. Oportet ergo locum hunc per eas febres assiduè intueri, eadem prorsus causa, qua linguam. Eodem enim modo repræsentat febris vehementiam, nimirum, ut per febrem maximè ardentem lingua sit arida, & multis fissuris affecta, si ingens sit, ita etiam fiunt faucium ulcera, maximè si Medicus non fuerit diligens per febris ardorem, in usu eorum, quæ sitim sedant. Verum cum Medicus hæc auxilia non omiserit, exulcerari fauces, multò majoris ardoris indicium est. Merito ergo Hippocrates dicit, malum esse, non tamen adeo malum est ut vel sine ullo alio signo possimus mortis periculum prædicere. Nam fieri potest, ut ob destillationem, quæ cum febre conjuncta est, exulcerentur fauces, quod non adeo malum est ut hac una de causa mortis periculum prædici possit. Si verò à summa partium inferiorum intemperie procedat faucium exulceratio, periculosa quidem est: sed cum illa non poterunt non apparere signa alia prava. Oportet ergo signa alia considerare, & si aliquod aliud prævum appareat, mortis periculum prædicere. Valefius hoc signum gravi hoc elogio commendat. Ego inquit, testari possum, me signum hoc magnificare, vidisseque multos, quibus febris ardens jam videbatur inclinare, cum hac affectione perire. Quod accedit gravissimum, est fastidium quoddam maximum, adeo ut nihil possint accipere, sed petunt etiam detestentur, quamvis exurantur. In his conjectavi semper internas gula partes usque ad ipsum ventriculum ulcere exedi. Hæc Valefius. Nos verò faucium inflammationes & exulcerationes millies observavimus in febribus illis malignis, quæ annis elapsis populariter grassatæ sunt, & castra Regia potissimum infestabant. Illæ autem ab ipso morbi initio in omnibus ferè ægrotantibus apparebant, ut inter signa hujus morbi pathognomonica vulgo haberentur: unde colligere licet, eas à prava malignaque causa plerumque generari.

Hypochondria optima sunt, quæ sine dolore, molli & æqualia sunt, dextera ac sinistra parte. Hipp. in progn.

Hypochondriorum nomine vulgò intelligitur tota illa regio, quæ est inter septum transversum & umbilicum, in qua hepar, lien, & ventriculus continentur. Harum partium attrectatio nunquam est contemnenda à Medico per morbos; plurimum enim facit ad prænotationem. Imò verò singulis diebus Medico diligenti & sedulo attrectanda sunt hypochondria, imitatione Hippocratis, quem hoc in usu habuisse apparet ex 1. Epid. Aegri. 2. ubi ait: Sileno tertia die hypochondriorum tensionem apparuisse, quo innuit, se eadem aliis etiam diebus attrectasse. Unde existimandum est, Medicos in

cogno-



## Cap. II. De Signis fut. Morbi Salut. &c. 91

cognoscendo quotidie hypochondriorum statu debere esse diligentissimos, quandoquidem ibi est sedes facultatis naturalis, hoc est, viscerum naturalium, in quibus ferè tota vis salutis aut interitus posita est, & in quibus tanquam in palæstra quadam omnes ferè morbi & naturæ fiunt conflictus, quos maxime omnium semper Medicus observat. Itaque in morbis acutis hypochondria bene se habere, non leve est optimi præfagii argumentum; nam impossibile est, aliquam partium illarum læsam esse, & hypochondria mollia esse, & absque dolore. Tum æqualitas iisdem locis secundum dextras & sinistras partes necessaria est, quæ quidem æqualitas in omnibus accidentibus intelligenda est, scilicet in calore, mollitie & mole. Talia enim hypochondria sunt, quæ in hominibus bene valentibus solent apparere.

*Hypochondrium exæstuans, aut dolens, aut tensum, aut inæqualiter affectum, à dextris partibus ad sinistras, morbi est non mansueti. Hipp. 2. Coac. & progn.*

Hypochondrium ardens & multo calore abundans fit ex calidorum humorum multitudine, ibidem putrescentium. Dolor & tensio ab eadem causa producantur, partes replente & malam intemperiem in iis producente; vel etiam à nimio calore siccitas introducit, quæ tensionem facit. Inæqualiter afficitur parte alterutra, vel utraque, quando scilicet hinc calidius, illic frigidius est, hinc durius, illic mollius, hinc lævius, illic asperius, alibi doloris expers, hinc dolens, denique magis minusve distentum: quæ omnia aliquam earum partium deterius habere significant, & aliqua inflammatione affici, quæ in febribus acutis sæpissimè solet contingere.

*Hypochondria sursum revulsa, nullis criseos per hæmorrhagiam futura signis apparentibus, mala.*

Contingit aliquando, instante hæmorrhagia critica, hypochondria sursum revelli; humoribus sursum irruentibus vi jecoris se contrahentis & excutientis humores illos; quod tamen sine dolore fit, & parum durat, & alia signa apparent futuræ hæmorrhagiæ. Si verò diu perseveret illa hypochondriorum revulsio, cum dolore & sine ullis futuræ hæmorrhagiæ signis, pessima est & lethalis; fit enim ab inflammatione vel exsiccatione, ex ardore febrili diaphragmatis, aut membranæ costas succingentis, quæ partes contractæ & revulsæ attrahunt secum peritonæum & hypochondria, quæ illis annectuntur. Hujus rei etiam signum erit certissimum vox acuta, quæ antea fuerat gravis; illa enim immutatur ex diaphragmatis contractione, unde Hippocrates in Coacis: *Quibus acuta vox, hypochondria intro sursum iis revulsa sunt.*

*Tumor in hypochondrio durus & dolens pessimus, si totus est in hypochondrio. Si verò sit in alterutra parte, minus periculosus est in sinistra. Hipp. 1. progn.*

Tumor durus & dolens ab inflammatione fit, quæ si totum occupat hypochondrium, maximum impendit periculum: si solum dextrum, minus; & si solum sinistrum, adhuc multò minus. Ratio uniuscujusque evidentissima est. Etenim inflammata esse simul plura viscera in febre acuta, exitiosissimum est. At cum in dextera parte collocatum sit jecur, in sinistra lien; certissimum est, affectum eundem multo esse graviolem in jecore, quod nobilior est viscus, quàm in liene, multò ignobiliore.

*Tibiarum inflatio vespere apparens, & manè discussa, cum bonis signis bona, cum malis mala est.*

Hæc tibiarum inflatio contingit sæpe in convalescentibus. At si convalescentiæ signa non appareant, sed alia quædam signa mala, hydropem minatur, aut pravam aliquam hepatis dispositionem significat. Aliquando enim apparuit, cum abscessus esset in hepate. (Conf. ad hæc omnia Melet. III. 27. 28. 29. 60. 61. 62.)

*Laz. Riverii Opera.*

### CAPUT III.

*De modo, quo finietur morbus: An scilicet per crisin, vel paulatim solutionem.*

**O**Mnes morbi vel per crisin, vel per paulatinam solutionem finiri consueverunt.

*Per crisin finiuntur qui magni sunt & acuti; paulatim verò finiuntur, qui inter chronicos recensentur, aut nullam habent magnitudinem.*

*Signa igitur morbum acutum & magnum, vel chronicum & parvum indicantia, etiam per crisin, vel paulatinam solutionem, utrum sit finiendus, pronuntiabunt; quæ quidem in diagnosi fuere proposita, indeque repetenda. (Melet. II. 143. III. 68.)*

### CAPUT IV.

*De tempore, quo finietur morbus: ubi dies & hora futura criseos prænuntiantur.*

**T**Empus futuræ criseos ex duobus potissimum innotescit, acumine nimirum morbi, & concoctionis finis: quæ omnia ex sequentibus theorematibus patent.

*Morbi acuti simpliciter decimo quarto die solent judicari, peracuti die septimo, & perperacuti die quarto.* Acutorum differentia

Has morborum acutorum differentias dignoscemus ex vehementia & celeritate symptomatum. Si enim primo statim die symptomata ingravescant, sumantque vehementiam & impetum, erit perperacutus, seu extremè peracutus, & quarto morbi die judicabitur. Si verò impetum sumant & vehementiam primo quidem quaternario, sed non primo statim die, erit ille peracutus, & septimo judicabitur. Si verò vehementia illa secundo tantum quaternario, idque in illius principio apparuerit, decimo quarto crisis erit speranda. Si denique post septimum tantum impetus sæviat, vigesimo tantum, vel vigesimo primo judicium apparebit.

Notandum autem est, crises illas dies judicatorios non rarò prævertere aut retardare, pro materiæ mobilitate aut contumacia, & in diebus indicibus perfici, qui etiam sunt nonnihil judicatorii: quod tamen inde poterit dignosci, cum vehementia & impetus morbi paulò citius vel tardius incipiunt, ex. gr. cum impetus incipit in principio secundi quaternarii, nimirum die quinto, crisis decimo quarto erit speranda. At si sexto vel septimo tantum impetus incipiat, decimo septimo futuram crisin erit conjiciendum. Quæ quidem solerti admodum indigent exercitatione, ab usu artis comparata.

*Si primo statim morbi die concoctionis signa apparuerint, quarto morbus judicabitur: si quarto tantum appareant, septimo finietur. Si septimo appareant, undecimo judicabitur. Si undecimo, fiet crisis decimo quarto: & ita de aliis per quaternarios vel septimanas, computando juxta naturam morbi.*

Concoctionis signa aliunde sunt repetenda. Ex his tamen præcipuum est in febribus, hypostasis urinarum. Notandum autem est, concoctionis signa cum vehementia symptomatum perpetuò esse conjungenda, ut certam prognosin efficias.

*At vero jam futura crisis facile dignoscitur ex perturbatione, quæ illam solet præcedere: cum enim fieri incipit certamen morbi & naturæ, omnia symptomata maxime exacerbantur, quod innuit Hipp. Aphor. 13. sect. 2. Quibuscunque crisis sit, iis nova gravis ante accessionem existit.*

*Hæc denique futura criseos inde artificiosè erit*



## 92 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

præfagienda, supponendo primum omnem crisin in morbi vigore seu statu fieri. Cum ergo vigoris tempus cognovimus, criseos etiam tempus cognoscemus. Rursus si morbus aliquas habere solet exacerbationes, prius animadvertimus, quâ horâ fieri soleant exacerbationes, & quantum temporis perdurent, ac postremo quâ horâ vigor exacerbationis soleat apparere: cum enim certum sit crises in vigore morbi & in vigore exacerbationis fieri, illis sedulo præcognitis, non solum diem, sed ipsissimam etiam horam futuræ criseos prævidebimus. Conf. Joëlem. (Melet. 66. 68. 69.)

### CAPUT V.

*De loco, per quem futura est crisis. Ac primum de signis futuræ criseos per vomitum.*

**O**Mnis critica vacuatio fit per vomitum, vel alvi fluxum, vel sudores, vel urinas, vel hæmorrhagiam, vel menses, vel hæmorrhoides, vel abscessum: quorum signa, è prædictis fontibus deprõpta, sequentibus patefient theorematis, à vomitu incipiendo.

*Tenebricosæ apparitiones oculis obversantes, futurum vomitum prænuntiant.*

Indicant enim materiam mobificam in ventriculo cumulari, quæ halitus copiosos ad caput emittit, & hujusmodi apparitiones tenebricosas efficit.

*Capitis dolor acris & mordens, futurum vomitum significat.*

Ille enim dolor à dictis halitibus excitatur, qui acrimoniâ suâ meninges cerebri vellicant.

*Oris ventriculi morsus instantem vomitum significat.*

Fit enim à dictis halitibus, partes illas vellicantibus.

*Rigor & frigus hypochondriorum instantem vomitum significant.*

Fit enim etiam à dictis halitibus, partes illas vellicantibus.

*Labri inferioris tremor instantem vomitum significat.*

Fit enim ob communicationem tunicæ interioris ventriculi cum ore & palato.

*Sputationes frequentes imminensem vomitum significant.*

Fiunt enim ob dictam tunicæ communionem; & ventriculi compressionem, sese ad vomitum accingentis. (Melet. III. 70.)

### COROLLARIUM.

*Nota, ut plurimum post vomitionem criticam subsequi diarrhoeam; quæ morbo finem solet imponere, & reliquias ex vomitu expurgare.*

### CAPUT VI.

*De Signis criseos futuræ per alvi fluxum.*

**C**Risis, quæ per alvi fluxum perficitur, non admodum certis & manifestis signis indicatur. Illa tamen erit prænoscentia partim ex signis, quæ proponuntur, partim etiam ex signorum privatione, quæ alias crises indicare solent. Ad eam igitur prænoscentiam sequentia proponuntur theoremata.

*Quibus adsunt frequentes ructus, eisque succedunt multi status & crepitus ventris cum borborismo, & quadam illius inflammatione, eos instantem alvi fluxum expectare oportet.*

Hæc enim omnia significant translationem materiæ morbificæ ad intestina.

*Lumborum dolor, cum aliis signis potissimum conjunctus, alvi fluxum prænuntiat.*

Quando enim per venas mesaraicas humor noxius fertur ad intestina, dolor lumbis communicatur per continuationem mesenterii; quod à ligamen-

tis. lumborum vertebrae contrectantibus, ducit originem.

*Quibus hypochondria suspensa murmurant, dolore lumborum superveniente, alvi iis humectantur, nisi status erumpant, aut urinae multitudo procedat: in febribus autem hæc. Aph. 73. sect. 4.*

Cum regio hypochondriorum intumescit, & murmurat, constat humorem cum flatu eò loci redundare. Quibus si dolor lumborum succedit, humor ille aut status deorsum repit, unde alvi fluxus sequitur, aut saltem flatuum eruptio per sedem, nisi ille humor per urinas evacuetur. (Melet. III. 70.)

### COROLLARIUM.

*Nota, majorem fieri conjecturam, si toto morbi decursu alvus libera valde fuerit, aut die indice apparuerit fluidior, quàm alio tempore.*

### CAPUT VII.

*De Signis futuræ criseos per sudores.*

**M**Orbi acuti frequentius multò per sudores, quàm aliam quamvis evacuationem solent judicari. Ideo exactiores paulò erimus in futuri sudoris signis investigandis, quorum facilem intelligentiam sequens Tabula præstabit, notata literâ M.

M  Signa indi- cantia futurā crisin per su- dore desu- muntur vel ab	{	Essentia.	{	Efficientes	{	Externæ [ aër.	
		{				Causis , quæ sunt vel	{
	{		Materialiales [ corpus ægrotātis				
				{	actiones	{	animales { Rigor.
							vitales { Pulsus.
	{	Effecti- bus qui sunt vel	{	naturates [Supres- tio urinæ			
{					excrementa.		
	{	qualitates mutatae.					

Cujus Tabulæ seriem observando, sequentia proponuntur theoremata.

*Morbi acutissimi per sudores ut plurimum judicantur.* Essentia.

Fiunt enim ab humore bilioso, calido & tenui, qui faciliè per habitum corporis excluditur.

*In calida & humida aëris constitutione morbi ut plurimum per sudores terminantur.* Causa efficiens. Aër.

Quandoquidem à calida & humida aëris ambientis temperie pori & meatus totius habitus laxantur & aperiuntur, humores liquantur, & fluidiores efficiuntur, ut faciliè per sudores expurgari valeant.

*Quicumque morbi ab humore tenui & calido producantur, per sudores solent judicari.* Humores.

Sic febres biliosæ plerumque per sudores judicantur, quia illius humoris tenuitas & calor facit, ut à natura commodè per habitum excernatur.

*Quicumque agrotantes carne molli & cute laxa sunt præditi, his per sudores crisis faciliè perficitur.* Causa materialis.

Sive illa habitus laxitas & mollities à nativâ dispositione sit, sive à cœli constitutione, ut dictum est, perpetuò maximè confert ad crisin per sudores efficiendam.

*Rigor aut horror in febribus continuis apprens, crisin per sudores imminere significat.* Effectus.

Quia humores illi tenues dum à venis ad habitum feruntur, partes membranofas vellicant acrimoniâ suâ, atque ita rigorem pariunt.

*Pulsus.*



*Natu- rales.* Pulsus mollis & undosus in febris, sudorem ad- futurum demonstrat.

*Supres- sio uri- nae.* Quando enim tenuiores humorum partes ad ha- bitum affectant viam, arterias humectant & emol- liunt; unde fit pulsus mollis & undosus, sudoris futuri prænuntius.

*Urinae suppressio in febris crisis per sudorem futuram ostendit.*

*Excre- menta.* Quia cum eadem sit materia sudoris & urinæ, nimirum serosi humores, dum illi ad habitum fe- runtur, necesse est urinam suppressi, aut maximam pati imminutionem.

*Si calidus quidam vapor è corpore ægrotantis ele- vari præsentatur, aut levis quidam mador perci- piatur, per sudorem futura est crisis.*

*Si præter consuetudinem in ægrotante partes cor- poris externæ incalescant, aut facies rubescat, crisis per sudorem futura judicatur.*

Postrema hæc duo signa ostendunt naturam ad ha- bitum corporis viam affectare, per quam humores noxios & præternaturales expellat. (*Meleth. c. I.*)

## CAPUT VIII.

### De Signis futuræ Criseos per urinas.

**S**igna futuræ criseos per urinas, pauca admo- dum proponuntur: illa tamen licet prævidere partim ex quibusdam signis positis, partim verò ex absentia aliorum. Si enim signa apparuerint, quæ crisis futuram in genere demonstrent; & nulla vo- mitus, diarrhœæ, sudoris, aut hæmorrhagiæ si- gna apparuerint, per urinas eam futuram, erit col- gendum.

*Signa verò quæ illam futuram peculiariter demon- strant, hac serie proponuntur, quæ tamen simul sunt colligenda, ut aliquam in iudicando certitudinem habere valeamus.*

Illæ autem hæc sunt:

*Hyberna constitutio.*

*Senilis ætas.*

*Cutis densitas.*

*Frequens micturitio, vel urinæ copiosiores die in- dice apparentes.*

*Ardor vel pruritus in extremo pudendi.*

*Gravitas in hypochondrio.*

Tria priora signa continent impedimenta, quæ in habitu reperiri possunt & efficere, ne serosus hu- mor per sudores expurgetur. Cum autem eadem ma- teria, quæ per sudores effluit, per urinas facile pos- sit expurgari, posito impedimento in via sudoris, conijcere possumus per urinas futuram excretionem. At tria signa posteriora ostendunt jam humores des- cendere ad urinæ meatus. (*Melet. III. 70.*)

## CAPUT IX.

### De Signis futuræ Criseos per Hæmorrhagiam.

**F**uturam hæmorrhagiam sequentia theoremata demonstrant.

*Essentia* Inflammationes hypochondriorum hæmorrhagiâ ut plurimum solvuntur.

Et in hoc solutionis modo tota salutis spes est constituta, quia si non accadat, mors prædicenda est.

*Causa adju- vantes.* Hæmorrhagiæ sæpius solent contingere usque ad vigesimum quintum annum, quàm ultra hunc, & quidem temperamento sanguineo aut bilioso, vernâ tempestate, & austrinâ constitutione.

*Effectus* Ex effectibus, qui ab actionibus lafis, excremen- tis, & qualitativis mutatis desumuntur, sequentes futuram hæmorrhagiam prænuntiant.

*Insomnia & imagines rerum rubrarum.*

*Capitis & cervicis dolor subinde obortus.*

*Temporum gravitas & pulsatio magna in arteriis illorum.*

*Tinnitus, vel sonitus aurium.*

*Oculorum hebetudo & marmariges illis obversantes; Ruber eorumdem, ac totius fere faciei.*

*Lucis aversio.*

*Lachrymæ involuntariæ.*

*Pruritus nasi.*

*Sanguinis stilla die indice.*

*Spirandi difficultas.*

*Tensio hypochondriorum sine dolore.*

Quando sanguis ad caput deferri incipit, parit in cerebro phantasmata rerum rubrarum, tum per in- somnia, tum etiam inter vigilandum, ut juveni Ro- mano contigit, cujus mentionem facit Gal. lib. de Præ sag. ad Posthumum: is enim morbo acuto labo- rans, rubrum serpentem ad cubiculi laquearia ober- rantem videre visus est, quo perterritus, è lecto su- binde exiliit, unde Gal. adventantem hæmorrha- giam prædixit, & sanguinis missionem impedivit; quàm alii Medici præscripserant. Dolor capitis & cervicis, ex eadem sanguinis translatione ad par- tes superiores exoritur, qui membranas divellens distendensque, doloris sensum parit. Pulsant arte- riæ temporum extraordinario motu propter earum compressionem, quæ à venarum repletione fit. Au- rium tinnitus fit ex vaporibus ad cerebrum magna copia ascendentibus. Visus hebetudo fit, quia co- piofi & crassi vapore, ad superiora elati, meatus ob- struunt: unde fit, ut denegato aditu spiritui animali, hebescat visus. Marmariges oculis observantes, ni- hil aliud sunt quàm tenuia quædam & divulsa cor- puscula variorum colorum intra corneam tunicam & crystalloidem contenta, ex vaporibus sursum elatis producta, quæ licet interius sint, exterius tamen posita deceptione visus, apparent; quandoquidem oculus externæ assuetus visioni, quæcunque intus sunt, extra esse judicat. Rubor faciei & oculorum ex sanguine fit, qui majori copia ad illas partes cu- mulatur. Lucis aversio ex eo proficiscitur, quòd di- stenti oculi humorum copia & ex nimia luce magis di- stendantur, quia lux disgregat spiritus, unde oculi di- latatio, quam dolor consequitur, quem ut evitent æ- grotantes, lucem refugiant. Lachrymæ involunta- riæ fiunt ex repletione oculorum, & partium ad- jacentium, quæ præter modum distentæ compri- munt glandulas illas humorem continentes, ex quo lachrymæ generantur, Pruritus narium fit ex vapo- ribus sursum ascendentibus & nares vellicantibus. Sanguinis stilla die indice apparens, ut quarto vel undecimo, ostendit futuram hæmorrhagiam die ju- dicatorio, v. g. septimo, vel decimo quarto, quæ diebus indicibus natura incipit transferre humores ad eas partes. Difficilis redditur respiratio, quia dum sanguis ad superiora transfertur, diaphragma comprimitur. Tensio denique hypochondriorum fit, quia sanguis in suo fonte & radicibus venarum moveri incipit, sed fugax est ea distensio, & sine dolore; quemadmodum & difficilis respiratio: si e- nim diutius & contumaciter perseverarent, signa es- sent potius hepatis inflammati. (*Melet. III. c. I.*)

## CAPUT X.

### De Signis futuræ criseos per menses aut hæ- morrhoidas.

*Mensium & hæmorrhoidum fluxus futura iisdem si- gnis dignoscuntur; in eo tamen distinguuntur, quod si in muliere appareant, menstruas purgationes pati consuevit, per uterum perficiantur: Si vero in viro se prodant, hæmorrhoides pati solito, per eas fu-*



# 94 Institutiones Medicæ, Lib. III. Sect. III.

*uram crisin arbitrandum sit. Illa autem signa, utrique vacuationi communia, sunt hæc.*  
*Dolor & gravitas lumborum, ac æstus eorundem.*  
*Dolor & tensio in hypogastrio.*  
*Oris ventriculi molestia.*

**Q**uando sanguis ad partes inferiores descendit venam cavam admodum replens atque distendens, dolorem & gravitatem, necnon æstum in eis efficit, quandoquidem vena cava descendens lumbis superjacet; à qua insignes rami ad hypogastrium deferuntur, qui dolorem etiam atque tensionem in iis partibus efficiunt: unde etiam molestia in ore ventriculi persentitur, propter magnum consensum, quem habent partes hypogastricæ & lumbares cum ventriculo. (*Melet. III. c. I.*)

## CAPUT XI.

### De Signis Futuri Abscessus.

**A**bscessus in aliquo morbo eventurus, sequentibus aphorismis breviter significatur.

*Quos febres longæ exercent, iis tubercula, vel labores in articulis fiunt. Aph. 44. sect. 4.*

Febres longæ eæ dicuntur, quæ ultra quadraginta dies exporriguntur, & fiunt ex materia frigida, crassa & contumaci: quoniam igitur illa materia non facile per excretionem potest vacuari, ideò sæpiissime ad partes debiliores à natura expellitur, ibique abscessum producit.

*Quicumque urinas tenues & crudas multo tempore mingunt, si alia omnia signa ut in supervicturis sint, in his oportet expectare abscessus in regionibus infra septum transversum. Hipp. 2. progn.*

Dictum fuit supra, signa cruditatis longo tempore durantia, si vires sint debiles, mortem præfagire, eo quòd metus sit, ne æger possit durare, donec materia concocta sit. At verò si vires sint validæ, & reliqua signa convalescentiam polliceri videantur, sperandum est fore, ut homo liberetur, non quidem perfecta solutione, sed permutatione vel abscessu.

*Quæ cum rigore sistuntur urinae, iis qui sopore tentantur, parotidas fore sperabile. Hipp. in Coac.*

Sopor magnam cerebri oppressionem significat, quæ rigore superveniente abscessum producit; aut magnam convulsionem.

*Febricitantibus, lassitudinem habentibus in articulis, & circa maxillas potissimum, abscessus fiunt. Aphor. 31. sect. 4.*

Lassitudo spontanea in febribus fit ex crassorum & crudorum succorum multitudine, & illæ febres difficillimi sunt iudicii, atque ut plurimum per abscessus judicantur.

*Quibus convalescentibus ex morbo aliquid laboraverit, illis abscessus fiunt. Aph. 32. sect. 4.*

Non solum dolor aliquam partem affligens circa morbi declinationem, in ea futurum abscessum præmonstrat, sed etiam ea omnia, quæ partem debilem esse ostendunt.

*Nota ex Hippocr. Aphor. 74. sect. 4. quod dum signa futuri abscessus apparent, à metu abscessus liberet, si urina multa, crassa, & alba appareat, idque multò certius & citius, si cum his urinis hæmorrhagia contingat. (Melet. c. I.)*

## CAPUT XII.

*De Signis eorum, quæ superventura sunt his, qui jam ægrotant, vel in morbos prolabuntur. Ac primum de signis futuri delirii.*

**M**ulta in morbis præter crisin supervenire solent, tum symptomata gravia, tum etiam,

quando unus morbus in alium commutatur; quæ omnia si à Medico prævideri possint, summum illi honorem & ægrotanti utilitatem afferre solent. Eorum igitur signa juxta prædictam methodum proponere aggredimur, à signis futuri delirii incipientes, quæ quidem sequentibus theorematibus innotescunt.

*Oblivio derepente contingens in acutis, phrenitidem prænuntiat.* Actio-  
nes ani-  
males  
princi-  
pes.

Ostendit enim cerebrum jam affici, & materiam morbosam ad ipsum à partibus inferioribus irrumperere.

*Somni perturbati atque tumultuosi, delirium portendunt.* Minus  
princi-  
pes.

Hoc docuit Hipp. in Coac. his verbis: *Turbulenta ferocesque excitationes è somno, delirium afferunt.* Et ostendunt cerebrum valdè affici, & à naturali suo statu dimoveri. Somnus  
et vi-  
gilia.

*Vigiliæ indefinentes delirium afferunt. Hipp. in prognost.*

Utraque enim affectio ab eadem causa producit: calida nimirum & sicca cerebri intemperie, ut docet Galen. 4. de præf. ex pulsib. Ideò remissior intemperies facit vigiliam. Quando verò intenditur, in delirium commutatur.

*Tinnitus & sonitus aurium, vel etiam surditas, insaniam sæpe præcedit, præsertim si cum urinis appareat, habentibus suspensionem claram & sublimem. Hipp. 1. prædict.* Audi-  
tus.

Significant enim hæc materiam transferri ad cerebrum, à qua delirium excitatur.

*Exquisitus nimium odoratus futuram insaniam prænuntiat.*

Significat enim insolitam cerebri exsiccationem, & spirituum attenuationem, quæ cerebrum ad phrenitidem disponit.

*Dolor capitis vehemens & assiduus, in acutis febribus, delirium portendit, præsertim qui in auribus observatur, aut qui cum præcordiis revulsis conjungitur.* Tactus.

Significat enim humores magna copia transferri ad cerebrum, idque vehementer afficere.

*Lateris dolor, qui cum sputo bilioso sine causa manifesta evanuit, excessum affert mentis.*

Significat enim translationem humoris biliosi à latere ad cerebrum.

*Surarum dolores mentem præcipitant, idque tum alias, tum si in urina parvum sit enæcrema. Hipp. in Coac.*

Tanta est surarum communio cum partibus principibus, ut quemadmodum in calcis fractura accidunt febres peracutæ, tremulæ, singultuosæ, paucorum dierum, mortiferæ denique; ita quoque in surarum doloribus, qui fiunt à cacoehymia maligna, febris excitetur in corde, & delirium in cerebro, quandoquidem humores maligni faciliè cerebrum invadunt. Quanquam verò hujusmodi dolores non modò surarum, sed & femorum, dorfi, & aliarum partium ignobilium, sua præsentia delirium portendant, attamen multò certius id præstant, si postquam apparuerint, occultentur. Significant enim materiæ morbosæ translationem ad cerebrum; ut videre est apud Hipp. in 3. Epid. sect. 3. Ægr. 5. ubi Calvus in Larissa femur dextrum doluit repentè, eorum verò quæ adhibebantur, nihil juvabat. Prima die febris acuta, ardens, dolores autem pergebant. Tertia femoris quidem dolor cessavit, alienatio verò mentis, & turbatio, & multa jactatio. Quarta circa meridiem extinctus est acutissimè.

*Respiratio magna & rara delirium significat.*

Spiritus magnus & rarus proprius est delirantium Hipp. 1. progn. 24. illi enim, ob febris ardorem plurima respiratione indigentes, atque ob mentis errorem respirare obliviscentes, rarò respirant, & raritatem magnitudine compensant. Hæc sententia Actio-  
nes vi-  
tales.



# Cap. XIII. & XIV. De Signis Convuls. & c. 95

tentia est etiam Galeni de difficultate respirationis, cap. 3. Ubi ostendit huiusmodi respirationem esse delirii propriam. Et cap. 10. ejusdem libri dicit, Philiscum & Silenum non habuisse alias causas talis respirationis, quam delirium. De Philisco & Sileno agitur apud Hipp. in epidem. sect. 1. histor. 1. & 2. Utrique à principio respiratio magna & rara fuit, in progressu vero manifesta deliria contigerunt.

Excre-  
menta.

Urinæ albæ & lucidæ in acutis, phrenitidem præ-  
nuntiant.

Significant enim bilem, quæ per urinas effundi solebat, easque calorationes efficere, ad cerebrum transferri.

Quali-  
tates  
muta-  
ta.

Si in morbo acuto album oculi rubrum appareat, phrenitidem portendit.

Significat enim membranas cerebri inflammari, quæ inflammatio faciliè communicatur tunicæ adnatæ, quæ ab ipsis ducit originem.

Acci-  
dentia  
propria.

Si pulsus insit in hypochondrio, tumultum significat aut delirium: verum oculos horum conspici oportet. Si enim obtutus crebro movetur, fore ut furiant, expectandum est.

Cum arteria pulsat vehementer in eo loco, in quo non solet sentire, calidam significat intemperiem, & multum flatus calidi per arterias delati, quæ ipsa causa tentans cerebrum, delirium facit. Iis enim quæ per arterias meant, expeditissima via est ad cerebrum per carotidas & jugulares, quæ penetrant in ipsos cerebri ventriculos. Cum verò delirium cum furore est, accidit menti magna varietas imaginationum & inquietudo; movet ergo variè oculos, quasi requires res varias, quæ illi observantur per cerebrum.

## CAPUT XIII.

### De Signis futuræ Convulsionis.

Effec-  
tus ac-  
tiones  
princi-  
pes.

Ex frigore cum adest metus & mæror immerito, convulsione finis est. Hipp. in Coac.

**M**etus & mæror fiunt ex contractione spirituum versus sua principia, à copia humoris melancholici obrutotum, unde cum frigore conjuncta sunt; atque ita humor ille cerebrum afficiens convulsionem excitat, nisi hæmorrhoidibus, varicibus, aut mensum profluvio vacuetur.

Minus  
princi-  
pes.  
Som-  
nus, &  
vigilia.

Deliria immanissima in convulsionem desinunt. Hipp. in Coac.

Fiunt enim à calidissima & siccissima cerebri intemperie, quæ principium nervorum afficiens, convulsionem inducit à siccitate.

Quibus incidente rigore, nocturna exacerbatio somni vacuitatem affert, cum fatuitate conjunctam, si nonnunquam in somnis urina excidit, convulsione finis fit. Hipp. in Coac.

Hæc omnia symptomata significant materiæ anadromen ad cerebrum, quæ convulsionem minatur.

Dolor capitis ingens & perseverans cum alvo suppressa convulsionem minatur.

Tactus.

Significat enim materiam morbosam in cerebrum defigi, quæ ad nervorum principium tandem delata, convulsionem efficit.

Dolores cubitorum & cervicis graves & profundi convulsiones accersunt.

Procedunt enim ab oppressione partium posteriorum cerebri, & humorum diffusionem in spinalem medullam, aut membranas ejus, ob copiam materiæ, aut malignam qualitatem, quæ extenditur per dorsum & ad cubitum: eo quod natura causam dissolvere aut concoquere non valeat.

Excre-  
menta.  
Urina.

Urina cum rigore suppressa, prava, convulsionem enim invehit, cum alias, tum si antea sopor invaserit. Hipp. in Coac.

Rigores symptomaticos cum urinæ suppressione; convulsio faciliè excipit: quandoquidem ostendunt anadromen humorum ad cerebrum, & principium nervorum; idque magis, si æger sopore afficiatur, quia evidentissimum est affecti cerebri indicium.

Urina, quæ in somnis excidit præter consuetudinem, convulsionem minatur.

Significat enim muscolum cervicem occludentem, debiliorem esse redditum, cujus motus dependet à nervo, cujus principium & origo in vicio est, nisi peculiari morbo pars illa afficiatur.

## CAPUT XIV.

### De Signis Futuræ Recidivæ.

**F**utura recidiva, in convalescentibus, sequentibus theorematis poterit prævideri.

Morbi maligni & mali moris non raro solent recidere.

Essen-  
tia.

Illi enim naturam admodum debilitant, ut vix possit à causa morbifica se ita perfectè liberare, quin aliquæ supersint reliquæ, recidivam producturæ.

Morbi quanto longiores sunt, tanto magis obnoxii recidivæ: quanto verò acutiores, minus revertuntur.

Morbi diuturni fiunt à materia crassiori & frigidiori, quæ difficilius concoquitur & evacuatur. At morbi acuti ex materia tenuiori, quæ facilius præparatur atque excernitur.

Quibus die non critico febres solvuntur, iis revertuntur.

Quemadmodum dies critici maximam habent vim ad perfectam morborum curationem, quandoquidem tunc temporis natura utiliter excernit humores morbosos; ita quæ die non critico contingunt solutiones, infidæ perpetuò esse consueverunt, quandoquidem naturæ bene operantis legibus non respondent.

Morbi, qui ab atra bile, variis & mixtis humoribus, viscidis, crassis, & perversis oriuntur, recidivas facere solent.

Illi enim humores maximè rebelles sunt & à natura perfectè subigi & edomari nequeunt, unde recidivæ solent exoriri.

Morbi, qui à sanguine, pituita dulci, aut bile pallida producuntur, aut aliis humoribus, qui nullam malignitatem acceperunt, simplicesque existunt, & qui neque copia hominem gravant, nec crassitie aut lentore sunt præditi, nullam recidivam minantur.

Causæ  
inter-  
na.

Quia natura facillimè se liberat à sarcina huiusmodi humorum, qui nullam contumaciam præ se ferunt.

Qui morbi in hyeme, vere, aut prima æstate contingunt, non solent facere recidivas: Qui verò autumno solent contingere, illis maximè obnoxii sunt.

Extex-  
na.

Hieme enim & vere calor nativus potentissimus est & noxios humores efficaciter dissolvit. Autumno verò maximè debilis est, exhaustus ex prægressæ ætatis exsolutione; ideo vix potest causas morbosas integrè discutere.

Qui bona corporis constitutione præditi sunt, à morbo semel curati, non patiuntur recidivas: at malè constituti, ut plurimum relabuntur.

Robur partium causam morbosam perfectè dissolvit; at quando est imbecillitas, ut in malè habitis, imperfecta sit humorum excretio.

Subjec-  
tum.

Quicumque ægrotantes perfectam sanitatem nequeunt adipisci, & à paucis rebus juvantur, leduntur verò à plurimis, sunt in periculo recidivæ.

Hæc omnia significant causæ morbosæ reliquias in corpore latitantes, quæ recidivas facere consueverunt.

Juven-  
tes &  
lædentes.

In quibus convalescentibus actiones, excrementa, & qualitates plurimum à naturali constitutione eva-  
riant.

Effectus.



riant, nec ad pristinum statum reducuntur, in his metuenda est recidiva.


Quibus febres cessant sine signis concoctionis, recidivam in his expectare oportet. Hippocrates in prognost.

Non possunt humores morbifici convenienter excerni, nisi prius concocti fuerint: ideo, quamvis febris cesset, si cruditatis signa appareant, osten-

dunt materiam morbificam adhuc intus retineri; recidivam essecturam.

Si post crisin peractam urina tenuis diu reddatur, & parum colorata, recidivam prænuñciat.

Significat enim naturæ imbecillitatem, quæ concoctiones suas ritè non exercet; unde novorum excrementorum proventus, ex quibus recidiva expectanda est. (Melet. III. 56.)



# INSTITUTIONUM MEDICARUM LIBER QUARTUS,

Qui est de ὑγιεινῇ, seu valetudine conservanda.

## PROOEMIUM.

Finis Medicinæ duplex est, ut scilicet sanitas præsens conservetur, & amissa recuperetur. Priori debetur ὑγιεινῇ, posteriori θεραπευτικῇ.

ὑγιεινῇ, in sex rerum non naturalium administratione tota versatur. Illæ autem sex res nonnaturales sunt Aër, cibus & potus, motus & quies, somnus & vigilia, excreta & retenta, & animi pathemata.

**N**on naturales dicuntur, quasi mediæ inter naturales, & præternaturales. Illæ enim propriè & absolutè naturales dicuntur, quæ corporis viventis constitutionem ingreditur, & tractantur in Physiologia. Hæ verò dicuntur nonnaturales, quandoquidem rectus ac legitimus earum usus sanitatem conservat, & tunc ad causas naturales referuntur: præposterus verò & illegitimus, morbos producit; & tunc præternaturales fiunt, omniumque propemodum morborum causæ, ut in Pathologia docetur. Sunt tamen earum nonnullæ, quæ in rerum verè naturalium serie continentur, ut motus corporis, & animi pathemata, prout functiones sunt à facultatibus suis profectæ: consideratæ verò prout earum usus corpus afficit, nonnaturales appellantur.

Dicuntur etiam necessaria, quia iis carere, earumque vim effugere non possumus; sed continuo, & necessariò corpus nostrum afficiunt.

Objici potest, alia adhuc esse non pauca, quæ corpus nostrum alterant; & ideo ad res nonnaturales esse referenda, nempe cœlum, aquam, ignem, terram, & regiones; ac proinde senarium earum numerum esse multiplicandum. Respondemus, Cœlum, ignem, terram, & regiones ad aërem reduci quia non agunt in nos, nisi per aërem. Aquam verò, si assumatur, ad potum esse referendam; si verò admoveatur, ut in balneo & lotionibus negamus esse necessariam; siquidem ea facilè carere possumus, atque hoc respectu è rerum nonnaturalium censu est expungenda.

Totus igitur hic liber in sex rerum nonnaturalium explicatione versabitur: in eoque ostendemus, quo modo iis utendum sit ad sanitatem tuendam, vitamque incolumem, & à morbis immunem diutissimè conservandam: à cibo & potu incipiendo, quòd majoris sint momenti, & multo plurima in iis consideranda veniant.

## CAPUT I.

De Cibo & Potu, seu de Alimentis.

Alimentum est id, quod à calore nativo commutatum in corporis nostri substantiam convertitur, illudque nutrire potest.

In eo differt à medicamento, quòd medicamentum definiatur à Galeno 1. simpl. quod corporis nostri substantiam alterare, neque in eam, quatenus tale, converti potest.

Datur tamen medium quoddam inter illa duo, utriusque naturæ particeps, quod & nutrire & alterare potest, vocaturque alimentum medicamentosum, vel medicamentum alimentosum.

Varia autem sunt alimentorum genera, ex diversis rebus petita, quæ tamen omnia sub plantarum & animalium generibus continentur.

**R**es omnes sublunares, quibus in Medicina utimur, sub triplici genere comprehenduntur, plantarum, animalium, & mineralium. Omne autem mixtum, nutriendi facultate præditum, vitam (succumque nutritium) habuisse necesse est, sicque mineralia, (& non pauca etiam plantæ) ex alimentorum serie prorsus excluduntur.

In eorum verò usu consideranda sunt substantia, quantitas, qualitas, ordo, tempus, & hora sumendi; preparatio, consuetudo, & delectatio, ætas, & anni tempus. De quibus omnibus sigillatim agemus. Iisque consequenter præcipuorum ac magis usitatorum ciborum ac condimentorum facultates subjiciemus. Ac tandem potulentorum materiam & vires excutiemus.

## CAPUT II.

De Alimentorum Substantia.

Per alimentorum substantiam intelligimus formam & materiam, ex qua illa componuntur.

Sub formæ nomine comprehendimus illam totius substantiæ proprietatem, qua alimentum idoneum redditur, ut in corporis nostri substantiam convertatur. Unde vulgò dici solet, alimenta nos nutrire propter substantiæ similitudinem, quam habent cum corporibus nostris.

Hinc cibi dicuntur boni vel mali succi, multum vel parum nutriendi, quatenus habent substantiam corpori nostro magis vel minus analogam, eamque puriorem aut multis partibus heterogeneis permixtam. Ad materiam referuntur, durities, mollietas, rari-



tas, densitas, gravitas, levitas, crassities, tenuitas, lentor & friabilitas.

Quæ licet sub qualitatibus secundarum classe contineantur, quia tamen materiam proximè sequuntur, & idcò qualitates materiales nominantur (propterea quod ex varia permixtione humidi cum sicco oriuntur) ad substantiam, vel substantiæ modum reducuntur.

Ergo ratione substantiæ, bona & laudabilia alimenta vocantur, quæ bonum & laudabilem succum, ac pauca excrementa generant, & mediocrem obtinent consistentiam, nempe quæ neque nimis dura, crassa, aut densa; neque nimis mollia, rara, aut tenuia. E quorum genere sunt panis ex purissima tritici farina confectus, recens, benè coctus & fermentatus, caro vervecina, hædina, vitulina, caponum, gallinarum, pullorum, pipionum, perdicum, aliarumque avicularum montanarum, aliaque sequentibus fusius explicanda.

Prava verò, & dyspeptia, ac malè nutrientia, multaque excrementa generantia, dicuntur ea, quæ duram, gravem, densam, ac crassam substantiam obtinent, ut panis fursuraceus, caro bovina, caprina, hircina, legumina, caseus antiquus, & similia.

Hæc tamen bona vel mala alimenta salubria aut insalubria generaliter dicenda non sunt omnibus hominibus; sed pro diversa eorum natura, vitæ genere, & exercitiis illa quibusdā magis conveniunt, hæc verò aliis commodiora sunt. Sic quibus calor fortior est, iis dyspeptia alimenta, qualia sunt carnes bubulæ, cervinæ, lepore, infumata, & similia benè concoquantur: contra verò eupeptia, ut carnes agnina, vitulina ova tremula, pisces saxatiles & similia, deterius concoquantur: siquidem illa corrumpuntur, & aduruntur à calore fortiori: prout enim alterantur facile, sic promptè vitiantur ac corrumpuntur. Alia verò quæ communiter dyspeptia nominantur, sicut difficulter alterantur, ita egrè ad statum deteriorem perducuntur.

**H**UJUS rei exempla desumere possumus ex iis, quæ exterius coquantur, v.g. melle, quod suā naturā dulcissimum, si ulterius coquatur, amaritudinem contrahit. Contra verò carnes bubulæ, & porcina, diutius coctæ, sapidiore evadunt. Idem mel juvenibus est noxium, quoniam à mordaci eorum calore adurit, & in bilem convertitur, senibus verò salubre est, quoniam à modico eorum calore probe concoquitur. Propter eandem causam agricolæ, fœsores, bajuli, nautæ, alique artifices laboriosam artem exercentes, carnibus hœdinis, vitulinis, pullis gallinaceis, columbinis, & ovis forbilibus non probè nutriuntur: non solum quod à fortiori eorum calore alimenta illa citius consumantur ac dissipantur; sed etiam, quod ab eodem calore nimis concoquantur, & corrumpantur. Contra verò leguminibus, brassica, caseo, carne bubula, & similibus commodè aluntur.

## CAPUT III.

### De Alimentorum Quantitate.

Quantitas alimentorum debet esse moderata quæ scilicet corpori nutriendo, & viribus reficiendis sufficiat. Et si hos limites plurimum excedat, varios producit morbos, ac vitam abbreviat.

Quemadmodum autem ciborum multitudo plurimos morbos generat, sic eorundem parcimonia, quæ sobrietas vulgò ac frugalitas nominatur, multorum morborum curationi & præcautioni inservit, vitamque longam efficit.

**S**UMMA ac præcipua diæteticæ ratio in moderata quantitate consistit. Licet enim alimenta in substantia, qualitate, aliisque conditionibus aliquantulum aberrant; si tamen pauca sit eorum quantitas, benè concoquantur, & optimè nutriunt. Itaque in primis quantitati attendere oportet, quæ ut plurimum nimia esse solet. Hoc ex se satis patet, quod omnes ferè morbi venæ sectione, purgatione, aliisque evacuationibus curentur, quibus superflua humorum copia auferenda est, quæ ex

Laz. Riverii Opera.

nimia ingestorum copia ducit originem. Hinc sobrietas, & ciborum parcimonia, sanitatis & vitæ longæ parens dici consuevit. Unde Hipp. 6. epid. sect. 4. Aph. 20. sanitatis studium est, non satiari cibis, & impigrum esse ad labores. Idem Aphor. 17. sect. 1. ubi plus cibi quam pro natura ingestum est, hic morbum facit. Plato intemperantem civitatem hoc signo patefacit, quod multos Medicos alat. Hinc natum proverbium: Intemperantia Medicorum nutrit. Tum etiam illud: plures occidit gula, quàm gladius. Galenus verò: Majores nostri, inquit, paucioribus morbis laborabant, quia frugalius vivebant. Et Seneca luxum & ingluviem sui temporis, mendacem fecisse Hippocratem scribit, qui Eunuchos & fœminas arthriticis doloribus non vexari asseruerat. Arist. verò in problematis dicit saluberrimum esse cibum minuere, & laborem augere. Diogenes Cynicus dicere solebat, insanum esse ea à Diis petere, quæ in nostra essent potestate; dum scilicet pro obtinenda bona valetudine Deum oramus; deinde nos cibo, potuque ingurgitamus. His omnibus sacre Scripturæ auctoritatem subnectamus. Ecclesiastes cap. 37. Noli, inquit, avidus esse in omni epulatione, non te effundas super escam; in multis enim cibis erit infirmitas, & avaritas appropinquabit usque ad cholera: propter crapulam multi obierunt, qui autem abstinentes est, adjicit vitam.

Idipsum exemplis luculentis confirmari potest. Sanctus Paulus, primus Eremita, referente Divo Hieronymo in ejus vita, ad annos 115. ætatem produxit, ex quibus centum egit in Eremito, quadraginta quidem primos cum paucis dactylis, & haustu aquæ; reliquos verò, postquam dactyli defecissent, pane dimidio, quem corvus ei quotidie subministrabat. Sanctus Antonius, teste Athanasio, vixit annos 105. ex quibus 90. egit in Eremito, solo pane & aqua corpus sustentans, quibus interdum aliquid oleis addebat in extrema senectute. Arsenius, præceptor Arcadii Imperatoris vixit annos 120. quorum 55. transegit in deserto, abstinentiâ mirabili. At nostro sæculo Ludovicus Cornarus, Nobilis Venetus, cum ad 35. ætatis annum vitam insalubrem duxisset, licet multis remediis frustra usus esset, variis frequenter morbis conflictatus: tandem consilio cujusdam Medici solâ diætâ morbos illos oppugnare cœpit; cibi & potus quantitatem sensim imminuens donec ad uncias quatuordecim cibi, computando panem, carnes, ova, & alia quævis edulia, & sexdecim potus ad singulos dies pervenisset; in quo regimine perseverans, vitam incolumem, & à morbis liberam, atque vegetam ultra centesimum annum produxit, ut ipsemet testatur in libello de vitæ sobriæ commodis inscripto, ab eo Italicè edito; qui postmodum in Latinam, & Gallicam linguam conversus est. Ex quibus colligere possumus, ciborum parcimoniam non solum ad sanitatem in eodem statu conservandam, sed etiam profligandos morbos contumaces & diuturnos maximè conferre. Postquam enim calor natus pauca illam alimentorum quantitatem citò concoxit, circa humores superfluos occupatur, eosque digerit, dissipat, & per varia corporis emunctoria sensim eliminat, ut tandem corpus purum, & à causis morbificis liberum evadat. Perseverando autem in eodem victus regimine, corpus ab omnibus morbis liberum redditur, saltem ratione causarum internarum, quarum congeries ab eodem præcavetur. Si verò à causis externis corpus offendatur, multò minor læsio sequitur, quia corpus superfluitatibus vacuum magis resistit. Unde videmus in magnis mutationibus temporum, v.g. quando à constitutione austrina, calida & humida, subita & repentina fit mutatio in Aquiloniam, frigidam & siccam, multos homines affici catarrho, pleuritide, aut peripneumonia, in quorum scilicet corporibus morbosus apparatus latitabat; alios vero minimè, quorum scilicet corpora magis vacua superfluis humoribus reperiuntur. Et si tales homines interdum causarum externarum vehementia in aliquem morbum præcipitentur, citius liberantur, ob paucitatem causæ internæ ab externa commotæ, quæ idcò facile vincitur ac resolvitur.

Præterea, si exacta illa diætâ morbos incurabiles auferre nequit, eos saltem multò leviores & tolerabiliores reddit

N

facitque



facitque, ut ægri cum iis diu vivere possint. Sic multos quotidie videmus cum ulcere pulmonis, cum scirrho hepatis vel lienis, cum calculo in renibus, aut vesicâ, diu vitam producere. Sic testatur Aristoteles in *Problematis* quendam fuisse suo tempore Philosophum, Harodicum nomine, qui cum tabe laboraret, tamen arte *τῆς διαίτης* ad centesimum pervenerat.

Vulgò obijci solet, multos ad extremum senium pervenire, qui multis cibis quotidie sese ingurgitant. Respondemus, rarissimos esse illos, & eximio partium robore ac temperamento præditos, qui si sobriè viverent, vitam diutius protraherent, & ad animi actiones melius dispositi essent. Neceffe est enim eos qui non frugaliter vivunt, multis pravis humoribus impleri, & sæpe morbis tentari, nec posse, sine detrimento valetudinis, arduis mentis functionibus diu intendere: tum quia in illis tota vis naturæ & spirituum concoctioni ciborum mancipata est, à qua si violentè per animi contentiones abstrahatur, prava fiet concoctio, & multe nascuntur cruditates: tum quia illis opus est crebra corporis exercitatione vel medicamentis, quibus corpus expurgetur: atque adeo etsi diu videantur vivere corpore, tamen animo & ingenio parum vivunt, cum exiguo tempore ad functiones animi sint idonei, & major pars tempore debeat impendi obsequio corporis. His adde, quòd si aliquando contingat, eos qui fortiori naturâ præditi sunt, diu vitam producere, licet plurimis cibis sese ingurgitent; nullum tamen unquam videre est ex iis qui debilioris sunt naturæ, tali victu utentem, qui ad senectutem pervenire potuerit. Contrà verò si temperatè vivant, longius vitam producant, quàm robusti intemperatè viventes.

*Moderata autem & necessaria ciborum quantitas regula generali determinari nequit, cum diversas temporum, ætatum, & temperierum eam multum evariet.*

Hoc theoremate ostenditur, Ludov. Cornari exemplum suprâ propositum, quibuslibet hominibus, tanquam exemplar imitandum obijci non debere. Multi enim homines reperiuntur robusto ac valido calore nativo præditi, qui à tam parco victu maximè læderentur. Scribit enim Hippoc. *Aphor. 5. lib. 1.* tenuem victum, eumque admodum exquisitum paulò pleniori esse periculosiorem; quia facilius est causis replentibus subvenire, quàm exhaustum humidum primigenium, & exhaustas partes solidas alimento reficere. Victus ratio triplex instituitur ab Hipp. & Gal. *tenuis*, quæ vires imminuit; *mediocris*, quæ conservat; & *plena* quæ auget. Tenuis nunquam sanis, sed ægris tantum competit, nam sicut sanis cibis robur est, ita ægrotanti morbus: & impura corpora quò plus nutries, eò magis lædes. In sanis verò semper servandum est naturæ robur, vel augendum alimentis, non frangendum; quod in ægris non potest fieri, quia victus mediocris vires conservans in sanis, eas imminuit in ægris, morbum augendo, quia quò magis nutrias, eò magis lædas. Tam exacta igitur victus ratio, qualis à Cornaro observata est, omnibus hominibus convenire non potest, sed tantum iis qui valetudinarii sunt, & calorem nativum habent admodum debilem, multis cibis coquendis minimè capacem: tum etiam iis, qui corpus habent multis humiditatibus refertum, inedia enim corpus exsiccat: ac denique iis qui parum exercitiis indulgent & vitam agunt sedentariam: simulque contemplationi, aut magnis animi contentionibus dediti sunt. Nonnulla tamen theoremata stabiliri possunt, quibus unusquisque sibi convenientem ciborum copiam circumcirca determinare poterit.

Primum theorema est: *Numquam bene sano ad satietatem esse comedendum, sed à mensa, vigente adhuc appetitu esse recedendum.*

Hoc theorema respondet *Aphor. Hipp. suprâ citato*, non satiari cibis; in bene valentibus enim viget appetitus, donec ventriculus valde repletus sit, quæ repletio admodum noxia est, ut suprâ monuimus.

Secundum theorema est: *Si tantum ordinariè sumas cibi & potus, ut postea sentias torporem quendam, gravitatem & lassitudinem corporis, cum antea esses agilis & alacrior: signum est mensuram congruentem excedi, & quantitatem alimentorum esse minuendam; donec prædicta incommoda non amplius appareant.*

Tertium Theorema est: *Si à pastu parum aptus sis actionibus mentis, ut studio, meditationi, aut contemplationi, aliisque tum animi, tum corporis functionibus; perspicuum est, te justam mensuram excedere.*

Quartum theorema desumitur ab Hipp. 3. de diætâ, ubi signa repletionis proponit; quæ quidem repletio ex nimia alimentorum copia procedit, & ideo minuenda est. Imò vero si multum exsuperet, ut morbum minari videatur, cum vitæ parsimonia nonnisi lente humores superfluos consumat; evacuationibus confestim auferenda est.

Signa ergo repletionis ab Hippocrate proposita hic summatim describenda sunt, juxta semeiotices nostræ methodum, ut melius percipiamur, in ordinem à nobis redacta. Talia igitur sunt, capitis dolor & gravitas, somni longiores & perturbati, insomnia turbulenta, ut videtur homo cum aliquo pugnam committere; somnus etiam diurnus, præcipuè post pastus. Signis totius corporis, lassitudines & dolores, vel toto, vel aliqua parte. Appetitus dejectio aut imminutio, cruditates in ventriculo, ruclus acidi vel nidorosi, alvi restrictio, aut tarditas insolita. Destillationes frequentes, nares, à cæna repletæ, è quibus tamen nihil aut parum emungitur manè cum exerceri incipiunt, multum emungitur & expuitur. Flatuum copia præter consuetudinem, alvi profluvia interdum à corruptis alimentis, & interdum dysentericæ.

Quintus theorema est: *Ab inordinata vivendi ratione non est immediatè transcendendum ad exactam regulam, sed sensim id faciendum, minuendo modicis subtractionibus consuetam quantitatem, donec ad eam perveniatur mensuram, quæ non amplius corpus gravet, aut animi functiones offendant.*

Hoc theorema fulcitur *Aphorismo Hippocratis 51. lib. 2.* Plurimum atque repente evacuare vel replere, refrigerare vel calefacere, sive quovis alio modo corpus movere, periculosum: omnis enim mutatio subita est periculosa.

Ad quantitatem discretam spectat ciborum varietas, quæ sanitati noxiosissima est. Cum enim diversorum ciborum diversa sit natura, sit ut alii celerius & alii tardius conficiantur, inde prava sequitur concoctio. Si enim cibi concoctu faciliores, postquam perfectè concocti sunt, ulterius in ventriculo detineantur corrumpuntur citissime. Si verò quamprimum concocti sunt ad intestina detrudantur, reliquos cibos nondum concoctos simul abripiunt, unde cruditates emergunt.

Hoc theorema intelligendum est de varietate ciborum, natura, & temperie plurimum inter se discrepantium. Nul- lum enim est inconveniens, in una & eadem mensa, pullos, pipiones, perdices, aliasque carnes deliciores comedere, sed si carnes cum piscibus, oleribus, fructibus, aliisque edulis heterogeneis misceantur, prava inde sequitur concoctio. Hippocrates lib. de flatibus: *Dissimilia*, inquit, *seditionem movent*, aliaque celerius, alia tardius, & ægrius concoquuntur. Et Seneca eleganter: *Diversa cibaria inquinant, non alunt.*

#### CAPUT IV.

##### De Qualitate Alimentorum.

*Alimenta ratione qualitatis, vel temperata sunt, vel intemperata.*

*Temperata dicuntur, in quibus nulla qualitas manifesta superat: & illa omni hominum generi, præsertim verò temperatis conveniunt. Ex eo genere sunt panis & carnes, quas euechymas nominavimus: & illa simpliciter Alimenta vocantur.*

*Intemperata sunt, quæ manifesta aliquâ qualitate nos immutant, & Alimenta medicamentosa dicuntur.*

*Illa autem alimenta medicamentosa corpora nostra immutant calefaciendo, refrigerando, humectando: vel exsiccando; obstruendo, vel aperiendo; alvum laxando, vel constringendo; semen vel lac generando.*

**M**anifestè calefaciunt, vinum, piper, & alia aromata, cepa, allium, porrum, nasturtium, hyssopus, mentha, petroselinum, & salsa omnia; eadem etiam exsiccant. Refrigerant verò panis ex farina hordei, aut secalina, acetum, lactuca, portulaca, acetosa, cucurbita, cucumeres, melones & fructus



fructus horarii; quæ etiam humectant, si acetum excipias. Obstruunt alimenta crassa supra enumerata, & reliqua ejusdem generis: quæ maximè vitanda sunt omnibus hominibus, quia omnes ferè morbi fiunt ab obstructione. Aperiant obstructiones aromata prædicta, apium, petroselinum, capparitis, asparagus, pastinaca sylvestris, fœniculum marinum, cicera rubra, & alia quamplurima. Semen & lac generantia ex materia medica desumenda sunt: in qua etiam multò plura prædictis facultatibus prædita reperiuntur, præterea, quæ supra, tantum exempli gratia proposita sunt.

CAPUT V.

De Ordine Alimentorum.

*Si ultimum theorema cap. 2. propositum, ritè observetur, ut scilicet ciborum varietas in una & eadem mensa, tanquam noxia vitetur, huic capiti nullus erit locus; sed quia hominum intemperantia strictioribus vivendi legibus submitti non vult; cogimur etiam præcepta docere, quibus noxam illius imminuere valeant.*

*Communis igitur atque generalis circa ordinem regula habenda est; ut alimenta tenuia, liquida, concoctu facilia, laxantia, & quæ facile descendunt, prius assumantur; crassa vero, solida, concoctu difficilia, & astringentia, posterius.*

**H**oc theorema desumitur è Gal. 2. de Alim. facul. c. 2. & 3. de victus rat. in morbis acutis, text. 22. Et ratio id ipsum maximè confirmat. Nam quæ celerius concoquuntur, qualia sunt humida & liquida citius è ventriculo descendunt: & si diutius retineantur, postquam concocta sunt, facile putrescunt. Adde quod postquam cōcocta sunt, & ad duodenū detrusa, reliquis nondum concoctis locum cedant, ut ad fundum ventriculi devoluta, melius concoquantur.

Quamvis autem hæc doctrina receptissima sit, nonnulli tamen contrarium probare conati sunt ex eo, quod solida & dyspepta alimēta majori calore indigeant, qualis est in fundo ventriculi magis carnosus, atq; adeo prius ingesta eadem temporis distantia concoquantur, qua eupepta superiorem partem minori calore præditam occupantia. Verum non tanta est in superiori & inferiori ventriculi parte caloris differentia, ut in unâ eupepta, in aliâ dyspepta eodem tempore concoqui valeant. Sed potius dicendū est, alimenta in ventriculo eandem sedem toto concoctionis tempore non fervare, quam dum ingesta fuerant, obtinuerunt; sed per coctionem, quæ elixatione fit, simul commisceri, cum calor sit congregare homogenea. Et constat experientia, chylum uniformem, & omnibus suis partibus similem, ex omnibus alimētis generari. Adde quod potus, qui per prandii & cœnæ decursum partitis vicibus ingeritur, exactè cibis misceatur: quod etiam de jusculis, aliisque liquidis alimentis dicendum est. Non est igitur magni momenti hæc regula ciborum ordinem spectans. Sed multò majoris momenti est, huic ciborū varietati non indulgere, cum unicus cibus, aut saltem plures valde analogi, simul ritè concoquantur, nulumque cruditatis metum inferant, si modica quantitate sumantur. Afferendum tamen est, alimenta humida & laxantia, prius assumpta, ventriculi tunicas laxare, & alvum molliorem reddere: contra verò astringentia eandem comprimere, si priori loco sumantur.

*In principio mensæ jusculum, aut ossa, aut quodvis aliud alimentum actu calidum sumatur. Nunquam tamen pastus à potu est inchoandus.*

Huic theoremati repugnare videtur vulgaris ille versiculus scholæ Salernitanæ:

*Ut vites pœnam, de potibus incipe cœnam.*

Ille tamen non intelligendus est de potu aquæ, & vini, alioqui purè & simpliciter rejiciendus esset; sed de alimento liquido audiendus est: in quo sensu etiam Hippoc. nomen potus usurpavit Aphor. 11. sect. 2. ubi *facilius est, inquit, impleri potu quàm cibo*, per potum intelligens liquidum alimentum, quod potu hauritur, quale febricitantibus vulgò exhiberi solet, idque alibi victum humidum

*Laz. Riverii Opera.*

appellans. Illa siquidè facilius concoquuntur & distribuuntur, sicque faciliè corpus impletur ac reficitur. Potus autem ordinarius, qui ex aqua & vino componitur, priori loco assumptus, crudus rapitur à venis, præsertim existentibus famelicis, nervosque ferit, maximè si vinum bibatur. Nam aquam bibere ante pastum, iis qui ventriculum habent calidum & sitibundum, præcipuè æstatis tempore, incommodum non est: illa enim aqua citò rapitur ab hepate sitibundo, unde ipsi refrigerium aliquod accedit.

Neque obstat veterum consuetudo, à quibusdam allata, quæ apud Athenæum reperitur lib. 4. *Dipnosophist.* ubi refert donatas fuisse convivis assidentibus argenteas phialas viginti, hisque evacuatis, panem demum carnesque appositas esse. Idem loco citato frugalitatem describens Cleomenis Lacedæmoniorum Regis, notat convivis datum esse cyathum unum ante cœnam. Hæc bibendi ratio *προπομα*, & *προποτισμος* vocabatur. Apud Latinos etiam hic mos observatus fuit, quemadmodum refert Plinius lib. 12. c. 22. Tiberio Claudio Principe, ante annos 40. institutum, ut jejuni biberent, potusque vini cibos antecederet. Verum prava fuit & damnosa illa consuetudo, in conviviorum luxu, non apud homines sobrios usitata. Quod ipse Plinius innuit iniquiens, hunc morem introductum fuisse externis artibus, & placitis quorundam Medicorū novitate aliqua sese commendantium. A Plutarcho etiam improbatur lib. *sympos. quæst.* 9. ubi inter causas novorum morborum *προπομα* recenset: *Antiqui, ait, ne aquam quidè biberunt: antequam comedisent: nunc ante cibum captum vino opplati, humectato & fervente corpore, cibum aggrediuntur.* Saluberimum autem est ante potum cibos solidos assumere; donec sitis excitetur, eosque actu calidos, ne calorem stomachi offendant, sed sint veluti fundamentū stabile totius pastus.

*Pastum verò potu claudere inconveniens non est.*

Non est res magni momenti, si pastus potu vel cibo claudatur; sed hoc tantum advertendum est, ne nimia copia potus ingeratur; fluctuationem enim in ventriculo efficeret. At si in fine pastus sitis aliqua supersit, commodè potus assumitur. Celsus optimum esse asserit, in fine pastus, aquæ frigida parum assumere, quod à ratione alienum non est; illa enim stomachi orificium frigiditate sua leviter constringit, calorem cogit antiperistasi, & vaporum ascensum prohibet, quemadmodum experientia docet, gravem quorundam eduliorum halitum, ut ceparum, aliorum, casei antiqui, & similibus aquæ frigida potu in fine mensæ prohiberi; aut plurimum imminui, ut proinde aquam potius & cerevisiam post caseum, &c. sumant doctiores.

CAPUT VI.

*Tempus & horam sumendi alimenti à consuetudine desumere oportet. Si quis enim bis aut ter in die, & statis horis alimenta sumere consueverit, & cum his bene habeat, in eo modo perseverare debet, donec aliquid contingat, quod eum immutare cogat.*

**N**on potest certa regula statui circa cibandi tempus; sed illud imprimis à consuetudine desumendum est, cui natura tantopere inhæret, ut adveniente horâ prandii, in bene sanis ventriculus plurimum appetat, & novum famelicus appetat alimentum. Quâ horâ prætergressa languet plurimum appetentia, & fames dejicitur.

*Adveniente verò prandii aut cœnæ horâ, necesse est, ut appetitus vigeat, & cibus in priori pastu ingestus optimè concoctus fuerit, alioqui satius est horam illam differre, aut pastum omnino intermittere, aut paucissimam alimentorum copiam assumere.*

In eo universim hæc regula versatur, ut cibus non assumatur antequam prior, antea ingestus, sit omnino concoctus, & ad intestina detrusus; tunc enim appetentia reintegratur, & coctio postmodum egregiè perficitur. Si verò cibus assumatur priori nondum concocto malè concoquetur, & insignem cruditatem pariet. Hoc tantum in iis habet locum, qui usu aliquo extraordinario, ut in convivio lautiori, sese præter modum epulis ingurgitarunt



tunc enim saluberrimum est sequentem pastum omnino præscindere, aut unico hauſtu vini diluti, & tantillo cibi abſolvere. Si enim in victu ordinario illud contingeret, ut horâ paſtu ordinaria appetentia non vigeret, & alia nondum concocti prioris cibi ſigna apparent, indicio eſſet, nimiam alimenti copiam aſſumi, eamque eſſe minuendam.

*Cùm autem tempus aliquid ſumendi cibi univerſim præſigi debeat, quod majori hominum parti conveniat: ſtatimus, bis in die cibum ſumere convenientiſſimum eſſe. Frequentiores enim epulæ cruditatis metum aſſerunt. Jejunia verò longiora corpus debilitant, & prævos humores ad ventriculum deducunt, unde multi affectus exoriri poſſunt.*

Maxima pars hominum prandio & cœna contenta eſt: multi tamen jentaculum addunt, alii etiam merendam: quod præcipuè pueris & ſenibus convenit: illis, quia ut docuit Hipp. *Plurimum habent calidi innati, & plurimo egent alimento.* His verò, quia cùm habeant calorem debilem, paucum alimentum ſingulis vicibus ingerere debent, ut benè concoqui valeat, & illud frequentius aſſumendum, ut toti corpori nutriendo ſufficere poſſit. Jejunia verò longiora picrocholis præſertim noxam aſſerre ſolent, quia ventriculus vacuus bilioſis impletur humoribus, qui cardialgias, colicas bilioſas, & alios affectus pariunt. Cæteris autem hominibus ventriculus vacuus non habens quod concoquat, à vicinis locis trahit quod invenit, ſicque prævis impletur humoribus, qui etiam multorum morborum cauſa eſſe poſſunt. Satiſ ergo eſt in ſingulis paſſibus quantitatem ciborum minuire, quam poſt lautas epulas longum jejunium exercere.

*Cœna in nonnullis, optima ſanitate præditis, & in florenti ætate conſtitutis, prandio æqualis aut largior eſſe poteſt. At in reliquis omnibus parcior eſſe debet.*

Nulla res in tota arte magis controverſa reperitur, quàm ubi quæritur, an cœna prandio largior eſſe debeat, aut contra. Quæ aliam etiam graviſſimam quæſtionem includit: an coctio melius noctu quam interdium, in ſomno melius quam in vigilia perficiatur. Utrique enim authoritates & rationes efficaciter militant.

Ac primum cœnam largiorem eſſe debere, probatur ex Hippocrate 3. *de diæta*, ubi hyeme ſemel tantum in die cibum ſumere præcipit, niſi quis ventrem valdè ſiccum habeat. Quod ſi id fieri minime poſſit, modicum prandere jubet. Unde facile colligitur, per unicum illum paſtum, quem hyeme præcipit Hipp. cœnam eſſe intelligendam.

Ceſus verò Hippocratem ſecutus *Hyeme*, inquit, *oportet ſemel in die cibum capere, niſi venter nimis aſtriſus ſit.* Poſtea addit: *Si prandeat aliquis, utilius eſt exiguum aliquid, & ipſum ſiccum, ſine carne, ſine potione ſumere.*

Galenus 7. *meth. c. 6.* cœnam prandio liberaliorem eſſe debere, diſertè pronuntiat: rationem addit, quòd cibum veſpertinum ſequantur quies & ſomnus, ac tempus diuturnius, ac duplum ferè ad illud quod inter cœnam & prandium intercedit. Ex his Gal. dictis triplex ratio elici poteſt.

*Primò*, In quiete corpus non movetur, nec agitur, ita ut cibus in ventriculo apertè reſideat, non fluctuet, non dimoveatur; ſicque melius concoquitur, quia concoctio indiget quiete.

*Secundò*, In ſomno, cùm animales ſpiritus magna ex parte ſerientur, vitales & naturales fortiores ac vegetiores evadunt, unde melius fiunt concoctiones.

*Tertiò*, Cùm duplum ſit tempus à cœna ad prandium, duplum debet eſſe alimentum.

*Quartò*, His addit Galenus exemplum Athletarum, qui multas carnes comedebant in cœna, in prandio verò ſolum panem. His Galeni rationibus ſequentes adduntur.

*Quintò*, Noctis frigidiſas cibi concoctionem juvat. Hæc enim perinde ut hyems, ventres calidiores reddit, calorem pellendo ad interiora, ut melius coctionem perficiat.

*Sextò*, In ſomno calorem concentrari, probatur tum autoritate Hippocratis 7. *Epid. ſect. 4.* dicentis: vigilantem calidiorem eſſe circa exteriora, frigidiorem circa interiora; dormientem contra: tum ex pulſu ac reſpiratione, validiore in ſomno, quàm in vigilia.

Contra verò prandium largius eſſe debere, ſequenti-

bus auctoritatibus & rationibus conſcitur.

Autoritates deſumuntur ab Actuario & Avicenna, qui præcipiunt, cibum in tres partes eſſe distribuendum, & duas ſumendas eſſe in prandio, tertiam verò in cœna: quibus accedunt ſcholæ Salernitanæ verſiculi.

*Ex magna cœna ſtomacho ſit maxima pœna.*

*Ut ſis nocte levis, ſit tibi cœna brevis.*

His rationes validæ ſubnectuntur.

*Primò*, Inter prandium & cœnam ſeptem vel octo tantum horæ intercedunt; inter cœnam verò & prandium circiter ſedecim. Si verò per ſomnum coctio melius perficeretur, circa mediam noctem illa abſoluta eſſe deberet, & ſtatim fames urgere. At contra videmus manè è lecto ſurgentes minus fame tentari, quàm ante cœnam; unde facile videre eſt, coctionem tardiùs perfici in ſomno, quàm in vigilia.

*Secundò*, Somnus à prandio facit in non aſſuetis, ut horâ cœnandi appetitus non vigeat, & ventriculus cibis gravatus ſentiat, quod oſtendit coctionem imperſectius fieri in ſomno. Si enim ſomnus coctionem adjuvaret, eſſet utilior omnibus.

*Tertiò*, vigilantes fame laborant, unde Hipp. 6. *Epid. ſect. 4. Aphor. 20. aqua vorax, vigilia vorax.* Sic qui noctu præter ſolitum vigilant, citiùs famem percipiunt. Sic vinum & oleum exprimentes, quia perpetuò vigilant, multum & frequenter comedunt.

*Quartò*, ſi per ſomnum melior fieret concoctio, ſtatim à paſtu eſſet dormiendum; quia tunc cibus ſolidior majori ventriculi actione indiget, & primarum horarum actio difficilior eſt, quæ tamen vigilando tranſigitur, alioqui ſtomachus gravatur.

*Quintò*, Qui ventriculum habent debilem, & prædu-  
-cti laborant, magis torquentur noctu poſt primum ſomnum, quàm interdium poſt meridiem: quo arguitur coctionem difficiliùs perfici in ſomno.

*Sextò*, Ceſus præcipit in longis diebus ſatiſ eſſe meridiari ante cibum, cujus rei non poteſt eſſe alia ratio niſi quia ſomnus coctionem retardat.

*Septimò*, Per ſomnum calor recurrit ad ſuos fontes; reliquæ verò partes illo magis deſituuntur, quàm in vigilia, per vigiliam verò ad omnes partes magis diffunditur. Ergo minor eſt calor in ventriculo per ſomnum, quàm per vigiliam.

*Octavò*, Interdium calor Solis coctionem adjuvat: Sol enim ex Ariſt. 2. *Phyſ. 2.* eſt vitæ principium. Ergo Concoctio diurna duplex habet calidum; nocturna verò minimè.

*Nonò*, Situs ventriculi in vigilantibus magis facit ad concoctionem, quia erecta figura facit, ut cibi melius deſcendant ad fundum ventriculi, qui carnoſior eſt; cubantibus verò latera ventriculi magis attingunt; unde os illius non ſufficienter clauditur. Hinc fit ut ſomnus meridianus minus noceat, ſi ſedendo capiatur, quàm cubando.

*Decimò*, Pituita, quæ interdium per nares & ſputum rejicitur, noctu in ventriculum deſluit, & coctionem retardat, quo incommodo carent vigilantes.

*Denique*, experientia huic veritati maximè favere videtur; ſiquidem pauciſſimi homines reperiuntur, qui liberè non fateantur, ſe à leviori cœna longò melius habere. Et Cardanus teſtatur, ſe multos interrogaffe, qui ad centefimum annum pervenerant, & omnes pariori cœna uſi fuerant. His addere poſſumus Telephi Grammatici exemplum à Gal. relatum 5. *de ſanitate tuenda*, qui ad annum fere centefimum acceſſit. Illius autem verba ita ſe habent: *Mel crudum alicæ cum aqua coctæ permixtum edebat hora dici tertia; ſerme ſeptimâ prandeat, oleribus primò ſumptis, inde piſcibus ſaxatilibus, aut avibus. Veſpere autem pane cum vino permixto contentus erat.*

Nos igitur poſterioris ſententiæ rationibus, & multò magis quotidiana experientiâ convicti, cenſemus cœnam prandio parciorem eſſe debere. Concedimus tamen (ut in *theorem.* dictum eſt) eos, qui perfectâ fruuntur valetudine, & ventriculum habent validum, poſſe aut æqualiter cum prandio, aut etiam copioſius cœnare: modò tota utriuſque paſtus quantitas mediocritatem non excedat, in iis enim & noctu & interdium optima fit concoctio. Et hîc locum habet ſententia Celſi, *Homo bene ſanus nullis ſeſe debet obli-*

*gare*



*gare legibus.* Imò verò in debiliore etiam constitutione, si quis paucò utatur alimento, & minimam illius quantitatem sumat in prandio, poterit sine dubio lautius cœnare, ut tota ciborum quantitas, quæ unâ die sumitur, corporis nutritioni sufficiat. Sed in hodiernorum hominum morem intueamur, qui in prandio comedunt ad satietatem, certum est eos maximè gravari, si in cœna adhuc largiùs comedant, & tunc verificatur ille versiculus Scholæ Salernitanæ suprâ citatus.

*Ex magna cœna stomacho fit maxima pœna.*

*Ut sis nocte levis, sit tibi cœna brevis.*

At præcipuè locum habet hoc theorema in iis qui fluxionibus & catharris obnoxii sunt. Noctu siquidem humor pituitosus è cerebro defluit in ventriculum, & coctionem perturbat. Contrà verò si paucus in cœna cibus assumatur, pituitosus humor consumitur à calore nativo, nec tam faciliè multiplicatur, ut in copiosè cœnantibus: cum ex illa alimentorum copia multi vapores per somnum in cerebrum exhalent. Et ita affecti post levem cœnam placidè dormiunt: si verò lautius cœnaverint, somnum habent inquietum & interruptum, ita ut eorum maxima pars in cœna parcè comedere, nonnulli etiam à cœna planè abstinere cogantur. Hinc sapienter dictum à Manardè, *Epid. 4. lib. 6.*

*Exiguam cœnam capiti & oculis conferre.*

Ut autem veritas ista clariùs elucescat, autoritatibus & rationibus in contrarium allatis satisfaciendum est.

Ac primum ad Hippocratis, Celsi, & Galeni auctoritates dicimus: ex iis quidem convinci, morem apud Antiquos fuisse, parùm comedere in prandio, multùm verò in cœna: Attamen cum parvisse prandii essent, majorem cibi copiam in cœna ferre potuerunt. Interim ille cibus in cœna ingessus, longiore tempore ad coctionem indiguit, quam si in prandio sumptus fuisset. Nostris autem temporibus, cum prandium lautius esse soleat. Antiquos in cœna imitari non possumus. Et melius pro ul dubio sese gessissent Antiqui, si quod in cœna ingerebant, in prandio sumpsissent: & quod in prandio sumebant, cœnæ loco habuissent. Adde, quod non eadem fuerit apud Antiquos hora cœnæ, quemadmodum apud nos, siquidem Romani, cum parvisse prandii essent satis mane, tribus horis ante Solis occasum cœnare solebant; ita ut coctio ferè peracta fuerit antequam ad somnum sese componerent.

Ad primam verò rationem pro adversa sententia allatam dicimus, omnimodam quietem ad coctionem juvandam non esse utilissimam: siquidem motus levis & moderatus à passu facit ut cibi in fundum ventriculi melius descendant, & calorem nativum aliquantulum excitat, ut faciliùs coctioni incumbere valeat. Hinc vulgaris ille versiculus: *Post cœnam stabis, aut passus mille milis.*

Ad secundam dicimus, vitales quidem spiritus fortiores fieri in somno, sed non influere in ventriculum & alias partes eâ copiam quâ in vigilia, quia per somnum retrahuntur ad suum fontem: in vigilia verò magis diffunduntur.

Ad tertiam respondemus, quod duplum tempus inter cœnam, & prandium intercedens, duplum requireret alimentum, si coctio in utroque passu æqualiter fieret. Sed cum illa tardius à cœna perficiatur, ut à nobis demonstratum est, longius illud tempus fuit necessarium.

Ad quartam dicimus, Athletarum constitutionem non probari à Galeno *I. Aph. 3. & in libro de bono corporis habitu, & in suasoria ad artes:* quinimò & brevis vitæ, & morbosæ illos accusat. Ad corpus quidem instaurandum & impinguandum magis confert cibus in cœna sumptus, quia minor fit illius resolutio per somnum, sed copia superfluitatum, quæ inde emergit, morbos producit. Hinc etiam convalescentes ex paulò lautiori cœna citiùs quidem reficiuntur, sed majus recidivæ periculum incurrunt.

Ad quintam & sextam dicimus, in somno quidem calorem concentrari & ad suos fontes recurrere, nempe cor & hepar; hinc meliores fiunt concoctiones in venis & arteriis: unde nihil utilius somno, ad coctionem pravorum humorum in febribus continuis perficiendam, quàm vigiliæ continuæ. Hinc etiam ebriosi crapulam edormire dicuntur, quæ ex potu nimio in venis cumulata est. Sed coctionis, quæ fit in ventriculo, longè alia est ratio, quæ imperfectiùs exercetur,

quando natura intenta est alimentorum antea coctorum distributioni, & pravorum humorum concoctioni; à quo opere vicinè non parum avertitur coctione ciborum, quæ fit in ventriculo, præsertim si illa magnâ copiam ingerantur.

*Hora prandii tempestiva, nempe duabus aut tribus horis ante meridiem, longe salubrior est eâ, quæ ad meridiem, aut ulterius differtur.*

Ex prandio tempestivo tria lucramur. Primo, tempus longius usque ad cœnam, quo melius coctio perfici valeat. Secundo, cum homo sit frigidior (quod in æstate potissimum locum habet) illa frigiditas coctionem juvat. Tertiò, quod homo sit robustior quia vicinior somno præcedenti, ex quo multi spiritus geniti sunt, qui totum corpus robustius & alacrius reddunt. Hinc passim videmus eos qui diutissimè vixerint, tempestivè cibum sumpsisse: contra verò eos, qui tardius pransi sunt, morbosos fuisse, & brevioris vitæ.

## CAPUT VII.

### De Præparatione Alimentorum.

*Ciborum alii præparatione artificiali indigent, ut alendis corporibus nostris idonei reddantur: alii ab ipsa natura sufficienter præparantur, ut assumi valeant, qualiter notis à natura exhibentur. Prioris generis sunt carnes, pisces, & similia; posterioris, fructus ferè omnes maturi.*

*Præparatio ciborum coctione potissimum perficitur, eaque triplici: dum scilicet elixantur, assantur, aut fringuntur, seu torrentur.*

*Elixatio dupliciter fit, vel cum res in aqua decoquantur, & tunc idem elixationis nomen retinet, sicque hoc modo præparatæ carnes elixæ nominantur: vel ubi cum proprio succo lento igne decoquantur, & carnes hoc modo paratæ, jurulentæ appellentur.*

*Scribit Celsus, carnes jurulentas magis alere quàm assas: & has magis quàm frixas. Addimus nos elixas omnium minime nutrire, quia bonam partem succi alibilis in jusculum deposuerunt.*

*Magis tamen laudatur elixatio vulgari usu familiaris, quia quod ex carne amittitur, in jusculo reperitur. Deinde cum elixatione carnes molliores evadant, in ventriculo faciliùs dissolvuntur & concoquuntur.*

*Assatio carnis vervecinæ melius procedit, si prius malleo aut pistillo ligneo contundatur, ut vulgò coqui & ancillæ facere solent: sic enim tenerior redditur, & laxior evadit, ut à calore ignis melius penetrari valeat.*

*Reliquæ ciborum præparationes, sanitati inservientes, in particularibus eorum descriptionibus proponuntur. Quæ verò ad lautitias & conviviorum luxus spectant, ad coquos releganda sunt.*

## CAPUT VIII.

### De consuetudine, & delectatione in alimentorum usu.

*Cibi consueti, licet paulò deteriores, utiliores sunt insuetis aliquantulum melioribus.*

**H**Oc theorema ab Hippocrate sancitum est. *Aph. 50. sect. 1.* qui sic habet: *Quæ longo tempore consuetæ sunt, etsi deteriores sint insuetis, minus molesta esse solent.*

Consuetudo enim est altera natura, siquidem alimenta, longo tempore consueta, natura immutant, eamque sibi similem reddunt. Per naturam autem temperamentum intelligimus quod redditur simile alimentis, quibus longo tempore uti consuevimus. Illius autem consuetudinis efficacia quamplurimis historiis ab autoribus relatis comprobatur. Nobis unicam proposuisse sufficiet, à Solenandro relata, *Consilior. Medicinal. sect. 5. consil. 15.* de quodam rustico, qui ad hospitale perductus, nullis remediis curari potuit. Tandem à brevi morituro quæsit Medicus quid peteret, & quâ victus ratione antea usus esset? Respondit, se planè ab isto cibo & potu, syrupis ac id genus aliis,



aliis, ut & lecto; quod nimis molle esset, abhorrere; cum non dormivisset intra annos novemdecim in lecto, atque usus fuisset caseo & similibus, & sub die in stramine vestitus dormivisset. Medicus permittit, ut una nocte in stramine dormiret, & uteretur sale, cepis, & aquâ frigidâ. Etsi verò arbitraretur eum inde citius moriturum: tamen postridie præter omnium opinionem eum foco adstantem invenit. *Consuetudinis autem ratio habenda est, non solum circa substantiam ciborum, sed etiam circa qualitatem, quantitatem, & tempus exhibendi.*

Hoc etiam theorema ab Hippocrate mutatum est, qui *Aphor. 17. sect. 1. Et quibus, inquit, semel aut bis, & quibus plura aut pauciora & particulatim oporteat offerre, considerandum. Concedendum autem aliquid tempori, regioni, consuetudini, & ætati.*

*Quando cibi consueti deteriores propter aliquam occasionem, corpori noxam inferunt, commutandi, & ad meliores transeundum est, modò id sensim, & paulatim fiat. Omnis subita mutatio periculosa est.*

Propter varias causas ciborum mutationes interdum necessariae sunt, è quarum numero sunt morbi, qui à cibis consuetis foveri vel augeri possunt: ætas, quæ jam provecta, cibos concoctu difficiles ita subigere non potest ut in juventute solebat, & alia quamplurima. Si igitur propter aliquam causam necessarium videatur, victus rationem mutare id sensim & paulatim faciendum est. Quod docuit Hipp. *Aph. 51. sect. 2. Plurimum, inquit, atque repente evacuare, vel replere, vel calefacere, vel frigerare sive quovis alio modo corpus movere, periculosum, omne enim nimium naturæ inimicum, sed quod paulatim fit, tutum est; cum alias, tum cum ab altero ad alterum transitus fit. Id ipsum multis exemplis confirmari potest, sed instar omnium sit historia Dionysii Siciliae tyranni, qui ebrietati & luxui valde deditus fuerat. Cum verò ab hoste aliquando obfideretur, & necessitate coactus à solita potandi consuetudine sibi desistendum esse animadverteret, subito ab ea abstinuit, quod cum aliquandiu fecisset, tabifico morbo corripit, nec eo liberari potuit, priusquam ad pristinum potandi morem ebrietatemque rediisset. Quod si sensim & paulatim pravam illam consuetudinem deseruisset, nihil incommodi passus esset.*

*Illi cibi semper præferendi sunt quibus aliquis maximè delectatur, etiamsi paulo deteriores sint iis, quos aliquantulum averfatur.*

Hoc docuit Hipp. conceptis verbis *Aphorif. 38. sect. 2. in hunc modum: Paulo deterior cibus & potus, qui tamen sit suavior, melioribus quidem, sed minus suavis antefereendus. Qui enim cum voluptate cibi assumuntur, eos ventriculus avidius amplectitur, promptiusque & expeditius concoquit. Contrà, eos, qui displicent, averfatur; quo fit, ut neque avidè illos amplectatur, neque probè conficiat. Et hoc Hipp. Aphorismo multi assentatores sibi patrocinium quærunt, qui ut ægrotantibus gratificentur, omnia ab iis expetita liberaliter concedunt. Verùm ij turpiter errant, & à Gal. damnantur lib. 12. method. cap. 1. Quemadmodum, inquit, crudelis hominis officium facit, qui unà cum morbo vitam quoque homini auferi; sic qui cubantis deliciis perpetuo subscribit, ejusque voluptatem, non sanitatem pro meta gerendorum habet, adulatoris. Et 1. meth. c. 1. graviter in istos adulatores invehitur, qui frigidam exhibent, si hanc agri poposcerint: qui lavant, cum jusserint, nivem, vinumque porrigunt, quando hæc postularint, qui denique quidquid optarint, mancipiorum ritu faciunt, Contra quàm veteres illi Medici ab Æsculapio oriundi, qui tanquam duces militibus, & ut Reges subditis imperarunt; nequaquam vero Getarum, Libiorum, Phrygum, & Thracum empitiorum more, parere & obsecundare voluerunt.*

Ut igitur certa quædam mensura statuatur eorum, quæ ægris concedi possunt consulendus Hipp. 6. *Epid. sect. 4. ubi sic loquitur: Hæc sunt, in quibus gratificandum est ægris ut scilicet cibus ac potus purè conficiantur; grata sint etiam, quæ viderint, & mollia, quæ attigerint; sed non admodum ledant, & facile reparabilia sint veluti frigida exhibitio, qui est opus fuerit illà, & alia. Ubi hæc verba præcipuè notanda sunt, quæ non admodum ledant, & facile reparabilia sint: Si*

enim ea, quæ ab ægris expetuntur, satis insignem noxam inferre valeant, prorsus abdicanda.

## CAPUT IX.

### De Victu Singulis Ætatibus Congruo.

*Victus puerorum ad frigidum, & humidum inclinare debet: Et ideo vinum illis inimicum est.*

Cum puerorum corpora multo calore prædita sint, victu refrigerante opus habent. Hinc vinum illis noxium est, quia calorem auget, & præterea caput eorū multo halitu replet, quâ ratione iis interdicitur à Gal. 1. *de sanit. tuenda, cap. 9.* & Plato 2. *de legibus*, præcipit ne pueris usque ad vigesimum secundum annum vinum concedatur, quia inquit, *ignem igni addere non oportet.* Humidum verò cibum illis competere docuit Hippocr. *Aphor. 16. sect. 1. victus humidus febricitantibus convenit, maximè vero pueris.* Et ratio id ipsum suadet. Cum enim in hac ætate corpus admodum crescat & augeatur, incrementum illud exsiccantibus cibis inhibendum non est. Deinde puerorum substantia valde resolubilis est, & ideo humidis alimentis quæ citò distribuuntur, reparanda.

*Quantitas etiam ciborum major eis concedenda est, quàm reliquis ætatibus, ob caloris copiam, & corporis incrementum.* Hoc theorema ab Hippoc. sancitum est *Aphor. 16. sect. 1. Qui crescent plurimum habent calidi innati, plurimo igitur egent alimento, alioqui corpus absumitur.* Ratio *Aphor.* est, quia à multo calore in corpore molli & raro substantia illius multum absumitur, quæ plurimo alimento reparanda est.

*Puberibus & adolescentibus victus medius, cum ratione qualitatis, tum ratione quantitatis exhibendus est.*

Puberes & adolescentes moderatum habent temperamentum, ideo temperatis alimentis nutriendi sunt quæ scilicet moderatam primarum qualitatum proportionem habeant. Quantitas etiam eorum debet esse moderata, minor scilicet quàm pueritia, & major quàm aliarum ætatum.

*Juvenes, quia impensè calidi & sicci, contrario victu, id est, frigido & humido indigent.*

Licet victus iste juvenibus præscriptus, puerorum victui ratione qualitatum similis esse debeat: ratione tamen substantiæ dissimilem esse oportet. Siquidem alimenta humida pueris, actu & potentia talia præscribenda sunt, id est, liquida majori parte & forbilia, aut saltem mollia, & concoctu difficilia, ut olera, fructus, & similia, quæ à ventriculis eorum robustioribus facilius concoqui valent. Imprimis vinum iis maximè noxium est præcipuè meracum: hoc enim, ut Plato loquitur habitum eorum furiosum reddit. Et Galenus ait, eos vinum præcipitare ad iram & libidinem.

*Senibus victus calidus & humidus convenit, quia corpora eorum refrigerata & exsiccata sunt.*

Inter alimenta calefacientia & humectantia vinum senibus maximè convenit, & ideo lac senum nominari solet. Debilem enim eorum calorem fovet, vires infirmas reficit, cruditates quibus abundant, concoquit, humiditates excrementitias absumit & exsiccatur, ac per urinas evacuat, tristitiam depellit, & hilaritatē inducit. Quod à Platone eleganter traditum est 2. *de legibus*, Deus inquit, vinum hominibus, quasi auxiliare adversus senectutis austeritatem pharmacum largitus est, ut rejuvenescere videantur, & mæstitiâ nos oblivio capiat, atque ipse hominis habitus mollis è duro factus, ut ferrum igni impositum, tractabilior fiat. Cavendum tamen, ne nimia ejus copia assumatur, humidum enim primigenium citius absumeret, caput tentaret, & catarrhos excitaret. Eligendum autem est vinum potens, tenue, flagrans, sapore bono, ætate medium, colore fulvum. Crassa verò senibus non competunt, quia obstructions pariunt, alvum constringunt, urinas non provocant, sicut prædicta. Utile quoque est senibus hydromel ad vitam diutius producendam sicut,



# Cap.X. De Victu Sing. Anni Tempor. Idon. 103

sicut narrat Plinius lib. 22. *hist. nat. cap. 4.* de Pollione Romano annum centesimum excedente, qui cum ab Imperatore Augusto interrogaretur, quanam maximè ratione vigorem illum animi & corporis tandiu custodivisset, respondit, intus mulso, foris oleo. Mel crudum etiam (modò optimum sit ut Narbonense,) senibus multum convenit, cum pane in jentaculo vel cœna comestum.

*Ciborum quantitas senibus minor esse debet, quàm aliis ætatibus.*

Calor enim senum debilis est, ut magnam alimentorum copiam concoquere non valeat. Hoc docuit Hipp. *Aph. 14. sect. 1.* Senibus, inquit, parum innati calidi inest, paucis propterea fomitibus egent, quia à multis extinguuntur, sicut enim, inquit, Gal. in comment. *Lucernarum flammæ quarum oleum est alimentum, si quis id totum simul superinfundat, extinguuntur potius quàm nutriuntur; eodem modo & in senibus calidum sui fomentum quidem habet alimenta; si verò multis & confertis cumuletur, ac quodammodo stranguletur, periculum est ne extinguatur; sicuti etiam, si prava scintilla ignis lignorum multitudinem superacervet.* V. Ranch.

## CAPUT X.

### De Victu Singulis Anni Temporibus Idoneo.

*Hyeme alimenta calidiora, sicciora, & copiosiora usurpanda sunt, quàm aliis temporibus. Potus verò parcior esse debet, ac vinum paulo meracius.*

**C**alidiora & sicciora debent esse alimenta, ut frigiditati atque humiditati aëris hyberni resistatur, & pituita quæ hyemis tempore congeritur, absumatur. Copiosiora verò debent esse alimenta, quia naturalis calor hyeme maximè viget, ut docuit Hipp. (*Vid. Gal. in comm. Aph. 15. sect. 1.* *Ventres Hieme & Vere naturâ calidissimi sunt, & somni longissimi, quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda. Etenim tunc calor nativus plurimus est, unde & pluribus egent alimentis.*

Potus verò parcior esse debet, quia tunc temporis corpus humiditatibus abundat. Et vinum paulò meracius bibendum est, ut noxas à temporis frigiditate allatas, corrigere valeat. *Vere debent esse qualitate & quantitate mediocres: calidiores tamen & copiosiores, quàm æstate; minus verò quàm hyeme.*

Cum ver sit omnium temporum anni temperatissimum, idèd temperatissima requirit alimenta, & quantitate mediocria. Attamen quia ventres etiam vere sunt calidissimi, ut docuit Hipp. *Aphor. supra citato*, copia ciborum debet esse major, quàm aliis temporibus, excepta Hyeme advertendum tamen, in principio Veris, quod aliquid adhuc retinet de natura Hyemis, victum hyemali similiorem esse debere: in progressu verò sensim immutandum esse, ut ad æstatem proximè accedens, quantitate minor sit, & frigidior atque humidior reddatur.

*Æstate cibi refrigerantes atque humectantes conveniunt, & pauca eorum quantitas assumenda. Potus verò copiosior esse debet.*

Caliditas, aëre æstivo corporibus nostris indita, refrigerantibus atque humectantibus cibis ac multo potu corrigenda est. Cui rei natura ipsa incumbere videtur, quæ fructuum atque olerum copiam tunc temporis nobis suppeditare solet. Cum autem calor nativus tunc temporis debiliior sit, pauciora alimenta ingerenda sunt, ut commodius concoqui valeant.

*Autumno paulo pleniori, calidiori, ac sicciori victu utendum quàm æstate: sed in principio ab eo, qui æstati conveniens est, parum declinet: in fine verè ad hyemalem magis accedat.*

Dictum fuit antea, mutationem victus sensim esse faciendam, ut ei natura facilius assuescat, quod in Autumno, sicut aliis temporibus observandum est.

## CAPUT XI.

### De Pane.

*Panis ad corporis nutritionem & sanitatis conservationem*

*utilissimus esse debet, ex purissima tritici farina confectus, fermentatus, benè coctus, levis, oculatus mediocri sale conditus recens, sed ante 24. horas coctus.*

**P**ostquam generalia theorematum circa ciborum usum proposuimus, jam pecularia quædam, & magis necessaria, ad præcipuos & magis usitatos cibos spectantia, paucis exponere aggredimur, reliqua omittentes, quibus opus nimium excresceret, & quæ apud authores, qui de alimentorum facultatibus ex professo scripserunt, fusè exarata inveniuntur.

A pane igitur incipientes, tanquam primario nutritionis fundamêto, dicimus primum illum ex purissima tritici farina confici debere. Ex omnibus autem cerealibus, pani conficiendo idoneis, triticum maximè prævalet, cujus plurimæ species enumerantur; unicuique tamen regioni notissima est, etiam apud plebeculam, illa tritici species, quæ meliori pani conficiendo magis idonea est. Matthiolus in *Dioscoridem*, optimi tritici conditiones describit, ut ne per sit fractu contumax, densum, grave, colore aureum, lucidum, læve, trium mensium, maturum, mundum, pinguique terrâ ortu.

Ex purissima illius farina panis confici debet, quæ scilicet repurgata sit ab omni fursuracea materia, & flos farinæ sive siligo nominatur, unde panis ex ea confectus, siligineus dicitur.

Panis autem siligineus omnium maximè nutrit, quamvis ille, qui fursur habet admixtum, magis ventrem subducatur, propter vim detergendi, quæ in fursure residet. Idèd quidam, alvum strictam habentes, aliquid fursuris farinæ admiscunt, ut alvus laxior fervetur, alii secalem admiscunt, quòd cum humidius sit, alvum molliorem reddit.

Fermentatus etiam debet esse panis optimus quia pasta viscida & lenta fermenti admixtione inciditur, attenuatur, & in aëream substantiam (ut loquitur Plato in *Timæo*) quodammodo immutatur, atque in ampliore magnitudinem intumescit; unde panis fit levissimus & oculatus, quæ sunt aliæ optimi panis conditiones. Qui verò fermento caret, aut non satis habet fermenti, difficilè coquitur, stomachum gravat, validas parit obstructions. Neque obstat Celsi sententia, qui lib. 2. cap. 28. dicit, panem fermentatum corruptioni esse facillimum, non fermentatum verò minus intra corpus vitari, putredinique minus esse obnoxium: illa enim sententia, tanquam falsa & erronea, à Rhonfæo Bruyerino, Mercuriali, & Silvatico rejicitur. Excusari tamen potest, si unicum vocabulum sententiæ addatur dicendo, panem nimis fermentatum facile intus corrumpi, minime vero, qui nimis fermentatus non est. Quamvis fortè ea non fuerit authoris mens. Et profectò nescio, quomodo ab errore excusari valeat, quando, in eodè cap. mel enumerat inter ea, quæ facile corrumpuntur, cum mel incorruptibile sit, & omnia, quibus admiscetur, quantumvis corruptibilia, à putredine præservet, ut in fructibus horræis videre est, qui melle conditi putrescere non possunt. Audacter Mercurialis, summus authorum criticus, qui etiam librorum Hipp. censuram elegantem edidit, de Cornelio Celso suam sententiam profert, eum scilicet Medicum non fuisse. Propria illius verba referre lubet, quæ habentur tom. 4. *consult. medicinal. consil. 20.* ad Bernardinum Castellanum scripto, ubi sic habet: *Celsi locus de pane non fermentato semper mihi suspectus fuit, nempe quem medicinam non fecisse, ex eo conijcere licet, quod Plinius eo posterior scriptum reliquerit, n. minem Romanum usq; ad sua tempora artem medendi exercuisse, ac ob id multos errores in rebus, ad exercitationem artis spectantibus, commisisse. Etenim experientia ipsa docet, fermentum, moderate adhibitum, panem reddere leviores, ac propterea coctu faciliorem, minusque stomacho molestum, & nisi aliud posset hoc confirmare, unus omnium penè gentium mos & consensus sat esset ad ostendendum, panem fermentatum pro sanitatis usu non fermentato præstantiorem esse.*

Debet etiam panis esse benè coctus: nam si male coctus sit, ventriculum gravat, & male concoquitur: quod docuit Alex. 2. *Canone tract. 2.* dicens: panem, qui probè coctus non fuerit, plurimum quidem nutrire, sed si quis privatus, & ab exercitatione alienus, eo uti voluerit, celerrimè eum in obstructions incurrere.

Mediocri debet esse sale conditus, sal enim, quemadmodum



dum fermentum crassam viscidam illius subilandam attenuit, efficitque ut minus obstructionibus generandis obnoxius sit. Modica tamen illius quantitas esse debet, si enim falsior panis sit, nimium exsiccat.

Recenset etiam esse debet, & ante 24. horas coctus: vetus enim durus est ac siccus, difficiliter concoquitur, stomachum gravat, alvumque cohibet, attamen nimis recens, nuper è furno extractus, lentorem adhuc retinet, vehementer inflat, viscera obstruit, & si adhuc è furno caleat, empyreuma retinet, quod perturbat spiritus, & calori naturali nocet, ut loquitur Arnaldus Villanovanus lib. de iis, quæ juventutem inducunt.

*Panis medulla nutritioni aptior est, crusta verò nimium exsiccat, & humores adustos atque melancholicos procreat.*

Hoc theorema confirmatur vulgatissimo scholæ Salernitanæ versiculo:

*Non comedas crustam, cholera quia gignit adustam.*

Attamen qui ventriculum habent humidiores, ea uti possunt, modò exusta non sit. Potissimum verò in fine mensæ omnibus hominibus utile est crustæ frustum comedere; os enim veniiculi contrahit, & concoctionem adjuvat.

*Omnis repletio mala, panis pessima.*

Licet panis præ ceteris omnibus alimentis corpus optimè nutriat: si tamen nimia quantitate sumatur, insignem noxam afferre consuevit. Cum enim substantiam habeat glutinosam, cujus etiam ratione plurimum nutrit; si nimia copia sumatur, non concoquitur sufficienter, ac per consequens non satis attenuatur in ventriculo: unde fit, ut in venis mesenterii hæreat, ac graves obstructiones pariat. Hoc docuit Avicenna 3. can. lib. 1. doct. 2. cap. 7. in hunc sensum: panis impedimentum, ubi non percoquit venter, maximum censeferi debet; carnis verò non ita. In stomacho quippe residet diu, onere imprimis molesto: quod si non concoctus satis, tandem dilapsus fuerit, hepar obstruit ac mesaraicas. Caro autem majorem ducit cum humano corpore similitudinem; proinde ex ea minus provenit nocumenti, & hepatis aut mesaraicarum obstructio minor ac curationi minus obliens imbibentibus membris longè facilius carnis succum, ob cognationem quandam, quàm panis.

## CAPUT XII.

De hordeo, oriza, avena, fabis, pis, ciceribus & lentibus.

*Hordeum est in primo gradu frigidum & siccum. Cortex tamen exterior medulla interiori siccior est. Abstergendi vis est utrique, sed multò major cortici.*

*Ex eo interdum panis fit, qui frigidior est, & minus firmum ac stabile nutrimentum suppeditat.*

*Fit etiam ex eo hordeatum, ex hordeo decorticato in aqua decocto, addendo amygdalas contusas, & saccharum.*

*Coquitur etiam interdum cum frustulo colli vervecini, & colatura sumitur instar panatellæ, vel etiam interdum saccharo adjecto.*

*Hæc autem hordeata calido ac sicco temperamento præditis plurimum conferunt, tum etiam macilentos reficiunt, & ad tabem propeptos præservant, humorum acrimoniam temperando, & corpus reficiendo atque impinguando.*

**H**ic tantum proponimus esculenta, quæ in statu sano usitata sunt. Quæ enim ægrotis conveniunt, non sunt hujus loci. Ideo ptisanam antiquorum, & illius differentias, quæ apud antiquos maximo in usu erat, ad diætam ægrorum remittimus.

Oriza in primis qualitatibus temperata est, ad calidum & siccum aliquantulum declinans. Multum nutrit cum lacte, vel jure carnum decocta, ac paulo difficiliter concoquitur, crassiusque alimentum præbet. Ideo juvenibus ac laboriosis magis convenit frequens illius usus, propter substantiæ crassitiam, obstructiones parere potest. Propter incrassandi & adstringendi vim quæ prædita est iis qui sanguineis profluviiis, diarrhææ, dysentericiæ, aliisque affectibus, ex tenuium humorum saburra oriundis obnoxii sunt, plurimum conducit.

Avena non solum jumentorum, ut quidam censent, sed etiam hominum cibo intervenire sol. Ex ea enim decorticata & in aqua decocta, addendo lac amygdalarum & saccharum, op-

timum fit forculum, quod Avenatum nominatur, hordeato levius & ideo facilius concoquitur; urinas movet, ob substantiæ tenuitatem, & temperamentum ad calidum inclinans.

*Faba dupliciter usurpatur: arida, quæ à plebeiis tantum & vilioris fortune hominibus usurpatur; & virides, quæ mensis etiam delicatioribus apponuntur, tum elixæ cum jusculo, tum frigæ in sartagine.*

Quoquo modo parentur, malè concoquuntur ac distribuuntur crassos flatulentosque succos generant, ventrem inflant, spirandi difficultatem augent, alvum adstringunt, hepar, lienem, venasque mesaraicas obstruunt, vapores multos ad cerebrum transmittunt unde visum hebetant, & insomnia turbulenta inducunt, frigido & sicco temperamento prædita sunt, virides tamen humidiores.

Quamvis fabæ inter esculenta infimum locum obtineant ex iis tamen præstantissima medicamenta eliciuntur, quorum enumeratio licet hujus non sit loci, ubi alimentorum materiam tantum exponimus, lubet tamen ea extra theorematum seriem tanquam utilissima summam attingere, quæ certa ac frequenti experientiâ nobis cognita sunt.

Ac primùm ex corticibus fabarum recentibus, aqua per destillationem elicitur calculosis utilissima. Renes enim abstergit & mundificat, sicque calculorum generationem prohibet, si ejus unc. ij. vel iij. manè sumantur per intervalla. Iis qui calida renum intemperie laborant maxime convenit, quia frigida est & humida: cum omnia ferè nephritica medicamenta impense calefaciant.

Ex corticibus fabarum exsiccatis & spiritibus combustis cinis conficitur, qui in aqua parietariæ decoctus in formam lixivii, sicque ad unc. v. vel vj. mane exhibitus per aliquot dies, cum unc. j. syrupi capillorum veneris in forma julepi, contumaces gonorrhœas efficacissimè curat. Idem julepus præstantissimus est ad calculos in ureteribus hærentes, & graves dolores concitantes, confestim deturbandos. Eundem effectum præbet sal ex prædictis cineribus elicitus & Drachm. j. pondere cum aqua parietariæ exhibitus.

Exterius etiam farina fabarum utiliter admovetur in multis affectibus, præsertim in testium inflammationibus, quæ malè curatæ gonorrhœæ sæpe succedunt. Chirurgi plerique omnes, qui à stolidis ægrotantibus in morbis venereis frequentius consuluntur, quàm Medici, summam testium inflammationum duriem advertentes, cataplasmata emollientia statim admovent, unde inflammatio plurimum augetur, quandoquidem pars mollis & spongiosa, relaxantibus hisce aptior redditur ad suscipiendam fluxionem. Ideo astringentibus ac discutientibus tumores isti curandi sunt: cui usui mirabiliter conferet cataplasma confectum ex farina fabarum cocta in oxycrato, quod cataplasma sæpe mutandum est ac renovandum, quia citò exsiccat ob pinguium ingredientium defectum, quæ in omnibus aliis cataplasmatibus miscentur. Sed hæc non conveniunt, quia partem inflammant. Potest tamen addi huic cataplasmati, ut prompta illius exsiccatio prohibeatur, parum oxymelitis simplicis, quod utraque facultate, adstringendi scilicet ac discutiendi præditum est.

Pisa omnibus leguminibus præferenda sunt, & quodam modo mediæ inter euchyma & cacochyma, eueptæ & dyspeptæ, ut testatur Gal. 1. de alim. facult. c. 21. & nulla excedente qualitate prædita: atque adeo ad mediū temperamentum accedentia. Attamen frigidas & siccitas aliquantulum prædominantur, variis modis præparantur, tum viridia, tum sicca.

Facilius concoquuntur in stomacho à corticibus suis exuta quando scilicet post coctionem transcolantur, & inde puls conficitur (Puræ) nominata. Cortices enim dyspeptici sunt, cacochymi & astringentes. Sicca & iridibus præferuntur, quæ magis flatulenta sunt, & concocti difficiliora. Utraque tamen, quemadmodum & reliqua omnia legumina, melancholicis, & iis qui crassis abundant succis, aut obstructionibus laborant, noxia sunt.

Cicera crassiorè habent substantiâ, quàm pisa, & difficilioris sunt coctionis, ut intra tum extra corpus; longiori enim tempore elixanda sunt, antequam mollescant, neque optimè coquuntur in aqua puteali, sed pluviali, aut fontana tenuissima opus est.



# Cap. XIII. De Oleribus Usitatoribus, &c. 105

*Jusculum tamen eorum præstantissimum est : facultate siquidem abstergendi, aperiendi, urinas & menstrua provocandi prædita sunt : ad quos usus nigra præcipue commendantur, quæ ideo apud vulgus dicuntur medicamenta.*

Nostrates mulierculæ jusculum vulgò parant, adjicienda menstrua ex ciceribus nigris, radicibus petroselinii, & eroco, quod per triduum exhibent, instante aut incipiente illâ evacuatione.

*Lentes omnium leguminum pessimæ : frigido & sieco temperamento præditæ, distillile concoquuntur, succum melancholicum generant, obstructions pariunt, visui nocent, somnia excitant tumultuosa, capiti, nervis, & pulmonibus nocent, alvum adstringunt, mensis & urinas cohibent. Quæ omnia à crassa & adstringente earum substantia dependent. Decoctum tamen probatur in Variolis.*

## CAPUT XIII.

De Oleribus Usitatoribus, eorumque Facultatibus.

*Lactuca Galeno teste, meliorem ceteris oleribus sanguinem generat, sed paucum; frigida est & humida, somnum conciliat, lac generat, alvum emollit, ventriculi ardorem extinguit, omniumque humorum acrimoniam reprimit: biliosis, sanguineis, & jure enibus convenit, præsertim in æstate: Cruda comeditur in acetariis, tum etiam cocta in jusculis, & magis convenit iis, qui debilem habent stomachum. Crebrior illius usus oculorum claritati officit, inquit Dioscorides.*

**R**Eferunt multi (Galen. III. simpl. 13.) lactucæ succum epotum, trium aut quatuor unciarum pondere, reliquorum venenorum more interimere: attamen si tanta lactucæ copia edatur, à qua eadem succi copia elici valeat, nullam inferre noxam. Cujus eventus ratio duplex afferri potest. Prima est, quod lactuca integra diutius maneat in ventriculo, sicque frigiditas illius coctione longiori corrigatur: succus verò citius penitiora pervadat. Secunda est, quod lactuca coctione, aut salis, olei, & aceti, atque interdum sacchari admixtione corrigatur.

*Brassica, ex Galen. 3. simpl. cap. 15. duplicem habet substantiam: succulentam, & terrestrem. Illa calida est ordine primo, atque nitrosa; hæc frigida & sieca.*

*Succus nitosus est, acer, & absterforius, ideoque alvum movet. I. sum verò corpus crassum est, siccum, terrenum, astringens, ac proinde alvum supprimit.*

*Succi pars tenuior primâ ebullitione brassicæ extrahitur: ideo primum illud jusculum alvum movet; secunda verò, aut tertia ebullitio idem non præstat.*

*Paucum brassica præbet alimentum, neque probum succum generat, ut lactuca, sed vitiosum & graveolentem.*

*Pravum illius succum ostendit primum illius decoctum, quod effusum graviter olet, præcipue quod ex brassica capitata elicitur, tum etiam in hortis brassica putrefacta abominabilem spirat odorem.*

*Brassica, ante cibos ingesta, ebrietatem arcet: ac summo cibo sumpta, erupulam discutit, ac vini noxam resinguit.*

*Hæc brassicæ facultas ebrietatem arcendi, secundum quosdam ex antipathia colligitur, quæ inter eam & vitem vinumque intercedat. Vites enim minimè aut debiliter adolescere dicuntur, si in eodem solo brassicæ ferantur, sed falluntur.*

*Est verò concoctionis difficilis, & crassum melancholicumque succum generat. Halitiosa quoque est, ideoque crassis ad caput missis vaporibus mentem turbat, somnumque efficit turbulentum.*

*Quandam habet cum pulmone analogiam, ideo morbis pulmonum laborantibus illius usus minus noxius est. Brassica verò rubra inter herbas vulnerarias recensetur.*

*Pulmonum affectibus conferre brassicam ostendunt medicamenta, quæ ex iis componuntur. Pharmacopœiarum scriptores Looch. de caulibus commendant. Nos præstantissimos vidimus effectus in asthma, aliisque pul-*

*Lazar. Riverii Opera.*

*monum vitiis, ex succo caulium rubrorum cum saccharo, in julepi vel syrupi formam redacto. Ulcera verò contumacia optimè sanantur fori aquæ catapultarum vulgò dictæ, postmodum verò admovendo folium brassicæ rubræ, in eadem aqua calente madefactum. Aqua catapultarum fit ex rad. aristoloch. rotund. gentianæ, raphan. zedoar. an. unc. i. coctis in libris tribus vini albi ad medias, postea dissolvendo sacchari albi unc. iiii.*

*Beta ad brassicæ naturam accedit, illi s enim succus nitrosa qualitate præditus est; absterforia, & quodammodo acri, unde alvum stimulat; atque adeò ad calidum & siccum temperamentum vergit. Corpus verò terrestre frigidum & siccum est ventremque constipat.*

*Est rusticorum & plebeiorum edulium, unde Martialis betas fabrorum prandia nominat. Illarum autem cum brassicis similitudinem, in laxanda & constringenda alvo, propter substantiarum diversitatem, colligere possumus ex duobus versiculis, quorum prior de beta sic se habet.*

*Sicla parum nutrit, ventrem constipat, & urget.*

*Alter verò de brassica, Scholæ Salernitanæ, cap. 57.*

*Jus caulis solvit, ejus substantia stringit.*

*Spinachia refrigerat & humectat ordine ferè secundo, substantiam habet aquosam ac ferè insipidam. Ideò citò descendit, alvumque emollit: Pectus insuper expedit, asperam arteriam lenit, & tussi medetur: parum alit, multum feri producit, flatu generat, & nauseam parit, nisi aromatis conditur.*

*Endivia refrigerat, aperit, & abstergit: ideo inter olera maximi est usus, tum eruda, tum cocta. Conferit eximie calido, debili, obstructoque jecinori: stomachum debilem ac biliosum juvat, sanguinem purificat, scabiem sanat, sitim sedat, stomachi ardoribus subvenit, appetitum conciliat, ictericos juvat.*

*Cichorium easd. m vires obtinet, quas endivia, sed multò efficiaciores, propter amaritudinem, ejus ratione magis aperit, & abstergit, magisque stomacho placet, & hepatis simul.*

*Actosa frigida & sieca est in gradu secundo. Incidit, aperit, & modicè adstringit, parum nutrit, viscerum intempericem calidam emendat, sitim sedat, appetentiam excitat, bilis acrimoniam temperat, cor exhilarat, venenis resistit.*

*Borrago in activis qualitatibus temperata est, in passivis melancholico adversatur, & cor exhilarat.*

*Pertulaca frigida est tertio gradu, humida verò in secundo: parum alit, sanguinem refrigerat & incrassat, bilis acrimoniam atque fervorem temperat, sitim sedat, appetitum excitat, lumbricos interimat, visum hebetat & actus venereos infringit, quod omnibus plantis refrigerantibus commune est, si quis iis copiose utatur.*

*Petroselinum calidum & siccum est gradu secundo. Aperit, urinas movet, menses provocat, flatu discutit, ideoque colicis doloribus obnoxii plurimum confert.*

*Eruca calida & sieca est ordine tertio. Ideò sola non comeditur, sed eum lactuca aliisque herbis refrigerantibus miscetur instar correctivi. Concoctionem juvat, urinas movet, veniem stimulat largius assumpta.*

*Nasturtium cum eruca temperamento & facultatibus convenit. Aperit, attenuat, & incidit, arenulas expellit, propterea renibus & vesicæ confert. Hortense & aquaticum in acetariis usurpantur, utrumque imprimis lienosis conducit, & inter scorbutica remedia recensetur, ut nonnulli existiment, cochlearia ipsum, ac becabungæ non cedere.*

*Pimpinella refrigerat modicè, astringit & exsiccatur. Usus illius in acetariis, sapida est ac bene odorata: tum etiam cordialis est, & hilaritatem inducit; ideo etiam vino mæceratur.*

*In Medicina maximus est pimpinellæ usus, ita ut in julepis & apozematis frequenter præscribatur, præcipue in febribus malignis. Propter vim adstrictoriam ad omnes ventris fluores, & sanguinis profluvia utiliter usurpatur. Levè illius decoctum in potu ordinario usurpatum citò dysenteriam curat. Ad pulmonum ulcera sananda utiliter exhibetur aqua pimpinellæ stillataria, in qua conferva rosarum dissoluta fuerit, & colata. Eiusdem pulvis frequenter exhibitus multum confert.*

O

CAPUT



## CAPUT XIV.

## De Radicibus Esculentis.

*Rapæ & napi ejusdem sunt naturæ; moderatè calefaciunt & humectant.*

*Cum carnibus elixæ comeduntur, tum etiam in aqua simplici addendo Butyrum vel oleum, exiguum præbent alimentum, succum generant mediocriter crassum, inflationem pariunt, quia flatuosa sunt, lac & semen augent, veneris stimulos incitant; urinas movent, fauces & pulmonem leniunt, humorem melancholicum contemperant, ideo ad quartanam à Cratone commendantur.*

*Pastinaca calida est & sicca ordine secundo: crassum ac melancholicum præbet alimentum, & difficilè concoquitur.*

*Attamen diuretica est, venerem stimulat, & menstrua ciet.*

*Raphanus calidus est ordine tertio, & siccus secundo. Est tamen aliqui differentia inter illius species. Acrior enim calidior est, dulcior verò magis temperatus: paucum, & vitiosum præbet nutrimentum, & magis obsonium est quàm alimentum. Nam ut ciborum condimentum, & appetentiæ incitamentum adhiberi solet.*

*Difficilè concoquitur, flatus generat, ructus olidos parit, gravitatem capitis infert, vaporibus illud replendo: menses & urinas provocat, arenulas renum deturbat. Ac denique aperiendo, incidendo, attenuando, lienosis prodest. Verùm oculis nocet propter halitus acres & mordaces: Salnitani addunt, venenis adversari.*

*Allium calefacit & exsiccatur ferè ordine quarto; exterius enim admotum cutem exulcerat. Coctum tamen debilius est, quàm crudum: alvum & urinam movet, menses evocat, flatus parit, & oculis nocet. Ventriculi concoctionem adjuvat, quando is frigidà intemperie laborat, si aliquot bulbi integri pilularum instar manè devorentur.*

*Viscerum obstructions aperit, crassos lentosque humores incidit & abstergit, bronchia pulmonum ab eorum infarctu liberat, & vocem clariorem reddit: lumbricos enecat, & venenis resistit, unde theriaca rusticorum nominatur.*

**Q**Uærit Galen. lib. 3. de temperam. cap. 3. cur allium, cepa, & sinapi cuti impolita eam exulcerent; devorata verò interiora non erodunt? Respondet, quia concoquantur in ventriculo & aliis partibus: in eodem loco non manent, sed per partes disperguntur; & quia multis cibis & potibus, (quæ ratio præcipua est) permiscuntur.

*Cepa calefacit & exsiccatur ordine quarto. Acris enim est, atque mordax; est tamen aliqua differentia, secundum magis & minus, ut de Raphanis diximus; & inter illius differentias longa acrior est rotunda; rubrà, albà; sicca, viridi; cruda, coctà. Paucum & prævum alimentum præbet, flatulentos gignit spiritus, hinc largiori usu capitis dolores iuvehit, somnia facit turbulenta, oculis nocet, ut & gingivis, propter acrimoniam. Incidit, attenuat, aperit, & menses movet.*

Quamvis cepa prævum sit alimentum, primum tamen est medicamentum, & in multorum morborum curationibus mirabiliter conducit. Ac primum cepæ sub cineribus coctæ, tussientibus & asthmaticis profunt, cum butyro comestæ. Idem beneficium conferunt cum jussulo carniū elixæ. Calculosis plurimum conferunt mane comestæ, & aceto prius intinctæ. Aqua illarum destillata in B. M. cum saccharo, in eodem affectu miranda præstat. Si in orbiculos scindantur, & in aqua per noctem macerentur; aqua illa pueris exhibita, lumbricos potenter enecat. Exterius etiam admotæ suppressam urinam promovent. In hunc usum ex cepis concisis & in sartagine frixis, cum ol. communi, deinde additis ovis placenta conficitur, pubis regioni applicanda ad urinam retentam provocandam, vel pelliculæ earum, in sacculum conjectæ, & in vino albo decoctæ, eidem parti admoventur. Felicius operantur, si pars oleo scorpionum prius inungatur. Cepæ excavatæ & ol. amygdal. amar. repletæ ac sub cineribus coctæ, denique expressæ, ejusmodi liquorem fundunt, qui sedi illitus hæmorrhoidum fluxum promovet.

Eadem coctæ sub cineribus, & in mortario marmo-

reo cum pistillo ligneo contusæ, additâ butyri recentis æquali portione, dolores hæmorrhoidum sedant, & tumentes hæmorrhoides emolliunt, ac breviter discutunt.

*Porrum similem cum cepis habet naturam & temperiem, easdemque facultates, sed paulò debiliores. Ab Hip. commentatur, 1. de n. orb. mulier. ad juvandam conceptionem, non solum intus assumptum, sed etiam exterius admotum per fomenta, semicupia, & cataplasmata.*

Hoc præcipuè dependet à vi absterforia, quâ uterum expurgat à mucosis humoribus, qui seminis retentionem & actuationem prohibent.

## CAPUT XV.

## De Fructibus esculentis usitatoribus.

*Poma omnia refrigerant & humectant. Differunt tamen inter se variæ eorum species, secundum magis & minus. Acidiora enim frigidiora sunt, & alvum astringunt. Dulciora sunt magis temperata, & alvum laxant.*

*Cruda difficilis sunt concoctionis, coctæ verò non item: cardiaca vim obtinent, præsertim redolentia, ideo melancholicis admodum utilia.*

**P**OMORUM facultates adversus morbos melancholicos animadverti possunt ex syrupsis, qui in Officinis habentur, hujusmodi morbis destinatis, quales sunt syrupus de pomis regis. Sapor, & syrupus de pomis redolentibus. Præterea in syrupsis magistralibus, qui ad prædictos morbos præscribuntur, nunquam omittitur succus pomorum redolentium. Vis laxandi alvum ex eo dignoscitur, quod iis, qui eam adstrictam habent, poma coctæ præscribantur, per horam ante cibum usurpanda.

*Pyrorum (ut etiam de pomis dictum est) variæ sunt species, & varia temperamenta. Inspida enim frigida & humida sunt. Acida, austera, & acerba, frigida & sicca. Dulciora ad aliquem calorem inclinant. Omnia adstringendi vim obtinent: sed majorem austera & acerba, minorem dulciora, minimam insipida. Coctæ crudis utiliora sunt, & ventriculo convenientiora.*

*Cydonia terrena sunt naturæ, valdè adstringunt, refrigerant & siccam gradu secundo. Vomitum & alvi fluxum curant, cor exhilarant, eique robur addunt, venenis resistunt, & ventriculi concoctionem adjuvant, in mense sine ingesta, quia orificium illius claudunt.*

*Pruna recentia refrigerant, humectant, alvum emolliunt, & parum nutriunt. Facilè corrumpuntur, unde largiore esu febres putridas, diarrhæas, & dysenterias pariunt, præsertim si non satis matura comedantur. Ab iis abstinendum, quibus ventriculus frigidus, humidus, ac debilis est: tum etiam senibus, & multa pituita refertis. Conveniunt autem juvenibus, biliosis, & sanguineis, æstuosa maxime aëris constitutione. Siccata stomacho salubriora sunt, nec tam facilè corrumpuntur: ventrè insuper subducunt in aqua cum saccharo decoctæ.*

*Mala Persica frigida & humida sunt gradu secundo. Prævum generant succum, & facilè corruptibilem. Ideò monet Gal. 2. de alim. facult. c. 19. post alios cibos non esse comedenda. Dicit enim corrumpi in superficie natantia. Sumenda igitur ante fercula alia, sic enim fiet, ut facilè egerantur, & aliis cibis viam muniant; si enim sumpta fuerint postrema, una secum alia quoque corrumpunt. Præterea eorum qualitas corrigitur vino & sale. Quidam decoquunt supra cineres calidos, ut poma, & saccharo conspergunt, quæ correctio omnium optima est.*

Præceptum Galeni de malis Persicis, ut ante alios cibos ingerantur, omnibus fructibus convenit, qui frigidi & humidi, valdeque corruptibiles sunt. Illi enim diu retenti in ventriculo, corrumpuntur, & aliis cibis innatantes eos quoque corrumpunt.

*Mala Armeniaca, Persicorum temperiem æmulantur, sed, paulò minus humida, illa tamen bonitate superant, Galeno teste, neque tam facilè acescunt, aut corrumpuntur. Sunt enim suaviora ideo magis grata ventriculo, cujus mos est, sibi gratiora melius concoquere.*

*Cerasa cum prunis maxime conveniunt, cum ratione temperiei, tum ratione facultatum. Non levis tamen est in variis eorum speciebus differentia. Acida enim magis refrigerant*



# Cap. XV. De Fructibus Esculentis, &c. 107

runt & difficilius corrumpuntur; duleia verò magis corruptibilia sunt.

*Ficus recentes in activis qualitatibus temporata, in passivis humida sunt. Satis laudabilem succum generant, si perfectam maturitatem adeptæ sint. Si verò satis maturæ non fuerint (quod ex eo cognoscitur, cum ex arbore decerpæ lac in extremo pediculi emittunt) tunc prævum & corrosivum succum produciunt, unde febres putridæ, ac præsertim dysenteria oriuntur. Facile in ventrem descendunt, & primo cibo assumptæ, eum laxant, abstergerendi vim obtinent.*

*Ficus sicca, carica vulgò dicta, calida sunt in primo gradu; attenuandi, atque abstergerendi facultate præditæ.*

*Vires forcent, alvum subducunt, renes mundificant, frigidis pulmonum vitiis opulantur, h patis & lienis obstructions referant. Largius ingesta sitim excitant, quia æstuosæ. Sanguinem impurum, & putredini obnoxium generant; unde ex illarum usu crebro pediculorum proventus, aut scabies exoritur.*

Venenis resistere non pauci auctores referunt, & Plinius narrat, Mithridatem, Regem Ponti, alexipharmacum in parato habuisse, contra venena præsentissimum, quod ex ficibus, nucibus juglandibus, foliis rutæ, & sale confectum erat. Quintus Severus ingredientium dosim notat, dicitque componi ex foliis rutæ 20. salis grano 1. nucibus duabus & toridem ficibus.

*Uvæ inter autumnales fructus principatum obtinent, ut testatur Galen. 2. de alim. facult. cap. 9. eo quod plus nutrant quam reliqui fructus, minimumque prævi succi contineant, modo ad perfectam maturitatem pervenerint. Bene eas nutrire ostendit exemplo eorum, qui vineas custodiunt: illi enim postquam per duos menses custodia præferunt, & foliis uvæ ac ficibus pasti sunt, corpulentè admodum evadere solent. Cero tamen, quæ inde progignitur, minus firma densaque est illa, quæ ex carnibus generatur.*

Bonitas uvarum in omnibus regionibus eadem non est. Quæ enim in frigidis locis proveniunt, & perfectam maturitatem non adipiscuntur, acidæ sunt, austera, vel acerbæ, & sanitati plurimum infensæ. Contra verò, quæ in calidis regionibus adolefcunt, gratam habent dulcedinem, corpus reficiunt, & humectant egrigie. Pueris maxime conveniunt, propter magnam temperamenti analogiam: sunt enim calidæ & humidæ. Nonnullos puerulos, febre hectica laborantes, & marasmo consumptos, solo uvarum usu restitutos vidimus, quas in omnibus partibus copiosè cum pane comedebant. Sed perpetuò cavendum est, ut sint bene maturæ, & iis, qui admodum debilitati sunt, à pelilibus exuendæ, ne illæ deglutitæ stomachum gravent; incotiles enim sunt. Recenter è vite decerpæ calidiores sunt, & empyreuma retinent, à radiis solaribus impressum, si autem per biduum aut triduum asserventur, frigidiores evadunt. Uvæ pensiles inter cibos refrigerantes enumerantur.

*Uvæ passæ calidiores sunt, & æstuosæ ab Hipp. dicuntur, bili enim generandæ idoneæ sunt, quemadmodum omnia dulcia, in corporibus scilicet biliosis: nam frigida & temperata corpora bene nutriunt. Ex iis præstantiores sunt pingues, & tenui folliculo vestitæ, pleniusque nutriunt. Album laxant & abstergunt, sed paulò minus quam carica; magis tamen stomachum juvant. Pectori, retribus, & vesicæ plurimum prosunt. Scribit Galen. 2. κατὰ τόπον, uvam passam hepatis tota substantia familiarem esse.*

Hæc cum hepate familiaritas locum dedit electuario de passulis, quod & electuarium de vino appellatur, hepatis roborando convenientissimum eaque ratione ad hydropem maxime commendatur. Illius descriptio reformata habetur in *Praxi medica à nostra, cap. de hydropem*. Nos aliquot puerulos ab hydropem liberatos vidimus usu electuarii simplici parati. Coquebantur passulæ in vino albo ad consumptionem vini, & per setaceum trajiciebantur, atque iterum recoquebantur ad cydoniati consistentiam, eoque utebantur in omni pastu, interjectis aliquot purgationis specificis.

Valde usitatæ sunt in Germania, multisque aliis locis passulæ laxantes, iis qui astrictam habent alvum utilissimæ puerulis, iisque qui medicamentorum sapes ingra-

Lazar. Riverii Opera.

tos abhorrent, convenientissimæ. Harum descriptio habetur in *Pharmacopœa Augustana*, in hunc modum.

*℞. Sennæ Alexandrinæ ℥. iii. cinnamom. electi, zinziberis, ʒ. iii. aquæ endiviæ, & vini alti, an. ℥. xiv. Infundantur per hor. vi. aut viii. deinde bulliant, & lenter exprimantur: huic decocto post colaturam adde sacchari albi ℥. iii. Coquantur ferè ad consistentiam syrupi; tum injice passularum minorum repurgatar. ℥. xii. Coquantur iterum lege artis, ad justam mensuram.*

*Amygdalæ dulces moderatè calidæ sunt, & pinguem atque olcosam humiditatem habent. Attenuant, & detergunt, urinas movent, & pulmones in primis ab infarctu liberant, bronchiorumque asperitates leniunt, copiosè nutriunt; & alimentum euchymum, sed crassum præbent, genituram augent, somnum conciliant, quia halituosæ, sed difficilè concoquantur; propter substantiæ crassitiem. Infinitis penè modis præparantur ad rem cibariam à coquis, pistoribus, & dulciariis.*

*Nuclei pinei ad naturam amygdalarum maxime accedunt, sunt enim calidi & humidii, crassumque succum generant, ac difficilè concoquantur. Lac & semen augent, ac venereos stimulos irritant. Detergunt, humectant, reficiunt, & impingunt: unde tussientibus, phthisicis & tabescentibus conferunt.*

*Nuces avellanæ ad pineorum & amygdalarum temperiem accedunt, sed difficilius concoquantur, & ventriculum gravant. Largius comestæ in ventriculo cibis supernant: vomitum, flatus, capitisque dolores creant. Nephriticis conferunt ante pastum esutæ, & à calculo præservant.*

*Nuces juglandes calidæ & sicca sunt, parum nutriunt, & difficilè concoquantur, stomacho noent, bilem generant, capitis dolorem inferunt, & pulmone noxiæ sunt, lumbricos expellunt. Virides cum saccharo conditæ, cortice priori detracto stomachum & corroborant. Sicca venenis resistunt; ut in sicum explicatione de Antidoto Mithridatis dictum est.*

Præcipit schola Salernitana, post pisces nuces esse comedendas: cujus præcepti ratio est, quia pisces frigidi sunt & humidii, phlegma generant, facilè corrumpuntur & putrescunt, præsertim in debili, frigido, humidoque stomacho. Nonnulli etiam, præsertim ii, qui in cœnosis stagnantibusque aquis habitant, maligni aliquid habent. At nuces aridæ calefaciunt & exsiccant, putredinem arcent, & malignitati resistunt.

*Castanæ in activis qualitatibus temperatæ sunt, ad calidum vergentes, in passivis verò sicca. Satis copiosum præbent nutrimentum, sed difficilè concoquantur, succum produciunt crassum, flatus excitant, alvum astringunt. Elixæ cum feniculo minus flatuosæ sunt quam assæ, quæ illico stomachum instant; variis tamen modis corrigi possunt, quod ex culinis petendum est.*

*Melones frigidi & humidii sunt, sitim sedant, urinas movent, facillimè corrumpuntur, & corrupti naturam veneni induunt, unde cholera morbus, aut febris maligna excitari solet.*

Eorum noxa aliquatenus evitatur, si multo sale corrigantur, in prima mensa modica quantitate sumantur, ut melius concoquantur, & facilius ad intestina descendant, si merum superbibatur, & cibi euchymi postmodum ingerantur.

Quidam volunt vinum post melonum esum assumptum magis nocere, quod prævi succum illorum citius deferat ad penitiora corporis, ubi noxam graviores inferre solet. Verum id quidem locum habere potest, si vinum debile, aquosum, & minus potens, vel in nimis exigua quantitate bibatur; sed si generosum, & satis copiosè sumptum, omnem melonum noxam corrigit, & bona fit illorum concoctio, ubi postmodum eorum succus ad venas translatus suam militiam deposuerit.

*Cucumeres sunt frigidi & humidii fere in tertio gradu: prævi succum corpori suppeditant, ac facilè putrescibilem, unde febribus malignis, diarrhææ, ac dysenteria materiam suppeditare possunt.*

*Cucurbita frigida & humida est in gradu secundo. Parum alit, succum gignit improbum, cucumeribus tamen salubriorem, & in jussulis, commode æstuantie cœlo usurpatur: refrigerat enim, & humectat, bilisque fervorem contemperat.*



*Articoca, quam Gal. Cynaram, recentiores scolymum vocant, calida est in gradu secundo. sicca in primo. Flatus generat, venerem stimulat, caput gravat. Hanc Gal. vocat edulium cacochymum, præsertim cum plusculum obduruit. Tunc enim habet succum biliosum in copia maiori, totamque substantiam lignosorem: adeo ut ex hac quidem succus gignatur melancholicus, ex ipso verò succo tenuis ac biliosus.*

## CAPUT XVI.

De cibis, qui ex Animalibus petuntur; ac primum de carnibus in genere.

*Carnes animalium plurimum inter se differunt, non solum ratione diversarum specierum, sed etiam in una & eadem specie, ratione ætatis, regionis, pabuli, habitus, castrationis, sexus, præparationis.*

*Juniorum animalium caro, & præsertim recentiorum genitorum mucosa est, mollis, humida, & excrementis referta, eorum maximè, quæ natura sunt humidiora: facilius tamen concoquitur, & alvum fluidum reddit.*

*Vetustorum autem ralius caro, dura est, sicca, nervosa, concoctu difficilis, paucique ac pravi alimenti.*

*Eorum verò animalium caro, quæ in media ætate sunt constituta, medio modo se habet.*

*Quæ humida & palustria incolunt loca, carnes habent humidiores, & superfluitatibus plenas: Quæ sicca & montosa, excrementis vacuas, concoctu faciliores, & ad nutriendum aptiores.*

*Animalia sylvestria carnes sicciores & magis excrementis vacuas largiuntur domesticis & urbanis, quæ carnes habent humidiores, magisque excrementitias.*

*Carnes macilentæ & extenuatæ duræ sunt ac siccæ, concoctu difficiles, & parum nutrientes: pingues verò & obesæ præhumidæ sunt, & ventriculo iunctæ, nauseamque parientes, si pinguedo admodum excesserit. Si verò medio modo se habeant, hoc est, neque macriores, neque pinguiore, substantiæ bonitate & saporis suavitate reliquis sunt præferendæ.*

*Animalia, quæ in locis nutriuntur optimis pascuis refertis, sapidiora sunt, & melius nutrientia. Sic verveci in dumetis nostris, thymo, lavendula, roremarino, aliisque plantis aromaticis refertis enutriti, longè suaviorem carnem habent iis, qui in montibus, hisce plantis destituti, aluntur. Sic etiam perdices montanæ nostratibus insipidiore sunt.*

*Castratorum animalium carnes teneriores, sapidiores, & concoctu faciliores sunt, ut in vervecibus, bobus, suibus, & caponibus apparet.*

*Masculorum carnes laudabiliores sunt carnibus fœminarum: quandoquidem mares calidiores sunt, & sicciores, laboriosiores, & excrementis minùs onerati, ut in pecore bovino & ovillo conspicuum est.*

*Assæ verò sicciores, quia humiditas & pinguedo igne absumpta est. Frixæ etiam sicciores & aciores. Sale & aromatibus conditæ calidiores & sicciores.*

**C**irca carnes assas & elixas est dubitatio, quæ elicitur ex Aristot. prob. 54. sect. 1. ubi asserit, carnes assas esse humidiores elixis, quod theoremati proposito, & sensibus ipsius repugnare videtur. Solvitur tamen dicendo carnes assas esse humidiores humiditate propria & congenita; elixas verò humiditate adventitia, quæ ab ipsis imbibitur, dum in aqua decoquuntur; assæ verò sicciores esse elixas ratione humiditatis propriæ, quæ in iusculum extrahitur, unde fit ut minùs nutrant, quàm assæ, si seorsum, & sine iusculo sumantur.

Carnes elixæ magis competunt iis, qui sunt adhuc in incremento corporis, qui sicco sunt temperamento præditi, & qui calidis siccisque laborant ægritudinibus, idque magis in regionibus & anni temporibus calidis & siccis. Assæ verò magis conveniunt iis, qui frigido & humido temperamento

præditi sunt, quibus alvus fluida est, & qui morbis frigidis & humidis obnoxii sunt.

## CAPUT XVII.

De Carnibus Quadrupedum.

*Caro vervecina in nostris (Gallia) regionibus omnium præstantissima, & usitatissima est, omni ætati, complexionis, & tempori convenientissima. Temperata est, aut saltem moderatè calida & humida. Optima tum assa, tum elixa, quæ ex vervecibus anniculis aut bimulis, mediocriter pinguibus, puro in aëre, & bonæ notæ pascuis enutritis provenit.*

*Caro ovilla mali succi est, & excrementitii; difficile concoquitur ob substantiam viscidam ac lentam, & partus frequentiam.*

*Agnina caro valde humida est, mucosa & pituitosa, & ob hanc causam declinanda, Galeni iudicio lib. de victu attenuante, cap. 8. Quod tamen de agnis recens natis intelligendum, non verò de adultioribus, qui optimum præbent alimentum, & facile concoquuntur. Hinc caro eorum convenientissima est iis, qui naturæ sunt delicatioris ac debiliore, & qui parum exercentur. Præterea distinguendæ sunt regionibus, in quibus adolefcunt. Lutetia enim caro agnina magno est in pretio, & hædina longè præfertur. Apud nos verò hædina agnina præferri consuevit.*

*Caro hædina carnem habet humidam, sed minùs agnina. Ideo præfertur saltem apud nos; moderatè nutrit, sanguinem gignit tenuem & humidum, alvum emollit, & melior est assa quàm elixa, sicut & agnina.*

*Caro bovina calida est & humida, absolute considerata, quia omnis caro tale habet temperamentum, utpote ex sanguine calido & humido genita. Comparatè tamen, respectu aliorum animalium, sicca est ac dura, concoctu difficilis, & alvum sistens. Sanguinem procreat sicciorum & melancholicum; firmum tamen præbet alimentum, si bene concoquatur; ideò robustioribus corporibus, & valido exercitio utentibus utilis.*

*Vitulina caro in activis temperata est, in passivis humida, boni succi, concoctu facilis, sanis atque ægrotantibus conveniens. Magis tamen competit iis, qui in otio & deliciis vivunt, quique molliore ac delicatioris sunt constitutionis, quàm bæjulis, nautis, fessoribus, & aliis, qui duos subeunt labores, quibus bubula caro est convenientior.*

*Suilla caro in activis temperata est, in passivis humida. Galenus humanæ carni similem esse asserit, & si bene coquatur, omnium ciborum potentissime nutrire. Crassum & lentum habet succum, & ideò nutrimentum præbet firmum ac durable, quod dissipari facile nequit.*

*Porcellorum caro præhumida est & mucosa, plurimumque gignit pituita; magis excrementosa, quàm suilla, quia humidior: minùs autem nutrit. Alimentum, quod præbet, facile quidem ob tenuitatem substantiæ distribuitur; sed promptè discutitur.*

*Leporina caro sicca est, dura & crassa, sanguinisque melancholici parens. Quod de vetusto animali audiendum; siquidem lepusculorum caro delicatissima est, & inter conviviorum lautitias cum perdicibus equiparatur. Laudantur verò bimestres, trimestres, & quadrimestres.*

*Cuniculorum caro ad leporinam proximè accedit: in eo tamen distinguuntur, quod cuniculi mediæ ætatis reliquis præstantiores sunt. Vetusti autem duriores, siccioresque: juniores verò, & nuper in lucem editi mucosiores. Sylvestres altilibus præferuntur, utpote minùs excrementosi, minùsque humidi. Altilis, qui domi educantur, pinguiore quidem, corpulentioresque sunt, at sapore & salubritate sylvestribus longè inferiores. Illud pabulum sapiunt, quo nutriti fuerunt, atque adeò, si brassicis alantur, (ut sæpe fit) abominabilem saporem habent.*



# Cap. XVIII. De Interaneis, & Extremit. &c. 109

*habent. Si verò triticum tantum comedunt, valde impinguantur, & delicatissimum præbent edulium; quod in Apiciorum gratiam sit dictum. Sylvestres, qui in dumetis nostris, thymo, lavendula, origano, aliisque herbis aromaticis nutriuntur, sapidissimum & saluberrimum alimentum præbent.*

## CAPUT XVIII.

### De Interaneis, & Extremitatibus Animalium.

*Hepatis substantia genericè considerata, crassum præbet alimentum, concoctu difficile, gignendisque obstructionibus idoneum: magna tamen differentia reperitur ratione animalium, à quibus desumitur: siquidem hepar gallinarum, caponum, anserum, pipionum, & pullorum gallinaceorum præstantissimum est. Ideò prior sententia de quadrupedum hepate audienda est: inter quæ hædi, vituli, & sues satis laudabilis succi jecinora exhibent.*

*Lien prævum alimentum suppeditat, & melancholicum succum producit, difficile concoquitur, & tarde distribuitur. Renes difficile concoquantur, ob substantiæ soliditatem qua præditi sunt, succum parium crassum & malum, propter varios & excrementitios humores, qui eos continuo pervadunt.*

*Cor fibrosam carnem obtinet, solidam, & duram; atque adeo difficile concoquitur, tardè distribuitur, & crassum succum producit. Si tamen bene concoquatur, non paucum corpori alimentum præbet, neque id mali succi.*

*Pulmo, hepate, ac liene concoctu facilior est, quia utroque rarior & mollior; longe tamen hepate, quoad alendum, inferior.*

*Glandulæ omnes hoc commune habent, ut suaves in cibo & teneræ ac friabiles appareant. Crassum dant alimentum, & si bene animal habitum sit, multum ac boni succi: & prode in ventriculo concocta non minùs nutriunt, quàm carnes musculosæ. Minùs verè quàm par sit digestæ succum pituitosum & crudum generant. Hæc de glandulis mammarum præcipuè audienda. Ex aliis verò glandulis molliores sanguinem pituitosum generant, duriores vero crudum.*

*Lingua vitulina, hædina, agnina, suilla, & vervecina concoctu facilis est, & laudabilem succum generat; bovina paulò crassior, sed nutritioni satis idonea: modò sale non condiatur, nec fumo indurcitur.*

*Cerebrum cibum præbet phlegmaticum, crassi succi, concoctu difficilem, crassum & tardè permeabilem. Appetitum prosternit, & nauseam parit.*

*Pinguedo & adeps pauci sunt nutrimenti, & potiùs carniū nos nutrientium condimenta, quàm alimenta. Ventriculi tunicas laxant, ejusque tonum dissolvunt, ac propterea nauseam pariunt, & appetentiam deiciunt. In biliosis corporibus facile in bile vertuntur, difficillimè concoquuntur.*

*Ventriculi substantia membranosa est, atque adeò frigida & sicca, dura & glutinosa. Difficile concoquitur, pituitam generat, obstructiones parit, multorumque morborum causa esse potest, mollibus & otiosis hominibus vitanda, & bajulis, fossoribus, nautis, & similis naturæ hominibus tantum exhibenda.*

*Intestinorum eadem est ratio, siquidem eorum similis est natura. Juniorum tamen animalium, ut agnorum, & hædorum intestina molliorem habent substantiam, & facilius concoquuntur.*

*Pedes, aliæque extremitates quadrupedum, ex membranis, ligamentis, tendinibus, venis, arteriis, & cartilaginibus compositæ, frigida sunt, & sicca, lentæ, viscosæ, pauci nutrimenti, & difficilis concoctionis; juniorum tamen & lactantium animalium extremitates excipimus, ut de ventriculo & intestinis annotatum est.*

## CAPUT XIX.

### De Alimentis quæ in Quadrupedum partibus continentur.

*Sanguis calidus est & humidus, concoctu difficilis, & plurima*

*excrementa generans. Licet enim dum in venis continetur, facile in substantiam corporis nostri convertatur, tamen postquam ab iis eductus est, calorem atque spiritus amisit, concrevit, & in pravam substantiam degenerat. Medulla calida est & humida; optimè nutrit si bene concoquatur. Nimia quantitate assumpta stomachum relaxat, & nauseam parit.*

*Lac integrum in activis qualitatibus temperatum est, ad frigidum aliquantulum vergens; in passivis verò humidum, ratione pinguis & aquosæ substantiæ; emplastrum & incrassans, ratione caseosæ: abstersorium, ratione frose; contemperatorium seu mitigatorium, ratione butyrosæ.*

*Optimi electio est, ut sit candidum, clarum, purum atque sincerum, dulce, omnisque amaritudinis, acrimoniæ, aciditatis & salsedinis expers, odore suaveolens, aut saltem boni odoris exiguum quid spirans: consistentia moderatum, hoc est, neque nimis crassum & caseosum, neque nimis tenue & serosum, sibi ipsi continuum, & ungui infillatum coherens, & non diffuens, recens multum, & ab animali bene pasto & habito petuum.*

*Lac optimum prædictis conditionibus stipatum, omnium ferè alimendorum est præstantissimum, facile concoquitur, & levi negotio vertitur in sanguinem, sufficienter alit, corpus roborat, atque impingat, alvum emollit, sed stomachum & intestina inflat. Quæ omnia locum habent in corpore temperato, & superfluitatibus vacuo; nam in ventriculo pituitoso acescit, in bilioso nidorem contrahit. Corrigitur sale, vitello ovi, saccharo, aut melle. Lac verò vitiosum nocentissimum est, & tantum abest, ut ad succum laudabilem generandum conferat, ut etiam corpora fumentium cacochymia reddat.*

**P**RAVOS vitiosi lactis effectus ostendit Galenus lib. 3. de aliment. fac. cap. 15. exemplo nutricum, quæ ob auronæ caritatem usæ sunt sylvestribus oleribus; pueri enim, earum lac fugentes, pravis ulceribus aliisque affectibus inficiuntur. Item exemplo caprarum, scammonio aut tithymalo pastarum, quarum lac catharticum est.

Incr lactis differentias, ad sanorum alimoniam magis usitatas, vaccinum omnium crassissimum & pinguisimum est; nam caseosæ substantiæ habet plurimum, serosæ verò, si cum aliis comparetur, minimum. Hinc alvum minus subducit, magis autem nutrit. Difficilius concoquitur, citius in ventriculo coagulatur, tardius descendit, difficilius distribuitur, & obstructionibus generandis magis est idoneum. Caprinum mediæ est consistentiæ, quemadmodum & ovillum, quod tamen caprillo crassius est, plus enim casei habet, minus verò feri: idcirco minùs deiecit, & valentius nutrit. Asininum omnium tenuissimum & maximè serosum est. Verum illius usus ad Therapeuticè magis, quàm ad Hygienè spectat.

Butyrum calidum & humidum est gradu primo, & ejusdem ferè naturæ cum oleo olivarum maturarum, teste Avicenna. Magis tamen humidum, quàm calidum. Ventum calidius est atque tenuius temperatum in activis. Nutrit, impingat, ventrem laxat, tussis obnoxius confert. Nimius illius ejus ventriculi tonum dissolvit, nauseam parit, appetitum aufert. Proinde iis vitandus, qui humidioris laxiorisque habent ventriculum. Vitandus & calidioris complexionis hominibus, in quibus facile accenditur, & in bilem mutatur. Apponendum est prima mensa, citius enim ex it. cibisque ingestis quasi viam sternit. Si autem post alios sumatur, ventriculum relaxat, & in completendo cibo, constringendoque officio superiori, eum impedit.

Cremor lactis butyro similis est, & cum eo viribus ac qualitatibus maximè convenit. In eo differunt, quòd butyrum arte extrahatur, cremor verò spontè supernat. Lac bubulum præsertim eo maximè abundat. Ob pinguedinis copiam ventriculū relaxat, supernatat, alimenta assumpta ejicit, priusquam concoquantur, vapores mittit ad caput, succum generat crassum.

Recocta est substantia recenti caseo similis, ex serosa lactis parte per ebullitionem extracta. Minus stomacho nocet, quàm caseus recens pressus. Calidis confert defluxionibus, suum



sedat, omnemque conciliat: sed frigido ventriculo & nervorum morbis obest. Vetus & indurata difficile concoquitur, suum parit, parum nutrit, alvum sistit, flatum generat.

Caseus omnis eandem non habet naturam & temperiem, sed pro diversitate animalium ex quibus desumitur, & pro sui ipsius casei ætate, odore, sapore, aliisque circumstantiis plurimum variat.

Caseus vaccinus multum alit, sed difficile concoquitur. Ovillus minus crassam habet substantiam, & facilius concoquitur, parcius alit vaccino, sed melius alimentum præbet. Caprinus utroque est deterior, sed ob acrimoniam facilius dejectur.

Antiquus calidus est, propter acrimoniam, & aliquando putredinem quam contrahit, vel propter coaguli, & salis, dum paratur, admixtionem. Et quo antiquior, eo acrior, ac per consequens calidior & siccior, adeo ut Avicenna talem gradu tertio calidi, & sicci, pronuntiet. Hinc ob caliditatem & siccitatem concoctu difficilior, & calculo gignendo aptissimus, præsertim si sit plus æquo salis. Vitandus igitur est, cum docente Galeno, Dioscoride, & Avicenna, male concoquatur & distribuatur, siccum & prævum alimentum generet, alvum confringat, & in atram bilem vertatur. In pauca tamen quantitate sumptus, præsumptorum alimentorum, præcipue carnis concoctionem iuvat, quanquam ipse difficilius concoquatur.

Recens, qui adhuc mollis & nuper coagulatus est, frigidus & humidus est, duro & sicco statuosior, propter humiditatem; minus tamen siticulosus, minusque ventrem sistit, bene nutrit & impinguat, stomacho utilis, facile in membra distribuitur, non tam crassus, aut pravi succi, ut antiquus. Attamen concoctu difficilis est, calculum, obstructions, aliosque affectus producit.

Puridus, aut fetidus omnium pessimus est: qui verò bonum spirat odorem, salubrior. Acer & salsus, calidus est & siccus, siticulosus, & cacochymus. Acidus, cacochymus & frigidus est. Dulcis & pinguis, modicè calidus, magis nutritivus, & succi melioris.

Caseus pinguis & butyrosus, cui nihil aut parum butyri ademptum est, melior est: macer verò, & oculatus, omni ferè butyro privatus, longe deterior.

## CAPUT XX.

### De Cibis ex Volatilibus desumptis.

Gallarum caro in activis temperata est, in passivis humida: concoctu facilis, boni succi, & multum nutritivus. Scribit Avicenna, eam augere intellectum & ingenium, clarificare vocem, & seminis copiam generare. Quæ omnia de juvenibus, mediocriter obesis, & quæ nondum pepererunt audienda sunt; annosæ enim, upotè duræ & nervosæ, macræ glorientes, & incubantes, damnantur.

Caponum & pullorum gallinaceorum caro, ejusdem est naturæ & temperiei, cum carne gallinarum juniorum: hac tantum differentia, quod pulli, tenuiorem substantiam habentes, minus alant, & minus solidam substantiam præbeant, ideo corporibus multum laborantibus minus aptam.

Pulli columbini inter laudatissima reponuntur alimenta, optimè concoquuntur, succum generant neque crassum, neque tenue, sed inter hunc medium.

Galli Indici caponibus & gallinis non cedunt, si juniores sint, & ante aliquot dies jugulati. Si enim veterani sint, aut recenter mactati, carnem habent duriores, & concoctu difficilem.

Anserum caro calida est, humida, crassa, concoctu difficilis, & excrementitia. Quo autem sunt annosiores anseres, eo sicciores, duriores, & ad alendum ineptiores, viscera obstruunt & prævum succum generant. Qui verò ætatis sunt mediæ, & bene loginati, meliores ac teneriores sunt, unde in multis regionibus inter cupedias habentur.

Pulli juniores insalubres sunt, quia nullo & excrementitia carne referti.

Perdices inter alios principatum obtinent, sine illis sumptuosæ convivia gratiam & splendorem amittunt, carnem habent sapidissimam, præsertim juniores, cum aliquandiu in aëre fuerint suspensæ; bonum ac laudabilem generant sanguinem, eumque copiosum & excrementis vacuum: memoriam augent, semen multiplicant; ventris stimulos excitant. Cardanus asserit, continuo perdicum usum lucem & venream curari, quandoquidem ab iis massa sanguinea & totum corpus renovantur.

Palumbi, turtures, coturnices, turdi, metula, alaudæ, & reliquæ montanæ aviculæ, secundum à perdicibus locum obtinent: optimum succum generant, bene nutriunt, & excrementorum paucissimam copiam obtinent.

**D**E Coturnice est controversia, siquidem Galenus, Plinius, & Avicenna referunt, eos qui coturnicibus iniquenter aluntur, spasmo esse obnoxios. Cujus rei causam desumit Galenus ex veratro seu helleboro, quo coturnices pasci consueverunt. Avicenna addit, substantiæ illarum quandam inesse facultatem occultam, quæ spasmus inducere possit. Contrà ab aliis improbat hæc sententia, quorum antesignanus est Averroes, asserens coturnicum carnem esse saluberrimam & optimam, ac laudabilem sanguinem generare. Quod rationi maxime consentaneum est. Paucissimæ enim sunt regiones, in quibus helleborus adolescat: sed paulim vescuntur coturnices optimis herbis & cerealibus. Neque experientia docet, eos qui coturnices conedunt, obnoxios esse epilepsiæ. Adde quod singulari Dei beneficio, Israëlitis olim in deserto concessæ sunt, quod factum non fuisset, nisi optimum præberent alimentum. Etiam si enim Israëlitis graves morbi inde exorti sunt, hoc ex abusu illius cibi provenisse constat, quo se plurimum ingurgitabant, ut sufficienter eum concoquere non possent. Hinc cruditates & putredines maximæ exortæ sunt.

De quadrupedum & volatilium carnibus hoc theorema universale annotandum est: illas plurimum inter se differre, ratione ætatis, modi præparationis, & loci in quo habitant. Siquidem juniorum, adhuc augeſcentium caro longè præstantior est ætate proveſtorum & declinantium. Eorum verò, quæ in ætate florenti constitutæ sunt, mediam naturam obtinet. At recentiorum caro prava est, quia mucosa, humida, & excrementis plena.

Assa & in sartagine frixa, siccior est: elixa verò humidior. Animalium, quæ in stagnis, paludibus, & locis humidis vivunt, carnes humidae & excrementitiae sunt, ac concoctu difficiles: quæ verò in montibus, dumetis, & locis siccis degunt, carnes habent sicciores, concoctu faciliores, & excrementis vacuas.

Ova ex variis animalibus petuntur: at sola gallinacea in usum quotidianum veniunt. Ex duplici substantia constata sunt, temperie diversi prædita, vitello scilicet & albumine. Vitellus moderatè calidus est & humidus, optimum præbet alimentum, sanguini maxime vicinus est; in eumque levissima coctione convertitur: unde vulgò dicitur, tantum gignere sanguinis, quantum habet ponderis, atque adeo excrementis vacuus est. Albumen verò frigidum est ac moderatè siccum, Galeno teste.

Ova optima eligenda sunt quæ candida, longa, nova: nam recentia ejusdem diei aurea dicuntur, duorum dierum, argentea, trium verò ferrea.

Ova tremula dicuntur, quæ in aqua modicè elixantur, eatenus ut in manu detenta tremere videantur. Ad corporis alimoniam omnium sunt accommodatissima, Galeno teste, & magis alunt quam sorbilia.

Ova sorbilia, quæ in aqua cum putamine eò usque elixa sunt, ut sorberi valeant, minus nutriunt quàm tremula, ut dictum est, propter substantiæ tenuitatem. Facilius autem subducuntur, ac probe alvum emolliunt, præsertim manè jejuno stomacho sumpta: vocem reddunt claram, tussim sedant, parum faciunt & venenis in peste adversantur. Illa, ut & tremula, convalescentibus, senibus, infantibus, phthificis, & hæmorrhagia, aliaque insigni evacuatione debilitatis plurimum conferunt.



Ova longiori elixatione indurata difficilè concoquuntur, succum crassum generant, & alvum constipant. Assa sub cineribus magis constipant, succique peioris sunt, crassiorisque: vim enim ignis patiuntur majorem, & plus nativæ humiditatis amittunt, quam elixatione indurata.

Ova frigida omnium pessima sunt, agrè concoquuntur, lente permeant, prævum crassumque succum gignunt, & humores sibi admixtos in corruptelam perducunt. Quod tamen intelligendum est de ovīs ad integram duritiem frixis.

Placentæ ex ovīs, paratæ in sartagine, cum butyri satis bona quantitate, & ad mollem adhuc consistentiam coctæ, saluberrimæ sunt. Idem dicendum est de ovīs suffocatis, quæ scilicet conquassata, in patina concoquuntur ad mediocrem consistentiam, cum butyro vel lacte, saccharo postmodum adjecto. Illa enim facilè concoquuntur, probè nutriunt.

## CAPUT XXI.

### De Piscibus.

Pisces in genere, frigido & humido temperamento præditi sunt. alii tamen plus alii minùs. Quoad substantiam tiam plurimum variant, ut alii concoctu faciles sint, ac succum laudabilem generent; alii verò difficilè concoquantur, & magnum faciant excrementorum proventum.

Pisces qui in limosis, sordidis, graviterque olentibus aquis degunt, insaluberrimi sunt. Improbantur etiam qui in paludibus, stagnis, fluminibus parvis atque stagnantibus, aut cænosis & turbidis, aut magnarum civitatum, quas perflunt excrementis, & sordibus inquinatis versantur.

Maximè probantur pisces saxatiles, qui in saxosis aquis seu limpidissimis delitescunt. Facilè enim concoquuntur, & mediæ consistentiæ sanguinem, hoc est, neque nimis tenuem, neque nimis crassum producant.

Squammosi pisces, & carnem teneram atque friabilem habentes, salubriores sunt iis, qui squammis carent. Illi enim substantiam habent sicciorē: hi verò lentam, glutinosam, & humidiorem.

Pisces in alto mari degentes, meliores sunt, quia ab undis agitantur, motuque continuo sicciores redduntur. Littorales his cedunt, quia mare in litore minùs agitur, estque ibi impurius.

EX generalibus hisce theorematis facilè erit singularem piscium specierum naturam, salubritatem, aut insalubritatem distinguere, ut in singulis enumerandis tempus infumere non sit opus.

## CAPUT XXII.

### De Condimentis.

Cinnamomum calidum est ordine tertio, siccum secundo: Urinas movet, menses provocat, visum acuit, attenuat, incidit, digerit, concoctionem juvat, flatum discutit, partesque corroborat, leviter astringit.

Caryophylli sunt calidi & sicci ordine tertio, cerebro, cordi, ventriculo, & utero appropriati. Cerebrum roborant, materiam distillationum absumunt, mentem erigunt, memoriam firman, frigidam humidamque cerebri intemperiem corrigunt, morbis ex ea oriundis medentur, spiritus vitales reficiunt, syncopen arcant, ventriculi concoctionem promoven, nauseam tollunt, flatum discutunt, uterum recreant, illius affectus leniunt, visum acunt, & venerem stimulant.

Zinziber calidum est ordine tertio, & humidum primo: facile cariem contrahit propter humiditatem. Ventriculum roborat, flatum discutit, inappetentiam à frigidis humoribus oriundam curat.

Piper calidum & siccum est ordine tertio. Longum minùs habet siccitatis, quo fit, ut cariosum evadat. Album acius

& calidius est nigro. Ventriculi concoctionem juvat, appetentiam movet, flatum discutit, tussi & pectoris vitium medetur, partum adjuvat, & oculorum caliginem discutit. Nux moschata calefacit & siccet gradu secundo, astringit & propterea ventriculum roborat, flatum discutit, oris balium emendat, alvi fluxum cohibet, frigidis cerebri, nervorum, & uteri affectibus medetur.

Crocus calefacit gradu secundo, siccet primo, leniterque astringit, concoctionem adjuvat, urinam movet, venerem stimulat, vim habet cardiacam, venenis inimicam, putredini adversam. Tussiculis, asthmaticis, phthisicis & pleuriticis mirabiliter subvenit: unde anima pulmonum appellatur. Eleganter, inquit Dioscorides, faciei colorem præstat, obstructa viscera aperiendo, & concoctionem ventriculi promovendo, si moderate usurpetur.

Menses etiam retentos, fætum, & secundinas potenter educit. Nimio verò usu aut assiduâ odoris inspiratione, caput lædit: id enim replet, mentemque perturbat, spiritus attenuat, dissolvit, ut in magna quantitate sumptus mortem inferre valeat.

Mulierem novimus, quæ ad provocanda menstrua meam croci quantitatem sumplerat, quam ei seplasiarius quinque assibus dederat. Inde tanto impetu menses prorupere, ut intra triduum è vivis sublata fuerit.

Ad pulmonis affectus tam efficax esse remedium scribit Dodonæus, ut subinde phthisicis, in summo vitæ discrimine & animam propè agentibus, spiritum reducat, vitamque ad dies aliquot proroget, scrupuli din idii, aut ad summam scrupuli unius pondere, cum passio aliave dulci vino exhibitus. Eodem modo oblatum affert gravissimas dyspnœas subito citra febrem irruentes, momento temporis, auferre idque non semel fuisse observatum.

Bellarium sinapis, quam mostardam vulgo vocant, quasi mustum ardens, frigidam & humidam ventriculi intemperiem corrigit, pituitam illius parietibus hærentem, detergit, concoctionem adjuvat, & dejectam appetentiam excitat.

Sal calidum est ordine secundo, & siccum tertio. Abstergit, digerit, astringit, condensat. putredinem arcet, torpentem appetitum excitat, ventriculi concoctionem adjuvat, alvum si bducit, & omnibus edulis gratum saporem conciliat. Nimia quantitate usurpatum, calculum gignit, pruritus parit, scabiem inducit, impetiginem accersit, scorbutum generat, quod nationes salsis tum piscibus, tum carnibus quotidie utentes experiuntur. Aciem oculorum obtundit; genituram minuit, biliosis, & melancholicis nocet.

Cibi sale conditi frequentius assumpti easdem noxas inferunt: præterea duriores & concoctu difficiliores redduntur, quia nativæ eorum humiditas absumitur, unde substantia eorum condensatur & induratur, quo nomine coctioni fit rebellior.

Oleum recens & dulce, ex maturis olivis expressum, modicè calidum est & humidum: Emollit, laxat, unit, acrimoniam omnem contemperat, lumbricos enecat, & venenis resistit.

Saccharum calidum & siccum est in gradu primo, putredinem arcet, abstergit, & idcirco stomachum juvat, quia detergendo illius phlogma cluit. Attamen si stomachus bile inquinatus fuerit, nocet, quia in bilem convertitur: Renibus & vesicæ confert; arenulas, & mucosam pituitam abstergendo: pelvis lenit & mundificat, alvum laxat, optimè nutrit: verum nimio usu obstructions generat, ut alia dulcia, quia promptè rapiuntur ab hepate, sicque alia edulia admixta nondum satis concocta attrahuntur. Dentibus est inimicum, quos denigrat, & ad cariem perducit, idcirco post illius esum os colluendum.

## CAPUT XXIII.

### De Melle.

Mel calidum & siccum est gradu secundo; est tamen quadam differentia ratione locorum, ex quibus mel ab apibus colligitur. Calidius enim & siccus est quod in locis provenit calidioribus, thymo, lavendula, roremarino, aliisque



que herbis aromaticis refertis : in regionibus verò frigidis, hujusmodi herbis destitutis, minus calidum est. In genere flavum calidius sicciusque est albo : & sensus ostendunt, aliud alio esse odoratius & acrius, atque adeò viribus & qualitatibus potentius. Abstergit, alvum movet, urinam provocat, tussi medetur, putredini mirum in modum adversatur, & fructus horæ maximè corruptiles, si cum melle aut saccharo condiantur, incorrupti permanent ad plures annos. Utile est senibus, frigidi temperamenti hominibus præsertim hyemali tempestate : noxium verò juvenibus, biliosis, & tempore æstivo. Calculosis, asthmaticis, aliisque pulmonum affectibus obnoxiiis maximè conducit. Purum homini nutrimentum exhibet; corporis, animæque vires reficit, sensus omnes recreat, eosque acutiores reddit.

**M**ellis naturam & facultates capite proprio & separato explicare voluimus, tum propter illius præstantiam, tum, quia non solum inter condimenta, sed etiam inter alimenta locum habet; ac denique quia Gal. I. I. simpl. scribit, mellis naturam separatam quid esse à plantis & animalibus.

Illius præstantia multis autoritatibus & exemplis confirmatur. Plinius enim mel, divinum nectar appellavit. Idem ex Aristæo, mella non minima hujus vitæ munera vocavit. Maximo autem in usu fuisse apud antiquos, & plurimam, ad sanitatem conservandam, utilitatem attulisse, historiæ plurimæ testantur. Pythagoras (referente Laërtio) cum frugalissimè viveret, toto sæpe melle contentus fuit & ad annum nonagesimum vitam perduxit. Eosque sine morbo vivere posse affirmabat, qui mel crebro comederent. Refertque Athenæus, Pythagoricorum cibum panem fuisse cum melle, Galen. 5. de san. tuenda, cap. 4. refert historias Antiochi Medici, & Telephi Grammatici, quorum ille singulis diebus tertiâ diæ horâ panem sumebat cum melle Attico. rariùs crudo, plerumque cocto, & sic cum alia victus ratione ibi descriptâ annum octuagesimum excessit. Hic verò pro jentaculo mel crudum esitabat, cum alica in aqua cocta, & ad centesimum annum vitam protraxit. Plin. lib. 22. cap. 24. de Pollione Romano, annum centesimum excedente, refert: cum Augustus Imperator illius hospes interrogasset, quam ratione maximè vigorem illum animi corporisque servasset, responsum tulisse: foris oleo, intus melle. Quod à Democrito didicerat, qui aliquando interrogatus, quomodo quis in sanitate vitam traducere valeret; respondit, si exteriora oleo, interiora melle rigaret. Idem Democritus, cum in senectute vitæ esset pertæsus, eam subtractione alimenti finire conabatur. Sed cum ingruerent Theophoria seu sacrorum cerealium dies, rogantibus mulieribus ne per id tempus domum funestaret, vas melle plenum adferri jussit, & sola illius anaphorâ, hoc est evaporatione, aliquot dies vitam produxit. Scribit etiam Athenæus, Cynrios, qui Corsicam insulam habitant, idè esse longævos, quòd mellis cibo utantur assiduè, cujus maxima copia ibi colligitur. Denique sacri Codicis testimonio, mellis præstantia confirmatur, ubi de Joanne Baptista loquens, Bayrum, inquit, & mel comedit, ut sciat eligere bonum & reprobare malum. Cum enim boni & laudabiles humores ex melle generentur, ex bonis humoribus boni spiritus, à quibus functiones corporis omnes, atque adeò functiones cerebri principes exercentur; consequens est, illius usu ingenium & intellectum acui, cujus tota operatio in boni & mali exquisita dignotione consistit.

Mellis natura satis recondita est, quandoquidem incertum est, ad quam rerum classem revocari debeat, cum scripserit Galen. loco supra citato, illius naturam separatam quid esse à plantis & animalibus. Et authores in hac re maximè variant, aliis ab aère purè & simpliciter provenire, & ab apibus in escam colligi, atque in favos transferri assertantibus, aliis verò dicentibus, ex plantarum succo ab apibus generari. Prior sententia ab Aristotele, Galeno, aliisque innumeris magis probatur: Et confirmatur experientia, quòd in regionibus melle abundantibus, verna tempestate, maturis horis, folia plantarum melle referta comperiantur, quod ex aère promanavit. Est igitur mel

ros quidam aëreus & pinguis, ex pinguibus quibusdam vaporibus è terra elevatis, & in aère condensatis genitus, ab apibus supra flores præsertim, tum etiam folia plantarum collectus, & ad cibum in favis reservatus. Dubium tamen aliquod remanet, num ex ipso florum succo aliquod etiam mellis generari possit, quandoquidem nemini dubium est, quin cera ab ipsis apibus ex plantarum succis generetur, quæ cum maximam habeat analogiam cum melle, verisimile videtur, mel etiam ex iisdem succis in roris penuria generari posse. Hoc saltem certissimum est, mel qualitates plantarum referre, è quibus colligitur. Sic, quod in thymo colligitur, thymum redolet: quod in Sardinia provenit, ubi absinthii magna copia crescit, amarum est: in Ponto verò est venenatum, propter Rhododendron, quod in eo magna copia adolescit. Verum qualitates plantarum melli facillè communicari possunt, dum in eas spargitur, iisque tenaciter adhæret, & aliqua ex parte imbibitur.

Mellis optimi electio ab autoribus proposita est, ut si colore flavo, odore suavi, nullum nec florum, nec herbarum odorem aut saporem referens, gustu jucundum. Album tamen, quale est nostrum Narbonense, & quale Atticum olim fuit, præstantius est ratione alimenti, quia magis temperatum. Flavum verò præferri potest ratione medicamenti. Omne tamen mel est alimentum medicamentosum, quia non solum perfectè nutrit, utpote purissimum & incorruptibile alimentum, ac excrementis vacuum; sed etiam corpus calfacit, pituitam ventriculo & inofinis hærentem alstergit, alvumque laxat. Aliaque commoda non pauca corpori suppeditat.

Mel vernum præstantius est autumnali, quia è cera nova exemptum, novellisque stirpibus genium. Æstivum deterius est verno, quia calidius & acrius. Hybernium omnibus deterius, halitum enim ceræ expirat, inquit Dioscorides, & crassius existit.

## CAPUT XXIV.

### De potu & materia potulenta.

Aqua simplex frigida est & humida. Omnium verò optima qua limpida & clara est, pura, minimeque cænosa, & ab omnibus, qua innatare solent, ramenti liberata, omnis saporis, omnisque odoris expers: tenuis & levis, quæ hypochondria celeriter permeat, & per corpus citò distribuitur, citò cal scit & refrigeratur. His optimæ aquæ notis ab autoribus propositis duæ aliæ addi possunt non adeò vulgares, ut scilicet duo lintei frusta ejusdem ponderis sumantur, & in aquis diversis humectentur, ac postmodum ad solem exsiccantur: si alterum prius exsiccetur, melior erit aqua, in qua illud humectatum fuerit. Deinde, postquam ambo exsiccata fuerint, iterum ponderentur, & si alterum altero levius sit, melior erit aqua, in quam leve demersum fuit.

Ratione locorum, ex quibus aquæ desumuntur, fontana reliquis præferenda est, modo conditiones habeat superiori theoremate propositas: si enim iis destituatur, improbanda est. Hip. lib. de aère, loc. & ap. alias proponit conditiones, ut scilicet versus ortum solis, præcipue æstivum scaturiat: per terram mundam, minimeque lutosam vel argillosam, sed per arenas & lapillos fluat; quæve hyeme sit calidior, æstate verò frigidior. Hoc enim significat ex profundis terræ visceribus eam scaturire, quæ propter antiperistasin hyeme calens, æstate verò frigens, ut in puteis solet contingere. Quæ ad Septentrionem aut Occidentem oriuntur, & Solem aversum habent, deteriores sunt, utpote crude, graves, & tardè permeantes.

Aqua pluvialis post fontanæ omnium optima censetur, imò verò à quamplurimis autoribus fontanæ præfertur, si conditionibus requisitis stipata sit. Illæ autem conditiones sunt, si fistilibus tubis in coniectam cisternam diducatur: si per locum arenâ repletum transfundatur: si verno tempore blandè & pacatè, non autem procellosè decidat: si in munda cisterna pura & incorrupta servetur



*servetur, neque sordes aut vitium aliquod contrahat ex tegulis, quas eluit.*

**A** Quæ fontanæ primum locum concessimus, juxta sententiam Hip. Gal. & Avicennæ. Multa tamen afferri possunt, quæ pluvialem cum ea de dignitate certare posse ostendant. Ac primum Celsus, lib. 2. cap. 18. *levissima, inquit. pluvialis est, deinde fontana, tum ex flumine, tum ex puteo: post hanc ex nive, aut glacie: gravior his ex lacu, gravissima ex palude.* Aëtius tetrabib. 1. sermone 3. cap. 165. *Aqua pluvialis, inquit, omnium levissima censetur, & facile transmutatur.* Hippocrates lib. de aëre, locis, & aq. aquam pluvialem laudat, quod levis, dulcis, limpida, & tenuis sit, ex eo quod à Sole tenuissimum trahatur & levissimum. Vitruvius lib. 8. c. 9. *Quæ ex imbris, inquit, aqua colligitur, salubriores habet virtutes, eo quod eliciatur ex omnibus fontibus levissimis, subtilibusque raritatibus, deinde per aëris exercitationem percolata, tempestatibus liquefendo pervenit ad terram.* Averroës in Canticis, disertè asserit, aquam pluviam optimam esse, & fontanâ ac fluviali longè excellentiorem. His auctoritatibus accedunt rationes ab experientia desumptæ: siquidem aqua pluvialis ad stateram omnium levissima est, promptissimè calefit atque refrigeratur, hypochondria non gravat, sed faciliè permeat; nū lam in calore, odore, vel sapore insignem qualitatem obtinet: ejusque tenuitas ex eo potissimum apparet, quod legumina in ea meliùs coquantur quàm in fontana. Præterea aquæ pluviae salubritatem ostendunt olera, & omne stirpium genus, quæ imbrum depluvio meliùs, quàm irrigatione nutriuntur & incrementum capiunt. Imò & arundines in palude prognatæ, sine imbris non adolefunt, ut Plin. affirmat. Et Aristot. 8. de histor. animal. dicit, pisces ipsos, qui in aqua continuò degunt, non benè vivere ac subolescere iis annis, quibus pluviae deficiunt. Diceres, humorem in vapores solutum, & insita levitate sursum delatum, è coelo & syderibus vivificam vim mutuari, quam postmodum hisce inferioribus imperitur.

Objici potest, nivem & grandines ex pluviae materia generari, attamen aquas ex iis eliquatas rejici ab omnibus, cum tamen eandem cum pluvia naturam participant. Respondet Paulus, aquam nivalem & glaciale omnium vitiosissimam esse, quod aquarem congelatione omnes tenuissimæ partes exprimantur.

Secundo objici potest ex Galeno aquam pluviae faciliè putrescere & astringendi facultate præditam esse. Respondet iterum Paulus, his verbis: *Nemo citius putrescibilem aquam deterrimam esse judicet, cum alterationis mutationisque proclivitas virtuti magis, quam vitio adscribenda sit.* Et Galenus ipse 1. de aliment. facultatibus, ait, ea quæ faciliè concoquuntur, faciliè item alterari & corrumpi, & contrà, quæ concoctu sunt difficilia, difficiliùs alterari & corrumpi. Ad astringentem verò, aquæ pluviali tributam à Galeno, responsio elicitur ex Avicenna, qui dicit, aquam pluvialem ea ratione videri astringentem, quod mox distribuatur, & ad vias urinæ penetret: hinc enim fit, ut facibus minùs humiditate dilutis, factisque siccioribus, alvus astrictior evadat. Per se autem aqua pluvialis astringere non potest cum tenuissima sit & aërea, astringentia autem vis à terrea materia dependeat.

Ex iis quæ dicta sunt, aqua pluvialis fontanæ videretur præferenda. Nos tamen fontanam cum gravissimis auctoribus prætulimus, quia si debitis conditionibus, in theoremate propositis, stipata sit, eodem statu semper remanet, neque faciliè à causis externis immutatur. Contrà verò pluvialis tot conditionibus indiget à rebus externis petitis, ut difficillimum sit omnes concurrere simul: sed aliqua earum deficiente, non parùm illam de perfectione sua amittere necesse est; si nimirum à tegulis non diligenter ablutis, sed sordibus inquinatis excipiat, vel in cisterna non bene mundata servetur, & tempore minùs apto colligatur.

Est autem dubitatio circa tempus aquæ pluviali colligendæ magis idoneum. Siquidem non pauci ex Hipp. censent, æstivo tempore collectam, & cum tonitru descendentem, esse præferendam: quod illa tenuissima & levissima

*Laz. Riverii Opera.*

fit. Verum licet talis aqua ratione tenuitatis & levitatis, aliquam habeat prærogativam; tamen cum tempore æstivo variæ exhalationes è terra eleventur, quæ mineralium naturam quodammodo amulantur; & cum vaporibus miscentur, ex quibus pluviae conflantur, non tam laudabiles videntur illæ aquæ: cujus rei evidens est indicium quod faciliè putrescant, & vermiculi frequenter in iis generentur. Fulgura enim & tonitrua à sulphureis exhalationibus oriuntur, quæ etiam aliquando aërem odore suo inficiunt. Adde quod æstatis tempore, aquæ stagnorum, lacuum, & paludum contrahant putredinem, ex iisque vapores elevati pluviae materiam suppeditent, quæ ideo vitiosa, & faciliè putrescibilis est. His rationibus ducti, eam aquam prætulimus in theoremate, quæ verno tempore colligitur; quandoquidem stagna, lacus, & paludes aquam habent copiosam, eamque puram ex pluviarum copiâ, quæ toto hyeme deciderunt. Deinde impossibile esset, eam aquæ copiam colligere, quæ usui annuo sufficere valeret, cum rarissimæ sint, & paucissimæ pluviae æstivæ, ad aliquot tantum horas perdurantes. Et docet nos experientia hinc Monspelii, ubi aquæ pluviae usus frequentissimus est, quæ vulgò per hyemis & veris decursum colligitur, eam esse optimam, & omnes habere prærogativas supra descriptas. In decoctione leguminum præsertim, hæc sola usurpari solet, in qua mollitiem eam insignem adipiscuntur: cum in aliis aquis duritiem aliquam retineant, quantumvis decoquantur.

*Aqua putealis crassa est & gravis: unde in visceribus diutius hæret, & obstructionum generationem promovere.* Magna tamen est inter aquas puteales differentia, ita ut nonnullæ cum fontanis de bonitate certent: si nimirum sequentibus conditionibus stipatæ sint. 1. Si font. s. vicinos habeant, ex quibus aquæ laudabiles scaturiunt; (conspiciendum enim est, ab illis fontibus aquas suas qualitates mutuari,) vel flumini puro ac rapido vicinæ sint. 2. Si ex profundis puteis hauriantur, tales enim æstate frigida, hyeme calida sunt, & externis injuriis minùs patent. 3. Si cælum spectent, & aëri libero, à Sole illustrato expositæ sint: Solis namque lumine depurantur & serenantur, vitalisque cujusdam auræ redduntur participes. 4. Si frequenter moveantur & hauriantur; attenuantur enim, & minus putrescunt. 5. Si earum putei sæpè ac diligenter expurgentur, unde puriores redduntur. 6. Si à cloacis aut sterquiliniis sint remotæ, à quibus pravam aliquam qualitatem mutuari possunt. Si verò contrarias haberent conditiones, illaudabiles censendæ sunt. Quæ enim profunda non sunt; nisi à fontis cujusdam scaturigine oriantur (injuriis patent externis, hyeme algent, æstate calent, palustrinum & stagnantium aquarum more. Corcl. s. sub tellis, locisque concameratis, celesti lumine privantur, & situ mucido inquinantur. Immo crassescunt, crude manent, putredinis quid concipiunt, ventriculum offendunt, agrè permeant, viscera lædunt. Cloacis & sterquiliniis vicinæ, viroso sapore & odore imbuuntur.

*Aquæ fluviales cum putealibus bonitate certant, & in quibusdam locis præferendæ sunt. in aliis postponendæ.* Magnas tamen habent aquæ fluviales inter se differentias. Meliores enim sunt, quæ dulces ac limpidae sunt, & è magnis ac rapidis fluminibus petuntur, per laudabiles terras fluent, & felici cæli aspectu fruuntur. Males autem sunt, quæ ex pravis & stagnantibus aut cœnosis ac turbidis fluvii hauriuntur; vel ex magnis quidem ac currentibus, sed latrinis expurgantibus, sordesque culinarum, vestium, & linteorum recipientibus.

Huic flumina, quæ magnarum civitatum mœnia alluunt, multas habent impuritates admixtas. & multos morbos generant, ni cautio adhibeatur, quæ in eo præcipuè versatur, ut loca hauriendæ aquæ destinata supra civitatem posita sunt, ubi aqua civitatis sordibus nondum infecta est. Si verò aqua civitatem præterlapsa usurpetur, salubris esse non potest. Hæc etiam cautio in aquæ fluvialis usu adhibenda est, ut in hydriis per aliquot dies asservetur; ibi enim quiescens, terrestres ac limosas partes, omnesque impuritates ad fundum deponit.

*Aquæ stagnantes & palustres omnium pessimæ sunt: Cum enim*



enim nullo aut exiguo motu cieantur facile putrescunt. Crassæ sunt, crudæ, & sæpè malignæ ac pestilentes.

*Aquæ Nivales & Glaciales pessimæ etiam sunt: Dum enim à frigore congelantur, tenuiores partes exhalant; præterea insigni frigiditate præditæ sunt, quæ ventriculum offendit. Quod de vinis & aquis, nive & glacie refrigeratis, intempestivè & præposterè usurpatis, etiam dicendum est. Licet enim juvenes robustiores earum noxam statim non percipiant, progressu tamen ætatis eam sentiunt, & varios articularum, viscerum, & parium nervosarum morbos incurrunt.*

Nostri ætate, & paucis annis, apud nos maximè invaluit potus aquæ nive aut glacie refrigeratæ, ætatis tempore usurpatus; in dō non pauci vinum hoc modo refrigerant. Quæ res inter Medicos, in dō & apud vulgus maximè controversitur; aliis hunc usum plurimùm laudantibus, aliis improbantibus. Quandoquidem igitur opportuna occasio hîc sese offert sententiam nostram aperiendi, paucis eam explicabimus. Ac primùm, in theoremate, aquæ nive aut glacie refrigeratæ potum damnavimus; sed cum hac additione, si intempestivè & præposterè usurpetur, quod accurata explicatione indiget. Nam primò potus iste admodum frigidus, in genere consideratus, dammandus absolutè viderur, juxta sententiam Hippocratis, *Aphor. 51. sect. 2. Plurimùm atque repentè evacuare, vel replere, vel calefacere, vel refrigerare, vel alio quovis modo corpus movere, periculosum. Omne enim nimium naturæ inimicum, sed quod paulatim fit, tutum est.* Cùm igitur in magno ætatis ardore corpus plurimùm æluet; periculosum esse viderur, illud subitò & derepentè glaciali illo potu refrigerare. Hujus periculi effectus confirmari potest plurimis exemplis eorum, qui ex hujusmodi potu in gravissimos morbos præcipitati sunt, quorum non paucos ipsimet vidimus & curavimus. Ex altera vero parte infiniti reperiuntur, qui hunc usum ad cælum effecerunt, & plurimis tum rationibus, tum experimentis confirmant.

*Prima ratio ex eo desumitur, quod calor noster natus à duobus validis & potentissimis hostibus oppugnari & extingui consuevit; frigore nimirum extinguente, & calore dissipante. Sic in vehementissimo ætatis ardore corpora languida & effœta redduntur, ab æstuante aère, partes corporis veluti inflammante, earumque calorem exsolvente. Quæ exolutio impediri non potest, nisi refrigerantibus assumptis & admotis. Quemadmodum igitur ab omni ævo balnea & natationes in aquis frigidis convenienter usurpatæ fuerunt, ad fervorem illum corporis temperandum; sic etiam potus frigidus assumptus, ad hoc ipsum efficiendum maximè valebit.*

*Secundò, Potus in genere necessarius est ad restaurandam humiditatem, quæ à calore nativo indefinenter absumitur ac dissipatur; potus autem ille quatenus humidus, id præstat: si autem cum humiditate juncta esset caliditas, illa plurimùm humiditatis resolutionem adjuvaret, idèò communis est omnium hominum instinctus, ut frigidum potum appetant, etiam hyemis tempore, ad calorem illum internum temperandum, & humidi dissipationem remorandam. Potiori ergò jure ætatis tempore, ubi magna fit humiditatis dissipatio à calore viscerum intenso, potus ille refrigerans necessarius est.*

*Denique, frigidissimum potum ætatis tempore usurpatum, maximè conferre, infinitorum hominum testimoniis constat, qui se à plurimis incommodis, potu, nive aut glacie refrigerato, liberatos esse testantur. Tum etiam in Hispania & Italia pro certo habetur, ab eo tempore, quo hujusmodi potus invaluerit, mirè grassari ætatis tempore febres continuas & malignas, quæ antea eos maximè infestabant.*

Nos verò hac de re ita statuendum censemus. *Primò* de potu mediocriter frigidus nulla est dubitatio, quin omnibus hominibus maximè conveniat. Hinc ab antiquo solent omnes (quantum fieri potest) vinum in cellis subterraneis pro ætatis usu asservare, aquas è profundis puteis haurire iisque vinum diluere, si portabiles sint; sin minus, in iis vinum & aquam meliorem refrigerare. Atque adeò saluberrimum censemus, vigente æstu, vulgaribus & antiquis hîc modis vinum & aquam refrigerare; quibus

etiam ulteriorem frigiditatis gradum conciliare possumus, si lagenæ iis repletæ in puteum demittantur, ita tamen ut aquam non attingant: aër enim, aquæ vicinus, ab ea frigiditatem contrahit, & magis penetrat quàm aqua; lagenasque suspensas potentius refrigerat. Sed de potu, nive aut glacie refrigerato, qui longè intensiorem ac propemodum glaciale frigiditatem contrahit, major est difficultas. De ea enim maximè valet citatus Aphorismus, *plurimùm atque repentè refrigerare vel calefacere, periculosum.* Ad cujus resolutionem dicimus: in regione & tempestate calidissima posse usurpari ab iis, qui in juvenili ætate constituti sunt, calidiori temperamento præditi, & pravis humoribus vacui; tum etiam viscera omnia valida ac robusta obtinent, & imprimis, qui hujusmodi potui sunt assueti, & sese plurimùm exercent. Aliis verò, qui nempe in senili aut puerili ætate constitui, debilia habent viscera, vel obstructa, pituitoso aut melancholico temperamento præditi sunt, plurimos habent humores excrementitios, otiosam vitam agunt, paucò exercitio & plurimò coitu utuntur, noxiosissimum esse. Cùm igitur tot circumstantiæ requirantur ad hujusmodi potum impunè usurpandum, & illæ in paucissimis hominibus reperiantur, satius est ab eo abstinere, & potu modis propositis refrigerato uti, qui ad sanitatem conservandam sufficere potest.

At verò, quia tantopere invaluit hoc tempore potus glacie refrigeratus; ut multi, ei non assueti, in conviviiis aut aliis locis eo uti cogantur, alio potus genere destituti, unde nonnullos vidimus in gravissima pericula coniectos: operæ pretium duximus præceptum aliquod excogitare, quo minorem noxam ex eo incurrere valeant. Atque adeò præcipimus, ut ante omnem potum plurimos cibos ingerant, eosque calidiores, ut ossam calidam, salsa & pipërata, quibus excalefactus ventriculus vehementi potus frigiditati meliùs resistat: mox potum assumant paucissimum, eumque non multùm dilutum, sed solito meraciorem: vinum enim tantum frigus non concipit ut aqua, ac promptius incalcescit in ventriculo, quem postmodum actutùm calefacit. Atque ut sibi omninò satisfiat, potuum singulorum paucitas frequentia compensetur: Sic enim potus illius frigidioris noxa saltem majori parte evitari poterit. Eandem cautionem observare possunt ii, qui calidiori temperamento præditi, ardente Sirio plurimùm æstuant & febribus ardentibus obnoxii sunt, aliasque conditiones præ se ferunt, quibus innoxii tali potu uti valent, & se ex eo haud exiguum fructum percepturos sperant, ut scilicet ei paulatim assuescant, per aliquot dies, ab initio pituitando, seu parùm & frequenter bibendo.

*Vinum in genere consideratum in activis qualitatibus calidum est, in passivis verò siccum. Calorem nostrum fovet, cor maximè roborat, spiritus auget, vires reficit, concoctiones juvat, pituitam attenuat, bilem per urinas expurgat, omniumque excrementorum expulsionem promovet.*

Per vinum in genere consideratum, intelligimus illud, quod principaliter vinum dici meretur, & quod in regionibus calidis, aut saltem temperatis provenit, quod ex uvis maturis expressum est, in dolio probe confectum, cum insigni tamen differentia, ut aliud in primo, aliud in secundo, aliud in tertio gradu calidum sit & siccum. Illud verò quod ex uvis immaturis exprimitur, quodque acidum est, austèrum, vel acerbum: vini nomen propriè non meretur, sed potius omphacium appellandum est.

At verò circa passivas vini qualitates, gravis est difficultas propter pugnantem invicem auctoritates & rationes. Nam *Primò*, Aristoteles *problem. 17. sect. 3.* vinum discretè calidum & humidum pronuntiat. *Secundò*, Gal. 3. *de caus. puls. cap. ultimo*, vinum propter humiditatem celeriter nutrire asserit, eoque magis, quia simul calidum; calorem enim ducem humoris nominat.

*Tertiò*, idem Galenus *I. de sanit. tuenda, cap. 11.* pueris vinum interdicit: tum alias ob causas, tum præcipuè, quia eos nimis humectat, & copioso halitu replet. *Eodemque loco* scribit, vinum humectare quidquid immodicè siccatum est.

*Quartò* idem Gal. 5. *de sanit. tuenda, cap. 5.* vinum senibus aptissimum censet non modò propter calorem, quem senes habent debilem, verum etiam propter humiditatem.

*Quintò*



*Quinto*, Plato 2. *de legibus* dicit : Dionysium hominibus vinum largitum esse, quasi remedium adversus duritiam senectutis, ut rejuvenescere videantur : & non secus ac igne ferrum, ita vino senum corpora molliori.

*Sexto*, Hippocrates 2. *de diata*, vina dulcia nigra, dulcia tenuia, & acida humectare asserit.

*Septimo*, succus uvarum maturarum, ex quo vinum conficitur, calidus est & humidus, teste Hippoc. 2. *de diata*.

*Octavo*, Vinum humanæ naturæ, quæ calida est & humida, gratissimum est & amicissimum.

*Nono*, Vinum melancholicis maxime confert, qui humectatione indigent, unde illud : quamdiu humectantur, tamdiu curantur.

Contrà verò, siccitatem in vino prævalere, sequentibus autoritatibus & rationibus ostenditur.

*Primo*, Galenus 8. *simplic. de vino*, in eo siccitatem caliditati proportionem respondere dicit.

*Secundo*, idem confirmat Paulus Ægineta lib. 7. *cap. 3.* & Galeni mentem sequitur.

*Tertio*, Aëtius *tetrabibl. sect. cap. de vino*, vinum antiquum tertio ordine siccum statuit.

*Quarto* lib. 2. *Synops. cap. 15.* vinum gradu secundo siccum esse asserit, & *cap. 16.* ponit in gradu tertio, si nempe valde sit vetustum.

*Quinto*, Vinum multum spiritum continet, qui igneæ naturæ, & facile inflammabilis.

*Sexto*, Phlegmaticis naturis confert, & immoderate sumptum suum excitat, at viscera torrefacit, unde calor rubicundus, & pustulæ præcalidæ in ebriosorum facie apparent.

*Septimo*, ad ulcerum curationem utilissimum est, docente Galeno 4. *meth. cap. 5.* At ulcera deterfione & exsiccatione curantur.

Pro hujus controversiæ decisione, duplex distinctio adhibenda est : una humiditatis, altera vini.

Humiditas duplex est, actualis & potentialis. Et utraque nativa, vel accititia

Vinum vel immaturum est, acidum, & imperfectum; vel maturum, perfecteque coctum. Iterum, vel recens, vel antiquum : & utrumque vel generosum ac potens, vel debile & infirmum.

His positis, dicimus vinum actu esse humidum, quandoquidem omne corpus fluidum actu humidum est. Potentialiter verò siccum est, si sit maturum generosum, neque valde recens : quemadmodum in theoremate posuimus.

Quod verò crudum & acidum est, valde recens, & adhuc musti naturam redolens, tum etiam dulce, humidum est à prædominio. Crudum abundat phlegmate & aquosâ humiditate, tam propriâ quam accititiâ : recens multâ abundat humiditate, quæ sensim in dolio per fermentationem absorbitur.

Præmissis igitur hisce distinctionibus, autoritatibus & rationibus acquiescimus, quibus vini siccitas confirmatur. Iis verò, quæ pro illius humiditate allatæ sunt, ita respondemus.

Ad primam dicimus, Aristotelem vinum vocare humidum actuali humiditate, non autem potentiali.

Ad secundam Respondemus, Galenum vinum considerare, ut alimentum est, quâ ratione actu humidum est, & propter illam actualem humiditatem celeriter distribuitur, & facile immutatur, unde etiam celeriter nutrit.

Ad tertiam dicimus, Galenum pueris vinum interdicare, non quod potentialiter, sed actualiter eos humectet, quod calefaciat, quodque halitibus caput repleat sicque variis morbis, & imprimis convulsionibus ansam præbeat.

Ad quartam Respondemus, Galenum senibus vinum commendare, non quod humectet, sed quod calorem eorum debilem reficiat, serososque humores, quibus abundant, per urinas evacuet. Quâ de causâ vinum tenue ac flavum iis accommodatum esse monet.

Ad quintam Respondemus, Platonem, cum vinum dicit remedium esse adversus duritiam senectutis, non intelligere duritiam corporis, sed animi, inquit enim, senioribus bibendum esse vinum, ut rejuvenescant, & mœstitiæ eos capiat oblivio, ipsaque animi affectio, velut ferrum in igne, ex duritie in molliorem deducta, flexibilior fiat. Quod

Lazar. Riverii Opera.

etiam clarius explicat in sequentibus, dicens bibentium animos, sicut in igne ferrum, molliores junioresque evadere.

Ad sextam dicimus, Authoritatem Hippocratis sententiæ nostræ minime repugnare, quia controversiæ decisione dicimus, vinum acidum & dulce esse humidum à prædominio.

Ad septimam Respondemus, Hippocratem loqui de musto seu vino recenti, quod vocat succum uvarum maturarum; & illud etiam humidum esse à prædominio fatemur.

Ad octavam Respondemus, Vinum humanæ naturæ amicum esse, quia celeriter nutrit, spiritus reficit; qui effectus non impediuntur ab exsiccandi vi quæ valde moderata est, & ab humana temperatura non admodum recedens.

Ad nonam Respondemus, Vinum melancholicis conferre, non quatenus humectat, sed quatenus spiritus recreat, cor exhilarat, & lætitiâ inducit.

Varia autem sunt vinorum differentia, à propria natura, sapore, odore, colore, & ætate desumptæ, quæ viribus etiam ac facultatibus multum inter se variant.

Ratione propriæ naturæ, vinum aliud vocatur *δαιτφόρον*, seu pauciferum, quod in diluendo paucam aquæ admixtionem fert : aliud vinosum ac generosum, quod potentius est, & plus aquæ ferre potest; & quo generosius est, eo magis ad caliditatem & siccitatem vergit.

Ratione saporis, vina dulcia bene nutriunt, & à visceribus acide arripiuntur. Quia tamen sunt crassiora, obstructions pariunt, hypochondria instant, flatus generando propter eandem crassitatem, & facile in bilem vertuntur. Pulmonibus conferunt, neque nimis calida sunt, neque caput tentant, aut nervos feriunt. Quæ omnia relata sunt ab Hipp. 3. de rat. vict. in acut. text. 2.

Vina austera & acerba calorem habent debiliorem, in ventre diutius morantur, neque facile venas permeant, & ad vias urinae penetrant : pulmonis affectibus nocent, alvi fluxui conferunt, utpote astringendi vi prædita.

Ratione odoris, vina odorata & fragrantia maxime commendatur, vires instaurant, spiritus reficiunt, totum corpus recreant & exhilarant, senibus utilia sunt, nisi quod caput repleant nervosque feriant : ideo noxia sunt iis, qui catarhis, aliisque capitis affectibus obnoxii sunt.

Ratione coloris non adeo certa facultatum indicia desumi possunt. Sunt enim vina quædam alba, aquosa, & minus potentia : alia generosa, & impenetrabiliora. In universum tamen alba fulvis & flavis minus calefaciunt. Inter fulva generosissima sunt Rhœnanum, Creticum, & Meschatriellinum. Ex rubris etiam alia magis alia minus generosa. Ut plurimum tamen quæ interiorum habent rubedinem, & quo magis ad nigredinem accedunt, minus potentia sunt, & quo crassiora, eo magis obstructionibus generandis idonea sunt. Tenuia verò meatus aperiunt, sudores & urinas movent; paucioris tamen sunt nutrimenti, quàm crassa.

Ratione ætatis, vina nova & recentia, quæ musticam adhuc dulcedinem servant, aquosiora debilior. quæ sunt, quàm vino convenient; excrementosa sunt, & coctionis difficilis, alimentum distributionem sufficienter non adjuvant, sed diu in ventre retinent, unde hypochondria instant & distendunt : gravia insomnia excitant, viscera obstruunt, & calculum generant, præcipue quæ dulcia sunt, crassa, turbida, & parum defæcata, mustique naturam adhuc retinentia.

Vina antiqua, quæ ab ortu suo & propria natura generosa sunt, acriora ac vinosiora evadunt, ac plus justo calefaciunt. Caput nervosque ledunt, facile inebriant, corpus usu quotidiano attenuant; calidis temperatis noxia, nisi modice, ac bene diluta bibantur : In quibusdam tamen regionibus frigidioribus, vina quæ acerba & austera esse solent, secundo vel tertio anno meliora & salubriora evadunt, & longiori coctione quæ fit in doliis, austeritatem deponunt.

Vina ætate mediâ victui sanorum & ægrorum accommodatissima; siquidem tunc temporis optime defæcata sunt, & in calore mediocri : Vini enim calor successu temporis magis sese exerit, & minus potens est in novo, magis in ætate media, maxime in annoso.

Licet autem varia vinorum genera variis naturis ac



temperiebus magis vel minus opportuna sunt; in universum tamen, optimi vini & omnibus propemodum hominibus convenientissimi, conditiones sunt: ut saporem habeat inter dulcem & austerum medium, ut sit odoratum & fragrans, sit clarum & nonnihil fulvum, non nimis tenue, aut crassum, ad tenuitatem tamen magis accedat, neque nimis potens, neque nimis debile, ætatis mediæ.

#### APPENDIX.

Multa alia potuum genera ob vini penuriam in variis regionibus communiter usurpantur, ut cerevisia, pomaceum, pyraceum, &c. quæ quoniam apud nos incognita & inusitata sunt, iis qui dictas regiones incolunt, examinanda relinquimus. Præterea varia etiam potuum genera vulgo usurpantur, & à Medicis præscribuntur, ad multorum morborum curationem & præcautionem, ut pisanæ ex hordeo, liquoritia, ebore, cornu cervi, variisque radicibus & herbis confecta; bochetum ex China, salsaparilla, santalo, buxo, rhabbarbo, hydromel, & infinita alia, quæ consilio omitimus, potui sanorum tantum inhaerentes. Videantur Senert. Joël, Florsius & alii de his potibus Scriptores.

### CAPUT XXV.

#### De Aëre.

Aër omnibus hominibus saluberrimus, eorumque sanitati conservandæ maximè idoneus, debet esse in primis qualitatibus temperatus, purus, nitidus, tenuis, patens & liber nullo vapore malo, nullis inquinamentis, nulla uligine aut corruptelâ perfusus: sed blandis, ac suaviter spirantibus ventis diffusus, & ut plurimum serenus.

Insalubris verò est, qui stagnantium aquarum, aut paludum halitu inficitur, aut è profundo quodam specu pestilentem auram recipit: qui è cloacis, vastam urbem purgantibus, vitium contrahit, aut ex animalium laniena, coriario- rum officinis, sinique putredine: Qui ex stagni, aut magni fluminis vicinâ crassus, nebulosus, & caligine plenus est: qui editis undique montibus sepius, demissoque loco ac cavo arctatus, nullum recipit perflatum.

**A** Er duobus modis corpora nostra afficit, vel quatenus extrinsecus ambit, & per cutis poros ac spiracula sese insinuat; vel quatenus inspiratione attrahitur. Utroque modo magnam corpora nostra afficiendi atque alterandi vim habet, dum omnes suas qualitates spiritibus (qui ex eo aluntur ac generantur,) continuo communicat & per spiritus singulis corporis nostri partibus. Quæ si corpori conservando idoneæ sint, ad tuendam sanitatem plurimum conferunt; si verò illius temperiei ac constitutioni sint adversæ, ad morbos procreandos insignem vim obtinent.

Galenus 1. de sanit. tuend. saluberrimum esse ait hominibus, optimum in pulmones aërem attrahere, ut puri ex eo spiritus generentur, uti pestilentissimum, noxio aëre uti. Et Columella 1. de re rustica cap. 3. in emendo agro coeli salubritatem imprimis spectandam censuit; neminem enim sanum debere facere sumptus in pestilenti; quamvis feracissimo pinguisimoque agro, cum incertum sit, an dominum sinat ad fructus pervenire. Nam ubi sit cum orco ratio ponenda, ibi non modò perceptionem fructuum, sed & vitam colonorum esse dubiam, vel potius mortem quæstu certior. Petatur igitur aër calore & frigore temperatus, quem ferè medius obtinet collis, qui neque depressus hyeme pruinis torpet, nec torret æstate vaporibus, neque, elatis in summa montium perpetuis ventorum montibus aut pluviis, omni tempore anni sævit.

Aër exquisitè temperatus & quasi mediam, inter calorem ac frigus, humiditatem ac siccitatem, constitutionem sortitus, optimè temperatis corporibus saluberrimus est. Intemperatus verò, aër contraria qualitate præditus longè salubrior est.

Sic calido temperamento præditi in aëre frigido melius degunt: qui frigidiorē temperiem nacti sunt, iis calidior aër utilior est; humidiores, sicciori; sicciores, humidiori aëre gaudent.

Cum verò unusquisque proprium, & suæ temperaturæ maximè idoneum aërem invenire aut eligere nequeat, arte supplendum est, quod naturæ beneficio denegatur. Atque adeò frigidior aër arte calefaciendus est, calidior refrigerandus, humidior exsiccandus, & siccior humectandus.

Si regendo corpori calido, aëre frigido egeamus, qui talis vel regionis vel situs ædium culpa, non fuerit, præparare ipsum ad frigidum oportet frequenti ædium irrigatione, florum & plantarum refrigerantium usu, patentium ad Septentrionem luminum apertione, quò inde spirans aura ædes refrigeret. Si aër frigidior sit, accenso igne luculento calefaciendus est, ædium meatus omnes occludendi, ut frigidi aëris ingressus prohibeatur: vel in hypocausto, ut plurimum degere oportet, ut apud Germanos, omnesque Septentrionalis plagæ incolæ fieri solet. Humidior aër igne multo ac suffibus siccabitur: siccior, aquarum perfusionibus humectandus erit.

Aër calidior corpora reddit calidiora, humores liquat, attenuat & dissolvit; vires dejicit, si immodica fuerit illius caliditas: coctionem debilitat, vitam insuper brevem facit. Aristoteles Æthiopes, & qui Lybiam Sole exustam incolunt, ideò brevioris ævi esse voluit, quòd nimio Solis ardore natus eorum calor brevi dissipetur, citoque senium accedat, siccatis eorum corporibus.

Frigidior aër corpora refrigerat, densat, astringit, coctionem adjuvat, urinæ copiam auget, catarrhos aliosque capitis morbo excitat, si frigiditas fuerit intensior.

Calor, vi frigoris ambientis ad interiora repercussus, validior ac vegetior fit: unde Hippocrati, ventres hyeme calidiores, & à calore illo potentiori coctio alimentorum melius perficitur. Urinæ copiam auget frigidus aër, quia condensatis cutis poros maximè impeditur diaphoresis, & vapores, qui per transpirationem excluderentur, interiorius retenti condensantur, ac feri formam adepti ad urinæ vias transferuntur. Sic vulgò dicitur eandem esse materiam sudoris & urinæ: ita ut profluentibus sudoribus, pauca sit urinæ copia; & contrà, iisdem suppressis, magnus sit urinæ proventus. Sic vulgaris docet experientia, hyemis tempore, & stante Borea, majorem urinæ copiam profundi; Æstate verò, & in constitutione Austri, longè minorem. Si verò intensior fuerit frigiditas, catarrhi excitantur cerebro refrigerato, quandoquidem frigidum cerebro valde inimicum est, ut docuit Hipp. in Aphorismis.

Humidus aër cutem emollit, & corpus humectat, excrementisque obnoxium reddit, idque pigrum ac deses efficit, & ingenti torporem ac tarditatem inducit.

Siccus aër totum corporis habitum siccet, excrementa minuit, corpori agilitatē, sensibus & ingenio claritatē inducit.

Aër turbidus, nubilus, ac nebulosus, corpora pravis humoribus & inquinatissimis spiritibus implet, in pituitosis naturis pituita copiam acervat, quæ nubi ac nebulae similis est.

Quotidiana docet experientia, in locis palustribus, stagnis, lacubus, aut magnis fluminibus vicinis, aut qui propter aliam causam crasso ac turbido aëre fruuntur, febres putridas, tum simplices, tum malignas, esse frequentiores.

### CAPUT XXVI.

#### De Temporibus Anni.

Ad aërem anni tempora referuntur, quoniam in eo magnas mutationes faciunt.

Astrologi quatuor anni partibus aequalibus illius tempora definiunt; nempe Ver ab ingressu Solis in principium arietis, usque ad finem geminorum; Æstatem, à principio canceri ad finem virginis; Autumnum, à principio libræ ad finem sagittarii; & Hyemem, à principio capricorni ad finem piscium.

Medici verò, & populi diversi, juxta aëris temperiem anni tempestates mensurant; & prout aër in quibusdam locis ex nativa constitutione calidior, in aliis frigidior est: ita his hyemem, illis æstatem longiorem efficiunt. Sic Hippoc. in Tarso, ubi habuabat, hyemem definiit. 3. de Diæta, à Vergiliarum occasu, seu initio mensis Novembris, usque ad æquinoctium vernum; ver autem



# Cap. XXVI. De Tempore Anni. 117

ab æquinoctio ad vergiliarum exortum, hoc est circiter diem septimum Maii; æstatem, à vergiliarum exortu ad Arcturi exortum; qui incidit in medium ferè Septembris: Autumnum ab Arcturi exortu ad vergiliarum occasum. Qua computatione tribuuntur hyemi quatuor menses, & dies decem: totidem æstati, veri duo solum menses & aliquot dies: Autumnus vix duo menses. In regionibus Septentrionalibus frigus maximè viget in æquinoctio, ut brumalis tempestas longè ulterius progredi, & ad quinque menses durare censeatur.

**P**rosper Alpinus lib.1. de med. Ægyptior. cap.7. scribit in Ægypto aërem esse temperatum, & ver vigere mensibus Januario & Febuario: æstatem Martio incipere, & ad finem Augusti durare: Autumnum Septembri & Octobri: hyemem verò Novembri & Decembri absolvi. Ab aëris ergò temperie anni tempora, juxta Medicorum doctrinam metiendo, sequentibus theorematibus erunt definienda.

Ver inter alias omnes anni tempestates temperatissimum est, & inter primas qualitates medium quoddam obtinet, ut neque, sicut in hyeme, maximè polleat frigido & humido: neque, sicut in æstate, calido & sicco.

Hippocrates, non uno loco, Ver calidum & humidum esse dixit, quod intelligendum est comparatione facta ad alias tempestates. Hyemi enim collatum, calidum dici potest: æstati verò humidum statuatur: sed in seipso, sine ulla relatione ad alias tempestates consideratum, temperatum dicendum est.

Quod Galen. ostendit L. de temperam. proprio cujusque experimento. Etenim, cum neque propter frigus in vere, nativam suam constitutionem fervante, algere nos perinde atque in hyeme contingat; neque æstu, perinde atque in æstate, premi; nec humore diffuere; aut siccitate torqueri, neque ullum insignem harum qualitatuum sentiamus excessum; temperatum omnino ver meritò judicabimus. Illa autem moderata temperies in toto veris decursu non reperitur, sed principium illius hyemis naturam redolet, finis verò ad æstatis temperiem accedit.

Ver inter alias anni tempestates saluberrimum est dicente Hipp. Aph. 9. sect. 3.

Adveniente vere, corpora, quæ hyberno tempore constringebantur, laxari & rarefieri incipiunt, sanguis augeatur, spiritus recreantur, post hybernas glacies omnia quasi exhilarantur. Neque obstat dicere, Vere morbos multos produci: siquidem ver ex propria natura salubritatem, non morbos inferre solet: & si corpus bonis humoribus præditum reperit, illud in sanitate conservat. Verum, si pravorum humorum, prægressa hyeme, collectorum congeries adfuerit, illi verno tempore funduntur, commoventur, & aliquando putrescunt, undè varii morbi excitari possunt. Sicquè ver per accidens tantum, non ex se, & ex propria natura, morborum ferax dici potest.

Objicies rursum, Ver ex Hipp. calidum & humidum est: At calida & humida constitutio insalubris est, & ad producendos morbos, ex putredine maximè idonea. Ergò ver saluberrimum dici non potest.

Respondemus, id habere locum in magno caliditatis & humiditatis excessu. Verum ubi moderatè caliditas frigiditatem, & humiditas siccitatem excedit, tunc temporis saluberrima est temperies & maximè laudata, ac pro temperata habetur. id est ten periei humanæ maximè congrua, quæ ad caliditatem & humiditatem inclinat. Adde quòd vita in calido & humido consistat quod similibus conservandum est.

Æstas calida & sicca corpora calidiora & sicciora, squalida, siticulosa, imbecillaque reddit: humores attenuat & accendit: bilis proventum efficit, unde febres ex ea genitæ illo tempore grassantur.

Autumnus frigidus est & siccus, morborum maximè ferax propter inæqualitatem, quæ in eo contingunt: mane enim frigus viget, circa meridiem æstu, ac deum circa vesperam aër frigidus evadit. Tunc temporis densantur corpora, & humores diffilari prohibentur, & ad interiora aëris frigiditate trahuntur: unde etiam multi morbi oriuntur, maximè

periculosi, propter atram bilem, quæ autumnus in corpore redundat.

Hyems frigida est & humida: corpora firmat, eaque vegetiora & multo calore nativo referta efficit, somnosque, ob longitudinem noctium, prolixiores reddit. Pituita procreatrix est, & corpora fluxionibus facit obnoxia.

## CAPUT XXVII.

### De Motu & Quietē.

Motus & exercitatio, ad sanitatis conservationem, supra omnes alias res non naturales, principem locum obtinent si sobrietatem exceperis.

**H**ic locum habet vulgatissima Hippoc. sententia, ex lib. 6. Epid. desumpta: Sanitatis studium est, non satiari cibis & impigrum esse ad labores. Galenus verò, pluribus in locis, exercitationem maximè commendat. Unus sit instar omnium, in quo exercitationem etiam ciborum parsimonia anteposit. Is habetur lib. de succorum bonitate & vitio cap. 2. Nisi quis, inquit, satis exercetur, nullà ciborum parsimonia se à morbis immunem tueri poterit; nisi per intervalla inopiam exercitii purgatione, vel sanguinis missione compenset. Sin integrè exercetur, etiam aliquando in alimentis ratione peccans, durabit sine morbis. Aristoteles verò probl. 47. sect. 1. quærens cur cibum minuere & laborem augere salubre sit: An, inquit, quia causam ægotandi excrementorum habet nimietas, quæ tunc certè exuliat, cum aut cibis, aut labor deest.

Motus & exercitatio calorem nativum excitant, spiritus movent & exagitant: unde corpus fit robustius, ut externis injuriis minus pateat, & ad omnes actiones oleundas aptum evadat. Cognitiones præcipuè, ex caloris augmento melius perficiuntur: & spirituum commotio transpiratione uberiorem facit, cujus defectus omnium ferè morborum causa esse solet.

Plures autem sunt motus & exercitationis species, nempe ambulatio, cursus, saltus, equitatio, velox, gestatio, & insitæ aliæ, quorum aliæ magis, aliæ minus corpus exercent: aliæ totum corpus, aliæ quasdam tantum partes.

Galenus ludum parvæ pilæ præcipuè commendat, in quo omnes corporis partes exercentur. Cursu & ambulatione potissimum crura exercentur, armorum tractatione & remigatione brachia, & partes superiores; cantu, vociferatione & clara lectione thorax, equitatione ventriculus.

Commodior & usitator exercitationis species est ambulatio mediocris, per amœna & virentia loca, placido & sereno cælo suscepta. Qui verò pedibus ire suis liberè non possunt aut propter virium infirmitatem nimis fatigantur, equitationi indulgere saluberrimè poterunt.

Ambulatio moderata probè universum corpus exercent, appetentiam excitat, calorem nativum exulscitat, corpus roborat, & vacuationem excrementorum maximè juvat.

Ut exercitatio corporis sit utilis & fructuosa, duo observanda sunt: tempus & mensura.

Tempus commodum est ante cibum, & præcipuè ante prandium.

Ante cibum commodior est exercitatio; quia coctione superioris pastus peracta, excrementa residua per exercitationem evacuantur & dissipantur; sicque corpus melius disponitur ad novum cibum recipiendum & concoquendum: unde Galen. de san. tuenda cap. eum qui non concoxit, jubet ex toto conquiescere. Exercitatio verò quæ fit à pastu, pessima est, crudos enim humores in venas rapit, unde jecur obstruitur, caput gravatur, & morbi multiplices excitantur. Hac de causa Scholastici plerumque scabie laborant, quia statim à prandio ut plurimum sese exercere solent: unde cibi è ventriculo ante debitam coctionem rapiuntur, hincque crudorum humorum copia cumulatur, quæ vehementibus exercitationibus ad cutem rapitur, scabiei materiam suppeditat. Idem enim illis accidere solet, quod iis qui in cacochymia & humorum vitio se exercent: in iis enim ad cutem pravi humores evo-



# 118 Institutiones Medicæ, Lib. IV.

tantur, unde ulcera & scabies procreantur, ut docuit Hippoc. 6. Epid. sect. 5. Si impurgatus laboraverit, ulcera erumpent. Melior autem est exercitatio ante prandium, quàm ante cœnam: quia matutinis horis ventriculus vacuus est, & per longius tempus, quod à pridiana cœna intercessit, concoctiones melius absolutæ sunt; contra verò ante cœnam cibi in prandio ingessi, nondum perfectè elaborati sunt.

Post cibum tamen levis deambulatio utiliter usurpatur, ut quæ necque calorem revocet, necque cibum rapiat; sed eum ad fundum ventriculi melius descendere faciat, ubi promptius concoquitur, & jam concocti distributionem adjuvat.

Mensura exercitationis stabilitur à Gal. 2. de sanit. tuenda, cap. ultimo, quæ ad quatuor capita referre potest primò, ut continuetur exercitatio, donec corpus intumescat; secundò, donec corpus floridum appareat; Tertiò, donec corpus lassitudine affici incipiat; quartò, donec sudor modicus, aut saltem calidus vapor erumpat. Quorum aliquo apparente ab exercitatione desistendum est.

## CAPUT XXVIII.

### De Somno & Vigilia.

*Somnus ad vitæ conservationem absolute necessarius est, & si moderatus sit concoctiones adjuvat; vires ex vigilia resolutas instaurat; internas corporis partes humectat; ac senibus præsertim maximè conducit.*

**O**Mnia, quæ ex somno omnibus eveniunt commoda, uni caloris ad interiora retractioni adscribenda sunt. Calor enim, in visceribus auctus, copiosos spiritus generat, & per vigilias dissipatos reparat, & instaurat: unde concoctiones melius perficiuntur, præsertim in hepate, & singulis partibus, & excrementorum expulsio adjuvatur. Et cum virium resolutio, quæ vigilando inducitur, ex spirituum resolutione oriatur, iis instauratis vires reficiuntur, & lassitudo fugatur. Per coctiones autem copia humoris alibilis partibus internis suppeditatur, unde illæ plurimum humectantur: quemadmodum docuit Hippoc. 6. Epid. Labor articulis cibis est; somnus verò visceribus. Ac denique senibus plurimum conducit, quia nihil æquè eorum corpora frigida & sicca calefacit & humectat, atque adeò deperditam humidam substantiam instaurat. Unde illud Homeri à Galen. citatum, de sanit. tuenda. Ut lavit, sumpsitque cibum, dat membra sopori: Namque hæc iusta seni.

Somnus verò immodicus membra omnia laxat; colorem, habitumque corporis deteriorem reddit, caput gravat, multisque vaporibus atque humoribus implet, calorem nativum hebetiorem, partesque omnes ad motum pigriores reddit.

Hæc omnia dependent ex nimia excrementorum retentione, quæ ex somno immodico contingit. Notissimum enim est, somnum omnes evacuationes cohibere, præter sudores: atque adeò, postquam concoctiones peractæ sunt, quas sequi debet excrementorum evacuatio, si illa in corpore præter modum retineantur, omnia mala in theoremate recensita producant.

In somno salubriter ineundo tria spectanda sunt: tempus, spatium, & decubitus.

Tempus somno convenientissimum est nocturnum, post horam unam aut duas à cœna, præmissa levi deambulatione, ut cibus ad inferiora descendat.

Nox propter suam humiditatem & tranquillitatem somno est aptissima, & longum illius spatium satis temporis suppeditat ad coctionem absolvendam: ita ut somnum interrompere negotiorum causâ, non sit necesse, quemadmodum in diurno somno plerumque solet contingere.

Somnus meridianus maximè noxius est, præcipuè non assuetis.

Tempus enim, quo quis interdiu dormit, ad perfectam concoctionem non sufficit; hinc fit, ut ii qui à prandio dormiunt, excitati à somno, propter interruptam coctionem gravitatem sentiant in stomacho, acidos edant mæcus, flatibus impleantur, & hora cœnæ inappetentia

laborent. Adde, quod somnus diurnus, nimia humiditate cerebrum implens, catarrhos, aliosque capitis morbos procreat. Implet autem cerebrum humiditate, quod nox cerebrum abundè satis humectavit, ut non opus sit illud denuò per somnum diurnum humectare; quin potius per vigilias humiditas, quæ plerumque nimia est, discutienda.

Si quis tamen propter labores matutinos, aut corporis debilitatem, ut in convalescentibus contingit, lassitudine teneatur, ut nocte prægressa non dormierit: somno indulgere post meridiem innoxie poterit.

Imò verò utilis esse poterit somnus meridianus, si brevissimus sit, qui tantum caloris revocet ab externis partibus ad interiores, ut concoctio melius perficiatur.

Cum enim minimo temporis spatio daret, vaporibus caput replere nequit, & tamen vires recreat, vaporesque in cerebro potius dissipat, quàm colligit; calore intus tantisper revocato.

In longissimis etiam & calidioribus diebus meridiari licet, iis præsertim, qui affucti sunt.

Cum enim noctes breves, & sæpè inquietæ, somnum sufficientem interdum non concedant, defectus ille somno meridiano reparari potest. Adde, quod spiritus resoluti à nimio æstu, per somnum refarciantur. Talis autem somnus affuctis magis prodest, quod Itali experiuntur, qui per æstatis decursum meridiari consueverunt, & inde maximum solatium percipiunt.

Quoties ob prædictas causas somno meridiano indulgendum est, ille somnus aut longissimus esse debet aut brevissimus.

Quod brevissimus esse debeat, ratio reddita est. Longissimi verò hæc est ratio, etiam supra allata, quia si ante absolutam coctionem somnus interrumpatur, perturbatur ea, & inde multæ orientur cruditates.

Minus verò nocet somnus meridianus, si erecto corpore capietur, quàm decumbente: sic enim facilius ascendentibus vaporibus exitus patet.

Necque statim à prandio dormiendum, sed aliqua mora est necessaria, & levis deambulatio, ut cibi ad fundum ventriculi descendant.

Spatium somni definitur ex perfecta concoctione, quæ in ventriculo & hepate absolvitur; quæ ex coctis urinis & actionum claritate dignoscitur.

Cum igitur in quibusdam promptius, in aliis tardius coctiones perficiantur, in his longior, illis brevior somnus concedendus est.

Sic de helluonibus, repletis, pituitosis, mulieribus, & ventriculum debiliorem habentibus, somnus longior necessarius est, quia longiori caloris retractione indigent: Brevior verò crassis & obesis, sobriis, & validè concoquentibus competit: mediocris denique sanis ac bene temperatis, qui vulgò septem vel octo horarum spatio definitur.

Decubitus debet esse capite sublimiori, in latere alterutro: primum quidem in dextro, postmodum verò in sinistro. Pronus decubitus ad coctionem confert, visui tamen nocet. Supinus excrementorum evacuationem per consuetos meatus prohibet, calculosis imprimis noxiosissimus est, Vid. Plemp.

Erectior decubitus facit, ut caput ab excrementis facilius liberetur. In latere dextro facit, ut cibus facilius in imum descendat & respiratio sit faciliior: in sinistro, ut melius concoquatur, ob jecur ventriculo incubans. His addit Aristoteles in problematis, non recto, sed inflexo corpore, ut venter incalescat.

Vigiliæ moderatæ omnes sensus excitant, ac vegetiores reddunt, spiritus & calorem in omnes corporis partes diffundunt; alimenti distributionem adjuvant; excrementorum evacuationem promovent. Immoderatæ verò spiritus absumunt, & dissipant corpus universum, imprimis cerebrum exsiccant; bilem augent, aciunt, inflammanant, ac morborum calidorum sæpe causa existunt: interdum etiam frigidorum, calore dissipato & absumpto.

## CAPUT XXIX.

### De Excretis & Retentis.

*Ad excreta & retenta referuntur fæces alvi, urina, insensibile*



# Cap. XXX. De Animi Pathematis. 119

filis transpiratio, menses, & semen. Quæ si tempestivè egerantur sanitatem conservant, si verò retineantur diutius, quam par sit, morbos pariunt.

Alvi excrementa, si debito tempore non ejiciantur, coctionem impediunt, inappetentiam excitant, & nauseam pariunt, quia vapores putridi, à retentis excrementis elevati, ad caput exhalant, dolores colicos excitant, & flatibus ex-  
tu prohibitis vertiginem & cephalalgiam afferunt.

Dum verò secundum naturam se habent, mollia sunt, mediocrem tamen consistentiam habentia, colore subru-  
fa, nec admodum fœtida: copia autem assumptis respon-  
dere debent.

Urina naturalis, mediocris esse debet consistentiæ, coloris  
fulvi, sine sedimento, aut cum sedimento, albo, lævi, &  
æquali: quantitate liquidis assumptis respondens.

Transpiratio insensilis si prohibeatur, vel occlusionem poro-  
rum externorum, à frigore ambiente; vel internorum à  
pravis humoribus retentis; gravissimi morbi excitantur,  
ut pleuritides, peripneumonix, febres putridæ. Quando  
verò legitima sit & conveniens transpiratio; corpus sa-  
num ac bene dispositum conservatur.

**H**ic diligenter advertenda sunt, quæ de insensili tran-  
spiratione prodidit Sanctorius lib. de statica medici-  
na, ubi dicit, transpiratione insensili multò plura & co-  
piofiora excrementa vacuari, quàm omnibus aliis eva-  
cuationibus simul sumptis: quod quidem omnium sæ-  
culorum Medicos latuit. Id tamen sibi compertum asse-  
rit Sanctorius, experimentis triginta annorum, in cor-  
poribus innumeris ante & post pustus, & post excremen-  
torum rejectiones exactè ponderatis: Quæ omnia apud  
authorem videnda sunt, aut apud Sennertum, in febrium  
putidarum theoria, fidelissimè transcripta.

Mensium fluxus debet esse moderatus, mulieris tempera-  
turæ & consuetudini conveniens; certa intervalla, cerias-  
que periodos observans. Alioquin dum supprimitur, vel par-  
ce aut immodicè fluit, multorum morborum causa esse  
solet.

Ad seminis excretionem refertur Veneris usus: qui si mo-  
deratus sit, vel tudini non officit. Eo tamen homines ple-  
rumque impune carere possunt, ut experientia docet in mo-  
nachis, & cœlibem vitam agentibus: in iis enim materia se-  
minalis ad partes diversas transmittitur, in earumque ali-  
moniam insumitur; partes verò seminales arescunt, & ad  
munus suum ineptæ redduntur. In quibusdam tamen mulie-  
ribus magis noxia est Veneris abstinencia, quibus semen re-  
tentum corrumpitur, & hystericos affectus parit.

Immodicus autem Veneris usus viros magis quàm feminas  
lædit: spiritus dissolvit, totum corpus refrigerat, cerebrum,  
nervos, ventriculum, oculos, & articulos debilitat; men-  
tem, sensusque obtundit; cruditates, & oris fœtorem parit.

Ætas Veneri aptissima, est juvenilis & virilis: reliquis  
nocet, potissimum senibus & naturis siccis ac debilibus.

Intervalla autem talia adhiberi debent (docente Gale-  
no in arte parva) ut homo post cœtum levior scipho & agi-  
lior factus videatur.

Vernum tempus Veneri magis idoneum est, deinde hyems,

minis autumnus, omnium minimè æstas, quo tempore me-  
lius est omnino abstinere.

Quoad partes dici spectat, manè aut post primum som-  
num opportunè venus instituitur, peracta concoctione cibo-  
rum in ventriculo: non statim post cibum. Importuna verò  
& noxia post crapulam exercitia valida, tempore inediæ,  
aut post immodicas evacuationes.

## CAPUT XXX.

### De Animi Pathematis.

**A**nimi Pathemata ad immutandam totius corporis con-  
stitutionem maximam vim habent: Ita ut non solum  
gravissimi morbi, sed etiam mors interdum ex immodico  
eorum excessu oriatur. Si verò in moderatione contineatur,  
ad sanitatem conservandam plurimum conferunt.

Quisquis igitur sanitatis conservationi studere cupit, ani-  
mi tranquillitatem aucupari debet, & vehementibus passio-  
nibus resistere. Sic enim corpus in statu naturali conserva-  
tur, & nulla in eo ex parte pathematum, mutatio contingit.  
Quia verò impossibile est ab omnibus pathematis sese immu-  
nem reddere: enitendum summa rationis vi, ut illis obsta-  
mus, eorumque impetus frænemus. Horum autem pathema-  
tum, aut saltem præcipuorum effectus, paucis exponendi sunt.

Gaudium moderatum, inter relictos animi affectus, ad sa-  
nitatem conservandam principem locum obtinet: ex eo enim  
calor, spiritus, & sanguis ad totum corpus diffunduntur,  
undè facultatum vigor excitatur, habitus corporis alitur,  
humeflatur, & vivido colore diffunditur, hinc illud Sa-  
pientis; animus gaudens ætatem floridam reddit. Gau-  
dium verò immodicum spirituum substantiam dissipat, & vi-  
talis facultatis robur dissolvit: unde syncope, & interdum  
mors repentina succedit, præcipue in senibus, mulieribus,  
& naturis imbecillioribus.

Tristitia calorem nativum debilitat, corpus refrigerat &  
exsiccat, & faciem reddit decorem, pulsumque imminuit,  
propter cordis constrictionem interdum febrem incendit, ob  
diffusionem prohibitam, ex quo putredo in humoribus accen-  
ditur. Avicenna lib. de viribus cordis, cap. 6. Duo ex tri-  
stitia consequi testatur: naturalis facultatis imbecillitatem,  
ob caloris extinctionem, & spirituum humorumque increas-  
sationem à frigiditate, unde humor melancholicus exagger-  
ratur.

Timor subito calorem ad cor revocat: unde partes extimæ  
algescunt, pallent, contremiscunt, dentes strident, vox in-  
terrumpitur, vires concidunt: interdum alvus solvitur, &  
urina profunditur, ob retentricis imbecillitatem, & muscu-  
lorum resolutionem: mors interdum succedit, revocato mag-  
nâ copia sanguine, ad cor, à quo opprimitur & extinguitur,  
facultas vitalis.

Ira calorem & spiritum vehementer exagitat; pulsum  
auget, accelerat spiritus & sanguinem inflamat, bilem  
acuit, febres diarias & putridas accendit: si valdè effrænis  
sit rationem subigit, & interdum de sede sua dimovet, fri-  
gidis naturis interdum utilis est; calor enim debiliior inde  
excusatur, & vegetior redditur.



## INSTITUTIONUM MEDICARUM

## LIBER QUINTUS.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΝ CONTINENS.

## PRÆFATIO.

Quinta Medicinæ pars, quæ *Therapeutice* nominatur, in duas principales dividitur.

Prima continet methodum generalem medendi, & indicationes omnes proponit, quæ ad morborum curationem sunt necessariae.

Secunda instrumenta docet, quæ ad illas indicationes adimplendas sunt necessaria.

Ideò quintus iste liber duas partes continebit.

In prima methodus generalis medendi: in secunda, instrumenta Medici exponentur.

## THERAPEUTICES

## PARTIS PRIMÆ,

*De Methodo Generali Medendi,*

## PROOEMIUM.

**M**ethodus medendi duplex ab authoribus proponitur: generalis scilicet & particularis. Generalis est, quæ communia tradit præcepta, quibus singula morborum genera curari debeant: & ostendit, quæ remedia morbis similaribus, quæ organicis, quæve communibus idonea sint. Particularis verò docet, quomodo singulæ morborum species, in singulis partibus, à capite ad pedes curandæ sint. Quæ quidem methodus observatur in auctorum operibus, quos Practicos vulgò vocant: & hæc morborum particularium curatio universa dependet ex communibus præceptis, quæ in methodo generali proposita sunt. Imò verò nihil aliud est, quàm methodi generalis, per omnes morborum species, & singulas corporis partes exercitatio. Quia verò dogmatica medendi methodus per indicationes perpetuò procedit, ideò noster hic Tractatus quatuor comprehendetur Sectionibus: *Prima* erit de methodo medendi, & indicationibus. *Secunda*, de indicationibus à causa. *Tertia*, de indicationibus à morbo. *Quarta* denique, de indicationibus à viribus. Et sic nullum erit præceptum morborum curationi inserviens, quod quatuor hisce Sectionibus non explicetur.

## SECTIO PRIMA.

*De Methodo Medendi, & Indicationibus.*

## CAPUT PRIMUM.

Quid methodus medendi, quid curatio, & quæ illius conditiones?

*Methodus medendi est pars Medicinæ, quæ per indicationes auxilia invenimur; ut deperdita hominis sanitas restituatur.*

*Curatio est presentis in corpore vitiosi affectus in naturalem habitum mutatio.* Galen. 9. meth. cap. 15.

*Debet autem institui curatio, quantum fieri potest, citò, & tuto, & jucundè.*

**M**ethodus medendi, & curatio morborum, parum inter se differunt, si quidem methodus medendi

nihil aliud est, quàm rationalis via, quæ Medicus in morborum curatione debet incedere. Et hac medendi methodo quæ per indicationes progreditur, Medici dogmatici à reliquis sectis distinguuntur; quia illi soli indicationibus, tanquam propriis instrumentis, uti consueverunt: reliqui verò minimè. In omni autem curatione propositæ conditiones perpetuò observandæ sunt, iisque tanquam firmissimis fundamentis inniti debet vera atque rationalis medendi methodus. *Tuto* itaque curatio progreditur, si morbum expellat, quantum fieri poterit, sine metu recidivæ, & nullam vel quàm minimam ægrotanti noxam attulerit, adhibitis nimirum remediis, frequenti usu & longâ experientia cognitis. *Citò* verò fiet curatio, si nulla agendorum occasio prætermissa fuerit, & remedia efficacia, ac morbo æqualia, vel etiam potentiora fuerint usurpata. Denique *Jucundè* curatio exercebitur, si inter remedia, morbo expugnando aptiora, ea imprimis eligantur, quæ & gustui gratiora sunt, & cum minori ægrotantis molestia usurpantur: quemadmodum docet Hippocrates. Primum dietâ curationem esse tentandam, mox pharmaceuticis remediis, priusquam ad ferrum & ignem deveniatur; tum sic accidentia, morbos consequentia ut sitis, dolor, vigiliæ, blandè leniantur, atque demulceantur.

## CAPUT II.

*De Indicationibus, & Earum Differentiis.*

*Indicatio est comprehensio juvantis, una comprehensione nocentis, quæ simul cum re indicante adveniat sine ulla experientia, aut ratiocinio.* Gal. lib. de opt. sect. cap. 11.

**I**ndicatio Græcè *ἰνδύζω* dicitur, quæ nihil aliud, quàm ostensionem seu delationem significat; atque ita, cum in methodo medendi usurpatur, significat ostensiones auxiliorum. Indicantia enim indicata quasi deferunt, & ad curationem utilia esse indicant, ac veluti digito demonstrant. Indicationem definit Galenus 2. *method. cap. 7.* agendi insinuationem, quæ ferè nominis explicatio est, quoquo modo illius naturam adnumerans. Perfectior habenda est illa, quæ proponitur in theoremate, desumpta ex eodem Galeno lib. *de optima secta*, in qua Galenus *primum* genus conveniens proponit, dum ait esse comprehensionem seu notionem quandam, Medico atque ægrotanti insitam à natura, ex rei molestæ sensu, ad ejus expulsionem: *Deinde* propriam differentiam addit, dum vult, hanc notionem proficisci ex rei nocentis naturâ cognitâ ad juvantis auxilii perceptionem, id est, à cognitione effectus præternaturalis, in ordine ad quem, sive cujus gratia sequitur cognitio juvantis auxilii. *Denique* indicatio advenit sine experientia aut ratiocinio, quia ubi primum patuit natura rei molestæ, ex insito quodam principio statim indicatur seu infertur genus ipsius auxilii. Nam percepto frigore calorifica inquirimus, infixam acum evelimus similiaque absque discursu præstamus. Advertendum enim est, res præter naturam remedia indicare, non per se; sic enim sui destructionem molirentur: sed per accidens, quatenus molestiam animanti inferentes sui depulsionem insinuant, & per communem quandam notitiam contrarii usum.

Adversus propositam doctrinam *objici* potest. Si inventio remedii ex communi quadam notitia & insito principio dependet, sequetur idiotas quoslibet à peritis artificibus nihil



nihil differre, & rei medicæ æquè esse peritos, ac ipsos Medicos. Respondendum est maximum esse discrimen, non quidem in primis ac generalissimis indicationibus, quæ in sublatione rei præternaturalis & contrarii usu versantur, illæ enim omnibus communes sunt; sed in ipso progressu. & specialibus indicantibus, ad quas adimplendas necesse est genera remediorum, seu materiam medicam habere perfectam; tum enim morbos, eorundem causas atque symptomata rectè distinguere, necnon remedii formam, qualitatem, quantitatem, locum, tempus, & exhibendi modum accuratè indagare, in quibus omnibus maximè ratiocinatio expetitur, & variâ inter ipsos Medicos peritiâ elucescit. Ex quibus concludendum est, quamvis indicatio primariò & generatim sine ratiocinio eliciatur, attamen secundariò & speciatim eo maximè indigere, ita ut quamplurimi auctores, non exigui nominis, indicationem retulerint ad tertiam mentis operationem, quæ syllogismus nominatur. Sennertus corrigi in textu Græco, sine λογισμῷ id est, ratiocinio, & ponit ἀναλογισμῷ: & sic omnis ambiguitas tollitur.

*Hæc autem indicatio quadrisariam dividi potest.*

*Primò, alia est indicatio conservatoria, alia curatoria.*

*Indicatio conservatoria respicit res naturales, quæ conservandæ sunt per similia.*

*Indicatio curatoria respicit res præternaturales, quæ auferendæ sunt per contraria.*

*Secundò, Indicatio alia est generica, alia subalterna, alia specifica.*

*Generica indicatio ea est, quam communis & generica indicantis natura supponit.*

*Subalterna, quam subalterna indicantis natura suggerit.*

*Specifica quæ à speciali indicantis naturâ petiuntur.*

In hac indicationum serie totum Medici Dogmatici artificium constituitur, cui insistenti methodum sequi dicitur, progrediendo nimirum à generica indicatione per subalternas, ac específicas & determinatas, ut docetur à Galen. 2. meth. cap. 7. Quisquis, inquit, conderi methodum parat, huic à primis indicationibus est auspicandum, atque hinc à eas, quæ deinceps sunt, transeundum, rursusque ab his ad proximas: Itaque pergenti non prius consistendum, quàm ipsius composui finis. Finis autem est invenire cuique morbo remedia. Hujus methodi & seriei indicationum exempla desumi possunt ab omnibus morbis. Proponatur v. g. curanda frigida ventriculi intemperies in secundo gradu: primò adest morbus, à quo sumitur indicatio generalissima, eum esse tollendum. Secundò est morbus intemperiei, à quo sumitur indicatio subalterna, esse alterandum. Tertiò est intemperies frigida, à qua sumitur indicatio itidem subalterna, esse calefaciendum. Denique est intemperies frigida in secundo gradu, à qua petitur indicatio specifica, esse adhibendum medicamentum calefaciens in secundo gradu: & ultra ars non progreditur, nec ultra infimas species methodus descendit.

*Tertiò, Indicatio alia est inartificiosa, alia artificiosa.*

*Inartificiosa est, quæ aliis, quam artificibus, & ipsi vulgo innotescit.*

Eadem omninò est hæc inartificiosa indicatio cum ea, quam suprà genericam appellavimus, quemadmodum docet Gal. 3. method. cap. 7. indicatio, inquit, quæ à morbo sumitur, est velut principium, vel carcer, unde medendi ratio promittitur; nulla prorsus ipsius medicæ artis adhuc portio, aut certe nec magna, nec propria, sed quæ etiam sit communis.

*Artificiosa indicatio est, quæ non omnibus, sed artificibus tantum nota est, & ut cognoscatur, magno artificio indiget.*

Quemadmodum indicationes genericæ inartificiosæ sunt, ita subalternæ magis artificiosæ ac multò magis specificæ: quia difficilius, & cum magno artificio cognoscuntur, idèò medendi methodo propriæ.

*Quartò, alia est indicatio utilis, alia inutilis.*

*Utilis indicatio illa est, cui aliqua respondet materia, seu quæ tale auxilium indicat, cujus materiam reperire licet, quæ primò, & per se effectum tollere possit.*

*Inutilis indicatio est, quæ tale auxilium indicat, cujus non invenitur materia, quæ affectum primò & per se tollere possit.*

Lazar. Riverii Opera.

Quidam affectus præter naturam utiles præbent indicationes; alii verò inutiles V. g. in calida, vel frigida temperie indicatio utilis est, quia multæ dantur materiæ, quibus eam possimus corrigere: at obstructio quæ indicat aperiendum esse, inutilem indicationem suppeditat: quia nullum datur medicamentum, quod per se obstructionem tollat; sed obstructionis apertio consequitur ad alia, nempe incisionem, attenuationem, detentionem, & ad evacuationem materiæ obstructantis.

## CAPUT III.

### De Indicantibus.

*Indicans est agens aliquod in corpore permanens, quod per propriam naturam & essentiam auxilium aliquod indicat, atque indicatum, quod expostulat, ad sese dirigendum esse monstrat, ut sanitas hominis amissa restituatur.*

**H**æc definitio indicans tantum curatorium comprehendit, non autem conservatorium, cujus finis est sanitatem conservare, ut hujus amissam restituere.

*Veri indicantis quatuor sunt conditiones.*

*Prima, ut sit agens aliquod, & corpus afficiat.*

Sic morbus, quia corpus afficit, idque destruit & corrumpit, indicans est, sui que sublationem insinuat.

*Secunda conditio est, ut indicans maneat in corpore.*

Prout enim sui ablationem indicat per remedia corpori adhibenda, sic etiam eidem corpori debet inharere.

*Tertia conditio est, ut Indicans sit notum intellectui.*

Explicatur: quidquid enim indicat, in alterius cognitionem nos deducit, putà indicati, seu remedii; quod autem ignotum est, alterius cognitionem insinuare nequit. Idèò Gal. 3. meth. cap. 6. & passim alibi, quæ occulta qualitate agunt, & idèò intellectui nota non sunt, à methodo medendi, quæ indicationibus perficitur, solet excludere.

*Quarta conditio est, ut indicans unum indicet, quemadmodum unum tantum ab uno indicatur.*

Hoc axioma traditur à Galen. 1. 1. meth. & lib. de optima secta: & illius ratio est, quod indicans perpetuò sui contrarium indicet, à quo auferatur: at unum uni tantum contrarium est. Adverte tamen affectum, qui unus appellatur, sæpe compositum esse; idèò quatenus compositus est, plura indicare potest, seu ut Galen. loquitur, 9. meth. c. 11. Quod simplex est, simplicem indicationem habet; quod non simplex, etiam non simplicem. Adverte etiam, unum indicans habere esse genericum, subalternum, & specificum, & prout diversam habet naturam, plura indicare posse: sed tamen per unam essentiam unum tantum, per genericam remedium genericum, per subalternam subalternum, per specificam specificum indicat.

*Indicantia vera & propria duo sunt: morbus, & causa morbi.*

Indicans est res præter naturam, quæ auferenda est contrariis remediis: Remedia autem causæ morbificæ & morbo adhibenda sunt. Primò quidem causæ, quandoquidem, ut docet Galen. 7. meth. cap. 12. impossibile est ullum affectum ad perfectionem sanari, manente adhuc affectrice ejus causâ. Quamvis autem idem Galenus præservationem causis propriè deberi asserat, undè nonnulli causam indicans præservatorium nominant: hoc tamen audientum est de præcautione causarum imminuentium & futurarum, non earum, quæ jam actu morbos in nobis producant, in quarum averlione & curatione versatur plerumque tota curationis vis; nemo enim unquam febrem à putredine profectam, nisi illâ sublatâ, curaverit. Si velis igitur cum Gal. loqui, sit hæc præservatio curatoria, cum aliis simpliciter præcautio dicatur in statu salubri & neutro. Morbo etiam curatio debetur, quia ille, sublata causa, sapientissimè adhuc permanet, imò verò intemperies interdum nuda & per se sine ullius causæ præsentia, diutissimè perseverat, ut in febre hectica videre est: tum in plerisque morbis contraria est indicatio, quæ ab affectu morbofo petitur, illi quæ causa suppeditat: ut in quotidiana febre, quæ in propria

Q

essentia



## 122 Institutiones Medicæ, Lib. V. Pars I. Sect. I.

essentia refrigerari vult, at ratione causæ, quæ pituita esset calefacientia requirit. Porro ex definitione indicantis, supra propositâ manifestè apparet, errare eos, qui vires inter vera indicantia numerandas esse contendunt: quandoquidem omne indicans therapeuticam sui sublationem exposulat, sed vires perpetuò conservandæ sunt, igitur magis appositè coindicantibus annumerandæ sunt, cum in morbo considerantur: quamvis in statu salubri, & in ea parte, quæ *ὁρμή* nominatur, vires propriè & verè indicent, quia omnis indicatio, quæ in illa parte consideratur conservationem respicit. Ergo uno verbo concludendum est, vires in parte Medicinæ conservatoria esse verum indicans: in curatoria verò tantum coindicans.

*Symptoma inter indicantia non potest numerari.*

Licet indicationes à rebus præter naturam desumantur, hæ verò ternario numero comprehenduntur, prout morbum, causam morbi, & symptoma continent, omnes tamen indicationes à morbo & causâ morbificâ tantum desumuntur, nullæ verò à symptomate: quia symptoma ita dependenter à morbo essentiam suam atque existentiam mutuatur, ut eo sublato confestim evanescat. Et quamvis symptomati mitigatio debeatur; quæ curationi subalterna est; tamen id fit, non quatenus symptoma est, sed quatenus causæ rationem obtinet, & morbum suâ præsentia vel producere, vel augere potest. Sic hæmorrhagia sistenda est, quia frigida intemperiei, & mortis causa esse potest: aquæ hydropicorum educendæ, quia jecoris intemperiem augent: dolor in vulnere, aut inflammatione sedandus est, quia impetum auget fluxionis, & vires prostermit.

### CAPUT IV.

#### De Coindicantibus, Contraindicantibus, & Correpugnantibus.

*Coindicantia sunt, quæ propriè remedii usum non indicant, sed indicationis tantum id suadentis efficaciam augent, vel faciliorem reddunt.*

*Ea verò sunt res naturales, & non naturales.*

*Ad res naturales referuntur vires, temperamentum, ætas, sexus, consuetudo, & vitæ genus: tum pars affecta, ejusque substantia; temperamentum, actio, figura, situs, connexus, sensus exquisitus, vel obtusus.*

*Ad res non naturales referuntur sex illæ res hoc nomine donatæ: nimirum aër, cibus & potus, motus & quies, somnus & vigilia, excreta & retenta, & animi pathemata.*

*Ad aërem verò refertur domus, regio, anni tempus, dies, hora, venti, Lunæ quadræ, & varii cæli astrorumque positus.*

**Q**uemadmodum veræ & propriæ indicationes à rebus præter naturam desumuntur, sic coindicantia à rebus naturalibus & non naturalibus peti debent. Et quantumvis remedia primariò non indicent; secundariò tamen id præstant, & sine diligenti earum animadversione rectus eorum usus constare nequit. Ideò Galenus sæpe in *libris methodi*, quæ verè sunt coindicantia, simpliciter indicantia nominat, latiori tamen nominis acceptione: quod diligenter observandum est, ne Galeni lectio confusionem pariat. Primò igitur rerum naturalium vera & propria indicatio est conservatio, quatenus autem natura morbos curat, & remediis utitur tanquam instrumentis, eaque reducit de potentia in actum: illius vires expendendæ sunt, ut pro modo earum aestimetur remedii efficacia, atque ita si morbus vehemens postulet remedium, & vires sint validæ, illiusque vim ferre queant, tunc coindicare dicuntur. Sic etiam temperamentum calidum, in morbo calido coindicat remedia refrigerantia, & contrà. Tum verò qui plurimum à naturali statu distat morbus, vehementioribus eget remediis; qui verò à statu naturali minus recedit, ægriusque naturæ & temperamento naturali cognatus est, mitioribus remediis curandus est. Idem præstare solent ætas, sexus, consuetudo, idiosyncrasia, & vitæ genus, quæ particularem virium & temperamenti statum patefaciunt. Deinde, post considerationem totius, partis etiam affectæ

habenda est ratio, quæ in usu remedii potenter coindicat; considerando nimirum illius substantiam, temperamentum, figuram, situm, connexionem, & actionem, necnon sensum exquisitum vel obtusum, pro quorum varietate usus auxilii immutandus est. Denique res non naturales coindicant, quia varius earum status usum remedii variè immutare solet. Sic aër æstivus in morbo calido remedii refrigerantis indicationem adjuvat, & fortius adhibendum esse demonstrat, quàm si aëre frigidiori vel temperato existente, morbus contigisset: & ita de reliquis est sentiendum; quanquam aër cæteris rebus non naturalibus majorem in coindicando habeat potentiam.

*Contraindicantia sunt, ea quæ verè & ex diametro indicantibus opponuntur.*

Nomen ipsum satis ostendit contraindicantia indicantibus esse contraria. Cum autem contraria sub eodem genere collocari debeant, & indicantia propria atque primaria sint res præternaturales; ita contraindicantia sunt etiam res præternaturales, quæ indicantibus opponuntur; ut quando morbus morbo contrarius est, vel causa causæ, item morbus causæ, vel causa morbo, & contrarium remedium indicat. Sic calida hepatis intemperies indicat refrigerantia: huic autem frigida ventriculi intemperies contraindicat, cum ambæ in eodem individuo reperiuntur, quod sapissime contingit. Sic etiam febris quotidiana ratione sui refrigerantia indicat: causa verò contraindicat, quæ est humor pituitosus, & calefacientia potius exposcit.

*Correpugnantia sunt ea, quæ coindicantibus opposita sunt.*

Quemadmodum vera indicantia dicuntur indicantia primaria, & coindicantia indicantia secundaria; ita contraindicantia vera vocantur contraindicantia primaria, & correpugnantia vocantur contraindicantia secundaria. Hæc autem correpugnantia sunt eadem genere cum coindicantibus, nimirum res naturales, & non naturales; sed quatenus remedio à morbo vel causâ morbificâ indicato resistunt, & illius usum adhortantur; ut quando purgatio vel venæ sectio à causa morbificâ indicatur, vires autem sunt debiles, tum illæ correpugnare dicuntur, vel contraindicare contraindicatione istâ secundariâ. Sic etiam febris putrida in diebus canicularibus purgationem indicat ratione causæ, aër verò calidior repugnat, vel contraindicat: & ita de aliis est sentiendum. Hic autem advertendum est, Correpugnantia nomen rarò esse in usu apud auctores, sed contraindicationis nomen pro primaria & secundaria indiscriminatim usurpari.

### CAPUT V.

#### De Indicatis.

*Indicatum est istud, quod à natura indicantis sequendum demonstratur, ut illius efficaciam, dispositio præter naturam auferatur.*

**H**inc patet Indicatum nihil aliud esse, quàm remedium: quod Galenus *lib. de constitut. art. med. cap. 4.* dicit esse quidquid corpus juvat, dum affectum ad naturalem statum revocamus. Variis autem nominibus usurpatur à Galeno aliisque autoribus. Vocatur enim utile; postulatum, auxilium, præsidium, scopus, & intentio: quanquam scopi nomen in alio etiam sensu usurpetur, ut quando à Galeno scopi venæ sectionis proponuntur, magnitudo morbi, & virium robor: tunc enim scopi indicationes significant. In ò verò indicans primus scopus appellari consuevit; & indicatum scopus secundus.

*Omnis indicati consideratio versatur circa genus remedii, & rectam illius administrationem.*

*Ad genus remedii spectat primus scopus: quo quæritur, quid sit agendum?*

*Ad rectam remedii administrationem spectant quatuor scopi: quibus quæritur, quantum agendum, quo modo, quando, & ubi?*

*Quid agendum, seu genus remedii, ab essentia indicantis seu rei præternaturalis desumitur.*

Sic morbus frigidus indicat esse calefaciendum, calidus refri-



## Cap. VI. De Primo & Gener. Curat Princ. 123

refrigerandum repletio, vacuandum; solutio continui, conjungendum; & ita de cæteris. Per genus autem remedii non solum genus summum intelligimus, sed etiam subalternum & specificum, ut remedia inveniantur; quæ satisfaciant indicationibus genericis, subalternis, & specificis, quæ suprà c. 2. expositæ fuerunt. V. g. febris ratione generis summi, quod est affectus præter naturam, indicat remedium auferens seu removens febrem; ratione generis subalterni, quod est calor præter naturam, indicat remedium frigidum; & ratione generis specifici, quod est v. g. calida intemperies in secundo gradu, indicat remedium frigidum in secundo. Ex quibus facile videre est, qualitatem remedii, & gradus ejusdem, ad genus remedii pertinere: quamvis à nonnullis hæc perperam distinguantur, & malè ab iisdem gradus remedii ad illius quantitatem referatur. Rejiciendum quoque est, quod à nonnullis, & à Galeno ipso traditur: genus remedii à partis natura, dignitate, actione, substantia, situ, ægri viribus, aliisque indicari. Nam ut antea dictum est, unum tantum ab uno indicatur, & omne indicans est res præter naturam. At partis natura, actio, & similia, sunt res naturales: idè juxta fundamenta superius posita, illa tantum coindicant, vel correpugnant. Atque ut Galeni mentem ad exactam doctrinæ normam revocemus, dicendum est, eum Coindicantia nominare, non ut vera & propria indicantia, sed tantum ut indicantia secundaria, quæ ratione sedulo observanda sunt, velut ad curationem maximè conferentia. Sic hepar, cor, & aliæ partes præstantiores non ferunt vehementiora remedia, quæ illorum usui repugnant. Sic etiam, quæ frigida naturæ sunt partes, dum calido affectu laborant, remedia desiderant, quæ validius refrigerant: cum in pari affectu longius à naturali temperie, quam quæ calida sunt, recedant. Eodem modo, quæ sensu exquisito prædita sunt membra, dolorifica remedia non sistent, qualia illorum affectus sæpe possulent. Quæ idem longius ab externa superficie in profundo corporis sunt collocata, validiora, quàm affectus ipse naturæ suæ desiderat, requirunt auxilia. Et internæ partes non admittunt, quæ erodentem, aut venenosam vim obtinent, quibus earum mala sæpe gaudent: ea autem tolerant externæ.

*Quantum agendum, remedii quantitatem significat: illius scilicet dosin, quæ à morbi quantitate seu recessu à naturali statu indicatur.*

Quantitas remedii sæpe etiam pro gradu & vehementia usurpatur, sed exactius philosophantibus ad quantitatem sola dosin referenda est, cum gradus ad genus remedii reducatur, ut superiori theoremate dictum est. Prout autem morbus magis vel minus à naturali statu recedit, dosin major vel minor exhibenda est, quia in majori quanto est majus quale, & sic in majori excessu major dosin præscribenda est, ut morbum superare possit. Multum etiam conferunt ad quantitatem remedii definiendam, indicantia secundaria: quæ tamen verè non indicant, sed tantum coindicant, aut correpugnant. Sic naturalis temperies partis indicat remedii quantitatem, prout ostendit quantus sit ab ea recessus. Sic partes, quæ in profundo corporis sunt sitæ, majorem dosin remedii postulant, ut facultas eo usque facilius penetrare queat. Sic erisypelas pollicis, minore secundum quantitatem eget oxycrato, quàm cruris aut brachii. Sic inflammatio plurium partium internarum majorem medicamenti frigidi quantitatem exposcit, quæ huic incendio sedando sufficere possit.

*Quo modo, seu utendi modus, nihil aliud significat, quàm an semel, aut bis, partitè vel confertim adhibenda sint remedia: Illa autem à modo affectus præter naturam indicantur.*

Sic quando morbus affligit continuè & violenter, remedia subito & confertim adhibenda sunt. Si causa morbi turgat, & orgasmo teneatur; si bene sit concocta; tenuis & sequax, subitanèam evacuationem poscit. At verò si lentè tantum & per intervalla, & longitudinem potius ex cruditate, quàm periculū minetur, tunc repetitis alterationibus & purgationibus materia alteranda & concoquenda erit.

*Ad modum etiam utendi indicandū non parum conferunt indicantia secundaria, quatenus coindicant, vel correpugnant.*

Sic vires robustæ faciliè assentiuntur repentino reme-

*Lazar. Riverii Opera.*

dio: infirmæ verò ac debiles non nisi benignas & partitas ferre possunt mutationes. Sic etiam tenuis & rara partium substantia, vel exquisitior sensus, vix ferre potest vim præcipitem vacuantis aut alterantis auxilii, quam solida & densa, vel obtusioris sensus faciliè sustinet. Situs etiam valdè remotus per vices id præstandum suadet, ut tandem remedium eousque penetrare possit, salva interjectarum partium temperie. In parte etiam nobili cautè agendum, partitis vicibus, ne graviolem noxam ex illius subita mutatione toti corpori inferamus.

*Quando agendum, est tempus opportunum, & occasio conveniens administrationi remediorum.*

*Illud autem duplex est, generale & particulare.*

*Tempus generale est unum ex morbi quatuor temporibus, quæ vocantur principium, augmentum, status & declinatio.*

Sic Gal. lib. de opt. sect. cap. 37. docet, quo morbi tempore frigida potio sit administranda: an scilicet in principio, vel augmento, vel statu, vel declinatione. Sic in principio inflammationum docent Practici repellentia esse applicanda; in augmento, resolventia cum repellentibus: & ita de cæteris.

*Tempus particulare, sunt dies & hora exhibendi remedii.*

Sic idem Gal. eodem loco docet, quo die & qua diei hora aqua frigida sit exhibenda. Sic purgans medicamentum sexto die, vel alio pari, & matutinis horis exhibendum.

*Ad tempus etiam revocatur ordo remediorum, ut malè nonnulli ordinem à tempore distinguant, illiusque ratione diversum scopum constituent.*

In affectu simplici vel composito, si plura remedia sunt usurpanda, ut perpetuè ferè contingit, videndum est, quo tempore unumquodque administrandum sit, & hoc ad ordinem spectat. V. g. ratione febris, aqua frigida est exhibenda; ratione causæ, vena secanda; dum autem tempus cuique opportunum præfinitur, ordo simul stabilitur, qui in eorum celebratione est observandus.

*Tempus autem, & occasio, & ordo remediorum indicantur à præsentia urgentioris indicantis.*

Quando & quoties malum urget, perpetuè ei occurrendum est. Idè præsentia morbi, vel causæ morbificæ, indicat tempus & occasionem remedii adhibendi. At verò quando plura urgent occurrendum est urgentiori. In horum autem usurpatione habenda perpetuè ratio coindicantium, & contraindicantium. Licet enim affectus præsentia remedium hoc tempore esse usurpandum suadeat, tamen virtus aut natura particularis ægrotantis, aut ali-quid aliud prohibere possunt.

*Ubi agendum, significat locum in quo, & per quem remedia administranda sint: & indicatur à loco indicantis.*

Si morbus vel causa morbi totum corpus occupet, toti corpori remedia adhibenda: si unam tantum partem obsideat, ei tantum parti remedia convenient: si extremæ partes afficiantur, exterius erunt adhibenda: si internæ, interiorius erunt assumenda: & si per utramque viam remedii vis ad locum affectus ferri possit, utrumque admovendum.

*Ad locum etiam remedii indicandum non parum conferunt Coindicantia, seu res naturales, & præcipuè partium conformatio, situs, & connexio.*

Si ventriculus per vomitum & secessum, hepatis cava dejectione; convexa, urinarum provocatione potissimum expurgantur. Affectis intestinis remedia per anū infundimus.

*Eodem modo correpugnantia consideranda sunt, quæ impediunt remedii usum.*

Verbi gratia orificium ventriculi inflammatum exterius esset refrigerandum, ni diaphragmatis vicinia impediret; quemadmodum ejusdem refrigerati calefactionem hepatis lobus ei superjacens prohibere solet.

### CAPUT VI.

#### De Primo & Generalissimo Curationis Principio.

*Omnis curandi methodus à primo hoc & generalissimo principio desumitur: contraria contrariis curantur.*

**Q**uamvis de principiis minimè disputandum sit, sed ea tanquam vera & indubitata supponenda sit: quemadmodum



## 124 Institutiones Medicæ, Lib. V. Pars I. Sect. II.

admodum Galenus de hoc ipso *artis curativæ principio* refert, in Medicina tam certum esse, contraria contrariorum esse remedia, quàm in mathematicis, bis duo quatuor efficere; & hoc principium non tantum hominibus, sed etiam brutis esse à natura insitum. Nonnullæ tamen *objectiones* illius veritatem primâ fronte convellere videntur.

*Prima.* Tetanus morbus frigidus est, & frigida affusione curatur, dolor dolore tollitur, vomitus vomitu, alvi fluxus alvi fluxu.

*Secunda.* Omne contrarium contrarii adventu magis intenditur: quemadmodum torpentem gelu manum si quis igni exponat, magno vexatur cruciatu: si ambustum digitum frigida inmittat, crudeliùs torquetur, quàm si igni admoveat, aut aquâ vitæ perfundat.

*Tertia.* Purgantia medicamenta sunt humorum peccantium propria remedia: sed illa humores purgant familiaritate substantiæ, quam habent cum iis; non autem contrarietate.

*Quarta.* Natura morbos tum calidos, tum frigidos curare solet, cum quibus nulla ipsi intervenire potest contrarietas.

*Quinta.* Morbi magnitudinis, numeri, & figuræ, nihil habent contrarium, quo auferri valeant.

His ut satisfiat, dicendum est: Contrarietatis nomen latius patere apud Medicos, quàm apud Philosophos, & contrarietatem non solum spectari secundum formam, sed etiam secundum effectum & operationem. Quidquid enim rei præter naturam auferre potest, vel contrarium effectum inducere, sive per se sive per accidens id præstet, contrarium nominatur. Sic rhabarbarum biliosæ cacoehymiae contrarium dicitur, quatenus eam expurgat: sic ferrum vel ignis carni superflue contraria sint, quatenus eam extirpant. Quibus ita suppositis, ad *objectiones* faciliè est respondere.

Ad *primam* enim dicendum est, Tetanum affusione frigida curari per accidens, aucto per antiperistasin calore in partibus inferioribus: dolorem dolore tolli etiam per accidens, dum novus dolor causam prioris doloris, ad se revellit: vomitum curari vomitu, & alvi fluxum alvi fluxu, vacuatâ causâ, quæ eos committebat.

Ad *Secundam* dicimus, contrariorum conflictum naturæ molestum esse, si repentinus sit & vehemens, si verò moderatus & conveniens, maximè amicum. Sic manus frigore torpescens igni exposita cruciatur, quia subita sit eorum pugna: ut in tepidam coniecta, vel linteolis calidis involuta, restituitur. Et digitus combustus, igni admotus, aut aquâ vitæ perfusus levatur, ratione causæ; quia ejusmodi calidis consumuntur vel avocantur foras scintillæ parti penitiùs infixæ, quas frigida in profundum depellebat.

Ad *tertiam* respondeo, quod licet purgantia sint humoribus peccantibus similia, ratione substantiæ: tamen contraria effectivè dicenda sunt, quatenus eos expurgant, & extra corpus educunt.

Ad *quartam* respondeo, naturam morbis omnibus contrariam esse, quatenus eorum causam vel coquit, vel expellit, vel alio quovis modo expugnat.

Ad *quintam* dicimus, magnitudini, numero & figuræ effectivè contraria esse quæcunque ea auferre vel immutare possunt: ut ferrum, ignis ligaturæ, & similia.

*Illæ autem contraria, quantum fieri potest, debent esse invicem æqualia.*

Æqualitas illa indicatur à natura morbi & causæ morbificæ, qui etiam sui ablationem indicant. At vires, pars affecta, tempus morbi, & aliæ circumstantiæ huic æqualitati repugnant. Ideò addita est theoremati hæc particula, *quantum fieri potest*; quia æqualitas contrariorum ad curationem simpliciter necessaria non est, sed tantum ad commodiùs curandum, si reliqua consentiant.

Æqualitas verò remedii respectu morbi dupliciter consideratur, vel secundum gradum, vel secundum copiam & molem.

Æquale remedium secundum gradum dicitur, quod parè cum morbo recessum à mediocritate obtinet. Sic remedium frigidum in secundo gradu æquale est morbo calido in secundo.

Æquale remedium secundum molem & copiam illud est, quod præter gradum suæ qualitatis ea est quantitate, ut una, duabus, vel pluribus vicibus exhibitum, expugnare possit morbum.

Hoc sensu & mediocre & vehemens remedium adversus eundem morbum æqualitatem obtinere potest, quandoquidem vehemens semel aut bis usurpatum, mediocre verò frequenter morbum tollere potest.

*Præterea, æqualitas in gradu vel actu & realiter existit; vel tantum consideratur respectu operationis.*

Sic in morbis similaribus datur gradus contrarietatis actu existens, ut calidum remedium in secundo, appositum morbo frigido in eodem: at in morbis conformationis, magnitudinis, & numeri dicuntur remedia æqualia juxta operationem, quia scilicet eo usque agere possunt, donec naturalis conformatio, magnitudo & numerus restituantur.

Ex supra propositis dissolvi facile queunt omnes *objectiones*, quæ adversus æqualitatem contrariorum afferri solent, quarum præcipuæ sunt sequentes.

*Prima:* Hippocrates 5. *Epid.* contraria præcipit sensim usurpanda, & intermissionibus adhibitis.

*Secunda:* Galenus secundo, statim ab initio efficacissima prohibet, & à debilioribus inchoandum præcipit.

*Tertia:* Frigoris minor est efficacia quàm caloris, humiditatis, quàm siccitatis: non ergo pari gradu hæc opponenda.

*Quarta:* Morbis calidis vel frigidis in quarto gradu non possunt adhiberi remedia calida vel frigida in quarto, quæ venena sunt.

*Quinta:* Si omnes morbi curarentur contrariis æqualibus, par esset in omnibus agentis proportio ad id, quod patitur. Atque ita eadem velocitas mutationis, ac proinde eodem temporis intervallo omnes ægri sanarentur.

*Sexta:* Reductio, ex Galeno, debet fieri in corporibus sanis per contraria æqualia: ergo in ægrotis validiora erunt usurpanda, qui citiùs oportet morbum tolli, quàm temperamentum naturale.

Denique Paulus initio lib. 4. *Respondeo*, inquit, *mea sententia*, Cæppadox Aretæus memoriæ prodidit, auxiliorum vim morbis fortiores esse oportere, eoque elephantiam nunquam curari, ut quæ nulla fortior medicina reperitur.

Ad *primam* & *secundam* respondendum est: Hippoc. contraria adhibere sensim, & Galenum à debilioribus incipere, habita circumstantiarum ratione, ut scilicet vires frangantur, aut ratione contradicentium: ne cruda materia vehementioribus frustra agitetur, cum tamen ipse morbus æqualia respectu sui semper indicet.

Ad *tertiam* dicendum est: quamvis minor sit frigoris vis quàm caloris, humiditatis quàm siccitatis; quia tamen æqualitatem in ultimo actionis termino spectamus, ideò non minùs hæc dicuntur æqualia, siquidem excessum morbosum ad mediocritatem reducere possunt.

Ad *quartam* respondeo: etiam venena in usum medicum vocari, si ea morbi natura postulet, idoneâ tamen preparatione præmissâ.

Ad *quintam* respondeo: non esse par in omnibus morbis curationis tempus, quia non licet in omnibus eodem tempore uti contrariis æqualibus, propter variam subiecti & circumstantiarum dispositionem: quamvis eorum usus admitteretur, non esset par in omnibus curationis velocitas, ob multas circumstantias cum affectus, tum corporis affecti.

Ad *sextam* dicendum est, quamvis reductio debeat fieri per contraria æqualia; tamen ea non eadem efficacia operatur, quemadmodum in curatione morbi, qui cum in dispositione sit, faciliùs auferitur contrariis æqualibus, quàm temperamentum naturale, quod in habitu est, & ideò difficiliùs corrumpitur. Denique ad auctoritatem Pauli & Aretæi dicimus: Remedia morbi æqualia esse ratione intentionis, esse tamen valentiora ratione effectus, quæ adjuvantur à natura, quæ semper contra morbum cum iis pugnare consuevit.



# Cap. I. De Evacuatione In Genere, &c. 125

## CAPUT VII.

### De Inventione Remediorum.

*Remedia morborum curationi apta triplici viâ inveniuntur : ratione, experientia, & analogismo.*

*Ratione inveniuntur remedia per indicationes, quando morbi & remedii natura nobis cognita est.*

**S**ic febrem refrigerantia indicare dicimus, quia scimus, illius naturam esse calidam, & nobis inimicam, quæ sibi contraria & sui ablationem demonstrat.

*Experientia inveniuntur remedia, quando pluribus exemplis observatum est, aliquod remedium alicui morbo prodesse, etsi effectus illius causa ignoretur.*

Scribit Galenus, artem medicam duplici crure innixam incedere : ratione & experientia. Quod quidem intelligendum est, non de rudi illa experientia, quâ Empyrici & idiotæ in omnibus morbis summa cum temeritate utuntur; sed tantum illa, quæ circa eos morbos, & ea remedia versatur, quorum natura & causa incognita est. Quemadmodum antidota venenis & morbis venenatis opitulari, nullâ docente ratione, sed ipso duntaxat usu novimus.

*Analogismo remedia inveniuntur, quando morbo incognito ea adhibentur remedia, quibus alius affectus cognitus, qui cum eo aliquam habet similitudinem, curari solet.*

Sic in lue venerea, cum primum grassari coepisset, & adhuc ignota esset, remedia quæ in elephantiasi & scæda scabie utilia sunt, non inutiliter usurpata fuerunt.

## SECTIO SECUNDA.

### De Indicationibus à Causa.

## CAPUT PRIMUM.

### De evacuatione in genere, & illius differentiis.

*In legitima curatione causa morbifica primò auferenda est, secundo ipse morbus, si post causæ ablationem superstes maneat.*

**L**EGITIMÆ curationi opponitur illegitima & extraordinaria, quam aliquando usurpare cogimur, cum urgens aliqua intemperies corrigenda est, priusquam causæ demolitionem aggrediamur, aut etiam aliquod symptoma prius est mitigandum.

*Causa autem morbifica multiplex est ut docetur in pathologia. Præcipua tamen & magis ordinaria est humor, quia morbi ab humoribus multò frequentius quàm ab aliis causis producuntur.*

*Humorum autem peccantium præcipuum atque usitatissimum remedium est evacuatio, quæ nihil aliud est, quàm humoris vitiosieductio.*

*Ea verò duplex est, universalis & particularis.*

*Universalis est, quæ communiter ab universo corpore, & tribus illius distinctis regionibus materiam subtrahit.*

*Harum autem regionum prima est, quæ ventriculum, intestina, venas mesaraicas, & reliquos venæ portæ ramos, cava hepatis, lienem & pancreas continet.*

*Secunda regio hepatis convexa, omnemque venam cavam, atque illi comitem arteriam magnam, & aliquid inter alas & inguina comprehendit.*

*Tertia regio musculos complectitur; membranas, ossa, omnemque corporis molem, usque ad extimam cutem.*

*Præter communes illas regiones aliæ multæ sunt quæ particulares appellantur, in quibus etiam asservantur excrementa, ut cerebrum, pulmones, renes, & uterus.*

*Universalis evacuatio fieri consuevit per venæ sectionem alvi dejectionem vomitum, & sudorem. Harum siquidem quæcumque primum obtigerit, quanquam plurimum ac validè regionem unam; ceteras tamen consequutione quadam, licet parcius, evacuat.*

*Venæ sectio primum venas exhaurit & arterias illis anastomosif conjunctas, deinde corporis molem ipsaque viscera,*

*Lazar. Riverii Opera.*

*ad primas usque venas progressa.*

*Alvi dejectione primum intestina, ventriculum, viscera primasque vias expurgat: deinde venas, habitumque corporis.*

*Vomitum primum ventriculum expurgat: deinde viscera, venasque majores postremò corporis habitum.*

*Quæ per sudores fit evacuatio, proximè quidem è corporis habitum dissolvit; secundo è venis arteriisque grandioribus ac postremò visceribus, & ex intima corporis regione materiam pellit.*

*Particularis evacuatio est, quæ à parte quadam peculiari excrementa educit.*

*Hujus generis est cerebri per palatum & nares expurgatio, thoracis per anacatharsin, renum & vesicæ per urinas. Omnis porro evacuatio, vel spontanea est, vel artificiosa.*

*Spontanea evacuatio est, cum citra ullius remedii opem quippiam è corpore effunditur.*

*Eaque rursum duplex: naturalis, & symptomatica.*

*Naturalis est, quando vi solius naturæ bene operantis, vitiosi humores excluduntur.*

*Symptomatica rursum fit, vel ratione facultatis, vel ratione materiæ.*

*Ratione facultatis, quando ea imbecillior humores corporis regere atque retinere nequit eosque prorsus diffluere sinit.*

*Ratione materiæ, quando humor quantitate aut qualitate peccans naturam ita irritat, ut eum è vasis receptaculis suis excludere cogatur.*

*Utraque irrita est, præter naturam, nulloque usui, quod benignus atque salutaris humor pariter cum pernicioso promiscuè, nullisque legibus prorumpat.*

*Artificiosa evacuatio est, quæ remediorum ope perficitur.*

*Eaque duplex est, universalis, & particularis.*

*Universalis est, quæ ab universo corpore humores educit.*

*Particularis quæ ab aliqua tantum parte.*

*Rursum evacuatio ad duplicem præcipuè finem instituitur: revulsionem, & derivationem.*

Quamvis propter alios fines sæpe vacuationes instituantur, ut in progressu patebit; quia tamen revulsio & derivatio frequentius usu veniunt, & majores habent difficultates, ideò sequenti capite seorsim explicandæ sunt cum particulari evacuatione, propter summam quæ inter eas intercedit affinitatem.

## CAPUT II.

### De Revulsione, Derivatione, & Particulari Evacuatione.

*Revulsio est humoris in aliquam partem fluentis aversio ad opposita distantissima, habita fluxus originis, communitalis vasorum, & rectitudinis ratione.*

**E**Vacuatio quæ humori debetur, vel eum respicit quatenus est in motu, vel quatenus quiescit. Humori moventi, seu in aliquam partem fluenti, debetur revulsio aut derivatio: quiescenti verò, vacuatio simplex. Revulsionem verò fieri debere longissimè à parte, quæ fluxione tentatur, constat ex Galeni præcepto, 13. meth. c. 11. & 2. ad Glauconem, c. 2. Et ipsa revulsionis natura id ipsum insinuat: quærimus enim, ne quòd semel revulsus est, retrocedat, quod facilius obtinere licet, si revulsio in contraria & longinqua fiat, neque enim facilè motus contrarii sibi invicem succedunt. Id tamen non simpliciter & absolute accipiendum est, sed tantum suppositis conditionibus sequentibus theorematis exponuntur.

*Oppositio partium, seu contrarietas quæ in revulsione observatur, tribus conditionibus.*

*Prima conditio est, ut revulsio fiat ad fluxionis originem. Quotiescumque fluxionis origo cognita est, illi perpetuò revulsio opponenda est, & ad eam humores retrahendi sunt. V. g. si ab hepate ad uterum fluxio deferatur, venæ cubiti dextri aperienda est, ut ad fluxionis exordium humor revocetur.*

*Huic conditioni adversari videtur illa Galeni sententia, quæ habetur lib. de curandi ratione per venæ sectionem, cap. 8. quæ vult utero inflammatione laborante, venas crurum esse aperiendas. Cui Respondendum est, venas inferiores*



## 126 Institutiones Medicæ, Lib.V. Pars I. Sect.II.

feriores secari in uteri inflammatione, non ad simplicem revulsionem, cujus ratione melius foret à partibus superioribus sanguinem mittere, sed ad derivationem simul cum revulsione celebrandam. Quæ responsione solvuntur etiam alia Galeni loca, in quibus docet, affectis partibus infra renes positis, venas inferiores esse secandas: quod idè fit, ut derivatio simul cum revulsione fiat, cum alioqui sæpe ad simplicem revulsionem, in affectibus earum partium, venæ superiores aperiri soleant.

*Secunda conditio est, ut servetur vasorum communitas.*

Si fluxionis origo teneatur, primam conditionem observare satis est, ut scilicet ad partem mittentem fluxio retrahatur. Sed quando pars illa mittens cognoscitur, quod sæpissime contingit, tunc duæ posteriores conditiones observandæ sunt, quæ respiciunt partem recipientem, ut scilicet illius ratione servetur vasorum communitas, & partium rectitudo. Communia autem vasa sunt, quæ cum parte affecta communicationem habent. Sic in fluxu sanguinis è naribus, venæ brachii aperiuntur, non autem crurum; quamvis hæ majorem habeant distantiam à parte recipiente, quia minorem habent communicationem. Sic Galenus 13. *meth.* in phlegmone hepatis internam brachii venam secatur, eo quod inquit, cum jecinore amplà & rectâ viâ communicet. Sic etiam *lib. de tremore*: Si inquit, *venas quæ nullum cum affecta parte consortium habent, secueris, ipsam qui rem non juvabis, & sanam lades, è qua sanguinem hauris utilem.*

*Tertia conditio est, ut servetur rectitudo partium.*

Hæc conditio maximi est momenti, & diligenter observanda in omni revulsione: Fundatur enim in consortio & consensu mutuo, quod maximum reperitur inter partes ejusdem lateris, & vocatur illa rectitudo *κτ' ἔξιν* ab Hippocrate, & *ἰσθυμία* à Galeno, quæ confirmatur multis experimentis: Uteri enim pars dextra tantò est sinistra calidior, ut caloris aucti nomine mares formet, sinistra foeminas. Sic dexter testis, ad sinistram collatus. Est autem caloris actu causa rectitudo hepatis: vicinitas enim & vasorum communitas, non sunt utrique parti disparia. Paralysis medietatem corporis exactam corripit illasà reliquâ, & tamen humor illabitur à tertio & quarto cerebri ventriculis, in quibus non est dexteri à sinistro secretior. Si inflammato hepate, ex dextra nare sanguis erumpit, sanatur; si ex sinistra, non juvatur, cum una ad utramque narem ex jecinore vena pertingat. Si cubitus sinister secatur, vacuatur lien inflammatus, & pleura sinistra: quæ omnia ex dextra axillari non succedunt. Sinistra tamen, si venarum communionem spectes, non nisi interventu hepatis ex sinistro exhaurit. Ac denique dicebat Hippocrates *sexto Epid. per rectum sunt morborum permutationes, & crisis, & abscessus.*

Cur verò tantum possit rectitudo, adeò difficile est respondere, ut multi varia commenti sint, quibus omissis, probabilius videretur illud, quod à gravissimis quibusdam auctoribus sancitum est, multos nimirum esse canales corporis longitudinem perrepantes, & distinguentes, per quos sursum deorsum promptus est omnium in corpore contentorum commeatus, qui tamen non perinde per latera distribuitur. Illi autem ductus quoniam sensibus conspicui non sunt duabus rationibus firmanur præter experimenta superius proposita. *Prima* à fine desumpta est, quod scilicet natura conservationis individuorum sollicita, ea veluti gemina constituit, ut dimidiâ illius parte læsa, altera minus pateretur. Sic dum aliquo infortunio unus oculus, auris, brachium perit; altero oculo, aure, brachio vita servatur. Ita duo quasi animalia, dextrum sinistrumque, in unum animal conjungens diuturniorem illis vitam comparavit. *Secundò* ratio ab eventu petitur: repente enim & frequenter commutatio fit à dextro pede, ad dextrum vel brachium, vel humerum & contrà, quemadmodum etiam laborante dextrâ capitis parte, & def. endente humore, potius intumescit pars dextra cervicis, si illic sistitur humor, aut si ad thoracem descendit, potius dexterum latus, quàm sinistrum repletur: vel denique si ad partes inferiores labitur, dextram potius podagram efficit quàm sinistram. Eadem ra-

tione, laborante pede in epilepsia, subito ascendit materia aliqua ad caput, quod non posse fieri, nisi ductus illi concederentur, qui ut demortuo homine occulti sunt, sic in viventi manifesti; & per eos humores, qui rectâ feruntur ascendendo, vel descendendo, facilem viam inveniunt, si attrahantur, & aliis remediis hinc inde dimoveantur.

Ex suprà propositis facile confutatur sententia Arabum qui revulsiones moliantur, omiſſa illa rectitudine, ad quoslibet contrarietatis terminos, cujus tres faciunt species: videlicet à superioribus ad inferiora, ab anterioribus ad posteriora, & à dextris ad sinistra. Unde Avicenna. *fen. 10. lib. 3. tract. 5. cap. 1.* in pleuritide & aliis internis inflammationibus, primò jubet secari venam in malleolo ejusdem lateris, secundò communem in brachio contrarii lateris: ultimò internam ejusdem lateris. Quæ doctrina adversus *τὸ κτ' ἔξιν* Hippocratis, & legitimam curandi methodum manifestè pugnat. Adde quod in diatetris, seu quadris corporis enumerandis, deficient Arabes, cum tres tantum constituent: illis enim quarta adjungenda est, quæ scilicet ab internis est ad externa, quam proponit Galenus *libro de revulsione*, & illa observatur in pleuritide, quando vena secatur in eodem latere: fit enim tunc revulsio à partibus interioribus ad exteriores.

*Revulsio autem duplex est, universalis una, particularis altera.*

*Universalis est, quæ contrarietatem observat respectu totius corporis, & in eo contrarios terminos respicit, undecunque humores prolabantur.*

Hæc potissimum celebratur, quando majores venæ secantur, & ipsum hepar fluxionum origo exhauritur, atque adeo usitatissima & securissima est, ut nimirum quando fluxionis origo propria ignoratur, ab ipso hepate per majores venas revulsio ineatur: sic enim exinanitæ venæ reliquum sanguinem arctius retinent, neque eum fluere permittunt. Unde Galenus 1. *ad Glauconem* 14. inflammationem defluxum revocari vult, vel ad commune vas, vel ad originis fontem. Ita 2. *acut. cap. 10. quacunque*, inquit, *vena secatur, universæ exhauriuntur: quia omnium in corpore una est conflusio & commeatus*: Hac tantum differentia, quod quædam venæ exhauriant certas partes aliis celerius.

*Revulsio particularis, quæ & localis nominatur, est quæ in uno membro tantum contrarios terminos respicit.*

Hæc præcipuè fit venis minoribus apertis, quæ à parte tantum revellunt, & revulsionis nomen simpliciter non meretur, sed tantum revulsionis localis. Imò verò ad derivationem propriè referenda est, idè tantum revulsionis nomen retinens, ut hæc præcepta consentanea sint cum Galeni doctrina, qui hujusmodi derivationes revulsionum nomine usurpat. Explicans enim aphorismum Hippocratis 68. *sect. 5.* qui sic habet: *Dolenti parte capitis posteriori, in fronte vena incisa prodest*, dicit revulsionem fieri secundum longitudinem, suprà, infraque; secundum latitudinem, ad dextram & sinistram: secundum profunditatem, ad anteriora & posteriora: ac proinde, dolente parte capitis posteriori: revulsionem fieri secta vena frontis, quæ quidem revulsio particularis & localis est, nec nisi post universalem fieri debet in corpore plethorico.

*Derivatio est humoris ad aliquam partem fluentis, per vicinas partes averso.*

Quoniam derivatio revulsioni particulari finitima est, idè ex superioris theorematis explicatione derivationis natura satis innotescit.

*In derivatione vasorum communio perpetuò observanda est.*

Derivatio in eo differt à revulsione, quod illa ad opposita & remota fieri debeat, hæc verò ad vicina. Cum ea verò convenit, quod in utraque vasorum communio requiratur. Sic in fluxione, quæ ad dentes vel oculos labitur, vesicatorium pone aures admoveamus, derivationis gratia.

*Particularis evacuatio est, quæ humorem alicui parti impactum evacuat.*

*Hæc autem post revulsionē & derivationē celebranda est.*  
Et



*Et fit dupliciter: nimirum sensibiliter, aut insensibiliter. Sensibiliter rursus, vel per ductus à natura in eum usum conformatos, vel parte ferro aut caustico aperta*

Sic cerebrum per nares & palatum evacuatur, pulmo per asperam arteriam, vesica per urethram, per ductus scilicet naturales. Abscessus verò materiam, & alia hujusmodi in parte ductibus carente præter naturam contenta, artificiosa apertione educimus.

*Insensibiliter fit per poros & insensibiles partium meatus: & hæc Resolutio propriè nominatur.*

Sic materia in aliqua parte contenta, tumores, aliosque affectus pariens, citra manifestam evacuationem resolvitur fomentis, linimentis, emplastris, & similibus remediis.

*In revulsione, derivationis, & particularis evacuationis recta administratione, sequentia theoremata observanda sunt.*

*Cum fluxio maximè urget, revulsione utendum est: cum verò sedata est magna ex parte, derivatione: cum denique non amplius influit humor, sed parti impactus est, particulari vacuatione.*

*Quando materia fluens est venenata, nequaquam revelenda est, sed ab initio per partem ipsam recipientem vacuanda.*

Sic in carbunculis, pustulis malignis, variolis & bubonibus pestilentibus aut venereis, non licet secare venam, revulsione gratia, sed tantum simplicis evacuationis: si corpus sit valde plethoricum.

*Revulsio, derivatio, & particularis evacuatio, simul & semel una & eadem evacuatione celebrari possunt.*

Quamvis revulsio, derivatio, & particularis evacuatio contrariæ quodammodo videantur, quod una ad longinqua fieri debeat, aliæ verò ad vicina, multæ tamen possunt institui vacuationes, omnium participes: si nimirum media distantia inter propinquam & remotam eligatur. Ut in pleuritide, cum vena brachii secatur, quod fluit, revellitur; quod jam parti recipienti proximum est, derivatur; & quod partis ipsius angustis meatibus impactum est, evacuatur. Has autem evacuationes, simul & semel factas, utilissimas esse, colligitur ex Gal. præcepto, vulgo Medicorum incognito, quod habetur 6. *Epid. sect. 2.* ubi docet, non esse insistendum toto fluxionis tempore revulsoriis, sed interponendum esse medium tempus vacuationi humoris in parte contenti. Ita enim demum fluxio cessabit, si longè revellentibus evertatur confluens materia, & proxima vacuatione dolor, calorque partis tollantur, fluxionis causæ. Si ergo confluente humore simul detur, unica sectione, modicè remota, revellere simul & vacuare, non est dubium, quin illa amplectenda sit: quod Galenus in jecore inflammato, & alibi perpetuò sequitur: quemadmodum & in pleuritide vulgo fieri consuevit, ut antea ostensum est. Denique ex eodem Galeno 13. *meth. cap. 10.* Si solus fluxus curandus, scanda distantissima pars est; si sola partis plenitudo, vicinissima. Ex hoc conficitur, ubi duo scopi pariter iunguntur, mediam quandam distantiam observare necessum esse.

*Quando ex communi vena revulsio & derivatio simul & semel fiunt, illa adhibenda moderatio est, ne vacuatio sit exigua quæ agitando magis augeat fluxum, quam extractione sedet. Dandaque opera est, ut eodem die, si natura patitur: sin minus, postero repetatur ejusdem venæ sectio.*

Hoc præceptum utilissimum est, & maximi momenti in usu practico, quod tamen multi cum ægrorum incommodo furdâ aure pertranseunt. Si enim primum parca manu sanguis mittatur, ille magis exagitatus, nec sufficienti quantitate eductus, vehementius in partem irrui. Deinde, cum prima Sectione non liceat exhaurire totum, quod inflammato loco vitiosum continetur; sed tantum usque ad coloris mutationem, ex Hippocratis sententia, neque enim ampliorem virtus evacuationis ferre potest; superest, ut quod prior transposuit, sequens inaniet: & cum inanis locus affectus ex vicinis vasis sanguinem fugat, eumque vitiet, nisi ab eo beneficio repetitæ vacuationi brevi extrahatur, putreat necesse est, & rursus ingravescat malum.

*Quantitas revulsione & derivationis fluxionis quantitati respondere debet, modò vires ferre queant.*

Sic quando fluxio magna est, si revellenda sit, atque

derivanda per venæ sectionem, ea copia mitti debet sanguis, ut universam fluxionis materiam educere possit, habita semper virium ratione, ut scilicet totam evacuationem ferre queant. Ubi notandum est insignæ præceptum, quod habetur apud Hippocratem 2. *viellus ratione in acutis, text. 10.* docens modum & terminum venæ sectionis, in inflammationibus, & præsertim in pleuritide, scilicet usque ad coloris mutationem. Illa autem coloris mutatio ab ipsa parte affecta sanguinem educi significat, quemadmodum docet Galenus, in commentario hujus loci, his verbis: *Quidquid sanguinis in phlegmone continetur, id caloris abundantia, colore permutatur: reliquum autem in partibus omnibus simul manet. Eam ob causam sanguine, qui in totum spargitur corpus, pituitosiore existente, rubicundior sanè erit, qui in eo, quod phlegmone obsidetur, latere continetur. Quod si sanguis in totum corpus diffusus, rubicundior extiterit: is procul dubio, qui ad phlegmonem est, adustus assatusque in nigrum converteretur.* Coloris itaque mutatio sanguinis translationem ex parte affecta certò significat; sed unam eam semper, ut ibidem docet Galenus, non expectare oportet, ob virium imbecillitatem.

*Dum humor cum impetu fluit, majores venæ aperiendæ sunt, modo id loci natura & situs partium permittant.*

Quia per majores venas prompta & subita fit revulsio, ac plerumque derivatio, quæ fluxionis celeritati obsistere possit.

## C A P U T III.

### De Sanguinis Missione.

*Humorum vitium duplex est: in quantitate, & in qualitate. Illud vocatur Plethora; hoc cacoehymia.*

*A plethora indicatur sanguinis missio, à cacoehymia purgatio.*

**H**oc theoremate gravissima includitur controversia de indicationibus mittendi sanguinis, quæ auctorum ingenia variè torfit, & multis difficultatibus intricavit. A quibus ut nos breviter expediamus, proposita in superiori sectione principia sequemur, quibus indicantium & indicatorum natura rectè constituitur; & à coindicantibus ac correpugnantibus exactè distinguuntur.

Primum igitur supponendum est, nos hîc sanguinis missionem usurpare, prout est species evacuationis, & remedium sanguinem evacuans. Quo posito dicimus, sanguinis missionem indicari à sola plethora, seu plenitudine quæ sanguinis redundantiam significat; propterea quod unum tantum ab uno indicetur; & indicatum debeat esse contrarium indicanti: at copię sanguinis directè opponitur illius imminutio; quod quidem agnovit Galenus 2. *κατὰ τόπον*, & alibi sanguinis missionem à multitudine sanguinis indicari docet. Cum verò 4. *method. c. 6.* plenitudini adjungit magnitudinem morbi, virium robur, & ætatem florentem, & lib. de venæ sectione, tum multis aliis locis, tres jam dictas indicationes mittendi sanguinis simpliciter proponit, nempe magnitudinem morbi, virium robur, & ætatem florentem, non propriè & strictè intelligendum est indicationis nomen, ut ex sequentibus demonstrabitur.

*Primo*, unum tantum ab uno indicatur, ut supra ostensum est, capite 3. *sect. 1.* Ergo sanguinis missio à tribus indicari nequit.

*Secundo*, vires & ætas, cum ad res naturales referuntur, nunquam possunt verè indicare, sed tantum coindicant, ut supra demonstratum est, cap. 4. *sect. 1.*

*Tertiò*, Magnitudo morbi, servata lege contrarietatis, quæ debet intercedere inter indicans & indicatum, non potest indicare, nisi magnitudinem remedii. Atque ita, cum purgatio æquè magnum remedium sit ac venæ sectio, æqualiter utraque à magno morbo indicabitur, non autem speciatim venæ sectio. Quod videns Galen. 4. *meth.* magnitudinem morbi nunc sanguinis missionem, nunc purgationem indicare scribit: quo ostenditur magnitudinem morbi non esse verum indicans venæ sectionis quia non est unum, neque perpetuum.

*Quartò*,



# 128 Institutiones Medicæ, Lib. V. Pars. I. Sect. II.

*Quarto*, ex eadem contrarietatis lege, cum sanguinis missio sit species evacuationis, inter morbum magnum & evacuationem vera contrarietas deberet intercedere. Quæ cum nulla omnino sit, unum ab alio non potest indicari. Neque est quod dicas esse contraria per accidens, nam vera indicantia debent indicare per se contrarium remedium.

*Quinto*, multi sunt morbi magni, quibus non convenit sanguinis missio, ut febris hæctica, & quicunque ab inanitione fiunt: ergo magnitudo morbi non est vera indicatio venæ sectionis.

*Dicimus* igitur Galenum morbi magnitudinem proponere, quasi sanguinis missionem indicet, non quod propriè & revera id præstet, quod nonnulli recentiores summis viribus defendere conantur; sed quod sit signum, vehemens sanguinis vitium ostendens, quoties ab eo producit: & illud sanguinis vitium postulat venæ sectionem. Vires verò & ætas coindicant solummodò, latiori-que verbi acceptione indicare dicuntur, ut suprà ostensum est, coindicantia simpliciter indicantia sæpe à Galeno nominari. Magnitudo morbi venæ sectionem indicat, quatenus est conditio sine qua non, juncta multitudini sanguinis. Nam ea, absente plethora, solvi potest aliis viis, puta inedia, exercitio, &c.

*Plethora alia est ad vasa, alia ad vires.*

*Plethora ad vasa* fit, vel omnibus humoribus æqualiter adauctis, & appellantur simpliciter plethora: vel solo sanguine copiosius redundante, & vocatur plethora sanguinea.

*Quando alius humor à sanguine sua quantitate symmetricam excedit, & omnes alios exsuperat ipsis etiam adhuc adauctis, illius humoris appellatur plenitudo.*

*Cum denique unus tantum humor excedit, reliquis in æquilibrio positus, vocatur cacochymia.*

Cacochymia est vitium in qualitate, quemadmodum plethora in quantitate: quia sanguis absque vitio qualitatis potest augeri, alii verò humores nequaquam.

*Plethora ad vires est, quæ licet vasa præter modum non repleat, corporis tamen facultates premit, & præcipuè vitales: ita ut cum ab illis regi nequeat, in corruptiã degeneret.*

*Rursus plethora alia levis est, alia gravior, alia præsens, alia futura, alia communis, alia propria.*

*Confert etiam sanguinis missio ad revulsionem, derivationem, & totius corporis refrigerium, non quidem per se, sed tantum per accidens.*

Sanguinis missio per se multitudinem humorum, qui continentur in venis, educit: per accidens verò revellit & derivat humores ad aliquam partem confluentes. Totum verò corpus refrigerat etiam per accidens, videlicet humoris calidi portionem educendo, & illi qui reliquitur liberam transpirationem conciliando.

Ex prædictis theorematis facillè desumi possunt solutiones omnium argumentorum, quæ à multis afferri solent: ut probent sanguinis missionem non indicari à plethora: nam iis, qui ex alto ceciderunt, licet nulla adsit manifesta plethora, secatur vena, quia est plethora ad vires: illæ enim ex casu debilitatæ, non possunt regere humores, quia antea sub regimine naturæ ritè coercerantur, dum sanitas erat integra. Deinde fit illa sanguinis missio ad revulsionem humorum, qui fluere incipiebant ad partes contusas. Sic in immodico sanguinis fluxu venæ sectio celebratur, non quatenus est evacuatio, sed quatenus est remedium revellens. Sic in febribus putridis & quandoque etiam malignis secatur vena ad corporis refrigerium, aut quia adest plethora ad vires. Levata enim natura portione oneris, quo premebatur, quod reliquum est faciliùs sustinet. minoreque negotio domat atque conficit. Denique plethora levis, quæ solo exercitio & frictionibus curari potest, non indiget venæ sectione; sed tantum ea, quæ gravior est, & morbum magnum producit, aut brevi productura est.

*Interca quæ venæ sectionem coindicant, vires primum locum occupant: quæ si valide sunt, & robuste eam permittunt, si verò debiles ac languidæ, eam tamen prohibent.*

Vires sub triplici facultatum numero continentur, præcipuè tamen in facultate virali virium robur constituitur. Si enim illa ex pulsu magno & æquali, necnon respira-

tione libera, constans & robusta comperiatur, sanguinis missionem permittit. Si verò ex contrario pulsus & respirationis habitus imbecilla appareat, venæ sectionem dehortatur; etsi causa morbifica, vel morbus hoc remedii genus exposculet, aut certe parca manu, & per dilucida intervalla sanguis educendus est. Hic enim diligenter vires languidæ ab oppressis distinguendæ sunt. Opprimuntur à causis internis, ut obstructione, & humorum copia, & tunc vacuatione recreantur. Exsolvuntur & dissipantur à causis evidentibus, ut aëris fervore, & maligna corruptione, labore, vigiliis, inedia, vacuatione quavis immodica, doloris atrocitate, morbi violentia & diuturnitate, aliisque hujusmodi: tunc verò refectioni potius, quàm evacuationi danda est opera. In languidis & oppressis viribus pulsus ferè similis est: sed hoc discrimen afferri potest, quod oppressis morbi initio exilis pulsus & sepultus percipitur: languentibus autem & dejectis in incremento & vigore, cum quibus causæ commemoratæ concurrunt.

*Coindicat etiam sanguinis missionem ætas florens, quæ inter pueritiam & extremam senectutem media est. At pueritia & ultima senectus eandem prohibent; aut certe non nisi maxima urgente necessitate, & summa cum cautione celebrandam esse suadent.*

Ætas non coindicat aut correpugnat, nisi ratione virium, quæ in puero & senes sunt tam debiles, ut vix ferre queant venæ sectionem. Pueri enim corpus habent molle, tenerum & patens, quod sponte sua assiduò digeritur ac diffundit: senes verò spiritu & caloris inopia laborare solent. Ideò Hippoc. 4. de victus ratione in morbis acutis, ætatem florentem cum magnitudine morbi & virium robore, ad sanguinis missionem requiri præcipit. Quem secutus Galenus 11. meth. c. 14. & lib. de curandi ratione per venæ sectionem, ante annum 14. & post septuagesimum venam secare vetat. Quod de pleniori illa veteribusque consuetudine vacuatione audiendum est: nam moderatam, quæ viribus & plenitudini aut par, aut inferior sit, omnis ferè ætas ferre potest, si vegeta & robusta sit. Ætas siquidem non tam annorum numero, quàm habitus & virium robore metienda est. Quod eleganter Celsus confirmavit lib. 2. cap. 10. Antiqui, inquit, primam, ultimamque ætatem sustinere non posse hoc auxilii genus judicabant: persuaserantque sibi, mulierem gravidam, quæ ita curata esset, abortum esse facturam. Postea verò usus ostendit, nihil ex his esse perpetuum, aliasque potiores observationes adhibendas esse, ad quos dirigi curantis consilium debet. Interest enim non quæ ætas sit, neque quid in corpore intus generatur, sed quæ vires sint: ideò firmus puer, & robustus senex, & gravis mulier valens tuto curantur. Sic Rhasis in ætate decrepita, quæ gravi urgenteque pleuritide laborabat, sanguinem misit. Sic Avenzoar filio suo trimo se utiliter venam secuisse commemorat. Et nos plerumque experimur pueros quarto aut quinto ætatis anno (in Gallia) à gravissimis morbis venæ sectione liberari.

*Quantitas venæ sectionis à magnitudine vitii à sanguine dependentis indicatur. Atque ita magnus morbus copiosam indicat sanguinis missionem, mediocris moderatam, parvus denique exiguam aut nullam.*

*Quantitatè verò coindicant vires ægrotantis, quæ si valide fuerint, quantum morbus desiderat, fidenter vacuandum: Minus validis, parcius, prostratis, nihil prorsus educendum.*

In magno sanguinis vitio, viribus constantibus antiqui sanguinem mittebant usque ad lipothymiam, seu animi deliquium, quo non intelligendum est illud, quod nonnullis, venæ sectionem expavescentibus, aut alia de causa, citra insignem evacuationem accidit, sed illud, quod ratione evacuationis contingit. Talem adhibebant sanguinis missionem in magnis inflammationibus, febribus synochis vel ardentissimis & doloribus vehementissimis, assertque Gal. se experientia comperiisse, si in ardentissimis febribus usque ad animi deliquium sanguis mittatur statim corporis habitum refrigerari, & febrem extinguere, plurimosque alvo soluta, & sudoribus erumpentibus, planè sanitati restitui. Hæc tamen usque ad lipothymiam vacuatio nostris temporibus rarissimè usurpatur, &



& apud vulgus temeritatis maximè suspecta esse consuevit. Satius igitur est infra subsistere, & sanguinis quantitatem, quæ unâ vice lipothymiam induceret, duabus potius, aut tribus vicibus educere, absque ullo lipothymiae metu, & minori virium jacturâ.

*Coindicant etiam quantitatem mittendi sanguinis causæ internæ & externæ.*

*Internæ sunt corporis temperamentum, habitus, ætas.*

*Temperamentum calidum, & humidum copiosorem patitur venæ sectionem, quàm frigidum & siccum.*

*Habitus corporis extenuatus, mollis, & rarus, magnam ferre nequit sanguinis evacuationem: contra verò carnosus, firmus atque densus.*

*Habitus præpinguis & obesus difficile substinet venæ sectionem.*

Quamvis hujusmodi habitus minimè resolubilis sit, quia tamen angustas & exiles habet venas, quas exinanitas pinguedo faciliè stringit, ut inde metus sit, ne nativum calorem extinguat, ideò difficile ferre potest venæ sectionem.

*Juvenilis ætas largiorem patitur venæ sectionem, quàm puerilis aut senilis.*

*Causæ externæ sunt regio, anni tempus, cæli status, vacuatio suppressa, vel immodicè procedens, consuetudo victus, vel generis vitæ, vel vacationis.*

*In regione calida & sicca sanguis minori copiâ educendus est.*

Quia talis regio multum innati calidi, sanguinis, & spirituum absunt; hinc vires comminuuntur, & minor sanguinis quantitas relinquitur in venis.

*Regio frigida & humida satis largam patitur venæ sectionem, minus verò, quæ est frigidissima: at temperata largissimam profusionem tolerat.*

*Frigida & humida aëris temperies innatum calidum humoresque intus coercet, horumque minimum dissolvit. In extremè frigida sanguis, veluti frigore congelatus, vacuationi vix cedit: tum partes internæ, si à suo calore destitutæ maneat, ambientis frigoris injuriâ, extinctionis periculum subibunt.*

*In anni temporibus ver sanguinem largius profundi permittit: post autumnus, deinde hyems, omnium verò minimè æstas.*

*In cæli statu calidissimo & frigidissimo parçè sanguis mittendus est, in temperato, copiosius.*

*Consueta aliqua vacuatio suppressa largiorem patitur sanguinis missionem.*

*Vacuatio spontanea, materiæ morbi nihil detrabens, venæ sectionem non excludit, modo illâ vires valde attritæ non fuerint. Harum tamen ratione sanguis parcius mittendus est, & sistenda vacuatio, si magis vires offensura est.*

*Spontanea vacuatio, quæ materiam morbificam educit, si jam ægrotum levet, possitque, quantum requiris, vacuare, prorsus est naturæ committenda. Sin minus id possit, tantum ipse detrahes, quoad conjunctim perficiatur, quod postulas.*

*Qui frugaliter, sive ex consuetudine, sive ex morbi impedimento vitant, parcius vacuandi, quàm qui liberalius pleniusque vivunt.*

*Qui venæ sectioni sunt assueti, alacrius ac levius eam perferunt, quàm non assueti.*

*In quibus morbis convenit venæ sectio, iis ab initio est celebranda.*

Tempus sanguinis mittendi definitur à præsentia eorum indicantium, quæ tale remedium postulant. In principio enim morbi illa indicantia maximè concurrunt, tum ratione sui, tum ratione virium, quæ tunc temporis validiores sunt: tum quia in progressu morbi natura, coctioni & pugna cum morbo intenta, ab opere non est avocanda.

*Si morbi principium fuerit prætermissum aut in eo sufficiens sanguinis quantitas detracta non sit, aliis etiam temporibus educendus est, si plenitudinis, atque cruditis signa perseverent, & vires ferre queant, aliaque coindicantia con-*

*Laz. Riverii Opera.*

*currant, aut saltem non prohibebunt.*

*Ex iis, quæ venæ sectionem prohibere solent in principio morbi, aliisque temporibus, non infima est cruditas ventriculi aut cibi incocti in primis viis.*

Hoc præceptum proponitur à Galeno 9. meth. cap. 5. ideò semper, nisi sanguinis vitium sit vehementissimum, differenda est venæ sectio, donec humores ii concoquantur, ne ad hepar attracti obstructions pariant, & plus damni inferant, quàm ex venæ sectione possit sperari commodi.

*In iis morbis, quorum certa est vel remissio, vel intermissio, venæ sectio in remissione, aut intermissione celebranda est.*

In febrium accessionibus & exacerbationibus maximus est naturæ cum morbo conflictus, in quo nihil movendum est, neque vires ad pugnam necessariae, venæ sectione imminuendæ sunt, quod eleganter à Celso proditum est, cap. 10. lib. 2. his verbis: *Si vehemens febris urget, in ipso impetu ejus sanguinem minuere, hominem jugulare est.*

*Quando affectus vehementer urget, quacunque horum sanguis mittendus est, in iis verò qui dant inducias horæ sanguis mittendo aptior est matutina, maximè secunda vel tertia ab exortu solis.*

Tum enim cibus hesternus probè coctus est, & vires plerumque magis vigent, nec non matutinis horis sanguis magis dominatur, & ipso die lumine quodammodo tenuior, & ad fluendum aptior efficitur.

## CAPUT IV.

### De Purgatione.

*Purgatio est humorum qualitate peccantium evacuatio.*

**H**Æc definitio proponitur à Galeno comm. in 2. Aph. sect. 1. quæ ut rectè intelligatur, sciendum est, per qualitatis vitium non audiendam esse meram intemperiem, quia illi sola alteratio deberetur, sed potius cacochymiam, seu humorum nutritioni ineptorum redundantiam. Hujus generis sunt humores omnes excrementitii, qui in venis cum sanguine permixti, vel extra venas continentur. Illi autem duorum sunt generum, ut ex Physiologia constat. Alii scilicet naturales, alii præternaturales. Naturales sunt, qui ex naturæ instituto generantur, ut pituita dulcis, bilis, melancholia, & serum. Hi si debita proportionem ac quantitatem generentur, vacuatione non indigent: si verò majori quantitate abundant, cacochymiam constituunt, & purgatione educendi sunt. Humores verò excrementitii præternaturales sunt, qui præter naturæ leges producuntur, ut bilis vitellina, porracea, æruginea, glasstea, & atra, nec non pituita acida & falsa, & serum ipsum acidum vel falsum factum: quod humorum vitium cum nullo modo esse debeat in corpore, sed minima quantitas cacochymiam constituat, purgationem indicat, si diæta, exercitio, aut levioribus remediis auferri nequiverit.

*Unicuique autem humoris peccantis speciei medicamentum purgantis species respondere debet. Atque ita pituitæ phlegmagogum; bili, cholagogum; melancholiam, melanagogum; sero, hydragogum; mixtis humoribus mixtum medicamentum adhibendum est.*

*Purgationem verò coindicant ægrotantis vires, temperamentum, habitus, ætas, sexus, naturæ consuetudo, & aëris status.*

*In omni purgatione ægrotantis vires validas, saltem mediocres esse necesse est.*

Purgatione vires aliquatenus infringuntur; ideo si valde labefactatæ fuerint, non est tentanda purgatio, ne ab ea planè dejiciantur.

*Corpora calida & sicca, tum frigida, sive humidiora sunt, sive sicciora, difficilius purgationem ferunt: calida verò & humida facilius.*

Qui calidiori & sicciori temperamento præditi sunt, ex

R

purgat



# 130 Institutiones Medicæ, Lib. V. Pars I. Sect. II.

purgatione facillè possunt incallescere, rarefieri, exsiccari nec non in convulsiones incidere, si purgatio nimia extiterit. Frigidi & humidi tum frigidi & sicci, calorem habent languentem, & spiritus exiguos, qui facillè à purgatione dissipantur. Calidi verò & humidi calidiora habent naturæ principia, quæ purgationis impetum eludunt.

*Habitus gracilis, tenuis, & laxus facillè exsolvitur; carnosus verò & bene compactus commodè purgationem tolerat, pinguis non æque bene.*

Pingues à carnosis sedulò sunt distinguendi: licet enim utrique ferre possint purgationem; tamen nultò minùs pingues, quia frigidiores sunt, spiritus habent pauciores, & vasa angustiora.

*Pueri & senes benigniora tantum ferre possunt medicamenta: in ætate media constituti vehementiora.*

*Gravida mulieres quarto, quinto, & sexto mense, magna urgente necessitate, & summa cum cautione purgandæ sunt.*

Hæc sententia desumpta est ab Hippoc. *Aph. 1. sect. 4.* & illi ratio evidens suffragatur. Cum enim natura à purgante medicamento irritata, humores excrementitios, & ipsum pharmacum expellere nitatur; uterum concutit, & foetum simul expellit, nisi fortiter adhæreat. Si tamen prægnans morbo affligatur, qui purgationem maximè desideret, illa nihilominus tentanda est, sed blandis atque benignioribus medicamentis quæ corpus parum concutiant: & illis insuper mensibus fidentiùs ineunda quibus foetus utero fortius alligatus est, quod quarto, quinto, & sexto mense contingit. Similis enim est, ut docet eleganter Galenus, in *comm. prædicti Aphorismi* foetus cum utero, ac fructuum cum arboribus adhesio. Fructus in prima generatione debilioribus pediculis continentur, & ideo facillè decidunt, quando vehementior ventus ipsos concussit: postea verò aucti difficilem habent à plantis dissolutionem; sicuti rursus cum perfecti sunt, sponte suâ sine vi extrinseca decidunt. Eodem modo conceptus, in principio suæ formationis, & quando jam perfecti sunt, ex leviori commotione facillè disrumpuntur, tempore verò intermedio firmiorem habent coalitum.

*Ægrotantis natura particularis diligenter observanda est: quidam enim à mitioribus medicamentis facillimè & copiosissimè purgantur, alii verò fortioribus vix commoventur.*

*Qui purgationibus assueti sunt, faciliùs eas tolerant; in iis verò, qui nunquam, aut rarissimè purgati sunt, cautius procedendum.*

*In calidiori aut frigidiori aëre purgationes difficiliore: in temperato, faciliores.*

Calidior aër vires debilitat, & morbos calidos gignit: ideo purgantia, quæ vires magis debilitant, & corpus calefaciunt, non adeo facillè admittit. Unde Hippocrates *Aphor. 5. sect. 3.* In cane, & ante canem purgationes difficiles.

*Frigus humores condensat, & meatus constipat, atque ita corpus minùs fluxile reddit, unde laboriosa succedunt purgationes. Rectè igitur Hipp. Aph. 27. sect. 6. purgationes verno tempore magis convenire, quam reliquis temporibus, asseruit.*

*Purgationis quantitatem humoris peccantis quantitas ostendit. Univerſus enim expurgandus est, ut corpus à morbo vindicetur.*

Si noxius humor totus non auferatur, vel non curatur morbus vel si curatus appareat, recidivæ obnoxius est: unde Hipp. *Aph. 10. sect. 2.* Quæ relinquuntur in morbis recidivas facere consueverunt. Si tamen exigua humoris illius portio derelicta est, exquisita vivendi ratione, & naturæ calorisque vi domari ac vinci poterit.

*Pauca cacochymia universè detrahi potest, constantibus viribus, præsertim si concocta sit, aut tenuis. Imbecilis autem viribus non modò multa, sed & pauca cacochymia partitè eximenda est.*

Huic theoremati suffragatur Hipp. *Aphor. 36. sect. 2.* Qui pravo utuntur cibo, medicamenta purgantia assumptes, statim debilitantur. Et ratio est, quia multis vitiosis

corruptisque scatent humoribus, & paucò fruuntur bono succo, unde vires debiles à fortiori medicamento deſiciuntur; tum sentina illa pravorum humorum, purgantibus mota, putres, tetros, ac perniciosos humores ad cor & ventriculum emittit, unde lipothimla, vertigines, & alia accidere possunt. Non tamen hi humores in corpore relinquendi sunt, sed sensim & per intervalla, ac per epistram sine magna agitatione evacuandi.

*Tempus morbi, purgationi aptissimum, est morbi status aut declinatio, in quibus humores concocti sunt, & ad evacuationem præparati.*

Fundatur hoc theorema *Aphor. Hip. 22. sect. 1. Concocta medicari oportet, non cruda.* At in tota morbi declinatione, aut saltem in fine status, integrè humores concocti sunt. Hac tamen restrictione limitandum est hoc theorema, videlicet si natura per se evacuationem non aggreditur; quando enim humores criticè vacuantur, purgatio nulla instituenda est, nisi crisis fuerit imperfecta: tum enim reliquæ materiæ morbificæ medicamentis educendæ sunt, ne recidivam pariant.

*In principiis etiam morborum purgationes convenire possunt, si nempe materia turgcat.*

*Turgere dicuntur humores, quod ὀρᾶν Græci nominant, quando cum impetu in corpore agitantur, partesque lacerant & vellicant. Hæc autem turgentia humoribus biliolis propriè competit, qui calidi sunt, tenues, atque mordaces, morbos acutos gignere aptissimi. Crassi verò humores atque frigidi, ex quibus morbi diurni generantur, organa capaces minimè esse solent. Si itaque tales humores turgcant, eos non expectatâ coctione purgare licet. Metu enim est, ne vires ex illa materiæ agitatione deſiciantur, vel humores, impetu illo concitati, in partem aliquam principem ruant. Tum verò satis facillè purgantur illi humores, licet concocti non sint: quia tenues & mobiles, & ipsa natura ab iis stimolata & lacerata, purganti medicamento auxiliatrices manus porrigit, ut ita ex hac turgentium humorum ante coctionem purgatione plus utilitatis, quàm damni æger percipiat. Unde Hippoc. *Aph. 10. sect. 4. Medicandum in valde acutis, si materia turgat, eadem die: tardare enim in talibus, malum est.* Hoc tamen summâ cautione, & cum diligenti præmeditatione exequendum est, ut plurimum enim materia non turgat, ut est *Aphor. 22. sect. 1.* & docuit idem Hipp. *Aph. 24. sect. 1. In acutis morbis raro, & in principio medicamentis purgantibus utendum, & hoc cum præmeditatione faciendum.* Purgantia enim caliditate suâ & acrimoniâ morbos acutos augent: & acuti morbi sæpiùs critica evacuatione, quàm purgatione solvi solent. Illæ autem crises haud temerè turbandæ sunt: quin potiùs, si aliqua earum spes, à purgatione abstinendum, viæque potiùs ad illam evacuationem præparandæ. Considerandæ etiam vires & reliqua coindicantia: tum etiam corpus ipsum, an scilicet vias habeat patentes, & ab obstructionibus liberat, & æger multitudine crassorum humorum atque cruditarum non scateat; tum verò, num inflammatione aliquâ internâ conflictetur, quæ purgatione ingravesceret.*

*Humores ad partes nobiliores, aut ad eas, quæ nobiles in consensum trahere possunt, fluentes, aut quamprimum fluxuri, in morbi principio purgatione educendi sunt.*

Sic in magnis vulneribus, ulceribus, inflammationibus, aliisque tumoribus, capitis doloribus, aliisque aliarum partium affectibus, si pravorum humorum copia in corpore luxuriat, non est dubium, quin purgatio conveniat; si nihil aliud eam prohibeat, ut materia, quæ affectum augere posset, minuatur, & à parte affecta evocetur. Quod quidem & in praxi ordinaria usurpatur, & à Galen. sancitum est *lib. de curandi ratione per venæ sect. cap. 8.* In iis (inquit) quibus pars quædam graviter icta est, aut utcumque aliter incipientem habet phlegmonem, eam si magnam fore suspicamur, curationem ab evacuatione incipimus, aut purgatorio medicamento exhibito, aut vena incisa prout nimirum alterum altero magis convenire judicamus.

*Quando humores copiâ luxuriant, & ideo commodè coqui nequeunt, eorundem portio catharsi detrahenda est,*



ut natura portione liberata, quod reliquum est, facilius expellat.

Quia huiusmodi purgatio materiam morbificam immittit, demptâ aliquâ illius portione; ideo *minorativa* vulgò nominatur, quæ nostris temporibus in omnibus ferè morbis usurpari solet.

Neque pericula, quæ huiusmodi purgationes minorantes, in morborum principiis institutas, averfantes in medium afferre solent, admodum reformidanda sunt. Metuunt enim, ne commota saltem, & non evacuata materia, ob multitudinem æger in grave aliquod discrimen conjiciatur, & humores mali cum bonis magis commisceantur.

Quæ pericula evitare facillimum est, si benigniora medicamenta, ut vulgò fieri solet, usurpentur, quæ sine ulla aut saltem minimâ humorum commotione, primam regionem expurgant, & eam materiæ morbificæ portionem educunt, quæ evacuationi magis disposita est.

Quod si fortè Hippocratis & Galeni temporibus minùs usitata erant huiusmodi purgationes in morborum principiis usurpatæ; ideo factum esse certissimum est, quod illis temporibus vehementia tantum, acria, & maligna medicamenta propinari consueverant. Neque mitiora illa atque benigniora, nostris temporibus familiarissima, illis nota erant, quæ sine ulla ferè molestia usurpari possunt. Ideò Celsus præfente febre pharmacum semper abdicat, quia sua ignea caliditate & acredine, sui temporis pharmaca febrilem calorem intendebant. Et ob eandem rationem Hippocrat. vigente æstate huiusmodi medicamenta exhorrebat, ut *Aph. 5. lib. 4. sub cane & quæ canem, purgationes difficiles*; quia exusti tunc temporis humores illam purgantium acrimoniam ferre nequeunt. Eadem omnino ratione nos hos seculo medicamenta illa, quæ vulgò *diagrydiata* nominantur, temporibus illis calidioribus, & in corporibus febre affectis averfamur: sed mitiora alia quæ parum calida & ferè temperata, imò verò nonnulla eorum refrigerantia sunt, & in febribus continuis, & in earum principiis, & æstatis tempore, ipsis etiam diebus canicularibus tutò, & feliciter usurpamus, ut sunt Manna, Cassia, Tamarind. &c.

Certum tamen est, antiquos in morborum principiis purgationi indulgisse, præsertim in morbis febre vacantibus, & in quibus non aderat humorum cruditas ex putredine oriunda; quemadmodum Galenus 4. *de vitæ ratione in morbis acutis*, interdum primâ, interdum secundâ, interdum quartâ, & quandoque quintâ die pharmacum se exhibuisse tradit, tum etiam *lib. de compos. medic. secundum loca*, nulla præcedente coctione, aliâve præparatione, utramque bilem & pituitam purgat in alopecia, & paulò post in multis capitis morbis idem facit. Denique 13. *methodi* refert multos, quibus inflammatio in oculis coeperat, sola per inferiorem ventrem purgatione una die liberatos.

In morbis, qui exacerbationes habent vel paroxysmos, tutius est, remissionis aut intermissionis die, purgans medicamentum exhibere.

Quando enim morbus minùs fatigat, vires robustiores sunt, & morbi impetum facilius ferre possunt. Certum tamen est, in exacerbatione, vel accessione promptiorem fieri evacuationem, quia tunc temporis humores sunt in motu, & veluti turgentes, sicque facilius educi possunt. Ideò Empirici non rarò febres intermittentes curare solent, exhibito medicamento, quod per vomitum vel secessum, utramque regionem evacuat. Quia tamen hoc modo natura valdè conflictatur, ideò prudens Medicus rarò & non nisi summa cum cautione huiusmodi curatione experietur.

Purgationi libera & electiva dies temperata, Austrina potius, quàm Aquilonia, & benevola syderum commixtione salutaris.

Austrina tempestate corpora laxiora sunt, & humores fluidiores; unde melius purgatio succedit. At syderum influxus esse advertendos in purgatione instituenda, docent Astrologi, eorumque de hac re præcepta in unum caput collecta, videnda sunt apud Joann. Ant. Magninum, *Laz. Riverii Opera*.

*lib. de legitimo Astrologia in Medicina usu, cap. 26.* In primis autem observandum est, ne in conjunctione & oppositione Lunæ cum Sole catharsis instituat: quamvis enim cum aliis Astrologorum dogmatis etiam hoc præceptum à non paucis derideatur; observatum tamen persæpe est, illis temporibus purgationem non ita feliciter procedere: idcirco satius est in purgatione electiva eos aspectus evitare.

Locus, per quem debet fieri purgatio, duplex est: scilicet per vomitum, & per secessum.

Et indicatur à loco humoris, & natura ejusdem.

Humores in ventriculo residentes per vomitum commodè expurgantur; tum etiam non rarò ii, qui in liene, cavis hepatis, & pancreate continentur. Illi verò, qui in partibus inferioribus, aut à ventriculo remotis continentur, per alvum facilius educuntur.

Evacuatio, quæ fit per vomitum, præcipuè competit humori in ventriculo contento. Certum tamen est, partes ventriculo vicinas, ut lienem, cava hepatis, & pancreas, per vomitum aliquando utiliter expurgari; ita ut interdum contumacissimi humores morbos diuturnos committentes ex iis locis utiliter per hanc viam evacuati fuerint, qui aliis remediis eradicari nequiverant.

Humores tenues, calidi, & biliosi, per vomitum, crassi verò, pituitosi, & melancholici, per alvum facilius educuntur.

Biliosi sunt ἀρρόποι, quia leviores; pituitosi & melancholici καταρρόποι, quia graviores.

Locum verò, per quem debet fieri purgatio, coindicant tempus anni, ægrotantis habitus, natura, & consuetudo.

Æstate commodius per superiora purgatio instituitur: hyeme verò per inferiora.

Hoc præceptum habetur apud Hippocratem, *Aphor. 4. sect. 4.* & ratio illius est, quia æstate bilis flava, calidique humores abundant, qui facilius sursum feruntur: hyeme verò contrarium accidit. Neque huic sententiæ obstat, quod habetur apud eundem Hippocratem, *lib. de salubri dieta*, sex hybernis mensibus vomendum esse: id enim à Galeno in commentario explicatur, tantum intelligendum esse de pituita, quæ in ventriculo colligitur: ea enim per vomitum expurganda est, reliquum verò corpus per secessum.

Qui habitu sunt gracili, per superiora facilius expurgantur, crassi verò & carnosì, per inferiora.

Desumitur hoc theorema ex *Aph. 6. & 7. sect. 4.* illiusque ratio ex eo desumitur, quod graciles bile magis abundant, carnosì verò pituita. Adde quod hi, propter omenti & musculorum abdominis pondus, non nisi laboriosè, cum violentia, ac vasis alicujus in thorace rupturæ periculo vomere possunt.

Quorum natura ad vomitum prona atque facilis est illis, tutò vomitus excitari potest, qui verò difficulter vomunt à vomitu arcendi sunt.

Difficulter vomentes non nisi vehementissimis medicamentis ad vomitum excitari possunt: unde metus est, ne exagitatione alicujus venæ in pectore ruptio contingat.

Qui vomitionibus assueti sunt, facilius per vomitum expurgantur; qui verò non assueti, difficilius.

Vomendi consuetudo antiquis erat usitatissima, qua de causa vehementiora vomitoria ferebant. Nostris autem temporibus vomendi illa ratio ferè obsolevit: ideò etiam in ciendo vomitu cautiùs agendum & diligenter advertendum, quando utiliter moveri possit, quando verò adhibenda per alvum purgatio: quæ certè plerumque commodior est. Natura enim ipsa viam hanc, per intestina scilicet, ad excrementorum ejectionem paravit, eaque idcirco ignobiliora fecit. Imò etiam brevior & rectior à corpore universo ad intestina via est, quam ad ventriculum: plures enim & potentiores venæ ad intestina, quàm ad ventriculum feruntur.



## CAPUT V.

## De Humorum Præparatione &amp; Concoctione.

*Humores noxii antequam expurgentur, præparandi & concoquendi sunt.*

*Præparatio humorum fit ab arte, coctio verò à natura.*

*Et autem concoctio mutatio substantiæ in meliorem statum, quæ caloris vi perficitur.*

**I**N hoc concoctio ab alteratione differt, quòd in alteratione solæ qualitates mutantur; in concoctione verò ipsa etiam substantia.

*Eaque duplex est: una quæ vocatur pepsis, altera verò pepasinus.*

*Pepsis est illa vera & propria concoctio, quæ alimentum in corporis nostri substantiam commutatur.*

*Pepasinus verò est, quando vitiosus ac putridus humor qui in corporis substantiam facessere non potest, in aliud melius & nature convenientius, ut in pus, aut quidpiam puri finitimum deducitur.*

Tumores à sanguine oriundi in verum pus commutantur, quemadmodum & sanies, quæ in ulceribus generatur. At humores putrescentes, qui in venis continentur, non quidem in verum pus, sed in quippiam aliud puri finitimum convertuntur, quemadmodum illius idea in urinæ hypostasi apparere solet.

*Humorum verò præparatio, quæ fit ab arte, vel in hos humores respicit, vel vias, per quas illi humores expurgandi sunt.*

*Humores calidiores refrigerandi, frigidiores calefaciendi, crassiores incidendi & attenuandi: lenti ac glutinosi detergendi; tenuiores incrassandi sunt.*

Quamvis multi existiment, contra Avicennam, humores quòd tenuiores sunt, eò facilius expurgari, neque unquam esse incrassandos; attamen rationi magis consonum est, moderatam crassitiem iis magis competere. Ut enim palea vento agitata huc illuc impellitur, ait Avicenna, sic humor biliosus interdum, præ tenuitate suâ hinc inde agitatus, non tam facile trahitur à medicamento, vel à natura expellitur, quàm ubi mediocritatem substantiæ per leviter incrassantia fuerit adeptus.

*Vie per quas humores expurgandi sunt, liberæ & patentes reddantur; atque ventriculus humorum copia minimè sit nauseabundus; ne haustum pharmacum magnopere aversetur ac revomat, intestina etiam satis vacua sint, & cursui humorum non obstant: tum venarum atque viscerum obstructions referentur.*

*Quælibet præparatio, quæ artis & remediorum opera perficitur, non solum ad juvandas purgationes, sed etiam coctiones humoris morbifici promovendas usurpatur.*

Quia hujusmodi remediis præparantibus subactus humor morbificus, facilius à calore nostro vincitur, & ad pepasimum perducitur: ideò hæc medicamenta præparantia, à Medicis concoquentia, quamvis improprie, nominantur, quia ad juvandum concoctionem & humorum morbificorum mutationem conferunt.

## CAPUT VI.

## De Evacuatione per Urinas.

*Per urinas evacuari solent humores serosi, biliosi, & pituita tenuior ab universo corpore.*

**L**icet in operibus naturæ ordinariis humor tantum aquosus vacuetur, qui ex potu superesse solet; tum etiam commodius per eas vias gibba hepatis pars, renes, vesica, & vasa his inservientia purgentur, quàm reliquæ corporis partes: interdum tamen & totum corpus per eas vias humores quoslibet tenuiores evacuat, ut videre est in crisis, quæ per urinas frequenter & utiliter contingunt: ideò etiam Medicus hujusmodi evacuationes aptis remediis promovebit.

*In iis præcipue morbis evacuatio per urinas molienda est, quorum materia sensim & paulatim evacuanda est.*

Diuretica enim medicamenta non nisi sensim & paulatim corpus evacuant: ideò in illis morbis parum profunt, qui subita evacuatione indigent.

*Quando per urinas instituitur vacuatio, cavendum est, ne humor educendus multus atque copiosus sit; periculum enim est, ne dum ad vias angustas impellitur, eas copia obstruat, sibi quæ & aliis exitum præcludat.*

Ideò Medici ante usum diureticum, purgatione per alvum instituta, bonam humoris peccantis quantitatem educunt, ac illius postmodum reliquias per urinas evacuant.

*Si renes, vesica, & huic evacuationi destinata vasa exulcerata, vel inflammata sint, aut simili vitio laborent, urinæ provocatio suscipienda non est.*

Quia minimè consentaneum est, humores ad partem affectam & debilem deducere.

## CAPUT VII.

## De Evacuatione per Sudores.

*Per sudores expurgari possunt quicunque humores tenues, aut tenuitatis capaces in habitu corporis & venis continentur, aut ad eas partes deduci possunt.*

**I**N hac evacuatione contraria videtur esse naturæ & Medici operatio: natura enim morbos tantum acutos per sedores criticè resolvit; at Medicus chronicorum tantum curationem per hoc evacuationis genus tentare consuevit. Ratio hujus rei est, quia non possunt sudores arte procurari, quin corpus universum impensè calefiat: quod in morbis acutis esset periculosissimum. Illud tamen in morbis longis & frigidis utilissimum esse solet, quandoquidem hac ratione humores pituitosi, partibus pertinaciter infixi, attenuantur, & paulatim educuntur.

*Evacuationem illam, quæ per sudores perficitur, dissuadere solent vires languidæ, temperamentum calidum & biliosum, & materiæ multitudo.*

Sudorificorum usu cutis spiracula referantur, & multa sit spirituum calorisque nativi deperditio, unde vires maxime atteruntur. Per eadem sudorifica corpus vehementer incalescit, unde metus est, ne calidior temperies in febrem, aut marcorem conjiciatur. Denique si materia sit multa, dum tota simul commovetur & potenter attenuatur, metus est, ne in partem aliquam principem irruat, aut poros ipsius habitus ocludat; unde putredines, tumores, & alia vitia contingunt. Ideò consultissimum est, ante sudorem provocationem universali purgatione materiam morbificam imminuere.

## THERAPEUTICES

## PARTIS PRIMÆ

## SECTIO TERTIA.

## De indicationibus à morbo.

## CAPUT I.

## De indicantibus à morbo similari.

*Omnis intemperies alteratione per contraria corrigenda est.*

**S**ic calida intemperies indicat medicamentum refrigerans; frigida calefaciens; humida exsicicans; sicca humectans. Sic etiam in compositis intemperiebus calida humida medicamentum postulat frigidum & siccum; calida sicca frigidum & humidum, frigida & humida calidum & siccum; frigida & sicca calidum & humidum.

*Intensior intemperies & à naturali statu valde recedens, intensioribus indiget contrariis; remissior verò & à statu naturali minus recedens, remissioribus.*

*In corrigenda qualibet intemperie, partis affectæ ratio maxima habenda est, ut illi appropriata & specifica, seu peculiarem quandam cum ea affinitatem, & naturæ convenientiam habentia remedia præscribantur.*

Sic quando cerebrum calefaciendum, non ipsi quælibet calefacien-



## Cap. II. De Indicationibus à morbo organ. 133

calefacientia, indiscriminatim adhibenda sunt, sed ea quæ Cephalica dicuntur. Sic thoraci thoracica; cordi cardiaca; ventriculo stomachica; hepati hepatica; lieni splenica: utero hysterica, & quælibet parti appropriata medicamenta adhibenda sunt, iis qualitatibus primis donata, quas dictarum partium intemperies requirit.

### CAPUT II.

De indicationibus à morbo organico.

Morbi organici plures sunt species: nimirum in conformatione, magnitudine, numero & situ, quorum indicationes sigillatim proponendæ sunt.

Morbi conformationis versantur in figura, meatu & cavitate, asperitate & levitate.

Figura vitiosa vel ab utero contracta est, vel à partu genita. Quæ ab utero contracta est, tanquam incurabilis omittenda. Quæ post partum genita est, si diuturna facta sit, difficillimè curatur; recentior multò facilius.

Si figuræ vitium ex humorum affluxu producat, aut aliquâ aliâ causâ, vel interna vel externa; illarum causarum sublatione protinus emendabitur.

**S**ic depravata figura, quæ in hydropo, tumoribus, præter naturam, elephantorum facie, & similibus apparet, humorum eos affectus committentium revulsione, derivatione, & evacuatione restituenda.

Si figuræ vitium absque humoris affluxu contingat, ut iis sit, qui obtorta habent erura, vel dorsi spinam convexam, aut costas nimis elevatas: in pueris quidem correctio tentanda est contractione longa & frequenti manuum in oppositam partem; postea decubitu & deligatione conveniendi cum fasciis, clitellis, & chartulis: In adultioribus verò emollientibus medicamentis pars prius demulcenda est, deinde in loco debito continenda prædictis instrumentis. Quod si ex fractura, & malè genito callo, ob indebitam membri collocationem vitium figura acciderit; denuò callus frangendus est, ut deinceps commodius regignatur, modo illud sine periculo fieri possit, nimirum in corpore robusto, bonè habito & temperato.

Morbi meatus & cavitatis, sunt dilatio, strictio, & obstructio; quæ ab innumeris causis produci solent, & secundum causarum varietatem, quam plurimas exhibent indicationes, quæ nonnisi in methodo particulari exacte tradi possunt.

Asperitates etiam & levitates præternaturales sunt ab innumeris causis, tam internis, quam externis, vulnerantibus, erodentibus, abstergentibus, siccantibus & similibus, quarum ablatio nonnisi in particulari methodo doceri potest.

Morbi in numero deficiente à sola natura curabiles sunt. Quidquid enim deest, vel est caro, vel os, vel alia quædam pars, quam Medicus nequit reponere. Illius tamen generationem promovere potest, removendo impedimenta, quæ naturam in hoc opere remorari possunt. Tum etiam quando membra deperdita à natura regenerari nequeunt, in eorum locum quippiam aliud Medicus subrogare potest, quod partem amissam usum quodammodo præstare possit, ut quando brachium ferreum, aut crus ligneum, aut nares artificiales Taliacotii in amissorum locum adaptari solent.

Quæcumque numero excedunt, protinus rescindenda sunt, modo id sine periculo, & cum egrotantis comodo fieri possit. Prout autem eorum maxima est varietas, sic diversissimus esse solet extirpationum modus, cum tamen omnes ferro, igne, vel medicamentis perficiantur.

Magnitudo aucta imminutione: imminuta additione sanatur, iislem propemodum instrumentis, quibus numerus auctus & imminutus curari solent.

Quando partes situm & connexum naturalem amittunt, in pristinum locum reponendæ sunt, ea præsertim methodo, quæ in luxationum & herniarum curatione proponitur.

### CAPUT III.

De Indicationibus à morbo communi, seu solutâ unitate.

Omnis solutio continui unionem desiderat, quæ à natura perficitur, cuius tamen minister est Medicus. cuius præcipua hac in re officia quinario numero continentur.


Primum est, ut videat, ne quid incidat in partem affectam, quod conglutinationem impedire possit.

Secundum, ut extrema solutæ unitatis rectè iterum conjungantur, & sibi mutuo applicentur.

Tertium, ut extrema conjuncta conserventur.

Quartum, ut eorundem unio & mutuus coalitus promoveatur.

Quintum, ut symptomata, quæ supervenire possunt, præcauantur & corrigantur, quorum præceptorum exercitatio in vulnere, ulcere, & fracturarum curationibus fusè ostenditur.



## THERAPEUTICES PARTIS PRIMÆ SECTIO QUARTA.

De Indicationibus à viribus.

### CAPUT I.

Quid diætam in ægris indicet ac coindicet?

Vires in quocumque corporis statu sui conservationem indicant.

Illa autem conservatio à diætâ, seu victus ratione perficitur, quæ ut à viribus propriè indicatur, sic à morbo seu causâ morbifica coindicatur, vel prohibetur.

**Q**uemadmodum suprà dictum est remedium, prout est curationis instrumentum, indicari à rebus præter naturam, & coindicari à rebus naturalibus, sic etiam contrà pro certo habendum est, alimenta, utpote conservationis instrumenta, à rebus secundum naturam indicari, & coindicari à rebus contra naturam. Sunt autem vires ipsæ facultates, seu potius eorum instrumenta, nimirum caloris, spirituum, & partium solidarum robur, quo firmo ac vegeto existente, vires esse dicuntur validæ, & contrà. Quia igitur partium solidarum & spirituosarum conservatio fit beneficio alimenti, ideo illius usus, qui diætâ nominatur, vires conservare dicitur. Morbus verò, & causa morbifica coindicant vel prohibent alimenti usum, quatenus ab ea augeri vel foveri possunt, vel natura pepsi intenta, à pepasmo avocari. Quando enim ea in concoctione alimentorum occupatur, à materiæ morbificæ concoctione distrahitur: unde fit, ut, ex consideratione morbi, cibationi modus sit adhibendus.

### CAPUT II.

Quæ ad diætam seu victus rationem spectent?

In omni corporis statu diætâ seu victus ratio in rebus non naturalibus versatur, præcipuè verò in morbis cibi & potus consideratio principem locum obtinet.

**C**ibus & potus, prout sunt vera nutritionis objecta, sic vera sunt instrumenta, quibus vires conservantur; reliquæ verò res non naturales sunt tantum causæ adjuvantes, quæ bonè vel malè dispositæ faciunt, ut nutritio ex alimento melius aut pejus procedat. Nam somnus & vigilia, si modum excefferint, calori & spiritibus officiant, si verò intra sanitatis limites constiterint, eadem conservant, ac proinde coctionem juvant. Somnus enim immo-



# 134 Instit. Medicæ, Lib. V. Pars I. Sect. IV.

dicus cerebri refrigerat & humectat, unde calor innatus marcescit spiritusque animales humiditate obruuntur, atque ita facultas animalis labefactatur, cui facile vitalis & naturalis compatiuntur. Nimiæ verò vigiliæ spiritus & calorem dissipant. At moderatus somnus, & moderatæ vigiliæ, calorem & spiritum conservant, atque ita coctionem juvant. Sic etiam motus & quies, quæ intra modum constiterint, calorem nativum excitant & fovent. Tum etiam repletio & inanitio in symmetria positæ optimæ coctioni inserviunt. Animi verò pathemata, & ipsa moderata faciunt, ut calor nativus vigeat, & hinc bona fiat concoctio: contra verò eorum excessus, calorem & spiritus vel dissipat, vel suffocat. Ac denique aër ambiens, bene temperatus, omnes corporis functiones recreat: intemperatus easdem insigniter lædit, morborumque curationem impedit.

## CAPUT III.

Quotnam sint diætæ species, & quibus morbis convenient?

*Diætæ triplex est; plena, mediocris, & tenuis.*

*Plena est, quæ non solum vires præsentis conservare, sed etiam augere potest.*

*Eaque rursum triplex est: simplicissima, quæ & ægrotantibus convenit, sique secundum Hippocratem per pisanam hordeaceam integram: alia plenior & crassior, quæ fit per pisces & ova; alia plenissima, quæ carnes solidiores complectitur.*

*Diætæ tenuis est, quæ vires quidem conservat, nonnihil tamen imminuat.*

*Eaque etiam triplex, alia simpliciter talis, quæ fit per pisanam succum, alia tenuior, in qua melioratum exhibetur; alia tenuissima, quæ erat inedia.*

*Diætæ mediocris est, quæ vires in eodem statu conservat, & fæbat olim per panem in jure lotum, vel etiam per carnes pullorum.*

*Nostri temporibus diætæ ægrotum valde diversa est, & victus non magis tenuis quam per jussula caponum, gallinarum, aut pullorum instituitur, mediocris verò per hordeata, panatellas, & cætera perficitur. At denique plenior, usu alimentorum euechymorum & solidorum, ut perdicum, caponum, columbarum, & aliorum ejusdem naturæ.*

*Quælibet diætæ ægrotum ex virium & morbi collatione metienda est, ita ut quo magis natura in morbo expugnando occupata est, eo tenuior diætæ imperanda sit; quantum scilicet vires eam ferre possunt; & quo minus natura occupata est, eo uberiores victum adhibere liceat.*

*In morbis longis mediocri vel pleno victu opus est, & tanto quidem plenior, quanto morbus longior est.*

**V**ires enim ita conservandæ sunt, ut usque ad statum durare possint, & totius morbi expurgationi sufficere, qui cum diu duraturus sit, vires tenui victu non imminuendæ sunt.

*In acutis morbis tenuis victus requiritur, & quo acutior est morbus, eo tenuior victus est exhibendus.*

*In acutis morbis natura expurgationi causæ morbificæ maximè occupata est, ideo alimentis, quantum fieri potest, ab opere suo non avocanda. Ideo tenuis victus convenit, qui quamvis aliquantulum vires imminuat; illæ tamen totius morbi decursui, qui brevissimus, sufficere poterunt.*

*Si vires non adeo Medico perspectæ sint ut justam alimenti formam præscribat, satius est, justo pleniorum victum præscribere, quam tenuiorem.*

*Hoc præceptum depromptum est ab Hippocrat. Aph. 5. sect. 1. qui sic habet: In tenui victu ægri delinquent, quo fit ut magis lædantur. Quicumque enim error committitur magnus major in hoc fit, quam in paulò pleniori victu. Propterea etiam sanis periculosus existit valde exquisitus victus, quoniam errores gravius ferunt. Ob hoc igitur tenuis victus, atque admodum exquisitus, eo qui sit paulò plenior, magis pericu-*

*culosus. Cui tamen sententiæ contrarium attulisse visus est idem Hippocrates 2. de vict. rat. in acut. Adjectioni, inquit, ciborum attendendum multò minus, subtrahere autem omnino expedit. Hanc tamen contrarietatem conciliare possumus, dicentes; in priori sententiâ loqui Hippocr. de forma victus, quæ si sit iusto tenuior, majora affert incommoda, quàm paulò plenior; in posteriori verò loqui de quantitate victus, in quo eadem forma observata, satius est nos esse pauciores.*

## CAPUT VIII.

De Quantitate Victus.

*Quantitas victus triplex est: summa, media & minima: qui in omni victu, sive pleno, sive tenui, sive mediocri adhiberi potest.*

**Q**uemadmodum in medicamentis triplex quantitas seu dosis consideratur, nimirum summa, media, & infima, quæ tum in vehementioribus, tum mitioribus, tum etiam mediis consideratur; sic & in alimentis idem fit: postquam enim Medicus judicavit, an in morbo proposito victus tenuis conveniat, vel plenus, vel mediocris advertere debet, an in quantitate mediocri, summa, vel minima exhibendus sit, quod ex morbi acutiei, & majori vel minori naturæ cum morbo certamine distinguere poterit.

*In principio morbi, victus qui ei competii, in summa dosi exhibendus est.*

*Quia tunc temporis natura cum causa morbifica non valde pugnat, neque adhuc in illius coctione & evacuatione occupata est, ideo majorem alimenti copiam conficere poterit.*

*In augmento morbi, victus mediocri quantitate exhibendus est.*

*Quia tunc temporis natura circa materiæ morbificæ concoctionem magis occupata est, quàm in principio.*

*In statu morbi victus in minima dosi est exhibendus.*

*Quia tunc temporis naturæ pugna cum morbo vehementissima est, & natura in concoctione ac evacuatione materiæ occupatissima, ab instituto suo minimè est revocanda.*

*Si vires sint debiles, & causa morbifica valde urgeat, parva cibi quantitas & sæpius iterata exhibenda est.*

*Ratione causæ, quæ vehemens est, parum cibi exhibere oportet, ne illa causa morbifica augeatur: at ratione virium sæpè iterare convenit, ne ipsæ deficient, in quo magna Medici prudentia opus est, quia omnia indicantia, coindicantia, & prohibentia diligenter debet circumspicere, quod annotavit Hippocrates Aph. 17. sect. 1. quibus inquit, etiam semel aut bis, & plus minusve, & partitis vicibus cibum præbere convenit, spectandum est; dandum verò aliquid regioni, & consuetudini.*

## CAPUT V.

De Tempore Victus Exhibendi.

*In morbis continuis, & qui accessionum aut exacerbationum differentias non habent, victus exhibendus est secundum consuetudinem, eo potissimum tempore, quo prius æger cibum assumere consuevit.*

*In morbis, qui accessiones vel exacerbationes habent, in tempore majoris quietis cibum est offerendus.*

**C**um enim in paroxysmo vis morbi sit maxima, & naturæ cum morbo pugna acerrima, natura alimentis oneranda, & ab opere suo ad cibi concoctionem evocanda non est; ne inferior evadat. Tum etiam cibus exhibitus tunc temporis non coquitur, sed crudus manet, & à materiâ putrida, quæ tempore accessionis agitur, contaminatur & corrumpitur, atque ita morbus augetur, & mala symptomata inducuntur.

*Quando maxima est virium jactura, etiam in paroxysmo cibum exhibere convenit.*



# Cap. I. de Medic. bilem refriger. & attenuant. 135

*Si febris sit ab humore acri & mordaci, accenso à Sole, in mediâ laboribus; & æger sit habitu gracili, temperatur à calida & sicca; præsertim æstatis tempore, in ipso paroxysmo, vel paulò ante ipsum, æger cibandus est.*

*Si enim hujusmodi ægrotantes diutius à cibo abstineant periculum est, ne febris magis incandescat, syncope vel convulsio excitetur, aut etiam febris hæctica, ut docet Galenus 10. meth. cap. 2.*

\*\*\*\*\*

## THERAPEUTICES

### PARS SECUNDA.

De Instrumentis Medicis.

#### PROOEMIUM.

*Omnia Medici opera tribus instrumentis perficiuntur: Diætâ, Chirurgiâ & Pharmaciâ.*

**R**emediorum sylva, quibus Medicus utitur ad morborum vel præsentia curationem, vel imminuentium præcautionem, sub tribus hisce instrumentis omnino comprehenditur. Quorum primum de bitam victus rationem, secundum legitimum sex rerum nonnaturalium usum instituit. Secundum circa ea versatur quæ manu periti artificis in corpore humano exercentur. Tertium denique omnia medicamentorum genera, quibus humores noxii præparantur & expurgantur, partium intemperies emendatur, earumque robur intenditur, ac reliquæ omnes indicationes curativæ implentur, gremio atque ambitu suo complectitur.

*De Diætâ & Chirurgia, quantum ad medicas institutiones attinet, satis abunde egimus in methodo generali medendi. Superest jam, quæ ad Pharmaciâ spectant, diligenter inquirere.*

*Est autem Pharmacia illa Medicinæ pars, quæ materiam medicamentorum, eorumque facultates, usus, & componendi modos complectitur.*

*Quæ ut sigillatim explicentur, totus iste Tractatus in duas sectiones erit distribuendus.*

*In prima, omnis medicamentorum materia, eorumque facultates & usus exponuntur.*

*In secunda verò, componendorum medicamentorum ratio docebitur.*

\*\*\*\*\*

## THERAPEUTICES

### PARTIS SECUNDÆ

### SECTIO PRIMÆ.

De Materia Medica.

#### PROOEMIUM.

**Quid medicamentum, quæ illius differentiæ, & sectionis divisio.**

*Medicamentum, ex Gal. 1. de simpl. med. facultatibus, c. 1. & 3. est quod naturam nostram alterare potest, & statu præternaturali ad naturalem reducere.*

*Differt ab alimento & veneno, quod alimentum à natura vindicatur, & in corporis substantiam commutetur; Venenum verò corpus nostrum corrumpat.*

*Et ideo medicamentum est veluti medium inter alimentum & venenum, quod neque à corpore nostro vincitur, neque illud corrumpit, sed tantum alterat & immutat.*

*Omnia verò medicamenta vulgo dividi solent in simplicia & composita.*

*Simplicia sunt, quæ à sola natura suggeruntur, & nihil ab arte permixtum habent. Eaque ex tribus fontibus desumuntur, plantis, animalibus, & mineralibus.*

*Composita sunt, quæ ex pluribus simplicibus simul mixtis conglata sunt, aut quæ artis ministerio in aliam formam commutata fuerunt.*

*Utraque rursum duplicia sunt, interna & externa.*

*Interna hæc vocamus, quæ internorum affectuum rationi sunt accommodata.*

**N**E quis ægrè ferat, nos internorum medicamentorum catalogo illa etiam admiscere, quæ foris admoventur: sciat nos hæc interna appellare non solum quæ intra corpus assumuntur: sed etiam, quæ foris admoventur, dummodò affectuum internorum curationi inserviant, quod magno tyronum commodo factum est, ut ad eadem indicationem adimplendam materiam internam & externam simul congestam reperire possint.

*Externa verò, quæ curandis affectibus externis inservire solent.*

*Ideo Sectio ista prima in duas particulas dividenda est.*

*Prima materiam medicamentorum internorum proponet.*

*Secunda verò externorum materiam continebit.*

\*\*\*\*\*

## SECTIONIS PRIMÆ

### PARTICULA PRIMÆ.

De Materia Medica Interna.

#### P R Æ F A T I O.

*In morborum internorum curatione præcipuæ indicationes respiciunt vel causas morbificas, vel morbos, vel ipsas partes affectas.*

*Causæ morbificæ majori ex parte sunt varii humores, qui prout variis qualitatibus peccare solent, ita varia requirunt medicamenta, contrariis qualitatibus donata. Verbi gratiâ, frigidi humores calida exposcunt remedia; calidi, refrigerantia; tenues, incrassantia; crassi, attenuantia; corrupti, expurgantia; & ita de cæteris.*

*Morbi quandoque sublatis suis causis adhuc permanent, & peculiarem exposcunt curationem per contraria remedia, ut in methodo generali medendi luculenter docetur.*

*Partes denique corroborantia requirunt roborantia & alterantia specifica, qualia sunt Cephalica, Thoracica, Cardiacæ, Stomachica, Hepatica, &c. quæ omnia ordine suo proponuntur.*

*Porrò omnis hæc materia vel sumitur ex plantarum radicibus, lignis, corticibus, foliis, seminibus, fructibus, floribus, gummis, resinis, liquoribus, succis; vel ex animalibus integris, aut ipsorum partibus, tam viventibus, quam non viventibus & excrementitiis; vel denique ex mineralibus, qualia sunt Terra, succi concreti, lapides & metalla, ex quibus omnibus varia composita parantur in officinis, ut aquæ, syrapi, conservæ, pulveres thochisci, confectiones, electuaria, &c.*

#### C A P U T I.

**De medicamentis bilem refrigerantibus & attenuantibus.**

*Biliosus humor, quoties morbum aliquem producit, refrigerantia medicamenta postulat. Quando autem crassior est, & alicui parti impactus, tum medicamenta non solum refrigerantia, sed etiam leviter attenuantia esse debent.*

**R**efrigerantia medicamenta in usum revocantur, sumpta indicatione à morbo & à morbi causa. Bilis enim propriâ naturâ calida est, & morbos calidos producit; unde utrique refrigeratio est consentanea. Attenuantia verò esse debent in omnibus propemodum febribus, præsertim iis, quæ ab humorum putredine ducunt originem. Siquidem omnis putredo à prohibita transpiratione fit, prohibita



# I 36 Instit. Medicæ, Lib. V. Part. II. Sect. I. Pars I.

prohibita transpiratio ab obstructione, obstructio ab humorum crassitie, vel multitudine. Quemadmodum ergo nonnullæ febres putridæ fiunt ab humorum multitudine, ita maxima pars earum humoris crassitiem solet habere comitem: quæ si tanta non fuerit, in bile potissimum, ut patentes meatus possit obstruere; sufficiens saltem est poros insensibiles partium internarum occludere: qui ut aperiantur leviter saltem attenuantibus humor est præparandus. Adde, interdum parvi alicui bilem esse impactam, quæ ut auferatur, attenuanda est iisque usibus medicamenta bilem refrigerantia & attenuantia, destinata fuerunt. Quæ licet frigida sint, tamen substantiæ tenuitate sunt prædita, quam levi aciditate, aut amarore patefaciunt: hincque humores attenuant.

*Illorum autem medicamentorum series hæc est.*

## S I M P L I C I A.

Radices, *Acetosæ, graminis, cichorii, lapathi acuti.*

Folia, *Endiviæ, cichorei, acetosæ, capillorum Veneris, scariolæ, dentis leonis.*

Semina, *Quatuor frigida majora, endiviæ, acetosæ, bordci.*

Fructus, *Poma, pruna acida, cerasa acida.*

Flores *Cichorei*, præsertim quibus adduntur flores *borraginis, buglossi, & violarum*, qui licet non habeant attenuandi vim, quia tamen refrigerant, humectant, & corroborant, ideo in omni ferè refrigerationis indicatione, siue attenuandum sit, siue incrassandum, frequenter præscribi solent.

## C O M P O S I T A.

Aqua, *acetosæ, cichorei, graminis, endiviæ, bordci*, quæ non destillatione, ut aliæ; sed sola decoctione fit.

Succi, *limonum, granatorum, pomorum, acetum, omphacii.*

Syrupi, *de limonibus, acetosus simplex, cichorei simplex, de succo acetosæ, capillorum Veneris, de pomis, de granatis acidis, de agrestia oxysaccharum.*

Conservæ, *Florum cichorei, foliorum acetosæ; capillorum Veneris, cerasa condita.*

Pulveres & Electuaria, *Diamargaritii frigidi, diatriasani.*

Chymia, *Spiritus sulphuris & vitrioli, sal prunellæ.*

## C A P U T II.

De Medicamentis bilem refrigerantibus & incrassantibus.

*Interdum bilis suâ tenuitate multa parit incommoda, quibus opitulatur incrassantia medicamenta, quæ simul refrigerant & ferocientis humoris impetum coercunt.*

**B**illis calida, & tenuis sæpe in morbis acutis facit orgasmus, unde periculum est, ne vehementer commota, in partem aliquam nobilem irruat, eamque insigniter lædat. Aliàs, ad intestina delata, molestas parit diarrhoeas, nonnunquam etiam, aliis humoribus permixta, iisque tenuitatem concilians, graves excitat fluxiones, unde postquam cathartici quædam illius portio vacuanda est, reliqua incrassanda, ut ferox illius motus coercetur. Quâ ratione usurpari solent medicamenta incrassantia, quæ necessariò frigida sunt, cum incrassatio à frigiditate communiter dependeat.

*Illæ autem medicamenta incrassantia sunt huiusmodi.*

## S I M P L I C I A.

Radices, *Altheæ, plantaginis.*

Folia, *Portulacæ, plantaginis, malvæ, altheæ.*

Semina, *Lactucæ, portulacæ, papaveris albi, malvæ, psyllii, cidontorum, bombacis.*

Fructus, *Jujubæ, scabæ, cydonia.*

Flores, *Nymphæ, papaveris rhæados, violæ, rosæ rubræ.*

Gummi, *Arabicum, tragacanthum.*

Animalia, *Ebur, spodium, cornu cervi.*

Mineralia, *Terra sigillata, bolus armena.*

## C O M P O S I T A.

Aquæ, *Lactucæ, portulacæ, papaveris rhæados, nymphæ, rosarum.*

Syrupi, *Violaceus, jujubarum, papaveris rhæados, rosarum siccarum, papaveris albi.*

Succi, *Cydoniorum, amylium.*

Conservæ, *Rosarum, violarum, florum nenupharis, lactucæ condita, cydonia condita.*

Electuaria, *Eiagaracanthum frigidum, diapenidion sine speciebus.*

Trochisci *de spodio.*

Chymica, *Laudanum opiatum, sal prunellæ.*

Licet sal prunellæ inter attenuantia fuerit recensitum; hic tamen locum habere debet, quia summè refrigerando humorum motum cohibet, & mira quadam naturâ contrarios veluti effectus parit: Siquidem humores tenuiores & mobiliore in crassat, eorumque impetum mirabiliter cohibet. Unde fit, ut ad quamlibet hæmorrhagiam potentissimè conducat. Tum etiam diaphoreticum est, ut pleuritidi, peripneumoniz, & febribus malignis multum prodest, nec non urinas provocat, & calculosis efficacissimè confert.

## C A P U T III.

De Medicamentis Pituitam Alterantibus.

*Pituita excrementitia frigida est & humida, crassa, viscida, & lenta, ideo medicamenta illam præparantia calefaciendi, exsiccandi, attenuandi, incidendi, & detergendi facultate prædita esse debent.*

**N**on potest pituita cathartici commodè expurgari quin prius alterantibus convenienter præparetur, & purgationi idonea reddatur. Ideò medicamenta ei destinata, quoad primas qualitates frigidum humidumque humorem calefaciunt & exsiccant, quoad secundas, crassum attenuant, viscidum incidunt, lentum detergunt, eumque ita disponunt, ut purgantium tractationi facilè obsequatur.

Nota pituitam falsam tantopere calefacientibus non indigere, sed tantum temperatis admixtis etiam frigidis, quæ bilem incrassare valent, quando præsertim à pituita falsa catharrhi generantur.

*Medicamenta verò pituita alterantia sunt.*

## S I M P L I C I A.

Radices, *Enulæ campanæ, cyperi, calami aromatici, galangæ, apii, petroselinæ, feniculi, zedoariæ, ireos florentinæ, chinæ, salsæ parillæ, zinziberis.*

Ligna, *Xyloaloes, guaiacum, sassafras.*

Cortices, *Curi siccæ, guaiaci, cinamomum.*

Folia, *Salviæ, betonicæ, rorismarini, majoranæ, thymi, origani, calamenthi, pulegii, absynthii, menthæ, chamædryos, chamæpityos.*

Semina, *Anisi, feniculi, apii, petroselinæ, citri, cardui benedicti, ameos, dauci, seseleos.*

Fructus, *Piper, cubebæ, cariophylli, cardamomum.*

Flores, *Salviæ stæchados, anthos, lavendulæ, betonicæ, schœnantes, macis.*

Animalia, *Moschus, zibeta, castoreum.*

Mineralia, *Ambra grysea, chalybs præparatus.*

## C O M P O S I T A.

Aquæ, *Salviæ, betonicæ, feniculi, hyssopi, absynthii, mellissæ, cardui benedicti, cælestis, Imperialis, theriacalis, cinnamomi, aqua vitæ.*

Syrupi, *de stæchade, de hyssopo, de mentha, de absynthio, quinque radicibus, oxymel simplex, oxymel compositum, syrupus conditura corticis citri, mel rosatum.*

Conservæ & conditura, *Florum salviæ stæchados, anthos, foliorum absynthii, zinziberis, radicis enulæ campanæ, radicis acori, corticis citri, mirobalanorum, nucis moschatæ.*

Confectiones, *Theriaca, mihiadatium, aurea Alexandrina, confectio alkermes.*

Pulveres & electuaria, *diambra, diamoschi, de gemmis, dianthos, diatreos, diagalange.*

Trochisci, *Gallie moschatæ, aliptæ moschatæ, de myrrha, de absynthio, de euphorio.*

Chymica,



Chymica, Oleum, seu essentia anisi, fœniculi, thymi, salviae, cinamomi, caryophyllorum. Ex his elæosacchara, & multa alia.

CAPUT IV.

De Medicamentis Melancholiam Alterantibus.

Humor melancholicus frigidus & siccus, crassus & terrestris est. Ideo medicamenta, quæ illum præparant, calefacere, humectare, attenuare, & incidere debent.

Impossibile est aliquod reperire medicamentum, quod calefaciat & attenuet, simulque humectet: illa enim quæ calefaciunt & attenuant, necessariò exsiccant. Non possumus igitur hunc humorem secundum omnes suas qualitates alterare, nisi attenuantibus admiscendo ea, quæ peculiarem humectandi vim præ se ferunt, prout in sequentibus fiet.

SIMPLICIA.

Radices, Enulæ campanæ, eryngii, apii, petroselini, buglossi, fœniculi.

Cortices, Radicum capparum, medianus fraxini, tamarisci, sambuci, citri.

Folia, Fumariæ, lupulorum, ceterach, cuscute, melissæ, borraginis, pimpinellæ, capillorum Veneris.

Semina, Anisi, fœniculi, apii, citri, cardui benedicti.

Fructus, Passilæ, cappares, poma redolentia, uvæ Corinthis, grana Kermes.

Flores, Genistæ, tamarisci, borraginis, buglossi, calendule, sambuci, violarum, crocus.

Gummi, Bdellium, ammoniacum.

Mineralia, Chalybs.

COMPOSITA.

Aquæ, borraginis, buglossi, fœniculi, cardui benedicti.

Syrupi, de pomis redolentibus, fumariæ, de quinque radicibus, Byzantinus, capillorum Veneris.

Conservæ & conditurae, Florum borraginis, buglossi, genistæ, violarum, radices enulæ campanæ, corticis citri, myrobalani conditæ.

Confectiones, Alkermes, theriaca.

Pulveres & electuaria, Diambra, lætificans Galeni, de gemmis, diamoschum dulce.

Chymica, Sales fraxini, tamarisci, tartari, cremor tartari, chalybs præparatus.

CAPUT V.

De Medicamentis Atram Bilem alterantibus.

Atra bilis adustione generatur, unde calida est & sicca, nec non crassiusculi pariceps: unde medicamenta, quæ eam præparant, frigida humidaque esse debent, & simul attenuantia.

Hæc ab iis, quæ bilem flavam præparant, ferè non distinguuntur, nisi quòd ea tantum seligantur, quæ majori pollent humiditate, atque adeò, quæcunque acida sunt, hîc non usurpantur, propterea quod siccandi facultate quadam prædita censeantur. Igitur quæ bilem flavam alterant, hîc usurpari poterunt: attamen propriè & directè sequentia medicamenta atram bilem oppugnant.

SIMPLICIA.

Radices, buglossi, borraginis, liquiritiæ.

Folia, borraginis, buglossi, fumariæ, lupulorum.

Semina, quatuor frigida majora.

Fructus, poma redolentia.

Flores, borraginis, buglossi, violarum, nymphaeæ.

COMPOSITA.

Aquæ, borraginis, buglossi, nymphaeæ.

Syrupi, violaceus, pomorum redolentium.

Conservæ, violarum, borraginis, buglossi, nymphaeæ, lactucæ.

Chymica, spiritus sulphuris, vitrioli, (etsi acidi sint) prunellæ, Saturni, Martis, tartari.

Laz. Riverii Opera.

CAPUT VI.

De Medicamentis Aperientibus.

In multis corporis meatibus, venis potissimum hepatis; lienis, mesenterii & uteri, obstructions generantur à crassis viscidisque humoribus, vasorum tunicis adhaerentibus, ac reliquorum humorum transitum præpedientibus.

In frigidioribus naturis, vita sedentaria, & pravis alimentis utentibus, humores crudi generantur, qui per angustiora vasa delati, propter crassitiem non possunt transfluere, sed magis ac magis incrassantur, lenti ac glutinosi evadunt, venarum tunicis adhaerent, in iisque obstructions generant, à quibus infinita incommoda solent exoriri.

Solvuntur autem illæ obstructions aperientibus medicamentis, quæ ex Galeno 5. de simpl. medic. facult. c. 11. nitrosa sunt & amara, quarum qualitatum ope attenuant, incidunt, & abstergunt, atque adeò pituitam præparantibus sunt finitima.

Aperientia medicamenta à Galeno appellantur ἐκπαρτιὰ, seu ἐκκαθάρτια, quasi expurgantia & ab infarctu liberantia, quæ facultate ea omnia præstant, quæ ad tollendas obstructions sunt necessaria: quatenus enim attenuant, humoris crassitiem auferunt: quatenus incidunt, visciditatem tollunt, quæ in partium tenuitate consistit; quatenus denique abstergunt, humorem partibus adhaerentem excutunt.

Quæcunque igitur verò atque efficaciter aperientia sunt, calida esse necesse est. Dantur tamen aperientia frigida minoris virtutis, & minùs propriè ita dicta, levioribus obstructionibus, & calidioribus naturis idonea.

In febris putridis, aut alioqui calidioribus naturis, obstructions sæpe contingunt, quæ nisi sint valde contumaces, aperientibus frigidis sunt auferendæ aut saltem calidioribus frigida hæc miscenda; quæ tamen non tam absolutè frigida dicuntur, quàm aliis comparata. Ex se enim vel temperata sunt, vel remissè frigida. Non potest siquidem aperiendi vis cum eximia frigiditate consistere.

Illæ autem medicamenta aperientia sunt hujusmodi.

APERIENTIA CALIDA  
SIMPLICIA.

Radices, apii, petroselini, fœniculi, filicis, cyperi, enulæ campanæ, gentianæ, eryngii, ononidis, aristolochiæ utriusque, asari.

Cortices, radices capparum, mediani fraxini, mediani tamarisci.

Folia, origani, calamenthi, pulegii, chamædryos, chamæpityos, centaurei minoris, betonica, hyperici, absynthii romani, capillares omnes, quæ temperatæ sunt.

Semina, apii, petroselini, fœniculi, cardui benedicti, urticae, agni casti, anisi, dauci, ammeos, seseleos, cicera rubra.

Flores, stæchados, anthos, genistæ, sambuci, tamarisci, hyssopi, betonica.

Gummi, ammoniacum, bdellium, aloës, terebinthina, myrrha. Mineralia, chalybs.

COMPOSITA.

Aquæ, fœniculi, betonica, absynthii, hyssopi, cardui benedicti, cinamomi.

Syrupi, Byzantinus, de quinque radicibus, de absynthio, oxymel simplex, oxymel compositum.

Compositæ, florum genistæ, tamarisci, foliorum absynthii.

Electuaria, aromaticum rosatum, diarrhodon abbat. is.

Confectiones, Alkermes, Theriaca.

Trochisci, de capparibus, de absynthio, de eupatorio, de myrrha.

Chymica, chalybs præparatus, sal absynthii, tamarisci, fraxini, tartari, & Cremor ejusdem. Oleum anisi, fœniculi, cinamomi, spiritus terebinthinæ, bals. sulph.

APERIENTIA FRIGIDA  
SIMPLICIA.

Radices, cichorei, graminis, asparagi, acetosæ, brusci, oxylapathi.

Folia, endiviæ, cichorei, cucurbitæ, acetosæ, hepaticæ, agrimonie, capillares omnes.

S

Semina



# 138 Instit. Medic. Lib.V. Part. II. Sect. I. Pars I.

Semina, quatuor frigida majora, acetosæ.  
Flores, cichorci.

## COMPOSITA.

Aquæ, endiviæ, cichorci, graminis, acetosæ, agrimonie.  
Sirupi, acetosus simplex, de limonibus, de cichoreo simplex, de succo acetosæ, capillorum veneris.  
Electuaria, triasantaloni, diarrhodon abbatis temperatum.  
Chymica, spiritus sulphuris, vitrioli, sal prunellæ, cremor & liquor tartari.

## CAPUT VII.

### De Medicamentibus Purgantibus.

Hactenus medicamenta proposuimus, quæ humores noxios præparant, & purgationi subeunda idoneos efficiunt: jam de purgantibus agendum.

Solent autem humores evacuari purgantibus medicamentis, quæ substantiæ familiaritate, quam habent cum illis, eos ad se attrahunt, ut magnes ferrum.

Tot igitur erunt purgantium medicamentorum genera, quot sunt humores in corpore purgationi idonei: nimirum cholagoga, phlegmagoga, melanagoga, & hydragoga.

**H**UMORES, qui catharticonum ope vacuari solent, vulgò sunt bilis, pituita, melancholia & serum, seu aquosus humor. Unicuique horum peculiaris competunt remedia, electivè purgantia. Sic quæ bilem purgant, cholagoga nuncupantur; quæ pituitam, phlegmagoga; quæ melancholiam, melan goga; quæ serosos humores, hydragoga.

Illa iterum dividi solent in mitiora, mediocria, & vehementia.

Medicamenta purgantia non æquali virtute operantur; sed alia minori, alia majori, pro varia agendi vi sibi à natura insita. Ideo ut facilius possint in usum revocari, in tres classes distribuuntur, mitiorum scilicet, mediocrium, & vehementium. Mitiora usurpari solent in debilioribus naturis, vel ubi à prima tantum regione est vacuandum. Mediocria, in mediocri virium robore, & ubi à secunda regione vacuandum. Denique vehementia, in robustioribus corporibus, & quando à remotioribus partibus humores attrahendi, cerebro putà, articulis, &c. Plerumque tamen in eodem pharmaco vehementia cum mitioribus & mediocribus à prudenti Medico permisceri solent, ut felicius invicem permixta operentur.

Atque ut faciliè in usum revocari queant, iuxta singulorum dosis erit proponenda.

Maximi est momenti, cujuslibet medicamenti dosin rectè tenere, sine qua nemo unquam medicinam facere audeat, nisi cum certo ægrotantium vitæ discrimine. Quia tamen purgantium dosis ubique immutanda est pro varia corporum dispositione, quod quidem à judicio Medici omnino dependet, ideo cujuslibet medicamenti majorem & minorem dosin proponemus, quatenus scilicet in ætate mediocri usurpantur, ut ex earum latitudine quantitas magis consentanea elici possit.

Illæ autem doses ita accipiendæ sunt, prout scilicet medicamenta per se, aut in substantia (ut vocant) assumuntur: nam in infusione vehementiora dupla quantitate exhibentur; in decocto verò, tripla. Mitiora verò, & mediocria, tripla scè in infusione; & quadrupla in decocto.

Virtus medicamentorum infusione & decocto deperditur; illa etenim in tenuiori substantia residet, quæ à calore facile dissipatur. Ideò cum in decoctione multò major sit caloris vis, quam in infusione, necesse est vim purgatricem magis minui, atque adeo majori dosi medicamenta erunt præscribenda.

Ab hoc tamen generali theoremate excluduntur rhabarbarum & myrobalani, quæ magis purgant in infusione, quam in substantia, propterea quod non solum vim purgatricem præ se ferant, sed etiam adstrictoriam, quæ infusioni non communicatur.

Hæc duo medicamenta purgandi & adstringendi vim obtinent, ratione diversæ substantiæ, tenuis scilicet, & crassæ seu terrestris. In tenui enim substantia vis purga-

trix residet; in terrestris verò adstrictoria. Jam infusione tenuis substantia in liquorem transfertur, terrestris verò rejicitur, unde in infusione purgans tantum remanet. Vide M. M. Fernelianam Gr. Horstii.

## CAPUT VIII.

### Cholagoga Medicamenta.

## SIMPLICIA.

### MITIORA.

**C**assia, ab ʒ. j. ad ʒ. j. β.

Manna, ab ʒ. j. ad ʒ. ij. & ʒ. ij. β.

Succus rosarum, ab ʒ. j. β. ad ʒ. ij.

Tamarindi, ab ʒ. ij. ad ʒ. iij.

## MEDIOCRIA.

Alcè, à ʒ. j. ad ʒ. j. Corrigitur mastiche, tragacantho. Rhabarbarum, ʒ. j. ad ʒ. ij. tam in substantia, quam in infusione. Corrigitur spica nardi, cinnamomo.

Myrobalani citrini, à ʒ. ij. ad ʒ. iij. magis adstringunt, quam purgent. Vis illorum adstrictoria minuitur infusione & frictione cum oleo amygdalarum dulcium.

## VEHEMENTIA.

Scammonium, à g. iij. ad viij. Corrigitur succo cydoniorum; & quando correctum est, diacrydium appellatur.

Corrigitur etiam vapore sulphuris, ut in pulveris Cornachini descriptione videre est; tum etiam succo limonis per infusionem & evaporationem: Ac denique extractum illius paretur cum spiritu vini, quo resina scammonii vocatur, blandè admodum purgans, ad ʒ. β. exhibitum.

## COMPOSITA.

### SYRUPI.

Rosatus solutivus

De cichoreo cum Rhero } ab ʒ. ij. ad ʒ. iij.

## OPIATÆ.

Catholicum,

Diaprunum simplex, } ab ʒ. j. ad ʒ. j. β.

Diacassia.

Diaprunum solutivum

Electuarium de succo rosarum } ab ʒ. β. ad ʒ. vj. & vij.

Tryphera persica.

## PILULÆ.

Aureæ,

Sine quibus

De Rhabarbaro

} à ʒ. β. ad ʒ. j.

## CHYMICA.

Extractum rhabarbari, scammonii, mercurius dulcis, mercurius vitæ, crocus metallorum, aliæque Antimonii præparationes purgantes; de quarum dosi V. Schroder. pharm.

## CAPUT IX.

### Plegmagoga Medicamenta.

## SIMPLICIA.

### MITIORA.

Semen carthami, ab ʒ. j. ad ʒ. ij. Corrigitur aniso & cinnamomo.

## MEDIOCRIA.

Agaricus ʒ. j. ad ʒ. ij. Corrigitur Zinzibere & sale gemmæ.

## VEHEMENTIA.

Turbith, à ʒ. ij. ad ʒ. iij. Corrigitur zinzibere.

Hermodytylus, eadem dosi & correctione qua turbith;

Colocynthis non exhibetur, nisi correctæ & præparata in trochiscis, qui albandal appellantur, ad grana octo vel decem.

## COMPOSITA.

### OPIATÆ ET ELECTUARIA.

Catholicum

Diaphenicum

Hiera picra

Electuarium diacarthami

De solutivum.

} ab ʒ. β. ad ʒ. vj. aut ʒ. j.

## PILULÆ



PILULÆ.

Coccia majores. }  
De Agarico. } à 3. j. ad 3. iij.  
Sine quibus. }  
Stomachicæ. }  
Coccia minores. }  
Foetida majores. }  
Lucis majores. } à 3. ij. ad 3. j.  
Arthriticæ. }  
De Hermodactylis. }

TROCHISCI.

Agaricus trochiscatus, à 3. j. ad 3. iij.

CHYMICA.

Extractum agarici, colocynthidis, mercurius dulcis : mercurius vitæ, crocus metallorum, aliæque antimonii præparationes. Vid. Schroder.

Hæc purgantia, è mineralibus petita, omnes humores purgant : ideò in variis capitibus enuntiantur.

CAPUT X.

Melanagoga Medicamenta.

SIMPLICIA.

Senna, à 3. j. β. ad 3. ij.  
Polypodium, à 3. ij. ad 3. β.  
Epithimum, eadem dosi.  
Elleborus niger, à g. x. ad 3. β. præstat infundere vel decoquere, à 3. β. ad 3. ij.

COMPOSITA.

OPIATÆ.

Cathelicum, }  
Diasenna, } à 3. vj. ad 3. x.

Confectio Hamech, à 3. iij. ad 3. vj.

CHYMICA.

Extractum sennæ, Ellebori nigri, Animonii, variè præparatum.

CAPUT XI.

Hydragoga Medicamenta.

SIMPLICIA.

MITIORA.

Ebuli semen, ad 3. j.  
Cortex medianus ejusdem ad 3. ij.  
Succus ejusdem, ab 3. j. ad 3. x.  
Succus ireos nostratis, ab 3. j. ad 3. ij.  
Sambucus, idem cum prædictis, sed minùs efficaciter.

MEDIOCRIA.

Radix mechoacan, à 3. j. ad 3. ij. non coquitur; sed infunditur in vino albo, & liquor cum pulvere simul exhibetur in infusione.

Radix jalappæ, ad 3. β.

VEHEMENTIA.

Soldanella pulverata, à 3. j. ad 3. ij.

Succus ejusdem, ab 3. β. ad 3. j.

Elaterium, à g. viij. ad g. xvj.

Esula, à g. viij. ad g. xij.

Chamelea.

Thymelea. } à g. v. ad 3. β.

Gutta gummi. }

COMPOSITA.

Diatribis, ad 3. j.

Diacarthanum, ab 3. β. ad 3. j.

Pilula de sagapeno, ad 3. iij.

CHYMICA.

Resina jalappæ, scammonii, pulvis Cornachini, Mercurius & animonium variè præparatum : (de dosi dictarum specierum, tam simplicium quàm compositarum, vide Simonis Pauli appendicem ad Quadripartitum.)

Laz. Riverii Opera.

CAPUT XII.

De Vomitoriis Medicamentis.

Humores noxii in ventriculo & partibus ei vicinis contenti faciliùs vacuantur per vomitum, quàm per secessum, si ager ad eum fuerit propensus; cui usui usurpantur medicamenta, Vomitoria nuncupata.

IN ventriculo sæpe humores excrementitii natant, qui breviori via per vomitum excluduntur, præcipuè si ægotans nausea infestetur, & vomitum non ægrè ferat. Facile enim vomitum patiuntur, ex Hipp. doctrina, biliosi, graciles, & qui amplo sunt pectore: Contrà verò lædi solent à vomitu melancholici, valdè carnosì, & stricto pectore præditi, idque magis, si phthisi, asthmate, aut alio pulmonum affectu laboraverint. His addere oportet tempus anni, æstate enim per superiora purgatio facilis, hyeme verò minimè. Licet verò horum remediorum usus non sit valdè frequens, certum tamen est opportunè usurpata præstantissimos effectus producere. Multas enim febres intermittentes videre est, quæ cæterorum remediorum vim eludentes, solis vomitoriis eradicantur, quod frequenti experientia nobis innotescit.

Illa autem vomitum provocant, vel qualitate manifesta, ventriculum relaxando; vel specifica proprietate, quemadmodum cathartica.

Quæcunque pingua sunt & oleosa, magna quantitate hausta, ventriculum relaxant, eumque subvertunt, unde vomitus sequitur, quo ea tantum vacuantur, quæ in ventriculo continentur. At verò propriè dicta vomitoria, qualitate occulta humores attrahunt ad ventriculum, eumque ad expulsionem excitant per superiora. Et sic feliciter humores in hepate, liene, & partibus ventriculo vicinis contenti, non rarò vacuantur.

Præcipuorum & magis usitatorum series hæc est.

MITIORA.

Aqua tepida, aqua hordei tepida, juscula pingua tepida, butyrum, oleum simplex, oxymel simplex, syrupus acciosus, Quæ omnia magno haustu sunt exhibenda.

MEDIOCRIA.

Semen atriplicis, anethi, in decocto, ab 3. β. ad 3. j.

Flores anethi genistæ, in decocto, à p. j. ad p. ij.

Semen raphani, in decocto, ab 3. β. ab 3. vj.

Raphani succus, ad 3. iij.

Radix peponis, ad 3. in decoctione.

Agaricus, à 5. j. ad 3. ij.

Radix asari, à 3. j. ad 3. iij.

VEHEMENTIORA.

Nux metell. balanus myrepica, cataputia, æs usum, helleborus albus. (Aqua Nicotianæ, succus Ireos nostratis.)

Dosis eorum non proponitur, quia satius est illis nunquam uti, propter vitæ periculum, quod ex nimia vehementia inferre possunt, aut saltem non nisi diligentissima præparatione & correctione adhibenda.

Chymici vomitoriis medicamentis nimium abundant, iisque majori parte adeò vehementibus, ut eorum causa omnia spagyrica remedia apud vulgus suspecta evaserint. Ex eorum genere sunt, quæ ex antimonio componuntur, præcipuè verò vitrum & flores antimonii, quibus ego nunquam uti hætenus ausus sum, licet aliquando medicamentorum spagyricorum usum tentare voluerim, & quid in medicina possint, experiri. Verum enim verò, negandum non est è spagyricis medicamentis, nonnulla interdum, ritè à prudenti Medico administrata, optatos producere effectus, qui à vulgaribus remediis obtineri nequiverant. Ideò non abs re facturus videor, si quæ propria experientia comprobata sunt, spagyrica vomitoria summatim exposuero.

Ea autem quatuor omninò sunt, viribus & efficacia maximè diversa, quæ omnia in manibus habere debet quicumque cautè hujusmodi remediis uti voluerit, ut nimirum à minus vehementibus incipiat, & ad fortiora progrediatur, si illa satis efficacem operationem non ediderint.



# 140 Instit. Medicæ, Lib. V. Part. II. Sect. I. Pars I.

*Primum est vitriolum album præparatum*, prout à Crollio & Beguino describitur, quod tam blandum est vomitivum, ut etiam puerulis tutò exhiberi valeat. D. ʒ. ad ʒ. ʒ. adultioribus verò ad ʒ. j. in aqua communi (*cerevisia calida butyrata*) dissolutum: humores tantùm ventriculo contentos evacuat, ab aliis verò partibus nihil educit.

*Secundum est sal vitrioli*, ex vitriolo Cyprio calcinato extractum, quod priori vehementiùs operatur: at verò ex ventriculo similiter tantùm humores educit. Dosis à gr. x. ad xx. in aqua communi, describitur à Beguino sub nomine *salis colchotaris*, & ab Angelo Sala in triumpho *Emeticorum*, tum etiam in *anatomia vitrioli*.

*Tertium est Aqua benedicta*, quæ describitur à Quercetano in *pharmacopœa*: hæc componitur ex Antimonio, & prioribus multò vehementior est, nec nisi robustioribus hominibus, & summa cum cautione exhibenda. Si tamen opportunè usurpetur, præstantissimos sæpe effectus parit. Dosis ejus aquæ est ʒ. j. ad (ʒ. ij.) ʒ. iij. humores non solum è ventriculo, sed etiam è toto corpore educit.

*Quartum denique est pulvis Emeticus*, qui vulgò nominatur *mercurius vitæ*, & è Beguino & Crollio describitur. Omnibus prædictis vehementior est, suos tamen in medicina usus habere potest in cura morborum contumacium, quique remedia vulgaribus non cedunt; cautè tamen & nonnisi in summa virium fiducia eo utendum est. Humores è noto corpore eradicat potentissimè, dosis à g. iij. ad v. in jusclo, conserva rosarum, vel alia quavis re. Corrigi tamen potest illa mercurii vitæ vehementia, ut majori dosi exhiberi valeat innoxie, & vix aut leviter vomitum moveat, totamque ut plurimum operationem suam perficiat per inferiora. Corrigendi modi varii proponuntur ab Hartmanno in *commen. ad Crollium*.

Nos hanc addimus usu nostro comprobata, quæ in multis ægrotantibus per inferiora tantùm purgat, in nonnullis verò semel tantùm aut bis vomitum movet. Facillima autem est hæc correctio nostra, quæ fit ponendo mercurium vitæ, seu pulverem emeticum benè lotum in patina terrea vitreata supra foculum menfarium, aut furnulum exiguum, semper movendo. Fumus exhalat ater & foetidus, qui venenositatem intus latentem continet, & illam operationem continuando, per duas vel tres horas, tota absumitur. Peractæ sufficienter operationis signum est, quando nullum amplius fumum emittit. Si post istam operationem adhuc vomitum moveat, iteranda erit, & optatum habebis effectum. Pulvis albißimus coctione ista griseum colorem acquirit. Dari potest à gr. iij. ad gr. viij. in tabellula cum saccharo & mucilagine tragacanthi redactus, ut sine ullo fastidio exhiberi valeat. Adde Tartarum Emeticum & alia Antimonialia à Schrodero descripta.

## CAPUT XIII.

### De Sudorificis Medicamentis.

*In morbis chronicis & contumacibus sudorifica medicamenta frequenter usurpantur.*

**I**lli morbi, qui alterantibus & purgantibus medicamentis curari nequiverunt, sed radices habent altius infixas, quales sunt epilepsiæ, paralyfes, contumaces catarrhi, hydropes, arthritides, & quilibet frigidi affectus, tum imprimis lues venerea, potentioribus medicamentis eradicandi, qualia sunt sudorifica, quæ per plures dies, ut moris est, usurpata, non solum tertiam corporis regionem, cui peculiariter destinata sunt, sed etiam totum corpus à recrementis expurgant.

*Illæ autem, calefaciendi & attenuandi vi prædita humores colliquant, eosque per insensibiles meatus excutunt.*

Humores diuturnos morbos efficientes, frigidi & crassi ut plurimum esse solent; ideò sudorifica illis ritè conveniunt, quæ eos calefaciunt, colliquant, attenuant, insensibiles corporis meatus recludunt, per eosque evacuant.

*Multa tamen non tam manifestis qualitatibus, quàm specifica proprietate sudores promovent.*

Apud antiquos Medicos hoc dogma non habetur, quia

illi omniæ sudorificorum vim ad manifestas qualitates retulerunt. Neque enim præstantiora sudorifica, quibus hodie utimur, illis nota fuerunt. Attamen necesse est, occultam qualitatem in iis agnoscere, qua sudores provocant: cum piper & pyrethrum, valde calida & attenuantia, sudores non mōveant; & radix Chinæ in primis qualitatibus ferè temperata, id potenter efficiat. Inter omnia sudorif. eminet Opium, teste Walvo, (correctum.)

*Illæ autem sudorifica medicamenta sunt.*

### SIMPLICIA.

*Lignum guaiacum, & cortex ejusdem, lignum sassafras, radix Chinæ, radix falsæparillæ.*

Hæc efficaciter sudores movent; minùs vero sequentia.

*Radices, carlinæ, angelicæ, zedoariæ, scorzonæræ, fœniculi, apii, petroselinii, bardanæ, pimpinellæ, tormentillæ.*

*Folia, scordii, ulmarie, cardui benedicti, capilli veneris, bardanæ.*

*Semina, cardui benedicti, milium vulgare, lentes.*

*Flores, chamæmeli, cyani, papaveris rubri.*

### COMPOSITA.

*Aquæ, papaveris rhæados, cardui benedicti, scabiosæ, theriacalis.*

*Opiatæ, Theriaca vetus.*

### CHYMICA.

*Sal cardui benedicti, mater perlarum calcinata, bezoardicum minerale Beguini, Antimonium diaphoreticum Crollii, Bezoardicum joviale Hartmanni, in commentariis ad Crollium; & alia penè infinita à Chymiatriis descripta. Nos prædicta tantùm in usum revocavimus, & præstantissimos effectus ex iis obtinuimus, quorum exempla nonnulla in Observationibus nostris videri possunt in febrium præsertim malignarum curationibus.*

## CAPUT XIV.

### De Diureticis Medicamentis.

*Diureticis medicamentis convenienter expurgantur gibba hepatis partes, renes, vesica, uterus, & universum venosum genus.*

**Q**uemadmodum affectus venosum genus occupantes, ex urinis dignoscuntur; quia portio materiæ in venis contentæ ad illas transfertur, nec non iidem affectus crisi, quæ per urinam fit, sæpè terminantur: ita humores noxii diureticorum ope non difficili negotio expurgari solent.

*Ex his quædam calida sunt, quædam verò frigida.*

*Calida, humores fundendo, partes magis aqueas & serosas separant, quæ postmodum à renibus attrahuntur.*

Quæ verè & propriè *Diuretica* nominantur, acria sunt, vehementer calida & sicca, ideò sanguinem fundunt, & serosum humorem ab eo separant, tum etiam pituitam & crassos humores colliquant, eosque in aquosum humorem commutant, qui cum sero facilè commiscetur, simulque ad renes attrahitur, & cum urinis excernitur.

*Frigida verò vel abstergendo, vel aquosam materiam suppeditando, urinas movent.*

Nonnulla medicamenta humores, qui in vasis & renibus continentur, abstergunt, eosque nonnihil attenuant; quia licet frigida sint, tenues tamen habent partes, atque ita urinas promovent. Talia sunt *gramen, asparagus, parietaria, capillares herbæ, &c.* Alia multa humiditate sunt prædita quæ venis suppeditatur, deinde à renibus attrahitur, & cum ea humores in venis contenti simul rapiuntur. Hujus naturæ sunt *althea, cucurbita, semina frigida majora.*

*Horum autem diureticorum medicamentorum, tam calidorum, quàm frigidorum materia talis est.*

### DIURETICA CALIDA SIMPLICIA.

*Radices, apii, petroselinii, fœniculi, eryngii, valerianæ, asari, ononidis, raphani.*

*Cortex, medianus genistæ, & medianus tamarisci.*

*Folia, Saxifragiæ, pimpinellæ, apii, urticæ, fœniculi, chamædrios, centaurei minoris, sisymbrii, nasturtii aquatici, sabine.*

*Semina,*



## Cap. XIV. De Diureticis Medicamentis. 141

Semina, *sefeleos*, *Massiliensis*, *petroselinii Macedonici*, *apii*, *raphani*, *urticæ*, *levistici*, *mili folis*, *paliuri*, *cicera rubra*.

Fructus, *baccæ lauri*, *juniperi*.

Flores, *genistæ*, *chamomillæ*.

Gummi, *terebinthina*.

Animalia, *sanguis hirci præparatus*, *cantharides*.

Mineralia, *carabe*.

### COMPOSITA.

Aquæ *fœniculi*, *apii*, *sabinæ*.

Syrupi *de quinque radicibus*, *capillorum veneris*, *Byzantini*, *oxymel simplex*, & *compositum*.

Conservæ *florum genistæ*.

### CHYMICA.

Spiritus *sulphuris*, *vitrioli*, *tartari*, *salis terebinthinæ*.

Sales *tartari*, *baccarum bederæ*, *siliquarum*, *stipitum fabarum*.

### DIURETICA FRIGIDA SIMPLICIA.

Radices *asparagi*, *graminis*, *rusci*, *althææ*, *oxylapathi*, *acetosæ*.

Folia *capillorum veneris*, *acetosæ*, *parietariæ*, *herniariæ*, *bismalvæ*, *summitates asparagi*.

Semina *quatuor frigida majora*, *acetosæ*, *alkekengi*, *hordeum*.

Fructus, *cucurbitæ*, *pepones*, *cucumeres*, *fragæ*.

Flores *althææ*, *cichorei*.

Gummi, *caphura*.

Succi *limonum granatorum acidorum*.

### CHYMICA.

*Salprunellæ*, *spiritus sulphuris & vitrioli*, qui licet inter diuretica calida relati sint, refrigerandi tamen facultate insigni præditi sunt, & nihilominus in affectibus tum calidis, tum frigidis conveniunt, propter summam tenuitatem, & penetrandi vim, cujus ratione vehicula sunt aliorum remedium.

### COMPOSITA.

Aquæ *parietariæ*, *graminis*, *acetosæ*, *kordei*.

Syrupi *capillorum veneris*, *de limonibus*, *de althæa*.

Conservæ *capillorum veneris*, *radicum eryngi*, *carnis cucurbitæ*.

Trochisci *de Caphura*.

### COROLLARIUM.

Ad horum vacuantium genus spectant menses moventia, quæ tamen ad hysteri corum classes melius referuntur: inde ergo erunt repetenda.

## CAPUT XV.

### De Errhinis Medicamentis.

In affectibus capitis diuturnis, à pituita productis, post universales vacuationes, errhina usurpantur, quæ illam per nares attrahunt & expurgant.

VAcuationes illæ, quæ humores à toto corpore expurgare solent, universales appellantur: quibus succedunt, quæ peculiarem tantum partem evacuant particulares nuncupatæ, qualis est illa, quæ pituitam per nares è cerebro elicit, multis illius affectibus convenientissima. Postquam enim major excrementorum pars universali vacuationeeducta est, postmodum per vicina emunctoria reliquæ commodè educuntur.

Utque facile humorem illum crassum & frigidum attrahant, calida esse debent, attenuantia, & detergentia: Qualia sunt, quæ sequuntur.

Radices *ireos*, *cyclaminis*, *cucumeris agrestis*.

Folia *betæ rubræ*, *brassicæ*, *anagallidis*, *majoranæ*, *salviæ*, *betonicæ*, *pulegii*, *origani*, *prassii*, *bederæ*, *nicotianæ*.

Gummi *euphorbium*.

Succi *radicum & foliorum prædictorum*, *claterium*.

## CAPUT XVI.

### De Sternutatoriis.

Sternutatoria medicamenta sua acrimonia expultricem cerebri facultatem irritando, pituitam à cerebro

eliciunt, tum etiam in affectibus comatosi sopitum cerebrum exsuscitant. Talia sunt quæ sequuntur.

Radices, *zinziberis*, *pyrethri*, *ireos Florentinæ*, *hellebori albi & nigri*.

Folia, *betonicæ*, *majoranæ*, *salviæ*, *nicotianæ*.

Gummi, *euphorbium*.

Animalia, *castoreum*.

### CHYMICA.

Spiritus *sulphuris*, *vitrioli*, *sal vitrioli*.

## CAPUT XVII.

### De Masticatoriis.

Απορροματιζοντα medicamenta sunt, quæ pituitam per os è cerebro educunt, idque præstant sua caliditate & acrimonia, qua humorem attenuant, & facultatem irritant expultricem. Illa autem sunt hujusmodi.

### SIMPLICIA.

Radices, *zinziberis*, *pyrethri*, *angelicæ*.

Folia, *salviæ*, *majoranæ*, *hyssopi*, *origani*, *tabaci*.

Semina, *nasturtii*, *sinapi*, *staphisagriæ*, *nigellæ*, *piperis album*, & *nigrum*.

Fructus, *passulæ*, *cubebæ*.

Gummi, *mastiche*.

### COMPOSITA.

Acetum *scilliticum*.

Oxymel *scilliticum*.

Theriaca, *confectio anacardina*.

## CAPUT XVIII.

### De Cephalicis Medicamentis.

Cephalica medicamenta dicuntur, quæ cerebrum roborant; ejusque inemperiem emendant.

Multa dantur medicamenta, quæ specifica proprietate & sympathia quam habent cum certis corporis nostri partibus, earum robur intendunt, & peculiare earum affectus oppugnant. Talia sunt Cephalica, quæ vires suas peculiariter in cerebro exercere creduntur.

Eaque duplicia sunt; calida scilicet, & frigida.

Calida cerebrum calefaciunt & exsiccant, ac pituitam in eo contentam incidunt & attenuant.

Frigida partim calidam cerebri intemperiem contemperant, partim pituitam acrem & salsam, aliosque humores tenuiores graves fluxiones efficientes, incrassant.

Quum cerebrum nunc frigidis, nunc calidis affectibus tentetur, medicamenta illam partem respicientia duorum generum esse debuerunt, ut omnibus hisce affectibus succurrere possemus.

Horum autem omnium materia talis est.

### CEPHALICA CALIDA SIMPLICIA.

Radices, *spica nardi*, *calami aromatici*, *valerianæ*, *ireos Florentinæ*, *acori*, *galangæ*, *zedoaræ*, *pæoniæ*.

Ligna, *viscus quercinus*, *xyloaloës*.

Cortices, *cinnamomum*.

Folia, *betonicæ*, *majoranæ*, *salviæ*, *rorismarini*, *lauri*, *calamenthi*, *polii montani*.

Semina, *pæoniæ*, *cardamomi*, *sileris montani*, *nigellæ Romanæ*.

Fructus, *baccæ lauri*, *juniperi*, *cariophylli*, *nux moschata*, *cubebæ*, *grana kermes*.

Flores, *betonicæ*, *stæchados*, *anthos*, *salviæ*, *macis*, *chamomillæ*, *lilii convallium*, *tiliæ arboris*.

Succi & liquores, *opobalsamum*, *vinum*.

Gummi, *thus*, *mastiche*, *storax*, *benzoinum*.

Marina, *succinum*, *ambra*.

Animalia, *castoreum*, *moschus*, *zibetta*.

### COMPOSITA.

Aquæ, *betonicæ*, *salviæ*, *majoranæ*, *naphæ*, seu *florum aurantium*, *cinnamomi*, *theriacalis*, *imperialis*, *cælestis*, *aqua vitæ*.

Syrupi, *de stæchade*, *mel rosatum*.

Conservæ, *acori zinziberis*, *florum stæchados*, *anthos*, *salviæ*, *myrobalanorum conditorum*, *nux condita*, *nux moschata condita*, *corticis citri*.



# 142 Instit. Medicæ, Lib. V. Pars II. Sect. I. Part. I.

Confectiones, alkermes, theriaca, mithridatum, aurea Alexandrina.

Electuaria, dianthos, diambra, diamoschi dulcis, diaireos, aromatici rosati.

Trochisci, de Gallia moschat. de carabe.

## EXTERN A.

Olea, de castoreo, chamæmelium, irinum, laurinum, nardinum, rutaceum, de spica, vulpinum.

Unguenta, martiatum, aregon.

Emplastra, de betonica, de baccis lauri, de meliloto, de mucilagibus.

## CHYMICA.

Olea destillata, succini, rorisnarini, lavendulae, salviae, thymi, fœniculi, anisi, cinnamomi, nucis moschatae, caryophyllorum, balsamus vite.

## CEPHALICA FRIGIDA SIMPLICIA.

Folia, lactuca, portulacæ, plantaginis.

Ligna, santali omnes.

Semina, lactuca, papaveris albi, quatuor frigida majora, psyllii, hordei.

Flores, rosarum, violarum, nymphae, papaveris rhæados.

Succi, limonium, granatorum, acetum, emphacium, opium.

Lacrymæ, camphora.

## COMPOSITA.

Aquæ, portulacæ, lactuca, plantaginis, rosarum, papaveris rhæados, nymphae.

Syrupi, violaceus, rosarum siccarum, de papavere.

Conservæ, rosarum, violarum, nymphae, lactuca, cucurbitæ.

Electuaria, trium santalorum, diamaçgariti frigidi.

Confectiones, philonium, requies Nicolai.

Trochisci, de caphura.

Pilulæ, de cynoglossò, laudanum opiatum.

## CHYMICA.

Sal prunellæ, spiritus sulphuris, & vitrioli.

## EXTERN A.

Olea, violaceum, nymphae, rosaceum, caphura, emphacium.

Unguenta, rosaceum, populeum, refrigerans Galeni, ceratum santalinum.

## CAPUT XIX.

De Ophthalmicis Medicamentis.

Ophthalmica propriè dicta sunt, quæ proprietate specifica oculos corroborant, eorumque visum acuum, oxydormica appellata.

Alia tamen secundariò referuntur, quæ variis oculorum affectibus curandis sunt necessaria, videlicet anodyna, repellentia, digerentia, detergentia.

**O**Culi, sensu exquisitissimo donati, in plurimis affectibus dolore acerbissimo cruciantur, ut omni arte is mitigandus sit anodynus medicamentis. Sæpe etiam inflammationibus laborant, quibus in principio repellentia conveniunt, ut alio tempore resolventia. Denique lacrymis, ulceribus, aliisque affectibus tentantur, quibus exsiccantia & detergentia conveniunt. Illa autem omnia exquisitè selecta esse debent, ob delicatorem partis naturam & exquisitum sensum. Qualia sunt quæ sequuntur.

## OXYDORCICA, SEU VISUM

### ACUENTIA.

Radices, fœniculi, chelidoniae, raphani.

Folia, chelidoniae, verbenæ, rutæ, euphrasie, fœniculi.

Semina, fœniculi, raphani, ormini sativi.

### ANODYNA.

Lac muliebre, albumen ovi agitatum in aquam conversum. Aqua rosarum, mucilago seminis psyllii, mucilago seminis cydoniorum, medulla panis macerata & in lacte cocta, addito pauco croco. Poma dulcia cocta sub cineribus. Pomorum putidorum pulpa. Trochisci albi Rhasis cum opio.

## REPELLENTIA.

Aqua, rosarum, plantaginis, portulacæ.

Succus, cydoniorum, pomorum acidorum, albumen ovi, Alumen.

## EXSICCANTIA.

Cerusa lota, tutbia lota, antimonium lotum, unguentum de tutbia, Trochisci albi, Rhasis sine opio.

## DIGERENTIA, SEU RESOLVENTIA.

Sarcocolla cum lacte nutrita, crocus, lac muliebre, decoctum senugraci, sanguis columborum juniorum, è pennis majoribus in oculum expressus.

## DETERGENTIA SINE MORSU.

Saccharum cantum, syrupus rosarum siccarum, tutbia, pompholix, plumbumustum & lotum, antimonium lotum.

## DETERGENTIA CUM MORSU.

Fella piscium mitiora, Quadrupedum media, avium fortissima, & inter illa, fel perdicis omnium validissimum; gallinae mitissimum. Succus chelidoniae, fœniculi, aqua mellis composita.

## CAPUT XX.

De Thoracis Medicamentis.

**T**horacica medicamenta dicuntur quæ pulmoni familiaria sunt, & humores in eo contentos præparant ad anacatharsin.

Ut autem hi humores per anacatharsin facilè expellantur, non debent esse nimis crassitieci aut tenuitatis participes; unde crassiores præparantur attenuantibus, incidentibus, & detergentibus medicamentis, quæ calida sunt; tenuiores incrassantibus, quæ frigida sunt. Horum omnium materia talis est.

## THORACICA CALIDA SIMPLICIA.

Radices, enulae campanæ, ireos Florentinae, aristolochiaë utriusque, liquiritia, zinziberis, squilla.

Folia, tussilaginis, prassi albi, hyssopi, thymi, satureia, origani, calamentki, pedis caui, hederae terrestres, roris solis, nicotianæ, pauca dosi, quia vomitiva.

Semina, urtica, lini, brassica, fœl os massiliensis.

Fructus, ficus pingues, passula dulces, amygdalæ, nuclei pini, bacca lauri.

Flores, Chamomilla.

Aromata, crocus, qui eximius.

Gummi, Terebinthina, myrrha.

Animalia, mel, pulno vulpis præparatus.

Mineralia, flores sulphuris.

## COMPOSITA.

Aquæ, hyssopi, tussilaginis.

Syrupi, de tussilagine, de hyssopo, de liquiritia, capillorum veneris, oxymel simplex, oxymel scilliticum, saccharum cantum.

Conservæ, capillorum veneris, radices enulae campanæ, zinziberis.

Electuaria, diaireos simplex, diaireos Salomonis.

## EXTERN A.

Olea, irinum, amygdalarum dulcium, chamomilla, liliorum alborum.

Adipes, axungia gallinae, anatis, vitulina, butyrum.

Medullæ, cervina, vitulina.

Unguenta, de althea, resimptivum.

Emplastra, de sulphure, de baccis lauri, filii Zachariae.

## THORACICA FRIGIDA

### EXTERN A.

Radices, althea, liquiritia.

Folia, capillorum veneris, pulmonariae.

Semina, quatuor frigida majora, malvæ, althea, papaveris albi, psyllii, bombacis, hordeum.

Fructus, jujubæ, sebesten, amygdalæ dulces, pruna dulcia.

Flores, violarum, nymphae, papaveris, rhæados.

Gummi, Arabicum, tragacanthum.

Succi, amyllum, succus liquiritia.

Animalia, lac muliebre, asinum, caprinum, caro testudinum, cancri fluvialis.

## COMPOSITA.

Aquæ, lactuca, portulacæ, nymphae, papaveris rhæados, hordei.

Syrupi, jujubinus, violaceus, capillorum veneris, papaveris albi, narcoticus.

Sacchara, rosaceum, penidiatum.

Conservæ, rosarum, violarum, borraginis, lactuca, caro cucurbitæ condita.

Ele-



## Cap. XXI. De Cardiacis Medicamentis. 143

Electuaria, diatragacantum frigidum, diamargaritum frigidum, diapenidium sine speciebus.

### EXTERN A.

Oleum, violaceum, nymphaeae, amygdalarum dulcium.

Axungiae, gallinae, anatis, vituli, butyrum recens.

Axungiae istae temperatae sunt, & ideo in affectibus tam calidis, quam frigidis usurpantur.

## CAPUT XXI.

### De Cardiacis Medicamentis.

**M**edicamenta Cardiacia nominantur, quae proprietate specifica corroborant, spiritus vitales reficiunt, ac venenis & malignis affectibus resistunt.

Et quia interdum ab intemperie calida, interdum à frigida cor debilitatur: ideo Cardiacia medicamenta alia calida, alia frigida esse debuerunt.

### CARDIACA CALIDA SIMPLICIA.

Radices, dictamnii seu fraxinellae, angelicae, pentaphylli, scorzonerae, zedoariae, gentianae, imperatoriae, doronici.

Cortices, cinnamomum, cortex citri siccus.

Ligna, xyloaloes.

Folia, melissae, scabiosae, cardui benedicti, ecymi, seu basiliconis, polii, abrotani, rorismarini, lavendulae.

Fructus, grana tinctorum, baccae juniperi, nux moschata, garyophylli.

Gummi, thus, myrrha, mastiche.

Succi, melissae, scabiosae, borraginis.

Animalia, moschus, zibetta, lapis bezoar, fericum crudum.

Mineralia, ambarum, succinum.

### COMPOSITA.

Aquae, florum aurantiorum, melissae, rorismarini, cardui benedicti, scabiosae, aqua vitae, imperialis, theriacalis, caelestis, cinnamomi.

Olea Chymica, cinnamomi, garyophyllorum, nucis moschatae.

Syrupi, conditurae corticis citri, byzantinus.

Conservae, florum anthos, cortex aurant. conditus, nux moschata condita, myrobalani condita.

Confectiones, alkermes, theriaca.

Electuaria, aromaticum rosatum, diambrae, de gemmis, latificans Galeni, diamoschum dulce.

### CARDIACA FRIGIDA SIMPLICIA.

Radices, acetosae, buglossi, bistortae, tormentillae.

Ligna, santali omnes.

Folia, borraginis, buglossi, acetosae, oxylapati.

Semina, cydoniorum, plantaginis acetosae.

Flores, rosarum, violarum, borraginis, buglossi, nenupharis.

Fructus, citria, limones, cerasa acida, ribes, granata acida, poma odorata, cydonia.

Gummi, Camphora.

Animalia, perlae, unicornu, os de corde cervi, ebur, spodium, cornu cervi, lapis Bezoar.

Mineralia, terra sigillata, bolus armena, fragmenta pretiosa, aurum, corallium.

### COMPOSITA.

Aquae, rosarum, borraginis, buglossi, acetosae.

Syrupi, granatorum, de limonibus, violaceus, de succo acetosae, rosarum siccarum, de pomis redolentibus.

Conservae, florum borraginis, buglossi, rosarum, violarum, foliorum acetosae.

Confectio, de hiacyntho.

Electuaria, diamargariti frigidi, diatriasantalor.

## CAPUT XXII.

### De Hepatis Medicamentis.

**H**epatica medicamenta hepati roborando, ejusdemque intemperiebus corrigendis sunt destinata: unde alia calefaciunt, alia refrigerant.

Quia tamen omnes humores in eo generantur, & ob venarum angustiam obstructionibus est valde obnoxium, idcirco omnia ferè medicamenta, hepati convenientia, sunt etiam aperiendi facultate donata.

### HEPATICA CALIDA.

#### SIMPLICIA.

Radices, calami aromatici, cyperi, enulae campanae.

Folia, agrimoniae, absynthii, mentae, chamædryos, chamæpitys, betonicae, centaurii minoris.

Semina, anisi, fœniculi, carvi, ammeos.

Flores, anthos, macis, schœnanthos, spicae nardi.

Fructus, garyophylli, nux moschata, passulae.

#### COMPOSITA.

Aquae, absynthii, menthae, betonicae.

Syrupi, de absynthio, de mentha, bysanthinus, de quinque radicibus.

Conservae, florum salviae, anthos, cortex citri conditus, radix enulae condita, aconus conditus, nux condita, nux moschata condita, myrobalani condita.

Confectiones, theriaca, mithridatum.

Electuaria, aromaticum rosatum, diambra, diarrhodon temperatum.

Trochisci, de absynthio, de rhabarbaro, de eupatorio.

#### EXTERN A.

Olea, de absynthio, de mentha, nardinum.

### HEPATICA FRIGIDA.

#### SIMPLICIA.

Radices, graminis, asparagi, cichorei, acetosae, brusci.

Ligna, santali omnes.

Folia, endiviae, cichorei, scariolae, chondrilla, hepatica, adianti, acetosae, portulacae.

Semina, quatuor frigida majora, quatuor frigida minora, nempe lactuca, portulacae, endiviae, cichorei, semen acetosae.

Flores, rosarum, nymphaeae, cichorei.

Fructus, pruna acida, granata acida, cucurbitae, ribes, cucumeres.

Succi, limonum, granatorum, cydoniorum, endiviae, acetosae, cichorei, acetum, omphacium.

Animalia, ebur, spodium.

Mineralia, corallium.

#### COMPOSITA.

Aquae, cichorei, endiviae, graminis, acetosae, rosarum, agrimoniae.

Syrupi, de cichoreo simplex & compositus, de succo acetosae, de granatis, de limonibus, rosarum siccarum.

Conservae, florum cichorei, foliorum acetosae, rosarum, fructuum berberis, cerasa acida condita.

Electuaria, diatriasantalum, diarrhodon abbatis, diamargaritum frigidum.

Trochisci, de spodio, de capbura.

#### EXTERN A.

Olea, rosaceum, omphacium, nenupharis.

Unguenta, rosaceum, ceratum, santalinum, refrigerans, Galeni.

## CAPUT XXIII.

### De Stomachicis Medicamentis.

Ventriculi actio multis mediis offenditur, vel quatenus alimentum non appetit, vel malè concoquit, vel denique probè non retinet.

Appetentia deicitur, quando ventriculus, & praesertim superioris illius orificium, aliquo humore excrementitio obducitur, qui partis illius sensum obtundit. Concoctio laeditur immutato ventriculi calore. Retentio denique labefactatur ex partis laxitate, quam sequitur vomitus & alvi fluxus.

Appetentiam exsuscitant medicamenta, quae humores noxios detergunt, partis robore servato, partemque blandè vellicando, divulsionis sensum efficiunt: qualia sunt acida & salsa. Concoctionem juvant nonnulla proprietate specifica, alia calore moderato & aromatica vi. Retentio denique adstringentibus appropriatis confirmatur.

Ille



# 144 Instit. Medicæ, Lib. V. Part. II. Sect. I. Pars I.

*Ita autem omnia stomachica medicamenta ad calidorum vel frigidorum classes referri solent.*

**V**entriculi, quemadmodum & aliarum partium functiones, à variis intemperiebus lædi solent, quæ generaliter sui ablationem incidunt: ideo semper in stomachicorum classe ea erunt seligenda, quæ cum partem roborent generali etiam indicationi inserviunt, hanc scilicet vel illam intemperiem corrigendo.

## STOMACHICA CALIDA SIMPLICIA.

Radices, zinziberis, ciperis, calami aromatici, galangæ.

Cortices, citri sicci, cinnamomi.

Lignum, xilaloës.

Folia, menthæ, absynthii, utriusque salviæ, betonicæ, rosmarinii.

Semina, anisi, fœniculi, coriandri, citri, piper.

Fructus, Cariophylli, nux moschata.

Flores, salviæ, anthos, betonicæ, macis, crocus.

Gummi, mastiche.

Mineralia, succinum, ambra.

## COMPOSITA.

Aquæ, betonicæ, absynthii, menthæ, salviæ.

Syrupi, de mentha, de absynbio pontico.

Conservæ, florum salviæ, anthos, foliorum absynthii cortex citri conditus, nux moschata condita, myrobalani condita, zinziber conditum, acorus conditus.

Confectiones, theriaca, mithridaticum, alkermes.

Electuaria, aromaticum rosatum, diambra, diagalangæ.

Trochisci, de absynbio, de rhabarbaro.

## EXTERNA.

Olea, nardinum, de absynbio, de mentha, nucis moschate, mastichinum, myrrhinum.

Emplastra, pro stomacho, de mastiche.

## STOMACHICA FRIGIDA SIMPLICIA.

Radices, plantaginis, acetosæ.

Ligna, santalum rubrum.

Folia, plantaginis myrti.

Semina, plantaginis cydoniorum.

Flores, rosæ rubræ, balaustra.

Fructus, cydonia, pyra, mespila, myrtilli.

Succi, acaciæ, hypocistidis.

Mineralia, corallus.

## COMPOSITA.

Aquæ, rosarum, plantaginis.

Syrupi, rosarum siccarum, cydoniorum, granatorum, myrtinus, de succo acetosæ, de agresta.

Conservæ, rosarum rubrarum, foliorum acetosæ.

Electuaria, diatriasantaloni.

## EXTERNA.

Olea, rosaceum, lentiscinum, omphacinum.

Unguenta, ceratum santalinum, rosaceum.

## CAPUT XXIV.

### De Splenicis Medicamentis.

**L**eni dicata medicamenta ferè sunt, quæ melancholicum humorem præparant, propterea quòd lien dicatur, melancholiæ conceptaculum.

At verò quandoque illa melancholia naturalem fortitur conditionem, estque frigida, crassa, & terrestris, obstructions efficiens, tumque medicamenta postulat aperientia, incidentia, & detergentia; imò & interdum emollientia, quando humor induratus scirrhum producit.

Interdum nimio calore aduritur, & atræ bilis conditiones acquirit, tumque eadem requirit medicamenta, quæ suprà atræ bili præparandæ idonea diximus.

## SPLENICA CALIDA SIMPLICIA.

Radices, apii, emulæ campanæ, ireos, calami aromatici, aristolochiæ.

Cortices, radicum capparum, cortex medianus fraxini, medianus tamarisci, cinnamomum.

Folia, chamædryos, cuscute, cæterach, summitates lupuli, tamarisci, pulgii, thymi, nasturtii, fumarie, centaurei minoris, melissæ.

Semina, agni casti, nasturtii, anisi, apii, cardui benedicti.

Flores, genistæ, calendulæ, tamarisci, crocus.

Fructus, cappares.

Gummi, ammoniacum, bdellium, myrrha.

Mineralia, chalybs.

## COMPOSITA.

Aquæ, fœniculi, fumarie, melissæ, cardui benedicti, cinnamomi.

Syrupi, de fumarie, de quinque radicibus, oxymel simplex, oxymel scilliticum.

Conservæ, florum tamarisci, genistæ, acorus conditus, zinziber conditum, cortex citri conditus.

Confectiones, alkermes.

Electuaria, de gemmis, lenificans Galeni.

Trochisci, de capparibus, de eupatorio.

## EXTERNA.

Olea, de capparibus, tamarisci, irinum rutaceum.

Unguenta, de arthanita, de albea.

Emplastra, de mucilaginibus, de meliloto, diachylum cum gummis, de ammoniaco.

## SPLENICA FRIGIDA.

Eadem ferè sunt ac bilem attenuantia, quæ ideo, ne hîc frustra repetantur, inde erunt depromenda, quibus addenda erunt, quæ bilem adustam præparare valent.

## CAPUT XXV.

### De Nephriticis Medicamentis.

*Medicamenta renum affectibus curandis idonea dicuntur, vel quatenus urinas promovent, vel quatenus renum ardorem contemperant, vel quatenus calculos frangunt, aut comminuunt, vel denique, quatenus arenulas viscidoseque humores in renibus contentos, detergent.*

*Urinas moventia suprà fuerunt proposita, iis tamen quædam addenda sunt, renibus magis peculiariter appropriata. Renum ardorem contemperant diuretica frigida, tum alia nonnulla simpliciter refrigerantia, quæ nephritica frigida appellantur.*

**A**D calidam renum intemperiem corrigendam non semper utendum est diureticis: quantumvis refrigerent. Nam quando immoderatum urinæ profluvium illam intemperiem consequitur, aliis refrigerantibus est utendum, quæ potius incassent, aut leniter adstringant, qualia sunt lactuca, portulaca, semen psyllii, gummi tragacanthum, &c.

*Lithonriptica, seu calculum frangentia medicamenta id præstant vel specifica proprietate, vel quatenus incidunt & attenuant, sine admodum insigni calore: alioquin calculum magis excoquerent, vel denique asperitate sua summam calculi faciem abstergunt & attritu comminuunt.*

*Arenulas viscidoseque humores detergentia ex diureticis aut lithonripticis desumuntur.*

*Horum omnium materia talis est.*

## URINAS MOVENTIA.

*Hæc suprà fuerunt proposita tã calida, quàm frigida, c. xiv.*  
**URINÆ RENUMQUE ARDOREM**  
temperantia & lenientia.

## SIMPLICIA.

Radices, albeæ, liquiritiæ.

Folia, malvæ, lactucæ, portulacæ, endiviæ, cucurbitæ, scariolæ.

Semina, melonum, cucurbitæ, cucumeris, albeæ, malvæ, lactucæ, papaveris albi, psyllii, hordeum.

Fructus, pruna dulcia, passulæ, jujubæ, amygdalæ.

Flores, violarum, nenupharis.

Gummi, tragacanthum.

Animalia, lac, butyrum.

## COMPOSITA.

Aquæ, lactucæ, portulacæ, nenupharis.

Syrupi, de liquiritia, albea, jujubarum, violarum.

Con-



# Cap. XXVI. De Hysteriis Medicamentis. 145

Conservæ, violarum, nymphae, lactucæ conditæ.

Electuaria, diatragacanthum frigidum.

## EXTERNÆ.

Olea, violarum, rosaceum, nenupharis.

Unguenta, refrigerans Galeni, unguentum rosaceum.

## LITHONTRIPTICA, SEU

calculus frangentia.

## SIMPLICIA.

Radices, ononidis, lappæ majoris, saxifragiæ, virgæ aureæ, calcitrapæ.

Ligna, lignum nephriticum.

Cortices, fabarum siccarum, radicis lauri.

Folia, saxifragiæ, calcitrapæ, argentiæ, fragariæ, parietariæ, fœniculi marini.

Semina, milii solis, urticæ, raphani.

Fructus, nuclei ceraforum, persicorum, mespilorum, bacca juniperi, hedera.

Gummi, terebinthina.

Animalia, millepedes, sanguis hircinus præparatus, oculi cancrorum fluvialium.

Lapides, Judaicus, nephriticus, crystallus præparatus.

## COMPOSITA.

Aquæ, saxifragiæ, calcitrapæ, nicotianæ.

Syrupi, nephrocatharticus Jouberti, de Raphano Fernelii, oxymel simplex, oxymel scilliticum.

Electuaria, lithontripticon.

## ARENULAS ET VISCIDOS

Humores detergentia.

Eadem sunt, quæ diuretica, & calculos expellentia.

Terebinthina, parietaria, raphanus, apium, cicera rubra.

## CAPUT XXVI.

### De Hysteriis Medicamentis.

Quæ in uteri affectibus usurpantur medicamenta, vel ipsum corroborant, & conceptionem adjuvant: vel partus & secundinarum exulsionem promouent, vel menstruas purgationes educunt; vel nimium earundem fluxum cohibent; vel uterum ab excrementorum illuvie expurgant.

Conceptum juvantia moderato calore uterum reficiunt, aromatica vi recreant, & quam adstrictione fiunt.

Quæ secundum & secundinas excludunt, menses etiam promouent, sed fortiora ex his usurpantur.

Menses moventia, calida sunt & tenuium partium, nec tamen vehementer exsiccant, neque solum sanguinem attenuant, sed etiam vasorum oscula aperiunt.

**M**axima est menses moventium & diureticorum afinitas. In eo tamen distinguuntur secundum Gal. de simpl. med. fac. c. 22. quod ambo quidem sint calida, sed diuretica potenter exsiccant, menses moventia minimè. Illa enim quæ validius exsiccant, sanguinem absument, & sic menstruis materiam subtrahunt, necnon eundem incrassant, & fluxui minus idoneum efficiunt; eandem tamen urinarum profusionem juvant, quia dum sanguis à calore susus cogitur à siccitate, oportet fieri ferocia substantiæ secretionem, quæ urinæ materiam suppeditat.

Menses cohibentia medicamenta, vel adstrictoria vi meatus occludunt, vel humores incrassando eorum fluxum impediunt.

Omnis fluxio immodica vel ex nimia meatuum laxitate, vel humorum tenuitate, ac mobilitate dependet: hinc, meatus illos adstringendo, ac humoribus crassitiem & lentorem conciliando, facile cohibetur.

Uterum expurgantia ex menses moventibus desumuntur, ea præsertim eligendo, quæ sunt detergendi facultate donata.

Horum omnium materia talis est.

## CONCEPTUM JUVANTIA

## SIMPLICIA.

Radices, calami aromatici, bistortæ, galangæ, cypri.

Folia, betonicæ, salviæ, rorismarini, majoranæ.

Fructus, nux moschata, caryophylli.

Laz. Riverii Opera.

Flores, salviæ, rorismarini, betonicæ, macis, spica nardi.

Gummi, styrax, benzoinum, thus, mastix.

Animalia, moschus, zibetum.

Mineralia, succinum, corallium, ambra.

## COMPOSITA.

Aquæ, salviæ, betonicæ, majoranæ.

Conservæ, florum betonicæ, salviæ, anthos, acorus conditus, nuces juglandis conditæ, nuces moschata conditæ myrobalani conditæ, radix satyrionis condita.

Confectiones, iberiaca, mihridatium.

Electuaria, diamoschum, diambra, de gemmis, diagalanga, aromaticum rosatum.

Trochisci, gallinæ moschata, aliptæ moschata.

## EXTERNÆ.

Olea, nardinum, myrrhinum.

## PARTUM ET SECUNDINAS

Excludentia.

Quæ menses movent, etiam foetum & secundinas educunt: peculiariter autem hæc.

Dictamnus creticus, arthemisia, aristolochia, crocus, aqua cinamomi, Confectio alkermes, borax officinarum, saïna, opopanax, sagapenum, myrrha, testiculi equorum, hepar anguille, castoreum, assa fetida.

Posteriora duo secundinis tantum conveniunt, quia gravi odore foetum enecarent.

## MENSES MOVENTIA SIMPLICIA.

Radices, aristolochiæ utriusque, rubiæ tinctorum, valerianæ, cyperi, irios, gentianæ.

Cortices, cinamomum.

Folia, arthemisia, mercurialis, matricariæ, nepetæ, salviæ, calamendi, pulegii, origani, ruthe, abrotani, prassii, dictamni cretici.

Semina, seseleos, anisi, dauci, fœniculi, rutæ, carvi.

Flores, chamomille, matricariæ, crocus.

Gummi, myrrha, assa fetida, opopanax, sagapenum, galbanum.

Animalia, castoreum.

Mineralia, borax officinalis.

## COMPOSITA.

Aquæ, arthemisia, cinamomi.

Syrupi, de arthemisia, de hyssopo.

Conservæ & electuaria, repetenda ex diureticis.

Trochisci, de myrrha.

## EXTERNÆ.

Olea & unguenta repetenda ex emollientibus, quæ in secunda sectione traduntur.

## MENSES SISTENTIA SIMPLICIA.

Radices, symphiti, bistortæ, tormentille.

Folia, plantaginis, lentisci, equiseti rubi, portulacæ, myrti, centinodæ, menthæ.

Semina, plantaginis, acetosæ.

Fructus, myrtilli.

Flores, rosarum, balaustrorum.

Gummi, mastiches, sanguis draconis.

Animalia, coagulum hædi, leporis, cornu cervi ustum, ebur, spodium.

Mineralia, bolus armena, terra sigillata, corallium.

## COMPOSITA.

Aquæ, plantaginis, rosarum, nymphae, portulacæ, menthæ.

Syrupi, myrtinus, de mentha, cydoniorum, rosarum siccarum.

Conservæ, rosarum, cydonia condita.

Confectiones, philonium Romanum.

Trochisci, de spodio, de terra sigillata.

## EXTERNÆ.

Olea, myrtinum, rosaccum, cydoniorum.

Unguenta, Comitissæ.

Emplastra, de mastiche, contra rupturam.

## UTERUM EXPURGANTIA.

Eadem, quæ menses moventia, & præcipuè.

Bryonia, aristolochia utraque, gentiana, mercurialis, arthemisia, matricaria, marrubium, chamædrys, &c.



## CAPUT XXVII.

## De Arthriticis Medicamentis.

Articuli ex nervosis partibus maximè componuntur. Cum verò nervorum ac cerebri eadem sit portio, quæ supra proposita sunt Cephalica, interius usurpanda, eadem arthritica censentur.

Quando humor in articulis contentus, apozemate aut aliquo alio interno medicamento præparandus est, eadem omninò præscribenda remedia, quæ in affectibus capitis conveniunt: ex quibus tamen ea eligenda erunt, quæ magis specificè articulis convenire credidit antiquitas.

Quia verò articulorum affectus topicis remediis maximè curari solent, ea hîc proponenda sunt, quæ illis peculiariter conveniunt, atque ita distinguenda, ut illa statim initio ardorem, si quis inest, compescant, & fluxiones arceant, nec tamen humores in partem inflammatam altius impingant: alia dolorem, qui circa inflammationem fuerit, compescant: alia denique dolore sedato humorem impactum digerant: quæ omnia sigillatim sunt proponenda.

## FLUXIONEM INHIBENTIA.

Folia, hyoscyami, cicuta solani, mandragora, sempervivi.  
Succi, hyoscyami, solani, lactuca, acetum, opium.  
Gummi, caphura.  
Mucilagines, seminis psyllii, cydoniorum.  
Aquæ, rosarum, plantaginis, solani.  
Olea, rosaceum.

## DOLOREM SEDANTIA.

Radix, alibea, lac vaccinum, stercus vaccinum, œsopus, ribus ovi albumine subactum, vitellus ovi, flos chamæmeli, meliloti, crocus, & quamplurima alia ex practicis repetenda.

## DIGERENTIA.

Radices, enula campanæ, hermodactyli.  
Folia, verbasci, chamæpityos, urtica, ebuli, salvia, centaurei minoris.  
Semina, urtica, nasturtii.  
Gummi, opopanax, bdellium, ammoniacum, sagapenum, galbanum, euphorbium.  
Animalia, castoreum, catuli admoti.  
Liquores, vinum, aqua vitæ, aqua marina, aqua theriacum sulphurearum.  
Olea Chymica, vitrioli, ceræ, de lateribus.  
Emplastra, de mucilagibus, de meliloto, oxycroceum, diapalma, diaphoreticum.

## CAPUT XXVIII.

## De Medicamentis lac generantibus, idemq; minuentibus.

Medicamenta lacti generando idonea, ex Gal. 5. de simpl. fac. cap. 22. modicè calefaciunt, & non exsiccant, quia calefaciendo sanguinem attenuant, ut facilius ad mammas ferri possit: neque exsiccando illius copiam minuant, quæ magna esse debet ad lactis generationem.

Lac generantia iisdem qualitatibus videntur esse prædita, quibus menses moventia: cum tamen hæc illis maximè videantur esse contraria quoad effectus. Quoties enim mensium fluxus proripitur, toties lactis generatio impeditur. In eo tamen differunt, quod menses moventia calidiora sint lac generantibus, & magis attenuent: nam in lactis generatione fit expulsio sanguinis ad mammas, & attractio ab iisdem; at in mensium vacuatione fit tantum expulsio ad uterum: unde oportet sanguinem magis attenuari, & remedia esse calidiora, siccioraque. Sic Gal. cap. 21. lib. 5. de med. fac. vult anethum, fœniculum, & rutam, illas, inquam, herbas virentes & humiditas, lacti generando convenire: siccas verò, menses movere; quia tunc temporis magis calefaciunt & exsiccant.

Lactis copiam minuunt, quæ exsiccando sanguinem absumunt, vel eundem refrigerando & incrassando ineptum efficiunt, ut ad mammas deferatur.

Horum omnium materia talis est.

## LAC GENERANTIA.

Fœniculum viride, semen ejusdem, anethum viride, apium, Amaranthus, lac Lunæ, crystalli pulvis, brassicæ decoctum, butyrum, cum lacte & fœniculo sumptum.

## LAC MINUENTIA.

Mentha, chelidonium majus, calamentum, coriandrum, ocymum, acetum, oxymel, camphora.

## CAPUT XXIX.

## De medicamentis semen generantibus, idemque extinguentibus.

Semen generant, & ad libidinem provocant medicamenta, quæ calida sunt & flatuosa sine exsiccatione. Minuunt verò semen, & veneris stimulos obtundunt, quæ vel impensè refrigerant, vel admodum exsiccando, materiam feminalem absumunt.

Horum materia talis est.

## SEMEN GENERANTIA.

Semina, eruca, napi, urtica, sinapi, piper.  
Fructus, pistacia, nuclei pinci.  
Animalia, scincus, cerebella passerum, testiculi galli.

## SEMEN EXTINGUENTIA.

Lactuca, portulaca, camphora, mentha, ruta, semen agni casti, ancibi.

## CAPUT XXX.

## De Medicamentis flatus discutientibus.

Medicamenta flatus discutientia calefaciunt & attenuant, vaporesque à materia frigida productos per diaphoresin resolvunt.

Hæc ab iis, quæ pituitam calefaciunt & attenuant, ferè non distinguuntur: ideò hîc non erunt repetenda.

## CAPUT XXXI.

## De Adstringentibus Medicamentis.

Adstringentia medicamenta frigida sunt, & sicca, substantiæque terrestres, unde partes contrahunt, constipant & condensant.

Hoc theorema verissimum quidem est de simpliciter adstringentibus, quæ illas qualitates præ se ferunt: attamen dantur alia medicamenta, quæ cum aliis facultatibus habent etiam adstringendi vim, ob variam substantiæ conditionem: seu dantur multa adstringentia, quæ calida sunt, ut absynhium, mastiche, vitriolum, & alia hujusmodi.

Quacumque ad menses sistendos supra fuerunt proposita, eadem sunt adstringentia: quare inde illa erunt repetenda.

## CAPUT XXXII.

## De Medicamentis Lumbricos Enecantibus.

Quacumque medicamenta amara sunt acria, acida, adstringentia, oleosa, lumbricos enecare valent.

Amara, acria, & acida, tenuitate sua lumbricorum substantiam penetrant, eamque dissolvunt. Adstringentia, lumbricos constipando: oleosa eorundem poros obturando, transpirationem impediunt, quâ solâ vivunt, sicque eos suffocant. Certum tamen est, nonnulla dari medicamenta, quæ non solum qualitatibus manifestis, sed specifica proprietate lumbricos enecant. Exemplo sit Mercurius qui ventri tantum admotus, cum unguentis, lumbricos



# Cap. I. De refriger. & repellent. medic. 147

in intestinis contentos potenter enecat, ac interius assumptus, convenienter administratus, ac debite præparatus, miranda præstat. Imò verò Mercurius crudus, cum aqua simplici aliquandiu agitatus, virtutem suam ei aliquatenus communicat, ut purissima illa aqua, nulla sensibili qualitate prædita, pro potu ordinario exhibita, lumbricos etiam efficaciter enecet.

Horum autem lumbricos enecantium materia talis est.

## SIMPLICIA.

Radices, *graminis, primulae veris, zedoariae, dictamni albi, gentianae, angelicae, rhabarbarum.*

Folia, *portulacae, cichorii, acetosae, absinthii, Corallinae, scordii, hyperici, centaurei minoris, verbenae, marrubii, dictamni cretici.*

Semina, *citri, tanacetii, brassicae, lupini, semen contra vermes, amygdalae amarae.*

Succi, *limonum, granatorum, portulacae, aloës.*

Animalia, *rasura eboris, cornu cervi.*

## COMPOSITA.

*Pulvis contra vermes, hiera picra.*

Chymica, *spiritus sulphuris, vitrioli, Mercurius dulcis.*

## CAPUT XXXIII.

### De Vulnerariis Medicamentis.

*Vulneraria medicamenta ea sunt, quæ leviter adstringendo & exsiccano, vulnorum conglutinationem promovent.*

**N**on solum externis & topicis medicamentis vulnera curari solent, sed etiam internis, quæ conglutinationem assumpta promovent, ex illisque potiones vulnerariae frequenter componi solent.

Horum materia talis est.

Radices, *symphyti, aristolochiae rotundae, zedoariae, tormentillae.*

Folia, *vincae peruvinae, pimpinellae, saniculae, bugulae, pilosellae, veronicae, agrimoniae, centaurei minoris.*

Semina, *cardui benedicti.*

Animalia, *canceri fluviales.*

## LIBER QUINTUS.

### PARTIS SECUNDÆ.

#### SECTIONIS PRIMÆ.

### PARTICULA SECUNDA.

#### De Materia Medica Externa.

## CAPUT PRIMUM.

### De refrigerantibus, & repellentibus Medicamentis.

**I**n partibus externis sæpè contingunt inflammationes, erysipelata, herpes, carbunculi, & similes affectus calidiores, quos refrigerantium admotione compescere necesse est, potissimum in eorum principio. Et quandoquidem hi affectus ut plurimum à fluxionibus ducunt originem, ideò illa medicamenta in principio repellentia esse debent, ut humorum fluxum impediant, eosque à parte affecta eliminent.

Repellunt autem medicamenta, quatenus prædita sunt adstringendi vi, quæ supra fuit explicata, cum de adstringentibus internis ageretur.

Quia verò refrigerantia & repellentia externa ab internis maximè differunt, ideo illorum series hîc exponenda est.

*Laz. Riverii Opera.*

## REFRIGERANTIA

### Medicamenta.

#### SIMPLICIA.

Cortices, *radicis solani, mandragorae.*

Folia, *lactucæ, intybi genera quatuor, hyoscyami, lentivulae palustris, umbilici veneris.*

Prædicta simpliciter refrigerant. Sequentia verò refrigerando leniter adstringunt.

*Portulacæ, polygonum, plantago, ligustrum, solanum, sempervivum, mandragora.*

Semina, *psyllii, hyoscyami albi, papaveris albi, frigida majora & minora.*

Flores, *rosarum, violarum, nymphaeae.*

Succi, *granatorum, lactucæ, portulacæ, sempervivi, solani, plantaginis, limonum, acetum, omphacium.*

Animalia, *albumen ovi.*

#### COMPOSITA.

Aquæ, *solani, nymphaeae, rosarum, plantaginis, polygoni.*

Olea, *rosaceum, violatum, nymphaeae, papaveris, hyoscyami, mandragorae.*

Unguenta, *rosaceum, ceratum santalinum, refrigerant. Galeni, populeum.*

## REPELLENTIA ET

### Adstringentia.

#### SIMPLICIA.

Radices, *bistortae, symphyti, tormentillae, rhapontici.*

Cortices, *medianus, sumach, granatorum, juglandium viridium, calices glandium.*

Folia, *vitidis & capreoli ejusdem myrti, expressi, quercus, oleastri, sumach, centinodia, bursae pastoris, equiseti, plantaginis, absinthii, menthae, verbasci, summitates rubi.*

Semina, *portulacæ, plantaginis, bursae pastoris, granatinctorum, acini uvarum.*

Flores, *rosæ rubrae, fex rosarum stillarum, balaustiae.*

Fructus, *myrtilli, nuces cupressi, galae immaturae, mespilla, sorba, cydonia.*

Succi, *plantaginis, & herbarum prædictarum, acacia, hypocistis.*

Gummi, *mastiche, sanguis draconis, thus sandaracha, tragacanthum, sarcocolla, gummi Arabicum.*

Mineralia, *bolus Armena, terra sigillata, alumen, corallium.*

#### COMPOSITA.

Aquæ, *rosarum, plantaginis, solani, corticis nucum ferrata.*

Olea, *rosarum, omphacinum, myrthinum, masticinum, leniscinum, de absinthio, de mentha.*

Unguenta, *Comitisse.*

Emplastra, *contra rupturam, de crusta panis.*

## CAPUT II.

### De Emplastis Medicamentis.

**R**epellentibus & adstringentibus emplastica sunt finitima, & in fluxionum principiis ac sanguinis eruptionibus, ex quacunque etiam parte, conveniunt. Sunt enim glutinosæ & pingui substantiâ prædita, quâ parti tenaciter adhærent, illiusque poros implent & obstruunt, ne humor influens eas pervadere possit: tum etiam partem comprimendo humorem illum aliò impellunt.

Ex his quædam simpliciter talia sunt, nec ulla alia qualitate insigni prædita, quædam verò simul exsiccant, aut etiam adstringunt: imò maxima eorum pars duas hæc qualitates solet habere conjunctas.

Horum autem materia talis est.

#### SIMPLICIA.

Farinæ, *tritici, fabarum.*

Succi, *amylum.*

Gummi, *mastiche, sanguis draconis.*

Animalia, *album ovi, mumia.*

Mineralia, *lapis hematites, corallium, terra sigillata, bolus armena, gypsum, lithargyrus, cerussa, pompholyx, cadmia, lapis calaminaris, antimonium, alumen, plumbum.*

T 2

Unguenta,



# 148 Instit. Comp. Med. Lib. V. Pars II. Sect. I. Part. II.

Unguenta, album Rhafis, de lihargyro, nutrium, diachalcitheos, diapompholigos, deficcativum rubrum.

## CAPUT III.

### De Anodynis Medicamentis.

**D**olor corporis partes affligens tribus modis sedari solet: vel causam dolorem efficientem auferendo; vel sensum stupefaciendo narcoticis medicamentis; vel iis medicamentis, quæ anodyna propriè appellantur.

Illa autem anodyna, seu paregorica, dicuntur, quæ causâ & morbo remanentibus, dolorem mitigant.

Idque præstant blando & moderato calore, quo pars affecti fovetur, & ad quandam æqualitatem reducitur, cutis relaxatur, ejusque pori aperiuntur, ut per eam quædam materiæ portio resolvatur.

Horum autem materia talis est.

#### SIMPLICIA.

Radices, *althea*, *malva*, *liliorum*.

Folia, *malva*, *althea*, *branca ursina*.

Semina, *lini*, *sænugræci*, *althea*,

Flores, *liliorum*, *chamomille*, *meliloti*.

Farinæ, *seminis lini*, *sænugræci*.

#### COMPOSITA.

Olea, *commune*, *amygdalarum dulcium*, *liliorum*, *chamæmelinum*, *anethinum*, *irinum*, *ex vitellis ovorum*.

Unguenta, *de althea*: *resumptivum*.

## CAPUT IV.

### De Narcoticis Medicamentis.

**N**arcotica dolorem sedant, stupefaciendo partem, eique sensum auferendo, vel somnum conciliando, quo sensus toti corpori adimitur.

Hunc effectum producere creduntur summa frigiditate, quam habent in quarto gradu. Hæc est antiqua Galeni doctrina. Recentiores tamen non pauci existimant, non frigiditate simpliciter, sed peculiari facultate, & proprietate specificâ, quam vim narcoticam appellant, ea sensum adimere, & somnum conciliare.

Horum usus non adnuitur, nisi post anodyna frustra tentata.

#### SIMPLICIA.

Radices, *mandragoræ*, *hyoscyami*.

Folia, *hyoscyami*, *cicutæ*, *mandragoræ*, *papaveris albi*.

Semina, *hyoscyami*, *papaveris albi*.

Succi, *lactucæ*, *cicutæ*, *hyoscyami*, *opium*.

#### COMPOSITA.

Opiatæ, *philonium Romanum*, *Requies Nicolai*.

Olea, *mandragoræ*, *hyoscyami*, *papaveris albi*.

Chymica, *laudanum opium*.

## CAPUT V.

### De Emollientibus Medicamentis.

*Durities omnis à tribus causis produci solet: siccitate, tensione, concretione.*

**Q**uæ exsiccantur, duriora evadunt: quæ verò repleta sunt, distenduntur, & renitentia fiunt, ita ut contactui resistant, & dura appellentur: illa etiam, quæ à frigore concreverunt, duritiem acquirunt, ut in glacie apparet. Omnes istæ duritiei species corpori nostro contingunt. Humores enim siccitatem contrahunt, diuturnâ caloris aut resolventium medicamentorum actione, quia tenuiores humidioresque partes dissipantur, crassiores siccioresque remanent. Ab humorum multitudine partes replentur & distenduntur: ac denique humores naturâ frigidi, proprio calore destituti, vel in parte intemperie frigida laborante, residentes, sponte concreverunt & indurantur.

*Quæ à siccitate oritur durities, humectatione curatur, quæ à repletionem & humorum multitudine, vacuatione solvitur,*

*quæ à concretione, propriè dictis emollientibus auferuntur.*

Sunt autem verè emollientia anodynus finitima, moderato calore & siccitate prædita, secundum Galenum 5. de simpl. medic. fac. cap. 8. omni acrimonia & excedente qualitate destituta: unde concretum frigore humorem fundunt & colligunt, sicque illius duritiem auferunt.

Horum autem materia talis est.

#### SIMPLICIA.

Radices, *malvæ*, *althea*, *liliorum*, *iridis*, *brionia*, *ebuli*, *cucumeris agrestis*.

Folia, *violariæ*, *parietariæ*, *acanthi*, *malvæ*, *althea*, *atriplicis*, *ebuli*.

Semina, *lini*, *sænugræci*, *malvæ*, *althea*.

Flores, *chamæmeli*, *meliloti*, *liliorum*.

Fructus, *ficus pingues*.

Gummi, *terebinthina*, *ammoniacum*, *bdellium*, *styrax*, *galbanum*, *opopanax*.

Animalia, *butyrum*, *adeps suillus*, *gallinaceus*, *anserinus*, *Æsypus*, *medulla cervina*, *viulina*.

#### COMPOSITA.

Olea, *commune*, *liliorum*, *violaceum*, *lumbricorum*, *chamæmelinum*, *lini*, *irinum*, *catulorum*.

Unguenta, *de althea*, *resumptivum*.

Emplastra, *diachylum magnum*, *de mucilaginis*, *de meliloto*, *filii Zachariæ*, *ceroneum*, *oxycroceum*, *de ranis*.

## CAPUT VI.

### De Resolventibus Medicamentis.

**R**esolventia medicamenta emollientibus sunt calidiora, necnon tenuem habent substantiam, unde facile penetrant, cutis poros dilatant, humores attenuant, & in vapores convertunt, ut per insensibilem transpirationem seu diaphoresin vacuentur.

Eorum materia talis est.

#### SIMPLICIA.

Radices, *enulæ campanæ*, *ireos*, *aristolochiæ*, *galangæ*.

Folia, *majoranæ*, *absinthii*, *hyssopi*, *calamenti*, *pulegii*, *origani*, *lauri*, *rutæ*, *sauriciæ*, *salviæ*, *rorismarini*.

Semina, *danci*, *cumini*, *anethi*, *sænugræci*, *lini*, *nigellæ*, *anisi*, *feniculi*.

Fructus, *baccæ lauri*, *juniperi*, *piper*.

Flores, *stachados*, *hyssopi*, *lavendulæ*, *anethi*, *chamomillæ*, *meliloti*.

#### COMPOSITA.

Olea, *anethinum*, *rutaceum*, *amygdalarum amararum*, *de caparibus*, *scorpionum*, *nardinum*, *hyperici*, *vulpinum*, *terebinthina*, *de spica*.

Unguenta, *Agrippæ*, *Aregon*, *martiatum*.

Emplastra, *de sulphure*, *de baccis lauri*, *diachylum ireatum*.

## CAPUT VII.

### De Epispasticis, seu Attrahentibus Medicamentis.

**A**trahentia medicamenta resolventibus sunt calidiora, & humores in profundo corporis contentos cuti adnota, foras evocant, eosque dissipant.

Licet autem ut plurimum à caliditate & partium tenuitate vim illam obtineant; nonnulla tamen proprietate insita id præstant, quemadmodum dictamus infixâ corpori spicula trahere creditur: alia similitudine substantiæ, ut scorpius, vulnere à se inflicto impositus, venenum ad se trahit.

Attrahentium autem medicamentorum materia talis est.

#### SIMPLICIA.

Radices, *aristolochiæ utriusque*, *pyrethri*, *thapsiæ*, *hermodactyli*, *iridis*, *bellebori*, *cyolaminis*, *anacardii*.

Folia, *anagallidis*, *calamintæ*, *iberidis*, *saponariæ*, *urticæ*, *zelæariæ*.

Semina, *thlaspi*, *sinopi*, *nasturtii*, *urticæ*.

Fructus, *colochynthidis*.

Succi, *elaterium*.

Gummi



# Cap. VIII. De Suppurantibus Medicam. 149

Gummi pix, euphorbium, ammoniacum.  
Animalia, castoreum, funus columbinus, gallinaceus, stercus caprillum.

Mineralia, sulphur.

## COMPOSITA.

Olea, balaninum, sinapium.

Emplastra, de meliloto, de baccis lauri, de sulphure, oxycroceum.

## CAPUT VIII.

### De Suppurantibus Medicamentis.

*Suppurantia medicamenta moderato calore & humiditate prædita sunt, ac partis, cui admoventur, temperaturæ simillima, sicque nativum illius calcrem augent, quo sanguis putrescens concoquitur, & in verum pus commutatur.*

**I**N corporibus nostris tres omnino fieri solent alterationes, secundum Galen. 5. de simpl. medic. fac. cap. 6. Prima planè secundum naturam est, cum videlicet in ventriculo, hepate, & singulis partibus alimentum concoquitur ad nutritionem. Secunda est omnino præter naturam, cum substantiæ in corpore contentæ putredinem contrahunt. Tertia denique media existit: partim naturalis partim verò præternaturalis, & suppuratio appellatur. Cum enim sanguis, in parte contentus putredinem contrahens, calorem præternaturalem acquirit à partis calore nativo alteratur & concoquitur, ita ut calore utroque simul operante, nec perfecta concoctio, nec putredo absoluta producat; sed media quædam operatio, suppuratio dicta, qua humor non quidem nutritioni idoneus redditur, sed ad quandam subtilitatem & qualitatum moderationem, naturæ magis consentaneam, reducitur. Jam verò medicamenta, suppurationem promoventia ea sunt quæ calorem nativum augent, ut melius vires suas possint exerere. Talia sunt, quæ calorem habent, partis cui imponuntur, calori consimilem, sicque eum fovent, & vegetiorem efficiunt.

*Illa verò emollientibus medicamentis sunt valde similia: in eo tamen distinguuntur, Galeno teste, quod emollientia calidiora sint & sicciora, atque adeo nonnihil humoris in parte contenti absument, suppurantia verò magis temperata totum humiditatem servant.*

*Porro suppurantia ex ætate talia, emplastica esse debent: ut enim calor in parte retineatur, pori illius obstrui debent ut per eosdem fiat dissipatio: emplasticis verò medicamentis proprium est poros partium ocludere.*

*Suppurantium autem medicamentorum materia talis est.*

## SIMPLICIA.

Radices, altheæ, liliorum, cepa sub cineribus cocta, in tumoribus, qui ægrè suppurant efficac.

Folia, malvæ, altheæ, acanthi, tussilaginis, oxalidis.

Semina, altheæ, lini, fenugræci.

Flores, chamomilla, meliloti.

Gummi, pix liquida, terebinthina, resina, ammoniacum, bdellium.

Farinæ, tritici, lini, fenugræci.

Animalia, butyrum, æsypus, adeps suillus, vitulinus, gallinaceus, anserinus, medulla cervina, vitulina, vitellumovi.

## COMPOSITA.

Olea liliorum, chamæmelinum, irinum, commune, hydrellum.

Unguenta, Basilicum, de althea, Agrippæ, resumptivum.

Emplastra, diachylum magnum, de mucilaginibus.

## CAPUT IX.

### De Medicamentis Detergentibus.

*Ad abscessuum disruptorum, vel ulcerum sordidorum sanienem, aliasque sordes expurgandas, detergentibus nimirum*

*medicamentis, quæ asperitate sua, vel nitrosa vi, materias illas impactas eliciant.*

**D**Etergendi facultas à primis qualitatibus non dependet, cum dentur calida & frigida detergentia, sed à quadam asperitate & nitrosa vi, quæ nihilominus calori conjuncta potentiùs operatur: propterea quod materia lenta, & parti adhærescens, calore attenuata facilius detergatur.

*Horum autem detergentium materia talis est.*

## SIMPLICIA.

Radices, apii, ireos, aristolochiæ utriusque, gentianæ.

Folia, absynthii, centaurei minoris, marrubii, apii, agri-

monia, plantaginis, anagallidis.

Semina, apii, plantaginis.

Succi, foliorum prædictorum, vinum.

Farinæ, fabarum, lupinorum, fenugræci, hordei, lini.

Gummi, terebinthina, aloës, thus, myrrha.

Animalia, mel, urina.

Mineralia, vitriolum ustum, arugo, salpetra.

## COMPOSITA.

Syrupi, de rosis siccis, mel rosaceum.

Olea, de myrrha, de tartaro, ex vitellis ovorum, sambucinum.

Unguenta, aureum, enulatum, Apostolorum, Ægyptiacum, mundificativum de apio.

Emplastra, de janua, gratia Dei, divinum.

## CAPUT X.

### De Sarcoticis Medicamentis.

*Sarcotica medicamenta dicuntur, quæ carnis in vulnere aut ulcere deficientis generationem promoven.*

*Id præstant moderatè exsiccano, & ulcerum sordes blandè detergendo. Ideò moderatè calida & sicca esse debent, omnisque acrimonie expertia. Si enim calidiora & acriora forent, carnem colliquarent: si frigidiora, & adstringentia, citius cicatricem inducerent, antequam ulcus carne foret repletum.*

**P**roprium naturæ munus est, carnem generare per alimenti assimilationem. Medicamenta verò, quæ sarcotica, seu carnem generantia nominantur, non possunt per se id efficere; sed tantum naturæ actionem adjuvant, impedimenta auferendo. Solent enim carnis generationem impedire sordes in ulcere contentæ, & humiditates superflue, in eo luxuriantes; hinc leviter exsiccantibus & detergentibus medicamentis ulcus purum efficitur, & actioni naturæ, carnem deficientem reparare studentis, suscipiendæ dispositum.

*Sarcoticorum autem materia talis est.*

## SIMPLICIA.

Farinæ fenugræci, orobi, lupinorum.

Gummi, thus, pix utraque, terebinthina, sarcocolla, aloë, myrrha.

Mineralia, plumbum ustum, cerusa.

## COMPOSITA.

Unguenta, Basilicum, aureum, pompholygos, Apostolorum.

Emplastra, de janua, gratia Dei, divinum, de bctonica.

## CAPUT XI.

### De Epuloticis, seu cicatricem inducentibus Medicamentis.

*Epulotica medicamenta dicuntur, quæ ulcris carnem cuti consimilem efficiunt eam valde exsiccano & adstringendo.*

**U**T cute nuda caro cicatrice obducatur, extima illius superficies debet maximè adstringi, contrahi, & exsicari: unde cicatricem inducentia medicamenta, exsiccantia & adstringentia cum sint, glutinantibus finissima esse videntur, quæ iisdem qualitatibus prædita esse, supra



annotavimus. In eo tamen differunt, quod epulotica potentiùs exsiccent & adstringant, neque enim id solum, quod in carnem influit & excrementitium est, humidum absumunt; sed ipsam carnis substantiam valde exsiccant, eamque in cutis naturam ferè convertunt.

*Epuloticorum autem materia talis est.*

#### SIMPLICIA.

Plantæ, *malicorium, plantago, myrius balaustia, rose.*  
Mineralia, *bolus armena, terra sigillata, lithargirus, cerussa, lapis hæmatites, calaminaris, cadmia, pompholyx, scoria ferri, plumbum ustum, squama æris, æs ustum, antimonium ustum, calx, alumen ustum, vitriolum ustum.* Sex ista posteriora sæpius lota, donec acrimoniam deposuerint, sunt usurpanda.

#### COMPOSITA.

Unguenta, *album Rhasis, desiccativum rubrum, diapompholygos.*  
Emplastra, *de cerussa, de lapide calaminari, diapalma Paracelsi.*

### CAPUT XII.

De Medicamentis Sanguinem Sistentibus.

**E**A medicamenta, quæ sanguinem ex quacunque parte fluentem prohibent, trium generum esse solent. Vel enim proprietate peculiari id præstant, vel quatenus emplastica sunt venasque apertas infarciunt & occludunt; vel denique quatenus partem vulneratam urunt, eamque crustâ obducunt.

*Præcipuorum autem materia talis est.*

Radices, *symphyti, pentaphylli.*

Folia, *continodia, pimpinella, equiseti, plantaginis; vinca pervinca, urtica.*

Fructus, *gallæ.*

Flores, *balaustia.*

Succi, *accium, omphacium, acacia, hypocystis.*

Gummi, *mastiche, sanguis draconis, ibis, mirrha.*

Animalia, *gluten, mumia, Albumen ovi.*

Mineralia, *bolus armena, terra sigillata, lapis hæmatites, jaspis, corallium, alumen, vitriolum.*

*Idiisum præstant emplastica omnia; sed minùs efficaciter.*

### CAPUT XIII.

De Glutinantibus Medicamentis.

*Κολλητικὰ, seu glutinantia medicamenta sunt, quæ vulnerum labra diducta coniungunt, & ad perfectam unionem perducunt.*

*Eaque omnia adstringentia & exsiccantia esse debent.*

**Q**Uando pars divisa constringitur, unio illius faciliùs perficitur: ad quam etiam necesse est, ut non id solum quod influit, sed quod in ipsa carne consistit liquidius absumatur; atque ita magnâ exsiccatione opus est, quæ tamen calorem non habeat tam excedentem, ut vel partem colliquet vel acrimoniam feriat: inde enim nova humiditas succresceret, quæ conglutinationem impediret.

*Horum materia talis est.*

#### SIMPLICIA.

Radices, *symphyti, tormentilla, pentaphylli.*

Folia, *arnoglossi, cynoglossi, millesolii, verbenæ, pilosellæ, betonica, scabiosæ, bugulæ, hyperici, prunellæ.*

Gummi, *sarcocolla, myrrha, thus, aloë, terebinthina, pix liquida.*

Animalia, *lumbrici, mumia, pili leporis minutim dissecti.*

Mineralia, *lithargyrus auri.*

#### COMPOSITA.

Olea, *Myrrhæ, nicotianæ, balsama varia.*

Unguenta *aureum, desiccativum rubrum.*

Emplastra, *contra rupturam, triapharmacum, nigrum.*

### CAPUT XIV.

De Vesicantibus Medicamentis.

**V**esicantia medicamenta summam cutem valde calefaciunt, serofos humores ad ipsam attrahunt, ac cuticulam urendo à subiecta cute divellunt, unde vesiculæ excitantur.

Sunt etiam summè calida, tenuis & ferè igneæ substantiæ, ut partem, cui admoventur, facile inflamment, in eaque vesiculas excitent: unde nomen sortita sunt.

*Horum materia talis est.*

#### SIMPLICIA.

Radices, *thapsiæ, pyrethri.*

Semina, *sinapi, staphisagriæ.*

Gummi, *euphorbium.*

Animalia, *stercus columbinum, cantharides.*

#### COMPOSITA.

Emplastrum, *vesicatorium.*

### CAPUT XV.

De Catharticis, seu exedentibus Medicamentis.

**C**athartica medicamenta carnes superfluas in ulceribus excrecentes, polypos, & tubercula quævis absumunt.

Calidissima sunt, etiam in quarto gradu, necnon tenuis substantiæ, ac ferè adurentis, quæ omnes illas excrementas obliterant. Vesicantibus paulò minùs vehementia, quod inde patet, quod cathartica, cuti admodum, illam non alterant; sed tantum carnem denudatam, quæ mollior multo existit. At vesicantia partem, cui admoventur, facile inflamment.

#### SIMPLICIA.

*Pamex crematus, sal torrefactus, alumen ustum, vitriolum ustum, antimonium ustum, crocus metallorum, ærugo, squama æris, mercurius præcipitatus, cinnabaris, pulvis Sabinæ.*

#### COMPOSITA.

*Oleum vitrioli & sulphuris, aqua secunda, unguentum Apostolorum, Ægyptiacum.*

### CAPUT XVI.

De Causticis Medicamentis.

**C**austica medicamenta non solum cuticulam, sed etiam ipsam veram cutem & carnem subiectam ustione solvunt, in eaque escharam efficiunt, quæ à parte separatur & decedit, in eaque profundum ulcus relinquit.

Hæc verè *pyrotica* appellantur, quia prorsus igneam obtinent naturam, crassamque substantiam, quæ impensius urunt: ignis enim in densiori materia magis urit.

*Horum materia talis est.*

*Calx viva, æs ustum, mercurius sublimatus, arsenicum, causticum vulgare chirurgorum, liquor gummosus, qui ad mercurii vitæ confectionem elicitur, de quo vide Zappatam.*

## THERAPEUTICÆ

### PARTIS SECUNDÆ.

## SECTIO SECUNDA.

De Compositione Medicamentorum.

### PROOEMIUM.

*Composita medicamenta triplicia sunt interna, media & externa.*

*Interna sunt, quæ intra corpus assumuntur.*

**T**alia sunt apozemata, potiones, julepi, syrapi, emulsiones, boli & opiata, tabellæ, pulveres, trochisci, pilulæ, &c.

*Media*



# Cap. I. De Apozemate Alterante.

151

*Media sunt quæ neque intra corpus assumuntur, nec corporis superficiei admoventur; sed in certas corporis cavitates immittuntur.*

Talia sunt suppositoria, clysteres, injectiones, pessaria errhina, gargarismata, masticatoria, collyria, &c. Externa verò quæ partibus exterioribus admoventur.

Cujusmodi sunt epithemata, fomenta, balnea, olea, unguenta: emplastra, cataplasmata, sacculi, &c.

Ideo hæc Sectio secunda tribus articulis comprehenditur.

In primo, internorum medicamentorum componendorum regulæ traduntur: in secundo, mediorum, in tertio deinde externorum.

## SECTIONIS SECUNDÆ

### ARTICULUS PRIMUS.

#### De Compositione Medicamentorum Internorum.

#### CAPUT PRIMUM.

##### De Apozemate Alterante.

**A**pozema est forma medicamenti liquida, multorum simplicium decoctione conflata, saccharo, vel melle dulcorata, clarificata, & aromatisata, in tres, quatuor, aut quinque doses, ad alterandum vel purgandum parata.

Ideo duplex esse solet, alterans scilicet & purgans.

Apozema alterans componitur ex radicibus, corticibus, lignis, foliis, seminibus, fructibus & floribus: quorum quantitas talis esse solet.

Radicum ꝑ. iij. vel vij.

Corticum ꝑ. j. vel ij.

Lignorum, eadem quantitas.

Foliorum m. v. vel viij.

Seminum ꝑ. j. vel ꝑ. j. 6.

Fructuum minorum, ut passularum, ꝑ. j. interdum numero mensurantur ad paria xij vel xvj. Majores verò fructus tantum numero mensurantur, eoque pari, ut ficus, ad paria vij. vel octo; maximi verò, impari numero, ut poma.

Florum pugil. iij. vel vj.

Hæc omnia decoquantur in liquore idoneo, qui vulgò est aqua fontis, interdum etiam aqua hordei in affectibus biliosis, vel hydromel tenue in pituitosis. Nonnunquam etiam in obstructionibus fit decoctio in æquis partibus aquæ fontis & vini albi, sub finem additi, vel duabus partibus aquæ fontis, & una vini albi, arbitrio Medici.

Liquoris quantitas non definitur, sed hac præscribitur formulâ: *Fiat decoctio in aqua fontis, verbi gratiâ sufficienti quantitate.*

Decocti tamen colati quantitas determinari debet, scilicet ad lb. j. pro tribus dosibus, ad quartaria quinque pro quatuor dosibus, ad lb. j. 6. pro quinque dosibus hæc formulâ: *de colatura cape lb. j. 6.*

Postea dissolvuntur syrupi, ea quantitate, ut pro unaquaque dosi apozematis, sit ꝑ. j. syrupi, hac formulâ: *in qua (scilicet colaturâ) dissolve syrupi, v. g. violacei, & capillor. ven. ana ꝑ. ij.*

Interdum, saccharum præscribitur eadem dosi, præcipuè quando succi aliqui dissolvuntur, qui apozema reddunt efficacius.

Illi autem succi utilissimè præscribuntur in apozemate, ad ꝑ. ij. hac formulâ: *in colatura dissolve succorum depuratorum, borraginis, verbi gratiâ, & acetosæ, ana ꝑ. j. sacchari albi ꝑ. iij. ut plurimum verò sacchari quantitas non definitur, sed dicitur; sacchari albi quantitate sufficienti.*

His præstitis, apozema condiri solet aliquo aromate, quo jucundius evadat. Frquentissima autem & magis grata aromata sunt santalum citrinum, vel electuarium trium santalorum in apozemate refrigerante, cinamomum verò in calefaciente: & horum aromatum dosis est ꝑ. j. 6. 3. ij. hac formulâ: *Fiat apozema clarificatum*

*& aromatizatum, verbi gratiâ ꝑ. ij. cinamomi electi; pro iij. dosibus (matutinis.)*

#### CAPUT II.

##### De Apozemate Purgante.

*Apozema purgans est, quod humores non solum præparat, sed etiam una eademque opera evacuat: purgantibus medicamentis cum alterantibus admixtis.*

**H**odie usitatissimum est hoc apozematis genus, & solum ferè in usum revocatur. Illud enim, quod simpliciter alterat, Julepi nomine ut plurimum usurpari solet.

Et quadruplex esse solet pro quadruplici cathartorum differentia. Cholagogum scil. phlegmagogum, melanagogum & hydragogum.

Componitur ex eadem alterantium materia, eademque forma, qua alterans apozema. Ac præterea cathartica adduntur, cum suis correctivis, & inter fructus & flores collocantur ea proportionem, ut totidem sint cathartorum doses, quot apozematis.

Usitatissimum autem est in omni apozemate sennam pro basi præscribere ferè ad ꝑ. ij. cui adduntur polypodium & semen carthami, eadem quantitate, vel saltem ad ꝑ. j. uriusque. Deinde alia præscriuntur cathartica, pro humoris peccantis ratione quorum alia decoqui solent, ut turbit, hermodactyli, agaricus, epithymus, helleborus niger, semen ebuli: alia verò infunduntur, ut rhabarb. agaricus, tamarindi.

Illæ autem, quæ non decoquantur, sed tantum infunduntur, hac formulâ præscribi debent: Rhabarb. verbi gratiâ, seorsim infusi ꝑ. 6. ea verò quæ decoquantur, simpliciter enuntiar. Dosium verò computatio ita fieri debet, ut unica sennæ dosis in decoctione, sit ꝑ. j. turbit hermodactyl. & agarici ꝑ. 6. rhabarb. infusiciam ꝑ. 6. polypodii verò, sem. carthami, & Epithymi nulla ferè habetur ratio, quia sunt exigue virtutis.

Sic, quando apozema componimus in quatuor doses, possumus præscribere, sennæ ꝑ. ij. turbit. & agarici, ana ꝑ. 6. Ita enim erunt quatuor doses purgantium, videlicet duæ sennæ, una turbit, & una agarici, quorum loco alia substituere possumus, prout indicatio exigit, eadem semper methodo observata.

Correctiva statim post omnium purgantium enumerationem præscribuntur, quæ ut plurimum sunt zingiber & caryophylli, uriusque ꝑ. j.

In decocto colato dissolvuntur iidem propemodum syrupi, qui in alterantibus apozematis præscripti fuerunt. Interdum verò, quando apozema sufficienter purgans non æstimatur, syrupi purgantes dissolvuntur, & frequentissimè syrupus rosatus soluitur. Aliquando syrupus de cuborio compositus cum rheo, in affectibus biliosis, & syrupus de sumaria cum rheo, in affectibus melancholicis.

Nonnunquam etiam veris tempore dissolvitur succus rosarum pallidarum, vel infusio earundem completa, ad ꝑ. iij. in affectibus biliosis, & tunc nulli præscribuntur syrupi, sed sacchari q. s.

In usu autem omnium apozematum hæc observandum, ut initio humores, in prima regione contenti medicamento cathartico vacuentur, & in fine illius omnes humorum reliquæ expurgentur, quod sæpissimè fit ipso apozemate, si prima & ultima, illius dosi validius purgans efficiatur; dissolvendo in illa opiata vel electuarii purgantis ꝑ. ij. plus, minus, pro dispositione agrotantis, syrupi purgantis ꝑ. j. hac formulâ: In prima & ultima dosi dissolve electuarii diacarthami v. gr. 3. syrupi rosati solutivi. ꝑ. j. Misce fiat potio, capiat æger cum regimine.

Aliquando minorans medicamentum præscribitur ante Apozema, & tunc in ultima tantum dosi purgantia illa dissolvuntur.

Nonnunquam etiam in affectibus capitis & partium à ventriculo valde remotarum, pilule præscribuntur post apozema, & tunc nihil dissolvitur in ultima dosi.



## CAPUT III.

## De Potione Purgante.

**P**Otio est medicamenti forma liquida, in unicam dosin præscribenda, ex variarum rerum decoctione, infusione, aut dissolutione, in liquore idoneo composita.

Eaque multiplex est secundum varias indicationes, in quibus usurpatur, videlicet purgans, corroborans, somnum concilians, lumbricos enecans, partum promovens, &c.

Potio purgans in multis modis parari solet, & in ea tria considerantur: 1. decoctio. 2. infusio. 3. dissolutio.

Decoctio magis usitata præscribitur, ex senna ad ʒ. β. vel ʒ. vj. sem. anisi ʒ. j. ad correctionem sennæ, vel sem. anisi & caryophyll. ana ʒ. β. herbarum affectui propriarum M. j. β. vel manip. ij. liquiritiæ ras. & passular. mundat. ana ʒ. iij. (in omnibus ferè potionibus hæc duo præscribuntur, præterquam in nonnullis mulieribus, quæ à dulcedine abhorrent) florum appropriatorum purg. j. vel ij. & fit decoctio ad ʒ. vj.

Vel sumitur decoctum commune medicinæ purgans, quod in officinis haberi solet.

Interdum etiam in affectibus pectoris præscribitur decoctum commune pectorale purgans, eadem methodo.

Infusio fit ex rhab. in affectibus biliosis: agarico, in pituitosis: vel utroque; in mixtis: & illorum quantitas est à ʒ. j. ad ʒ. j. β. addito correctivo, scilicet spicâ nardi, vel cinamomo, vel santalo citrino, à gran. vj. ad ʒ. β. Spica foli rhabarbaro correctivum est, cinamomum utrique; sed in affectibus minus calidis: santalum citrinum in febribus vehementissimis.

Liquor autem, in quo solet fieri infusio, est aqua stillatitia, affectui appropriata, vel etiam decoctum purgans prædictum.

In dissolutione præscribuntur composita purgantia, opiatæ, vel electuaria, varia dosi pro majori vel minori quantitate purgantium, quæ in decoctione vel infusione præscripta fuerunt, & syrupus aliquis purgans, ut rosatus solutivus, frequentissimè. Interdum syrupus de cichorio compos. cum rheo, vel de fumaria compositus, qui minus purgant quàm prædictus. Syrupi autem quantitas perpetuò est ʒ. j. non unquam verò in affectibus pulmonum, manna dissolvitur, ab ʒ. β. ad ʒ. j. & tunc syrupi quantitas minuitur ad ʒ. β.

His variis modis potiones cathartici componuntur: scilicet vel tribus hisce præparationibus, vel duabus tantum, vel unica.

Ex tribus præparationibus variæ etiam componuntur formulæ, pro varietate decoctionis vel infusionis.

Si enim fiat decoctio magistralis cum infusione in eadem decoctione, ita præscribitur: ʒ. fol. sennæ &c. *Fiat decoctio ad ʒ. v. in colatura infunde* rhabarb. verbi gratia ʒ. i. β. spicæ nardi gr. vj. *expressione facta dissolve* diaprun. solut. verbi gratia ʒ. iij. *syrup. rosat. solut. ʒ. i. misce, fiat potio, quæ detur cras manè, cum custodia & regimine artis.*

Si verò fiat decoctio magistralis, cum infusione in aqua stillatitia, hac formula præscribitur: ʒ. &c. *fiat decoctio ad ʒ. v. in colatura dissolve* rhab. verbi gratia in aqua cichorii cum spica infusi & expressi ʒ. i. electuarii de succo rosarum ʒ. iij. *syrupi de cichorio compos. cum rheo ʒ. i. Misce fiat potio, quæ detur, &c.*

Si fiat ex decocto officinali cum infusione in aqua stillatitia, hac formula præscribitur: ʒ. verbi gratia, rhab. elect. & agarici trochiscat. ana ʒ. ii. cinamom. ʒ. β. *Infundantur in aqua betonice, expressione facta dissolve* electuarii diacarthami & diaphœnic. ana ʒ. i. ʒ. i. β. *syrupi rosat. solut. ʒ. j. decocti communis med. purgantis ʒ. vj. vel decocti commun. pectoral. purgant. ʒ. vj. Misce fiat potio quæ detur. &c.*

Nota interdum nulla electuaria præscribi, quando scilicet benignius est purgandum; sed tantum decoctum commune, & syrupum.

Ex duabus tantum præparationibus conflata potio-

nes, duplices sunt: vel scilicet ex decoctione & dissolutione; vel ex infusione & dissolutione.

Ex decoctione & dissolutione fiunt potiones hac formula ʒ. &c. *fiat decoctio ad ʒ. iij. in colatura dissolve* electuarii, &c. *syrupi, &c. Misce, fiat potio.*

Ex infusione & dissolutione fiunt potiones hac formula: ʒ. Rhab. &c. *Infundantur, &c. expressione facta dissolve* electuarii, &c. *syrupi, &c. Misce, fiat potio.*

Ex unica tantum præparatione fiunt potiones, quæ simplici dissolutione constant, quod fit in casibus valde urgentibus, ubi decoctionibus vel infusionibus tempus non suppetit: & tunc electuaria purgantia dissolvuntur cum jusculo vel aqua appropriata, ad ʒ. vi. aut ʒ. j. hac formula. ʒ. *Electuarii*, verbi gratia, diacarthami ʒ. j. *detur cum jusculo. vel ʒ. elect. &c. syrupi rosar. solut. ʒ. j. aquæ, verbi gratia, betonice, q. f. Misce, fiat potio.*

Interdum dissolvitur rhab. pulverat. cum jusculo, in diarrhœa vel dysenteria, hac formula. ʒ. Rhab. pulverat. ʒ. j. *detur cras mane cum jusculo.* Datur etiam Rhab. cum jusculo ad ʒ. β. puerulis, qui ferre nequeunt vehementiora cathartica.

Pueris etiam exhibetur manna cum jusculo dissoluta ad ʒ. j. & grandioribus, in affectibus pulmonum, ad ʒ. iij. & ʒ. ij. β.

## CAPUT IV.

## De potione corroborante, somnum conciliante, lumbricos enecante, &amp; similibus.

**P**Otiones istæ, quia unica tantum dosi præscribuntur, sub potionum titulo exponuntur; licet hodie usus invaluerit in Medicina facienda, ut frequenter vocentur Julepi pro unica dosi ad differentiam vulgare Juleporum, qui pro tribus dosibus ut plurimum præscribuntur.

Fiunt autem potiones cardiacæ ex aquæ cardiacæ ʒ. iij. syrupi cardiaci ʒ. j. confectiois cardiacæ ʒ. i. pulverum cardiacorum ʒ. i. hac formula. ʒ. &c. *Misce, fiat potio* (vel fiat julep. pro unica dosi) *quam capiat tali hora, omnis enim hora apta quidem est huic remedio propinando; sed potissimum manè & sero usurpatur.*

Somnifera potio fit ex syrupi de papavere ʒ. j. aquæ cardiacæ ʒ. iij. confect. alhermes ʒ. β. vel ʒ. i. hac formula.

ʒ. &c. *Misce, fiat potio, quæ detur hac nocte, hora somni.*

Potus contra vermes fit ex aqua portulacæ vel graminis ʒ. iij. syrupi de limonibus ʒ. i. confect. de hyacyntho, ʒ. i. pulveris contra vermes ʒ. i. vel alio modo consimili.

Ad reliquas indicationes adimplendas, eandem ingredientium proportio perpetuò erit observanda, ut sint aquarum ʒ. iij. aut iij. syrupi ʒ. i. confect. ʒ. i. pulver. ʒ. ʒ. β. vel ʒ. ii. ad summum.

## CAPUT V.

## De Julepis.

**J**ulepus duobus modis componi solet, nimirum vel ex aquis stillatitiis, vel ex simplicium decoctione, aut aqua fontana.

Præscribitur autem ut plurimum pro tribus vel quatuor dosibus, ea proportione, ut pro unaquaque dosi sint aquarum ʒ. iij. vel iij. syruporum ʒ. i. hac formula. *Aquarum, &c. Misce, fiat Julep. pro tribus dosib. mane sumendis.* Interdum succi aquis admiscuntur, ea proportione, ut pro unaquaque dosi sint succorum ʒ. β. vel ʒ. vi.

Nonnunquam etiam in julepis refrigerantibus præscribuntur spiritus vitrioli guttæ aliquot, quæ non definiuntur, sed hac formula usurpantur, *spiritus vitrioli q. f. ad gratiam aciditatem.*

Ex decoctione julepi componuntur eadem methodo, quæ apozemata alterantia, minori paulò simplicium dosi. In eo tamen differunt, quod in fine non præscribatur clarificatio & aromatizatio, sed talis eorum sit formula: ʒ. *Rad. &c. fiat decoctio ad ʒ. i. In colatura dissolve* syruporum ʒ. iij. *Misce, fiat Julep. pro tribus dosibus, mane & sero sumendis.*



## CAPUT VI.

### De Syrupis, Ac Primùm De Alterante.

**S**yruporum duo sunt genera, alterantium scilicet, & purgantium.

Alterantes syrupi rarò componuntur à Medicis, quia quàm plurimi habentur in officinis, ad omnes indicationes adimplendas idonei.

Idèò nunquam, aut rarissimè syrupi magistrales alterantes præscribuntur; sed soli officinales usurpantur, idque dupliciter, vel enim in aliis liquoribus dissolvuntur; vel soli per se exhibentur.

Quomodo in aliis liquoribus dissolvantur, supra monstratum est in apozemate, potione, & julepo.

Sed præterea dissolvi solent nonnulli syrupi cum aqua communi, vel pitana, ad restinguendam sitim. Tales sunt syrupus capill. ven. de limonibus, cydoniorum in alvi fluxu, & hac formula præscribi solent. *R. Syrupi, verbi gratia, capill. ven. ʒ. iv. utatur cum aqua potabili, suis tempore, extra pastum.*

Soli & per se exhibentur in affectibus ventriculi & pulmonum. Possin à in imbecillitate ventriculi frequentissimus est syrupus de absynthio, qui manè per se exhibetur hac formula. *ʒ. syrupi de absynthio ʒ. j. capiat manè dualis horis ante pastum, continuando per triduum.*

In affectibus pulmonum bechici syrupi præscribuntur hac formula. *R. Syrupi de tussilag. verbi gratia ʒ. iv. utatur frequenter ex cochleari, sensim lambendo.*

## CAPUT VII.

### De Syrupo Purgante Magistrali.

**S**yrupus magistralis eodem modo componitur, quo Apozemia purgans, & ex eadem materia, parique simplicium alterantium dosi. Purgantia verò dupla ferè apozematis quantitate præscribuntur, cum suis correctivis, dupla etiam dosi.

Interdum efficacissimi componuntur syrupi ex succis herbarum & fructuum depuratis, quibus purgantia infunduntur & decoquantur, & illi succi ad ʒ. iv. v. vel vj. præscribi debent: quòd decoctione & infusione cathartico- rum plurimùm absumantur.

Decoctione fieri solet ad ʒ. j. vel ʒ. i. ʒ.

Et in ea dissolvitur saccharum, quantitate circiter decocto pari.

Interdum syrupi dissolvuntur purgantes, vel alterantes, a ʒ. v. vel vj. & tunc sacchari quantitas minuta præscribitur; ad syrupi quantitatem proportionata, quia syrupus pro saccharo habetur.

Aliquando succi dissolvuntur ad ʒ. vj. vel vij. quando ex aqua simplici facta fuit decoctione, & tunc nulli syrupi dissolvi debent, sed solum saccharum.

Nonnunquam in affectibus pulmonum frigidis mellis portio saccharo conjungitur; sed valdè rarò. Postea coquitur in syrupum, qui in usum asservatur.

Dosis est ab ʒ. j. ʒ. ad ʒ. ij. pro majore vel minore syrupi efficacia, idque semel, aut bis in mense.

Sumitur tandem cum jusculo, herbis convenientibus alterato, vel à melancholicis cum fero lactis, aut decocto florum & fructuum cordialium.

Quæ omnia hac formula præscribi solent. *R. &c. fiat decoctio ad ʒ. j. in qua dissolve sacchari albilissimi ʒ. j. fiat syrupus perfectè coctus, clarificatus, & aromatizatus cum ʒ. ij. verbi gratia, cinamomi, qui fructur in vase vitreo, de quo caviat ʒ. j. ʒ. vel ʒ. ij. bis in mense, cum Jusculo, foliis, verbi gratia, borraginis, buglossi, capill. ven. & scabiosæ alterato.*

Si ex succis fiat syrupus, hac formula præscribitur. *ʒ. Succorum depuratorum, &c. in quibus decoque folia fennæ, &c.*

## CAPUT VIII.

### De Vomitoriis.

**V**omitoriorum compositio tam varia & multiplex est, ut vix certas eorum componendorum regulas proponere valeamus; sed variæ eorum formulæ ex variis authoribus sunt mutuandæ. Præcipuæ tamen sequentes esse solent, quæ ex triplici vomitoriorum genere, scilicet mitiorum, mediocrium, & vehementiorum desumuntur.

Mitiora fieri solent ex aquæ tepidæ ʒ. vij. cum olei vel butyri ʒ. ij. vel ex aquæ hordei tepidæ, aut jusculi valde pinguis bono haustu.

Vel ex radicis peponis ʒ. ij. contusæ & infusæ in ʒ. viij. aquæ hordei, vel hydromelitis.

Vel ex decoctione sem. atriplic. ʒ. . florum anethi P. j. ad ʒ. viij. dissolvendo oxymel. simpl. vel syrupi acet. ʒ. ij.

Ufus horum omnium hac formula præscribitur. *ʒ. &c. Fiat vomitorium quod sumatur tepide: deinde post paucam deambulationem indatur digitus in fauces; aut penna oleo intincta vomitus proritetur.*

Mediocria fieri possunt ex radicis raphani ʒ. j. agarici ʒ. ʒ. coctis in ʒ. x. aquæ hordei, addendo oxymel. scillit. ʒ. ij. si crassa pituita luxuriet, vel syrupi acetosi simpl. ʒ. bilis exsuperet.

Vel ex radicis afari ʒ. ij. sem. urticæ ʒ. ʒ. flor. genistæ p. ʒ. coctis in ʒ. viij. hydromelitis.

Vel ex radicis afari pulverati ʒ. ʒ. in aqua hyssopi, aut menthæ dissoluta, vel ex foliis Afari infusis.

Vehementia fiunt ex vitrioli albi præparati ʒ. ʒ. aut ʒ. ij. in jusculo dissoluti: vel ex croco metallorum, (quod *hepar antimonii* appellant quidam) infuso in vini albi, vel aquæ cardui benedicti ʒ. iij. cum paucis cinamomo.

## CAPUT IX.

### De Emulsione.

**E**mulsio fit ex amygdalis dulcibus excorticatis ad ʒ. i. ʒ. j. ʒ. b. quatuor feminum frigidorum majorum ʒ. ʒ. vel ʒ. j. feminum lactucæ & papaveris albi, ubi adiunt vigiliæ, ʒ. ʒ. contunduntur omnia & dissolvuntur cum aquæ hordei ʒ. ʒ. pro iij. dosibus, & dulcorantur vel saccharo solo ad ʒ. iij. vel iv. aut syrupis gravioribus, ut violaceo & capillorum veneris.

Formula autem præscribendi talis est, *ʒ. &c. contundantur in mortario marmoreo sensim affundendo aquæ hordei ʒ. j. ʒ. in colatura dissolve syrupi violacei, & capillor. Ven. ana ʒ. ij. si ut emulsio pro ʒ. dosibus, manè & fero sumendis.*

Interdum nuclei pinei prædictis adduntur, in affectibus thoracis.

Aliquando decocto hordei additur aquæ rosarum ʒ. j. quæ suaviorem reddit emulsionem.

## CAPUT X.

### De Lacte.

**L**ac exhibetur phthificis, & febre hectica consumptis: reliquis præstat alimen- tum, ubi refrigerandum & detergendum; caprillum verò, ubi nutriendum & reficiendum.

Præscribitur illius usus per mensem integrum, mense Majo præsertim, corpore prius purgato, & exhibetur prima die ad ʒ. iv. cum sacchari rosacei ʒ. j. augendo singulis diebus ʒ. j. donec ad ʒ. viij. perveneris, sacchari quantitatem proportionaliter augendo ad ʒ. ij. in eadem quantitate postmodum persistendo.

Hora assumendi est matutina, quatuor horis ante cibum, quibus neque dormiat, nec sese vehementius commoveat æger.

Formula autem, qua præscribitur, talis esse potest: *Utatur lacte asinino, recentior ab ubere extracto, per mensem integrum: sumendo prima die ʒ. iv. sacchari ʒ. j. augendo singulis diebus lactis quantitatem ad ʒ. j. donec perveneris ad ʒ. viij. ubi postmodum subsistat, eademque assumat quantitatem quotidie manè,*



manè, quatuor horis ante cibum, quibus neque dormiat, nec sese vehementius commoveat.

## CAPUT XI.

## De Scro Lactis.

**S**erum lactis præscribitur etiam verno tempore, per quindecim dies, aut mensem integrum.

In eo macerantur per noctem herbæ refrigerantes, ut fumaria, cichorium, acetosa, ad M. j. ℥. vel frequenter epithymum in melancholicis, ad ℥. ℥. in quo casu etiam dissolutum interdum succus pomorum redolentium, ad ℥. j.

Dosis est ℥. viij. vel ℥. j. manè, quatuor horis ante pastum.

Tali autem formula præscribitur. ℥. Scri lactis q. s. bulliat leviter & coletur, & in ejus libra una macerentur per noctem sol. &c. coletur manè addendo sacchari albi ℥. i. capiat manè quatuor horis ante pastum singulis diebus, continuando per mensem integrum. Vid. Rod. Castrenf.

## CAPUT XII.

## De Decoctionis Sudorificis.

**D**ecocta sudorifica vulgò componi solent ex quatuor illis præcipuis sudorificis, ligno guaiaco, fassafra, radicibus Chinæ, & salsæ parillæ, ex quibus diætæ tam sudorificæ quàm simplices instituuntur.

Quantitas sudorificorum præscribitur ad ℥. iiij. vel vj. eaque unius tantum, vel duorum Mensium, pro varia ægrotantis dispositione; hac perpetua observatione, ut guaiacum in frigidioribus naturis; radix chinæ, in calidioribus magis conveniat.

Postea infunduntur in ea aquæ fontis quantitate, ut pro singulis unciiis sudorifici, sint totidem aquæ libræ. Infusio autem fit per viginti quatuor horas supra cineres calidos, ac tandem decoquantur ad mediæ partis consumptionem.

Dosis decocti est ℥. viij. manè, corpus tegendo plus solito, ut facilius sudores eliciantur.

Formula verò præscribendi, talis esse potest. ℥. v. g. Rasure ligni guaiaci ℥. iiij. corticis ejusdem ℥. ij. infundantur per horas viginti quatuor in ℥. vj. aquæ fontis, supra cineres calidos coquantur in vase duplici, lento igne & sine fumo, ad mediæ partis consumptionem, coletur per manicam Hippocratis, colatura servetur in vase vitreo, de qua capiat ℥. viij. singulis diebus manè, corpus tegendo plus solito, ut excutiantur sudores, continuando per viginti aut triginta dierum spatium.

Aliquando in delicatioribus dulcoratur sacchari ℥. iij. vel iiij. cinamomi ℥. ij.

Totum illud tempus, quo æger decocto sudorifico utitur, Diætæ appellatur: propterea quòd victus observetur valdè exquisitus, attenuans & exsiccans, & pro potu ordinario præscribatur decoctum secundarium, ex prioris residentia paratum, quod etiam Bochetum appellatur.

Illa autem residentia vel sumitur sola, vel ut efficacior decoctio evadat, additur sudorifici recentis ℥. j. Infunditur per horas octo in ℥. xij. aquæ fontis, coquitur ad quartæ partis consumptionem, dulcoratur, & aromatizatur hac formula. ℥. Residentiam prædictæ decoctionis, infundatur in ℥. xij. aquæ fontis supra cineres calidos per octo horarum spatium, coquatur ad quartæ partis consumptionem, coletur per manicam Hippocratis, addendo sacchari & cinamomi q. s. ad saporis gratiam. Fiat Bochetum, quo utatur pro potu ordinario toto diætæ tempore, utendo interea pane biscocto & anisato, carnibus assis & non elixis, aviculis montanis, garyophyllis, aut cinnamomo transfixis, passulis, amygdalis torrefactis, nucleis, pincis, &c.

Si diætæ simplex instituenda sit, in qua potiones sudorificæ non exhibentur, sed victus tantum exsiccans cum usu bocheti præscribitur, componitur bochetum ex ℥. ij. sudorifici, infusi & decocti in ℥. xij. aquæ fontis, & reliqua eodem modo præstando, ut in decocto ex residentia, hac formula. R. v. g. Radicis chinæ in tabellas divise ℥. ij. infundantur per horas xij. in ℥. xij. &c. fiat bochetum, quo utatur pro potu ordinario æger per spatium viginti vel

triginta dierum, utendo interea pane biscocto.

Interdum etiam decoctum secundarium eodem modo paratur ex recentis sudorifici ℥. ij. rejecta residentia prioris decoctionis, cujus virtus est ferè deperdita.

In omni diætæ sudorifica hoc observandum. Alvum perpetuò ferè esse adstrictam quæ laxanda est quarto quæque die, injecto clystere emolliente. Ac propterea quia per sudores tenuior tantum materia vacuatur, crassior verò remanet; ideò consultissimum erit octavo quoque die purgans medicamentum exhibere, abstinendo tunc temporis ab usu potionis sudorificæ.

## CAPUT XIII.

## De Decocto Galli Veteris.

**U**surpatur non rarò hujusmodi decoctum in morbis chronicis, ut melancholia hypochondriaca, asthma, obstructionibus diuturnis.

Et duplex parari solet: alterans scilicet & purgans.

Alterans componitur ex materia eadem, quæ fuit proposita in apozemate alterante, & præterea adduntur sudorifica, ad ℥. ij.

Maximè tamen differunt præscribendi modo; nam in hoc decocto sudorifica, semina, & fructus prius præscribuntur, iisque venter galli veteris impletur: postea verò radices, folia, & flores in decocto adduntur, hac formula. ℥. Radicis chinæ, v. g. ℥. ij. seminum, &c. contundenda contundantur, & misceantur omnia simul, iisque impleatur venter galli veteris eviscerati, & antequam juguletur, cursu & verberibus fatigati, fiat decoctio in sufficienti quantitate aquæ fontis, vel quando sunt obstructiones, in tribus aquæ partibus, & in una vini albi, addendo radicem, &c. florum, &c. Coquantur, donec galli caro ab ossibus separetur, coletur decoctum, & fortiter exprimat, serveturque in vase vitreo, in loco frigido, omni pinguedine detracta: de quo capiat ℥. viij. omni manè per multos dies.

Purgans eodem modo præscribitur, addendo prædictis purgantia simplicia, eadem dosi, qua in apozemate purgante: & illa misceantur iis, quibus venter galli impletur. Vulgò autem in hoc decocto præscribi solent senna, polypodium, carthamum, epithymum, agaricus, turbitum.

Formula hujus decocti talis, ℥. &c. coquantur donec galli caro ab ossibus separetur: de colatura cape ℥. ij. quæ serventur in vase vitreo in loco frigido, omni pinguedine detracta: de quibus capiat. ℥. ℥. manè per quatuordecim, singulis mensibus repetendo.

## CAPUT XIV.

## De Jusculis.

**J**uscula duplicia sunt: alterantia, & purgantia.

Alterantia fiunt ex herbis convenientibus, cum pullo gallinaceo, vel jusculo communi: ita ut herbarum sint manipuli iiij. vel iiij.

Omnium vulgarissima sunt juscula refrigerantia, in febribus biliosis, & calidis hepatis intemperiebus, hac formula. ℥. fol. &c. coquantur cum pullo gallinaceo, & fiat jusculum, quod capiat manè, continuando per 8. vel 9. dies.

Fiunt etiam interdum in affectibus calidis pectoris, ex thoracis simplicibus, cum pullo decoctis, quarta tantum parte, apozemata thoracis, quibus additur rad. Chinæ ad ℥. j. antea alia simplicia præscribenda. Sape etiam usurpantur juscula aperientia ex radicibus, herbis & semin. aperientibus, dicta quantitate cum jusculo communi semiconfecto decoctis.

Juscula Restaurantia conficiuntur ex capone pingui exenterato & in frustula conciso, qui ponitur sine ullo liquore in ollam vitream accuratè clausam & lutatam, ne quid exspiret: idem coquitur in balneo Mariæ ad putrilaginem. Exprimitur succus, è quo pinguedo separatur, servaturque in vase vitreo, & loco frigido ad usum.

Nonnunquam jusculi singulis libris adduntur succi cardiaci ℥. ij. vel iiij. sacchari tantundem. Eo utitur æger per se, vel cum jusculo.

Juscu-



# Cap. XV. & XVI. De Bolo & Opiata, &c. 155

Jusculi hujus restaurantis formula peculiaris non ponitur, propterea quod ab iis, qui ægro ministrant, parari soleat, & Medici illius componendi modum verbo tenus tantum docere sint affueri.

## CAPUT XV.

### De Bolo.

**B**Olus duplex est: *purgans*, & *corroborans*.

*Purgans* fit interdum ex cassia sola ad ʒ. i. qui lenitivus tantum est.

Vel ex cassiæ ʒ. β. cum alterius opiatae purgantis ʒ. ii. iii. vel ʒ. β.

Vel ex opiatibus purgantibus, una vel pluribus, ad ʒ. β. ʒ. vi. ʒ. i.

Vel ex opiatibus & electuariis purgantibus, ea proportionem, ut perpetuo major opiatae quantitas quam electuarii, & omnia simul ʒ. i. quantitatem nunquam excedant.

Formula omnium illorum talis est: R. v. g. *Cassiae recentius extracta*, &c. cum *saccharo fiat bolus*, quem cap. mane cum *syrupo capill. vcn.* vel alio convenienti. & palato grato.

Interdum fiunt boli ex terebinthina ad ʒ. β. vel ʒ. vi. ad renes detergendos. Ea vero abluuntur vino albo, aut aqua aliqua aperiente. Formula talis est: ℞. *Terebinth. Venetæ*, &c. *fiant boli*, qui *nebulis irroborantur*, & in *cochleari cum syrupo capill. devorantur mane 4. aut 5. horis ante prandium*, continuando per triduum.

*Bolus corroborans* fit ex conservæ alicujus ʒ. iij. vel ʒ. β. confect. β. vel ʒ. ij. pulveris ʒ. j. hac formula, ℞. &c. cum *saccharo fiat bolus*, quem capiat mane, dualis horis ante prandium.

Præscribi solet passim bolus corroborans, post die purgationis, ad ventriculum, aliasque partes roborandas, quæ purgatione molestiam subierunt.

## CAPUT XVI.

### De Opiatis.

**O**piata duplex est: *purgans*, & *corroborans*.

*Purgans* componitur ex opiatibus purgantibus officinalibus, electuariis purgantibus, pulveribus simplicium purgantium, & syrupo purgante idoneo hac proportionem, ut pro singulis opiatae ʒ. ij. sint electuarii ʒ. ij. vel iij. pulveris simplicis purgantis ʒ. j.

Interdum fit tantum ex opiatibus & electuariis, pulveribus simplicibus omisiss.

Alias ex opiatibus & pulveribus simplicibus tantum; electuariis omisiss.

Alias ex opiatibus solis.

Frequenter etiam, ubi benignior efficienda est opiata, cassiæ portio opiatibus permiscetur, vel solis, vel enim electuariis & pulveribus permixtis.

Quantitas vero opiatae totius, ʒ. iij. non excedat.

Dosis vero ab ʒ. β. ad ʒ. j. per se in forma boli, vel cum decocto herbarum appropriatarum, semel in hebdom. vel bis in mense.

Formula autem præscribendi talis est, ℞. &c. cum *syrupo rosato solut.* v. g. *fiat opiata*, de qua capiat ʒ. β. v. g. *per se*, vel *dissolvendo in decocto* borraginis, fumariæ, & cichorii, *semel in septim. cum custod. & regimine artis.*

*Roborans* opiata componitur ex conservis ad ʒ. j. ʒ. j. β. condituris ad ʒ. β. ʒ. j. confectioibus ad ʒ. ij. ʒ. β. pulveribus ad ʒ. iij. ʒ. β. ʒ. vi. cum syrupo idoneo.

Interdum ad ornatum permiscuntur foliola auri N. ij. vel iij. post pulveres præscribuntur. Dosis ij. vel ʒ. iij. aut quod frequentius, ad magnitudinem castaneæ, superbibendo liquorem convenientem, ut aquam stillatidiam appropriatam, vel vinum album, vel vinum rubrum dilutum.

Quæ omnia hac forma præscribi solent, ℞. &c. cum *syrupo*, &c. *fiat opiata*, de qua capiat magnitudinem castaneæ singulis diebus mane, duabus horis ante prandium, superhausto vini diluti momento: vel superbibendo parum aquæ borraginis, verbi gratia.

Laz. Riverii Opera.

Interdum præscribi solet assumenda duabus horis ante coenam, si horis matutinis aliquod aliud remedium sit assumptum.

## CAPUT XVII.

### De Conditis.

**C**onditum eodem modo fit, quo Opiata corroborans, eadem scil. conservarum, confectio, & pulverum quantitate, addendo sacchari albi, vel rosacei ad pondus omnium, hac formula ℞. *Conservarum*, &c. *sacchari rosacei*, ad pondus omnium. *Fiat conditum auro coopertum*, quo utatur frequenter, per se, ex cochleari, vel dissolvendo in jusculis, vel cum aqua potabili, sitis tempore, extra pastum.

In hoc tamen differt conditum ab opiata, quod hæc ad omnes partes præcipuas corroborandas, vel etiam alterandas præscribatur; illud vero ad cordis & pulmonum affectus tantum usurpetur.

## CAPUT XVIII.

### De Eclegmate, seu Looch.

**E**clegmata solis affectibus Thoracis conveniunt, ad humorem in pulmone contentum expectorandum, asperitates leniendas, & hæmoptysin compescendam.

Fiunt passim ex pulveribus bechicis ad ʒ. iij. ʒ. β. sacchari canti, vel penidati, vel rosati tabulari ad ʒ. vj. ʒ. j. syrupi convenientis, q. s.

Vel prædictis addi solent frequenter pulpæ fructuum, scil. passularum, ficuum, vel jujubarum, ad ʒ. β.

Multis etiam aliis modis eclegmata parari solent; sed minus usitate, quæ tamen apud Authores varios videri possunt. Sequenti vero formula præscribuntur. ℞. &c. cum *syrupo*, &c. *fiat looch*, quo utatur frequenter cum baculo liquiritiæ, sensim lambendo.

## CAPUT XIX.

### De Tabellis.

**T**abellæ duplices sunt: *purgantes*, & *corroborantes*.

*Purgantes* in officinis habentur, & nunquam, aut rarissime magistrales præscribuntur.

*Roborantes* fiunt ex pulveris simplicis aut compositi ʒ. β. ʒ. vj. sacchari in aqua appropriata dissoluti ʒ. iij. vel vj. hac formula: ℞. &c. *Fiant tabellæ ponderis ʒ. ij. quarum unam capiat singulis diebus*, duabus horis ante pastum, superbibendo, &c. eodem modo ac in opiata corroborante.

Fiunt etiam frequenter tabellæ ad affectus pulmon. ex pulver. appropriatis, eadem methodo.

## CAPUT XX.

### De Pilulis.

**P**ilulæ duplices sunt: *Officinales* & *magistrales*.

*Officinales* passim præscribuntur in affectibus frigidis præsertim, & hyemis tempore, ad partes à ventriculo remotas vacuandas.

Formula eas præscribendi talis est, ℞. *massæ pilul.* &c. *malaxentur cum*, &c. (aqua vel syrupo idoneo) *formantur pilulæ*, vj. vel vij. *de aurata*, quas capiat post primum somnum.

Si pilulæ infirmiores videantur, adduntur diacridii, vel trochis. alhandal. gr. iij. vel v.

*Magistrales*, quæ à Medicis ad varias indicationes frequenter componi solent, usuales etiam vulgò nuncupantur, quia earum usus frequens esse debet, nempe semel in septimana, vel bis in mense.

Componitur ex variis purgantibus, nempe Senna, agarico, turbith, hermod. rhab. diacrydio, trochiscis alhandal, cum correctivis, omnibus in pulverem redactis, & syrupo convenienti exceptis.

Omnium harum pilularum perpetuo ferè aloë basis esse solet, & præscribitur ferè ad ʒ. iij. vel ʒ. β. reliqua vero purgantia simul



# 156 Institut. Med. Lib V. Pars II. Sect. II. Art. II.

simul sumpta, 3. ℔. quantitatem non excedant : correctiva verò ad 3. j. ℔. syrupi quantitas non definitur. Dosis pilularum metienda est pro purgantium efficacia, ita ut non admodum vehementer purgent, & à 3. ℔. ij. non excedant.

Interdum ad obstructions purgantibus admiscetur gummi ammoniacum vel dellium, aceto dissoluta, ad 3. ij. vel 3. iij.

Hac autem formula præscribi solent. *℥. aloës, hepaticæ, &c. fiat omnium pulvis, & cum syrupo, v. gr. Rosar. solut. fiat massa pilularum, ex cuius 3. ij. formenur pilule vj. deauratæ, capiat num. iij. vel iij. manè duabus horis ante prandium semel in septimana* (Præstant maximè Marocostinæ, & Francofurt. 3. ℔. pondere.)

## CAPUT XXI.

### De Trochiscis.

**T**rochisci rarò præscribuntur à Medicis, quia officinalibus sunt contenti. Si quis tamen componere voluerit, id facile præstabit : sumendo pulveres suæ intentioni aptos, ad 3. j. vel ij. eosque excipiendo liquore convenienti aut mucilagine, ex quibus permixtis fiat pasta, & ex illa orbiculi, in umbra exsiccandi, v. gr. Trochisci Gordonii in Gonorrhœa.

## CAPUT XXII.

### De Pulveribus.

**P**ulveres ad purgandum, corroborandum, & alias intentiones præscribi solent.

Purgantes ex simplicibus gravioribus gustui, cum correctivis & saccharo, in delicatioribus : quorum dosis erit metienda pro purgantium efficacia.

Sumuntur verò illi pulveres, cum jusculo vel alio liquore dissoluti, manè cum custodia & regimine.

Inter pulveres roborantes frequentissimi sunt stomachici, qui vulgo *digestivi* appellantur. Fiuntque ex stomachicis suavioribus, ut coriandro, aniso, fœniculo, cinamomo & similibus ad 3. ij. cum sacchari æquali vel dupla quantitate, hac formula *℥. &c. ad pondus omnium duplum : Misce, fiat pulvis, de quo capiat cochlear unum post singulos pastus, nihil insuper edendo vel bibendo.*

## SECTIONIS SECUNDÆ

### ARTICULUS SECUNDUS.

#### De Compositione Medicamentorum Mediorum.

## CAPUT PRIMUM.

### De suppositoriis.

**S**uppositoria ad alvum laxandam vulgo usurpantur : interdum verò, licet valde rarò, ad quosdam ani & recti intestini affectus.

Alvum laxantia componi solent ex melle ad 3. j. cocto & indurato, additis pulveribus idoneis ad 3. j. vel 3. iij. Pulveres autem illi sunt sal commune, hiera picra, vel ubi fortius est agendum, sal gemmeum, ammoniacum, hiera diacolocynth. helleborus pulveratus.

Formula eorum talis est. *℥. &c. Fiant suppositoria, quorum unum oleo vel butyro illitum immittatur in anum, quoties opus videbitur. His add. globul. sacchar.*

## CAPUT II.

### De Clystere.

**C**lysteres alii sunt mollientes & laxantes, alii detergentes, alii adstringentes, alii anodynii, & ad alias intentiones parati.

Mollientes & laxantes fiunt ex decocto herbarum emollientium, ad ℥. j. opiatas laxantibus ad 3. j. ℔. interdum melle, melle mercuriali, rosaceo, aut violaceo, ad 3. ij. oleo liliorum communi aut violaceo, ad 3. iij. sale communi, aut gemmeo, ad 3. ij.

Quia decoctum emolliens in officinis paratum haberi solet, ideo nunquam ferè præscribitur, sed absolute enuntiatur.

Hujus ergo clysteris formula erit. *℥. Decocti communis emollientis clysteris, ℥. j. in quo dissolve, &c. Misce : fiat clyster, qui injiciatur hora commodæ.*

Detergens clyster componitur ex decoctione hordei, surfuris macri, & rosar. rubr. singulor. pugillo uno. Si simul leniendum sit, flores chamomillæ ex meliloti præscribuntur, ad p. j. vel ij. Si verò lumbrici sint eliciendi in pueris, adduntur passulæ & liquiritia, ad 3. j. singulorum.

Quantitas decoctionis clysteris non excedat ℥. j. & in ea dissolvatur saccharum rubrum ad 3. ij. vel cum eo mel rosaceum, diminuta sacchari dosi. Dissolvatur etiam vitellus ovi N. j. pro pueris, duo verò pro adultis.

Pueris etiam decocti quantitas minuitur à ℥. 6. ad quartaria iij.

Adstringentes clysteres fiunt ex decoctione simplicium adstringentium, dosi apozematis paulò minori, & in decocti ℥. j. dissolvuntur saccharum, mel rosaceum, & vitelli ovorum dosi prædicta.

Anodynii clysteres fiunt ex lacte caprillo, aut ovillo, vel decocto capitis & intestinorum vervecis ad ℔. j. dissolvendo saccharum & vitellos ovorum dicta quantitate.

Interdum in gravissimis doloribus intestincrum, aut partium adjacentium, renum v. gr. etiam dissolvitur Philonium Romanum ad 3. j. vel ij. aut laudanum opiatum ad gr. v. aut vi.

Fiunt etiam aliquando clysteres nutritives ex jusculo, saccharo, & vitellis ovorum : quibus interdum ad corroborandum dissolvitur confect. Alkerm. aut de hyacinth. ad 3. ij.

Ad colicum dolorem præscribuntur clysteres carminantes, ex decocto simplicium flatus discutientium, qualia sunt quæ pituitam attenuant, eodem modo, ut diximus in adstringente ; dissolvendo in decocto oleum rutaceum, laurinum, ad 3. iij. Vel fiunt clysteres ad eundem scopum ex vini generosi & olei nucum, utriusque ℔. 6.

Ad calculum renum expellendum fiunt clysteres ex decocto simplicium aperientium, dissolvendo olea aperientia ad 3. iij. vel iij. quorum præcipuum est oleum scorpionum : additur etiam terebinthina, vitello ovi dissoluta, ad 3. j.

## CAPUT III.

### De Injectionibus.

**I**njectiones in varias partes fieri solent, uterum, vesicam, aures, & alias partium cavitates, natura vel morbo factas, ut fistulas, & similes.

In uterum fiunt injectiones ad menses movendos,ordes detergendas, dolorem & inflammationem sedandam, & multas alias intentiones.

Fiunt autem hujusmodi injectiones decocto simplicium idoneorum, dosi apozematis paulò minore. Fit decoctio ad ℔. j. quæ frequenter in uterum injicienda per syringam, quam *metrenchytam* vulgò appellant.

Vel fiunt tales injectiones ex succis herbarum depuratis, vel ex aquis stillatitiis.

Et non rarò prædictis liquoribus quædam dissolvuntur, ut syrupi, electuaria, trochisci, pulveres, & similia.

Reliquæ verò injectiones eadem ferè methodo præscribuntur : quæ tamen, sicut & prædictæ, quia sunt particularia remedia, ex praxi particulari erunt mutuandæ.

## CAPUT IV.

### De Pessariis.

**P**essaria ad varios uteri affectus in illius cervicem immittuntur, & intricatioris longiorisque digiti figuram efforman-



efformantur: nonnunquam tamen instar globuli effinguntur pro virginibus, ut facilius ab iis admittantur, & *nasalia* appellantur. Fiunt autem pessaria. *Primò*, vel ex unguentis aut opiatis solis, ad  $\mathfrak{z}$ . j.  $\mathfrak{b}$ .  $\mathfrak{z}$ . ij. stupis mollioribus exceptis, & panno serico vel lineo involutis. *Secundò*, vel ex pulveribus idoneis ad  $\mathfrak{z}$ . j.  $\mathfrak{z}$ . ij. melle cocto exceptis, instar suppositorii, unde pessarium efformatur. *Tertiò*, vel ex succis herbarum cotone exceptis, quibus pulveres pro arbitrio possunt admisceri ad  $\mathfrak{z}$ .  $\mathfrak{b}$ .  $\mathfrak{z}$ . vj.

Hac denique formula præscribi solent.  $\mathcal{L}$ . &c. *Fiat pessarium magnitudine digiti crassioris, quod panno serico involutum, & filo alligatum, in uteri cervicem immittatur.*

## CAPUT V.

### De Errhinis.

**E**rrhinum est medicamentum liquidum, quod naribus attractum, humores à cerebro, pituitam potissimum evacuat, & ad multos etiam narium affectus usurpatur.

Componitur ex succis herbarum errhinarum, qui extrahuntur ex fol. contusis Milii, cum vini albi  $\mathfrak{z}$ . iij. vj. vel viij. His ad correctionem folia cephalica adduntur, ac aquæ vitæ nonnunquam ad penetrandum.  $\mathfrak{z}$ . j.

Vel ex decocto simplicium idoneorum, dosi dimidia apozematis, ad  $\mathfrak{z}$ . viij. in quo dissolvuntur interdum succi ad  $\mathfrak{z}$ . ij. vel iij. mel. aut syrupus ad  $\mathfrak{z}$ . j. vel ij. pulveres ad  $\mathfrak{z}$ .  $\mathfrak{b}$ . vel  $\mathfrak{z}$ . j. Hac verò formula præscribi solet.  $\mathcal{L}$ . &c. *Fiat errhinum, quo utatur t-pide mane, duabus horis ante pastum, ore prius aqua repleto.*

## CAPUT VI.

### De Sternutatoriis.

**E**st etiam sternutatorium, ad pituitam è cerebro eliciendam, & cerebri sopitam facultatem expultricem irritandam, in affectibus comatosi.

Componitur ex pulveribus rerum acrium, quales sunt piper, pyrethrum, semen sinapi, staphisagriæ semen, radix hellebori albi, euphorbium, tabacum.

Quantitas horum omnium,  $\mathfrak{z}$ . ij. non excedat, quibus addere poteris, ad cerebri defensionem, majoranæ siccæ  $\mathfrak{z}$ . j.

Adverte, euphorbium esse vehementissimum nec ultra gran. iij. iij. esse præscribendum, aceto correctum.

Formula præscribendi talis est.  $\mathcal{L}$ . &c. *Misce, fiat pulvis tenuissimus, qui pennula suffletur in nares.*

## CAPUT VII.

### De Gargarisnate.

**G**argarisma fit ad varios oris & partium ei adjacentium affectus.

Componitur ex decoctione simplicium, dosi apozematis, ad  $\mathfrak{lb}$ . j. in qua dissolvuntur syrupi convenientes ad  $\mathfrak{z}$  iij. vel iij. Quia verò frequentissimè parantur gargarismata adstringentia ad fluxiones repellendas; ideò usitatissimè in eis dissolvuntur diamorum, dianucum, syrupus, myrthinus, & de rosis siccis: non raro etiam mel rosaceum, ubi detergendum.

Fit etiam interdum ex aquis stillatitiis ad  $\mathfrak{lb}$ . j. dissolvendo in iis syropos prædictos.

Hac denique formula præscribitur:  $\mathcal{R}$ . &c. *Fiat gargarisma, quo utatur omni hora.*

## CAPUT VIII.

### De Masticatoriis.

**M**asticatoriis etiam pituita è cerebro copiosè attrahitur.

Fiunt autem ex rad. pyrethri sola, in frustula incisa, & in aceto macerata.

Vel ex multorum simplicium pulveribus, cera excep-

tis, ut inde globuli conficiantur. Illa autem simplicia magis usitata sunt, ad pyrethri, zinziberis, iridis sem. sinapi, staphisagriæ, piper longum, mastiche, quibus adduntur cephalica, caryophylli, nux moschata.

Pulveris quantitas non excedat  $\mathfrak{z}$ .  $\mathfrak{b}$ . ceræ quantitas non definitur.

Formula præscribendi talis est.  $\mathcal{L}$ . &c. *fiat omnium pulvis, qui cera alba excipiatur, fiantque plures globi li. Masticetur unus manè, prono capite, frequenter spuendo.*

## CAPUT IX.

### De Collyriis.

**C**ollyria pluribus formis componi solent; scil. vel liquoris forma, vel linimenti, vel cataplasmatibus.

Usitatissima tamen sunt liquida, quæ verè & propriè collyria appellantur.

Componuntur ex aqua stillatitia ad  $\mathfrak{z}$ . iij. vel iij. cui admiscetur pulvis conveniens, v.g. turhia præparata, trochisci albi Rhasis, antimonium lotum, sarcocolla in lacte muliebri nutrita, &c.  $\mathfrak{z}$ . j. vel  $\mathfrak{z}$ . j.  $\mathfrak{b}$ .

Interdum succi permiscuntur, vel albumen ovi agatum, ad  $\mathfrak{z}$ . j. vel ij.

Formula præscribendi talis est.  $\mathcal{L}$ . &c. *Fiat collyrium, quod insilleitur oculis, manè & serò.*

Reliquæ collyriorum formulæ ex praxi peculiari sunt desumendæ: propterea quod exquisitum remediorum delectum & exactam præparationem ac dosin desiderant, ob eximium partis sensum.

## SECTIONIS SECUNDÆ

### ARTICULUS TERTIUS.

#### De Compositione Medicamentorum Externorum.

## CAPUT PRIMUM.

### De Epithemate.

**E**pithema cordi & hepati potissimum admoventur solet, ad partes illas alterandas & corroborandas.

Et duplex est: liquidum & solidum.

Liquidum fit ex aquis stillatitiis, ad  $\mathfrak{z}$ . viij. vel  $\mathfrak{lb}$ . j. succis fructuum v.g. limonum, granatorum, pomor. redolent. ad  $\mathfrak{z}$  ij. vel iij. aceti rosacei ad  $\mathfrak{z}$ . j. aut  $\mathfrak{z}$ . j.  $\mathfrak{b}$ . pulverum cardiacorum, ad  $\mathfrak{z}$ . ij. vel iij. *Nota*, quando præscribuntur succi acidi limonum, vel granatorum, non esse opus aceto.

*Nota* etiam, in epithemate cordis, si pulmones sint peculiariter affecti, acida non esse præscribenda, quia sunt pectori noxia.

Item in epithemate hepatis majorem quantitatem succorum acidorum vel aceti esse præscribendam, quàm in epithemate cordis.

Interdum præter pulveres cardiacos permiscuntur confectiones cardiacæ, alkermes, vel de hyacintho, ad  $\mathfrak{z}$ . j. vel ij. trochisci de caphura, in epithemate refrigerante, ad  $\mathfrak{z}$ .  $\mathfrak{b}$ . Crocus, in calefaciente, ad gr. v.

Formula præscribendi talis est.  $\mathcal{R}$ . &c. *Fiat Epithema liquidum, applicandum regioni cordis tepidè, frequenter, cum pannis scarlatinis, hoc liquore imbutis & expressis.*

Solidum cordi tantum admoventur, & componitur ex confervis cardiacis, ad  $\mathfrak{z}$ . iij. confectionibus, ad  $\mathfrak{z}$ .  $\mathfrak{b}$ . pulveribus, ad  $\mathfrak{z}$ . j.  $\mathfrak{b}$ . aut  $\mathfrak{z}$ . ij. cum aqua cardiaca convenienti.

Formula illius talis est.  $\mathcal{R}$ . &c. cum aqua rosarum v.g. *Fiat Epithema solidum, applicandum regioni cordis, cum panno scarlatino.*

Solidum hoc Epithema solum non rarò præscribitur, ubi major roborandi, quàm alterandi necessitas apparet. At verò liquidum nunquam usurpatur, quin post usum



# 158 Instit. Med. Lib. V. Pars. II. Sect. II. Art. III.

illius solidum statim admoveatur : ideo solent Medici in illo casu liquidum & solidum consequenter præscribere , & in fine formulæ addere : *Fiat epithema solidum , applicandum regioni cordis , statim post liquidum.*

Ad epithemata referuntur juniora animalia per medium secta, pulvere cardiaco conspersa, & cordis regioni admota. Illa autem animalia sunt pullus columbinus, vel catellus. Horum verò præscribendorum formula talis est. *Admoveatur regioni cordis pullus columbinus , per medium sectus , & pulvere electuarii diamarg. frigidi sinapizatus.*

Vel *R. pulv. electuarii diamarg. frigidi 3. ij. sinapizetur pullus columbinus per medium sectus regioni cordis applicandus.*

Interdum ea animalia fincipiti raso admoventur , pulvere cephalico conspersa , ad cerebrum corroborandum , v. g. gallina in Phrenitide.

## CAPUT II.

### De Fomento.

**F**otus fit in variis partibus : sed frequentius in latere , ad dolores pleuriticis ; in ventriculo , ad corroborandum ; in hypochondriis , ad solvendas obstructions.

Pro latere fiunt decocta ex simplicibus emollientibus , additis anodynis & resolventibus , quæ omnia dosi apozematis ferè præscribuntur , hac formula , *℞. &c. fiat omnium decoctio , qua foveatur latus dolens calidè frequenter , cum vesica fuilla hoc decocto semiplena.*

Pro ventriculo præscribuntur simplicia stomachica , dosi apozematis minori , quibus adduntur aromata vel cariophylli , nux moschata , spica nardi , satis magna dosi , nempe singulorum 3. ii. iii. vel 3. ʒ. ʒ. *fiat decoctio in æquis partibus aquæ fontis , & vini rubri adstringentis , sub finem additi.* Vel ubi magis adstringendum , loco aquæ fontis , aqua ferrata præscribenda.

Formula hujus talis est. *℞. &c. fiat decoctio in æquis partibus , &c. qua foveatur regio ventriculi calidè , longè à pastu , duobus sacculis prædictis simplicibus semiplenis.*

Pro hypochondriis fiat decoctio ex simplicibus aperientibus , in dosi dicta , admistis quibusdam emollientibus , in æquis partibus aquæ fontis & vini albi , sub finem additi , dummodo calida intemperies non impediatur.

Formula hujus talis est. *℞. &c. fiat decoctio , &c. qua foveantur hypochondria calidè frequenter , cum filtris imbutis & expressis.* Si alterum tantum hypochondrium laboret , præscribendum est , ut foveatur regio hepatis vel lienis , prout hæc vel illa pars fuerit affecta , admixtis in decoctione iis simplicibus , quæ partes illas peculiariter respiciunt.

## CAPUT III.

### De Balneo.

**B**alnea parari solent ad multas intentiones , scil. ad refrigerandum & humectandum , menses movendos , conceptum juvandum , & ad externos affectus , scabiem , & elephantiasin.

Componuntur ex radicibus tribus , quatuor , aut quinque , ad ʒ. i. ʒ. i. ʒ. ʒ. herbis 5. 6. vel 7. singularum fasc. i. feminibus , ad lb. ʒ. ad ʒ. i. fructibus , à ʒ. i. ad ʒ. i. ʒ. floribus ad M. iii. vel iv.

Formula præscribendi est. *℞. &c. fiat decoctio pro balneo , quod ingrediatur tepidè , sine sudore , bis in die , per biduum aut triduum.*

## CAPUT IV.

### De Semicupio.

**S**emicupium nihil aliud est , quàm dimidium balneum , quo immergitur æger umbilico tenus.

Componitur ex iisdem balnei simplicibus dimidia tantum dosi , & sequenti formula præscribitur. *℞. &c. fiat decoctio pro semicupio , cui æger insideat à genibus*

*usque ad umbilicum , manè & vesperi , longe à pastu per biduum aut triduum , vel urgente necessitate , si ad dolores sedandos præscribatur.*

## CAPUT V.

### De Oleis.

**O**lea rarissimè componuntur à Medicis , quia in officinis ad omnes ferè intentiones parata habentur. Si quis tamen olea componendi rationem desideret , ita progrediatur.

Præscribatur primò olei vel communis , vel officinalis , unius vel plurium , v. ʒ. ʒ. simplicium pulverat. 3. i. succi , vini , vel alterius liquoris , ad scopum facientis , 3. ij. vel iij. coquantur ad succorum consumptionem , fortiter exprimantur , fiatque oleum usui reservandum.

Si olea officinalia sola , ( ut frequenter fit ) præscribantur , sive à Medico seorsim componantur ; talis erit formula. *℞. &c. Misce , inungatur talis pars calide , vel tepide , admotis linteis tepidiusculis.*

Vel *℞. &c. Misce , fiat embrocatio supra talem partem , admotis , &c.*

## CAPUT VI.

### De Linimentis.

**L**inimenta vulgò fiunt ex oleis officinalibus , cum axungis , butyro , medullis , aut mucilaginibus , ea proportionem , ut sit oleorum quantitas ad reliqua , dupla unde linimenti consistentia emergit , quæ est media inter oleum & unguentum.

Vel loco butyri , aut axungiarum , cera præscribitur ea quantitate , ut pro olei 3. i. sit ceræ 3. i. Passim tamen ceræ quantitas non definitur , sed præscribitur in fine , ceræ q. f. Interdum pulveres admiscuntur ad 3. ʒ. pro olei 3. i.

Vel denique fit linimentum ex unguentis officinalibus cum oleis , dupla quantitate , additis etiam pulveribus si lubet , proportionem dicta.

Quantitas linimenti præscribitur pro partis affectæ magnitudine , passim tamen ad 3. iv. vel vi.

Formula illius talis est. *℞. &c. fiat linimentum , quo illinatur pars affecta calidè , admotis linteis calidiusculis.*

## CAPUT VII.

### De Unguentis.

**C**omponuntur vulgò unguenta ex oleis , pulveribus & cera , ea proportionem , ut pro olei 3. i. sit pulveris 3. i. vel 3. i. ʒ. ceræ 3. ii. ut plurimum tamen ceræ quantitas non definitur ; sed dicitur q. f.

Quantitas totius massæ pro partis inungendæ magnitudine , & temporis diuturnitate præscribenda est , ad 3. v. vi. vij. Formula verò talis est , *℞. &c. fiat unguentum , quo inungatur pars affecta.*

Frequenter etiam fiunt unguenta efficacissima ex oleis , ad 3. iv. v. vel vi. pulveribus , ad 3. ʒ. ʒ. succis dimidia oleorum quantitate , vel majore : ita ut bulliant ad succorum consumptionem , addendo postea ceræ q. f. vel aliquando unguenti officinalis ad 3. i. ʒ. q. f.

Hujus formula talis est. *℞. &c. bulliant ad succorum consumptionem : expressione facta dissolve ceræ , &c. fiat unguentum , &c. Nota , prædictis unguentis sapissimè misceri pinguedines , medullas , butyrum , & mucilagines , loco olei : gummata verò , ut ammoniacum , bdellium , &c. ceræ locum obtinere.*

Fiunt etiam unguenta ex unguentis officinalibus , ad 3. ij. olei , eadem plus minùs quantitate : pulveribus , ad 3. ij. vel ceræ q. f.

Vel interdum unguentum officinale solum sine ulla additione præscribitur.



duo emplastra ad formam semilunæ, applicanda pon. uram-  
que aurem.

## CAPUT VIII.

### De Emplastris.

**E**mplastra vulgò componuntur ex oleo, pulveribus, & cera, aut iis quæ olei consistentiam ferè habent, ut sunt axungia, medullæ, butyrum, mucilagines; aut iis quæ ceræ naturam referunt, ut gummata, pix, resina.

Horum talis est proportio, ut pro olei ℥. j. sint pulveris s. vj. ceræ ℥. i. s. Quantitas totius massæ eadem, quæ unguenti.

Fiunt etiam emplastra ex emplastris officinalibus ad ℥. j. aut ℥. s. pulveribus, ad ℥. s. vel s. vj. oleo, ad ℥. j. cera, q. f. addendo terebinthinæ parum.

Vel ex folis emplastris officinalibus, quantitate Parti affectæ proportionata.

Formula præscribendi talis est, R. &c. *Fiat emplastrum quod extendatur super alutam, & parti applicetur.*

Nota, figuram emplastri in multis partibus designari ut in sincipite, ad formam literæ T. vel etiam ovalis figuræ: in ventriculi regione, in formam scuti: lienis, ad formam linguæ bovis: uteri, rotundum; renum, quadratum. In aliis partibus non definitur sed dicitur: *Fiat emplastrum magnitudinis debite.*

## CAPUT IX.

### De Cataplasmate.

**C**ataplasma vulgò fit ex radicibus, foliis, seminibus, fructibus, doli Fotus. Hæc decoquuntur in liquore idoneo, postea contunduntur, & trajiciuntur per setaceum addendo pulverem, vel farinarum ℥. ii. iij. vel iij. oleorum, vel axungiarum ℥. iij. vel iij.

Hac autem formula præscribi solent, ℞. &c. *decoquantur omnia, pistentur in mortario marmoreo & per setaceum trajiciantur, addendo, &c. fiat cataplasma, applicetur parti affectæ.*

Sæpillimè post usum fomenti cataplasma admovetur, & ex illius residentia paratur, quando scilicet intentio est emolliendi, resolvendi, &c. hac formula, ℞. *Residentiam prædicti fomenti, contundatur in mortario, &c.*

Interdum fit ex fructibus sub cineribus coctis, ut in alvi fluxu & dysenteria, ex cydoniis coctis sub cineribus, N. iij. vel iij. pro eorum magnitudine, vel certius ad ℥. j. ℥. j. s. contusis & trajectis, addendo pulveres adstringentes, dosi dicta, & tantillam vini rubri, si lubet.

Fit etiam in alvi fluxu ex crusta panis in vino macerata ad ℥. s. aut quartar. iij. cui adduntur pulveres roborantes & adstringentes ad s. j. vel ij.

Vel ad dolorem sedandum in inflammationibus fit cataplasma de mica panis, vulgò dictum, ex mica panis albi, in lacte macerata ad ℥. s. vitellis ovorum duobus, & croci s. j. nonnunquam olei rosacei q. f.

## CAPUT X.

### De Vescatorio.

**V**escitorium duplex est: officinale, & magistrale.

In officinis habetur emplastrum vescitorium, quod frequentissimè præscribitur à Medicis hac formula. ℞. *Massæ emplastri v. sicatorii ℥. i. vel ℥. i. s. extendatur supra alutam, fiat emplastrum magnitudinis dimidiæ volæ manus, applicandum posteriori parti cervicis, vel alteri parti, si opus videbitur.*

Magistrale præscribitur ex fermenti acrioris ℥. i. cantharidum pulveratarum s. ij. cum aceto rosaceo, fiat cataplasma vescitorium.

Interdum ad affectus oculorum vel dentium applicantur vescitoria ponè aures, in formam Semilunæ, hac formula. ℞. *Massæ emplastri vescicatorii ℥. i. formentur*

## CAPUT XI.

### De Sacculis.

**S**acculi duabus potissimum intentionibus præscribi solent: vel scilicet ad humorem frigidum, crassum, & impactum in aliqua parte resolvendum, ut in capite frequenter per diætas sudorificas tales sacculi adhibentur, post assumptam sudorificam potionem, vel ad roborandum cor præsertim & ventriculum.

*Resolventes* sacculi fiunt ut plurimum ex milio ad ℥. i. sale communi ad ℥. s. seminibus discutientibus, aut anisi, fœniculi, fœnugræci, baccis lauri ad ℥. s. ℥. iij.

Illi autem hac formula præscribuntur: R. &c. *torrefiant in sartagine, sensim affundendo vini generosi, q. f. includantur duobus sacculis, qui vicissim applicentur, aqua vitæ prius irrorati.*

*Roborantes* fiunt ex pulveribus radicum, lignorum, corticum & aromatum, ad ℥. ij. ℥. iij. s. quibus aliquando pulvis cyprius aut violaceus adjungitur, ad ℥. s. item moschus, ambra, ad grana iij. v. s. s.

Hac autem formula præscribi solent, ℞. &c. *Fiat omnium pulvis, qui excipiatur cotone moschato, & cum panno serico rubro interpuncto fiat sacculus, qui collo appensus gestetur supra regionem cordis, stomachi.*

## CAPUT XII.

### De Cucupha.

**S**acculos roborantes amulatur cucupha, cerebro roborando & calefaciendo dicata.

Fit ex cephalicis magis odoratis radicibus ad ℥. i. foliis ad M. ij. vel iij. floribus ad P. ij. vel iij. aromatis ad ℥. s. quibus addi possunt pulvis violaceus & cyprius, ad ℥. s. storax benzoinum ad s. i. vel ij. moschatus ad s. . .

Formula autem talis est, ℞. &c. *Fiat pulvis, qui excipiatur cotone moschato, & cum panno sericeo interpuncto fiat cucupha, supra caput gestanda vel pileo assuenda.*

Interdum duæ præscribuntur cucupha, una interdiu, altera de nocte gestanda. Et tunc pulveris quantitas est duplicanda, atque ita præscribuntur: *Fiant duæ cucupha quarum unam pileo assuat, alteram de nocte gestet.*

## CAPUT XIII.

### De Frontali.

**A**dmovetur frequenter frontale, ad capitis dolorem sedandum, & somnum conciliandum, ex seminibus quatuor frigid. major. lactuc. & apav. albi, ad s. s. aut s. vii. floribus rosar. violar. & nymphaeæ ad p. iij. adduntur sæpè ad robur grana chern es, ad s. s. vel pulvis trium santalor. ad s. i. interdum florum chamom. & meliloti ana p. s. qui dolorem sedant, nec valdè calefaciunt.

Formula horum talis est: R. &c. *Fiat omnium pulvis crassior, qui includatur ductus pannis lineis, & vapore aceti irroratus fronti applicetur hora somni.*

Fit etiam frontale forma humida, quod ad oxyrrhordini naturam accedit, & intentius refrigerat, ac somnum conciliat in phrenitide & febribus ardentibus, aut diuturnis vigiliis.

Componitur ex unguento populeone ad ℥. i. oleo rosaceo ad ℥. s. parte dimidia albuminis unius ovi, addendo parum aceti rosacei, hac formula, R. &c. *agitantur omnia simul, excipiantur stuppis cannabinis, ac fronti applicentur duobus lineis inclusa.*

Aliquando adduntur conservæ rosarum, violarum, &c. ad ℥. s. aut s. vi.





# PRAXEOS MEDICÆ LIBER PRIMUS.

## DE AFFECTIBUS CAPITIS.

### PRÆFATIO.



N capitis affectuum serie illos tantum comprehendimus, qui cerebri substantiam aut meninges occupant. Licet enim oculi, aures lingua, dentes, gingivæ, fauces, & columella, capitis constitutionem ingrediantur: earum tamen partium affectus, clarioris doctrinæ gratia, separatis libris exponere visum est, & cerebri ac meningum morbos, capitis affectuum non ine, per excellentiam insignire. Illi autem affectus ex cerebri actionum læsionibus erunt desumendi, quæ quidem actiones sensum & motum respiciunt; tum etiam actiones naturales, quæ ad illius nutritionem spectant. Sensus verò dividuntur in internos, & externos. Interni principes actiones comprehendunt; imaginationem, ratiocinationem, & memoriam; tum etiam somnum & vigiliam. Ad quarum functionum symptomata referuntur phrenitis, mania, melancholia, coma, lethargus, carus, apoplexia, catochus, & coma vigil. Sensus verò externi quinque vulgò statuuntur: visus, auditus, olfactus, gustus, & tactus. Quia tamen quatuor prioribus partes peculiares, tanquam propria eorum organa, destinatae sunt, quæ varios patiuntur morbos, in propriis libris explicandos; ideo in hoc libro symptomata tantum exponemus, quæ sensum tactus respiciunt; quandoquidem illa à cerebro affecto, vel illius membranis immediate procedunt: & vel paralyfin in sensu tactus abolito, aut imminuto; vel dolorem capitis in depravato respiciunt. Motus autem voluntarii læsiones reperiuntur in convulsione, epilepsia, paralyfi, apoplexia, vertigine, tremore. Denique affectus, ad actiones cerebri naturales spectantes, vel in intemperie consistunt, vel in excretorum vitio, quo catarrhus generatur. Nos omnes illos affectus ad propria capita reducimus, eo tamen ordine, qui ad therapeiam instituendam magis conveniens est. Atque ita primum frigidam cerebri intemperiem, mox omnes affectus, qui ab illa oriuntur, subjungimus, quia eorum curationis fundamentum ab illius curatione desumi debet: Postmodum verò affectus à calida intemperie, & calidis humoribus oriundos exponimus. Quæ omnia in singulorum capitum perlustratione clarius apparebunt.

### CAPUT PRIMUM.

#### *De Frigida Cerebri Intemperie.*

Omnes intemperies vulgò dividuntur in pathologia in simplices & compositas, materiales & immateriales. Simples raro inveniuntur, tum etiam immateriales; nec nisi à causis procataceticis produciuntur: & vel sponte, vel levissimis remediis evanescunt. Materiales verò, omnes capitis affectus produciunt: illarum ideo tractationi sedulo

incumbendum est; quod tamen seorsim paucissimi auctores præstiterunt, propterea quod in expositione affectuum, qui ab illis intemperiebus produciuntur, earum etiam explicatio sufficienter proponatur. Nos itaque eorum vestigiis inherentes, calidæ cerebri intemperiei, tum etiam humidæ & siccæ theoriam, ad affectuum, qui ab iis produciuntur, tractationes, remittimus. Sed quia maximus capitis affectuum numerus à frigida & pituitosa cerebri intemperie dependet; operæ pretium censuimus, illius theoriam in hujus tractationis limine seorsim proponere, ut postmodum illius curatio sit veluti basis curationum omnium, quæ dictis affectibus erunt adscribendæ, & remedia, quæ eorum causæ debebuntur, ex hoc capite depromi valeant: atque ita inanis eorum repetitio, (qua omnes propemodum practici Medicinæ scriptores laborare solent, & inde sua volumina inutiliter augere, artemque difficiliorem, ac magis tyronibus laboriosam atque tædiosam reddere,) à nobis evitetur.

Frigida igitur cerebri intemperies composita, & cum materia conjuncta, ut plurimum pituitosa est: quia cerebrum est metropolis pituitæ, & frigiditas diu durans sibi accersit humiditatem. Quamvis enim interdum humori melancholico copulata sit, raro tamen ille humor in cerebro gignitur, quemadmodum pituita, sed in hypochondriis ut plurimum cumulatur, & ad cerebrum transmittitur, in eoque gravissima symptomata producit.

Causæ frigida ac pituitosa cerebri intemperaturæ sunt alimenta frigida & humida, quæ facili in pituitam abeunt, tum etiam, dum coquuntur. Ventriculum & hepar refrigerando, faciunt ut multam pituitam producant, quæ postmodum magna copia ad cerebrum transmittitur.

Nimia alimentorum, non solum frigidorum, sed etiam laudabilium quantitas: quæ calorem nativum obruit, & cruditates gignit.

Cibi assumpti statim à somno, vel ante somnum, vel antequam priores sint concocti: ex iis enim cruditates plurimæ oriuntur, quæ materiam pituitosam cerebro suppeditant.

Omissa naturalis consuetudo pituitam evacuandi per vomitum, aut secessum, vel artificialis per medicamenta purgantia, diuretica, sudorifica, vel frequentes exercitationes.

Ortus ex parentibus frigida cerebri intemperie laborantibus.

Ætas senilis, quæ propter caloris inopiam multam generat pituitam, tum quoque puerilis, propter ingluviem & incautam victus rationem.

Regio frigida & humida: quales sunt, quæ stagnis paludibus, aut majoribus fluminibus sunt vicinæ, ac boreæ, nivibus, imbribusque expositæ, & quæ sunt magis septentrionales.

Somni longi, & præsertim à cibo.

Vita sedentaria, otiosa, sine curis, studio, mœrore, aut cum his valde excedentibus, quia calorem nativum dissipando, præcipue in cerebro, illud refrigerant.

Ad has causas etiam referri potest hepar calidum & humidum, quod multos vapores transmittit ad cerebrum,



rebrum, qui in eo concrefcunt, & in materiam pituitofam abeunt.

Signa frigida: intemperaturæ cerebri defumuntur tum à caufis fupra pofitis, quarum præfentia intemperiei hujus magnam conjecturam faciet, tum præcipuè ab effectibus, qui ut figillatim examinari queant, à fuis fontibus illos mutuabimur, nempe ab actionibus, paffionibus, excrementis, & habitu corporis.

Actiones animales, frigidam cerebri intemperiem indicantes, funt mens torpida & hebes, ingenium tardum & obtufum, infelix memoria; maxima ad fomnum propenfio, & fomni longiores ac profundiores, nifi catarrhus, dolor capitis, aut animi pathemata obfliterint.

Infomnia frigoris, aquarum nempe, pluviarum, nivium, fluminum, flagnorum, marium, & rerum albarum.

Sensuum omnium inertia & hebetudo.

Motus tarditas, fed in eo duratio, qua fpiritus craffiores minùs diffolvuntur.

Paffiones frigidam cerebri intemperiem indicantes, funt morbi frigidi, ut paralyfis, lethargus, catarrhus & alii quamplurimi: quibus fi æger antea obnoxius fuerit, eum hac intemperie laborare conjiciendum eft.

Idipfum confirmabit, fi æger cœlo fereno, & in calida & ficca aëris constitutione melius habeat: in frigida verò & humida, hyemali nempe, pluviofa & aufrina, pejùs.

Excrementa pituitofa, per os & nares frequenter & copiofe rejecta, manifefiffimè humoris pituitofi redundantiam in cerebro oftendunt.

Ex habitu corporis defumuntur figna tam generalia, quàm fpecialia hujus intemperiei.

Generalia ex toto habitu corporis defumuntur. Si enim totus corporis habitus frigidus fit & humidus, cerebrum procul dubio, omnium corporis partium frigidiffimum & humidiffimum, tale futurum eft.

Cutis ergò ad tactum frigida, mollis, lævis & alba, totius corporis habitus mollis & obefus, non autem carnofus, & venarum anguftia, frigidam temperiem significant.

Signa fpecialia, frigidam cerebri temperiem indicantia, in capite confiderantur, ut funt faciei pallor, venarum carentia in oculis: capilli molles, læves, ac tenues ab initio, tardè orientes, deinde rufi ac minimè crifpi, ac tota vitâ fine calvitie perfeverantes; à frigore externo capitis facilis læfio, à calefacientibus juvamentum.

Quod ad prognofin attinet, hæc intemperies curatu difficilis eft, fæpe graviffimos capitis affectus producit. Quæ à longo tempore contracta eft, difficilius curatur; quæ à nativitate nunquam; tum etiam quæ eft hæreditaria, & quæ in corpore fenfibile reperitur, fi per longum tempus illud obfederit. Tempus hybernium huic curationi idoneum non eft, æftate verò melius curatio fuccedit.

Curatio duabus indicationibus perficitur, nimirù pituitæ redundantis evacuatione, & ipfius intemperiei per contraria correptione. Quibus indicationibus debet fatisfieri triplici inftrumento, diætetico, chirurgico, & pharmaceutico.

Diætâ calefaciens & exficcans inflituenda eft. Ac primum eligatur aër purus, ad calidum & ficcum vergens, qui tamen in caliditate non multum excedat; humores enim in capite contentos fundere ac liquare poffet, ficque catarrhos, aliosque affectus producere; quod fæpe contingit iis, qui fub Solis radiis morantur, vel caput ad ignè calefaciunt. In ficcitate verò non poteft nimium excedere modò in activis qualitatibus fit temperatus; ad calidum magis tamen, quàm ad frigidum defleat. Cubiculum, in quo æger degere confuevit, non anguftum fit, nec deprefum, nec humefcens, aut aliquo fitu obductum; fed pervium & perflatum, ficcioribus ventis expositum. Temporibus humidis, nebulofis, ac frigidis, alterari interdum poterit aër cubiculi herbis calidis ac odoratis, pavimento ftratis: ut falviâ, majoranâ, lavendulâ, roremarino, thymo, ferpillo, vel etiam iisdem in ignem conjectis, aut etiam lignis ficcioribus accenfis, ac præcipuè Juniperino. Ignis autem fit luculentus, qui aërem conclavis fufficienter exficcet. Suffitus in ædibus excitati, nifi admodum graves funt, ficcando abfumendoque humiditatem, non parum conferre poffunt. In eorum tamen ufu cautio magna ad-

Lazar. Riverii Opera.

hibenda eft, tum ut moderatiffimi excitentur. Si enim nimii funt, quofcunque homines offendunt, & humores fundendo, graves catarrhos excitant. Tum etiam, ut patientis constitutio advertatur: nonnullorum enim capita tam facile replètur, & à fuffitibus alterantur, ut quilibet odor capitis dolorem indicat: Suffitus temperatus & utilis parabitur ex fuccino puriore, cujus tenuia ramenta carbonibus erunt injicienda. Minus gravis eft, & optimè ficcat roboratque, cerebrũ fuffitus ex Indico fuccino, quod *gummi animæ* nominatur, vel magis cõpofitus ita præfcribi poterit.

℥. Ligni aloës & benzoini, ana 3. ii. ftyracis calamitæ 3. i. b. thuris & fandaracæ, an. 3. ii. gummi animæ & caryoph. an. 3. 6. Fiat pulvis craffior, fupra prunas injiciendus.

Vitetur aër aufrinus & pluviofus, tum quoque nocturnus & imprimis caput non exponatur radiis lunaribus, qui cerebro mirum in modum funt infenfi. Vitandus eft, quoque aër valdè frigidus & aquilonaris: præcipuè quando fubitò ad eum ab aufrino fit mutatio. Is enim cerebrum, humidis excrementis refertum, non minùs quàm manu comprehenfam madentem fpongiam, exprimit, & in partes fubjectas deturbat.

Secundò alimentorum ratio maximè adhibenda eft: quandoquidem (ut docet Hipp. lib. de natura humana) morbi funt partim à victu, partim à fpiritu cujus attractione vivimus. Itaque cibi funt boni fucci, facilis coctionis, nec frigidi, nec excrementitii. Atque adeò in frequenti ufu erunt carnes vervecinæ, hoedinæ, vitulinæ. Hæ verò præcedunt pulli columbini, gallinacii, capones, gallinæ, perdice, turdi, omne genus avicularum montanarum, & ovorum recentium vitelli, prædictæ carnes magis afllæ, quàm elixæ ufurpentur. Vitentur autem carnes duræ & concoctu difficiles, ut bovinæ, porcina, cervinæ, leporina, anferum, anatum, aliarumque avium aquatilium. Ad hoc genus referuntur capita, inteftina, extrema, & interanea animalium. Pifcium ufus fit rariffimus, iique eligendi, qui carnem habent folidam friabilem; in rivis rapidè fluentibus, aut juxta faxa viventes, faxatiles ideò dicti, in vino præcipuè decocti, addendo acetum, butyrum, & aromata, quorum ufus etiam in aliis cibis concedendus eft, nifi calida hepatis intemperies contra indicet. Ex his præcipuè funt nux mofch. macis, caryophylli, cinamomum. Herbarum refrigerantium & humectantium, ut lactucæ, portulacæ, spinachiæ, nullus aut rariffimus fit ufus. Æftivo tamen tempore earum, quæ mediocriter refrigerando ficcare aliquantulum, & membri robur addere maffæque fanguinis, quo minùs evaporet, firmitudinem qualemcunque conciliare valeant, mediocris ufus concedi poteft. Tales funt endivia, cichorium, acetofa, quæ tamè coctæ, non crudæ ufurpandæ funt. Conveniunt autem radices petrofelini, dauci, apii & pafinacæ; folia menthæ, hyffopi, nafurtii. Vitanda quoque omnia quæ facile caput tentant, illudque replent. Ea verò duorum funt generũ. Unum eorum, quæ acrimoniâ fua humores fundunt, ut cepæ, allium, finapi, eruca, raphanus. Alterum eorum, quas craffis vaporibus caput replere folent, ut lac & lacticia omnia, & legumina. Ex quibus tamen minùs nocent cicera rubra, propter eximiam aperiendi & detergendi vim, quæ prædita funt. Ideò concedentur præcipuè jufcula eorum. Fructus omnes recentes, & præcipuè fugaces, multa aquea humiditate præditi, ut frequens cruditatum materia, vitandi. In bellariis fructus ficciores ufurpari poterunt, ut paffulæ, amygdalæ, nuclei pinei, dactyli, & fimiles, quorum tamen ufus parvus effe debet, quia majori ex parte difficilè concoquuntur. Pyra cocta faccharo contexta, vel conditura corticis citri, limonis, aurantii, in fine menfæ ufurpari poterunt. Sed multò utilis erit pulveris digeffivi cochlear unum fumere poft pafum, cujus vapor aromaticus, & cerebro amicus, cum alimentorũ vaporibus furfum elevatur, ficque cerebrũ roborat & exficcat. Parabitur ex coriandro, fœniculo, anifo, cinamomo, nuce mofchata, cum dupla quantitate facchari rofacei. Panis ex optima tritici farina conflatus, fit bene coctus & fermentatus, cui etiam aliquid falis & anifi aut carvi utiliter addi poterit. In majori intemperie bifeoctus erit utilior. Potus fit vinum tenue, ac oligophorum, quod caput vaporibus non replet.



replet, & aqua multa dilutum. Tum etiam valde confert, per horam ante pastum, vinum aquæ miscere, ut illius vapores infringantur; nec non coriandri tantillum in aqua decoquere, quo vis roborandi cerebrum & ventriculum ipsi conciliabitur. In graviore affectu, si vinum etiam cum prædictis cautionibus usurpatum, suspectum esse videatur, illius loco hydromel tenue subrogari poterit. Hoc autem in omni cibatione semper observandum, ut cibi moderata quantitate sumantur, & coena sit levior prandio. Sobrietas, ut in omnium morborum curatione & præcautione magni momenti est, sic præcipue in omnibus capitis affectibus maximè commendatur. A plurimo enim ingesto alimento caput vaporibus & humoribus repletur, & contra ab ejusdem penuriâ plurimum inanitur.

Tertiò, corporis exercitatio moderata esse debet, & singulis diebus, quantum fieri poterit, continuari. Otium enim, & quies corporis nimia, calorem nativum debilitant, ac torpidum reddunt, ita ut coctiones suas non ritè peragat, & corpus excrementis repleat. Contra verò motus & exercitatio calorem nativum suscitant, concoctiones adjuvant, excrementa discutunt, spiritus purificant & exhilarant. Debet autem fieri exercitatio ante singulos pastus: & utilius est, à pastu per aliquot horas quiescere, aut saltem non valdè concitato motu corpus movere.

Quartò in somno & vigilia modus adhibendus est. Ut enim somno mediocri reficiuntur vires: ita longiore torpescit corpus, refrigeratur, & oneratur excrementitiis humoribus, præcipue verò cerebrum. Nimia verò vigilia corpus extenuat, spiritus absunt, & quod in corpore sanum est, depascitur. Somnus itaque longior non sit: is tamen metiendus pro consuetudine, & rebus incidentibus. Vulgò septem horis determinatur. Quod spatium produci vel abbreviari potest, præ ægrotantis ætate vel consuetudine. Si in alterutro peccetur, præstat in vigilia immodica, quam in superfluo somno delinquere. Non statim à coena somno indulgendum est, sed duabus saltem horis interjectis, in quibus levis deambulatio prodest. Capite altiore & in alterutrum latus dormiendum. Supinus decubitus improbatur.

Quintò, omnium corporis partium excrementa suis temporibus sunt evacuanda: cerebri potissimum. Atque adeò quotidie manè screando è palato, emungendo è naribus, peccinando, & linteo aspero vel spongia caput confricando, è futuris cerebri superfluitates evocandæ. Alvus libera & mollis servanda est: & si sponte non obediât, glande vel enemate sollicitanda, vel etiam interdum levia medicamenta purgantia per os exhibenda, v. g. pilulæ Francos. aut Marocos. ad ʒ.β. Non solum enim alvi excrementa istis auxiliis evocantur; sed etiam paulatim & successe revellitur aliquid à capite: aut saltem retinetur, derivaturque, quod eò, tanquam ad partem imbecilliorē, amandabatur.

Denique animi affectuum maxima ratio habenda est: utpotè à quibus corpus nostrum mirum in modum alteratur, & de sede sua dejicitur. Inter cæteros maximè cavendæ sunt tristitia & ira. Illa calorem nativum imminuit, & spiritus conterit; unde concoctiones infelicitè obeuntur, & multus fit excrementorum proventus: hæc verò magnam sanguinis ebullitionem, & spirituum agitationem efficit; unde humores funduntur, liquantur, commoventur, & si quæ pituitosa excrementa in cerebro fuerint, affatim in partes debiles infirmasque præcipitantur, quæ gravissimos affectus parere consueverunt.

Reliqua duo instrumenta medica, nempe chirurgia & pharmacia, hujus affectus curationi in sequentem modum aptari poterunt.

Generalis evacuatio, in omnibus serè morbis humoralibus fieri solet venæ sectione & purgatione.

Sanguinis evacuatio ratione pituitæ consentanea non est. Sitamen in reliquo corpore sanguinis abundet, hepar sit calidius, ætas florens aut consilens, eum detrudere convenit. Sic enim vaporum ad caput effusio impeditur, & superfluum alimentum demitur, ut natura postea, quidquid crudum & pituitosum in sanguine est, facilius concoquat; & purgantia medicamenta tutius postea usur-

pari valeant.

At verò, nisi plethora vehementer urgeat, melius erit venæ sectioni præmittere potionem phlegmagogam, bolus, pilulas aut pulverem. Quorum formulæ tales esse poterunt.

℥. Sennæ mundat. ʒ. β. sem. anisi & caryophyll. ana ʒ.β. fol. menthæ & betonicæ, ana M.β. summitatum thym. P.β. Coquantur ad ʒ.iiii. Incolat. infunde agarici recenter trochiscati ʒ.ii. cinamomi ʒ. β. In expresso dissolve diaphœn. ʒ.iii. syrapi rosat. ʒ. i. Fiat potio, quæ detur cum regimine. Vel

℥. Catholici duplicati, & diaphœn. ana ʒ.β. Cum saccharo fiat bolus. Cui potest etiam addi electuar. diacarth. ad ʒ. i. vel iii. detrahendo partem diaphœn. tum etiam catholicum pro arbitrio detrahi, & bolus ex diacarthamo & diaphœnico componi poterit. Vel

℥. Massæ pilular. cochiar. min. ʒ. ii. Malaxentur cum aqua betonicæ. Formentur pilulæ x. vel xi. deauratæ, quas capiat summo mane, præcedente levi coena.

Pilulæ de agarico, & cochiar. majores, huic etiam usui accommodari poterunt. Vel

℥. Sennæ mundat. turbith. hermodactyl. ana ʒ. i. diagyridii gr. v. caryophyll. n. i. Fiat pulvis, qui detur cum iusculo.

Post venæ sectionem, si quidem necessaria fuerit; aut eâ omisâ, si minus utilis videatur, statim ad humoris præparationem & purgationem veniendum est, quod fiet apozemate sequenti.

℥. Rad. cyperi, ireos Florent. angelicæ, zedoariæ, & enulæ campanæ. ana ʒ. i. fol. beton. majoran. melissæ, pullegii, origani, calamethi, ana M. i. summitatum thymi & salviæ, ana M. β. sem. anisi, seseleos, & fœniculi, ana ʒ.iii. liquiritiæ rasæ, & passularum mundat. ana ʒ. i. sennæ mundatæ, aquâ vitæ irroratæ ʒ. ii. sem. carthami contusi, & polypod. querc. recentis, ana ʒ. i. agarici recenter trochiscati, turbith. hermodactyl. ana ʒ. iii. zingiberis & caryoph. ana ʒ. i. flor. floechados, anihos. salviæ, & lavendulæ, ana P. i. Coquantur ad ʒ. i. β. In colatura dissolve sacchari albi ʒ. iv. Fiat apozema, clarif. & aromatizata ʒ. ii. cinam. electi pro iv. dosibus matutinis.

In prima & ult. dosi dissolve electuarii diacarthami vel diaphœnici ʒ. iii. Capiat cum regimine.

Vel si nihil addatur ultimæ dosi, postridie illius pilulæ purgantes exhiberi poterunt, quales supra descriptæ sunt.

Post purgationem, ut cerebrum alteretur & roboretur, & purgantium noxa corrigatur, capiat æger bolus sequentem.

℥. Theriacæ veter. ʒ. i. conservæ anthos & rosarum, ana ʒ. ii. Cum saccharo fiat bolus, quem capiat manè duabus horis ante pastum, superhausto vini diluti momento.

Quia verò malum hoc sæpe pertinax est, & generosis etiam remediis non semper cedit, ad potentiora præsidia confugere necesse est. Ac primum, corpore purgato, diætâ sudorifica instituenda est, quæ cerebrum & totum corpus calefacit & exsiccât, crudos humores concoquit, crassos attenuat, viscidos incidit, lentos abstergit, & quidquid aquosum est, per urinam educit ac per sudores aut insensibilem transpirationem discutit. Ad quæ omnia multum etiam facit tenuior illa victus ratio, quæ tempore diætæ adhiberi solet.

Illâ autem diætâ componi poterit vel ex decocto guaiaci, solius, vel addendo lignum sassafras, aut radicem sassa-parillæ, aut etiam cephalica specifica, prout videbitur Medico prudenti, varias corporum dispositiones, variæque temperamenta sedulo contemplanti. Quorum etiam respectu longiorem aut breviorē illius usum imperat, v. g. per xv. xx. vel xxx. dierum spatium.

Decoctum verò sudorificum in hunc aut similem modum componi poterit.

℥. Rafuræ ligni guaiaci & radix sassa-parillæ, ana ʒ. ii. Infundatur per 24. horas in ʒ. iv. aquæ fontis, supra cineres calidos. Bulliant lento ligue: & sine fumo, ad mediæ partis consumptionem. Colentur per manicam Hippocratis. Colatura servetur in vase vitreo, de qua capiat ʒ. β. calidè mane, corpus tegendo plus solito, ut excitentur sudores.

℥. Radic.



℞ Radic. falsæ parillæ ʒ. ii. Infundantur per horas xii. in ℥. xii. aquæ fontis. Bulliant ad quartæ partis consumptionem. Colentur per manicam Hippocratis, addendo coriandri & liquiritiæ, vel sacchari & cinamomi, quantum satis ad saporis gratiam. Fiat bochetum, quo utatur pro potu ordinario, toto diætæ tempore, utendo interea pane biscocto & anisato, carnibus assis, & non elixis, amygdalis torrefactis, passulis, nucleis pineis, prunis cum saccharo coctis, & similibus.

In usu decocti sudorifici hoc perpetuo observandum est, ut semel in septimana purgans aliquod medicamentum propinetur, omiffa eâ die potione sudorifica. Quandoquidem per sudores tenuior humorum portio tantum educitur, remanente crassiore, quæ per alvum expurganda est. Præterea, quia ut plurimum in usu diætæ alvus constringitur, clyster tertio aut quarto quoque die injiciendus.

Si adhuc pluribus machinis morbus iste oppugnandus videatur, durante diætâ, sacculi sequentes capiti admoveberi poterunt.

℞ Sem. anisi, fœniculi, baccarum lauri contus. ana ʒ. iii. milii ℥. i. salis communis ℥. ʒ. Torresiant omnia in sartagine, sensim affundendo vini generosi quantum satis. Iisque impleantur duo sacculi, qui applicentur sincipiti raso, calidè, per vices, post assumptam potionem sudorificam.

Deterfio sudore, emplastrum caput roborans capiti admoveatur, in sequentem modum compositum.

℞ Succini pellucidi, thuris, mastiches, ana ʒ. i. ʒ. galbani, opoponacis, ana ʒ. i. visci quercini ʒ. ii. sem. pœoniæ maris ʒ. ʒ. olei nucis moschat. q. s. Fiat ex omnibus massa emplastri, quæ extendatur super alutam in formam ovalem, & applicetur sincipiti raso, post deterfionem sudorem.

Vel admoveberi potest emplastrum caput roborans, quod in officinis Monspel. Pharmacopœorum habetur, licet in dispensatoriis non reperiatur; cujus descriptio talis est.

℞ Storacis, benzoini, ladani, ana ʒ. iv. rad. pœoniæ, ireos Flor. visci quercini, mastiches ana ʒ. i. styracis liquidæ q. s. Fiat emplastri massa de cujus ʒ. i. fiat emplastrum ovalis figuræ, applicandum futuræ coronali

Si verò emplastrum magis attrahens & resolvens habere cupias, quod epispasticum vulgò nominatur, in hunc modum parari poterit.

℞ Massæ emplastri de mucilag. ʒ. ii. rad. ireos florent. hermodact. pyrethri, sem. staphisagriæ, cubearum, stercoris columbini, & sem. sinapi, ana ʒ. i. nucis moschat. caryophyl. cinam. piperis longi & nigri, ana ʒ. ʒ. styracis liquidæ q. s. Fiat massa emplastri, cujus portio extendatur super alutam in formam ovalem, & sincipiti applicetur.

Post universales evacuationes, particulares etiam commodè usurpari poterunt: quæ fiunt per errhina, sternutatoria, & apophlegmatismos quorum formulæ in hunc modum componi poterunt.

℞ Fol. majoranæ, salviæ, & betonicæ, ana M. i. Terantur in mortario marmoreo, sensim affundendo aquæ betonicæ & vini albi, ana ʒ. ii. Exprimatur succus & fiat errhinum, quod paulò acrius efficietur, si rad. ireos ʒ. ʒ. prædictis adjiciatur.

Usus hodie invaluit, folia nicotianæ sicca & digitis contrita in nares immittere, vel pulverem eorum naribus attrahere, sicque parata facillè errhinum habetur, quo magna humoris copia è cerebro elicitur.

Sternutatoria verò sic parari poterunt.

℞ Fol. majoranæ, salviæ, & rorismarini siccorum, ana ʒ. ʒ. rad. pyrethri & hellebori albi; ana ʒ. i. moschi grana iii. Fiat pulvis, qui pennæ tubulo suffletur in nares. Vel

℞ Radic. zinziberis & ireos Florent. ana ʒ. i. castorei ʒ. ʒ. euphorbii gr. vi. Fiat sternutatorium. Præstantissimum sternutatorium fit ex helleboro nigro, cum parte æquali sacchari canti in subtilissimum pulverem redacti. Quod etiam ad catarrhi curationem plurimum confert.

Apophlegmatismi componuntur in formam masticatorii, vel gargarismatis. Masticatorium ita parari poterit.

℞ Rad. pyrethri ʒ. ii. sem. sinapi, staphisagriæ, ana ʒ. i. Excipiantur cerâ albâ, & formentur globuli, quorum unus masticeatur, prono capite mane continuò spuenndo.

Lazar. Riverii Opera.

In vulgari usu habetur radix ireos Florentinæ masticata, quæ in levioribus affectibus potest sufficere. Mitior adhuc est mastiche sola, quæ humorem attrahit ad os citra illius calefactionem: quod reliqua præstant.

Gargarisma verò in hunc modum erit præscribendum.

Sem. staphis. ʒ. ʒ. sem. sinapi ʒ. iii. rad. pyrethri ʒ. i. Coquantur in hydromelite ad ʒ. vi. in quibus dissolve oxime. scyllit. ʒ. ii. Fiat gargarisma.

In usu tamen horum remediorum hoc observandum est, eam evacuationem, quæ per palatum fit, esse commodiorem, quandoquidem illa à natura cerebri expurgationi simpliciter destinata est. At nasus odoratus & respirationis gratia factus est, eoque natura abutitur, quando humores in cerebro majori copia redundantes, per hanc viam expurgat. Præterea per palatum via securior est, neque eâ excretionem tantopere cerebrum concutitur, quemadmodum illa, quæ fit per nares. Attamen errhina humores potentiùs educunt, quia non solum medicamenti qualitas, aut vapor, ut in apophlegmatismis; sed & ipsa ejus substantia cerebrum stimulat.

Observandum etiam, errhinorum usum esse suspectum dum oculi sunt affecti, vel nares ulceribus obnoxia, vel æger in hæmorrhagiam facillè incidit, aut etiam vertiginem, quam sternutatoria in primis excitare valent, cerebrum vehementiùs concutiendo.

Errhina liquida in nares ex vola manus attrahuntur vel supino corpore naribus infunduntur: ore tamen priùs aqua vel vino repleto, ne liquor per palatum in os influat, quanquam quod sic influit, etiam humores efficaciter per fauces educit.

Apophlegmatismi cautè usurpandi sunt iis, qui fluxioni in pectus, & tabi sunt obnoxii.

Ad particularem etiam capitis evacuationem utiliter adhibentur vesicatoria posteriori parti cervicis, in formam emplastri quod à Pharmacopœis Monspelienfibus compositum habetur, licet in ordinariis dispensatoriis non habeatur. Illius autem formula talis est.

℞ Galbani, ammoniac. ana ʒ. v. pulveris cantharid. ʒ. i. ʒ. sinapi, piperis ana ℥. ʒ. viridis æris, pyrethri, an. ʒ. ii. ʒ. euphorbii ʒ. i. ʒ. ceræ ℥. i. picis, resinæ terebinth. ana quartaria iii. olei parum. Fiat massa emplastri, cujus ʒ. i. vel ii. extenduntur super alutam, & posteriori parti cervicis admoveatur.

Exterius capiti admoventur pulveres & cucufæ, quibus cerebrum roboratur, ejusque calor intenditur, ac humoris reliquiæ discutuntur.

℞ Pulveris ireos Florent. ʒ. ʒ. storacis & benzoini, ana ℥. ii. Fiat pulvis tenuissimus capillis inspergendus in lecti introitu, & manè pectine decutiendus.

Hic pulvis est odore gratissimus, cerebrum roborat, & capillos valde exsiccat, ita ut delicatioribus in usum revocari valeat. Si tamen illius efficaciam intendere volueris, caryophyllos, nucem moschatam, & cinamomum addere licebit.

℞ Flor. stœchados, anthos, & rosar. rub. ana P. ʒ. betonicæ sicca ʒ. ii. sem. coriandri, ligni rhodii, thuris, mastiches, nucis moschatæ, ireos Flor. ana ʒ. i. benzoini, vernicis, macis & caryophyl. ana ʒ. ʒ. (ii) Fiat omnium pulvis, qui excipiatur rasura scarlatæ, vel cotone moschatæ, & cum panno serico rubro fiat cucufa interpuncta, pileo asluenda, vel in formam calantina perpetuò gestanda. Sequenti etiam suffumigio caput nō parū exsiccare poterit.

℞ Ligni aloës, thuris, mastiches, succini pellucidi; santali citrini, rosar. rubr. & fol. betonicæ siccorum, ana ʒ. i. cinamomi, macis, caryophyl. styracis calamitæ, ana ʒ. i. Fiat ex omnibus pulvis crassior, aspergatur super prunas, & sumum hauriat mane, jejuno stomacho, ore & naribus apertis, capite linteo circumvoluto, ne fumus tam facillè exhalet, eoque utatur bis aut ter in septimana.

Vel si à suffumigio dolor capitis excitetur, eo saltem suffumigentur singulis noctibus operimenta capitis. In quem usum potest etiam præscribi sequens paratu facilius.

℞ Thuris, mastiches, styracis calamitæ, benzoini, & sandaracæ, ana ʒ. ʒ. macis caryoph. ana ʒ. ii. Fiat pulvis crassior pro suffitu.



Quia verò huiusmodi intemperies contumacissima est, novumque pituitæ proventum, etiam post universales & particulares evacuationes, solet efficere, usualia etiam remedia præscribenda sunt; quibus per intervalla humor educatur, & in cerebro melior illa dispositio, quæ prædictis remediis inducta est, diutius conservetur. In hunc finem syrupus magistralis componi poterit, ex materia, in apozematis supra propositis, triplicatâ purgantium dosi, quo utetur bis, aut ter in mense ad 3. ii. vel iii. cum decocto betonice & majoranæ.

Vel in locum syrupi, sequentibus pilulis usualibus assuescere poterit.

℞. Aloës optimæ 3. ℔. turbit. gummosi, hermodactyl. & agarici recenter trochiscati, ana 3. ii. diagrydii 3. i. zinziberis & caryophyll. ana 3. ℔. croci & salis gemmei, ana g. vii. Pulverentur omnia, & persundantur succo majoranæ, ac denuò exsiccentur in umbra. Postea excipiantur oxymelite scillitico, & fiat massa pilularum, de qua capiat 3. ℔. vel 3. ii. semel in septimana duabus horis ante prandium.

Postridie syrupi, aut pilularum, etiam bis aut ter in septimana capiat dosin opiatae sequentis.

℞. Conserv. rad. acori, aut zinzib. & cort. citri condit. ana 3. i. conserv. flor. salviæ & rorisim. ana 3. vi. nucis moschatæ condit. 3. ℔. myrobal. condit. N. i. theriacæ veteris & confectionis alkermes, ana 3. iii. pulveris electuarii diambrae & diamoschi dulcis, ana 3. i. Cum syrupo conditurae corticis citri fiat opiata, de qua capiat ad magnitudinem cassaneæ, manè duabus horis ante passum, superbibendo parum vini generosi mediocriter diluti.

Potentius cerebrum roboravit balsamum sequens, cuius guttæ iii. vel iv. per intervalla sumi poterunt, cum vino vel iusculo.

℞. Ol. nucis moschatæ 3. iii. pulv. majoranæ, anthos & carabes, an. 3. ℔. moschi, ambrae griseæ, an. 3. i. Cum sufficienti quantitate olei cranii humani, reducantur ad balsami consistentiam.

Oleum cranii humani huic usui idoneum parabitur ponendo rasuram cranii non humati in retorta cum vini albi s. q. ut digerantur in B. M. per aliquot dies postea distillantur in arena ad siccitatem: prodibit oleum aquæ supernatans.

Hoc balsamo possunt etiam inungi nares interiores horâ somni, ad cerebrum efficaciter roborandum. Aliud tamen balsamum paratu facilius, ad nares saltem interius inungendas, & valde efficax, componi poterit in hunc modum.

℞. Ol. è flor. arantiorum 3. iii. ceræ albæ 3. i. Liqueantur levissimo calore. Deinde adde ol. succini purissimi 3. ℔. olei stillatitii salviæ & rorisinarini, ana gutt. xv. olei spicæ gutt. v. Fiat Balsamum.

Utilissimum etiam erit causticum inurere posteriori parti cervicis, ut materia, quæ in cerebro sensim colligitur, per hanc etiam viam sensim evacuetur.

Denique ad cerebrum exsiccandum atque roborandum efficacissimæ sunt aquæ thermales sulphureæ, nitrosæ ac bituminosæ, quales sunt nostræ Bellilucanæ, & German. Uvisbadenses potissimum. Ex quibus fiunt embrocationes seu irrigationes capitis, per aliquot dies, præmissis vacationibus universalibus. Harum enim usu gravissimos capitis affectus discuti, quotidiana docet experientia.

Utilissimæ etiam erunt aquæ thermales (maximè Emsenses, & Aquisgranenses) in potu usurpatæ, ad roborandum stomachum, qui cerebro maximè compatitur. Ad eundem finem præscribendus erit pulvis digestivus in hunc modum.

℞. Coriandri præpar. 3. i. sem. anisi, fœniculi dulc. ana 3. iii. cinam. & nuc. mosch. ana 3. ii. coralli præpar. rasuræ eboris, & marg. præp. ana 3. i. sacchari rosat. ad pondus omnium, vel pro delicatioribus ad pondus omnium duplum, fiat pulvis, de quo capiat cochl. i. post singulos passus, nihil desuper comedendo, vel bibendo.

xia. Quæ cum plurimum ab iisdem causis oriantur eandem curationem postulant; Ideò unico hoc capite comprehendendi possunt.

Differunt autem inter se quatuor isti affectus, quod in comate, seu cataphora, seu subetha Avicennæ, est quidem somnus profundus; sed à quo æger excitatur, & oculos aperit & respondet, moxque iterum profundè dormit; in lethargo fit somnus comati similis, sed cum febre, & delirio: in caro æger febre careat, ut in comate, sed in eo somnus fit profundior: ita ut ægre excitatus oculos vix aperiat: & non respondeat, sicuti in prædictis; attamen vellitatus sentiat, & integra maneat respiratio: In apoplexia somnus fit profundissimus, & omnimoda sensus & motus privatio, excepta respiratione; atque ita ægri neque oculos aperiant, neque respondeant, neque sentiant, & respirationem habeant difficilem.

Causæ horum affectuum plurimæ assignari possunt.

Prima & potissima est humor pituitosus, vel aquosus, in cerebro præternaturaliter contentus, qui in minori copia cumulat, & cerebri substantiam irrorans ac refrigerans, ejusque meatus insensiles obturans, coma generare solet. Si verò in eadem copia collectus putredinem concipiat, sive in tumorem collectus sit, sive per totam substantiam dispersus, lethargum producit. Quando verò majori copia collectus & sine putredine, & toti propemodum cerebri substantiæ imbibitus, carum efficere consuevit. Ac denique si copia adhuc majori affluens, non solum cerebri substantiam, sed etiam ventriculos oppleat, aut saltem mole cerebri concidente comprimatur & angustetur; nec non principium nervorum, in basi calvariæ à cerebro prodicens, premit, & spiritui animalium transitum præcludat, apoplexiam facit. Consultantur Recentiores hac de re, maxime Schneiderus de Catharris.

Secundò, à sanguine etiam redundante in cerebro soporosi affectus generari solent. Si nimirum nimia copia illius vasis contentus, crudior, serosior, ac frigidior fuerit; spiritus animales condensat, & motus ineptos efficit; tum copia cerebrum gravando, liberum eorum comitatum impedit, ac pro majori vel minori copia, majori vel minori frigiditate, graviolem aut leviolem affectum producit. Sicque tum coma, tum carus, tum apoplexia ab hac causa generari possunt.

A sanguine etiam extravasato, & cerebri ventriculos opplente vel comprimente, affectus soporosi, præsertim apoplexia, generari solent. Id autem contingit, ruptâ vena in cerebro, vel ob plethoram ad vasa, vel ob contusionem capitis insignem, vel etiam ob vulnus, punctum aut cæsum factum, quo venæ in cerebro dividi, multumque sanguinem profundere consueverunt. Sola etiam cranii fractura, cerebrum comprimendo, stuporem ac comatosum affectum producere potest.

Tertiò, à tumore in cerebro genito, & pondere suo gravante, comatosum affectum generari posse, dubium non est. Et hujus rei exemplum refertur à Platero, in Barone quodam observatum, qui longe tempore attonitus & somnolentus, nihil secundum rationem agebat, cibum nec petebat, nec nisi per vim intrusum capiebat, ne lectum nisi coactus accedebat; sed ad mensam tota die, brachio innixus, oculisque clausis, veluti dormiens sedebat, nec nisi interrogatus, sæpiusque admonitus, quicquam & hoc quoque ad rem minime pertinens, respondebat. At post obitum illius, apertâ calvariâ, inventa est in cerebro glandula magna, dura, supra callosum corpus genita, cuius causa esse potuit ictus quem in capite longè ante morbi principium acceperat.

Quartò, vapores immodici ad cerebrum delati, comatosi affectus sympathici causa esse possunt. Si enim copiosi & halituosi sint, spiritus animales aggravant, & veluti caligine suffundunt; quemadmodum nubes in majori mundo Solis radios obtenebrant. Si verò crudiores fuerint, cerebrum adeo humectant, ut languidum ad actiones obundas fiat. Sic ebrii sopore profundissimo, à vaporum, ex vino & crudis alimentis elevatorum copia detinentur. Sic pueri lumbricis laborantes, comatosi affectibus corripiuntur, à crassis & copiosis vaporibus, ex crudorum & pitui-

## CAPUT II.

De affectibus soporosis, comate, lethargo, caro, & apoplexia.

**S**Omni præternaturalis quatuor præcipuæ proponuntur differentia: coma, lethargus, carus, & apople-



pituitosorum humorum copia elevatis. Sic in febribus nonnullis intermittentibus sopor inexpugnabilis accessionis initio contingit, ob crudorum & putrescentium in venis humorum, præsertim mæfaraicis contentorum copiam qui à calore febrili paroxysmi attenuati, multos vapores ad caput transmittunt, talemque soporem inducunt, qui interdum, cessante frigore vel rigore, cessat; interdum verò usque ad finem paroxysmi permanet, prout vapores crassiores aut tenuiores, magis aut minus copiosi, facilius aut difficilius discutuntur.

Quintò à medicamentis narcoticis, nimia copia assumptis, somnus tam profundus excitatur, ut multi ex imprudenti opii usu in somnum perpetuum demersi fuerint. Talis etiam vis narcotica in quibusdam animalibus reperitur, ut in torpedine. Sic etiam ex morsu Aspidis soporem lethalem induci, refert Plutarchus in Cleopatrarum interitu. In humanis etiam corporibus qualitas hæc narcotica generatur ex maligna humorum putredine, quæ in malignis ac pestilentibus febribus reperitur, unde comatosus affectus in hujusmodi febribus sæpissimè contingit, qui malignitatis certissimus est index, & futuræ mortis non rarò prænuntius.

Signa diagnostica, varias soporosis affectuum differentias indicantia, in eorum distinctione, in principio hujus capitis fuere proposita. At signa causarum hos affectus producentium, ita se habent.

A pituitosis humoribus, in cerebro restagnantibus, affectus soporosos produci, testantur habitus pituitosus, ætas senilis & puerilis, regio & tempestas frigida & humida, consuetæ per os & nares pituitosæ excretionis suppressio, & quod æger ante invasionem capitis gravitate, oculorum obtenebratione, & totius corporis segnitie affectus fuerit, quodque non rarò in ipso morbo pituita per os & nares effluat, aut in gulam defluens, ab ægro frequenter deglutitur.

A sanguine verò soporosis affectum generari, significant plethorica dispositio, rubor faciei, & capitis dolor, affectum præcedens.

Tumor in cerebro genitus vix ullis indiciis internosci potest: sed sola calvariae apertione post obitum ægrotantis detegitur: ut in casu supra proposito ostenditur.

Sympathicum affectum, & à vaporibus ad cerebrum elevatis oriundum ostendunt primo, absentia eorum signorum, quæ idiopathicum affectum significant. Secundo, signa indicantia peculiarem affectum partium, à quibus vapores ad cerebrum transmittuntur. Sic à ventriculo vapores hujusmodi elevari, testantur crapula præcedens, ructus acidi aut nidorosi, aliaque crudorum humorum, in ventriculo aliisque partibus ventris inferioris redundantium indicia. Si verò à lumbricis oriantur, propria eorum signa apparebunt, proprio capite descripta.

Quod ad prognosin attinet, omnis soporosis affectus periculosus est; sed quo major & profundior est somnus, à quo æger difficilius expergiscitur, eo majus portendit vitæ periculum. Atque ita carus comate & lethargo periculosior est, apoplexia caro, quæ si fortis fuerit, omnino incurabilis censetur ab Hipp. *Aphor. 42. sect. 2.* qui sic habet: *Apoplexiam fortem solvere, est impossibile; debilem verò, non facile.* Fortis verò dicitur apoplexia, in qua respiratio inæqualis, inordinata, & interdum intermittens est.

Si verò ita se habens respiratio, magna vi exerceatur, fortior censenda est: si autem respiratio penitus prohibeatur, fortissima est. Contra verò, ubi respiratio aliquem servat ordinem, debilior existit, quæ doctrina proponitur à Gal. *Comment. Aphor. prædicti.*

Valde periculosus est comatosus affectus, qui acutissimo morbo supervenit. Vel enim caloris nativi extinctionem significat, vel malignam & venenatam qualitatem, quæ in febribus malignis cerebrum plerumque solet impetere. Qui, per consensum partium inferiorum fit comatosus affectus, & à vaporibus ex iis elevatis, minus infert periculum.

Lethargo affecti septem diebus moriuntur: si verò hos effugerint, evadunt. Hipp. *secundo de morbis.*

Affectus comatosi in senibus ut plurimum lethales esse consueverunt. Cum enim, propter caloris nativi inopiam,

debilem habeant facultatem concoctricem & expultricem fit ut materiam morbificam superare & expellere nequeant, eam in primis, quæ in cerebro redundat. Siquidem cerebrum, cum sit pars corporis frigidissima, advertente senio, caloris imminutionem, tandem extinctionem, citius quàm reliquæ, pati consuevit.

In lethargo parotides supervenientes, vel pus ex auribus effluens, cum imminutione symptomatum, salutare. Significat enim dominium naturæ supra causam morbificam, quam vel expellit ad emunctoria nondum perfectè concoctam, vel in pus conversam per ductus naturales evacuat.

Qui ex lethargo servantur, empyici fiunt, ex Hipp. *in Coac. & 3. de morbis.* Hæc sententia, ut sonat, & ut plerique eam interpretantur, experientia non respondet. Vix enim verum empyema, ex lethargo genitum, ulli videre contingit. Sed veritati est consentanea Mercurialis interpretatio, quæ empyicos seu suppuratos hoc loco intelligit, quibus per aures vel nares materia purulenta evacuat. Docuit enim Gal. *con. Aphor. 7. sect. 5. & Aphor. 44. sect. 7.* per empyema Hippocratem non solum quæ in thorace, sed quæ etiam in singulis partibus fit, suppurationem intelligere.

Soporosis affectui, à causa frigida oriundo, phrenitidem succedere, bonum: quandoquidem à calore intensiore, phrenitidem efficiente, materia pituitosa, affectum soporosis producens, concoquitur.

Apoplectici in septem diebus pereunt; nisi febris apprehendit. Hipp. *12. de morbis, Aphor. 51. sect.* Illa autem febris acuta esse debet & essentialis, ab humorum & spirituum effervescencia oriunda, ut possit materiam morbificam discutere. Si autem remissior fuerit, & symptomatica, qualis apparere consuevit in apoplexia, quæ à dispositione inflammatoria cerebri, & nimia sanguinis copia, in venis illius contenta exoritur, morbum non imminuit, quin potius phrenetica quædam symptomata accersit, quæ facultates animales debilitant. Et in hac causa phrenitis, soporosis affectui superveniens, non est bona, ut in superiori prognostico dicebatur. Præterea febris morbum solutura, alia conditione indigêt, ut nimirum à principio morbi accadat, dum natura, adhuc in suo robore consistens, validos conatus exercere potest. Quæ enim progressu morbo supervenit, salutaris non est, ut docuit Hipp. *in Coacis. Apoplectica,* inquit, *affectiones, derepentè exolutorio modo fientes, febre temporis progressu accidente, perniciose.*

Apoplectico *idiopetis* superveniens mala; illa enim sudatiuncula summam naturæ oppressionem significat.

Ad horum effectuum curationem, sicut & reliquorum omnium, tria instrumenta medica necessaria sunt; diæta, chirurgia & pharmacia.

Diæta in horum effectuum principio tenuissima est imperanda, quia morbi sunt acutissimi. Idcirco solis jusculis ægri nutriendi sunt, per dilucida intervalla usurpatis. In declinatione verò & curatione, prophylactica eadem diæta convenit, quæ in frigida cerebri intemperie descripta est.

Reliqua duo instrumenta sequenti methodo sunt usurpanda.

Quando quidem hujusmodi affectus soporosi præcipientes sunt, & periculo pleni, sedulam Medici diligentiam postulant & in talibus casibus remedia festinanter administranda sunt.

Primo igitur medicus, ad effectum aliquem soporosis vocatus, ægrum confestim à gravi illo somno excitare conabitur, omnibus sensibus objecta vehemètia offerendo. Atque adeò oculi radiis solaribus & luci splendide obijciendi.

Aures clamoribus, strepitu, & sonitu concutiendæ: & imprimis æger proprio nomine magna voce sæpè appellandus est.

Naribus acria, ut ruta, castoreum, acetum objicienda, in os & palatum itidem acria injicienda.

Tactus frictionibus, vellicationibus, pilorum evulsionibus, ligaturis digitorum complicationibus, & aliis hujusmodi, irritandus.

Clyster laxans præscribatur, primum ex decocto communi, ut citius paretur, in hunc modum.



℞. Decocti communis clysteris ℥. i. hieræ picræ, & diaphoen. ana ℥. i. ol. lilior. & rutac. ana ℥. i. ℞. mellis anthosati ℥. ii. talis ℥. i. Fiat clyster injiciendus statim.

Dum hæc sunt seriò apud se meditari debet Medicus an venæ sectio celebranda sit, quandoquidem in hisce affectibus, quod dixit Celsus de apoplexia, sanguinis detractio vel occidit, vel liberat. Convenit autem venæ sectio, si sanguis causæ principalis, adjuvantis, vel sine quâ non rationem habeat, viresque ferant.

Vires autem non actionum animalium ablatione æstimandæ sunt, sed quales ante morbi invasionem fuerant. Si enim tum satis fortes fuerunt, etiam nunc permittunt, nisi planè fortis sit apoplexia. Neque vires sunt debiles per resolutionem, sed per oppressionem.

Si verò nullo modo sanguis peccet, aut vires sint verè dejectæ, aut ager admodum senex, venæ sectio omnittenda.

Statim verò & sine omni mora, sive noctu, sive interdiu affectu qui corripitur, venæ sectio instituitur, & quidem ante clysterem, si quam primum injectus non fuerit. Fricetur tamen prius corpus, & aperiatur vena in brachio.

Hoc etiam advertendum est, utilius ac tutius esse, non unâ vice mittere, quantum opus est sanguinis, sed per vires, intra tamen paucarum horarum spatium. Nam per iteratam illam sanguinis missionem & materia facilius movetur, & vires non deiciuntur. Inspiciatur post primam venæ sectionem ægri facies, & pulsus exploretur. Et si color faciei vividior reddatur, & respiratio faciliior, ac pulsus benè habeat, optimè sperandum, & confidentius venæ sectio repetenda.

Vulnus in venæ sectione fiat ampliori foramine: alias enim sanguis, qui crassior est, statim subsistit.

Quò magis abundat sanguis, eo liberalius detrahi debet. Si verò pituita magis luxuriat, pariori manu mittendus est: ne calor natus, ad hunc affectum discutiendum tantoperè necessarius, quadantenus infringatur.

Copiosæ & frequentis sanguinis detractio in apoplexia exemplum singulare proponitur à Zacuto Lusitano, lib. 1. *historiæ Medicorum principum, hist. 33.* his verbis: *Nobilis quadam sæmina juvenula, in omnium rerum oblivionem deinde in veram apoplexiam, cum menstrui effluvio incidit. Cui cum plurima tam in superioribus, quam in inferioribus partibus essent celebrata auxilia, per ligaturas, acres clysteres, scarificatas cucurbitas, dorso applicatas, neglecta indicatione, quæ à menstruo actu fluente desumitur, oburgens ex procrestatione periculum, cum viribus esset valentibus, factis frictionibus crurum, & cucurbitulis femoribus apposis, octo horarum spatio quater è cephalica copiose sanguinem mitto, à quo presidio loqui cepit, & convaleuit.*

Quidam practici recentiores audent in apoplecticis jugulares venas aperiri, sicque omnes propemodum liberari affirmant, in eaque apertione hac methodo progrediuntur. Primo collum leviter constringunt linteò, apertione facta statim laxant. Sanguis spontè fluit sine ligatura, quæ posset sanguinem ad caput attrahere. Vulnus postea occludunt emplastro glutinante, sine ligatura, eoque faciliè sanguinem cohiberi asserunt. Quod confirmat Zacutus Lusitanus, qui tamen ligaturâ adhibet, *observat. 79. l. 1. Praxeos Medicæ admiranda*; ubi refert historiâ anginæ acutissimæ, in qua peritissimorum Medicorum consilio venæ jugulares apertæ fuerunt, unde sequutus est irreparabilis (ut ipse loquitur) sanguinis fluxus, quo ager in omnimodam virium jacturam lapsus est. Vocatus Zacutus accurrit, emplastrum Galenicum superimpofuit, quo ipse lib. 5. meth. 4. ad arteriarum & jugularium hæmorrhagias feliciter utitur: sicque collo commodè ligato, ager jam exhaustus reficitur & è morbo liberatur. Emplastrum verò componitur ex thure, aloë & pilis leporinis, albumine ovi subactis, dupla thuris ad aloë quantitatem, ut docet Gal. loco citato; aliquando verò æquali utriusque quantitate, in durioribus scilicet corporibus superiorem operationem Gal. comprobabat, cum dicit, hoc emplastrum venarum jugularium profluvium citra vinculum sistere. Hoc etiam animadverti velim, in apoplexia sanguinem ex vena aperta tanto impetu non profluere, quemadmodum in angina, quia in illa sanguis est refrigeratus, ac veluti congelatus, ut docuit

Hip. 2. *de morbis*, & ea ratione creditur venas & arterias carotides obstruere, in hac verò fervidus est ac tenuis, cum anginosi febre acutissima laborare soleant.

Purgatio instituitur paucis horis post venæ sectionem, neglectâ temporum electione. Neque enim in purgando cunctabundus nimis aut timidus esse debet Medicus: cum morbus valde urgeat, & brevi sua percurrat tempora. Et illa purgatio forti medicamento debet fieri, quia humor contumax est, & obruta facultas, nec nisi vehementioribus irritatur.

Illud autem medicamentum vulgò fieri solet ex ℥. i. electuarii diacarthami, dissoluta cum aqua betonicæ, addendo castorei ℞. ℞. Vel

℞. Turbith. electi ℞. iii. agarici recenter trochisc. ℥. ii. zinzib. ℞. ii. sem. foeniculi ℞. i. castorei gr. vi. Infundatur in sufficienti quantitate aquæ betonicæ. In colat. ℥. iii. dissolve electuarii diacarthami ℥. iii. sirupi ros. ℥. i. fiat potio. Vel

℞. Massæ pilul. coch. min. ℥. i. castorei gr. iii. Malaxentur cum aqua betonicæ, formentur pilulæ septem, & si ager non possit glutire, dissolvantur in aqua salviæ, lavendulæ vel betonicæ. Vel

℞. Massæ pilul. coch. maj. & de agarico, ana ℥. ℞. trochisc. albandal, diacridii & castorei, ana gr. iii. Fiat massa cum melle anthosato, quæ dissolvatur in aqua salviæ. Vel fiat talis potio.

℞. Fol. fennæ ℥. i. ℞. agar. albi ℥. i. ℞. turbith. elect. ℥. i. zinzib. & galangæ, an. ℥. ℞. Coquantur in aqua salviæ & rorismar. Colat. ℥. iii. ℞. adde electuarii diacarthami ℥. ii. castorei ℞. ℞. oxymelitis simplicis ℥. ℞. Fiat potio.

In lethargo purgatio ab initio mitior esse debet propter febrem continuam conjunctam, ex agarico; cui aliquid rhab. addi potest, vel scammonii, aut pilulis de hiera cum agarico, cum bilis plerumque humorum ad caput vehiculū sit. In morbi tamen progressu, cum jam materia ad caput fluxit, & in eo hæret purgantibus etiâ prædictis utendū est.

Trallianus scammonii ℞. ℞. cum castorei ℞. ii. in oxymelite exhibet, quo multos lethargicos deploratos se restituisse refert. Et Oribasius ex Ruffo Ephesio refert, nullum aliud esse lethargo correptis æquè utile, atque efficax medicamentum ad purgandam pituitam, quam bilis admixta in caput detulit, ac scammonium cum castoreo exhibitum. Sæpe verò facultates tam sunt oppressæ, ut medicamenta in actu minimè deducantur, atque adeò etiam nihil operentur, quod mali ominis est, & ita affecti ut plurimum pereunt. Attamen, ut inquit Celsus, quando hujusmodi tempestates ingruunt, remedia etiam cum aliqua temeritate rapienda sunt, & omnino periculum in hoc morbo aliquid tentare permittit. Nam ut Serenus habet *Medici hæc potiora putant, quàm dulci morte perire.* Et ut idem Celsus, *multa in præcipiti periculo rectè fiunt, quæ aliàs essent omittenda.* Ideò propositis remediis non proficientibus, ad ea quæ ex antimonio parantur, licet transcendere, præsertim minùs vehementia: quale est aqua benedicta, ex croco metallorum composita, quæ per superiora & inferiora potenter expurgans, tantum pituitæ copiam non solum è ventriculo, partibusque inferioribus, sed etiam è cerebro educit, ut hac evacuatione interdum ægri liberentur. Et bonâ fide testari possum, me virum nobilem ex primoribus hujus civitatis vidisse, ter intra biennium ab apoplexia hoc solo remedio liberatum. Quamvis autem nonnulli etiam viri doctissimi, vomitoriorum usum in hisce affectibus improbant; tamen experientiæ magis credendum est, quæ etiam nos docet quotidianis experimentis, pueros comate affectos, tali vitrioli vomitivo promptius & tutius quàm ullo remedio liberari.

Tinctura nicotianæ aqua vitæ extracta, ad ℥. ii. cum melle excepta, & in os infusa, potenter educit.

Interim, medicamento purgante exhibito, antequam operari incipiat, & dum etiam operatur, revellentia omnium generum in usum revocanda sunt, non solum frictiones & ligaturæ antea propositæ; sed etiam cucurbitulæ, dorso, scapulis, brachiis, femoribus affixæ, sine scarificatione, si sanguinis missio sufficiens celebrata sit: cum scarificatione, saltem earum aliquæ si phlebotomia fuerit omissa.



In apoplexia non admoveantur cucurbitulae posteriori thoracis parti, aut hypochondriis, ne contractis thoracis & abdominis muscibus, respiratio magis impediatur.

Summum & unicum remedium habentur, praesertim in apoplexia, cucurbitulae capiti impositae. Quod remedii genus insignis ille Medicus Fracastorius, apoplexia correptus nutibus suis indicasse fertur; sed non intellectus periiit.

Zacutus Lusitanus *hist. 21. lib. 1. de Medic. princ. histor.* refert desperatam apoplexiam, cucurbitula bis occipiti admoda cum profundis scarificationibus, à se curatam fuisse.

Vesicatorium posteriori parti cervicis & scapulis admoveatur.

Clysteres acres injiciantur, duo vel tres, eadem die.

℞. Fol. parietar. hyssopi, calamenthi, origani, salviae, rutae, & centaurei minoris, ana M. i. sem. carthami ℥. ss. sem. foeniculi & cumini, ana ℥. iii. agarici albi in nodulo inclusi ℥. ii. pulpae colocynth. in eodem nodulo inclusae ℥. i. ss. Coquantur ad ℥. i. In colat. dissolve hierae picrae ℥. ss. diaphoenici ℥. i. olei rutacei ℥. ii. Fiat clyster.

Chymici clysteribus admiscant aquae benedictae ℥. ii. vel iii. & sic potenter purgant.

Aquae autem hujus dosi augeri potest ad ℥. iv. & ℥. v.

Imò verò, antequam è phiala educatur, aliquantulum agitari debet, ut nonnihil pulveris in fundo residentis admisceatur, unde vires efficaciores evadunt. Ideò ut plurimum clysteres ex aqua benedicta, seu vino Emetico, hac formula praescribere soleo, qui in multis affectibus, praesertim colici doloris miranda praestant.

℞. Decocti emollientis ℥. i. diaphoenici ℥. i. aquae benedictae turbidae ℥. iv. Fiat clyster.

Si clyster debito tempore non reddatur, glande alvus proritur.

℞. Pulv. hierae picrae Gal. ℥. ii. pulpae colocynthidos, agarici albi, ana ℥. ss. diagridii d. i. falis gemmei ℥. ii. mellis ad debitam consistentiam cocti quantum satis, fiant suppositoria.

Sapè tamen accidit, ut sphincter ani resolvatur, unde anus planè pateat, ac clysteres sine fructu injiciantur, cum retineri non possunt, qui casus plerumque desperatus est.

Naribus admoveatur castoreum cum aceto, quod specifica proprietate somnum excutere creditur.

Efficax etiam remedium est, si acetum acerrimum supra laminam candentem effundatur, & vapor ab agro naribus excipiat. Adhuc efficacius erit, si aceto addatur semen nigellae, rutae, & castoreum, ipsum etiam acetum modicè calefactum & naribus adhibitum excitat potenter si acerrimum sit, & adhuc potentius, si ei piper & castoreum admisceantur. Excitat etià à somno suffusus sulphuris.

Pili caprae usti, & cornu cervi & caprae ustum & naribus admotum, potentissima sunt ad excitandum altissime dormientem.

Succini albi fumus ad apoplecticos excitandos praestantissimus est: item si illius oleo tempora & nares sapè illinantur.

Fiant etiam frictiones in plantis pedum cum sale & aceto, manibus inunctis oleo rutaceo & de castoreo: linguae palatum inungatur theriaca veteri, in aqua coelesti, aut apoplectica dissoluta. Sed advertendum est, ne theriaca recens adhuc sit. Nam ratione opii somnum inducit. Ad eundem usum revocari poterit aurea Alexandrina, & confectio anacardina. Sinapi etiam potest coqui in vino forti, & eo palatum inungi. Pyrethri radices in oxymelite coctae idem praestant. Omnibus verò hisce castoreum utiliter admiscetur.

Universali evacuatione peracta, & purgato corpore, caput evacuandum est, tam sensibiliter, quam insensibiliter.

Sensibiliter, per nares & palatum, errhinis, & sternutatoriis, in curatione frigidae intemperie cerebri propositis, & inunctionibus palati supra descriptis. Hisce omnibus addantur ruta, castoreum, acetum.

At de sternutatoriis hoc advertendum, si affectus perseveret, & aeger difficulter excitetur, eorum usum commodissimum esse. Non tamen diutius iis insistendum, ne caput impleant, humores commoveant, ac fundant. Sed initio morbi ab intempestivo sternutatoriorum usu

abstinendum, cum magis ab iis tum materia fundatur, & partibus impingatur: unde morbus fit contumax, vel interdum levior affectus in apoplexiam degenerat.

Tandem insensibiliter resolventia applicanda, quae in sequentem modum componi poterunt.

℞. Baccarum lauri & juniperi, ana ℥. i. ss. radic. angelicae, zedoariae, imperatoriae, ana ℥. i. sol. beton. salviae, rorismar. an. M. i. rutae, satureiae, majoranae, flor. lavendulae, ana M. ss. Coquantur in aceti sufficienti quantitate. Hoc decocto spongia, aut linteam, aut stupa imbuta, capiti calidè applicentur. Mirum quantum auxilii soporosis affectibus hoc remedium afferat. Brachia quoque & manus eo abstergantur, eoque crura & pedes fricentur.

℞. Castorei ℥. ss. capill. hominis ustorum ℥. iii. succi rutae, aceti & olei comunis, ana ℥. ii. Coquantur ad ungueti consistentiam, quo illinatur caput calidè post fotum. Vel

℞. Olei cossini, castorei, & de euphorbio, ana ℥. i. pulv. sinapi, euphorbii, ana ℥. i. aceti cochlear i. ceræ quantum satis. Milce. Fiat unguentum.

Si praedictis remediis non cessarit affectus, vesicatorium magnum vertici & sincipiti erit applicandum.

Efficacius multò evadet vesicatorium, si euphorbium ei addatur, quod è profundioribus capitis partibus humores attrahit ad superficiem.

Nonnulli etiam cum morbi vis maxima est, cauterium actuale occipiti inter primam & secundam vertebrae applicant.

Zacutus Lusitanus plura eodem tempore applicuit cum felici successu, ut testatur *lib. 1. praxeos admirandae, observat. 14.* his verbis: *Vocatus ut inviserem agrum, qui post dies triginta inexpugnabili dormiendi necessitate correptus, cum febricula lenta, agra palpebras attollere poterat, profundo somno immersus. Hic varia revellentia & vacuante erat expertus, quibus cum non levaretur, ad cauterium accessit, cum utilitate. Quare candenti fermento crustas in vertice capitis excitavi, in occipite unam, & circumcirca multas: ex quibus cum excitaretur ager, & ichores effluerent, expergefactus ad mentem rediit. Hoc auxilio, praeter omnium spem, omnibus tentatis, memini me bis caroticos persanasse. Hi enim ignis ope, liquata & per multos dies per os & nares excreta, corvaluerunt.*

Alii, ex antiquorum praescripto, sartagine candentem capiti admoveant, ea distantia, ut pilos, non cutim capitis possit comburere.

Commodè quoque in hujusmodi affectibus, aliquid aquae coelestis, vel apoplecticae agro infunditur. Aquae enim haec, ob summam penetrandi vim, praestantissimum sapè afferunt auxilium, & multos ab imminente apoplexia, vel etiam jam praesente liberarunt, modo sanguis non valde abundet, qui aquarum istarum usu posset fundi.

Aquarum autem apoplecticarum multae descriptiones habentur apud Langium, Uveccherum, Quercetanum, Crollium, & alios. Unam tantum, exempli gratia, ex selectioribus simplicibus, à nobis composita, hic asserere lubet.

℞. Radic. paeoniae, visci quercini, ana ℥. ii. calami aromatici, galang. cyperi, ana ℥. i. sol. beton. salviae, majoranae, ana M. i. sem. paeoniae, anisi, foeniculi, carvi, ana ℥. iii. flor. lavendulae, stoechados, & rorism. ana P. i. nucis moschat. macis, caryophyll. cubebae. granor. paradisi, cardamomi, ana ℥. ss. cinamomi ℥. ii. croci ℥. i. ss. specierum diambrae, & diamoschi, ana ℥. ii. Contundantur & incendantur, ut artis est, & reponantur in alembico vitreo, de super affundendo spiritus vini optimè rectificati q. s. ut tribus digitis materia supereminet. Digerantur in B. M. per octo dierum spatium, postea distillantur, & aqua servetur in vase vitreo bene clauso.

Si tandem morbus ad declinationem translatus esse videatur, somnusque ille profundus jam discussus fuerit, omisssis praedictis remediis, soli roborationi cerebri incumbendum est. Quod satis commodè fiet usu quotidiano opiatae cephalicae, pro frigida intemperie cerebri descriptae. Vel si potentius agendum, aqua apoplectica usurpari poterit.

Imprimis verò castorei usus continuetur, si malum protrahatur, & manè per aliquot dies ejus gr. iiii. vel iv.

cum



cum ozymelite simplici, vel scill. exhibeantur. Testatur Trallianus, multos isto morbo victos, hoc solo remedio mortem evasisse.

Exterius etiam utiliter admoventur balsama apoplectica, quorum variae extant formulæ apud Chymiatros. Nos unicam, e. g. hinc tantum subjiciemus.

℞. Olei nucis moschat. per expressionem parati ℥. β. ambræ griseæ, moschi optimi & zibetæ, ana ℥. i. ol. destillati lavendulæ, succini, cinamomi, rorismar. caryophyll. ana ℥. β. Misce, fiat balsamum, quod naribus & auribus instilletur palatoque illinatur singulis diebus manè. Ad hanc rem valdè commendatur oleum nucis moschatæ destillatum, eodem modo usurpatum.

Denique in horum affectuum generali curatione diligenter advertendum est, in iis qui fiunt à sanguine, minus calefacientia medicamenta esse adhibenda, at phlebotomiam largiori manu celebrandam, postea venam frontis aperiendam: tum etiam purgantibus phlegmagogis cholagoga esse admiscenda.

Qui hisce affectibus semel affecti, ab iisque liberati sunt, in eos ut plurimum solent recidere. Quod ut præcaveatur, frigidior cerebri intemperies corrigenda est, eademque illius cura instituenda, quæ supra fuit proposita. Eademque via & methodo imminens apoplexia, vel carus, vel lethargus, vel coma præcavebitur. Et si cerebrum valdè refrigeratum est, post universales vacationes, aqua apoplectica in usu frequenti esse poterit. Vel etiam uti poterit æger tabellis in sequentem modum compositis.

℞. Ambræ griseæ ℥. β. olei destillat. anisi, cinamomi, nucis moschat. ana guttulas iii. olei caryophyll. gutt. i. sacchari in aqua flor. aurantium dissoluti ℥. iv. Fiant tabellæ, capiat ℥. i. vel duas manè.

Pilulæ caput roborantes etiam usurpari poterunt, in hunc modum compositæ.

℞. Cubeb. mastiches, nucis mosch. caryophyll. ana ℥. i. ambræ griseæ ℥. β. mosch. g. vi. Cum succo majoranæ fermentur pilulæ, capiat ℥. i. hora somni, bis in septimana.

Commendatur etiam, & apud multos in usu est hic pulvis.

℞. Succini albi ℥. β. pulv. electuar. diarrhod. abbatiss. ℥. ii. radic. pœoniæ ℥. i. β. Fiat pulvis, de quo capiat ℥. i. aqua conveniente, ante novilunium.

Utile quoque est nucem moschatam sæpè ore detinere & masticare.

Tum etiam odora menta sæpè naribus admovenda sunt, & in primis balsama apoplectica.

Aromata in cibis usurpantur: post pastus pulvis digestivus, in curatione frigida intemperiei cerebri descriptus.

Si è sanguinis copia affectus soporosis metuitur, illius imprimis quantitas imminuenda est, dandaque sedulo opera, ut hæmorrhoides profluant, quibus nihil utilius esse potest.

His etiam purgationes instituendæ sunt ex senna & rhabbaro: eaque remedia eligenda, quæ minus calefaciunt.

Si denique ab humore melancholico metuatur apoplexia, fluxus hæmorrhoidum etiam utilissimus est. Purgantia iterata humoris melancholici, & medicamenta proposita ad roborandum cerebrum, præcipuè verò pulvis ex succino, diarrhodone, & pœonia supra descriptus, etiam conducunt.

### CAPUT III.

#### De Comate Vigili.

**L**icet coma *αχυνος* seu vigiliū ad soporosos affectus referri soleat; tamen quia longè diversā à cæteris conditionem obtinet, seorsim in hoc capite explicandum est.

Est autem coma vigiliæ affectus, in quo ægri clausis oculis decumbunt, ut dormire videantur, cum tamen vigilent & delirent, ac si eos tetigeris, statim oculos aperiant, & torvè aspiciant, & iterum delabantur in somnum, quia variis imaginibus & deliramentis impediuntur, ita ut vigilare cogantur. Hunc affectum Gal. medium constituit inter phrenitidem & lethargum, & tiphomaniam appellat.

Causa hujus affectus vulgarissima est bilis, pituitæ permixta, à quibus humoribus cerebrum, vel tantum irriga-

tur, vel tumorem atque inflammationem concepit, unde erysipelas œdematosum, vel œdema erysipelatosum exoritur. Cum autem ea humorum miscela variis modis & proportionibus fieri valeat, varii in diversis ægrotantibus isti etiam affectus apparent. Si enim bilis in mixtione prævaleat, delirium majus est; & ægri, licet clausos habeant oculos, minus dormiunt. Si verò pituita prædominetur, ægri magis dormiunt, minus delirant, & expergefacti minus vociferantur ac desipiunt.

Fit etiam coma vigiliæ per sympathiam, à vaporibus biliosis & pituitosis simul mixtis, in cerebrum translatis: quod non raro solet contingere in febribus ex humorum miscela oriundis, præcipuè hemitritæis, ex tertiana & quotidiana compositis. Non est tamen inconveniens asserere, vapores simpliciter calidos & humidos in febribus satis intensis hunc affectum producere, quia ab humiditate fit somnus, à calore autem vigilia.

Diagnosis hujus affectus ex iis, quæ antea dicta sunt, satis elucescit. Eo enim laborantes clausis oculis permanent, & somnum capere videntur: attamen dormire nequeunt, & se variis modis exagitant, sese subito erigunt, à lecto surgere nituntur, & iterum in somnum relabuntur. Causarum varietas ex prædictis etiam facile dignoscitur.

Periculosus affectus maxime censendus est. Sive enim tumore & inflammatione cerebrum afficiatur, grave malum esse consuevit: sive alio quovis modo à prædictis humoribus obsideatur, sive à vaporibus ex febrium malignarum materia oriundis afficiatur.

Deliria vehementiora in comate vigiliæ convulsionem efficiunt. Fiunt enim ab humore vel vapore acerrimo, qui partes nervosas feriendo, convulsionem facile concitare potest.

Curatio comatis vigiliæ idiopathici iisdem instrumentis perficitur, quibus phrenitis & lethargus curari consuevit. Quod si magis ad phrenitidem deflectat, illius remedia magis adhibentur. Si verò magis ad lethargum inclinet, ejusdem remedia magis usurpantur. Sympathici verò comatis curatio à febris malignæ curatione dependet, à qua sumit originem. Peculiariter tamen remedia, vapores illos à cerebro revellentia & repellentia, usurpanda sunt in principio: ut phlebotomia ex brachio & malleolo, & cyrrhodina fronti & syncipiti admota; quibus accedent clysteres frequenter injecti, cucurbitulæ, tum siccæ, tum humidæ, scapulis, dorso, naribus, & cruribus affixæ, vesicatoria cervici, brachiis, & femoribus admota: & si quid cerebro infixum videatur, derivatio per apertionem venæ frontis, aut hirudines, pone aures & temporibus affixas molienda erit, simulque resolutio procuranda animalibus tenellis calentibus, capiti admois.

### CAPUT IV.

#### De Catocho, seu Catalepsi.

**Q**uædam apud authores confusio reperitur circa catochi nomen, quod alii pro comate vigiliæ, alii pro catalepsi usurpant. Illis autem occasionem dedit Paulus, qui lib. 2. cap. 8. de duplici catocho agit, & primum sub illius nomine de comate vigiliæ tractat: in fine verò sub eodem nomine, catalepsin explicat. Ufu tamen invaluit, ut catochus & catalepsi pro uno & eodem morbo apud omnes propemodum authores habeantur. Latini vulgò congelationem appellant.

Rarissimus est affectus, & admiratione dignissimus, & quicumque ex authoribus aliquem ejus casum viderunt, observatione dignissimū celsuerunt, ejusque historiam descripserunt. Primus omnium Gal. comment. in 1. prorrh. sect. 2. part. 56. ejusdem condiscipuli sui historiam proponit, qui cum assiduo studio se fatigaret, catalepsi correptus est. *Jacebat, inquit, veluti lignum, prorsus inflexus, rigidusque, atque extensus. Videbaturque oculis apertis ita nos inuerti, ut ne conniveret quidem, nihil tamen loquebatur. Is quoque eodem tempore quæ loqueremur audire se dixit, quāquam non evidenter, clarèque. Nonnulla item & memoria tenens referebat, præsentisque omnes se conspiciere dixit: ita ut quorundam actiones recordatus exponeret; sed neque*

post



post loqui poterat, neque membrum ullum movere. Fernellius verò lib. 3. de morborum partibus, cap. 2. duas refert historias, quæ sic habent Unus dum literis & chartis sedulo invigilaret, repente hoc vitio percussus, ita quidem obrigit, ut sedens calamusque digitis premens, oculis in libro defixis, putaretur in eadem studia incumbere, donec vocatus ac impulsus deprehensus est, omni sensu atque motu carere. Alterum mortui ritu jacentem invisi, qui neque cernebat, neque audiebat, neque compunctus sentiebat quicquam. Facilis tamen inerat respiratio, & quicquid in os ingerebatur promptè vorabat, è lectulo sublatus solus insistebat, impulsusque incedebat, & quocunque vel manus, vel brachium, vel crus insteteretur, illic quasi fixum vel stabile permanebat. Expressum quamdam dixisses larvam, aut arte progredientem statuam.

Similes historias videre est apud Schenkium, Marcelum Donatum, Rondeletium, Jacotium, Tulpium, & alios; ex quibus colligitur, in hoc affectu sensuum internorum & externorum abolitionem, cum membrorum rigiditate ut plurimum reperiri; interdum tamen sensus non esse prorsus abditos, ita ut ægri colloquentes audiant; interdum etiam membra non esse rigida, sed ab adstantibus flecti posse, & in varios situs moveri.

Causæ hujus affectus variæ assignari possunt. Galen. comm. Aphor. 3. sect. 2. frigida & sicca cerebri intemperiei cataleptis generationem tribuit, quæ quidem intemperies partem cerebri posteriorem præcipuè occupat, consipat, & condensat; unde nervi ab ea oriundi etiam condensantur, & tensi ac rigidi evadunt. Talis etiam intemperies totum nervosum genus occupare potest, ab externa vel interna causa producta. Hanc tamen causam nonnulli in dubium revocant, existimantes talem frigiditatem in vivente corpore reperiri non posse, quæ talem nervis congelationem inferat. Verum hoc tacitè redarguit Galen. lib. de diff. morb. cap. 5. ratione ab experientia desumpta, his verbis. *Nam ij quos in itinere usque ad mortem frigus oppressit, talibus rigoribus corripuntur, quales Græci emprosthotonos, opisthotonos, tetanosque appellant, nonnulli verò his passionibus, quas congelationes nominant affliguntur.* Docet igitur Galen. à frigore externo cataleptin generari posse. Et ratio facile persuadet, in iis, qui in itinere ex intenso frigore rigescunt & intereunt, rigiditatem mortem præcedere, atque adeò minorem frigiditatem eam posse inducere, quàm sit illa, quæ mortem inducit. Sicque congelatio nervorum, seu cataleptis à frigida intemperie produci poterit, quæ citius talem affectum pariet, si siccitatem comitem habuerit.

Frequentiùs tamen generatur hic affectus ab intemperie frigida & sicca, cum materia conjuncta. Illa autem materia est humor aut vapor melancholicus, à quibus consipatio partis cerebri posterioris, & nervorum tensio, atque rigiditas inducitur, non solum qualitate sua frigida & sicca; sed etiam quantitate, quæ replendo distensionem facit.

Aëtius lib. 6. c. 4. à sanguine etiam fieri posse cataleptin asseruit, cui subscribit Rondeletius, dicens: illud contingere, quando venæ & arteriæ cerebri opplentur, unde rigescit corpus, & distentum, in modum corporum à frigore congelatorum conspicitur. Hanc sententiam confirmat historia nobilis mulieris febre syncho laborantis, quæ 16. die catalepti correpta est, sed largo tandem fluxu te è naribus sanguine liberata.

Sennertus novam excogitavit causam, quam dicit esse spiritum quendam congelantem, à quo spiritus animales figuntur & immobiles redduntur. Illam autem vim congelativam & fixativam ab intemperie frigida & sicca dependere negat; sed à qualitate quadam occulta exoriri asserit, cujusmodi spiritus congelantes in Macrocosmo reperiuntur, ut in fulmine, à quo interdum homines rigidi, & veluti congelati redduntur; quemadmodum refert Cardan. octo menses sub quercu cœnantes fulmine percussos fuisse, & eadem figuram corporis servasse, ut unus comedere videretur, & alter manum poculo admove, alius bibere, licet omnes essent exanimati. Vulgò etiam asseritur, vinum in dolio à fulminis spiritibus interdum

Laz. Riverii Opera.

congelari; in terræ motibus aliquando spiritus quosdam è terra erumpere, à quibus homines & reliqua animalia repentè consistunt & rigida manent. Addit Sennertus, vim congelandi in nitro & pluribus mineralibus insignem reperiri. Exempla eorum non affert. Nos unum pt. ponimus ex plumbo desumptum, cujus vapor mercurium ita figit & congelat, ut malleabilis evadat. Hoc Sennertus inventum non esse prorsus recipiendum; nisi ille hanc unicam cataleptis causam statuens, reliquas omnes expungeret. Quæ enim à Galeno, aliisque præstantissimis Medicis stabilita sunt, temerè non sunt rejicienda. Neque ulla necessitas cogit ad causas occultas confugiendi, quando manifestæ habentur, talem affectum producendi capaces, ut in earum enumeratione satis demonstratum est. Et cum Sennertus hujusmodi spiritum congelantem ab humore melancholico excitari dicit, illius sententia à communi parùm distat, quæ humori aut vapor frigido & sicco, atque adeò melancholico, cataleptis generationem tribuit.

Diagnosis hujus affectus satis manifesta est ex historiis supra ex Galen. & Fernell. propositis. Malum enim subito hominem invadit, eumque in statu detinet, in quo primò eum offendit. Sicque immotum servat, ac si congelatus esset. Diversitas verò symptomatum, in differentiis proposita, sensibus discernitur.

Prognosis hujus affectus eadem propemodum insituenta est, qualis in soporosis affectibus fuit proposita. Nempe affectum esse periculosum, & pro majori aut minori intensione symptomatum, majus aut minus portendere periculum.

Curatio autem duplex instituenda est: una in paroxysmo, altera extra paroxysmum. In paroxysmo ad ægrum excitandum conveniunt ea remedia, quæ in soporosis affectibus descripta sunt. Extra paroxysmum curatio melancholici hinc omninò conveniet, si catochus ab humore aut vapore melancholico generetur: quæ quidem causa frequentissima est. Si autem frigida intemperies sola, à causa externa vel interna producta, huic malo originem dederit; quæ illam emendant remedia, è capite primo hujus libri erunt depromenda. Ac denique, si copia sanguinis hunc affectum generet, vel soveat, illius imminutio per venæ sectionem erit consentanea.

Victus ratio calefaciens & humectans præscribenda erit, sicut in affectibus ab humore melancholico oriundis.

## CAPUT V.

### De Paralyfi.

**P**aralyfis est privatio motus & sensus, in quibusdam partibus, ob impeditum influxum spirituum animalium, Variæ sunt illius differentiæ. Velenim omnes, quæ sub capite sunt, partes occupat, & παραπληγία dicitur, vel dimidiam tantum corporis partem, & ημιπληγία nominatur: vel unicam tantum particulam obsidet, & paralyfis particularis appellari solet. Quamvis nonnulli authores paralyfin, hemiplegiam, paraplegiam, paresim & resolutionem, pro una & eadem motus & sensus privatione, quæ dimidiam corporis partem occupat, indiscriminatim usurpent.

Duplex iterum paralyfis constituitur. Una perfecta, in qua sensus & motus omninò abolentur. Altera imperfecta in qua functiones illæ tantum imminuuntur. Et si levis sit earum imminutio, nondum paralyfis, sed torporis vel stuporis nomen obtinet: quia via est ad veram paralyfin, & prodromus illius.

Alia est species imperfectæ paralyfis, quando motus læditur illafo sensu; vel vice versa.

Causæ paralyfis in genere sunt omnes, quæ spirituum animalium influxum in nervos, & musculos impedire possunt.

Omnium frequentissima est humor pituitosus, qui nervos obstruendo, comprimendo, densando vel refrigerando, dictum spirituum animalium influxum prohibere solet.

Y

Humor



Humor ille pituitosus influit à cerebro in nervos & medullam spinalem. Sic apoplexia levis degenerat in paralyfin, quia humor illam efficiens, è cerebro excutitur in medullam & principium nervorum, si- que vel in eorum substantiam se insinuat, meatusque insensibiles, per quos spiritus influunt, occludit; vel per cavitatem vertebrarum dorsi descendens, & spinalis medullæ ac nervorum ductus sequens eos comprimit & angustat, sicque spirituum animalium com meatum etiam impedit. Potest etiam idem humor frigiditate sua nervi substantiam densare, ut deinceps spiritibus animalibus pervia non sit. Ac denique simplici intemperie frigidiore & humidiori, spirituum influxum impedire potest, quandoquidem, dum nativum nervi temperamentum, & calor illius insitus, à nimia refrigeratione destruantur, spiritus animalis officio suo fungi non potest. Calor enim illius influens, cum partis calore insito conjungi debet, ad propriam illius actionem obeundam.

De aliis humoribus controvertitur, num paralyfis causæ esse possint? Attamen licet infrequentiores sint, non sunt omnino abdicandæ.

Trallianus *lib. 1. cap. 6.* refert quemdam in paralyfin ex mœrore incidisse: deinde sumpta hiera adeo læsum, ut totus immobilis fieret, & propemodum interiret, nisi in contrarium mutatus fuisset, & humectantibus omnibus, tum cibis, & aliis, quæ temperatum ipsum redderent, usus fuisset: maxime verò balneis compluribus, & unctionibus ex hydræleo.

Paulus *lib. 3. cap. 28. & 43.* paralyfin proponit ex colica biliosa, cui refrigerantia maxime conferunt. Et nostro sæculo notissima est colica Pictonum, quæ in paralyfin ut plurimum degenerat, eamque ab humore bilioso produci apud omnes in confesso est, de qua fusiùs agetur in colici doloris theoria.

Ejusdem rei exemplum proponitur à Foresto *observ. 97. lib. 10.* cujusdam adolescentis cum earundem partium extenuatione & atrophia. Qui cum calefacientium & exsiccantium medicamentorum usu ab aliis Medicis præscriptorum, in pejus continuo rueret, tandem solis humectantibus assumptis & admotis ab eo restitutus est.

Ratio id ipsum convincit. Bilis enim melancholica, & quivis alius humor in nervos influens, meatus eorum insensibiles occludere potest, si eorum interiora petat, vel eosdem comprimere, si extrinsecus ambiat.

Neque rationes Rondeletii, contrarium sentientis, ullo modo convincunt, dum ait, bilem & melancholiam siccare potius quam emollire nervos, bilem ad convulsionem, magis, mordendo & vellicando, quàm ad paralyfin faciendam esse idoneam: siquidem emollitio nervorum ut in paralyfi à pituita concedi potest, in omni tamen paralyfi necessaria non est; licet vulgò paralyfis nervorum resolutio nominetur, cum illius essentia à sola privatione influxus spirituum animalium dependeat, quæ dum à compressione nervorum, aliisque causis producitur, eorundem emollitio ad illius generationem minimè concurrit. Hujus autem relaxationis & emolliationis nervorum opinio inde exorta est, quod partes paralyticæ, tensione destitutæ emollitæ videantur. Motus enim membrorum fit per tensionem musculorum & contractionem versus suam originem: qua tensione cessante, resoluta dicuntur, licet nulla humectatio aut emollitio extraordinaria illis acciderit. Deinde cum bilis variæ sint species, variique gradus, non est necesse, ut omnis talem habeat acrimoniam quæ convulsionem efficere valeat. Adde quod varia sit humorum permixtio: & pituita, aut serosus humor bili paralyfin producenti misceri possit, quæ illius acrimoniam contemperet. Talis permixtio in febribus tertianis nothis præcipuè contingit, quales esse credibile est eas, quas dicit Fernelius in paralyfin migrare.

Denique res manifesta evadit ex paralyfi scorbutica, quæ convulsionem sæpè habet comitem, ut docet Eualenus multis in locis, & Sennertus *lib. de scorbuto, cap. 5.* Et licet verus scorbutus Gallis penè ignotus sit, non raro tamen scorbuticas quasdam affectiones nobis videre contigit, in quibus nonnulla hujus morbi symptomata elucebant. Unde duo exempla paralyfis scorbuticæ, cui convul-

siones frequenter superveniebant, recensuimus in observationibus nostris, nempe observatione 74. cent. 1. & observatione 98. centur. 2.

Aliæ causæ paralyseos, minùs frequentes, variæ esse possunt. Ac primò, frigida & humida intemperies nuda & sine materia, tum spiritus congelando, eorum influxum impedire potest, tum nervi temperiem destruyendo eum reddere potest ineptum ad spiritum animale recipiendum. Eaque excitari potest ab aère ambiente frigidiore, & cujusvis rei frigidæ contactu, quemadmodum docet Galenus 4. *de locis aff. cap. 4.* quendam tempore frigido ac pluvioso, cum madidum pallium collo diutius obvolvisset, in manus paralyfin incidisse, nervis nimirum, qui à spinali medulla ad manum feruntur, refrigeratis & humectatis.

A vi etiam narcotica, medicamentis, venenis, & ipsis interdum humoribus insita, paralyfin generari posse, Neoterici nonnulli censuerunt: & ab hac causa produci paralyfin existimant, quæ ex contactu torpedinis exoritur, quamvis ab hoc animali stupor quidam potius, quàm vera paralyfis excitari soleat. Ejusdem generis est, quæ à contactu hydrargyri contingit aurifabris, & iis artificibus, qui specula parare solent, quod Venetiis frequenter conspicitur. Vinum etiam virtute narcotica censetur à Platero stuporem & paralyfin inducere, licet alii aliter sentiant. Fernelius tamen huic sententiæ favere videtur: asserens loco supra citato, se vidisse aliquando universam corporis cutem, ex crapula & vinolentia stupore affectam. Et Petrus Fabius Diversus *in notis in Altimarum, cap. 24.* refert historiam cujusdam tonsoris, qui cum vino gulæ nimium indulgisset, nocte media expergefactus, incidit subito in paralyfin omnium corporis partium intra faciem existentium: in qua adeo motus & sensus erant deperditi, ut nec acu profundè perforatus, nec gladiolo scarificatus quicquam sentiret. Hic tamen solutus in totum ebrietate & crapulâ, intra tertium diem omnino sanatus est, factis tantummodo nonnullis revulsionibus ac unctionibus quibusdam resolventibus ad spinam. Attamen hic author non virtuti narcoticæ, sed vaporibus crassis, ex crapula oriundis, & nervos obstruentibus, paralyfis hujus generationem adscribit. Quam causam supra propositis addere, non est à ratione alienum. In humoribus etiam corruptis, & malignam qualitatem adeptis, vim narcoticam residere, in soporoso affectuum expositione ostensum est: qui humores, si ad nervos deferantur, actionem eorum labefactare possunt. Et cum humores scorbutum producentes malignam qualitatem adepti sint, vis illius narcoticæ possunt esse participes, quæ etiam ad paralyfin scorbuticam efficiendam concurrere potest, quamvis sola obstructio, vel compressio, ad eum affectum producendum sufficiat, ut antea monuimus.

Tumores etiam, juxta spinam aut nervos concreti, eos comprimendo, paralyfin sine dubio efficere possunt.

Sic etiam præcisio nervorum, & quæcunque continuitatis solutio eundem effectum parit.

Luxatio vertebræ, aliorumque articulorum, spinam & nervos comprimendo, idem præstat.

Ac denique condensatio nervorum spirituum influxum impedire potest; eaque fit, vel exsiccatione nimia, vel ab humore crassiori terrestriori, eorum substantiæ imbibito. Sic in elephantiacis perit sensus multarum partium, propter earum densitatem nimiam, quæ inducitur ab alimento crasso & terrestri, quo illæ nutriuntur.

Causæ differentiarum ita se habent. In perfecta paralyfi, quæ integram motus & sensus privationem supponit materiæ morbificæ copia major est, quæ integram nervi obstructionem, vel adstrictionem producit: in imperfecta verò minor, quæ spirituum animalium influxum penitus non impedit, sed aliquam eorum portiunculam commeare sinit.

Motus læditur interdum illaeso sensu, quia ad motum efficiendum major virtus requiritur, quàm ad sensum. Sentire quippe est quoddam pati; motus verò in actione omnino consistit. Sensus autem læditur illaeso motu, quia in aliquibus partibus nervi, aut eorum ramuli, sensui infer-

vientes,



vientes, motui non inferviunt, quemadmodum illi, qui ad cutem feruntur. Si igitur illi nervi tantum afficiantur, solus sensus læditur. Quod tantum contingit in paralyfi particulari, quæ unicam particulam occupat. Si enim afficiantur nervi insigniores, qui ad musculos feruntur, non potest lædi sensus, illaſo motu.

Diagnos̃ hujus affectus ad tria dirigenda est; affectus speciem, partem affectam, & causam affectum producentem. Affectus species per se notissima est, cum motus impotentia, & sensus privatio, aut imminutio, oculis ipsis pateant.

Partis affectæ dignotio difficilior est; ea tamen universa ex anatome desumitur, in qua nervorum origines & insertiones docentur.

Si enim pars faciei dextra vel sinistra resolvatur, reliquis partibus illaſis; cerebrum tantum afficitur secundum eam partem, à qua nervi ad partes eas deferuntur. Si verò partis capiti subjectæ unà cum facie lædantur; spina dorsi & cerebrum afficiuntur. Et si partes subjectæ lædantur facie illaſa, in sola spina vitium consistit. Et quidem in principio illius; si omnes simul lædantur. Si verò dimidia pars corporis paralytica sit; dimidia tantum spinæ portio obsidetur. Cruribus resolutis, affectio est circa finem spinalis medullæ, juxta vertebraſ offis sacri. Sic in cæteris inquirendus est locus, quo nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur.

Aliquando etiam causæ externæ inquisitio ad loci affecti dignotionem plurimum confert: cujus rei exempla duo apud Galenum inveniuntur, quorum unum supra propositum est ex 4. de loc. affect. c. 4. cujusdam hominis qui tempore frigido ac pluvioso madidum pallium collo diutius obvolvisset, in manus paralyfin incidit. Alterum habetur 1. de loc. affect. c. 5. de Paulania Syro. qui in tribus digitis sensum amiserat. Quem cum Galenus è vehiculo in dorsum prolapsus cognosceret, conjecturam fecit, in primo exortu nervi post septimam vertebraſ prodeuntis, partem quamdam ab ictu fuisse læsam. Ideoque medicamentum digitis frustra admotum, huic parti apposuit; & curatio subsequuta est.

Causarum diagnosiſ ex causis procatacticis, morbis prægressis, & temperamento agrotantis eruitur. Atque adeo, causæ externæ refrigerantes & humectantes prægressæ, ætas senilis, aut temperamentum pituitosum, tempus hyemale victus frigidus & humidus, apoplexia præcedens à frigida intemperie & humore pituitoso, morbum exoriri significant.

Paralyfin verò à bilioso humore, melancholico exoriri, testantur febres prægressæ, & interdum præſentes; temperamentum biliosum, aut melancholicum, tempus æstivum vel autumnale, usus aromatum, salforum, aliorumque ciborum calidiorum; animi pathemata gravia & diuturna; humorum biliosorum aut melancholicorum, vel feri acidi aut acris excretio. Fluxiones acres in varias partes decumbentes, & dolores in iis concitantes; ac denique cum motus & sensus imminutione adsunt dolor & convulsio; & laborantes à calefacientibus & exsiccantibus remediis læduntur: à frigidis & humidis juvantur. Tumores, luxationes, & solutiones continui, paralyfin efficientes, per se satis innotescunt.

Quod ad prognosin attinet, paralyſis ab humore pituitoso, nervorum substantiæ impacto genita, curatu difficilis est: quia ægerrimè discutitur propter frigiditatem partis & situm spinæ nervorumque profundum, ita ut ad eas partes vis remedium integrum pervenire non possit. Et cum diuturnus eorum usus necessarius sit ægri ut plurimum tædio affecti, curationi adeò protractæ subicere se nolunt.

Paralyſis apoplexiæ succedanea rarissimè curatur, & plerumque in apoplexiam iterum degenerat, ex novo ejusdem materiæ ad cerebrum affluxu, quod ex priori morbo debilitatum est.

Tremor paralyfi superveniens, salutaris. Significat enim meatus nervorum aliquo modo aperiri, per quos aliquid spiritus animalis, ad musculorum motum efficiendum, transire incipit.

Laz. Riverii Opera.

Si pars paralytica calore actuali prædita sit, sanitatis spes est, si verò actu frigida continuo sentiat, difficillimè curatur.

Atrophia, aut insignis extenuatio, parti paralyticæ adveniens, & pallor ingens, curationis spem adimunt. Non solum enim spiritus animalis defectum, sed & calorem naturalem propemodum extinctum arguunt.

Si resoluti lateris oculus imminuatur, exigua curationis spes est: summam enim spirituum penuriam in ea corporis parte significat.

Crurum & pedum resolutio facilius curatur, quàm partiū superiorum: quia illi nervi duriores ac robustiores sunt.

In senibus paralyſis incurabilis est, ob caloris nativi inopiam.

Hyemis tempore paralyſis curari nequit; vere autem & æstate curatio obtineri potest: si cetera consentiant.

Paralyfi febris valida superveniens, bona: materiam enim morbificam absumere potest.

Paralyfi debili & recenti diarrhœa superveniens, bona: dicit enim Rhasis 1. contin. se multos paralyticos ex diarrhœa superveniente curatos vidisse.

Curatio paralyſis juxta varietatem causarum varianda est: Et cum ut plurimum fiat à pituita & frigida intemperie, hujus causæ ablationi præcipue incubendū est. Hæc autem ab universali totius corporis evacuatione inchoanda est.

Et quidem quod ad venæ sectionem attinet, vix ea conferre potest, cum sanguis non peccet, sed pituita: & plerumque hoc malum senibus, pituitosis, naturâ frigidis accidere solet: Si tamen crudi sanguinis copia humorem pituitosum producere videatur, eumque fovere; venam in brachio partis sanæ aperire licet: attamen parca manu, ne languidus calor extingatur.

Prætermisâ igitur phlebotomiâ, aut parca manu, ut dictum est, celebrata: reliqua curatio inchoanda est à sublatione causæ antecedentis, quæ est frigida cerebri intemperies. Ejus curatio eadem omnino instituenda est, quæ antea fuit proposita, per apozemata, pilulas, diætam sudorificam, sacculos, emplastra, errhina, sternutatoria, apophlegmatismos, vesicatoria, pulverem cephalicum, cucumam, suffumigium, syrupum magistralem, pilulas usuales, opiatam roborantem, causticum, pulverem digestivum, & aquas thermales.

Diætâ ad hunc affectum parari debet ex decocto guaiaci foliis & corticis ejusdem. Post cujus haustum admovendi partibus paralyticis lateres igniti, extincti in decocto cephalico, facto in vino albo cum paucis aceto, & involuti linteis, ut partium calor languidus excitetur. Et quarto, aut quinto quoque die purgatio repetenda. Melius tamen erit, si decocto sudorifico purgans præmittatur ad xv. dies, ut tota humorum crudorum saburra melius educatur, ac postmodum illorum reliquiæ per habitum corporis discutiantur. Illud autem ita parari poterit.

℞. Rasuræ ligni guaiaci ℥. iij. cort. ejusdem ℥. j. aquæ fontis lb. viij. Infundantur per xxiv. horas. Deinde ebulliant ad mediæ partis consumpt. addendo sub finem, senne mund. ℥. j. turbit, hermodact. ana ℥. ij. Colaturæ capiat. lb. ss. mane, sine sudore per xv. dies.

Causticum applicetur occipiti vel brachio sano, si alterum sit affectum, utrique, si tibiæ tantum laborent.

Post diætâ utatur, pro potu ordinario, bochetto ex guaiaco, vel hydromelite, in quo tantillum rorismar. bullierit, à vino abstinendo, quod in hoc affectu valde nocivum est. Si tamen ægrum vini cupiditas teneat, betonica & salvia in eo infundantur. Et longè efficacius erit si tempore vindemiarum prædictæ herbæ in dolium vino recenti plenum conciantur.

Si affectus sit contumax, post diætæ usum, omissis syrupo magistrali, & pilulis usualibus prædictis, fortiores usurpandæ sunt, in hunc modum compositæ.

℞. Massæ pilul. scetidæ. major. & cochiar. min. an. ℥. ss. trochisc. alhandal. gran. iv. Capiat semel in septimana.

Sed quia humor ante quamlibet purgationem præparatione indiget; ideò per biduum, aut triduum, ante singulas doses pilul. capiat ℥. iij. vel iv. aquæ sequentis, manè duabus horis ante pastum.

Y 2

℞. Rasur.



℥. Rasur. ligni guaiaci ℥. iv. corticis ejusdem ℥. i. radic. falsæ paril. ℥. i. β. rad. chinæ ℥. i. ligni sassafras β. v. ligni aloës, galang an. ℥. i. β. rad. angel. pœoniæ, fœniculi, an. ℥. iij. sem. pœoniæ ℥. ij. Infundatur per 24. horas in aquæ fontis ℥. iv. vini albi ℥. iv. Postea adde fol. betonice. ivæ arth. salviæ, an. M. i. flor. tiliæ, primulæ veris, stæchad. & anihos, an. P. ij. lavendulæ P. i. theriacæ ver. ℥. β. sem. & cortic. citri. an. ℥. ii. β. polypod ℥. β. cinamomi ℥. v. Fiat secundum artem destillatio in B.M. pro ℥. ij. β. liquoris destillati, adde manus Christi cum oleo cinam. paratæ ℥. iv. Vel loco illius aquæ, opiata caput roborans, in frigida cerebri intemperie descripta, usurpari poterit. Sed multò efficacius, & cum majori fructu, opiata Montagnanæ, in epilepsiæ curatione descripta.

Cæteris purgantibus parum proficientibus, haud erit inutile ad vomitoria chymica transcendere, si æger satis robustus sit: qualia in soporosis affectibus fuere proposita. Illa enim humores contumaces ex alio trahunt, & morborum interdum, qui vulgaribus remediis extirpari nequiverunt, curationem absolvent.

Diebus vacuis ab usu aliorum remediorum, utatur opiata cephalicâ, descriptâ in curatione frigida intemperiei cerebri, vel aquâ apoplecticâ vel tabellis pro soporosis affectibus propositis.

Post universales evacuationes ad topica veniendum est quæ & parti resolutæ applicanda ad calorem & spiritus revocandos; & spinali medullæ, ubi ut plurimum mali causa hæret, ad eam exsiccandam & discutiendam.

Pars ergo affecta pannis calentibus quotidie fricetur sed leniter: ne quod de naturali calore & spiritibus attractum est, iterum dissipetur.

Cucurbitulæ etiam applicentur capitibus musculorum partis affectæ, eæque sint angustioris orificii & cum multa flamma adhibeantur: nec tamen diu affixæ maneant, ne quod attractum est dissipetur. Postea emplastr. ex pice & resina pini applicetur, ut quod attractum est, ibi conservetur. Vel membrum resolutum urticis viridibus leniter percutiatur, aut ipsi sinapismi imponantur, donec pars tubescere incipiat, ea tamen non sunt tamdiu in parte relinquenda ut vesicæ excitent, sic enim spiritus & sanguis dissiparentur: sed tamdiu solum donec pars rubicunda digito pressa non albescat, sed rubicunda permaneat.

Postea inunctiones fiant & parti affectæ, & spinali medullæ, oleis, unguentis & balsamis, quorum descriptiones apud Autores numerosæ habentur. Ad hanc rem peculiaris est efficaciæ balsamum Guidonis quod apud Pharmacopœos nostros perpetuò paratum invenitur. Hoc vel solo utimur, vel cum aliis permixto in hunc modum.

℥. Ol. vulpini, lumbricorum & castoreo, an. ℥. j. balsami Guidonis ℥. iij. aquæ vitæ ℥. β. olei rorismar. destill. ℥. i. β. Misce, fiat linimentum, quo inungatur tota spina dorsii, & partes resolutæ calidissimè, supertegendo eas linteis calidissimis. Sequens etiam unguentum à Valeriola in observationibus plurimum laudatur.

℥. Fol. salviæ, majoranæ, betonice, lauri, rorismar. & primulæ veris, an. M. i. radic. acori veri, & ireos recentis, an. ℥. iij. olei vulpini, de nucle Indica, & rutacei, an. ℥. i. olei terebinthinæ ℥. β. vini potentissimi ℥. i. aquæ vitæ ℥. β. Coquantur simul ad vini consumptionem, & colentur. Colaturæ adde ferapini, opopanax. bdellii, an. ℥. ij. castorei ℥. β. macis nucis moschat. styracis calamitæ, benzoini, an. ℥. iij. piperis longi, pyrethri, an. ℥. i. axungie cati pinguioris, axungie serpentis, & anseris, an. ℥. i. medullæ cruris bovis ℥. ij. succorum ebulli, salviæ, & Melissæ, an. ℥. ij. ceræ propoleos ℥. ij. Misce, & cum ceræ q. s. in prædictis oleis liquatæ reducantur omnia ad formam unguenti mediocris consistentiæ, quo universa dorsii spina calidè inungatur, desuper admotis lanis mollibus, vel linteis calidis.

Majoris etiam efficaciæ, & minoris operæ unguentum parari potest in hunc modum.

℥. Succ. scillæ ℥. iv. succi cucumeris sylvestris, succi rutæ, an. ℥. i. euphorbii, castorei, sagapeni, ammoniaci, bdellii in aceto solutorum, ad. ℥. i. β. myrrhæ, thuris, pyrethri. nitri. an. ℥. i. olei sambuci, terebinthinæ, & de euphorbio, an. ℥. β. ceræ q. s. Fiat unguentum secundum artem.

Hujusmodi linimentis præcipue utendum est tempore diætæ, post detersum sudorem, & in usu thermarum etiam post sudorem; quia tunc temporis pori cutis & partium referati, unguenti penetrationem facilius admittunt.

Lintea post inunctiones applicanda suffumigentur, & incalescant suffitu sequenti.

℥. Succini, mastiches, myrrhæ, an. ℥. i. thuris ℥. ii. caryophyll. nucis moschat. cinnam. macis, an. ℥. β. ligni aloës ℥. β. Pulverisata irrorentur spiritu vini, postea exsiccantur, & iterum irrorentur quinquies, & exsiccantur. Et fiat pulvis, qui injiciatur prunis pro suffumigio.

Si his malum non cedat, cerata & emplastra supra spinam dorsii erunt applicanda.

℥. Massæ empl. de beton. de melilot. & de baccis lauri, an. ℥. i. thuris ℥. β. castorei, euphorbii. an. ℥. i. sem. nigell. nasturtii, sinapi, radic. pyrethri, salis nitri, ana ℥. β. Cum oleo de lateribus redigantur in formam emplastri, quod super alutam extensum applicetur. Longè majoris erit efficaciæ emplastrum in hunc modum compositum.

℥. Picis navalis, galbani, sagapeni, & gummi ammoniaci, an. ℥. i. radic. Pyrethri, & sem. sinapi, an. ℥. β. euphorbii ℥. ii. ceræ flavæ ℥. iij. olei terebinth. q. s. Fiat massa emplastri.

Sudores quoque in parte provocare utile fuerit, per evaporationes ex decocto herbarum & radicum cephalicarum, cum vino albo ita parato, ut halitus partem affectam attingant. Si nimirum decoctum calens in vas aliquod infundatur, in quo æger jejunos ita sedeat contentus, ne decoctum attingat, sed vaporem tantum excipiat. Vel in balneo sicco, quod stupham vulgò appellant, vapor ex decocto prædicto, silicibus candentibus insperso, excipiat.

Ad sudores hujusmodi movendos, valdè commendatur decoctum rad. bardanæ, seu lappæ majoris. At nostrates mulieres ad hos affectus, & dolores artuum diuturnos, utuntur decocto ebulli, quo sudores copiosi eliciuntur. Ubi æger satis sudarit, in lecto componatur, exhibita theriacæ ℥. i. cum aqua conveniente. Ejusmodi autem balneis bis, aut ter in septimana utendum est. Autumni quoque tempore, vinaceis effervescentibus membra per horam unam aut longius spatium immergere, & postea linimento convenienti inungere, toto vindemiarum tempore, summè utile fuerit.

Denique thermæ sulphuræ, nitrosæ, & bituminosæ supra recensitæ, maximè conveniunt, & reliquorum remediorum vires plerumque superare solent, si iis æger utatur per aliquot dies in potu, balneo, & lotione capitis, & post sudorem, ungatur linimentis prædictis.

Chymici commendant multa remedia ad hujus morbi curationem. Ex quibus non infimum locum obtinet elixir proprietatis, spiritus tartari, & balsamum galbani.

Toto morbi decursu partes resolutæ probè muniantur pellibus vulpinis, leporinis, agninis, & similibus.

Paralytis vero, quæ, à bilioso humore, aut melancholico producit, eandem curationem postulat, quæ ad melancholiam hypochondriacam præscripta est: ita tamen: ut in affectu magis bilioso, remedia magis ad frigiditatem inclinantia eligantur.

## CAPUT VI.

### De Convulsione.

**S**pasmus, seu convulsio, est nervorum musculorumque, versùs suam originem, involuntaria & perpetua retractio.

Duplex autem est convulsio. Altera propriè dicta, cui jam proposita definitio competit: Altera impropriè, quæ potius motus convulsivus dici debet. Eæ ita distinguuntur, quòd in vera convulsione retractio musculorū sit perpetua, seu continua & indefinens; in motu verò convulsivo interpolata. Præterea in vera convulsione membrum est immobile; in motu convulsivo variè agitur ut in epilepsia, quæ inter motus convulsivos principem locū obtinet.

Differunt etiam inter se ratione causarum. Vera enim convulsio



convulsio fit à repletionem & inanitionem : motus verò convulsivus ab irritatione. Denique in eo distinguuntur quod convulsio à solo morbo sit; motus verò convulsivus à sola facultate. Quæ ut rectè à junioribus intelligantur, sciendum est ex Gal. 2. de sympt. caus. c. 1. depravati motus symptomata inter se distingui, quòd alia solius naturæ sint opera, quæ tamen à morbosa quapiam causa violentè moveri sit coacta : alia morbosos comitentur affectus, natura ad eorum generationem suppetias minimè ferente : alia denique concurrente simul naturâ & morbo fiant. Naturæ autem nomine Galenus facultatem intelligit. Facultatis ergo opera sunt sternutatio, tussis, olcitatio, pandiculatio, & singultus. Unius autem morbi opera sunt palpitatio, & convulsio. Utriusque verò, morbi scilicet & facultatis opera sunt, tremor & imperfecta resolutio.

Ex Galeni dictis supra positis gravis difficultas emergit, cum ille singultum recenset inter opera, quæ à facultate fiunt : Fit enim perpetuò ab irritatione, & est motus convulsivus : convulsionem verò inter opera, quæ à solo morbo fiunt, Gal. recenset. Attamen Hippoc. Aphor. 39. sect. 6. convulsionem & singultum à repletionem & inanitionem fieri affirmat; cum tamen repletio & inanitio veram tantum convulsionem efficiant. Ad cujus difficultatis resolutionem dicendum est repletionis nomen latè sumptum, irritationem etiam comprehendere, juxta multorum authorum sententiam; quia causæ irritantes materiales sunt, atque adeo replent aliquo modo partes, in quibus continentur. Sed hoc modo repletio non est causa proxima singultus; sed tantum mediata, quatenus partem, in qua est quantitate vel qualitate sua irritat ad expulsionem.

Denique sciendum est, & diligenter annotandum, Hippocratem & Galenum motum convulsivum communi & generico convulsionis nomine simpliciter enuntiare : ita ut non, nisi per supra positas differentias, invicem distinguere possint.

Vera autem convulsio rursus dividitur in universalem, quâ totum ferè corpus contrahitur; & particularem, quæ certum aliquod membrum convellitur.

Universalis, vel causam habet in cerebro; quando nimirum cum universo corpore, muscoli etiam faciei convelluntur : vel in exortu spinalis medullæ, cum muscoli caput & spinam moventes, vel anteriores, vel posteriores, vel utrique convelluntur : unde tres exurgunt convulsionis differentiæ. Prima Emprosthotonos dicitur, quando corpus cum cervice & capite violentè ad anteriora contrahitur, ut mentum pectori annectatur, & corpus carinam navis referre videatur, imò verò interdum in arcum contorqueatur, quandoque in orbem, ægrique caput genibus annexum habeant. In hac differentia duo muscoli, caput ad anteriora flectentes, præcipue afficiuntur. Secunda Opisthotonos nominatur, quando corpus ad posteriora convellitur, & in ea muscoli duodecim caput extendentes, aut eorum nonnulli convelluntur. Tertia Tetanos dicitur, quando muscoli & nervi, tam anteriores, quam posteriores contrahuntur æqualiter, partesque ab oppositis musculis extractæ, velut in æquilibrio positæ, rigidæ & erectæ permanent, & ille motus Tonicus appellatur; qui omnium violentissimus est, cum ex omnium musculorum contentione oriatur.

Particularis convulsio fit ex contractione musculi partis alicujus, à nervo illius motioni destinato, malè affecto & interdum ab affectu vel symptomate particulare nomen fortitur. Sic convulsio musculorum oculos moventium, strabismus nominatur : mandibularum & musculorum temporum, trismus dicitur; oris convulsio, ex contractione lati musculi, ex una tantum parte oriunda, spasmus cinicus, convulsio canina, & oris tortura nominatur, si verò in utraque parte contractio fiat, risus sardonius appellatur. Interim tamen oris tortura sine convulsione contingit; nempe ex paralyfi alterius musculi, quo relaxato, ejus antagonista os ad partem sanam contrahit, & distortio in ea apparet, quæ convulsio improprie nominatur. Musculorum penis convulsio, satyriasis vel priapismus dicitur.

Reliquæ verò convulsionem propriis nominibus designantur.

Causæ veræ convulsionis immediatæ, juxta Hippocratis, & Gal. placita ad repletionem & inanitionem referuntur ut antea dictum est. Et confirmatur hæc doctrina exemplo chordarum, quæ in lyris & citharis tendi consueverunt : quod sæpè & elegantissimè inculcatur à Galeno, nempe lib. de tremore, palpit. & convuls. cap. 8. tertio de locis affectis, cap. 6. secundo de symptom. caus. cap. 2. & comment. Aphor. 39. sect. 6. Dum enim chordæ ab humore replentur, quod in austrinis constitutionibus solet contingere, tenduntur & disrumpuntur. Si verò præter modum arefiant, ut in constitutione Aquilonia fit, contrahi, & disrumpi etiam contingit. Eodem modo lora, prope ignem sicciscentia, tenduntur & contrahuntur. Idem nervis omnino solet contingere, qui vel ab humore repleti, vel nimium rarefacti, tenduntur & contrahuntur, & musculos simul, ad quos inferuntur, retrahunt ad suum principium, unde totum membrum convellitur.

Causæ mediata convulsionis, quæ repletionem aut inanitionem efficere possunt, variæ sunt. Ac primum causæ repletionis referuntur à Galeno, lib. de tremore, capite ultimo, ad humoris pituitosi affluxum & inflammationem. Humor pituitosus ad nervos influens eos distendere censetur secundum latitudinem, unde secundum longitudinem contrahi necesse est.

Verum hîc gravissima sese offert difficultas, quænam scilicet differentia sit constituenda inter causam paralyfis & convulsionis; Et quando utraque fit ab humore pituitoso, in nervos influente : cur materia paralyfin efficiens, nervos ita replendo, ut omnes illius meatus occludantur unde spirituum animalium transitus impeditur, non faciat nervi distensionem in latitudinem, atque adeo convulsionem; Et cur materia convulsionem efficiens, nervos replendo, meatus illorum obstruat, ut paralyfin efficiat, cum tamen in convulsione sensus integer maneat, & pars affecta ut plurimum gravissimo dolore torqueatur. In hoc dubio resolvendo auctores variè se torquent, & qui inter subtilissimos principem locum obtinent, ingenii sui captum superare fatentur. Acutissimus Averroës tertio collige in hæc verba erumpit : *Utinam scirem, cur distendantur in latum nervi, & non in longum.* Mox subjicit : *Scias, Medicorum verba in hoc symptomate inversè propria esse verbis musicorum, seu fabellas canentium, quàm demonstratorum.* Et subtilissimus Argenterius comment. Aph. 26. sect. 2. sic loquitur. *Non est facile per os elo reddere omnium rationem, & præsertim, cur pituita, quæ resolutionis nervorum, & convulsionis causa dicitur, nunc unum nunc aliud ex iis malis inferat : cum enim eadem materie sit & eadem pars affecta, nempe nervus, cur idem non semper sit effectus?* Hæc Argenterius. Summa rei difficultas in varias sententias Auctores distrahit, ita ut nonnulli ab Hippoc. & Gal. doctrina omninò desciverint, inter quos recenseri possunt Averroës, Erasius, Platerus, Cæsalpinus, Sennertus, alique quorum varias cogitationes, & prolixas hac de re disputationes recensere, instituti nostri ratio non patitur, qui summam breviter in hoc opere affectamus, & omnes controversias ablegamus, iis tantum inhærentes, quæ ad medicinam faciendam maximè necessaria sunt. Saniorum decisio, à Galeni placitis recedere nolentium, eò revolvitur : convulsionem fieri ab humore crassiori, qui nervos secundum latitudinem extendit, & secundum longitudinem coarctata, paralyfin verò ab humore tenui, qui per nervi substantiam decurrit, eamque emollit, poros autem illius non extendit. Hæc tamen animum veritatis avidum omninò non explent. Si enim humor crassus, nervum replendo, eum in latitudinem extendit, cur poros illius, & meatus insensibiles non implet, & spirituum animalium influxum non impedit, atque adeo paralyfin inducit? Et cur paralyfi, saltem successu temporis, non succedit convulsio, cum humor tenuis, in parte diu hærens, necessariò crassescat, ita ut etiam serosa materia, arthritidem efficiens, longa mora in partetophaceam materiam acquirat. Alii dicunt, in convulsione partem tantum nervi exteriorem & membranofam ab humore



humore obsideri, in paralyfi verò medullarum. Sed hoc multò minus satisfacit. Cum enim nervi majori parte exiles admodum sint, non est facile concipere, quomodo humor partem tantum nervi exteriorem occupet, illàsa interiori, aut vice versa. Vel saltem, si hoc ita posset contingere, paralyfi ut plurimum convulsio succederet, & convulsioni paralyfis, multiplicata materia morbifica, & quæ exteriorem partem solum, vel interiorem tantum ab initio occupabat, successu temporis totum nervum invaderet.

Nos igitur licet in tanta difficultate nobis ipsis satisfacere nequeamus, nec certiora ab aliis proponantur, existimamus prædictas objectiones dilui posse dicendo, convulsionem & paralytin in eo differre, quod paralyfis ab humore pituitoso puro & impurissimo generetur, qui quidem humor tensionem non efficit in partibus, sed eas potius relaxat, ut in oedemate videre est: convulsio verò ab eodem humore fiat, non quidem sincero sed plurimis flatibus permixto, à quibus flatibus præsertim tenduntur nervi ac muscoli, & versus suam originem contrahuntur. Nulla etiam causa excogitari potest aprior ad tam vehementem contractionem efficiendam, quam spiritus flatuosus, quam etiam agnovit Galenus 2. *de sympt. causa cap. 1.* & docet experientia, maximas distensiones à flatibus præsertim fieri, ut videre est in hydrope tympanite, & colico dolore. Adde, quod in convulsione ut plurimum gravissimi dolores reperiantur, quos à flatibus distendentibus fieri creditile est. Hac decisione dilui possunt omnes objectiones supra propositæ. Si enim quærat, cur pituita convulsionem efficiens, paralytin non afferat, spiritus animalis influxum impediendo? dicere poterimus, eam esse in perexigua quantitate, ut meatus nervi insensibiles occludere non possit, & multis flatibus permixtam ita attenuari, ut obstructionem parere non valeat. Vel certe dicamus; spiritum flatuosum præcipuam esse causam convulsionis, quam Galenus loco citato, & lib. 6. *de loc. aff. cap. ult.* priapismi (qui à membri virilis convulsione fit) causam unicam proposuit spiritum flatuosum.

Altera causa convulsionis à repletionem factæ, quam proponit Galen. loco citato. est inflammatio partium nervosarum, præcipue in nervorum principio, aut prope ipsum, qua nervi tenduntur & contrahuntur. Et exciatur illa inflammatio vel à causa interna sola; nempe à fluxu sanguinis in partem; vel à causis externis, ut vulnere, contusione, punctura nervi.

Causæ convulsionis ab inanitione sunt omnes immodicæ evacuationes per hæmorrhagiam, vomitum, alvi fluxum, sudores, tum etiam maximæ humidi primigenii consumptiones, quæ contingunt in febribus ardentibus & colliquantibus, laboribus immodicis, vigiliis, sollicitudinibus, venere immodica, fame & siti, & usu diuturno alimentorum & medicamentorum calefacientium & exsiccantium.

Hæc etiam convulsio ab inanitione à non paucis rejicitur, existimantibus, tantam siccitatem in corpore vivente reperiri non posse, ut inde nervi contrahi valeant: illa quippe in febre hectica & marasmo præcipue contingeret. Quibus tamen abundè satisfieri potest, dicendo non omnem inanitionem aut siccitatem idoneam esse convulsionem efficere; sed eam tantum, quæ confertim & inæqualiter fit. Quando quidem subita interni humidi facta inanitione, partes connivent, & in se concidunt, vacuum fugientes. Si verò æqualiter undique & sensim exhauriatur humiditas, nulla fit contractio quia inanitæ partes ingressu aëris occupantur.

Morus convulsivus fit à materia ingente, vellicante & irritante partes nervosas: estque ut plurimum humor, vel vapor acrimonia aut alia quavis maligna qualitate præditus, qualis in febribus malignis sæpius contingit. Fiunt autem isti morus convulsivi plerumque, cerebro & nervis per sympathiam affectis, & convulsio sympathica non inatur. Compationitur autem vel per nudam condolentiam, & generis, officii aut vicinæ societatem; vel à prava qualitate, aut aura veni nata ad initium nervorum transmissa; Sæpius autem fit per consensum

oris ventriculi, à bile æruginosa, vermibus, veneno, aut alia materia acri & vellicante: tum etiam per consensum uteri, sicut in hysterice affectibus contingit.

Diagnosis convulsionis ex iis, quæ in principio hujus capitis proposita sunt, facile elicitur. In vera enim convulsione pars contrahitur, ac rigida & immota manet, ut flecti aut moveri pro arbitrio non valeat. In motu verò convulsivo pars variè concutitur & agitur.

Quod ad prognosin attinet, convulsio quæ multas partes, & præsertim cerebro vicinas occupat, periculosior est: Tum etiam, quæ musculos thoracis obsidet. Metus enim est, ne ob difficilem respirationem æger suffocetur.

A copioso sanguinis fluxu vel hypercatharsi convulsio lethalis, ex Hippocr. in Aphorismis, quia, ut docet Galenus in commentariis, talis convulsio ab inanitione fit. Attamen fieri potest, ut talis convulsio interdum ab irritatione fiat, commotis humoribus acerbis biliosisque, & ad partes nervosas translatis, vel à qualitate maligna venenati medicamenti, ut ex assumptione hellebori contingit.

A phrenetide convulsio lethalis. Aëtius affirmat se neminem ex iis, qui ita convulsi sunt, servatum vidisse neque qui vidisset, audivisse.

Febrem convulsioni supervenire, melius est, quam febri convulsionem. Aph. 5. *sect. 2.* Febris enim convulsioni superveniens, illius causam absumit. Convulsio autem febris superveniens, à materia maligna oritur, quæ vitæ periculum minatur.

Quicumque tetano corripiuntur, in quatuor diebus pereunt: si verò effugerint, sani fiunt Aph. 6. *sect. 5.* Maxima enim tensio omnium musculorum respirationem impedit, ita ut ægri suffocati moriantur. Et notanda est causa interitus in convulsione, quæ non videtur alioqui periculosa ratione causæ nervos obsidentis, quemadmodum paralyfis à simili ferè causa oriunda, ad multos annos producit. Sed lethalis evadit convulsio ex eo solum, quod suffocationem inducat, convulsis musculis respirationi dicatis.

Curatio hujus affectus varia est pro varietate causarum. Quæ ab inanitione fit, rarissime contingit, & incurabilis est, ideo illius therapie non immorandum. Authores humectantia omnis generis præferunt, & inunctiones ex oleis chalcidicis. Ea verò, quæ fit ab irritatione, ab aliis morbis dependet, & illorum curationi subjicitur. Superest igitur ut convulsionis à repletionem curationem proponamus: quæ cum à pituita & flatu potissimum dependeat, ad illorum sublationem dirigenda est. Eaque primum à venæ sectione auspicanda, si sanguis abundet, & vires sint validæ. In qua tamen evacuatione satius est peccare in defectu quam in excessu; cum illa causæ principali, quæ pituita est contraria sit.

Post venæ sectionem, aut ea omisâ, si conveniens non sit purgatio instituenda est per pilulas, quæ satis potenter evacuant, (habita tamen virium ratione) juxta formulas in frigida cerebri intemperie descriptas. His verò adjungenda sunt castorei gr. iii.

Si pilulas fastidiat æger, potionis, pulveris, aut alterius medicamenti forma usurpari poterit, prout dicto capite habentur.

Post purgationem admoveantur cucurbitulæ cum scarificatione, si sanguis non fuerit detractus alioqui sicca, primum quidem partibus remotioribus, postea affectæ parti vicinæ. At si crura sint convulsa, natibus & lumbis applicentur: si brachia, collo & scapulis. Hoc in omnibus observando; ut fluxio versus originem retrahatur.

Vesicatorium etiam partibus affectæ oppositis utiliter admovetur.

Interim post primam purgationem materia præparanda est apozemate descripto in curatione intemperiei frigide. Purgante quidem, si vires & reliqua consentiant sin minus, detractus purgantibus.

Finis apozemate, iterum pilulæ exhibendæ, castoreum illis & omnibus purgantibus adjiciendo.

Si apozema tantum alterans usurpetur, durante illius usu, clysteres acres frequenter injiciendi, & quales in soporosis affectibus fuerunt propositi.

Fiant



Fiant etiam inunctiones supra partem affectam, linimento convenienti.

℥. Unguenti de althæa 3. vi. ol. terebinth. & chamæmel. an. 3. j. ol. lavendulæ 3. iii. ol. vulpini 3. β. styracis liquidæ 3. ii. fiat linimentum, quo inungatur pars affecta calidè frequenter, & spina dorsii. Vel

℥. Ol. anethini & chamæm. ana 3. j. unguenti martiati 3. β. ol. petrolei & de spica, ana 3. j. spiritus vini 3. iii. Misce.

Maximè laudatur axungia anseris, aut anatis, in sequentem modum parata.

℥. Anatem aut Anserem pinguem deplumatum, & exenteratum, quem reple materia sequenti.

℥. Fol. salviæ, majoranæ, & stœchad. an. M. j. gummi ammoniaci & bdellii, ana 3. i. calami arom. nucis moschat. macis, caryophyl. ana 3. β. Contundantur in mortario, & malaxentur cum ol. lumbricorum, postea includantur ventri anseris, qui benè consuatur, ne quid effluat, & in veru assetur. Pinguedo exstillans excipiat vasa aceto semipleno, eaque illinantur partes affectæ.

Efficacius operabitur, si usurpetur in sequentem modum.

℥. Pinguedinis prædictæ 3. vj. oleor. ceræ, nucis moschat. & salviæ arte chymica extractorum, ana 3. iii. Misce, fiat linimentum.

Post inunctionem partes convulsæ contegantur pelle arietis adhuc calente: & cum refrigerit, si novarum non sit copia, recalescat oleo anethino, aut simili valdè calente.

Utiliter etiam parti convulsæ adhibentur pulmones vervecini calentes, tum etiam pulli columbini, catuli, galli, gallinæ per medium sectæ.

Pars etiam affecta in intima bovis, aut vervecis, aut majoris alius animalis recens cæsi, immittitur: Et ibi tamdiu detinetur, quamdiu animal calet.

Balnea decocto herbarum cephalicarum etiam conveniunt, addita olei tertia parte, vel inunctis mox à balneo partibus convulsis.

Alii hoc emplastrum commendant.

℥. Colophonæ 3. ii. resinæ, picis navalis, ana 3. j. thuris, massiches, cerussæ, ana 3. β. sanguinis draconis, salis communis, salis ammoniaci, terebinth. ana. 3. ii. ceræ novæ 3. ii. vitrioli albi 3. ii. matris perlarum 3. ii. lapidis magnetis 3. β. succini flavi 3. i. ol. ovor. rosac. ana 3. ii. Fiat secundum artem emplastrum, quod alutæ inductum imponatur.

Præstantissima verò sunt balnea sulphurea in diuturnis præcipuè convulsionibus. Conveniunt etiam balnea sicca, seu vaporosa ex decocto salviæ, rorismar. stœchados, chamæp. origani, & similium, cum vino albo lapidibus ignitis, cupro, aut scoriis ferri ignitis infuso.

Optimum etiam est fovere occiput & cervicem aqua vitæ calente.

Penotus sequens linimentum mirè prædicat, ad convulsionem brevi tempore dissolvendam.

℥. Ol. terebinth. 3. β. ol. caryophyll. gutt. vi. mucilaginis bryoniæ, q. s. ad consistentiam linimenti. Misce, inunge locum affectum cum radicè sui nervi.

Alii oleum seu spiritum salis cum oleo terebinthinæ, ceræ, chamæmeli & similium commixtum, membra convulsa citò restituere asserunt.

Linimentum sequens eximia est efficacæ.

℥. Buryri rancidi, & laridi veteris, an. quart. i. bdellii, ammoniaci, an. 3. j. myrrhæ, castorei, an. 3. ii. flor. stœchad. & anthos, P. j. nucis moschat. & caryophyl. an. 3. i. catum parvum exenteratum, excoriatum, & in frusta divisum. His infarciatur anser, & consuatur, ac torreatur in verni. Primus qui stillabit succus magis aqueus, abijciatur; secundus verò pinguior, colligatur in vase aqua semipleno, eoque illinantur partes convulsæ & tota dorsii spina.

Interdum verò dolor tam intolerabilis sentitur, ut ad eum priùs cura dirigenda sit. Illi igitur convenit sequens linimentum.

℥. Olei violacei, lilior. & chamæmeli, an. 3. j. β. olei amygdalarum dulcium, massiches, & rosac. ana 3. j. Misce, inungatur pars affecta. Si potentius agendum sit, paretur sequens balneum.

℥. Rad. althææ, & liliorum, ana. lb. β. fol. malvæ, violariæ, origani, salviæ, absinthii, M. ii. sem. lini & scœnogr. ana lb. j. Decoquantur pro balneo, in quo diu non immoretur æger, sed dolore sedato confestim egrediatur. Sufficiet autem partes convulsas tantum immergere.

Alii parant balneum ex oleo puro, & si æger sit dives, in eo decoquunt vulpem unam, aut alteram.

Dum hæc fiunt, cerebri expurgationi incumbendum est apophlegmatismis & errhinis, suis capitibus descriptis.

Tum etiam eadem pars roboranda est opiatâ cephalicâ, aquâ apoplecticâ, theriacali aut aliâ earundem virium.

Rondeletius de aqua sua hirundinum hæc habet: *Aqua ex hirundinibus & castoreo parata, exhibita, convulsionem à repletionem subito cessare facit.* Ejus descriptio est in cap. de epilepsia, apud Autorem dictum.

## C A P U T VII.

### De Epilepsia.

**E**pilepsia est convulsio totius corporis, non perpetua, sed interpolata, cum mentis & sensuum læsione.

Convulsionis nomen hic propriè & strictè non sumitur pro vera convulsione; sed impropriè pro motu convulsivo. Sed convulsionis nomen retinere volumus, imitatione Galeni, qui eam passim convulsionem appellat.

Hac autem definitione ex Gal. desumpta 3. *de loc. aff. cap. 7. & lib. de diff. sympt. cap. 3.* perfectam & integram Epilepsiam proponimus, in qua totum corpus convellitur, & omnes sensus, tum interni, tum externi abolentur. Dantur tamen imperfectæ Epilepsiæ, in quibus caput tantum, vel brachium, vel tibia, & femur, vel dimidia corporis pars convellitur. Datur etiam Epilepsia, in qua integra mens remanet, sensus etiam exteriores vigent, necnon quarundam partium motus voluntarius. Vidi Monialem, quæ in paroxysmis epilepticis contractiones varias patiebatur, nunc brachiorum, nunc crurum, nunc capitis, nunc trunci totius corporis: videbat tamen adstantes, & loquebatur: imo verò contra motum partium, quæ convellebantur, motu voluntario obnitebatur, ita ut motum involuntarium quodammodo minueret. In paroxysmo leviori interdum stabat, & in cubiculo ambulabat; sed motu admodum inordinato, saltando scilicet, & motus præposteros edendo, instar histrionum, quibus reliquis Monialibus risum concitabat, & cum illis etiam ridebat, & pro arbitrio loquebatur.

Omnis motus convulsivus, ut superiori capite dictum est, fit ab irritatione. Irritatio autem fit à materiæ quantitate, vel qualitate. Quantitas, materiæ morbificæ naturam gravans, eam irritat ad expulsionem ejus, quod sibi molestum est. Unde stabilitur, me iudice Galeni doctrina, à quam plurimis neotericis variè exagitata, quæ sancitum est ab obstructione imperfecta ventriculorum cerebri Epilepsiam generari. Si enim humor obstruens naturæ molestus est, quidni cerebrum insurgere poterit ad illius exclusionem? De qualitate nulla est difficultas. Omnes enim in id consentiunt, facultatem expultricem singularum partium irritari ab acrimoniâ, & pravâ quavis qualitate naturæ insensâ.

Causæ irritantes vel in ipso cerebro continentur, & Epilepsiam idiopathicam efficiunt; vel aliunde ad cerebrum transmittuntur, & sympathicam Epilepsiam generant.

Illa autem irritatio Epilepsiam facit, quandoquidem cerebrum, dum rem noxiam expellere conatur, seipsum concutit, & consequenter nervos sibi adnexos.

Triplex à Galeno constituitur Epilepsiæ differentia & ab omnibus propemodum authoribus recipitur. Prima, qua cerebrum afficitur, consistente in ipso affectu. Secunda, in qua cerebrum per ventriculi consensum afficitur. Tertia cum aliis corporis partibus ad cerebrum affectus transmittitur. Et propria etiam nomina, apud nonnullos, sortitæ sunt istæ differentiæ. Prima enim tanquam præcipua, generis nomine, Epilepsia nominatur; secunda, analepsia; tertia, catalepsia. Verum (pace Galeni, aliorumque dixerim)



dixerim,) superflua est illa divisio, & frustra separatur Epilepsia à ventriculo genita, ab aliis, quæ per aliarum partium sympathiam oriuntur: cum omnes utro sympathicæ Epilepsiæ nomine comprehendi debeant. Neque satisfacit, dicere: Epilepsiam à ventriculo seorsum enuntiar, tanquam frequentissimam: siquidem ea, quæ ex uteri aut lienis consensu oritur, non minus frequens, aut certè frequentior esse consuevit.

Dividatur ergo Epilepsia in idiopathicam & sympathicam. Sympathica rursus juxta varias partes, à quibus vapores acres aut maligni ad cerebrum transmitti possunt. Nulla autem propemodum pars in toto corpore reperitur, à qua malignus vapor ad cerebrum transmitti nequeat. Harum historiarum duæ proponuntur à Galeno *loco citato*. Una de puero decimum tertium ætatis annum agente, in quo paroxysmus à tibia initium capiebat, mox illinc rectè ascendebat (per fessuram & superposita illa, ac per latera ad cervicem, donec ad caput perveniret, quod cum primum tangeret, ipse haudquaquam sibi constabat. Altera est de adolescente, qui invadentis paroxysmi initio, veluti frigidam auram ascendere sentiebat.

A ventriculo autem, intestinis, & materia verminosa, tum etiam ab utero, aliisque partibus Epilepsiam, plerumque generari notissimum est, & variorum authorum historiis confirmatum.

Constat igitur ex prædictis, quomodo defendi possit Galeni doctrina, ab imperfecta ventriculorum cerebri obstructione idiopathicam Epilepsiam generari afferentis, quam tamen causam perpetuam esse, defendere non possumus, ut Galenus innuere videtur, nullam aliam proponens; quin potius, eam ceteris infrequentiore esse confiteri cogimur.

Neque tamen argumenta adversus Galenum proposita ullo modo convincunt: quorum præcipua hæc sunt.

Primo enim inquit Fernelius, si Epilepsia ab humoris copia fieret, in sopore ea maximè contingeret, in quo magna humoris copia reperitur. Respondeo, humorem, à quo sopor excitatur, esse in substantia cerebri, non in ventriculis; & idè facultatem expultricem non irritare, quæ in ventricularis magis residet.

Secundò, ex eodem Fernelio cum Epilepsia citò solvatur, desineret in paralyin, ut apoplexia, excusso in nervos humore. Respondeo, in apoplexia humores excui ad partes viciniores, propter debilitatem expultricis, à copia humoris oppressæ: quæ cum liberior sit in Epilepsia, ad vias naturales, expurgationi dicatas humores amandat. Falsum tamen est, quod asserit Fernelius, nunquam Epilepsiam desinere in paralyin; nos enim paralyin Epilepsiæ succedaneam vidimus. Et non rarò apoplectici in prima invasione convulsionibus Epilepticis corripiuntur, nondum perfecta obstructione ventriculorum cerebri, tum etiam multi Epileptici tandem apoplexia pereunt, quando dimidia obstructio in integram degenerat.

Tertiò, contra Galenum nonnulli ita argumentantur. Sicut completa ventriculorum obstructio functiones penitus tollit in apoplexia, ita incompleta eas tantum imminueret, non depravaret, neque motus illos convulsivos ederet, sanis plerumque validiores. Respondeo; naturam omnino oppressam ab integra obstructione non excitari ad expulsionem: in dimidiata verò obstructione satis habere virium, ut cerebrum commoveat, & exagitet ad expulsionem. Confirmatur doctrina exemplo catarrhi in pulmonem delabentis, qui si totum pulmonem repleat, summam spirandi difficultatem efficit sine ulla tussi, ut in asthma contingit. Si verò minor fluentis humoris copia extiterit, pulmo irritatur ad expulsionem, unde tussis excitatur.

Signa Epilepsiæ diagnostica in tres ordines distribuenda sunt quæ scilicet imminentem Epilepsiam significant, quæ præsentem demonstrant, & quæ illius differentias præstanciant.

Imminentis Epilepsiæ signa dupliciter considerari possunt: vel prout primam morbi invasionem præstanciant; vel prout imminentem paroxysmum significant, Eadem autem signa utrique indicio inserviunt, sed multò certius

in iis, qui ab Epilepsia actu possidentur, imminentem insultum indicant. In iis enim, qui nunquam hætenus morbo affecti sunt, æquivoca majori ex parte sunt hujusmodi signa, & multos alios capitis affectus prænuntiare possunt. Integra tamen eorum congeries aliquam certitudinem afferre potest.

Omnia igitur imminentis Epilepsiæ signa proponenda sunt: hac præmissa admonitione, non omnia in omnibus Epilepticis concurrere, sed nonnulla in his, alia in illis pro varia causarum & corporum dispositione. Ut autem ea debito ordine proponantur, fontes signorum percurrendi sunt, qui ab actionibus animalibus, vitalibus, & naturalibus excrementis, qualitatibus immutatis, & propriis accidentibus scaturiunt.

Ratione functionum animalium, Epilepsiam minantur animi & corporis insueta conturbatio, capitis gravitas, cephalalgia, vertigo, vigilia, aut plurimus somnus, à quo nullum levamen emergit, insomnia turbulenta, mentis torpor vel anxietas, oblivio, mœstia, pavor, formido, segnitie, artuum gravitas. Saltus & tremores membrorum, sensuum hebetudines, obtutus defixus, scintillæ oculis obversantes, & interdum nubeculæ, aut marmatyges. Aurium tinnitus, fœdi odoris perceptio, lingua inflexibilis, ejusque inordinata motio, oscitatio, sternutatio.

Ratione functionum vitalium, Epilepsiam minantur, cum aliorum signorum concursu, iracundia, cordis palpitatio, pectoris restrictio, anhelitus mutatio.

Ratione functionum naturalium, Epilepsiæ prodromi sunt cibi fastidium, aut appetitus immodicus, nausea molesta, cardiogmos, seu oris ventriculi morsus.

Ratione excretorum, Epilepsiam portendunt, salivæ per os effluvium, urinæ tenues & crudæ, pollutio nocturna frequentior.

Ratione qualitatis mutatae, & propriorum accidentium, Epilepsiam portendunt faciei pallor, & præcordiorum inflatio.

Præfens Epilepsia etiam vulgo notissima est, si omnibus suis numeris absoluta sit. Multas tamen habet differentias, quæ difficilem interdum faciunt diagnosin, ut ex sequentibus videre est.

In paroxysmo Epileptico integro & absoluto sensus omnes, tum interni, tum externi intercipiuntur. Æger subito in terram concidit, & totum corpus, aut partes tantum nonnullæ variis motibus concutuntur: adest præterea oculorum prominentia, stridor dentium, respiratio suffocatoria, velut in iis, qui laqueo strangulantur; semen, stercus & urina involuntariè aliquando profunduntur; & circa finem accessionis spuma per os & nares effluit: quæ non nisi in vehemente Epilepsia contingunt, & finita accessione, rerum omnium quæ in paroxysmo actæ sunt oblivio remanet.

Antiquorum nonnulli tres Epilepsiæ differentias faciunt: unam quæ somno similis alissimo videtur: aliam quæ variis motibus corpus exagitat; tertiam denique, ex utriusque commixtione constata. Primam speciem recentiores quidam admittere nolunt, dicentes, illam coma potius aut carum esse, quam Epilepsiam: & non alia ratione distingui inter se hos duos affectus, quàm ex eo, quod coma sit somnus profundus sine convulsione, convulsio autem sit signum pathognomonicum Epilepsiæ. Verum aliter docet Avicenna, dicens, sæpè evenire epilepsiam sine spasmo sentato, id est, nulla convulsione apparente. Et docet experientia multos Epilepticos habere paroxysmos comati per similes. Esse autem Epilepsiam, non coma, vel carum, ex eo tantum cognoscitur, quod sopor ille per intervalla periodicè recurrat, cum coma semel tantum invadat, neque periodico recursum obnoxium sit.

Idiopathica Epilepsia à sympathica distinguitur: quòd in idiopathica multa appareant cerebri affecti indicia. Mentis torpor vel tarditas, memoriæ imminutio, insomnia turbulenta, sensuum hebetudo, corporis gravitas & segnitie, capitis dolor, aliaque: præterea æger venientem paroxysmum non percipit, sed ab eo incautus subito opprimitur. Tum paroxysmus in coitu Solis & Lunæ ut plurimum contingit. Hanc diagnosin confirmat bona



bona partium inferiorum diathesis, & nullum vitium in iis apparens.

Dextram verò, aut sinistram capitis partem magis affici & mali mineram continere, ex eo dignoscitur, quod visio alterius oculi obtusior sit, vel auditus in altera aure hebetior, aut tinnitus eam afficiat, & partes dextræ vel sinistræ ad motum, aliasque actiones ignaviores sint.

A quo verò humore præsertim Epilepsia generetur, ex signis pituitam, bilem, aut melancholiam in toto corpore, & capite præsertim redundantem, indicantibus dignoscere poterimus.

Symphathica verò Epilepsia inde dignoscitur, quòd nulla appareant cerebri affecti signa; æger venientem paroxysmum percipiat, & interdum veluti auram quandam, à partibus inferioribus ad cerebrum ascendentem: aut pars aliqua inferior peculiari quodam vitio labefactata est, aut tempore invasionis gravi aliquo symptomate affecta.

Sic à ventriculo communicari Epilepsiae causam, ostendunt cibi fastidium, difficilis inediae tolerantia, nausea, vomitus, ventriculi dolor, erosio, compunctio, vel distensio, vel etiam interdum cordis palpitatio, ventriculo cordi affectum communicante.

Ab hepate, vel liene malum oriri, significant flatuum frequens & copiosa excretio, ventris inflatio, rugitus, borborygmi, ructus acidus, præcordiorum molesta coarctatio, eorumque dolor ad dorsum usque interdum procedens. Quibus addere licet vitia peculiarem ventris inferioribus partem obsidentia.

Ab utero effectum procedere indicat hysterica passio, convulsionibus epilepticis implicita; tum si menses aut seminis retentio præcesserit.

Si à parte aliqua externa Epilepsia oriunda sit, aura quædam percipitur à parte illa elevari, & minera morbi in ea delitescens, velicat interdum, aut titillat, quod imminuentem paroxysmum prænuntiat. Et si pars illa constringatur vinculo, impeditur paroxysmus.

Denique à lumbricis procedere affectum ostendunt signa lumbricos indicantia, ut anhelitus, foetor acidus, narium pruritus, ventris dolor, faeces cineritiæ, stridor dentium, sopor, & similia tum præcipuè si lumbrici per alvum interdum externantur.

Ratiores verò causæ & extraordinariæ, ut abscessus, ossis caries, unguis suppressio, anadrome, & similia, ex propriis signis mutuari poterunt.

Quod ad prognosin attinet: Epilepsia morbus est diuturnus, & contumacissimus, & infantibus ut plurimum lethalis.

Epilepsia hæreditaria incurabilis est, quæ verò à causis externis, & prava victus ratione ducit originem, curationem admittit.

Epilepsia ante pubertatem eveniens, curabilis est, eadem verò post 25. annum, curationem non admittit, ex Hipp. *Aphor. 8. sect. 5.* Siquidem in pubertate magna fit caloris nativi eclampsis, quæ causas morificas discutere potenter valet. Adde quod tunc temporis in foeminis menstrua erumpere incipiant, per quæ impuritates corporis expurgari solent. Licet autem post 25. annum incurabilis dicatur Epilepsia ab Hipp. hoc tamen non est perpetuæ veritatis. Multos enim ætate proventus, ab hoc morbo liberatos fuisse, plurimis observationibus relatum est, quamvis tamen hoc raro contingat; sicque Aphorismum prædictum ut plurimum, & ferè semper verum esse statuendum est.

Vehemens Epilepsia sæpe in paroxysmo ægrotantem abripit, & de medio tollit, vel etiam in apoplexiam degenerat, & vel propter pravitatem symptomatum & violentam cerebri concussionem, tota illius œconomia vertitur, ut interdum particulae illius diffingantur; & contigerit aliquando, processuum mammillarum particulas per nares explosas fuisse.

Epilepsia à melancholico humore oriunda, in melancholicam insaniam nonnunquam degenerat: quando videlicet ille humor à ventriculis cerebri in substantiam ejusdem transmittitur. Idem etenim humor, dum cerebrum afficit, ut partem instrumentalem, ventriculos illius

obstruendo, aut tunicas eorum divellendo, epilepsiam efficit. Dum verò ipsam cerebri substantiam, quæ functionem principum sedes est, ut similem partem offendit, naturale ipsius temperamentum vitando, & animales spiritus corrumpendo, atque obtenebrando, delirium melancholicum inducit. Unde apud Hipp. *6. epid. sect. 8. textu 40.* melancholici plerumque fiunt epileptici, & epileptici fiunt melancholici. Degenerant autem isti affectus in se invicem dupliciter: vel per materiae morificæ transpositionem, sede derelicta, & sic uno exoriente alter definit; vel per materiae propagationem, & tum uterque affectus permanet.

Epilepsia pituitosa in apoplexiam vel paralyfin degenerat.

Quartana febris, Epilepsiae superveniens, & diu perseverans, eam solvit: quandoquidem à calore febrili materia morifica sensim absorbetur, si pituitosa sit; vel si melancholica fuerit, à parte affecta transmittitur in locum, ubi minera morbi residet, ut novis paroxysmis materiam suppeditet.

Curatio Epilepsiae duplex instituitur, alia in paroxysmo, alia extra paroxysmum.

Ad paroxysmi curationem raro vocantur Medici, nisi ipse interdum longius protrahatur. Quo in casu conveniunt eadem remedia, quæ pro soporosis affectibus fuerint proposita. Præsertim verò aqua apoplectica, cinnamomi, aqua vitæ & aliæ multum spirituosæ, ad paroxysmi materiam discutiendam efficacissimæ.

Extra paroxysmum curatio varianda est pro varietate causarum. Ac primò Epilepsiae idiopathicae curatio proponenda est, quæ in totius corporis evacuatione, materiae morificæ discussione, pravæque illius qualitatis emendatione, cerebri roboratione consistit. Cum autem materia peccans, in idiopathica epilepsia ut plurimum pituitosa sit; nos ad illius oppugnationem curationem universam dirigemus, tyrones alioqui admonentes, ut si humores biliosi, aut melancholici in vitio esse videantur, medicamenta illos præparantia & expurgantia substituantur. Specifica verò remedia, à quacumque causa morbus oriatur, eadem perpetuò usurpanda sunt.

Ad integram ergo curationem sequenti via procedendum est. Primò portio phlegmagoga erit propinanda, aut aliud medicamentum, ægrotantis naturæ accommodum, ex iis, quæ in frigida cerebri intemperie fuerint proposita, injecto prius clystere, si alvus non sit libera.

Postea si plenitudinis notæ appareant, aut æger sit sanguineo temperamento præditus, phlebotomia erit celebranda: sin minus, omittenda.

Mox cura universalis frigidae intemperiei cerebri supra proposita sigillatim celebranda erit, hoc observando: ut decoctis, apozematis, diætæ sudorificæ & syrupo magistrali, tum etiam masticatoriis, & pulveribus cephalicis addantur radix & semen pœoniæ, & viscus quercinus, quæ proprietate specifica epilepsiam curare tota credit antiquitas.

In diætâ verò ex sudorificis guaiacum præferant: cujus usu se multos epilepticos curasse refert Jachinus. Continuetur autem per triginta, vel quadraginta dies.

Singulis dosibus decocti sudorifici aliquot guttæ spiritus vitrioli addantur, qui etiam specificus creditur ad epilepsiam.

Notandum est, purgantia usualia, nimirum pilulas, aut syrupum magistrale, in frequenti usu habenda nempe semel aut bis in septimana, prout vires ægrotantis ferre poterunt; & per plures menses purgationes esse continuandas: imò ad fortiora interdum purgantia esse transeundum, juxta præceptum Massariæ, qui hinc fieri dicit, quod epilepsia raro curetur, quòd Medici semper levioribus inhæreant.

Hac ratione Chymici purgantia mineralia usurpare solent, quæ à remotissimis partibus humores attrahunt: at non sine periculo; præsertim si à peritissimo artifice præparata non fuerint. Si tamen in hoc casu felix eventus ex hujusmodi remediis aliquando contingat; ille in primis sperandus est ex mercurio, per se, vel cum auro calcinato,



in furno arenæ, longo ignis regimine : probè cavendo, ne qua illius portio cruda adhuc & volatilis maneat, quæ summam vehementiam medicamento conciliaret, aliqui satis blandè purganti, si cum pilulis cochiis, aut quod melius erit, cum extracto aliquo phlegmagogo vel panchymagogo, pondere gr. iv. vel v. usurpetur.

Recens autem epilepsia sale vitrioli aliquando curatur quemadmodum refert Angelus Sala, ex hoc remedio, quarto quoque die exhibitio, se epilepsiam tertiam exhibitione curasse. Posterius verò curat. 77. cent. 2. gloriatur se stibio calcinato ter exhibitio puellam undecim annorum ab epilepsia hæreditaria liberasse.

Syrupus de peto Quercet. maximam vim habet ad curandam epilepsiam. Sed nonnisi à prudenti Medico usurpandus, quia vehementissimum est medicamentum.

Loco opiatæ, dicto loco propositæ, sequens, magis huic affectui specifica, erit subroganda.

℞. Conservæ flor. anthos, pœoniæ, buglossi, ana ʒ. β. corticis citri saccharo conditi ʒ. ij. pulv. visci querni, sem. pœoniæ, decrefcente luna collecti, & ungulæ alcis, ana ʒ. β. cranii humani non humati, ad albedinem calinati ʒ. i. β. corall. præp. marg. præp. & cornu cervi præp. ana ʒ. iv. lapid. bezoard. veri ʒ. j. diamoichi ductis, diatriafant. ana ʒ. ij. theriac. ver. & confect. de hyacinth. ana ʒ. ij. spiritus vitrioli gut. xv. Cum syrupo condituræ corticis citri, fiat opiatæ, de qua capiat ad magnitudinem avellanæ, superbibendo aquæ cinnamomi parum.

Sequens verò efficacissima est ad morbum radicitus tollendum, post diligentem corporis purgationem.

℞. Conservæ flor. betonicæ & roris. ana ʒ. ij. β. rad. eryngii conditæ, & mithridatii, ana ʒ. j. pulv. ligni sassafras ʒ. vi. castorei ʒ. iij. cranii humani non humat. ungulæ alcis, ana ʒ. ij. rad. & sem. pœoniæ, nigellæ, rutæ sylvestris; & rad. pyrethri, ana ʒ. j. oxymel. q. s. Fiat opiatæ, de qua capiat ʒ. ij. & iij. Reliquas omnes efficacia superat opiatæ Montagnanæ, cujus beneficio multi epileptici liberantur. Illius descriptio talis est.

℞. Rad. pœoniæ maris, stœchados, costi an. ʒ. x. agari- ci ʒ. v. pyrethri, carvi, sem. anethi, assæ foetidæ, & aristol. rot. ana ʒ. ij. β. succi scillæ, & mellis electi, ana ʒ. j. & ʒ. ij. Scilla & mel simul coquantur lento igne, usque ad bonam consistentiam; deinde superadditis speciebus fiat electuarium, de quo capiat æger ʒ. ij. vel iij. iij. pro ætatis ratione, continuando per 20. aut 30. dies.

Post usum emplastri epispastici, vesicatorium etiam sincipiti erit admovendum, & cauterium posteriori parti cervicis.

At fetaceum multò efficacius humores extrahit à cerebro. Refertque Fabricius Hildanus se juvenem, quotidie epilepsia laborantem, & cui frustra alia remedia adhibita fuerant, & puellam 18. annorum, ab ipsa infantia epilepticam, solo fetaceo restituisse.

Si conjectura sit, vapores ad cerebrum exhalantes à partibus inferioribus affectum producere, vel fovere utilissimum erit, causticum sincipiti admove, vitatis futuris: refert enim Carolus Piso, duos epilepticos hoc cauterio fuisse curatos. Tum etiam si à partibus inferioribus affectus producat, aquæ acidulæ mirabiles sæpè effectus producant, & morbum interdum radicitus tollunt; si prius evacuationes universales, & venarum inferiorum sectiones celebrentur.

Peculiariter verò, ab utero procedens epilepsia, curationem sortitur, pulvere granorum actes à Quercet. descripto in Pharmacop. restit. per triduum exhibitio ad ʒ. i. cum aqua quadam hysterica.

Si cætera non profuerint, extremum remedium erit sinciput terebello perfodere, vitatis futuris, ut hoc veluti spiraculo aura maligna exhalare possit. Hoc remedio aliquando desperatæ epilepsie curatæ sunt. Et sine periculo celebrari potest, si periti Chirurghi manus adhibeatur. Utatur æger pro potu ordinario hydromelite, vel bocheto ex guaiaco, & rad. pœoniæ.

Sacculus de collo suspensus continuò gestabitur, in sequentem modum paratus.

℞. Rad. pœoniæ, visci querc. ana ʒ. j. ungulæ alcis ʒ. ij.

nucis mosch. caryophyll. macis. ana ʒ. ij. fol. rutæ & hyssopi, ana ʒ. j. ss. Pulveriscentur, & rubro sindone excipiantur. Fiat sacculus, deferat appensum collo, sæpe illum odorando.

Post universales evacuationes inter aliorum remediorum usum, specificis præsertim morbus oppugnandus est, quorum infinitus ferè numerus reperitur apud Authores. Nos ex selectioribus nonnulla proponemus, præter opiatas suprâ descriptas, quæ ad hunc morbum expugnandum non infimum locum obtinent.

Rondeletius maximè commendat aquam hirudinum, quam etiam ab eo mutuatus est Quercetanus in pharmacopœa. Non minoris est pretii aqua theriacalis cephalica, syrupus antepilepticus, ab eodem Quercetano dicto loco descriptus.

Radix valerianæ sylvestris à Fabio Columna tantopere celebratur, ut semel, aut bis exhibitam ab epilepsia liberare affirmet. Refertque se hanc multis amicis dono dedisse, qui deinde divino prius numine & fautore glorificato, pulvere hujus radice sibi restitutam sanitatem affirmarunt: Dosis autem est cochleare semis cum vino, aqua, lacte, aut quovis liquore appropriato. Pueris verò in minori dosi cum lacte datur.

Chymici valdè commendant mixturam spiritualem qua in epilepsia nullum medicamentum præstantius exoptari posse asserunt. Illius autem compositio talis est.

℞. Spiritus vitrioli partem unam, spiritus tartari partes tres, aquæ theriacalis camphoratæ partes quatuor. Miscuantur, & vitro bene clauso, per tres, aut quatuor septimanas digerantur. Dosis est ʒ. j. in convenienti vehiculo.

Rulandus oleum ligni heraclei (quod corylinum esse affirmant Chymiatræ,) in frequenti usu habebat; & nonnullas historias refert in centuriis eorum, qui hujus medicamenti usu ab eo morbo liberati sunt. Dosis autem est trium, vel quatuor guttarum, cum liquore idoneo per quinque dies.

Huic nullo modo cedit, aut fortè multò præstantius est oleum succini albi, à perito artifice extractum, quod nullum empyreum redolet, imò verò fragrantissimum expirat odorem. Dosis à ʒ. β. ad ʒ. j.

Oleum buxi ad gutt. iij. cum pari quantitate spiritus sulphuris, & aquæ flor. tilie arboris ʒ. iij. per aliquot dies exhibitum insignis est efficacitæ, & à multis creditur verum ligni heraclei oleum, & per descensum elicitur.

Crato cinnabarim nativam epilepsie magnetem vocat, ex eaque talem pulverem parat.

℞. Cinnabaris nativæ pellucidæ limatæ, & in tenuissimum pulverem tritæ ʒ. ss. coralli rubri & margarit. præparat. ana ʒ. ij. croci orientalis ʒ. j. fol. auri n. xv. Terentur omnia subtilissimè super lapidem. Dosis in ipsa accessione à granis vj. ad ʒ. j. in aquis appropriatis.

At non minoris virtutis censetur à non paucis Chymiatris cinnabarim antimonii quæ post mercurii vitæ extractionem elicitur. Si enim æquali pondere jungatur cum magisteriis perlarum, corallorum, & cranii humani, specificum esse aiunt in epilepsia etiam inveterata. Dosis à granis x. ad xv. in liquore idoneo.

Sympathicæ epilepsie curatio ad partem primariò affectam dirigenda, eaque remediis convenientibus, è propriis capitibus desumendis, evacuanda, & roboranda est: non omisiss specificis & antepilepticis, quæ in omni epilepsia perpetuò usurpanda sunt. Attamen si à parte aliqua externa concitetur epilepsia, præter curationem universalem ad eam peculiariter respiciendum est, & materia maligna in ea contenta educenda, cucurbitulis scarificatis, vesicatoriis, & cauteriis admotis. Et si malum perseveret, supra cauterium, post escharæ casum, cucurbitula frequenter admoveatur; ac tandem, urgente necessitate, ad cauterium actuale confugiendum est. Si à cranii carie malum oriatur, trepano & usione illa auferenda est.

## CAPUT VIII.

### De Epilepsia Puerorum.

**Q**uia iste morbus pueris familiaris, in iisque plerumque acutus & valde periculosus esse consuevit; ideò



ideo peculiaris illius curatio hic seorsum subnectenda est, utpote ab adultiorum curatione valde diversa.

Primò igitur suppositorio vel clystere alvus solvenda est.

Postea, & ferè eodem tempore, purgans medicamentum exhibendum, satis validum, pro ætatis robore, ita ut non dubitemus in puerulis unius anni electuarium diacarthami ad 3. ij. exhibere, si sit affectus ex lacte corrupto. Vel

℞. Hieræ picræ 3. β. j. pulv. de gutt. 3. β. Cum liquore specifico, vel cum melle rosato, fiant pilulæ, quæ dentur.

Cucurbitulæ scapulis & lumbis admoveantur, & cum scarificatione, & si puer sit grandior.

Vesicatorium applicetur posteriori parti cervicis.

Si purgatio non rectè processerit, aut parum profecerit vomitus provocandus est vitriolo albo præparato, vel etiam sale vitrioli. Quod bis, ter, aut quater exhiberi poterit, si affectus protrahatur. Pulvis epilepticus, de gutteta vulgò nominatus, frequenter exhibeatur cum lacte, jusculo, & pana-ellis, 3. β. ad 3. j.

Ille autem pulvis de gutteta in vulgaribus Pharmacopœis descriptus non habetur; sed in Montpelientibus officinis vulgò componitur ex traditiva descriptione, quæ talis est.

℞. Rad. pœoniæ, sem. ejusdem, dict. anni albi, visci querc. ana 3. β. sem. atriplicis 3. ij. cranii humani 3. iij. corall. rubr. præparati, hyacinthorum præpar. 5. j. ungulæ alci præp. 3. j. mosch. 3. j. fol. lauri 3. j. Misce. fiat pulvis.

Exhibeatur etiam aquæ alicujus antepilepticæ cochlear exiguum, vel ejus defectu aqua inam. vel imperialis vel guttulæ aliquot mixturæ spiritualis cum liquore idoneo.

Occipiti admoveatur emplastrum de ammoniaco, de-raso capillitio, fluxionem enim impedit, à capite in spinam ruentem, per partes exteriores.

Synceput verò sequenti pulvere sinapisetur.

℞. Nucis mosc. 3. β. granor. pœoniæ 3. j. flor. laven-dulæ P. j. succini 3. ij. Fiat pulvis.

Vel roborans emplastrum applicetur, in curatione frigida intemperiei cerebri descriptum.

Olei succini guttæ ij. vel iij. cum pari quantitate spiritus vitrioli, in aqua betonica exhibitæ, puerulos à paroxysmo epileptico statim plerumque liberant. Idem oleum naribus illitum multum confert. Loco olei succini, oleum buxi per descensum paratum, utiliter exhibetur, tum etiam aqua flor. tilie arboris; aqua betonica utilior in hoc casu censetur.

Fumus tabaci pueros ab insultu epileptico liberat si minister eum, tubulo attractum, in os pueri apertum frequenter sufflaverit.

Spina dorsii, & membra quæ contrahuntur, inungantur sequenti linimento.

℞. Ol. rutacei, lumbricorum, ana 3. ij. ol. de castoreo 3. j. aquæ vitæ parum. Fiat linimentum.

℞. Theriacæ vet. 3. j. confect. alkerines, & de hyacintho, ana 3. j. aquarum betonica, salviæ, majoranæ, & cinam. ana 3. β. Misce, foveantur nares, tempora, & aures.

Ejusdem aquæ cochlear j. per os poterit exhiberi.

Majori tamen efficacia inunguntur nares, tempora, & vertex capitis, balsamo apoplectico, ad soporosos affectus descripto.

Interim etiam os & palatum, urgente necessitate, eodem balsamo inungi possunt.

Schenckius exotericonum experimentorum cent. 5. n. 85. ex Georgia Kufnero hæc habet. *De epilepsia puerorum expertum medicamentum. Detur de moscho fino ex micro subtili, bis vel ter in die parum, & sic perfecte curantur.*

Dum hæc omnia fiunt, clysteres semel aut bis in die injiciendi sunt, in hunc modum compositi.

℞. Rad. aristol. rotundæ, polypodii quercini, sem. carthami, ana 3. β. sem. pœoniæ, cumini, ana 3. iij. flor. chamomil. & anthos, ana P. j. Coquantur ad 1/2 j. De colat. cape 1/2 β. hieræ picræ 3. iij. mellis anthosati 3. j. olei rutacei & liliorum, ana 3. iij. Fiat clyster.

Inter specifica duo sunt maximè laudata, quæ ideo

Lazar. Riverii Opera.

merentur ad experimentum revocari.

Unum est radix valerianæ sylvestris, supra à Columna commendata, quam ipse asserit in pulverem redactam, & cum lacte exhibitam, multos puerulos liberasse.

Alterum est sel catelli lactentis, quod ab Untzero hisce verbis prædicatur. *Sume catellum parvum nigrum, adhuc sugentem (pro femella verò epileptica sume catellam) eumque strangula ac interfice. Ex interfecti, & per sectionem aperti corpore, extrahere totam cystim felleam vix ij. vel iv. guttas sinceræ bilis in se habentem. Illum biliosum succum omnem puerulo, in paroxysmo epileptico, cum pauxillo aquæ flor. tilie propina, & miraculi instar videbis illum ab hoc morbo è vestigio sanari & curari.*

Si puer epilepticus adhuc lac sugat, habenda est cura nutricia: illiusque lac diligenter examinandum, ne vitio aliquo laboret. Victu nihilominus attenuante utatur, & laudabili vino interdicitur, bibat aquam, vel hydromel, vel bochetum fassaparillæ.

Pueri denique nonnulli adeo huic morbo obnoxii sunt, ut semel curati, tamen soleant recidere. In ò verò in quibusdam familiis omnes liberi hoc morbo solent interfici. Ideò tum iis, qui nuper in lucem editi sunt, tum qui à morbo convalescunt, debetur prophylaxis.

Primò igitur recens natis, antequam lactari incipiant, detur pulveris de gutteta 3. j. cum paucò lacte, eademque dosi ter repetatur intra duos dies.

Isdem verò post aliquot dies à partu, tum etiam iis qui semel epilepsia correpti sunt, causticum occipitio inurere utilissimum est. At multò utilius cauterium actuale, quod apud nostrates nequitiam usurpatur, à vehementioribus remediis, ut terrorem aliquem incutientibus, abhorrentes. Rondeletius tamen hujusmodi cauterium actuale Florentiæ tam usitatum esse affirmat, ut ipsæ mulieres illud, ut torrem ignitum, plerumque applicare soleant. Idipsum testatur Aquapendens in operationibus chirurgicis, & modum applicandi docet cap. proprio de exustione occipitii in infantibus & puerulis.

Purgetur puer bis in mense, cum manna, syrupo rosaceo, aut de chicorio cum rhabarbaro.

Singulis interluniis capiat dosim pulveris epileptici, de gutteta dicti.

Paretur cucufa cerebrum roborans, & suffumigium pro tegumentis capitis, juxta descriptiones in curatione frigida intemperiei cerebri propositas. Tum etiam poterit inspergi capillis pulvis ad curationem hujus affectus supra descriptus.

Nonnulli denique ad præservationem hoc remedium commendant.

℞. Spiritus vini 1/2 iv. castorei. 3. i. rad. pœoniæ 3. iij. Macerentur, & colentur. Colatura totum corpus infantuli ablatur calidiuscule.

## CAPUT IX.

### De Vertigine.

**V**ertigo est falsa imaginatio, in qua omnia objecta & caput ipsum rotari ac circumagi videntur, ut æger sæpè in terram decadat, nisi propinquis adminiculis nitatur.

Objici potest, in vertigine non esse læsam imaginationem: quia si hoc esset, vertiginosi putarent objecta verè in gyrum verti: quemadmodum phrenetici & melancholici verè putant illud esse, quod imaginantur. Respondemus, in vertigine rationem manere integram, quæ cognoscit imaginationis errorem: in phrenitide verò & melancholia rationem cum imaginatione affici.

Duæ illius proponuntur differentiæ. Una vertigo simpliciter, ὁπότε Græcis nominatur, in qua visio illæsa per-manet. Altera σκοτία, tenebrosa vertigo nominatur, in qua oculi simul obtenebrantur, iisque veluti fumus aut nubes quædam aufertur.

In utraque vertiginis specie visio aliquantulum læditur, quia spiritus, qui ad oculos tendere recta solent per nervos visorios transversum moventur, unde oculus illis non adeo commodè fruitur. Sed in vertigine tenebrosa



vehementior est spirituum commotio, ita ut minus ad oculos ferantur, unde visio obtenebratur.

Causa proxima vertiginis est circumvolutio spirituum, producta à materia vaporosa vel flatulenta, quæ in cerebri ventriculos, ac plexum choroïdem irruens, spiritus animales exagitat, & in gyrum commovet, unde species objectorum, per spiritus illos delatæ pari motu cientur; atque ita objecta ipsa eodem motu cieri videntur.

Verum hic dubitare licet, cum vertigo sit symptoma actionis læsæ, & omnis actio læsa ab aliquo morbo immediate dependeat: quomodo circumvolutio spirituum possit esse causa proxima vertiginis, cum illa ad nullum morbi genus referri valeat; Cui dubitationi respondendum est, circumvolutionem spirituum esse morbum in situ; tunc enim spiritus non servant eum situm, quem debent naturaliter obtinere, sed perperam & præternaturaliter moventur.

Hæc tamen responsio gravem patitur instantiam. Morbus enim est affectus veræ partis, spiritus autem non sunt veræ partes. Respondemus, axioma illud verum esse ut plurimum, non autem perpetuò. Et ut consistere possit Galeni doctrina, qua sancitum est, illud quod primò & per se actionem lædit, esse verum morbum: dicendum est nomen partis latius paulò usurpari debere, ut ea omnia comprehendat, quæ ad corporis constitutionem concurrunt, & quæcunque alicujus partis actionem lædunt, morbi nomine esse afficienda. Si color flavus in oculo visionem lædit immediate, & ideo dicitur esse morbus in numero. Sic sapor amarus in lingua, & sonitus aurium sunt morbi in numero excedente, quatenus in iis partibus est aliquid præter illa ex quibus naturaliter constituuntur, quod actionibus officit. Eodem modo circumvolutio spirituum in ventriculis cerebri est morbus in situ, propter rationem dictam.

Vapores autem illi ex pravis humoribus elewantur, non continenter & assiduò; sed per circuitus & intervalla, quoties à causa aliqua externa excitantur. Illi autem humores sunt, quicunque vapores vel flatus emittere nati sunt: sanguis nimirum, bilis, pituita, melancholia, & humor serosus; cum tam calidus, quam frigidus vapor vertiginem excitare possit, ut docet Gal. *de loc. affect. cap. 8. & comment. Aphor. 25. sect. 3.*

Humores illi pravi vel continentur in cerebro, vel in partibus inferioribus. Hinc duplex emergit vertiginis differentia: idiopathica scilicet & sympathica.

Humores aquei & pituitosi in cerebro cumulati, flatus & vapores emittunt à ventriculo ejusdem, qui in iis rotantur, & vertiginem excitant. Atque ideo vertigo idiopathica plerumq; est epilepsiæ aut apoplexiæ prænuntia.

In partibus verò inferioribus, ventriculo præsertim & liene, humores contenti faciliè ad cerebrum vapores transfunt, qui si ventriculos & arterias subeant, vertiginem efficiunt.

Causæ externæ sunt, quæcunque humores subito fundere, & in vapores dissolvere, vel flatibus illis & spiritibus motum inordinatum conciliare possunt. Inter illas recensetur ab Hipp. *aphor. 17. sect. 2.* austrius constitutio, & subita aëris mutatio. His addantur Solis ardor, cibi vaporosi & flatulenti, allium, sinapi, raphanus, legumina, tum etiam ebrietas, ingluvies, exercitia immodica & intempestiva, evacuatio solita suppressa, ira, balneum, inedia, maximè in picrocholis; frequens ac diuturna corporis circumgyratio, diuturnus rotarum, & rerum in circulum motarum intuitus, & aquarum præcipiti cursu labentium prospectus ex loco altissimo in profundum, casus, ictus & percussio capitis vehemens: fractura, vel depressio cranii, cerebri compressionem inducens.

Diagnosin hujus affectus in genere nulla proponenda est, quandoquidem affectus per se satis patet. Attamen in specie signa partem affectam & morbi mineram continentem, tum etiam humorem peccantem indicantia, proponenda sunt.

Idiopathicam vertiginem ex cerebri affectione ortam ostendunt capitis dolor & gravitas, alicujus sensus oblatio, ut visus caligo, seu hebetudo, aurium tinnitus, &

gravis auditus, olfactus, gustusque imminutio. Arteriarum capitis pulsatio, & aliarum partium incolumitas.

Materiam peccantem signa indicantia hæc sunt. Pituitam exuberantem significant sensuum interiorum & exteriorum hebetudo, capitis gravitas, ad motum pigrities, somnolentia, sputio multa, inappetentia, sitis carentia, urina alba & cruda, & reliqua pituitæ redundantis indicia.

Biliosam verò materiam peccare ostendunt vigiliæ, iracundia, actionum promptitudo, sitis, oris amaror, pulsus celeritas, urina tenuis & flava, & similia.

Atrabilarium humorem significant timor, mæstitia, cogitationes turbulentæ, vigiliæ importunæ, insomniæ horrenda, ructus acidi, & similia.

Sanguinem verò redundare ostendunt venarum tensio & tumor, faciei rubor & calor; pulsatio temporum, capitis gravitas ac tensio, somni longiores, insomniæ rerum rubrarum, lassitudo, pandiculatio, urina rubra & crassa, aliquando tenuis & perspicua, ex translatione sanguinis ad caput.

Vertigo sympathica dignoscitur ex absentia symptomatum à capite manantium, & quod nullum vitium in cerebro appareat, quin aliqua pars inferior sensibilem noxam patiatur.

A ventriculo procedere vertiginem ostendunt inappetentia, nausea, ructus acidi, vel nidorosi, dolor ventriculi, aut inflatio.

Jecoris, lienis, aut uteri consensu fieri vertiginem, ostendunt eadem signa, quæ pro Epilepsiâ sympathica, ab iisdem partibus oriunda, superiore capite fuere proposita. Prognosis hujus morbi in hunc modum instituenda est.

Vertigo recens, & rarò invadens, quæ nonnisi à causis externis excitatur, levior est, ac curatu facilior: contra verò, quæ gravior est, frequentior, & antiqua, in Epilepsiâ aut in apoplexiâ plerumque degenerat.

Vertigo in senibus magis periculosa; quia ipsorum cerebrum frigidius ac debilius est, pituitaque abundans.

\* Vertigo, in qua non solum res externæ, sed etiam caput, & totum corpus circumagi videntur, & quæ cum visus læsione accedit, periculosior: majorem enim causæ vehementiam significat. Et si æger in terram concidat, imminentem Epilepsiâ aut apoplexiâ prænuntiat.

Vertigo à calidis humoribus oriunda citius solvitur, quàm quæ à frigidis, quia humores calidi facilius discutuntur.

Curatio vertiginis cum epilepsiæ curatione multum convenit, cum ab iisdem propemodum causis uterque affectus oriatur. Unde fit, ut vertigo sæpè in epilepsiâ degeneret. Attamen cum vertigo sit levior affectus, non tanto indiget remediorum apparatu, ut epilepsiâ: sed ea sufficient, quæ nos hic summarim indicabimus, ubi simul, quid hic morbus peculiariter desideret, breviter exponemus.

Primò itaque si sanguis in toto corpore, vel in capite abundet, phlebotomia celebranda est, & sanguis per intervalla educendus, clystere præmisso aliquantulum acriori.

Deinde purgatio solemnis instituatur apozemate proposito in curatione frigidæ intemperiei cerebri.

Postea ad particulares cerebri evacuationes veniendum est per errhina, sternutatoria, & apophlegmatismos dicto loco propositos.

Cucurbitulæ tum siccæ, tum scarificatæ; frictiones partium extremarum, & apertio hæmorrhoidum celebrentur revulsivis gratia.

Vesicatoria & cauteria ad derivationem applicentur; tandemque adhibenda, quæ cerebrum roborant, vapores & humores discutunt, tam interna, quàm externa, ut opiata, pulvis & cucusa, secundum formulas loco dicto descriptas.

Neque omittatur pulvis digestivus, quia ventriculi imbecillitas etiam idiopathica, ad hujus morbi generationem sæpissimè concurrat.

Ac denique usurpanda ea remedia, quæ proprietate specifica vertiginem curare æstimantur: qualia sunt, quæ pro epilepsiâ curanda fuerunt proposita. Nimirum aquæ antepilepticæ, balsamum pro inunctione narium, tempo-



rum, & verticis capitis, oleum succini, puls cinnabaris, & alia permulta.

Laudatur etiam à Quercetano in Pharmacopœa c. 20. remedium ex stercore pavonis, cujus præparationem & utendi modum apud Authorem videre est.

Si morbus pertinaciter obstat remediis propositis, ad diætam ex guaiaco veniendum est.

Conserva florum calendulæ à nonnullis tanquam specificum vertiginis maximè commendatur.

Cauterium sincipiti admotum maximè laudatur à Zacuto Lusitano lib. 1. Praxis admiranda, obs. 28. his verbis. *Vir quidam tenebricosa vertigine adeò vexabatur, ut illi cerebrum ferè continuò in gyrum ageretur. Cumque plura expertus esset auxilia, & de futura apoplexia timor esset, nullo alio præsidio (præter vacuationes universales & particulares, celebratasque in variis partibus fontanellas, setonemque nuchæ affixum) quàm cauterio bregmati imposito, potuit persanari. Quo solo plurimos, cerebri morbis exitiabilibus correptos, præter Medicorum votum, ad sanitatem, ulceribus diu fluidis permanentibus, perduxit.*

## C A P U T X.

### De Tremore.

**T**remor Græcis τρέμου dictus, est motus involuntarius depravatus, quo membrum per vices elevatur & deprimitur, ex mutua facultatis & gravitatis membri contentione.

Dicitur motus depravatus à Gal. 2. de sympt. caus. c. 1. idemque repetit lib. de sympt. different. c. 3. Sibi tamen videtur contradicere, dum lib. de tremore, cap. 4. tremorem recenset inter motus diminutos. Verum conciliari potest illa contradictio dicendo, motum dupliciter considerari posse; vel secundum seipsum, vel ratione facultatis. Si consideretur secundum seipsum, est depravatus: quia non fit eo pacto, quo deberet. Si secundum facultatem, est motus diminutus: quia fit à facultate debili, quæ satis fortes motus edere non potest.

Instabit aliquis, à facultate debili semper imminutam actionem fieri, non autem depravatam. Respondeo, id verum esse; si tota actio à sola facultate dependeat. Sed tremor fit partim à facultate, partim à gravitate partis, idè est motus depravatus.

Facultas motrix membrum attollere, & in eo situ continere nititur, gravitas verò membri illud deorsum deprimit, unde motus ille tremulus contingit.

Causa proxima tremoris est imbecillitas facultatis motricis, seu potius instrumenti proximi illius, nempe spiritus animalis, qui non sufficit ad motum voluntarium perfectè exercendum.

Debiliores fiunt spiritus, vel ob vitium proprium ipsorum, vel ob nervorum defectum, qui sunt canales, per quos illi deferuntur, & actiones suas exercent.

In spiritibus vitium residet, vel quando sufficienti copia non generantur, vel geniti dissipantur.

Non generantur in sufficienti copia, vel ob frigidam cerebri intemperiem, ut senibus plerumque contingit; vel ob inopiam vitalium spirituum, qui sunt materia animalium.

Dissipantur verò spiritus à multis causis externis, ut immodicis evacuationibus, venere immoderata & intempestiva, dolore magno, diuturno jejuniis, mœrore, & morbis vehementioribus diuturnis.

Nervorum defectu viriantur spiritus, ac debiliores fiunt, cum illi vel frigida intemperie laborant, vel maligna quadam qualitate inficiuntur, vel obstruuntur, vel comprimuntur.

Frigida intemperie afficiuntur ab aère valdè frigido, usu alimentorum frigidorum, & largo frigida potu, natione frequenti in aqua frigida, & aliis huiusmodi.

Maligna qualitate afficiuntur ab usu opii, hyoscyami, papaveris, vel ab hydrargiri vapore, ut in aurifabris contingit, vel ab lue venerea affectis, qui per cinnabari suffitum curati sunt. Sic in febribus malignis tremores eadem causa sæpè contingunt, qui tamen ad motus convulsivos potius referendi, ab irritatione partium ner-

vofarum frequenter oriuntur.

Obstruuntur non totaliter, ut in paralyfi, sed multo levius, ab eadem tamen causa humore non pe pituitoso nervos leviter irrigante, qui à crapula, vinolentia, aliisque causis produci solet.

Denique à nervorum compressione potest interdum fieri tremor, quando humores excrementitii, in toto ambitu redundantes, nervos comprimunt, & liberum spirituum animalium influxum impediunt.

Hercules Saxoniæ, præter causas propositas, à Galeno mutuatas, alium tremorem agnoscit à flatibus excitatum: Cardanus alium, qui à vellicatione partium nervofarum fit. Verum in eo decipiuntur, quòd motus ab illis causis oriundi, ad palpitationem, aut motum convulsivum referri debeant.

Diagnosin huius affectus nulla alia necessaria est, siquidem tremor per seipsum patet. Causæ verò illum producentes, ex propriis signis dignoscendæ sunt: tum causæ externæ, quæ præcesserunt, diligenter investigandæ.

Quod ad prognosin attinet, tremor per se periculosus non est, sed inclinante ætate adveniens, ad mortem usque agrum comitatur. Per accidens tamen lethalis esse potest, quatenus paralyfin aut apoplexiam sæpè præcedere solet.

Curatio tremoris eadem instituenda est, quæ pro paralyfis curatione fuit proposita, ut eam hinc frustra repetere non opus sit.

## C A P U T XI.

### De Phrenitide.

**P**hrenitis est inflammatio cerebri, & membranarum ejus, cum delirio perpetuo, & febre acuta continua.

Inflammationis nomine verum tumorem intelligimus, qui vulgò sytrophica inflammatio nominatur, ex sanguine extravasato, in partis substantiam effuso, oriunda. Ille autem sanguis calidus atque biliosus est, & in cerebri membranis, ipsaque substantia erysipelas exquisitum, vel erysipelas phlegmonodes, vel phlegmonem erysipelatodem inducit.

Per delirium autem, ratiocinationis errorem præcipuè intelligimus. Nam imaginationis solius errorem sine vicio ratiocinationis in phrenitide contingere non posse censemus, quidquid alii sentiant, Galeni auctoritate persuasi, qui lib. de sympt. different. cap. 3. exemplum proponit Theophili Medici, qui tibicines quosdam angulum domus, ubi decumbebat, occupasse, assidueque sonare putabat; atque illos se intueri videbatur partim stantes, partim verò sedentes, & continuò exclamabat, ut foras ejicerentur. In eoque dicit Galenus imaginationem fuisse læsam, illæsa ratiocinatione. Primò enim dicere possemus Theophilum illum phrenitide non fuisse affectum. Galenus enim hunc morbum ipse non describit, cujus verba hæc sunt, de delirio verba faciens, *quod genus Theophilo Medico agrotanti contingit*, sed eum potius melancholia morbo affectum fuisse, quandoquidem melancholici non rarò errant tantum circa unum objectum, & in reliquis constant & benè habent. Sic de Theophilo dicit Galenus, quod in reliquis illi prudentia fuerit, & disputandi; & præsentibus exactè noscendi. Verum ulterius dicimus, in Theophilo non solum imaginationem, sed etiam ratiocinationem fuisse læsam. Quia verè putabat tibicines adesse, eosque ejici cupiebat. Nam quando sola imaginatio læditur, ratio illæsa illum imaginationis errorem agnoscit, ut in vertigine contingit, in qua agris videntur omnia circumvolvi. Attamen ratio agnoscit, non revera ita fieri, sed in eo imaginationem errare.

Neque tamen recipienda est in hoc casu Eustachii Rudii sententia, qui statuit nunquam fieri posse, ut imaginatio lædatur, ratiocinatione illæsa. Quia ratiocinatio circa phantasma operatur ab imaginatione decepta. Atque adeò si ratiocinationi absurda phantasmata offeratur, necesse esse putat, ut intellectus prava illa phantasmata speculando, pravè quoque & absurdè speculetur. Et hinc colligit Eustachius Rudius, in vertigine non esse imaginationem



depravatam, sed meram fieri & simplicem visionis hallucinationem. Dicimus enim intellectum ab uno ad aliud discurre, & circa species memoria retentas eum occupari. Atque adeo licet phantasia aliquid absurdi menti offerat; attamen si species antea perceptæ in memoria adhuc retineantur, & rationi offerantur, errorem illum phantasiæ cognoscere & corrigere potest: si nempe iudicet absurda illa phantasmata, quæ illi ab imaginatione depravata offeruntur, neque loco, neque tempori, neque aliis circumstantiis, quæ adhuc in memoria habentur, & vera esse scit convenire. Sic in vertigine ratione se bene habens rerum omnium externarum, quæ visui offeruntur, ut parietum, laquearium, & pavimentorum circumvolutionem impossibilem esse iudicat, atque adeo falsò imaginationem representari. Sic Philosophus ille, qui à cane rabido demorsus fuerat, dum illi imaginatio lædi incipiebat, balneum ingressurus, falsam canis imaginem in balneo percipiebat, quem tamen imaginationis errorem ratio adhuc integra redarguens, hæc illi verba supeditavit: *quid cani cum balneo?* Et statim in balneum se coniecit, cuius opera morbi imminenti, nempe hydrophobiæ periculo liberatus est.

Phrenitidis species duæ sunt præcipuæ. Vera nempe & legitima, quæ proposita definitione exprimitur, alia non vera, sed spuria, quæ paraphrenitis appellatur. Vera phrenitis alia est in dispositione, quæ frequentissima est: alia verò in habitu, quæ hæctica nominatur: in hac biliosi humores altius cerebro infiguntur; & plures illius partes occupant, ac tincturæ instar adhaerent. Paraphrenitis verò fit, dum calida intemperies cerebro communicatur, vel à toto corpore, ut in febribus ardentibus contingit; vel ex cuiusdam partis inflammatione, ventriculi v. g. hepatis, pulmonis, & potissimum diaphragmatis; quod inflammatione delirium, veræ phrenitidis æmulum, scilicet perpetuum excitari solet. Quod fit ex magno consensu, qui inter cerebrum & diaphragma intercedit, propter nervos insignes, qui ad illud feruntur, & ex motu perpetuo diaphragmatis, cuius ratione perpetuos vapores ad cerebrum transmittit.

Causa verò phrenitidis est sanguis biliosus, cui etiam bilis excrementitia ut plurimum admixta est; & pro variis illius gradibus, majori scilicet, vel minori fervore aut adustione, graviores aut leviores phrenitidem producit. Sic bilis pallida omnium mitissimam, adusta verò, ferinam excitat phrenitidem.

Ut verò fiat inflammatio cerebri & membranarum, oportet sanguinem illum biliosum extravasatum, & in dictarum partium substantiam effundi: quod duobus præcipue modis fieri consuevit, vel cerebro primariò affecto, vel secundariò.

Primariò afficitur cerebrum, quando immediatè à causa aliqua externa incalescit; ut radiis solaribus, meri potu, ira, & similibus, ut sanguis in venis cerebri commotus extra vasa feratur; quod etiam à vulnere, percussione, contusione capitis fieri potest. Et phrenitis hoc modo genita primaria phrenitis dici potest.

Secundaria verò phrenitis illa est, quæ febribus ardentibus vel malignis succedit, quando humoris morbifici portio ad cerebrum detruditur.

Fit enim portio plerumque in huiusmodi febribus, ut natura, à causæ morbificæ malitia perturbata, illius portionem ad viscus aliquod deponat. Unde vidimus pleuritides, peripneumonias, anginas, hepatitides, aliarumque partium inflammationes, illis febribus supervenire. Ita si humores illi ad cerebrum transmittantur, veram phrenitidem efficiunt; & tunc febris delirium præcedit: in primariis verò delirium ab initio cum febre apparet.

Signa phrenitidem imminentem indicantia sunt, vigiliæ, somni turbulenti, sermo in medicus, urina primum crassa, mox tenuis, & diaphana; calor capitis. Hæc enim indicant materiam calidam ad caput ferri. Oculi immutantur, quia læso cerebro, spiritu animali destituntur. Dolor circa occiput persentitur, quia venæ jugulares ad eam partem feruntur, & sanguinem biliosum refundunt.

Præsentem verò Phrenitidem indicant delirium affiduum, quia cerebrum indefinenter afficitur: vigiliæ turbulentæ, ab intemperie calida cerebri productæ, respiratio magna & rara, quia phrenitici respirare obliviscuntur. Cum enim per oblivionem, aut maximam mentis occupationem, infinitis phantasmatis, quæ in imaginatione delira representantur, & spiritus animales evocant, rara fiat respiratio, magnitudine raritas compensatur. In phrenitide etiam sitis nulla est, aut saltem perexigua, quamvis præsentis sint intensæ sitis causæ, quia mens ægrotat, & quia animales spiritus ob læsum cerebrum non mittunt radios sufficientes ad os ventriculi superius, ad quod sitis pertinet. Pulsus parvus est, quia cor compattitur, durus, ob membranam inflammata; celer & frequens, propter magnam necessitatem; nonnihil undosus, quia cerebrum afficitur. Febris etiam est continua; quia inflammatio cerebri necessariò febrem accersit. Lingua denique aspera, & admodum nigra vel citrina; propter vapores biliosos, illius humiditates absumentes.

Hæctica phrenitis ex eo dignoscitur, juxta Hippocr. præceptum 2. *prorrhet. text. 3.* quod in ea delirium sit mite & obscurum, ægri non loquantur, sed quieti maneant, atque dormire videantur.

Phrenitis vera à paraphrenitide distinguitur ex eo, quod affectus, qui hanc producit, multò citius manifestetur, quam delirium, & eo ingravescente vel mitescente, delirium intentetur vel minuat, inò per vices intermittit, & non est continuum. At verò paraphrenitis, ex septi transversæ inflammatione orta, in qua delirium est continuum, aliis signis distinguitur: Quod nimirum in vera phrenitide respiratio sit magna & rata, in ista verò parva & frequens. Parva quidem, quod diaphragma inflammatione obfessum, non possit facile extendi & dilatari: frequens verò, propter necessitatem, ut frequentia parvitas compensetur. Deinde in vera phrenitide vox est gravis, & in ea ægrotantes admodum vociferantur; in hac verò vox acuta, quia respirationis organum est impeditum. Ac denique in septi transversæ inflammatione hypochondria sunt rursus revulsa, secundum Hippocr. in *Coacis*. Et ratio est, quia diaphragma inferiori parte tegitur membrana à peritonæo mutuata: atque ita, dum inflammatur, peritonæum retrahit, & cum peritonæo hypochondria.

Causarum denique signa ex humoris in toto corpore prædominio, tum etiam ex modo delirii mutuari poterunt. Pallida enim bilis phrenitidem efficit mitiorem; flava ferociorem, adusta ferocissimam. Sanguis verò biliosus, omnium mitissimam & cum risu conjunctam.

Prognosis hujus affectus ut plurimum lethalis est, pauci enim evadunt, quia pars nobilis gravissimè afficitur.

Maximam tamen solutionis spem præbent delirium cum risu, omnium symptomatum vehementia minor, virium constantia, tum si post summum morbi vigorem inignis aliqua evacuatio contingat, per sudores, hæmorrhagiam, aut alvi fluxum.

Lethalem verò affectum ostendunt, lingua & manus tremulæ, stridor dentium, convulsio, rigor in principio morbi apparens, & quando ægri floccos & sarcinas colligunt, & festucas carpunt. Eiusdem efficacitæ sunt ad prognosin lethalem efficiendam, stilla sanguinis nigri è naribus emanans, albæ dejectiones, urinæ albæ & pellucidæ. Hæc enim omnia significant magnam cerebri oppressionem, vel bilis à toto corpore in partem affectam translationem.

Ad hujus affectus curationem sanguis ad caput affluens, evacuandus, revellendus, derivandus, repellendus, interceptendus; qui jam affluxit evacuandus & discutiendus est, partis intemperies corrigenda, robur illius & totius corporis observandum.

Hæc omnia præstari poterunt sequentibus remediis.

Ante omnia mox ab initio, & quacunque diei hora, quia morbus est acutissimus, venæ sectio instituenda est, præmissis clystere, ex cephalica: vel si magna adsit sanguinis copia, ex basilica, vel mediana primum, & post aliquot horas ex cephalicâ.



Si ex mensium, vel lochiorum, vel hæmorrhoidum suppressione malum oriatur, saphena in pede aperienda. Postea ad cephalicam veniendum, ut quod in capite receptum est, vel proximè in id movetur, educi valeat.

Unica phlebotomia ad hujus affectus curationem ut plurimum non sufficit; sed bis, ter, & amplius principio vel augmento morbi, pro humoris copia & conditione, ægrotantis ætate, temperie, viribus, repetenda.

Si febre continua laboranti phrenitis supervenerit, (ut non rarò fit in earum febrium augmento vel statu, quibus naturam errantem, & materiæ morbificæ malignitate perturbatam, biliosos humores ad caput transmittere videmus,) licet antea ratione febris sanguis detractus fuerit; repetenda est venæ sectio. Sed quia vires à febre & prægressa evacuatione debilitatæ sunt, parcius sanguis detrahendus est. Ideò tunc temporis vena cephalica aperiatur, vel si vires id non ferant, saphena, in alterutro pede, vel utroque: cujus venæ in talibus morbis apertio plurimum utilitatis affert. Neque minoris tamen est efficaciæ, hæmorrhoidum apertio per hirudines.

In omni autem venæ sectione, quæ præsentè delirio fit, hoc observandum: ut foramen non amplum fiat. Sic enim vulnus citò coalescit; quod etiam accuratè obligandum est, ne ab ægro dissolvatur: Tum ad promptiorem coalitum utile erit emplastrum ex aloë, albumine ovi, & pilis leporis paratum applicare.

Post venæ sectionem provocetur somnus. Nam si à sanguine evacuato procedunt vigilæ, de novo accensis humoribus, æger ferocior evadit. Conciliatur verò somnus tum repellentibus remediis sincipiti admotis, tum etiam refrigerantibus & hypnoticis, quorum seriem infra proponemus.

Cum venæ sectioni non est locus, cucurbitulæ cum scarificatione profunda applicentur, primò partibus inferioribus, postea superioribus. Tum etiam cucurbitulæ non scarificatæ cruribus & aliis partibus applicentur.

Frictiones in iisdem partibus, ligaturæ in tibiis celebrentur, revulsionis gratia. Vescicatoria etiam scapulis & brachiis utiliter admoventi poterunt.

Clysteres singulis diebus injiciantur, ex refrigerantibus & humectantibus parati. His enim humorum acrimonia temperatur, eorumque motus ad inferiora promovetur. Eorum autem formula talis esse poterit.

℞. Radicum althææ ʒ. j. foliorum malvæ, violarum, lactucæ, parietariæ, betæ, an. M. j. florum nymphææ & summit. anethi, an. P. j. prunorum par. vi. Coquantur in aqua hord. In colaturæ ʒ. j. dissolve cassiæ recentè extractæ, & diaprun. simpl. an. ʒ. vj. sacchari rubri ʒ. j. Fiat clyster.

Hujusmodi clysteribus ne misceantur olea; quia faciliè inflammantur.

Purgatio in phrenitide primaria, quæ scilicet alteri morbo non succedit, nullo modo convenit. In ea verò, quæ febre continuæ supervenit, aliquando confert. Si nimirum magna sit cacochymia, & phrenitis incipiens: tunc etiam materia est errabunda, & pro turgente habetur, atque adeò ex consilio Hipp. *Aphor. 22. sect. 1.* per initia statim evacuanda est.

Purgatio etiam debet institui ex decocto refrigerante, cum purgantibus benignioribus, ut senna, rhab. cassia, tamarindis, catholicone, & syrupo rosaceo.

Statim verò post venæ sectionem ad repellentia veniendum est, quæ humorum accessum impediunt, caputque refrigerant. In hunc finem oxyrrhodina usurpantur, quæ ex oleo rosaceo & aceto ab antiquis componebantur. Recentiores verò aquas stillatitias & succos herbarum adjiciunt; & magis vel minùs refrigerantia ac repellentia fiunt, prout magis vel minùs fluxio & inflammatio urget, cui rei diligenter attendendum est. Ideò plures eorum formulas hîc describamus, ut casibus particularibus aptiores eligi possint.

℥. Ol. rosac. ʒ. iij. aceti rosac. ʒ. j. aquæ rosar. & plantagin. ana ʒ. ij. Admoveantur sincipiti raso, & temporibus cum pannis quadruplicatis. Vel

℥. Aquæ rosar. ʒ. iv. olei rosac. ʒ. ij. aceti rosac. ʒ. ʒ.

albumina ovorum n. ii. Conquassata misceantur. Vel

℥. Ol. violar. rosar. nymphææ, ana ʒ. ʒ. aquæ rosar. lactucæ, sempervivi, ana ʒ. ij. aceti ʒ. ʒ. Misce. Vel

℞. Succo lactucæ, portulacæ, folani, umbilici Vener. ana ʒ. ij. ol. rosac. ʒ. iij. aceti rosac. ʒ. ʒ. Misce. Vel

℥. Ol. rosac. omphac. ʒ. j. ʒ. unguenti popul. recentis, (nam vetus calefacit) ʒ. i. aceti rosac. ʒ. ʒ. albumen ovi n. j. Agitentur omnia simul, excipiantur stupis cannabinis, & applicentur.

Lac mulieris quæ puellam peperit, cum succo lactucæ, & oleo rosaceo subactum, instar oxyrrhodini admotum, mirè delirium sedat.

Circa hujusmodi refrigerantia hoc observandum, ut cautè, & cum judicio usurpentur, cum cerebrum suapte natura frigidum sit, & membrum princeps, ac metus sit, ne diuturniori horum remediorum usu æger in contrarium affectum, scilicet comatosum, inducatur, præsertim si senex fuerit, aut admodum debilis. Ac licet nunc longiori, nunc breviori tempore eorum usus continuandus sit; tamen circiter ad dies tres potest extendi.

Ut verò ista medicamenta haud faciliè diffuant, neque oculos & faciem, aliasque partes inquinent, corona ex panno lineo, vel lana convoluta, anteriori capitis parti imponatur, ut caput circundet parte anteriore in media fronte ex lateribus supra aures: Parte posteriore versùs occiput, & in medio coronæ remedia applicentur. Ista verò remedia, juxta Gal. præceptum 2. de compos. med. c. 2. hyeme actua calida vel tepida; æstate frigida applicanda sunt. In sene tamen aut debili melius est actua frigida non admovere.

Si inflammatio ad cutem & partes exteriores vergere videatur, quod nonnunquam accidit, tunc temporis à repellentibus, præsertim fortioribus, abstinendum est: ne materia ad cerebrum repulsa, gravius malum efficiat.

Ad humoris quoque ad caput fluentis impetum interceptiendum, fasciæ, aquæ rosar. & aceto madidæ, inter initia collo circumjiciendæ.

Cautica & vescicatoria, tibiis admota, humorum revulsionem ad inferiora plurimum adjuvant.

Interim dum hæc fiunt, quæ totum corpus & præcipuas partes refrigerant, tum interna, tum externa, in usum revocanda sunt.

Interius usurpari poterūt julepi, emulsiones, & electuar.

℥. Aquar. lactucæ, portulac. rosar. & papav. rhœados, an. ʒ. iij. syrupi violac. & granat. an. ʒ. j. ʒ. falis prunellæ ʒ. iij. fiat julep. pro iij. dosib. bis aut ter in die sumendi. Vel

℥. Fol. lactucæ, portulacæ, plantag. ana M. ij. florum nymphææ, & violar. ana P. i. Coquantur in aqua hord. ad ʒ. i. ʒ. In colat. dissolve syrupi violac. ʒ. iij. falis prunellæ ʒ. iij. Fiat julep. pro iij. dosibus.

Julepis perpetuò, præter salem prunellæ, optimum erit spirituum sulphuris aut vitrioli admiscere, his enim bilis fervor optimè temperatur.

℥. Quatuor seminum frigidorum maj. mundat. ʒ. vj. sem. papav. albi ʒ. ij. aquæ hord. ʒ. ʒ. aquar. lact. & nymphææ, an. ʒ. ij. aquæ rosar. ʒ. j. Fiat emulsio secundum artem, pro duabus dosibus, addendo syrup. violac. ʒ. ij.

℥. Conservæ viol. & rosar. an. ʒ. j. conservæ flor. nymphææ, & caulium lactucæ condit. an. ʒ. ʒ. pulv. electuarii diamarg. frig. ʒ. ʒ. Cum syrupo violaceo fiat electuar.

Parari etiam potest electuarium ex sem. papav. albi in mortario marmor. contuso, & cum saccharo permixto, quod diacodium album potest nominari. Humores enim calidos & acres temperat, & somnum conciliat. Fit ex sem. papav. ʒ. j. contuso, cum tantillo aquæ rosar. deinde adde sacchari ʒ. ij. vel utriusque partes æquales.

Exteriùs verò admoventur epithemata refrigerantia cordi & hepati.

℥. Aquæ rosar. ʒ. iv. aquar. borrag. bugloss. & acetos. ana ʒ. ij. aceti vini albi ʒ. ʒ. pulv. trium fanta. ʒ. i. ʒ. spodii ʒ. ʒ. ligni aloës ʒ. j. croci gr. viij. camphoræ. gr. vj. Fiat epithema cordi.

℥. Aquar. lactuc. & rosar. ana ʒ. iij. aquarum endiviæ & portulac. ana ʒ. ij. aceti rosac. ʒ. j. fantali albi, rubri, spodii, ana ʒ. j. camphoræ, & spicæ nard. ana gr. v. pulv. electuarii diarrhod. abbat. ʒ. j. Fiat epithema hepati.

Item



Item hepatis & lumborum regio inungatur sequenti linimento.

℞. Unguenti rosac. ℥. j. β. cerati fantal. ℥. j. succi lactuc. & olei rosac. ana ℥. β. Fiat linimentum.

Pectus etiam oleis relaxantibus, ut violaceo, inungatur. Testes linteis oxycrato madidis involvantur, vel quod erit præstantius, aqua rosarū cum tantillo aceti usurpetur.

Lotio pedum ex decocto refrigerante actu calido commendatur: nam calore humido eas partes relaxat, & humorum motum ad inferiora promovet. Frigiditas verò illius potentialis per nervos toti corpori, & cerebro in primis communicatur, somnusque conciliatur. Illius autem formula talis est.

℞. Fol. violar. malvæ, salicis, vitis, nymphææ, ana M. ij. flor. nymphææ, rosar. ana M. i. cap. papaverum n. x. fiat decoctio ad usum dictum.

Aqua pura ad lotiones pedum sufficere potest, in aqua subfrigida si pedes ægrotantis mergantur per tres aut quatuor horas, à delirio liberatur, somnusque conciliatur.

Similem effectum præstat sedum majus contusum instar cataplasmat, & plantis pedum admotum; tum etiam cucurbita contusa, & eodem modo apposita.

Odoramenta etiam naribus frequenter admota cerebrum refrigerant, in sequentem modum parata.

℞. Florum violarum, nymphææ, ana P. j. rosar. P. ij. fantali citrini ℥. j. Ligentur in nodulo raro, qui aqua rosar. adpersus naribus offeratur. Vel

℞. Santali citrini flor. rosar. nymphææ, ana ℥. camphoræ ℥. β. Includantur in vase angustî orificii cum aqua rosar. & supra ignem ebulliant, vaporque naribus excipiat.

Quia verò in hoc affectu vigilie maximè urgent, omni arte somnus conciliandus est, ab ipso morbi initio. Cui usui non parum conferunt repellentia medicamenta antea proposita. Præsertim, si ante oxorrhodini admotionem caput oleo violaceo frigido perfundatur; quod in vigiliis maximè proficuum est, tum etiam convulsio-nibus ex hoc morbo oriundis. Idipsum tamen efficacius sequentia præstare poterunt.

℞. Capit. papav. albi cum sem. n. vj. florum nymphææ P. ij. Contundantur omnia, & cum aqua rosar. & lactucæ q. f. Fiat instar cataplasmat, quod fronti applicetur duobus linteis inclusum.

Nota, medicamentis somnum conciliantibus acetum non esse permiscendum, nisi quantitate paucissima, quia vigilias excitat.

℞. Flor. lact. M. j. β. ros. M. β. sem. papav. albi ℥. β. Coquantur in aqua ad mollitionem. Contusis adde farinæ hordei, lact. mulieb. an. ℥. β. ol. viol. q. f. Misceantur pro frontali. Vel

℞. Ol. violac. nymphææ, unguenti popul. recent. an. ℥. iij. opii, olei nuc. mosch. gr. iij. misc. Fiat linimentum, quo frons & tempora inungantur.

Sedum majus contus. & cum lacte muliebri mixtum, syncipiti admotum, mirè sedat phrenitidem & somnum conciliat. Sed statim ac dormire cœperit æger, detrahendum, ne in coma præcipitetur. Ramenta cucurbitæ recentis idem præstant, & minori periculo.

Penotus sequens epithema miris laudibus effert, quod sic habet.

℞. Moschi gr. xij. camphoræ gr. xx. aquæ rosar. rubrum, tinctura fantalorum rubror. imprægnatæ ℥. xx. Mifce. Capite derafo madefiant lintea duplicata in hoc liquore, & tepida, per omnes capitis futuras applicentur. Ubi resiccata fuerint, iterum imbibe, & per 24. horas applicationem continua, & somno conciliato, cerebroque confirmato, agrum mirificè convalescentem propicies, nisi ipsamet cerebri substantia fuerit corrupta.

Interius verò cum julepis, aut emulsionibus interdum exhiberi poterit syrup. de papav. simp. ℥. j.

Vel ladani opiat gr. ij. aut iij. exhiberi poterunt, quod etiamnum in clysteribus usurpatum, satis potenter & mitius somnum conciliat.

Attamen in narcoticorum usu cautus esse debet Medicus. Exhiberi enim non debent, si vires sint valdè debiles, ne spiritus & calor ab iis extinguatur.

Celebratis sufficienter prædictis materiæ fluentis eva-

cuationibus, revulsionibus, derivationibus, & interceptionibus, ad materiæ fluxæ educationem veniendum est.

Ac primum vena frontis aperienda, si manifesta sit, & secari possit, fascia collum non adstringendo, ut vulgò solet fieri; sic enim sanguis sursum impellitur.

Utilissime etiam aperiendum venæ narium, & si ullo modo morbus est sanabilis, hoc præcipuè curabitur: sanguisque satis copiosè per eas emittendus, idque satis maturè, & statim post universales evacuationes faciendum est. Aperiantur autem hujusmodi venæ, nares interioris seris aliisque asperis frequenter pungendo atque lancinando. Vel adhibitis post aures, naribus, fronti, podici hirudinibus, sanguis exsugendus est.

Capiti verò applicentur resolventia simul cum repellentibus, ea proportionem, ut primò parum addatur de resolventibus; quo verò morbus magis ad declinationem vergit, eorum quantitas urgeatur, ut tandem sola resolventia usurpentur, ad materiæ morbigicæ reliquias discutiendas. In hunc finem usurpari poterit oleum chamæmel. vel anethinum, cum oleo rosac. permixtum.

Sed inter resolventia primas obtinent animalia tenella mactata capiti statim adnota, vel eorum partes, ut Gallinæ, pulli columbini, & gallinacei, catelli per spinam secti, & pulmo vervecinus: suo enim calore naturali partem roborant, humorem discutiunt, illiusque acrimoniam contemperant.

Quibus uno aut altero die tentatis, si nihil commodi consequaris, docet Mercatus summo capiti cucurbitulam affigere, ut per suturas aliquid expiret, evoceturque ad cutem: ac si rubor compareat ac tumor subtus cucurbitulam ipsa scarificare. Quo auxilio asserit Medicum consequi posse, quod reliquis omnibus non valuerit, maximè si mox adhibeatur lavacrum aquæ dulcis, in quo aliquid ex discutientibus coctum sit. Hoc tamen monet, in ea solum inflammatione faciendum esse, quæ per se inceperit, non aliis autem febribus supervenerit.

Hoc remedium confirmat Zacutus Lusitanus referens, se desperatam phrenitidem curasse, admota syncipiti cucurbitula cum scarificatione.

Quidam majori audacia vesicatorium syncipiti admovent, quod aliquando successisse aiunt; sed maxima indiget præmeditatione.

Pro potu utatur æger decocto hordei, vel rad. acetosæ, cum syrupo granatorum, berberis, aut limonum. Vel sequens infusum propinetur.

℞. Aquæ fontis ℥. ij. sol. acetosæ, & papav. rhœados an. M. β. flor. borrag. nymphææ, viol. an. P. β. spiritus vitrioli ℥. j. fantali rubri linati ℥. ij. Stent in infusione per aliquot horas frigide. Colentur per chartam emporeticam, addendo sacchari albi, q. f. ad saporis gratiam.

Urina in hoc morbo ut plurimum supprimitur, quia ægri eam emittere negligunt, unde partes illæ distenduntur, ac tandem inflammationem concipiunt, quæ vel sola interitum ægro afferre potest. Itaque ægri ad urinam reddendam sæpius incitandi sunt. Mox vesicæ regio fovenda aqua tepida. Dein manu comprimendo urina propellenda, aut ea elicienda penem contrectando. Et si levioribus hisce symptoma non cedat, ad sequentia veniendum erit.

℞. Fol. parietariæ M. ij. petrosel. cum rad. M. j. Fiat decoctio. In colatura dissolve olei scorpionum ℥. iij. Fiat fots supra pectinem.

Hujus decocti residua frigatur in sartagine cum oleo scorpionum, & post fotum applicetur.

Si decoctum efficacius desideretur: adde sem. apii, petroselini, milii solis, seseleos, an. ℥. ij.

Utiliter etiam post fotum, sequens unguentum potest applicari.

℞. Pinguedinis cuniculi, olei scorpionum, ana ℥. ij. sem. apii, petrosel. asari, & seseleos subtiliss. pulverat. an. ℥. β. Fiat unguentum.

## C A P U T XII.

De Cerebri abscessu, & sphacelo.

Cerebri abscessu & sphacelus à paucissimis Autoribus describitur, licet ab Hipp. annotatus fuerit 3.



de morbis, & in usu practico interdum occurrat, minusque exercitatos Medicos alterius morbi specie deludat.

Est autem cerebri sphacelus substantiæ cerebri suppurationi, vel corruptio, quæ gangræna, vel syderatio etiam nominatur.

Causa illius immediata est cerebri substantiæ inflammatio, quæ tamen à phrenitide distinguitur eo quod in ea membranæ potissimum inflammentur, & ab iis inflammatio parti tantum exteriori & contiguæ communicetur. In hac verò inflammatio partes cerebri interiores, ac totam propemodum illius substantiam occupat. Magna autem illa inflammatio, in parte mollissima & humidissima, brevi sphacelum accersit.

Hujus inflammationis causa est sanguis supercalefactus, vel admodum biliosus, in cerebri corpus, & partes ejus internas affatim irruens.

Causæ procatacticæ sunt illæ omnes, quæ sanguinem calidum copiosum in toto corpore cumulare, & ad caput transferre valent, ut exercitatio vehemens, insolatus vel capitis ad ignem calefactio, ita & similia. Sed frequentius hunc affectum inducere solent vulnera capitis gravia, & contusiones. Ab hac tamen causa oriundus abscessus vel sphacelus, à dicto diversus aliquo modo est. Quia ex contusione factus abscessus, tot cerebri partes ut plurimum non occupat, sed uni præcipue adhæret. Unde symptomata leviora, saltem ab initio esse solent, & affectus ad plures dies prorogatur.

Signa abscessus & sphaceli, quia sine vulnere aut contusione producitur, ita se habent.

Invadente affectu ingens capitis dolor ægrotantem adoritur, qui per occiput collo & universæ spinæ communicatur. Cui mox succedit sensuum omnium, tum internorum, tum externorum abolitio, sicut in apoplexia contingit; à qua tamen signis infra describendis distinguitur.

Variis motibus & inordinatis sese ægri exagitant, ut vix uno loco contineri valeant. Manibus interdum partes superiores invadunt, easque divellere ac laniare conantur, faciem unguibus dilacerant, crines avellunt. At procedente morbo corpus languescit, & ad motum impotens efficitur.

Febris acutissima & intentissima hunc perpetuò comitatur affectum, quæ ab ingenti cerebri inflammatione procedit.

Denique in hoc affectu ægrotantes neque cibum, neque potum admittunt, vixque aliquid stomacho illorum quocunque artificio ingeri potest: undè cita advenit virium exolutio.

Abscessus, ex vulnere aut contusione genitus, sequentibus signis dignoscitur. Post acceptam contusionem capitis torpor quidam & mœstitia apparet, animalibus spiritibus à materia extravasata lebefactari incipientibus. Morbo invalescente, febricula exoritur, materiam putrescere incipiente. His capitis dolor succedit, & somnolentia. Mox aucta putredine omnia symptomata ingravescent. Febris intensior evadit, æger è profundiori somno emergens, subito vociferatur, surgit è lecto, statimque iterum decumbit. Frequenter manum ad caput adducit. Ex his plerique ante obitum purulentam materiam, & virescentem ore, aut naribus rejiciunt.

Quod ad prognosin spectat, affectus iste periculosissimus est, & ut plurimum lethalis, imò intra triduum ægrotantes interimit, ut docet Hippoc. Aphor. 31. sect. 7. Quibus, inquit, cerebrum sphacelatum est, in tribus diebus pereunt, si verò hos evaserint, sani fiunt. Galenus in comm. docet, per sphacelum hinc non esse intelligendam factam & completam partis corruptionem, quoniam hæc sanationem non admittit, sed quæ est in fieri, imminetque, ob inflammationis magnitudinem.

In iis, qui convalescunt (quod rarissimè contingit) nulla est præteritorum memoria: ægri enim nec morbi, nec alterius rei ad morbum pertinentis, meminerunt.

Ad curationem hujus affectus magna festinatione opus est. Nisi enim in principio illius remedia statim adhibeantur, nullus amplius superest curationi locus.

In prima igitur morbi invasione statim sanguis detra-

Laz. Riverii Opera.

hendus est magnâ copiâ, & iteratis vicibus, bis, ter, quater eadem die, quantum vires ferre possunt, in hoc enim unico remedio tota curationis spes residet. Cum enim magna sanguinis copia cerebri substantiam occupet, quæ magna est, mollis & humidissima, ab ea sufficienter revelli ac derivari nequit, nisi totus ferè sanguis in venis contentus educatur. Et in hoc casu locum habet vulgaris illa Celsi sententia; *Multa in præcipiti periculo recte sunt, quæ alias essent omittenda.*

Post venæ sectiones clysteres acriores injiciendi sunt, ut humores superiora petentes, ad inferiora revellantur, iique singulis diebus iterandi.

Eodem tempore oxyrhodina admovenda sunt syncipiti & fronti, qualia in phrenitide descripta sunt.

Ad majorem revulsionem & derivationem cucurbitulæ scapulis & dorso cum profundis scarificationibus admovendæ sunt, frictiones & ligaturæ extremorum celebrandæ; venæ primum malleoli, postea frontis, & arteriæ temporum aperiendæ; hirudines ponè aures, & hæmorrhoidibus applicandæ; vesicatoria cervici & brachiis admovenda, & reliqua remedia usurpanda, quæ in phrenitidis curatione à nobis proposita sunt.

Ac tandem si morbus ad declinationem vergat, leniter resolventia capiti admovenda sunt, inter quæ pulmones vervecini, ex animali ex tempore macerato calentes principem locum obtinent.

## CAPUT XIII.

### De Mania.

**M**ania est delirium sine febre, cum furore, & audacia. A phrenitide distinguitur, quia in ea febris acuta viget, à cerebri & membranarum ejus inflammatione oriunda. Mania verò febre caret, saltem ratione propriæ essentia; nihil enim impedit, quin febris cum mania complicari possit; sed ab alia causa oriunda, non autem ab ea quæ maniam producit. Atque idè in phrenitide febris est symptomatica: in mania essentialis & primigenia, ab alia causa procedens, & sic Gal. 3. de loci aff. c. 7. explicandus est. *Quemadmodum, inquit, altera atræ bilis succus qui ex præassata flava bile nascitur, ferina deliramenta inducit, modò sine febre, modò cum febre.*

A melancholia distinguitur per symptomata pathognomonica; siquidem mania est cum furore & audacia; melancholia verò cum timore & mœstitia.

Causa mania proxima & immediata, juxta Galeni mentem, est calida & sicca intemperies, ab humore atrabilatio oriunda; quæ tamen gravissimis urgetur difficultatibus.

Si enim tanta esset intemperies in cerebro, ut mentem de sua sede dejicere valeret, febrem debere parere, cum calor remissior, delirium efficere non valens; febrem pariat, qualis est, quæ ab insolatu exoritur.

Ad hoc dubium varii varia respondent: Solidiorum responsio est, calorem, qui febrem excitat, debere esse fuliginosum, ut ad cor delatæ fuligines febrem efficiant; calorem fuliginosum autem in materia humida consistere debere, qualis est materia febrium putridarum: in mania verò humores esse adustos & incineratos, ita ut ab iis nulla eleventur fuligines. Uno verbo aiunt, calor in mania est, velut in pruna; in febribus verò, ut in flamma.

Hæc tamè responsio fortissimâ urgetur instantiâ: Quod nimirum in febre hectica major sit humiditatum consumptio, quam in mania; attamen febris usque ad integram & absolutam omnium humiditatum, & ipsius humidi primigenii consumptionem, ægrique interitum perseveret.

Platerus hac ratione, aliisque nonnullis, persuasus, existimat, præter calidam & siccam intemperiem, adesse quoque malignam & venenatam quandam qualitatem, quæ sit præcipua causa delirii. Magna hujus sententiæ probabilitas indè elici potest, quod furor uterinus à semine corrupto, & malignam ac venenatam qualitatem adeptò exoritur: Quod hydrophobia, quæ est species mania, à

A a

morsu



morfu venenato canis rabidi, in quocumque temperamento, sine atræ bilis concursu inducatur; quod morbus, qui à morfu Tarantulæ exoritur, quædam etiam mania species appelletur; ac denique venena quædam maniam inferre possint, ut de cerebro mustelæ & solano maniaco referunt. Ideò verisimile est, peculiare quoddam venenum, in corpore humano genitum, mania causam esse præcipuam: cum etiam febres malignæ, quæ non rarò mitissimæ sunt, ut in iis pulsus ac urinæ sanis simillimæ appareant, deliria producere soleant potiùs, quàm febres ardentes, malignitatis expertes. Et docet experientia, maniam contingere frequenter, non tantum atrabilario temperamento præditi; sed etiam omnibus naturis & ætatibus, præsertim si hæreditario jure contigerit: ac denique illam calidioribus medicamentis, specifica virtute præditi, non rarò curari. Etsi diffiteri minimè oporteat, in melancholicis & atrabilariis hunc morbum frequentius & ut plurimum produci; quia ille humor tali veneno suscipiendo magis idoneus est. Et Galenus ipse malignitatem istam, humori atrabilario advenientem, agnoscere videtur *Comment. Aphor. 56. sect. 6.* ubi dicit, mania causam esse melancholicum humorem, non semper; sed cum supra modum exustus, aut putrefactus malignam induerit acritudinem.

Sed manet adhuc difficultas, ex eo desumpta, quod maniacy frigus externum etiam hyemis tempore nudato corpore innoxie patientur, & præterea ad tactum calidi sentiantur, quod indicat calorem intensissimum in iis vigere.

Verum respondemus, hoc in omnibus maniacy minimè contingere, & ultos hybernæ frigus averfari, vestibusque plurimis gaudere. Alios verò aëre externo non affici, propter consuetudinem, quia ab assuetis non fit passio. Sic videmus puellas delicatulas hyemis tempore pectus denudatum habere, quod tactu calidum sentitur: quamvis ex Hippocrate frigus sit pectori valde inimicum.

Materia hunc affectum producat, in venis & arteriis continetur, vel totius corporis, vel cerebro propioribus, vel ipsis cerebri vasis: unde ex locorum varietate varia symptomata, eaque graviora vel leviora emergunt. Non rarò etiam in uteri vasis, ex sanguine vel semine corrupto, materia morbifica continetur, ex qua furor uterinus gignitur.

Si materia peccans est in omnibus venis, aut cerebro vicinis, insana sit perpetua & indefinens. Si verò in parte tantum aliqua concluditur, delirium quasdam habet intermissiones, & per intervalla recurrit.

Signa diagnostica alia imminem, alia præsentem maniam significant.

Ad imminem vel futuram maniam dignoscendam primò consideranda est ægrotantis nativa dispositio, quæ scilicet ad biliosam seu atrabilariam temperiem accedit. Sic apud Hippoc. 2. *Epid. 5. Cui vena in cubito pulsatur, furibundus est, & ad iracundiam præceps: cui verò sensim movetur, torpens est ac stupidus.* Arterias nomine venarum Hippocrates afficit. Non autem simplicem pulsationem intelligit, sed vehementem, cui opponit illud, *quando sensim movetur*, ut sensus hujus sententiæ ita se habeat. Qui habent pulsum magnum, velocem, & vehementem, à nativa constitutione, ad iram & furorem, maximè proclives sunt: qui verò tardum habent pulsum, torpidi sunt & stupidi.

Secundò; sexus ratio habenda est. Viri enim frequentius furore exagitantur, quàm mulieres. Quod intelligendum est de affectu primigenio: ex utero enim mulieres non rarò in furorem aguntur.

Tertiò ætas consideranda est. Juvenibus enim frequentius mania contingit, quàm pueris & senibus.

Quartò, anni tempus advertendum. Sæpè enim verno tempore contingit hic affectus, sæpius æstate, sæpissime autumno, ex Hipp. & Gal. *sententiis Aphor. 20. 21. & 22. sect. 3.* Mere humores, aliis temporibus geniti, & per hyemem asservati ac quiescentes, commoventur & exagitantur, morbosque analogos pariunt. Æstate multa bilis non

solum flava, sed etiam atra in dispositis gignitur, quæ maniam efficit eodem tempore, vel ad autumnum usque, majori copia cumulata, morbum producit.

Hæc signa remotiora sunt, & in genere tantum dispositionem ad hunc morbum significant. Proximè verò imminem affectum ostendunt, dolor capitis assiduus, vigiliæ contumaces, somni levissimi atque brevissimi, insomnia turbulenta, curæ & sollicitudines molestæ, terrores ex levi causa, præceps & frequens iracundia ex minima vel nulla occasione, splendores oculis obversantes, aurium sonitus, proclivitas ad Venerem insueta, pollutio nocturna frequentior, risus præter assuetudinem & rationem, loquacitas insueta & ferè assidua, & interdum taciturnitas meditabunda. Posteriora hæc incipientem maniam significant.

Factum verò, & præsentem maniam ostendunt ea, quæ in definitione prolata sunt: nempe delirium sine febre, cum furore & audacia. Varia tamen sunt hujusmodi deliria in variis ægrotantibus, tum etiam in iisdem, diversis temporibus, pro majori vel minori causæ vehementia. Alii enim feroci iracundia rapiuntur, & obvios quosque invadunt, proprias vestes proscindunt, & sibi interdum violentas manus inferunt, sibi que vitam eripere conantur. Alii verò mitiores & pacatiores sunt, nullamque adstantibus noxam inferunt, sed tantum varios sermones & ridiculos proferunt; interdum canunt & rident, & variis deliramentis afficiuntur, ac symptomata patiuntur iis aliquo modo similia, quæ in melancholia & stultitia solent contingere.

Ex illa autem varietate symptomatum, causarum varietas dignoscitur. Risus enim immodicus, hilaritas, & cantillatio, materiam peccantem multo sanguine dilui significant. Iracundia verò, inquietudo, clamor, percussio, pallidus & flavescentis faciei color, bilem flavam in vitio esse ostendunt. Insania verò admodum furiosa, ut ægri obvios impetant, & aliquando interficiant, à flava bile exusta, quæ atra bilis dicitur, ducit originem. Si verò atra bilis non ex flava bile, sed à melancholia exusta & præassata generetur, ægri truculento vultu præditi sunt, manent interdum in diurno silentio, quod nonnumquam in sermonem importunum erumpit, immites sunt, pertinaces, ingenti mœrore interdum ac ludibus afficiuntur.

Prognosis hujus affectus in hunc modum instituenda est.

Mania gravissimus est affectus, & non solum per menses, sed per annos aliquandò & usque ad mortem perseverat: præsertim si hæreditaria sit. Cum omnes morbi ab atra bile sint curatu difficillimi, iste præ cæteris difficilior est, quod ægri Medicis non obtemperant, & necessaria remedia usurpare minimè velint.

Facilius curatur mania, quæ cum risu, & mitioribus symptomatibus copulata est, quàm quæ cum studio ac furore.

Brevi successuram morbi curationem ostendunt quæcumque evacuationes, ex motu naturæ contingentes, per sudores, alvi fluxum, hæmorrhagiam, per nares, aut hæmorrhoides, aut si varices supervenerint: unde Hippocrat. *Aphor. 21. sect. 6. Si insani varices, aut hæmorrhoides contigerint, morbi solutio fit.*

Dysenteria, aut hydrops, aut febris tertiana, vel quartana mania superveniens, eam tollit: fit enim metastasis humorum à cerebro ad partes inferiores, in quibus novum morbum producat.

Ad hujus morbi curationem materia peccans evacuada, revellenda, & repellenda est; calida intemperie corrigenda, cerebrum aliæque partes principes roborandæ. Quæ omnia sequentibus præsidii adimpleri poterunt.

Primò sanguinis missio celebranda est, præmissa clystere, ex vena brachii insigniori: postmodum verò iteranda ex altero brachio, idemque remedium frequenter usurpandum. Asserit enim Platerus, innumeros hac ratione curatos fuisse à Chirurgis & aliis, qui ex professo hisce morbis curandis operam dabant, qui vigesies, imò sexagesies venas aperiebant. Non solum enim venæ brachii utriusque, sed etiam malleoli, frontis, narium, hæmorrhoidum, etiam varices, si appareant, & salvatellæ: idque per inter



intervalla, interjectis clysteribus, & medicamentis purgantibus infra describendis. Cucurbitulæ etiam, scapulis & dorso cum scarificatione admotæ, post multas venæ sectiones: tum etiam hirudines temporibus, & pone aures utilissimæ sunt.

At frequentibus illis phlebotomiis materiæ peccantis præparationes & purgationes interjiciendæ sunt: eæque diu, multumque continuandæ. Cui usui conferent omnia, quæ ad bilis & melancholiæ præparationem, & expurgationem usurpari solent, quibus & sequentia, utpotè selectiora, adjicere possumus.

℥. Lapid. Lazuli 3. i. s. diagryd. 3. s. turbith. 3. i. sennæ 3. s. epithymi, cremor. tartari, ana 3. ii. cinam. & cort. citri, an. 3. i. croci 3. s. Fiat pulvis, cujus dosi erit 3. i. vel 3. iv. cum jusculo, vel liquore appropriato.

℥. Rament. helleb. nigri 3. i. Infundantur per triduum in aquæ pluviae 3. iv. Decoquantur lento igne ad tertias. Colaturæ adde mellis optimè despumati 3. ii. Misce, capiat cochlear i. cum jusculo pingui. Vel

℥. Extracti hellebori nigri 3. s. syrupi violac. 3. i. Misce pro una dosi.

Omnia medicamenta, ex helleboro confecta, ut vinum, syrupus & oxymel, ad hujus affectus curationem plurimum conferunt. Undè olim ferunt Melampum, Amythaonis Medici filium, vino helleborato, Prati Argivorum regis filias, quæ se boves existimabant, liberasse.

Antimonium in hoc morbo non solum à Chymiatris, sed etiam à Galenicis omnibus commendatur: cum quodd humorem atrabilarium è toto corpore evacuet: tum quia eo ægrotantes commodè falli possunt, remedia alioqui in suavia renuentes. Dosis varia est pro variis illius præparationibus.

Balnea aquæ tepidæ frequenter & post singulas purgationes usurpanda sunt.

Ordo medicamentorum purgantium in hoc morbo talis est: ut primò apozema alterans & purgans per tres aut quatuor dies exhibeatur, post venæ sectionem in utroque brachio celebratam. Deinde purgantia mediocria ex positionibus, pulveribus, aut syrupo magistrali bis in septimana exhibeantur. Vehementia verò bis in mense, interjectis continuò venæ sectionibus, ut antea dictum est.

Diebus verò intermediis balnea, julepi præparantes, aut juscula alterantia, tū etiā opiata rorobantes exhibeantur.

Præter julepos vulgares, sequens ex succis paratus erit utilissimus.

℥. Succorum borrag. bugloss. & pomo. redol. an. 3. iii. aquar. fumarie & cichor. an. 3. iv. sacchari albi 3. vi. Coquantur, depurentur, & aromatisentur santalo citrino. Capiat 3. vi. manè & serò.

Opiata etiam in sequentem modum concinnari poterit.

℥. Conservæ Rosar. violar. & bugloss. an. 3. i. conservæ flor. tamarisci, caryophylli hortensis, caulium, lactuc. cond. & cortic. citri condit. an. 3. s. myrobal. emblic. condit. n. i. conf. alkerm. & de hyacint. an. 3. iii. pulv. elect. diamarg. frig. & lætif. Gal. an. 3. i. coral. præpar. & margarit. præpar. an. 3. s. Cum syrupo de pomis redol. fiat opiata, de qua capiat magnitudinem castaneæ, superbibendo parum julepi, aut aquæ cujusdam appropriatæ.

Tabellæ etiā usurpari poterunt in hunc modū cõpositæ.

℥. Confect. alkerm. 3. ii. pulv. electuar. de gemmis, & diamarg. frig. an. 3. s. sacchari in succo pomorum dissoluti 3. iv. Fiant tabellæ pond. 3. ii. Capiat unam pro dosi.

Interdum etiam tentari poterunt specifica & amuleta, quorum non exiguum numerum collegit Sennertus. Nos verò unum adjiciemus, quod in illustri quadam familia Monspelienfi, pro secreto gentilitio & hæreditario habetur, illiusque descriptio talis est.

℥. Fol. melissæ M. i. Incidantur minutim, & infundantur in spiritus vini 3. iv. Deinde adde margarit. præp. 3. s. Misc. Dosis est cochlear. ii.

Interim dum hæc fiunt, somnus omni arte conciliandus est, & somnifera per intervalla usurpanda. Quæ non alia esse debent, quàm quæ in phrenitidis curatione propo-  
posita sunt, tam interna, quàm externa.

Ac præter somnifera externa admovenda quoque ca-

Laz. Riverii Opera.

piti sunt topica medicamenta, quæ æstum ac furorem vehementem temperent ac demulceant. Illa verò non solum refrigerantia, sed multò magis humectantia sint & in principio morbi nonnihil repellentia.

Ideo in principio morbi oleum rosac. conveniet, cum violac. anethino, chamæmelino: postea verò eadem olea detracto rosac. Ubi verò magis refrigerandum est, olea ex semine cucurbitæ & papav. addenda erunt. Ac denique ut in formam linimenti reduci queant, mucilagine sem. lini, fœnugr. & butyrum addi poterunt.

Plurimum etiam confert epithema in sequentem modum compositum.

℥. Aquæ nymphææ lb. i. salis prunellæ 3. i. camphoræ 3. i. Misce, & cum linteis complicatis admoveantur tepidè syncipiti.

Epithema ex sale Saturni & aqua rosarum utilissimū est.

Utilissimum quoque erit epithema ex aqua rosarum, santali rubri tinctura imprægnata, cum moscho & camphora composita, quæ superiori capite descripta est.

Chimici verò balsamo Saturni palmam tribuunt, eaque caput inungunt instar linimenti.

Maximè etiam conveniunt, in summo furore, animalia tenella per medium secta, vel eorum partes, ac præsertim pulmo vervecinus. Ubi semel refrixerit, iterum potest calefieri in aqua fervente.

In declinatione nonnulli discutientia validiora adhibēt. Imò verò in ipso vigore morbi, potest evacuationes sufficientes, fomentum sequens admirandæ creditur efficaciam.

℥. Herbarum cephalicarum cum floribus q. s. Decoquantur in aqua fontana. Deinde ℥. baccarum lauri & rad. hellebori nigri veri, an. q. s. Contundantur crassiusculè, & insuantur sacculo oblongo interbassato. Sacculus parum bulliat in prædicto decocto.

Tandem per novem dies continuos ℥. istius decocti lb. ii. Eoque calefacto foveatur caput rasum per integram horam, cum linteis duplicatis. Postea sacculum istum applicata futuræ coronali cum bona ligatura, linteis calidis involvendo. Patiens decumbat in lecto, & si fieri potest, quiescat. Tum mirè expurgatur per omnia capitis emunctoria, & alvus simul aliquantulum fluit. Sic enim fuligines inhærentes cranio & cerebro mirabiliter dissolvuntur, quod vix alia remedia præstare poterunt.

Denique cauterium futuræ coronali applicatum maximè probatur à Gordonio, ejusque utilitatem confirmat historiâ cujusdam maniaci, cui cum esset inflictum vulnus capiti cum cranii fractura, quamdiù fuit vulnus apertum, tamdiù benè habuit; vulnere sanato, reversa est mania.

Quamvis autem cerebrum in hoc affectu præcipuè laboret; tamen aliæ etiam partes alterandæ præcipuè cor & hepar, epithematis & linimentis, in phrenitidis curatione propo-

## CAPUT XIV.

### De Melancholia.

**M**elancholia est delirium sine febre cum timore & mœstitia.

A phrenitide distinguitur per carentiam febris; & à mania, per timorem & mœstitiam, quia hæc est cum furore & audacia.

Dicimus autem febrem abesse ab hoc affectu, quod intelligendum est ex propria natura, & per se; attamen ex accidenti febris cum illa copulari potest. Nihil enim impedit, quin febris continua; vel intermittens melancholiâ laboranti contingat; sed illa febris non erit de essentia melancholiæ, quemadmodum in phrenitide febris est de essentia illius.

Dubitare licet, quomodo timor & mœstitia dicantur esse de essentia melancholiæ, cum in multis melancholicis gaudium & lætitia maximè vigere videantur. Alii enim continò rident, alii canunt, alii se ditissimos, alii Reges & Monarchas esse putant.



Respondemus, varios esse melancholiæ gradus, & varias humoris melancholici cum aliis humoribus permixtiones, indeque maximam deliriorum varietatem emergere. Ita ut qui multum sanguinis, aut pituitæ, cum humore melancholico permixtum habent, gaudio & lætitiâ affici possint. Ast ille affectus tunc temporis non est vera & legitima melancholia; sed potius ad stultitiam & fatuitatem accedit.

Ex varia autem humoris melancholici dispositione maxima deliriorum varietas emergit: undè alii se Reges, Principes, vates, alii vitreos, testas fragiles, grana tritici à gallinis devoranda; alii ceram igne liquabilem, alii se canes, feles, lupos, cuculos, luscinnias, gallos esse putant, horumque aut aliorum animalium voces imitantur. Alii se mortuos, nec quicquam edendum, aut bibendum esse imaginantur. Alii mingere non audent, ne diluvium inde oriatur. Alii se capite, vel membris truncatos esse, vel orbem digito sustinere, vel passeris in capite, serpentes, ranas, mures, aliaque animalia in ventre habere arbitrantur.

Causa melancholiæ proxima & immediata est spiritus tenebrosus, & (ut Galeni verbis utar,) nigro colore infectus. Cum enim spiritus animales, naturâ suâ puri, tenues & perspicui esse debeant, ad actiones cerebri alacriter exercendas, & alacritatem ac lætitiâ inducendam; si ab ea constitutione deiciantur, & opaci ac tenebrosi evadant, mœstitiam & timorem inducunt. Undè Galenus 2. de symptom. caus. cap. 6. à tenebris exterioribus mutuato exemplo rem explicat. *Eorum, inquit, quæ extra corpus sunt, nihil videmus quod nos perinde terreat, ac tenebræ: ergo cum tenebræ rationalis animæ parti sunt circumfusæ, necesse est hominem timere, qui semper, unâ cum corpore, sui timoris causam circumferat.*

Causa verò pravæ hujus spirituum dispositionis est humor melancholicus: qui crassitie, opacitate, & colore nigro præditus, spiritus animales inficit, & tenebrosos reddit. Et cum humor melancholicus frigidâ & siccâ temperie donatus sit, ad figendos & densandos spiritus maxime conducit, quæ quidem densatio & fixatio spirituum ad mœrorem & tristitiam necessaria est. Si enim humor tenuis sit & calidus, qualis est atra bilis, à qua mania producit, furorem potius & audaciam excitat. Ergo causa proxima melancholiæ est opacitas, & tenebrositas spirituum animalium. Conditio verò necessaria, & sine qua non, est frigida & sicca intemperies.

Si quis verò insitet in melancholia hypochondriaca, ex Galeno 3. de locis affect. cap. 7. esse inflammationem in hypochondriis, atque adeò calidam intemperiem prævalere.

Respondemus, illam inflammationem, seu potius phlogosin hypochondriorum fieri ex eo; quod sanguis melancholicus in liene & venis mesaraicis diutius retentus, propter obstructions incalescat, undè multi vapores eleventur ad cerebrum: qui licet calidi sint, vincuntur tamen à frigiditate cerebri, & facile ad temperiem, humori melancholico propriam, nempe frigidam & siccam, reducuntur. Si verò tantus sit illorum vaporum calor, ut cerebri temperiem invertat, & in calidam & siccam permuet; tunc mania non melancholia generatur. Ità ut mania & melancholia in eo præsertim differant, quod in illa sit calida & sicca intemperies; in hac verò, frigida & sicca.

Prædicta spirituum tenebrositas, à Galeno sancita, rejicitur ab Averroë: ex eo, quod tenebræ spiritibus animalibus inductæ, & color niger humoris melancholici non possunt afficere sensus internos, juxta vulgatum illud axioma: *Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu.* Atque adeò, cum color ille niger, aut tenebræ interiores oculis non offerantur, à sensibus externis percipi non possunt.

Respondemus, colorem nigrum humoris melancholici, aut spirituum tenebrositatem, non afficere sensus internos sub ratione coloris; sed quatenus aliquid præter naturam existens in cerebro, quod actiones illius lædat. Quia nimirum spiritus animales ad actiones cerebri perfectè obeundas debent esse puri, tenues & perspicui. Si contra impuri, crassi, & tenebrosi extiterint, actiones cerebri vitiant, quatenus species à sensoriis trans-

missas inficiunt veluti, & inquinant, sicut vitrum coloratum, aut aliter infectum, species objectorum eodem modo infectas oculis repræsentat.

Frigida etiam & sicca intemperies, quæ tanquam conditio necessaria proposita est ad melancholiam efficiendam, hoc argumento impugnari potest, ab Avicennæ autoritate desumpto, qui *fen. 1. lib. 3. tract. 4. cap. 18.* Balbi, inquit, sunt plurimum dispositi ad melancholiam. Sed balbi sunt valdè humido temperamento donati: quod probatur ex Gal. *comment. Aphor. 52. sect. 6.* ubi Hippocrates sic habet, *Balbi ab alvi profluvio maxime capiuntur.* Galenus verò dicit, Balbos habere humidioram temperaturam, quemadmodum & pueros, ratione cujus alvi profluvio sunt maxime obnoxii.

Respondemus, contextum Avicennæ non de verè balbis esse intelligendum, qui literam R. pronuntiare non possunt, de quibus loquuti sunt Hipp. & Galenus *Aphor. prædicto*, & illi quidem humidiori temperie præditi sunt; sed de illis, qui trauli nominantur, qui scilicet eandem syllabam sæpius repetunt, antequam verbum integrum pronuntiare valeant. Quod sit ex præcipitatione mentis, cum celerius loqui contendunt, tunc enim lingua sese implicat, & in verborum prolatione hæsitare cogitur. Et illi trauli sunt melancholico temperamento donati.

Denique dubitare licet, quomodo tenebrositas spirituum sit causa immeditata delirii melancholici, cum omnis actio læsa dependeat immediatè ab aliquo morbo; hæc autem tenebrositas ad nullum morbi genus referri valeat.

Respondemus, tenebrositatem illam esse morbum in numero, quatenus illius accessu augetur numerus eorum, quæ necessaria sunt in cerebro, ad actiones animales obeundas. Instantia verò, quæ contra hanc responsionem afferri potest, quod scilicet morbus sit affectus veræ partis, in vertiginis explicatione resoluta est.

Signa melancholiæ pathognomonica in definitione proposita sunt timor nempe & tristitia, sine causa manifesta, quæ in omni melancholiæ specie reperiuntur. At verò singulæ melancholiæ species propriis signis innotescent. Sicque primariam in solo capite residentem melancholiam significant, cerebri vitiosa constitutio, aut morbi calidi prægressi, quibus sanguis in venis illius contentus, exustus & torrefactus est, tandemque in humorem melancholicum conversus. Somni breves & interrupti, insomnia turbulenta, vertigines, aurium tinnitus, & symptomatum in reliquo corpore, ac præsertim ventre inferiori absentia.

A toto corpore provenire hunc affectum, ostendunt habitus totius corporis melancholicus, vel naturalis; qui ex colore nigro, hirsutie, macilentia, aliisque dignoscitur: vel asciticius, ex curis, laboribus, vigiliis, victu crasso, & similibus contractus.

Ab hypochondriis procedere hunc affectum, testantur æstus in præcordiis sine siti, sputatio frequens, ructus acidi, flatu per superiora, vel inferiora frequenter emissi ventris rugitus, compressio interdum diaphragmatis, anxietas, nausea, appetitus interdum insatiabilis, cordis palpitatio, tumor aliquando & renitentia in hypochondriis. Et reliqua, quæ fusiùs in affectione hypochondriaca exponuntur.

Ab utero affectum procedere, indicant ea signa, quæ hystericas affectiones præcedere suo loco dicentur.

Prognosis hujus affectus in hunc modum instituenda est. Chronicus est iste morbus, & contumacissimus, si semel altas in corpore radices egerit. Humor enim melancholicus, præcipue qui per adustionem genitus est, & ad atræ bilis naturam accedit, vim remediorum eludit, mitiora contemnit, & à fortioribus efferatur. Undè humor melancholicus flagellum Medicorum, crux seu opprobrium Medicorum, vulgò nominari consuevit.

Recens tamen melancholia, & à causis procatasticis oriunda, facile curatur. Refert enim Gal. 3. de loc. affect. cap. 7. se melancholiam incipientem solo aquæ dulcis balneo frequenter curasse.

Melancholicis hæmorrhoides aut varices supervenien-



res, curationem interdum afferunt; n̄ criticè à natura humores ad illas partes inferiores detrudantur. Interdum enim symptomaticè contingunt, & per epigenesin, multiplicatâ materiâ morbificâ, indèque ad plures partes diffusâ.

Solvitur etiam interdum melancholia per fluxum hæmorrhoidum, & per scabiem, aliosque cutaneos affectus.

Quod curationem spectat, undecumque morbus primam traxerit originem, duo perpetuò advertenda sunt. Primum, ut totum corpus ab humore melancholico, omnique aliorum humorum illuvie liberetur. Rarissimè enim contingit, ut unica pars hoc humore obsideatur. Secundum, ut ad hypochondria curatio præcipua semper dirigatur: quandoquidem in hepate & liene prima humoris melancholici generatio, & in iisdem partibus, totaque hypochondriaca regione, illius collectio fieri consuevit: Ideo curatio, pro affectione hypochondriaca proposita, ad reliquarum melancholiæ specierum curationem sufficere poterit. Vix enim hypochondria ab illius humoris redundantia, & nova ejusdem generatione liberari possunt, quin totum corpus consequenter ab eodem immune fiat.

Pro omnium igitur melancholiæ specierum curatione, sufficientia remedia, quæ in affectionis hypochondriacæ curatione proposita sunt.

## CAPUT XV.

### De Catarrho.

**C**atarrhus est humoris excrementitii è capite in subiectas partes præternaturalis effluxus.

Est ergò symptoma tertii generis, nempe vitium in excretis.

Cerebri substantia, eximiâ mole prædita, multo indiget alimento, ex quo necessariò copiosa generantur excrementa, concurrente potissimum frigida humidâque partis temperie: quæ si naturalem & modicam quantitatem servaverint, in prioribus cerebri ventriculis excipiuntur, & per choanam seu infundibulum ad glandem pituitariam transmittuntur, ac per palatum, quotidie excernuntur. Si verò paulò uberius redundaverint, in statu tamen naturali constituta, circa cerebrum, & meninges disperguntur, commodè tamen, non solum per palatum, sed etiam per nares expurgantur.

Cum verè cerebrum intemperie atque imbecillitate affectum est, vel alimentum copiosius & improporcionatum recipere cogitur, quod sufficienter concoquere nequeat, magnus fit excrementorum proventus. Adde quod cerebrum (ut inquit Hippoc.) tanquam cucurbitula corpori imposita, humores & vapores à partibus inferioribus attrahere non desinat: hinc non parum adaugetur excrementorum cumulus, quæ quantitate & qualitate suâ facultatem expultricem istimulantia, & retentricem superantia, quâ data porta, ruunt immodicè & inordinatè, per vias & loca non conferentia, magna cum corporis afflictione.

Cum igitur fluxio sit motus materiæ ab una parte in aliam, in ea perpetuò (ut in omni motu) quinque consideranda sunt. Terminus à quo, terminus ad quem, movens, mobile, & viæ, per quas ipsa movetur. Terminus à quo, est cerebrum; terminus ad quem, partes cerebro subiectæ; movens, est facultas expultrix irritata, vel retentrix debilitata: mobile est humor excrementitius, viæ per quas movetur, sunt ductus patentes, nempe palatum, nares, oculi, aures, & meatus insensibiles, tum etiam venæ, arteriæ & nervi.

In termino à quo, seu parte mandante; duo causarum genera consideranda sunt. Unum est earum, quæ humoris pituitosi copiam in corpore gignunt & cumulant: alterum earum, quæ fluxum ejusdem excitant & promovent. Illæ generantes, hæ impellentes dici possunt.

Generantes, consistunt in frustratione facultatis concoctricis: quæ contingit vel vitio ipsius facultatis, vel alimenti.

Concoctrix cerebri facultas læditur potissimum ab intemperie, eaque frigida vel calida.

Frigida intemperies efficit, ut alimentum ad cerebrum delatum malè concoquatur, & in pituitam commutetur: tum etiam, ut vapores à partibus inferioribus translati, sufficienter non discutiantur; sed in aqueum humorem condensentur.

Calida verò intemperies copiosius alimentum & copiosiores vapores allicit, ut non possint à natura sufficienter discuti ac resolvi.

Vitio alimenti concoctrix cerebri frustratur, cum illud vel nimia copiâ cerebro suppeditatur, vel alienis qualitatibus infectum difficilius concoquitur. Sic frigida, crassa, & viscida alimenta, immoderatus ingesta, perfectè concoqui nequeunt, sed crudum alimentum cerebro suppeditant. Sic alimenta acria & vaporosa multos vapores ad cerebrum transmittunt.

His adjungendæ sunt causæ externæ, quæ superflua humiditate caput replere solent, ut austrius constitutio, somnus longus, præcipue meridianus; vita deserta & otiosa, & alia hujusmodi.

Licet autem cerebrum pars mandans præcipue dici soleat; non est tamen perpetuò causa fluxionis præcipua, sed plerumque fluxionis materia aliundè ad cerebrum transmittitur. Postquam enim vitiosi humores vel in toto venoso genere, vel in aliqua parte peculiari, ventriculo nimirum, hepate, liene, mesenterio, utero, aliisque collecti sunt: non solum ab iis ad caput vapores multi ascendunt; sed etiam ipsi humores vitiosi ad caput feruntur, & indè rursùm ad subiectas partes descendunt. Istorum autem viscerum vitia præcipua, ad catarrhos generandos idonea, sunt intemperies variæ & obstructions.

Calida viscerum intemperies copiosam facit anathymiasin, ex qua velut in alembico distillatione generantur. Frigida verò, propter concoctionis defectum, humores crudos generat, qui datâ occasione ad caput transferuntur.

Obstructions verò partium infimi ventris liberant excrementorum expurgationem impediunt: undè fit, ut illa sensim cumulata, cum liberum exitum non inveniant per vias naturales & ordinarias, ad superiora resfluant, & ad cerebrum transferantur. Ad hoc autem opus eo modo perficiendum, concurrere necessariò debet cerebri imbecillitas, horum excrementorum receptioni idonea: quandoquidem (ut antea dictum est,) partes robustiores ad debiliores sese exonerant. Frequentissimè autem contingit, ut cerebrum sit debilius reliquis partibus, propter substantiam suam mollem & laxam, quæ compactis & solidioribus minorem habet resistentiam.

Causæ impellentes sunt nimia cerebri calefactio, vel refrigeratio, aut alia quævis humorum commotio. Nimia cerebri calefactio humores in eo contentos attenuat, & fundit meatusque referat, per quos illi fluere consuevere. Talis est capitis calefactio à sole, igne, nimio capitis tegumento, olfactu aromatum calidiorum, irâ, aliisque animi pathemate excedentè.

Refrigeratio verò cerebrum comprimit, & humores in eo contentos exprimit, ut in spongia aquâ repleta & manu compressa contingit. Talis alteratio hyeme frequens est; sed præcipue contingit in subitis aeris mutationibus: quando scilicet constitutio austrius calida & humida in aquiloniam frigidam & siccam convertitur, vel quando aliquis è loco calido egrediens, aëri frigido subito se exponit. His annumeranda est pedum refrigeratio, quæ sympathicè per nervos cerebro communicatur.

Predictam cerebri compressionem, à frigore factam, multi negant; quia frigus humores densat & incrassat, minùsque fluidos reddit. Neque quadrare videtur exemplum spongiæ aquâ repletæ, quæ aëri exposita nullo modo comprimitur.

Verùm hæc sententia ab Hippoc. tradita lib. de locis in homine, veritati consentanea est: Fluxiones, inquit, propter frigus fiunt, cum caro in capite & venæ tense fuerint; hæ enim horrente carne & ad angustias perveniente adstrictæque ac excludente, humiditatem exprimunt. Et simul carnes ipsæ contrà exprimunt, ad angustias provenientes, & capilli sursum erecti fiunt, utpote simul undequaque



*fortiter compressi. Quicquid igitur inde expressum fuerit, idissum quocumque contigerit, fluit.*

Ex quibus coarctationem & compressionem partium à frigore fieri, indèque humorem exprimi, manifestum est.

Neque obstant densatio humorum & incrassatio à frigore supra proposita; siquidem hæc locum habere potest, quando totum corpus sensim & æqualiter refrigeratur. Ac tùm à frigore subito irruente partes externæ offenduntur, tunc illæ subito coarctantur, & humores intus coërcitos exprimunt.

Multò minoris est efficaciam, quod de spongia dicebatur, eam nimirum à frigore aëris non exprimi. Alia enim est ratio partium viventium, quare calor & spiritus ad frigoris sensum refugiunt, undè partes iis destitutæ consequenter coarctantur, quod in spongia aqua repleta, fieri nequit.

Attamen confiteri oportet, non hunc unicum esse modum, quo fluxio à frigore excitatur. Etenim refrigeratio pedum catarrhum inducit, intemperie frigida cerebro communicata per nervos insignes, qui ab eo ad pedes deferuntur per spinæ medullam. Illa autem refrigeratio intimas cerebri partes petit, non verò externas, ut frigiditas aëris caput immediatè afficiens, facere consuevit. Idèò potius existimandum est, in hoc casu retentricem cerebri facultatem debilitari, quæ ex refrigeratione non potest humores superfluos in eo contentos (si quidem illi copiâ luxurient,) ampliùs retinere, sed eosdem effluere patitur.

Est & alius modus admodum efficax & frequens, quo catarrhus à frigore generari consuevit, nempe pororum externorum constipatio, eo præsertim tempore facta, quo maxima fieri solet per corporis habitum diaphoresis. Hinc fit, ut excalefacti, frigidum aërem subito incurrentes, catarrhis maximè afficiantur. Sic in primis autumnii frigoribus catarrhi maximè fiunt, quia per æstatis decursum, habitu corporis rarefacto, & poris valdè apertis, multa fit per transpirationem insensilem excrementorum dissipatio: quæ si derepentè; constricto corporis habitu, cohibeatur, vapores & humores in centrum cerebri & corporis repercussi fluxionibus materiam suppeditant: ità ut circa autumnii initia non solum catarrhi contingant, sed etiam copiosa fiat in omnibus ferè hominibus serosæ materiæ per urinas excretio, & in nonnullis per alvum, undè alvi fluxus dictis temporibus frequentes esse consueverunt.

Si quis verò quæsierit, cur per totum hyemis decursum catarrhi non perseverent, cum perpetua fiat à frigore ambiente pororum externorum constrictio? Respondimus, naturam per alias vias superfluitate expurgare hyemis tempore magis, quàm per diaphoresin: nempe per alvum, urinas & sputa.

Quàm copiosa autem sit evacuatio, quæ per insensilem transpirationem fieri consuevit, luculenter docetur à Sanctorio, *libello de Statica medicina*, ubi dicit perspirationem insensilem esse longè plenior omnibus evacuationibus sensilibus simul unitis, ità ut si cibus & potus unius diei sit ponderis octo librarum: transpiratio insensilis ad quinque circiter libras ascendat. Curiosa & laboriosa isthæc circa transpirationis mensuram speculatio, quantam lucem in morborum causis introspectendis, eorumque curationibus instituendis afferre valeat peritioribus & solertioribus quibusque iudicandum relinquo.

In parte recipiente consideranda est imbecillitas, vel alia quævis dispositio, fluxioni recipiendæ vel attrahendæ idonea. Ratione imbecillitatis vulgatissimum est Medicorum axioma, partes robustiores in debiliores perpetuò onus superfluum deponere, sicut in Republica Magnates & potentiores in debiliorem plebem gravia onera deponunt.

Imbecillitas verò partium, vel insita est & nativa, vel adventitia. Insita pendet à mollitie & laxitate partium: undè glandulæ & pulmo fluxiones facillè recipiunt. Adventitia verò fit ab intemperie, vel solutione continui.

Frigida intemperies calorem nativum debilitando facit ut pars minorem habeat resistentiam, sicque faciliùs humorem influentem recipiat.

Solutio continui partem etiam debilitando, fluxioni recipiendæ magis reddit idoneam. Hinc ortus est cauteriorum usus, quia in partem ulcere debilitatam humores ab aliis partibus decurrunt. Sic etiam pulmo in phthisi ulceratus, humores à cerebro & toto corpore influentes recipit.

Inter alias verò dispositiones, fluxioni attrahendæ idoneas, calor præcipuè annumerandus est. Undè videmus partes inflammatas copiosos humores attrahere. Sic etiam in phthisi non solum propter ulcus, sed etiam propter calidam humoris intemperiem humores copiosi à capite proliciuntur. Undè Hip. *de morbis* agens de phthisi, sic loquitur; *Pulmo à calore ad se trahit pituitam ex toto corpore, & maximè ex capite. Caput verò calefactum ex corpore hanc putrescentem subcrassam expuit.*

Viæ per quas humores feruntur à capite in partes subjectas, duplices statuuntur, internæ & externæ. Internæ sunt, cum è partibus, sub calvaria contentis, potissimum è ventriculis cerebri, humor defluit per vias interiores, & pro natura partium, ad quas defertur, varios morbos, variaque symptomata producit quorum nonnulla propria nomina sortiti sunt, juxta vulgares illos versiculos Scholæ Salernitanæ:

*Si fluat ad pectus, dicatur rheuma, catarrhus:*

*Si ad fauces, bronchus: si ad nares, esto coryza.*

In pectus defluentè humore, affectus generis nomen retinet: ad fauces verò & asperam arteriam, bronchus, seu raucedo generatur: si verò ad nares defluat, non solum coryzam, sed etiam ozænam, & polypum efficit, si humor insignior est malignus.

In aliis etiam partibus varios producit affectus: in nervis torporem, paralytin, convulsionem, tremorem; in auribus surditatem, tumorem; in oculis ophthalmiam, lachrymas, cæcitatem: in uvula tumorem, laxitatem, ulcus; in gutture anginam; in pectore & pulmone pleuritidem, peripneumoniam, tussim, asthma, hæmoptoen, phthisin; in ventriculo vomitum, inappetentiam; in intestinis diarrhoeam & dysenteriam, ità ut maxima morborum corpus humanum infestantium pars à capite ortum ducere jure meritò censeatur.

In venas etiam cum sanguine humor à cerebro defluit, undè febris catarrhalis generatur; quando scilicet natura ad humoris superflui expulsionem acriùs commovetur, undè commoti vehementer spiritus accenduntur, & febrè Ephemeram efficiunt: hinc catarrhus inter febris Ephemeræ causas recensetur. Sic ante invasionem arthritidis, aut erysipelatis eruptionem, tales sæpissimè contingunt.

Externæ autem viæ, per quas humor à capite defluit, sunt illæ, quæ calvariæ adjacent, & sub cute continentur. Undè censuit Fernelius, inter carnem & cutem humores ut plurimum deferri: quamvis etiam per continuitatem musculorum, membranarum & nervorum, tunc etiam per venas & arterias defluere soleant in oculos, dentes, maxillas, cervicem, scapulas, brachia, articulos, & alias partes externas.

Differentiæ catarrhi nonnullæ ab Authoribus proponuntur quarum præcipuè sunt, quod alius dicatur ferinus, alius suffocans, alius epidemicus.

Catarrhus ferinus est, qui suâ acrimoniâ pulmonem exulcerat, & tabem inducit: fitque ab humore acri & falso, in hepate fervido genito, & in cerebrum translato, undè in pulmones propellitur. Suffocans verò catarrhus fit, quando fluxio in bronchia pulmonis confertim irruit, ac subindè renovatur: undè suffocationis impendet periculum. Catarrhus denique epidemicus malignâ qualitate præditus est, & populariter grassatur, à vitio aëris dependens.

Diagnosin hujus affectus ad tria dirigitur, subjectum, morbum & causam.

Subjectum vel corpus catarrhis obnoxium indicant rara corporis & capitis textura, facillè aëri frigido vel calido penetrationem præbens, tum etiam eadem textura nimis densa,



denſa ; liberam tranſpirationem impediens : cerebrum frigidum & debile, vapores ad ſe tranſmiſſos diſcutere non valens, vel proprium alimentum ſufficienter non coſcoquens : cerebrum item calidum, vapores copioſos attrahens : ventriculi & hepatis ἀντιπαζία, ut unum ſit calidum, alterum verò frigidum.

Signa morbum indicantia, vel imminentem prænuntiant, vel præſentem offendunt.

Imminentem catarrhum prænuntiant cauſæ prædictæ, ſed magis præciſè capitis gravitas, ſenſuum hebetudo & torpor, ſomni longiores, ſternutatio frequens, emunctio narium, & exſputio ſolito copioſior, alvi ſegnities, & flatuum copia.

Præſentis verò catarrhi indicia manifeſta ſunt. Humor enim è cerebro deſluens, vel manifeſtè percipitur, vel tumoribus ac doloribus in partibus, quas invadit, ſatis manifeſtatur.

Signa cauſarum ſatis etiam conſpicua ſunt. Si enim ab humore frigido catarrhus excitetur, aderit ſenſus frigoris, faciei pallor, ſapor pituitæ dulcis, ruſtus acidus, materia viſcoſa vel aquoſa, & univerſum temperamentum corporis pituitoſum.

Calidum verò humorem diſtillantem offendunt rubor faciei, ſitis, ſalfedinis vel acrimoniæ ſenſus in ore, inflammationes, dolores & ulcera in partibus affectis, & temperamentum totius corporis bilioſum.

Fluxio verò externa ab interna dignoſcitur, quo in illa dolor magis externus ſit, imprimis ſub cute verticis, ubi interdum tumor mollis percipitur ; ſæpius verò pilorum inverſio dolorifica eſt, ſæpè ægri humorum deſcenſum per partes exteriores cum dolore, calore aut frigore perſentiunt.

Prognofis huius affectus à Cornelio Celſo eleganter proponitur his verbis : *Si ex capite in nares deſtillat humor, leve eſt : ſi in fauces, pejus : ſi verò in pulmonem peſſimum eſt.* Hippocrates verò in validè ſenibus catarrhum difficillimè concoqui aſſeruit.

Ubi magna humorum copia redundat, ſivè ea à plethora ſit, ſivè à cacoſymia, periculofus inducitur catarrhus. Metuendum enim eſt, ne affatim irruens copioſus humor ſuffocationem aut grave aliquod aliud malum inducat.

Huius affectus curatio duplex inſtituenda eſt, alia quæ frigidum catarrhum, alia quæ calidum reſpiciat.

Tota catarrhi frigidi curatio in eo conſiſtit, ut materia peccans præparetur & evacuetur, & ſi ad peſtus aliamve partem influat, revellatur, illiusque motus inhibeatur, tandemque intemperies cerebri corrigatur.

Primò itaque ſi materia copioſa ſit, aut nimio impetu ruat, & metus ſit ne à reliquo etiam corpore affluat, præſertim ſi hepar ſit calidum ; ( contingit enim non rarò, ut catarrhis obnoxii habeant cerebrum frigidum, & hepar calidum, ) ſanguis mittendus eſt, ſed parciore manu. Si verò materia ſit pauca, & lentè moveatur, ætas verò ſenilis, aut temperamentum hepatis minimè calidum, unde nulla ſit ſuſpicio, humorem aliundè cerebro ſuppeditari, venæ ſectio omittenda eſt.

Materia verò peccans plurimum imminuenda eſt portione aut pilulis, vel alio quovis medicamēto purgante, ex his, quæ in frigida cerebri intemperie fuerunt propoſita.

Mox reliquæ humoris præparandæ apozemate dicto loco deſcripto : aut ſi nimia humoris exagitatio non metuatur, apozema purgans poterit inſtitui.

Ac tandem pilulis fortioribus, aut alio cathartico, integra purgatio erit abſolvenda.

Si catarrhus admodum contumax fuerit ad vomitoria conſugiendum eſt, quæ illius materiā potenter eradicant.

Colocynthis ad cerebrum potenter expurgandum efficaciſſima eſt ; ſed ſummo amarore inſenſa eſt, vehementique illius eſt operatio. Corrigitur utrumque infuſione in urina, ſic enim amaritudinem deponit, & ſerè inſipidum remedium evadit, tum vehementia illius infringitur, ut ad 3. j. tutò exhiberi valeat, ſitque excellens ad omnes capitis morbos à cauſa frigida oriundos remedium.

Interdum verò contingit, ut humores excrementitii, à partibus inferioribus ad cerebrum ſublati, catarrhum effi-

cient. Motum autem illum præternaturalem nanciſcuntur, obſtructis meatibus ordinariis, per quos humores illi expurgari ſolebant. Et tunc temporis opportuniffimè curatur catarrhus apertione viarum, tum etiam blandà, miti, & continua purgatione, quia humores ἀνδροποι ad partes inferiores deturbantur, iſſque motus contrarius ſenſim conciliatur.

Huiusmodi autem purgationes blandæ fieri poſſunt per decocta vel juſcula, ad multos dies uſurpata. Interim tamen roborantia medicamenta non erunt omittenda.

Ad revulſionem verò admovebuntur cucurbitulæ, & veſicatorium ſcapulis & cervici ; tum etiam cauteria occipiti, vel brachio. Zacutus Luſitanus *lib. Praxis admirandæ, obſervat.* 160. cauterium retrò aures, tanquàm præſtantiffimum ad omnes diſtillationes à capite manantes, remedium plurimum commendat. Et nos in fluxionibus, oculorum præſertim, laudabiles effectus vidimus. Errhina, ſternutatoria, apophlegmatifmi, & maſticatoria erunt uſurpanda, eā tamen adhibitā cautione, ut quando catarrhus in fauces, pulmones, aut ventriculum decumbit, errhina & ſternutatoria tantum uſurpentur ; quando verò in oculos & nares influit, maſticatoria & apophlegmatifſima.

Horum omnium formulæ capite prædicto fuerunt propoſitæ. In his tamen advertendum, quando materia tenuitatis cujuſdam particeps eſt, ne fortius reſolventia uſurpentur : his enim humoris impetus ad peſtus & pulmonem, aliasque partes adaugeri poteſt. Sed nonnulla in craſſantia, aut humoris impetum cohibentia erunt admiscenda, ut roſæ rubræ, maſtiche, coriandrum, nux moſchata, aliaque in catarrho calido fuſius proponenda. In hunc ſenſum errhinum in ſequentem modum componi poterit.

℞. Aquæ majoranæ 3. iv. ſucci betonicæ 3. j. ſem. nigellæ pulverat. 3. ſ. nuc. moſchat. 3. j. Fiat errhinum. Pro ditioribus addi poterunt moſchi & ambræ grifeæ an. g. ij. Vel

℞. Ligni guaiaci limati 3. j. aquæ puræ ʒ. j. Infundantur per noctem ſupra cineres calidos, deindè coquantur ad mediæ partis conſumpt. addendo ſub finem majoranæ & roſarum rubr. an. P. ij.

Sic etiam maſticatorium, ſubtenui exiſtente materiâ, vel fiet ex maſtiche ſola, vel in hunc modum.

℞. Nucis moſch. 3. i. maſtiche, gummi Arabi, an. ʒ. ſ. Redigantur in pulverem, cum aqua roſar. fiant trochiſci maſticatorii.

Præſtaus ſternutatorium componitur ex hellebori nigri & ſacchari partibus æqualibus quod cerebrum potenter expurgat.

Extractum nicotianæ cum aqua vitæ paratum, lingue impoſitum ad piſi magnitudinem, magnam pituitæ copiam inſtar apophlegmatifmi per os educit. Verum ſi nimia copiâ uſurpetur, aut ſi in ventriculum effluere ſinatur, vomitum excitat etiam vehementem.

Supra dictum eſt cauteria brachiis, occipiti, & pone aures inuſta plurimum conferre, quod etiam efficaciter præſtant poſteriori parti cervicis & inter ſcapulas admota, quæ hodiè in maximo uſu ſunt, & Practicis noſtris paſſim uſurpantur. Notus etiam locus à quibuſdam inventus eſt, nempe in cervice prope venas jugulares, in muſculorum interſtitio : huius cauterii beneficio catarrhus inveteratus, raucedinem efficiens, in duobus curatus eſt.

Tandem poſt convenientes evacuationes, cerebrum roborantia & exſiccantia, tam interna quàm externa erunt utiliſſima, ut opiatæ, pulveres, cucurbitulæ, ſuffitus, prout in curatione frigidæ intemperiei cerebri deſcripta fuerunt.

Notandum eſt opiatæ prædictæ, aut aliis ſimilibus, in catarrhi curatione conſervam roſarum, nucem moſchatam, & thus albiſſi utiliter admisceri.

Decoctum ligni lentifcini, in modum decocti tudorifici uſurpatum, cerebrum exſiccatur, & fluxionem cohibet.

Præterea ſequentes morſuli ad hunc uſum utiliſſimi ſunt.

℞. Sem. coriandri præparati 3. ſ. nucis moſch. thuris an. 3. ij. glycyrrhizæ, maſtiche, an. 3. ij. cubebar. 3. j. conſervæ roſar. rubr. 3. j. ſacchari albi in aqua roſar. diſſoluti 3. x. Fiat conſectio in rotulis, pond. 3. ij. Capiat unam manè & vespri.

Trochiſci



Trochisci sequentes valdè commendantur à Solenandro *conf. 10. fcl. 4.* quos ab antiquis, tum Græcis, tum Arabibus mutuatur.

℥. Thuris masculi, succi liquiritiæ, an. 3. j. opii, croci, myrrhæ, an. 3. j. Cum syrupo papav. formo trochiscos vel pilulas, urgente catarrho exhibendas per intervalla. Dosis erit ʒ. ij. vel 3. ʒ.

Tabellæ sequentes etiamnum usui esse poterunt.

℥. Pulver. electuar. diamb. & diamoschi dulcis an. 3. j. succini albi ʒ. j. ol. anisi gutt. iij. sacchari in aqua lavedulæ dissoluti 3. iv. Fiant Tabellæ pond. ij. Capiant unam manè & serò.

Inter remedia interna, capite de intemperie frigida cerebri descripta, summæ est efficaciæ, ad catarrhi inveterati curationem, balsamum cephalicum ibidem, post opiatam descriptum, quod intus assumi poterit & in narium cavitates immitti.

Lac sulphuris, & flores ejusdem ad catarrhum exsiccandum maximè laudantur à Chymiatris, tum etiam Galenici in Tabellis flores sæpissimè usurpant.

Recentem catarrhum aqua nucum, cum hydromelite exhibita horâ somni per triduum; valdè imminuit.

Ad cohibendum catarrhum utiliter admovetur syncipiti raso cataplasma ex fermenti 3. ij. & carabes 3. ij. compositum. Si verò æger caput radere noluerit, supra ipsum capillitium aliqua ex parte detonsum, sacculus ex chamæpit. & carabe confectus apponi poterit.

Præter suffitus prædictos, qui ex gummi Tacamahaca fit, summæ est efficaciæ: catarrhum enim exsiccat, ejusque motum cohibet, neque vehemens est illius odor, ita ut conclave ægrotantis eo sine molestia perfundi valeat.

Commodissimum est etiam caput exsiccare sacculis ex furfure, milio, sale, foliis salviæ, betonicæ, stœchados, sem. fœniculi, anisi, & similibus.

Denique si affectus sit contumax, omnia conveniunt remedia, quæ pro frigidæ cerebri intemperici curatione fuerunt proposita.

Calidus catarrhus curatur remediis materiam peccantem evacuantibus, incrassantibus, & revellentibus; tum etiam partium mandantium & recipientium intemperiem corrigentibus.

In hunc finem primò phlebotomia instituenda est, si cætera consentiant; quâ humor fluens revellitur, ejusque acrimonia temperatur.

Deindè humoris ejusdem portio ducenda est blando cathartico, quod humores nullo modo commoveat, in hunc aut similem modum.

℥. Rhab. electi ʒ. iv. myrobolan. citrinor. ol. amygdal. dulc. confricat. 3. ʒ. fantali citrini ʒ. ʒ. Infundantur in aqua lactucæ & portulacæ. In expressione dissolve mannæ granat. & syrup. rosar. solut. an. 3. j. Fiat potio.

Vel loco aquarum prædictarum potest fieri decoctio ex herbis refrigerantibus & tamarindis, cui purgantia prædicta permisceantur.

Deindè humor alterandus & incrassandus est julepis convenientibus.

℥. Fol. lactuc. portulac. & plantag. an. M. j. sem. quatuor frig. maj. & papaveris albi, an. 3. ij. flor. violat. nymphææ, & papaveris rhœados, an. P. j. Coquantur ad ʒ. j. In col. dissolve syrupi violac. & rosar. siccat. an. 3. j. ʒ. Fiat julep. pro tribus dosibus, bis in die sumendis.

Vel loco decocti, aquæ stillatitiæ prædictarum herbarum, vel emulsionem quatuor sem. frig. maj. substitui poterunt.

Deindè purgatio paulò fortior usurpanda, addendo purgantibus prædictis sennâ, catholicum, diaprunū, & similia.

Lene ac blandum remedium incrassans, humorisque acrimoniam demulcens, desumitur ex vitellis ovorum recentium, quorum duo in uncis quinque vel sex aquæ fontis dissolvantur binario numero, addendo sacchari albi 3. j. Coquantur parùm sine ebullitione, semper movendo, & capiat calidè quantum ferre poterit, manè & serò per triduum.

Ac tandem majori humorum incrassationi & fluxus cohibitioni incumbendum est: quod fiet syrupo sequenti.

℥. Syrupi violac. & de ros. siccis, an. 3. j. syrupi de papavere 3. ʒ. Detur ex cochleari 3. j. horâ somni.

In eundem finem usurpari poterit opiata subsequens.

℥. Conservæ rosar. antiquæ 3. vj. pulveris electuar. diatrag. frig. 3. ij. boli armen. loti in aqua rosar. ʒ. ij. Cum syrupo rosar. siccatum fiat opiata; capiat ad magnitudinem avellanæ horâ somni.

Hordeatum sequens utilissimum etiam est.

2. Hord. mundat. q. f. Maceretur per horas vj. postea coquatur perfectè, & trajiciatur. Deindè accipe amygd. dulc. excort. 3. iij. sem. cucurbitæ mund. 3. j. ʒ. sem. melon. 3. j. papav. albi, & lactuc. ana 3. ʒ. Contusis omnibus cum aqua hord. ejiciatur lac, quod cum ʒ. ij. pulpæ hord. permixtum coquatur parum, addendo sacchari portionem. Bibat 3. x. aliquot matutinis, superdormiendo, & nunquam in introitu lecti. Tum etiam trochisci sequentes in ore frequenter erunt detinendi.

℥. Gummi tragacanthi & Arabici, ana 3. ij. boli Armen. terræ sigillat. lotor. in aqua rosar. ana 3. j. sem. papav. albi, succi liquiritiæ, ana 3. ʒ. sacchari penidiat. 3. j. Cum mucilag. sem. cydon. extract. cum aqua rosar. fiant orbiculi parvi, quos diu noctuque in ore detineat.

Spiritus sulphuris vel vitrioli ad gutt. iij. vel. iv. exhibitus manè & serò, cum liquore idoneo, contra omnes fluxiones magnas vires habet, præsertim verò eas, quæ à calida viscerum intemperie ducunt originem. Potest etiam in minori dosi potui permisceri, quia cum eo venas omnes pervadit, & motum humorum cohibet.

CrySTALLUM etiam minerale, ad eundem usum, julepis aliisque remediis admisceri potest.

His nihil proficientibus, necessitas cogit uti narcoticis. Inter quæ principatum obtinet laudatum opiatum, à gr. j. ad ij. aut iij. horâ somni exhibendum. Vel syrupi de papav. 3. ʒ. vel 3. j. exhiberi potest. Hæc ab initio morbi usurpata, miranda præstant. Eandem habet vim theriaca recens, ad ʒ. j. vel 3. ʒ. nocturnum exhibita.

Benedictus Faventinus sequentibus pilulis usus est in catarro falso, felicissimo cum successu.

℥. Succj glycyrrhiæ 3. ij. aloës lotæ 3. j. pilul. de cynoglossa 3. ʒ. Cum syrup. violac. fiat massa pilularum, de qua capiat ʒ. ʒ. horâ somni. Trochisci Solenandri, supra descripti, erunt utilissimi.

Huic usui etiam maximè conferre potest diacodium album, in curatione phrenitidis descriptum.

Interdum revellenda est materia fluens per clysteres, cucurb. frictions, & ligaturas extremorum, omniumque potentissimè per vesicatoria, posteriori cervicis parti admoda, ac denique cauterium occipitio vel brachio, si catarrhus sit diuturnus.

Ad caput etiam roborandum, fluxionem retinendam, ejusque reliquias absumendas, conveniunt pulveres, cucufæ & emplastra.

℥. Succini albi, sandarac. Arab. (Gum. junip.) mastiches, bezoini, nucis moschatæ, ana 3. j. thuris, gran. kermes & rosar. rubrar. ana 3. ʒ. santalor. omnium, myrtill. & balauft. ana 3. ij. Fiat pulvis, qui inspergatur capiti, horâ somni, manè pectine decutiendus.

℥. Gummi juniperi ʒ. ij. rosar. rubrar. P. ij. myrtill. 3. j. macis, nucis moschat. ana ʒ. j. thuris, sem. pœoniæ, cortic. papav. ana ʒ. ij. nuc. cupress. ʒ. ʒ. Pulveriscentur, & cum floccis panni coccinei, ac sindone rubra, fiat cucufa interposita, perpetuò gestanda.

℥. Mastiches, cortic. thuris, ana 3. ʒ. sandaracæ, coralli rubri, rosar. rubrar. myrtill. balauft. cortic. granat. an. 3. i. laudani 3. ii. ceræ, & olei rosacei q. f. Fiat emplastrum, applic. futuræ coronali.

Quia verò hujusmodi catarrhus à calida plerumque hepatis intemperie ducit originem; idè remedia, quæ illius intemperiem emendant, erunt etiam usurpanda.

Denique hoc imprimis notatu dignissimum est, quod etiamnum supra in catarrhi frigida curatione propositum est; nimirum, non rarò humores excrementitios, à partibus inferioribus ad cerebrum sublato, catarrhos efficere, & motum acquirere præternaturalem, obstructis meatibus ordinariis, per quos expurgari solebant. Et tunc temporis opportunè curatur catarrhus apertione viarum, simulque, blandâ & continuâ purgatione per jacula, aut alia decocta: ad multos dies insti-



tuta. His omnibus jungenda sunt, quæ tradit Sneiderus de Catarrhis.

## CAPUT XVI.

### De Doloze Capitis.

**C**ephalalgia nomen pro omni dolore capitis generaliter usurpatur. Sed in specie, & magis strictè, recentem capitis dolorem significat; cephalæa verò, inveteratum; & hemicrania, cum qui dimidiam tantum capitis partem occupat.

Sunt & aliæ doloris capitis differentia, quibus dividitur in internum & externum; sympathicum & idiopathicum, & ex his denuò alius pungitivus; alius tensivus, alius gravativus, alius pulsatorius.

Dolor capitis internus in meningibus locum habet, qui profundus est, & ad radices oculorum pertingit: externus verò, in pericranio situs, pilorum radices inverti non sinit, & ad capitis compressionem exacerbatur. Hæc est Galeni doctrina, quam proponit 3. de loc. aff. c. 1. & lib. 1. de comp. med. secundum locos, c. 3. ubi disertè asserit, dolorem capitis internum hoc peculiari signo distingui ab externo, quòd internus ad radices oculorum pertingat, externus verò minimè. Et rationem reddit, quia tunica oculorum à cerebri meningibus prodeunt, undè dolor eò usque facillè propagetur.

Attamen Fernelius huic doctrina contradicit lib. 5. sue Pathologiae, cap. 1. asseritque, externos etiam dolores ad radices oculorum pertingere, quod pericranium, cui insident, ad oculorum cavum pertingat.

Huic respondet Rondeletius lib. 1. meth. med. cap. 5. ad dolorem pericranii oculi cavum non dolere, licet illud eò usque pertingat, quòd pericranii dolor à frigore externo ut plurimum oriatur; quia pars frigida à simili facillimè patitur qualitate. Illud autem frigus ad oculi cavum non potest pervenire, quia à calore oculorum, spiritibus, & sanguine conservatur. Si verò interdum ab æstu, aut simili causa, dolor capitis externus excitetur; tunc autem capitis tantum affici affirmat, non autem pericranium in profundiori loco situm.

Verum hæc Rondeletii doctrina non omnem omnino tollit difficultatem. Licet enim omnia, quæ ille adstruit, ipsi concederentur; tamen si dolor excitetur ab aliquo tumore juxta pericranium collecto, aut ab alia causa continuo solvente, nulla ratio erit, cur dolor ad oculi cavum non feratur.

Dicere possumus ad Galeni defensionem, duplici ratione hoc signum fuisse à Galeno propositum. Primò, quia membrana, quæ in pericranio ad oculi cavum fertur, est hebetioris sensus, atque ita non compatitur dolori pericranii, nisi admodum obtusè: tunica verò oculi, quæ prodeunt è meningibus, sunt exquisitissimi sensus atque adeò insigniter dolent. Deindè membrana illa, quæ à pericranio oritur, non adeò intrinsecè & profundè attingit oculum versùs nervos opticos, sicut tunica quæ à meningibus procedunt. Undè dolor ille externus non potest se extendere ad fundamenta oculorum, ut loquitur Gal.

Idiopathicus dolor stabilis & permanens est, nec aliarum partium sequitur effectus: Sympathicus verò ab alterius partis affectu dependet; ita ut dum affectus ille susceperit incrementum, dolor capitis intendatur; dum verò remittitur, conquiescat. Ille autem sympathicus dolor fit vel ex consensu totius corporis, sicut in febribus contingit; vel determinatæ partis; putà ventriculi, hepatis, lienis, vel uteri.

Quænam verò sit illa pars quæ dolorem capiti communicet, ex cujusque partis affectu propriis indicibus facillè innotescet.

Dolor pungitivus ab acri & bilioso humore vel vapore, membranas feriente excitatur. Gravativus à copioso humore crasso, frigido, pituita scilicet, vel melancholia partes sensibiles comprimente. Tensivus fit à flatibus aut humoribus mitioribus intra membranas se se insinuantibus, easque distendentibus. Pulsatorius denique

Laz. Rivèri Opera:

fit à tenti biliosoque sanguine, vel spiritu redundante, quo turgentes, ac diffentæ arteriæ vehementius pulsant, membranasque concutiunt: sicque partes vicinas percutiendo sensum pulsationis in iis efficiunt, ut fusiùs docetur à Galeno 2. de loc. aff. cap. 3.

Ex supra propositis causæ præcipuæ doloris capitis satis declarantur, quæ in universum ad solutionem continui, tanquam ad causam proximam & immediatam referuntur. Quæcunque igitur continui solutionem manifestam vel occultam inferre possunt, ea capitis dolorem etiam inducere apta nata sunt.

Signa etiam diagnostica tum specierum doloris capitis, tum causarum eas producentium, ex superioribus desumi possunt, ut prognostica tantum exponenda super sint.

Dolor capitis externus perpetuò minus periculosus & curatu facilius est interno.

Dolor capitis in febre acuta, cum urina tenui & alba, periculosus. Significat enim raptum materiæ biliosæ ad cerebrum, undè phrenitidis periculum impendit.

Dolor capitis fortis, subito delitescens, nulla subsequente evacuatione, aut morbi immutatione, lethalis. Significat enim facultatis animalis abolitionem, quæ objectum dolorificum amplius non sentiat.

In vehementi capitis dolore extrema frigescente, malum; ex doloris enim vehementia magna fit caloris retractio ad partem affectam, undè periculum imminet inflammationis.

Quibus ex morbo partium inferiorum convalescentibus dolor capitis vehemens supervenerit, si non præcedat excretio manifesta, iis in cerebro futurus est abscessus; materiæ enim morbificæ translationem ad cerebrum significat.

Qui in doloribus capitis æruginosa vomunt, & cum surditate vigilant, ii citò vehementer insaniant. 1. Prorrh. Significat enim bilis adustæ in cerebro collectionem, quæ ventriculum in consensum trahat.

Capitis dolores, & sonitus aurium sine febre, aut vertigo; aut surditas, aut manuum torpor imminentem apoplexiam aut epilepsiam significat. Hipp. in Coacis. Fiunt etiam ista symptomata è pituitæ crassæ copia, in cerebro cumulata.

Uterò gerentibus capitis dolores soporosi cum gravitate fientes, mali. 1. Prorrh. Significant enim humorum transfluxum ad cerebrum, qui cum multi & copiosi sint in muliere gravida, ob purgationis menstruæ defectum, hinc gravius malum metuendum est.

Dolor capitis, qui à morbi principio non apparuit, agitato & perturbato corpore obortus, imminentem crisis per hæmorrhagiam, aut vomitum significat.

Cum igitur capitis dolor tum à frigida causa, tum à calida dependeat: ad utriusque oblationem curatio dirigenda est.

Ad prioris curationem materia pituitosa primò evacuanda est convenienti præparatione adhibita, ut superiori capite dictum est. Deindè intemperies cerebri frigida corrigenda, ac reliquæ humoris discutiendæ sacculis, superiori etiam capite propositis, vel iis, qui in frigida cerebri intemperie descripti sunt. Quibus calentibus confricetur caput dextrum manè per sesqui horam, singulis diebus, dum doloris causa fuerit exhausta.

Post frictionem capitis per sacculos, inspergatur pulvis sequens, cotone, aut lanâ superposita.

℞. Nuc. moschat. caryophyll. piperis, pyrethri; ana ʒ. ss. fol. salviæ, baccarum lauri, ana ʒ. ij. sem. sinapi, nasturtii contus. an. ʒ. vj. Fiat pulvis, capiti inspergatur ut dictum est, & manè pectatur ante usum sacculorum, ut pulvis pridie inspersus excidat.

Utilia etiam erunt errhina, sternutatoria, & apophlegmatismi: quorum descriptiones supra fuerunt propositæ.

Utilis etiam erit syrupus magistralis, in hunc modum compositus.

℞. Raf. ligni guaiaci, & rad. chinæ in taleolas divisæ, an. ʒ. j. ʒ. Infundantur per horas xii. in lb. iv. aquæ fontis. Bulliant ad mediæ partis consumptionem addendo sub

Bb

finem



finem fol. verbenæ M. i. flor. floechados & major. ana. P. j. In colatura dissolve sacchari albi lb. β. Coquantur in syrupum, & antequàm sit perfectè coctus, in eum conjice in nodulo, fennæ mundat. ℥. iij. agarici recenter trochiscati ℥. ij. rhab. opt. ℥. iij. Capiat ℥. ij. vel iij. semel in septimana.

Conferent etiam plurimùm pilulæ sequentes, quæ in Italia olim magno in pretio habitæ sunt tempore Eustachii Rudii, in Academia Patavina professoris Prædicæ primarii, qui earum autor prædicabatur, & pro magno secreto habebat; ideòque uni duntaxat Pharmacopœo conficiendas dederat, ne aliis innotesceret earum descriptio, quam tamen mutuatus fuerat à Weckero, qui eam proponit ex Andernaco. Illa autem talis est.

℥. Colocinth. ℥. vi. agarici troch. diacrydii, hellebor. nigri, turbith, an ℥. β. aloës ℥. j. specier. diarrhod. abbatis ℥. β. Contundantur purgantia, & podantur in vase vitreo cum spiritu vini, ut octo digitos superemineat, & digerantur per octo dies in loco calido, postea adjiciatur pulvis diarrhod. Et infundantur adhuc per quatuor dies. Mox colentur omnia & fortiter exprimantur. Liquor expressus destilletur in balneo, donec in fundo alembici extractum redeat ad eam crassitiem, quæ pilulis efformandis idonea sit: quarum dosis est ʒ j.

Sequentes verò pilulæ Fernelio tribuuntur, quarum se tantam vim experiendo cognovisse affirmabat, ut nullam cephalalgiam aut hemicraniam offenderit, quam non curaverit.

℥. Aloës opt. ℥. β. pulv. electuar. de gemmis, trium fantal. rosar. rubrar. ana ℥. iij. Cum syrupo absinthii, vel rosat. fiat massa. Detur ʒ. i. bis in hebdomada hora i. vel ij. ante cœnam.

Ac denique in contumaci dolore & inveterato omnia convenient remedia, quæ pro curatione frigidæ intemperiei cerebri fuerunt proposita. Inter quæ non infimum locum obtinent emplastra epispastica. Quibus etiam non conferentibus, nonnulli ausi sunt capiti admoveere emplastrum de ranis Vigonis cum mercurio, quo multis pituitosis humoribus per sputa evacuatis, inveteratos capitis dolores interdum cessasse asserunt.

Thermæ sulphuræ ac bituminosæ in hoc casu efficacissimæ sunt, tum balneo, tum lotione capitis.

Plurimùm etiam conferunt, in dolore inveterato, decocta sudorifica, quibus multos fuisse liberatos, apud celeberrimos Autores legere est.

Quibus non conferentibus Mercatus ad sibi usum audit confugere, eumque cum elogio commendat *lib. i. de intern. morb. curatione, c. 8.* In dolore autem diurno plus præstat caput frequentius roborare, quàm pertinaciter vacuationibus insistere, ideò conferent pulveres & cucuræ, aliaque topica, in frigidæ intemperiei cerebri curatione proposita.

Magis tamen probantur pulveres, quia virtus pilei non ita cerebro communicatur, & ex ejusdem sorditis dolor excitari potest.

Præterea fieri poterit inunctio ex ol. amygd. in quo serpillum, lauri folia, massiche, spicia, mentha, majorana, thymus, pulegium, nux moschata, cariophylli, & cinamomum, aut horum nonnulla bullierint, addendo, dum sit ebullitio, vini rubri parùm.

Vel sequens oleum arte chymicâ paratum componi poterit.

℥. Terebinth. lb. i. massiches, nucis moschatæ, cinamomi, ana ℥. j. caryophyll. zedoar, galangæ, ladani, ana ℥. i. β. succi ebuli, & cucum agrest. ana ʒ. i. ol. chamom. & liliorum, ana lb. β. vini rubri lb. i. β. serpilli virid. M. i. Pulveranda pulverentur & conjiciantur in retortam vitream, extrahaturque oleum, quo derastrum caput illinatur.

Oleum succini ad idem est efficax, eoque tempora inungere sufficet. (Efficacior Balf. vitæ Bilgeus.)

Dum prædicta remedia administrantur, ab ipso etiam curationis initio specifica remedia usurpari poterunt, quale est hoc epithema.

℥. Pulv. zedoar. ʒ. i. aquæ betonice, verbenæ, sambuci ana ʒ. i. Misce, applicentur calidè parti dolenti cum pannis scarlattinis.

Inter specifica doloris capitis à quacumque causa oriatur, principem locum obtinet verbena, cujus aqua destillata & capiti admovetur, & intus assumitur ad ʒ. iv. cum spiritus salis gut. iij. Imò verò ipsa verbena viridis, de collo tantùm suspensa, duos ægros sanavit apud Forestum, cum multa remedia frustra usurpata fuissent.

Zacutus Lusitanus *lib. 1. Praxis Med. mirab. observ. 7. 8. & 10.* quatuor proponit remedia experimentis ibid. enarratis confirmata: nempe foniculum in summa manu, hirudines temporibus affixas, apertionem venæ frontis, & juxta canthum oculi, quorum historias dictis locis videre est.

Circa illas observationes hæc notanda. Primò, foniculus inter pollicem & indicem admotus, aliis experimentis comprobatus est, & rebellem capitis dolorem curavit.

Secundò, in curatione quæ per hirudines fit, Zacutum non esse contentum duas vel tres admoveere, ut vulgò solet fieri; sed decem aut duodecim circulariter temporibus affigere: undè maxima sequitur sanguinis attractio, quæ totam materiam morbificam exhaurire potest.

Tertiò, in curatione quæ fit secta vena frontis, notandum est, eam venam bis sectam fuisse; undè innuitur primam sectionem satis non profuisse: cum tamen practici nostri rarò eam operationem repetant, si primâ vice non successerit.

Causa calida, dolorem capitis primum & essentialem efficiens, est sanguis aut bilis. Eademque utique conveniunt remedia, sed magis minùsve potentia, pro majori vel minori causæ efficacia.

Primò igitur à phlebotomia incipiendum est, præmissis clystere. Major tamen sanguinis copia educenda est, cum dolor sit à sanguine, minor, bile redundante.

Deindè medicamentum purgans bilem exhibendum est, non solum quando bilis causæ principalis rationem obtinet, sed etiam quando sanguis luxuriat, cujus portio tenuior facilè in bilem vertitur.

Si unica evacuatione materia peccans sufficienter educta non videatur, repetenda erit purgatio per debita intervalla.

Postea admoveantur capiti repellentia, & oxorrhodina, qualia in curatione phrenitidis fuerunt proposita, mitiora eligendo.

Ac consequenter animalia recenter mactata, aut eorum partes, ad materiæ morbificæ reliquias dissolvendas & dolorem demulcendum, erunt utilissima.

In dolore capitis, qui per febres continuas affligit, pulmo vervecinus ex recens mactato animali extractus, & calidè admotus, dolorem potenter demulcet.

Ad idem valet cataplasma ex cucurbita contusa, vel sempervivo majore plantis pedum admotum.

Apertio saphænæ, præmissâ sufficienti phlebotomia in brachio, capitis dolorem in febribus, sæpè in momento fugat.

Interim revulsiones per cucurbitulas tam siccas, quàm scarificatas, & frictions extremorum erunt celebrandæ.

Ac toto morbi decursu, si alvus non sit fluida, clysteres emollientes, refrigerantes, & leniter purgantes alternis diebus erunt injiciendi.

Tum enim derivatio rectè & utiliter celebratur post generales evacuationes & revulsiones, secta vena frontis, aut eidem admotis hirudinibus, & vesicatoriis cervici applicatis.

Dum hæc fiunt, tota humorum massa erit temperanda julepis, emulsionibus, & jusculis, in curatione phrenitidis propositis.

Si denique dolor valdè urgeat, ad narcotica veniendum est, tam externa, quàm interna: prout in dicta curatione phrenitidis usurpata sunt.

Apertio venarum frontis, & hirudines temporibus, ex Zacuto Lusitano supra commendatæ, hîc etiam conferre poterunt.

Paræus *lib. 16. cap. 4.* hemicraniam desperatam arteriotomia in temporibus celebrata curatam esse refert, nulumque in ea periculum esse testatur. Aperitur arteria ut in



in phlebotomia, & sanguinis impetu ac saltu profilientis, 3. vj. detrahendæ. Mox appositis, ut decet, plagulis deligatio faciendæ, & per quatrimum detinenda.

Eadem dicit Botallus in vetustis capitis doloribus, quasi miraculo conferre. Nos etiam illius usu atrocissimam hemicraniam curavimus, & nullum in ea arteriarum aperitione periculum esse advertimus.


Vulnere emplastrum admovendum est, ex thure, mastiche, bolo armeno, & pilis leporinis, albumine ovi subactis. Deindè fascia admovenda, qualis in vulneribus

capitis concinnari solet.

In omni dolore capitis, à quacumque causa fiet, si aliis remediis non cesserit, & doloris atrocitas ad extrema confugere cogat, vesicatorium toti capiti admotum, de-raso capillitio. curationem absolvere poterit.

Cauterium futuræ coronali admotum, dolorem capitis contumacem aliquando radicitus abstulit.

Multò majoris est efficacis si temporibus admoveatur, de quo vide Poterium *observationum centur. 3. c. 8.* & observationes nostras publico communicatas.



# P R A X E O S M E D I C A E

## L I B E R S E C U N D U S.

### D E A F F E C T I B U S O C U L O R U M.

#### P R A E F A T I O.



**O**CULORUM affectus tam varii sunt atque multiplices, ut difficillimum sit eos perpicue ac dilucide enarrare, ab invicemque distinguere. Quod tamen ut ncs, (quantum fieri poterit,) assequi nitamur, & tractationem istam praxeos usui maxime accommodemus, eos ita partiemur, ut morbi à quibus visio immediate læditur, primum exponantur: postmodum verò reliqui morbi explicentur, qui partibus oculum componentibus, aut illi adjacentibus, citra ullam, aut saltem perexiguam visionis læsionem contingunt. Læditur autem visio imminutè, abolitè, depravatè. Abolita visio τὸ φλότις Græcis, Cæcitas Latinis nominatur. Imminuta verò, pro variis imminutionis gradibus & modis, varianomina sortita est, quorum præcipua sunt, Amblyopia, Myopia, Nyctalopia, & acies sive acuties vespertina.

Cæcitas vel à nervorum opticorum obstructione absoluta (Et tunc Amaurosis nominatur) vel à suffusione integra, vel aliis humorum & tunicarum vitiis gravioribus exoritur. Amblyopia, quæ Latinis visus obscuritas, hebetudo, vel caligo nominatur, in qua objecta non satis clarè & perspicue cernuntur, in quacumque distantia posita, ab iisdem cæcitatibus causis producitur, sed levioribus & imperfectis, ut nervorum opticorum obstructione imperfecta, suffusione levi, spirituum inopia, vel crassitie, & aliis hujusmodi. Myopia Latinis lusciositas dicitur, in qua objecta non nisi propinqua & ferè oculis admodum cernuntur; dissita verò minime, vel saltem imperfectè, ut ita affecti notos, & amicos prætereuntes non agnoscant. Fitque secundum Galeni & omnium ferè recentiorum doctrinam, paucitate & tenuitate spiritus visorii, qui non eget mediis illuminati copia, ad perfectè visionem efficiendam; sed ab ea dissipatur. Contra verò, qui spiritus habent crassos, remota melius vident, quia spiritus ille crassus majori indiget collustratione, quæ in majori mediis illuminati copia reperitur. Verùm hæc doctrina falsissima, ex Opticæ ignorantia oriunda, ex illius theorematibus aperte demonstratur, & ex humoris crystallini situ diverso, hæc visionum diversitates emergere. Cum enim species objectorum per pyramidem recipiantur in crystallino humore, ad quem conus pyramidis protenditur; si crystallinus ad anteriora & versus pupillam magis vergat, objecta remotiora melius videntur, quia ut conus pyramidis ad crystallinum perveniat, & in eo terminetur, objecta remotiora esse necesse est. Si enim ad oculum magis accedunt, conus pyramidis crystallinum transgreditur, & objecta magis confusa percipiuntur: contra verò si crystallinus in profundo oculi magis situs sit, & ab uvæ tunica magis remotus, objecta debent oculis esse viciniora, ut conus pyramidis ad eum accedere valeat. Undè patet myopiam non aliter fieri, quàm ex situ crystallini profundiori, atque ita affectum hunc esse connaturalem, ne-

Laz. Riverii Opera.

que remediis superabilem. Affectus verò myopiæ contrarius in quo nimirum objecta remotiora melius videntur, plerumque solet contingere, in quibus humoris aquei portio consumpta est, ut crystallinus ad pupillam accedat. Adde quod à longa capitis inclinatione, quæ vitæ decursu fit, vel in legendo, scribendo, vel alia negotia tractando, humor crystallinus sensim ad anteriora vergat. Hæc demonstratur usu specillorum. siquidem myopiæ laborantes juvantur specillis concavis, à quibus radii specierum visibilibus disperguntur, sicque efficiunt, ut conus pyramidis longius protendatur, atque adeò res, quæ ob distantiam majorem à myopicis percipi non poterat, postmodum percipiatur; protenso nimirum pyramidis cono usque ad crystallinum, qui antea in pupilla, vel humore aqueo seu albugineo desinebat. Senes contra juvantur specillis convexis, quibus radii uniuntur & conus pyramidis abbreviatur, atque ita res propinquæ melius cernuntur, quorum conus antea crystallinum pupillæ propiorem transgrediebatur.

Nyctalopia, seu nocturna cæcitas, fit quando interdum quidem satis vident occidente sole obscurius, noctu verò nihil. Fitque à spiritibus, humoribus, aut tunicis crassioribus, vel pupillæ angustiore. In iis enim omnibus majus lumen necessarium est ad rectè videndum, quo deficiente sub Solis occasu, vel noctu ad lucernam, parum aut nihil vident.

Vespertina acies sive acuties est, quando obscurius interdum, noctu verò melius vident. Hæc etiam aliquando nyctalopia nominata est, ut videre est apud Hippocr. 2. prorrh. Usus tamen retinuit apud recentiores Græcos, ut nyctalopia pro nocturna tantum cæcitate usurpetur. Fitque à tenuitate nimia spirituum, qui multo splendore disgregantur, vel à pupillæ dilatatione, in qua nimium luminis interdum oculum ingreditur, & visionem lædit, noctu verò exiguum lumen magis illustrat, quàm in eis, qui minus dilatam pupillam sortiti sunt.

Quomodo imminutè, abolitè & depravatè visio lædatur, diligentius exponemus, dum omnium oculi partium morbos sigillatim explicabimus. Cum enim omnes particule oculum constituentes, ad actionem illius, puta visionem, conferant, iisdem partibus vitiatis, visionem etiam malè officii necesse est.

Componitur autem oculus ex tunicis, humoribus, & nervo optico, ad quarum partium actionem spiritus animalis tanquam agens principale & universale concurrat. Atque ut earum partium morbos percurramus, à nervi optici vitiata constitutione ordiemur: mox ad humorum & tunicarum affectus progrediemur.

Spiritus autem vitia, vel à cerebro malè affecto dependent, & tunc alii sensus quoque læduntur; vel ab ipsius oculi vitiis, quibus curatis, pristinam atque debitam

Bb 2

constitu-



*constitutionem spiritus recipiunt, ut peculiaris eorum tractatio necessaria non sit. Sed in oculorum affectibus curandi, quibus visio læditur, ea quæ spiritus visivos reficiunt, & visum confortare dicuntur, reliquis remediis perpetuò admiscenda sunt. (Conf. Melet. l. 40. II. 105.)*

## CAPUT I.

## De gutta serena.

**Q**Uando visio aboletur, nullo sensibili vitio in oculis apparente, Amaurosis, seu Gutta serena, affectus ille nominatur. Fitque dum spiritus animales à cerebro ad oculum transmeare nequeunt. Cum autem spiritus animales à cerebro per nervos opticos in oculos influant, influxus illius impedimentum in nervis opticis querendum est. Multis autem modis affici possunt nervi optici, potissimum verò obstructione, adstrictione, & solutione continui.

Obstructio communissima est, & maximè ordinaria guttæ serenæ causa, quæ ab humore pituitoso generatur, à cerebro in nervos illabente, non secus ac alii nervi in paralyti ab eodem humore obstruuntur, ita ut consimiles affectus, ratione illius obstructionis, dici possint.

Certum tamen est, ab adstrictione & compressione nervorum opticorum hunc affectum etiam generari, quæ quidem compressio fieri potest tum ab humore pituitoso circa nervos opticos collecto, eosque comprimente; tum etiam à sanguine, pure, aliave materia in eodem loco cummulata. Undè tumores quilibet in iis partibus geniti, similem affectum possunt producere. Docet enim experientia, cerebri inflammationi, tum etiam phrenitidi, in febribus malignis cæcitatem interdum in uno oculo, interdum in utroque supervenire. Et refert Platerus *lib. 1. observationum*; cæcitatem à se visam, quæ à tumore globoso, in cerebro enato, & nervos opticos comprimente, ortum duxerat, quod per dissectionem cadaveris post ægri obitum innotuit.

Deniquè vulnera capiti inflata, in quibus nervi optici præscinduntur, sine controversia efficiunt, quod spiritus animales ad oculos ampliùs influere nequeant.

Dignoscitur hic affectus, quod oculi in statu naturali constituti videantur, nullumque vitium in iis conspiciatur, nisi quòd pupilla nigrior & amplior appareat. Verum in causarum differentiis distinguendis maxima difficultas est. Licet enim à sanguine aut pure genitus affectus ex inflammatione, abscessu, aut vulnere prægresso dignoscatur, nullum tamen signum certum dari potest, per quod compressionem ab humore pituitoso factam, ab obstructione distinguere possimus. Conjecturâ tamen id quodammodo assequi possumus, quandoquidem in obstructione sola nervi optici solus oculus afficitur. Si verò ejusdem nervi compressio sit ab humoribus pituitosis circa oculorum radices & processus mammillares collectis, vel illa materia alias etiam cerebri partes occupet; tunc reliqui sensus læduntur, aut eorum nonnulli. Si verò nervos tantum opticos obsideat, materia pituitosa solito copiosior per nares excernitur; & gravitatis sensus in anteriori capitis parte præsertim circa supercilia percitur.

Quod ad prognosin spectat, hic affectus, si absolutus sit, id est, si integra sit visus abolitio, ab obstructione nervi optici præsertim oriunda, plerumque incurabilis est. Quemadmodum etiam videmus obstructiones aliorum nervorum, à quibus generatur paralytis, vix aut nunquam curari, præcipuè in iis qui ætate provecti sunt. Si verò imperfecta tantum sit obstructio, quæ visus tantum imminutionem, non autem cæcitatem efficiat, major salutis spes est: licet ea non nisi magno labore & longissimo remedium usu obtineri possit.

Si verò hic affectus fiat ab humoribus in anteriore cerebri parte collectis, & nervos comprimentibus, facilius curari potest. Sic refert Fabricius Hildanus *obser. 19. cent. 5.* virum quemdam, ex assumpto vomitorio vehementi visum amisisse, eumque ejusdem medicamenti beneficio re-

cuperasse: quandoquidem vehementi vomitorio humores nimium exagitati, & versus nervos opticos propulsi, eodem comprimendo, spirituum ad oculos com meatum impediebant, iisdem vero eodem medicamento evacuatis, morbus solutus est. Similis ferè historia refertur à Senerto de quodam studio, cui cum medicamentum purgans fortius exhibitum fuisset, subito obcæcatus est. Idem etiam testatur, scæminas quasdam, cum in utero concepissent, ex nervorum opticorum angustia obcæcatas fuisse, malumque hoc post quatuor aut quinque menses, vel tempore partus, omnino desisse. Nos etiam nonnullos vidimus, qui subito in maximam visus imminutionem inciderant, vacuationibus universalibus & revulsionibus quibusdam, intra quindecim dies restitutos. Ex facilitate curationis coniecimus, humore non intra nervi substantiam impactum, sed in cerebro tantum circa eosdem nervos congestum fuisse.

Ad hujus morbi curationem, materia nervis impacta vel adhærens, quæ obstructionem vel adstrictionem efficit evacuanda est. Quod fieri non potest, nisi prius universum corpus evacuetur, quemadmodum docuit Galen. *4. meth.* oculum non esse sanandum ante totum caput; neque caput ante totum corpus.

Atque ut remedia convenient methodo describantur, victus ratio huic morbo conveniens primùm instituenda est, quæ quidem attenuans & moderatè siccans esse debet. Ac primum aër ad calidum & siccum inclinare debet; crassus verò, frigidus, nebulosus ac pluviosus omnino vitandus. Cibi laudabiles ac boni succi usurpentur, vitando eos, qui crassum succum generant, quales sunt cato porcina, anserina, pisces, legumina, caseus, & similia; tum etiam, quæ vaporosa cum sit, caput replent, ut lactinia, & aromata calidiora, piper nimirum, zinziber, &c. Panis conficiatur cum aqua fœniculi, aut ejusdem semen permisceatur, sedulo cavendo, ne tritico, ex quo panis conficitur, lolium admistum sit, quod visui maximè obesse tota credidit antiquitas. Undè apud Comicum ille qui alteri visus defectum exprobrat, *lolio* inquit, *credo visitare te*. In ciborum condimentis & jussulis utatur iis, quæ extenuandi vim habent, ut hyssopo, fœniculo, majoranâ, betonicâ, salviâ, euphrasiâ, ac præsertim nuce moschatâ, quæ cerebrum roborat, visumque clarificat. Raparum usus frequens esse debet, quia oculos acutiores reddere creduntur. Idem etiam præstant passeris & columbæ, frequenter usitatæ. Vitandæ herbæ frigidiores, ac imprimis lactuca, quæ oculis insensa est.

Ciborum quantitas moderata sit, neque unquam æger iis se immodicè repleat. Cœna sit parcius prandio; & semel, aut bis in septimana, à cœna abstinere utilissimum est. In pastu loco salis conferet uti pulvere sequenti.

℥. Salis communis ʒ. ij. euphrasiæ sicci ʒ. ij. nuc. mosc. ʒ. j. cinamom. ʒ. ij. M. fiat pulvis. Post singulos pastus capiat æger pulveris sequentis cochl. i.

℥. Sem. coriand. præparati ʒ. β. semin. anisi, fœniculi, ana ʒ. ij. cinamom. auc. mosch. ana ʒ. i. euphrasiæ siccæ ʒ. iij. sacchari rosac. duplum pondus omnium, fiat pulvis.

Vinum in hoc affectu non convenit, quia vaporosum est, & caput replet, fluxionibusque promovendis maximè idoneum. Ideò decoctum falsæparillæ, liquiritia dulcoratum, & coriandro aromatizatum, erit utilissimum. Sed quia diuturnus admodum est affectus, & omnes tam longam vini abstinentiam ferre nequeunt, si illius usus concedendus sit, eligatur oligophorum, quodque minùs generosum minùsque potens est. Multòque utilius erit, si euphrasia sicca in eo ante maduerit. Atque ut ad longum usum paretur vinum euphrasiatum, doliolo musto repleto, vindemiarum tempore, euphrasia immittatur, eo-que vino utatur æger pro potu ordinario.

Somnus consueto brevior sit, & decubitus supinus quantum fieri potest, somnusque fugiatur meridianus, tanquam maximè noxius. Exercitia moderata sint, eorumque loco frictiones inferiorum partium celebrentur. Alvus laxa perpetuò servetur; & gravia animi pathemata fugiantur.



Institutâ hoc modo victus ratione, curatio ab universali evacuatione incipienda est. Ac primum purgatio instituenda est sequenti medicamento.

℞. Sennæ mund. ʒ. β. semin. fœnic. ʒ. j. folior. beton. euphras. & verben. ana. M. β. liquiritiæ ʒ. iij. Coquantur ad ʒ. v. In colatura dissolve diaphœnici ʒ. iij. syrup. rosar. ʒ. j. Fiat potio, quæ detur manè cum regimine.

Post primam illam purgationem, seriò apud se cogitare debet Medicus, an phlebotomia usurpanda sit. Quandoquidem ea ab omnibus ferè practicis in hoc casu rejicitur, cum affectus sit chronicus à frigida intemperie & materia pituitosa oriundus. Undè metuunt, ne per sanguinis evacuationem cerebrum magis refrigeretur, sicque majorem pituitæ copiam generet, & ne causa morbi conjuncta magis incrassetur, atque ita difficilius discuti ac dissipari valeat. Verùm, ut eorum sententia in senibus, & pituitoso temperamento præditi locum habere debet: in iis tamen, qui aut in juvenili ætate constituti, aut calido temperamento præditi sunt, admittenda non est, præsertim si sanguinis redundantis notæ manifestæ appareant, tunc dubium non est, quin phlebotomia maturè usurpata plurimum conferre valeat. Imò verò, ubi sanguinis mittendi indicationes prædictæ reperiuntur, utile erit ex Pauli & Aëtii sententia, post venæ sectionem in brachio celebratam, venas capitis particulares & oculis vicinas aperire, nempe venam frontis, temporum, & eas quæ sunt in angulis oculorum juxta nasi radicem. Temporibus tamen commodius hirudines applicabuntur, quæ etiam pone aures admotæ, non parum conferre poterunt. Referunt practici nonnulli, ob frontis vulnera nonnullos à cæcitate fuisse liberatos. In quibus cæcitatæ causam verisimile est fuisse nervorum opticorum compressionem, a venis & arteriis vicinis sanguine turgentibus, quas dicta vulnera delevire. Undè Spigelius, referente Plempio in *ophthalmographia*, in gutta serena non sine fructu mediam frontis venam pertundere solebat, sanguinemque tandiù evacuat, donec sua sponte erumpere desineret.

Si verò mensium suppressio hunc affectum præcesserit, ex venis inferioribus sanguis detrahendus est: aut hirudines hæmorrhoidibus affigendæ, si æger earum fluxum antea passus fuerit, qui tunc temporis suppressus sit, vel si hepate calidiori, aut melancholico temperamento donatus sit.

Postmodum verò totum corpus exactius vacuandum est apozemate sequenti.

℞. Rad. fœnic. salsæ paril. ireos Florent. & enulæ camp. ana ʒ. j. folior. beton. majoranæ, melissæ, euphras. fœn. verben. & chelidon. major. ana M. j. liquiritiæ rarsæ & passular. mund. ana ʒ. j. semin. anisi & fœnic. ana ʒ. iij. sennæ mund. ʒ. ij. turbith. gummosi & agarici recentier trochisc. ana ʒ. ij. zinzib. & caryophyllor. ana ʒ. j. flor. stœchad. anthos, & lavandulæ, una P. j. Coquantur ad lb. ij. β. In colatura dissolve sacchari albi ʒ. iij. Fiat apozema clarificat. & aromatizat. ʒ. ij. cinamomi electi, pro iij. dosib. matutinis. Finitis apozematis, exhibeantur pilulæ sequentes.

℞. Massæ pilular. lucis maj. & cochiar. min. ana ʒ. β. Malaxentur cum aqua betonice, formentur pilulæ sex (vel xii.) deauratæ, quas capiat summo mane.

Præmissa hac universali evacuatione, causa antecedens revellenda est, conjuncta verò dirivanda ad discutienda.

In hunc finem frictiones partium extremarum, & præcipuè inferiorum, matutinis horis celebrandæ sunt.

Cucurbitulæ scapulis & dorso sine scarificatione admovendæ. Ac præsertim cucurbitula occipitio cum scarificatione admotæ, tanta efficacità humores à partibus anterioribus & nervorum principio detrahit, ut nonnulli, post illius applicationem, quasi momento visum recuperaverint.

Eodem tempore vesicatorium posteriori parti cervici, admoveatur, & vesiculæ excitatæ servantur diu apertæ: betæ aut brassicæ foliis frequenter admotis.

Exsiccatò vesicatorio, admoveatur causticum occipiti, inter primam & secundam vertebra; (vel quod jam apud nos in frequenti usu est) duo caustica applicentur poste-

riori parvi cervicis, juxta quartam & quintam colli vertebram, ita ut spina dorsi utrique cauterio intermedia sit, & utrumque eodem emplastro curari valeat.

Loco cauteriorum, seraceum eidem parti admotum efficacissimum est; sed nostrorum hominum mollities illius usum penè abolevit.

Si prædicta cauteria non profuerint, futuræ coronali ad moveri potest causticum potentiale, quod aliquando profuit, reliquis non conferentibus.

Dum hæc fiunt, statim post purgationem universalem diætâ sudorifica instituenda est ex decocto ligni guaiaci, sassafr. & rad. salsæ paril. juxta methodum, quæ in frigida cerebri intemperiei curatione à nobis proposita est. Hoc tamen advertendo, ut decocto sudorifico, & circa finem illius addantur ea, quæ oculos peculiariter respiciunt, ut verbena, fœniculum, euphrasia, & chelidonia major.

Et ad cerebrum potentiùs exsiccandum, sacculi loco prædicto descripti, tempore sudoris, capiti admovendi sunt, si nimia illius calefactio non metuatur.

Imò verò, post diætâ sudorificam, usus thermarum sulphurearum & bituminosarum, tum balneo, tum capitis irrigatione erit convenientissimus; cum hujusmodi aquæ ad frigidam & humidam intemperiem corrigendam, pituitam absumentam, & cerebrum roborandum efficacissimæ sint.

Præter universales totius corporis & capitis evacuationem, peculiare etiam institui possunt per apophlegmatismos, quibus pituita per palatum è cerebro elicitur, qui quidem forma gargarismatis aut masticatorii præscribi possunt juxta formulas in cerebri frigidi intemperiei curatione descriptas.

Errhina & sternutatoria ab omnibus propemodum practicis damnantur in hoc affectu, quia humores ad oculos attrahunt. Si tamen post exactam totius corporis & capitis evacuationem mitiora & benigniora per aliquot dies usurpentur, utilia esse poterunt: siquidem materiam morbificam, nervis opticis impactam sensim educere ac derivare poterunt, neque ex profundioribus cerebri partibus quicquam eliciant ad partes anteriores. Alioquin omni derivatione, quæ est evacuatio per partem affectam, aut ipsi vicinam, perpetuò metuendum esset, ne ad ipsam partem affectam fieret attractio, quæ tamen ab universalibus evacuationibus, quæ ipsam debent præcedere, facile impeditur. Illa autem errhina componi poterant ex succo betæ & majoranæ, cum vino albo extracto, in quo manna dissoluta fuerit.

Potentius autem & nihilominus totum errhinum parari potest ex pulvere nicotianæ, præcipuis cephalicis & oxydoricis correcto. Ab eo enim per palatum magis, quam per nares pituita educitur, & cerebrum ita roboratur, ut non adeò facile humorum influxum ab aliis partibus recipiat. Illius igitur compositio talis erit.

℞. Nicotianæ sicca ʒ. j. fol. salviæ majoran. beton. euphras. Flor. caryophyll. nostratis rosar. rub. an. ʒ. j. Fiat pulvis, qui naribus attrahatur manè per aliquot dies.

Neque sufficit purgatione universali totum corpus ab humoribus excrementitiis semel liberare; sed in eo statu conservandum est toto curationis decursu, atque adeò purgationibus interpolatis, quæ in dies congeruntur excrementa, educenda sunt. Quod fiet pilulis usualibus in hunc modum compositis.

℞. Aloës optimæ ʒ. β. sennæ mund. turbith. hermodactyl. & agar. recentier trochisc. an. ʒ. ij. diacrydii. ʒ. j. maccis, caryophyl. & croci Oriental. an. gr. vii. Irroretur succo majoranæ & chelidonæ maj. Deindè iterum exsiccentur in umbra, & cum oxymelite scillit. fiat massa pilularum, de qua capiat ʒ. β. vel ʒ. ij. bis aut ter in mense.

Dum hæc sunt, cerebri & oculorum roborationi perpetuò insistendum est, & varia medicamenta per vices usurpanda: ne æger unum & idem continuò sumendo, nimium fastidiat, nève natura eidem remedio assuescat: inter ea verò, quæ hac dote prædita sunt, recensetur theriaca vetus, quæ ʒ. j. pondere sumi potest horâ somni, cum aqua fœniculi, euphras. & chelidonæ, bis aut ter in septimana.



Commendatur etiam nux moschata manè, jejuno stomacho comesta, & dentibus diu attrita, ut vapor illius ad oculos deferatur. Si illius deglutitio metuatur, propter viscerum calorem, exspui potest comestione.

Myrobalani conditæ, manè assumptæ, visum maximè clarificare existimantur.

Opiata etiam usualis ita componi poteri.

4. Conservæ flor. beton. & antho, ana 3. ij. myrobalanos conditos num. ij. theriacæ veter. 3. ij. pulveris folior. euphras. 3. iij. sem. fœn. 3. ij. nucis moscat. cinam. & cariophil. ana 9. ij. Cum syrupo ex succis fœnic. rutæ, chelidon. cum melle confecto, fiat opiata, de qua capiat æger ad magnitudinem castaneæ, superhausto vini, aqua fœniculi diluti momento.

Neque omittenda sunt externa remedia, quæ caput roborant, calefaciunt, & exsiccant: qualia sunt pulvis cephalicus, capillis inspergendus, cucufa & suffitus, quæ in frigida cerebri intemperiei curatione à nobis tradita sunt.

Denique topica roborantia, oculis admovenda, ab Autoribus passim proponi consueverunt, quæ tamen nullius aut exiguæ sunt efficaciam, quod eorum vis ad nervos opticos penetrare non possit. Si quis tamen eorum nonnulla usurpare desideret, ex suffusionis curatione (ubi ingens copia est) desumere poterit.

In casu desperato, postquam omnia remedia frustra usurpata sunt, vesicatorium toti capiti raso instar cucuphæ admotum, multum aliquando profuit, etiam bis aut ter admotum, ubi priores vesiculæ & excoitationes exsiccatae fuerint.

## CAPUT II.

### *De humoris vitrei affectionibus.*

**H**umor vitreus crystallino subjectus est; & ideo diaphanus à natura factus, ut species puræ ac limpidae ad nervum opticum deferri possint. Si igitur perspicuitas illius, humoris cuiusvis admixtione turbetur, eique opacitas inducatur, pro majori vel minori illius gradu, visum imminui aut aboleri necesse est.

Præterea iste humor laborare potest situ vitiato, si nimirum quædam illius portio per ictum & contusionem ante crystallinum transferatur: tunc enim visus obtenebratur, quandoquidem humor vitreus aqueo crassior est, atque ita species objectorum puræ & sinceræ ad crystallinum deferre nequeunt.

Prior affectus nullis signis cognoscitur, sed sola ratione fieri posse judicatur. Vitreus enim humor introspecti non potest, neque illius dispositio internosci, cogunturque proxim medicam exercentes, cum nullum vitium in oculis appareat, eum cum gutta serena confundere, idque sine ullo ægrotantium damno: cum humores extranei, in vitreum effusi, iisdem remediis discuti debeant, quibus gutta serena curari consuevit.

Situs verò vitrei vitiatas ex eo cognosci potest, quod sub pupilla aluminis instar appareat. A suffusione tamen non facile distinguitur, nisi causæ antecedentes & procacitæ diligenter advertantur. Fit enim suffusio à simplici humorum influxu: hæc verò vitrei humoris transpositio ab ictu & vulnere solet generari.

Incurabilis est iste affectus, neque artis operâ vitreus humor ad pristinum locum reduci potest. Id tamen à natura fieri contingit, atque adeò totum negotium illi est committendum.

## CAPUT III.

### *De humoris crystallini affectibus.*

**C**rystallinus humor, præcipuum visionis instrumentum, præ cæteris oculi humoribus suam puritatem & perspicuitatem retinere debet, ut visio perfectè exerceri valeat. Et si ab ea puritate deflectat, visio plurimum læditur.

Præcipuus autem crystallini affectus, quo illius puritas turbatur, est glaucoma, seu humoris crystallini in glaucum colorem mutatio. Fitque hic affectus quando hu-

mor crystallinus condensatur per exsiccationem; quæ in senectute contingit, concurrente tamen causa aliqua exsiccante & condensante.

Cognoscitur hic affectus, quòd circa pupillam insignis & profunda appareat albedo, & omnia tanquam per fumum & nebulam videantur. Difficile tamen à suffusione distinguitur, quæ talem albedinem in pupilla repræsentat. Undè factum est, ut autores quamplurimi glaucoma cum suffusione confundant. Verum diligenter introspectantibus ex eo distingui possunt illi duo affectus, quod in suffusione albedo in ipsa pupilla, & ferè juxta corneam; in glaucomate verò profundior apparet.

Incurabilis est hic affectus, præcipuè in senibus, in quibus siccitas partium emandari non potest. Si tamen non satis confluit, in crystallino affectum residere, sed suffusionis quædam conjectura sit, illius remedia in usum revocari poterunt.

Præterea laborare potest humor crystallinus situ vitiato, cum nimirum latiori sua parte, quæ lentis instar compressa est, pupillæ foramini non rectè opponitur; sed vel sursum declinat, vel deorsum, tuncque res geminæ solent apparere, si unus tantum oculus hoc vitium patiatur; quia amittitur parallelus, qui in utroque oculo idem esse debet, ut res à duobus oculis percepta eadem appareat. Et si in eadem planitie constituti non sint, res geminæ apparent, quod facile experitur, quicumque alterum oculum digito deprimit, vel attollit: tunc enim amisso parallelo res duplices apparent. Hæc tamen visionis depravatio, qua objecta duplicia apparent, non solum ex causa proposita exoritur, sed etiam à vaporibus, aut tenui pituita, crystallinum inficientibus, à quibus spiritus visorii discinduntur. Undè fit, quod ejusdem rei species in duobus locis recipiatur: quod etiam in ebriis sæpè solet contingere.

Secundò, situs crystallinus vitatur quando versus anteriora aut posteriora inclinatur. Si versus anteriora & pupillam, tunc res propinquæ non rectè percipiuntur, melius verò dissitæ, quod in senibus plerumque contingit. Si verò versus posteriora & nervum opticum magis situs sit, propinqua rectè videntur, dissita verò minimè: & tunc fit Myopia, quæ in præfatione explicata est, dictumque est ibidem, hos affectus solis specillis esse reparabiles.

Tertiò situs crystallini vitatur, quando ad dextram vel ad sinistram nimium inclinatur. Hic affectus Strabismus nominatur, cum pupilla rebus videndis non directè, sed obliquè opponitur, neque ipsa in medio oculi apparet, sed ab eo declinat: ita ut in una oculi parte plus albi appareat, quam in alia.

Fit tamen hic affectus non solum à crystallini situ vitiato, sed etiam ex prava musculorum oculos moventium dispositione, quæ vel naturalis est, vel à dictorum musculorum paralyfi, aut convulsione oriunda.

Verum à quacumque causa producat, si connaturalis est, incurabilis censendus. Si verò à prædictorum musculorum paralyfi aut convulsione fiat, eorum morborum curatio à capitis affectuum curationibus desumenda est.

Denique ex majori vel minori inversione crystallini, aliæ visus depravationes possunt contingere, quando nimirum quæ recta sunt, curva apparent, vel quando objecta quasi inversa videntur. Hoc contigit Medico cuidam, ut refert Sennertus, qui cum scalam, librum aliquem è forulis petiturus ascenderet, & oculos fortius sursum converteret, accidit ut omnia ei postea inversa apparerent, & homines in platea capite ambulare viderentur. Illud quod ex situ crystallini mutato contigit, siquidem post anni quadrantem, cum fortè iterum oculos sursum converteret, naturalis visio rediit, & omnia in recto situ vidit. Undè patet, violento oculi motu crystallinum è sua sede dejectum, simili postmodum motu ad eundem iterum transmissum fuisse. Eam autem crystallini mutationem ita contigisse existimo, ut crystallinus humor sic fuerit inversus, ut pars illius anterior, quæ reliquis depressior est, pupillæ directè opposita non fuerit, sed potius pars illius lateralis: quæ cum gibbosior & magis convexa sit, species objectorum inversas repræsentare potuit, quemadmodum videmus in speculis rotundis, objecta inversa apparere. Idque ea ratione contingere, ex Opticæ præceptis



præceptis docetur, ubi in medio convexo & densiores radii specierum visibilium ita refranguntur ut se se cruciatim interfecent, & qui à parte objecti superiori feruntur, eam tanquam inferiorem repræsentent, & vice versa.

Si verò minor fuerit humoris crystallini inversio, ita ut tum pars crystallini depressa, tum ejus em convexa, pupillæ aliquatenus opponatur, objecta incurva apparere possunt. Quamvis etiam alia ratione fieri possit illa visus depravatio, quâ objecta incurva apparent: nempe si portio humoris crystallini pituitoso humore suffundatur. Tunc enim, propter diversam crystallini tenuitatem & crassitiem, diversæ fiunt refractiones, quæ causæ sunt illius visus depravationis, quâ objecta incurva apparent. Hoc dilucido exemplo demonstrari potest, scilicet baculi, cujus media pars in aquam demersa sit; tunc enim incurvus apparet, ex eo, quod portio in aquam demersæ species, quando ex aqua in aërem defertur, utpotè à medio densiori ad tenuius, refrangatur à perpendiculari: portio verò quæ est in aëre, non refrangatur, quia non transit per diversam mediâ, quemadmodum ea, quæ est in aqua; inde fit, ut baculus incurvus appareat. Eodem modo species objecti, quæ fertur in portionem crystallini densiorem, magis refrangitur, quam dum fertur ad portionem illius tenuiorem, quæ scilicet in statu naturali constituta est, pituitoso humore minimè suffusa, atque ita propter varias refractiones objecta incurva apparent.

Cum autem in horum affectuum curationibus remedia non conferant, in iis inquirendis frustra laborandum non est.

#### CAPUT IV.

*De humoris aquei affectibus, ac præcipuè de suffusione.*

**H**umor aqueus à sua naturali constitutione dejectur, cum quantitate vel qualitate peccat. Dum quantitate peccat, augetur, vel imminuitur præter modum, & pupillæ dilationem aut constrictionem efficit, qui affectus suo loco erunt exponendi. Dum verò qualitate peccat, crassior evadit, quod fit ab humore extraneo in eum effuso, & Suffusio nominatur, quæ hic explicanda est. Licet enim Galenus 1. de sympt. ca. 5. cap. 2. ab ipsius humoris aquei condensatione fieri interdum suffusionem doceat, sine humoris excrementitii affluxu: tamen quia rarissime id contingit, & imaginatione potius, quam artis usu dignoscitur, & si talis affectio detur, prorsus incurabilis est: illa omissa, de ea, quæ fit humoris excrementitii affluxu tantum agemus. Hæc autem ἀρόχυμα Græcis, Latinis suffusio, Arabibus aqua, vulgo cataracta nominatur. Auctores quidam hæc nomina inter se distinguenda esse volunt ut varios hujus morbi gradus significant. Incipiens enim affectus, in quo levis quædam visus obtenebratio contingit, suffusio ab iis nominatur. Cum verò ulterius progressus est morbus, & aliquid in pupilla collectum, aquæ instar apparet, aquam peculiariter nominant. Cum denique materia in pupilla omnimodè concreta est, visionemque prorsus aufert cataracta ab iis nominatur. Fitigitur suffusio ex serosi vel pituitosi humoris, in illud spatium, quod inter corneam & crystallinam est, affusione. Cum autem in illo spatio humor aqueus contineatur, jure merito inter aquei humoris affectu recensetur.

Hæc quidem veræ suffusionis causa est. Alia tamen datur suffusio spuria, quæ fit à vaporibus à ventriculo aliisque partibus in oculos translatis. A capite etiam vapores ad oculos transmitti, & suffusionem spuriam efficere posse, docuit Galen. 4. de loc. aff. cap. 2. Quamvis autem duæ suffusionis differentię inter se distinctæ, ab Auctoribus proponantur, ut plurimum tamen complicatæ sunt. Saltem legitimæ suffusioni spuria complicari solet: quia vapores à partibus inferioribus ad cerebrum translatis, facile deferuntur ad eas capitis partes quæ à morbo aliquo debilitatæ sunt. Id quidem ex eo docetur, quod omnes suffusione laborantes, minus lædantur, ac perspicacius videant matutinis horis, quam meridianis & vespertinis; quia nimirum à prandio & coena multi vapores à ventriculo ad

oculos elevantur, & visum conturbant. Imò docet experientia, in dictis laborantibus visum esse hebetiorem & caliginosorem statim à pastu, quam paucis post horis ab ipso. Præterea omnes suffusione laborantes, referunt sibi videri in aëre corpuscula quædam volitantia, velut culices, muscas, pilos, telas araneorum, & similia, quæ non fiunt, nisi à vaporibus crassis ad oculum translatis, & in eo se se commoventibus. Licet enim Auctores existiment, hujusmodi repræsentationes dependere à particulis crassioribus humoris pituitosi, in oculo contenti & suffusionem efficientis, hoc tamen credibile non est, quia oportet humorem illum pituitosum, suffusionem efficientem, perpetuò moveri in oculo, ut species illas corpusculorum in aëre volitantium repræsentare posset: quod quidem rationi penitus adversatur. Quin potius haud dubium est, vapores esse in perpetuo motu; atque adeo phantasmata illa volitantia repræsentare posse.

Humor quidem pituitosus præcipua est ac magis ordinaria suffusionis causa: alii tamen humores, exigua saltem portione ei commisceri possunt: & si bilis misceatur, citrina; si melancholia, nigricans suffusio apparet.

Humores autem isti ad oculos confluere solent, quando aliquâ debilitate affecti sunt, seu nativâ, seu adscititiâ.

Ad nativam debilitatem pertinet oculorum prominentia. Qui enim tales oculos habent, suffusioni obnoxii sunt. Oculi siquidem prominentes magni esse solent, atque adeo virtus diffusa in iis debiliior est; tum etiam magis ni & prominentes oculi humores & vapores faciliè succipiunt. Debilitatem verò adscititiâ faciunt causæ externæ, ut ictus, contusio, balneum, austerina & pluviosa constitutio, insolatio, fumus, lectio assidua, præsertim ad lucernam, & alia hujusmodi. Quæ etiam causæ humorum fluxionem ad oculos commovere possunt.

Fluunt autem humores à cerebro ad oculos per venas, uveam tunicam, & nervum opticum. Venæ, per quas humores deferri possunt ad eas partes multiplices sunt, quæ scilicet vel feruntur à pericranio ad conjunctivam tunicam, inde ad corneam, & uveam; vel à meningibus cerebri, à quibus rami ad oculi membranas derivantur. A quibus membranis, præcipuè verò uvea tunica, ad humorem aqueum, sibi contiguum, excrementiti humores faciliè instillari possunt.

Denique per nervos opticos faciliè deferri possunt humores à cerebro per tunicam retiformem & araneam ad humorem crystallinum, tumque materia suffusionis crystallini superficiiei adhæret. Licet autem ut plurimum suffusio per fluxionem fiat; potest tamen aliquando per congectionem fieri: quando nimirum oculi nutrimentum probe non immutatur, & facultas expultrix debilis illius residua excrementa sufficienter non expurgat, ita ut sensim congesta circa pupillam ea excrementa suffusionem efficiant. In quo casu, alii etiam humores plerumque labefactantur, & difficillimi affectus producuntur.

Suffusionis differentię desumantur ex humoris eam efficientis crassitie, quantitate, & loco, in quo humor ille residet.

Ratione crassitie majoris vel minoris, major vel minor visionis læsio efficitur. Si enim tenuis & serosus humor existat, à quo suffusionem fieri, & punctione evacuari docuit Gal. lib. 4. meth. c. ultimo, visio parum minuitur, & suffusio incipiens nominatur. Si crassior paulò fuerit, visionis obscuritas major. Si verò crassior, cæcitas omnimoda emergit.

Ratione quantitatis & loci, vel humor totam pupillam occupat, & tunc visio æqualiter læditur, quocumque modo ad objecta dirigatur, vel unam partem pupillæ magis quam aliam occupat, & objecta directo intuitu integra non cernuntur, nec uno tempore multa. Si verò humor perexiguus sit, & medium pupillæ occupet, objecta fenestrata apparent. Si verò materia divulgata fuerit, & in varia corpuscula, varias pupillæ partes occupantia, distincta; culicum species ante oculos versari videbuntur: quæ omnes differentię exactè distinguuntur à Galen. 1. de sympt. causis, cap. 2.

Ratione loci etiam, vel situs materiæ, aliæ possunt de-



sumi differentia: quod scilicet aliquando materia in ipso uvæ foramine juxta corneam tunicam sita sit; aliquando juxta uveam, & inter hanc & humorem aqueum; aliquando ipsi humori aqueo permixta; ac denique interdum inter crystallinum & aqueum.

Possunt & quædam differentia: à figura materia: desumi quas recenset Gal. 1. *de sympt. causis, cap. 2 & 4. de loc. affect. cap. 2.* Prout enim varia est humoris pupillæ adjacentis figura, & græ repræsentantur in aëre volitantes culices, pili, telæ araneorum, circa candelam, & alia quamplurima.

Diagnosin hujus affectus primò dirigenda est ad legitimam suffusionem à spuria distinguendam; postea vero variae legitimæ suffusionis differentia: internoscendæ sunt.

Vera suffusio alterum tantum oculum plerumque occupare solet. aut utrumque, non tamen simul, nec similiter. quod in spuria accidit.

Secundò, in legitima suffusione tenebrosum quiddam in pupilla apparet, quod in spuria non contingit. Hoc tamen signum perpetuum non est. Si enim à tenui & seroso humore suffusio generetur, cum ille humor aqueo ferè crassior non sit, nulla in oculo immutatio apparet. Quo decepti plerumque Medici, eam suffusionem non agnoscen- tes, guttam serenam esse existimant, cum nempe nullam in pupilla mutationem percipiant. Sed facillè distinguitur hæc suffusio à gutta serena. Primò, quod in gutta serena visio vel abolita, aut valdè imminuta sit, nulla in oculo læsione apparente. Contrà verò in suffusione, quæ sensui non patet, est levis tantum visus immutatio, quia humor serosus à quo illa producit, tenuis est & diaphanus, ita ut à speciebus objectorum, vitri instar, penetrari possit. Secundò, ex eo, quod ut plurimum in suffusione visio in omnibus pupillæ partibus æqualiter non lædatur; sed objecta aliquando directè oculis opposita, aliquando versùs angulum collocata, melius videantur: quia nimirum major est plurimum humoris crassities vel tenuitas in una pupillæ parte quàm in alia.

Tertiò, in vera suffusione symptomata sunt continua, nec ulla habent intervalla. In spuria verò per intervalla augentur & remittuntur, prout vaporum anathymiasis major vel minor ad cerebrum effertur. Sicquæ, jejuno stomacho, multò minora sunt, quàm eo cibus repleto præcipuè paulò post passus; tunc enim plus vaporum sursum attollitur. Qui vapores ad oculos translati, muscas, culices, araneorum telas & alia hujusmodi corpuscula visui quidem repræsentant, non continuò sed tantum per intervalla quædam. Quæ quidem exigua corpuscula, in ære repræsentata, à vaporibus dependent ut antea dictum est, attamen, quia dum oculi à vera suffusione debilitati sunt, continua ferè sit à eos vaporum transmissio, idèò continua est propemodum hujusmodi corpusculorum in aëre volitantium apparitio. Præterea, in vera suffusione, visus obtenebratio, qua omnia objecta, veluti per nebulam aut vitrum densum conspiciuntur, (quod est primum symptoma & pathognomonicum hujus affectus,) continua est, & semper eodem modo se habet. In spuria verò suffusione, nunc major, nunc minor, & aliquando ferè nulla est visus obscuritas, prout vapores vel majori copia, vel minori, vel nullo modo transferuntur ad oculos.

Denique vera suffusio brevi tempore incrementum suscipit, & plerumque intra sex menses confirmata evadit. Interdum etiam paucis diebus crescit: & refert Fernelius 5. *pathol. cap. 5.* consummatam suffusionem uno die subortam; quod nobis etiam non semel videre contigit. Spuria autem per multos annos sine incremento perseverat.

Veræ autem suffusionis differentia: sequentibus signis erunt distinguendæ.

In suffusione incipiente corpuscula quædam, ut pili, culices, muscæ volantes, lanarum aut araneorum fragmenta oculis obversantur.

Dum verò incrementum sumit, aërnebulosus apparet, & objecta veluti per vitrum densius conspiciuntur: color pupillæ immutatus est eaque vel turbida, vel nebulosa, aut vitro contaminato similis, aut colore cæruleo infecta

apparet. Quando suffusio perfecta est, visio omnino perit, pupillæ color albus apparet, aut alio colore infectus.

Ex colore etiam quædam signa desumuntur. Color enim margaritæ similis, pituitam adhuc fluidam & diaphanam significat; gypseus, crassam & compactam, citrinus pituitam cum bile mixtam; niger cum humore melancholico.

Locus suffusionis dignoscitur ex eo, quod materia inter uveam & corneam sita sit, & pupilla magis obtenebrata conspiciatur, quia materia oculis intentis propinquior est. Denique pupilla dilatata apparet; ab humore enim contento distenditur. Et in affectu confirmato albæ & virides, fibræ, aut striæ, supra iridem protensæ conspiciuntur, aut puncta quædam albicantia circa pupillam apparent.

Si materia inter crystallinum & uveam contineatur, contraria prædictis apparebunt symptomata, tum etiam pupilla angusta apparebit, si profundior materia sit; amplior verò, si minus profunda.

Prognosis hujus affectus, pro variis illius temporibus varia statuenda est. Incipiens enim suffusio, in qua ægri objecta possunt discernere, eaque per nebulam conspici videntur; curabilis est, juxta Gal. sententiam 14. *meth. cap. ult. & Celsi lib. 6.* Quæ tamen sententia restrictione indiget, modo scilicet æger in ætate florenti sit constitutus: in senibus enim hi affectus incurabiles sunt, & si oculi ex nativa constitutione debiles non fuerint. Nos enim nonnullos in suffusionis principio, etiam quinquagesimum annum prætergressos, sola evacuatione universali, dieta sudorifica, & vesicatorio sine ulla topicorum applicatione, intra quindecim dies curatos vidimus.

Curatio autem feliciter succedit in aëre calido, & tempore æstivo; quia pori aperiuntur, materia morbifica mobilior & obsequentior redditur; ita ut sponte sua sæpè ad alvum deferatur. Qui motus, quantum momenti habeat ad hujus morbi solutionem, docuit Hipp. *Aph. 17. sect. 9.* his verbis: *Lippientem alvi profluvio corripere, bonum.*

Si ex febre acuta, peripneumoniâ, phrenitide, aut dolore capitis intenso suffusio proveniat, difficillimè curatur.

Suffusio confirmata, in qua materia jam contracta est, discuti medicamentis non potest, & solâ compunctione, curabilis est.

Hæc tamen operatio, quæ compunctione perficitur, & acu in oculum immissa ad inferiores oculi partes suffusio deprimitur, tuta non est, & sæpè malè succedit. Vel enim uvea tunica laceratur; vel ex dolore & inflammatione nova fluxio in oculum jamdiù debilitatum influit, & alia contingunt incommoda, quibus visio in perpetuum afficitur. Cum tamen aliquando succedat hæc operatio tentari potest ab iis, quibus nulla curationis spes superest. Satiùs enim est, ut docet Celsus; anceps experiri remedium quam nullum.

In confirmata suffusione, si altero oculo clauso pupilla dilatetur, curatio per acus immissionem sperabilis est: si verò non dilatetur, visus non recipitur, docente Gal. 1. *de sympt. causis, cap. 2.* quia nervus opticus obstruitur, & spiritus ad pupillam, licet aperta foret, pervenire nequit.

Licet autem altero oculo clauso pupilla dilatetur, æger acu immissa visum non recipiet, si lumen non percipiat, quia spiritus visus turbidus & obscurus redditus est; atque adèò visioni ineptus.

Suffusio nigra, & omni splendore orbata, neque medicamentis, neque chirurgia curari potest, quia spiritus visorii destructi sunt. Pellucida verò & splendorem aliquem ostentans curabilis est.

Curationem etiam plerumque non admittit viridis, obscura & multum citrina. dura & quæ hydrargyrum colore & mobilitate repræsentat.

Suffusio, quæ objecta fenestrata repræsentat tentanda non est. Cum enim materia in centro pupillæ consistat, periculum est, ne acu immissa, tota pupilla impleatur, & integra visionis jactura fiat.

Operatio, quæ per acus immissionem fit, feliciter succedit in oculo pleniorè, & naturalem magnitudinem servante



vante. Si verò oculus minor & marcidus evaserit succedere non potest.

In senili ætate prædicta operatio tentanda non est, neque in puerili. In illa morbus est incurabilis; in hac verò humor mollior est, & non satis maturus. Curationi aptissima ætas est juvenilis, & consistens.

Si operatio exerceatur, quando oculo digito compresso suffusio nonnihil diffluit, & latior aliquantulum apparet postmodum verò ad pristinam magnitudinem & figuram revertitur, non succedit: quia suffusio nondum matura est, sed adhuc tenuis & cruda. Si verò digito compressa nullam patiat figuræ mutationem, matura est, & acui decuti potest.

Notandum tamen, istam suffusionis, quam vocant, maturitatem seu concretionem, moderatam esse debere, ut deponi facile possit. Debet enim esse instar pelliculæ; quæ acui circumvolvitur, & ad inferiora oculi deponitur. Si enim crassior & solidior sit, discuti non potest: quod inde dignoscitur, quando gypsi aut grandinis speciem colore præ se fert. Contra verò, quæ mediocrem maturitatem nacta est, colorem coeli, aut maris, ferri, aut plumbi non admodum nigri repræsentare solet.

Suffusionis curatio non solum ad causam conjunctam, sed etiam antecedentem dirigenda est. Atque ita, primò totum corpus, & præcipuè cerebrum exactè evacuandum est. Mox humor pupillam obstruens discutiendus, aut alio quovis modo amoliendus est.

Quæ indicationes, cum eadem fermè sint, quæ ad guttæ serenæ curationem fuerunt propositæ, eadem remedia, quæ victus rationem, totius corporis evacuationem, humoris peccantis revulsionem, & capitis atque oculorum roborationem respiciunt, hæc etiam aptari poterunt, ut non opus sit eadem hæc frustra repetere.

Præmissa igitur tota illa curatione, quæ pro gutta serena instituta est, ad ea remedia veniendum est, quæ peculiarem materiæ juxta pupillam contentæ educationem respiciunt. Et quamvis topica remedia non multum conferre existimentur, juxta Gal. sententiam 2. *κατὰ τόπον*, qui dicit ea plus promittere, quam præstare: attamen legitimus eorum usus rejiciendus non est. Et docuit experientia, probatissimorum auctorum fide confirmata, suffusiones incipientes, præmissis universalibus, usu topicorum fuisse dissipatas.

Primò igitur à mitioribus solventibus incipiendum est, quæ non valdè exsiccent, ne materia suffusionis induratur, & resolutioni inepta evadat. Tum solventibus emollientia admiscenda sunt, ut prædicta induratio impediat, & resolutio facilius perficiatur. In hunc finem fons sequens ab initio usurpari poterit.

℞. Fol. rutæ, fœnic. euphras. chelidon. major. ana. M. i. sem. fœnugr. ℥i. flor. chamom. & melilot. ana. P. i. Coquantur in tribus partibus aquæ font. & una vini albi, sub finem additi. Colatura foveantur oculi manè & serò, cum sponsa molli.

Ex eodem decocto suffitus parari poterit, fumum illius excipiendo oculis, undique capite coniecto.

In ipso morbi principio, dum fluxio fieri incipit, dumque revellentia remedia usurpantur, utile est fovere oculos simpliciter vino rubro austero, quod astrictione sua fluxionem impedit, parte verò spirituosâ discutiit ac resolvit.

In processu morbi, fons ex vino albo, cui crocus metallorum infusus fuerit, utilissimus est.

Non parum etiam utilis est pueri halitus manè oculis exceptus, si prius aliquandiu puer semen fœniculi mastica-verit.

Neque minùs conducibile est, oculos lingere per longum tempus, matutinis horis, linguâ pueri aut catelli.

Ad suffitum etiam referri potest panis, cum semine fœniculi contuso subactus, & dum calens è furno extrahitur, per medium sectus: si ejus vapor oculis recipiatur, panem scilicet ita oculis admovendo, ut fixo intuitu in panem oculi vapore illius madescant.

Remedia prædicta matutinis horis præcipuè usurpan-

Lazar. Riverii Opera.

da sunt. Noctu verò sequens cataplasma admoveri poterit.

℞. Farinæ fœnugr. ℥. i. aloës ℥. β. croci ℥. i. Fiat pulvis subtilissimus, excipiatur vino albo, in quo crocus metallorum infusus fuerit, & fiat cataplasma applicandum calidè hora somni.

Multi laudant sanguinem columbinum, in oculum calidè instillatum. Eo enim calore nativo animalis, perfecta pars valdè corroboratur, & materia excrementitia dissolvitur. Sed quia in illo sanguine calor citò evanescit, multò conducibilis foret pullum columbinum juniorem, & nondum plumis contextum, ac per spinam sectum oculo applicare.

Prædictis remediis, præsertim materiæ conjunctæ dissipatio obtineri potest, si illa separabilis est. Topica enim varia, quæ oculis instillantur, collyria vulgò dicta, exiguæ sunt efficaciæ, & illa sunt de quibus dixit Galenus, ea plus promittere, quam præstare. Tota enim eorum virtus in cornea tunica ferè absumitur, neque potest ad interiores partes penetrare, nisi ea insigni acrimonia prædita sint, qua dolores in oculis excitantur, & fluxio ad illos magis promovetur; unde non pauci immodico eorum usu, ex leviori affectu, in omnimodam cæcitatem perducti sunt. Quia tamen multæ reperiuntur apud authores collyriorum descriptiones, quibus præstantissimi effectus ab iis tribuuntur, ne hæc aliquid deficere videatur, nos selectissimas nonnullas proponemus, ut unusquisque eorum effectus explorare valeat.

℞. Mellis optimi lb. ii. rad. fœnic. aristoloch. long. & rotund. ana lb. i. fol. rutæ, euphras. chelidon. majori & summit. fœnic. ana M. vi. centaur. min. M. iii. rosar. recent. P. iii. urinæ pueri impuberis lb. ii. Misceantur omnia simul in vase vitreo, & destillentur in balneo Mariæ. Hæc aqua instilletur oculis frequenter.

Vel parari potest panis ex tota farina cum rutæ chelidon. euphras. betonic. & fœnic. pulveribus, addito melle, qui recenter ex furno extractus, in partesque dissectus, intra vasa duo stannea vel argentea concluditur, inde aqua quædam colligitur, quam guttatim in oculis instillatam mirificè conducere Zechius affirmat. Sequens etiam collyrium ab eodem autore miris effertur laudibus.

℞. Fol. viol. alb. seu leucoij, M. i. sem. raphani hortensis ℥. i. ammoniaci ℥. β. Misceantur, & pulverata macerentur per horas 24. in aquæ fœnic. lb. i. Deinde bulliant unica ebullitione levi. Postea colaturæ adde succi fœniculi depurati ℥. i. balsami Peruviani ℥. ii. Fiat collyrium, quod manè & vespere instillatum (inquit Zechius) corpore (ut decet) prius evacuato, antiquas oculorum ægritudines ita detergit ac dissipat, ut cataractam, etiam citra ferrum, mirabiliter auferat.

Hollerius aquam describit, quam dicit restituisse visum cæco novem annorum, quæ talis est.

℞. Succu apii, fœnic. verben. chamedr. pimpinellæ, caryophyllatæ, salviæ, chelidon. rutæ, centinod. morsus gallinæ, caryophyllorum, farinæ volatilis, ana ℥. i. piperis crassiusculè triti, nucis moschat. ligni aloës, ana ℥. iii. Omnia immergantur urinæ pueri incorrupti, & sextæ parti vini malvatici. Bulliant brevi tempore. Tum exprime, percola, & repone in vase vitreo obturato: hora somni singulas guttas singulis oculis instilla.

Succus anagallidis aquaticæ solus in oculos per aliquot dies instillatus curavit aliquando suffusionem incipientem; cui tamen plurimùm adjumenti attulit cauterium futuræ coronali inustum.

Non minoris sunt efficaciæ succi chelidonis & calce-trapæ simul mixti.

Quercetanus in Pharmacopœa aquam ex infusione croci metallorum paratum valdè commendat, quæ in hunc modum componitur.

℞. Aquar. chelidon. maj. ℥. v. croci metallor. ℥. i. Infundantur simul. Et hujus aquæ tepidæ guttas tres vel quatuor infunde intra oculos ter aut quater in die per longum tempus. Hanc aquam se expertum esse dicit Fonsæ visionem restituisse cuidam, qui eam offuscata habebat per plures menses. Habet autem hoc egregii,



gli, ut sine morfu validissimè abstergat, quod vix in alio medicamento reperitur.

Idem Fonsæca aquam sequentem tanquam mirabilem prædicat.

℞. Plures hirundines. Contundantur integræ cum suis pennis in mortario, illarum cuilibet libræ adde medulæ panis ℥. iv. vini albi maturi ℥. iv. Infundantur per sex dies & destillentur per balneum usque ad siccitatem. Deinde expone illam aquam in vasè vitreo ad solem per dies viginti, & instilla in oculos manè & serò.

Ex floribus rorismarini liquor elicitur, nebulis discutendis admodum idoneus, qui in hunc modum paratur.

℞. Flor. rorismar. q. s. Impleatur ampulla vitrea, quæ probè obturetur, & soli meridiano exponatur ad parietem. Inde liquefcit oleosus quidam humor, quo oculi pennâ illinantur.

Auctores fella animalium commendant, quod potenti-ssimè abstergant & discutiant. Sed acrimonia suâ dolorem excitant, & ideo rarò in usum revocantur.

Forestus obs. 53. lib. 11. pisciculum quendam patriæ suæ familiarem commendat, ex cujus jecore succus quidam elicitur, quo suffusiones quasi momento & miraculo curari testatur; ejus historiam & utendi modum vide loco citato. Guillelmus Lozellus se plures curasse refert nullâ lucis usurâ fruente, aqua sequenti, post universalia remedia usurpata.

℞. Hepatis hirci fani & recentis lb. ij. calami aromat. & mellis, ana ℥. s. succi rutæ ℥. iij. Aquæ chelidonæ, verbenæ, sceniculi, euphrasæ, ana ℥. iv. piperis longi, nucis mosch. caryophyll. ana ℥. ij. croci ʒ. j. flor. rorismarini aliquantulum contritor. M. s. sarcocolæ, aloës hepaticæ, ana ℥. iij. fellis avium rapacium, vel caponum, aut perdicum ℥. j. Incidenda incidantur, terenda terantur, deinde omnia simul misceantur, addendo sacchari albi ℥. ij. mellis ros. ℥. vj. ponantur in alerobico vitreo. Destillentur in B. M. igne lento. Hæc aqua servetur in vasè vitreo bene obturato, tanquam pretiosa, in oculum laborantem instilletur bis aut ter in die.

Zacutus Lusitanus aquam sequentem maximè commendat his verbis. *Ophthalmiæ diuturnæ, noctisque oculorum affectionibus, quæ ex nimia humiditate crassisque humoribus, & caliginosis scaturiunt, ut densitati, albugini, ungui, & suffusioni. Et hanc aquam principatum obtinere diutino experimento compertum habeo, si corpore exquisitè vacuato, noctu solum tribus horis post pastum juxta oculum sex guttas ejus instilles, actu frigidæ. Post duas horas tanquam è fonte perenni, manabunt ichores in copia multa.*

℞. Aloës ℥. iij. rutæ sceniculi betonicæ, ana M. ij. verbenæ, tormentillæ. ana M. j. sarcocollæ ℥. iij. spumæ nitri ℥. ij. s. sacchari candi ℥. iij. syrapi rosac. ℥. iv. urinæ pueri, impuberis lb. s. stercoris lacerti ℥. iij. marrubii M. iij. euphrasæ M. j. s. zinzib. spicæ nardi piperis longi caryophyll. tuthiæ, ana ℥. ii. balsami ℥. iij. mellis rosati ℥. j. viridis æris ℥. j. licii ʒ. ij. fol. raphani M. j. Pulveranda pulverentur, misceantur omnia & infundantur in vino albo generoso, in vasè distillatorio, additâ quartâ parte mellis optimi, decem dierum spatio, dummodo quotidie agitentur, & deinde destillentur, & aqua, quæ exierit, reservetur.

Idem Zacutus sequens unguentum maximè commendat his verbis. *Ad siccandas humiditates, ad oculos à capite confluentes, simulque valentissimè per canthos expurgandas, unguentum fit magistræ nulli secundum, aplicitum post totius corporis, capitis, & oculorum vacationem universalem. Et bis in die, manè & noctu, tribus horis post cœnam, palpebræ superiores leviter illinantur. Post horam humoris serosi rivuli per angulum præsertim majorem effluunt ubertim.*

℞. Ol. rosac. ℥. iij. aquæ ros. ℥. ix. camphoræ ℥. j. tuthiæ ʒ. j. mellis ℥. ij. fellis hirci ℥. s. farinæ lupinorum ℥. s. aloës socotrinæ ℥. j. sacchari candi ℥. s. succi marrubii, sceniculi, rutæ, ana ℥. s. myrrhæ ʒ. j. ammoniaci ℥. s. sarcocollæ ℥. j. s. Pulverata pulveranda misce, & lento igne coque modicè, & cum pinguedine hircina & arietina, & momento ceræ, fiat secundum artem unguentum.

Denique, reliquis remediis non conferentibus morbo

propemodum ad desperationem verso, ad experimentum reduci meretur inunctio ex hydrargyro, quam à se exco- gitatam ait Fonsæca, non tamen in usum revocatam. *Consultatione enim 19. lib. 1. sic loquitur: Aliquando cogita- vi inunctionem argenti vivi, ea ratione, qua adhibetur in morbo Gallico, magna efficacia posse extirpare cataractas incipientes & crescentes, quod visum est in ophthalmiis gallicis, ubi humorum residua visionem impediunt; sed etiam in non gallicis. Isto remedio caput ita expurgari poterit, ut dissolvantur vestigia cataractæ, & aliquando experiri decrevi.* Huic suæ cogitationi maximè applausisset Fonsæca, si Schenckii observationem 309. lib. 1. vidisset quæ ex Alexandri Trajani Petronii lib. 5. de morbo Gallico c. 1. desumpta est. *Quidam, inquit, qui antequam morbo Gallico afficeretur, altero oculo cæcus erat, suffusione den- sissima (vulgo cataractam vocat) oculum occupante, hy- drargyri inunctione & à morbo Gallico, & à suffusione, quod maximè mirum est, evasit. Neque à ratione alienum est, inunctione illa cataractas posse dissolvi, cum frequens experientia doceat, præduros tumores ex pituita crassa & concreta genitos, illitu hydrargyri potenter dissolvi.*

Cum nullis medicamentis dissolvi potest cataracta, ultimum remedium est Chirurgica operatio, qua acu in oculum immissa, materia pituitosa suffusionem efficiens, condensata, & in pelliculam conversa, ad inferiores oculi partes decutitur, & apertâ veluti fenestrâ visus recupe- ratur. Quæ operatio aliquando succedit feliciter, pluries verò infelicitè, ita ut ex ea non pauci visum in perpetuum amiserint. Quando tamen res eò devenit, ut nulla alia supersit visionis recuperandæ spes, satius est, juxta Celsi sententiam prius laudatam, anceps experiri reme- dium, quàm nullum. Hæc autem operatio propter incertum eventum à Chirurgis ordinariis non solet exerceri, sed ab Operatoribus vulgo dictis, qui per varias urbes va- gantes, frequentius sese in operationibus exercent: atque ita operandi tempus & modus illis prorsus committuntur. Quia tamen à medico ignorari non debent, apud Practi- cos non paucos exactè descripta inveniri poterunt.

Curata suffusione, sive solventibus medicamentis, si- ve operatione Chirurgica, prophylaxi per longum tem- pus incumbendum est, quia recidivæ maximum est peri- culum: oculi enim, ex longo affectu debilitati, admodum dispositi sunt ad fluxiones è cerebro denuò excipiendas. Idcirco purgationibus usualibus incumbendum est, fon- ticuli ad fluxionis aversionem continuo gestandi, & ocu- los roborantia frequenter usurpanda, qualia in guttæ fe- renæ curatione proposita sunt. Quibus addi potest ablutio oculorum, quæ singulis diebus manè usurpanda est in hunc modum. Ab exitu lecti masticetur semen sceniculi aliquandiu, deinde os vino repleatur, eoque vino tantil- lum in ore calefacto, abluantur oculi, donec acrimoniâ suâ eos vellicet, & dolorem aliquem inferat, qui cessan- te ablutione statim etiam cessare consuevit.

Præterea visus conservationi plurimum conferunt spe- cilla, quæ objecta, prout naturaliter se habent, nempe ne- que majora neque minora repræsentant. Nec non utile est per vices specillis viridibus aut cæruleis visum recreare.

Ac denique ea omnia vitanda, quæ visui nocent, & usurpanda, quæ ipsi conferunt, prout in victus ratione pro guttæ serenæ curatione instituta, annotata sunt.

## CAPUT V.

### De Dilatatione pupillæ.

**U**vea tunica, ex Galeno 1. de symptomatum causis, capite 2. variis morbis obnoxia est, ac præcipuè rup- tionem, distorsionem, dilatationem, & constrictionem pati consuevit.

Ruptio fieri potest, tum à causa externa, ut percussio- ne & contusione: tum ab interna, humore scilicet copioso tunicam uveam distendente & rumpente. Cum autem ea arte reparabilis non sit, medicam tractationem non postu- lat.

Distorsio uveæ tunicæ non potest contingere nisi à prima



prima conformatione, cum illa corneæ tunicæ undique adhæreat. Ideo Galenus ipse, *loco citato*, nudam illius enumerationem facit, inter differentias symptomatum uveæ tunicæ: in ea autem explicanda non immoratur, quia nullius est usus in praxi medica. Nos etiam prioribus duabus differentiis prætermisissis, dilatationis & constrictionis pupillæ explicationi tantum incumbemus.

Dilatatio igitur pupillæ, quæ est uveæ tunicæ foramen, per quod species objectorum oculum ingrediuntur, Mydriasis Græcis appellata, visionem lædit, quod lumen nimiam copiam oculum ingrediatur: unde fit, ut ea laborantes in obscuriori loco magis videant, quam in lucidiori. Quod ostendunt naturales & ordinariæ pupillæ mutationes, quæ in locis splendidis & obscuris contingunt. Dum enim visio fit in loco splendidiori & multum illuminato pupilla constringitur, ut minori copia lumen oculum ingrediatur & ne majori copia visionem lædat, spiritus dissipando ac disgregando. Et hinc fit, ut qui è loco valde lucido obscuriorem ingrediuntur, primo ingressu nihil ferè videant: quandoquidem pupilla constricta in loco lucido, non satis luminis recipit ad visionem integrè perficiendam. Postea verò cum aliquandiu in loco obscuro morati fuerint, pupilla sensim dilatatur, ut maiorem luminis copiam recipiat, quæque primo ingressu non videbantur, clarè percipiuntur. Contrà verò, qui à loco obscuro in valde lucidum transeunt, lumen ferè non possunt ab initio, & eorum oculi graviter perstringuntur. Quia cum pupilla magis dilatata fuerit in loco obscuro, ut sufficiens luminis copia oculum ingrediatur, si hoc modo dilatata, subito magno lumini obijciatur, nimiaque copia lumen oculum ingrediatur, eum perstringit, ac visionem turbat. Unde patet, lumen visioni necessarium, copia mediocri oculis ingredi debere, & ad illius receptionem, pupillæ latitudinem moderatam esse necessariam.

Fit autem dilatatio pupillæ præternaturalis, vel à primo ortu, quæ immedicabilis est; vel post ortum à causis præternaturalibus & adventitiis, quæ vel internæ sunt, vel externæ.

Internarum proxima est & immediata, tensio uveæ tunicæ: illa autem tensio vel à siccitate fit, vel à repletionem.

Siccitas uveam tendit, & foramen pupillæ amplius efficit, quemadmodum coria perforata cum exsiccantur, patentiora foramina efficiunt. Fit autem sicca illa intemperies à vigiliis diuturnis, febribus, aliisque causis exsiccantibus.

Repletio uveæ tunicæ, dum eam omni ex parte distendit, ampliorem pupillam efficit, eaque producit vel à flatibus & vaporibus in oculum transmissis, vel ab humoribus in eundem confluxis; vel ab aquo humore supra modum aucto, vel denique à tunicæ ipsius uveæ tumore. His causis addere possumus convulsionem uveæ tunicæ, quæ in paroxysmis epilepticis præcipuè apparet. Cum enim tunc omnes partes nervosæ & membranosæ distendantur; uvea etiam tunica suam distensionem patitur. Et hæc præcipuè ac manifestè apparet in puerorum convulsionibus epilepticis, in quibus tanta fit pupillæ dilatatio, ut totam ferè iridem occupet, & illius ratione visio prorsus aboleatur.

Causæ externæ sunt percussio vel casus ab alto, vel spiritus retentio ut in parturientibus & tibicinibus. Percussio & casus fluxionem ad oculos promovent, unde distensio pupillæ. Spiritus retentio, flatus & humores ad oculos impellit, à quibus distensio producit.

Diagnosis hujus affectus difficilis non est. Siquidem pupillæ dilatatio oculis est conspicua, præsertim si ante morbosam constitutionem pupillæ amplitudo naturalis Medico innotuerit: tum etiam si cum latitudine, pupillæ mediocritatem excedente visionis læsio adfuerit.

Præterea naturalis amplitudo pupillæ dignoscitur ex eo quod clauso uno oculo, alterius pupilla magis dilatetur: quod non fit in dilatatione morbose, quia tunica uvea à causa præternaturali distensa amplius distendi nequit.

Si denique dilatatio pupillæ in uno tantum oculo appareat; & præternaturalis est, & unicum tantum oculum affici significat.

*Laz. Riverii Opera.*

Quod ad prognosim spectat pupillæ dilatatio ab ortu contracta incurabilis est: quæ verò post ortum accidit, difficile curatur, maximè verò quæ à siccitate producit. Quæ verò ab aliis causis fit, si adhuc recens fuerit, curabilis est, cum affectus oculorum recentes, juxta Gal. doctrinam, curationem recipiant; inveterati verò nunquam, aut saltem difficillimè tollantur.

Curatio pro varietate causarum varianda est. Si à siccitate fiat, cum vix illud valeat contingere à causa interna, quoniam totum etiam corpus eadem intemperie afficitur; ideo remediis atque alimentis humectantibus & analepticis totum corpus reficiendum est, qualia in febre hectica usurpari consueverunt. Peculiariter verò corpus humectandum est balneo aquæ tepidæ, & lacris recentem mulsi, quod etiam in oculos frequenter instillabitur, præsertim muliebre.

Si fiat ab humore oculum replente, cum ille à capite defluat, etiam caput & totum corpus erit vacuandum, mox humor oculis impactus discutiendus. Quæ quidem, cum sufficienter perfici valeant remediis pro suffusionis curatione propositis, ea hinc frustra repetenda non sunt, sed in curatione prædicta desumenda.

Quæ etiam ea remedia suppeditabit, quæ humori in oculo contento discutiendo ac dissipando idonea sunt. Iis tamen succedere possunt quædam adstringentia, quæ pupillam nimis dilatatam angustiorē efficiant. In hunc finem collyrium sequens usurpari poterit.

℞. Rosar. rub. siccar. ℥. ij. croci, spicæ nardi, corticis thuris, an. ℥. β. tuthiæ præparatæ, spodii, acaciæ, ana ℥. j. In pulverem redacta includatur panno lineo raro, & fiat nodulus, qui infundatur in aquæ rosar. ℥. iij. & illa aqua instilletur in oculum frequenter, toties nodulum exprimendo, quoties aqua usurpabitur.

Si fiat à flatibus, post universales evacuationes, ea medicamenta erunt usurpanda, quæ flatus discutiunt in toto corpore & ipsis oculis. Atque ita illi foveri poterunt decocto sceniculi, rutæ, anethi, rosar. rub. myrtilorum, facto in aqua pediculi rosarum, cum quarta parte vini albi.

Si denique à percussione fiat, pro contusionis magnitudine varianda curatio est; & si adsit inflammatio, instar ophthalmiæ curanda est. Si verò inflammatio non sit, admovebitur in principio cataplasma ex farina fabarum, foliis plantaginis, & rosis rubris, cum aqua rosarum paratum. Postea verò sanguis columbinus ex pennis expressus frequenter instillabitur, qui in omnibus oculorum vulneribus ac contusionibus excellens est remedium.

## CAPUT VI.

### *De Pupillæ angustia.*

**P**upillæ angustia visui etiam officit, quemadmodum dilatatio, ut dictum est capite superiori, quandoquidem moderata pupillæ amplitudo necessaria est ad species visibiles perfectè recipiendas. Sic quando in statu naturali, oculo in loco splendidiori posito, pupilla constringitur, ne lumen nimium recipiat, si subito in obscuriorem locum transferatur, res in eo contentæ primo ingressu vix aut parum videntur, propter dictam angustiam. Postea verò quando pupilla dilatata est, omnia ritè percipiuntur. Igitur in loco mediocri lumine affecto, pupillæ latitudo mediocris esse debet, ut mediocre lumen recipiat, ad visionem rectè efficiendam. Si verò pupilla debito angustior sit, sufficiens lumen non recipit. Ideò in iis qui hoc vitio laborant, visio imminuta est. Illi tamen in loco valde lucido rectè visionem exercent, quia sufficiens lumen tunc temporis per angustum foramen ingreditur, nisi alii oculorum morbi cum hoc affectu conjungantur.

Fit autem pupillæ angustia, vel ab ortu & prima formatione, & tunc parum nocet. Si enim eà affecti minùs videant in loco obscuro, aut mediocriter lucido, quam mediocri pupillæ latitudine præditi: in loco tamen lucido melius & perspicacius vident. Unde dixit Gal. *de sympt. causis*, cap. 2. eos, qui à nativitate pupillam angustam habent, acutiùs videre.



Vel fit angustia pupillæ à causis præternaturalibus, nempe nimia humiditate, siccitate, defectu humoris aquei, & spirituum inopiâ.

Ab humiditate fit angustia pupillæ, quando ab eadem tunica uvea relaxatur, & relaxata foramen angustius efficit. Licet enim ab eadem humiditate fiat pupillæ dilatatio; non tamen contrarii effectus ab eadem causa fiunt: quia ut causa eadem dici possit, debet eodem modo se habere ad suum effectum. At non eodem modo se habet humiditas, quando facit dilatationem. Eam efficit siquidem replendo & distendendo membranam; angustiam verò efficit relaxando. Distendit, quando in illius capacitatem continetur: relaxat, quando substantia illius imbibitur.

De siccitate eadem est difficultas, quandoquidem illa inter causas dilatationis pupillæ recensita est. Hæc autem est differentia. Quando uvea tunica exsiccatur, humoribus in debita quantitate permanentibus tunc facit pupillæ dilatationem quandoquidem tensionem suam, quam antea habebat, non amittit, quemadmodum (ut superiori capite dictum est) coria tensa, quæ exsiccantur, foramina sua ampliora reddunt. Si verò uvea tunica, dum exsiccatur, corrugetur & concidat, tensionemque priorem amittat, propter defectum & imminutionem humorum oculi; tunc pupillæ foramen angustius efficitur.

Et sic constrictio pupillæ à siccitate eadem firmè erit, quæ à defectu humoris aquei contingit; quamvis etiam possit fieri sine exsiccatione, dum humore aqueo effuso tunica uvea concidit.

Denique ex spirituum defectu vel paucitate fit angustia pupillæ, quando propter obstructionem nervi optici, aut aliam causam, spiritus visivus non potest confluere ad oculum qui eo repletus, tunicarum suarum tensionem conservat, eoque deficiente, illæ laxantur & concidunt, unde pupillæ constrictio evenire solet. Hoc apparet in valde senibus, in quibus pupilla angustior efficitur propter spirituum defectum.

Hic affectus ex se facile dignoscitur, & sensui patet. Si enim unus tantum oculus afficiatur, alterius comparatione angustia pupillæ dignoscitur. Si verò uterque oculus laboret, aliorum hominum rectè se habentium oculus inspiciendo, laborantis pupillæ angustiores compariuntur.

Quod ad prognosin spectat, pupillæ angustia, quæ ab humoris aquei jactura procedit, incurabilis est: quandoquidem ille semel effusus regenerari nequit, præcipuè in grandioribus. In pueris tamen aliquando per vulnus effusus humor aqueus reparatus atque regeneratus est. A siccitate etiam producta pupillæ constrictio, vix aut difficillimè saltem curari potest. Illa verò quæ ab humiditate fit in suo principio adhuc recens, facile curari potest, inveterata verò difficillimè.

Curatio hujus affectus à præcedente non variat, quandoquidem ab iisdem causis producit, nimirum siccitate vel humiditate: quæ intemperies, quamvis contrarios effectus pariant, modo ante explicato, iisdem tamen remediis auferendæ sunt.

## C A P U T VII.

*De Albugine, seu macula, & aliis corneæ coloribus mutatis.*

**N**aturalis corneæ constitutio evertitur, quando perspicuitatem suam amittit, vel colore alieno inficitur.

Perspicuitatem suam amittit, quando crassior evadit. Crassescit autem cornea tunica vel per exsiccationem, ut in senibus, quæ affectio irreparabilis est; vel ab humoribus crassis in eam impactis, quod contingit frequenter in ophthalmia, quando vel à nimio resolventium medicamentorum usu tenuiores humoris partes discutuntur, crassæ verò remanent; vel cum importuno refrigerantium usu humores incrassantur. Et non solum crassior evadit cornea tunica, in ea parte, cui humor ille impactus est, sed etiam album colorem contrahit, unde Leucoma, seu Albugo nominatur. Fit enim talis affectus

à cicatrice ex ulcere relicta, in qua cornea densior redditur, & diaphaneitatem suam amittit.

Variae sunt illius differentiae, prout alia magis, alia minus crassa est. Alia corneæ superficiem tantum occupat, alia in profundo confisit, in totam corneam penetrat; alia major est, & totam pupillam obsidet, vel maximam illius partem; alia minor, & exiguum pupillæ spatium comprehendit; tuncque propriè macula nominatur.

Colore etiam alieno inficitur cornea, quando sanguis in eam effunditur, qui affectus Sugillatio nominatur, & tunc omnia objecta rubra apparent: vel quando bilis sese in eam insinuat, quod in ictericis contingit, & tunc objecta flava apparere solent, juxta Galeni doctrinam. Quod tamen intelligendum est de magna bilis effusione in corneam. Si enim leviter tantum tincta fuerit cornea, quod plerumque contingit; (major enim bilis receptio in tunica adnata fit quàm in cornea;) tunc objecta colore flavo minimè infecta, sed prout naturaliter se habent conspiciuntur.

Hi affectus peculiari non indigent diagnosi, quia sensibus conspicui sunt. Speciatim verò albugo, quæ crassior est, magis albicat, & magis visum offendit. Sic etiam quæ magis superficialia est, magis albicat: quæ autem profundior, ad nigredinem declinat, utpote uveæ tunicæ propior. Quæ cum nigra sit, aliquid sui coloris illi communicat. Causæ eam producentes ex iis, quæ præcesserunt, facile dignoscuntur: si nempe ophthalmia, vulnus aut ulcus præcesserit.

Quod ad prognosin spectat, albugo, quæ à pituita fit, humoreve crasso ex ophthalmia relicto, satis facile curatur, præsertim si inveterata non sit. Quæ verò à cicatrice relicta, difficillimè quandoquidem in parte exquisito sensu donata, remedia aciora, exercendæ cicatrici, idonea, vix tolerari possunt.

Curatio albuginis, ab humore pituitoso in corneâ concreto productæ emollientibus, attenuantibus, & discutientibus remediis perficitur, præmissis tamen universalibus, quæ causæ antecedentis sublationem respiciunt, & novum humorum influxum ad oculos perhibent, qui facile proritari posset à topicis remediis, præcipuè iis quæ acrimonia quadam, aut calefaciendi vi prædita sunt, nisi illius materia prius submoveretur.

Itaque primum universales evacuationes usurpandæ sunt, tum etiam pervulsiones & derivationes, quæ in cura suffusionis & guttæ serenæ traditæ sunt.

Postmodum verò, ad materiam concretam emollientiam, sicut admovendus est, cum spongiis mollioribus, ex decocto scænuigræci, meliloti, chelidonis, & scæniculi paratus.

Vel ejusdem decocti vapor oculis excipiat, & in hunc finem sequens etiam decoctum parari poterit.

**℞.** Rad. alth.  $\mathfrak{z}$ . i. fol. malvæ, euphras. chelid. maj. ana.  $\mathfrak{M}$ . i. femin. lini & scænuigr. ana  $\mathfrak{z}$ . iij. flor. melilot.  $\mathfrak{P}$ . i. Fiat decoctio in aqua fontis, cujus vapor recipiatur in oculum manè & serò.

Mox discutientia remedia usurpanda sunt, qualia in suffusionis curatione descripta fuerunt. Illa enim hæc etiam plurimum conferre poterunt, atque ita collyria attenuantia, & humorem oculo impactum resolventia inde erunt desumenda, præcipuè ea, quæ ex melle cum oxydorcicis remediis destillato componuntur. Aqua enim mellis destillata, etiam sola usurpata, multum præstat ad omnes oculorum maculas extergendas, si illius usus diu continuetur.

Ad idem præstat saccharum candidum, in aquâ euphrasæ, chelidonis, aut scæniculi dissolutum.

Tum etiam valde confert, si oculus lingua pueri vel puellæ quæ scæniculum mâssicaverit, frequenter lambatur.

Amatus Lusitanus nubeculas crassas, in puella duodecim annos nata, se curasse refert, post decocti falsæ parillæ exhibitionem per viginti dies, sequenti collyrio.

**℞.** Mellis in ipso favo  $\mathfrak{t}$ . ij. summam scæniculi, flor. sambuci, euphras. ana  $\mathfrak{P}$ . ij. sacchari candi  $\mathfrak{z}$ . iv. Destillantur in B. M. & aqua instilletur in oculos.

Semen hormini oculo impositum hora somni, purgat oculum



## Cap. VII. De Albugine, seu macula, &c. 205

oculum à sordibus, eumque abstergit, sicque albuginis curationi conducit.

Potenter etiam albuginem discutit succus sceniculi recte extractus, cui balsami Peruviani gutta una admista sit.

Idem præstat oleum ex linteis combustis, cum saliva pueri mixtum, & penna illitum. Elicitur hoc oleum, lintea accendendo, & inter duas patinas suffocando: materia refrigerata, guttæ illius olei patinæ adhærentes inveniuntur.

Albugo verò seu macula à cicatrice producta, curatur iis remediis, quæ cicatricem emollire, attenuare, ac dissolvere possunt. Cum autem ea quæ cicatricem conterunt, acrimonia non careant; majori cura universales evacuationes ac revulsiones præmittendæ sunt, ut fluxio humorum attrahatur ad partem. Illis igitur, ut supra dictum est, usurpatis; primum foci emollientes, aut suffumigia adhibere convenit, quæ suprà proposita sunt. Deinde abstergentia & discutientia remedia admovenda sunt: Primò leniora, qualia sunt suprà proposita, præferim aqua mellis composita. Postea verò ad fortiora veniendum est, qualia sunt fella piscium, ut uranoscopi, passinacæ, luci; tum etiam aliorum animalium, ut perdicis, galli, anseris, bovis, & aliorum. Eodem modo usurpari poterunt succi chelidon. maj. centaur. minor. anagallidis, & similibus, quæ melli permiscenda sunt, tum quòd mel abstergendi & discutiendi vi præditum sit; tum quia liquores in oculum infusi, diffuunt ad canthos, nec in pupilla morantur, in qua eorum actio desideratur, sed cum melle inspissato facillè pupillæ adhærent. Si tamen eorum mordacitas tolerari nequeat, dicti succi aut fella inspirari poterunt mucilagine gummi tragacanthi, psyllii, aut cydoniorum, extractâ cum aqua sceniculi, euphras. aut aliâ ophthalmicâ. Formula collyrii ex succis talis esse poterit.

℞. Succi sceniculi, chelidon. & anagallidis, ana ʒ. iij. succi centaur. min. ʒ. i. mellis albi. ʒ. i. M. instar linimenti. Si cum albugine adsit oculorum rubor, utile erit collyrium ex vino albo, sale, & tritico paratum, in ophthalmia descriptum. Vel sequens.

℞. Aloës & agarici, ana ʒ. i. Pulverentur, & includantur nodulo, qui maceretur in aqua euphras. vel sceniculi, & confricentur oculi manè & serò. Aloë abstergit, roborat & fluxionem sistit, agaricus potenter abstergit.

Sugillatio, seu color oculi rubeus, ex sanguine in eum effuso productus, si recens adhuc fuerit, optinè curatur sanguine columbino in eum insillato. In illius verò defectu lac muliebre instillari poterit cum pauco thure & croco: vel ovi vitellus cum vino admovebitur, quod remedium à Gal. laudatur 4. de comp. mod. sc. loc. cap. 8. Si verò contumax fuerit affectus, fovendus erit oculus decocto scænuigr. alihææ, sceniculi, rutæ, chelidon. vel illius decocti fumus oculo excipendus est. Ac denique ea omnia, quæ pro suffusione descripta sunt, ad hujus affectus curationem poterunt esse idonea. Speciatim verò, in malo inveterato, quando rubor ad nigredinem declinat, à Gal. commendatur hyssopi coma trita, linteo inclusa, in aquam ferventem demersa, & oculo admota. Et docet experientia, hoc remedium tantæ esse efficacis, ut cruor sensibiliter attrahatur, & linteo adhæreat.

Ac denique color flavus ictericorum, qui in oculis maximè apparet, curato morbo, sponte discutitur. Si tamen illius dissipationem accelerare lubeat, suffitu aceti, oculis excepto, id præstari poterit.

### CAPUT VIII.

#### De Ophthalmia.

**T**unica adnata ita corneæ conjuncta est, ut quamplurimi affectus utramque tunicam occupent. Sicque oculorum inflammatio, licet tunicæ adnatæ propria sit, ad corneam tamen non rarò extenditur, in eaque varios affectus producit, ulcera nimirum, hypopyon, albuginem, & alia. Sic etiam pustulæ aliique tumores, vul-

nera & ulcera, utrique tunicæ communia sunt. Ita ut omnes harum tunicarum affectus seorsim tractari nequeant. Ideò nos adnatæ tunicæ affectus aggredi cogimur priusquam corneæ morbos ulterius persequamur.

Ab Ophthalmia igitur incipientes dicimus, illam, quæ ut verbum sonat, nihil aliud est, quàm oculi inflammatio, ab omnibus authoribus pro tunicæ adnatæ seu conjunctivæ inflammatione usurpari. Lippitudo à Latinis post Cornelium Celsum nominatur.

Hæc autem inflammatio prout major vel minor est, triplicem differentiam sortita est. Prima, τάρσις Græcè, Latinis conturbatio dicitur, quæ juxta Pauli sententiam, à causâ extrinseca oritur, nempe sole, fumo pulvere, oleo, & similibus. Sed nihil impedit fieri etiam à causâ interna, vitio scilicet ventriculi, post vini potationem, vel alios errores; estque levis inflammatio, seu phlogosis, cum exiguo rubore & dolore miti, quæ tamen in veram ophthalmiam non rarò degenerat, & est illius principium.

Vera autem ophthalmia à causâ externa perpetuò producit, estque vera inflammatio cum tumore, rubore, & dolore, Lippitudo à Celfo nominatur, quia in eâ crassum excrementum, quod lippa vocatur, oculis adhæret.

Tertia χύμωσις Græcè, Latinè etiam chemosis appellata est, quando inflammatio ita ingravescit, ut magna sit cum dolore vehemente, & utraque palpebra inversa sit, ut vix ab eis oculi contegantur, & album oculi sublimius evaserit, rubrumque magna ex parte itidem occupet. In pueris oculos prominentes habentibus, sæpius contingit, fitque à magna plethora & pituitosis humoribus.

Alia desumitur differentia ophthalmiæ ex Hippocr. Aph. 14. sect. 3. qua nimirum ophthalmia dividitur in humidam, & siccam. Humida illa est, quæ jam fuit proposita, & lacrymarum effusionem secum habet conjunctam. Sicca verò, quæ ex eodem Hipp. ξηροφθαλμία nominatur, & in siccori æstate & autumno contingit. Fit à bile aut melancholia exaffata, cujus pars humida & aquosa absumpta est, ideò nullas humiditates, aut lacrymas emittit. Alias etiam patitur subdivisiones ab adjunctis. Si enim sit cum pruritu, ψιροφθαλμία dicitur: si cum duritie palpebræ, τηληροφθαλμία nominatur.

Alia etiam desumi potest differentia ophthalmiæ ex Gal. 1. de diff. febr. cap. 11. ubi quandam dicit ophthalmiam esse periodicam, quæ scilicet per intervalla repetit in iis, qui illi valdè obnoxii sunt, & qui caput habent calidum & humidum, oculosque debiles, fluxioni recipiendæ idoneos. In iis autem postquam frequenter per multos annos ophthalmia affecti sunt, oculi tandem contabescunt, & visus prorsus amittitur, unde tabida ophthalmia nominatur; vel potius ophthalmia in oculi tabem degenerat.

Alia denique desumitur differentia à causâ proxima & immediata, quæ est fluxio, vel congestio. Per fluxionem ut plurimum fieri solet ophthalmia: Aliquando tamen per congestionem generatur, si nimirum aliqua intemperies seu imbecillitas conjunctivæ acciderit, ex qua ὀμρίωσις in parte rectè non exercetur, sed multa excrementa in ea congeruntur, à quibus pars sese eximere sufficienter non potest, unde inflammatio succedit.

Causa ophthalmiæ conjuncta est sanguis biliosus, pituitosus, aut melancholicus, in oculos defluens, vel in iis per congestionem cummulatus.

Fluxionis causæ sunt multiplices, tum externæ, tum internæ, etiam vulgò notissimæ.

Congestionis verò causæ sunt illæ omnes, quæ oculos intemperie aut imbecillitate afficiunt; ita ut, quæ à sola fluxione initium duxerat, successu temporis partem debilitans, illius coactionem viriet, & ophthalmia partim à fluxione, partim à congestione fiat, quod in chronica ophthalmia plerumque solet contingere.

Cum autem ophthalmia per vim fluxionis generatur, à capite ut plurimum fluxionem eam derivari certum est, & omnes propemodum authores hanc unicam fluxionis originem agnoscunt. Verum docet experientia, contumaces ophthalmias ab hepate non rarò exoriri;



& humoribus ab eo in oculos confluentibus; ita ut tunc temporis cauteria occipitio admota, inorbum foveant, quæ alioqui fluxioni à capite oriundæ maximè conducunt: tunc enim humorum motum ad partes superiores magis promovent. Et vidimus sæpè veteres ophthalmias, nullisque cedentes remediis, clauso fonticulo, qui diu in occipitio gestatus fuerat, brevi & spontè desisse, cessante nimirum humorum motu à partibus inferioribus ad superiores, qui à cauterio continuò fovebatur, naturâ humores amandante ad illum emissarium, quorum portio ad oculos, tanquam partes vicinas, & à longo affectu debilitatas ferebatur.

Quæ à capite fit fluxio, vel à partibus interioribus ad oculos deferitur, per venas scilicet quæ sub cranio exsunt, vel per partes externas, quod frequentius est, per venas scilicet & arterias, quæ à pericranio per se frontem, & tempora ad conjunctivam deferuntur.

Diagnosis ophthalmiæ facillima est, quandoquidem sanguis in conjunctivam effusus, oculis objicitur. Et si rubor sine tumore appareat, atque ab externa causa genitus fuerit *ρᾶσις* seu conturbatio dicetur. Si verò præter ruborem, tumor & calor cum lachrymis adfuerint, vera erit ophthalmia. Ac tandem, si adeò ingravescat, ut nigrum oculi occupet, & palpebræ invertantur, *χίμαρις* erit appellanda.

Signa causarum indè repetenda erunt, quod si fiat à plethora & sanguine propriè dicto, non solum in adnata tunica, sed etiam in tota facie rubor apparebit: tum etiam venarum latitudo, sensuum gravitas, & totius corporis tumor erit.

Si à sanguine bilioso oriatur; aderit lachrymarum acrimonia, ut non solum oculorum anguli, sed etiam genæ ipsæ erodantur: dolor aderit pungitivus & intolerabilis; tumor parvus cum rubore ad citrinitatem vergente: exercitationes immodicæ, insolatus, ira, & acrimonia præcesserunt: temperamentum erit biliosum, ætas florens, & tempus æstivum.

Si fiat à pituita, aderit dolor gravans, calor exiguus, non intensa rubedo, dolor parvus, lachrymæ non acutæ sed cum multa lippitudine & viscositate.

Si fiat à melancholia, tumor erit exiguus, rubor ad fuscum vergens, lachrymæ paucae, pauca viscositas, sed densa, temperamentum melancholicum, & alia melancholiam indicantia.

Si ab interioribus capitis partibus fluxio oriatur, dolor capitis apparet, isque magis internus, & ad radices oculorum pervenit. Si verò per vasa exteriora fluxio in oculos irruat; dolor capitis externus est, frontis venæ distenduntur, & pulsatio in temporibus persentitur.

Prognosis respicit ophthalmiam imminens, vel præsentem.

Imminens lippitudo cognoscitur ex eo, quod pruritus quidam aut puncturæ in oculis cum calore percipiuntur. Illiusque præsagium auget dispositio oculorum ob fluxiones recipiendas. Sic qui oculos prominentes habent, huic affectui sunt magis dispositi. Malo etiam huic generando maximè conducit constitutio temporum, quemadmodum docet Hip. *Aph. 11. sect. 3. Si hiems fuerit sicca & aquilonia, verò verò pluviosum & australe: æstate lippitudines fieri consueverunt, præcipuè in mulieribus, & viris naturâ humidioribus.*

Alvi fluxus ophthalmiæ superveniens, bonus: ex eodem Hip. *Aph. 17. sect. 6.* quia humorum abundantia evacuatur, & ad inferiora retrahitur.

Dolor oculorum valdè diuturnus, malus est. Causæ enim contumaciam arguit, & periculum est, ne suppuratione aut exulceratio succedat.

Ophthalmia in uno oculo incipiens, ad alterum ut plurimum transire consuevit.

Ad ophthalmiæ curationem causæ externæ primùm submovendæ sunt; tum antecedens evacuanda, revellenda, ac repellenda; conjuncta derivanda ac discutienda, & pars affecta roboranda. Quibus adimplendis indicationibus tria medica instrumenta de more aptanda sunt.

Victus itaque sit refrigerans & humectans, ex ali-

mentis euchymis, elixis potius quàm assis, forbilibus potius quàm solidis, quia mandendo oculi exagitantur. Vitet æger acria, salsa & piperata; tum etiam vaporata, quæ caput replent; tum quæ in bilem faciliè convertuntur, ut lac, saccharum, mel, & omnia dulcia. Vinum in principio non convenit: cujus loco ptisana ex hordeo & liquiritia, aut alia refrigerans usurpanda est.

Somnus valdè utilis est, quia oculus quiescit à motu qui dolorem & fluxionem irritat; tum somno dolor sedatur, & materia morbifica concoquitur. Æger dormiat elevato capite, & in latus magis sanum.

Motus omnis corporis vitandus est, & quies imperanda: quæ tantopere utilis, ut Celsus primo die à sermone quoque abstinere jubeat, ne motu illo materia ad caput attrahatur.

Alvus fluida servanda est, lippientem enim (ait Hip.) alvi profluvio corripere, bonum.

Vitentur animi pathemata, & præ cæteris ira.

Ær sit temperatus ac purus, expers fumi, pulveris, & ventorum: obscurior etiam & tenebriosior. Lux enim fluxiones commovet, spiritus agitando. Linteolum nigrum, viride aut cæruleum oculo obducatur, habeatque æger non solum oculum ægrum; sed etiam sanum clausum, vel reclusum: quia sanus oculus, dum ad objecta movetur, ægrum etiam commovet, unde doloris incrementum. Et hæc ratio est, cur uno oculo tantum inflammato majores fiant dolores, quam utroque affecto.

Victus ratione hoc modo instituta, Taraxis curatio primùm exponenda est. Et cum ea à causis externis plerumque oriatur; illæ statim submovendæ sunt, ne morbum foveant, & in ophthalmiam convertant. Mox collyrium paratur ex aqua rosarum, plantaginis, albumine ovi, & lacte muliebri, idque instilletur in oculum pluries in die, tum pannus lineus in eo madefactus applicetur. Eodem tempore æger somno indulgeat quantum poterit: plurimum enim valet somnus ad materiam morificam concoquendam & discutiendam. Si his non sedetur affectus, ad veræ ophthalmiæ remedia confugiendum est, quæ hac serie usurpanda sunt.

Statim ab initio morbi vena secanda est, præmissis clystere: eaque è directo partis affectæ aperienda, sæpeque iteranda phlebotomia, donec sufficiens evacuatio, & revulsio facta fuerit; docetque Avicenna in vera ophthalmia sanguinem mittendum esse usque ad lipothymiam. Galen. verò *lib. de curatione per sanguin. miss. cap. 1.* refert historiam cujusdam œconomi, qui à gravissima ophthalmia liberatus est, sanguine detracto, primum ad *℥. iij.* deinde verò post quatuor horas ad *℥. j.* & capit. *16. ejusdem libri*, testatur ophthalmias sæpe sola phlebotomia intra unam horam fuisse curatas: quod non potuit contingere, nisi magna sanguinis copia detracta fuerit, quemadmodum eo tempore passim fieri consueverat. Moderanda tamen est ista sanguinis missio, juxta temperamentum, ætatem, sexum, virium, & speciei ophthalmiæ rationem. Major enim quantitas sanguinis detrahenda est in ophthalmia, quæ fit à sanguine, & in corpore plethorico: minor verò in ophthalmia biliosa, melancholica, aut pituitosa, aliis circumstantiis magnam sanguinis detractionem dehortantibus. Si sanguis in toto corpore redundet, primum basilica, vel mediana aperienda est, postea verò cephalica. Si verò minori copia sanguis mittendus esse videatur, statim cephalica erit aperienda.

In iis autem, quibus aliqua sanguinis evacuatio consueta suppressa est per menses aut hæmorrhoidas, venæ inferiores aperiendæ sunt, hirudines hæmorrhoidibus affigendæ.

Postquam verò sufficiens sanguinis copia per venæ sectionem detracta est, est ulterius molienda revulsio per cucurbitulas, scapulis & dorso affixas, tum siccas, tum scarificatas.

Ad eandem revulsionem non parum etiam conferent frictiones & ligaturæ, in partibus inferioribus celebratæ. Revulsionibus prædictæ derivationes quoque adjungendæ sunt, quæ sunt per apertionem venarum frontis &



& temporum, quibus addunt nonnulli apertiones venarum, quæ sunt in angulo oculi. Alii hirudines temporibus admovent, alii ponè aures. Quæ omnia derivationum genera post sufficientes evacuationes utilissima sunt.

Galenus 13. meth. capit. 22. arteriotomiam laudat in arteriis temporum celebratam, quando ophthalmia fit à sanguine valdè calido & ferventi. Et quamvis hoc remedium genus nostris temporibus ferè obsoletum sit; præstantissimum tamen atque utilissimum est, omnis experti periculi. Sola enim ligaturâ impeditur sanguinis arteriosi effluxus in minoribus illis arteriis. Neque necessarium est emplastrum à Galeno propositum loco citato ex bolo armeno, thure, massiche & pilis leporinis cum albumine ovi compositum: quod tamen ad maiorem cautelam, qui hanc arteriarum apertionem reformidant, in usum revocare poterunt. Quæ de hac arteriarum apertione à nobis sunt dicta, in doloris capitis curatione videri poterunt.

Vesicatoria quoque in hoc affectu utilissima sunt, tum posteriori parti cervicis, tum ponè aures adnota.

Sanguine sufficienter detracto, purgatio etiam celebranda est, ut biliosi humores, præsertim qui sanguini fervorem & impetum conciliant, evacuentur. Eam autem maximè convenire, docuit Hipp. Aphor. 17. sect. 6. ubi ait: *Lippientem alvi profluvio corripi, bonum.* Galenus 13. meth. cap. 11. Ex his, inquit, quibus oculi tentari phlegmone cæperant, nonnullos sola purgatione per alvum uno die sanatos vidimus. Debet autem fieri purgatio ex medicamentis blandioribus ac sanguinis fervorem cohibentibus, vitatis diacrydiatis, quæ in sequentem aut consimilem formulam reduci poterunt.

℞. Tamarindor. ʒ. v. fennæ mund. ʒ. iij. femin. anisi ʒ. β. folior. endiv. cichor. fumar. ana M. β. Coquantur ad ad ʒ. vj. In colatura infunde rhabarb. electi & myrobolanor. citrin. oleo amygdalar. dulcium conficatorum, an. ʒ. j. fantali citrin. ʒ. i. In expressione dissolve mannæ & syrupi ros. ana ʒ. j. M. Fiat potio. Vel in forma boli.

℞. Cassiæ recentè extractæ ʒ. vj. cathol. dupl. ʒ. iij. rhabarb. pulverati ʒ. j. Cum saccharo fiat bolus.

In ophthalmia pituitosa pilulæ non rarò præscribuntur, nempe lucis majores, de agarico, & aliæ hujusmodi: quæ quidem, licet in statu morbi commodissimæ sint; satius tamen est in principio ab iis abstinere, ne vehementi medicamento humores commoti magis in partem irruant.

Neque unica purgatio sufficit; sed ea per intervalla repetenda, si morbus in longitudinem abeat, præmissis præparationibus convenientibus per apozemata, vel julepos, humori peccanti appropriatos. In primis verò ab initio morbi humorum fervor temperandus est julepis refrigerantibus & incrassantibus, vel emulsionibus semin. quatuor frig. major. lactucæ, & papaver. albi, in decocto refrigerante, addita aquâ rosacæ.

Præmissis universalibus evacuationibus & revulsionibus, ad tæpica veniendum est: quæ quidem ab initio repellentia esse debent. Monent tamen seniores Practici, ne primis statim diebus collyria repellentia oculis admoveantur, quia plerumque humorem in oculos impetu irruentem in parte retinent, & dolorem atque inflammationem augent. Galenus enim comment. Aphorif. 31. sect. 6. Ocularium quendam reprehendit, qui hisce remediis ab initio inflammationis uti proposuerat. Suspecta enim esse ait ab initio, quòd vehementer fluxiones non reprimant, sed ne excernantur, prohibeant. Unde, si acres humores extiterint, corneam exulcerari accidit: si verò multi, distenti, & irritari vehementer, & interdum dirumpi. Avicena verò sen. 3. tract. 1. cap. 9. sic loquitur: *Et oportet, quantum possibile est, ut retardetur in ophthalmia collyriorum administratio, usque ad tres dies.* Et paulò post: *Oportet, inquit, ut in principio non adhibeantur inspissantia fortia; & quæ sint vehementer styptica; quoniam inspissant tunicas, & prohibent resolutionem, & augent dolorem.* Non tamen tam exactè dierum numerus præfiniendus est, cum morborum tempora in quibusdam breviora, in aliis longiora

esse soleant. Utiliter tamen adstringentia fronti & temporibus statim à principio admoventi poterunt; illis enim venæ, per quas humores defluunt ad oculos comprimuntur, humorque influens repellitur. Horum formula talis esse poterit:

℞. Boli armenæ, sanguin. dracon. thuris, massiches, ana ʒ. j. rosar. rubr. balauftior. & farinæ lentium, ana ʒ. ij. Excipiantur albumine ovi & aceto rosaceo. Fiat cataplasma fronti & temporibus applicandum.

Ad fluxionem etiam cohibendam plurimum valere creditur cataplasma ex succo urticæ & farina tritici, fronti & temporibus applicatum, quandoquidem urticæ succus specificâ vi omnem sanguinis fluxum cohibet, & narium hæmorrhagiam iisdem partibus admotus potenter sistit; tum ore sumptus eandem hæmorrhagiam, aliaque sanguinis profluvia efficaciter cohibet.

Interim tamen, si dolor valdè urgeat, qui fluxionem ad oculos magis ac magis promovere consuevit, anodyna medicamenta ipsi oculo admovenda sunt. Inter quæ lac recens, præsertim mulieris benè sanæ, primum locum obtinet, idque ex ipso ubere in oculos emulgendum & sæpè mutandum. Citò enim acefcit, sicque oculo insensum est. In ejus locum suffici poterit caseus ovillus recens, qui etiam sæpè mutandus est, ne butyrescat, sicque oculum inflammet.

Ovi albumen diu agitatum, & in aquam conversum maximè commendatur à Galeno; quia dolorem lenit, & fluxionem leniter cohibet.

Pomum sub cineribus coctum, dolorem oculorum etiam valdè temperat.

Mucilagines seminum psyllii, cidoniorum, fœnugr. extractæ cum aqua rosar. dolorem valdè leniunt. Illæ tamen biduo quoque renovandæ, quia diutius servatæ acorem contrahunt.

Ex his variæ formulæ in rem præsentem concinnari poterunt. V. g.

℞. Medullæ pomi dulcis sub cineribus cocti ʒ. j. mucilag. semin. psyllii & cydoniorum extractæ aquâ rosar. ana ʒ. vj. liquoris albuminis ovi recentis, & lactis muliebris ana ʒ. j. Fiat cataplasma oculo applicandum. Vel

℞. Pulpæ pomi cocti ʒ. j. micæ panis albiff. ʒ. β. ovum num. i. Cum lacte muliebri fiat cataplasma.

Laminæ carnis recentis, hœdinæ, vitulinæ, aut vervecinæ oculis frequenter admotæ, dolorem potenter demulcent.

Simplicius cataplasma parari potest ex medulla panis, in lacte muliebri, & aqua rosarum macerata.

Si dolor vehementissimus sit atque intolerabilis ad narcotica confugiendum est; quibus tamen parcè & cum religione utendum; quia spiritus visorios condensant, humores & tunicas incrassant, sicque visum hebetant. Inter narcotica ocularia primas tenent trochisci albi Rhasis cum opio, qui in hunc modum præscribi possunt.

℞. Aquæ rosar. ʒ. ij. liquoris albuminis ovi fortiter agitati ʒ. j. trochiscor. alb. Rhasis cum opio ʒ. j. Fiat collyrium in oculum instillandum.

Sedato aliquantulum dolore, ad repellentia veniendum est, quæ tamen mitiora esse debent, & iis anodyna quædam perpetuò admiscenda; in hunc finem collyrium sequens præscribi solet.

℞. Aquar. Plantag. rosar. (vel magis repellendum) pediculi rosar. ana ʒ. j. β. liquoris albuminis ovi ʒ. j. trochisc. alb. Rhasis sine opio ʒ. j. Fiat collyrium, in oculos frequenter instillandum.

Si dolor sit acerbior, possunt addi collyrio lac muliebre, & mucilagines prædictæ.

Remedium sequens inflammationem potenter sedat, & fluxionem cohibet.

℞. Albumen ovi unius. Agitetur cum frusto aluminis fati magno in patina stannea, & tamdiu moveatur, donec unguenti consistentiam adeptum sit, quod extendatur supra linteum, & oculis tepidè applicetur. Post duas aut tres horas auferendum est remedium, ne longiori mora & adstringendi vi fati insigni, quam ex alumine habet, humores in oculo retineat.

Aqua



Aqua etiam aluminis, destillata in alembico supra cineres, & oculo cum linteis madidis admota, inflammationem efficaciter temperat.

Sal Saturni in aqua rosarum vel oxycrato dissolutum, vel cum pomata permixtum, oculorum inflammationes potenter extinguunt.

In augmento morbi digerentia repellentibus miscenda sunt; atque ita collyriis prædictis addi poterunt aquæ euphrasæ, fœniculi, chelidonæ, & mucilagines seminum lini, althææ, fœnugræci Gal 13. *meth.* decoctum fœnugræci præcipue commendat; quod digerit, concoquit, & modicè repellit. Debet autem fœnugracum, antequam decoquatur, vel ex eo mucilago extrahatur, excuti per cribrum, ut pulvis, quo abundat, auferatur, postmodum verò aqua frequenter ablui. Collyrii formula talis esse poterit.

℞. Mucilag. semin. fœnugr. & cydoniorum, extracta aquâ rosarum & euphra. ana ℥. j. s. trochiscor. albor. Rhafis sine opio ℥. j. tuthiæ præparatæ ℥. s. Fiat collyrium.

Quando morbus ad statum magis vergit, sarcocolla etiam collyriis additur, quæ paulò potentiùs digerit. Sed cum licetate sua & acrimonia quadam oculos laedere possit; priùs lacte nutrienda est, macerando scilicet in lacte per dies aliquot, lacte frequenter mutato. Et parva illius quantitas una vice præparanda est: diu enim affervata accescit, & oculis insensa est. Illius usus talis esse poterit.

℞. Florum chamomil. melil. rosar. rubr. ana P. j. sem. fœnugr. optimè mundati ℥. j. Coquantur in aqua plantaginis. In colatura ℥. iiij. dissolve sarcocollæ nutritæ ℥. j. tuthiæ præparatæ & trochiscorum albor. Rhafis sine opio, ana ℥. s. Fiat collyrium.

Aquæ etiam nonnullæ ab authoribus commendantur tanquam efficacissimæ.

Quercetanus in Pharmacopœa laudat infusionem croci metallorum in aqua euphrasæ & fœniculi, quæ satis efficax est, & nullo morfu oculum afficit, quemadmodum reliquæ ferè omnes.

Crollius & reliqui Chymici miris laudibus efferunt sal Saturni in aqua rosarum dissolutum, cui etiam salis ammoniaci grana aliquot addunt. Hujus formula talis esse poterit.

℞. Salis Saturni gr. xij. salis ammoniaci gr. iij. aquæ rosar. ℥. ij. M. Infilletur in oculum manè & serò.

Ex plumbo etiam calcinato, vel lythargyro, aut minio in aceto infuso paratur aqua, quæ cum priùs linteis oculis admota, eorum inflammationibus citissimè medetur.

In vulgari usu habetur aqua ex vitriolo albo, in aqua rosar. aut plantag. dissoluta, quæ inflammationes temperat, discutit & fluxionem arcet. Eorum præparatio talis est.

℞. Vitrioli albi ℔. j. aquæ rosar. vel plantag. ℥. iiij. Vitriolum pulveratum in aqua ad ignem dissolvatur. Coletur aqua per linteum, & in oculos infilletur. Si acrimonia sua nimium eos vellicet, additione aquæ rosar. vel plantag. ad libitum temperabitur. Sequens minoris acrimoniæ particeps est, & magis resolvit.

℞. Radic. ireos Flor. & rosar. rubr. ana ℥. i. aquæ rosar. & plantaginis, ana ℥. iiij. Bulliant lento igne ad tertias. Colaturæ adde vitrioli albi pulverati gr. viii. Fiat collyrium.

Unguenta etiam quamplurima ad ophthalmiæ curationem usurpari solent, ex quibus tria sequentia cætera longè superant, & mirabiles non rarò effectus producunt. Primum describitur à Renodæo in Pharmacopœa, titulo unguenti ophthalmici in hunc modum.

℞. Boli armænæ aquâ rosar. lotæ ℥. i. lapidis calaminaris aqua euphrasæ abluti, tuthiæ præparatæ ana ℥. ii. margaritarum tenuissimè lævigatarum ℥. s. camphoræ ℔. s. opii gran. v. butyri q. s. Fiat unguentum secundum artem, ad oculorum angulos, & palpebrarum oras adhibendum.

Secundum est Joannis Cratonis, quod proponitur in consiliis Medicis à Laurentio Scholzio collectis, consilio 6. in hunc modum.

Accipiat butyrum, si haberi potest, mense Maio factum, aut aliud recentissimum diligenter elotum, vel loco illius medulla bovina è cruribus, vel cervina: atque huic admisceatur lapidis calaminaris in tenuissimum pulverem triti quantum excipere poterit. Fiat unguentum.

Tertium habetur apud Penotum in denario in hunc modum compositum.

℞. Tuthiæ præparatæ ℥. j. s. camphoræ ℥. j. viridis æris gr. xij. Tuthiam cum camphora simul contere in mortario, æs seorsum, omnia verò ad pulveris impalpabilis consistentiam. Tum ℞. Butyri recentis ℥. j. aquæ rosar. ℥. j. Bulliant leniter simul, & ab igne remotis, primùm tuthiam cum camphora, deinde æris viride sensim immisce, agitato optimè, & in vase vitreo reconde. Fiet unguentum, quod per sericum transeoletur. Inunge interiores palpebras, præsertim circa angulos, & brevissimè sanabitur. Probatissimum est ad oculorum inflammationes, tam materiales, quàm siccas, & palpebrarum pruritus, & lachrymas singulare remedium.

Aliud unguentum habetur magnæ efficacæ in cista medica, quod tamen acrimoniæ valdè particeps, idcirco palpebris tantum admoveatur. Illius descriptio talis est. Cæteris omnibus nihil conferentibus, hoc remedium profuit in rebelli ophthalmia. Quod fit ex succo nicotianæ & butyro maiali. simul coctis ad unguenti consistentiam, quod clausis palpebris admoveatur, in loco obscuro, quamprimum patiens oculos aperit, statim mordicare incipit, & feliciter curat.

In statu resolutiva remedia repellentibus prævalere debent. Ideò eadem remedia, quæ pro augmento descripta fuerunt in statu etiam convenient, si resolutivum quantitas augeatur, repellentium verò minuatur. Præcipue verò unguenta duo posteriora non solum in statu, sed etiam in ipsa declinatione, & usque ad perfectam curationem usurpari poterunt.

Fotus in primis ad discutiendum materiam morbificam in statu idonei sunt, qui in hunc modum parari possunt.

℞. Florum chamomil. meliloti & rosar. ana P. sem. fœnugr. ut supra dictum est, præparati ℥. ij. Fiat decoctio, quâ foveantur oculi cum pannis lineis tenuibus quadruplicatis. Hic fotus in fine augmenti, & principio status convenient, & calidè applicabitur hyeme, æstate verò tepide, aut subfrigide.

In fine status & declinatione magis resolvens fotus efficietur, si prædictis simplicibus addantur folia euphrasæ, majoranæ, betonicæ, & tantillum vini albi.

Præstantissimum etiam, & paucis notum ad discutendas ophthalmias remedium paratur ex oleo, seu liquore, qui ex linteis accensis, & inter duas patinas suffocatis elicitur; cujus liquoris gutta una cum saliva pueri permiscetur, & pennæ apice oculis admoveatur.

In declinatione non solum remedia prædicta, sed etiam collyria magis resolutiva usurpari poterunt, in hunc modum.

℞. Thuris & aloë ana ℥. s. sarcocollæ nutritæ in lacte muliebri ℥. j. s. croci ℔. s. mucilag. fœnugr. ℥. s. aquæ fœniculi, & euphrasæ ana ℥. j. s. Fiat collyrium. Vel si magis siccandum & simul digerendum est.

℞. Sarcocollæ nutritæ ℥. j. s. tuthiæ præpar. ℥. s. aloës ℔. j. myrrhæ ℔. s. mucil. sem. fœnugr. ℥. s. aquar. verbenæ & chelidonæ ana ℥. s. Fiat collyrium.

In fluxione pituitosa potenter resolutiva, non solum in declinatione, sed etiam in statu & augmento audaciùs usurpari possunt.

Præterea in declinatione, duo insignia remedia ab auctoribus proponuntur, nempe balneum & vini usus: quæ primùm ab Hipp. tradita sunt *Aph.* 41. *sect.* 6. his verbis: *Dolores oculorum, vini potio, aut balneum, aut fomentum: aut venæ sectio, aut medicamentum epotum solvit.* Galen. in commentario hujus *Aphorismi*, distinguit casus & tempora, in quibus prædicta remedia conferunt: quæ etiam à nobis exposita sunt, quod venæ sectionem, purgationem & fomentum spectat. Balneum verò docet Galenus dicto loco, & cap. 22. lib. 13. *Meth.* tunc temporis venire, quando ophthalmia fit ab humoribus acris, &



& corpus sufficienter per phlebotomiam & purgationem evacuatum est. Quandoquidem humorum acrimoniam temperat, eorumque motum atque fluxionem sistit, maxima eorum parte per insensibilem transpiratum excreta; sic quod superest humoris biliosi, contemperatum facilius vincitur à natura. Convenit etiam balneum ex Galeno in ophthalmia pituitosa præmissis perpetuò evacuationibus idoneis, quando quidem humores crassi oculis impacti per balneum attenuantur, sicque faciliè discutuntur.

Vini autem meracioris potio, ex eodem Galeno *com. prædicto*, utilis est in quibus sanguinis copia crassioris in oculorum venulis continetur, sine plethorica in toto corpore dispositione, quia sanguinem illum crassiorem liquat, fundit ac discutit, tum etiam obstructionem aperit.

Ad ruboris & inflammationis reliquias auferendas, fatus sequens parari poterit.

℥. Folior. euphras. pulegii, ana M. j. flor. chamomil. meliloti, rosar. rubr. & paleæ avenæ, ana. P. j. semin. foenugr. 3. iij. semin. foeniculi 3. j. Fiat decoctio in f. q. aquæ, addendo sub finem parum vini albi, qua foveantur oculi cum pannis lineis, vel sacculis prædictis simplicibus semiplenis.

Aqua foeniculi sola, vino adstringenti permista, utiliter admovetur pro fatus, ad reliquias discutiendas, & oculum roborandum.

Ovum ad duritiem coctum, detractâ tessâ, & per medium sectum, calidè oculo admotum, ruboris reliquias absumit.

Fotus ex decocto hyssopi solius, ruboris reliquias etiam efficaciter discutit.

Ophthalmia inveterata, & quæ per multos sæpè annos perseverat, diversam aliquantulum, & longiorem curandi rationem postulat, & illa non rarò magnum Medico curanti facessit negotium; cum difficillimè impedire possit, quo minùs pars nobilissima & delicatissima, à longo tempore debilitata, fluxionem recipiat. Adde quod non solum per fluxionem foveatur hic affectus, sed etiam sæpè numero per congestionem, ex intemperie in parte contracta, quæ difficillimè corrigi potest.

Ad illius curationem primò advertendum est, num à calidiori hepatis intemperie, quod non rarò fit affectus, iste foveatur; & tunc remedia calidam illam intemperiem corrigentia, primùm administranda sunt. Et in primis post phlebotomiam & purgationes convenientes, maximè conferunt balnea, serum lactis, & aquæ minerales vitriolatae, tum etiam hirudines hæmorrhoidibus affixæ.

Si verò ophthalmiæ materia à sola cerebri intemperie oriatur, cujus ratione humores pituitosi ad oculos defluant, cum aliqua sanguinis portione permisti; tunc temporis cerebri expurgationi incumbendum est per pilulas usuales (post evacuationes universales per apozemata, aut alia hujusmodi remedia) bis, ter aut quater in mense usurpatas; quæ similes esse poterunt iis, quæ pro frigida cerebri intemperie præscriptæ sunt.

Si purgationes prædictæ, cum aliis remediis infra descriptis, ad curationem non sufficiant, ad purgationes mercuriales per intervalla repetitas, tanquam ad sacram anchoram confugiendum est.

Tum etiam ad humoris influentis diversitatem, cauterium occipitio admotum erit utilissimum. Cujus loco setaceum posteriori cervici infixum, multò felicius operabitur in iis qui hoc remedii genus ferre poterunt. Vesicatorium sincipiti admotum mirificè profuit in vetula quadam, lippitudine contumaci laborante, ut refert Forestus *obs. 11. lib. 1.*

Rondeletius verò cauterium futuræ coronali affixum magis prodesse asserit, quam in aliis partibus.

Masticatoria etiam ad fluxionis derivationem proficua futura sunt, minimè verò errhina, quæ propter partium viciniam, humores ad partem affectam attrahere possunt.

Si autem cerebrum majori exsiccatione indigere videatur, ad diætam sudorificam confugiendum est, ex china; salsa parilla, & aliis etiam sudorificis confectam.

His accedunt topica resolventia & oculos roborantia, qualia sunt in primis fatus & unguenta pro statu & decli-

natione ophthalmiæ supra proposita, quæ etiam inveteratas ophthalmias discutere plurimum valent.

Neque omittenda est ablutio oculorum supra memorata, ex aqua foeniculi & vino rubro, ad ruboris reliquias discutiendas, & oculos roborandos, quæ singulis diebus manè iteranda est. Ad hujusmodi etiam ophthalmias inveteratas aqua sequens magnæ est efficacisë.

℞. Aloës opt. & tuthiæ præparatæ, ana 3. vj. sacchari albi 3. j. aquæ rosar. & vini albi non acidi, ana 3. vi. Infundantur in ampulla vitrea benè clausa ad solem per 40. dies. Hujus aquæ non colatæ instillantur guttæ aliquot in oculum.

Vel ℥. vini alb. lb. iij. aquæ ros. ℥ss. tuthiæ præparat. 3. iij. caryophyl. pulver. 3. j. camphoræ 3. 8. Misceantur omnia in vase vitreo benè clausa, & agitentur per duas horas, ac soli exponantur per mensem integrum, ea cautione, ut singulis diebus ante solis occasum ab aère removeantur, nec illi unquam, nisi à sole illuminato, exponantur. Hujus aquæ per filtrum trajectæ guttæ duæ, vel tres in oculum instillantur hora somni, vel etiam horâ unâ aut alterâ ante exitum è lecto vel cubiculo. Ruborem oculorum etiam inveteratum tollit; lacrymantes oculos, & fistulosos siccatur; omnem superfluum humiditatem circa membranas exteriores absumit, visum acuit.

Sequens etiam præstantissima est. ℞. Tritici M. ij. salis triti M. j. Ponantur in vase cupreo, & affundatur vinum album, ut materiæ supernatet altitudine duorum digitorum transversorum. Tegatur vas & sinul stent in umbra per 5. aut 7. dies donec liquor colorem viridem acquirere incipiat, movendo pluries in die cum spatula lignea. Liqueor tandem effundatur per inclinationem, & coletur si opus fuerit, per chartam emporeticam. Ejus gutta una instilletur in oculum. Ruborem discutit, fluxionem arcet, oculos abstergit à maculis, omnibusque fordibus, & visum acuit.

Solenander plurimum laudat decoctum foliorum cottoniorum quæ primo vere integra & illæsa colligenda sunt & diligenter asservanda, ne situ, pulvere, aliisque inquinamentis oblectantur & usus tempore eorum manipulus incoquatur aquâ purissimâ; eaque sæpè numero oculi abluantur. Mirum (inquit,) oculos præservant, ruborem discutunt, & influentem humorem arcet.

Aliquando cum ophthalmia pertinaci sordes quàm plurimæ, puris instar, in oculis colliguntur, quæ vix collyriis aliisque remediis curari possunt. Attamen hoc casu maxime confert gossipium optimè carptum, aut digitis discerptum, & ad prunas diligenter exsiccatum, cujus paucâ quantitate instar plumaceoli oculi contegantur, fascia superinducti. Manè gossipium aufertur dictis fordibus imbutum, hocque remedio per plures noctes continuato, morbus curatur, qui aliis remediis non cesserat. Et præcipuè succedit in pueris & infantibus, tali morbo laborantibus.

Pro hujus capitis coronide, non erit abs re, Zacuti Lusitani experimentum proponere, qui ophthalmiam desperatam, & omnibus remediis per annum integrum pertinaciter obsistentem, unguento mercuriali curavit. Quamvis enim nulla luis venereæ apparerent indicia, Mercurialis admotione persuasus, qui *lib. de Morbo Gallico*: Cum videritis, inquit, morbum quempiam communibus remediis non curari, putate esse morbum Gallicum cognominatum; ægrotantem interrogavit, num esset passus aliquando luen veneream, aut cum foeda obsequinaque scemina concubisset; omnia negavit, unum solum confessus, se per noctem in lecto, hujus contagiosi morbi suspitione non carente decubuisse. Hac sola fretus conjectura, diætam sudorificam ex decocto salsæ parillæ per viginti dies præscripsit, attamen circa fructum; quamobrem licet in superis partibus premeret affectio, ut timor esset; ne vacuato humore per os, mercurii vi fluxio rueret in oculos, & ingravesceret amplius affectus; tamen cum esset diuturnus, & confluentis humoris impetus sedatus, unguentum mercuriale corpore exquisitè purgato præscripsit, eoque admoto septem dierum curriculo, post copiosam sputi evacuationem, dolores cessarunt, evanuit inflammatio, mitigatus pruritus, qui antea percipiebatur in



palpebris cum acrimonia multa : & relicto solo in brachio sinistro fonticulo , ut spiraret cerebrum , & servato victu , pristinam recuperavit sanitatem.

Idem Zacutus Lusitanus in praxi ad historias , ad ophthalmiam inveteratam , admodum contumacem valde commendat aquam & unguentum , quæ à nobis descripta sunt cap. de suffusione.

### C A P U T IX.

*De Hipopyo , seu pure sub cornea.*

**O**culorum inflammationes , quando insignes sunt , & in magnum tumorem elevatæ , aliquando per resolutionem terminari nequeunt , sed in suppurationem abeunt , quod maximè metuendum est , & omni ratione avertendum. Inde enim ulcera succedunt , & aliquando pus sub cornea colligitur , qui affectus *ὑπόπυον* dicitur. Contusionibus etiam oculorum non rarò succedit , & sugillationibus inde ortis. Interdum totam pupillam conregit , & visionem impedit. Interdum verò iridis circuitum amplectitur , & unguis resecti figuram refert , eaque ratione *ὀφθαλμὸς* seu unguis nominatur.

Cognoscitur hic affectus non solum ex colore albicante , puris naturam referente , sed etiam ex præcedente inflammatione , aut sugillatione. Commoto etiam oculo , pus sub cornea commoveri videtur : adest color rubeus in oculo , & dolor pulsans , aut saltem præcessit.

Ad curationem , præmissis universalibus remediis , si inflammationis reliquiæ supersint , auferendæ sunt remediis in ophthalmia descriptis. Postmodum leviter discutientia admovenda sunt remollientibus permista , ne tenuiori parte resoluta , crassior materia fiat , & resolutioni minimè idonea. Fiant igitur fomenta ex decocto florum chamomil. meliloti , semina. psyllii , fœnugr. cum pannis lineis , vel sacculis applicanda. In progressu verò addi poterunt decocto folia euphras. chelidon. & semina. fœniculi : vel sequens collyrium usurpari poterit.

℞. Aquar. verbenæ , rutæ , chelidon. rosar. fœniculi , ana ℥.ss. aloës opt. tuthiæ præparatæ , ana ℥.ss. sacchari cant. 3. i. Pulveriscentur & misceantur , addendo lactis mulieris tantillum , & fiat collyrium ; de quo bis terve in die guttæ aliquot oculis instillantur.

Sequens erit valde efficax.

℞. Croci , aloës , myrrhæ ana 3. j. vini 3iij. mellis 3. vj. Dissolvatur crocus in vino. Deinde cum aloë & myrrha misceantur. Tandem mel addatur. Hoc remedio oculi illinantur.

Denique ea remedia quæ in declinatione ophthalmiæ , in oculorum maculis , & suffusione præscripta sunt , hic etiam conveniunt.

Si resolventibus medicamentis materia discuti nequeat , ad alia remedia confugiendum est. Galen. 14. *meth.* refert , Ocillarium quendam sui temporis Medicum , cui Justus nomen erat , concussione capitis multos hypopyos sanavisse. Collocans enim eos in sella rectos , ac capita eorum utrinque à lateribus apprehendens , mox quatiebat adeò ut manifestè descendere pus ipsi videtur.

Si neque hac ratione pus visum impediens ad moveri valeat , Galenus *loc. cit.* ad chirurgiam confugit , (quem sequitur Aetius & alii quamplurimi ) quæ oculi punctione perficitur , qualis in suffusione consuevit. Quæ quidem operatio ut parum nostris temporibus usitata est ; sic peritissimi Chirurghi manum desiderat , & verendum maximè est , ne apertâ corneâ , cum pure humor aqueus effluat.

### C A P U T X.

*De Phlyctanis.*

**I**N cornea & adnata tunica , quemadmodum in reliquis corporis partibus , generari solent vesicæ parvæ , aqua repletæ , bullis seu vesiculis similes , quæ à combustione aquæ ferventis excitantur , *φλυκταίναι* Græcis , Arabibus *Bothori* nominantur : suntque tumores quidam parvi instar granorum millii , acri quodam aut humore oriundi.

Harum pustularum cognitio facillima est , cum sensibus pateat. Quæ in adnata oriuntur , rubrum colorem referunt : quæ autem in cornea , subnigrum si in illius superficie consistant ; album verò , si in parte corneæ profundius sitæ sint.

Quod ad prognosin spectat , phlyctanæ in adnata minus periculosa sunt , quàm in cornea. Superficiares pustulæ , minus periculosa ; profundiores verò magis. Metuendum enim est , ne tota corneæ densitas erodatur , & vel humor aqueus effluat , vel uveæ procidentia contingat.

Curatio in materiæ conjunctæ resolutione tota versatur , & causæ antecedentis aversione. Et omnimodò pustularum suppuratio prohibenda est , quæ in ulcus degenerat.

Universales igitur evacuationes , revulsiones , ac derivationes , quæ in ophthalmiæ curatione propositæ fuerunt hic etiam celebrandæ sunt.

Postmodum topica administranda , quæ leviter repellant in principio , tum etiam discutiant , qualia in ophthalmiæ augmento proposita sunt , quæ magis convenient , quando inflammatio pustulas comitatur , quod plerumque fieri consuevit.

In progressu verò , magis exsiccantia & resolventia erunt usurpanda , qualia in statu & declinatione ophthalmiæ descripta sunt , ac præsertim unguenta ibidem proposita , quæ pustulis illis discutiendis & exsiccandis aptissima sunt.

### C A P U T XI.

*De corneæ & adnate ulceribus.*

**O**phthalmiæ succedere solent ulcera , in cornea tunica & adnata , quando in suppurationem versa est. Succedunt etiam phlyctanis , seu pustulis , in cornea oriundis , iisque disruptis. Fieri etiam solent ab humoribus acris & erodentibus , in oculos confluentibus.

Varia eorum differentia ab auctoribus proponuntur , ex variis circumstantiis desumptæ , prout scilicet vel superficialia sunt , vel profunda lata , vel angusta , varias figuras habentia , & alia hujusmodi. Siculus , cavum angustum , & durum *βόρην* , fossula nominatur. Latum & minus profundum *κνίλωμα* dicitur. Quod in iridis circulo situm est , *ἀρρημον* appellatur , & à nonnullis *ulcus coronale*. Quod denique profundum , solidius asperum , quasi crustosum est *ἐπίκρουμα* & *ἐγκρουμα* vocatur.

Cognitio ulcerum non est difficilis , cum per se oculis pateant. Si ulcus sit in cornea , ulcusculum album apparet in nigro oculi : si in tunica adnata , punctum veluti rubicundum in albo oculi conspicitur , ob illius tunicæ venas sanguine refertas.

Ulcera oculorum curatu difficilia & periculosa sunt : multò magis tamen in cornea , quàm in adnata. Ulcus , quod è regione pupillæ situm est , magis periculosum , quia in eo sanato relinquitur cicatrix , quæ corneæ diaphaneitatem aufert , sicque visionem lædit. Quod si tota tunica erodatur , fit effluxus humoris aquei , & uveæ procidentia.

Curatio hujus affectus , quemadmodum & reliquorum ulcerum , detergentibus & exsiccantibus perficitur , quæ tamèn mitissima esse debent , propter partis molliem , & exquisitum sensum. Præmittenda tamen ea , quæ fluxionem ab oculis revellunt , eamque reprimunt ; qualia in ophthalmia , tum recente tum antiqua fuere proposita. Et si inflammatio ulceri conjuncta sit , remedia illam respicientia prædictis erunt permiscenda. Quibus etiam dolorem lenientia addere conveniet , quoties ille partem infestaverit.

Detergentia & exsiccantia moderata sunt , saccharum , mel , crocus , myrrha , thus , aloës , sarcocolla , tithia , & cerussa , ex quibus formulæ sequentes componi poterunt.

℞. Decocti hordei & fœnugr. 3. iv. mellis optimi 3. 6. vel syrupi de rosis sic. 3. j. Fiat collyrium , quo oculi sæpe abluantur. Vel

℞. Aquar. verbenæ , & plantag. ana 3. ij. sacchari cant. 3. 6. Misce pro collyrio. Vel

℞. Aquæ



℥. Aquæ mellis B.M. destillatæ, & aquæ rosar. ana partes æquales. Vel

℥. Ovum coctione induratum & à putamine mundatum. Dividatur in duas partes, & detracto vitello repleatur fovea saccharo cando pulverato. Optimè ligetur & ponatur in cella vinaria. Extillabit liquor, qui detergendis ulceribus sine morfu valdè idoneus est. Et si potentiùs remedium desideres, myrrha pulverata saccharo cando admiscenda est.

Montanus pulverem sequentem valdè commendat.

℥. Albumina ovorum recentium n. xx. Ponantur in vase stanneo ad solem, donec exsiccentur, postea pulverentur subtilissimè cum æquali pondere sacchari, & pulvis immittatur in oculos, qui sine erosione plurimum adjuvat.

In progressu morbi. si potentiùs detergendum sit & exsiccandum, adde collyriis prædictis trochiscos albos Rhafis, thus, aloën, myrrham, sarcocollam, & alia hujusmodi, in parva tamen dosi, ne oculos exasperent, quibus etiam lac, albumen ovi, mucilagines, aliaque anodyna ad di poterunt.

Tuthia præ cæteris valet, quia minimè dolorifica est, & sine morfu siccatur, ac cicatricem inducit, idè collyria & unguenta ex ea parata, utilissima sunt. Et præ cæteris unguentum in ophthalmiæ curatione descriptum, quod magnam tuthiæ quantitatem recipit, erit utilissimum.

Collyrii valdè detergentis & exsiccantis, ac cicatricem inducentis formula talis esse poterit.

℥. Sarcocollæ nutritæ in aqua rosar. cerussæ & aloës lotæ, myrrhæ, tuthiæ præparatæ ana ʒ. β. sacchari candi ʒ. j. cum mucilagine gummi tragacanthi extracta in aqua rosar. Fiat collyrium, quo palpebræ illinantur.

## CAPUT XII.

### De corneæ cancro.

**U**T singulis corporis partibus cancer solet accidere, sic etiam oculis aliquando contingit. Et cum, quæ communem canceri theoriam & praxim respiciunt, è morborum externorum tractatibus desumenda sint, nos hinc tantum ea, quæ ad oculum peculiariter tali morbo affectum pertinent, paucis attingemus.

Cancer vel occultus est, vel ulceratus. Occultus ad tumorum genera refertur, & in oculo tumor cancriosus, seu cancer oculi nominatur. Ulceratus verò, ulcus cancriosum oculi dicitur.

In utroque tamen adest durities inæqualis & renitentia, color plumbeus & livescens, dolor intensus & pungitivus, caput & tempora præsertim occupans; venæ lividæ & varicosæ, in tumore & partibus vicinis apparent. Sanguis acerrimus & adustus à parte affecta non raro effluit, quando cancer ulceratus est. Ac denique medicamentis tantillum calefacientibus dolor admodum exasperatur.

Incurabilis est affectus in oculo, quemadmodum reliquis corporis partibus, quando jam radices egit, nisi operatione chirurgicâ radicitus extirpetur.

Curatio duplex ab auctoribus proponitur, vera scilicet, & palliativa. Vera, ut dictum, in cancro jam genito, & parti valde radicato, non potest obtineri, nisi chirurgiâ. Recens tamen cancer, ac ferè incipiens, curari potest frequentibus evacuationibus humoris atrabiliarii, præmissâ venæ sectione convenienti, ut docet Galen. 2. ad Glanconem, cap. 10. ubi gloriatur, se hunc morbum per initia sæpe sanasse, adjungendo remediis prædictis optimam victus rationem.

Curatio palliativa, quæ ad symptomatum mitigationem dirigitur, non solum per dictas evacuationes, sed etiam topica convenientia perficitur.

Primum igitur victus ratio refrigerans & humectans, qualis humori atrabiliario debetur, instituenda est.

Postea sanguis detrahatur à directo oculi affectu, hircines pone aurem ejusdem lateris applicentur: tum etiam hæmorrhoidibus; si aliquantulum tumeant. Cucurbitulæ

Laz. Riverii Opera.

scapulis admoveantur, & reliqua revulsionum genera celebrentur.

Purgationes & præparationes humoris atrabiliarii fient per potiones, apozemata, juscula medicata, syrupos magistrales, & alia hujusmodi. Sed præ cæteris multum confert ad humorem atrabiliarium evacuandum, helleborus niger ritè præparatus: ejusque extracto bis aut ter exhibito, cancer incipiens aliquando à nobis sanatus est.

Hæc remedia humoris affluxum ad oculos, dolores, & reliqua symptomata vehementia valdè imminuunt. Ad id tamen non parum etiam conferunt topica remedia, qualia sunt in ophthalmia; ad dolorem leniendum descripta. Præcipuè autem collyria cum mucilagibus, trochiscis albis Rhafis, & tuthia præparata, cum aqua rosarum, solani, & plantaginis.

Aqua sequens pro collyrio & oculi ablutione erit præstantissima.

℞. Radic. scrophulariæ maj. & geranii Robertiani, an. M.ij. arnogliffæ, solani, borragin. buglos. portul. euphras. beton. ana M. j. ranarum viridium, & albuminum ovorum, ana num. xij. sem. fenugr. & cydonior. ana ʒ. j. Radices & semina contendantur, & folia incidantur. Deindè affunde aqua rosar. & euphras. ana lb. j. Misceantur omnia, & distillantur in alembico plumbeo.

Pullorum caro ad doloris sedationem plurimum potest, & morbum ipsum aliquando hoc solo remedio curatum fuisse, à nonnullis creditur. Sic Mauritius Cordæus, Comment. 7. in lib. 1. Hipp. de morbis mulierum, refert historiam nobilis cujusdam fœminæ, cui tota pars dextra faciei cancro, eoque ulceroso obsessa fuit diutissimè, quæ cum variis auxiliis, à medicis Italis, Gallis, Germanis, Hispanis petitis usâ esset, tandem vulgari hoc barbitonforis remedio sanata est. Pullos gallinaceos in partes tenues & latas concidebat, quas sæpiusculè commutando interdum admovebat parti affectæ. Alii admovent carnes pullorum columbinorum, sectas & adhuc tepidas.

Denique curatio vera canceri confirmati, sola expiratione obtineri potest, quæ fit omnimodâ oculi extractione: quam tutò, & salutariter fieri posse docet Fabricius Hildanus, & extractionis modum, omnesque illius circumstantias fusissimè describit obs. 1. cent. 1. ut eas hinc frustra repetere non opus sit.

## CAPUT XIII.

### De ruptura corneæ.

**C**Ornea tunica tantam aliquando patitur continui solutionem, ut humor aqueus interdum tunicâ uveâ egrediatur, & illa solutio ruptura corneæ ab auctoribus nominatur.

Hujus causa est ulcus, aut vulnus illius membranæ, aut magnus humorum affluxus, à quo dicta membrana ita distenditur, ut media crepet, & contenti humores effundantur: ut in muliere quadam Parisiensi contigisse refert Paræus lib. 16. cap. 13.

Incurabilis est plerumque hæc affectio, & visus privationem relinquit, quandoquidem humores oculi effusi regenerari nequeunt. Si tamen vulnus sit exiguum, ex quo portio tantum humoris aquei effluat, curationem suscipere potest: quandoquidem aqueus humor interdum generari potest, ut docuit Galen. 4. de sympt. conf. cap. 2.

Curatio hujus affectus glutinantibus remediis tentanda est. Et præmissis universalibus evacuationibus, venæ sectione scilicet, & purgatione, si eæ necessariae sint, adstringentia & glutinantia oculo admoveantur, & in oculum instilletur albumen ovi, cui trochisci albi Rhafis admisceantur.

Eadem pars foveatur decocto rosar. rubr. fol. polygoni, rubi, bursæ pastoris, & plantag. in vino adstringente parato, si non adsit inflammatio, alioquin in simplicii. Vel



℥. Carnis cydonior. ℥b. 6. rosar. rubr. P. iij. acaciæ 3. ij. croci 3. j. decoquantur in vino adstringente, & fiat cataplasma parti applicandum.

Ad integram consolidationem sequens collyrium adhibeatur.

℥. Aloës lotæ, tuthiæ præparatæ, & sarcocollæ nutritæ in lacte muliebri, ana 3. ℥. croci gr. v. cum mucilage gummi tragacanthi, fiat collyrium.

#### CAPUT XIV.

##### De uveæ procidentia.

**U**veæ procidentia corneæ rupturæ non rarò succedere consuevit, quæ Græcis *προπίπτεις ῥαγοιδῆς* nominatur. Quatuor illius differentiæ ab auctoribus, & præsertim Paulo, proponuntur: quarum prima *μοσκιφαλον* dicitur, quod formam capitis muscæ habeat; & contingit quando exigua portio uveæ egreditur. Secunda *σαφύλωμα* dicitur; & fit, quando major portio uveæ excidit, ut acini uveæ figuram repræsentet. Tertia verò *μῆλον* nominatur, quando maxima est uveæ eruptio, ut ad pomi magnitudinem accedat. Quarta denique *ῥαγ*, id est, clavus dicitur, quando uveæ procidentia inveterata est, & callosa reddita.

Curatio hujus affectus difficillima est, & eo difficilior, quo major est uveæ procidentia. Si verò minor sit, ut in myocephalo, curationem admittit, quæ adstringentibus moderatis perficitur, qualia in corneæ ruptura supra fuerit proposita.

Antiqui, ut Paulus, Aëtius, & Celsus, procidentias inveteratas, quæ medicamentis non cedunt, chirurgiâ perficere tentant. Hæc tamen nostris temporibus obsoleta est, propter summam illius difficultatem, & ancipitem eventum. Si quis tamen eam tentare cupierit, exactè descriptam inveniet apud Hieron. Fabric. ab Aquapend. *cap. de staphylomate*.

#### CAPUT XV.

##### De Ægylope & fistula lachrymali.

**H**ætenus affectus oculorum, qui in humoribus, & tunicis eorum contingunt, expositi sunt. Superest jam ut angulorum & palpebrarum morbi explicentur.

Ac primum sese offert tumor inter majorem angulum & nasi radicem apparens, qui ægylops & anchylops nominatur. Anchylops quidem, si nondum sit ruptus; ægylops verò, postquam ruptus est.

Tumor iste, seu potius tuberculum, duplici modo se habet, cum inflammatione scilicet, vel sine ea.

Quando inflammationem habet comitem, est veluti phlegmone parva, furunculo similis, rubore in ambitu perfusus, cum dolore lancinante. Fitque à sanguine tenui & bilioso, per temporum, frontis, faciei que venas in partem delato. Unde in abscessum plerumque degenerat, qui apertus, ulcus producit, quod sinuosum brevi efficitur, unde fistula lacrymalis nominari consuevit.

Si autem fistula per annum perseveret, cariem in osse producere consuevit, juxta Aph. Hipp. 45. *sect. 6. in ulceribus annuis os abscedere necesse est*. Et insuper caries jam facta dignoscitur ex cavitate, quæ digito comprehenditur, faniei ex ulcere manantis foetore, asperitate, specillo demonstrata.

Sine inflammatione etiam dictum tuberculum sese prodit, tuncque generatur ab humore crasso & viscido, pulti, aut melli per simili, & ad tumores illos accedit, qui atherometa, steatomata, & melicerides nominantur, quique doloris expertes esse consueverunt.

Curatio ægylopi valde difficilis est, tum quòd medicamenta difficile ad moveri possint, propter oculi viciniam; tum quod ob partium molliem abscessus in ulcus sinuosum facile degeneret, ut ante dictum est. At multo adhuc difficilius curatur, si abscessus ad nares rumpatur, & pus per illas effluat, qui subjectorum ossium corruptio ut plurimum consequitur.

Aliquando verò ægylops ad canceri naturam accedit, quod dignoscitur ex dolore pungitivo, venarum tensione cuius duritie atque lividitate, tuncque satius est omnino non attingere, quia remediis magis efferatur, doloresque acerbiores excitat.

Fistula lacrymalis recenter genita, & quæ orificium habet extrinsecum ac manifestum, medicamentis curabilis est: quæ verò profunda & inveterata, ac cum ossis carie conjuncta, vix sine cauterio auferri potest.

Varia horum affectuum tempora, variam remediorum administrationem desiderant. Ac primum ægylope incipiente, fluxio, quæ ad partem fit, revellenda est phlebotomiâ & purgatione: simulque repellentia fronti admoveenda, quibus aliquando morbi progressus prohibetur, & suppuratio impeditur. In hunc finem ceratum sequens concinnari poterit.

℥. Cortic. malor. granator. acaciæ, balaustior. gallar. nuc. cupressi, aluminis rochæ, boli armenæ, ana 3. j. ceræ albæ 3. iij. terebinthinæ 3. iij. Fiat ceratum.

Post usum percussientis remedii, per aliquod tempus resolventia parti affectæ admoveenda sunt: quale est hoc decoctum.

℥. Mellis puri, aloës, ana 3. ij. myrrhæ 3. j. croci 3. j. ʒ. aquæ ℥b. ij. Coquantur lento igne ad mediæ partis consumptionem. Hoc decocto imbuatur frustulum spongiæ mollioris, & inediocriter exprimatur, ac parti applicetur calidè. Postea fascia deligando, & sæpe iterando.

Amatus Lusitanus ceratum contra ægylopos describit *curatione 60. cent. 5.* & multis laudibus effert, quod ita se habet.

℥. Pulver. testar. cochlearum 3. ij. myrrhæ, aloës lotæ, thuris, ana 3. ℥. sarcocollæ, sanguin. dracon. cerussæ, ana 3. iij. opopanacis aceto soluti, & lapidis hæmatitis, ana 3. j. ʒ. croci 3. j. ceræ & resinæ, ana 3. iij. M. simul ad ignem secundum artem, & fiat ceratum angulo oculi applicandum.

Si prædictis remediis tumor resolvi nequeat, sed ad supurationem tendat, illa juvanda est emplastro diachylo simplici: aut si dolor & inflammatio urgeant, cataplasma de mica panis utiliter admovebitur. Si sponte abscessus non rumpitur, ferro aperiendus est, idque quamprimum: si enim apertio differatur, pus partes vicinas erodit, & fistulam incurabilem sæpe producit. Multi cauterio aperiunt; sed ferrum non ignitum tutius est.

Aperto abscessu ulcus detergendum est, & ad cicatricem ducendum, more aliorum abscessuum. Si verò ulcus pertinacius evadat, & in fistulam abeat, curatio sequens illi adhibenda est.

Ac primum vacuatio universalis per phlebotomiam & purgationem repetenda. Fluxio à capite avertenda per cucurbitulas, vesicatoria, & caustica, idoneis locis apposita, quibus succedere poterit decoctum chinæ, vel falsæ parillæ, per plures dies exhibitum. Eodemque tempore cerebrum exsiccandum suffumigiis, pulveribus cephalicis, & aliis in catarrhi curatione propositis.

Cauterii loco setaceum cervici utiliter admovebitur; eo enim solo curatam fuisse fistulam lachrymalem refert Fabr. Hildanus *obs. 41. cent. 1.*

Si jecoris intemperies fluxionis causa antecedens (ut sæpe fit) esse videatur; illi peculiariter est providendum remediis idoneis.

Ad topica veniendo, ulceris orificium aperiendum & dilatandum est lentè & paulatim, cum penicillo ex medulla sambuci, spongia præparata, vel radice gentianæ confectio. Eoque satis aperto, sequens medicamentum à Foresto commendatum, *obs. 17. (15.) lib. 11.* apponatur.

℞. Mellis communis 3. ij. viridis æris 3. j. aquæ rutæ 3. iij. ʒ. viride pulverifetur, & cum aliis lento igne decoquatur ad tertiæ partis consumptionem: & colatura per syringam tepidè ac suaviter imponatur. Si acrius medicamentum videatur, aquâ rutæ ulcus abluitur quotidie, & post lotionem exiguum unguenti apostolorum admoveatur. Hæc remedia per vices ad tres septimanas continuanda, superponendo emplastrum conveniens, & oculum aqua rosaceâ defendendo.



Ulcere satis repurgato, ad incarnandum & cicatrizandum, sequens collyrium usurpabitur.

℞. Thur. sarcocoll. aloës, sanguin. dracon. balaustior. alumin. antimonii. ana 3. j. viridis æris gr. v. Subtiliter pulveriscentur, cum aqua rutæ fiat collyrium, satis liquidum, instillandum leviter cum stipite rutæ ter in die, & turunda in eo madefacta immittatur, superimposito emplastro diapalmæ. Turunda paulatim minuatur, & circa finem omnino auferatur, abluendo tantum partem collyrio prædicto, & diapalma imponendo. Hac methodo fistulas recentes curatas fuisse, refert Forestus *loco citato*, ab insigni quodam sui temporis Chirurgo.

Si os carie affectum manifestè appareat, solo cauterio actuali curari potest, cujus adhibendi modus exactè describitur à Paræo, Fallopio, & Aquapendente *in operibus chirurgicis* Fabric. tamen Hildanus *obs. 22. cent. 5.* se fistulam lacrymalem cum ossis carie, à quatuor annis infestantem, & pro deplorata habitam, in puero tredecim annorum, solis medicamentis feliciter curasse gloriatur, eam dilatando cum spongiis præparatis usque ad ipsum os, postea euphorbium per se fistulæ inspergendo, & quidem in copia, deinde emplastrum ex solo gummi elemi applicando. His eâ, quâ fieri potuit diligentia, per septimanas aliquot adhibitis remediis, squamula ossis se obtulit, quæ exacta est, & postquam per paucos dies semiguttulam balsami tolutam, semel in die cum filamentis ulceri imposuisset, fistula brevi plenissimè consolidata est.

## CAPUT XVI.

De Rhyade, & Encanthide.

**F**istulis lacrymalibus ut plurimum succedit alius affectus, qui Rhyas nominatur, & carunculæ anguli majoris absumptio vel imminutio, à qua & angulus latior evadit. Fit tamen ab aliis causis, nempe ab humoribus acris & erodentibus in eam partem decumbentibus; vel à medicamentis cathæreticis, pro fistulæ curatione adhibitis.

Rhyadi opponitur Encanthis, quæ est ipsius carunculæ immodica excretio & eminentia, eâque generatur à sanguine redundante ad partem translato, & ulcere ejusdem partis non satis maturè exsiccat.

Rhyadis curatio sarcoticis & consolidantibus medicamentis perficitur, qualia sunt quæ sequuntur.

℞. Ros. rubr. P. j. nucum cupres. & myrtillor. ana 3. ii. aloës 3. j. β. vini austeri β. j. Coquantur ad quartæ partis consumptionem. Hoc decocto abluatur pars frequenter. Vel

℞. Aloës, thuris, ana 3. j. sanguin. dracon. 3. β. rosar. rubr. & granor. sumach, ana 3. j. atque rosar. β. j. Bulliant ad quartæ partis consumptionem. Fiat instar collyrii.

Encanthis curatur ablatione carnis superflue, oculi angulo adnatæ, quod perficitur exedentibus medicamentis, à mitioribus ad potentiora progrediendo. Igitur alumen ustum prius admovendum est; quod si non sufficiat, ad unguentum Apostolorum, vel ægyptiacum, vel vitriolum ustum progrediendum. Quod si ne hæc quidem sufficiant, ferro abscindenda est caruncula, vel cauterio actuali absumenda.

Antequam autem hæc fiant, corpus prius præparandum est evacuationibus convenientibus, ne nova fluxio ad partem attrahatur.

In excisione autem & cauterii administratione, vel etiam in absumptione carunculæ, quæ medicamentis fit, hoc diligenter observandum, ne tota caruncula absumatur, sed illud tantum, quod superfluum est, auferatur; alioquin in contrarium affectum, rhyadem puta, deducetur.

## CAPUT XVII.

De Epiphora.

**E**piphoræ nomen, humoris fluxum generatim significat, in quamcumque partem irruat. Usus tamen obtri-

nuit, ut pro tenuis humoris per oculos effluxu speciatim accipiantur, unde, lachrymæ involuntariæ etiam nominantur, quæ per oculorum angulos assidue defluere consueverunt.

Ad harum autem lachrymarum præternaturaliter effluentium generationem, concurrunt pravæ partis mandantis & recipientis dispositiones. Pars mandans est cerebrum, quod frigidiori aut calidiori intemperie præditum serofos humores congerit, eosque ad partes inferiores, & fluxioni recipiendæ idoneas transmittit. Parsiciens est glandula, juxta oculi angulum majorem constituta, & caruncula eidem angulo superposita: quarum partium raritas, aut densitas, aut alia quævis imbecillitas efficit, ut humorum influentium decubitus facile recipiat. Ideo sæpe solet contingere epiphora in ægylope, fistula lachrymali, rhyade, & encanthide; quod nimirum humores superflui ad partes laborantes facile transmitti soleant.

Fertur hujusmodi humor à cerebro in oculorum angulos, interdum per venas internas, & interdum per externas, ut propriis signis paulò inferius distinguemus.

Ille autem humor, epiphoram efficiens, aliquando frigidus est, & nullum aliud incommodum ægrotanti adfert, præter fluxionis molestiam: aliquando verò acrimoniæ & fædæ partisiceps, dolorem, ardorem, ruborem, tum etiam exulcerationem palpebris asferre solet.

Signa præsentium lachrymarum nulla sunt, cum ipsa satis per se pateant. Apparet etiam ex prædictis, num lachrymæ frigiditatis, an caliditatis & acrimoniæ sunt participes. Superest tantum distinguere an per interna vasa, an per externa efferantur. Cum per internas venas humores defluunt, dolores in intimo capitis sentiuntur, & acres sternutationes nonnunquam excitantur. Si verò per venas externas, quæ extra calvariam positæ sunt, humores defluant vasa in fronte & temporibus distenta apparent, & caput veluti revinctum sentitur, & ab adstringentibus remediis exterius applicatis ægri juvantur.

Quod ad prognosin spectat, recentes epiphoræ, & à causis externis præcipue oriundæ, facile curantur, maxime verò in juvenili ætate. Antiquæ & in senibus difficilimè curationem recipiunt, Quæ verò ex aliis morbis procedunt, ut ægylope, fistula lachrymali, & similibus ab illorum affectuum curationibus omnino dependent.

Curatio hujus affectus in fluxionis ablatione, & partis recipientis roboratione consistit.

Fluxio auferenda est humoris peccantis evacuatione, revulsione, derivatione, & partis mandantis roboratione.

Humor peccans, seu serofos humor, in cerebro redundans evacuabitur venæ sectione & purgatione.

Venæ sectio in frigida cerebri intemperie non convenit, nisi manifesta plethoræ signa adfuerint. In calida verò intemperie, quando humores acrimoniâ præditi sunt maxime convenit, eaque bis, aut ter, si opus videatur, iterari poterit.

Purgatio fieri potest per potiones, apozemata, pilulas, & alia hujusmodi, quæ ægrotantis naturæ aptari poterunt.

Revulsio humoris affluentis fiet per cucurbitulas, scapulis frequenter admotas: vesicatoria, posteriori parti cervicis apposita, & cauteria occipiti aut brachiis inusta.

In contumaci affectu vesicatorium sincipiti admotum mirifice prodest, ut narrat Forestus *obs. 11. lib. 11.* de vetula quadam, quæ cum oculos haberet lippientes, lachrymantes, & saniosos, cum intenso dolore, & prurigine, & nullis remediis curari posset; admoto capiti raso emplastro, ex pulvere cantharidum, fermento, & melle, perfectè curata est.

Rondeletius verò cauterium, supra commissuram admotum, magis conferre asserit, quam si aliis partibus applicetur.

Ad derivationem conferunt, hirudines pone aures admotæ, & massicatoria horis matutinis usurpata.

Ne verò humores semel evacuati de novo generentur, cerebrum roborandum atque exsiccandum est. Et quidem, si frigida fuerit illius intemperies, omnia remedia, quæ pro intemperiei frigidæ cerebri curatione à nobis proposita sunt, usurpari poterunt. In calidiori verò ea, quæ in



calidi catarrhi curatione præscripta sunt, præcipuè cerebrum respicientia, hîc convenient.

Dum prædicta remedia ulsurpantur, parti recipienti providendum est topicis remediis. Ac primum si humor fluat per venas externas, adstringentia fronti & temporibus admovenda sunt, & si fluxio fiat ab humore calido, & acri, sequens cataplasma admovendum est.

℞. Boliarmen. sanguin. dracon. balauftior. & myrtillor. ana ʒ. j. β. acaciæ & hypocistidos, ana ʒ. j. thur. mastich. ana ʒ. ij. rosar. rubr. P. j. Pulverentur & excipiantur albumine ovi, & pauco aceto. Fiat cataplasma, quod linteum inductum, dictis partibus applicetur, & quoties exsiccatum fuerit, renovetur.

Si fiat ab humore frigido, ceratum sequens admoveatur.

℥. Thur. mastich. ana ʒ. j. β. gummi animæ, tacamahacæ, & lapidis hæmatitis, ana ʒ. j. gummi juniper. ʒ. ij. terebinthinæ, & ceræ q. s. Fiat ceratum.

Ipsi verò parti affectæ collyria adstringentia & exsiccantia admovenda sunt, in sequentem modum composita.

℞. Tuthiæ præparatæ ʒ. j. sarcocollæ nutritæ ʒ. β. thur. mastich. ana β. spicæ nardigr. vj. Fiant trochisci. qui ovi albumine vel succo cydoniorum excepti, cantho oculi applicentur.

Vel tuthia præparata linteo raro excipiat & filo alligetur, in vino austero immergatur, eoque oculus sæpe abluatur. Vel

℥. Tuthiæ præparatæ, cortic. ovorum pulverifator. aloës optinæ, ana ʒ. j. Involvuntur in panno lineo, & fiat pila; quæ infundatur in aqua sceniculi suspensa cum filo, postea sæpe in die exprimatur pila in oculos.

Sola aloë pulverata, & in pilam, ut dictum est, concinnata, & in aqua rosar. posita, non parum conducibilis est. Vel

℥. Aloës. nucis cupres. thur. mastich. myrrhæ, ana ʒ. ij. tuthiæ præparatæ, sarcocollæ nutritæ, ana ʒ. j. β. sanguin. dracon. berberis, sumach. rosar. rubrar. ana ʒ. j. Pulverentur tenuissimè, & excipiantur aqua sceniculi, fiatque collyrium.

In calida fluxione sequens præcipuè convenit.

℞. Trochiscorum albor. Rhasis sine opio, sarcocollæ nutritæ, lycii, acaciæ, olibani, ana ʒ. j. β. ossium myrobalan. adustorum, corallii albi & rubri, ana ʒ. β. margaritar. ʒ. β. succi mali punici, ad medietatis absorptionem cocti quantum satis. Fiat collyrium.

Si rubor oculorum epiphoræ conjunctus sit, sequens erit utile.

℥. Granor. sumach. contusor. ʒ. j. aquæ plantagin. calidæ ʒ. j. Macerentur aliquandiu, deinde sortiter exprimantur, addendo aquæ rosar. euphras. aquæ album. ovi diu concussi, ana ʒ. β. sacchari candi subtilissimè triti, & cum pauca aqua colati ʒ. j. Fiat collyrium.

Denique ea collyria, quæ pro ophthalmia inveterata præscripta sunt: hîc etiam aptari poterunt.

## C A P U T XVIII.

### De Pterygio, seu ungue oculorum.

**U**NGUIS oculi est membranula dura & nervosa, quæ ex angulo oculi majore prodiens, album oculi primum contegit, mox & successu temporis ad nigrum tenditur, & pupillam tegendo visionem impedit.

Aliquando tenuis est hæc tunica, colore albicante prædita: interdum verò carnosa evadit, venis multis cruentis contexta, diciturque *panniculus*, & *sebel* ab Avicenna. Quamvis nonnulli panniculum ab ungula distinguant, quodd scilicet ungula sit nervea quædam tunica, sine venarum repletionem, & tunicam tantum adnatam contegat: Sebel verò, seu panniculus tantum oculum cooperiat, & rubro colore præditus sit, ac venulis intertextus.

Oritur hic affectus ab exulceratione carnis, quæ est in angulo oculi, aut tunicæ adnatæ, unde scabrities parti & inæqualitas emergit, quam dum facultas nutriendi adæquare, & complanare nititur, copiosiore sanguinem affundit, eique incrementum præternaturale producit, aut quoddam veluti tegumentum ei ingenerat. Quæ tamen

in oculum male affectum quamplurima excrementa confluant; idè non ex sanguine puro, sed pluribus excrementis permixto unguis generatur. Unde variæ illius differentiæ exsurgunt, quod alius durus, alius mollis, alius albo, alius citrino, alius rubro, alius fusco colore præditus sit. Alius faciliè separabilis ab adnata & cornea, alius tenaciter adhærens. Alius simplex & prævæ qualitatis expers, alius putridus & cancrifusus.

Hujus affectus diagnosi ex dictis faciliè intelligitur.

Tum causæ illum producentes, humores scilicet ex quibus generatur, ex colore internosci poterunt: rubra enim ungula fit à sanguine puro, citrina à bile; alba, à pituita; fusca ac nigricans, à melancholia.

Quod ad prognosin attinet, malum hoc difficiliè curatur & non nisi longissimo tempore: siquidem remedia acria, ungulæ conterendæ necessaria, non nisi sensim & paulatim usurpari possunt, propter exquisitum oculorum sensum.

Si oculus affectus minor evaserit, malum est signum: partis enim debilitatem arguit.

Recens ungula & magnitudine mediocris, pharmaceuticis remediis curari potest. Quæ verò aucta est, ad nigrum oculi se extendens & jam inveterata, non nisi manuali operatione curari potest.

Ungula, quæ crassa est, everfa, eminens, indurata & nigricans, curari non potest, cancrifam enim naturam obinet.

Curatio ad causam morbi antecedentem & conjunctam dirigenda est.

Ratione antecedentis, primum victus ratio idonea præscribenda est, qualis in aliis oculorum affectibus à fluxione oriundis supra proposita est.

Simulque evacuationes ac revulsiones, in dictorum affectuum curationibus præscriptæ, etiam hîc usurpari poterunt: nempe purgationes, phlebotomiæ, cucurbitulæ, vesicatoria, & alia hujusmodi.

Ac sufficienter corpore purgato, ad topica veniendum est, quæ ungulam absolvere valeant, à minoribus incipiendo; qualia sunt omnia, quæ pro macularum curatione supra proposita sunt. Quæ si non sufficiant, ad fortiora veniendum est, quæ ab auctoribus passim descripta inveniuntur. Forestus collyrium sequens maxime commendat.

℞. Succo sceniculi ʒ. iij. succi chelidon. ʒ. iij. succi rutæ ʒ. ij. succi malvæ ʒ. ij. β. aloës ʒ. j. vitrioli ʒ. ij. æruginis æris ʒ. j. zinziberis & cinamomi, ana ʒ. β. fellis anguillæ ʒ. β. fellis tauri, bovis, aut porci ʒ. ij. sacchari candi ʒ. ij. bulliant succi, addendo reliqua, & depurentur. Fiat collyrium.

Sequens etiam ab eodem commendatur.

℥. Lapid. hæmatitis Drach. ij. vitrioli albi, viridis æris, ustorum ana ʒ. iij. myrrhæ & croci ana Drach. j. piperis longi Drach. β. sacchari candi ʒ. β. Pulverifentur subtilissimè ut alcohol. Hujus pulveris ʒ. j. misceatur Drach. ij. aquæ raphani, & applicetur bis, terve in die, prout æger tolerare poterit.

Ante usum horum remediorum, pars fovenda est decocto emolliente, quod etiam post eorum applicationem iterandum est, ad dolorem leniendum.

Inter remedia minus vehementia, sequens cum fructu usurpari poterit.

℥. Ossis sepiæ ʒ. ij. sacchari candi Drach. j. vitrioli ʒ. β. tuthiæ præparatæ Drach. β. M. Fiat pulvis subtilissimus, ungulæ inspergendus.

Si topicis hisce remediis ungula absolveri nequeat, ad chirurgicam operationem veniendum est, quæ fit hamulo perforando ungulam ad basim, deinde filum lineum duplicatum acu trajiciendo, utrinque ad basim arcuè deligando, atque sic apprehensam incisore instrumento abscindendo, prout fusiùs docetur à Celso, Paulo, Aëtio, Hieronymo ab Aquapendente in operationibus chirurgicis, aliisque quamplurimis.

Facta incisione, linteum aqua rosaceâ & albumine ovi imbutum est apponendum, ad dolorem sedandum, & inflammationem prohibendam. Ac denique siccantibus medicamentis, collyriis ex tuthia, thure, aloë, trochiscis albis Rhasis, aliisque siccantibus medicamentis cicatrix induenda.



# PRAXEOS MEDICÆ LIBER TERTIUS.

## DE AFFECTIBUS AURIUM.

### PRÆFATIO.

**A**URES pluribus morbis conflitari solent; similibus, organicis, & communibus, ut docet Galenus de sympt. caus. c. 1. qui cum nonnisi per symptomata cognoscantur, ad symptomatum seriem eos redire est animus. Symptomata verò quæ auribus contingunt, ad actiones lasas, aut vitia excretorum referuntur. Actio lasa, vel est auri propria, vel communis omnibus sensoriis. Actio auri propria, nimirum auditus, læditur abolitè, imminutè, & depravatè. Abolitè, in surditate: imminutè, in gravi auditu: depravatè in sonitu aurium. Actio communis omnibus sensoriis est sensus tactus, cujus ratione doloribus obnoxia sunt. Vitia denique in excretis ea omnia continent, quæ ab auribus præternaturaliter egrediuntur. Sicque totus hic tractatus quatuor concluduntur capitibus. Primum erit de surditate, & gravi auditu. Secundum, de tinnitu aurium. Tertium, de dolore aurium. Quartum, de exeuntibus præter naturam ex aurium cavitatibus.

### CAPUT I.

#### De surditate, & gravi auditu.

**S**URDITATEM & gravem auditum eodem capite complectimur, qui fiunt ab iisdem causis, secundum magis & minus tantum differentibus: ita ut valde excedentes auditum prorsus auferant, remissiones verò eum tantum imminuant. Imò verò uterque affectus vulgò surditas nominatur; qui enim alios audire nequeunt, nisi altâ voce loquentes, surdi esse dicuntur.

Surditas autem propriè dicta ἀφωσις Græcis nominatur, cum nempe auditus omnino aboletur, adeò ut ea affecti vel nullum penitus sonum audiant; vel si sonum aliquem auribus percipiant, illius tamen differentias percipere nequeant. Hi etiam sæpe muti sunt, si nimirum ab ortu surdi nascantur; non solum ex eo, quod per auditum homines loquendi formulas addiscunt; sed etiam propter maximum consensum, qui est inter auditus & loquelæ instrumenta, per nervum quintæ conjugationis, cujus rami præcipui ad aures quidem feruntur, nonnulli tamen ad linguam & laryngem protenduntur. Unde fit, ut aurem internam vellicando, tussis exciteretur. Et ratio evidens est. Si quidem surdi à nativitate, si loquelæ instrumenta non haberent vitata, aliquam vocem articulatam ex naturali instinctu ederent: quemadmodum reliqua animalia, etiam si à nativitate ab aliis ejusdem specie animalibus segregentur, ut nunquam ea audire valeant, vocem tamen sibi connaturalem proferunt. At surdi à nativitate nullam vocem articulatam edunt, sed sonum tantum confusum, qui partium loquelæ inservientium læsionem manifestam arguit. Læsiō autem illarum partium potissimum est ab humiditate, quæ cum nervum illum afficiat, qui ad aures, linguam, & laryngem protenditur, auditum & loquelam simul affici necesse est.

Gravis auditus βαρύνεισς Græcis appellatur, eoque affecti agrè sonum percipiunt, nec loquentes intelligunt, nisi alta voce clamantes. Alii verò ne sic quidem audire satis possunt, nec nisi colloquentes in aures ipsis loquantur, ac vociferentur.

Uterque affectus à cerebri, vel auris vitio exoritur.

Cerebri intemperies frigida, aut repletio, aut imbecil-

litas, aut alia quælibet læsiō, in ea præcipuè parte, quæ nervi auditorii exortum aut progressum occupat, surditatem, aut gravem auditum potest efficere.

Auris affectus vel in exteriori, vel in interiori auris parte versantur.

In exteriori cavitate auditus defectum efficit obturatio perfecta, vel imperfecta, à tumore, abscessu, sanguine, pure, pituita, aliisque rebus tum intrinsecus, tum extrinsecus incidentibus. Advertendum tamen est, meatus exterioris obturationem, integram & absolutam surditatem non posse efficere, sed tantum gravem auditum: quandoquidem per os etiam soni ad aures deferri possunt. Etenim meatus patens est ab auris interna cavitate ad palatum, per quem soni faciliè ingrediuntur & ad aures sese insinuant, qui etiam meatus aurium expurgationi dicatus est. Et sonum per os opertum excipi, multa ostendunt experimenta. Videmus enim surdastros, ut melius loquentes audiant, aperto ore sermones eorum excipere. Et si utraque aure diligenter obturata, musica instrumenta baculo contingas, quem dentibus apprehenderis, exquisitiùs audiuntur. Et in via noctu alicujus procul advenientis strepitum captamus, & è longinquo magis audimus, si baculi aut ensis alterum extremum terræ affigamus, alterum verò dentibus apprehendamus.

In parte auris interiori, surditatem, aut gravem auditum efficiunt humores in cavitate interiori collecti, & à capite præsertim defluentes: qui plerumque pituitosi sunt, nonnunquam tamen biliosi, ut patet *Aph. 28. sect. 4.* ubi Hipp. biliosas dejectiones surdis prodesse asserit; interdum etiam sanguinei, siquidem surditatem, quæ crissim comitatur, ex sanguinis fluxu per aures fieri compertum est. Illi autem humores à toto corpore interdum ad aures transmittuntur, ut in febribus continuis, & præcipuè malignis. Eundem affectum producit mala auditus organorum conformatio, qualis est, si tympanum nimis laxum evaserit à sono violento vel humectatione: (Eà ratione surdastri quamplurimi in constitutione austriana graviores habent auditum: quia membrana aëris humiditate relaxatur) aut nimis tensum exsiccatumque, post morbos acutos, vigilias, aut jejunia, aut disruptum ab iisdem motibus ingentibus, aut erosum à pure. Egrediuntur tamen aliquando pus, ex suppurata aure, & sanguis, in magnis concussionibus, sine læsione auditus, quando exitus est inter os & membranam; sic enim septum illæsum permanet. Vel si reliquæ auris particulæ ab ortu, aut aliqua causâ externa, ut ictu, casu, aliisque, à debito naturali statu dejectæ sint. Intemperies denique frigida ab aëre frigidiore, vel aqua frigidissima in aurem immissa, vel narcoticorum, aliorumque medicamentorum usu nimio, hunc effectum producere solita est.

Has omnes causas per propria signa diagnostica sigillatim distinguere difficillimum est. Arte tamen & conjectura in hunc modum elucidari possunt.

Si à cerebri vitio surditas contingat, aut alii etiam sensus læduntur, aut aliquis affectus peculiaris in cerebro apparuit, aut dolor capitis, aut gravitas, apoplexia, lethargus, aut alii hujusmodi.

Obturatione externæ aurium cavitatis oculis ipsius dignoscitur; si ad Solem cavitatem illam introspicias, tumque apparebit, num tumor, aut materia crassa, aut alia quæpiam substantia heterogenea cavitatem illam repleat. Tum etiam,



etiam, si aliquid extrinsecus in aurem illapsum sit ex relatu agrotantis dignoscitur.

Si verò cavitas interior aliquo humore repleatur, pituitam esse judicabimus, si fluxio pituitosa agrotantem prius infestaverit, aut si ille hujusmodi fluxionibus frequenter fuerit obnoxius.

Biliosum verò humorem hunc affectum producere, indicabit febris biliosa prægressa, aut jam agrotantem detinens, & acutissimi doloris præsentia. A sanguine verò fieri ostendit dolor gravans, & sanguinis redundantia in toto corpore. Et hæc in perturbationibus criticis præcipue contingit.

Tympani laxitas & humectatio dignoscitur ex causis prægressis humectantibus, & humida intemperie aliquam aliam partem affligente: vix enim fieri potest, ut causæ humectantes hanc unicam particulam affecerint.

Ejusdem tympani tensio & exsiccatio nimia ex totius corporis siccitate & causis exsiccantibus prægressis erit dignoscenda.

Tympani etiam dispositionem aut erosionem conjicere poterimus, si causæ vehementes rumpentesque aut erodentes enumeratæ præcesserint.

Prognosis hujus affectus in hunc modum instituenda est.

Surditas è nativitate, & quæ longo tempore contra est, eaque integra & absoluta, incurabilis est. Quæ verò non absoluta, sed diuturna, difficillimè, & ut plurimum nunquam curatur.

Surditas à bile, aut sanguine oriunda, cum in febribus continuis & acutis tantum soleat contingere, cum earum febrium curatione solvi consuevit.

Gravis auditus, si brevi tempore non curetur in omnimodam surditatem degenerat, teste Gal. 3. *de compos. med. sec. loc. cap. 3.*

Membrana tympani rupta, vel cicatrix, in ea relicta, incurabilem surditatem efficit.

Surditas per intervalla crescens & decrescens curabilis est: ab humore enim mobili, qui interdum minuitur & augetur, eam produci significat.

Surditas, quæ à vitio cerebri excitatur facilius curatur, quam quæ à proprio auri affectu producitur.

Curationem quod attinet, illa surditas, quæ ab aliquo cerebri affectu dependet, non aliam curationem requirit, quam quæ dictis affectibus destinata est, è propriis capitibus repetenda. Quæ à tumore exoritur, si ille durus sit & inveteratus, curationem non recipit: si verò calidus & inflammatorius, illius curatio in aurium doloris curatione proponetur. Si vero à pure in aure collecto producat, ex capite ultimo hujus tractatus curatio erit desumenda, ubi de his agitur, quæ præternaturaliter ex aure egrediuntur.

Si à siccitate hic affectus oriatur, curandus est, juxta Rhasis præceptum, victu humectante, somno longiori, & capitis perfusione cum aqua tepida: quibus addi possunt humectantia in aurem immissa, ut oleum amygdal. dulc. & similia. Si ab aliena re, extrinsecus in aurem illapsa, surditas, vel gravis auditus oritur; ea protinus auferenda est eluendo, aut excutiendo, aut extrahendo: & si animalcula quædam sint, quæ auri cavitatem subierint, alliciendo, aut enecando. Eluuntur infundendo, quæ viam hanc lubricam reddunt, & humectant, dilatantque: ut lac, oleum amygdal. dulc. vel decoctum aliquod emolliens & relaxans. Excutiuntur impetu quodam, ut sternutatione motâ; sic enim spiritus impulsu, commotis illis partibus, quod in meatu auri latet, sæpè excluditur, idque citius, si prius via, ut dictum est, dilatata & lubrica facta fuerit. Prodest etiam inclinâtâ aure affectâ, supra pedem illius lateris saltare; qua ratione pueri post natationem aquam auribus influxam excutiunt. Si hæc non succedant, extractio molienda est auriscalpio, cavendo tamen, ne dum intromittitur, illud quod adhæret, ulterius propellatur. Idcirco auriscalpii cochleare admodum tenue sit, ut facilius in aure contentis postponi possit. Vel forcipe ad id accommodata, utrinque acutâ & asperâ, illa apprehendi & eximi debent. Vel si neque hoc succedat, cum corpora dura sunt, ut nucleus, vel lapis; alio instrumento

apprehensa confringenda sunt; deinde ut, dictum, humore infuso eluenda. Si auriscalpium intromitti nequeat, specillum cotone involvatur in extrema sui parte, deinde immergatur in therebinthinam, aut in aliquod aliud viscidum: post immittatur in aurem, ut agglutinet id, quod obstruit. Idem fit ex candela cerea, extrema sui parte visco inducta. Quod si aliquid visci aut glutinis post extractionem intus inhæserit, in auriscalpio extrahendum. Sunt qui calamus aperiunt in extremis ejus partibus, unam ejus partem in aurem immittunt, alteram ore comprehendunt; ut inde frequenti sucu, quod intus conditum est, attrahant.

Animalcula ex aure alliciuntur, admotis quibusdam quæ illis grata sunt, ut extrorsum repant; ut si lac cum saccharo in spongiola auri adhibeantur, vel leniter intrudantur, vel ficus inversa, vel pulpa pomi dulcis; vel lardum, quo vermiculi citius alliciuntur; idque præsertim, si aures Soli obvertantur, dum hæc contineant. Peculiariter verò hircines casu ingressæ, alliciuntur sanguine immisso in aures. Pulices verò pilis caninis in aurem introductis. Si autem viva sint animalia, enecanda sunt; mortua enim non amplius auditui obstreperunt, & facilius extrahuntur. Enecantur autem, si saliva auribus instilletur, aut propria urina infundatur.

Amara autem citius infecta enecant, ut centaurii, vel absinthii succus, aut decoctum aloës, & fella quælibet. Acria idem præstant, ut acetum, succus ceparum, & similia.

At cum frequentissima surditatis & gravis auditus causa sit frigida intemperies, & humoris pituitosi influxus in eam partem; ad illius oppugnationem hæc præcipue curatio dirigenda est.

Quia verò hujusmodi pituitæ influxus à cerebro ducunt originem; curatio ad eam partem dirigenda est, non ab similibus ei, quæ frigida cerebri intemperiei assignata est: quam prudens Medicus, pro vario intemperiei gradu, ejusdemque contumacia moderari poterit.

Summa autem hujus curationis erit, ut præmissâ victus ratione attenuante, & modicè calefaciente, atque exsiccante, qualis in gutta serena præscripta est, vitando in primis ventos austros, & ab iis aures muniendo, vaporosa alimenta, & in primis allium & cepæ, quæ auditui nocent: tum etiam quæ humores crassos ac pituitosos generant, ut inquam, primum evacuatio universalis instituat per pilulas, apozema cephalicum & purgans: tum etiam per phlebotomiam, si illius indicationes adfuerint. Cui subnectatur, si affectus sit contumax, diætâ sudorifica, eique succedant particularia remedia, fluxionem revellentia; ut cauteria, vesicatoria, errhina, sternutatoria, masticatoria apophlegmatismi. Peculiariter verò masticatoria sunt maximi usus in hoc morbo, propter meatum, qui ab interna aure ad palatum deferitur, & aurium excrementa deponit. Ac denique morbo in longitudinem abeunte, ad pilulas usuales, aut syrupum magistrale, opiatam cephalicam, pulverem, aut cucupham caput roborantem, & alia hujusmodi veniendum erit. Quæ omnia in frigida cerebri intemperiei curatione proposita sunt.

In usu diætæ, si affectus sit contumax, conveniunt etiam sacculi post assumptam potionem sudorificam capiti admovendi, quales in dicta curatione descripti sunt, iique non sincipiti tantum, ut ibi dictum est, sed etiam auribus erunt admovendi.

Peculiariter verò conducunt ad hujus affectus curationem thermæ sulphuræ & bituminosæ, cum balneo, tum lotionem capitis. Balneo siquidem sudores copiosi provocantur, & materia fluxionis antecedens educitur. Lotione verò capitis cerebrum roboratur & exsiccatur, & humores in ipsam aurem impacti discutiuntur. Utendi modus peculiaris à Pennoto describitur, & valdè commendatur his verbis. *Nihil æquè conducit in surditate, etiam post centum remedium usum, quàm ut patiens, optime prius corpore mundato, & deinde capite purgato, sulphureis balneis caput madesfaciat, hoc modo. Et spongiis magnis confutis veluti cucupham ferat in capite, ad supercilia & infra aures descendentem. Sedeat sub canali balnearum, & verso epitomio aquam accipiat, qua absorpta spongiis, caput*



caput continuo calore suo fovebit, atque omnes capitis futuras auriumque commissuras diducens atque aperiens, vapores tollet, vel materiam impactam nervis viisque auditoriis resolvit per habitum, aut adeo mutabit, ut brevi sit abitura. Bis in die ita sedere eum convenit ad horas duas, ac deinceps statim sudare in lecto, dietamque adhibere tenuem ex succis & jure carniū. Vino, nisi oligophoro, planè abstinendum est.

Tandem ad topica materiam auri impactam discutientia veniendum est; quæ in hunc modum administrari poterunt.

℞. Fol. orig. absinth. pul. serpil. salv. menth. centaur. min. malv. & alth. ana M. j. flor. chamom. melil. fœchad. & anth. an. P. j. cinam. & caryoph. ana ʒ. i. Decoquantur in æquis partibus aquæ font. & vini albi, sub finem additi. Colatura foveatur auris affecta cum spongia, calidè, manè, & serò.

Et eodem decocto poterit fieri suffitus in aurem per infundibulum, quem maximè prodesse, certum est ex eo, quod vapor, ex decocto calente elatus, penitissimas auris partes facilè penetret.

Fomenti loco adhiberi potest panis cum semine carvi subactus, & calens è furno per medium sectus.

Vel panis ordinarius ex clibano sumptus, & inferiori crustâ ablata spiritui vini immergatur, & calidè quantum æger ferre poterit, ad aurem applicetur, ut vapor intromittatur. Efficacior erit panis ex farina vulgari factus, & cum semine carvi, baccis lauri, juniperi, & nuce moschata subactus, antequam coquatur: deindè post levem cocturam, dum adhuc calet, disruptus, & auri laboranti impositus.

Si decoctum pro fomento & suffitu præscriptum fortius desideres, pulpa colocynthidis, & radix hellebori albi ad ʒ. j. vel ij. addi poterunt. Idem decoctum ex vino albo solo, vel ex vino & aceto parari poterit ut magis penetret, & potentius discutiat.

Pro suffitu etiam utiliter excipi poterit in auri meatum, per infundibulum, fumus caryophyllorum, caput muniendo linteo calidissimo, dum fumus excipitur.

Post solum & suffumigium, liquor aliquis in aurem injiciendus est eaque postmodum cotone moschato obturanda.

℞. Olei amygdal. amar. & rutacei, ana ʒ. j. M. infundantur calidè in aurem. Vel

℞. Olei de castoreo & lilior. albor. ana ʒ. j. olei aneth. ʒ. ss. hellebori albi ʒ. ss. aquæ vitæ ʒ. j. Bulliant in B. M. ad aquæ vitæ consumptionem. Colentur ad usum dictum. Vel

℞. Radic. cyperī, baccar. lauri, semin. anisi & cumini pulverator. ana ʒ. j. castorei pulverati ʒ. ss. olei rutæ quantum satis. Misceantur, iisque impleatur cepæ magnum excavatum, quod postea coquatur super prunas, & exprimat succus in aurem instillandus.

Olea chymica efficacissimè operantur, qualia sunt oleum rorismarini, majoranæ, salvie, fœniculi, de spica, caryophil. Quæ tamen propter nimiam vehementiam sola non sunt usurpanda, sed cum prædictis in parva quantitate admisceri possunt, in hunc aut similem modum.

℞. Oleorum prædictorum ʒ. ij. olei de spica, fœniculi, aut caryophil. aut alterius cujusvis ʒ. ss. vel ʒ. j. Misc.

Aquæ enim nonnullæ in aurem instillantur, quæ ad surditatem maximè conferre existimantur. Sic plurimum laudatur ab auctoribus aqua fraxini, quæ elicitur ramos virides fraxini unâ extremitate igni admovendo, & ex altera extremitate aquam stillantem usui asservando. Præcipuè confert, quando surditas à causa valida oriunda est, & remedia valdè calefacientia suspecta sunt. Si caliditas non timeatur, pari aquæ vitæ portione admista, efficacior evadat. Matthiolus hanc aquam succis quibusdam permiscet, eamque sic compositam valdè prædicat his verbis, *Fraxini spumam, quæ à viridi ligno igni exposto manat, additis succis cyclaminis, scillæ, rutæ, æqualibus partibus, omnibus simul parumper fervefactis, plurimum valere ad surditatem scimus, si in aurem sanam hic liquor calidus infundatur, cum se cubitum receperit æger, atque eum super affecta aure jace oportet. Ubi verò utramque aurem surditas occupaverit in eam fundatur, quamvis affecta fuerit, & super alterâ jaceat.*

Spiritus vini, in quo helleborus albus infusus fuerit, in aurem affectam instillatus, magnæ est efficaciz.

Alii multum commendant succum hæderæ depuratum, cum vino albo potenti permiscum.

Lazar. Riverii Opera.

Fella animalium, ut leporis, capræ, perdicis, maximè laudantur, si recentia usurpentur, cum pari mellis portione misceantur, & in cepæ pellicula incallescant.

Pinguedo anguillæ maximo in usu est. Ea autem colligitur dum anguilla magna in veru affatur, & suppositis lauri foliis excipitur, eaque tepidè in aurem instillatur.

Zechius ova formicarum prædicat his verbis: *Ova formicarum contrita & cum succo cepæ in aurem infusa, quàm vetustissimam surditatem persanant.*

Sanguis lupi junioris calens in aurem instillatus surditatem curare creditur.

Denique, si affectus contumacissimus propositis remediis non cedat, non esse abs re, extremum tentare remedium quod à Fonsæca proponitur *consult. 58. tom. 2.* inunctionem nempe factam ex hydrargyro, quia surditas ex lue venerea contracta ita curari solet, quare etiam si hæc talis non sit, fortè curari poterit. Et ratio huic sententiæ videtur suffragari, quia hydrargyrum tumores duros emollit & dissolvit, ac humores concretos, & partibus impactos, potentissimè dissolvit: atque ita pituitam in auris particulis concretam, & reliquis remediis non cedentem, fortè poterit dissolvere. Hoc tamen remedium, non nisi in desperato casu tentandum est; anceps enim & dubius admodum est illius eventus. Siquidè ab inunctione hydrargyri cerebrum valde labefacta ur, & variæ fluxiones concitantur, ita ut nonnullis, à lue venerea per hydrargyrum curatis, ipsa surditas aut gravis auditus interdum contingat; quamvis, ut antea dictum est, ex ipsa lue venerea contingens surditas interdum curetur. Fit debite administrata hydrargyrosis, post sufficientes purgationes, si nullam cerebro noxam relinquat.

In topicorum remediorum administratione hoc perpetuò observandum, ut non frigida, sed semper tepida, aut calidiuscula in aurem immittantur. Præterea nunquam medicamenta instillanda sunt, quin priora abstergantur. Instillato verò medicamento, auris perpetuò cotone moschato obturanda, ille enim solus, & per se surditati maximè conducit: quod confirmatur à Foresto *observ. 15. lib. 12.* his verbis: *Mulier Delphensis, cum ex diuturno morbo convalesceret, incidit in surditatem satis diuturnam, quæ cum satis purgata esset, & deindè à medicamentis abstineret, & longo tempore adhuc surditate laboraret, vetula quædam ei consuluit, ut granum unum vel alterum moschi optimi in bombyce misceret, & auri perpetuò imponeret. Hoc remedio, præter omnem spem, ab omni surditate liberata est. Ego multos quidem, quibus auris sanie longo tempore maderet, curavi sola imposita bombyce, vel cotone, in quo moschus reservatur, quod & aurem exsiccaret, & simul surditatem tolleret.*

## CAPUT II.

### De Sonitu aurium.

**A**uditionis sensus depravatur in sonitu aurium. Quæ admodum enim oculus debet esse omnis coloris expers, ut colores omnes objectorum ritè percipiat, & si aliquo colore præternaturaliter efficiatur, ut in ictero, tunc depravari visionem necesse est; ita auris nullum in se debet habere sonum, ut omnes sonos extrinsecus advenientes percipere valeat. Et si in ea sonus aliquis præternaturaliter efficiatur, auditus depravatur. Hæc autem depravata auditio *παρὰ φύσιν* Græcis, Latinis Obauditio nominatur, vulgò etiam tinnitus aurium appellari consuevit, quamvis tinnitus propriè unicam tantum depravati auditus differentiam constituat: ut ex sequentibus patebit.

Fit autem sonitus in aure, ex commotione præternaturali aëris vernaculi seu congeniti, in auris cavitate contenti. Quamvis enim aër ille congenitus naturaliter in aure moveatur, ut docuit Aristoteles, sonus tamen ex eo motu non exauditur, nisi quando aurem manu concava, aut aliâ re simili obturamus, tunc enim melius fit auditio in aure interna, cum aëris externi ad aurem ingressus impeditur, ut docetur vulgari experimento. Si nimirum testudinis, aut alterius instrumenti musici manubrium dentibus apprehendamus, aures obturando; tunc enim sonus quaduplo major percipitur, quàm si apertis auribus exci-

E e

piatur,



piatur; quia sonus testudinis per continuitatem manubrii in os ingreditur, & ad aures cavitatem sese insinuat per patentem canalē, qui ab aure fauces exporrigitur. Motus autem ille naturalis aëris implantati, fit à spiritu *auditorio* seu auditorio, qui continuo in aurem influit, & aërem illum tenuem & mobilem leviter exagitat. Si verò aër ille implantatus folio vehementius moveatur; tunc sonus intra aurem percipitur, qui præternaturalis est, & auditum vitiat.

Causæ verò aërem vernaculum præternaturaliter commoventes, quamplurimæ sunt. Præcipua tamen & frequentissima est vapor, flatus, aut spiritus, in aurem ab aliis partibus transmissus, vel, in ipsa aure genitus. Si ab aliis partibus feratur, vel à toto corpore, vel, aliqua parte peculiari ducit originem. A toto corpore promanat in febribus, unde Hipp. in *Coacis*, *Bombus in acutis*, & *sonitus aurium lethalis*. Et ille aurium sonitus fit à spiritu flatuoso, per arterias à toto corpore ad aures transmissio. Frequentius tamen accidere consuevit in principio paroxysmorum, & instante crisi per hæmorrhagiam. A parte peculiari flatus elevati ad aures transferuntur, nempe à ventriculo, hepate, liene, mesenterio, utero, aliisque partibus. Unde in vomitu vehementi, melancholia hypochondriacâ, & hysterica suffocatione, aurium tinnitus frequenter solent contingere. A capite etiam frequentius spiritus flatuosus, ex frigidis pituitosis humoribus excitatus à calore debili, in aures deferatur per venas, arterias, & quintam nervorum conjugationem, per quas etiam vias vapores & flatus ab inferioribus partibus transmittuntur.

In aure ipsa generatur flatus ex materiâ pituitosâ in auribus contentâ; unde fit, ut gravis auditus cum tinnitu aurium sæpius conjunctus sit. Ab humore enim fit obstructio, à qua surditas, aut gravis auditus, dum in minori copia redundat; à flatibus verò, ex eodem humore, elevatis, aurium tinnitus generatur.

Aliæ verò causæ sonitum aurium excitantes sunt, percussio capitis vehemens, sonus vehementior, aurium ulcera, calida intemperies, debilitas, & sensus exquisitor.

Percussio capitis vehemens, spiritus in capite contentos violenter commovendo facit, ut illi in aurem confertim propellantur, & sonitum edant.

Sonus vehemens in aurem violenter impulsus, aërem implantatum maximè exagitat, ut commotio illius diutius perseverans, sonitum diuturniorem efficiat.

Aurium ulcera, puris, aut saniei fervore strepitum quendam in aure excitare solent; quod etiam fieri potest à spiritibus majori copiâ in partem ulceratam translatis, & in auris cavitatem effusis, aëremque implantatum commoventibus.

Calida intemperies arteriam auris interiora subeuntem multo spiritu replet, unde contingit, ut pulsatio fiat vehementior, & sonus pulsans in aure excitetur. Vel copiosior spiritus, per arteriam illam effusus in aurem, aërem vernaculum commovet, & sonitum producit. Et ab ista causa sonitus aurium diuturnus efficitur, per menses interdum perseverans.

Auditus debilitas sonitum aurium efficere solet, ut in convalescentibus, quia omnis sensus debilitatus ab objecto, non solum vehementiori, sed etiam mediocri offenditur. Sic illi, qui debilem habent visum, à lumine etiam moderato læduntur.

Ac denique sensus exquisitor, ex Gal. lib. 3. de comp. med. sec. loc. cap. 1. tinnitus aurium efficit eadem ratione, quia scilicet objecta, etiam moderata, illum nimium afficiunt. Ille autem sensus exquisitor præternaturalis esse debet, ut affectum præternaturalem efficiat. Nam sensuum perspicacitas per se actionem depravatam non potest producere: quin potius, quo exquisitor est sensus, eò minus aberrare debet. Præternaturalis autem efficitur à calida intemperie, ulcere, aut alio consimili affectu; quemadmodum partes inflammatae contactus moderatos depravate sentiunt, nempe dolorifice. Vel si exquisitus sensus in flatu naturali consistat, existimandum est, causam tinnitus efficientem esse præternaturalem, & excedentem, ratione illius exquisiti sensus: vapor enim v. g. tam exiguus, ut à sensu obtusiori non percipiatur, sicque actionem non læ-

dat, ab eo, qui exquisitori sensu præditus est, percipitur, & tinnitus efficit; atque ita in hoc præternaturalis erit, in alio verò sanitatis limites non excedet.

Varie dari possunt aurium sonitus differentia, quæ à vaporum multitudine vel paucitate, crassitie vel tenuitate, motu celeri aut lento oriuntur: si enim vapor aut flatus multus sit, crassus, & celeriter moveatur; sensorio exhibebit similitudinem aquæ rapido cursu cum fragore fluctantis, vel tympani, vel id genus instrumentorum musicorum, vel ventri reboantis, vel id genus similia. Quod si paucus sit, crassus, & celeriter moveatur; arboris contractæ; vel domus collabentis, subitaque ruinæ, vel catapultæ speciem refert. Si multus sit, tenuis, & celeriter moveatur, sibilum excitare solet, & torrentis cuiusdam lenioris imaginem. Si paucus sit, tenuis & celeriter moveatur, tinnitus excitat. Si multus sit, crassus, & lenè moveatur, murmur quoddam excitare solet. Si paucus sit, crassus, & lenè moveatur susurrum representat. Si multus sit, tenuis, & lenè moveatur; sibilum remissiorem refert. Ac denique cum gradus innumeri dari possint crassitie & tenuitatis, multitudinis & paucitatis, motus celeris & tardi; pro eorum ratione innumeri prope modum sonorum modi in auribus produci poterunt, prout magis, vel minus, ad hanc, vel ad illam accedere videbuntur.

Diagnosis prædictarum causarum certa haberi non potest, docente Gal. 3. de comp. med. sec. loc. cap. 1. Artificialem talem conjecturam ex causis prægressis, aliisque circumstantiis elicere possumus.

A flatuoso spiritu fieri sonitum aurium, inde colligi potest, quod interdum cesset, & intervallo posito revertatur, tum etiam si præcesserint cibi, flatibus generandis idonei.

Per consensum ab aliis partibus fieri ostendunt, si aliqua alia pars affectu peculiari laboret, & affectus per intervalla repetat.

A cerebro præsertim fieri, testatur dolor capitis præcedens, aut gravitas ejusdem, & ut plurimum nocumentum aliis sensibus communicatur.

In ipsis auribus vitium esse, testatur sonitus continuus, & sine ulla internissione infestans.

A materia frigida affectum produci cognoscimus, si æger à calidis medicamentis juvetur, & si sanitatis tempore omnes strepitus facile perferat.

A vaporibus crassis vel tenuibus, paucis vel copiosis effectum produci, ostendunt sonorum differentia, quæ in aure percipiuntur, supra propositæ.

A facultatis imbecillitate exoriri, facile patebit ex iis, quæ præcesserunt, utpotè morbis præcedentibus, ex quibus vix dum agri convalescere incipiunt.

A calida intemperie, exquisitori sensu inde oborto fieri conjicimus, dum æger percipit caliditatem in capite circa aures, causæ calefacientes præcesserunt, & flatus discutientia medicamenta malum augent, tum etiam æger sanitatis tempore magnos strepitus, propter sensum exquisitum, perferre non potest.

Quod ad prognosin spectat, recens aurium tinnitus facile curatur, chronicus verò difficile, eoque magis, si à lue venerea ortum duxerit. Qui à causa calida ortum ducit, facilius curatur, qui à frigida, difficilius.

Diuturnus aurium tinnitus, è materiâ pituitosâ in aure contentâ oriundus, in surditatem degenerat: auctâ enim materiæ illius copiâ, meatus auditorius obstruitur, & spiritus influxus ad aures inhibetur.

Curatio hujus affectus pro varietate causarum varia esse debet.

Ac primum curatio sonitus aurium, qui per consensum aliarum partium generetur, à curatione affectuum illarum partium dependet, & ideo ex propriis cujusque capitibus erit desumenda.

Qui verò ab aure primario affectu exoritur, peculiarem curationem desiderat. Et si à frigida intemperie, crassiusque flatu generetur, eandem curationem desiderat quæ in gravi auditu descripta est. Consimiles enim sunt affectus, qui sæpè simul complicantur, aut unus in alium degenerat: tinnitus enim non rarò gravis auditus, & surditas prodromus esse consuevit.



Omnia igitur remedia, tum universalia, tum particularia, superiori capite ad surditatis, & gravis auditus curationem proposita, huc transferri poterunt.

Si ab aurium ulcere tinnitus provenit, non aliam postulat curationem, quam quæ ulceri debetur: qualis capite sequenti proponetur.

Si à sensus debilitate procedat, ut in convalescentibus ab aliquo morbo graviore, instaurazione ac refectione totius corporis sponte affectus evanescit. Poterunt tamen interim olea quædam temperata in aurem infundi, ad symptomata demulcendum, ut chamæmelinum, anethinum amygdalar. dulc.

Ac denique, si à calida intemperie, vel exquisitiori sensu ducat originem, victus refrigerans & humectans præscribendus est, tum etiam refrigerantia in aurem immittenda, à mitioribus ad fortiora progrediendo. Ac primum insillari poterit decoctum hordei, violarum, lactucæ, nymphaeæ, quibus ad penetrationem aliquid melissæ, aut chamæmeli addi poterit. Quibus non conferentibus, succi lactucæ, portulacæ, hyosciami usurpandi sunt: imo ad papaveris succum, & ipsum opium confugit. Gal. quibus tamen parcè & summa cum cautione utendum est, ne calorem nativum partis debilitando, auditum nimis hebetent.

## C A P U T III.

### De dolore Aurium.

**A**urium dolor, ὠταλγία Græcis nominatur. Estque gravissimus affectus, tum propter partem affectam, membranam puta interiorem, auris cavitatem ambientem, tum propter cerebri viciniam, cujus ratione illud non raro in consensum trahitur.

Cum autem omnis dolor à solutione continui oriatur: quæcumque partium illarum sensibilibus auris cavitatem ambientium continuitatem solvere possunt, aurium dolorem excitare solent. Horum præcipua sunt intemperies, tum immaterialis, tum humoralis, seu cum materia conjuncta, vulnera, ulcera, & res externæ in auris cavitatem illapsæ vel immissæ.

Frigida intemperies sæpè aurium dolorem excitat, induciturque à ventis frigidioribus, balneo aquæ frigidaæ, aliisque causis impensius refrigerantibus. Calida intemperies sine materia raro aut nonnunquam aurium dolorem producit, quemadmodum frigida. Nam frigidum partibus hisce nervosis & membranosis inimicum est, calidum verò amicum: neque dolorem in auribus efficere potest, quin multum excedat, sicque humorum defluxum ad partem alliciat, unde materialis intemperies producitur. Hac de causa nec Galenus, neque alius Græcorum calidæ intemperiei mentionem fecerunt, quamvis Avicenna & Arabes ferè omnes eam proposuerunt.

Materia verò frigida, dolorem aurium efficiens, est pituitosa, vel serosa, in aures à cerebro defluens: vel flatus, ab eodem cerebro, aut partibus inferioribus transmissus.

Materia verò calida vel biliosa est, ex venis & arteriis in prædictas partes elapsa, vel sanguinea, per dictas etiam vias effusa, à qua inflammatio generatur.

Prædictæ causæ solutionem continui occultam producant, à qua dolor excitatur. Solutiones verò manifestæ, ut vulnera, & ulcera, non est dubium, quin dolorem etiam inferre possint. Vulnera fiunt à causis externis pungentibus, incidentibus, & contundentibus, ita ut contusio ad hanc classem referatur. Ulcera verò fiunt post inflammationem, abscessu rupto, vel ab humoribus acerbis partem erodentibus.

Denique res externæ in aurem immissæ, si duræ, acutæ, aut alio quovis modo mordentes aut vellicantes sint, dolorem procul dubio efficere consueverunt.

Diagnosisharum omnium causarum ita instituenda est. Si intemperies immaterialis sit, nulla sentitur gravitas in aure, neque ulla tensio, & nullus tumor apparebit. Frigidam autem esse intemperiem cognoscēs ex eo, quod causæ refrigerantes præcesserint, ut peregrinatio tempore hyberno. A frigore externo dolor intenditur, & admotis ca-

lesacientibus lenitur. Calidam verò intemperiem indicabunt externæ calefacientes, ut insolatio, vel aer calidior, & noxa è remediis calidis in aurem injectis; levamen verò à refrigerantibus.

Si ab humore pituitoso dolor excitetur, gravitas quædam in aure & ipso capite percipietur tum fluxio pituitosa interdum aliam aliquam partem infestabit. Præterea causæ refrigerantes præcesserunt, ut aer frigidus & aquilonijs alimenta frigidiora: adestque tempestas hyemalis, senilis, & similia.

Si à flatu oriatur, dolor erit vehemens, sine pondere aut gravitate, interpolatus, non continuus, & cum tinnitu conjunctus.

A seroso humore fieri ostendunt alii affectus, ab eodem producti, & simul agrum infestantes, ut fluxiones acres & tenues in dentes, oculos, aures, pectus, aliasque partes; & serosi humoris per vomitum, alvum, urinas, aut sudores evacuatio.

Si ab humore bilioso ducat originem, dolor erit pungens & acutus; cum caloris sensu adjuncto; à refrigerantibus juvabitur, & biliosæ quædam humiditates interdum è capite manabunt: quibus accedunt calidum & biliosum temperamentum, ætas juvenilis, tempus æstivum, victus ratio calidior, aliquæ causæ calefacientes, à quibus lædi æger consuevit.

Inflammatiō cognoscitur ex dolore intenso & pulsatili, cum calore insigni, & robore, interdum ad malas & tempora sese extendere: quibus febris adjuncta est continua & intensa, nec non aliquando delirium, convulsio, syncope, & frigiditas extremorum.

Vulnus ex sanguine ab aure profluente cognoscitur: ulcus verò à pure vel sanie. Sed quia puris effluxus interdum à cerebro fit per aures, distinctione opus est. Si enim procedat à cerebro, dolor capitis aliaque apostematis cerebri signa præcesserunt, & primò sanies magnâ copiâ effunditur; deindè sensim minuitur, donec ex toto consumpta sit. Potest quidem magnâ copiâ effundi ex abscessu auris; sed inflammationis in aure conceptæ signa præcesserunt. Huic postea ulcus succedit quod postmodum, sive ab abscessu, sive à fluxione humoris acris duxerit originem sequentibus signis innotescit. Pauca puris, aut saniei quantitas sensim & continuò profluit; dolor, ardor, & punctio sensus in ipsa aure percipitur, præcipuè dum auriscalpium immittitur. Imò verò ulceris differentias conjectura quadam assequi poterimus. Si enim ulcus sit in ossè; cognoscitur ex sanie tenui ad citrinum colorem vergente, & ex affectus longitudine. Si sit profundum, ex puris multitudine si mundum sit, ex pure laudabili: si sordidum crassitie & copia ejusdem: si virulentum ex sanie tenui: si putridum, ex fœtore puris: si corrosivum, ex eo, quod post saniem sanguis egrediatur, si fistulosum, ex vetustate ulceris sanie virulenta, & carne callosa, ac duriori. Denique extrinsecus in aurem immissa, vel illapsa, aut sensibus percipiuntur, in auris cavitare contenta, aut ex relatu agrorum addiscuntur.

Prognosis doloris aurium varia est pro varietate causarum. Qui à nuda intemperie ducit originem, facile curabilis est. Qui à materia frigida, pituitosa, serosa, vel flatuosa producitur, non est quidem valdè periculosus, sed chronicus ut plurimum esse consuevit. Qui verò à calidis humoribus, & præsertim inflammationem efficientibus exoritur, admodum periculosus est. Cerebrum enim propter viciniam trahitur in consensum, unde delirium & convulsio subsequi solent. Juvenes in hoc morbo magis periclitantur. Cum enim calidiori temperie præditi sint, & sanguine calidiori, intensior fit inflammatio, quæ calorem nativum cerebri dissolvit, prorsusque hominem extinguit: unde fit, ut ægri plerumque intra septimum diem intereant. Senes verò cum humores habeant frigidiores, minore inflammatione afficiuntur, sicque minùs periclitantur.

Ulcera in auribus difficilè curantur, quia cerebrum vicinum ad eas partes excrementa deponit. Ea tamen quæ abscessus consecutaria sunt, faciliùs curantur; tum etiam, quæ pus laudabile generant. Ubi verò sanies virulenta, fœtida,



aut aliâ pravâ qualitate prædita fuerit, difficillimam curationem arguit, idque magis si ulcus fistulosum, aut cum ossis carie copulatum fuerit.

Curatio, non secus ac diagnosi & prognosis, juxta varietatem causarum varianda est.

Si enim à frigida intemperie nuda producat, calefacientia remedia, auri admota, ad illius curationem sufficient, qualia in surditatis curatione fuere proposita, ac præcipuè fortis & suffusus, tum etiam olea calefacientia ibidem descripta. Calida verò intemperies, si aliquando sine materia contingat, topicis refrigerantibus, quæ paulò inferius proponuntur, edomari poterit, ac præcipuè ovi candido cum lacte muliebri subactò, & in aurem instillato.

Si à frigida intemperie cum materia conjuncta, pituita scilicet aut flatu, aut serosa materia, eadem curatio erit administranda quæ ad surditatis curationem fuit proposita. Ut primum totum corpus evacuetur, cerebri intemperies corrigatur, & topica remedia calefacientia ac discutientia auri admoveantur, è curatione prædicta desumenda.

Si à calida intemperie, cum biliosi humoris affluxu, aurium dolor producat, qui chronicus sit, aut per intervalla recurat. Primum humor ad partem affluens revellendus erit phlebotomia, quâ etiam calida intemperies totius corporis, nedùm ipsius hepatis, in quo humor biliosus generatur, emendari poterit. Deindè humoris peccantis evacuatio fiet purgationibus idoneis. Dicta hepatis intemperies calidior emendabitur julepis, aut jusculis refrigerantibus, sero lactis caprini, aquis mineralibus & acidulis & vitriolatis, balneis aquæ tepidæ, & similibus. Ac denique ea omnia convenient, quæ in doloris capitis, à calida intemperie oriundi, curatione fuere proposita. Dolor verò ipse demulcebatur topicis refrigerantibus & anodynis, pro inflammatione infra describendis.

Inflammatio auris curabitur, missò prius sanguine ea quantitate, quæ tum plenitudini satisfaciât, tum humorem ad aurem affectam confluentem revellere possit, idque præmissò clystere emolliente, refrigerante & laxante. Debet autem sanguis detrahi magnâ copîâ, iteratis saltem vicibus: id enim postulat morbi magnitudo, & acuties. Secunda est autem vena cephalica è directo auri affectæ. Si à suppressione mensium aut hæmorrhoidum affectus originem duxisse videatur, venæ inferiores aperiendæ sunt demptâ prius plenitudine per venam brachii. Imò & absentibus hujusmodi causis, venarum inferiorum apertio optimam revulsionem præstabit ad opposita distantissima, cui etiam usui conferent hirudines ano affixæ.

Revulsiones etiam commodè fiunt per frictiones, & ligaturas brachiorum & crurum, cucurbitulas scapulis, & dorso admotas, tum siccas, tum scarificatas.

Interdum etiam ad derivandum, cucurbitula scarificata ponè aures apposita, multum juvat, ut docetur historiâ luculentâ à Zacuto Lusitano appositâ *obsrv. 69. lib. ... praxis admirandæ*, his verbis: *Divinus senex lib. 2. epid. sect. 6. post medium sic præfatur: Ad auri dolorem cucurbitam affigito. Hæc memoranda sententia summam attulit opem misero cuidam, qui ex dolore auri atroci malè habens, omnibus præstidiis destitutus vigiliis debilis & amens factus, continuo febriens, & in horas moriturus sperabatur. Hic cum ex venæ sectione, cucurbitulis costis, humeris collo affixis, revellentibus clysteribus, expurgantibus, cæterisque revulsoriis auxiliis, sicut & anodin' intra aurem inditis, nullam sentire utilitatem, cucurbitula scarificata, juxta aurium glandulas applicata, levatus est. Extracto enim copioso sanguine, inflammationeque resoluta, hujus auxilii beneficio omnino sanus permansit.*

Idem Zacutus Lusitanus, in *praxi ad historias*, laudat hirudines ponè aures admotas quaternario numero, quas maximum levamen attulisse refert juveni cuidam, sævillima auri inflammatione laboranti.

Mirandum etiam interdum effectum profert arteriotomia in temporibus celebrata, ad aurium dolorem atrocissimum compescendum; sanguinem fervidum & spirituosum educendo, qui symptoma illud gravissimum producebat. Operandi modus à nobis expositus est in curatione doloris capitis, à materia calida oriundi.

Purgatio etiam in hoc affectu utilissima est, ex cholagogis composita; humores enim biliosi, sanguini permixti, eique fluxibilitatem & antirropiam conciliantes, ad inferiora retrahuntur, & foras educuntur.

Postmodum verò julepis refrigerantibus tota humorum massa contemperanda est, qui fiunt ex decocto lactucæ, portulacæ, plantaginis, acetosæ, & similibus, cum syrup. limon. granat. aut papaveris rhœados.

Interim verò dum prædicta remedia usurpantur, topica continuo administranda sunt, quæ perpetuò anodina esse debent, propter doloris vehementiam, cujus mitigatio reliquas indicationes superat. Harum tamen ratio poterit, si prædictis anodynis, in principio & augmento leniter repellentia admisceantur; in statu verò & declinatione resolventia, quorum exempla talia esse poterunt.

℞. Lactis mulieb. recenter mulcti ℥.ij. album ovi agitati, ut in liquorem abeat, ℥. ℞. M. instillentur tepidè in aurem.

Vel lac solum, ab ubere in aurem instillatum, valdè dolorem lenit.

℞. Fol. plantag. & solani, ana M. j. flor. chamomil. & melis. ana p. j. Fiat decoctio, cujus sumum æger excipiat in aurem, per infundibulum.

℞. Ol. viol. nymphææ & rosac. ana. ℥. j. M. instillentur in aurem per suffumigium.

Aselli prædictis oleis infusi & expressi, præstantius faciunt anodynum. Hæc enim animalia eximiam habent vim dolorem sedandi, eaque ratione in doloribus dentium hæmorrhoidum, aliisque usurpantur. Vel dicti aselli vivi capiuntur & in oleis cum aqua decoquuntur, ad aquæ consumptionem.

Si ardor sit valdè intensus succi refrigerantes oleis prædictis admisceri poterunt, in hunc modum.

℞. Ol. nymph. & rosac. ana ℥. j. succi solani & plantag. ana ℥. ℞. M. instillentur in aurem.

Oxyrrhodinum à Practicis non paucis usurpatur, ex olei rosacæ partibus duabus, & acetii parte una compositum, quod tamen suspectum esse debet, quemadmodum omnia quæ potenter repellunt. Periculum enim est, ne humor defluens, in cerebrum vicinum retrocedat. Estque præceptum generale perpetuò observandum, in inflammationibus quæ partibus nobilibus proximæ sunt, repellentia admoveantur. Admisceri tamen possunt leviora repellentia anodynis & relaxantibus. Sic enim fluxionem moderatè reprimunt, nec tamen eam longius propellunt, cujusmodi sunt ante proposita, quibus etiam sequens commodè addi poterit.

℞. Ol. rosac. & nymph. ana ℥. j. ℞. aquæ rosar. & plantag. ana ℥. ℞. lactis muliebris. ℥. j. mucilag. semin. psyllii & cydon. extractæ cum aqua rosar. ana ℥. vj. M. injice in aurem guttulas aliquot hujus liquoris tepentis, & circum aures lintea, eo liquore macerata, appone.

In dolore vehementissimo ad narcotica interdum confugere cogimur. Sed rarò ea usurpanda sunt, & maxima cautione adhibita, quia cerebro insensa sunt. *Novi quendam* inquit Gal. 3. *de comp. med. sec. loc. solo usum opio, & vocem & sensû agro ademisse, ut ne opobalsamo quidè, aut aliis injectis calefacientibus, homo amplius restitui potuerit.* Si igitur magna urgeat necessitas, in hunc modum præscribenda sunt.

℞. Ol. de semin. papaveris ℥. j. ℞. camphoræ, opii, ana gr. ii. M. instillentur in aurem.

℞. Ol. amygdal. dulc. ℥. ij. succi malvæ ℥. ℞. myrrhæ ℥. ℞. croci ℞. ℞. opii gr. iij. vi. M. utatur ut suprâ.

In topicorum administratione diligenter observandum est Galeni præceptum, quod habetur *lib. de compos. medic. sec. loc. 1.* ut scilicet auri inflammatione affecta non attingatur, sed medicamenta in eam instillantur per auriculariû specillum, lanâ mollissimâ obvolutum, & in iis intinctum; tum æger interrogetur, num medicamentum tepidum ei videatur, & num calidius ipsum ferre possit, & ad tantam caliditatem procedatur, ut ipsum non offendant. Tinctum itaque pharmaco specillum ad principium meatus auditorii moderatè imponendum est, ut ex eo in altum medicamentum defluat: idque toties iterandum, donec meatus impleatur; mox lana eodem medicamento imbuta tum meatus osculo, tum auri universæ imponenda est.



In statu morbi olea leniter resolventia anodynis permiscenda sunt, in hunc modum.

℞. Ol. chamamel. amygdal. dulc. & violac. an. ℥. i. ol. lilior. ℥. β. M.

Sed fomenta & suffumigia potentiùs resolvunt, quæ ex decocto sequenti parari poterunt.

℞. Rad. alth. ℥. i. fol. malvæ, folani, hyperici. ana M. i. semin. lini ℥. β. semin. malvæ, alth. & papav. albi, an. ℥. ij. flor. chamom. aneth. & rosar. an. P. i. Fiat decoctio in aqua, vel lacte, pro fotu vel suffitu. Aqua è stipitibus fraxini educta, in aurem instillata, mirificè dolorem sedat, ejusque causam resolvit. Stipites fraxini virides igni admoventi, & aqua ab eorum extremitatibus stillans usui reservanda.

Si tumor resolvi non possit, sed ad suppurationem tendere videatur, quod ex doloris incremento, pulsatione majore, & febre intensiore dignoscitur: naturæ motus adjuvandus erit, & cataplasma sequens admoventi poterit.

℞. Residentiam prædicti decocti, pro fotu & suffitu descripti, cui adde adipis anseris, gallinæ, medullæ vituli, mucilag. semin. psyllii & fœnugr. ana ℥. i. olei chamom. violac. an. ℥. i. butiri recentis ℥. β. croci ℥. β. Fiat cataplasma.

Cataplasma de mica panis hîc etiam erit convenientissimum; dolorem enim sedat, & suppurationem leniter sine calefactione juvat, eaque ratione in omni phlegmone feliciter usurpatur. Illius compositio talis est.

℞. Medullæ panis albissimi. lb. i. Coquantur in lacte caprino ad pulvis consistentiam, deinde adde vitellos ovorum. num. ij. ol. rosac. ℥. ij. croci ℥. j. Fiat cataplasma.

Maximè etiam commendatur cataplasma ex cepa, Victorii Faventini, quod in hunc modum componitur.

℞. Cepam num. i. butiri recentis ℥. ij. ol. chamom. & rosac. an. ℥. i. croci ℥. i. Fiat cataplasma, quod moderate calidum parti applicetur.

Factâ suppuratione abscessus rumpitur, & pus egreditur per auris membranam rarefactam, aut erosam. Tumque æger in aurem affectam decumbere debet, ut pus commodè effluat; & in aurem infundenda, quæ pus eluere & abstergere valent.

℞. Decocti hordei ℥. iv. mellis rosac. ℥. i. M. instillentur tepidè in aurem.

Si à puris acrimonia ulcus generetur, peculiaris cura illi adhibenda est, quæ etiam conveniat ulceri, ab humorum influxu oriundo.

Ac primum quia ex sententia Gal. *de compos. med. secund. loc.* topica alicui membro adhiberi non debent, nisi priùs toto corpore repurgato: Evacuatio. solennes instituendæ sunt per phlebotomiam & catharsin, ægrotantis naturæ, & temperamento appropriatam; eaque per curationis decursum repetendæ, quoties opus videbitur. Mox topica abstergentia & exsiccantia usurpanda, à mitioribus ad validiora progrediendo. Quorum exempla talia esse poterunt.

℞. Mellis optimi, & vini albi antiqui an. ℥. iij. Bulliant ad despumationem, & instillentur in aurem, cotone postmodum, eodem liquore inbuto obturandam.

Deindè, ut medicamentum potentiùs efficiatur, succum marrubii, apii, absinthii, centaurii minoris, aut cyclaminis inelli admisce, leviter decoque, & in aurem instilla. Vel

℞. Succu betæ ℥. i. marrubii ℥. β. mellis opt. ℥. vj. Coque parum, postea adde syrupi absinthii ℥. ij. M.

Fortius medicamentum ita parabitur.

℞. Succu cyclaminis ℥. i. myrrhæ ℥. i. croci ℥. β. thuris ℥. i. viridis æris ℥. β. vini antiqui ℥. i. Bulliant leviter ad vini consumptionem: liquor bis, aut ter in die infundatur.

Nota, ante quamlibet liquoris infusionem aurem esse abluendam hydromelice tepido, probeque abstergendam penicillis, ex mundis linteis confectis, vel specillo auriculario, cotone obvoluto.

Detersum ulcus sufficienter ad cicatricem perducendum est medicamentis epuloticis, in hunc modum paratis.

℞. Aristolochiæ rotundæ, cortic. granat. & gallar. an. ℥. β. Coquantur in æquis partibus vini & aquæ ferratæ ad lb. β. Colat. adde succi plantag. & polygoni, an. ℥. i. mellis rosac. ℥. ij. M. instillentur in aurem. Vel

℞. Thuris, myrrhæ, an. ℥. j. gummi juniperi ℥. β. sarcocollæ, ladanii, an. ℥. j. Fiat pulvis qui excipiat terebinthina, & fiant pastilli supra carbones injiciendi, quorum fumum recipiat æger in aurem per infundibulum.

Vel pulvis iste misceatur alicui succorum prædictorum, & auri instilletur. Vel alumen ustum cum vino mixtum in aurem infundatur, potentissimam enim exsiccandi vim obtinet.

Si ulcus contumax fuerit, & vetustatem contraxerit, à fluxione foveri necesse est, cujus remotioni incumbendum est purgationibus usualibus; diætâ ex guaiaco & falsâ parillâ, errhinis; masticatoriis, cauteriis, aliisque remediis fluxionem avertentibus. Mox ulceris exsiccationi incumbendum est remediis fortioribus, quale est antea præscriptum, ex succo cyclaminis, myrrhâ, viridi æris, aliisque compositum. Vel sequens Valesii, quo se aurium ulcere laborantem Presbyterum ab octo annis, curasse refert.

℞. Mellis ℥. x. aceti ℥. viij. Coque ad ignem, & despuma, deinde adde viridis æris ℥. i. M.

Hæc remedia manè & serò in aurem infundenda sunt, & antequam instillentur, auris abluenda est sequenti decocto.

℞. Folior. absynt. althææ, & agrimon. an. M. i. Fiat decoctio in æquis partibus aquæ fontis & vini albi sub finem additi ad lb. β. In colatura dissolve oxymel. simpl. ℥. i. β. alum. pulverat. ℥. i. M. Abluatur auris calidè, & postea exsiccetur specillo cotone obvoluto.

Si dolor excitetur à remedium acrimonia, immittatur ol. amygdal. dulc. vel amarar. cum myrrhâ, aloë, & croco. Et si major sit dolor, misceatur parum opii, vel instilletur oleum ex vitellis ovorum, in mortario plumbeo subactum.

Si ulcus valdè fordidum appareat, unguentum Ægyptiacum succis prædictis dissolutum, usurpandum erit.

Denique plurimum commendatur à Galen. Aëtio, aliisque, tum Græcis, tum Arabibus, tum Neotericis, scoria ferri, ad ulcus aurium potenter exsiccandum. Galen. *3. de comp. med. sec. loc.* scoriam ferri, cum aceto acerrimo tritam, vel decoctam usurpat. Hollerius in *commentario illius capitis*, Arabum præparationem magis probat, qui scoriam cum aceto terunt, & postea exsiccant, idque septies repetunt, postea in pollinem redigunt, & cum aceto acerrimo coquunt longa coctione, dum mellis crassitudinem acquisierit: atque ita siccant, & in usum revocant, cum melle aliisque liquoribus dissolutam.

Si auris dolor excitetur ab aliquo corpusculo in aurem immisso, ut lapillo, nucleo cerasi, aut aliis hujusmodi, quæ interdum dolorem parere consueverunt, & interdum inflammationem, convulsiones, ac mortem accerere; ut refert Matthæus de Gradibus, puero cuidam decem annorum nucleum cerasi in aurem immisum, & malè à chirurgo tractatum, insignem dolorem ac mortem intulisse. Eorum corpusculorum extractio sic molienda est.

Primum advertendum est, an auriculario specillo corpuscula illa extrahi possint: quod cautè admodum agendum est, nec ab eodem specillo penitiùs immittantur, quod non rarò solet contingere. Ideò si res in aurem immissa totum foramen impleat, satius est ab usu specilli omninò abstinere, & reliqua auxilia tentare, quæ in hunc modum adu. inistranda sunt.

Paulus specillum lana involutum in resinam seu terebinthinam, aut gummi, aut aliud quoddam glutinans medicamentum demittendum esse scribit: ibique vertendum, donec sensim res in aure contenta extrahatur.

Si hoc modo nihil efficitur, oleum calens meatui continuè instillato, ut pars illa relaxetur, & res in aure contenta lubrica fiat; sic enim faciliùs excidere, aut extrahi poterit.

Adhibeantur sternutamenta naribus, naresque claudantur, & os comprimatur; ita enim à vehementi spiritu



explosiones id quod in aure continetur, expellitur.

Hæc auxilia indefinenter usurpanda sunt, donec æger liberetur. Si enim res in aurem immissa diutius persisterit, inflammatio orietur, & post modum multò difficilior erit corpusculi extractio, & grave impendebit periculum.

Arculanus in *nonum Rhasis* refert, caput lacertæ auri admotum, corpuscula illa extrahere, & propriâ experientiâ confirmat his verbis: *De expertis per me in extractione rerum infixarum in aurem est, ut lacerta viva, aut noviter mortua applicetur cum capite suo auri, & ligetur sic per tres horas retenta: cum eam amovebis, invenies rem infixam adhaerentem capiti lacertæ. Et hoc valet in extractione cujuscunque rei ubicunque fixæ.*

Denique, si prædicta remedia non sufficiant, ad extractionem veniendum est, quæ sit per instrumenta chirurgica; quæ fusè & eleganter docentur à Fabricio Hildano *cent. 1. observ. 4. 5. 6.* & ab Aquapendente in *operationibus chirurgicis, & capite de aurium chirurgia.*

Pulices aliquando in aurem sese insinuant, & in illius cavitate sese commoventes magnam molestiam pariunt. Ad illarum extractionem globulus ex pilis caninis compositus in aurem demittitur, & pulex sese in eum inferet ob sympathiam, quam habent pulices cum canibus. Vel ex lana molli compressa pessulum composito, & in aurem frequenter demittito. Vel dictum pessulum terebinthinâ illinito, & altius in aurem demittito.

Aqua in aurem introducta natando, aut caput irrigando, sæpissimè molesta esse consuevit, & dolorem efficere. Illa ut plurimum facillè excutitur, si quis alteri pedi innixus ejusdem lateris cum aure affecta, capite parumper declivi saliat. Si hoc non sufficiat, extractio molienda est exsuctione facta per fistulam, aut arundinem peritissimè in aurem immissam, aut solle parvo in eandem introducto, & postea dilatato. Extremitas autem fistulæ, quæ in aurem demittitur, cotone obvolvatur, ut foramini auris arctius uniatur, neve aer externus ingrediatur, qui attractionem impediret.

Galenus, & Aëtius assidue oleum infundunt, & aurem irrigant, mollique lana sovent; deinde molli etiam lana extergunt, rursumque infundunt; idem sæpius repetendo.

Ac denique spongiæ mollissimæ & siccissimæ frustula in aurem demittantur, donec sicca, nec amplius humida extrahantur.

#### CAPUT IV.

*De excurrentibus præter naturam ex aurium cavitatibus.*

**E**X auribus multa præter naturam egrediuntur, quæ sigillatim commemoranda sunt: iisque propria remedia sigillatim adscribenda.

Primo igitur rupto abscessu, post inflammationem genito, aut ex ulcere ab humorum acrimonia pus aut sanies solet effluere, cujus curatio à prædictorum affectuum cu-

ratione dependet, quæ superiori capite fuit proposita.

Sanguis etiam aliquando ex auribus profluit, ut in vulneribus capitis ac percussionibus, in quibus venæ aurium rumpi, aut lacerari possunt. Si autem modicus sit ille fluxus cohibendus non est, quia intus retentus inflammationem efficeret. Si verò immoderatus sit aut diuturnior, cohibendus est venæ sectione in brachio celebrata, & cucurbitulis affixis scapulis cum scarificatione. Deinde astringentia & refrigerantia in aurem instillantur, qualia sunt succus plantaginis, polygoni, vel decoctum rubi, rosar. rubr. mastiches, acaciæ, hypocistidis, halsustiorum, sumach. & simil. in vino & aceto, aut aqua ferrata.

Aquosus humor per aures è cerebro nonnunquam effluit, idque pueris plerumque solet contingere; qui humor cohibendus non est: nam importunè suppressus epilepsiam, aut gravem alium cerebri affectum parit. Natura enim per hanc viam, licet minus idoneam, excrementa deponit: nimiaque humiditas, in capitibus puerorum luxurians, non solum per vias ordinarias, huic usui à natura destinatas, nares scilicet & palatum; sed etiam per aures, oculos, & totam capitis superficiem, (unde ulcera & achores capitis) expurgatur. Cum tamen ista evacuatio symptomatice sit, & humor ad aures profluens, eas tandem exulcerare, & auditum lædere valeat, illius curationi convenienti methodo incumbendum est.

Ac primum humores superflui, in cerebro redundantes educendi sunt blandis, & frequenter repetitis purgationibus; tum etiam derivationibus, per vesicatoria, posteriori parti cervicis admota, & causticum occipitio inustum.

Postea meatus aurium detergendus & exsiccandus est tali medicamento.

℞. Succ. agrim. & absinth. an. ʒ. iv. vini albi & mel. rosac. an. ʒ. i. Bulliant parum, & in aurem instillantur, sordibus prius absterfis; postea verò aures cotone obturentur, eodem liquore imbuto. Vel

℞. Vini albi ʒ. iv. succor. agrimon. absinth. & centaur. minor. an. ʒi. Bulliant simul, & in aurem instillantur.

In adultioribus verò, si aquosus humor per aures effluat, & diu perseveret, totum corpus, & ipsum cerebrum evacuandum est apozemate cephalico & purgante. Postmodum humiditas superflua absumenda dietâ sudorificâ; derivanda, vesicatoriis, cauteriis, & cucurbitulis, cæteraque remedia administranda, quæ in frigida cerebri intemperiei curatione proposita sunt.

Vermes denique in auribus aliquando generantur ex putridis ulceribus, & ex iis emanare solent, qui curatis quidem ulceribus cessant. Quia tamen ulceris sanatio non tam brevi tempore obtineri potest, vermium extinctio interim molienda est remediis convenientibus. Hoc unicum exempli loco haberi poterit.

℞. Ol. amygdal. amar. succi apii, centaurii minor. an. ʒ. ij. aceti ʒ. 6. Bulliant parum, deinde adde myrrhæ, aloës, an. ʒ. i. M. instillantur in aurem. Si fortius desideres, colocynthidis ʒ. ss. addi poterit.



## PRAXEOS MEDICÆ LIBER QUARTUS.

### DE NARIUM AFFECTIBUS.

#### PRÆFATIO.

**N**ARES varios affectus præter naturam pati consueverunt; qui ad morborum, vel symptomatum seriem referuntur. Ad morbos referuntur ulcus & Ozæna, sarcoma & polypus. Ad symptomata verò reducuntur, olfactus læsio, fetor narium, coryza, sternuta-

tio, hæmorrhagia. Ideò quartus hic liber septem absolvetur capitibus. Primum erit de narium ulcere & ozæna. Secundum, de sarcomate & polypo. Tertium, de læso olfactu. Quartum, de narium fetore. Quintum, de coryza. Sextum, de sternutatione. Septimum denique, de hæmorrhagia narium.

CAPUT



## CAPUT I.

### De Narium Ulcere & Ozæna.

**U**lcus narium, aut recens & simplex est, aut vetustum & putridum, quod Ozæna nominatur.

Recens & simplex fit vel à causis externis, aut vulnere aut contusione; vel ab internis, humorum quippe acrimoniâ ad illas partes decurrentium, aut præcipuè pituitæ falsæ à cerebro profluentis.

Ozæna verò fit ab ulcere simplici, si negligatur, aut propter causæ malitiam, & maiorem acrimoniam magis penetret, putridumque & sordidum efficiatur.

Diagnos utriusque petitus ex eo, quod ulcus simplex nullum aut exiguum dolorem inferat; sed tantum aliquid sanguinis frequenter emittat, præsertim cum attingitur, aut irritatur. Alioqui crustula sicca eaque nigra obducitur, quæ emunctionis impetu nonnunquam excutitur, Ozæna verò maiorem dolorem infligit, crusta illius sordidior est, tum graveolens mucus ex ea profluit. Ager ipse tum sibi graveolet, tum adstantibus tetri odoris expiratione molestus est, & à fædo illo odore ozæna Græcis nominata. Sæpè ulcus illud serpit, & vel narium pinnas, vel earum interstitium, vel interdum tenella illius loci ossa exedit ac putrefacit, exesumque palatum aliquando perforat, idque maximè, si ad canceri naturam accedat, vel ex lue venereâ (quod frequenter contingit,) aut elephantiasi originem duxerit.

Quod ad prognosin attinet, ulcera recentia, & ab humore benigno, minorisque acrimoniæ particeps genita satis faciliè curantur. Vetusta verò, sordida, putrida, difficile: & si in cancerum degenerent prorsus insanabilia sunt. Si à lue venereâ, aut elephantiasi oriantur, curari non possunt, nisi affectus illi prius auferantur.

Ad curationem, primum victus ratio conveniens instituenda, quæ humorum acrimoniam contemperet eorumque generationem prohibeat. Mox totum corpus evacuandum est phlebotomiâ, & purgatione convenienti; tum cucurbitulæ affigendæ cum scarificatione. Et si fluxio humorum acrim in nares sit valde contumax, vesicatoriis & cauteriis, posterioribus partibus admotis, erit derivanda, tum capiti roborantia administranda.

Præmissis universalibus remediis, ad topica veniendum est. Ac primum advertendum, num ulcera crustosa sint; & antequam ulterius progrediaris, crusta auferenda est; eam emolliendo fotu aquæ tepidæ, butiro insulso, adipe anseris aut gallinæ recenti, oleo amygdalarum dulcium, & similibus. Emollita crusta, vi excutienda non est, ne irritetur ulcus, & fluxio exasperetur; sed expectandum est; dum sponte decidat, nares emungendo, aut saltem leniter & blandè summitate digiti oleo amygdalarum dulcium inuncta detrahenda.

Ablata crusta, astringentia & exsiccantia remedia usurpanda sunt. In simplici ulcere sufficit, aquâ hordei cum melle rosaceo ulcus abluere, deindè unguento de tuthia, vel albo Rhafis, vel oleo ex vitellis overum illinire, quod erit efficacius, si in mortario plumbeo prius agitetur.

Ad ozænam verò sequentia parabuntur.

℞. Hordei integri P. i. fol. agrimon. plantag. absinthii, & centaurii min. ana M. i. rosar. rubr. P. β. Coquantur in aqua ferrata. In colat. dissolve mellis ros. ℥. iv. Fiat errhinum narium frequenter attrahendum..

Post aliquam deterfionem, sequens decoctum usurpandum est.

℞. Balaustiorum & cortic. gran. ana ℥. ij. fol. plantag. caudæ equinæ, pilosellæ & herniariæ ana M. i. radic. bistortæ ℥. i. aluminis crudi ℥. i. β. Fiat decoctio in s. q. aquæ.

Aqua aluminosa ad idem etiam est efficax tum ea remedia, quæ ad polypum adstringendum & exsiccandum capite sequenti proponuntur, erunt efficacia.

Ad idem facit unguentum Ægyptiacum, in qua hordei dissolutum.

Deindè fiant unguenta, quæ adstringant, detergant, & summè exsiccant, ut unguentum pompholygos, addito

alumine, chalciride, & cortice mali granati. Vel sequens unguentum præscribatur.

℞. Omphacii ℥. β. cortic. mali granati, balaustiorum, ana ℥. iij. myrrhæ, aluminis; ladani. ana ℥. ii. chalciridis aloës, cortic. thuris, ana ℥. i. olei rosac. & myrtin. ana ℥. ij. ceræ rubræ quantum satis. Fiat unguentum, quod applicetur ulceri: vel dissolvatur in vino, aqua plantag. pediculi rosar. aut myrtillor. & frequenter narium attrahatur ore aqua pleno.

Si hæc non sufficiant, abluatur ulcus aqua sublimata, bis, quaterve in die. Siccat enim egregiè, & citra ullum morsum detergit. Illius præparatio talis est.

℞. Aquæ plantag. ℥. iv. sublimati crudi pulveris gr. xij. Bulliant in phiala vitrea ad mediæ partis consumptionem. Potest augeri vel minui sublimati quantitas, prout fortius, aut debilius medicamentum efficere volueris.

Ulcere probè deterfso, ad illius exsiccationem veniendum est: cui rei confert pulvis rosarum rubrarum insufflatus. Et si efficacius id præstare velis, pulveres unguenti prædicti addi poterunt.

Rondeletius ad ulcera exsiccanda, post sufficientem deterfionem, nihil efficacius esse testatur suffur ignis, quod partes illas profundas attingit & siccat, idque parandum esse docet ex potentissimè exsiccantibus, ut auripigmento & cinnabari, quibus addenda sunt aliqua odorata, ex quibus fuligo excitatur, & ulcera siccantur, ut myrrha, thus, mastiche, benzoinum, &c. quæ in hanc formam reduci possunt.

℞. Ladani duri, hypocystidos, mastich. myrrhæ, ana ℥. iij. styracis rubræ, & calamitæ. cortic. thuris, sandaracæ; auripigmenti, ana ℥. ij. Excipiantur omnia terebinthina, & fiant trochisci, quibus sufflatur æger serò & manè in cubiculo.

Optimum etiam est parare candelas ex cera rubra, nam fuligo talis candelæ narium ulcera potenter exsiccant, maximè si æger contineatur in cubiculo bene clauso & angusto. Quod autem fuligo recipiatur, idem experimur (inquit Rondeletius) cum diutius in Musæolo moram trahimus noctu; nam postea sputum & excrementa narium fuligine illa denigrata redduntur. Deindè hæc addit. *Hæc ratione nos ulcus curavimus, quod neque ab Italis, neque à Gallis Medicis curari potuerat.*

## CAPUT II.

### De Sarcomate, & Polypo.

**N**arium ulceribus excrecentiæ carneæ interdum superveniunt, quæ aliud morbi genus, nempe tumorem præter naturam constituunt. Earum autem duplex est differentia; quarum una Sarcoma nominatur, altera verò Polypus.

Sarcoma est excrecentia carnea in narium genita, certa figura carens & ulcerum, quæ partibus externis adveniunt, hyperfarcosi quàm simillima.

Polypus verò est excrecentia carnea, radicibus exilibus adhærens, in latum sese porrigens, & ad inferiores narium partes propendens, ita ut polypi piscis speciem referat, unde nomen sortitus est. Rhafis narium hæmorrhoidas appellat, quoniam hæmorrhoidibus, quæ in ano succrescunt, quodammodo similes sunt. Hæc autem caruncula mollis est, modò alba, modò rubra, ac interdum livida, & si multum excrescat, aliquando extra nares propendet, si verò in summis narium partibus adnascatur, aliquando ad palatum propendet, & communes oris meatus obstruit, & post uvulam faciliè conspici potest. In austruina constitutione maxime inflatur, tum etiam in plenilunio. Tempore verò aquilonio & sicciore existente tum etiam in novilunio, plurimum imminuitur. In hoc etiam à sarcomate differt, quod sarcoma magis intimis narium partibus, quæ carnosiores sunt, succrescere, polypus verò in summis ac superioribus juxta nasi radicem solet.

Utriusque tumoris causa est humor crassus, viscidus, ac pituitosus, è cerebro defluens, alicui sanguinis portioni admixtus. Aliquando humoris melancholici portio quædam



quadam admixta est, tuncque metus est, ne in cancrum degeneret. Ex superfluo tamen narium nutrimento, in carnem luxuriantem commutato, sarcoma sæpè generatur idèò curatu facilius est.

Horum affectuum diagnosi ex his quæ dicta sunt, facile intelligitur, tum ipsis oculis per se patet.

Prognosis verò ita instituenda est, ut sarcoma plerumq; facilem curationem incipiat, polypus verò admodum difficilem. Ille tamen qui mollis est, albus vel ruber, vel colore ex albo & rubro composito præditus, facilius curatur. Purus verò ac lividus, difficillimè. Et periculum est ne in cancrum degeneret. Item qui in ima aut media narium parte residet, facilius curatur, qui verò in summa parte radicatur, difficilem curationem suscipit: quoniam remedia ad eam partem vix possunt pertingere.

Uterque affectus iisdem remediis curatur, quæ ad hunc scopum redigenda sunt, ut caro superflua auferatur. Sed prius causa antecedens tollenda est, humor scilicet pituitosus à capite desluens: quod fiet victus ratione attenuante & exsiccante vacuatione universali, revulsione, derivatione, & capitis exsiccatione. Quæ omnia perficiuntur remediis, in frigida cerebri intemperiei curatione propositis cum Medici curantis prudentia usurpandis. Quamvis enim multi auctores testentur, decoctum guaiaci, cum victu exsiccante, in hoc affectu plurimum sæpè contulisse, cavendum tamen est, ne calidi humores pituitæ admixti sint; eorum enim efferatione polypus in cancrum converti tandem possit.

Postmodum verò caro superflua absumenda est causticis medicamentis, vel ferramentis idoneis abscindenda, & ulcus relictum cicatrice obducendum. In principio tamen, dum adhuc morbus recens, solis adstringentibus & valdè exsiccantibus interdum curatio obtineri potest, & perpetuo mitiora illa remedia prius tentanda sunt antequam ad vehementiora deveniatur.

Primò igitur tentandum est medicamentum compositum ex tribus generibus malorum granatorum, à Galeno propositum *lib. 3. de comp. medic. sec. loc. cap. 3.* quod sic habet: Accipiantur tria mala granata, ex tribus generibus eorum, acidis scilicet, dulcibus, & mediis, eaque matura ac recentia terantur simul in mortario. Deindè succus exprimatur, & coquantur in linimenti formam. Specillum ex lana, vel linteo confectum eo succo imbuetur, & frequenter in nares demittatur. Hoc remedium siccatur & adstringit sine morsu, & excrementitium humorem absumit.

Sequens verò aqua eundem effectum præstat efficaciter.

℞. Uvarum immaturarum ℥. iij. cortic. mali granati, balaustiorum, sumach. ana ℥. ij. Macerentur in aceto & destillentur, deindè adde aluminis ℥. j. vitrioli ℥. iij. Destillentur iterum omnia simul, & aqua illa tangantur partes internæ narium frequenter.

Si hæc non sufficiant, ad potentiora veniendum est: & aquæ prædictæ sandaracha & auripigmentum adicienda sunt.

Vel spiritus vitrioli, aut aqua separationis auri, quæ secunda vulgò nominatur, aquâ plantaginis temperanda est, iisque polypus frequenter attingendus.

Vel illinatur aqua mercuriali, in ulceris narium curatione descriptâ.

Vel immittatur turunda, succo radicis ari imbuta, & si succus acrior fuerit, aquâ plantaginis etiam temperari poterit.

Inter præcipua annumerari debet mercurius præcipitatus rubeus, qui si plurimis lotionibus dulcoretur, hyperfarcosin egregiè absumit, sine ullo, aut exiguo dolore. Ille pulvis mellis rosaceo permiscendus est, eoque intincta turunda in nares demittenda.

Emplastra etiam in hunc usum revocantur, quæ sine insigni dolore polypum absumere valent, quorum formula talis esse poterit.

℞. Massæ emplastri de mucilaginis ℥. β. pulveris fabinæ ℥. ij. Malaxentur, & incorporentur simul. Ex hac massa fiant cereoli debitæ magnitudinis, in nares immittendi. Vel

℞. Viridis æris, auripigmenti, vitrioli aluminis crudi, ana ℥. j. β. antimonii ℥. vj. Macerentur in aceto, deindè exquisitè terantur, post siccantur, eadem triturâ & maceratione octies repetitâ, deindè in aqua plantaginis denuò macerata siccantur. Postea recipe olei rosacei ℥. iv. lithargyri ℥. ij. Nutriantur & coquantur; addendo sub finem coctionis, prædicti pulveris ℥. ii. Coque in emplastrum satis glutinosum, ex quo formentur cereoli, ut supra.

In usu medicamentorum causticorum primò notandum est, ante eorum admotionem nares esse muniendas unguento refrigerante Galeni, vel nutrito vel populeo, vel ovi albumine agitato, cum oleo rosaceo, & similibus.

Secundò observandum est, medicamenta caustica ne nares lædant, per fistulam argenteam immitti posse, ita ut fistulæ extremitas polypum ambiat, atque ita medicamenta ad eum conferri possint naribus intactis.

Tertiò notandum est, dicta medicamenta decresciente luna esse usurpanda. Tunc enim tumor admodum imminuit, & ita remedia facilius ad radicem usque immitti possunt, cum tumor eorum introitum impediatur.

Denique si medicamentis polypus auferri nequeat, ad operationem chirurgicam veniendum est quæ describitur à Paulo Ægineta, Cornelio Celso, Hieronymo Fabricio ab Aquapendente, aliisque recentioribus.

### C A P U T III.

#### De Læso olfactu.

**O**lfactus, quemadmodum & reliquæ omnes corporis actiones, tribus modis læditur, imminutè, abolitè, & depravatè.

Imminuti & aboliti olfactus eadem sunt causæ, secundum magis & minus tantum differentes: intemperies scilicet, obstructio, & adstrictio.

Intemperies frigida & humida cum materia pituitosa conjuncta, ut quemlibet sensum obtundere nata est, sic olfactum imprimis imminuit, aut abolet: unde in catarrho & coryza frequens esse solet huiusmodi olfactus læsio. Frigiditas enim sensum imminuit, aut abolet, quatenus calorem nativum partis, actionum omnium opificem obtundit ac debilitat.

Obstructio ab eodem humore pituitoso producitur, qui meatuum sensiles, seu narium ductus; tum insensiles, seu poros ipsis cerebri, & processuum mammillarium replet, ut odores ad eas partes pervenire nequeant. Potest etiam fieri à sarcomate, polypo, & alia quavis causa narium meatuum replente & obturante.

Adstrictio etiam interdum potest contingere ab humore pituitoso, in anteriore cerebri parte collecto, & processus mammillares comprimente, ut de visus imminutione, à nervorum opticorum adstrictione, à nobis dictum est. A nativa etiam narium conformatione eadem adstrictio potest contingere: si nimirum illæ ita depressæ & angustæ fuerint ut liber odoribus aditus non pateat.

Depravati olfactus causa est odor pravus, nares continuo feriens, qui quidem aut ex ulcere narium exhalat, aut putrida pituita, circa nares vel os ethmoides contenta. Nam quæ ipso olfaciendi sensu aut prope hunc intra meninges putrescunt, sensum ipsum haudquaquam feriunt, nec ea laborans, sed quisvis assidens deprehendit. Ut enim quippiam odoratum feriat, oportet aliundè ad ipsum sensum deferri. Potest etiam teter ac foetidus vapor ab aliis partibus, ut ventriculo, gingivis, & cerebro ipso, ad processus mammillares exhalare, eosque ita inficere, ut omnes odores eò delati simili foetore infecti appareant, quemadmodum lingua, bile amara infecta existente, omnia quæ gustantur, sapore amaro prædita esse videntur.

Harum causarum quælibet satis faciliè dignoscetur. Frigidam intemperiem, & pituitæ redundantiam ostendunt frigida & humida cerebri intemperies & mucosa pituita è cerebro stillans.

Obstructio verò, si à pituita originem duxerit, iisdem signis



signis indicabitur. Si à sarcomate, vel polypo, ex propriis capitibus diagnosi erit desumenda.

Locus verò, in quo materia residet, obstructionem efficiens dignoscitur ex eo, quod si narium meatibus hæserit, vocis ablætio contingat, quia nares ad vocem efforandam plurimum conferunt. Si verò anteriori cerebri parti, aut processibus mammillaribus dicta materia hæserit, vox integra permaneat.

Odor pravus olfactus sensorium feriens, à qua parte ducat originem, ex proprio cujusque vitio erit dignoscendam.

Quod ad prognosin attinet: olfactus læsio recens & à simplici coryza genita, facile curatur, in vetere verò, & à confirmata intemperie proveniens difficile: quæ ex mala narium conformatione procedit, incurabilis est.

Curatio pro diversitate causarum diverso modo instituenda est. Si à frigida intemperie oriatur, ea remedia illi adhibenda sunt, quæ pro frigido catarrho proposita sunt.

Ad obstructionem verò, ab eadem pituita ductibus narium, aut processibus mammillaribus impactâ auferendam: partes illas expurgantia remedia usurpanda sunt, errhina nimirum, sternutatoria, & apophlegmatismi, quæ etiam in frigida cerebri intemperiei curatione à nobis proposita sunt.

Si denique à sarcomate aut polypo nares obstruantur, ex præcedente capite eorum curatio erit desumenda.

## CAPUT IV.

### De fœtore narium.

**N**arium fœtor, & fœtor anhelitus valdè differunt inter se. Ille enim ex naribus tantum procedit, hic verò ex variis partibus ventriculo nimirum, pulmone, gengivis, ac faucibus ulceratis, quæ vel sensu ipso, vel propriis signis discerni possunt.

At narium fœtor ex putridis vaporibus, vel in naribus ipsis genitis, ut in ozæna, sarcomate aut polypo putrefactis, vel ad nares transmissis, ex humoribus putridis in ipso cerebro, & parte illius anteriore: vel circa processus mammillares, aut os cribrosum contentis producit. Putrescunt autem humores pituitosi in dictis partibus, quando in iis præter modum retinentur præsertim si calida & humida cerebri temperies accesserit. Retinentur verò propter obstructionem earum partium, aut constrictionem nimiam ut in simis & depressioribus contingit.

Narium affectus, talem fœtorem producentes propriis signis supra propositis dignoscuntur: quorum si nullus adfuerit, ab humore putrido, in ipso cerebro, aut processibus mammillaribus, aut osse cribroso contento, gravem illum odorem pervenire conjiciendum erit.

Prognosis fœtoris narium, qui ab ulcere, polypo, aut sarcomate promanat, ex eorum prognosi dependet.

Qui verò à corruptis humoribus, in cerebri anteriori parte contentis exoritur, si recens fuerit, facile curatur; si inveteratus, incurabilis est, maximè si à mala narium conformatione, nempe simitate & depressione nimia contingat.

Curatio perficitur causarum ablatione, & symptomatica lenitione.

Ulceris, sarcomatis, & polypi curatio supra posita est. Humor verò putridus in cerebro processibus mammillaribus, aut osse ethmoide contentus, vacuantibus & abstergentibus auferendus erit.

Ac primum evacuationes universales instituendæ sunt, quæ totum corpus, & ipsum cerebrum excrementis pituitosis liberent, per apozemata, pilulas, & alia id genus. Quibus, si magna humorum saburra redundare videatur, diætâ sudorifica addi poterit. Mox errhina abstergentia, & materiam conjunctam educantia erunt administranda.

Ac primum manè & vespèri, è vola manus vinum album attrahatur, cui centaurium minus, & calamentum incoctum fuerit.

*Laz. Riverii Opera.*

Deindè betæ succus, cum aqua majorana extractus instar prædicti attrahatur. Vel

℞. Rad. cyperi & calami aromat. ana ꝑ. ss. rosar. rubr. P. j. myrrhæ 3. ij. Coquantur cum vino albo pro errhino.

Ad potentiùs pituitam ex alto eliciendam, sequens componi poterit.

℞. Rad. ireos Flor. 3. ss. ellebori albi, piperis longi, an. 3. ss. sem. anisi & majoranæ siccæ pulver. ana 3. j. euphorbii gr. j. ol. nardini, cheirini, & viol. ana quantum satis. Fiat unguentum molle, quo intincta minimi digiti extremitate fricentur nares internæ: vel turundâ, aut alio limimento, lentis magnitudine in nares immittatur.

Denique ad fœtidum odorem fallendum, suaveolentia naribus sæpè attrahenda: ut galla moschata, in vino odorato dissoluta; aqua angelica, & alia ejusmodi.

## CAPUT V.

### De Coryza.

**C**oryza, quæ & gravedo à Latinis nominatur, est catarrhi species, in qua fluxio è cerebro in nares defluit. Illa autem defluxio est humoris crudi, in anterioribus cerebri ventriculis contenti, qui à causa plerumque externa concitatur, æstu Solis nimirum, in vini potu largiori, balneo calidiori & similibus: quæ pituitam in cerebro collectam fundere ac liquare possunt. Fit etiam à causis externis cerebrum refrigerantibus; comprimitur enim tunc temporis spongiæ instar, & humorem in se contentum ad partes subjectas amandat. Tum etiam cerebri refrigeratione novus fit pituitæ proventus: illud enim caloris penuriâ malè concoquit alimentum, unde plurimi excrementi proventus, quod à facultate expultrice per vias patentes excluditur.

Effectus iste per se patet, in eo enim plurimus humor per nares excernitur.

Inter reliquas catarrhi species, quæ in nares fit, levissima & tutissima est, ac citò curatur, si recens fuerit, & à causa externa concitata. Quæ verò diuturna est, à contumaci cerebri intemperie oriunda, difficilè curatur. Tum etiam, si à calida hepatis intemperie producat, quæ non rarò catarrhos calidos & acres invehit, à quibus nares sæpè exulcerantur, aliosque affectus graves patiuntur.

Curatio hujus affectus à catarrhi curatione desumenda est. Easdem enim evacuationes, & revulsiones, & derivationes postulat. Nisi quod errhina hic usurpanda non sint, ne nimium ad partem affectam attrahant; sed apophlegmatismi & masticatoria, post universalia maximè convenient.

Ac præter dicta remedia, authores nonnulla commendant, quæ coryzæ compescendæ peculiariter conveniunt, ut vapor decocti majoranæ, naribus exceptus, vel aqua majoranæ naribus excepta. Vapor aceti, in farream laminam candentem infusi, ad id confert: idque efficacius, si in aceto rosæ rubræ priùs infundantur.

Si fluxio valdè frigida fuerit, suffitus sicci ex nigella, thure, aliisque in prunas coniectis erunt utilissimi. His enim frigida cerebri intemperies corrigitur, & superflua humiditas absimitur.

## CAPUT VI.

### De Sternutatione.

**I**cet Sternutatio in flatu sano sæpissimè contingat, & tam levis affectio ut plurimum esse soleat, ut symptomaticis nomen non mereatur; aliquando tamen adeò molesta efficitur, ut Medici curantis opem desideret. quemadmodum apud Forestum videre est, qui *observatione* 127. lib. 10. historiam proponit cujusdam ancillæ, quæ tam gravem & molestam ex catarrho acri & falso sternutationem patiebatur, ut ad plurimum Medicorum opem confugiendum fuerit. Idem confirmat vetus consuetudo sternutantibus benè precandi, quam nonnulli inde ortam existimant; quod Gregorii Magni temporibus morbus epidemicus sævierit, in quo ægrotantes sternutando moriebantur, quamvis

ff



quamvis alii antiquiorem esse illam consuetudinem asseverent.

Est igitur sternutatio cerebri motus velox, quo per nares confertim aëto spiritu molesta excernere conatur. Per cerebrum autem non solum cerebri substantiam, sed totum aggregatum ejus cum membranis intelligimus, præcipuè anterioribus, quæ in primis in hoc affectu contrahuntur. Quod ex eo licet colligere, quod dum caput attollitur, facilius sternutemus; tunc enim materia irritans, quæ ut plurimum vaporosa est, & sursum suâ naturâ fertur, facilius ad illam partem defertur.

Ille a item motus, qui sternutatione contingit, ad cerebri & membranarum facultatem expultricem naturalem spectat, juxta Galeni doctrinam 2. de sympath. caus. cap. 1. ubi distinguens sternutationem à tremore & palpitatione, dicit palpitationem à solo morbo fieri, tremorem verò à natura & morbo, sternutationem denique à sola natura.

Sibi tamen prima fronte contradicere videtur Galenus, qui cap. 4. ejusdem libri, tussim & sternutationem voluntariæ facultatis symptomata esse dicit. Nulla tamen contradictio est, seque ab ea diserte liberat Galenus, innuens, facultatem animalem in sternutamento concurrere tantum secundario, quod videlicet in sternutamento è capite & à pulmone spiritus emittatur; attamen caput pectori principium motus tradere. Cum enim quæ in naso offendunt persequi properat, utriusque emittendi spiritus viis simul utitur, altera quidem, quam ipsum per se facit; alterâ, quam per nervos, veluti per quædam longa brachia, quæ in pectus descendant: unde idem Galenus comm. Aph. 52. sect. 7. docet: antecedente inspiratione sternutamentum fieri, natura aggregante aëris copiam ad sternutationem. Tum enim aër, qui è pectore egreditur, conjunctus ei, qui per nares ad cerebrum attrahitur, quidquid narium membranarum, exquisito sensu donatis molestum est, cum impetu & sono explodit.

Ex hoc etiam Galeni loco colligitur, irritationem sternutationem excitantem, in naso potissimum fieri. Quod etiam confirmatur aliâ sententiâ, quæ habetur in comm. Aph. 51. lib. 7. ubi: *Soli*, inquit, *ex his ita affectis illi sternutant, quibus mordax est ea, quæ à capite fluit humiditas; seu & si quid mordax naribus imponas. Sicut enim tussis motus quidem naturalis est, ad expurgandas eas, quæ sunt in pulmone, asperas arterias; sic & sternutamentum manifestè videtur expurgare narium meatus.*

Verum objici potest, quod multi caput nudantes, aut alio quovis modo aëri frigido exponentes sternutamentum illic patiantur, ut videatur tunc temporis cerebrum immediatè irritari. Respondendum est, aërem frigidum esse causam sternutationis, non dum in cerebrum immediatè agit, sed quia cerebrum ejusque membranas exprimendo, in causa est, ut acris materia ad nares descendat. Quamvis igitur in hoc symptomate cerebri membranæ possint etiam irritari; non prius tamen sternutatio promovetur, quàm noxa ad narium membranam, quæ exquisitissimo sensu prædita est, pervenerit.

Causæ sternutamenti ex dictis colligi possunt, quæcunque nimirum tunicam narium internam irritare possunt, quales sunt humores, aut vapores acres, vel à cerebro delabentes, vel à partibus inferioribus transmissi. Unde in febribus interdum sternutationes consurgunt, ut ait Avicenna, quia vapores acres à toto in caput transferuntur; vel exterius in nares acris immittuntur, quemadmodum medicamentis acrimonia præditis, quæ ptarmica nominantur, sternutamentum excitamus. Hæ quidem causæ externæ sternutationem immediatè produciunt. Dantur tamen aliæ quamplurimæ, eandem mediatè efficientes, internas scilicet generando vel commovendo, quales sunt omnes aëris alterationes, ut de frigido aëre supra dictum est. Galenus lib. de instrum. odoratus, cap. 6. dicit à Solis aspectu sternutationem excitari, quia cerebri spiritus, vaporibus similes, à Sole funduntur.

Diagnosis ipsius affectus per se manifesta est. Causæ externæ ex ægri relatione patent, internæ verò ex signis partium affectarum, à quibus materia irritans ad nares & anteriorem cerebri partem transmittitur.

Quod ad prognosin attinet; hîc affectus ex se omni vacat periculo. In principio tamen catarrhi & coryzæ valdè nocet, quia humor concoquendus quiete indiget. Interdum autem in febribus adeò urget, ut vires deiciat, & fluxum sanguinis è naribus interdum excitet. Sæpè tamen nullo modo nocet, & in sanis cerebri superfluitates expellit. In ægris verò pro bono signo habetur. In febribus præcipuè malignis etiam rebus omnibus desperatis, salutem promittit. Hytericæ mulieri aut difficulter parienti, si sternutatio accadat bonum. Aph. 35. sect. 5. Medicamentis ptarmicis provocata sternutatio, apoplexiæ, aliisque gravioribus cerebri affectibus prodest. At si provocata non aeveniat, signum lethale est: naturam enim succumbere significat.

In morbis pulmonum, pleuritide præsertim, & peripneumonia, sternutatio mala est, ex Hipp. 2. progn. quia ex concussione illa sternutantis cerebri lacerantur & violenter divelluntur partes thoracicæ, unde inflammatio valdè augetur, & nulla prætereà sit materiæ morbificæ vacuatio. Ad pituitam verò in bronchiis pulmonum contentam, potenter expellendam quæ tussi rejici non poterat sternutamentum conferre docet Gal. 2. de sympt. caus. cap. 5. & 6.

Curatio quando necessaria est, dum scilicet sternutatio alia infert incommoda, perficitur primò causarum externarum amotione, si ab iis excitetur. Si verò fiat à causa interna, illa etiam auferenda est evacuantibus, revellentibus, derivantibus, & discutientibus remediis.

Si ita que calida cerebri, aut alterius partis intemperies, vapores acres ad nares & interiores cerebri meningis transmittat, venæ sectio celebranda est: mox purgatio idonea instituenda. Deindè vapores illi revellantur frictionibus & ligaturis extremorum, cucurbitulis scapulis admotis; tum reliqua revellentia, derivantia, & discutientia usurpentur; caput pectinetur, aures vellicentur, oculi confricentur, nares emungantur, spiritus cohibeatur.

Ad acrimoniam denique demulcendam & narium irritationem compescendam, utile erit aquæ repidæ vaporem naribus excipere; vel easdem oleo violaceo, rosaceo, amygdal. dulcium, aut butyro recenti illinere, vel lac tepens naribus attahere, quo solo remedio Forestus ancillam à gravi sternutatione, in principio hujus capitis proposita, confestim liberavit.

## CAPUT VII.

### De Hæmorrhagia narium.

**H**æmorrhagiæ nomen quemlibet sanguinis fluxum à quacunque parte profluentis, vulgò significat. Peculiariter tamen quando simpliciter absque ulla partis affectæ mentione enuntiatur ab Hippocrate, id tantum profluvium significat, quod è naribus fit tanquam speciem primariam & evidentissimam, ut annotavit Galenus comm. 1. in epid.

Est autem hæmorrhagia narium symptoma in excretis eorum, quæ sunt toto genere præter naturam. Sanguis autem per nares effluens, aut è venis & arteriis, cerebri basim perreptantibus effunditur, aut è valis è palato ad nares descendentibus, quæ sunt instar venarum hæmorrhoidalium in ano & utero.

Cum verò omne symptoma pendeat à morbo tanquam à causa proxima & immediata: hujus causa erit morbus organicus, vel communis. Organicus duplex est, vasorum apertio, quæ ἀνεύρωσις Græcis dicitur, & rarefactio, διασπῆσις appellata. Communis etiam duplex: eorundem vasorum ruptio, quæ ρήξις nominatur: & erosio, διάβρωσις appellata.

Causæ illos morbos immediatè producentes sunt, sanguinis quantitas vel qualitas, excedens. Sanguis quantitate peccans, venas rumpere, aut orificia illarum aperire potis est; idem verò qualitate peccans, si nimirum calidior tenuiorque sit, per anastomosin effluere potest, quia calor orificia dilatat, & tenuitas efficit, ut facilius effluere possit. Eadē qualitates diapedesin etiam efficiunt. Calor enim rare



rare facit tunica vasorum : & sanguinis tenuitas efficit , ut per poros earum tunicarum transfluere possit. Sanguinis denique acrimonia venarum tunicas erodit & exulcerat , & diabrosim parit.

Causæ etiam externæ ad horum morborum productionem concurrunt mediâtè, vel immediâtè. Immediâtè id præstant casus, ictus, vulnus, & alia id genus, quæ venas rumpere, aut dividere valent. Mediâtè verò operantur quæcumque sanguinem multiplicare, calefacere, aut attenuare possunt, ut victus plenior, crapula, otium, aut exercitia nimia, magnus clamor, æstus, longa in sole mora, & alia quamplurima.

Hæmorrhagiæ differentiæ ex eo desumuntur, quod alia critica sit, alia symptomatrica. Critica fit in febribus acutis vi naturæ, causam morbificam per has vias expellere conantis præsertim in iis, quæ visceris alicujus inflammatione conjunctæ sunt; ac in primis hepatis & lienis, quæ per has vias sæpissimè solvuntur. Fit etiam interdum sine febre, naturâ sese à superfluo sanguine exonerante; unde vidimus quamplurimos ætate juvenili periodicam hæmorrhagiam pati; alios etiam per alias vias sanguinem utiliter effundere.

Symptomatrica verò in morbis chronicis præcipuè contingit, in quibus sanguis vitiosus ab hepate debili, & insigni aliqua intemperie laborante producitur, qui vel ob retentricis facultatis imbecillitatem, per venas illas effluit, vel ab expultrice rejicitur, tanquam onus inutile, cum sanguis impurus & vitiosus corpori alendo idoneus non sit.

Cognoscitur per seipsam hæmorrhagia. Causæ verò illius hoc modo distinguuntur. Ea quidem quæ fit per *ἀναστόμωσιν* hoc habet commune cum ea, quæ per *ῥήξιν*; quod in utraque sanguis copiosè fluat. Sed in eo distinguuntur, quod si præcesserit ictus, vel casus, *ῥήξιν* potius adesse conjiciendum sit. Cum autem à plethora & sanguinis multitudine ruptio & apertio vasorum possit contingere; ita distingui possunt quod rupto vase sanguis continuè effluat; aperto verò, tantum per intervalla, quia vasorum orificia constringi solent, quando humoris copia dilatans ad ea minùs confluit. Vasa autem rupta semper aperta manent; & idèò sanguis continuè effluit, donec solutio continui in iis facta iterum uniatur. Præterea distinguitur apertio vasorum à ruptione, ex ipsius sanguinis substantia. Si enim tenuis sit, ab apertis vasis potius; si crassus, à disruptis emanat. Hinc fit, ut hæmorrhagia plerumque in juvenibus à vasorum apertione fiat, quia sanguinem habent tenuiorem: in senibus verò à ruptione, quia crassiorem obtinuerunt.

Si à venarum erosione fiat hæmorrhagia, adsunt signa cacochymiae ulcerisve, & pus aut sanies interdum egreditur aut saltem catarrhus falsus præcessit. Si per *διαπύρσιν* effluat sanguis, ille tenuis est, & admodum paucus.

Causæ verò antecedentes & externæ faciliè distinguuntur. Si enim à copia sanguinis hæmorrhagia contingat, adest rubor in facie, & tensio venarum: tum etiam præcessit victus largior & calidior, aut causa aliqua externa fundens & attenuans sanguinem: hæc autem præcipuè contingunt iis, qui calidiori hepate præditi sunt.

Si à cacochymia affectus proveniat, illa propriis signis distinguetur, quæ bilem, aut melancholiam redundantem ostendunt. Præterea sanguis effluens, aut per venam brachii detractus, corruptus, aut pravâ qualitate infectus apparebit.

Si a retenticis facultatis imbecillitate hæmorrhagia contingat, pallidus faciei color, & totius corporis debilitas apparet; tum etiam affectus aliquis præcessit, à quo hepar in primis debilitatum est, ac denique sanguis paucus & per intervalla effluit.

Si sanguis è venis narium immediâtè effluat, adstringentibus remediis, naribus admotis, faciliè sedatur, & nullibi capitis dolor percipitur. Contra verò si à cerebro profluat, in aliqua capitis parte determinata dolor percipitur, fluxus difficilè sedatur, & naso imposita nihil conferunt. Ab aliis etiam partibus sanguis interdum profluit, ut hepate, liene, utero, quarum indicia dabunt dolores & tensiones circa easdem partes.

*Laz. Riverii Opera.*

Si sanguis fluat ab arteria, cum impetu egreditur calidus est, purus, floridus & rutilans: ex vena verò, rubeus, in fuscum tendens, crassus interdum impurus, & cum parvo impetu egreditur.

Prognosis imminens hæmorrhagiæ præcipuè critica, ab actionibus lætis, excrementis & qualitibus mutatis desumitur; sicque futuram hæmorrhagiam indicant insomnia, & imagines rerum rubrarum; capitis & cervicis dolor subinde ortus, temporum gravitas & pulsatio magna in arteriis illorum; tinnitus, vel sonitus aurium, oculorum hebetudo, & marmariges illis observantes, ruboreorundem, ac totius ferè faciei; lucis aversio lachrymæ involuntariæ, pruritus nasi, sanguinis stilla die indice, spirandi difficultas tensio hypochondriorum sine dolore.

Quorum signorum ratio talis est. Quando sanguis ad caput deferri incipit, parit in cerebro phantasmata rerum rubrarum, tum per insomnia, tum etiam inter vigiliandum, ut juveni Romano contigit cujus mentionem facit Gal. lib. de præfagitione ad Posthum. cap. 12. Is enim morbo acuto laborans; rubrum serpentem ad cubiculi laquearia oberrantem videre visus est, quo perterritus, è lecto subinde exiit. Unde Gal. adventantem hæmorrhagiam prædixit, & sanguinis missionem impedivit, quam alii Medici præscripserant. Dolor capitis & cervicis ex eadem sanguinis translatione ad partes superiores exoritur; qui membranas divellens distendensque, doloris sensum parit. Tinnitus autem arteriæ temporum extraordinario motu, propter earum compressionem: quæ à venarum repletionem fit; Aurium tinnitus fit ex vaporibus ad cerebrum magna copia tendentibus. Visus hebetudo fit, quia copiosi & crassi vapores, ad superiora elati, meatus obstruunt: unde fit, ut denegato aditu spiritui animali, hebescat visus. Marmariges oculis obversantes, nihil aliud sunt, quam tenuia quædam, & divulsa corpuscula variorum colorum, intra corneam tunicam & crystalloidem contenta, ex vaporibus sursum elatis producta, quæ licet interiùs sint, exteriùs tamen posita, deceptione visus apparent, quandoquidem oculus, externæ assuetus visioni, quæcumque intus sunt, extra esse judicat. Rubor faciei & oculorum à sanguine fit; qui majori copiâ ad illas partes cumulat. Lucis aversio ex eo proficiscitur, quod distenti oculi humorum copiâ, ex nimia luce magis distendantur, quia lux disgregat spiritus, unde oculi dilatatio, ex qua dolor consequitur, quem ut evitent ægrotantes, lucem fugiunt. Lachrymæ involuntariæ fiunt ex repletionem oculorum, & partium adjacentium, quæ præter modum distentæ, comprimunt glandulas illas humorem continentes, ex quo lachrymæ generantur. Pruritus narium fit ex vaporibus sursum ascendentibus, & nares vellicantibus. Sanguinis stilla, die indice apparens, verbi gratia quarto vel undecimo, ostendit futuram hæmorrhagiam die judicatorio, nempe septimo, vel decimo quarto: quia diebus indicibus natura incipit transferre humores ad eas partes. Difficilis redditur respiratio, quia dum sanguis ad superiora transfertur, diaphragma comprimit. Tensio denique hypochondriorum fit, quia sanguis in suo fonte & radicibus venarum moveri incipit, sed fugax est ea distensio & sine dolore, quemadmodum & difficilis respiratio; si enim diutius & contumaciter perseverarent, signa essent potius hepatis inflammati.

Præsentis verò hæmorrhagiæ prognosis ita instituentur da est.

Sanguis è naribus die critico moderatâ quantitate fluens, salutaris. Quamvis hæc sententia à Galeno sæpiùs inculcata sit, illi tamen Fernelius reluctatur lib. 2. de sanguinis missione, cap. 1. dicens: nullum sanguinis profluvium, licet criticum, salubre esse. Quoniam licet deliria, vigilias, capitis dolorem, & reliqua symptomata demulceat, vix tamen morbum penitus evellit, quia sanguinis portio purior emittitur, impuriori remanente. Idque ex eo probatur, quod sanguis ex nare profluens, colore & substantiâ laudabilis appareat, cum sanguis eodem tempore vena detractus, impurus & corruptus appareat.

Speciosa quidem est hæc Fernelii doctrina, non tamen



absolutè recipienda. Verum quidem est, in plurimis morbis acutis, præcipuè verò in febribus malignis, hæmorrhagiam sæpè morbum penitus non solvere, quemadmodum nec sudores in iisdem febribus perpetuò salutares sunt, quia tales evacuationes à natura irritata ante tempus, materiæ morbificæ malitiâ plerumque fiunt. Attamen non raro morbi acuti hæmorrhagiâ solvuntur: ut docuit Gal. *lib. 3. de cris. cap. ultimo*, & passim alibi. Quod autem sanguis per nares excretus, purus semper appareat, ratio inde desumitur, quòd nimirum ille guttatim effluat, sicque statim refrigeretur, ut partes impuræ separari nequeant, & illæ puriores partes, reliquis permixtæ, rubrum colorem toti massæ concilient. Sanguis verò è brachio detractus, quia affatim effluit, calorem in vasculo diu retinet à quo partes impuræ separantur, ita ut crassa & sæculenta fundum petat, biliosa verò & pituitosa, quæ magis alterata & impurior est, supernatet: & ita sanguis impurus ac sordidus appareat. Contra verò, si sanguis è brachio guttatim effluat, purus apparebit, quia citò concrefcit, antequam partes heterogeneæ à calore secerni potuerunt. Imò verò sanguis copiosè effluens, si in pelvi latiore recipiatur, purus etiam apparet, quia citò refrigeratur.

Hæmorrhagiæ nimis copiosæ & vehementes, pessimæ: nam ad convulsionem deferunt. Fit enim aliquando, ut natura copiâ sanguinis gravata, & ad excretionem concitata, modum tenere nequeat, & supercrisin efficiat, quam Medici sæpè cohibere coguntur.

Hæmorrhagia in principio morbi mala, quia symptomatice est, & fit, natura ante tempus irritata ad excretionem, à materiæ morbificæ malitiâ.

Hæmorrhagia, quæ è directo partis affectæ incidit, bona, contra verò, mala. Sic in hepatis inflammatione, sanguis effluens è nare dextra, bonus: è sinistra verò, malus. Contra, liene inflammato, è sinistra bonus; è dextra verò, malus; quia omnis bona evacuatio *NOTA 184* debet fieri.

Stillæ Sanguinis paucæ per nares effluentes, malæ: Significant enim naturæ imbecillitatem & malignitatem morbi. Omnis siquidem excretio in morbis acutis, quæ inchoatur tantum, & non perficitur, maximè damnatur ab Hipp. quia major est securitas in febribus, in quibus natura nihil excernit, quàm in quibus pauca & inutilia, siquidem concoctioni esse intentam tunc temporis arguitur. Quòd si stilla appareat, signum est, ante tempus naturam irritari. Stilla tamen die indice prodiens signis concoctionis utcumque apparentibus, futuram crisin per hæmorrhagiam die critico significat.

Hæmorrhagiæ longo tempore perdurantes, hepatis imbecillitatem & refrigerationem, & inde cachexiam atque hydropem portendunt.

Quibus in febribus quartanis sanguis è naribus fluxerit, pravum, Hipp. *Aph. 87. sect. 7.* quia, ut docet Avic. sanguinis fluxus in melancholicis & pituitosis noxius, ab eo enim magis refrigerantur.

Quibus febricitantibus sanguinis fluxerit multitudo, quacumque ex parte, cum reficiuntur, alvi iis humectantur, Hipp. *Aph. 17. sect. 4.* quia ut docet Gal. *in comm.* calore nativo debilitato ex profluvio sanguinis, neque cibi benè concoqui, neque in sanguinem transmutari, neque distribui possunt per corpus. Et propterea alvos fieri humidiores par est, donec processu temporis vires suas naturam recuperarit.

In hæmorrhagiæ curatione, primùm advertendum est, an illa critica sit, vel symptomatice. Critica enim cohibenda non est: sed ad insignem quantitatem sanguis fluere permittendus. Ait enim Avicenna, sanguinem è naribus interdum criticâ expulsionem ad libras quatuor sine virium insigni lapsu profluisse. Idque videtur desumptum è Gal. qui *lib. de præcog. ad Posth. cap. 13.* juveni Romano, hæmorrhagia correpto, sanguinem fluere permisit ad libras quatuor cum dimidia, priusquàm remedia fluxum cohibentia usurparet.

Quod quidem, ut in valdè plethoricis corporibus aliquando utiliter contingere; ita in aliis vitæ periculum inferre potest. Et certum est, criticam hæmorrhagiam, quantumvis operâ naturæ fiat, modum non raro excedere.

Natura siquidem sanguinis multitudine gravata, & ad illius expulsionem excitata, modum aliquando tenere non potest, nimiamque evacuationem facit, unde maximam virium dejectionem, & mortem metuere oportet: & tunc cohibenda est, quoties nimirum ex ea notabilis virium infirmitas prodierit.

Sic etiam sanguis, qui sine febre, ex consuetudine fluit, cohibendus non est; sed naturæ arbitrio relinquendus, nisi immoderatio fuerit. Multi enim per huiusmodi hæmorrhagias periodicas, à gravissimis morbis immunes fiunt, in quos earum suppressione incidere consueverunt.

Symptomatice verò hæmorrhagia cohibenda est. Quod fiet sanguinem ad nares confluentem revellendo, ab iisdem, & vicinis partibus repellendo, venas apertas occludendo, sanguinis motum præposterum inhibendo, & humores acriores, aut tenuiores sanguini permixtos, hæmorrhagiæ causas præcipuas, evacuando, corrigendo, eorumque generationem prohibendo, & facultatem retentricem hepatis & venarum roborando. Quæ omnia sequentibus præsidiiis præstari poterunt.

Ac primùm sanguinis missio inter revulsoria remedia principem locum obtinet, quæ maturè celebranda est, antequam vires admodum debiles evaserint, idque è vena brachii è directo partis, à qua sanguis profluit, dextri nimirum, si è nare dextra; vel sinistri, si è sinistra sanguis emanaverit. Et Gal. *lib. de sang. miss. cap. 11.* huius remediï efficaciam confirmat, asserens se validas sanguinis è naribus fluxiones repente venæ sectione sedasse. Debet autem detrahi sanguis, & satis largâ manu, si vires ferant, & amplo foramine: Quamvis maxima Medicorum, tum antiquorum, tum neotericorum pars aliter censeat, qui angusto foramine, & exigua quantitate sæpius repetitâ, sanguinem detrahendum esse censeat, sicque revulsionem melius fieri. Nam ut sanguini motus contrarius concilietur, vehementiori motu agitandus est, siquidem motus vehementior debiliorem rapit. Ideò quo ampliori foramine, & magis confertim sanguis effluit per venam sectam, eò promptius è naribus profluentem sanguinem abducit, ita ut non raro hæmorrhagia vehemens, phlebotomiâ hoc modo celebratâ, sine plethora in instanti fuerit cohibita. Attamen si unica phlebotomiâ, aliisque remediis inferiùs describendis hæmorrhagia cohibita non sit; illa reiterari poterit pro virium modulo. Tum etiam vena pedis secari poterit, ut revulsio fiat ad distantissima, quæ etiam sæpè plurimum confert, ut testantur Avicenna, Paulus, & Trallianus.

Post venæ sectionem, vel etiam ante ipsam, sient frictions & ligaturæ partium extremarum, & cucurbitulæ satis magna hypochondrio admovenda: dextro, si à nare dextra; sinistro vero, si è sinistra sanguis profluxerit. Galenus enim hæmorrhagiam cohibuit in juvene Romano, cucurbitula hypochondrio admota, sine venæ sectione, ut ipse refert *lib. de præcognitione ad Posthumum cap. 13.*

Non est tamen usquequaque tuta cucurbitularum applicatio hypochondriorum regioni. Sanguis enim tunc temporis affervescens ad hepar, aut lienem nimia copiâ attrahi potest, & inflammationem in iis partibus efficere. Cujus rei exemplum habetur apud Fabricium Hildanum *obs. 47. cent. 2.* de quodam aulico, maxima hæmorrhagia narium laborante, cui præter alia remedia, cucurbitulæ magnæ ad regionem hepatis admotæ sunt. Sanguis quidem sublevis; sed inflammatio hepatis sequuta fuit. Cautè igitur agendum est in cucurbitularum admotione regione hypochondriorum, & ad eam confugiendum non est, nisi reliquis remediis non conferentibus & post iteratas phlebotomias. Copia enim sanguinis in venis imminuta, minus est periculum, ne sanguis nimia copia ad hepar attrahatur, ut inflammationem excitare valeat. Attamen quocumque modo applicentur cucurbitulæ hypochondriorum regioni, sanguinem, & spiritus attrahunt ad illas partes, & sic calorem earum augent; quod adversari videtur sententiæ Hippocratis *Aph. 13. sect. 5.* ubi in his, unde sanguis fluit, aut fluxurus est frigidis utendum esse



esse præcipit. Interpretes autem volunt ad ea loca frigida esse admovenda, unde motus sanguinis incipit, qualia sunt hepar & lien.

Forestus commendat cucurbitulas supra pedes, insigni experimento, quod habetur *obs. 14. lib. 13.* his verbis: *Vir generosus sanguinis narium profluvio cum extremè laboraret, neque remedia commodè adhibita juvarent, circiter duodecim libræ sanguinis ex utraque nare per vices effluxere, Cum ad eum accitus essem, & per integrum diem sanguis effluxisset, ut duas ventosas absque scarificatione, unam supra hepatis regionem, alteram supra lienis locum poneret, mandavi: quibus parum videbatur fluxus subsistere. Verum post meum discessum, uxor cum videret sanguinem iterum ex utraque nare cum impetu erumpere, & quod ventosæ hypochondriis adhibita nullo modo juvarent, alias duas, unam supra pedem dextrum, alteram supra signistrum affigi jussi, dictu mirum, sanguis præter spem subito restrictus est. Verum cum aliquo tempore ventosæ cuti adhererent, æger in animi deliquium incidit, quare iisdem ventosis detractis, aqua in faciem conspersa excitatus est; mox odore vini recreatus ad se rediit, & à fluxu sanguinis narium, miraculi aut incantamenti instar, præter omnium spem pristinae sanitati restitutus est.*

Cucurbitulæ etiam scapulis admotæ, tum siccæ, tum humidæ, fluentem sanguinem è naribus retrahunt. Attamen non est usquequaque tutum remedium. Possunt enim à partibus inferioribus ad superiores sanguinem attrahere, & novo fluxui occasionem præbere.

Quidam practici cucurbitulas brachiis admovent supra musculum bicipitem, quibus etiam sanguis ad nares profluens revellitur.

Crato in consiliis, inter revulsoria remedia proponit incurvationem digiti minimi, in dextra manu, si ex dextra nare fluit, vel in sinistra, si è sinistra. Cum enim vehemens illa compressio intensum dolorem pariat, ab illo dolore sanguinis retractio fieri potest.

Sed multò potentius sanguis & spiritus ad interiora retrahuntur per animi deliquium, cujus interventu contumacissimam hæmorrhagiam curatam vidimus in Illustrissimo Episcopo Lodovensi, anno 1629. qui febre maligna laborans, cum renis dextri inflammatione, qui postmodum in abscessum abiit, die 7. morbi, tam vehementi correptus est hæmorrhagia, ut intra quatuor horas sanguinis libras duas excreverit. Sed cum adhuc sanguis affatim afflueret, viresque collaberentur, de hæmorrhagia cohibenda cogitandum fuit, & in hunc finem multa remedia usurpata. Quibus nihil proficientibus, æger se alvum deponere velle dixit, nec potuit cogi, ut in lecto deiceret. Præmonuimus, si è lecto surgeret cum tanta virium exsolutione, fore ut in syncopem rueret, eam tamen syncopem cohibendæ hæmorrhagiæ futuram esse perutilem. Ita ferè successit, nam postquam surrexisset, animi deliquium passus, à quo statim excitatus est vino exhibitio, & aqua frigida in faciem projecta, postea copiosè deiecit, & postquam in lectum delatus fuisset, sanguis multo minori impetu fluebat, & exhibitio sale prunellæ ad 3. j. ʒ. in aqua frigida dissoluto, statim sanguinis fluxus omninò fuit cohibitus; cum tamen antea idem remedium & quamplurima alia frustra in usum revocata fuissent.

Quamvis autem animi deliquium à vulgaribus practicis inter hæmorrhagiæ remedia non vulgatur, habetur tamen apud Hipp. *lib. 5. Epid. sect. 1.* his verbis: *Sanguinis venarum suppressiones faciunt, animi deliquium, figura alterata, interceptio, linamentum intortum, appositio, deliquatio.* Idem quoque docuit Gal. 3. *meth. cap. 5.* his verbis: *Porro sanguis confluere prohibetur, & propter animi deliquium, & cum ad contraria revellitur, & cum ad vicina derivatur, & per refrigerationem tum corporis totius, cum verò præcipue ipsius partis afflicte.* Notandum tamen est; animi deliquium tantum convenire, quando sanguis affluit è venis, quæ ad corporis superficiem destinunt, quod innuit Hipp. dum eidem linamenta, deligationes, & alia ejusmodi præscribit. Quando enim sanguis è partibus interioribus profluit, ut in hæmoptoe; mensium fluxu immodico ut vulneribus partium interiorum, tunc animi deliquium

fluxum augere potest, reuacto calore ad interiora, & ad eas partes à quibus sanguis profluit.

Zacutus Lusitanus, *præcis admirandæ, observ. 66.* refert se deſeratam hæmorrhagiam, & nullis aliis remediis cedentem apposto cauterio actuali in utraque planta pedum cohibuisse. Quod remedium similem successum habuisse refert in magna sanguinis excretionem per os, ex venæ raninæ apertione producta, quæ ab acri catarrho erosa fuerat, & cum per biduum sanguis ad libras viginti effluxisset, multaque emplastica, & astringentia parti admotâ fuissent, revellentia & inraffantia remedia, tum etiam narcotica usurpata cauterio in eadem pedis parte indito, fluxus omninò cessavit.

Revulsionibus prædictis aliquandiu usurpatis si fluxus nihilominus perseveret, ad ea remedia veniendum, quæ fluentem sanguinem repellunt, qualia sunt ea quæ anacolle mata vulgè nominantur, fronti & temporibus applicanda quæ in hunc modum componi poterunt.

4. Boharmenæ, terræ sigill. sanguinis dracon. thuris, mastiches, & aloës, ana 3. j. farinæ volatilis, & pilor. leporis minutim iucif. ana 3. ʒ. albumen ovi num. j. succi plantag. & solani ana q. s. fiat cataplasma fronti & temporibus applicandum.

In casu urgente promptissimè parari potest cataplasma ex bolo armeno solo, cum albumine ovi & aceto subacta, fronti ac temporibus appositum.

Efficacissimum etiam paratur cataplasma ex gypso cum aceto subcto, & ad crassitiem duorum digitorum fronti & temporibus admoto. Et si prima applicatio non succedat, iterabitur, & certò curare creditur.

Amatus Lusitanus laudat pileum ex dictis astringentibus cum oxycrato subactis, capiti raso appositum, quod in summa necessitate tentari poterit.

Fotus etiam fieri potest ex aqua valdè frigida, vel oxycrato fronti & temporibus, cum linteis frequenter immutatis, quamprimùm scilicet caleſcieri incipiunt. Vel idem fotus fieri potest ex succo plantag. polygoni, equiseti, bursæ pastoris, & similibus, addito aceto ad penetrationem.

Ubi notandum, caput non esse aquâ frigidâ perfundendum, neque repellentia fronti admovenda, donec revulsiones sufficientes præcesserunt; alioqui sanguis per refrigerantia intrò compulsus, venas quæ in alto sunt replebit, ut docet Galen. 5. *meth. cap. 6.* atque ita fluxus sanguinis augebitur, calore aucto per antiperistasmum, à quo sanguinis motus & impetus adjuvatur, aut si sanguis retineatur, convulsio, apoplexia, dyspnœa, aut alius quispian gravis affectus excitari poterit.

Solum etiam acetum sanguinem fluentem cohiberi potest, si eo frons cum spongia foveatur.

Eadem spongia aceto imbuta, & in nares immissa ad idem est efficax.

Conspersio faciei aquâ frigidâ, non solum repellit sanguinem fluentem, sed etiam euudem retrahit ad interiora interventu timoris, qui ex aqua frigida in faciem ex improviso injecta oritur. Quemadmodum enim syncope, ut antea dictum est, fluxum sanguinis cohibet, propter caloris retractionem ad interiora, eadem ratione timor, à quo similis retractio potest conducere.

Atque ita, quocumque modo excitetur, conferre potest.

Aqua autem frigida, satis magna copia in faciem conjici debet, nempè ad duos, vel tres cyatos per brevia intervalla projectos.

Vulgò etiam usurpatur ad sanguinis impetum ad superiora retundendum, illiusque ascensum prohibendum, fotus cervicis, ex linteo aceto frigido imbutio, quod collo circumducere debet, & frequenter immutari, antequam incalescat.

Idem oxycratam in ore detentum, & sæpè immutatam, sanguinem etiam ad partes superiores confluentem repellit, tum etiam impedit, ne sanguis è naribus ad gulam defluat, quod sæpè contingit.

Ad idem valet acetum instillatum in aurem, quæ nari fluenti vicina est, sic enim vena per quam fluit sanguis, refringitur.



Faba, aut numisma argenteum radici narium inter cilia admotum, & fascia recte alligatum, ut fortiter partem comprimat, eundem fluxum cohibet. Tum etiam animadvertendum est, an in temporibus, aut fronte venæ aut arteriæ tumeant: tunc enim eas numismate aliquo, aut fabâ sicca per medium in longitudinem sectâ comprimere, fascia interveniente, optimum & supremum remedium est. Et ad maiorem compressionem supra fabam aut numisma, albumem ovi concussam, adjecto gypso & flupa exceptum admoventum est.

Vapor aceti, in laminam candentem affusi, naribus exceptus venas apertas constringit.

Ad idem confert oxycratum naribus frequenter attractum.

Præter repellentia dicta, in usum revocanda sunt, quæ ipsas venas apertas occludere & conglutinare solent. In quem finem multa remedia in nares immitti consueverunt.

Galenus *lib. de paratu facilibus*, c. 13. thus & aloë in pulverem redacta albumine ovi excipit, & cum linteolo, aspersis prius pilis leporinis, in nares immittit.

Vel turunda in hunc modum parari potest.

℞. Thuris, aloës, sanguin. dracon. farinæ volatilis, telæ aranearum, & pilorum leporinorum minutim incisorum ana 3. β. Excipiantur succo plant. & gossypio fiantque turundæ in nares frequenter immittendæ.

Idem pulveres in nares insufflari poterunt. Cui etiam usui maximè conferre testantur practici magni nominis, cinerem testarum, ovorum & chartarum. Verùm, circa horum pulverum usum, observandum est, dum illi administrantur, os aqua frigida plenum esse debere; ne medicamentum ad os per palatum transferatur.

Potenter etiam sanguinem fluentem cohibet gossypium atramento infectum, quod in thecis scriptoriis asservari solet, si aliquantulum expressum, & in turundæ figuram efformatum in nares immittatur.

Idem gossypium atramento imbutum, & fronti admotum cum fascia, fluentem sanguinem potenter sistit.

Tandem hæmorrhagiâ prædictis remediis, tum etiam infra proponendis pertinaciter obistente, ad escharotica veniendum est, quæ venarum extremitates apertas comburendo crustam inducunt, & sanguinem inhibent. In iis tamen magna cautio adhibenda est, quia dum eschara decedit, vasorum apertio plerumque renovatur, & sic fluxus redintegrari solet.

Inter escharotica autem principium obtinet vitriolum ustum, quod præterquam quod escharam inducit, ad quemvis sanguinis fluxum cohibendum est efficacissimum.

Si mitius remedium habere desideres, vitriolum aliis permiscendum est, in hunc modum.

℞. Gallarum lb. β. aluminis quartarium j. Comburantur, & calcinentur, fiatque pulvis in naribus profundum demittendus. Vel

℞. Boli armænæ, sang. dracon. thuris, aloës, gipsi, vitrioli usti; sarcocollæ, mastiches, an. 3. j. Fiat pulvis subtilissimus.

Vitriolum album mitius operatur, quàm vitriolum ustum, neque valdè escharoticum est, hæmorrhagiam tamen potenter cohibet, orificia venarum constringendo, si in nares cum turunda ex gossypio confecta immittatur.

Remedia verò, quæ sanguinis motum cohibendo, refrigerando, incrassando, & veluti coagulando, hæmorrhagiam cohibent, in hunc modum præscribi possunt.

℞. Salis prunellæ 3. j. trochiscorum de carabe 3. β. lapidis hæmatitis, coralli rubri præparati; an. 3. j. syrupi de rosis siccis 3. j. aquæ plantag. 3iij. fiat julep. qui detur bis, aut ter in die.

℞. Conservæ rosarum & mivæ cydoniorum. ana 3. j. trochiscor. de spodio & de terra sigillata, an. j. coralli præparati & cornu cervi usti, ad 3. j. Fiat opiata de qua capiat ad magnitudinem castaneæ bis, aut ter in die.

Oxycr. tam satis copiosè sumptum hæmorrhagiam efficaciter sedat.

Exterius verò, ad sanguinem refrigerandum, illiusque

motum cohibendum, aqua frigida, vel oxycratum variis partibus applicanda sunt: sicque aqua frigida brachiis affundenda, pedes in aquam frigidam immergendi, testes oxycrato frigido fovendi, tum etiam sursum, propterea quod vena cava eam regionem occupat, & ita sanguis in ea fervens refrigeratur.

In maximo autem fervore sanguinis qui prædictis cohiberi nequit, quidam practici totum corpus oxycrato irrigant, vel in balneum frigidum demittunt, quod tamen, jam debili ægro existente, periculo non vacat.

Optimum etiam est hepar & lienem epithemate refrigerante, vel etiam oxycrato tepido fovere, ad sanguinis ebullientis fervorem temperandum.

Denique in contumacissimo affectu, & aliis remediis non cedente, ad narcotica veniendum est, quæ omnem tum fluxionem, tum evacuationem, & quemcumque humoris motum citissimè cohibent, & inter cætera laudandum ad gr. iij. vel iiij. exhibitum, principem locum obtinet.

Cavendum tamen est, ne ægro valdè debili exhibeatur, periculum enim est ne calor nativus admodum debilis, narcoticâ vi omninò suffocetur.

Syrupus de papavere idem præstare poterit ad 3j. in julepo adstringente, horâ somni exhibitus.

Tandem specifica remedia, quæ scilicet proprietate occulta sanguinem fluentem cohibent, multa ab autoribus proponuntur, quorum præcipua & frequenti usu comprobata sunt quæ sequuntur.

Succus urticæ miris laudibus effertur ad quemlibet sanguinis fluxum ex quacumque parte prodeuntem, maximâ efficacîâ cohibendum; & idè tum per os exhibetur ad 3. iiij. semel atque iterum; tum per nares attrahitur; tum fronti & temporibus admovetur, in formam cataplasmatis cum farina subactus, vel tota urtica contusa dictis partibus admovetur. Nonnulli asserunt radicem urticæ in ore detentam sanguinis fluxum statim constringere.

Fimus porcinus inter præstantissima specifica etiam recensetur, si adhuc calens fronti & temporibus admoveatur vel olfaciendus præbeatur, vel siccus in nares immittatur. Posterioris formula talis esse poterit.

℞. Stercoris porcini exsiccati 3. iiij. pulveris rosac. ad foetorem auferendum 3. β. Excipiantur succo plantag. in eoque intingatur bombax in nares immittendus.

Laudatur etiam ab autoribus stercus asininum eodem modo usurpatum, ut de porcino diximus. Et narrat Rodericus à Castro *lib. 1. de morbis mulierum*, cap. 5. Medicum quendam septuagenarium, hæmorrhagiæ maximè obnoxium, stercus asininum modicè exsiccatum in capsula semper gestare solitum, cui medicamento nullum aliud simile se reperisse referebat, præsertim si succo urticæ commixtum, & si siccum, aut recens per se naribus adhibeatur.

Zacutus Lusitanus *lib. ult. praxis Historiarum*, c. 2. stupendam narium hæmorrhagiam, septuagenario excarni & debili, se hoc remedio curasse refert, cui reliqua remedia frustra administrata fuerant, & septendecim sanguinis libræ effluerant. Stercus itaque asininum in exactissimum lavorem redactum omni juri potuque permiscebat, ex eodem tabellas cum saccharo efformabat; ægroque edendas præbebat cum aqua chalybeata; quo auxilio solo septem dierum spatio æger à fluxu salvus evasit.

Sanguis per nares effluens non solum apud vulgus commendatur, sed etiam à quibusdam Medicis præstantissimis probatur, tanquàm specificâ vi hæmorrhagiam cohibens, eumque frigunt in sartagine, ægroque inscio eundem exhibent. Tum etiam olla figulinâ exustum & in pulverem redactum, cataplasmatis adstringentibus supra propositis admiscunt.

Alii laudant pulverem limacum cum crusta combustorum, alii pulverem ranarum etiam combustarum, in nares immisum. Alii Comp. Sperniol. Crollii.

Refert Peteda vetulam quandam Monspeffulanam, sola menthâ naribus imposita, sanguinis profluvium è naribus trium dierum curavisse.

Inter



Inter cætera autem remedia præstantissimum est, & nobis frequenti usu expertum, spica nardi in tenuissimum pulverem redacta, & ad 3. j. cum jusculo, aquâ plantaginis, aut alio liquore exhibita, non solum enim specificâ vi, sed etiam hepar roborando, sanguinis fluxum cohibet.

Finkius testatur, bufonem exsiccatum, pulverisatum in sindone rubra, axillis suppositum, vel manibus retentum ut incalescat, sanguinem statim figere, eumque velut Gorgonis conspecto capite statim rigescere. Alii bufonem sub dio suspendunt, donec caro universa absumpta sit, os femoris denudatum servant, idque nari inditum, hæmorrhagiam in instanti cohibere asserunt.

Dum remedia prædicta in usum revocantur, de omni-modâ causæ ablatione cogitandum est, quæ ut plurimum esse solet humor tenuis, serosus, aut biliosus in sanguine redundans, eique motum præposterum concilians, naturamque ad illius excretionem irritans, unde fit ut humore illo evacuato, sanguine repurgato, natura eum tanquam amicissimum, & familiarissimum, ac vitæ thesaurum retineat, neque amplius excernat. Ideo purgatio instituenda est, bis terve iterata, si opus fuerit, ex purgantibus adstringentibus præditis, & refrigerantibus composita, in hunc aut similem modum.

℞. Tamarindor. 3. ℞. fol. plantag. M. j. Coquantur ad 3. iij. In colat. infunde rhabarbari electi 3. j. myroban. citrin. 3. ℞. spicæ nardi gr. vij. In express. diss. syrupi rosacei 3. j. rhabarb. pulv. 9. j. Fiat potio.

In affectu inveterato & frequenter recurrente, talis purgatio semel in septimana repetita erit efficacissima, & interim julepi astringentes post singulas purgationes, vel opiata per aliquot dies exhiberi poterunt. Opiata supra descripta huic usui inservit. Julepi verò in hunc modum concinnari poterunt.

℞. Radicum bistortæ & consolidæ majoris, ana 3. j. fol. plantag. centinodiæ, herniariæ, fumarizæ, ana M. j. ser. 4. frigid. major ana 3. j. Coquantur ad ℞. j. In colat. diss. sacchari albi 3. iij. Fiat julep. pro iij. dosibus matutinis.

Loco juleporum vel opiata, aut post eorum usum per aliquot dies continuatum, syrupus usurpari poterit ex succo urticæ cum saccharo partibus æqualibus compositus, & ad cochlearia duo, singulis diebus manè exhibitus.

Neque sufficit causam hæmorrhagiæ præsentem auferre, scilicet peccantem humorem evacuare; sed etiam nova illius generatio impedienda est, viscera roboranda, eorumque intemperies corrigenda, præcipuè hepatis, in quo humores illi generari consueverunt. Atque ita julepi refrigerantes supra præscripti, huic usui inservient, tum etiam tinctura rosarum, ad hepar refrigerandum, & maxime roborandum efficacissima est. Exteriùs verò epithema-

ta eidem parti admoveri possunt in hunc modum composita: ℞. Aquæ rosar. plantag. portulacæ. acetosæ. cichor. ana 3. iij. portulacæ acetosæ, cichor. ana 3. j. trochiscor. de caphura & santali citrini, ana 3. j. aceti 3. j. Fiat epithema.

His etiam addi poterunt omnia remedia, quæ pro calida hepatis intemperie curanda descripta sunt.

Interdum etiam calida lienis, aut renum intemperies, huic affectui præbet originem, & tunc refrigerantia medicamenta his etiam paribus admovenda sunt.

His omnibus accedere debet idonea victus ratio, quæ ab ipso curationis principio sedulo instituenda, atque ita primum aer in quo decumbit æger, frigidus sit, & si tempus sit æstivum, alteretur, irrorando pavementum aceto & aqua rosacea, tum sternendo folia vitis, salicis, nymphaeæ; & similia.

Cibi sint incrassantes & pauci nutrimenti, ut pedes vituli, arietis, hœdi & aliorum animalium, oryza, caseus recens & pinguis, ova inderata, & similia. Fructus acerbiores, attringentes, aut aciduli ex usu esse poterunt, ut pyra, cydonia, mespilla, sorba, & condimenta ex succis granatorum, limonum, arantiorum, acetosæ. Quidam laudant usum lentium in aceto decoctarum; quia astringendi & incrassandi sanguinis ejusque acrimoniam retundendi vim obtinent. Abstineat æger, saltem in principio morbi, dum vires adhuc non sunt debiles, à vino, carnibus, & ovis sorbilibus & tremulis; quæ copiosiores & liquidiores sanguinem generant.

Alimenta autem liquida præsentem sanguinis fluxum, & sorbilia, quantum fieri potest, exhibenda sunt, ut juscula refrigerantia, hordeata, avenata, & oryzata cum aqua, non jusculo parata. Masticatio enim hæmorrhagiam promovet. Si vires sint debiles, juscula carniùm, & panatellas exhibere oportet, in quibus amyllum sine calce paratum, aut gummi arabicum dissolvantur.


Potus sit aqua chalybeata, & omnes cibi in ea decoquantur, quæ quidem utilior erit, si radices urticæ priùs in ea incoctæ fuerint.

Quies totius corporis imperetur, ita ut æger nec ambulet, nec tussiat, nec vociferetur, nec loquatur; motus enim linguæ, & maxillarum, sanguinis fluxum commovet.

Teneat caput detectum, & oculos clausos, ne sanguinem fluentem videat, quoniam illius conspectus, mota imaginatione, sanguinem commovet.

Vigiliæ immodicæ maximè vitentur, quia sanguinem acriorem, biliosorem, ac fluidiorem efficiunt. Somnus contra humores contemperat, eorumque motum cohibet.

Denique animi pathemata vitentur, quæ sanguinem sursum impellunt, ut ira, risus & gaudium.



# P R A X E O S M E D I C A E

## L I B E R Q U I N T U S.

### D E A F F E C T I B U S L I N G U A E.

#### P R A E F A T I O.

**L**INGUA tum gustus, tum loquelæ instrumentum est. Utraque actio læditur per tumores varios, qui linguæ adnasci consueverunt. Speciatim verò unaquæque actio à peculiaribus causis imminuitur, aboletur & depravatur. Quæ omnia ut sigillatim describantur, quintus hic liber in quatuor capita distinguendus est, quorum primum erit de inflammatione, aliisque linguæ tumoribus. Secundum erit de ranula sub lingua, quæ licet ad tumorum genus pertineat, seorsim tamen tractanda est, quod diversissimam à reliquis tumoribus curationem

desideret. Tertium erit de gustu læso. Quartum denique de paralyti linguæ, aliisque multis illius læsionibus.

#### C A P U T I.

De Linguae inflammatione, aliisque ejusdem tumoribus.

**Q**uemadmodum omnes corporis partes, præcipuè carnosæ, inflammatione effici consueverunt, sic etiam lingua



lingua eâdem aliquando tentatur, ex sanguinis in eam affluxu, qui prout vel purus ac syncerus, biliosus, pituitosus, ac melancolicus est, phlegmonem veram, aut eandem erysipelatofam, œdematofam, aut scirrhopfam producit, quæ interdum etiam ad suppurationem desinit. Cujus rei exemplum habetur apud Forestum *obs. lib. 14.* cujusdam cerevisiarii, qui ingentem linguæ inflammationem patiebatur, qui in suppuratum abiit.

Patitur etiam lingua, idque multò frequentius tumorem mollem & laxum, ac parè œdematofum, ex pituitæ à cerebro in eam affluxu. Cujus exemplum proponit Gal. *lib. 14. meth. c. 8.* in quodam homine, cui lingua ita tumefacta erat, ut ore contineri non posset.

Interdum etiam lingua in magnitudinem excedentem excrescit, quæ tamen neque sub œdematis, aut scirrhi, aut alterius cujusvis tumoris genere collocari potest, ut docet Galen. *lib. de diff. morb. cap. 9.* se cujusdam linguam vidisse, quæ in ingentem molem excreverat absque ullo doloris sensu: neque enim prementi manui cedebat, neque dolore infestabatur, sed nudum linguæ incrementum erat ipsius substantiâ nullo modo vitiatâ, quod ex nimia copia utilis alimentie ejus in substantiam conversi acciderat. Ejusque rei exemplum proponit Claudinus *consult. 9.* puellæ 12. annos natæ, cujus lingua in tumorem excreverat, qui neque ad œdema, neque ad scirrhum referri poterat, quoniam indolens erat, nec prementi manui cedebat, ut fovea remaneret, nec sensu naturali carebat; cujus prima origo fuerat ex violenta frænuli linguæ disruptione, cujus dolore sanguis ad partem attractus fuit, & continua postmodum ejusdem transmissione tale incrementum productum. In hoc autem casu peculiariter notat Claudinus, tumorem illum vespere decrescere, manè verò augeri, & semper livescere. Quorum eventuum rationem reddit, quoniam in coctione & assimilatione sanguinis illius, alioquin pituitosi (qualis in pueris ob ætatem humidissimam & ingluviem generatur) multi flatus, potissimum autem per noctem, retracto & coacto calore concitantur, qui linguæ tumorem augment. Per diem verò ob motum linguæ, & ambientis aeris calorem dissipantur, unde tumor parum decrescit. Lividitatem refert ad ærem ambientem, in quo lingua continuò versatur: ab illius enim frigidityte sanguis ad superficiem linguæ affluxus, antequam assimiletur, concrevit aliquo modo, & sic lividitatem contrahit, à frigore enim sanguinem nigrescere scribit Galen. *3. de sympt. causis, c. 2.* quod tamen in aliis corporis partibus non contingit, quoniam ad illas ea sanguinis tantum portio quæ pro nutritione sufficit sed non superfluit, amandatur.

Horum tumorum diagnosi difficilis non est, quando quidem magnitudo aucta præter naturam, visui subjicitur. Tumorum autem differentiarum ita distinguuntur. Si fuerit inflammatio, adest dolor & caliditas in lingua, tum etiam rubedo, quæ etiam facies aliquantulum inficitur. Si verò à pituita tumor duxerit originem, lingua albicat, multumque pituitæ effluit, cujus sapor dulcis, aut insipidus est. Si nudum sit linguæ incrementum, aliorum tumorum, ac vitiosorum humorum signa non adsunt.

Quod ad prognosin attinet, tumores linguæ ut plurimum vitæ periculum non afferunt, nisi in tantam molem excreverint, ut inde suffocatio metuenda sit, aut ex humore quodam maligno atque atrabiliario ortum duxerint; unde canerosus tumor generari potest, quod duritie, lividitate ac dolore pungitivo internoscitur.

Curatio inflammationis linguæ revellentibus ac repellentibus remediis inchoanda est, atque ita primùm præmisso clystere laxante, venæ sectio celebranda est, & sanguis satis magna quantitate detrahendus, pro virium modulo.

Mox cucurbitulæ cū scarificatione scapulis admovendæ.

Postmodum gargarisma refrigerantia ac repellentia usurpanda, & inter cætera commendatur à Gal. *14. meth. c. 8.* succus lactucæ, quo lingua frequenter abluenda est. Vel magis compositum gargarisma parari poterit ex decocto plantaginis, solani, lentis decorticatæ, & cortic. granatorum, addendo syrupum de rosis siccis, vel diamorum.

Post venæ sectionem, purgatio etiam instituenda ex

medicamento ex cholagogis & plegmagogis composito, quandoquidem pituita e capite defluens ad horum tumorum productionem particulariter saltem concurrat.

Sedata fluxione evacuantibus, revellentibus, ac repellentibus remediis, humoris parti impacti derivatio molienda est, & in hunc finem venæ sub lingua aperiendæ, quod si fieri non possit, propter linguæ magnitudinem, cucurbitula sub mento cum scarificatione erit admovenda.

Si tumor ad suppurationem desinat, promovenda erit sic per medium secta frequenter admota, vel gargarismate ex decocto hordei, malvæ, violar. ficuum, passularum, seminum cydoniorum, & fœnugræci composito, addendo syrupum violaceum & jujubinum.

Factâ suppuratione, si abscessus sponte non aperiatur, scalpello aperiendus est. Mox ulcus detergendum decocto hordei, agrimonii, plantag. cum melle rosaceo.

Tumor verò mollis & laxus è pituitæ influxu oriundus curatur primùm revulsione facta per phlebotomiam, si æger sanguine abundet, deindè purgans medicamentum satis vehemens est exhibendum, quales sunt pilulæ cochlearum minores ex aloë, scammonio, & colocynthide paratæ, quæ à Galen. feliciter usurpatæ sunt in quodam sexagenario *24. meth. supra citato.* Quod si æger pilulas deglutire nequeat, medicamentum componi poterit ex fenâ, agarico, diaphœnicone, & similibus.

Post hujusmodi evacuationes, refrigerantia & repellentia in principio admovenda sunt, quemadmodum in inflammatione dictum est. Et Galenus *loco citato*, dictum sexagenarium oris collutione ex solo lactucæ succo post purgationem usurpata sanavit.

Potest etiam utiliter linguæ collutio fieri ex succo limonum, granatorum, acetosæ, & plantaginis: quandoquidem prædicti succi non solum frigiditate sua repellunt, sed etiam acetositatem humiditatem linguæ impactam educunt.

Utiliter etiam lingua illinetur oxymelite simplici, cui in augmento addi poterit parum zinziberis, salis gemmei, aut ammoniaci.

Collui etiam os poterit decocto origani, pyrethri, cum hydromelite.

Zacutus Lusitanus *lib. 1. historie Medicorum principum. obs. 47.* in casu valdè præcipiti, ubi linguæ tumor in molem ingentem excreverat, ut inde suffocatio metuenda videretur, vacuantibus ac revellentibus remediis frustra tentatis hirudines quatuor linguæ affixit, & brevi tempore copiosa sanguinis vacuatione sequuta, ipsa exilis tenuisque facta est, & sic æger à periculo evasit.

Idem Zacutus *obs. 43. ej. stem libri*, decem annorum puero ex catarrhosa fluxione linguæ tumore ingenti laboranti, ut ipsius ore contineri non posset, post revulsiones per venæ sectionem, cucurbitulas scarificatas, & acres clysteres, cum linguæ tumor mollis, laxusque esse profundis linguæ scarificationibus usus est, moxque aquâ salitâ linguam ablui jussit, unde tanta aquosi humoris vacuatio facta est, ut illicò sanitatem æger recuperaverit. Quam observationem è Joachimo Camerario desumpsit, qui libro observationum suarum narrat, quendam tumente linguâ suffocatum, ipsam sibi acuto cultello decussatim incidisse, multoque sanguine effluente fuisse perfanatum.

Denique tumor linguæ carnosus, seu linguæ incrementum nimium, ex superflua ipsius carne proveniens licet curationem suscipere non posse videatur; illa tamen à Claudino proponitur, *loc. cit.* per operationem chirurgicam: ut scilicet, quidquid linguæ superfluum est, cultello abscindatur, adhibitis prius præparationibus necessariis, quæ omnia dicto loco fusè ab eo describuntur.

## CAPUT II.

### De Ramula sub lingua.

**Q**uamvis superiori capite varii linguæ tumores à nobis expositi sint; unus tamen adhuc explicandus superest



## Cap. II. De Ranula sub lingua, &c. 233

superest; qui *Βαράνος* Græcis, Ranula Latinis nominatur. Cum enim ille naturam à prædictis maximè diversam obtineat, ac diversum planè curandi modum requirat; satius esse diximus, peculiari capite illius descriptionem exponere.

Est autem Ranula tumor, qui sub lingua colligitur, in ea parte, qua illa vinculo alligatur. Et tantus ut plurimum apparet tumor, ut dentes inferiores superet: rima autem media, dexteram tumoris partem à sinistra dirimente, ranæ posteriorem partem refert, unde affectui nomen. Alii verò *Batrachum* inde dictum existimant, quod eo affecti loquelæ impedimentum patiantur, & non nisi coaxando loqui possint, ranarum instar. Ad cedematis aut meliceridis naturam accedit, è quo aperto materia profluit, ovi candido, aut melli persimilis. Et cum dicta materia in folliculo continuatur, ideò inter Melicerides à nonnullis reponitur. In iis folliculis interdum calculus inventus est, ut plurimorum auctorum observationibus constat, quas collegit Schenkius *obs.* 388. *lib.* 10.

Diagnos. hujus affectus difficilis non est. Dum enim sublevatur lingua, quædam veluti carnositas laxa & mollis sub ea continetur; & ab utraque parte ligamenti quædam prominentia sphaerica, ciceris, vel fabæ, vel interdum castaneæ magnitudinem æquans, conspicitur.

Periculo vacat ut plurimum hic affectus. In pueris tamen aliquando suffocationis periculum intentat, propter asperæ arteriæ & laryngis viciniam. In adultis etiam, si dolor & febris adsint, vitæ periculum affert, quandoquidem in anginam degenerare potest. Periculosa etiam est Ranula, quæ nigra, aut fusca, & dura est, ad cancrinaturam accedens, & illa non est attingenda.

Ad curationem hujus affectus, primum causa antecedens auferenda est venæ sectione & purgatione, ægro-tantis naturæ & ætati accommodata. Et si affectus sit inveteratus, ad cauteria & decocta sudorifica veniendum est.

Postmodum topicis medicamentis resolutio tumoris tentanda est in hunc modum.

℞. Cortic. granat. hyssopi sicci, salis commun. ana ʒ. ii. Fiat pulvis sub lingua detinendus, & frequenter iterandus. Refert Forestus puellam 12. annorum, intra biduum fuisse curatam hoc solo remedio, cujus auctor est Nicolaus Florentinus, qui in adultis loco salis communis utitur sale ammoniaco, quod magis penetrat, & potentiùs dissolvit. Forestus verò in studioso quodam prædictum pulverem sale communi paratum usurpavit; tum etiam decoctum ex balauistiis, alumine, & gallis, aquis partibus paratum, ac denique partem sale tosto & gemmæ frigari jussit, & æger curatus est sine operatione chirurgica, quod rarissimè solet contingere; quia tumores isti ad naturam abscessuum accedunt, & in quodam veluti folliculo continentur, ita ut discussa quadantenus materiâ contentâ, iterum repleatur.

Si discutientibus remediis tumor curari nequeat, ad illius apertionem veniendum est, quod ut plurimum faciendum: rarissimè enim per resolutionem curatur.

Apertio autem exiguo foramine faciendâ non est, qui materia, folliculo contenta iterum colligitur, & folliculus impletur, cui rei maximè conducit summa partis laxitas, & mollities recipiendis excrementis maximè idonea. Sed per summum tumorem, longissima sectio faciendâ est in utraque eminentia, ut tota materia simul effluat. Postea ulcus abluendum est primùm lenientibus, ut decocto malvæ; postea verò detergentibus, ut vino albo cum melle rosaceo, aut diamoro, ac demum oxymelite, donec purum appareat ulcus, & folliculo liberum. Ac denique ad cicatricem inducendum, vino nigro, in quo alumen dissolutum sit, os frequenter colluendum.

Forestus similem abscessum curavit in quadam muliere rustica, sectione utriusque factâ, & postmodum ore frequenter colluto poscâ, cui ex guum salis admixtum fuerat.

Si affectus sit inveteratus, & ulcus prædictis remediis exsiccari nequeat, tangatur oleo sulphuris bis in die, temperato tamen cum aqua rosacea, ita ut ad unam

guttam olei quinque vel sex guttæ aquæ rosacæ miscantur: ita enim intemperies corrigetur, & exsiccabitur pars, quæ ad roborationem vino nigro, admixto alumine, sæpè abluenda est. Si post hæc remedia debite usurpata morbus redeat, ad cauterium actuale veniendum est, cujus administrationem docet Paræus *lib.* 7. *cap.* 5.

### CAPUT III.

#### De gustu læso.

**G**ustus, quemadmodum reliqui sensus, omnesque corporis actiones, tripliciter læditur; imminutè, abolitè, & depravatè, imminuitur, cum saporis remissos vix percipit, intensos verò remissè. Aboletur, cum prædictos saporis, sive intensi sint, sive remissi, nullo modo sentit. Depravatur denique, cum objectum alieno sapore infectum judicat.

Imminutionis & abolitionis gustus causæ eadem sunt, magnitudine tantum differentes. Si enim leviores sint, gustum imminuunt: si graviores, abolent. Et illæ causæ sunt, vel defectus spiritus animalis in ipsa parte, vel nervi à tertio pari in linguam translati intemperies, vel lingua ipsa aliquo affectu præternaturali afflicta.

Spiritus deficiunt, vel ob sui penuriam, ut in moribundis; vel propter obstructions nervorum tertii paris, per quod deferuntur; vel propter tumorem in ea cerebri parte genitum, à qua nervi oriuntur.

Lingua vel humida & pituitosa materia obducitur; vel tumoribus, pustulis, aut ulceribus afficitur; & hinc propria illius actio, seu gustus, imminui, vel aboleri potest.

Gustus depravatur, quando lingua vitioso aliquo humore inficitur, ut in febribus sæpè contingit, cum bile infecta lingua, omnia quæ gustantur, amara esse judicat. Alias pituita falsa, vel humore melancholico imbuta, omnia falsa vel acida judicat. Objecta enim externa, linguæ admota, vitiosum ipsius succum commovent, qui tunc temporis linguam magis feriens saporem suum in eam fortius imprimit: & ita, quæ gustantur, tali sapore infecta videntur. Contingit tamen non rarò, linguam succorum in se contentorum saporis percipere, etiam si nullum objectum externum ipsi admoveatur ut docet *Gal. 1. de sympt. causis, cap.* 4. Et quotidiana confirmatur experientia in febricitantibus, quorum lingua bile perfunditur: quæ si valde amara sit continuum amarorem in lingua persentiant, licet nihil extrinsecum degustetur.

Causarum prædictarum diversitas ex saporum varietate, & linguæ ipsius dispositione cognoscitur. Dulcis enim sapor, & linguæ rubedo, sanguinem significant: amaror & color flavus, bilem: albedo cum dulcedine, pituitam: color fuscus & aciditas, melancholiam. Sapor abominabilis, pravos humores in ventriculo contineri ostendit. Pustulæ tumores & ulcera, oculis patent. Ac denique, si nulla in lingua permutatio appareat, & gustus immutatur, aut aboletur; in cerebro, vel nervis causam late-re censendum est.

Curatio admodum varia est, pro varietate causarum. Et ideò si in cerebro vel nervis affectus lateat, illi remedia aptanda sunt, præsertim ea, quæ ad paralytici curationem præscribi solent. Cum verò à pravis humoribus gustus depravatur, illud symptoma ut plurimum ab aliis morbis dependet: præcipuè verò febribus, quibus curatis, illa etiam symptomata tolluntur.

Si à tumoribus lædatur gustus, illius curatio ex dictorum tumorum curatione dependet, quæ supra propofita est.

Si denique à pustulis, aut ulceribus linguæ affectus oriatur, curatio horum affectuum instituenda est per venæ sectionem, purgationem humorum acrim, quibus accedant topica refrigerantia & adstringentia, & exsiccantia, ad gargarismatis formam redacta, & si ulcera fœdida sint, abstergantur melle rosaceo, addito oleo sulphuris, aut vitrioli, ea quantitate, quæ linguam moderate feriat. Vel etiam ad potentiùs exsiccandum, oleis prædictis

Gg puris



puris & impermixtis, pars affecta semel atque iterum tangenda est. Sic enim aphræ, omniumque oris & linguæ ulcera certissimè sanantur.

## CAPUT IV.

## De Paralyfi linguæ, ejusque motu laeso.

**A**ctio linguæ præcipua, loquela est. Ea aboletur, imminuitur, & depravatur à variis causis, quæ ad morbos similes, organicos, vel communes referuntur. Quod ad similes attinet; humida intemperies, cum materia conjuncta, linguam molliorem & laxiorem efficit, ut motus suos libere exercere nequeat: Siccitas etiam nimia loquelam vitiat, ut in febribus contingit. Morbi verò organici sunt, magnitudo aucta, ut de tumoribus antea dictum est, qui liberum linguæ motum impediunt; figura vitata, ut si lingua brevior ex nativa conformatione, aut præcisione apicis illius, aut si fræno seu vinculo suo arctius alligetur; & obstructio nervorum septimi paris, qui ad musculos linguam moventes deferuntur. Morbo denique communes sunt solutiones continui, seu vulnera ejusdem partis.

Nimia linguæ humiditas balbutiem efficit, qua affecti literam R. pronuntiare nequeunt. Ea nativa est in pueris, qui ob nimiam humiditatem hoc affectu laborant, ab eoque liberantur ætatis progressu, quo superflua illa humiditas absumitur. In quibusdam verò intemperies humida tota vitâ perseverat, & illi perpetuò balbi remanent, de quibus agit Hippocr. *Aph.* 32. *sect.* 6. his verbis: *Balbi ab alvi profluvio diuturno maxime capiuntur.* Galenus in *comm.* dicit, eos qui natura balbi sunt, aut cerebrum habere humidum, aut linguam, aut utrumque, à cerebro humido multas profluere humiditates, quas in ventrem delabi par est, undè alvi profluvia. Lingua verò admodum humida naturâ existente, & ventriculum talem esse par est, (ut qui alteram tunicam communem habet cum lingua, imbecillemque ex humiditate. Ventriculi autem humidi propria passio est diuturnum profluvium.

Attamen Avicenna propositæ doctrinæ adversari videtur dicens *fen.* 1. *lib.* 3. *tr.* 4. *c.* 18. balbos esse maxime dispositos ad melancholiam, cum tamen melancholia à sicciore cerebri intemperie procedat. Conciliatur tamen illa contrarietas, dicendo: Per balbos seu traulos Avicennam intelligere non balbos propriè dictos, qui literam R. pronuntiare nequeunt; sed eos, qui linguæ hæsitantia laborant, quive eandem syllabam multoties repetunt, antequam dictionem proferant. Hæc enim linguæ hæsitantia ex calido & sicco cerebri temperamento oritur, in quo adeò promptæ sunt cogitationes, ut linguam præcurrant, ejusque motum præcipitent, unde conturbatio ipsius atque hæsitantia exoritur. Prædicta autem balbuties, à nativitate contracta, incurabilis est.

In quibusdam verò balbuties accidentaria contingit à catarrho, & copioso humoris pituitosi defluxu in fauces & linguam, quæ evacuatione, revulsione, & derivatione humoris influentis, tum etiam capitis roboratione & exsiccatione curatur. Cum autem remedia, propositas indicationes adimplentia, paralyfi linguæ jam describendæ convenient, ex illius curatione erunt repetenda.

Ad linguam deferuntur duo nervorum paria, tertium videlicet ad gustandi & sentiendi actionem exercendam; & septimum ad loquelam, & linguam variis modis movendam. Ex horum igitur nervorum, qui à septimo pari oriuntur, obstructione & relaxatione, paralyfis linguæ procedit, quæ est privatio, aut imminutio motus illius partis. Eaque succedere consuevit frequenter apoplexiæ; cerebro ipso secundum posteriorem partem humore pituitoso imbibito: Et tunc aliæ quoque partes, & plerumque dimidia corporis pars, paralyfi tentantur. Interdum tamen solitaria est, nervis tantum, aut musculis linguam moventibus, humore pituitoso imbibitis & repletis. Et præcisione etiam eorum nervorum linguæ paralyfis generari potest, cujus rei exemplum habetur

apud Avic. *fen.* 6. *lib.* 3. *tract.* 1. *cap.* 12. his verbis. *Quidam homo jam ventosatus fuit, & percussus est cum scalpello villus nervi, in substantia panniculi conjuncti cum lingua, quare mellificata est lingua.* Has autem cucurbitulas in cervice & juxta occiput admotas fuisse, conjiciendum est; cum enim nervi linguam moventes à principio spinali medullæ oriantur, quæ est in occipitio, ex profundiori scarificatione cujuspiam illius rami præcisionem contigisse certissimum est.

Quamvis autem materia hunc affectum producat pituitosa sit; interdum tamen crassior & frigidior, interdum tenuior & calidior esse consuevit, pro ratione humorum in corpore prædominantium, quorum diagnosi proponitur ab Avicenna *fen.* 6. *lib.* 3. *tr.* 1. *cap.* 6. his verbis: *Et quandoque significat, quod materia sit sanguinea, rubedo linguæ, & caliditas ejus. Et quandoque significat, quod materia sit subtilis & aquosa, multitudo cursus salivæ aquosæ, & paucitas juramenti ex resolutivis, & juvenitum ab eo, in quo est stypticitas.*

Affectus iste, si à cerebri vitio dependeat, & apoplexiæ sit consecrarius, ita ut aliæ quoque partes afficiantur, raro curationem recipit, præsertim si æger ætate provectior fuerit. Si verò simplex & solitarius fuerit, curationem recipit, idque multò facilius, si æger in ætate florente constitutus fuerit.

Curatio Paralyfis linguæ perficitur ablatione causæ antecedentis, humoris scilicet in cerebro redundantis; & discussione ac resolutione causæ conjunctæ, humoris scilicet nervis linguam moventibus impacti, & imbibiti.

Causa antecedens eliminabitur iis remediis, quæ in frigida cerebri intemperiei curatione proposita sunt.

Ac primum purgatio instituetur potione aut pilulis dicto loco propositis. Mox si sanguis redundare, & affectus causa principalis vel adjuvans esse videatur, detrahendus est quantitate, quæ viribus & ætati conveniat. Postmodum apozema cephalicum exhibendum. Et si affectus contumax esse videatur, ad diætam sudorificam transeundum est, quorum omnium formulæ dicto loco propositæ sunt.

Post universales evacuationes, ad materiæ morbificæ derivationem deveniendum est, per cucurbitulas & vesicatoria posteriori parti admota; tum etiam cauterium occipiti inustum. Avicenna cucurbitulam sub mento affigit, quod etiam à recentioribus probatur.

Vena etiam sub lingua utiliter aperitur, præmissis evacuationibus universalibus, ad derivationem humoris musculis linguæ imbibiti.

Ad discutiendum verò & extrahendum eundem humorem, gargarisma sequens frequenter usurpabitur.

℞. Rad. ireos Flor. ʒ. β. fol. origani, salviæ, stœchad. rorismar. ana. M. β. cubearum ʒ. iii. liquiritiæ ʒ. j. Coquantur in æquis partibus aquæ & vini albi sub finem additi ℥. j. In colatura dissolve oxymelitis scillitici ʒ. j. Fiat gargarisma. Quod si non satis efficaciter operetur, addi poterit decocto radix pyrethri ad ʒ. ii. vel iii. vel etiam semen sinapi pari quantitate. Addi etiam potest castoreum, nisi ægro nimium ingratum videatur.

Ad eundem usum potest frequenter lingua confricari oxymelite scillitico solo, cui etiam semen sinapi addi poterit. Succus salviæ ad linguæ paralyfin multum commendatur, si eo lingua frequenter confricetur: Cui etiam, sicut in præcedenti, sinapi addi poterit.

Pilulæ etiam sequentes supra linguam frequenter detineri poterunt in eundem finem.

℞. Succu betonicæ & liquiritiæ. ana. ʒ. j. β. castorei & assæ foetidæ, ana. ʒ. β. nucis moschatæ, spicæ nardi, ana. ʒ. j. Incorporentur cum melle, & fiant rotulæ instar lupinorum.

Hic etiam conferre poterunt gargarismata, masticatoria, & errhina, in frigida cerebri intemperiei curatione proposita.

Ad cerebrum verò roborandum, & humoris pituitosi in eo contenti reliquias discutiendas, convenient suffitus, pulvis capillis inspergendus, & cucupha dicto loco proposita.



Ac denique, ad novum pituitæ proventum quem cerebri intemperies, etiam post universales & particulares evacuationes solet efficere, usualia remedia præscribenda;

nempè syrupus magistralis, aut pilulæ usuales, quibus opiata roborans adjungenda est, eorumque remediorum descriptio à prædicta curatione desumi poterit.

~~~~~

## P R A X E O S M E D I C A E L I B E R S E X T U S.

D E A F F E C T I B U S D E N T I U M, G I N G I V A R U M,

Faucium, uvulæ, & laryngis.

### P R A E F A T I O.

**D**ARTES ore & faucibus contentæ, varios affectus patiuntur, quorum præcipuos tantum describere animus est, & reliquos minoris momenti, quæ à solis Chirurgis ut plurimum curari consueverunt, consilio prætermittere. Hic igitur liber septem concludetur capitibus. Primum erit de dolore dentium. Secundum, de dentium nigredine & erosione. Tertium, de gingivarum erosione, & exulceratione. Quartum, de fluxu sanguinis ex gingivis. Quintum, de oris & faucium ulceribus. Sextum, de uvulæ relaxatione. Septimum de angina.

redundantiæ alimenti, quod eis suppeditatur. Inopia igitur aridiores & macriores alimentumque non sentientes, & ob id tenuiores eos reddit: redundantiæ verò consimilem in iis affectionem excitare potest, qualis est circa carnosas partes inflammatio. Hæc Galenus. Verisimile tamen est, dolorem frequentius fieri (si modò ille valdè intensus fuerit) in partibus illis exquisito sensu donatis, nervulo nimirum & membranula alveolum succingente, dentiumque radices proximè ambiente: Quæ humoribus influentibus non solum distensionem ac vellicationem, sed etiam interdum inflammationem patiuntur, si nempè sanguis aliis humoribus admisceatur: tunc enim dolor à duplici causa exoritur, distensione, videlicet & compressione, quæ fit à dentis duritie; quam ferre non potest sine dolore, membranula inflammata. Hanc autem membranulæ inflammationem comitatur ut plurimum gingivæ inflammatio; quæ ideò à Gal. & Avic. inter causas doloris dentium recensetur.

### C A P U T I.

De dolore dentium.

**D**entes non solum secundum nervos, eorum radicibus insertos, & membranulam, dentis cavitatem intus succingentem: sed etiam in propria substantia sentire, docuit Galen. 5. de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 8. & 16. de usu partium, cap. 2. ubi dicit, dentes & cæteras oris particulas, una cum lingua sapores percipere. Tum etiam lib. de ossibus, c. 5. inquit, ex ossibus dentes tantummodo mollium cerebri nervorum esse participes, ob idque solos manifeste sentire. Dolor igitur non solum nervulis & membranulæ interiori, sed etiam ipsi dentium substantiæ contingit.

Fit autem dolor dentium ab humorum influxu, qui vel frigidi & pituitosi sunt, vel calidi & serosi, falsi & acres; unde particularum dictarum distensio aut vellicatio contingit. Illi autem humores vel in maxillarum & dentium alveolorum membranas confluunt, vel in nervulum radici dentium insertum vel in ipsam dentis substantiam. Quamvis enim multi existiment, dentes humorum affluxum ac distensionem in propria substantia recipere non posse, cum sint corpora densissima & durissima, tamen id docetur ab Avicenna. Fen. 1. lib. 1. doctrinæ, cap. 5. & Fen. 7. lib. 4. tract. 1. cap. 4. Et quandoque, inquit, est materia apostemans dentem ipsum. Quam sententiam confirmat, ac perspicue disputat. Fen. 1. lib. 5. tract. 3. cap. 1. his verbis: Non enim est, quemadmodum quidam existimant Medicorum, quod cerebrum ipsum non apostematur, sic ratiocinantes. Nam quod lene est, sicut cerebrum, & durum sicut ossa non extenditur, & quod non extenditur, non apostematur. Hic autem sermo est erroneus, & illud ideò, quoniam lene viscosum extenditur, & ossa etiam apostemantur, Gal. illud confessus est, & non monstrabimus sermonem in capitulo dentium. Imò dicimus, quod omne, quod nutritur, extendatur & augmentetur cum nutrimento, & similiter est possibile, quod extendatur, & augmentetur cum superfluitate, & illud est apostema. Hoc verò docet Avicenna ex Galeni sententia, qui lib. 5. de compositione med. sec. loc. cap. 8. Cum, inquit, impossibile sit, dentes incrementum accipere citra nutrimentum, omnino duabus affectionibus & iis contrariis obnoxii erant, inopiæ videlicet, &

Fluunt autem humores in dentes & parte adjunctas ut plurimum à capite: interdum tamen è partibus inferioribus promanant. Cum enim vitiosi aliqui humores, præcipuè serosi, in parte aliqua geniti, in venis cumulantur, natura illorum onus excutere tentans, ad partes debiliores eos præcipitat. Et si dentes propter intemperiem, cariem, aut erosione tales extiterint, ad eos præsertim fluxio decumbit. Hujus rei experimentum proponit Carolus Piso (qui etiam existimat dolorem dentium à seroso humore ut plurimum fieri) lib. de morbis ab illuvie serosa, obs. 7. ubi refert se ipsum dolore dentium per multos dies afflictum, ab assumpto medicamento purgante post selquihoram, sinceram aquam ad lb. j. & amplius evomuisse tanto successu, ut postea vel decem annis ab hujusmodi dolore immunis prorsus fuerit. Quo edoctus experimento simili affectu laborantibus, medicamenta, serosos humores educuntia præscripsit, felici successu. Præterea hunc affectum à tali causa ut plurimum dependere, hoc signo probare nititur, quod assidua salivatio doloris dentium comies ferè perpetua esse soleat.

Præter causas enumeratas, vermes in dentibus cariosis geniti, doloris dentium causa esse possunt: iique producuntur ex qualibet materia in illis cavitatibus retentâ & putrefactâ; sive ea excrementitia sit, sive ex alimentis putredini obnoxii; carnibus præsertim & dulcariis, quæ propter lentorem cavitatibus dentium adhærescunt.

Nonnulli etiam existimant, dolorem dentium interdum fieri à spiritu flatulento, intra dentis cavitatem & nervulum incluso, ac membranulam internam violenter divellente, unde dolor atrocissimus ac penè intolerabilis excitari solet.

Causæ externæ & procatasticæ dolorem dentium producentes, sunt illæ omnes, quæ humorum fluxiones promovere solent, quarum præcipuæ sunt aër frigidus, vel austrinus, mora in sole ardente aut in aëre nocturno, crapula, omnes denique errores in victus ratione commissi. His adde eas, quæ partim debilitate & fluxioni recipiendæ magis idoneam reddere valent, qualis est præsertim



caries & perforatio dentis, quæ pertinet non raro dentium dolores efficere consuevit.

Causarum diversitas variis signis dignoscitur. A calidis enim humoribus dolor oriundus, intensior multò est, temperamentum calidius, ætas florens, tempus æstivum, caliditatis sensus in parte percipitur, & sæpè gingivarum inflammatio contingit, à frigidis remediis juvantur, læduntur autem à calidis. Si verò à frigido humore dolor oriatur, signa prædictis contraria apparere solent.

Si vermis causa doloris extiterit, dolor erit interpolatus, exiguis intervallis desinens ac rediens; tum motus vermis in parte aliquando percipitur.

A spiritu flatuoso dolorem produci testantur illius atrocitas, & divulsionis sensus, qui in parte percipitur, quive exiguo tempore desinit, ac discutientibus remediis, parti admotis, faciliè curatur.

Prognosis varia est pro causarum varietate. Dolor enim, qui ab humore calido, tenui & sero acri & falso producitur, vehementior quidem est; sed citius desinit, ob humoris illius subitas mutationes. Qui verò ab humore frigido & pituitoso excitatur, mitior est; sed multò diuturnior.

Tumor in gingivis aut maxillis obortus, doloris dentium solutionem avertit, translata fluxione ad partes exteriores, ita ut non amplius ad internam dentis cavitatem decumbat.

Curatio ad doloris causam auferendam, & ipsum dolorem mitigandum dirigenda est. Licet enim anodyna parùm prosint, nisi fluxio auferatur: Ita tamen non raro urget, ut non solum anodynus propriè dictis, sed etiam interdum narcoticis ante causæ ablationem demulcendus sit. Humor igitur qui ab dentibus confluit, revellendus, evacuandus & repellendus est: qui verò jam influxit, derivandus & discutiendus.

Primò igitur, si dolor ab humoribus calidis oriatur, venæ sectio celebranda est è brachio ejusdem lateris, quâ fluens humor plurimum revellitur. Si verò dolor à frigidis humoribus excitetur, minus venæ sectio convenit, ratione tamen fluxionis etiam usurpari poterit, cum inter revellentia remedia principem locum teneat. Sed minori copiâ tunc temporis sanguis detrahendus, nisi plethoræ signa appareant, cujus ratione etiam si ea pituitosa sit, liberalis venæ sectio instituenda, juxta præceptum Gal. qui largam sanguinis detractionem plenitudini respondentem, omnium dolorum promptissimum esse remedium asseruit, quod nos frequentissimâ experientiâ, tum in aliis doloribus, tum præcipuè in dolore dentium, verissimum esse comperimus.

Sequenti die purgans medicamentum exhibeatur, humori peccanti accommodatum, & in forma, vel potione, si humor peccans calidus extiterit; vel pilularum, si frigidus, & pituitosus humor doloris causa fuerit.

Postmodum, perseverante dolore, cucurbitulæ scapulis cum scarificatione applicentur; vel cucurbitula magna inter scapulas sine scarificatione affigatur. Vesicatorium posteriori parti cervicis, vel pone aures admotum, humores fluentes potentissimè retrahit ad posteriora.

Ad fluxionem etiam inhibendam, adstringentia temporibus utiliter applicantur, qualia sunt emplastra ex gummi elemi, vel mastiche sola, supra pannum sericum liquata, cum pistillo æneo calefacto, emplastrum de mastiche officinarum, vel contra rupturam, vel tale in rem præsentem præscribatur.

℥. Thuris hypocist. ladani, ana ʒ. j. β. picis, mastiches, ana ʒ. j. opii. ʒ. β. olei lentisci. q. s. Fiat massa emplastrum.

Radix consolidæ majoris recens, contusa & admotâ temporibus in formâ emplastrum, fluxionem efficaciter intercipit.

Fiat etiam emplastrum ex pulvere aluminis & gallarum cum pice subactis efficacissimum.

Riverius Henrici magni Archiater emplastrum sequens pro secreto habebat.

℥. Nucum expressi, rosar. rubr. seminis nasturtii torrefacti, mastices, terræ sigillatæ, an. ʒ. j. β. Macerentur in aceto rosaceo per horas 4. postea siccantur, & adde opii in aqua vitæ dissoluti ʒ. iiii. picis navalis, colophogiæ, ana ʒ. j. ceræ flavæ in oleis expressis seminum hyoscia-

mi, & papaveris albi liquatæ q. s. Fiat emplastrum, quod applicetur arteriis, vel etiam loco dolenti.

In aures quoque immittuntur medicamenta ad dolores dentium, quia venulæ, per quas fertur alimentum ad dentes, per illas partes excurrunt. Ideò infunditur oleum amygdal. amar. in aurem vicinam denti dolenti, aut excipitur fumus aceti, in quo pulegium aut origanum cocta sint.

Alii acetum in aurem infundunt, quo fluxio cohibetur efficacissimè, & in fluxione calida præcipuè confert.

In frigida verò fluxione, succus allii cum theriaca mixtus, & in aurem tepidè instillatus, mirum in modum dolorem compescit. Idem præstat allii bulbis detractis cortice in formam suppositorii scissis, & in aurem intrusus.

Adstringentia etiam ipsi parti dolenti admoventur in fluxionis principio, eaque refrigerantia, si materia calida sit, frigida verò existente, calida cum repellentibus sunt permiscenda. In qualibet autem causa, si dolor vehemens fuerit, anodyna repellentibus erunt admiscenda. Materia verò hisce usibus idonea talis esse poterit.

℥. Rad. bistortæ, pentaphylli, tormentillæ. ana ʒ. j. fol. verbenæ, plantag. & tapii barbati, an. M. j. nucum cupressi, gallarum, calycum glandium, an. ʒ. iij. fantali rubri & crystallorum ana ʒ. i. β. rosar. rubr. & balaustiorum, ana P. i. Fiat decoctio in vino styptico, & aceto, qua abluatur pars dolens tepidè frequenter. Hæc in fluxione calida usurpari poterit ab initio, in frigida verò addi poterunt radix cyperi, cortex buxi, folia hæderæ, & similia.

Simplicius medicamentum componitur ex aqua plantag. & rosar. cum aceti tantillo ad formam oxycrati.

Vel gallæ decoquantur in aceto, quo abluantur dentes. Vel

℥. Rad. pentaphylli ʒ. β. fol. salicis M. β. gallarum ʒ. ii. Fiat decoctio in vino styptico, qua colluatur os. Hæc decoctio sistit fluxionem, & dolorem sedat.

Postmodum ea usurpanda erunt remedia, quæ dolorem sedant, ejusque causam discutiunt, quorum maximus apud autores, imò & apud vulgus, numerus habetur. Nos efficaciora hîc proponemus, ex quibus eo judicio delectus habendus est, ut quæ non solum resolvunt & discutiunt, sed etiam fluxionem cohibent, attringentium admixtione, in principio & augmento magis usurpentur, quæ verò tantum discutiunt, in statu & declinatione.

℥. Succus semper vivi & solani, ana ʒ. ii. lactis vaccini, aut ovilli ʒ. viij. olei rosacei, omphacini ʒ. i. ss. opii, croci, ana gr. iij. Misceantur, & lintheo exceptus liquor maxillæ dentis dolentis tepidè applicetur frequenter.

℥. Medullæ pomorum dulcium coctorum ʒ. ii. furfuris aceto macerati ʒ. iiii. olei rosacei omphacini ʒ. j. croci ʒ. ss. opii gr. ii. Misce, fiat cataplasma parti dolenti applicandum. Vel

℥. Farinæ hordei & fabarum, ana ʒ. iiii. olei rosati completi & amygdal. dulc. an. ʒ. ss. succi sempervivi majoris ʒ. i. ss. lactis q. s. Fiat cataplasma parti dolenti applicandum tepidè frequenter. Vel

℥. Albumina ovor. num. ii. Agitentur cum aqua rosacea; & excipiantur stupis canabinis, quæ aspergantur piperis pulverati ʒ. ii. & parti dolenti applicentur, ut totam genæ sedem comprehendant.

Hîc tamen sedulò advertendum ne astringentia maxillis applicentur, si tumor eas occupet; periculum enim est, ne humor ad fauces repellatur, ægrumque suffocet. Cujus rei exemplum proponit Malescus de Tarranta, cujusdam Medici, dolore dentium laborantis, cum maxillæ inflammatione, qui oleum rosaceum cum aceto admovit, undè incidit in anginam, & mortuus est.

Aliæ oris collutiones, in morbi decursu parari poterunt in hunc modum.

℥. Vini albi generosi ʒ. iiii. radices hyoscyami albi ʒ. ii. Bulliant ad consumptionem tertiæ partis. Colaturæ adde aceti ʒ. i. vernicis ʒ. i. iterumque bulliant unicâ ebullitione. Colaturâ abluatur os frequenter.

Decoctum verbenæ simplex ad eundem usum à quamplurimis comendatur.

Laudatur etiam decoctum guaiaci in aqua, vel vino



no paratum, cui sal interdum permisceri poterit. Vel

℥. Fol. persicariæ, & cortic. rad. hyoscyam. ana partes æquales. Coquantur in aceto rosaceo, & hoc decocto colluatur os. Et si à causa calida dolor producat, radix hyoscyami sola in aceto decoqui poterit.

Si persicariæ acrimonia offendat, illius quantitas minuenda est. Imò penitus omitti potest in fluxione à causa calida, & in illius locum subrogari persicaria maculata, quæ refrigerandi & astringendi facultate prædita est, cuiusque succus, aut decoctum ad omnes fluxiones acres & biliosas coercendas per os tuto exhiberi potest. Folia etiam hyoscyami loco radicis usurpari possunt.

Quidam foliis hyoscyami, & persicariæ cumulatae pro remedio magnetico utuntur; eaque decoquunt in aceto, cocta comburunt igne luculento, dentes aceto abluunt, & dolorem evanescere aiunt, quamplurimum folia combusta sunt. Ego verò effectum aceto tribuere malim quo dentes abluuntur.

In prædictis decoctis, si aceti acrimonia tanta sit, ut eam æger difficilè ferre valeat, ex æquis partibus vini & aceti parari poterunt; imò verò in causa frigida vinum solum usurpabitur.

Amatus Lusitanus sandaracham valdè laudat in aceto & vino decoctam, hoc modo.

℥. Sandarachæ 3. i. vini & aceti ana ℥b. ss. Coquantur, & colatura calida teneatur diu in ore.

Decoctum radicis urticæ majoris, cum pauxillo nucis moschatæ & croci, in æquis partibus vini & aceti paratum, & calidè in ore detentum, humores illapsos mirabiliter extrahit. Ab initio quidem videtur dolor augeri, sed paulò post mitigatur & desinit.

Radix lapathi acuti, vere, ante germinationem collecta & exsiccata, denti dolenti admota specificâ proprietate dolorem dentium tollit, quod confirmatur Foresti experimento, quod habetur *obs. 6. lib. 14.* ubi etiam dictam radicem, recentem in taleolas concisam denti dolenti feliciter applicavit in puella quadam, quo etiam remedio in aliis quamplurimis, præcedentibus universalibus remediis, se feliciter usum testatur.

Si corpus ritè purgatum fuerit, & caput pituita non sit admodum repletum, masticatoria ad humores à parte affecta extrahendos, erunt efficacissima, quæ parantur vel ex pyrethro solo dentibus diu præmanso, vel sequens componi poterit.

℥. Mastiches, pyrethri, & staphisagriæ ana 3. i. ss. hyoscyami 3. ss. Pulverentur, misceantur, ex iisque fiant globuli in panno lineo raro, quos diu masticet, frequenter exspuendo.

In vulgari usu habetur oleum caryophyllorum, quo frustulum gossipii intinctum denti amovetur, & si erosus fuerit, cavo illius inseritur, sicque humor parti adhærens extrahitur, & illa roboratur.

Oleum camphoræ ad eum usum mirè est efficax.

Vel in olei caryophyllorum 3. 1. dissolve camphoræ g. viii. iisque eodem modo utere.

Verum præ cæteris commendatur, & miris laudibus effertur oleum buxi, quod gossipio per stylum excipiat, & in foramen dentis gutta una, vel altera injiciatur, illi cò dolorem tollit. Fit autem hoc oleum, conciso ligno buxi in multas particulas; deindè destillatur per descensum duobus vasis, altero infra terram, altero supra posito, & circa hoc apponitur ignis ex carbonibus validior, & oleum exstillat in vas inferius.

Præter olea prædicta, Chimici etiam laudant oleum ligni, quod vocat, Heraclei, seu corylini, eodem modo usurpatum.

Si dolor ita vehemens sit, ut prædictis remediis cedere non valeat, ad narcotica veniendum est, quæ sub variis formulis à practicis proponuntur: & denti dolenti admoventur, quorum tamen effectus, non minùs quam cæterorum topicorum, admodum incertus est. Verum eadem assumpta dolorem certò consopiant. Inter cætera laudatum opiatum principem locum obtinet, quod non solum dolorem sedat, sed etiam fluxionem cohibet, & tuto exhiberi potest post remedia universalia ad g. iii. vel iv. modò à perito artifice præparatum sit.

Topica verò remedia ex narcoticis parata multa circumferuntur. Sequentia duo nobis sint instar omnium.

℥. Opii, myrrhæ & laudani, ana 3. i. Pulverentur, & cum vino albo decoquantur in formam linimenti, quod paucò gossipio exceptum denti applicetur.

Alterum est emplastrum Riverii, Henrici magni Archiatri, supra descriptum.

Si vermes in dentem ruerint, amaris enecandi sunt, & inter alia sequens conferre poterit.

℥. Aloës 3. i. camphoræ 9. ss. aquæ vitæ 3. s. Misceantur & cum bombace denti admoveantur.

Notandum est, rarò dentes dolere, nisi perforati fuerint, & erosio usque ad cavitatem internam penetret, ac nervum tangat, ideò ut doloris sensus auferatur, nervus adurendus est cauterio actuali, vel aquâ forti, aut oleo vitrioli in cavum dentis immisso; quod si frequenter iteretur, & dens valdè corrosus fuerit, in fragmenta sensim rumpitur, & extrahitur.

Si hisce omnibus dolor dentium non cedit, & dens valdè exesus fuerit, ferro extrahendus est, eoque extirpato dolor statim cessat, non ampliùs reversurus. Cavendum tamen est, ne dens evellatur eo tempore, quo fluxio impetu ruit, aut caput dolet, aut tumet gingiva, aut dolor atrox sentitur. Et monendus est Chirurgus ne violenter & affatim, uno scilicet ictu dentem evellat, ne violentam extractionem consequatur maxima cerebri concussio, & ossis maxillæ disruptio, quam sæpè magna hæmorrhagia, febris, & interdum mors consequitur. Evulso dente, ea pars à qua extractus est, digitis undequaque comprimatur, ut ad naturalem statum redeat; postmodum æger os colluat oxycrato tepido, caveatque ab aere frigido, ne nova fluxio in alios dentes delabatur. Si verò sanguis in tamta copia effluat, ut vix cohiberi possit (quod interdum contingit, etiam sine maxillæ ruptione, ex vena vel arteriâ dicifsa, & refert Valeriola historiam cujusdam, qui dente sine ulla vi & sine ferro, solis digitis extracto, sanguinis ℥b. i. uno impetu ejecit, & altero die ferè tantundem ex arteria gingivæ suppositâ.) sistitur ut plurimum ille sanguinis fluxus, appposito globulo solidiori ex linteo confecto, & digitis per horam unam, aut alteram compresso. Quod si non succedat, vitriolum ustum admovendum est, & linteum in aceto maceratum superimponendum, idque digito comprimendum; donec crusta inducta fuerit. Postremum remedium est cauterium ignitum, quo sanguis erumpens statim cohibetur.

Si quis meticulosus Chirurgi manum refugiat, & aliis remediis sibi dentem extrahi cupiat, ea tentanda sunt quæ ab authoribus passim proponuntur, & dentis casum promovere censentur, qualia sunt pasta ex lacte tithymali, & thuris pulvere simul incorporatis cum paucò amylo in cavum dentis immissa, radix ranunculi, cortex radicis mori, cinis vermium terrestrium, pirethrum in aceto infusum; radix cucumeris agrestis in aceto infusum, & similia. Sed præ cæteris efficacissimam vim obtinet ad dentium casum promovendum elleboraster, si ejus folio contrito dens confricetur, sed diligenter cavendum est, ne alii dentes hoc remediotangantur, eorum enim casum etiam promoveret. Quidam rusticus cum dolore dentium acerbissimo premeretur, suavitè alteri ut elleborastro dentem confricaret, ille incautè hoc utens remedio, majorem partem dentium maxillæ affectæ confricuit, & intra paucas horas omnes propemodum deciderunt. Si quis igitur tam vehemens remedium experiri cupierit, suaserim ut reliquos dentes cera diligenter obducatur; ita ut ille qui evellendus est, nudus relinquatur, & actioni medicamenti pateat.

Quamvis tumor in maxillis obortus, ut plurimum doloris solutionem afferat, translata materia ad partes exteriores: ut tamen ille citò resolvatur, quædam remedia usurpanda sunt, cui rei conferet sequens linimentum.

℥. Butyri recentis, & axungie gallinæ, an. 3. i. pulveris ireos Flor. 3. i. croci 9. ss. ol. chamæmel. & amygd. dulc. an. 3. ss. Fiat linimentum.

Promptius operatur cataplasma ex ficibus. pane, & acet. to. Urtica contusa maxillæ admota citò dolorem solvit.

Hæc est doloris dentium præsentis curatio. Si autem ille frequenter



frequenter recurrere consueverit, ut in multis hinc affectui obnoxii contingit, prophylaxis adhibenda est, quæ in eo consistit, ut humorum ad partes istas fluentium generatio impediatur, & dentes ipsi roborentur, ne tam facile fluxionem excipiant. Si igitur ab humoribus calidis affectus producat, eadem curatio adhibenda est, quæ in calida hepatis intemperie catarrho calido fuit proposita. Si verò à frigidis, & pituitosis humoribus ducat originem, frigida cerebri intemperiei, & catarrhi frigidi curatio usurpanda est, dentium verò roboratio ex sequenti capite erit desumenda.

## CAPUT II.

## De dentium nigredine &amp; erosione.

**D**entes non rarò nigrum, lividum, aut flavum colorem contrahunt, ab humoribus vitiosis, illorum superficiei adhærentibus, qui longâ morâ eos tandem corrodunt, & carie afficiunt. Producentur etiam iidem affectus à vaporibus tetris sursum exhalantibus, qui ex pravis alimentis ingessis, aut à ventriculi intemperie cibos corrumpente exoriuntur. Plurimum ad dentes denigrandos confert hydrargyrum, sive toti corpori admotum, ut in lue venerea contingit, sive facies tantum eo illinatur. Unde mulieres, quæ fucus ex mercurio utuntur, dentes nigros, aut foedo colore infectos habere consueverunt.

Ad curationem, causa antecedens prius auferenda est, & si humores pravi in ventriculo redundantes huic malo originem dederint, evacuandi sunt, & partium eos producentium intemperies corrigenda, optimaque victus ratio instituenda, eaque alimenta eliminanda, quæ dentes corrumpere nata sunt, præcipue verò dulcia.

Infinita propemodum ad dentes dealbandos proponuntur remedia apud autores: quæ unusquisque experiri poterit. Nobis unicum saltem sufficere poterit, quod in instanti dentes dealbat, ab omni sorditie liberat, à carie præservat, nempe spiritus sulphuris, aut vitrioli, in quo exiguus bacillus demergendus est, ejusque extremo dentes confricandi, moxque linteo detergendi. In magna dentium sorditie purum & putum oleum usurpari poterit, aliàs verò cum melle rosaceo permiscendum, aut aquâ simplici temperandum erit, ne usu frequentigingivas erodat. Montanus *conf.* 113. refert se id didicisse Romæ ex quadam muliere, quam Mariam Græcam appellabant: ad quam cum venisset admodum juvenis, atque illa esset annorum 20. postea quinquagenariam in eodem ferè statu eam reperit; quæ formæ atque virium integritatem oleo vitrioli acceptam tulisset, atque significasset, se ex ejus usu dentes, quos in juventute pessimos habuerat, pulcherrimos habere & firmissimos, gingivas etiam firmas, & addidisset, quod videretur sibi ob ejus usum tardius senescere. Usa erat autem singulis diebus unâ aut alterâ guttulâ gingivas & dentes leviter fricando.

Cinis tabaci ad dentes abstergendos & dealbandos est etiam mirè efficax.

Ad præcautionem verò, & dentes conservandos, primum ii à sordibus, & cibis quotidie mundandi sunt dentiscalpio ex ligno lentiscino, aut aliâ materiâ idoneâ, mox vino os colluendum, dentes verò confricandi pulvere sequenti.

℥. Rad. bistortæ, aluminis, & coralli albi ana ʒ. j. Fiat pulvis tenuissimus, quo dentes confricentur. Vel aqua sequenti abluantur.

℥. Aluminis usti subtilissimè pulverati ʒ. ii. cinamomi integri ʒ. β. aquæ fontis & rosarum, ana ʒ. iv. Bulliant in phiala vitrea supra cineres calidos, ad tertiæ partis consumptionem. Hoc liquore dentes confricentur manè cum linteo in eo madefacto.

## CAPUT III.

## De gingivarum erosione &amp; exulceratione.

**E**roduntur gingivæ, & exulcerantur ab humoribus acerbis & erodentibus ad eas confluentibus. Partes autem

mandantes sunt cerebrum, ventriculus, lien, aliæque partes. Lienosi præsertim ulceribus gingivarum maximè obnoxii sunt, unde in scorbuto, magna earum partium exulceratio, & corruptio contingit. Interdum etiam ex lumbricis, aut corruptis humoribus ex quibus illi generantur, gingivarum erosiones solent contingere, ita ut illæ diù perseverantes, lumbricorum intus latentium indicia esse soleant. Sic refert Fabricius Hildanus *observ.* 59. cent. cujusdam civis Dusseldorphenis puerum erosione gingivarum à longo tempore gravissimè vexatum, cum varia multa remedia tam interna quàm topica adhibita fuissent, tandem vitam cum morte commutasse. Et aperto corpore tantam inventam esse vermium copiam, ut aliquibus in locis intestina eroderent, multique in vacuo ventris reperti fuerint.

Curatio primum ad causam antecedentem dirigenda est, & humores vitiosi vacuandi per venæ sectionem & purgationem, acres & calidi temperandi per apozemata, julepos, jacula medicata, & alia hujusmodi. Eorundem humorum fluxio avertenda per cucurbitulas, & cauteria partibus idoneis admota. Ac denique partis præcipue affectæ vitia corrigenda.

Postmodum verò ad topica veniendum est, quæ pro magnitudine affectus varianda sunt, ita ut simplici erosione ea tantum admovenda sint, quæ astringendi & exsiccandi vi prædita sunt, atque ita lotio sequens primum usurpari poterit.

℥. Gallarum immaturarum, calycum glandium, & balustiorum, ana ʒ. j. rosar. rubr. p. i. aluminis crudi ʒ. iij. Coquantur in aquæ ferratæ partibus duabus, & una vini rubri austeri; hoc decocto sæpè gingivæ abluantur.

Si hoc decocto non tollatur erosio, opiata sequens adjungenda est.

℥. Sang. drac. ʒ. iij. ligni aloës. rosar. rubr. spodii, cornu cervi ad albedinem usti, & nucum cupressi, ana ʒ. j. mirrhæ & cineris tabaci, ana ʒ. ii. aluminis ʒ. i. Fiat omnium pulvis, qui excipiat melle, additis spiritus vitrioli aut sulphuris guttis aliquot. Fiat opiata, quæ extenditur supra linteola instar lamellarum, gingivis applicanda hora somni.

Spiritus sulphuris aut vitrioli, quemadmodum dentes mundificat & dealbat; sic etiam gingivarum putredinem arcet solus vel cum aqua, aut melle rosaceo permixtus, ut superiori capite dictum est.

Si ulcus profundum fuerit, aut sordidum, sequente balsamo illinatur.

℥. Myrrhæ electæ, & sacchari candi, ana partes æquales. Pulverentur, iisque impleatur album ovi ad duritiem coctum, & per medium sectum; postea filo probè alligetur, & suspendatur in cella vinaria, supponendo vas vitreum, instillabit liquor, seu balsamum, quo pars sæpius in die illinatur.

Quod si prædictis remediis ex parte administratis affectus non tollatur, & dens ulceri vicinus carie affectus sit, ad illius avulsionem veniendum est, & ulcus citò curabitur, alioqui incurabile prorsus remanebit.

## CAPUT IV.

## De Fluxu sanguinis ex gingivis.

**S**anguis magnâ copiâ interdum à gingivis fluere consuevit, idque vel criticè, vel symptomaticè. Quamvis autem hæmorrhagia critica rarissimè per gingivas fieri consueverit, id tamen interdum accidere docet experientia & authorum observationes. Si refert Dodonæus *obs.* 14. cuidam Latio esthymatis laboranti sanguinem à gingivis erupisse, eumque repressum ad urinarios meatus translatum fuisse, unde cruenta urina subsecuta est, quæ cum astringentibus cohibita fuisset, iterum ad gingivas se contulit, nec fluxus cessavit, donec æger à morbo liberatus est. Amatus Lusitanus *curatione* 5. cent. 5. refert quibusdam sanguinem à gingivis utiliter effluxisse, eoque cohibito nonnulla sanitatis incommoda prodiisse. Zacutus etiam Lusitanus *obs.* 86. lib. 1. *praxis admiranda*, refert aurifabrum quendam, cum ex multo labore juxta fornacem in arden-



tem febrem incidisset, & esset firmus ac fortis, copiosam celebrasse phlebotomiam, cujus vi ita levatus est, ut in 7. die præcedente gingivarum pruritu, & labii inferioris ingenti dolore, ex gingiva inferiori rivuli sanguini profluerent per tres continuos dies, in tanta quantitate, ut libras amplius quinque excederent, & quanto plus sanguinis effluebat, tantò magis remittebatur febris, qua omninò extincta, sanguis sponte suâ cessavit omninò.

Symptomaticè verò sanguis è gingivis profluit, ob suam acrimoniam, & vitiosam hepatis aut lienis constitutionem. Sic in scorbuto familiaris est hujusmodi sanguinis è gingivis effluxus.

Interdum etiam sanguis copiosè profluit à dente avulso, lacerata scilicet arteriolâ, quæ radici dentis inseritur; undè tanta interdum sanguis copia emergit, ut indè quibuldâ mors contigerit.

Fluxus symptomatici curatio perficitur sanguinis de tractione & purgatione, aliisque remediis viscerum affectorum vitia corrigentibus. Quibus succedent topica remedia adstringendi ut prædita, in gargarismatum, seu colutionum pulverum, & linimentorum, aut opiatarum formam redacta. Si evulso dente copiosa accedat hæmorrhagia, revulsio primùm instituenda est per venæ sectionem & cucurbitulas, & parti adstringentia admovenda, quales est cataplasma ex bolo armeno, terra sigillata, sang. dracon. aliisque adstringentibus, albumine ovi exceptis paratum. Tum gypsum solum albumine ovi exceptum sanguinem fluentem potentissimè cohibet. Quæ si non sufficiant, patientis digitus loco imponendus est, ex quo sanguis erumpit, & tandiu detinendus, donec sanguis supra orificium arteriæ coagulatus, non amplius effluat.

Si levioribus hisce sanguis cohiberi nequeat, quod sæpe contingit, ad potentiora veniendum est. Valeriolâ *obs. 3. lib. 5.* refert, in vetula ex dente putrido, sine ulla vi, ac sine ferro evulso, sed solo digito apprehenso & lenissimo concussu educto, ingentem sequutam fuisse hæmorrhagiâ ex arteria gingivæ subdita. Quem sanguinis fluxum cohibuit, cum leviora sistere nò potuissent, chalcitide usta imposita, quæ in sistendo sanguine mirificam vim obtinet: Nam & vehementer astringit, causticâ virtute instar ignis fluorem omnem reprimat. Zacutus Lusitanus *obs. 84. 1. Præneos Medicæ admirandæ*, refert historiam cujusdam qui cum dentis dolore premeretur immaniter, illum violento concussu ferri ope eduxit. Extracto eo, ex laceratâ arteriâ gingivæ subdita, copiosa sequuta est hæmorrhagia, quæ cum venæ sectione, cucurbitulis, & astringentibus appositis cohiberi non potuisset, neque digito vulnere imposito, neque chalcitide ustâ admota, tandem illius consilio, locus pulvere gummi Arabici impletus est, quod auxilium ita profuit, ut post tres horas sanguis fuerit omninò restrictus, hoc enim gummi obstruendi, refrigerandi, glutinandi & exsiccandi vim habet. Idem Zacutus *obs. 85. ejusdem libri* refert militem quendam strenuum dentem, cujus sævissimo cruciabatur dolore, ferro cum extraxisset violentiâ summâ, vehementem passum esse sanguinis fluxum ex arteria, cui dens innitebatur. Sanguine biduo ubertim fluente, peritissimi Medici, omnis generis obstruentia extra apponunt, revellentia consulunt, arteriam candenti ferro inurunt. At incassum omnia: Nam sanguis majori impetu profluens, eum in statum morti valde propinquum, viribus penè exhaustis deduxerat. Vocatus Zacutus Galenicum emplastrum ex aloë, thure, & pilis leporinis exactissimè tritatis, & mixtis cum candido ovi imposuit, quo intra paucas horas sanguis fuit omninò suppressus, & æger à mortis faucibus ereptus. Hoc pretiosissimo auxilio à se primum invento gloriatur Gal. *1. 5. Meth. c. 7.* incisam in Gibbeto arteriam, fuisse conglutinatam, & *c. 4. ejusdem libri*, tum etiam *lib. de curandi ratione per sang. misc. c. ult.* hujus remedii præstantiam confirmat, & quibusdam historiis illustrat.

## CAPUT V.

### De oris & faucium ulceribus:

**L**evia & superficialia oris ulcera vulgo Aphthæ nominari solent, quamvis apud Hip. & Galenum interdum

hoc nomen pro aliarum partium ulceribus usurpatum reperiatur, quæ verò profundius se dimittunt, oris, vel faucium ulcera absolutè nominantur, qualia sunt ea, quæ lue venereâ affectis contingere solent.

Hæc autem ulcera generari solent ab acribus humoribus, aut vaporibus à variis partibus in fauces translatis. Sic in febribus malignis hujusmodi ulcera sæpissimè contingunt, & in iis qui calidiori hepatis, aut aliarum partium intemperie laborant, aut corruptorum humorum illuvie scatent, unde puerulis aphthæ sæpissimè contingunt, ex Hip. *aph. 4. sect. 3.* tum ob lactis acrimoniam, quæ in transitu partes illas mollissimas exulcerat, ut docet Gal. *in comment. illius aphorismi*: tum quia lac in ventriculis puerulorum sæpe corrumpitur, & acres vapores ad os transmittit, ut idem Gal. *assert. 9. de compos. med. sec. loc. cap. ult.*

Variae autem sunt hujusmodi ulcerum differentiae non solum quòd alia leviora, alia deteriora sint: alia pueros, alia adultiores infestent, sed etiam quòd alia cum inflammatione conjuncta sint, alia verò minimè. Hi varii gradus reperiri solent, pro varietate humorum, à quibus generantur. Vel etiam fiunt à sanguine, vel à bile, vel pituita, vel melancholia, seu potius atra bile, quæ non solum exurentem, sed etiam plerumque malignam qualitatem obtinet, & ulcera *αβήγι* generare solet.

Hæc autem differentiae propriis signis distinguuntur; siquidem ulcera rubicundiora à sanguine oriuntur; flaviora à bile, albescentia, à pituita livida, ab atra bile. Foetida putredinem adesse significant.

Quod ad prognosin attinet, aphthæ propriè dictæ facilimè curantur, ulcera verò profundiora, aut putredinem adepta, *ύβήγι* à Græcis appellata difficiliora curantur. Et in pueris illa periculosiora sunt tum propter carnis mollitiem quam hujusmodi ulcera magis depascuntur, tum quod remedia potentiora, ob eandem carnis mollitiem, ferre nequeant: unde fit quod pueri interdum ex hoc affectu intereant, si malignitatem & putredinem comitè habuerint. Ratione causæ, etiam minus periculosa sunt ulcera, quæ à pituita, magis quæ à sanguine vel bile; maximè quæ ab atra bile generantur.

Ulcera nigra & crustosa, pessima & lethalia sunt, præcipuè in pueris.

Fauces exulceratæ cum febre, difficiles sunt: ut docet Hipp. *3. prog.* quia, ut Gal. explicat humoris erodentis malitiam indicant.

Curatio instituitur primùm idoneâ victus ratione, quæ refrigeret & exsiccet, ac causæ antecedentis generationem impediatur. Pueris itaque si à lactis vitio malum contraxerint, nutricis mutatio præcipiatur, aut propriæ nutricis lac corrigatur cibo & potu laudabili, tum etiam venæ sectione & purgatione, si opus fuerit. Præsertim verò nutricibus præscribantur edulia refrigerantia & adstringentia, qualia sunt cidonia pyra, mespilla, sorba, lactuca, & portulaca. In adultis eadem præscribantur, & vitentur acria, salsa, & piperata.

Deinde causæ antecedenti prospiciendum est universalibus evacuationibus, pro ætatis ratione usurpatis. Ac primum phlebotomia humores ad partem fluentes potenter revellit, eorumque acrimoniam temperat, totum corpus refrigerando.

Huic succedere debent cucurbitulæ scarificatæ, hirudines pone aures & sub mento affixæ, vesicatorium posteriori parti admotum.

Posteriâ die à venæ sectione purgatio præscribenda est humori peccanti & ætati congrua.

Eodem tempore, nempe ab ipso curationis principio; topica administrentur, stomatica à Galeno appellata, eaque ab initio mitiora sunt, qualia sunt gargarismata, vel oris collutiones ex aquis plantaginis, matrifylvæ pediculi rosarum, syrupo de rosis siccis, & de moris paratæ. Vel decocta ex foliis plantaginis, rubi, centinodiæ balauistiis, santalo rubro & similibus, cum syrupis prædictis. Et si inflammatio adfuerit, utiliter addi poterunt succi solani semper vivi, portulacæ, & salprunellæ: ea quantitate, quæ acrimonia non feriat, vel illius loco alumen crudum in parva dosi admisceri poterit.



Si non sit inflammatio, unicum ac summum remedium est spiritus vitrioli, aut sulphuris, qui in adultis purus ac putus usurpari poterit, intincto in eum gossipio, bacilli apici alligato, eoque ulceri admoto, levissimo contactu: sic enim aphthæ simplices momento ferè curantur. In pueris verò permiscetur dictus spiritus melli rosaceo, eâ proportionem, ut aciditas linguam leviter feriat, & penicillo ex linteo bacillo alligato, aphthæ illinuntur frequenter, & citò curantur.

Si admodum dolorifica sint ulcera, cum inflammatione conjuncta, lacte frequenter gargarisato demulcentur, vel lactis defectu, emulsionibus sem. frigid. vel mucilag. sem. psyllii & cydon. cum aquis rosar. plantag. & solani extractis.

Si denique dolor pertinax revulsionibus propositis & topicis non sedetur, ab illius vehementia copiosi humores acres continuo attrahantur, undè vigilæ continuæ exoriantur, & corporis consumptio sequitur, quæ vitæ summum periculum mittatur; extremum remedium est ad narcotica confugere, quæ dolorem sedant, & humorum influxum inhibent, eorumque dosis metienda est pro ætate & viribus.

Ego aliquando puerum quatuor annorum ab orci faucibus, Dei beneficio, liberavi exhibitio laudani gr. j. cum ejus fauces & lingua profundis ulceribus scaterent, cum tanta inflammatione, ut nec iuscula, nec topica remedia ferre posset, & tanto humorum acrimia affluxu, ut illi continuo ex ore rivuli instar emanarent, & puer dies noctesque insomnes ejulando transigeret.

Si ulcus sordidum ac putridum evaserit, abluatur primum decocto hordei & melle rosaceo, & in Pueris lacte chalybeato, cum conserva rosarum agitato, mox ad fortiora transeundum est, & in primis mel rosaceum supra laudatum, & guttis aliquot spiritus vitrioli acidum rediditum, multum confert.

Si hæc non sufficiant, aquis, vel decoctis supra descriptis addi poterunt alumenustum, collyrium Lanfranci, vel unguentum ægyptiacum, majori vel minori dosi, prout affectus vehementia postulare videbitur. Si denique à lue venerea faucium ulcus procedat, non nisi lue sublata curari potest.

## CAPUT VI.

### De uvulæ relaxatione.

**U** Vulvæ relaxatio contingit ab humore pituitoso, à capite in eam delabente, cui non raro sanguinis quædam portio admiscetur, & tunc cum relaxatione inflammatio conjuncta est, quin etiam tonsillis frequenter evenire solet. Harum tamen inflammationem curationem omittimus, cum iisdem remediis perfici valeat, quæ ad linguæ inflammationem, & oris ulcera, inflammationi conjuncta, proposita sunt.

Humor igitur pituitosus in columellam defluens, eam humectat, emollit & relaxat: ut longior facta partem superiorem œsophagi tangat, & nauseam pariat.

Tum etiam laborantes bolum quendam in summo œsophago habere videntur, quem frustra devorare conantur, ut hoc solo signo, sine inspectione, uvulæ relaxatio dignosci valeat.

Illius curatio primum ad causam antecedentem dirigenda est, sicque humores à capite fluentes evacuandi, revellendi ac derivandi, iis remediis, quæ in catarrhi curatione fuere proposita.

Topica verò in principio sint adstringentia & repellentia, qualia in gingivarum & faucium ulceribus fuere proposita & in curatione Anginæ capite sequenti proponuntur, quibus postmodum resolventia & exsiccantia erunt admiscenda. Et licet gargarismata, dictis locis proposita, hic utilia sint, tamen ubi nulla est inflammatio, pulverum usus efficacior est: iis enim uvula relaxata potentiùs constringitur & exsiccatur. Atque ita primum admovebitur cortex granatorum subtilissimè pulveratus, cui in progressu tantillum piperis admisceri poterit. Vel

℞. Ros. rub. balayst. cort. gran. an. 3. β. rad. bistortæ, tor-

ment. gallar. immat. ireos Flor. an. 3. j. alum. usti 3. ii. Fiat pulvis. Vulgus Chirurgorum piper longum pulveratum admoveat, quod non vacat periculo, siquidem metuendum est, ne humores affatim à cerebro ad partem affectam attrahantur, & grave aliquod damnum afferant.

Modus autem hujusmodi pulveres adhibendi talis est. Linguæ speculo oris depressa, mox spatula chirurgicâ, aut cochleari perexiguè ad id concinnato, pulvis uvulæ admoveatur: quod pluries in die repetendum est, donec humor columellæ imbibitus prorsus assumptus sit. Ut autem pulvis uvulæ undique aspergi atque insufflari possit, utile est instrumentum à Fabricio Hildano inventum, & descriptum *obs. 22. cent. 2.* quod indè mutuari curiosus quivis poterit.

Denique si relaxata columella prædictis remediis ad pristinum statum reduci non valeat, sed elongata permanens gravem continuo molestiam inferat, ultimum erit, summitatem ejus præscindere. In qua operatione quædam cautiones adhibendæ sunt. Prius desumitur ex Hipp. *progn. text. 21.* ubi gurguliones, inquit, cum periculo secantur, & scarificantur, & aduruntur, quod rubidi magnique fuerint: Inflammatio enim supervenit, & sanguinis fluxus. Sed, hos oportet aliis moliminibus extenuare eniti per illud tempus. Ubi verò pensile fuerit omne id quod uvam appellant, sitque pars gurgulionis summa major ac orbiculata, superior verò tenuior, per illud tempus admolari manus tutum est. Sed præstat, ubi alvum subduxeris, uti chirurgia, si liceat per tempus, ne æger stranguletur. Galenus in comm. hujus loci, verba Hipp. explicans, dicit gurgulionem inflammatione laborantem non esse præscindendum, aut scarificandum; sed eâ tantum sedatâ, ita ut pars superior saltem gurgulionis extenuata sit.

Altera cautio desumitur ex Paul. Æginetæ lib. 6. c. 31. ut scilicet columella ferro non attingatur, quando livida aut subnigra est, nempe malignitatis cujusdam particeps, vel ad canceri naturam accedens. Sed, ex eodem Paulo, in iis operatio tutò perfici potest, quæ tenues sunt, oblongæ, albicantes, & ut ait Hippoc. in suprema parte immixta hujus operationis feliciter peractæ exemplum habemus. Apud Amatum Lusit. *obs. 65. cent. 3.* in quodam studio, qui gurgulionem habebat lori modo oblongum & exsanguem: cui cum nulla remedia profuissent, portio ejus superflua forcipibus præcisa est, & illic oleo vitrioli contacta, sicque æger ab eo incommodo liberatus est.

Tertia denique cautio in hac operatione adhibenda est, ne nimia gurgulionis quantitas abscindatur. Inde enim vocis & respirationis læsionem exoriri docuit Gal. 11. de usu part. cap. 11. & ex integra illius consumptione ut in lue venerea aliquando contingit, tabes & mors non raro subsequuta est.

## CAPUT VII.

### De angina.

**A** Ngina nomen, in genere sumptum, omnem faucium & gutturis affectionem significat, qua respiratio & deglutitio impeditur, nullo existente in pulmone aut thorace vitio. Eaque duplex est, legitima & spuria.

Legitima sit ab inflammatione, quâ masculi faucium & laryngis tumefacti, respirationis & deglutitionis vias coarctant & angustiores reddunt. Illa autem inflammatio vel laryngen occupat, vel fauces, quæ pharyngis nomine enuntiarî consueverunt. Utraque pars musculos habet internos & externos. Ac licet plurimum pharynx & larynx propter viciniam & continuitatem in Angina patiantur; modò tamen hic, modò ille magis afficitur, undè non exigua symptomatum differentia emergit, quorum ratione quatuor à Gal. 4. de loc. affect. cap. 5. propositæ sunt anginae differentia, quas recentiores Græci, qui paulò ante Galeni sæculum vixerunt, propriis nominibus, nimis curiosi (ut idem Galenus cæset) verborum aucupio designarunt, prima vocantes, συνάγχη, secundam αράγχη; tertiam παρασυνάγχη; quartam παρααράγχη. Si inflammatio interiores propriosque laryngis musculos occupet, αράγχη; si interiores pharyngis musculos, συνάγχη; si exteriores laryngis



laryngis musculos, *παρὰ τὸν λάρυγγα*, ac denique si exteriores faucium musculos invadat, *παρὰ τὸν λάρυγγα* appellatur.

Non solum autem plerumque faucium & laryngis musculi simul inflammantur, ut antea dictum est; sed etiam interdum ad vicinas partes & cervicem ipsam exterioriorem inflammatio protenditur, ut in diagnosi & prognosi hujus affectus dicitur.

In hisce omnibus speciebus, cum periculosior est morbus, deglutitione impedita, solent assumpta ad nares resiliere, præcipue liquidiora, quorum deglutitio difficilior est; quod liquida, cum sese latius diffundant non possint tam facile à musculis comprehendere, ut ad oesophagum detrudantur, sed eorum majori contractione indigeant, quæ ob inflammationem sufficienter non fit. Solida verò alimenta cum magis corpulenta sint, superficialia tantum musculorum actione indigent, & levi eorum contractione deglutiuntur. Contingit tamen aliquando, ut solida difficilius, liquida verò facilius deglutiuntur, quod ex partium affectuum diversitate dependet. Siquidem musculi laryngis non solum ad vocem efformandam, sed etiam cibum devorandum destinati sunt. Dum etiam cibus in oesophagum impellitur, larynx cum lingua sursum effertur. Ad potum verò hauriendum magis lingua utimur, quæ dum intus retrahitur, ex labiis liquorem ducit ad fauces. Si igitur musculi linguam moventes magis afficiantur, potus deglutitio difficilior est: Si verò laryngis musculi magis lædantur, cibus difficilius ingeritur.

Hic obiter annotandum Hipp. aliquando, nomine Anginæ, laryngis tantum inflammationem intelligere, & sic magis strictè hoc nomen usurpare. Ejus rei exemplum habetur 6. *Epid. sect. 8. text. 1.* ubi sic loquitur: *Quibusdam verò faucium inflammationes aderant, aliis angine*: Ubi nomine anginæ, musculorum laryngis inflammationem intelligit, & à faucium inflammatione distinguit.

Spuria angina febris est expers, & duplex iterum statuitur. Prima communissima est, quæ ab humore pituitoso producitur, in fauces & partes laryngi vicinas delabente. Alter verò fit à luxatione vertebrarum cervicis, qua gulæ gutturisque introitus premitur & coangustatur.

Veræ anginæ causa, ut & aliarum inflammationum, est sanguis vel sincerus, vel biliosus, vel pituitosus, vel melancholicus, qui è venarum jugularium ramis in dictas partes effunditur, isque vel attractus à calore aut dolore illarum partium, vel transmissus aliunde, si partes illæ debiles aut laxæ ad suscipiendam fluxionem idoneæ fuerint: tum si humorum copia adfuerit in toto corpore, vel in capite, vel in partibus faucibus vicinis. Sanguis enim in toto corpore redundans, vel prava qualitate affectus, dum ad caput transfertur, cerebrum verò robustum est, ab eo non recipitur; sed per easdem venas ad subjectas partes retruditur, unde in iis variæ inflammationes fiunt, parotides, ophthalmiæ, anginæ & similes.

Juvenes anginæ magis obnoxii sunt, quàm senes, quia multo biliosoque sanguine abundant. Tum etiam, qui habitu corporis sunt crasso, ac multo sanguine abundant, præsertim in capite.

Nonnullis auctoribus annotatum est, viros magis esse obnoxios anginæ quàm foeminas: Quod videtur Hipp. observasse 6. *Epid. sect. 7.* Ubi epidemicam constitutionem describens, in qua anginæ, tussis, peripneumoniarum vagabantur, paucissimas foeminas ægrotasse affirmat. Cujus rei non aliam causam refert, nisi quòd minùs in publicum prodibant quàm viri, & ita aeris externi injuriis sese non objiciebant. Quæ ratio propositioni universali non convenit, quòd foeminae minùs anginæ sint obnoxie, quàm viri. Vera autem ratio esse potest, quòd foeminae sanguinem frigidiorum laryngem minorem, & gutturis venas angustiores exilioresque habeant. Quorum ratione partes illæ fluxionem tam facile non recipiunt.

Ad causas internas revocari possunt morbi præcedentes, ut febres continuæ, putridæ, ardentes & in primis epidemice: Qualis fuit illa, quæ recensetur à Foresto *obs. 2. lib. 9.* quæ contigit anno 1517. in qua omnes laborantes gravissimam faucium inflammationem corripiebantur: & intra sedecim aut viginti horas moriebantur, nisi ante sex

Lazar. Riverii Opera,

horas ab invasione sanguis detraheretur. In hac autem hora febris symptomatice non est, sed potius essentialis, & angina illius veluti symptoma, quando materiæ morbiæ pars ad hunc locum propellitur. Fiunt autem in febribus epidemicis aliquando anginæ, alias pleuritides, peripneumoniarum, dysenteriarum, & similes affectus, ab occulta quadam vi, & astrorum influxu, quo nunc hæ, nunc illæ partes magis afficiuntur.

Quidquid autem fluxiones humorum ad istas partes excitare potest, inter causas hujus affectus externas recenseri debet. Talis est austrina constitutio diuturna, juxta *Aphor. Hipp. 16. sect. 3.* *Morbi in pluviarum multitudine magna ex parte fiunt, febres longæ, alvi profluvia, purities, morbi comitiales, apoplexiæ, & anginæ.* Ad hunc etiam affectum producendum maxime facit temporum inæqualitas, quando à calore laxantur partes, & à frigore subito superveniente humores ad eas propelluntur. Idem præstat subita refrigeratio ac incallescencia, frigida potus post eandem: Cum etiam, si caput pluribus tegumentis incalcescat, vel nudum aëri frigido exponatur.

Primæ spuria anginæ speciei causa proponitur ab Hipp. 4. *de vict. rat. in morb. acut. text. 35.* ubi sic loquitur: *Synanche fuit, cum hyeme vereque multa fluxio & viscosa à capite ad venas jugulares descendit. Cum autem frigida & glutinosa fuerit, spiritus obstruit permeationes.*

Alterius denique spuria anginæ speciei causa proponitur ab Hipp. 2. *Epidem. sect. 2.* Tumor nempe seu tuberculum, juxta vertebrae cervicis obortum, ac præcipue illam, quæ dens seu dentiformis ab eodem Hipp. nominatur, à quo tumore vertebrae ad interiora trahuntur, & consequenter cavitas in parte exteriori apparet. Hic autem tumor vel ab humore pituitoso fit, copiâ sua vertebrae à propria sede dimovente; vel à sanguine in musculos effuso, unde inflammatio fit, qua musculi contracti vertebrae ad anteriora trahunt. Et tunc vera est angina, ab inflammatione scilicet dictorum musculorum oriunda. Potest etiam fieri luxatio vertebrarum ab humore pituitoso, earum vincula laxante, & internodia lubrica reddente. Ac denique potest fieri à causis externis, casu scilicet vel percussione, quemadmodum reliquæ omnium totius corporis articularum luxationes.

Angina primò in genere dignoscitur ex illius signis pathognomonicis respirandi nempe, & deglutiendi difficultate, absque aliquo thoracis, aut pulmonum vitio. Dolor præterea circa fauces & guttur percipitur; tum etiam in legitima angina, rubor, calor & febris.

Differentiæ verò propriis etiam signis distingui possunt. In synanche enim minor est respirandi difficultas deglutiendi verò maxima, ut liquida vix transire possint, sed potus ferè per nares rejiciatur.

In Parasyynanche minor est respirationis difficultas, imò perexigua, cum musculorum faucium externorum inflammatio parum respirationi officiat. Dolor etiam & rubor foris in cervice percipiuntur, cum inflammatio partes externas occupet.

In Synanche maxima est respirationis læsio, ita ut ægri strangulari videantur; & paucis etiam horis aliquando strangulentur, ac non nisi erectâ cervice, & aperto ore spirare valeant. Fauces vehementer dolent, nullus tamen rubor aut tumor, neque in faucibus intus, neque extra in cervice apparet. Lingua livida est, nigra, inflexa vel retorta, ob summam venarum circa linguam repletionem. Acutissima etiam febris adesse consuevit. Hujus speciei descriptionem accuratam videre est apud Hipp. 3. *de morbis.* Hoc autem notatu dignissimum est, quod tamen à paucis animadversum non tantum in hac specie musculos laryngis interiores affici, sed ipsum etiam pulmonem, unde tanta respirationis difficultas & suffocatio exoritur, quod à Dodonæo luculenter observatum est *obs. medic. c. 18.* ubi refert historiam cujusdam lanionis, qui cum meridie circa laryngem & fauces dolorem sensisset, & quamdam in deglutiendo cibo ac potu difficultatem, nocte strangulatus interiit. Hujus in corpore aperto inventa est pulmonis substantia in pus conversa. Alia exempla annotavit anno 1565. in quo multi angina correpti, apparente circa

H h

laryn-



laryngem dolore, & tandem desinente, in peripneumoniâ inciderunt, iisque defunctis pulmones vel purulenti fuere, vel abscessum habuere: juxta verò laryngem, aut ejus musculos nihil occurrit, quod vel adesse, vel adfuisse inflammationem ostenderet. Et in his casibus censet laryngem non primario, sed per consensum laborasse & verisimile esse, destillante humore à capite, asperam arteriam ejusque ramos impleri atque distendi, deindè eodem ad alia vasa transmissio, asperam arteriam & laryngem dolore liberari, pulmones verò affici, & hoc modo ex angina in peripneumoniâ permutationem fieri. In hac autem angina pulmonem non rarò affici, colligere possumus ex dictis Hippocr. quæ habentur 4. *acut. text.* 30. & 31. ubi duas anginae species proponit pro humoris diversitate: Alteram, in qua fluxio pituitosa, hyeme & vere, ad venas jugulares fertur, alteram in qua humores biliosi infestant, quod æstate & autumno contingit. De hac autem posteriori sic loquitur: *Cum ex capite fluierit calida & nitrosa fluxio, upotè acris, mordet, ulcerat, spiritu implet, orthopnoeam parit, siccitatemque multam. Præterea, quæ intuenti apparent, haud quaquam tumentia videntur: Tendines quoque cervicis posteriores contenduntur, apparentque tetani modo intendi. Vox abrupta, spiritus parvus, spiritusque revulsio frequens & violenta accedit. Talibus arteria ulceratur, intenditurque pulmo, neque extremum aërem admittere intro queunt.* Hæc Hippocrates. Dicit autem calidam & acrem fluxionem orthopnoeam parere, quia mordet, ulcerat, & spiritu implet. Feruntur enim spiritus ad locum demorsum, hinc pulmonis repletio, unde orthopnoea, cum non sit locus, in quem externus aër admittatur, quantumcunque thorax dilatetur. Eandem sententiâ confirmare videtur Hippocr. 3. *de morbis*, ubi in curatione Anginae dicit, venam secandam esse sub mamma; nam hac parte concomitatur ex pulmone spiritus calidus. Et paulò post inquit: Faciendum, ut quàm certissimè spuat, & pulmo gracilis fiat, quasi intumuerit pulmo ex spiritu calido replente. Notissimum autem est: Cum spiritus ad partem aliquam deferatur, magnâ copiâ cum eo etiam sanguinem transferri. Hic si tanta copia affluat, ut à natura commodè regi nequeat, inflammationes & abscessus efficere solet: Undè non mirum est, si in tali angina pulmones purulenti evadant.

In parachynanche respiratio minus difficilis est, quam in cynanche: Difficilior autem, quàm in synanche. Rubor ac tumor aliquis in faucibus deprehenditur.

Angina spuria ex pituita dignoscitur, febris carentia, & humore pituitoso, ad os magnâ copiâ confluyente.

Spuria verò angina, ex luxatione genita, cognoscitur ex motu capitis ac cervicis læso, & cavitate, quæ in cervice præternaturaliter apparet, ob vertebrae intus depresso.

Causarum dignotio cum ex universalibus humoris in toto corpore dominantis, signis elicitur, tum etiam particularibus. Quando angina fit à sanguine, in facie calor & rubor apparent, & major distensio in parte affecta. Quando fit à bile, dolor & calor major est, cum siti, oris amaritudine, & acrimoniæ sensu. Et si à pituitoso sanguine fiat, dolor & rubor minor est & febris exigua.

A parte affecta quædam etiam humoris peccantis diagnosi haberi potest. Sanguis enim biliosus plerumque in laryngis musculis potius inflammationem facit: Pituitosus fauces magis aggreditur. Cum enim exiles sint laryngis venæ, non nisi sanguis tenuis ad eas penetrat. Fauces verò quæ laxæ & spongiosæ sunt, pituitosos humores faciliè recipiunt.

Denique ex anni tempore humoris peccantis diagnosi desumi potest. Anginae enim biliosæ maximè æstate & autumno proveniunt, quod in æstate bilis generetur, & in autumno retineatur. Pituitosæ verò hyeme & vere fiunt, quod hyeme maximus sit pituitæ proventus, tum etiam vere: Quia collecti humores in hyeme, tum temporis liquantur, & à capite in partes subjectas decumbunt.

Quod ad prognosin attinet, angina vera morbus est acutissimus, & valdè periculosus, propter respirationem impeditam, & strangulationem, quæ non rarò contingit à constrictione meatus, per quem fit respiratio. Idèò quò major sit constrictio, eo majus periculum. Et sic prima

species anginae omnium periculosissima est, quia inflammatio musculorum internorum laryngis meatum magis præcludit. Undè Hip. *Aphor.* 34. *sect.* 4. sic loquitur. *Si febrem habenti suffocatio repente superveniat, nullo tumore in faucibus existente, lethale est.* Quam sententiâ confirmat in *Coac.* & *progn.* dicitque hujusmodi anginas eadem die 2. 3. & 4. strangulare.

Secunda species anginae, licet admodum periculosa sit, paulò minùs tamen lethalis est, quàm prima; quia inflammatio musculorum externorum laryngis tantam, tamque subitam constrictionem non facit. De hac loquutus est Hip. 3. *prog. text.* 17. his verbis. *Quacunque verò, id est anginae, dolorem alioquin alteri simile inferunt, in faucibus verò tumorem & ruborem excitant, valdè quidem lethales sunt; præcedentibus verò diuturniores, si rubor fuerit magnus.*

Tertia species minùs periculosa est, quia in ea minùs læditur respiratio, quàm deglutitio ab inflammatione musculorum faucium internorum. Læsa autem deglutitio non adeo periculosa est. De hac etiam loquitur Hip. *lib. antea citato, textu* 18. his verbis. *Si quibus verò fauces rubent, & cervix, hæ diuturniores sunt. Maxime verò ii servantur, si cervix ac pectus traxerit ruborem, nec sacer ignis intro recurrit.*

Quarta denique anginae species omnium levissima est & securissima, quia inflammatio longius à gutture abest. Hinc Hip. *Aph.* 37. *sect.* 6. sic loquitur. *Anginâ correpto, si tumor in collo apparcat, bonum: Extra enim vertitur morbus.* Idem confirmat, *progn. text.* 20. his verbis: *Securissimum verò si tumor aut rubor quam maximè foras vertatur.*

Has omnes differentias unicâ sententiâ complexus esse visus est Hip. 6. *Epid. sect.* 7. ubi signis anginae Epidemicæ loquens, hæc habet: *In summa qui solum deglutire non poterant, his valdè mites & tolerati faciles erant, pessimæ verò his, quibus unâ spiritus sublimis erat.*

Si anginae materia in pulmonem transferatur, vel moriuntur agri, vel in desipientiam aguntur; vel empulsi fiunt, ut docet Hip. *Aph.* 10. *sect.* 5. & 3. *progn.*

In angina valdè urgente, si spuma circa os appareat, lethale est ex *Aph.* 24. *sect.* 2. Summam enim cordis angustiam significat, fervoremque intensissimum, à quo propria pulmonis humiditas exprimitur & ad spumæ formam in os transfertur.

Anginâ laborantes, nisi celeriter cocta exspuant, sed pauca, viscida, crassa sputa reddant, malè & lethaliter habent. Hip. in *Coacis.*

Tumores faucium in angina, sine ulla ratione repente evanescentes lethales sunt. Hip. in *Coacis.* Sine ulla ratione, id est, sine præcedente evacuatione, per artem vel crisi facta. Significant enim materiæ ad interiora recessum, unde periculosior morbus in partibus internis excitari potest. Vel quod interdum accidit, materia ad eandem partem iterum delata, subito suffocationem inducit.

Anginae curatio iisdem indicationibus perficitur, quæ in omnium inflammationum curationibus observari consueverunt. Sicque humor ad partem confluens, revellendus & replendus est: Qui jam fluxit, derivandus & resolvendus. Quod si reitrovi nequeat, concoquendus & suppurandus: Quæ omnia sequentibus præfidiis perfici poterunt.

Primò victus ratio instituetur tenuissima, refrigerans & humectans, ex cremore hordei, jusculis pullorum, aut caponum, herbis refrigerantibus alteratis, & aliis hujusmodi. Si ob oesophagi angustiam, ab inflammatione contractam, æger deglutire nequeat, ut inde virium defectio & interitus metuatur: Ab eo periculo liberari poterit, immisso in oesophagum cathetere, cui syringa aptabitur, per quem jusculum in ventriculum immitti poterit. Præctici clysteres nutrientes usurpant, quibus aliquid nutrimenti ad hepar per venas mesaraicas transferri potest. Potus sit aqua hordei, & reliqua in febribus acutis observari solita. Aër sit temperatus, & omnis illius excessus arceatur. Frigidior namque meatus constringit. Calidior verò fluxionem & inflammationem auget. Æger capite sublimi, & erectâ cervice decumbat, ut faciliùs respiret. Somnus, ut in omnibus internis inflammationibus, maximè arcendus est. Nam, ut docet Hippoc. sanguis in



in somno ad interiora recurrit, sicque humorum confluxus ad partem affectam augetur.

Cum autem angina sit morbus acutissimus, & uno interdum die hominem de medio tollat; magna remedia summa cura & diligentia usurpanda sunt. Ideo quacunque diei hora vocetur Medicus, sanguinem statim detrahat è directo partis magis affectæ, è vena cephalica: Aut si ea satis conspicua non sit, è mediana, ad *tt. i. tt. i. s. tt. ii.* quantum vires ferre poterunt. In hoc enim remedio præcipua salutis spes constituenda est. Non tamen una vice magna illa sanguinis copia detrahenda est, ne æger in animi deliquium incidat, ex quo non exiguum vitæ periculum emergeret; sed partitè, & per aliqua intervalla, tertia nimirum, aut quarta quaque hora. Hæc autem sanguinis missio tantoperè est necessaria in hoc affectu, ut à nullo contradicente retardari debeat. Si fluentibus menibus aut lochiis, & quocumque graviditatis tempore, sanguis magnâ copiâ detrahendus est. Cujus rei exemplum habemus apud Zacutum Lusitanum *lib. Praxis admir. cap. 135.* de quadam muliere, quæ gravida septimestris, anginâ sævâ correpta, septies unâ die phlebotomiâ celebratâ, liberata est.

Si morbus non vehementer urgeat, venæ sectioni præmittatur clyster laxans: Sin minus, à venæ sectione injiciatur.

Dum iteratur phlebotomia eadem die, aliæ revulsiones fiant per cucurbitulas, tum siccas, tum scarificatas, scapulis & lumbis admotas, item frictiones partium extremarum & ligaturas dolorificas.

Detraçto sufficienter sanguine, ad purgationem veniendum est, quæ sequenti die usurpanda, non expectata humorum coctione, quia morbus non dat inducias. Sit potio purgans humori peccanti accommodata. Imò verò si morbus admodum urgeat venæ sectio & purgatio eadem die celebranda est, ut se fecisse refert Trallianus *lib. 4. c. 1.* his verbis: *Ego sanè memini me, cum usus valde urgeret, venam manè aperuisse, diluculo venas lingvæ subiectas secuisse, & vespere ex cremore ptisanæ extractum scammonii exhibuisse, atque ita liquorem ex inflammatione abortum, vix potuisse dissolvere. Imò alium quendam novi me postquam brachiorum duorum venas in cubito secuissem, repurgasse, sequenti die non expectato.* Potio autem purgans ex blandioribus esse debet, si à bile morbus originem duxit, ne vehementius commoti humores ad partem affectam irruant. Tum etiam si à sanguine sincero producatur inflammatio, satius est, purgatione prorsus abstinere. Si verò pituitosa cacochymia concurrat, ad fortiora confugiendum, & cum fenna agaricus & diaphoenicū præscribi possunt. Imò verò ad ea medicamenta, quæ vomitum excitant, etiam satis vehementia, transcendere licet in angina pituitosa, & inter reliqua palmam obtinet in hoc casu aqua benedicta, quæ ad *3. ii.* exhibita miranda præstat, & morbum ut plurimum inter duas horas dissolvit. Adde, quod nullo ingrato sapore prædita, faciliè pituitando ingeri possit, quod in aliis medicamentis fieri non potest, quæ propter saporis ingratitudinem non possunt nisi uno haustu ab ægrotis forberi. Ideo ut plurimum anginosi purgari nequeunt, donec meatuum angustia majori parte sublata sit. Sed frequentibus clysteribus purgandi indicationi aliquo modo satisfiat. Atque ita, quibus aqua benedicta non convenit, propter inflammationis naturam, vel ægri imbecillitatem, (vires siquidem robustæ in hujus remedii usu necessariae sunt) neque alia medicamenta exhiberi possunt, frequentibus clysteribus alvus subducenda est, iisque satis acribus, ut revulsio humorum ad inferiora fiat.

Ad eandem revulsionem cucurbitulæ scarificatæ, cervici & scapulis admotæ, frictiones & ligaturæ partium inferiorum, & lotiones pedum ex aqua calida plurimum conferre solent.

Ac potentiùs revellit humores, à capite defluentes, vesicatorium posteriori parti cervicis admotum, quod statim ab initio post sanguinis missionem admovendum est.

Revulsionibus sufficienter ac diligenter administratis, ad derivantia veniendum est, quæ humorem parti impactum evacuant. Ac primum ranularum, seu venarum sub lingua apertio, ab Hipp. Gal. & recentioribus commen-

datur, qua sanguis, inflammationem immediatè efficiens, educitur.

Antiqui in angina desperata venas jugulares aperiebant. Quod remedium licet à recentiorum plurimis etiam comprobatum, nostris ferè temporibus obsolevit, quod periculosum censeatur, ob sanguinis fluxum, qui difficilè cohiberi potest, propter venarum amplitudinem. Verum experientia docuit, non adeò periculosam esse hanc operationem, si debite administretur. Primò enim caput ægrotantis ad latus intorqueri debet, quantum fieri potest, ut mentum humerum ferè attingat, mox vena aperienda sine ligatura, angusto foramine, secundum illius longitudinem, (sic enim faciliùs coalescit) & extracta sanguinis quantitate sufficiente, caput reducendo ad situm naturalem, sanguis plerumque sponte cohibetur. Attamen vulneri statim admovendum est emplastrum à Gal. descriptum *5. meth. cap. 4.* ex pilis leporinis, aloë, thure, & albumine ovi confectum, sicque fluxus sanguinis certò cohibetur. Refert Trallianus *lib. 4. cap. 1.* plures anginosos, venarum jugularium apertione à se curatos esse, & Zacutus Lusitanus *obs. 89. lib. 1. Prax. admir.* refert historiam cujusdam Hispani, qui hujus auxilii beneficio, ab acutissima angina liberatus est.

Ad derivationem etiam plurimum confert cucurbitula sub mento scarificata: Cujus ope curatum fuisse mulierem angina caninâ laborantem, refert Zacutus Lusitanus *obs. 88. lib. 1. Praxis admirand.*

Non minoris efficacis sunt scarificationes sub maxillis, & supra collum; altioribus plagis infligitæ: Quarum beneficio scribit Benivenius *lib. de abditis morb. caus. cap. 83.* Nicolaum Rotam à deplorata angina liberatum fuisse, cujus integram historiam transcripsit Sennertus. *Prax. Med. lib. 2. p. 1. cap. 24.*

Dum prædicta remedia usurpantur, topicis remediis inflammatio gutturis & faucium oppugnanda est; eaque varianda, juxta varietatem temporum, ut in aliis inflammationibus, Sicque in principio conveniunt repellentia, ad gargarismatis formam redacta, ut partem inflamatam immediatè attingere valeant.

*℞.* Aquar. plantag. solani & caprifolii, ana *3. iii.* succi granator. *3. ii.* diamori. *3. iii.* salis prunellæ *3. i. s.* Fiat gargarisma. Vel ex decocto in hunc modum.

*℞.* Fol. Plantag. acetosæ, & summit. rub. an. *M. j.* granorum sumach. *3. s.* malum granatum cum cortic. & granis contusum num. *i.* rosar. rubr. *P. i.* Fiat decoctio ad *tt. i.* In colatura dissolve diamor. & dianuc. ana *3. i. s.* salis prunellæ *3. ii.* Fiat gargarisma.

De gargarismatis hoc notandum, ea suspecta esse posse, quia gargarizando partes inflamatæ commoventur, quæ quiete indigent. Sed hoc incommodum vitari potest, si gargarismata in ore detineantur, resupino corpore, citra ullam agitationem, ut partem affectam contingant.

Sine gargarizatione usurpari possunt spiritus acidi, salis, sulphuris, aut vitrioli, qui aqua temperati, ut eorum aciditas ferri valeat, paulatim sorbendi sunt. Transeundo enim per partem affectam, illius inflammationem temperant, & à ventriculo ad hepar & venas translati, sanguinis fervorem coercunt. Quod remedium in faucium & tonsillarum inflammationibus est etiam efficax.

Dum gargarismata repellentia usurpantur, laxantia & resolventia linimenta exterius cervici admovenda sunt, ut materia morbifica exterius evocetur, eaque in hunc modum parari poterunt.

*℞.* Olei chamomil. lilior. & amygdalar. dulc. ana *3. i.* axungia gallinæ, & butyri recentis, an. *3. j. s.* croci *3. i.* Fiat linimentum cervici admovendum, cum lana succida.

Hoc linimentum dolori leniendo etiam conferre poterit: Qui si vehementer urgeat, demulceri ulterius poterit gargarismate ex lacte parato, vel emulsione quatuor sem. frigidior. major. vel mucilaginis liquidis ex sem. psyllii & cydonior. cum aqua rosarum extracti, addito syrupo violaceo, vel diluto cassiæ, cum sero lactis aut decocto radicis althææ parato.

Transacto morbi principio, eoque ad augmentum & statum progrediente, in gargarismatis digerentia & resol-



ventia repellentibus admiscenda sunt, quod secundo statim die faciendum, quia morbus acutissimus est.

2. Fol. hyssopi & plantag. ana M. i. liquiritiæ rasæ & passulæ mundat. an. 3. i. caricarum ping. num. xii. rosar. rubr. & hordei integri ana. P. j. Fiat decoctio ad lb. i. In colatura dissolve mellis rosac. & syrup. violac. ana 3. i. Fiat gargarisma.

Nota, quandiu viget inflammatio, resolventibus & adstringentibus aliquid repellentium semper esse admiscendum, ne pars suâ naturâ mollis & laxa magis relaxetur, & fluxioni recipiendæ magis idonea reddatur.

Exterius verò magis resolventia admovenda sunt, addito etiam nido hirundinum, quem specificâ proprietate huic affectui conferre, omnium practicum consensu sancitum est.

24. Pulveris nidi hirundinum, & stercoreis canis jejuno macerati, an. 5. i. rad. ireos Florent. & flor. chamom. pulverat. an. 3. f. axurgæ gallinæ, & olei lilior. ana 3. j. ceræ flavæ parum. Fiat linimentum.

Vel formâ cataplasmatum in hunc modum componi poterit.

24. Nidum hirund. num. 1. fol. malvæ, violar. an. M. i. rad. althææ & lilior. an. 3. f. ficuum ging. par. iii. flor. chamom. & meliloti, ana P. i. Coquantur & contundantur, deinde adde farinæ hordei, sem. lini & fœnugr. ana 3. iii. croci 3. i. butyri recent. 3. i. olei chamom. & amygdal. dulc. ana q. f. Fiat cataplasma interiori colli parti admovendum.

Interim etiam eclegmata per intervalla usurpanda, ut materia, quæ à parte affecta exsudat, vel à capite defluens ipsi hærescit, sensim abstergatur.

25. Pulv. elect. diatragacanth. frig. 3. ii. diatrios simpl. 3. i. sacchari canti & penidiati, an. 3. β. diamor. 3. i. syrupi pūb. q. f. Fiat looch.

Si tumor discuti nequeat, & ad suppurationem vergat, quod plerumque quarto vel quinto die solet accidere, ea adjuvabitur cataplasmate prædicto, aliisque emollientibus & suppurantibus. Simulque in ore frequenter erunt detinenda, quæ dolori leniendo supra proposuimus. Vel

26. Liquirit. ras. & passul. mund. an. 3. j. caricarum ping. num. vi. sem. althææ & cydonior. an. 3. ii. flor. chamom. P. i. Coquantur in hydromelite. In colatura dissolve sap. 3. ii. Fiat gargarisma.

Utile etiam est medullam cassiæ recentem extractam ore detinere, ut paulatim liquefens in gulam descendat, lenit enim, resolvit, & maturat.

Si tumor tandem suppuratus fuerit, quod ex symptomatum remissione cognoscitur, nec tamen is sponte rumpatur, æger aut aliquis ministrorum, digitis in fauces immittit abscissum rumpere conetur. Quod si fieri non possit, ægri os per speculum oris valdè aperiatur, & ubi apparuit tumor, scalpello incurvo quod bistortum vocant, incidatur. Ruptâ vomitâ, æger caput inclinet, ne plus in pulmones irrumpat. Postmodum ulcus decocto hordei cum melle rosaceo hydromelite, aut œnomelite detergendum, deterfum aquâ aluminosâ exsiccandum, & ad cicatricem perducendum.

Alii candelam ceream oleo amygdal. dulc. illitam in œsophagum mittunt, ut rumpatur abscessus. Quod si obtineri non possit, cultro ligneo acuto, vel tandem scalpello aperiunt.

Alii oleo vitrioli abscessum attingunt, & mox plerumque rumpitur abscessus. Arculanus cuspide ferreâ, ligno infixâ, apertionem abscessus molitur, ne alias oris partes attingat. Idem remedium probat Faventius his verbis: *Accipiat lignum subtile rotundum, in cuius extremitate apponat ferrum acutum, cuius longitudo sit tantæ quantitatis, quantæ est medietas digiti: Deinde ore aperto, ponendo lignum intra dentes ægrotantis, ac si esset frænum, ponat cannulam illam cum ferro ad locum apostematis, ac scindat. Aperto apostemate, pronus declinet caput inferius, ore aperto, ut exeat sanies.*

Schenkius ex Dovyneto, decocto agarici abscessum rumpi asseverat, & sequenti historia confirmat, ab eodem Dovyneto relata *apologie lib. 3. cap. 1. Illustris mulier, Gabriella Gouffier, Domina à Sauliomo, cum angina Autumnali*

*li omnium periculossima detineretur, venit in mentem, legisse me apud Aëtium lib. 15. c. 6. agaricum oculos abscessus absorbere, vel foras materiam evocare. Statim agaricum in talleolas concisum in decocto radicis althææ, ficuum, cum momento zinziberis, & quarta parte vini albi macerati, addidi syrup. de althæa. portionem ægrotæ dedi, monuique ne illam statim deglutiret, sed aliquod tempus in imis faucibus contineret, si hac potione vitam sibi redimere vellet. Obsequitur ægrotæ. Interim dum cum illa sermonem conferebam, ecce magna puris albi copia, tum puridi, & graveolentis ore rejicitur, ut filia, quæ ad matrem cum p. lvi adstabat, excipiendo puris ergo, nec opinato prægravi illius puris fœtore, conciderit animo, reliqui custodes magnæ corporis contentio foras proruperint, (accurrunt alii, purulenta detrahunt, detergunt, festinant aliæ, ut inolerabilem gravis odoris fœditatem suffiu quodam depelleret, quâ sublata ad ægrotam redii, quam planè & vocis vinio, & respiratione difficili, & gravi deglutiitione, & febre levatam reperi, & ab omni vitæ periculo tutam, quæ nunc fruitur incolumis.)*

Si pus ad partes externas quodam modo vergere videatur, apertio exterius molienda est, quod se feliciter præstitisse refert Lanfrancus, Chirurgiæ majoris doctrina 2. tract. 3. cap. 5. his verbis: *Quoniam bona casuum variatio multum corroborat operantem, ponam hoc loco, quid mihi accidit in civitate Mediolani, de quadam Domina quinquagenaria quinta, quæ squinantiam phlegmaticam patiebatur, quæ totam occupavit gulam, intus & extra, ita ut extra tumor maximus appareat, & cum his non loquebatur, nec poterat transglutire. Cùm essem vocatus, tangens pulsum, in ultima inveni debilitate. Tangens locum corruptum, sensi materiam in profundo, & cognovi quod potius suffocaretur, quam exterius apostema, vel interius rumpere. Tunc mihi præparavi rasorium, & locum palans cum digitis, inveni maturam materiâ inter mentum & epiglottum, plusquam in alio loco congregatam, & vulnus ibi feci profundum, per quod de corrupta & malè fœtente materia magnam partem extraxi, magnamque partem dimisi, quam tunc evacuare poteram, secundum rationem nolui, quam scivisti. Tunc ægra leniorem habuit anhelitum, pulsusque fuit fortificatus. Tunc administravi ei brodium, per vulnus magna ipsius quantitate exibat, tunc ingeniavi, ut cum argentea cannula, quæ posita in ore totum vulnus transibat, suâ curâ reciperet ad ipsius necessaria nutrimenta: Gulam totam, & collum cum medicinis mundificantibus, & residuum materiæ maturantibus circumdabam donec extrahi de vulnere frustum magnum viscosæ materiæ, & fœtentiæ, quæ fuerat sicut quoddam intestinum, longius unius majoris digiti quantitate, quæ quidem materia calore fuerat exiranco condensata. Quæ remota, remansit locus sine fœtore, & ægra incepit maxime confortari, tamen in ea continuavi mūdificativa, & incarnativa, & cicatrizativa vulnus optimè sigillavi, & ægra fuit saluti pristina restituta.*

Huc referri potest historia Benivenii, cuius supra mentionem fecimus, de quodam anginoso, qui cùm ab aliis Medicis pro deplorato relictus fuisset, ab eo liberatus est profundis scarificationibus sub maxillis & ipsa cervice celebratis, à quibus multa sanies effluxit.

Si abscessus intus in ore rumpatur, decocto hordei, aut hydromelite, ut dictum est, detergitur. Verùm aliquando ulcus sordidum redditur, & tunc ad potentiora remedia confugiendum est, in hunc modum.

27. Fol. scabiosæ & agrim. ana M. j. nucum cupressi 5. j. rad. ireos Florent. & aristol. rotund. ana 3. f. myrrhæ 3. β. rosar. rubr. P. ii. Coquantur in hydromel. ad lb. i. Colatura colluantur frequenter ulceratæ partes.

Hoc decoctum ulceri sordido abstergendo plurimum conferet; attamen si non sufficiat, ad collirium Lanfranci confugiendum est, quod mirabilis est efficacia.

Ulcere probè deterfso illius consolidatio molienda est, bolo armena, melle rosaceo permixto ad formam eclegmatis, cui etiam thus & myrrha utiliter addi poterunt.

Fit autem interdum, ut deservente inflammatione tumor neque resolvatur, nec suppuretur, sed duritiem contrahat. Quo in casu cataplasmatum emollientibus & resolventibus curatio perficienda est, eaque in hunc modum componi poterunt.



2℥. Rad. althææ, bryoniæ, & cucumeris agreft. an. ʒ. j. fol. malvæ, parietariæ, origani, & centaurii min. ana M. i. caricarum ping. par. vi. sem. lini & fœnugr. ana ʒ. i. Coquantur, pistentur, & per setaceum trajiciantur; deinde adde pulveris hirundinum combustarum, & stercoreis canis ossa rodentis, ana ʒ. iii. sulphuris vivi ʒ. i. butyri recentis, & axungia anatis, ana ʒ. i. olei anethini ʒ. ii. Fiat cataplasma.

Pro coronide aliquid dicendum est de Laryngotomia, quæ ab antiquis, & à neotericis non paucis proponitur, & propriis experimentis confirmatur. Cum nempe in angina desperatâ quâ ægris suffocatio omnimoda præ foribus est, incisio fit in aspera arteria, per quam aëri ingressus datur in pulmonem, & fuliginum ab eodem expirantium egressus. Hanc probat Avicenna *Fen. 9. lib. 3. cap. 11*. Paulus *lib. 6. cap. 33*. Rhafis *3. continentis*. Alfaharavius, Avenzoar, Albucasis, & Halyabbas. Eandem ponit Gal. ex Asclepiade in *introductione*, cap. 13. Ex recentioribus Braffavolus *comment. in lib. 4. Hip. de victu ratione in mor-*

*bis acutis, sect. 35*. se propriis manibus hanc operationem fecisse testatur, cum felici successu. Rarissime tamen in usum revocatur hæc operatio, propter metum infamiae, quæ Medicis & Chirurgis impendit, dum æger post operationem occumbit, quod ut plurimum contingit & mors operationi potius, quàm morbo tribuitur, quantumvis Medicus præmissis prognostico sese adversum calumniam munierit. Adde, quod in angina valde pituitosa pulmones plerumque affecti sint, & multis humoribus repleti, unde plerumque suffocatio contingit, & tunc incisio asperæ arteriæ nihil conferre potest. Quæ advertens pericula Hieronymus Fabricius ab Aquapendente, Chirurgus expertissimus, se hanc operationem nunquam molitum esse, neque eam à sui temporis Chirurgis administratam fuisse testatur. Eam tamen posse in usum revocari fatetur, modò pulmo & aspera arteria colluvie non sint repleta. Operandi modum exactè describit in operationibus Chirurgicis, & capite proprio, quem inde desumere quis poterit. Confert Fontanum de laryngotomia.

# PRAXEOS MEDICÆ LIBER SEPTIMUS.

## DE MORBIS THORACIS.

### PRÆFATIO.

**T**HORACIS nomine comprehendimus eas tantum partes, quæ respirationi inserviunt. Licet enim Cor thorace contineatur; illius tamen affectus peculiari libro, qui hunc sequitur, exponendi sunt. In hoc verò eos tantum exponemus, qui respirationem lædunt, & partes respirationi inservientes frequentius infestant, quales sunt asthma, pleuritis, peripneumonia, empyema, hydrops pectoris, hæmoptoe, & phthisis, quorum unicuique caput proprium destinavimus.

### CAPUT I.

#### De asthma.

**R**espiratio læditur à variis causis, tum sympathicè, tum idiopathicè.

Idiopathica respirationis læsio fit ex vitiato pulmone, atque adeo omnes pulmonis morbi actionem illius lædunt, qui eandem morbi vel in ipsa partis substantia, vel in vasis vitiis resident.

In pulmonis substantia contingunt inflammationes, tubercula, abscessus, ulcera tum etiam interdum ipsius partis exsiccatio & atrophia: Interdum & humor serosus ac pituitosus spongiosæ pulmonis substantiæ imbibitur, & liberam ipsius dilatationem impedit. Rarius scirrhi, & carunculi, & grandines in eadem parte generantur.

In pulmonis vasis frequentissimæ sunt obstructions, quæ liberum aëris com meatum impediunt, difficilem faciunt respirationem.

Sympathicè læditur respiratio ex consensu aliarum partium, non solum vicinarum, sed etiam remotiorum. Sic inflammata membranâ costas succingente, vel diaphragmate, vel mediastino, respiratio læditur. Sic corde intemperie calidâ laborante, ut in febribus, aucto respirationis usu, magna & frequens respiratio evadit: Contra verò, eodem frigida intemperie laborante, ut in moribundis, imminuitur, & tandem omnino cessat. Idem contingit in syncope, cessante actione cordis, & consequenter cessante respirationis usu. Sic in empyemate aut hydrope thoracis, pus aut aqua in capacitate thoracis, collecta, pulmonis dilatationem impedit & respirationem lædit. Sic musculorum respirationi inservientium læsio eandem actionem vitiat, ut in vulneribus ac tumoribus eorum contingit: Tum præcipue

in apoplexia, denegato influxu spiritus animalis ad eos musculos. Musculorum etiam laryngis inflammatio spirandi difficultatem efficit in angina.

Affectus etiam hypochondriorum sympathicè respirationem lædunt, ut tumores hepatis, lienis, pancreatis, pondere suo diaphragma, cui annectuntur, ad inferiora retrahunt ejusque motum liberum impediunt. Sic etiam vapores & flatus, ab illis partibus elevati, diaphragma comprimunt, ejusque actionem lædunt, unde asthma flatulentum exoritur. Idem contingit à flatuum vel serosi humoris copia, in hydropicorum abdomine contenta, & diaphragma cōprimente. Ab utero denique vapores elevati respirationem vitiant, unde hic affectus suffocatio hysterica nominatur.

Inter prædictas respirationis læsiones asthma ab auctoribus seorsum tractatur, quia reliquæ ab aliis morbis dependent, suis locis explicandæ.

Licet autem asthma interdum, genericè & latâ significatione usurpatum omnem spirandi difficultatem complectatur, in specie tamen eam imprimis significat quæ à pulmonum infarctu & bronchiorum illius obstructione exoritur, quæ ex se & ratione propriæ essentia febre carere solet, licet interdum febris ei adjungi valeat. Et iterum in tres alias species subdividitur, quarum una Dyspnœa nominatur, secunda idem Asthmatis nomen retinet, tertia verò Orthopnœa nuncupatur.

Dyspnœa est difficilis respiratio, in qua crebrior densiorque fit spiritus tractio, ex infarctu pulmonum oriunda. Hæc Asthmate & Orthopnœâ minor est, & à minori materiæ obstruentis copiâ oriunda, & magis ipsam pulmonis substantiam obstruit, quàm bronchia, unde stertoris carentia, qui fit ab humoris, in bronchiis pulmonis contenti & commotione, & allisionibus cum aëre, per ea continuò oberrante.

Asthma & magna & frequens respiratio, in qua diaphragma, muscoli intercostales, tum etiam abdominis violenter moventur, cum stertore & sibilo conjuncta. In vero enim propriè dicto asthma bronchia pulmonis humore pituitoso opplentur, qui (ut dictum est) ab aere commotus talem strepitum edit.

Orthopnœa verò est maxima spirandi difficultas, sub qua ægrotantes non nisi sedentes & erecta cervicæ respirare possunt & non solum muscoli prædicti, sed etiam superiores



riores, pectoris scil. & scapular. vehementer exagitantur.

Dyspnœa etiam & Orthopnœa nomen, quemadmodum de asthma diximus, communiter non raro in omni difficultate spirandi usurpatur, quæ in pleuritide, peripneumonia, aliisque affectibus contingit. Idem dicendum est de Apnœa, quæ non depravatam, ut prædictæ, sed imminutam, vel abolitam respirationem significat, eaq; contingere solet in syncope, hysterico affectu, & apoplexia fortissima.

Humor asthma efficiens, est ut plurimum pituita à capite in pulmonem defluens; ejusq; bronchia obstruens. Interdum tamen fit ab humoribus crudis & serosis à venoso genere per arteriam venosam in pulmonem translatis. Hi si ad bronchiorum canales profluant, verum asthma cum stertore producant, si verò in pulmonum substantia vel in levibus arteriis subsistant, asthma spurium generant sine stertore.

Hæc asthmatis species, quæ vulgaribus Medicis ignota est, (nullam enim aliam causam præter fluxionem à capite agnoscunt) confirmatur, non solum ex stertoris carentia, sed etiam ex eo, quod urinæ ægrotantiû crassæ & turbidæ esse soleant, præsertim in paroxysmo, quia humorum crassorum & crudorum in venis agitatorum portio ad renes & vesicam transmittitur. Et nonnulli asthmatici urinæ difficultati obnoxii sunt, eaque vigente asthma liberi sunt, ab asthmatis verò paroxysmo præsentem, cessat urinæ difficultas, ob materiæ morbificæ, in venis contentæ, ad hanc vel illam partem decubitus. Vidimus etiam quosdam asthmaticos alvi fluxui obnoxios, ita ut præsentem alvi fluxu ab asthma liberi essent, eo verò cessante, asthmatis paroxysmi redirent. Adde, quod hæc asthmatis species, quæ sine stertore fit, venæ sectione ita efficaciter oppugnatur, ut eâ in paroxysmo celebratâ, quam primum sanguis fluere incipit, ægri statim melius spirare incipiunt, & in fine illius aut post exiguum saltem intervallum à paroxysmo penitus liberati apparent. Ac denique hujusmodi asthmatici plerumque cachexia & pedum tumore œdematoso laborant. Quod ostendit causam asthmatis tunc temporis ab hepate proficisci, & in venis contineri, ita ut tandem in plerisque hydrops consequatur. Inde Aretæus inter signa asthma imminentis status in præcordiis & eructationes præter rationem enumerat, quæ procul dubio à materiâ crudâ in præcordiis exagitata proveniunt.

Illa tamen flatulenta materia primò, & per se aliam asthmatis speciem interdum producit, quæ asthma flatulentum, seu hypochondriacum nominatur; quando scilicet flatus crassi & copiosiores, & ab hypochondriis elevati, diaphragma comprimunt, ejusque motum impediunt, unde summa spirandi difficultas sine stertore procedit.

Diagnosin hujus affectus, & speciem illius, ex propositis innotescit.

In dyspnœa enim spiritus est densus citra sonum & anhelationem, cum minori molestia.

In asthma gravitas pectoris est major, spiritus crebrior & densior, cum anhelatione, stertore, ac sibilo.

Orthopnœa verò non nisi erectâ cervice respirare permittens, decumbentibus suffocationem minatur.

Signa causarum in hunc modum se habent.

Si à crassis humoribus in pulmone collectis, asthma generetur, difficultas spirandi sensim & paulatim accrescit, eaque continua est & indefinens.

Si verò humores aliunde in pulmones per intervalla affluant, difficilis respiratio continua non est, sed per intervalla recurrit. Licet enim asthma, quod à materia in pulmone contenta excitatur, exacerbari plerumque soleat à causis externis, ita nimium, aëre austro, & similibus; in asthma tamen, quod à materia aliunde affluente producit, exacerbatio illa longè manifestior est. Si asthmatis materia à cerebro defluat, catarrhi signa adsunt: Si verò nulla catarrhi indicia appareant, per venas materiam affluere conjiciendum est. Hepatis affecti & partis mandantis rationem habentis indicium, est tumor pedum & cachexia.

Si humor crassus in bronchiis pulmonum contineatur, respiratio fit cum sonitu & tussi, tum pituita per tussim excretâ, cessat vel imminuitur affectus.

Si humor in venis aut substantia pulmonis hæreat, nullus adest sonitus, & raro aliquid per tussim excernitur.

Quod ad prognosin attinet, asthma chronicus est affectus, & curatu difficillimus, sæpeque in cachexiam & hydropem degenerat. Juvenes aliquando liberantur, sed & non sine magno labore: Senes verò nunquam. Infantes nisi maturè curentur, superveniente catarrho suffocante, intereunt.

Qui ex asthma vel tussi gibbi evadunt, ante pubertatem moriuntur. (VI. aph. 46.) quia gibbositas conveniens pectoris incrementum impedit, pulmo nihilominus debitam magnitudinem acquirens, non habet sufficiens spatium, in quo dilatari commodè possit ad liberam respirationem; unde calor cordis, non sufficienter ventilatus, marcescit, & hominem ad interitum perducit.

Asthmati pleuritis aut peripneumonia superveniens lethalis. Quia pulmo à longo morbo debilitatus, non potest gravissimo morbo supervenienti resistere, & materiam morbificam expellere.

Asthmatis curatio duplex instituitur, altera in paroxysmo, altera extra paroxysmum.

In paroxysmo statim vena secanda est, præmissa clystere, si sanguis mediocriter abundare videatur: Nam depletis sanguine venis liberior erit respiratio. Quod si affectus sit antiquior, pluriesque sanguis fuerit detractus, satius est à phlebotomia abstinere, quia calorem nativum imminuendo, majorem promovet pituitæ copiam.

Sectio malleoli præstans est, præcipue in affectu sympathico.

Post venæ sectionem, vel etiam eâ omisâ si non videatur idonea, purgans phlegmagogum erit exhibendum, ex iis, quæ in frigida cerebri intemperiei curatione descripta sunt, adjectis perpetuò quibusdam thoracis, quantum remedii forma permittere poterit.

Vomitoria verò, licet à nonnullis improbentur in hoc affectu, tamen convenientissima sunt, ut frequens experientia docuit, & non raro hoc solo remedio paroxysmus solutus est.

Inter alia autem vomitoria, principem locum obtinet aqua nicotianæ, exhibita ad ʒ. j. Reduci potest in syrupum cum saccharo. Dosis cochlearia ij. in cujus penuria usurpari potest sal vitrioli, vel aqua benedicta. Ratio autem, cur vomitoria in hoc affectu tantoperè profint, elegantissima est, quia dum pituita tenuior à capite defluens, in asperam arteriam, & pulmonis bronchia sese insinuat, crassior illius portio in ventriculum delabitur, illiusque parietibus ita affigitur, ut ægerrimè avelli possit. Interim verò, dum calor illius debilis materiam illam exagitat, flatus crassiores producantur qui ventriculum inflantes diaphragma comprimunt, & difficilem respirationem efficiunt. Unde fit, ut vacuato ventriculo cesset paroxysmus, aut mirum in modum remittat. Adde quod asthma interdum (imò frequentissimè juxta Sennerti sententiam) ab humoribus crudis generetur citrà hepar, & in venis collectis, qui per venam arteriosam ad pulmones feruntur, & bronchia comprimendo asthmatis causa sunt. Hisce autem humoribus purgandis & à pulmone revellendis maximè conferunt vomitoria. Quamvis etiam, hujus causæ rationes, remedia, quæ per inferiora humores expurgant, convenientissima sint.

Vomitum etiam in hoc affectu leniter movet, simulque per inferiora purgat succus ireos nostratis ad ʒ. β. in vini hippocratici ʒj. quem se felicissimo cum successu usurpasset refert Platerus in observationibus.

Potest augeri dosis succi ireos nostratis ad ʒ. ij. si minori exhibitus sufficienter operatus non fuerit.

Clysteres etiam acriores frequenter injici poterunt revulsionis gratiâ. Eorum tamen quantitas sit exigua, ne intestina admodum replendo diaphragma comprimant.

Tum etiam frictions in partibus inferioribus celebrandæ, iisdemque cucurbitulæ plures affigendæ: Tum etiam cervici. Postmodum humores crassi aliquando & attenuandi; flatus ab iisdem humoribus excitati resolvendi, atque discutiendi. In quem usum utiliter exhibetur aqua cinamomi ex cochleari, per se, vel cum syrup. violac. mixta. Ut

ʒ. Aquæ cinam. ʒ. ij. syrup. violac. ʒ. i. Misce. Loco syrup. violac. oxymel admisceri poterit, ad lentos humores potentiùs discutiendos.



Utile etiam est ol. salviæ, rorismar. vel anisi, arte chymica extractum, ad guttulas iii. iv. vel v. cum vino exhibitum. Vel his aspergantur tabellæ diatragacant. frigid. quas æger deglutiat.

Aiii commendant croci  $\mathfrak{z}$ . j. cum vinicochleari exhibitum. Utilis etiam est aqua clareta, in hunc modum cõposita.

$\mathcal{Z}$ . Aquæ vitæ  $\mathfrak{z}$ . iv. aquæ tussilag. & scabios. ana  $\mathfrak{z}$ . iii. sacchari  $\mathfrak{z}$ . ij. cinam.  $\mathfrak{z}$ . vi. Trajiciantur per manicam Hippocratis. Capiat æger  $\mathfrak{z}$ . ij. vel iii.

Fumus nicotianæ per tubulum haustus paroxysmum cohibet. Idem præstat eadem nicotiana linguæ tantum admota, idem quoque præstat fumus caryophyllorum per tubulum haustus.

Interim expectorantia usurpanda sunt, quæ crassiores materiam per anacatharsin educant.

$\mathcal{Z}$ . Syrup. de prassio, de liquirit. & de tussilag. ana.  $\mathfrak{z}$ . ii. oxymel. simp.  $\mathfrak{z}$ . j. M. utatur ex cochleari, sensim lambendo.

$\mathcal{Z}$ . Terebinth. claræ  $\mathfrak{z}$ . j. Gum. ammoniaci  $\mathfrak{z}$ . ii. florû sulphuris  $\mathfrak{z}$ . j. Misce, fiant pilulæ molles, quarum una singulis duabus horis deglutatur cum syrup. de hyssop.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ .

$\mathcal{Z}$ . Ol. amygd. dulc. recenter sine igne expressi.  $\mathfrak{z}$ . vi. sacchari canti  $\mathfrak{z}$ . ij. Misce, capiat sensim lambendo.

$\mathcal{Z}$ . Rad. enulæ camp. saccharo condit.  $\mathfrak{z}$ . iii. sacchari canti  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . syrup. de hyssopo, de prassio, ana  $\mathfrak{z}$ . j. gummi ammoniac. aqua vitæ dissoluti  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Misce, fiat looch. Vel

$\mathcal{Z}$ . Conserv. violar. rad. enulæ camp. ana  $\mathfrak{z}$ . vi. pulv. elect. diatragacanthi frig. diaireos Salomonis, ana.  $\mathfrak{z}$ . j. syrup. violac. & capil. ven. ana q. f. fiat looch.

$\mathcal{Z}$ . Rad. altheæ  $\mathfrak{z}$ . j. rad. enulæ camp.  $\mathfrak{z}$ . iv. cydoniorum vel eorum loco carnis cydonior. condit.  $\mathfrak{z}$ . xvi. Bulliant in aqua ad exsiccationem. Contundantur, trajiciantur per setaceum, addendo mellis  $\mathfrak{z}$ . ij. Coquantur leviter, abstrahe ab igne, & adde cinam.  $\mathfrak{z}$ . j. flor. sulphuris  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . liquirit. cum moscho, & aqua rosac. aromatizat.  $\mathfrak{z}$ . ij. fiat electuarium molle, de quo teneat in ore ad magnitudinem avellanæ per intervalla. Utilissimum etiam extra paroxysmum, si de eo sumatur  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . manè & serò.

Exterius etiam peccatori admovenda unguenta & linimenta laxantia & discutientia, in hunc modum composita.

$\mathcal{Z}$ . Ol. chamæmel. irini, Amygdal. dulc. ana  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . axung. gallinæ recent.  $\mathfrak{z}$ . j. pulv. rad. altheæ, ireos Flor. ana  $\mathfrak{z}$ . j. farinæ sem. lini & sœnugr. ana  $\mathfrak{z}$ . ij. gummi ammoniaci, cum vino dissoluti  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ . ceræ q. f. Fiat linimentum. Vel

$\mathcal{Z}$ . Mucilag. sem. cydonior. lini, sœnugr. extractæ cum aqua tussilag. vel scabiosæ, ana  $\mathfrak{z}$ . vi. pulv. radices ireos, hyssopi ana.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . croci  $\mathfrak{z}$ . j. ol. lilior. alb. amygd. dulc. ana,  $\mathfrak{z}$ . ij. ceræ q. f. fiat linimentum.

Si paroxysmus protrahatur, vesicatorium applicetur posteriori parti cervicis.

Extra paroxysmum humoris fluxio impedienda est, tum qui jam influxit, & in pulmone continetur, incidendus, detergendus est, & expectorandus.

Ad fluxionis impetum cohibendum, ea omnia conveniunt remedia, quæ in frigidi catarrhi curatione supra proposita sunt.

Attamen circa nonnulla remedia, eo loci proposita, cautiones quædam adhibendæ sunt.

Primo, in apozematis, aut syrupis, aliisque remediis, ne calida nimium & exsiccantia præscribantur, quæ partes tenuiores absumendo, reliquum in crassare possunt, & ita affectum contumaciorem reddere. Sed potius humectantia permisceantur, qualia sunt passulæ, ficus, liquiritia, jujubæ.

Secundo, in prædictis remediis, loco cephalicorum, thoracica supra enumerata usurpentur.

Tertio, ad derivationem humoris in capite redundantis, proponuntur errhina, sternutatoria, & apophlegmatismi. Verum in hoc casu non conveniunt apophlegmatismi, ob vicinitatem partium, per quas decurrit humor ad pulmonem. Sed errhina & sternutatoria utiliter usurpari poterunt.

Quarto, ad caput roborandum & exsiccandum inter alia remedia commendantur suffitus; qui tamen in hoc affectu non conveniunt, saltem ore & naribus excepti: Propterea quod difficiliorem anhelitum efficiunt, & asthmatis paroxysmum excitant. At verò iis operimenta capitis

extra ægri cubiculum tutò fumigari poterunt.

Ad deterfionem & expectorationem humorum crassorum, pulmonum bronchiis impactorum; expectorantia supra descripta usurpari poterunt, tum etiam sequentia.

$\mathfrak{z}$ . Rad. enulæ camp. & polypodii querc. ana  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . folior. origani, calament. hyssopi, satireiæ, capil. ven. scabios. & tussilag. ana M. j. sem. althææ, bombacis, & carthami, ana  $\mathfrak{z}$ . iii. liquirit. rasæ & passul. mundat. ana  $\mathfrak{z}$ . vi. jujubar. sebesten. & ficuum pinguium, ana n. v. Fiat decoctio ad quartaria v. in hydromelite. In colat. dissolve sacchari albi quartaria v. Fiat syrup. perfectè decoctus, quo utatur ex cochleari frequenter, sensim lambendo.

Majoris efficaciam, & paratu facilior syrupus componi poterit in hunc modum.

$\mathfrak{z}$ . Rad. enulæ camp.  $\mathfrak{z}$ . iij. tabaci indici  $\mathfrak{z}$ . j. Infunde per noctem in  $\mathfrak{z}$ . vi. aquæ vitæ vulgaris. Manè fiat colatura cui adde sacchari crystallini  $\mathfrak{z}$ . iv. Incendatur continuo agitando; adde syrupi de erythimo aut tussilagine  $\mathfrak{z}$ . j. ol. sulph. q. f. ad gratam aciditatem. Utatur ex cochleari, vel bacillo glycyrrhyzæ contuso, sensim lambendo & deglutendo.

Sequentia verò remedia pulmonibus ab infarctu liberandis specifica sunt efficacissima.

$\mathfrak{z}$ . Gummi ammoniaci & bdeilli in aceto scillitico dissolut. ana.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . flor. sulphuris.  $\mathfrak{z}$ . iii. fol. tussilag. & satireiæ siccor. & pulverat. & diaireos simpl. ana  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Cum syrupo de hyssopo, vel oxymelite scillit. fiat massa pilul. de cujus drach. i. formentur pilulæ vi. Sumat. n. iii. duabus horis ante cœnam, bis in hebdomade. Vel

$\mathcal{Z}$ . Aloës succotrinæ  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . myrrhæ, ammoniaci; ana drach.  $\beta$ . croci  $\mathfrak{z}$ .  $\mathfrak{z}$ . flor. sulph.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . cum syrup. de tussilag. fiat massa pilul. cujus  $\mathfrak{z}$ . i. capiat duabus horis ante prandium per aliquot dies.

Aqua quæ educitur ex rad. bryoniæ evacuata, destilletur in B. M. Hujus  $\mathfrak{z}$ . viii. misce spirit. vitriol. vel sulph.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Capiat singulis diebus cochlear. i. jejuno stomacho.

$\mathcal{Z}$ . Fol. peti. hyssopi, prassii albi, capil. ven. ana. M. ii. rad. ireos Flor. & liquirit. ros. ana  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Coquantur in aqua ad  $\mathfrak{z}$ . ii.  $\beta$ . In colat. dissolve sacchari albi  $\mathfrak{z}$ . i. mellis albi  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Fiat syrup. perfectè coctus, clarif. & aromatizet. tantillo croci & cinam. Capiat cochlear. ij. vel iii. horis matutinis.

Ejusdem virtutis sunt oximel & syrupus de peto, Quercetani in pharmacopœa. Tinctura peti sicci extrahitur cū aqua vitæ, melle excipitur pauca illius quantitas, & ad pisi vel fabæ magnitudinem in ore detinetur, sensim deglutendo, pituitam copiosè trahit à ventriculo & à pulmone.

Millepedes seu aselli, n. xii. panno lineo involuti, in vino albo n. acerantur; hinc facta expressio potui datur, quæ brevi saburratos pulmones deplet.

Oleum sacchari crassos & glutinosos humores in pulmone contentos potenter dissolvit, & expectorat. Sed multo potentiùs atque excellentiùs id præstat oleum sacchari compositum, cujus formula talis est.

$\mathfrak{z}$ . Rad. ireos Florent. & enulæ camp. pulverat. ana  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . pulpæ dactyl. & passul. purgat. ana  $\mathfrak{z}$ . iii. cortic. citrior. & aurantior. ana  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . benzoini  $\mathfrak{z}$ . ij. croci  $\mathfrak{z}$ . i. Infunde, bidui spatio, in spiritu vini sèpissimè rectificato. Mox separetur liquor per inclinationem. Admisce liquori sacchari canti pulv. quantum in eo dissolvi poterit, & accende spiritum vini, spatula continuo agitando, donec in spissum, olei æmulum liquorem flamma extincta abierit. Cui admisce olei sulph. q. f. ad gratam aciditatem.

Decoctum caulium rubrorum cum paucis saccharo per plures dies sumptum, asthmaticos multum juvat.

Efficacior multò est succus caulium rubrorum cum saccharo rosac. vel syrupo tussilaginis exhibitus ad julepi formam, per plures dies.

Spiritus sulphuris viscidam pituitam dissolvit & bronchia aperit, si illius guttæ iv. aut v. sumantur cum jusculo, aut syrupo convenienti.

Terebinthina ad hunc etiam usum valdè commendatur ad  $\mathfrak{z}$ . ii. vel iii. frequenter exhibita, cum ol. amygd. dulc. conserva viol. Vel in opiatæ formam reduci poterit in sequentem modum.

$\mathcal{Z}$ . Terebinth. aqua tussilag. diligenter lotæ  $\mathfrak{z}$ . j. ficuum pingui  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . pen.  $\mathfrak{z}$ . iv. ol. amygd. dulc.  $\mathfrak{z}$ . i. misc. fiat opiat.

Crocus



Crocus in condimentis pectori utilis est. Tum etiam bellarium sinapis cum melle paratum egregie expectorationem juvat.

Oxymel cum agarico utilissimum etiam est ad pulmones expurgandos, cujus cochlear. ii. manè exhiberi poterunt.

Flores sulphuris cum butyro recenti ad pilularum formam redacti, per triduum exhibiti manè, ad 3. j. asthmaticis multum opitulantur. Lac sulphuris idem præstat majori efficacia, & minori dosi, quæ gr. viii. transcendere non debet.

Tabellæ etiam sequentes præstantissimæ sunt.

℥. Pulpæ rad. altheæ. & rad. symphyti majoris, an. 3. ii. flor. sulphuris 3. ii. flor. benzoini 3. 6. sacchari in aqua lilior. alborum dissoluti 3. viii. Fiant tabellæ, quas teneat æger in ore frequenter.

Decoctum galli veteris commendatur etiam non parum ad hunc affectum expugnandum, ejusque formula talis est.

℥. Rad. enulæ campanæ, & ireos Florentin. ana 3. 6. folior. hyssopi, & prassii siccorum, ana 3. vi. sem. carthani 3. j. sem. anisi, & anethi, ana 3. ii. liquirit. ras. & passul. mundat. anat. 3. iii. pulmonis vulpis præparari 3. ii. Contundantur, iisque impleatur venter galli veteris, qui decoquatur in aquæ ℥. xv. donec caro ab ossibus separetur. Colatura post fortem expressionem ponatur in loco frigido, ut quod crassum est subsideat, pars verò clara separetur. Cujus capiat æger 3. vi. cum oxymel. simpl. 3. j.

Si purgans efficere volueris, addi poterunt folia fennæ ad 3. ii. vel iii. pro singulis dosibus. inò dissolvi poterit alicui dosi mannæ, 3. 6. vel (si fortius purgandum) electuarium aliquod phlegmagogum per intervalla. Platerus sequentem galli præparationem reliquis anteponebat.

℥. Gallum aliquot annorum jugulatum, deplumatum, & evisceratum. Infarciatur sequentibus, pulmonis vulpis frusto recenti, vel præpar. & ficcati 3. j. passular. enucleat. & ficuum, ana. 3. ii. rad. enulæ 3. j. herbarum hyssopi, fatureiæ marrubii, thymi, calamitæ, pulegii, siccat. ana. 3. j. sem. scæn. anisi, ana. M. j. sem. carthami confusi, rad. polypod. ana. 3. i. tartari albi 3. j. salis 3. 6. vitellis ovor. n. ii. butyri recent. 3. 6. Incidantur, contundantur, ut artis est, & infuantur gallo, decoquantur donec caro ab ossibus secedat, in multa aqua vase amplo, ne opus sit novam assundere. Dein eam colatò, & in lb. x. adde mellis despumari ℥. j. ne citò corrumpatur. Capiat scutellam unam mane, in qua dissolve mannæ, & cassiæ recentis, ana. 3. 6. continuando ad multos dies, aut mensem, & amplius. Quod eo melius juvabit, si mox etiam terebinth. 3. j. cum penidiis, in forma boli ter assumat.

Ludovicus Septalius, in *animadversionibus practicis*, hæc jura galli veteris damnat, tanquam inutilia, vel potius noxia. Rationes illius sunt, quod experientia non respondeant, & irritò successu à se & aliis Medicis Mediolanensibus fuerint usurpata. Quod ex longa ebullitione nitrosæ illæ partes, quibus maxime prodesse jura illa creduntur, subsideant atque in percolatione rejiciantur; Viscidæ autem, glutinosæ, crassæ, tum & perpingues ex cute, pedibus, alarum extremis, musculosis, & nervosis partibus prominentes, maxime remaneant. Undè crassior redditur materia morbifica, & expectorationi inidonea. Purgantia verò & alterantia longa ebullitione vires suas amittunt.

Verum non debet Septalii experientia tot tantorumque celeberrimorum Medicorum, tum antiquorum, tum recentiorum, à quibus hoc genus remedii maxime commendatur, experientia præferri. Si enim quibusdam ægrotantibus, à se aliisque curatis, non contulerit, multa alia obstat potuerunt, nempe vel prava ægrotantium dispositio, morbi que contumacia, vel cætera ad curationem spectantia non bene administrata, vel ipsum remedium malè præparatum. Quod verò dicit nitrosas partes longâ ebullitione subsidere, & in percolatione rejici, ridiculum est, subsident enim tantum partes terrestiores. Nitrosæ verò substantia in liquore simul recepta nunquam separatur. Undè fit, ut jacula, quo diutius coquantur, eo falsiora evadant. Salfedo autem illa incidit, attenuat, deobstruit, tantum abest ut jusculum salfedine illa præditum incrassare possit materiam morbificam. Neque habent carnes, aliæque par-

tes gallorum, substantiam tam glutinosam, ut ille fingit, qualis fortè in vitulorum pedibus, aliorumque animalium reperitur; sed potius attenuantem, cum nitrosâ substantia maxime refertæ sint. Ac denique purgantia & alterantia, si juxta Pharmaciam præcepta, & secundum artem decoquantur, vires suas integras in decocto relinquunt; cum quotidiana apud nos experientia constet hujusmodi jacula galli veteris perbellè purgare. Et si experientiam nostram, Septalii experientia opponere liceat, bona fide testari possumus, nos ex hujusmodi decoctis mirabiles effectus in asthmaticis affectibus & doloribus colicis diuturnis & contumacissimis percepisse. Hoc tamen in horum jusculorum præparatione immutare soleamus, quod nimirum pro una tantum dosi singulis diebus iteranda præscribimus; metuentes scilicet, ne ad plures dies asservata corrumpantur, aut saltem deteriora fiant. Formulæ autè à nobis præscribi solitæ, in asthmatis curatione exemplum tale erit.

℥. Rad. enulæ camp. & ireos Flor. an. 3. j. 6. fol. hyssopi, & tussil. an. M. j. liquirit. ras. & passul. mund. an. 3. ii. ficuum ping. n. iv. fennæ mundat. 3. iii. polyd. querc. & sem. carthami confus. ana. 3. 6. sem. anisi 3. j. 6. Coquantur cum tertia, vel quarta parte galli veteris secundum artem, & fiat jusculum, quod capiat æger per xii. vel. xv. dies.

Vino purgante infra describendo Platerus n. ulierem curavit dyspnœa laborantem, & ad hydropem inclinantem.

℥. Rad. iridis 3. j. rad. enulæ, scillæ præparat. an. 3. 6. marrubii M. j. cortic. sambuci, & ebuli. ana. 3. j. fennæ 3. j. 6. agaric. 3. ii. zinzib. 3. j. Conquassentur omnia, & adde vini albi lb. iv. Coquantur parum in duplici vase. Bibiit cubitum itura haustum per dies sex, cessavitque dyspnœa & tumor evanuit, pulchreque curata fuit.

Notandum autem est, purgantia in hoc affectu esse iteranda, idque sub variis formulis, ne uni eidemque remedio natura assuescat. Sic etiam remedia detergentia, incidentia, expectorantia, aliæque per vices immutanda sunt, propter eandem causam.

## CAPUT II.

### De Pleuritide.

**P**leuritis alia vera & legitima est, alia notha seu spuria.

Vera pleuritis est, inflammatio membranæ costas succingentis, vel musculorum intercostalium internorum.

Nota verò est inflammatio musculorum intercostalium externorum.

Dantur etiam alii lateris, aliarumque thoracis partium dolores, qui ad notham pleuritidem referuntur, quando nimirum mediastinum inflammatur, pulmo costis agglutinatur, humores serosi vel pituitosi à capite in thoracis musculos defluunt, flatus eosdem musculos aut thoracis membranas divellunt, & vapores à ventre inferiori elevati easdem partes vellicant aut distendunt, ut in lumbricis sæpe contingit.

Diximus in vera pleuritide non solum pleuram, sed etiam musculos mesopleuricos internos inflammari, quia impossibile est, quin inflammatio membranæ musculis contiguis communicetur: Nonnulli præterea pulmonem etiam in omni pleuritide inflammari contendunt, & sententiam suam autoritate, ratione, & experientia confirmant. Autoritas est Hippocratis lib. de locis in homine, ubi dicit, utraque pulmonis parte inflammata fieri peripneumoniam: Si verò altera tantum pulmonis pars inflammatur, esse pleuritidem. Id ipsum ratio convincere videtur. Siquidem signa pleuritidis sunt etià signa peripneumoniarum, tussis nimirum, febris continua, respirandi difficultas, & sputum cruentum. Prognosis etiam curatio eadem est in utroque affectu. Asserunt denique sibi experientia compertum esse, in apertis pleuriticorum cadaveribus pulmonem inflammatum semper apparuisse. Verum concedendum quidem est, in plurimis pleuriticis pulmonem cum pleurâ simul affectum esse; facile enim fluxio in utramque partem decumbit, cum pulmo pleuræ superiori parte alligetur. Asserendum tamen, solam pleuram sæpissime inflammatione affici, illæso pulmone, aut saltem tam leviter affecto, ut morbus illius partis affectus dici



dici nequeat. Authoritas verò Hippocratis à nonnullis rejicitur tanquam spuria, & aliis quam plurimis contraria, in quibus Hippocr. solam pleuram tanquam partem affectam agnoscit præsertim *lib. 1. de morbis*, ubi pluries repetit, bilem & pituitam ad latus affigi & dolorem vehementem excitare.

Martianus verò eam ita conciliat, dicens Hippocr. eo loco agere de peripneumonia, quæ sit à defluxione à capite, cujus portio decidit in pleuram, & ea ratione, ut distinguat eam, quæ unam tantum pulmonis partem afficit, ab ea quæ utramque, pleuritidis nomine eam afficere. Similitudinem verò symptomatum in pleuritide & peripneumonia facit morbi utriusque natura eadem, quæ in inflammatione consistit, & partium affectarum viciniâ.

Quod verò in plurimis ex pleuritide sublati pulmo affectus inveniatur, inde concludendum non est, semper ita contingere, nam pleuritides vehementiores, quæ mortem inducere consueverunt, in peripneumonia ut plurimum degenerant. Sed plurimi testantur, & nobis etiam experientia compertum est, in multis pleuriticorum cadaveribus solam pleuram corruptam & putrefactam inveniri.

Dubitare licet cur pleura frequentius quàm aliæ membranæ inflammatione afficiatur; Responso verò desumitur ab Hip. *de morb. textu 124. juxta Salii divisionem*, ubi dicit, latus esse partem maximè debilem, quia carne nudum est præ reliquis corporis partibus, & non habet aliquid, quo renitatur; idè commotis humoribus ab aliqua causa procacitica, usque excalescentis, eorum defluxus in illam partem facile concitatur.

Materia pleuritidem efficiens est ut plurimum sanguis biliosus, qui facilius densam membranam penetrat; & Avicenna de pleuritide loquens, in *membranam*, inquit, non penetrat, nisi humor tenuis & cholericus. Alii tamen humores hunc affectum etiam producere valent, modo humorem serosum aut biliosum pro vehiculo secum admixtum habeant; alios humores dico, non excrementitios, sed naturales, qui sub forma sanguinis continentur, & vel sanguis propriè dictus, vel sanguis pituitosus aut melancholicus nominatur. Observandum tamen est, humores tenuiores veram pleuritidem magis efficere, crassiores verò notham.

Ille autem sanguis per vasa thoracem nutrientia, venam præsertim axillarem & azygon defertur, & si quantitate, vel qualitate, vel motu peccet, in membranam & musculos vicinos effunditur.

Pleuritidis differentia à loca affecto & causis desumitur.

Ratione loci, vel situ doloris, dividitur ab Hipp. 2. *acutor*. in ascendentem, cum dolor ad jugulum magis tendit; & descendentem, cum versus hypochondria vergit. Nonnunquam etiam versus dorsum magis extenditur, cujus mentionem facit Hip. 3. *de morbis*, interdum etiam magis versus anteriora deflectit.

Ratione causæ seu humoris peccantis, alia dicitur sanguinea, alia biliosa, alia pituitosa, alia melancholica.

Insignis alia differentia proponitur ab Hipp. 1. *acutor*. quia pleuritis dividitur in siccam & humidam. Sicca dicitur ea, in qua nihil perexiguum exspuitur, non solum in morbi principio, sed etiam in progressu illius. Cujus rei variæ possunt esse causæ, nempe materiæ morbificæ cruditas, crassities & visciditas, vel facultatis imbecillitas, vel bronchiorum obstructio, vel doloris vehementia. Humida verò est, in qua sputum ab ipso morbi initio satis copiosum apparere incipit.

Diagnos hujus morbi per signa pathognomonica stabilitur à Gal. 5. *de loc. aff. c. 8. & aliis in locis*, quæ numero quinario comprehenduntur, nempe 1. Dolor lateris punctorius. 2. Febris acuta continua. 3. Difficilis respiratio. 4. Pulsus durus & serratilis. 5. Tussis frequens & molesta.

Dolor punctorius est membranæ proprius, præcipuè à materia biliosa proveniens. Ille autem dolor, latus occupans, ad vicinas partes se extendit, & tunc ad jugulum, nunc ad hypochondria exporrigitur per continuitatem membranæ, quæ totam thoracis cavitatem investit. Hoc signo pleuritis à peripneumonia distinguitur, in qua nullus aut perexiguus lateris dolor apparet, nisi eum pleuritide complicata sit.

Lazar. Riverii Opera.

Febris acuta continua ex phlegmone, parte cordi vicina, ducit originem, atque adeò symptomatica est; quamvis interdum febris essentialis pleuritidi conjuncta sit, imò verò illi primam originem dederit. Contingit enim sæpè in principio febrium continuarum, ut sanguis in venis ebulliens expellatur à natura in partem receptioni illius magis idoneam, quales sunt partes laterales, & inflammationem pariat. Hujus rei indicium est, quòd febris primum ægrotantem invadat, mox secundo tantum vel tertio die lateris dolor appareat. Quando verò febris est symptomatica, tunc dolor lateris ab initio ægrotantem corripit, febris verò paulò post aut eodem tempore apparet.

Respiratio difficilis in hoc affectu necessario contingit, cum partes inflammatae distendi sufficienter non valeant ad magnam aëris copiam attrahendam, quæ ad cordis æstuantis refrigerium necessaria est.

Pulsus durus fit ob membranam affectam, illiusque tensionem, quæ arterias etiam distendit, & illæ propter eandem tensionem, eam pulsus differentiam efficiunt, quæ serratilis nominatur, quando scilicet, dum plures digiti arteriæ admoventur, una illius pars magis attolli, quàm alia videtur, ut ferram hoc modo aliquatenus repræsentet.

Tussis molesta in pleuritide contingit, quia natura continuo rem molestatam à parte affectâ expellere nititur, tum etiam ex illa aliquid in pulmones refudat, quòd ejus facultatem expultricem commovet, undè tussis oritur.

Propositis signis adjungitur sputum cruentum, quòd quidem neque in omnibus pleuriticis, neque in omnibus morbi temporibus apparet; idè inter signa pathognomonica non recensetur. Qui pulmonem perpetuò affici in pleuritide affirmant, sputum cruentum à pulmone efferri asserunt, idque à membrana costas succingente, ad pulmonem transire posse negant, cum membrana densissima sit, tum etiam membrana pulmonem investiens sit ejus naturæ, quæ à sanguine illo extravasato penetrari non possit.

Verum hos Galenus manifestè redarguit 5. *de loc. aff. cap. 3.* ubi primum ostendit, materiam in thoracis cavitatem contentam transsumi in pulmonem, & per anacatharsin expurgari, duobus exemplis luculentis. Unum est eorum, qui vulnus in thorace acceperunt, in cavitatem illius penetrans. Si enim multa in cavitatem pectoris injiciatur, & vulnus confestim occludatur, parvo interjecto tempore multa per os cum tussi ejicitur, & æger multæ saporem in ore percipiet. Alterum exemplum desumitur ex ossium fractura, quæ sit illæsa cute. In ea enim dum callus conficitur, & ossa fracta conglutinari incipiunt, portio sanguinis, qui ad partem affectam confluit, ad cutem defertur, eamque pervadit, ita ut vittas fasciasque membro obductas irriget & conspurcet. Docet etiam modum Galenus, quo sanguis, pus, aut alia quævis materia in cavitatem thoracis contenta à pulmone transsumi soleat, nimirum per orificia extrema bronchiorum, sive ramorum asperæ arteriæ, qui per pulmonem disperguntur, & ad illius superficiem desinunt. Quamvis enim venæ arteriosæ & arteriæ venosæ orificia ad pulmonis superficiem etiam deferantur, bronchiorum tamen orificia reliquis ampliora & potentiora sunt. Quantò enim aspera arteria ratione caudicis major est caudice venæ arteriosæ aut arteriæ venosæ, tantò rami majores sunt ramis, & orificia orificiis, cum omnia hæc vasa æquali quadam divisione scindantur, quò in universum pulmonis corpus distribuuntur. Deinde asperæ arteriæ & bronchiorum ejus substantia cartilaginosa est; unde fit, ut non tamen convenire ac concidere valeant, ut reliqua vasa, eorumque orificia magis aperta mancant, sicque materiam in thoracis cavitatem contentam facilius excipiant.

Ista autem transumptio materiæ in thorace contentæ fit, docente Galeno, in constrictione thoracis, dum exspiratio perficitur: Tum enim thorax, quæ in sua cavitatem continetur, premit versus pulmonem, & in ipsum impellit, ut portio saltem eorum in bronchiorum orificio exprimatur. Neque obstat pulmonis mollities quæ compressioni cedit, atque ita materiam ad eum impulsam recipere non cogitur. Hæc enim mollities facit quidem, ut tota materia impulsæ non recipiatur. Non impedit tamen, quin



portio quedam illius in partis substantiam sese insinuare valeat, quamvis maxima pars in cavitate remaneat ob molliorem prædictam.

Addamus & nos huic Galeni doctrinæ admirabilem naturæ providentiam, quæ passim invenit vias non solum manifestas, sed etiam incognitas & sæpè incomprehensibiles, per quas res noxias & molestas expurgare consuevit. De sanie in fracturis dictum est, quæ per poros insensibiles musculorum & ipsius cutis expurgat.

Spuria pleuritis à legitima distinguitur, quòd in hac dolor exacerbetur, dum æger decumbit in latus oppositum: Tunc enim pars inflammata pondere suo divellitur, majoremque patitur distensionem: in illa verò musculi externi inflammati comprimuntur; quando supra latus affectum æger decumbit.

Tempora hujus morbi sequentibus signis indicantur. In principio omnia symptomata pathognomonica debiliora sunt, dolor & febris exigua, tussis sicca; vel cerè sputum exiguum & cradum. In augmento febris & doloris incrementum adest, sputum copiosius. In statu symptomata vehementiora, inquietudo, delirium, dolor capitis, si morbus salutaris sit, sputum concoctum, liberum & copiosum. In declinatione sputum perfectè coctum, libera anacatharsis, omniumque symptomatum ren illio.

Signa causarum diagnostica generaliter desumuntur ex temperamento ægrotantis, anni tempore, regione, victus ratione, aliisque communibus. Specialiter verò à sanguine puro fieri pleuritidem ostendunt, sputum rubrum & sanguinolentum, dolor tensivus pungitivo mixtus, venarum plenitudo, præsertim circa tempora & frontem, rubor faciei totius, pulsus plenus, urina rubra & crassa, cum corona interdum livescente.

Biliosum sanguinem ostendunt sputum flavum, febris ardentior, sitis vehementior, pulsus durior & velocior, dolor pungens acutior, vigilie & inquietudines majores, oris amaritudo, urina tenuis & intensè flava.

Pituitosum sanguinem demonstrant sputum album, viscidum, aut spumofum, dulce & tardè erumpens, febris remissa, sitis pauca, saliva & excretio multa, dolor ren illior & gravativus, somnus major, pulsus parvus & minus durus, urina pallida & crassa.

Sanguinem melancholicum ostendunt sputum nigricans tenax & tardè erumpens, febris, dolor remissior, urina rubra obscura, tussis sicciore, lingua nigricans & aspera, alvus adstricta.

Prognosis primùm ex symptomatum remissione & vehementia desumitur. Si enim dolor, spirandi difficultas & febris non multum molestarint, morbum remissiozem significant; si verò dolor vehemens fuerit, & tussis magna, in qua nihil excernitur, febris item valida, & anhelitus difficultas maxima, periculosam pleuritidem existimare oportet.

Pulsus in pleuritide parvus, frequens, & valdè durus mortem prænuntiat. Ex eo nullum sanatum esse affirmat Gal. 4. de præfag. ex puls. cap. 5.

Pleuritis exquisita, in qua nihil exspuitur, aut in qua sputum, postquam apparere incepit, iterum suppressum est, doloris lateris & pectoris gravitate superfluit, periculosissima est. Crudellissimum enim morbum significat, qui aut brevi hominem jugulat, vel non nisi longo temporis spatio finitur.

Sputum initio & intra tertium diem apparens, brevem morbum significat; sin verò posterius, longum. Hippocr. Aph. 1. sect. 12.

Flava bilis, pituitæ vel paucò sanguine valdè permixta cum sanis copioso sputo, in principio morbi apparente salutaris.

Sputum valdè sanguinolentum periculosum est, venarum enim aut carnis ruptionem significat, unde suppuratione expectanda est. Paucus verò sanguis per resudationem effluere censetur.

Sputum album ac glutinosum rotundum, malum est. Lentior enim & visciditas ab igneo calore materiam adurentem proficitur.

Sputum viride & æruginosum, malum; nigrum verò

pestiferum. Summam enim adustionem, vel caloris nativæ extinctionem significat.

Anacatharsis copiosa, quæ dolorem aliaque symptomata non sedat, mala. Magnam enim materiæ copiam arguit.

Pleuritis in senibus, mulieribus utero gerentibus, asthmatis, & iis, qui bis, terve hunc morbum passi sunt, perniciofa.

Quicumque laterali morbo laborantes in quatuordecim diebus non repurgantur, empyici fiunt. Aph. 8. sect. 6. Alii ad vigesimam diem expurgationem extendunt.

Diarrhoea pleuritidi aut peripneumoniæ superveniens, mala. Aph. 16. sect. 6. Quod intelligendum est de pleuritide, in qua tanta est inflammatio, ut hepar & ventriculum in consensum trahat, aut quando prostratus à morbo viribus, retentrix facultas ferè abolita est. Si verò pleuritis adeò magna non sit, & in corpore contingat multà cacoehymia laborante, alvi fluxus interdum salutaris esse solet; Præsertim si quedam concoctionis signa præcesserint.

Vomitus biliosus & copiosus in principio pleuritidis salutem prænuntiat. Levata enim natura ab illa evacuatione biliosæ cacoehymie, morbum facilius superat.

Pleuritidi si peripneumonia superveniat, malum. Aph. 11. sect. 7. Fit enim translatio materiæ ad partem nobiliorem.

Si pleuriticus dolor cum sputis biliosis sine ratione evanuerit, ægri in delirium incidunt. Hip. 3. Prorrhet. Humor enim biliosus sursum ad caput raptur, & tunc etiam urinæ tenues & albæ apparent.

Pleuritis, quæ diuturno morbo succedit, aut corpori cachectico accidit, periculosa.

Densa & exercitationi dedita corpora citius ex pleuritide & peripneumonia intereunt. Hip. in Coac. Et quotidiana docet experientia, flosiores pleuritide correptos, omnes propemodum interire. Quia robusta illa corpora nonnisi ex gravissima causa in morbos incidunt, & propter densitatem non facile transpirant, ut morbi resolutio fieri non possit.

Quibus in morbo laterali plurimus ex sputo strepitus in pectore sonat, & vultus demissus est, oculusque aurigine suffusus, & caligine obductus, in his mors expectanda est. Hipp. in Coac.

Quibus pleuritidis lingua circa initia biliosa est, hi intra septimum judicantur; quibus verò tertio aut quarto die, circa nonum.

Ad pleuritidis curationem primò humor illam committens, revellendus, derivandus, & discutendus est. Ac si totus discuti nequeat, concoquendus maturandus, & expectorandus. Tum febrì, quæ non rarò essentialis in pleuritide, non semper symptomatrica est, propriis remediis succurrendum. Quæ omnia sequentibus auxiliis perfici poterunt.

Et quidem ab initio sanguis detrahendus est è basilica ejusdem lateris, præmissò clystere, si affectus non valdè urgeat, alioqui post phlebotomiam ille poterit injici.

Mitti autem debet sanguis singulis diebus, donec dolor & febris non ultò mitiores evaserint. Imò verò interdum bis in die, cum peracuta pleuritis est.

Hippo. 2. de rat. viis in acutis, text. 16. insignem regulam, & in praxi utilissimam posteritati tradidit, ut mittatur sanguis usque ad doloris mutationem. Si nimirum prima aut secunda phlebotomia sanguis apparet crudus, pituitosus, aut aquosus; continuanda singulis diebus, aut bis in die vacuatio, donec sanguis detractus appareat rubicundus, vel flavescens. Si verò in principio appareat ruber, iteranda toties phlebotomia, donec lividus, aut niger appareat. Significatur enim sanguinem illum posteriorem à parte affecta, aut venis ipsi vicinis effluere, qui quidem à calore partis inflammatae alteratus est, & ex crudo ruber factus, vel ex rubro niger, aut lividus per adustionem.

Licet autem hujus præcepti observatio in praxi ut plurimum optimè succedat, aliquando tamen coloris illa mutatio pertinaciter expectanda non est, sed prius à sanguinis missione desistendum; cum videlicet aut vires sunt debiles



debiles; aut æger habitu raro, aut valdè resolutibili præditus, aut tempus calidissimum.

Quamvis autem sanguinis effusio in principio morbi præcipuè conferat, si tamen ea fuerit omissa, aut insufficienter celebrata, etiam post septimum, nonum, aut undecimum, venam secare licet, exemplo Hippocratis, qui 1. *Epidem.* Anaxioni venam secuit octava die, vel quòd citius non fuerit vocatus; vel quòd in pleuritide crudissima, quæ undecimo die vix coqui cœpit, morbus inducias dedit.

Cum verò anacatharsis libera & liberalis fieri incipit, tunc temporis à phlebotomia abstinendum, quia anacatharsis supprimitur, & æger in vitæ discrimen conjicitur.

Adeò autem necessaria est venæ sectio in hujus affectus principio, ut nunquam omitti debeat, nedum in senibus, pueris, gravidis mulieribus, puerperis, & menstruas purgationes patientibus, quibus omnibus experientia docuit phlebotomiam, præsentè hoc affectu, fuisse utilissimam. Cautiones autem in venæ sectione observandæ in mulieribus puerperis, aut menstruas purgationes patientibus, videantur infra lib. 15. c. ultimo, in morborum acutorum puerperarum curatione.

Ab ipso etiam morbi initio bis aut ter in die exhibendi sunt julepi refrigerantes, humoris ardorem & ebullitionem cohibentes, & fluxionem sistentes, in hunc modum compositi.

℞. Aquæ papav. rhœad. ℥. iv. syrupi violac. vel ejusdem papaveris ℥. j. salis prunellæ ℥. j. Fiat julep.

Post primam phlebotomiam inungatur latus dolens sequenti linimento, cutem postea tegendo lanâ succidâ lintheo insutâ.

℞. Ol. lilior. chamæ. amygdal. dul. an. ℥. j. butyri recentis, axungia gallinæ, an. ℥. j. Fiat linimentum.

Multi addunt ceram hujusmodi linimentis, quæ tamen non convenit, quia obstruit poros, ut neque mucilagines, quæ emplasticæ sunt, quia refrigerant & adstringunt.

In pleuritide maligna & pestilenti utiliter additur hujusmodi linimentis oleum scorpion. Matthioli, vel theriaca.

Post iteratam venæ sectionem focus admoveendus est, in sequentem modum compositus.

℞. Radic. althææ, & lilior. an. ℥. ij. fol. malvæ, vio. pariet. an. M. j. sem. lini, & sænugr. an. ℥. j. florum chamæ. melilot. sambuci, violar. an. P. j. Fiat omnium decoctio, qua foveatur latus dolens, cum vesica fuilla.

Post focum admovebitur linimentum prædictum, cui in progressu morbi addi poterunt olea magis resolutentia, ut anethinum, irinum; tum etiam pulvis ireos & crocus. Imò verò ipsi fomento addi poterunt herbæ discutientes, ut origanum, calamintha, hyssopus, & semina valdè discutientia.

Multa alia topica, pleuritidis curationi valdè proficua, ab auctoribus usurpantur, quorum præcipua hæc sunt.

Prius inungatur pars unguento de althæa postea cumini pulvis inspergatur. Vel post inunctionem brassicæ folium ad ignem calefactum & inunctum admoveatur.

Faventinus miscet unguentum de althæa cum ol. amygdal. Post inunctionem aspergit pulv. cumini & superimponit folium caulis, & miris laudibus effert.

Item cataplasma sequens utilissimum est.

℞. Residuum decocti pro focu supra descripti. Contundatur in mortario marmoreo, addendo ol. amygdal. dulc. lilior. & chamæmel. an. ℥. ij. pinguedinis gallinæ ℥. j. farinæ hord. fabar. an. q. s. Fiat cataplasma.

Item gallina viva per spinam secta, pulvere ireos Florent. conspersa, & admota multum prodest.

Omentum vervæ recentè ab animali extractum, vel in aqua calida calefactum, optimum est anodynum. At pulmo ejusdem animalis idem efficacius præstat.

Oleum ceræ arte chymicâ extractum, linimentis admixtum dolorem lenit & materiam morbificam potenter discutit.

Panis recens è furno extractus, per medium sectus, & in butyro recenti liquato madefactus, & admotus, materiam lateri impactam potenter resolvit.

Lazar. Riverii Opera.

Post tres aut quatuor doses julepi prædicti, usurpari poterunt julepi pectorales, in hunc modum compositi.

℞. Hord. integri P. j. liquirit. raf. & passul. mundat. an. ℥. j. jujubar. par. xx. sem. quatuor frig. maj. an. ℥. iv. flor. buglossæ & violar. an. P. j. Coquantur ad quartaria. v. In colat. dissolve syrup. violac. jujubini. an. ℥. ij. Fiat julep. pro quatuor dosibus, manè & serò sumendis.

Vel si febris valdè acuta sit cum vigiliis conjuncta, emulsionem usurpari poterunt in sequentem modum.

℞. Amygdal. dulc. excortic. & aqua frig. macerat. ℥. ℥. quatuor sem. frig. major. an. ℥. iii. sem. lactuc. & papav. albi, an. ℥. ij. Contundantur in mortario marmoreo sensim affundendo decoct. hord. & liquirit. ℥. j. v. In colatura dissolve syrup. violac. ℥. iii. fiat emulsio pro iii. dosibus manè & serò sumendis.

Quidam practici urgentibus vigiliis audent exhibere narcotica, ut syrup. de papav. philonium roman. & laudanum opiatum. Quæ tamen in hoc affectu perniciose sunt; sputum enim retinent, & pectus coarctant. Unde non raro præceps exitium consequitur.

Quod tamen intelligendum est de integra narcoticorum dosi; nam in perexigua quantitate exhibita prodesse possunt in dolore vehementissimo, tussi molesta, & inani, à valdè tenui humore oriunda & vigiliis assiduus. In quibus casibus sæpè laudani gr. j. felici cum successu exhibui, & pluries aliquando iteravi. Sed illius usus præcipuè in principio morbi convenit; tunc enim humor influens in partem, cohiberi potest, & morbi incrementum impediri.

Quando tussis importuna est, & natura incipit per anacatharsin aliquid evacuare, teneat æger frequenter in ore saccharum rosaceum, cantum, aut penidiatum, vel tabellas diatragacanthi frigidi. Tum utatur syrup. violac. vel jujubino ex cochleari frequenter. Vel utatur eclegmate sequenti.

℞. Sacchari canti, & penidiat. an. ℥. j. pulv. electuar. diatragacant. frigidi ℥. ij. syrup. violac. & jujubini an. q. s. Fiat looch, quo utatur frequenter cum baculo liquirit. sensim lambendo. Vel fiat eclegma ex butyri, mellis, & sacchari æqualibus portionibus.

Oleum sem. lini vel amygdal. dulc. recentè sine igne extractum, cum saccharo mixtum & exhibitum egregiè tussim lenit, & dolorem pleuriticum demulcet. Præsertim si cum jusculo, aut alio decocto assatim bibatur.

Si spuria crassiora sint, quadam incidentia & attenuantia erunt permiscenda ut syrup. de tussilag. de liquirit. oxynel simplex, pulvis diaireos, & alia hujusmodi.

Eclegmata autem supino corpore sumenda, quia sic melius pulmonem fubeunt.

Progrediente morbo, ad corroborationem virium conditum restaurans usurpari potest.

℞. Conservæ flor. violar. j. conservæ flor. borrag. & rad. buglossæ, an. ℥. ℥. confect. alchermes ii. pulv. electuarii diatrag. frig. & diatragacanth. frigid. an. ℥. i. sacchari rosati ad pondus omnium. Fiat conditum auro coopertum, quo utatur frequenter ex cochleari.

Purgatio in pleuritide vera non convenit, nisi omninò ad declinationem pervenerit: Et tunc sequenti medicamento illa potest institui.

℞. Sennæ mundat. ℥. ℥. sem. anis. ℥. i. fol. buglossæ & capil. ven. an. M. ℥. liquirit. raf. & passul. mundat. an. ℥. iv. flor. buglossæ & violar. an. P. i. Coquantur ad ℥. iv. In colat. dissolve rhab. in aqua scabiosæ cum santalo citrino infusi ℥. iv. mannæ granat. & syrup. rosac. an. ℥. i. Fiat potio. Toto morbi decursu utatur æger pro potu ordinario decocto hordei & liquiritiæ, vel decocto papav. rhœad. cum syrup. capill. ven. Potus verò non sit actu frigidus, quia pectori nocet. Vinum in hoc affectu merum est venenum quemadmodum acida omnia, quæ tussim excitant, constringendo anacatharsin impediunt.

In declinatione, post purgationem & febrem valdè imminutam, si dolor perseveret, ad moveri poterit ipsi parti dolenti cucurbitula cum scarificatione. Imò & sequenti die iterum applicari, ad sanguinem denuò extrahendum. Possunt etiam applicari ante declinationem post iteratam



phlebotomia, bis aut ter. Et si dolor augeatur, vel redeat post aliquod tempus, iterum secabitur vena, & post iterum cucurbitula applicabitur.

Zacutus Lusitanus locis scarificatis detracta cucurbitula, hirudines sex admovit felici successu, ut ipse testatur *observ. 104. lib. 1. praxis admiranda.*

In eundem finem, ad reliquias materiæ morbificæ discutientibus, utiliter parti applicabitur emplastrum de sulphure, vel de baccis lauri.

Præter remedia vulgaria huic morbo valdè proficua alia quadam usurpari possunt propria & specifica, nempe rasura dentis apri, cinis priapi tauri vel cervi, flores papaveris rubri, corallus præparatus.

Quercetanus in Pharmacopœa laudat pomum excavatum, & thuris masculi 3 j. repletum, & ad ignem coctum, quod æger deglutiat, superbibendo aquæ card. bened. 3. iij. postea verò benè contextus sudet. Hoc remedium post tertium morbi diem usurpandum esse vult, eoque multos asserit fuisse restitutos.

Flores buxi ad eò sanguinem purgare feruntur, ut si eorum pulveris 3. j. cum aqua papaveris rhœad. exhibita, sanguis post horam mittatur, floridus is appareat.

Stercus equinum in aqua cardui benedicti dissolutum & colatum, pleuriticum dolorem & humorem illum producentem, potenter discutit.

Idem præstat stercus album gallinæ, ad 3. j. cum eadem aqua exhibitum.

Stercora illa multum habent salis volatilis, qui maximâ penetranti ac discutiendi vi præditus est.

Ex duobus illis stercorebus potest fieri potio efficax in hunc modum.

℞. Sem. cannabis 3. j. Contundatur in mortario, deinde adde stercoreis albi gallinæ, & stercoreis equini, an 3. β. Dissolvatur in aquæ card. bened. 3. v. coletur per linteum, & exhibeatur.

Sanguis hirci sylvestris ad 3. β. exhibitus cum aqua prædicta, potenter discutit pleuritidem. In illius defectu sanguis hirci domestici usurpari poterit. Sed cum vires illius sint infirmiores, ad 3. j. exhibendus. Ejus autem præparatio in hunc modum se habet.

Hircum suspende cornibus, & crura posteriora reflecte ad cornua, testes abscinde, sanguinem fluentem excipe in vase amplo, & exsicca sole, si æstas sit, vel retrò furnum pistoris. Longissimè distat ab hircino sanguine officinarum.

Fuligo camini ad 3. j. exhibita multum confert, sed multò magis spiritus fuliginis, ab Hartmanno descriptus in praxi medica.

In pleuritide epidemica sudorifica, aut diaphoretica medicamenta usurpanda sunt, qualia in febribus malignis præscribi solent, quæ tamen hunc modum, quantum fieri potest, peculiariter debent respicere.

Diarrhœa pleuritidis superveniens, periculosa est. Ideò temperari debet syrupo myrtino, qui eam sistit, & nihilominus expectorat, atque ita cum aliis syrupis permiscendus est. Venter & renes adstringentibus inungantur, ut in omni diarrhœa fieri solet. Clysteres injiciendi, ex decocto hordei excorticati, quod ut Galen. docet refrigerat & astringit, additis rosæ rubris, & in eo dissolvendo ovorum vitellos.

### CAPUT III.

#### De Peripneumonia.

**P**eripneumonia eandem habet cum pleuritide essentiam, & parte affectâ tantum distinguitur, quod illa sit pulmonis inflammatio, hæc verò membranæ, costas succingentis. Materiâ etiam aliquatenus differunt. Siquidem pleuritis frequentius fit à bile; peripneumonia frequentius à pituita: quamvis omnes humores (ut de pleuritide dictum) hunc affectum producere valeant: humores, inquam, massam sanguinis constituentes, & sub forma sanguinis contenti. Quemadmodum humores crassi den-

sam pleuræ membranam difficilè penetrant, tenues verò & biliosi eam faciliè pervadunt; sic contra pituitosi & crassi in mollem & raram pulmonis substantiam faciliè transferuntur, eique tenaciter adhærent, biliosi verò & tenues faciliè præterturbantur. Hoc tamen non impedit, quin sanguis biliosus interdum pulmonis inflammationem efficere valeat, quemadmodum Hip. 1. de morbis, Erysipelas pulmonis describit.

Fit autem inflammatio erysipelatosa, ex sanguine bilioso à dextro cordis sinu per venam arteriosam in pulmonem delato. Oedematosa verò, ex sanguine pituitoso per viam fluxionis à capite in subjectas partes irruente. Sola tamen pituita excrementosa, per viam catarrhi à cerebro defluens, peripneumoniam efficere potis est, quatenus in pulmone putrescens sanguinem attrahit, ex cujus admixtione inflammatio oritur, & hæc sæpissimè in senibus contingit.

Mesue tamen peripneumoniam magis fieri à bile asseruit, quia pulmo sanguine bilioso nutritur, qui magna copia affluit per viam patentissimam, nempe venam arteriosam.

Respondemus, sanguinem floridum, tenuem & vapo-rosum in dextro cordis sinu elaboratum ferri in pulmonem, qui propter puritatem faciliè regitur & natura, & per arteriam venosam ad sinistram cordis ventriculum transmittitur: ideòque rarò tantum subire à naturali statu recessum, qui, peripneumoniam efficere natus sit. Contrà verò fluxione à capite irruente, & per vias amplissimas ad brachia delata, si ibi putrescat, sanguinem accerfere & peripneumoniam excitare.

Generatur verò peripneumonia interdum primariò, sine alterius morbi interventu: interdum verò aliis morbis succedit, ut anginæ & pleuritidi. Gall. in comm. 11. sect. 7. Aph. docet, duobus modis peripneumoniam pleuritidi succedere; vel quando morbus lateralis in peripneumoniam transmutat, vel quando morbo laterali pulmonis inflammatione supervenit. Hæc autem transmutatio fit, quando priore cessante morbo advenit alter; supervenit autem, quando altero manenti alter adjicitur.

Causa igitur interna & immediata peripneumoniarum sanguis est, frequenter pituitosus, rarius biliosus, rarissimè melancholicus. Qui vel à toto fluit corpore plethorico, vel cacochoymo, vel ab aliqua parte similiter repleta, aut præter naturam affecta.

Causæ externæ peripneumoniarum & pleuritidis eadem omninò sunt, quæcunque videlicet fluxiones ad eas partes commovere possunt, quarum præcipuæ sunt: Primò motus corporis & exercitium vehemens, præsertim post magnam quietem & multas epulas: tunc enim humores, ex ciborum multitudine asservati, & præcedenti quiete intus detenti, superveniente exercitio funduntur, attenuantur, & incallescunt, ac postmodum ad partes debiliores, & fluxioni eorum recipiendæ magis idoneas propelluntur, inter quas thorax & pulmo principem locum obtinent, quia valido exercitio anhelitus magnus & creber efficitur, sicque partes prædictæ maximè fatigantur, & pulmonis substantia mollis & laxa humorem influentem faciliè recipere potest.

Secundò inter causas externas efficaciores ponitur aer frigidus & aquilonius austrino & tepido subito succedens, à tepidiusculo siquidem aëre pori laxantur, & humores fluidiores evadunt, qui adveniente aëre frigido, comprimuntur, & ad partes debiles exprimuntur.

Denique ex Hipp. lib. de aëre, locis & aquis, usus aquarum lacustrium & stagnantium peripneumoniarum generandæ idoneus est. Dicit enim Divinus Senex, in regionibus lacustribus & paludosis frequentes peripneumonias observari.

Signa etiam peripneumoniarum cum signis pleuritidis majori parte conveniunt. Duo prorsus eadem, febris acuta, tussis, quæ aliquando sicca, aliquando humida est seu cum sputo magis pituitoso, colorato ex bile aut sanguine: interdum & in progressu spura fiunt purulenta, materiâ morbificâ à calore coctâ & maturatâ. quod fit plerumque illæsa pulmonum substantia, alioqui enim, ea exulceratâ, phthisis succede-



succederet. Sic passim videmus in oculi ophthalmia laborantibus & pure fordidis, humores in pus converti, non suppuratâ neque ulceratâ partis substantiâ.

Reliqua signa differunt ratione partis affectæ. Difficultas spirandi major est quàm in pleuritide, ob angustiam instrumenti inflammati, ut ægri suffocati videantur, & nonnisi erecti respirare valeant; pars enim ob tensionem & repletionem comprimi nequit, neque amplius dilatari quamvis magna adsit pulmonis dilatatio; paucum tamen aërem capit, idè celer & frequens est respiratio cum stertore. Augetur necessitas ex febre, cum afflatione calidioris spiritus, & aëris frigidi desiderio.

Pulsus magnus, languidus, mollis ob pituitam & pulmonis laxitatem; aliqua interdum durities ex bile & sanguine, inæqualis ob compressionem arteriæ prope cor, in crassis humoribus magis; interdum verò intermittens, intercurrentes, undosus, vermicularis, cum ex immodica humiditate pulmo computruit.

Dolor gravans & profundus ex imo ad pectus & spinam pertingens, quandoque inter scapulas, quandoque sub una tantum scapulâ dolor percipitur, & jugulo ac mammæ communicatur, præsertim in tussi. Quandoque dolorem non sentiunt, nisi cum tussire inceperint. Quandoque etiam dolor apparet punctorius in latere cum pleuritidi conjuncta est peripneumonia, quod sæpissimè contingit. Licet autem membrana pulmonem investiens sit ejusdem naturæ cum membrana costas succingente, ut docuit Gal. 4. de loc. aff. cap. 5. dolor tamen tam intensus non percipitur in peripneumonia, quemadmodum in pleuritide, propter duplicem differentiam, quæ ab eodem Gal. proponitur loco citato. Prima est, quod nervi, qui feruntur ad membranam pulmonis, sint pauci & exigui; qui verò ad pleuram, plures & insignes. Altera est, quod thorax constet ossibus & carne, quæ resistunt tensioni, unde major dolor, pulmo verò mollis cedat tensioni, unde minor dolor.

Rubor genarum apparet ob vapores calidos ad caput exhalantes, & tenuiorem sanguinem secum rapientes, cujus color in malis præsertim efflorescit, quia earum cutis tenuior.

Propositis signis accedunt anxietas, impotentia, jactatio, cum calor ingentis sensu in toto corpore. Color linguæ flavus, deinde processu temporis rubescens, sitis ingens, oculorum extumescencia, & venarum temporum elevatio. Delirium, quando peripneumonia ab humore bilioso; & coma, si ab humore pituitoso generatur.

Si à sanguine bilioso morbus oriatur, sputa erunt flava, æstus major & sitis; major respirationis angustia cum minore gravitate; expiratus aër calidior, febris ardentissima, cum pulsu creberrimo, delirium ingens, urina tenuis, citrina, & pellucida. Ætas, anni tempus, regio, victus præcedens bilem attestantur.

Si pituita (quod frequentius est) morbum producat, sputum erit album, viscidum & spumans; febris, thoracis incendium, sitis, linguæ siccitas minor: Thoracis gravitas major, pulsus rarior, & mollior, ætas ut plurimum senilis, habitudo, anni tempus, regio frigida & humida.

Si ex sanguine puro affectus ortum duxerit, sputum erit rubrum, urinae rubræ & crassæ, faciei rubor major, venarum temporum evidentior elevatio, cum totius corporis gravitate ac tensione, & reliquis, quæ sanguinis abundantiam ostendunt.

Si denique melancholicus sanguis in causa fuerit, sputum apparebit nigrum aut sublividum, lingua à principio nigra, sicca & scabra: Aderunt etiam tristitia & magna inter respirandum suspiria, ac reliqua melancholiæ in toto corpore dominantis signa apparebunt.

Prognosis hujus affectus in hunc modum instituenda est.

Peripneumonia pleuritide periculosior est, & ut plurimum lethalis, ob respirationis necessitatem & cordis viciniam. Hoc sanè morbi genus, (inquit Celsus) plus periculi quàm doloris habet, & plerumque in calamitatem abire solet.

Spem tamen salutis ostendant virium robur, minor sym-

ptomatum vehementia, sputa subflava, non multo permixta sanguine, circa initia excreta, sanguinis fluxus è naribus copiosè & die critico erumpens, vel alvi fluxus biliosus & spumolus, vel mensium aut hæmorrhoidum conferta eruptio.

Abcessus circa aures vel partes internas debite suppurati & aperti, salutem ostendunt, ut docet Hippocr. in Prognosticis.

Si peripneumonia in pleuritidem transmutetur, bonum est. Quamvis id rarò contingat, ut docet Gal. comment. Aphor. 11. sect. 7. Quia ex morbo periculosiore ad minus periculosum fit transitus. Et cognoscitur hujusmodi transmutatio ex superveniente lateris dolore punctorio & imminuta spirandi difficultate.

Periculosam verò ac lethalem peripneumoniam portant morbi & symptomatum vehementia sputi carentia, vigilie assidue, delirium vel coma, extremorum frigiditas, stertor cum maxima respirationis angustia, unguium livor & incurvatio.

Præterea pleuritidi peripneumonia succedens periculosissima est, ut docet Hipp. Aph. 11. sect. 7. quia humoris translatio à parte ignobiliore ad nobiliorem mala est; & vires à prægresso morbo fatigatæ, novi & deterioris vim perferre non possunt.

Urinae circa initia crassæ, & postmodum ante diem quartum tenues factæ, mortem portant. Hippocr. in Coacis.

Peripneumoniarum curatio pleuritidis curationi simillima est. Ac primum in ea utramque paginam implet phlebotomia, quantum vires ferre possunt, semel aut bis in die, donec morbus mitescat. Cum enim pulmo multo sanguine abundet, & à corde æfluante magnam illius copiam attrahat; minimè verendum est, ter, quater, quinquies & sexies sanguinem detrahare.

Si tamen peripneumonia anginae & pleuritidi succedat; majori cum religione sanguis mittendus est; quia vires affictæ sunt priori morbo.

Mitti verò debet sanguis è basilica utraque, si totus pulmo æqualiter afficiatur; vel ab alterutra, quæ lateri affecto magis respondeat, in quo scilicet æger dolorem, aut gravitatem majorem percipiat, & ex quo sputum potius evehi sentiat.

Mulieribus peripneumonicis, quibus sanguis menstruus actu fluit à talo primo, & mox intra sex horas à brachio sanguinem mittere oportet, nisi adeò urgeat periculum, ut cogat primo accessu sanguinem è brachio fundere. Quo in casu, toto venæ sectionis tempore, & parum ante illud, cucurbitulæ femoribus sunt affigendæ.

Posteaquàm verò non videntur vires ulteriorem venæ sectionem ferre posse, cucurbitulæ admovendæ sunt scapulis & dorso, tum siccæ, tum maxime scarificatæ, quantum vires ferre possunt.

Clysteres etiam emollientes & lenientes revulsorii sint; ne tamen iis vehementiora cathartica misceantur, metu alvi fluxus, qui in hoc morbo periculosus est.

Si humor crudus & pituitosus à capite irruens morbum efficiat, vel foveat, vesicatorium posteriori cervicis parti admotum, summopere proderit.

Interim usurpentur julepi & emulsiones, in cura pleuritidis descriptæ. Pectus illinatur oleo viol. amygdal. dulc. butyro recenti, & similibus, vel sequenti linimento.

℞. Olei violac. & nimp hæ, ana ʒ. j. b. butyri recentis & mucilag. sem. psyllii, ana ʒ. j. ol. rosac. ʒ. b. trochisc. de caphura ʒ. j. Fiat linimentum. Vel

℞. Ol. violac. ʒ. iij. ol. de sem. cucurbitæ, & lactis muliebris, ana ʒ. j. butyri recentis ʒ. j. b. Misce, fiat linimentum.

Anacatharsis promovetur syrupo violac. jujubino, aliisque in cura pleuritidis propositis. Similiter eclegmata & condita, ibidem descripta, usurpari poterunt, hac cautione adhibitâ, ut in materia tenuiori in crassantia, in crassiori attenuantia usurpentur.

Potus ordinarius sit decoctum hordei & liquiritiæ, quemadmodum in pleuritide.

Purgatio in hoc affectu non convenit nisi declinante morbo,



morbo, illiusque materia eligenda qualis in cura pleuritidis proposita est.

## CAPUT IV.

## De Empyemate.

**L**icet empyematis nomen omnem suppurationem significet, usus tamen obtinuit, ut non nisi pro puris collectione in thoracis capacitate usurpetur.

Hæc autem puris inter pulmonem & thoracem collectio triplicem agnoscit causam: Prima est inflammatio suppurata, quæ in pleuritide aut peripneumonia contingit: Et rupto abscessu, pus in thoracis cavitatem effunditur. Idem fieri potest in angina, ut docuit Hip. *Aph. 10. sect. 5.* his verbis: *Quicumque ab angina liberatur, iis ad pulmonem vertitur, & in septem diebus percunt: Si verò hoc effugerint, suppurantur.* Secunda est sanguis in thoracem effusus, ubi moram trahens necessariò suppuratur. Sic apud Hipp. *Aph. 20. sect. 6.* *Si in ventrem sanguis præter naturam effunditur, necessariò suppuratur.* Illa autem suppuratio (ut docet Gal. in *comm.*) non semper est vera & propriè dicta suppuratio, sed potiùs corruptio dicenda, ex qua materia quædam puri analogâ generatur. Effluere autem potest ille sanguis in thoracem, ex vulnere aut venâ quædam disrupta. Tertia est pituita à capite vel aliis partibus in thoracem emissâ & ibi putrefacta. Sic apud Hip. *Aph. 38. sect. 7.* *Distillationes in ventrem superiorem suppurantur intra viginti dies.* Gal. in *comm.* per ventrem superiorem, thoracem intelligendum esse affirmat. Illa autem pituita putrescens non verum ac legitimum pus, sed quippiam ipsi analogum producit, quemadmodum videmus tumores pituitosos, ut atheromata, steatomata, & mericerides quasdam abscessuum species constituere.

Signa diagnostica duorum sunt generum: Quædam recentem & incipientem affectum ostendunt, alia verò diuturnum & confirmatum.

Incipientis suppurationis tria proponuntur signa ab Hipp. 2. *Prognost.* Primum est, si pleuritide, aut peripneumonia non expurgatâ febris intensior evadat, dum enim pus conficitur, febris intenditur, ex Hippoc. *Aph. 47. sect. 1.* Secundum est rigor, qui fit, dum puris acrimonia partes vellicat membranofas. Tertium est pondus & sensus gravitatis in parte; humor enim in cavitate contentus magis gravat, quàm dum in partis substantiam effusus est. Addit Gal. 4. *de loc. affect. cap. 9.* fluctuationem. *Eam ubi quis (inquit) assatim à decubitu transmutatur, idque maxime, si ab uno latere in aliud se convertens despuere aliquid sentiat, puris multitudinem ibi contineri haud dubia conjectura est.* Quin etiam in his fluctuatio sæpenumerò haud obscurè auditur, nisi puris crassities aut copia, quæ totam thoracis cavitatem impleat, fluctuationem impediat. His etiam accedit respiratio difficilior. Quamvis enim rupto abscessu dolor lateris sedetur, & hinc diaphragma & thoracis muscoli liberius moveri possint, quia tamen pulmo à circumfuso pure gravatur, ut liberè moveri non possit, & præterea quædam puris portio spongiosâ pulmonis substantiâ imbibitur, inde pulmo gravior redditur, bronchiæque à pure imbibito obstruuntur, & respiratio redditur difficilior. Ex illa etiam puris in pulmonem & bronchia transmissione sputum purulentum exoritur, quod etiam factum empyema significat, non per thoracem puris excretio fit propter illius crassitiem, ob quam ad bronchia pervenire non potest.

Diuturniorem verò ac confirmatum affectum significant febris lenta, continuò infestans, quæ partim putrida, partim hectica videtur, interdù mitior, noctu verò vehementior, sudores multi, noctu præsertim advenientes. tussis frequens & molesta. Temporis verò processu maxillæ ruborem contrahunt, oculi concavi redduntur, ungues incurvantur, pedes intumescunt, & pustulæ circa pectus erumpunt, acriore puris parte ad extremam usque cutem penetrante.

Latus affectum distinguitur ex iis quæ habentur apud Hipp. 2. *Prognost. text. 21.* *Si empyema (inquit) in tantum parte existat, hos convertere ac discere oportet.*

*doleant ne in altero latere, & an alterum altero calidius sit, atque cubantem supra sanum latus interrogare, an videatur sibi onus aliquod desuper suspendi. Si enim ita est in quocumque latere pondus sit in altero suppuratio existit. Quemadmodum si utrinque calor & pondus sentiat, in tota thoracis cavitate pus continetur.* Addit Avicenna aliam conjecturam, quam deprompsit ex Hippoc. 2. *de morbis.* *Applicetur (inquit) lintum thoraci madefactum, secundum utramque partem, dextram & sinistram, citius enim exsiccabitur illud, quod supra partem pus continentem appositum est.* Aliud denique signum ab experientia nostra desumptum proponere liceat, quod ab authoribus non fuit animadversum; quod nimirum in latere affecto tumor ut plurimum oedematosus appareat, ex tenuiore materiæ collectæ portione, in thoracis musculos resudante. Et quando in suspitione empyematis huiusmodi tumor aut cutis inflatio in alterutro latere apparet, certò pronuntiare licet, empyema intus latere, & apertionem lateris tutò fieri posse.

Signa prognostica præcipua proponuntur ab Hippoc. insigni contextu, qui habetur 2. *Progn. text. 6. 3.* his verbis: *Suppuratorum ii potissimum supersunt, quos febris eadem die dimiserit post ruptionem, ac cibum cuius appetunt, & siti liberati sunt, & venier exigua ac consentientia dejecit, & pus album, leve concolorque est, & vacans pituita, & absque labore ac valida tussis expurgatur. Ita optimè, quidem sic ac celerrimè judicantur: Sin minùs, qui ad hoc proximè accedunt. Moriuntur verò ii, quos febris non deserit, aut cum videtur deferere denuò recalcenscens innotescit, & sitiunt, nec cibum appetunt, alvus humida est, pus viride, lividumque spumum, vel pituitosum spumosumque. Pereunt, si hæc desint omnia. At quibus alia veniunt, alia non, horum quidam intereunt, quidam multo tempore incolumes evadunt.* His & nos sequentia Prognostica adjungamus.

Empyici, quibus ob magnam puris copiam totus thorax in respiratione attollitur, celerrimè suffocantur, ex Gal. *de loc. aff. cap. 7.*

Empyema si 40. dierum spatio per sputum non repurgetur, in tabem degenerat, quæ mortem accersit ex Hipp. *Aph. 15. sect. 5.*

Suppuratio quæ utramque thoracis partem occupat, periculosior est, quàm quæ unicam. Item quæ sinistram occupat, periculosior est, quàm quæ dextram propter viciniam sinistri cordis ventriculi, qui à pure in illa parte collecto gravius afficitur.

Quicumque suppurati uruntur vel secantur, pus purum fluxerit & album, evadunt. Si verò subcruentum, sæculentum ac fœtidum, pereunt. *Aph. 44. sect. 7.*

Si pus Empyicorum per alvum & urinam, validis viribus existentibus satis copiosè expurgetur, salutem portendit. Licet rara sit puris hæc per alvum, aut urinas evacuatio: Tamen à Galeno, Paulo, & Aëtio proponitur: Tum viæ, per quas fit, à Galeno proponuntur 3. *de loc. aff. cap. 4. & comm. Aph. 30. sect. 7.* In priori sic loquitur: *Hæc quæstio Erasistrati sectatores non parum urget, quippe qui putant solum spiritum in arteriis contineri. Nobis verò nihil difficultatis affert, utpotè intelligentibus quod laevis arteria pulmonis, quantum puris ex rupta vomica suscepit, id in sinistram cordis sinum deferre potest quod inde per arteriam magnam in renes fluit.* In posteriori loco dicit, materiam in pulmone contentam primùm ad ventriculos cordis pervenire, & inde vel ad arteriam magnam, vel per cavam ad gibba hepatis, deinde illinc ad cava, & ita per portas ad intestina. Ex quibus facilè patent viæ, per quas empyema per alvum & urinas expurgari potest. V. Severin.

Empyici meliùs habentes, & qui ferè expurgati videntur, si sputum fœtidum excernant, cum recidiva intereunt. Hipp. in *Coacis.*

Quibus specillum à pure velut ab igne coloratur, ii ferè moriuntur. Hipp. in *Coacis.*

Pro hujus affectus curatione. Primùm, si materiæ in thorace collectæ suppuratio prohiberi nequeat, adjuvanda est cataplasmatibus convenientibus.



℥. Rad. althææ ʒ. iij. ficuum pinguium n. x. passul. mundat. ʒ. j. florum chamæm. & melilot. ana P. j. Coquantur omnia perfecte, deinde contundantur, & per cribrum trajiciantur. Postea adde farinæ sem. lini, sœnugr. & tritici, ana ʒ. j. ol. amygdal. butyri recentis, & terebinth. an. Unc. j. Fiat cataplasma.

Ad concoctionem & maturationem intus etiam adjuvandam, apozema sequens in usum vocari poterit.

℥. Rad. althææ, symphyti major. ana Unc. j. foliorum agrimonii, tussilag. scabiosæ, capil. ven. ana M. j. quatuor sem. frig. major. ana ʒ. j. sem. anisi. ʒ. j. liquir. raf. & passul. mund. ana ʒ. j. flor. trium cord. & chamæm. ana P. j. Fiat decoctio ad ℔. j. β. In colat. dissolve syrup. de tussilag. de liquirit. Sacchari canti, ana Unc. j. Fiat apozema aromatizat. pulv. rad. ireos Florent. ʒ. j. pro v. dosibus matutinis.

In eundem finem utatur eclegmate sequenti.

℥. Pulpæ ficuum pinguium Unc. j. butyri recentis Unc. ij. ol. amygdal. dulc. recenter sine igne extracti Unc. j. sacchari canti Unc. ij. amyli ʒ. Fiat looch. capiat lambendo.

Terebinthina Veneta, aquâ hordei lota, ad ʒ. iij. exhibita cum pulvere liquiritiæ, multum prodest ad maturandum, discutiendum, & detergendum.

Si denique per anacatharsin empyema solvi non posse videatur (quemadmodum ut plurimum non fit) ad lateris apertionem veniendum est, quæ fit inter quartam & quintam costam, ab inferioribus & nothis incipiendo, multis cautionibus adhibitis, quæ apud Chirurgiæ scriptores, & præsertim Hieronymum Fabricium ab Aquapendente, libro de operationibus Chirurgicis, eleganter descriptæ reperiuntur. At verò multo utilius est, abscessum, qui pleuritidi succedit, aperire, antequam disrumpatur, & pus in thoracis capacitatem effluat. Quod dignoscitur ex tumore, qui juxta suppurationis locum elevatur, aliisque signis empyemati omni communibus. Tum verò apertio molienda est, non in parte thoracis inferiori, & inter quartam & quintam costam, quia aperto foramine longè ab abscessu, pus nullum exiret; sed in medio tumore admoto prius caustico. Si verò nullus tumor appareat, difficillimum est apertionem tentare ante abscessus ruptionem.

Si tamen eam quis aggredi voluerit, eligere debet locum, in quo æger dolorem & pondus percipit, & qui majori calore pollet. Fieri autem debet apertio inter duas costas, supra partem costæ superiorem, quia inferiori adjacet vena & arteria: quod in omni empyematis apertione observandum est. Dum pus, aperto thorace, per intervalla educitur, utatur æger bis in die potione vulnerariâ, quæ sanguinem expurget, ulcera detergat, & putredinem inhibeat.

℥. Saniculæ, bugulæ seu consolidæ mediæ, scabiosæ, betonicæ, hyperici, card. benedicti pilosellæ, pimpinellæ, vincæ pervincæ, agrim. plantag. ana M. j. Sem. hyperici, card. bened. ana ʒ. sem. flor. card. ana P. j. Coquantur in hydromel. ad ℔. j. sem. cujus capiat Unc. vj. singulis vicibus.

Hoc eodem decocto poterunt fieri injectiones in thoracis cavum.

Pro potu utatur hydromel. vel aqua hordei saccharatâ, vel saccharatâ simplici.

Si aperto thorace pus debite non fluat, sequenti emplastro eliciendum est, quod ex omnibus abscessibus potentissime pus attrahit, & foras educit.

℥. Resinæ pini recentis claræ, & odoratæ, ℔. β. ol. laurini, & terebinthinæ, ana ʒ. j. gummi elemi ʒ. ij. Primò resina & gummi in igne liquentur, donec simul misceantur. Postea adde terebinthinam & oleum, omniaque simul bulliant tantillum, & per linteum crassius transcolentur. Massæ istius portio extendatur super alutam, & fiat emplastrum, quod mutetur semel in die tantum hyemis tempore, bis autem in die æstate. Perforetur in medio duabus aut tribus incisuris oblongis, ut pus attractum effluat.

## CAPUT V.

### De hydrope pectoris.

**E**mpyemati simillimus est hydrope pectoris, qui fit seroso humore, in pectoris capacitatem collecto. Practicorum vulgus hunc morbum non describit, licet ab Hippocrate graphicè delineatus sit 2. de morbis, sub nomine hydrope pulmonis, in hunc modum: *Febris & tussis tenet, & acervatim respirat, & pedes tument, & ungues contrahuntur, & patiuntur talia, qualia is, qui suppuratus est, sed debilius & diuturnius. Et si quid infundas, aut solum aut suffotum adhibeas, pus non sequitur. Atque ex hoc sanè cognoveris, non pus, sed aquam intus esse. Et si multo tempore, aure ad latera adhibita, audire tentaveris, ebulliit inus velut acetum. Et hoc quidem aliquando patitur, postea erumpit ad alvum, & statim quidem sanus esse videtur ac morbo liberatus. Verum progressu temporis alvus incenditur, eademque illa patitur, & adhuc amplius. Aliqui etiam intumescunt ventre, seroto, & facie.* Hæc Hippoc.

Hic morbus rarissime contingit, frequentior tamen est, quam vulgò creditur: sed plerumque non agnoscitur. Plures illius historiæ à Schenkio collectæ sunt, ex quibus patet, eum non nisi post dissecta cadavera ex hoc morbo defunctorum, innotuisse. Ideò exactè describendus est, ut Medici curantis peritiam non subterfugiat.

Serosus iste humor vel in ipso pulmone gigni potest, proprio ipsius vitio, dum scilicet proprium alimentum non bene concoquit, sed illud in serosum humorem convertit, qui sensim ad thoracis cavitatem transmittitur, quod etiam fieri potest vesiculis hydatidibus in pulmone excitatis, iisque disruptis, quæ ab Hippocrate recensitæ sunt lib. de internis affectionibus, & à quibusdam autoribus observatæ: Vel aliunde in thoracem transmittitur, præsertim ab hypochondriis quando scilicet hepar aut lien intemperie, scirrhus, aut alio gravi morbo afficitur, unde serosi humoris copia generatur, serosus ille humor vel per venas ad pulmonem naturâ aut casu debilem transmittitur, vel à cavitatem abdominis ad thoracem per cæca spiracula transfertur. Facilem autem esse illam serosi humoris ab uno ventre in alium transmissionem, docetur experientiâ, quandoquidem hydrope pectoris in hydrope abdominis tandem degenerat, & vice versâ humor, in asciticorum abdomine contentus, in thoracem sæpius transfertur, unde illi subito & ex improviso suffocati pereunt.

Diagnosis hujus affectus (sicut antea dictum) difficillima est, & omnia ferè signa cum aliis thoracis morbis communia sunt. Hoc tamen illi & empyemati tantum peculiare, murmur scilicet aquæ fluctuantis, quod intra pectus exaudiri potest, si corpus sursum ac deorsum, transversimque commoveatur, vel à valido homine scapulis apprehensum agitetur.

Omnia verò signa ex Hippocr. suprâ recensita, collective sumpta diagnosis satis certam stabilire possunt. Quibus hoc unicum addere licet, tanquam pathognomonicum, & quo solo hydrope pectoris à cæteris difficultatis respirandi speciebus distinguitur. Quando nimirum spirandi difficultas primo quoque somni tempore invadit, eumque intercipit, ac per noctem magis urget, procedente verò die sensim lenescit.

His accedit interdum brachii alterius vel humeri dolor, vel paralysis, vel quæ fit ab humore à capite in pectus delabente, cujus portio in brachium vicinum defluit, vel è sero in pectore contento, & ad brachia per venas axillares exsudante, vel à refrigeratione musculorum intercostalium à quibus ad brachia nervi derivantur, vel alia quavis sympathia viciniæ lege oborta. Hanc enim pectoris & brachiorum sympatiam notavit Hip. in Coacis, his verbis, *Si vehementer inflammantur appendentes utrinque pulmonis partes, aut in latus incumbat, resolvuntur ea parte corporis.*

Gravissimus est affectus, & difficillimè curationem suscipit. In iis enim, qui eo laborant, calor nativus admodum debilis



debilis est, viresque naturales languidæ ex gravi aliquo viscerum affectu: unde fit, ut quamvis collectus humor in thorace remediis idoneis evacuetur, quod tamen difficillimum est, novus subindè fiat novæ materiæ affluxus; unde morbus non solum fovetur, sed etiam deterior in dies evadit, ita ut tandem in hydropem ascitem corpus incidat, multiplicata materiâ, & in abdominis cavitatem transfusâ. In principio tamen, antequam viscera insignem læsionem susceperint, curationem interdum admittere potest.

Ad curationem hujus morbi duæ indicationes ante oculos proponendæ sunt, ut scilicet materia in thorace contenta evacuetur, & nova illius generatio impediatur.

Materiæ in thorace contentæ evacuatio difficillima est, quia non sunt viæ patentēs, per quas educi possit. Ideò Hipp. lateris apertionem præcipit, quam tamen, quia in usum revocatam non vidimus; neque felicem illius successum apud ullum autorem legimus, probare absolute non possumus. Et de ea idem dici potest, quod de paracentesi in hydropem ascite capite proprio dicimus.

Satius ergo est hydragogis medicamentis humoris illius evacuationem tentare. Cui rei conferent ea omnia, quæ in hydropis curatione à nobis proponuntur. Ubi tamen diligenter observandum, quod si morbo jam confirmato, & multa serosi humoris copia in thorace collecta, purgans validius exhibeatur, humores illi valde exagitentur, unde suffocatio ingens agrotanti contingit, quæ illum subito de medio tollit. Ideò cautè agendum est; & in minori dosi, atque iteratis vicibus medicamenta exhibenda sunt eaque cum potentioribus aperientibus ac diureticis miscenda, ut simul viæ aperiantur, & serosæ materiæ portio ad urinæ vias deducatur.

Inter hydragoga, ea quæ ex mineralibus desumuntur, in hoc affectu maximè conveniunt, qualia sunt mercurius vitæ, ita correctus, ut per inferiora tantum evacuet.

Diuretica etiam sola frequenter usurpata multum conferre possunt, quia materiam antecedentem ad thoracem consequentem avertunt, & per urinas evacuant; tunc etiam consequuntur quadam ab ipso thorace educunt.

Sudorifica etiam ad serosam illam materiam educendam utilissima sunt, & nos vidimus virum sexagenarium usu decocti sudorifici ex guajaco, & salsa parilla parato per 15. dies, sudores excitando cum vapore spiritus vini, fuisse liberatum.

Ad eandem serosi humoris à thorace aversionem plurimum conferent cauteria cruribus aut tibiis admoda.

Generatio verò illius serosæ materiæ impeditur, vitia corrigendo earum partium, quæ hanc materiam suppeditant. Sic pulmone ipso laborante, illi remedia appropriata erunt usurpanda. Si hepar aut lien intemperie, obstructione, scirrhus, aut alio quopiam vitio laboret, illorum affectuum curationes ex propriis capitibus erunt repetendæ.

Universaliter verò ea, quæ partes vitales & naturales roborant, semper convenire poterunt, qualia in virium imbecillitate, hydropis, & fluxus hepatici curatione descripta sunt.

## CAPUT VI.

### De Hemoptisi, seu sanguinis sputo.

**L**icet vulgò hæmoptisis omnem sanguinis per os excretionem significet, à quacunque parte procedat sive à thorace, pulmone, aspera arteriâ, sive à faucibus, gingivis, palato, columellâ, cerebro, ventriculo, hepate, & liene; propriè tamen à Gal. 1. *de cris. cap. 5.* hæmoptisis nomen pro ea sanguinis exspuitione sumitur, quæ à partibus vitalibus, thorace nimirum, pulmone, asperâ arteriâ procedit.

Est symptoma in excretis eorum, quæ sunt toto genere præter naturam.

Cum autem omne symptoma pendeat à morbo, tanquâ causâ proximâ & immediatâ; hujus causa erit morbus organicus, vel communis. Organicus duplex est, vasorum apertio, quæ *ἀναστόμωσις* Græcis dicitur, & rarefactio *διαπύκνις* appellata. Communis etiam duplex est, eorum-

dem vasorum rupio, quæ *ρῖξις* nominatur, & erosio *διαβρωσις* appellata.

Causæ internæ, istos morbos immediatè producentes sunt, sanguinis quantitas, vel qualitas excedens.

Sanguis quantitate peccans venas rumpere, aut orificia illarum aperire potest, atque ita rhixin aut anastomosis efficere.

Idem verò qualitate peccans, si nimirum calidior tenuiorque sit, per anastomosis effluere potest, quia calor orificia dilatat, & tenuitas efficit, ut facilius effluere possit. Eadem qualitates diapedin etiam efficiunt; calor enim rarefacit tunicas vasorum; tenuitas verò sanguinis efficit, ut per poros earum tunicarum facilius transfluere possit.

Sanguinis denique acrimonia venarum tunicas erodit & exulcerat, ac diabrosin parit. Id ipsum præstare possunt humores acres vel salii à capite destillantes, vel aliunde ad pulmonem confluentes.

Causæ etiam externæ ad horum morborum productionem concurrunt mediatè, vel immediatè. Immediatè id præstant ictus, casus, vulnus, & alia id genus. Mediatè verò operantur, quæcumque sanguinem multiplicare, calescere, aut attenuare possunt, ut victus plenior, aut calidior, mensium aut hæmorrhoidum suppressio, exercitatio nimia, clamor ingens, longa in sole mora, & alia quamplurima.

Frigus etiam externum vasorum disruptionem potest adjuvare, eorum tunicas duriores & ad extensionem difficiliore reddens. Ad hoc tamen concurrere debet motus vehemens, aut humorum abundantia.

Diagnosin hujus affectus satis difficilis est ratione partis mandantis, quam tamen Gal. paucis absolvit 4. *de locis affectis, cap. 6.* quod nimirum sanguis à gula & ventriculo excernatur vomitione; ex spiritalibus partibus tussis, ex faucibus & gurgulione scretu, ex ore simplici exspuitione. Quæ quidem clariori explicatione indigent. Siquidem sanguis, à capite ad gurgulionis partes internas & ad fauces affatim irruens, tussiendo educitur, sicque ab eo, qui ex partibus spiritalibus effertur, hoc saltem signo non distinguitur.

Præterea cum sanguis à pulmone & à thorace promanans, tussis educatur, alia signa necessaria sunt, quibus partes affectæ invicem distinguantur.

Primo igitur, à capite profluens sanguis, licet tussim interdum moveat, major tamen illius portio scretu excernitur & titillatio percipitur in palato, qualis ex catarrho solet contingere: tum etiam palatum inspectum, sordidum apparet & cruentum. Ac denique omnimodam certitudinem facit, si eodem tempore aliquid sanguinis stillet à naribus.

A pulmone prodiens sanguis, ab eo, qui à thorace, distinguitur, ex Gal. *loco citato*, ex eo quod à pulmone sit spumofus, majori copia, & sine dolore; à thorace verò nigricans, paucior, & cum dolore.

Objici tamen potest, quod sanguis à thorace prodiens per pulmonem feratur, ac per consequens spumofus sit, quia cum aëre inspirato permiscetur, quemadmodum ille qui à pulmone immediatè defertur. Et Avicenna dixit, ex thorace sanguinem spumescere. Respondendum est, aliud esse nonnihil spumæ permixtum educi, aliud, ex toto spumescere, quod solius substantiæ pulmonum proprium est. Ita tres spumæ gradus in concreto sanguine notari possunt. Aut enim ex toto spumans est à pulmonis carne, cujus induit similitudinem, est enim pulmo coagulata spuma: aut plurimum spumans à pulmonis vasis, aut spumæ permixtus ex thorace.

Verum certissimum thoraci affecti indicium desumitur ex dolore, qui fixus est & perdurans juxta illum locum, in quo est solutio continui.

Advertendum verò est, sanguinem interdum ab hepate, liene, utero, aliisque partibus in pulmonem transmitti, & per sputum excerni, ita ut pectus secundariò tantum, non primariò afficiatur. Cujus rei diagnosi perquam difficilis est. Illam tamen conjecturâ assequi poterimus; si nimirum aliqua prædictarum partium dolore, inflammatione, aut



aut aliquo alio affectu laboret, & nullum aliud in pectore vitium adfuerit, aut præcesserit.

Signa causarum ex iis, quæ superius dicta sunt, elici possunt. Si enim per anastomosin venarum sanguis feratur causæ vasorum orificia aperientes præcesserunt, & sanguis egredietur mediocri quantitate, & sine dolore. Per diapedesin verò effluens sanguis serosus est paucus, & sine dolore.

Per rhixin erumpens copiosus est, si plethora præcessit, vel causa aliqua externa, ruptionem vasorum efficere valens.

Si denique per *διόρυσιν* seu venarum erosionem sanguis profluxerit, falsæ vel acres à capite destillationes præcesserunt; sanguis falsedinis, vel acrimoniæ particeps percipitur, & malè coloratus apparet, præcesserunt causæ humores acres generantes. In principio sanguis paucus exspuitur, in progressu verò, aucta erosione, copiosior; tandemque puris sputum consequitur.

Prognosis hujus affectus Hippoc. generatim instituit. *Aphor. 25. sect. 4. Sanguinem superne quidem efferri, qualis cumque sit, malum. Omnibus enim vasorum apertio, quæ sanguinem effluere sinit periculosa est, præcipuè in pulmone, de qua in primis audiendus est aphorismus. Fit tamen interdum, ut talis sanguis excretio innoxie contingat, naturâ motu quodam critico sanguinem superfluum per illas vias expurgante. Et observatum est, quasdam mulieres, suppressione mensium laborantes certis periodis sanguinem ex pulmone, per illius venarum anastomosin, innoxie excrevisse.*

Ratione causarum, diapedesis minus periculosa est: Anastomosis magis. Rhixis adhuc periculosior; nisi enim intra tertium vel quartum diem consolidetur inflammatio succedit, quæ in suppurationem versa ulcus producit, à qua phthisis consequitur. Unde Hippoc. *Aph. 15. & 16. sect. 7. A sanguinis sputo, puris sputum, à puris sputo, phthisis.* Diabrosis verò omnium periculosissima est, & Galenus incurabilem pronuntiat, propter ulcus insanabile, quod illam consequitur.

Hæmoptoës curatio perficitur, revellendo sanguinem à pulmone, malam illius qualitatem corrigendo, & venam apertam obturando, astringendo, & conglutinando.

Primò igitur instituenda est venæ sectio ex brachio illius lateris, in quo gravitas, aut punctio percipitur, in pauca quantitate, & per intervalla repetita, ad majorem revulsionem.

Post sectionem venæ brachii, in pede etiam aperienda est: Sicque fiet revulsio ad distantissima. Adhuc multò magis conducit si affectus ex suppressione mensium traxerit originem.

Si æger sit obnoxius hæmorrhoidibus, utiliter etiam aperientur admotis hirudinibus.

Cucurbitulæ etiam scarificatæ admovebuntur scapulis & dorso: Vel cucurbitulæ sine ferro hypochondriis; inguinibus Frictiones & ligaturæ partium extremarum celebrentur; præsertim cucurbitulæ in hypochondriis per intervalla repetantur, toto curationis decursu.

Interim julepus sequens ab initio ter in die repetendus.

℞. Aquar. plantag. & papav. rhœad. an. ℥. ii. syrup. de rosis siccis ℥. j. salis prunellæ ℥. i. Misce. Fiat julep.

Denique humores serosi, biliosi, sanguinem tenuiorem & fluidiorem efficientes, repurgandi medicamentis astringendi vi præditis, & eo nomine humores minimè commoventibus, in hunc modum.

℞. Rhab. elect. ℥. j. myrob. citrin. ℥. ℥. tamarind. ℥. ℥. infundatur in aquæ plantag. ℥. iij. Expressione facta dissolve rhab. pulverat. ℥. ℥. syrup. de rosis siccis. Unc. j. Fiat potio.

Demùm exhibeantur medicamenta, quæ oscula referata occludant vi emplastica & astringente: Ita tamen, ne nimia astrictione sanguinem in pectore retineant. Quin potiùs ea interdum permisceantur, quæ sanguinem extravasatum & concretum dissolvant, & expectorent.

Ex omnibus, quæ ad hanc rem maximè faciunt, sequentia præstantissima sunt.

Lazari Riverii Opera.

℞. Boli armenæ, terræ sigillatæ, coralli utriusque, & lapid. hæmat. an. ℥. ℥. sacchari rosac. ℥. ℥. album. ovi cum aqua rosarum fortiter agitati n. j. Fiat looch, quo utatur ex cochleari frequenter.

Vel gustu gratius, & paratu facile, in hunc modum componi poterit.

℞. Liqueoris albuminis ovi fortiter agitati ℥. ij. sacchari rosac. Unc. j. amyli ℥. iij. Misce. Fiat looch.

℞. Conservæ rosar. & symphiti major. an. ℥. j. boli armenæ; terræ sigillatæ an. ℥. j. cum syrup. rosar. siccis. fiat opiata, teneat in ore frequenter, & sensim deglutiat.

Conservæ rosar. siccis. ℥. ij. trochisc. de carabe, & de terra sigillata, ℥. sem. margarit. præp. ℥. j. sacchar. rosacei ad pondus omnium; Fiat cum syr. ros. sicc. conditum, capiat cochlear unum, hora una ante passum.

℞. Succu portulacæ ℥. xij. sacchari Unc. viij. Coquantur in syrupum, quo utatur frequenter sensim labendo. Hic syrupus in hæmoptosi præ cæteris excellit. In portulacæ defectu ex succo plantag. componi poterit.

Ad idem summè est efficax syrupus ex symphito Fernelii, à Bauderono descriptus.

℞. Millefolii flore albo, & flore luteo, an. M. ij. radic. tormentillæ recentis, cum foliis, si haberi possit; sin minus, siccæ. Unc. j. pimpinellæ majoris M. j. conservæ rosar. rubr. ℥. ℥. aquæ fontis ℥. xvi. Ponantur in olla vitreata, quæ cum suo operculo diligenter lutetur, ut vapores non expirent. Coquantur postea in B. M. bulliente per horas xvj. Colatura fervetur in vase vitreo, de qua capiat ℥. vj. manè, meridie, vespèri.

℞. Trochisc. de carabe ℥. j. aquæ plantag. & rosar. an. Unc. j. sem. syrupi myrtini, & de rosis siccis, an. Unc. sem. Misce. Fiat julep.

℞. Spiritu vitrioli ℥. sem. aquæ plantag. Unc. iv. Misce, fiat potiuncula; subito sistit sanguinem, tussi vel vomitu rejectum.

Syrupus corallorum, ad cochlearia ij. singulis diebus exhibitus, omni sanguinis fluxui convenientissimus est. At tinctura ejusdem, cum succo limonum recenti aut spiritu Panis extracta, potentius operatur.

Quercetanus in Pharmacopœa sequentem aquam describit ad hæmoptosin, quæ est magnarum virium.

℞. Rad. bistortæ, symphiti major. tormentillæ, an. Unc. j. herbar. centinod. millefolii, veronicæ, pyrolæ, faniculæ, bursæ pastoris cum rad. an. M. j. summitat. rubri lentisci, an. M. sem. gran. fumach. myrtill. sem. plantag. berberis, papaveris albi, an. ℥. vi. florum nymphææ, cucurbitulæ cydon. rosar. rubr. an. P. ij. Contusa & commixta omnia macerentur per quadriduum ad ignem balnei in succor. depuratorum plantag. portulacæ, acetosæ, agrimonii, an. ℥. ij. Denique fortiter exprimantur. His adde acaciæ, hypocistid. an. ℥. ij. terræ sigillatæ, boli armen. veri, an. Unc. ℥. electuarii diatrag. frig. ℥. j. Macerentur denuò per quadriduum, dein per cineres ad siccitatem destillantur. Hujus aquæ capiat æger cochlearia duo vel tria per se aut cum syrupo convenienti.

Oleum de carabe chymicè extractum potentissimè penetrat, astringit, & siccatur, si guttæ duæ in potu dentur cum aqua plantag. ut docet Cæsalpinus in speculo artis Medicæ.

Mercurialis in consultationibus valdè commendat semen papaveris albi, vel hyoscyami albi, singulo mane, si ejus capiat æger ℥. j. plus minus, cum saccharo rosac. & syrup. de portulaca mixtum. Sed etiam diacodium album, in cura phrenetidis descriptum, utiliter usurpari poterit.

Amatus Lusitanus succum urticæ mirè prædicat his verbis: *Qui sanguinem ex pectore rejectarunt, & à Medicis tanquam deplorati sunt habiti, solo urticæ succo convalescunt. Post multa autem machinata remedia, nullum ita contulit, ut sanguis cohiberetur, ac urticæ succus, quem ad 5. vel 6. dies ebiberunt, singulis scilicet diebus quatuor uncias, jejuno stomacho. Imo & ipsam urticam concoctam in jure pulli aut vervecis sæpe comedebant.*

Sanguis draconis omnem venarum apertionem internam.



num mirè conglutinat, ad 3. 6. cum aqua plantag. aut alio liquore convenienti exhibitus, vel cum aliis medicamentis permixtus.

Pilulæ sublinguales usitatissimæ sunt, & in sequentem modum componi possunt.

℞. Mucag. gum. arab. & tragac. extract. cum aqua plantag. 3. ij. mumiæ, masliches, ana 3. j. sacchari rosati q. s. Fiant pilulæ sublinguales, quarum quam teneat in ore perpetuò.

Jusculis etiam pulvis sequens permisceri poterit.

℞. Coralli rubri, margarit. præparat. ana 3. 6. gummi arabici, tragacanth. an. 3. j. Fiat Pulvis.

Vel in jusculis semina papaveris albi & sumach. in panino lineo ligata decoquantur.

Narcotica in hoc affectu multum præstant, eaque in hunc modum usurpanda sunt.

℞. Syrup. de papaver. jujub. & de rosis siccis, an. 3. j. Capiat cochlear. j. hora somni. Vel

℞. Syrup. de papav. & de portulaca, an. 3. iij. terræ sigillatæ 3. 6. aquæ portulacæ & plantag. an. 3. j. 6. Fiat potio, detur hora somni. Vel

℞. Syrup. myrtini & de papav. an. 3. j. boli armenæ 3. 6. Misce, utatur noctu ex cochleari.

Vel etiam interdum theriaca recens quatuor mensium, ut docet Gal. 5. meth. cap. 13. philonium romanum, aut laudanum opiatum, sed cautè usurpari poterunt.

Refert Platerus, se hæmoptoicum curasse sola exhibitione trochiscorum alkekengi, cum opio in lacte caprino dissolut. per aliquot noctes. Idem mulierem simili affectu laborantem curavit purgatione ex mannæ 3. j. 6. cum jusculo, venæ sectione, & usu sequentium tabellarum, per multos dies manè & serò continuato.

℞. Semin. hyoscyami albi subtilissimè pulverati ʒ. ij. coralli rubri 3. 6. gummi arabici ʒ. j. violas recentes n. x. succi berberis 5. ij. sacchari in aqua rosar. & plantag. dissoluti 3. ij. Fiant tabellæ.

Trallianus lib. 7. cap. 1. mirum in modum commendat lapidem hæmatitem, quo dicit se multos hæmoptoicos curasse, exhibendo ad ʒ. iv. cum succo mali punici aut polygoni, iis qui copiosum sanguinem spuebant. In quibus verò sanguis non copiosè evacuabatur, cum aquâ purâ tepidâ. At levigandum esse curiosè monet, ut si æreus & vento persimilis, tum frequenter exhibendum, ut commodius distribuatur; & in vino etiam infusum exhibet ad præcautionem.

Antonius Valerius exercitat. ad c. 27. lib. 1. Hollerii de morbis internis, refert quendam hæmoptoicum, qui alternis temporibus multum sanguinis rejecerat, neque ullis remediis sanescere poterat, usu sequentis pulveris à Julio Scaligero sibi præscripti, brevi convaluisse.

℞. Spodii, rosar. rubr. boli armenæ, terræ sigillatæ, lapid. hæmat. an. 3. 6. coralli rubri, carabes, margarit. non perforat. an. 3. ij. 6. gummi arabic. tragacanthi, an. 3. ii. semin. portulacæ, malvæ, arnoglossæ, sem. rosar. rub. cornu cervis ussi amyli torrefacti an. 3. iij. Fiat pulvis tenuis. Dosis 3. iij. cum aqua pluviali. Hunc pulverem Scaliger mutuatus fuerat à Serapione, qui eum trahit cap. de sputo sanguinis. tanquam remedium expertum, quem etiam valdè laudat Valescus. Ex eo etiam possunt fieri tabellæ, cum saccharo in aqua plantag. & rosar. dissoluto.

Ad hunc pulverem quadantenus accedit, sed paratu facilius electuarium Hælidei ad hæmoptisin, in Germania olim celeberrimum, & à Gesnero, Erasmo, & Cratone commendatum, quod sic habet.

℞. Semin. hyoscyami & papav. albi, an. 3. x. terræ sigillatæ, coralli rubri, an. 3. v. sacchari rosar. antiquissimi q. s. Fiat electuarium, cujus dosis 3. j. manè & serò, præmissis universalibus.

Quia verò astringentium usu sputum supprimitur, & difficultas spirandi exoritur, per intervalla recurrendum est ad ea quæ pectus leniunt, & nihilominus sanguinis sputum cohibent. Qualia sunt ea, quæ componuntur ex gummi arabico, tragacantho, amylo, & syrupis de rosis siccis, cydonior. myrtil. jujubino, de succo portulacæ aut plantaginis.

Dum astringentia remedia in usum revocantur, si alvus

non procedat, clystere subducatur, vel purgante medicamento, adstrictionem aliquam relincente.

In toto curationis decursu, si sanguinis concreti, inque thorace contenti suspicio sit, dissolvendum erit oxycrato. Quod ut Gal. docet 5. method. in hoc casu ita componendum erit, ut potu sit jucundum, nec ob acetum copiosius tussim excitet: Ita enim sanguinem solvit, & leviter astringit. Hujus capiat æger 3. vi. tepidè, bis aut ter in die; si tamen adhuc tussim moveat, saccharo dulcorandum erit. Est autem eo utendum, cum jam aliquo modo fluere cessat sanguis. Huic etiam rei conferunt carabe & iunonia, quæ cum astringentibus & glutinantibus permiscenda sunt, ut in formulis nonnullis supra præstitum est.

In eodem curationis decursu, ad fervorem hepatis temperandum, epithema refrigerans hypochondrio dextro admoveatur.

℞. Aquæ rosar. plantag. & cichorii, an. 3. iv. aceti rosar. 3. ij. pulver. electuar. trium santal. 3. 6. camphoræ ʒ. j. Fiat epithema applicandum tepidè regioni hepatis.

Post usum epithematis inungatur eadem pars unguento rosar. vel cerato santalino, addendo aceti rosacei parum, unctionis tempore.

Lumbi etiam & spina dorsii illinantur oleo rosar. & nymphææ, lotis in aceto, addendo parum camphoræ, ut sanguinis in venâ cavâ contenti fervor temperetur. Cavendum tamen est ab iis, quæ vehementer astringunt, quia sanguinem è venâ cavâ in pulmonem propellerent.

Plurimum etiam ad sanguinis fervorem temperandum, ejusque fluxum cohibendum conducit oxycrato frigido testes fovere; maximus enim est consensus inter spiritalia & genitalia membra.

Balneum in hoc affectu conveniret ad viscerum calorem temperandum. Sed quia relaxare, & venas magis referare potest, ideo illius usus fugiendus est.

Pro potu utatur æger syrupo myrtino, de portulac. aut de rosis siccis, aut saccharo rosaceo cum aqua hordei, aut cum aqua infusionis lapid. hæmatit. vel terræ sigillatæ, aut conserva rosarum, cum earum aqua permixtâ, vel cum aquâ infusionis coriandri præparatâ, & acidulâ reddita cum spiritu vitrioli, vel cum tincturâ rosarum.

Leve decoctum millefolii, pro potu ordinario usurpatum ad quemcumque sanguinis fluxum cohibendum efficacissimum est.

Si acris fluxio, in pulmonem è capite irruens, causa sit hujus symptomatis, præter supra dicta, convenient ea remedia, quæ pro catarrhi calidi curatione supra proposita sunt.

Sedato sanguinis fluxu, ad impediendam recidivam, vitanda primùm ea omnia, quæ humores exagitare solent, ut vehemens exercitium, ingens calor, incandescencia, vociferatio, vina generosa, cibi præditi sale, aut aromate conditi.

Conserva rosar. vetus teneatur in ore frequenter, præsertim sub lecti ingressum.

℞. Conservæ rosar. & rad. symphyti, an. 3. j. trochiscor. de carabe, & de terra sigillata, an. 3. 6. coralli rubri & margarit. præpar. an. ʒ. j. sacchari rosacei ad pondus omnium. Fiat conditum, de quo capiat cochlear 1. per intervalla horâ unâ ante pastum.

Purgetur quater in anno, vel etiam sæpius, si opus videatur, potione ex rhab. & myrobolanis supra descripta, cui addatur loco syrupi mannæ granatæ. 3. j.

Utiliter etiam sumi potest per aliquod tempus à sedata hæmoptoë, rhab. torrefacti ʒ. j. singulis diebus manè, hora una ante pastum. Imò verò si sanguis valde aqueus & serosus sit ut plerumque in omni hæmorrhagia solet contingere. idem Rhab. non torrefactum, sed tantum pulveratum dicta dosi maximè conveniet; sicut enim sanguis, expurgatis paulatim serosis illius humoribus, pristinam suam crassitiem recuperare poterit. Vel poterit idem rhab. sumi ad 3. j. semel in septimana.

Poterit etiam in usum revocari syrupus magistralis, ad sanguinem mundificandum à serosis & tenuibus ichoribus & humoribus.

℞. Fol. Buglos. utriusque sumariæ, lupul. cichorii, endiviæ



endiviæ, agrimon. plantag. polytrich. ana M. j. summit. asparagi, verbenæ, euphrasæ, ana M. ß. sem. cucurbitæ, melonum, ana ʒ. ß. sen. in. endiviæ, cuscutæ, ana ʒ. ij. liquirit. raf. & passul. mundat. ana ʒ. j. prunor. dulcium. par. vj. fennæ mundat. ʒ. iv. polypod. querni ʒ. ij. agarici in panno raro ligati ʒ. vi. macis ʒ. i. flor. iij. cordial. & cicer. rubror. ana P. i. Coquantur in aqua simplici vel verbenæ ad ʒ. i. ß. In colat. dissolve succi pomor. redolent. ʒ. iij. sacchari albi quartaria quinque. Fiat syrup. perfectè coctus, aromat. santalo citrino. Postèa in syrupo infunde rhab. elect. contusi, & in panno raro ligati ʒ. i. capiat ʒ. ß. vel ʒ. ij. cum jusculo bis in mense.

Cauterium affigatur tibie dextræ, vel sinistræ, prout hepatis aut lienis affectus huic symptomati occasionem suppeditant.

Denique lactis asinini chalybeati usus, per mensem integrum, ad hujus affectus præcautionem erit utilissimus. Vel ad potentiùs hepar refrigerandum, serum caprillum chalybeatum illius loco poterit substitui.

Pro potu utatur aqua leviter cocta, cum semine coriandri preparato, vel decocto hordei & liquiritiæ.

## CAPUT VII.

### De Phthisi.

**L**icet phthiæ nomen generaliter omnem corporis consumptionem significet, propriè tamen & specialiter pro ea corporis extenuatione usurpatur, quæ ulcus pulmonum sequitur.

Hæc autem corporis extenuatio provenit à febre putrida & lenta quæ in hæcticam degenerat. Febris verò ab ulcere pulmonis exoritur, à quo propter viciniam, putridi vapores ad cor continuò exhalant, & in eo febrem accendunt. Postmodum verò calor ille febrilis à corde in totum corpus diffunditur, sicque partes omnes intemperie calidà & siccà laborantes, & calorem influentem, intemperatum, ac putredinosis recipientes, alimentum commodè non concoquunt, & malè nutriuntur: unde sensim propriæ substantiæ consumptio succedit.

Febris autem illa propter longitudinem & causæ perseverantiam in hæcticam degenerat; cui tamen non raro putrida conjuncta est, quod ex urinis dignoscitur, & exacerbationibus, quæ certis horis non raro contingere solent. Imo verò interdum paroxysmi febrium intermittentium in phthificis observantur.

Ulceris pulmonis causa proxima & immediata est humor acer & erodens, qui vel aliundè in pulmonem influit vel in ipso pulmone generatur.

Influit imprimis à cerebro pituita acris & falsa, catarrhum ferinum efficiens, qui pulmonem exulcerare facillè potis est. Interdum verò pituita effluens à cerebro, etiam falsedinis & acrimoniæ expers, exulcerationem pulmonis efficere potest, si nimirum in eo diutius remoretur, & putredinem contrahat: à putredine autem acrimonia exoriente partem corrodit, & exulcerat.

Non semper tamen pituita putrescens in pulmone, illum ulcerat. Siquidem videmus sæpe in catarrho pituitam putridam excerni, cum tamen pulmo nullam læsionem conceperit. Sed ad ulcerationem efficiendam duæ requiruntur conditiones, altera ex parte materiæ fluxæ, altera ex parte pulmonis. Ex parte materiæ conditio necessaria est, ut illa talem habeat dispositionem ac temperiem, quæ per putredinem acquirat insignem acrimoniam, quæ exulcerationem efficere valeat. Ex parte verò pulmonis concurrere solet mollis præter modum, tenella, ac corruptioni parata illius substantia, quæ uno verbo vitiosa pulmonis constitutio vocatur, ab ortu & semine parentum plurimum contracta, de qua paulò inferiùs agetur.

A vicinis etiam partibus humores pulmones exulcerantes & putrefacientes, solent influere, ut pleurâ, mediastino, diaphragmate, asperâ arteria; & in primis ex earum partium inflammatione suppuratâ, quæ in Empyema convertitur, de quo Hip. *Aph. 15. sect. 5. Qui ex pleuritide empyici sunt, si è ruptione empyematis intra dies 40. repurgentur, liberantur, alioqui transeunt in tabem.*

*Laz. Riverii Opera.*

In ipso pulmone generantur quando à vase illius, rupto vel eroso, aut ex vulnere aperto, sanguis effusus putrescit, aut à variolis ulcus in eo relinquitur.

Interdum verò ex ipso pulmonis vitio pravi humores generantur, qui illius substantiam corrumpunt, & phthisin efficiunt. Tale autem vitium, seu vitiosa pulmonis constitutio, plerumque à primo ortu contrahitur, & à semine parentum, simili labe infectorum. Unde phthisis inter morbos hæreditarios principem locum obtinet, ita ut multas familias viderimus, inevitabili fato, hujus morbi malitiâ è medio sublatas.

Hæc autem vitiosa pulmonum constitutio non in primis qualitatibus sita est, sed malignam quandam ac venenatam qualitatem agnoscit, hujus ratione contagiosa est.

Quamvis negandum non sit, mobiliorem & laxiorem pulmonum substantiam, atque adeò corruptioni magis paratam, ad cujus morbi generationem plurimum conferre.

Hæc autem pulmonum vitiosa constitutio efficit interdum, ut nullâ præcedente destillatione, nullo præcedente inflammatorio affectu, aut aliâ causâ evidente, ægri in tabem incidant, ex solo partis vitio proprium alimentum corruptente.

A tuberculo etiam in pulmone genito, suppurato, & disrupto, phthisis interdum generari solet. Est autem tuberculum pulmonis, tumor exiguus in quadam illius particula.

Duplex illius genus ab Hippoc. constituitur 1. *de morbis*, quorum unum crudum tuberculum ab eo nominatur, quod nunquam ad suppurationem venit, sed sensim crescens spiritus vias præcludit, & tandem ægrotantem interimit.

Alterum est, quod ad suppurationem venit, & vomica pulmonis nominatur. Fit autem dupliciter, per fluxionem, vel congestionem, & materia collecta vel in cystide concluditur, vel sine vesicula, in ipsa partis substantia. Vesiculæ illius densitas sæpe facit, ut hujusmodi vomica per multos annos in pulmone gestetur, nullis signis indicata, & nullâ aliâ corpori noxâ communicatâ. Unde Hippocrates *Aph. 51. sect. 6. Quibus suppuratio in corpore existens non innotescit, is ob crassitudinem puris, aut loci non innotescit.* ita ut multi omnia corporis munia ritè excercentes, rupta derepentè vomica è medio sublata sint, quorum exempla aliquot proponuntur à Fernelio *lib. 5. de part. morb. & sympt. c. 10.* è quorum numero fuerunt duo Medici, qui nullis signis impendens periculum prævidere potuerunt.

Si pus è rupta vomica effluens in cordis ventriculos feratur, ægri subito intereunt, si verò ad bronchia transmittatur, per anacatharsin expurgari potest, si corpus sit validum, & materiæ quantitas exigua, ut plurimum tamen relicto ulcere in pulmone phthisis inde exoritur.

Causæ etiam externæ ad hujus affectus generationem concurrere possunt: inter quas principem locum obtinet contagium, hic enim morbus est valde contagiosus, ita ut videamus ut plurimum uxores, maritis phthificis assiduò inservientes eodem affectu corripi, & vice versâ. Sic etiam liberi ejusdem familiæ ex eodem affectu sigillatim intereunt non solum propter impressam labem à semine parentum, sed etiam propter frequentationem illius, qui primus hoc affectu laboravit.

Inter consanguineos enim faciliùs & promptiùs communicatur hujusmodi contagium, ut tutum non sit fratribus aut sororibus, fratris, aut sororis, phthisi laborantis cubiculum ingredi. Siquidem *videtur* illa quæ à phthificorum pulmonibus exhalant, & cubuli totius aërem inficiunt, ab aliis (præcipuè dispositionem aliquam ad hunc morbum habentibus) in pulmonem attracta, similem in eo dispositionem generant.

Aliæ verò causæ externæ sunt: primò aër impensè calidus aut frigidus; calidus enim humores acres in capite contentos fundit & liquat & in pulmonem præcipitat. Frigus constringendo & comprimendo, ejusdem humoris defluxum promovet. Sed maximè noxius est aër in primis autumnalis, qui inæqualitate frigoris & caloris acres & falsas destillationes concitat, unde apud Hip. *Aph. 10. sect. 3.*



*Autumnus tabidis malus.* Secundò ad phthisin producendam maximè conferunt cibi potusque acres & falsi, & qui caput vaporibus hujusmodi replent: Ac denique omnes aliæ causæ, tum internæ tum externæ, quæ hæmoptoën inducere solent, cum ea plerumque in phthisin degeneret.

Inter causas antecedentes præcipuè recensentur humores vitiosi, in toto corpore collecti, qui ubi à causis externis commoventur, ad cerebrum transmittuntur, & inde in pulmonem confluunt. Huc pertinet mensium, hæmorrhoidum, aut alterius evacuationis consuetudo suppressio, quæ materiam catarrhis & fluxionibus suppeditat.

Prædictæ causæ hunc affectum inducunt præcipuè in dispositis, qui *φθινώδεις* & *πρεγυώδεις* ab Hip. (II. *Proorrh.* XII. III. *Epid.* III. 142.) nominatur, qui habent pectus angustum & depressum, collum oblongum & scapulas alatas, quibus si pulmonis mollities & hæreditaria dispositio accedat, inevitabili fato eos ex hoc modo concidere, necessarium est. Sunt etiam ad phthisin dispositi, qui caput habent debile, quod faciliè superfluis humoribus impletur, eosque ad spiritus organa dimittit.

Venæ & propriæ dictæ phthiseos differentię aliæ non sunt, quàm quæ à causarum varietate desumuntur. Hip. tamen plures tabis species proponit notatu dignissimas quæ non ad veram phthisin, sed ad tabem generaliter sumptam reduci debent, & sine pulmonis exulceratione contingunt. Ac primum *lib. 6. Epid. sect. 8. tex. 47.* tabem ex gonorrhœa proponit historia sequenti. *Satyrus in Thasso, cognomento Gripalopex, cum esset annorum circiter viginti quinque semen per somnum effudit sæpè, & interdum quoque sæpè ipsi prodibat: cum autem ad trigessimum pervenisset, tabis fiebat, & mortuus est.* Ex continua autem superflua seminis profusione corporis alimentum subripitur, unde partes solidæ absumuntur & exsiccantur, ac tandem in tabem incidunt.

Alia tabis species proponitur ab Hip. 2. *de morbis*, tabes dorsalis appellata, quæ fit ex nimia venere, corporis habitum universum absumente, solidisque partibus alimentum subripiente. Hæc recenter sponsis, estranata libidini deditis, solet contingere, & est præcipua tabis dorsalis species: quatuor enim illius species in Hip. scriptis reperiuntur. Prima est jam descripta ex immodica venere oriunda. Secunda describitur *lib. 2. de internis affection. textus 13.* pendens à nimia sanguinis & nutrimenti copia in medullam spinalem irruente, ex qua calor ejus innatus ac facultates omnes obruuntur ac suffocantur. A sanguinis autem copiâ emaciari corpus, docuit Hip. 5. *Epid. in historia viri in Oeneade*, qui cum ab alimentis non restauratur, sed in dies magis contabesceret, vena secta in utraque manu, sanguineque extracto, quousque ex sanguis redderetur, hoc solo remedio perfectè liberatus est, cum omnia in casum antea tentata fuissent. Tercio species loco citato proposita est, quando spinalis medulla resiccatur, & inde totum corpus arefcit & contabescit.

Hujus autem exsiccationis causæ in Hippocratis doctrina duæ inveniuntur. Una est obstructio venarum quæ ad spinam tendunt, quorum humore nutritur, eoque deficiente, resiccatur. Altera est bilis influxus à capite in spinam, quem Hip. *lib. de locis in homine* proponit.

Quarta describitur in libro *de locis in homine*, quæ fit ex destillatione in medullam spinalem irruente, his verbis: *Porrò, cum retro in spinam fluxio processerit, tabes fit hujusmodi, lumbos dolet, & interiores capitis partes vacuæ videntur ipsi esse:* In eodem etiam libro, n. 18. hæc habentur: *Cum verò in medullam fluxio contigerit, tabes occulta ac inconspicua exoritur.* Occultam eam dixit, quoniam hinc languescente corpore morbi causa non ita faciliè patet. Inconspicuam autem, quia nec destillationis, nec tabis notum enta, destillationi in medulla spinali firmata, & non ultra progrediente, sensibus clarè deprehenduntur. Desinit tamen esse occulta & conspicua, si fluxio non in sola spinali medulla firmetur, sed ultra progrediens in os sacrum & coxendicem irruat. Cum enim evidentior apparet destillatio, & dolores, ac motus impedimenta cum summa animi demissione prodeunt.

Hæc ab eodem Hippocrate clariùs explicantur *lib. de*

*glandulis*, num. 10. his verbis: *Alius morbus oritur ex defluxione capitis per venas in spinalem medullam, inde autem in os sacrum impetum facit, quo medulla ipsa fluxionem producit, & in coxendicum acetabula sive juncturas deponit, & si tabem fecerit homo marcescit, atque hoc modo contabescit, & vivere non expetit. Statim enim scapulæ dolent, amboque pedes, ac crura consequuntur, & semper tandem percunt, multo tempore curati. Sic deflorescit homo, ac moritur.* Hæc tabis species à Medicis observanda est, quia aliquando in praxi occurrit; & iis præcipuè contingit, quibus nervi languidi & tabefacti hujusmodi fluxiones faciliè recipiunt.

Ad tabis species etiam referri potest tabes ex inedia & fame cujus mentionem facit Galen. *lib. de Marasmo*, cum deficiente nutrimento corpus absumitur & contabescit. Deficit autem nutrimentum in solidis partibus, non solum ob ciborum penuriam, quos ventriculus concoquit, & ad hepar, generando sanguini, totius corporis alimento, transmittit, sed etiam quando chylus, in ventriculo sufficienter concoctus, venas mesaraicas pervadere non potest, propter graves earum obstructions, ut in strumis laborantibus sæpissimè contingit, quorum mesenterium ut plurimum glandulis refertum est, à quibus venæ lacteæ comprimuntur, unde totum corpus contabescit, & illi tabidi moriuntur.

Privantur etiam partes solidæ necessario alimento quando sanguis sanguinosus & parum nutritioni idoneus in venas congeritur, qui nisi per epicrasin curentur, ut docuit Galen. 5. *meth.* omninò insanabiles sunt, & inevitabiliter tabidi evadent. Ac denique Galen. *lib. de Marasmo, decimo methodi*, & aliis locis tabem proponit ex inflammatione manifesta, vel occulta ex syncope cardiaca, vel stomachica, & alias minùs frequentes, quæ dictis locis videri possunt.

Veræ phthiseos signa diagnostica alia imminenti, alia incipientem, alia verò confirmatum affectum ostendunt. Quæ omnia graphicè describuntur ab Hip. 1. *de morbis*.

*Imminentis phthiseos signa proponuntur ab Hip. lib. prædicto, text. 9. his verbis.*

*Fit autem & suppuratus, si pituita à capite in pulmonem destillet. Et primum quidem ut plurimum latenter destluit, tussimque tenuem exhibet, & sputum paulò amarius solito & aliquando tenuis adest calor.* In hac sententia quatuor signa continentur phthisis imminenti.

Primum signum est, quod fluxio à principio latenter destuat ad pulmonem, quia tunc temporis materia destillans quantitate est pauca, & tenuior humoris portio, quæ destluit per parietes asperæ arteriæ, non irritat pulmonem qui alioqui à principio magis reluctatur, nondum à morbo labefactus: Unde fit, ut cum ex his minima sequatur læsio, hæc materia dicatur latenter destluere.

Secundum signum est, quod humor ille destuens tussim tenuem excitet; cum enim in principio paucus sit, & tenuis, levem tantum tussim excitare debet.

Tertium signum est, quod sputum amarius solito appareat. Quia humor destuens, pulmoni exulcerando idoneus, dulcedinis acrimoniam, vel salsedinis particeps esse necessariò debet, quæ qualitates, ulteriori calore & præternaturali alteratæ, in amaram qualitatem degenerant. Notum enim est, dulcia & falsa, dum præter modum coquuntur, amaritudinem contrahere. Cum autem ille calor præternaturalis in principio non sit valdè intensus, ideo sputum levem tantum præ se fert amarorem, & subamarum tantum efficitur.

Quartum signum est, quod aliquando tenuis adfit calor, id est, quandoque illis aliquæ accedunt febres, leviores tamen, & non vehementes. Cum enim materia non sit conculcata, sed potius ex diuturna mora, & ex loci continentis calore præternaturali aliquam concipiat putredinem, hinc febris non potest esse intensa. Habet enim materia putrescens multa spiracula, per quæ diffari potest: Quare non est mirum, quod principio febres non urgent, & sint leviores.

His signis ab Hippocrate propositis adjungere possumus malam thoracis conformationem, & aetatem juvenilem



lem. Si enim illa duo cum prædictis concurrant, phthisin in prociectu esse, certò pronunciare possumus.

Prava thoracis confirmatio in iis reperitur, qui habent thoracem angustum, & scapulas prominentes, alarum modo, in similitudinem avium, quæ partem thoracis anteriorem angustam, posteriorem autem latam habent: Quare & pravitatem & malam conformationem thoracis simul possident. Thoracis angustia penuriam caloris nativi, mala confirmatio ejusdem imbecillitatem significat. Si enim calidum insitum plurimum ac vegetum fuisset, thorax amplius & magnus, extensa ab eo validè materia, formatus fuisset. Tanta autem & talis est hæc dispositio ad tabem, ut eam Hippocrates nativam tabem appellaverit, quòd ab intimis ortus primordiis & naturæ principiis concepta sit. Quamobrem necessarium ferè videtur, ita affectos in phthisin tandem incidere, nisi ab aliis gravioribus morbis præveniantur. Notandum enim est obiter, eos qui talem habent dispositionem, si gravi aliquo & acuto morbo corripiantur, ut plurimum interiri. Cum enim in his calor nativus exsilet, paucus in quantitate, & debilis in virtute, causis morbificis vehementibus facillè succumbit. Ideò cautiore Medici in hujusmodi naturis & habitibus, si gravi aliquo morbo corripiantur, mortem potius quam salutem, aut saltem grave periculum præfagient.

Ætas verò juvenilis in dispositis ad hunc morbum producendum maximè est idonea, quam definit Hip. *Aph. 9. sect. 5.* à decimo octavo ad 35. in illa enim ætate adest maxima sanguinis copia, ruptioni venarum efficiendæ idonea. Adest etiam ejusdem sanguinis tenuitas & acrimonia, apertioni, aut erosioni vasorum producendæ disposita. Contra verò in pueris catarrhi humido multo hebetantur; in senibus frigore torpent: Cum in media ætate, propter rationes dictas, frequentius exulcerent. Adde quod in adolescentia & juventute plurimi errores committantur in victu, & quibus pravorum humorum copia cumulari solent, & prava qualitas massæ sanguinis induci, tum etiam ob vehementiora exercitia in cursu, lucta, saltu, armis, & insolatu, ruptio vasorum in pulmone & ab ea phthisis excitari potest.

Incipientis phthiseos signa proponuntur ab eodem Hip. *de morbis, antica citato textu 10.* his verbis: *Temporis autem progressu exasperatus pulmo, & intus ulceratur à pituita in hæcemic & putrescente, & gravitatem exhibet pectori, & dolorem acutum antè, & retrò, caloresque acutiores in corpus incidunt, & pulmo à calore ad se trahit pituitam ex toto corpore, & maximè ex capite, caput verò calefactum ex corpore. Et hanc putrescentem subcrassam sputit.* In hoc contextu sex signa continentur phthiseos incipientis.

Primum signum est, quod temporis progressu exasperetur pulmo: Hoc est, tussis vehementior, & molestior efficiatur. Procedente enim morbo, destillatio invalescit, ab eaque pulmo lancinatur, atque irritatur ad expulsionem rei noxiæ. Quæ quidem tussis non solum à materia fluente excitatur, sed etiam ab ea quæ antea fluit. Cum enim illa sufficienter non expurgetur, diuturna mora putredinem contrahit, & pravam concipit qualitatem, à qua pulmo magis irritatur ad expulsionem, unde tussis vehementer exoritur.

Secundum incipientis atque finientis phthiseos signum est gravitas thoracis, quæ ex materia in pulmone congesta exoritur. Licet enim pulmo ex se parum aut nihil sentiat, & dolorificos affectus in se ipso non percipiat, quia tamen thoraci per membranas illigatur, ideò illi gravitatis sensum communicat, quando à majore copia gravatur.

Tertium signum est, dolor acutus antè & retrò. Materia enim pulmone contenta, etiam pravâ qualitate & putredine, pulmonis membranas pungit & vellicat, unde acutus dolor exoritur; dolor enim membranarum proprius pungitivus est. Percipitur autem ille dolor antè & retrò quoniam hæc membranæ sterno alligantur ex parte anteriore, & dorso ex parte posteriore. Infertur etiam talis dolor à molestissima tussi, quæ tussis ratione ingentis molestiæ & turbationis, quam infert, maligna &

ferina ab Hippocrate nominatur.

Quantum signum est quod calores acutiores in corpus incidant, hoc est, febres insignes & vehementes superveniant. Cum enim progressu morbi major ex diuturniori mora materiæ morbificæ putredo inducatur, majores inde febres excitari necesse est. Quamvis enim in solo pulmone ab initio materia illa putrescat, attamen ex suppuratione in thorace facta, & ulcere superinducto, putredo, humoribus, in venis existentibus communicatur; quibus putrescentibus, varia putridarum febrium genera oxoriuntur. Et hæc febres de putridarum genere sunt, toto genere diversæ à febricula illa, quæ ulcere pulmonis excitatur ex putridis vaporibus, ab eo in cor translatis: Quæ febricula temporis progressu in hæcticam degenerat, & ideò in phthisicis complicatio febris hæcticæ cum putrida plerumque annotatur.

Quintum signum est, quod magna pituitæ copia descendat à cerebro in pulmonem, quod indicavit Hippocrat. causam referens magni illius defluxus, quoniam scilicet pulmo à calore ad se trahit pituitam ex toto corpore. Hinc patet humores in toto corpore contentos fieri materiam fluxionis continuæ & copiosæ, quæ phthisicos infestat. Pulmo ex putredine concepta caliditatem contrahit, cujus ministerio pituitam attrahit à cerebro, cerebrum verò ex toto corpore: Et hæc est una ex præcipuis extenuationis & consumptionis totius corporis causas. Humores enim omnes, tum pravi, tum laudabiles, ad illas partes deferuntur sicque totum corpus exhauritur.

Sextum signum est, quod æger pituitam putrescentem subcrassam expuat; quandoquidem materia fluxa jam putredinem concepit, & supervenienti ulcere, necessariò pus ex eo excernitur, & ideò purulentum sputum scretur; Est autem pituita subcrassa, id est, inter crassam & tenuem mediocris. Quia cum ex mora, quam facit, in pulmone crassitiem acquisierit admixtione saniei, quæ ex ulcere pulmonis exsultat, tenuior efficitur; atque adeò mediocrem quandam crassitiem acquirit cujus ratione subcrassa ab Hippocrate nominatur.

Prædictis signis ab Hippocrate propositis hoc tanquam certissimum adjungendum est, nempe corporis extenuatio cum febre lenta & continua. Nam præter febres putridas, supra enumeratas, quæ per vices accedunt & recedunt, & ex humoribus in venis putrescentibus oriuntur, adest semper febris lenta & assidua, ex vaporibus ab ulcere ad cor continuò translatis, quæ nutritionem in toto corpore corrumpit, eique calidam siccamque intemperiem imprimit, unde extenuatio necessariò consequitur.

His etiam adjungendi sunt sudores nocturni, quibus ut plurimum phthisici vexari consueverunt, simul atque somno corripuntur. Per somnum enim calor concentratur, & pulmonis inflammatio augetur, eo calore autem intus augescente, magna fit evaporatio, quæ in cute condensatur, & in sudorem vertitur.

Addi etiam possunt rigores frequentes nullum typum servantes, qui ex puris acrimonia, membranas vellicante, oriuntur.

Ac denique addi potest sputi dulcedo, quæ in purè incipiente generari solet, siquidem illa est principium salcedinis.

Factæ denique ac confirmatæ phthiseos signa proponuntur ab Hip. *lib. prædicto textu undecimo*, his verbis. *Quanto verò magis tempus progreditur, tanto magis pus sincerum expuit, & febres acutiores fiunt, & tussis frequens ac fortis, & inedia vexat, & tamen alvus infernè turbatur. Turbatur autem à pituita, pituita verò de capite descendit. Hic cum ad hoc pervenerit, perit.* His dictis quinque signa confirmatæ phthiseos continentur.

Primum signum est, quod sputum reddatur magis purulentum, imò pus sincerum expuat.

Secundum signum est, quod febres fiant vehementiores & acutiores, putredine semper ulterius procedente, & ulcere magis sanioso ac purulento reddito.

Tertium signum est, tussis frequens ac fortis, id est,



frequenter ac fortior quàm antea fuerat. Frequentior quidem, quoniam plurima est irritatio, pauca verò expurgatio; unde natura iteratis vicibus perficere conatur, quod unica non potest. Fortior autem est tussis, non solum quia major puris acrimonia facultatem expultricem acrius stimulat: sed etiam, quia emaciatis solidis partibus, thorax quoad cavitatem amplior factus est, unde fit tussis quædam rauca & resonans, ut in illis rebus contingit, quæ ex cavo & recondito loco resonant.

Quartum signum est, inedia seu inappetentia, quæ ægrotantes vexat, & maiorem corporis extenuationem inducit. Fit autem illa inappetentia ex eo, quod destillatio à capite defluens, non solum ad spiritalia membra descendat, sed etiam naturalibus partibus communicetur, ventriculo præsertim, cujus orificium, inde labefactum, functionem propriam, nimirum appetentiam amittit. Adde, quod ex putridis exhalationibus, quæ partim ratione febrium putridarum, partim ratione putridæ pulmonum affectionis oris ventriculi communicantur, appetitricis facultatis robur destruat.

Quintum & ultimum signum est alvi fluxus, qui à pituita ex capite defluente producitur; unde successu temporis ventriculus, & intestina labefactantur, ac facultas retentrix debilitatur, hincque alvi fluxus exoritur, qui ad interitum ægrotantem deducit, ut in prognostico fusiùs dicitur.

His signis ab Hippocrate propositis adjungenda sunt alia. Primum est, summa totius corporis extenuatio, ita ut in illo statu caro musculosa universa absumpta sit, & ossa omnia se prodant, sola cute contacta. Hinc ungues incurvantur, absumptâ carne, quæ in summis digitis existerat, unguesque fulciebat.

His etiam addenda est respiratio difficilis, tum quia facultas est debilis, tum quia bronchia pulmonis à materia putridâ & purulentâ obstruuntur, tum quod ipsum viscus, majori parte consumptum & putrefactum, aërem sufficientem non trahat ad cordis refrigerium, ita ut quod unica respiratio præstare non potest, pluribus atque iteratis perficere conetur.

Ac denique addendum est, quod in phthisi confirmata & ad interitum vergente capilli defluant, malæ liveſcant, nisi quod post cibum, elevatis sursum vaporibus, rubefcant, pediculi magna copia generentur, & pedes intumescant.

Neque tamen in eo statu tanta signorum speculatione opus est. Si quis enim vel plebejus (inquit Aretæus) hominem videret pallentem, imbecillum, tussientem, macie confectum, hunc vera phthoë laborare pronuntiat.

Advertendum tamen est diligenter, quod in praxi maximi est momenti, catarrhum contumacem in pulmonem defluentem sæpè veram phthisin ementiri, siquidem pituita putrida puris æmula per tussim excernitur, hinc ex putredine fiunt febres, ac corporis extenuatio consequitur: attamen ita affecti diligenti curatione adhibita facile liberantur. Ideò attente distinguendus est hic affectus à vera phthisi; quod fit præcipuè, distinctione pituitæ putridæ à vero pure: Quæ distinctio his præcipuè signis perficitur, quod videlicet pus coloris est cineritii & minus album quàm pituita, & interdum varii coloris, & in aquam tepidam projectum, fundum petit, in eaque dissolvitur. Pituita verò aquæ innatat, & propter visciditatem coheret ac minimè dissolvitur: si verò sputi portio dissolvatur, alia verò minimè, tale sputum fit ex pure cum pituita mixto, quod ut plurimum in phthysicis contingit.

Quod ad prognosin attinet, recentis ulceris pulmonis sanatio difficillima est, inveterati omninò impossibilis: quia ulcus continuo pulmonis motu & tussi magis lacera- tur, tantum abest, ut coalescere valeat. Tum medicamentorum vis longo tractu ferè exoleſcit, & deperdita pulmonum substantia nulla arte refarciri potest. Adde quod ulcus, sputum, febris & macies, contraria remedia exposcant. Illa enim quæ ulcus exſiccant, sputum impediunt, febrem augent & maciem: humectantia verò, quæ febri & maciei obſiſtunt, ulcus sordidius efficiunt. Interdum tamen quibusdam ulcus sanatum videtur, crustâ superindu-

ctâ, quæ tamen, levi occasione decidens, morbum renovat, ægrumque ad priorem statum reducit.

Phthisis, quæ ab ulcere parvo & non diuturno provenit, licet curatu difficillima sit, non est tamen omninò incurabilis, si curatio idonea maturè adhibeatur. Et non pauca curatorum phthysicorum exempla apud observationum collectores reperiuntur. Spem autem aliquam curationis præbere possunt vires robustæ, sputum album, æquale, unius coloris, & quod facile expectoratur. Si humor à capite defluens ad nares convertatur, indeque febris remittat; si appetitus vigeat, sitis absit, alvusque quotidie compacta & assumptis convenientia deponat. Si æger bono habitu præditus sit, in ætate puerili, aut pectus habeat amplum & hirsutum.

Quibus phthysicis sputum graviter olet, aut alvi fluxus supervenit, aut sputum supprimitur, aut facies Hippocratica apparet, mors in propinquo est, docente Hip. *progn. & Aph. 11. & 12. sect. & Aph. 16. sect. 7.*

Phthisis acuto morbo superveniens, brevi interimit. Ab aliis verò causis genita, chronica interdum evadit, & ad multos annos perseverat. Refertque Avicenna, se mulierem phthysicam vidisse, quæ per 23. annos vixerit. Et Matthæus de Gradibus dicit, aliam mulierem phthysicam, quæ circa furnum & ignem quotidie occupabatur, plus viginti octo annis vixisse.

Curatio hujus affectus, ut antea dictum est, ut plurimum impossibilis est, si nimirum affectus altiores egerit radices: quia tamen incipiens affectus interdum curari potest, & multò facilius imminens; in iis scilicet, qui ex dispositione hæreditaria in phthisin incidere proclives sunt, nondum tamen in eam inciderunt, ideò prophylactica curatio priùs proponenda est, postea verò affectus jam geniti cura erit instituenda.

Ad corrigendam igitur pravam illam in tabem propensionem conveniunt victus refrigerans & humectans, & ea omnia, quæ sanguinem corrigere, eumque mitem ac blandum reddere possunt; omnesque illius acrimoniam & falsedinem corrigere, qualia sunt aquarum dulcium balnea, lactis usus, & cibaria similis naturæ. Tum etiam decoctum radicis chinæ in potu ordinario exhibitum. Sed multò efficacius erit decoctum santalorum, quod non solum in curatione tabis instantis, vel incipientis; sed etiam in destillationibus falsis, præcipuè autem tenuibus, in diuturnis sanguinis fluxibus, ab illius ardore productis, miranda præstat: & fit simili omninò ratione, quâ guaiaci decoctum componi solet, idque vel in aquis stillantiis, modò additâ portione vini, vel albi, vel rubri, pro ratione affectus. Paratur autem decoctum santalorum, ut guaiaci decoctum, cum primarium, tum secundarium, & eodem modo exhibetur. His addenda est mutatio aëris, quæ ad imminetis affectus præcautionem, & incipientis curationem plurimum potest. Ac denique illa convenient remedia, quæ in morbi jam facti curatione primo loco usurpanda proponere aggredimur.

Tota igitur jam factæ & confirmatæ phthysicos curatio versatur in ulceris absterſione & conglutinatione, causarum producentium, vel solventium ablatione, febris lentæ & hæcticæ oppugnatione, ac consumptionis restauratione.

Primò igitur, quia cacochymia redundans in corpore, ulcus pulmonis fovere & augere solet, blandis purgantibus auferenda est, per intervalla repetitis, quandiu corpus non est valdè consumptum. Eaque purgationes componantur ex rhab. manna, cassia, aut syrup. rosac. in hunc modum.

℞. Hordei integri P. f. liquirit. rosæ, & passul. mundat. an. ʒ. iij. jujub. par. ij. flor. bugloss. & viol. an. P. semis. Coquantur in aqua simpl. vel destillatâ convenienti, v. gr. scabiosæ aut veronicæ ad ʒ. iij. In colat. dissolve rhab. in aqua scabios. cum santalo citrino infusi ʒ. iij. mannæ ʒ. j. syrup. rosac. ʒ. semis. Fiat potio.

Vel mannæ ʒ. ij. cum jusculo pulli, aut communi exhiberi poterunt.

Vel parari potest bolus ex cassiæ ʒ. j. cum pulver. liquirit. scrup. j.

In principio phthysicos valentiora etiam purgantia usurpari



usurpari possunt, ad catharrum acrem & falsum, præcipuam ulceris causam, potentiùs revellendum, qualia in catarrho calido propolita sunt.

In eodem etiam phthiæ principio, antequàm corpus sit emaciatur, convenit venæ sectio, ad febrem temperandam, & humoris acrimoniam demulcendam.

Ab ipso etiam curationis initio catarrhus, si affectum istum foveat, sistendus, & à pectore avertendus est. Alioquin frustra cæteris remediis pugnatur. Huic autem negotio conferunt ea omnia, quæ in catarrhi calidi curatione propolita sunt.

Ac præter illa remedia setaceum cervici admotum summè est efficax. Refertque Fabricius Hildanus, se nonnullos phthiæcos hoc præcipuè remedio curasse.

Tandem ad ulceris ipsius curationem veniendum est: Cui usui maximè conferunt, quæ abstergunt, consolidant, & expectorant. Ad hanc rem infinita usurpari solent medicamenta. Efficacissima verò sunt, quæ sequuntur.

Lac omnes intentiones ad phthiæcorum curationem propositas adimplet. Abstergit ferosâ suâ parte, conglutinat caseosâ, corpus nutrit & reficit butyrosâ. Cum autem varia sint lactis genera, omnibus præferendum est muliebri, ut potè naturæ nostræ magis familiare, utiliusque erit, si ex ipso ubere fugatur. Hujus usu se aliquos restitutos vidisse testatur Platerus: Ex iisque unum non solum convalescere, sed etiam tantas vires recepisse, ut ne lac sibi in posterum deficeret, nutricem de novo imprægnaret.

At quia multi ab eo lacte abhorrent usitatus est asinum. Quod quia valde ferosum est, facilè venas penetrat, & ulcus optimè detergit, huic verò succedit caprillum. Asina nutriatur foliis plantag. rubi, vitis polygoni, gramine, hordeo, & fecali. Lac autem recentissimè mulctum & adhuc calens hauriatur. Idcirco inducta propè cubiculum asina, in vas calefactum mulgeatur. Assumatur primum in parva quantitate ad ℥. iij. vel iv. ut ventriculus illi assuescat, quantitatem illius sensim augendo, usque ad ℥. viij. x. & lb. j. Ne verò acefcat, aut coaguletur in ventriculo, atque pulmone magis fiat amicum, saccharum rosaceum ei permisceatur, ea proportionem, ut ad lactis ℥. viij. sit sacchari ℥. j. Post assumptum lac non dormiat æger, sed levi deambulatione per cubiculum se exerceat. Non prandeat, donec lac bene coctum à ventriculo secesserit, & æger fame provocetur ad cibum. Ut denique hoc commodè usurpari possit, non debet adesse magna febris, aut dolor capitis, aut hypochondriorum tumor, aut biliosus alvi fluxus, juxta Aphor. Hip. 61. sect. 5.

Vulgò sumitur lac semel tantum in die, sed melius est bis in die sumere. Et adhuc melius, si æger solo lacte nutriatur. Nam præterquam quod in majori copia sumptum, majores exerat effectus, magnum vitatur incommodum, quod ex jusculis & carnibus cum lacte permixtis exoritur, facilè enim putrescunt. Si ergo in morbo desperato curatio tentanda sit, exhibeatur lac præmissâ purgatione, sextâ quaque horâ, addita manu Christi perlata & corallata. Et ne vires deficiant per intervalla, potionibus lactis intermedia, capiat destillatum restaurans, & continuetur hæc methodus, donec vires refici videantur.

Saccharum rosatum phthiæcos utilissimum est, tum etiam conserva rosar. Cujus usu refert Avicenna, quandam mulierem phthiæcam & desperatam ita curatam fuisse, ut non solum sana, sed etiam pinguis redderetur.

Eadem testatur Mesue multos fuisse restitutos, præscripsitque, ut conserva rosar. recens sit, non excedens unum annum, magnâ quantitate, & frequenter assumatur cum medicamentis, cibis & potibus tum etiam per se, omni horâ. Prius tamen mundificantiâ usurpentur, quia materiam purulentam & excrementitiâ in pulmone retinet.

Quoties verò contingit restringi anhelitum, aut sputum suppressi, expectorantia ut syrup. de hyssopo, de tussilag. eclegmata, & similia usurpentur.

Si denique contingat calefactio propter desiccationem, dentur syrup. violac. jujubimus, mucilago feminis psyllii, cydoniorum, & similia.

Saccharo rosac. se quosdam vidisse curatos, testantur

Montanus, Valeriola, Forestus, quo ægri in maxima quantitate utebantur. Quidam Pharmacopœus phthiæcos, nobis notus, ingentem sacchari rosacei quantitatem sibi ipsi præparabat, idque perpetuò comedeat, & hoc solo remedio sanatus est.

Phthiæcos etiam maximè confert infusum ex millefol. torment. pimpinel. conserva rosar. in B. M. paratum, & in cap. de sputo sanguinis descriptum, si per xx. dies illius usus continuetur.

Decoctum bugulæ, in jusculo vervecis, phthiæ & internis ulceribus mirè prodest, parum & clementer ventrem laxat, contra naturam consolidatum.

Trallianus lib. 7. c. 1. se multos phthiæcos curasse gloriatur usu lapidis hæmatitis. Cujus præparationem & utendi modum proposuimus in curatione sputi sanguinis.

Syrupus ex succo hederæ terrestris commendatur à Quercetano, ejusque descriptio talis est.

℥. Succo hederæ terrestris lb. j. β. Digeratur & purificetur ad ignem in B. M. Huic succo perfectè depurato adde sacchari rosar. lb. j. penidiat. ℥. iv. Coquantur in syrupum, quo utatur æger ex cochleari.

Huic etiam syrupo idem Quercetanus flores sulphuris admiscet, ad consistentiam looch, de quo exhibet quater in die, eoque se multos phthiæcos desperatos & proclamat restituisse gloriatur.

Syrupus ex florib. hyperici per infusionem præparatus in B. M. huic etiam affectui, quemadmodum omnibus ulceribus internis consolidandis, convenientissimus.

Syrupus de symphito optimus; nam detergit, consolidat, & astringendo roborat, tum etiam radix symphyti, decocta in jusculo.

Hydromelite sequenti quosdam phthiæcos fuisse curatos à nonnullis asseritur.

℥. Rad. chinæ in taleolas sectæ. Unc. vj. rad. tussilag. idoneo tempore collectæ. Unc. iij. rad. bardanæ, & caryophyllatæ, ana Unc. iij. rad. enulæ camp. Unc. ij. Fol. pulmonariæ; scabiosæ totius, veronicæ utriusque, ulmarie, nummularie, an. M. ij. capillor. omnium, h. e. adiant, polytrichi aurei, rutæ murarie & trichoman. an. M. j. summit. florum bugulæ, betonicæ, flor. herbæ paralyseos, & veronicæ rubræ, an. P. iv. hederæ terrestris totius. M. iij. jujub. dactyl. febesten. passul. mund. an. Unc. j. β. liquirit. hispanicæ Unc. j. β. Omnia debite concisa bulliant debito ordine, in aquæ fontis purissimæ lb. xxxij. ad mediæ partis consumptionem, subdito calore lento. Colaturæ clarificatæ adde mellis Narbonensis lb. iv. Coquantur iterum despumando ad supernatantis ovi terminum. Colentur per manicam Hippocratis, addendò cinam. inter. ℥. β. sem. coriandri Drach. vi. β. anisi & fœniculi dulcis, an. Drach. iij. Ponatur liquor in dolium satis capax, & sinatur fermentari, quod promptius fiet si dolium in sole manserit; hoc enim modo intra 4. dies satis erit fermentatum, alioquin multò longius tempus necessarium est. Semper autem vas apertum, plenum servari debet, ut optimè despumetur. In hunc finem major quantitas hydromelitis conficienda est, quàm quæ in dolio contineri possit. Imò verò si morbus urgeat, recens, & non fermentatum usurpari potest, dum aliud in dolio fermentatur, quod etiam duplâ, vel triplâ quantitate componi poterit, quia per plures menses est usurpandum. Hujus capiat æger bonum haustum bis aut ter in die.

Syrupus sequens paratu facilius eximias habet vires.

℥. Succo hederæ terrestris, veronicæ, & card. bened. depurat. an. Unc. viij. in quibus bulliant leviter fol. adianthi, polytrich. scabiosæ, & lactucæ, an. M. sem. In colat. dissolve sacchari albiss. lb. j. sem. fiat syrupus perfectè coctus, addendo in fine extracti juniperi Drach. iij. succi liquirit. & extracti card. bened. an. ℥. iv. Capiat æger cochl. j. horâ unâ ante prandium, & ante cœnam, & sub ingressum lecti.

Cardanus se multos phthiæcos, etiam desperatos, restituisse testatur sequenti regimine. Ut scilicet non utatur æger alio alimento, quàm hordeato, sine jusculo carniū confecto. Potus sit aqua saccharata. Et singulis diebus manè capit. Unc. iij. decocti caudarum & bronchiorum cancrorum fluvialium, facti in aqua hordei cum sacchari Drach. ij.

Admiratio



Admiratione dignum est, quod testantur Arcæus, Ingrassias, Fracastorius, & Erasius se multos phthisicos curasse usu decocti ligni sancti, per longum tempus continuato, cum illud rationi causæ antecedentis, humoris scilicet calidi & acris, maximè adversum videatur.

Refert Avenzoar, ab avo suo quendam phthisicum perfectè curatum fuisse, cibando cum pane benè fermentato cum oleo olivarum. Tum etiam se ipsum alium ægrotantem eodem morbo, eadem ratione liberasse.

Pulvis sequens à Valesco de Taranta valdè commendatur & Haly Abbati tribuitur: Eoque præcipuè verum phthisicum se restituisse affirmat. Eodemque Forestus fratrem proprium curasse testatur.

℞. Sem. papav. albi Drach. x. gummi arab. anyli, tragacanth. an. Drach. iij. sem. portulac. sem. malvæ an. Drach. v. sem. cucur. melon. cucumeris, citrulli, cydonior. mundat. ana Drach. vj. spodii, succi liquirit. an. Drach. iij. penidiat. ad pondus omnium, fiat pulvis, dentur omni manè Drach. ij. cum syrup. de papav. vel jujubino. Eo etiam utatur æger in hordeatis, amygdalatis, aliisque cibis.

Capivaccius & Claudinus probant oleum vitrioli ad ulcus exsicccandum, ad guttas ii. vel iij. cum aqua rosar. vel succo plantag. & modico saccharo.

Crollius etiam valde commendat elixir proprietatis, quod ex spiritu sulphuris cum spiritu vini, myrrha, aloë & croco componitur.

Chimici medicamenta ex sulphure, ut flores, lac & balsamum maxime laudant, ut in eorum scriptis videre est, illorum usus commodissimus talis esse potest.

℞. Florum sulphuris, & thuris pulverat. an. ʒ. j. Includatur pomo appiano (vel *Borstorssiano*) excavato. Coquatur pomum, & saccharo conspersum comedatur ab ægro manè, per viij. aut x. dies. Vel

℞. Conserva rosar. antiquæ, diamarg. frigid. diapenid. an. ʒ. j. flor. sulphur. pulverat. ʒ. iij. Cum melle despumato q. s. fiat opiata, de qua capiat magnitud. avellanæ, bis aut ter in die. Vel

℞. Flor. sulphur. ʒ. iv. sacchar. in qua rosar. dissoluti ʒ. iij. Fiant tabellæ, quas teneat in ore frequenter. Vel

℞. Lactis sulphur. ʒ. ʒ. magisterii perlar. & coral. an. ʒ. ʒ. emuls. sem. melon. cum aqua tussilag. vel veronicæ factæ, ʒ. ij. julep. rosar. ʒ. vj. aquæ cinam. & manus Christi perlat. an. ʒ. ij. Misce, capiat cochlear unum vel ij. singulis diebus manè.

Laudant etiam Chymici nonnulli (*Hartman. in Praxi*) antimonium diaphoreticum, cum triplo salis petrae probe calcinatum, ut omnis vis vomitiva ablata sit. Quod singulis diebus exhiberi debet, in tabellas redactum cum saccharo rosaceo, vel conserva rosarum pernixtum, vel cum aliis remediis supra descriptis.

Balsamum Peruvianum ad ulcera pulmonum sananda multum conducit, si ejus gutta una, cum saccharo in pilulam redacta, singulis diebus exhibeatur.

Pulvis pimpinellæ, ad Drach. j. cum juseculo singulis diebus exhibitus, maximæ etiam creditur efficaciz.

Pilulae Ruffi à nonnullis commendantur tanquam efficacissimæ, sumendo Scrup. j. singulis diebus. Verum in sequentem modum compositæ mirabiles edunt effectus.

℞. Massæ pilular. Ruffi Unc. j. antimon. diaphoret. (*recentis*) & gummi guaiac. an. Unc. ʒ. cum balsamo Peruviano fiat massa, de qua capiat Scrup. j. per mensem integrum.

Syrup. Corallorum, & gelatina cydonior. huic affectui etiam maxime conducunt.

Rodericus à Fonseca decoctum santali citrini commendat, tanquam præstantissimum remedium ad fluxionem à pulmone inhibendam, quod parat in sequentem modum.

℞. Aquæ cichorii, acetosæ, an. lb. iv. santali citrini

minutim concisi, Unc. iij. Fiat infusio per unam diem. Deinde fiat coctio in B. M. ferventi, obturato vase, per tres horas: Hujus decocti capiat Unc. iij. manè, & libat in potu per 40. dies.

Omnia denique remedia, quæ ad venam pulmonis ruptam conglutinandam in hæmoptoës curatione proposuimus huic etiam affectui prodesse possunt.

Suffumigia etiam utilis erit usurpari poterunt, ad ulcus pulmonis potenter exsicccandum, & illa ore, naribusque frequenter attrahenda sunt. Compositio autem talis esse potest.

℞. Gummi hederæ Drach. j. ʒ. thuris Drach. j. myrrhæ Drach. ʒ. succi Scrup. j. benzonii, styracis, an. Drach. ʒ. hypocist. Scrup. ij. sem. coriandri. rosar. rubr. santali rubri an. Scrup. j. Pulverentur, & excipiantur mucilag. gummi tragacanth. vel resinâ laricæ. Fiant trochisci super prunas injiciendi.

Vel simplicius fiant suffumigia ex thure, myrrhâ, mastiche, benjoino, quæ semper sint in thalamo, ut siccus aer & odoratus attrahatur.

Efficacius suffumigium, sed non nisi in robustioribus corporibus, quidam parant sic.

℞. Gummi animæ. vel guaiaci ʒ. ij. tabaci Indici ʒ. ʒ. fol. siccor. tussilag. ʒ. j. hysopi, marrubii albi, rorismar. auripigmenti, an. ʒ. iij. Fiat omnium pulvis, cujus portuncula indatur fistulæ, qua fumus tabaci hauritur, accendatur & hauriatur fumus bis in die, longè à passu, & post dimidiam horam capiat dosin decocti sequentis.

℞. Rad. chinæ, falsæ parill. an. Unc. ʒ. fol. scabiosæ, tussilag. hederæ terrestris, ulmariz, capill. ven. & caryophyllatæ totius, an. M. j. hordei integri P. j. liquir. ras. & uvar. corinth. an. j. Coquantur ad lb. ij. Colaturæ adde sacch. rosar. ʒ. iv. capiat lb. bis in die, ut dictum est.

Pro delicatioribus suffitus humidus usurpari poterit, ex decocto herbarum compositus, qui processus utilissimus est, sic enim vires herbarum recta via ad pulmonem feruntur. Omnes autem pulmone appropriatæ & ulceribus curandis idoneæ usurpari possunt. Sequens formula pro exemplo habeatur.

℞. Tussilag. viridis M. viij. hyssopi M. iij. Incidantur, & includantur in olla, cum tantillo aquæ, lutetur operculum perforatum in summitate, ita tamen, ut foramen sit etiam lutatum. Immittitur olla in clibanum circa medium coctionis panis, qui cum extrahitur, dematur olla, & aperto foramine imponatur infundibulum, atque ita per os attrahatur fumus in pulmones, per nares rejiciendus. Mirabiliter movet exspuicionem.

Exterius verò linimentum refrigerans & leniens pectori adinvenendum est, manè & serò.

℞. Gummi tragachanti & arabici, an. ʒ. j. Infundantur in aqua rosacea per diem & noctem; adde olei violac. Unc. sem. butyri recentis Unc. sem. salis prunellæ ʒ. ij. camphoræ ʒ. j. lactis muliebris q. s. Misceantur in mortario, & fiat unguentum.

Ad consumptionem reparandam, aut saltem impediendam, vel retardandam, præter victum analepticum, ad quem præcipuè referuntur hordeata, amygdalata, pineata, oryzata, avenata, & instaurantia varii generis, quæ passim apud auctores inveniuntur, maximè conveniunt, lac ab initio laudatum, & balneum aquæ tepidæ, vel ex decocto hordei mundati, & amygdal. contusarum. Quod tamen præsentī catarrho non convenit, aut quandiū febris putredinis particeps esse judicatur, aut quando pulmo multis scatet excrementis.

Potus sit aqua saccharata, decoctum hordei, & liquirit. hydromel tenue, vel leve chinæ decoctum. De suffitibus sequere Bonnetum, qui fusiùs exponit hanc rem in Theatro Tabidorum. N. B. Auripigmentum tutò non adhibetur.



# PRAXEOS MEDICÆ

## LIBER OCTAVUS.

### DE AFFECTIBUS CORDIS.

#### PRÆFATIO.

**C**OR varios patitur morbos similes, organicos & communes; cum tamen paucissimi sint, qui Medici curantis diuioni subiciantur, quandoquidem viscus nobilissimum graves affectus diu ferre non potest, quin homo confestim de medio tollatur, sicque nullis remediis locus relinquatur. Nos ideo qui omnes labores nostros ad usum artis conferre jam diu constituimus, tres tantum cordis affectus explicare decreuimus, qui frequentius in praxi medica occurrunt, & multorum remediorum apparatu oppugnari possunt. Atque adeo tria illis capita destinauimus, quorum primum erit de syncope: Secundum, de palpitatione: Tertium denique de virium imbecillitate.

#### CAPUT I.

##### De Syncope.

**S**YNCOPE definitur à Galeno 12. meth. c. 5. præceptum omnium virium lapsus. Licet enim in ea solum cor patiatur, & sola facultas vitalis intercipiatur, ea tamen collabente cæteras perire necesse est, cum ab ea continuum & necessarium influxum recipiant.

Dicitur præceptum omnium virium lapsus, ut ab aliis affectibus distinguatur, in quibus vires paulatim deficient donec mors subsequatur. Neque obstat doctrina Avicennæ fen. 1. lib. 3. tract. 2. cap. 2. proponentis signa syncopes paulatim aduenientis: licet enim causæ spiritus dissoluentes, aliquando sensim & paulatim operentur, attamen ingravescentes subito syncopen efficiunt, & ideo Avicenna proponit potius signa antecedentia syncopen, quam ipsam syncopen præsentem.

Demum hæc definitio videtur etiam apoplexiæ competere, in qua contingit præceptum omnium virium lapsus; quod tamen non est veritati consentaneum, siquidem vires cordis in apoplexia permanent, pulsus ut plurimum magnus ac plenus reperitur. Adde quod respirationi læsio, quæ in apoplexia insignis reperitur, etiam ut plurimum cum stertore, maximè eam à syncope distinguat, in qua respiratio nullo modo læditur.

Quæritur cur cessante actione cordis, actio cerebri statim cesset: cum spiritus animalis ex vitali generetur per viam coctionis, & in cerebro aliquandiu manere debeat, licet vitalis continuo non influat. Respondemus, cerebrum, ut & alias omnes partes, ad actiones suas perficiendas indigere continuo affluxu caloris influentis: quo cessante, illæ statim cessant. Calor autem influens per spiritus vitales defertur.

Alii dantur affectus ad syncopen maximè accedentes, & ab ea tantum secundum magis & minus differentes, nempe Έκλυσις, λιποθυμία, & άσφυξία. Έκλυσις leve est animi deliquium: λιποθυμία, seu λιποψυχία, seu άποψυχία, gravius: syncope gravissimum, quæ si eo usque deveniat, ut in toto corpore pulsatio aboleatur άσφυξία nominatur, quæ proximus ad mortem gradus est.

Apud Hippocratem & Græcos antiquiores vox ista σύνκοπη usitata non fuit, affectum hunc lipothymiam, lipopsychiam, & asphyxiam appellarunt. Sed paulò ante Galeni tempora hæc vox inventa, & in medium adducta est, & in specie graviore malo tribuitur, quam sit lipothymia & lipopsychia. Sic apud Gal. 1. ad Glauco. c. 14. lipothy- Lazar. Riverii Opera.

mia est syncope imperfecta, & syncopen semper præcedit.

Ex prædictis patet, partem affectam in syncope esse cor; spirituum vitalium officinam, quorum influxu infusus singularium partium calor ac spiritus in actum deducitur; ideo cessante illa actuatione, ob prohibitum spirituum vitalium influxum, omnium partium vires collabi, actionesque cessare necesse est.

Causa hujus affectus proxima & immediata est spirituum vitalium defectus, non totalis; mortem enim subitanam affert, sed tantus ut natura cogatur (ne vires cordis penitus exsolvantur) spiritus ab aliis partibus ad ipsum cor retrahere, unde illæ à functionibus suis feriari coguntur.

Ille autem spirituum defectus quatuor modis potissimum contingere solet. Vel quia sufficienti copiâ non generantur, vel quia geniti dissipantur & evacuantur, vel quia præter naturam alterantur & corrumpuntur. Vel denique, quia suffocantur & obruuntur. Non generantur vitio facultatis, vel materiæ. Facultas spirituum generatrix læditur, vel proprio cordis affectu, vel per consensum.

Morbi proprii cordis insigniores sunt intemperies malæ, nativam temperiem evertentes, aut substantiam partium & caloris nativi depascentes. Quales sunt febres syncopales, acutæ, & malignæ, syntecticæ seu colliquantes & pestilentes, hecticæ marasmodos. His accedunt morbi organici, ut constrictio & dilatio nimia, & continui solutiones, quæ ad ventriculum cordis penetrantes, citissimè interficiunt.

Per consensum facultas cordis læditur à reliquis principiis, cerebro & hepate, quæ maximam cum corde sympathiam habent. Sæpissimè etiam ab ore ventriculi, ob viciniam sensumque exquisitum, unde orta est divisio syncopes in cardiacam, & stomachicam. Cardiacæ est illa, quæ fit corde primario affecto. Stomachicæ verò, quæ per consensum stomachi producitur. Non rarò etiam ab utero exoritur, ex tetræ vaporibus ex parte ad cor transmissis: unde uteri præfocatio, apnoea, & syncope hysterica proficiuntur, prout vapores illi pulmonem, diaphragma, aut cor impetunt & invadunt.

Vitium materiæ est defectus, vel corruptio aëris & sanguinis ex quibus spiritus vitales generantur. Aëris defectus contingit ex respiratione, vel transpiratione læsa; sanguinis verò defectus, ex læsa nutritione. Utriusque corruptio accidit, cum alienam qualitatem induunt. Sic aër inquinatus in constitutione pestilenti, lipothymiam & syncopen non rarò inferre solet: Sic tetræ odores nonnullis eundem affectum præstant, imò verò suaves mulieribus quibusdam: sic ex pravis edulis corruptus interdum sanguis generatur.

Spiritus dissipant evacuationes nimie, tum sensiles, tum insensiles. Sensiles fiunt primò ipsius sanguis per os, nares, uterum, alvum, hæmorrhoides, phlebotomiam, aliaque vulnera insigniora: secundò aliorum humorum, qui licet excrementitii sint, majori tamen copiâ excreti maximam spirituum dissipationem faciunt, & syncopen inferunt. Tales autem humores exerceri solent per vomitum, alvum, urinas, sudores, magni abscessus apertionem, præcipuè inrorsum, ut empyematis; tum etiam extrorsum, ut in hydrope, aperto umbilico, contingit.

Insensiles evacuationes fiunt ex nimia cutis raritate &



contentorum tenuitate, & acrimonia, immodico æstu, balneo, vel laconico calidiori, immodico labore. Dissipant etiam vigiliæ pertinaces, inedia longa, effrænata Venus, ira vel gaudium vehemens, agritudines longæ & acutæ. His adde ingentes dolores cordis, ventriculi, intestinorum, renum, aurium, dentium, & partium omnium nervosarum.

Spiritus alterant & corrumpunt prava viscerum dispositio, & quæcunque malignam & cordi inimicam qualitatem obtinent, ut aer & halitus rancidus, venenosus & pestilens, respiratione, vel transpiratione attractus, vel in corpore ex putredine humorum genitus. Idem præstat venenum assumptum, vel admotum, vel morfu animalium venenatorum communicatum.

Denique suffocant & obruunt spiritus vitales, sanguinis & spiritus ad cor vehemens refluxus: copiosa fuliginum pravarum circa cor & membra vicina congregatio: nimia sanguinis frigidi & crassi circa cor, ejusque venas & arterias, & membra vicina redundantia.

Syncopen gravissimam, quam mors repentina subsequuta est, à sanguinis & spirituum subito refluxu ad cor, nuper vidimus in nobili virgine, quæ ab ineunte ætate huic symptomati erat valde obnoxia, ita ut ex quovis animi pathemate, etiam leviori, in lipothymiam aut syncopen incideret. Cum autem egregio adolescenti, qui illam ardentem deperibat, matrimonio jungeretur, facto celebri parentum, consanguineorum, affinium, & amicorum conventu, postquam ipsi calamus à tabellione traditus fuisset, ut nuptialem contractum subscriberet, vix dimidiam syngraphi sui partem exaraverat, cum subito in terram concidit exanimis, & omnino demortua. Unde facile fuit conjicere, ex vehementi animi pathemate, maximam & subitaneam sanguinis & spirituum retractionem ad cor factam fuisse, quæ calorem nativum & spiritum insitum suffocaverit, unde mors repentina subsequuta est.

A sanguine verò frigido, crasso, copiosè circa cor, & in majoribus vasis congregato, syncopen oriundam vidit Petrus Salius Diverfus, ut ipse refert *lib. de affectibus particularibus*, c. 4. in puella quartum decimum annum agente: quæ cum per diem capitis gravitatem, vertiginem, & anxietatem passa esset, die sequenti subito extincta est. Secto post mortem cadavere, in arteria magna, & vena cava totus sanguis concretus apparuit, ut apprehenso illius altero principio, integer ex vena & arteria educeretur, ut gladius è vagina extrahi solet. Quare judicatum fuit subitam hanc mortem à sola inceptione venarum & occlusionem à sanguine concreto causatam fuisse. Casus iste rarus est, cum sanguinis concretio in venis in cadaveribus quidem rarò contingere soleat. Tanta enim est venarum sanguinis continendi proprietas, cum sint proprium illius conceptaculum, ut etiam post mortem illum fluidum conservent, qui in omnibus aliis locis illico concrefcit. Hujus autem extraordinariæ concretionis rationem desumit Salius ex analogia sanguinis extravasati, qui simul atque refrigeratur statim concrefcit, quod magis ei admixti sint humores frigidiores, crassiores, & viscidiores, pituitosi nimirum & melancholici, quorum ratione intemperiem consequutus frigidiorum ad concrefcendum majorem aptitudinem & promptitudinem recepit. Simile quippiam evenire potest sanguini intra venas coercito, qui vitiosis abundans succis, crassioribus & frigidioribus, venas majores adeò replet, ut spiritum intercipient, & penetrare non permittens, in extinctionem ducat, eoque extincto, sanguis refrigeretur ac concrefcit, propter humores frigidos & concretionem idoneos, illi admixtos, qui si præsto non fuissent, sanguis liquidus & incorruptus permanisset. Spagyrici hunc affectum referunt ad spiritum quemdam coagulantem & congelantem, ex peculiari & extraordinaria humorum diatesi genitum, quæ cum rarissime contingat, rarissimus etiam solet esse iste affectus. Et certe simplex refrigeratio concretionem istam efficere non potest, alioquin in defunctorum cadaveribus, hyemis tempore præsertim, sanguis in venis perpetuò concrefcere, cum tamen omni tempore fluidus reperiatur. Spiritum autem hunc, congelandi vi præditum, existimare possumus similem esse illi, qui catalepsi inducit; in qua

membra frigida & congelata redduntur, ut inflecti nullo modo valeant. Spiritus hujusmodi fixantes & congelantes Chymici in multis animalibus, vegetabilibus, & mineralibus agnoscunt: tales etiam è tertia interdum suscitari docent historiæ quorundam hominum & brutorum, & tetræ vaporibus in terræ motibus, aut etiam à cavernis quibusdam erumpentibus congelatorum, ut repente corpora illorum rigida facta fuerint. Tales denique spiritus fulminibus misceri, docet Cardanus, historia octo messorum sub quercu coenantium, qui fulmine percussi, rigidi omnino facti sunt, & in eadem specie permanserunt, ut unus comedere, alius manum poculo admoveere, alius bibere videretur.

Signa hujus affectus diagnostica vel respiciunt subjectum, ad illum recipiendum magis idoneum, vel paroxysmum imminens, vel eundem præsentem, vel denique causas illum producentes.

Subjecta magis ad syncopen disposita sunt homines, debilitate quadam nativâ vel adscitâ, à morbo aut alio casu præditi, pusillanimes, foeminae potius quam mares, virgines menstrua patientes, mulieres gravidae, tum etiam illi, qui sunt raræ texturæ, icterici, splenici, & melancholici.

Syncopen imminens significant, in illis præsertim qui illi obnoxii sunt, improvisa anxietas, animi perturbatio, capitis gravitas, vertigo, alieni & varii coloris, viridis & flavi observatio, coloris faciei, tum etiam pulsus frequens ac subita mutatio.

In lipothymia præsentem prædicta etiam signa reperiuntur, sed paulò graviora, quibus non ratò sudor frigidus adjungitur, tum ægrotantes (quod præcipuum est) de animi defectione conqueruntur.

Præsentem verò syncopen demonstrant præceps omnium virium lapsus, pulsus rarissimus, formicans, obscurus, tandemque abolitus, color faciei summo pallore, aut livore suffusus; totius corporis, præsertim extremorum frigiditas, sudor frigidus, syncopiticus ideò dictus, præcipue in temporibus, collo & thorace.

Signa causarum majori ex parte per se manifesta sunt. Febres enim malignæ, acutæ, syncopales, synæcticæ, syncopen idiopathicam efficientes, per se satis conspicuæ sunt: causæ etiam externæ, repentinam syncopen inducentes, sensibus obviæ sunt, ut ira, & gaudium immodicum, terror subitus & repentinus, odores tetræ, hæmorrhagia larga, aliæque evacuationes copiosæ, vigiliæ pertinaces, inedia longa, effrænata Venus, dolores atrocissimi.

Humores tenuiores & corporis raritatem significant nares acutæ, oculi concavi, collapsa tempora. Flavæ bilis abundantiam ostendunt morsus oris ventriculi, anxietas, vellicatio, calor & dolor insignis.

Humorum crudorum copiam significant totius corporis moles amplior, præcordiorum tumor, color faciei albidus, nigricans aut livescens; pulsus minor, obscurus, & inæqualis.

Syncope verò sympathica, ex aliarum partium vitio producta, ex earundem partium affectuum signis innotescit. Si ex affectu ventriculo si proveniat, ejusdem partis affectus præcefferunt, ut nausea, vomitus, ventriculi morsus, oris amaror, sitis, & similia. Idem de aliis partibus esto judicium. Si verò nullum alicujus partis affectus judicium appareat, ex primario cordis affectu syncopen exoriri, indicio est.

Ab aliis affectibus syncope propriis etiam signis distinguitur. Ab epilepsia quidem, quod in ea fit convulsio, non autem in syncope; ab Apoplexia, quod in ea insigniter lædatur respiratio; etiam ut plurimum cum stertore, & pulsus non admodum imminuatur, nisi in morti proximis: In syncope verò pulsus ferè aboleatur, & respiratio libera permaneat. Ab uteri suffocatione distinguitur quod in ea partes spirituales ut plurimum maxime afficiantur, ægrotantes strangulari videantur, pulsus tamen non valde immutetur, neque faciei color, qui statum naturalem servat, imò frequenter rubicundior apparet: in syncope verò respiratio non lædatur, pulsus verè abolitus sit, & facies admodum pallescat. Aliquando tamen syncope



cum uteri suffocatione conjungitur, & tum pulsus interdum non percipitur.

Prognosis hujus affectus ex Hipp. primum desumitur *Aph. 41. sect. 2. Qui frequenter ac fortiter sine causa manifeste deficiunt animo, de repente moriuntur.* Quia, ut ante dictum est, syncope gravior vires cordis penitus opprimat vel exsolvit, unde mors consequitur.

Syncope, à qua homo non restituitur post irrorationem faciei cum aqua rosacea, post vini exhibitionem & sternutatoria naribus immissa, est lethalis.

Cum quis à syncope suscitatur, non statim salus promittenda est. Si enim pulsus non restituitur, & calor vividus non redit, ægerque frigidus semper manet, in syncope citò relabitur, ex qua periculum impendet.

Quæ ab immodicis evacuationibus, timore, tristitia, aut alia evidenti causa syncope exoritur, minus periculosa est, quàm quæ ab interna causa procedit.

Quod ad curationem spectat, cum syncope à variis causis dependeat, illarum ratione diversum curandi modum desiderat.

A quacunque tamen fiat causa, urgente paroxysmo frequentia conveniunt: Supinus decubitus, injectio aquæ frigidæ in faciem, sternutamenti concitatio, vini generosi, aquæ cinam. imperialis, vitæ, cœlestis, & similia in os immissio, admotio propè nares panis è furno calentis, vociferatio & ægri agitatio, narium compressio, & digitorum contorsio, pilorum evulsio, frictiones, ligaturæ, & cucurbitulæ.

A ratione causarum diversarum curatio varianda est in sequentem modum.

Si ex defectu alimenti ducit originem, vino generoso assumpto reparetur, & crusta panis, in eodem madefacta & assumpta, tum etiam alimentis forbilibus & valdè nutritivis, ut jusculis destillatis, restaurantibus, & similibus.

Inter alia plurimum valet ferculum ex ovis, saccharo, vino, & cinamomo, sequenti capite descriptum.

Si ab humorum tenuitate, qua spiritus facile exhalant, odoramenta & cibi boni succi, incrassantesque exhibeantur: cutis pori constringantur ol. rosaceo, maneat æger in aëre frigidiore.

Si ab hysterico affectu, remedia illi appropriata adhibeantur.

Si à maligna qualitate, cardiaca, & alexipharmaca usurpentur, qualia in febrium malignarum curatione præscribi solent.

Si a veneno hausto, venenum illud evacuantis, & tum manifestis qualitatibus, tum peculiari proprietate oppugnantia propinentur. Ideòque vomitus statim provocetur, postmodum theriaca exhibeatur. Deinde si sentiat ardor, vel erosio ventriculi; lac vel butyrum accipiat, vel juscula pingua, aut portiones cardiacas refrigerantes.

Si ab immodica evacuatione, æger doloribus, cibo, potu, somno & quiete reficiendus.

Si à nimia profusione sanguinis; ponatur æger supra lectum, capite declivi, aqua frigidâ facies irroretur, detur parum vini, aqua frigida diluti.

Si à superpurgatione, detur theriaca recens, vel in ejus defectu, antiqua, cum opii gr. i. aut ii. vino dissoluta: vel quod melius est, ladani gr. i. ii. iii. Totus venter oleis sequentibus inungatur.

℞. Ol. myrrin. & cydon. ana Unc. i. semis, ol. absinthii Unc. i. aceti rosacei parum. Misce, fiat unctionio frequens.

Injiciatur, si opus fuerit, clyster ex lacte chalybeato, addendo vitello ovorum n. iii. philonii Romani ʒ. i. ad ii.

Fiant frictiones brachiorum & partium superiorum.

Mica panis, vino madefacta, aut etiam vinum ipsum exhibeatur.

Ac denique evacuatio quævis, sive sanguinis sit per nares, uterum, aliasque partes; sive aliorum humorum, per vomitum, aut alvi fluxum, remediis propriis capitibus describendis, erit cohibenda.

Quæ à sudore nimio exoritur syncope, curatur reme-

Laz. Riverii Opera.

diis sudorem coercentibus, ut aqua frigida, vel rosacea, solâ, aut cum modico aceto, in faciem & manus affatim coniectâ. Aër etiam prædictis aquis, aut flabellatione refrigeretur. Epytemata frigida cordi adhibeantur ex aqua rosar. acetosæ, borrag. & pulv. diamarg. frigidi, cum tantillo vini, penetrationis gratiâ.

Julepi etiam refrigerantes ex syrupo acetoso, violaceo, de pomis, aut de limonibus, cum aquis refrigerantibus, & sale prunellæ frequenter exhibendi. Obstruantur pori unctionibus cutis ex ol. rosac. myrtino, mastichino. A vino æger abstineat. Nullo pacto fricetur, sed sæpe locum mutet, & leviter operiatur. Lectus sequenti pulvere sinapifetur.

℞. Flor. nymphææ & rosar. rubr. ana ʒ. iii. ladani puri ʒ. ʒ. styrac. ʒ. ii. myrtill. & granor. sumach. ana ʒ. ii. Fiat pulvis.

Si ex suffocatione spirituum, ad ambitum corporis illi revocandi sunt frictionibus, ligaturis, cucurbitulis, & similibus remediis. At si à plenitudine oriatur suffocatio, sanguinis copiose, sed per intervalla detrahendus est.

Si à terrore & metu, sanguinis missio etiam usurpanda est, ne affluxu sanguinis, obstructio aliqua vel inflammatio excitetur.

## C A P U T I I.

### De palpitatione cordis.

UT in syncope motus cordis imminuitur; sic in palpitatione est depravatus. Malè à quibusdam tremor cordis nominatur, cum tremor sit passio motus animalis & voluntarii, & non nisi partibus voluntario motu præditis competat.

Galenus lib. de tremore, palpit. & convuls. dicit palpitationem à solo morbo fieri, nempe, solâ causâ morbificâ, partem attollente & deprimente, sine ullo facultatis concursu; tremorem verò partim à morbo, partim à facultate. Hinc multi, palpitationis vocabulum cordi & aliis partibus univocè tribuentes, eodem morbo, fieri existimant in corde, ac in cute & musculis, in quibus palpitatio contingit à spiritu flatulento, ad eas partes violenter impulsio. Si enim ab eodem spiritu impletum, atque iterum evacuatam cor moveatur utris instar, (in quo tale aliquid à liquore violenter infuso vel spiritu inflato & rursus compresso contingit) palpitationem pati existimant. Verum dispar admodum est ratio, cutis enim & musculi non habent naturalem sese dilatandi ac constringendi vim, sed tantum à causis morbificis motum illum acquirunt. Cor verò cum naturalem habeat dilatandi sese ac constringendi facultatem; Palpitatio cordis sine motu illius fieri non potest. Et frustra à nonnullis multa loca congeruntur ex Galeno, quibus probare conantur, palpitationem cordis non fieri à naturâ, sed à morbo, vel potius causâ morbificâ. Galenus enim in omnibus iis locis agit tantum de palpitatione, quæ in cute & aliis partibus externis fit, non verò de palpitatione cordis, quæ alterius naturæ est. Ipse Galenus de sympt. caus. cap. 2. palpitationem cordis & arteriarum ab aliarum partium palpitatione discernit.

Est igitur cordis palpitatio, immoderata & præternaturalis illius partis concussio, vehementi diastole ac systole molesta; quæ tanta interdum est, ut (docente Fernelio) sæpè sit animadversa, thoracis vicinas costas effregisse, sæpè & eas, quæ supra mammas sunt, de propria sede depulisse, sæpè etiam arteriam foras dilatasse in aneurisma, contrahi pugni magnitudine, in quo & tactu & visu conspicua erat pulsatio.

Fit autem moderata illa cordis concussio, ex facultate pulsificâ stimulatâ, & irritata à re molestâ, & usu illius plurimum aucto.

Hic obijci potest, in febribus hæc omnia reperiri. Immoderata enim fit systole & diastole, facultate irritatâ à re molestâ, vel usu aucto, ob calorem immodicum cordi impressum.

Respondemus, motum cordis in febribus distingui à palpita-



palpitatione tantum per magis & minus : & motum cordis depravatam dici palpitationem : quando insignis & vehemens est : si verè tantam vehementiam non habeat, pulsus frequens, magnus, velox, aut celer nominatur, ad aliasque pulsus immutati & præternaturalis differentias refertur.

Causæ igitur palpitationem cordis efficientes, ad tria capita reduci possunt. Vel enim est res molestans & irritans : vel refrigerationis necessitas, vel spirituum defectus : quæ duæ causæ posteriores ad usum auctum referri possunt.

Causa molestans omnium frequentissima est, ita ut quamplurimi authores haud unicam agnoverint, reliquæ verò rariores. Ista autem causa molestans, ut plurimum est vapor, vel flatus, qui quantitate, vel qualitate, vel utraque cordi molestiam parit. Qualitas autem vel manifesta est, vel occulta.

Vapor manifestâ qualitate molestus, vel in ipso corde est, & partibus vicinioribus; vel aliunde ab aliis partibus remotioribus transmittitur, iisque subito, in abditos cordis sinus ingressus, expultricem visceris stimulat, quod summo robore naturaliter præditum, potenter insurgit, & vehementiori nisu hostem expellere nititur.

In corde aut partibus vicinis, potissimum pericardio humores frigidi & crassi interdum colliguntur, è quibus vapores elewantur, & ad cordis ventriculos transferuntur, diu palpitationem efficiunt.

Ab aliis verò partibus remotioribus vapores & flatus ad cordis ventriculos elewantur putà ventriculo, liene, utero, cæterisque ventre inferiori contentis.

Vapor occultâ qualitate molestus cor non rarò afficit in febribus malignis, pestilentibus, in venenis assumptis; & aliquando vermes putrescentes, sanguis menstruus retentus semen corruptum, alia putrida materia, vapores malignos ad cor mittunt, qui facultatem illius vehementer irritant.

Humores varii cordi molestiam exhibent, quantitate, vel qualitate peccantes; sic sanguis nimia quantitate venas & arterias, tum & cordis ventriculos gravans, ut liberè moveri nequeant, cordis palpitationem efficit, motum illius liberum impediens, quem defectum ut refarciat facultas, violentius movet. Sic aqua in pericardio contenta, nimia copiâ luxurians, cordis substantiam comprimit, illiusque ventriculos, ut liberè dilatari valeant. Idem præstant humores confertim ad cor affluentes, ut fit aliquando in vulneribus formidine, ac terrore.

Humores qualitate peccantes cordi insensum sunt, eique molestiam afferunt, si venenati, putridi, corrupti, acres, & calidi nimis fuerunt. Ejusmodi est præcipuè bilis torrida & exusta, in cordis substantiam impetum faciens, illiusque vim expultricem irritans.

Tumores etiam, licet rariùs, hujusmodi effectum excitant, ut inflammatio cordis, abscessus, tuberculum arteriis pulmonum prope cor exortum, quod Antipatro Medico contigisse refert Gal. 4. *de loc. aff.* unde post pulsum inaequalem, in palpitationem & asthma incidit, ex quo subito interiit. Sic refert Dodonæus, se callum in arteria magna, loco cordi proximo, observasse; unde palpitatione orta erat, multis annis perseverans.

Tumores etiam in pericardio excitati, siue humoris expertes, & scirrhi sint, siue humorem in se contineant, ut sunt pustulæ hydatides : In corde ipso calculi officula, polypi & carnis frustula interdum generantur, quæ palpitationem efficiunt. Sic refert Platerus, in quodam diuturna cordis palpitatione vexato, & tandem è medio sublato, osseum quiddam in corde deprehensum fuisse. Schenkius verò refert, Sacerdoti cuidam, qui à teneris annis usque ad annum 42. quo è vita discessit, cordis palpitatione laboraverat, in cordis basi carnis excrescentiam repertam fuisse, quæ sex drachmas pendebat, & alterum corculum representabat.

Secunda palpitationis causa supra proposita fuit refrigerationis necessitas, quæ tum præcipuè adest, cum calor præter naturam in corde augetur, à quo spiritus intus acceduntur, ac propterea motus cordis & arteriarum auge-

tur, ut quod absumitur, restituatur, & calor refrigeretur. Id quidem fieri solet interdum à causis internis, quod tamen rarissimum est, ut antea diximus, frequentius verò ab externis, ut, irâ, exercitatione vehementi, & similibus. Quemadmodum observavit Platerus juvenem quendam admodum calentem, cum in ludo parvæ pilæ irâ corripere, sicque duæ causæ conjungerentur, palpitatione cordis adeo vehementi correptum fuisse, ut inde mors consequuta sit.

Tertia causa fuit spirituum defectus, qui fit per inediam, vigilias, iram, gaudium, metum, pudorem, morbos vehementes, aliasque causas, subito & copiose spiritus dissipantes. Quem spirituum defectum cor refarcire contendens, ut illos, promptius & copiosius regeneret, & ad totum corpus celerius transmittat, motum suum intendit, ac celeriores efficit.

Notandum est pro coronide, palpitationem cordis longè frequentiores esse, quæ fit per consensum aliarum partium, quam ipso corde primario affecto. Habet enim cor cum omnibus corporis partibus consensum per arterias & venas, per quas vapores, flatus, & humores transmittuntur. Quæ omnia suo loco in diagnosi jam proponenda clariùs innotescunt.

Diagnosis hujus affectus vel ad ipsum affectum, vel ad causas illam producentes refertur.

Affectus ipse sensibus conspicuus est, æger enim manifestè palpitationem in se percipit, & adstantes, manum regioni cordis admoventes, motum illum vehementem percipiunt. Imò verò visui etiam & interdum auditui sese objicit, subsultans enim arteriarum motus, præcipuè in jugulo, visu deprehenditur : aliquando etiam cum audiri, testatur Forestus exemplo juvenis cujusdam, cujus cor adeo palpitabat, ut prætereuntes, fenestræ cubiculi clausæ aurem admoventes, clarè exaudirent.

Causæ palpitationem producentes suis etiam signis distinguuntur. Calida intemperies dignoscitur ex pulsus magnitudine, celeritate, crebritate, febre, & calore thoracis, magna & frequenti respiratione, & frigidorum appetentiâ.

Si è vapore aut flatu generetur cordis palpitatio, citò fit & citò desinit, à levi corporis motu excitatur, respiratio interdum difficilis est, interdum etiam tremor genuum contingit; oculorum tenebræ, sonitus aurium, & dolor non rarò alicujus parti, subito evanescens. Cujus autem naturæ & qualitatis sit vapor aut flatus palpitationem committens; ex signis humoris corpore aut partibus quibusdam redundantis colligitur, cum vapores & flatus ab humoribus perpetuò elevari soleant.

Si ab humoribus cordis palpitatio generetur, affectus non adeo subito invadit, & diutius perseverat. Qualis autem humor causa mali sit, ex signis humoris in toto corpore redundantis, facile internosci potest. Ac præcipuè sanguinis copia, à qua frequentius quàm ab aliis humoribus hic affectus generatur, cognoscitur ex pulsu vario & inæquali, ita ut nunc magnus, nunc parvus : tardus, iterumque velox existat : cui etiam respiratio proportionem respondet, cor agrotanti constringi & opprimi videtur, quod ipsum testantur calor excedens, distensio venarum, rubor faciei, tempus verum, ætas, regio, & victus ratio sanguinem multiplicans.

Quæ per consensum aliarum partium palpitatio exoritur ex propriis illarum partium affectuum signis innotescit. Sic ventriculi consensum indicat inappetentia, nausea, humorum pessimorum vomitus, & stomachi morfus. Molesta circa pancreas aut lienem pulsatio, aut alius lienis affectus, materiam in iis partibus latitantem significat, à qua vapores & flatus ad cor transmittuntur. Sic mensium suppressio, & affectiones hystericae, ab utero malum exoriri significant.

Aqua in pericardio redundans difficiliùs cognoscitur, conjectura tamen eam suspicari possumus, si pulsus mollis & languidus sit, & æger conqueratur, sibi cor velut aquæ innatare & suffocari, si malum sit continuum, & in atrophiâ vel hecticâ degeneret.

Si humores maligni & venenati huic affectui originem dederint,



## Cap. II. De Palpitatione cordis. 269

dederint, magna in pulsu varietas apparet, virium maxima defectio; & interdum lipothymia, aliaque malignitatis signa conspiciuntur.

Si à tumore palpitatione oriatur, notabilis in pulsu apparet varietas & motus cordis à naturali valde recedit, admodum inæqualis & inordinatus est, & si humor sit calidus, ingens in corpore erit inflammatio, sitis magna, difficilis respiratio, succedit lipothymia, & tandem mors consequitur. Si verò tumor durus sit in pericardio, affectus est continuus, & æger sensim & sine causa manifesta contabescit. Si caro vel quippiam aliud solidius cordi adnascatur, palpitatione à morbi principio usque ad mortem continuo hominem infestat.

Denique spirituum defectus, cordis palpitationem excitans cognoscitur ex causis præcedentibus, à quibus magna spirituum exolutio fieri potuit; tum etiam ex pulsu crebro, celeri & parvo, & quod ex quovis labore, etiam levissimo palpitatione contingat. Simile enim quippiam convalescentibus accidit, quibus ex deambulatione, aut quavis alia corporis agitatione, etiam leviori, pulsus immutatio fit satis insignis, & palpitationi analoga.

Prognosis hujus affectus ita instituenda est, ut periculosus dicatur, ob læsum cordis motum, quo vita conservari debet, & frequenter ad syncopen deducit, tandemque hominem de medio tollit. Verissima enim est observatio à Gal. proposita, *comm. Aph. 41. sect. 2. & 5. de loc. aff. cap. 2.* omnes, qui juvenes, aut in declinante ætate, cordis palpitationi maximè obnoxii fuerunt, ante senectutem tuos esse. Frequens enim palpitatione signum erat facultatis vitalis admodum debilis.

Palpitatione idiopathica est sympathica periculosior; imò ut plurimum lethalis. Tum etiam illa, quæ ab interna causa fit, periculosior est illâ, quæ ab interna producitur: nisi magna sit externæ causæ vehementia, ut veneni, vel alicujus vulneris insignioris.

Si à cordis tumore, vel solutâ unitate palpitatione procedat, insanabilis & deplorata.

Curatio palpitationis cordis varia esse debet pro varietate affectuum, à quibus dependet. Ac primum ea, quæ à peculiari affectu cordis est, aut pericardii, curationem non recipit. Ideò tota practice curatio ad sympathicam dirigatur, quæ à variis partium inferiorum affectibus dependet, quorum curatio è propriis locis depromenda est.

At præter illa remedia, quæ causæ sublationem respiciunt, usurpanda etiam sunt, quæ symptomatis sedationi aut lenitioni conferunt, cor reficiendo roborandoque, nec non flatus & vapores ex humoribus melancholicis, crudis, & pituitosis elevatos discutiendo. Qualia sunt julepi cardiaci, opiata, epithemata, & odoramenta in virium imbecillitatis curatione describenda, etiam sequentia.

℞. Conservæ, melissæ, anthos, flor. borag. & caryophylli nostratis, ana ʒ. j. confect. alkerm. & theriacæ vet. an. ʒ. j. diambæ Spec. & diamoschi dulcis, ana ʒ. j. Cum syrup. de cortice citri, fiat opiata, qua utatur frequenter.

℞. Aquar. bugloss. rosar. & flor. arantiorum, ana ʒ. ii. syrup. caryoph. nostr. ʒ. j. ʒ. ʒ. aquæ cinamomi. ʒ. ʒ. spiritus rosar. ʒ. ii. confect. alkerm. ʒ. j. Misce, dentur cochlear. ii. per intervalla.

Liquor sequens ad imitationem succi ex cordibus, sequenti cap. describendi, erit utilissimus.

℞. Corda porci, aut vervecis num. iii. cinam. & caryoph. ana ʒ. j. sem. acetosæ & lactucæ, ana ʒ. j. ʒ. vini albi Unc. ii. (vi) aquar. borrag. scabios. & rosar. ana Unc. j. sem. (iii.) confect. alkerm. ʒ. j. Bulliant omnia inter duo vasa. De hoc liquore capiat cochl. ii. mane & vespere.

℞. Rosar. rubr. & flor. rorism. ana ʒ. ii. flor. lavendulæ Drachm. j. sem. angelicæ, cortic. citri, caryophyll. cinamom. macis, ana ʒ. ʒ. croci Scrup. i. moschi, ambræ, ana gr. vi. Cum sindone rubro fiat sacculus, qui irroretur vino albo, & aquâ rosar. Applicetur tepidè regioni cordis.

℞. Unguenti rosar. ʒ. ʒ. olei cinam. & caryophyll. ana gutt. vi. moschi, ambræ ana gr. iv. Misce, fiat linimentum quo illinatur regio cordis.

Clysteres purgantes & carminantes, frequenter injecti, flatuosam materiam potenter evacuant & discutiunt.

Sed venæ sectio omnibus remediis præstat in hoc affectu urgente paroxysmo. Et Gal. testatur 5. *de locis affectis. c. 2.* se nunquam inutiliter venam secuisse in palpitatione cordis.

Quidam practici admovent thoraci cucurbitulas sine scarificatione, quibus magnam vim tribuunt discutiendis ac dirigendis flatuosis spiritibus, qui in partibus internis inclusi continentur. Alii hypochondriis admovent, quando in iis locis mali minera residet.

At Zacutus Lusitanus cucurbitulam scarificatam regioni cordis admovit, si credere fas est, cum miro successu, ut videre est in historiâ ab eo descriptâ in *Praxi Medica admiranda observ. 133. lib. 1.*

Alii verò commendant rhaponticum verum, ad ʒ. ii. cum vino exhibitum, aut vinum, in quo eadem radix macerata fuerit.

### C A P U T III.

#### De imbecillitate virium.

ET si virium imbecillitas omnium actionum, scilicet animalium, vitalium, & naturalium læsiones generatim comprehendat: strictè tamen, & peculiariter vitales significat, quæ pulsu debili & infirmo denotantur. Illa autem virium imbecillitas in omnibus morbis gravibus, in quibus natura vel succumbit, vel ægerrimè resistit causæ morbificæ, reperiri solet.

Quemadmodum igitur in palpitatione actio cordis nimirum pulsatio, est depravata; sic in virium debilitate est imminuta: in quo quidem cum syncope coincidit. Ab ea tamen differt, quòd pulsus imminutio in syncope tanta fit, ut ille sit ferè abolitus & ægerrimè percipiatur: at in debilitate virium, manifestus & conspicuus, neque adeò imminutus, quemadmodum in syncope.

In hac perpetuò facultas animalis etiam offenditur, motus impotentia sequitur, quæ sine ullo cerebri, nervorum, aut muscutorum vitio contingit, sed tantum procedit à spirituum vitalium defectu, qui sufficienter cerebro non communicantur, ut ex iis spiritus animales generentur.

Causa proxima virium imbecillitatis est calor natus & spirituum defectus; à quibus vita & robor partium dependet. Contingit autem ille defectus in singulis partibus, ex defectu spirituum vitalium caloris influentis à corde. Deficiunt autem spiritus vitales, vel quòd sufficienti copîa non generentur, vel quòd geniti dissipantur, corrumpantur, aut suffocentur, quemadmodum in syncope fieri diximus. Ubi tamen hæc differentia reperitur, quòd in syncope causæ defectum spirituum producentes, subito & derepentè effectum suum producant: in virium autem imbecillitate sensim & paulatim operentur. Atque adeò in syncope & lipothymia spiritus vitales penè & toti & subito deficient; at in virium imbecillitate pauciores, quàm debeant singulis partibus communicantur.

Præterea cum calor natus non solum calore influente, sed etiam humido primigenio, tanquam pabulo indigeat: si humidum istud deficiat aut imminuatur, etiam calorem nativum debilitari & vires labefactari necesse est.

Causæ autem efficientes, ut spiritus non generentur, vel dissipantur, vel corrumpantur, vel suffocentur, in syncope theoria propositæ sunt.

Diagnosis hujus affectus nullâ explicatione indiget, siquidem malum per se patet, & ægri sponte virium imbecillitate conqueruntur. Signa verò causarum in syncope fuere proposita.

Prognosis etiam ex varia causarum dispositione dependet. Prout enim causæ virium imbecillitatem producentes, leviores aut graviores sunt, majus vel minus inde periculum emergit.



Curatio hujus affectus ad duo dirigenda est: causarum sublationem, & cordis ac spirituum vitalium restaurationem.

Causæ sunt omnes ferè morbi graves, in quibus vel natura succumbit, vel agerrimè resistit causæ morbificæ; Ergò causarum sublatio omnium ferè morborum curationes respicit, quæ à suis locis erunt desumendæ.

Cordis verò roboratio, & spiritualium vitalium restauratio seorsim instituenda est, imò interdum causarum morbificarum curationi præferenda, cum mortis periculum impendet; cavendo tamen perpetuò, ne vires reficiendo causas morbificas augeamus. Atque adeò in calido morbo cardiaca magis temperata; in frigido, calidiora potius usurpentur.

Primò igitur alimentis cardiaca permiscenda sunt, ut confectio alkermes, vel de hyacintho, cum jusculis, vel etiam cum vino odorifero, aut aqua cinam. si summa sit imbecillitas.

In jusculo etiam decoquatur inter duas patinas frustum coxæ vervecinæ, detractis membranis & pinguedine. Postea colatum jusculum capiat æger uno haustu.

Caro caponis, detracta pelle & pinguedine, in frusta divisa, ponatur in ollam vitreata bene lutatam, & maneat in B. M. bulliente, per quinque horas. Tum liquoris inde manantis capiat æger cochlear. ij. vel iii. cum singulis jusculis.

Vel poterit fieri destillatum restaurans in hunc modum.

℥. Caponem vel gallinam, detractis pelle & pinguedine, ac in frusta divide. Deinde affunde aquar. buglossæ, borrag. acetosæ, rosar. & flor. arant. ana ℥. β. pulv. aromat. rosar. triafantal. & cinam. elect. ana ℥. β. santal. citrin. ℥. j. limones incisos num. iii. Fiat destillatio secundum artem, quæ detur ex cochleari omni hora.

Succus carnis vervecinæ solus ac simplex in usu est frequentissimò. Coxa vervecina in veru assatur, & inter assandum, cum semicocta est, mucronato cyltro pungitur. Expressus succus parum adhuc in patina coquitur, & exhibetur per se, vel cum jusculis, aut vitellis ovorum permixtus.

Valeriola succum ex cordibus vervecinis extractum miris effert laudibus. Et Zacutus Lusitanus propriâ experientia confirmat, dicitque se hoc remedio per inensem exhibitò, divitem quendam virum liberasse, qui frequenter in syncopen incidebat ex debilitate facultatis vitalis, sanguinis, & spiritus resolutione; cum multa alia remedia antea usurpata nihil profecissent. Extrahendi hujus succi hæc est ratio. Acceptum vervecis cor, aut hædi, finditur medium, & probè aqua eluitur, & ultimò aqua rosea fovetur, in taleolas oblongas disseccatur, inque vitreato vase testaceo cum caryophyllis aliquot imponitur, sine ullo liquore. Probèque operculato vase pastâ, vel luto sapientiæ, in talentem furnum, extracto pane, inditur, quoad calore contabescens, in succum eliquatur. Inde post extrahitur, & aperto vase sumitur inventus in vase succus, & agro propinatur [*vix est operæ pretium.*]

Itali in usu habent sorbitionem ex vitellis ovorum, vino, saccharo, cinamomo paratam, quæ optima & valde reficiens est.

Zacutus Lusitanus ex viginti ovorum vitellis ferculum parat, ut videre est *observation. 107. lib. 2. Praxis admiranda.*

Poterunt etiam fieri julepi cardiaci in sequentem modum.

℥. Aqua. buglos. rosar. & flor. arantior. ana ℥. j. syrup. de pomis, & de limonib. ana ℥. β. confectio. alkerms. ℥. β. aquæ cinam. ℥. ii. ii. Fiat julep.

Vel paretur mixtura sequens.

℞. Sacchari albiss. ℥. ii. Humectetur cum aqua cinam. optima, & nonnihil fluidum reddatur saccharum. Deinde adde spiritus vitrioli q. s. ad manifestam aciditatem, essentia cinam. gut. iv. essentia macis, nucis moschat. & anisi, ana gut. iii. essentia caryophyllor. gutt. ii. misce, utatur per se, vel cum jusculo.

Parari etiam poterit opiata restaurans in sequentem modum.

℥. Conservæ rosar. buglossæ, borrag. & caryophylli nostratis, ana ℥. i. cortic. citri condit. & nucis moschat. condit. ana ℥. iii. myrobal. condit. num. j. confect. alkerms. ℥. β. spiritus rosar. & essentia citri, ana ℥. β. essentia cinam. gut. vi. Cum syrup. de pomis, fiat opiata, quæ utatur frequenter.

Aqua sequens præstantissima est.

℥. Gelatinæ cornu cervi cum vino albo extractæ ℥. iv. sanguinis agni, & vituli, manibus agitati, & ab omnibus fibris liberati, ana ℥. ii. vini moscatelli, canarini, aut malvatici ℥. iij. Corda vituli per frusta secta & valdè recentia num. iv. micæ panis albilissimi recentis lacte vaccino inebriatæ ℥. ii. sem. succi melissæ recenter expressi ℥. j. β. aquæ rosar. fragrantis, & flor. arantiorum, ana ℥. j. mala citria majora in taleolas secta num. iii. cinam. opt. ℥. iv. macis. Unc. j. Ponantur in alembico vitreo capaci, & distillantur in B. M. Aquæ dimidia pars, quæ primò prodibit, fervetur ad usum.

Liquor cardiacus excellens & pretiosus in hunc modum componi poterit.

℥. Ambra griseæ Drach. ii. moschi opt. scrup. ii. ligni aloës ℥. i. sem. partis albæ benzoini purissimi ℥. iii. contusis & simul mixtis affunde spirit. vini, ut quatuor digitis supernatet; & ad leniss. cinerum calorem extrahatur tinctura saturata, fiatque liquoris tincti per chartam emporeticam colatura, (aut simplex decantatio) & evocetur dimidia pars spiritus in cineribus, lentissimo igne per alembicum. Liquor in cucurbita restans fervetur in ampulla vitrea forti, optimè obturata subere, cerato, & vesicâ. Cujus guttæ ii. iii. iv. poterunt sumi cum jusculo, vino, julepis, aliisque liquoribus prædictis, vel cum syrupo sequenti.

℥. Aquæ cinam. Unc. iv. aquæ flor. arantiorum fragrantissimæ, aquæ rosar. admodum odoratæ, ana Unc. vi. Misce, & in his dissolve sacchari canti quantum dissolvi poterit; & fiat sine ullo calore veluti syrupus, cujus cochleari uni permisceantur guttæ iv. liquoris cardiaci prædicti.

Ex magmate residuo illius liquoris, addito pari pondere rosarum damascenarum, & quadrupio benzoini, poterunt fieri pastilli valdè suaves pro suffitu cubiculi.

Cordi applicentur epithemata, tum liquida, tum solida, & pulli columbini per medium secti, & pulveribus cardiacis conspersi.

Ventriculo admoveantur sacculi ex aromatibus in vino madefacti. Testes & pudenda foveantur confectioe alkerms. in vino dissoluta.

Arteriæ temporum, manuum, & pedum eodem confect. illinantur, addendo tantillum aquæ cinam.

Odoramenta offerantur naribus, in sequentem modum composita.

℥. Fol. melissæ, ocymi, & majoranæ ana Drach. ii. cort. citri, santal. citrin. caryophyll. ana Drach. i. croci. scrup. sem. ambra griseæ gr. vi. moschi gr. iv. Ligentur in nodulo, & irrorentur aquâ cinam. & rosar. ac naribus frequenter offerantur.

Vel ex prædictis oleis destillatis ex nuce mosch. cinam. & caryophyllis, cum tantillo ceræ, fiant balsama, quibus nares illinantur.



# PRAXEOS MEDICÆ

## LIBER NONUS.

### DE AFFECTIBUS VENTRICULI.

#### PRÆFATIO.

**U**T ventriculi variae sunt actiones, sic variae earum laesiones diversos affectus constituunt. Cum enim illa pars ciborum coctioni, & confectioni chyli destinata sit, ad illud opus perficiendum primò instituta est cibi & potus appetentia, quæ immui, aboleri, & depravari solet. Abolita ciborum appetentiâ, anorexia, & apostita nominatur. Imminuta, inappetentia, & cibi fastidium. Depravata verò caninam famem, & picam, ac malaciam constituit. Nimia potus appetentia suis morbofa nominatur. Vitia prædicta attractricem facultatem respiciunt. Ea verò quæ ad ciborum concoctricem spectat, prout immuitur, aboletur, aut depravatur, unico læsæ concoctionis nomine comprehenditur. Retentio & expulsio læsæ in vomitum & singulum versatur. Vomitus tamen variae sunt species, pro diversæ materiæ, quæ excernitur, natura & conditione. Quia verò ventriculus sensu tactus exquisitus præditus est, propter nervum, quem à sexta conjugatione recipi satis insignem, doloribus ideò, quemadmodum aliæ partes sensibiles, obnoxius est. Ac denique tumores, quemadmodum aliæ partes, præsertim inflammationes, tum etiam abscessus, & ulcera pati consuevit.

Ut igitur omnes ventriculi affectus, qui frequentius in praxi Medica occurrunt, in hac sectione explicemus, eam prorsus undecim concludemus capitulis. Quorum primum erit de inappetentia, & cibi fastidio. Secundum, de fame caninâ. Tertium, de picâ & malaciâ. Quartum, de sui morbofa. Quintum, de concoctione læsâ. Sextum, de singultu. Septimum de vomitu. Octavum, de vomitu sanguinis. Nonum, de colera morbo. Decimum, de dolore ventriculi. Undecimum, de ventriculi inflammatione, abscessu, ulcere.

#### CAPUT I.

##### De inappetentia, & cibi fastidio.

**I**nappetentia, & cibi fastidium actionem ventriculi abolitam & imminutam comprehendunt. Abolita vocatur ἀνορεξία, ἀπορεξία. Imminuta verò δυσορεξία. Usus tamen obtinuit, ut ἀνορεξία & ἀπορεξία pro imminuta & abolita appetentiâ usurpentur. (Conf. Melet. II. 101.)

Causæ hujus affectus variae sunt atque multiplices, quæ ut in ordinem quendam redigantur, considerandæ sunt causæ naturales, quæ famem, seu appetitum naturalem efficiunt. Illæ autem à Galen. I. de sympt. caus. cap. 7. symptomata improprie nominantur, & quinario numero comprehenduntur. Prima est inanitio partium. Secunda est inanitarum partium appetentia naturalis, & tractio alimenti à jecore & venis, usque ad ventriculum continuata. Tertia est venarum mesaraicarum (ad quas omnium partium attractio terminatur) suctio & attractio ab intestinis & ventriculo. Quarta est suctionis sensus in ventriculo. Quinta appetentia animalis, quæ sensu tactus, orificio stomachi implantato, per nervum insignem à cerebro communicato perficitur. Hanc etiam actionem non parum adjuvat humor melancholicus, à liene in ventriculum transmissus, qui aciditate sua & astrictione tunicam interiorem ventriculi vellicat & corrugat, estque illi instar acetarii, ad excitandam appetentiam. Ut igitur appetentia secundum naturam se habeat, omnes istas causas bene constitutas esse necesse est. Si verò aliquod

vitium in quamlibet earum contigerit, appetitus læsio exoritur.

Prima ergò causa, quæ est partium inanitio, si quacumque de causâ defuerit, non fit earum attractio ex aliis partibus & ventriculo, sicque appetentia non excitatur. Deest autem illa partium inanitio, vel quando repletae sunt crudorum succorum copiâ, ob crapulam & ingluviem, vel ob intermissas exercitationes, aut evacuationes consuetas; vel quando tanta est pinguedinis moles, ut partibus ipsis ad alimoniam sufficiat. Impedit etiam partium inanitionem pororum cutis dissipatio magna, vel ingens caloris nativi imbecillitas, ut nihil, aut perexiguum substantiæ partium dissipare valeat, vel ejusdem caloris ad morbificam cujusdam materiæ pepasimum revocatio, neglecta interim partium nutritione, ut in febribus fieri consuevit.

Secunda causa erat appetentia naturalis, & tractio alimenti usque ad ventriculum producta. Illa autem vitatur, quando partes, licet inanitæ sint, non trahunt tamen à venis ob exsolutum sui robur, sed velut effictæ, ac muneris sui oblitæ, languent & feriantur, ut solet contingere in febribus acutis, malignis, pestilentibus, synecticis & heclicis. Idem contingit in immodicis ac diuturnis evacuationibus, ut in fluxu hepatico, uterino, hæmorrhoidali, hæmorrhagiâ è naribus, sudore diaphoretico, venere effrænata, inedia longâ, & similibus.

Tertia causa erat tractio, quæ fit è ventriculo per venas mesaraicas, quæ vitari solet per obstructions insignes illarum venarum, quarum ratione partes inanitæ non possunt materiam chylosam attrahere, neque orificio ventriculi divulsionis sensum inferre. Sic videmus sæpè pueros strumis laborantes, cum alvi fluxu chyloso, eoque diuturno, sensum contabescere, & ad menses deduci: propterea, quod in iis universum mesenterium glandulis refertum est, quæ venas illius obstruunt, & chyli ad jecur commeatum impediunt; unde fit, ut ille semiconfectus per alvum excludatur, sicque partes alimento necessario priventur.

Quarta & quinta causa quæ sunt suctionis sensus & appetentiæ animalis, bonam ventriculi, cerebri, & nervorum dispositionem requirunt. Ideò quacumque illas dispositiones evertere possunt, appetentiam quoque dejicere valent. Sic quacumque intemperies ventriculi valde excedens appetentiam vitiat, præcipue calida & sicca. Calor enim ingens humidam ventriculi substantiam dissipando, appetentiam aufert. Frigidus etiam valde intensum appetentiam vitiat, non solum positivum, quando nimirum viscera ab externo aëre, aquâ, gelu, nive, & similibus ita refrigerantur, ut in narcosis incidant; sed etiam privativum, ab exhausto calore nativo, quod Galenus Narcosis appellat, ut per longas hæmorrhagias, febres ardentes, & similia: quibus exhauritur ventriculi & aliarum partium robur. Sic etiam humores pravi & excrementitii tum calidi, tum frigidi, inappetentias excitare solent. Calidi quidem, ut biliosi, adusti, putridi, aut virulenti, sive in ventriculo ob vitiatam coctionem generentur, sive ex aliis partibus malè affectis transferantur. Frigidi verò, ut pituitosi, viscosi ac lentis, in ventriculo collati, ex malè concoctis alimentis, vel illapsis ex toto corpore. Ut in illis; qui per vomitiones consuetas aliarum partium impuritates in ventriculum allicere consueverunt; vel ex cerebro per catarrhos, in quibus frequenter ventriculus ab hu-

more



more pituitoso gravari consuevit, suppressis mensibus, aut hæmorrhoidibus, calorem suffocando, appetentiam minuit.

Cerebri etiam & nervorum vitia faciunt, ut in stomacho suctionis sensus non percipiatur: in quibus scilicet facultas animalis concidit, vel depravata est, atque adeo, quibus mens ægrotat, ut in apoplexia, lethargo, phrenitide, mania, & similibus contingit, (quemadmodum etiam in paralyti, propter obstructionem nervi sextæ conjugationis, qui ad ventriculum defertur: vel propter ejusdem obstupefactionem, ex usu refrigerantium narcoticorum contractam.

Diagnosis hujus affectus per se satis innotescit: æger enim ipse de appetentiâ dejectâ & alimentorum aversione satis conqueritur. At signa causarum partim conspicua sunt, partim verò artificiosè elicienda.

Ac primum illæ, quæ inanitionis defectum pariunt, cognoscuntur ex victu liberaliori prægressio, corpore admodum repleto, intermissis exercitationibus, aut evacuationibus, somno longiore, & aliis causis, crudorum succorum copiam congerere idoneis; tum etiam si corpus obesum, & venæ distentæ appareant. Eundem inanitionis defectum significat cutis densitas, quæ humoris alimentarii dissipationem impedit: tum etiam morbus aliquis gravis, peculiare membrum obsidens, à quo facta est caloris nativi dissipatio in toto corpore, ita ut summa debilitas illius non possit attractum ad partes alimentum sufficienter conficere, ejusque penuriam inferre.

Secundæ causæ signa satis conspicua sunt: nimirum febres acutæ, malignæ, pestilentes, aut syntecticæ, vel evacuationes immedicæ, aliæque causæ, à quibus magna caloris nativi exsolutio producta est in partibus, ut non possint necessarium alimentum attrahere.

Tertiæ causæ signa ad obstructiones præsertim referuntur, quarum signa in hepatis, lienis & mesenterii affectibus innotescunt.

Quartæ & quintæ causæ signa majori indagine opus habent. Ac primum calidam ventriculi intemperiem, & biliosi humoris redundantiam significant æstus in præcordiis, ac præsertim in regione ventriculi, sitis, linguæ & faucium ariditas & amaror, febris interdum adest, & si ab alia parte humores calidi & biliosi influant, illius partis affectus innotescet, ut hepatis inflammatio, aut alterius partis. Si verò nulla alia pars laborare videatur, in ipso ventriculo intemperiem residere conjiciendum est, aut vitioforum alimentorum usum præcessisse. His ut plurimum accedunt cardialgia, nausea, vomitus, vel alvi fluxus, & ab eorum, quæ excernuntur, qualitatibus, humoris peccantis natura innotescit. Frigida intemperies & pituitosorum humorum copia ex causis refrigerantibus prægressis, vel nativum calorem insigniter dissipantibus & extinguentibus innotescit; tum etiam ex gravitatis sensu in regione stomachi, ructu acido, humore viscido & crasso per os aut per alvum excreto. Eandem etiam significant catarrhus frequens aut diuturnus, & affectus alicujus partis, quæ humorem pituitosum aut melancholicum ad ventriculum transmittere potest, ut lienis, uteri, & similibus. Cerebri denique & nervorum vitia per propria indicia erunt distinguenda.

Quod ad prognosin spectat, quemadmodum bona appetentia in omnibus morbis laudabilis est, ut docuit Hippocr. *Aph.* 3. 3. *sect.* 2. Mente constare, & bene se habere ad ea, quæ offeruntur, bonum: sic etiam inappetentia, malum omne esse consuevit. Magnam enim à statu naturali aversionem significat, oriturque, ut docet Galen. *comment.* in 3. *Epid.* aut à pravis malignisque humoribus, ventriculi orificium occupantibus, aut ab ipsius facultatis extinctione, cujus munus erat alimenti indigentiam sentire, idque consequenter appetere. Sic Hippocr. in 1. *Epid.* de tabidis in Epileptica constitutione mortuis, ait: *cibos omnes perpetuo fastidiabant, non sivebant.* Sic etiam Galen. *comment.* in 3. *Epid.* multos se vidisse affirmat, in quadam pestilenti constitutione qui nihil quicquam ciborum assumebant, & de medio tollebantur. Quidam tamen, ut ipse ait, fortiores quippe, qui viam sibi ipsis asserentes, ci-

bum oblatum assumpserunt, superstites manserunt. Ita apud Hipp. 3. *Epid.* *sect.* 1. *Ægr.* 2. *Hermocrates*, qui die 27. mortuus est, *cibum adversabatur toto morbi tempore, & ultimis diebus ne degustare quidem poterat.* Et *sect.* 2. ejusdem libri, *Ægr.* 6. *Euryanactis filia abhorrebat omnes cibos toto tempore, neque appetebat quicquam, sine sui, neque aliquid bibebat esset dignum, ex quo morbo interit post diem duodecimam.*

Advertendum tamen est, cibi fastidium esse quidem functum, si à caloris nativi exsolutione prodeat; sed non esse tam perniciosum, si ab humorum pravorum redundantia & cacochymia oriatur, ut videre est apud Hippoc. 7. *Epid.* in Cleomenis filio, cibi fastidio citra febrem totos duos menses laborante, ex pituitæ crudæ & viscidæ copia, quæ tamen vomitu copioso fuit exclusa. Sic in morborum ac febrium præcipuè initiis, non est adeo periculosa in appetentia: quia tunc natura, putrescentium humorum sepalmo intenta, minus appetit alimentum, quo ab instituto suo revocaretur. Postmodum enim, sedatâ febre, & humoribus morbificis exclusis, sponte suâ munus suum repetit intermissum.

In pueris inappetentia gravior est, quam in alia ætate, propter humidam valde & dissipabilem substantiam, quæ præditi sunt, & quæ majori restauratione indiget, usu alimentorum, quibus privantur per inappetentiam.

In convalescentibus cibi fastidium recidivam minatur, propter reliquias materiæ morbificæ, inappetentiam producentes.

In morbo diuturno cibi fastidium & dejectionis syncera, malum. Hippocr. *Aph.* 6. *sect.* 7. Cibi fastidium per seipsum pravam est signum in morbis diuturnis; in iis enim, qui à talibus morbis sunt evasuri, contrarius affectus solet accidere, vehemens scilicet ciborum appetentia. At dejectiones syncera, iis supervenientes, deterius multò præsagium efficiunt; quandoquidem per synceras dejectiones intelligit Hippocr. impermixtas aquosæ humiditatis, quando solus humor sero suo destitutus ejicitur, sive is biliosus sit, sive melancholicus. Nam dejectiones hujusmodi exusam esse omnem humiditatem nativam significant à calore febrili.

In longis difficultatibus intestinorum cibi fastidium malum, & cum febre pejus. Hippocr. *Aphor.* 3. *sect.* 6. quando in dysenteria profundiora & putrida ulcera sunt ventriculus ipsis compatiens non bene concoquit, quâ offensione, magis ac magis ad superiora perveniente, quando os ventriculi unâ afficitur, tum agrotantes cibi fastidio laborant. Sunt quidem dysenterici non raro ab initio morbi cibum fastidientes, ob pravorum humores ab hepate confluentes: pars enim eorum superfuitans ad eos ventriculi effertur, quod tamen non est perpetuè periculosum. Sed in longis difficultatibus intestinorum, cum hic casus adveniret, duorum alterum est, vel putredo aliqua circa ulcera, vel magna inflammatio, quorum utrumque admodum est exitiosum.

Curatio hujus affectus, si ab aliarum partium vitio dependeat, ab earum curatione desumenda est. Si verò proprio ventriculi vitio contingat, ad calidam vel frigidam illius intemperiem, cum materia conjunctam, reducenda est.

Calida intemperies curanda est primum humoris biliosi expurgatione, blandè & frequenter repetitâ. Eaque parari poterit ex rhab. myrob. tan. arind. syrup. ros. vel de cicchorio, composit. cum rheo. Aut si æger sit ad vomitum proclivis, blandis vomitoriis provocari.

Idem humor alterabitur julepis aut jusculis refrigerantibus, in quibus non omittendus est spiritus vitrioli, aut sulphuris. Quandoquidem acida omnia, præterquam quod bilem valde contemperent, appetitum etiam maxime excitare valent. Unde fit, ut acetaria æstatis tempore ad excitandam appetentiam frequenter usurpentur.

Vel simul & semel humor ille biliosus alterari & expurgari poterit apozemate convenienti, cui ratione ventriculi, addi poterunt absynthii pontici M. sem. myrobal. citrin. Unc. sem.

Post purgationem ad ventriculum roborandum, convenient miva cydonior. aut cydoniatum ipsum, vel syrupus cydon.



cydon. cum syrupo de absinthio pontic. mixtus; tabellæ diamarg. frig. vel triasantal. vel etiam diarrhod. abbat. si quædam obstructionis suspicio fuerit. Vel opiata sequens.

℞. Condituræ lactucæ & cucurbitæ, ana ʒ. j. conservæ acetosæ rosar. flor. cichorii, buglossæ, ana ʒ. β. santal. rubri, coral. præparat. & margarit. præp. ana ʒ. β. trochif. de spodio, & sem. acetosæ ana ʒ. j. cum syrupo limon. (*malim endiv.*) fiat opiata, cujus capiat ad magnitudinem castaneæ manè & serò superbibendo parum vini dilutissimi.

Exteriùs verò sequenti unguento regio ventriculi inungatur.

℞. Ol. rosar. myrtini, & cydonior. aceto rosac. lotor. ana ʒ. ij. santal. omnium, coralli rubri, coriandri præp. rosar. rub. ana ʒ. j. gran. Kermes, & spodii, ana ʒ. β. ceræ albæ q. s. Fiat linimentum, quo subtepido, & in vola manus tantum calefacto, inungatur dicta regio bis, aut ter in die, addendo etiam aceti rosac. parum, unctionis tempore.

Vel eidem parti admoveatur placenta panis rosac. aceto irrorata, aut in eodem parum macerata quæ removen- da erit priùs quàm incalcescat.

Denique in perseverante affectu plurimum proderit bal- neum, vel semicupium refrigerans & humectans, bis aut ter repetitum. Quo maximè recreantur convalescentes, & in priorem statum atque appetentiam sæpè restituntur.

In alimentis acetum & acida omnia erunt utilissima.

A frigida intemperie producitur inappetentia, quando humores pituitosi & melancholici, in ventriculo collecti, functionem illius destruunt, vel aliunde illapsi à toto cor- pore, ut in illis qui per assuetas vomitiones allicere solent aliarum partium impuritates in ventriculum, aut à cerebro, liene, utero, aliisque partibus. Illiusque curatio primùm respicere debet intemperiem partium mandantium, quæ corrigenda remediis è propriis capitibus desumendis.

Ipsi verò ventriculo medicatio adhibenda est per eva- cuationem humoris morbifici, & partis corroborationem.

Vacuatio potest fieri per vomitum & secessum.

Per vomitum quidem, si æger sit nauseabundus, & facile vomat, medicamentis ciendo vomitui destinatis.

Si verò illi humores crassi sint, & tunicis ventriculi im- pacti, ægerque vomitui non sit assuetus, per alvum detur- bandi sunt, pilulis præcipuè, quæ huiusmodi conveniunt, quia diutius in ventriculo morantur, ut docet Gal. *cap. 7. lib. 4. de sanitate tuenda.* Qui etiam valdè commendat pi- lulas de hiera, quæ exhiberi possunt ad ʒ. ij. vel ʒ. j. ma- nè duabus horis ante passum, vel recenter in hunc mo- dum componi possunt.

℞. Aloës electæ, succo absinthii diligenter nutritæ ʒ. j. agarici trochif. ʒ. ij. rhab. pulverat. & vino albo irrorati, ʒ. j. nucis mosch. & spicæ nardi, ana ʒ. β. salis tartari, mas- tich. & cinam. ana ʒ. j. cum syrup. de absinthio, fiat massa pilular. de cujus ʒ. j. formentur pilulæ vj. deauratæ. Ca- piat summo manè, si velis integrè purgare, velumat ʒ. β. horis duabus ante prandium, bis aut ter in septimana. Possunt acui, si validius purgare volumus.

Si metus sit calidioris jecoris, poterunt misceri quædam refrigerantiæ, ut rosæ rubræ, santala, pulv. diamargariti. Et fieri massa cum syrup. de cichor. composito.

Validiores pilulæ non conveniunt, quia humores ab aliis partibus ad ventriculum alliciunt.

Si pilulæ devorari non possint, hiera propinanda est cum decocto convenienti. Vel si potio videatur ingrata, fiat infusio fol. sennæ, myrobalan. rhei, & agrici, in vino absinthite vel decocto stomachico; dissolvendo tantillum electuarii de citro solutivi, si magis purgans medicamen- tum componere sit animus.

Si à pituita admodum lenta viscidaque oriatur hic affe- ctus, ante purgationem dissolvenda est usu mellis rosac. oxymel. syrup. de hyssopo, aliisque cum decocto inci- dente & abstergente. Vel sequenti apozemate utrumque simul præstari poterit.

℞. Rad. acori vulgaris, cyperi, calami aromat. ana ʒ. ij. cortic. citri sicci, & rad. falsæpar. ana ʒ. vi. fol. absinthii pontic. menthæ, majoranæ, chamæd. chamæp. ana M. j. sem. citri & anisi, ana Drach. ij. sennæ mundat. Unc. ij. sem. carthami contusi Unc. j. agarici trochiscat. Drac. iij.

*Laz. Riverii Opera.*

epithymi, flor. salviæ, anthos, lavendulæ, ana P. j. Fiat de- coctio ad ʒ. j. β. In qua dissolve syrup. de absynthio pontic. & condituræ cortic. citri, ana ʒ. j. Fiat apozema cla- rum & aromat. pauco cinam. & pulv. electuarii aromat. rosar. pro iv. dosibus matutinis. In quarum prima & ulti- ma dissolvi possunt; ad uberiores purgationem, electuar. de citro solut. ʒ. iij. cum rhab. pulverat. ʒ. j.

Terebinthinæ usus opportunissimus est, quia viscera omnia commodè repurgat; maximè si ex ea & rhab. pi- lulas confeceris.

Venæ sectio in hoc affectu non convenit, nisi jecur sit calidius.

Post purgationem sufficientem ad roborantia venien- dum est, tam interna, quàm externa: quæ in sequentem modum præscribi poterunt.

℞. Syrup. de absynthio pontic. ʒ. j. Capiat. manè jeju- no stomacho per aliquot dies. Vel illius loco vinum ab- sinthites substitui poterit.

℞. Conservæ anthos, menthæ, cort. citri conditi, nu- cis moschatæ condit. ana ʒ. β. myrobal. Chebul. condit. num. j. confect. alkerm. ʒ. iij. tunicar. interior. ventricu- lor. gallinæ præparat. ʒ. ij. cinam. pulver. & pulver. aro- mat. rosat. ana ʒ. j. Cum syrup. de mentha fiat opiata, vel cum saccharo rosac. fiat conditum. Utatur manè, superbibendo parum vini generosi.

Dictis remediis utiliter additur sal absinthii, vel ol. de mentha, arte chymica extractum.

Vel sal absinthii, & cortic. arantior. vel alterutrum, ad ʒ. β. in vino, vel jussulo dissolutum exhibeatur.

Sequens etiam syrup. efficacissimus est.

℞. Syrup. cydonior. & condit. cortic. citri, ana ʒ. ij. aqua cinam. ʒ. j. ol. sulphur. gutt. xij. Misce, capiat co- chlear. j. per intervalla.

Aqua clareta frequentissimo in usu apud multos habe- tur, cujus compositio talis est.

℞. Cinam. crassiusculè triti ʒ. ij. Macerentur in lb. j. aquæ vitæ per se in vase vitreo. In alio vase vitreo per se, & seorsim macerentur sacchari albiss. ʒ. vj. aquæ rosar. lb. β. Stent hæc omnia seorsim in infusione, per duos aut tres dies, agitando quolibet die pluries hæc duo vasa. Tandem simul misceantur materiæ in ipsis contentæ, & per manicam transfiantur. Colatura fervetur in vase vitreo benè obturato. Sumat. cochlear j. aut ij.

Apud Parisienses maximo in pretio habetur syrupus de absinthio Penæ. Cujus descriptio in hunc modum se habet.

℞. Cort. citri saccharo conditi & in taleolas dissecti lb. β. Coquantur in æquis partibus aquæ cichorii & agri- monii usque ad putrilaginem. Expressioni fortiter factæ adde succi cydon. & aquæ stillat. absinth. pont. ana ʒ. β. Quibus simul mixtis infunde per quatrduum schoëmanth. ʒ. iv. in vase benè clauso vitreato, supra cineres calidos, in expressione fortiter facta dissolve sacchari albiss. q. s. Coquantur postea in syrupum perfectum, in quo calente dissolve ambra cineritiæ Drach. j. Servetur postea in vase vitreo benè clauso.

In maxima frigiditate ventriculi aqua cinam. sola præ- stantissima est. Sin minus, cum aliis medicamentis per- miscenda, v. g. cum syrupo de absinthio, de mentha, co- rallor. quibus etiam ambra grif. utiliter addi poterit.

Non minoris est efficaciæ syrupus cinam. cum aquæ vitæ confectus, prout describitur à Quercetano in Pharmacop.

Aqua cinam. cum succo cydon. destillata præstantis- sima est.

Ad idem præstat spiritus mastiches, in hunc modum compositus.

℞. Mastiches ʒ. iij. galangæ ʒ. j. spiritus vini ʒ. β. Digerantur ac destillantur.

Utile est etiam elixir proprietatis à Crollio descriptum. Cujus guttæ xij. aut xv. (ad xx.) cum vino exhibitæ mirè stomachum roborant.

Tabellæ etiam ad eundem usum componi poterunt in hunc modum.

℞. Pulpæ cortic. arantior. recent. & pulv. aromat. rosar. ana ʒ. ij. sacchari albi in aqua flor. arantior. dissoluti ʒ. iv. Fiant tabellæ.



Eundem usum præstant tabellæ aromat. rosar. opiata Salomonis, & theriaca.

In affectu inveterato plurimum conducit decoctum ligni guaiaci, aut sassafras, in plures dies sumptum, cum levi sudore, aut sine eo in debilioribus.

Aquæ etiam thermæ sulphuræ & nitrosæ, & quales nostræ Bellilucanæ, magnâ copiâ per plures dies sumptæ, crassos & mucilaginosos humores, omnemque ventriculi & intestinorum illuviem potenter abstergunt & evacuant.

℥. Fol. agrim. cent. minor. & absinthii vulgaris ana M. sem. Coquantur ad ℥. sem. Dissolve sacch. Unc. j. Fiat potio præstans, & in causâ frigida, & calida efficax.

Hartmannus zedoariæ usum valdè commendat, his verbis: *Frequens usus Zedoariæ ventriculum malè affectum adeo roborat, ut nihil supra. Ideoque usum ejus toties comprobatum magni facere licet, cum nusquam non effectus consequatur petitus. Sapiens autem zedoaria est comedenda.*

Costeus vini calidi usum prædicat in sequentem modum. *In potu ordinario vinum calidum ebibitum ventriculi imbecillitatem corrigit. Non infrequens enim est observatio eorum, qui cum ventris fluitibus, doloribusque ob malam coctionem perpetuo torquerentur, ubi calido potu uti cœpere, omni proxus ejusmodi molestiâ soluti, meliorem multos jam annos vitam vivunt.*

Cum vino aqua potus ordinarii permiscenda est, quæ prius cum semine coriandri parum bullierit.

Notandum autem est diligenter, si cum frigida ventriculi intemperie calida hepatis concurrat, ut sæpe fit, calida medicamenta esse caute adhibenda, & temperatoria potius usurpanda.

Zechius sequentem bolum his verbis commendat: *Ut stomachus moderatè calefiat, neque exsicceat, nullum ex internis valentibus hoc præsidium usurpari potest.*

℥. Terebinth. claræ 3. ij. mastich. pulver. 3. sem. pulver. aromat. rosat. 3. sem. Fiat bolus, duabus horis ante cibum dandus.

Pulvis digestivus, ad concoctionem ventriculi adjuvandum, in frequenti usu esse consuevit.

℥. Coriandri præp. Unc. 6. sem. scœn. dulc. & anisi, an. 3. ij. cinam. caryophyll. an. Drach. sem. sacchari ad pondus omnium duplum. Fiat pulvis, de quo capiat cochl. j. post singulos passus, nihil desuper comedendo, vel bibendo.

Balsamum Peruvianum, ad roborandum ventriculum, præstans & efficax est remedium, si ejus guttæ aliquot cum vino hippocratico, vel alio, horâ unâ ante passum exhibeantur.

Vel balsami Peruviani gutta una, aut altera, cum saccharo permixta in formam pilularum sumatur per multos dies.

Magis familiaria medicamenta ventriculo roborando & calefacto idonea, sunt vinum hippocraticum, bochetum ex decocto anisi & coriandri, cum saccharo & cinam. paratum, pro potu ordinario. Pulvis dulcis vulgò dictus ex duabus sacchari partibus & una cinam. conflatus, omnibus alimentis inspersus. Sal ad condiendos cibos confectum ex pulvere coriandri, anisi, piperis longi, galangæ, & nuc. moschat. mixto cum pari portione salis communis: Piperis grana aliquot, integra vel contusa, ventriculo jejuno sumpta. Noces juglandes, caryophyllis & cinam. transfixæ, & saccharo conditæ. Cortex citri & arantior. pariter conditus. Semina anisi, scœniculi, coriandri, & frustula cinam. saccharo incrustata. Quæ omnia ægrotantes ad libitum usurpare poterunt.

Ex prædictis cortex citri gustui gratissimus est. Sed quia sæpe ab exsiccatione duritiem contraxit, ut dentibus facile comminui non possit, cogimur non rarò eum in mortario marinoreo contundere cum aqua rosarum, in formam opiata.

Myrobalani condit. & nuc. mosch. condit. in eundem finem usurpari possunt, & si opus fuerit, eodem modo contundi, quamvis ut plurimum sufficientem mollitiem obtineant.

Essentiæ anisi, cinam. cortic. citri, nuc. moschat. & caryophyll. ad ventriculum roborandum efficacissimæ sunt. Earumque usus erit, quemadmodum supra in affectu cordis propositus est.

Ex alimentis salsa appetentiam plurimum excitant. Imo verò & acida usurpari poterunt in parva quantitate, cum aliis permixta, ne ventriculum refrigerent.

Exteriori verò admoveantur fomenta, linimenta, & emplastrâ, in sequentem modum composita.

℥. Rad. cyperi, galangæ, ireos Flor. & cort. citri sicci, ana Unc. ij. fol. menthæ, hyssopi, salviæ, rorismar. & majoran. an. M. j. sem. anisi, baccar. lauri, nucis moschat. caryophyll. & cinam. an. Drach. iij. flor. stœchad. scœnan. & rorisin. an. P. j. Incidenda incidantur, & contundenda contundantur, ut artis est, includanturque duobus sacculis interpunctis, qui macerentur in vino generoso; & applicentur regioni stomachi calidè per vices.

℞. Ol. de absinthio, de mentha, & nardini, an. 3. ʒ. ol. nucis moschat. 3. ij. ligni aloës, macis, cinam. an. ʒ. j. Cera parum, fiat linimentum. Quod præstantius evadet, si addideris olei caryophyll. gutt. vj. moschi & ambre griseæ, an. gr. vij.

Linimentum ex ol. nucis moschat. & balsamo Peruviano: vel ex oleo absinth. massic. & balsamo Peruviano.

℞. Massæ emplastri de massiche. 3. j. pulv. aromat. rosat. 3. j. ol. moschat. q. s. Fiat emplastr. scutiforme, applicandum regioni stomachi.

Crato sequens emplastrum miris laudibus effert.

℥. Ladani 3. ij. ceræ 3. iv. olei nucis mosc. 3. iij. Fiat emplastrum massa ad usum, adde Tacam. Massic. an. 3. j.

Admonet Gal. 7. meth. hujusmodi emplastrâ diutius non esse in parte detinenda, quia tandem calorem dissolvunt.

Multi practici hujusmodi remedia admovent non solum parti anteriori, supra cartilaginem xiphoidem; sed etiam posteriori supra 13. vertebram, quia orificium ventriculi superius ad posteriora fertur.

℥. Rad. galangæ, & calami aromat. an. 3. iij. mastiches & caryophyll. an. 3. ij. nuc. moschat. n. j. cort. citri sicci Unc. i. sem. anisi 3. j. ʒ. ex his contusis fiat sacculus interpunctus cum sindone rubro, & cotone moscato, perpetuò gestandus supra regionem stomachi.

Ad idem valdè laudantur pelles lupinæ, & vulturis preparatæ, & supra regionem ventriculi gestatæ, earum defectu pelles leporis, aut pannus scarlatinus usurpari poterit.

## CAPUT II.

### De Fame canina.

Cum superiori capite de appetentia imminuta & abolita actum sit, ordinis ratio postulat, ut depravata explicetur. Depravatur autem appetentia duobus modis, quando scilicet vel quantitate, vel qualitate peccat. Quantitate peccat, dum majori copia alimenta expetuntur, quàm naturalis ordo requirit, & ille affectus βουλμία, seu fames canina nominatur: qualitate verò, cum cibi absurdi, aut ea, quæ extra rationem alimenti sunt, expetuntur, & pica seu κίτλα appellatur. De priori hoc capite: de posteriori capite sequenti agendum est.

Nomen igitur βουλμίας, ἀπό τῆ βῆλς λιμῆ deducitur, quia βῆλ particula, aliis vocibus addita, significationem auget, ac si bovis magnitudini conferatur. Vocatur etiam φηγίσαινα, quod nomen ulceribus quoque tribuitur, quæ carnem exedunt, & continuum incrementum capiunt; eaque ideo auctores ulcera φηγίσαινα, id est, depascentia nominant. Fames etiam canina nominatur, quoniam sic affecti vehementi appetitu, canum more, in cibos feruntur.

Notandum autem est, hæc duo nomina, nempe bulimiam & famem caninam, interdum confundi & pro uno & eodem usurpare; interdum verò distingui, ut fames canina dicatur quando post nimium assumptum alimentum vomitus consequitur: & ita ægroti canum more afficiuntur, qui cibos, nimia quantitate assumptos, vomitu rejicere solent. Quibusdam tamen alvi fluxus potius quàm vomitus accidit, natura copiam illam alimenti, quàm ventriculus concoquere non potest, per alvum detrudente. In bulimia verò vomitus non accidit, sed eam interdum lipothymia comitatur. Sunt etiam quidam, qui insatiabili illo comedendi desiderio premuntur, non tamen vomunt,



vomunt, nec alvi fluxu tenentur, sed omnes cibos ingestos probè concoquunt, nisi mox alium sumant, malè habent. Quemadmodum narrat Sennertus de quodam studio, nigro corporis habitu prædito, qui non solum de die, sed noctu etiam comedebat, cibum tamen, quem sumebat, sine vomitu concoquebat, imò verò cibis delicatis satiari non poterat, sed crassos expetebat: unde nec panem à pistoribus confectum, sed à rusticis in vicinis pagis emptum, ut solidiorem, comedebat; sæpè manè tempore æstivo pastinacæ sativæ radices tor, quot sex nummis emuntur, crudas sine damno comedebat. (*conf. Melet. II. 101.*)

Ex his patet, hunc affectum esse symptoma actionis depravatæ, respectu quantitatis, quæ actio aucta nominatur, nempe appetentia modum naturalem excedens. Pars affecta præcipua est os ventriculi superius. Causa continens, est sensus suctionis & vellicationis vehemens & immodicus, appetitum subinde irritans.

Galenus 2. de sympt. caus. cap. 7. causas hujus affectus proximas ad duo genera reducit, his verbis: *Vitiosæ appetentiæ, quæ modum in q. antitate excedunt, vocanturque à quibusdam caninæ. tum existunt, cum vel acidus quispiam vitiosus succus ventriculum mordet, vel totum corpus immodicè digestum inops alimenti redditur. Vitiosus namque succus, qui frigidus est, similem juctui morsum infert, appetentiam verò proritat naturalis affectus similitudine.* Causa igitur proxima auctor præter naturam appetentiæ, juxta Galeni mentem est primò humor vitiosus & acidus in ventriculo hærens: secundò, alimenti indigentia ob nimiam digestionem.

Humores vitiosi, in ventriculo hærentes, famem immodicam excitant, quatenus nimia sua frigiditate, aciditate, & auctoritate officium ventriculi constringunt, corrugant, ac vellicant, adeoque sensum naturali sectioni similem, & spuriam famem inferunt. Talis humor est vel pituita acida in ventriculo restagnans, vel ut plurimum melancholia à liene in ventriculum transfusa, quæ in statu naturali existens, & moderata quantitate & qualitate prædita naturalem & moderatam excitat appetentiam, si verò præter naturam se habeat, & in prædictis excedit, eam intensiorem ac præternaturalem efficit.

Alimenti indigentia, ob quam venæ continuò ex ventriculo fugunt, vel à nimis oritur evacuationibus, per hæmorrhagiam, alvi fluxum, vomitum, sudorem, & similia; vel ex nimia substantiæ alimentariæ consumptione, ob calorem partium immoderatum; aut humorum tenuitatem, corporis raritatem, & pororum laxitatem, vigilas, balnea, exercitia immodica venerem effrenatam. Quæ omnia humiditatem substantificam maxime dissolvunt, ab illis facta inanitione & alimenti penuriâ, cibus citius quàm debeat, à ventriculo abripitur.

A lumbricis etiam chylum depascitibus, potest fieri fames canina, quemadmodum refert Trallianus lib. 7. cap. 4. de quadam muliere bulimia laborante, quæ ab usu hieræ vermem duodecim cubitos longum excrevit, & liberata est.

Hermetici aliam hujus stupentis appetitus causam statuunt: nempe spiritum quemdam dissolventem in corpore genitum, qui insita proprietate quidquid ciborum ingeritur, tam promptè consumit & resolvit, ut legitimum & necessarium nutritioni terminum naturæ non concedat. Hunc spiritum vocant famelicum, esurinum, voracem, salinum, acidum, & vitriolatum prout ex variis salibus, vitriolo, nitro, sale communi, ammoniaco, & similibus, spiritus, seu liquores, quos aquas fortes vocant, arte chymica eliciuntur, qui lapides durissimos, & durissima metalla, brevi temporis spatio in liquorem resolvunt; ita ut aurum, quod neigne quidem fortissimo intra mensis spatiū dissolvi potest intra horæ quadrantem in aqua regia solvatur & in liquorem aquæ ipsi persimilem convertatur.

Hæc doctrina diligenti examine digna est. Sicut enim digestio ventriculi, naturaliter se habens, sedulis rerum indagatoribus quippiam mirabile, & stupendum ostentare videtur: sic eadem, immoderata & præternaturalis reddita quippiam habet admiratione dignissimum. Hoc autem

Lazar. Riverii Opera.

admirabile est in digestionem ventriculi naturali, quod cibi durissimi in eo dissolvantur, & trium vel quatuor horarum spatio in liquorem chilosum convertantur tam tenuem, ut per angustissimos venarum lactearum ramos transcolari, ac veluti filtrari valeant: Nec minus, quod canes ossa durissima in eundem liquorem convertant: quod certè calori intensiori validè concoquenti tribui non potest, cum cibi in olla, igne, quantumvis luculento, intra 24. horas ac plures dies in similem succum converti nequeant. Dicunt Galenici à facultate ventriculi illud dependere. Sed facultas non agit sine instrumento, quod etiam assignatur idiosyncrasia partis; quæ tamen idiosyncrasia, si est certa primarum qualitatum proportio, ut vulgo circumfertur, præcipua illius actio erit à calore. Frigiditas enim, humiditas, & siccitas nihil faciunt ad eximiam illam ciborum liquationem. Calor autem, ut dictum est, non habet illam efficaciam. Est igitur illa idiosyncrasia aliquid aliud ignotum & inexplicabile. Liceat ergo illud inquirere per ea, quæ fiunt in macrocosmo, quorum analogia quædam esse potest in microcosmo. Et idè dicunt Hermetici acutiores spiritum quendam, seu liquorem acidum, transfundi à liene in ventriculum, qui solidiora dissolvit alimenta, & in liquorem chylosum brevi tempore convertit; ita ut spiritus ille, seu liquor acidus sit præcipuum digestionis instrumentum. Et quædam hujus rei conjectura ex eo elici potest; quod aves quæ durissima alimenta conficiunt, lienem habeant, ventriculum undequaque ambientem, caro enim illa, quæ ventriculis avium circumducta reperitur, lienis substantiam omnino repræsentat; unde nobiliorem lienis usum tribuunt, quàm qui ab antiquis est traditus, qui eum solum modo limosæ sanguinis parti expurgandæ dicatum censuerunt, cum alimentorum concoctioni, juxta novam hanc doctrinam maxime inferviat. Si igitur spiritus aut liquor ille acidus à liene promanans, naturaliter se habens, digestionem naturalem & moderatam perficit: ille idem spiritus à naturali statu dejectus, & vitiosus redditus, acutiori, nempe & nimia dissolvendi vi præditus, solida alimenta promptius liquabit & conficiet, illisque dissolutis & à ventriculo confestim deturbatis, nova fames, eaque immodica exsurgat. Novam hanc doctrinam certam & indubiam non statuimus; sed eam tantum proponimus, ut à solidioribus ingeniis sedulo examinetur. Eamque inferius iterum discutietur, dum læsæ concoctionis causas inquiremus.

Signa hujus affectus diagnostica satis manifesta sunt. Per se enim ægrotantibus & adsstantibus apparet appetentia depravata & excedens, quæ plures cibos assumere cogit; qui tamen postmodum nimium gravantes, per vomitum rejiciuntur, & est fames canina; vel si vomitus non subsequatur, animi deliquium adest, cum extremorum refrigeratione, & tunc est bulimia.

Signa causarum ex antecedentibus, comitantibus, & consequentibus facillè desumi possunt. Frigidæ intemperiei & humorum acidorum in ventriculo restagnantium signa sunt ructus & vomitus acidi, dejectiones crudæ, sitis carentia, & causæ externæ refrigerantes prægressæ. Si à defectu alimenti dependeant, ægri emaciantur, & causæ humiditates corporis dissolventes adsunt, vel præcesserunt, ac denique lumbricorum signa ex proprio capite erunt desumenda.

Prognosis hujus affectus ita instituenda est, ut si à causis externis omnino dependeat, periculosus non sit, modò illæ citò auferantur: à lumbricis etiam oriundus parum infert periculi, quia illis sublatis effectus etiam tollitur.

Maximè autem periculosus est, si ingentes evacuationes aut colliquationes corporis consequantur, præcipuè si post ingestum alimentum, ventriculo adhuc pleno existente, animi deliquia contingant; quando enim ea, quæ maximè juvare debent, inuilia existunt, magnam significant ventriculi atoniam.

Sic etiam canina appetentia, cum vomitu aut crebra dejectione perseverans, periculosa est: in cachexiam enim, hydropem, hienteriam, marcores, aliosque lethales affectus degenerare solet.



Quod ad curationem spectat, quia ut plurimum fames canina ab humoribus melancholicis aut pituitosis, ventriculi tunicis impactis & imbibitis, ducit originem; ad ea præsertim remedia dirigenda sunt, quæ tum humoris peccantis evacuationem & alterationem, tum partis laborantis roborationem respiciunt.

Evacuatio instituenda est per vomitum, vel secessum remediis supra in curatione inappetentiæ à frigida causa ortæ propositis. Licet enim hi duo affectus invicem contrarii sint, ab iisdem tamen humoribus, sed frigiditatis gradu, & secundis qualitatibus admodum diversis, ac ventriculorum diversimodè afficientibus, produci solent.

Remedia etiam ventriculum calefacientia & roborantia, tam interna, quàm externa, ibidem proposita, maxime conveniunt. Quæ non solum conferunt, frigidam intemperiem corrigendo, sed etiam exsiccando & sitim inducendo. At urgente siti fames imminuitur.

Præterea vinum meracum satis copiosè sumptum famem potentissimè resolvit, juxta Aph. Hippoc. 21. sect. 1. Idque potentius adhuc præstat illius spiritus, aqua vitæ vulgo nuncupatus.

Famem illam peculiariter obtundunt, quæ ventriculum potenter humectant & relaxant, humorisque aciditatem leniunt. Qualia sunt pingua omnia & oleaginosa ut adipēs, olea, extremitates animalium. Quemadmodum Villanovanus refert, quendam hoc affectu percitum panem calentem amurcæ olei imbutum comedisse, & mulierem bovis liquatum adipem, cum pari calentis olei quantitate, duabus vicibus bibisse, & in tantum cibi fastidium utrumque incidisse, ut nihil per quinque dies comederint, & à priori affectu liberati sint.

Narcotica medicamenta, sensum ventriculi nimis exquisitum obtundendo, famem illam caninam possunt imminuere. Et inter alia, theriaca recens magis ex usu est. Quia præter vim narcoticam, humorum etiam malignam qualitatem, quæ à nonnullis in hoc affectu subesse creditur, virtute alexiteriâ corrigere valet.

Quia verò narcotica rarò, & nonnisi summa urgente necessitate usurpanda sunt, aliis temporibus theriaca antiqua, propter rationem dictam, tum etiam roborationis causâ erit usurpanda.

Ambra grisea ad gr.v. vel vj. cum ovo sorbili sumpta, non solum ventriculum roborat, sed etiam proprietate specificâ huic affectui prodesse creditur, (conf. Hipp. V. Epid. II. &c.)

### CAPUT III.

#### De Pica & malacia.

**P**ica & malacia sunt appetitus depravatus, quo ægrotantes res absurdas, inutiles, & noxias appetere consueverunt.

*Kitla* sive pica nominatur à pica ave, sive ob varietatem coloris, quo donata est, sive quòd terræ globos esitet; mulieres autem hoc affectu laborantes, terram, gypsum, & similia plerumque comedere solent. Malacia etiam ex Plinio appellatur, quia mulieres hujusmodi, præ animi impotentia & mollitie, à recto & naturali alimentorum appetitu deficiunt. (v. Melet. II. 101.)

Producitur hic affectus à pravis & certo modo corruptis humoribus, qui in ventriculo ob læsam illius coctionem colliguntur, vel ab aliis partibus in eum transferuntur.

Ad horum autem humorum productionem maxime disposita sunt corpora pituitosa & melancholica, præsertim verò mulieres, quibus hic affectus proprius & peculiaris esse videtur, quamvis pueri interdum, imò etiam viri, sed rarius, eo affligantur. Ad hanc rem maxime faciunt pravorum eduliorum usus, suppressa aliqua evacuatio naturalis, præcipuè menstruorum, animi moerores, hepatis & lienis intemperies, obstructions, & imbecillitates uteri affectus varii, & similia.

Illi autem humores vitiosi, pro variis intemperierum aliarumque dispositionum gradibus, variam & dissimilem naturam obtinent; unde variæ rerum absurdarum appetentiæ oriuntur. Cum enim hujusmodi humores aliàs cru-

di & incocti, aliàs exusti & præassati existant; sic quorundam appetitus ad res acidas, austeras, acerbis, & valde frigida feruntur, ita ut fructuum immaturorum, acetii, emphacii, succi limonum, granatorum, & arantiorum, aquæ frigidæ, nivis, glaciei & similium usu assiduo & copioso delectentur: alii terrea, sicca & exusta appetunt, ut caryophyllos, cinamonum, nucem moschatam, aliaque aromata, sal, cineres, gypsum, & similia.

Familiaris est hic appetitus virginibus chlorosi laborantibus, & gravidis mulieribus, ob suppressionem menstruum, quæ in corpore moram trahentia, vitiosam induunt qualitatem, ad partes superiores delata ventriculum inficiunt pravo illo succo à quo actiones illius depravantur, & appetitus in primis à statu naturali maxime dejicitur. Pueri interdum hoc affectu detinentur, præcipuè qui à matre chlorosi laborante oriundi sunt. Neque viri ab eo omnino immunes sunt, quamvis rarius id contingat, & præsertim illi obnoxii sunt, qui melancholico temperamento præditi sunt, obstructionibus laborant, aut fluxus hæmorrhoidum consuevi suppressionem patiuntur.

Apud autores maxime controversitur, an appetitus depravatus feratur ad ea, quæ diathesi ventriculi præternaturali similia sunt, an verò ad contraria. Dubitandi ansam dedit Galen. cap. 3. art. parvæ, ubi docet, ventriculum præter naturam se habentem appetere contraria, & in statu naturali appetere similia. Quam doctrinam sequutus Avicen. fen. 13. lib. 3. tract. 2. c. 20. sic loquitur: *Quando in stomacho aggregatur humor malus diversus à consuetudo in qualitate suæ naturæ, tunc requirit aliquid sibi contrarium. Quapropter incidit quibusdam appetitus luti, imò carbonum, & terræ, & gypsi, & rerum hujus generis: propter qualitatem, quæ in eis est, exsiccantem, aut incidentem, contrariam qualitati humorum.* Saniorum tamen judicium eò dirigitur ut similia potius quàm contraria appetantur. Cum enim ad appetentiam excitandam phantasia maxime concurrat, quæ à dispositione corporis maxime excitatur, verisimile est, dominantem humorem ad similiam appetitum phantasiam movere. Sicut enim biliosi, in statu tum sano, tum morbo, ignis & irarum insomnia patiuntur; pituitosi, nivium, glaciei, & aquarum: quarum rerum phantasmata ab humore in corpore prædominante excitantur, sic etiam affecta sede appetentiæ, humores vitiosi, in ea diu stagnantes, sui speciem phantasie imprimunt, quæ ab ea obsessa similiam appetentiam excitat, etiam ratione repugnante, quæ à vehementi illa imaginationis vi superatur. Adde, quod si contraria morbo aut illius causæ appeterentur, continuato illorum usu, morbus tandem curaretur, cum tamen ab iis deterior in dies reddatur. Huic sententiæ quotidiana experientia suffragari videtur, qua docetur, virgines chlorosi laborantes & prægnantes mulieres ea plerumque appetere, quæ ipsarum temperamento & præsentis cacochymie consentanea sunt, ut scilicet illæ, quibus falsi & adusti insunt humores, carbonēs, salem, aromata, & similia expetant: quibus verò melancholia, aut acida pituita dominatur, ad acetum, fructus immaturos, & similia ferantur.

Quod ad Galeni auctoritatem spectat, quidam penitus eam rejiciunt, dicentes: quòd si verum esset, morbosas dispositiones contraria appetere; ægrotantes omnes convalescentes, & reliqui cacochymiâ laborantes, cibos euechymos expeterent, quod tamen veritati non est consentaneum. Videmus enim sæpe ægrotantes & convalescentes pravorum cibos appetere, laudabiles verò respuere. Videmus etiam corpora excalefacta, sive in statu præternaturali, ut in febribus, sive in naturali, ut per exercitia immodica, refrigerationem expetere.

Alii verò hanc Galeni sententiam conciliare nituntur, dicentes: In pica intemperiem ventriculo impressam esse velut habitualement & connaturalem, & ideo facere appetentiam similem naturali, quæ est ad similia. Quod in hunc modum explicari potest dicendo, omnem temperiem naturalem appetere similia: præternaturalem verò contraria; intelligendum esse postremum de intemperiebus, quæ fiunt sine succi redundantia. Quæ enim sunt cum succi abundantia, quando succi admodum imbibiti sunt tunicis



tunicis ventriculi, appetunt potius iſſis ſuccis, quibus madent ſimilia, quia humor, qui totas tunicas jam penetrat, quamvis noxius ſit, moleſtiam non infert. Contra verò quando humor partem tantum aliquam ventriculi occupat, vel eſt ſolum in cavitate, ventriculus appetat contrarium ei, quod ſibi noxium eſt. Si autem humor totum ventriculum occupet, illiusque tunicis imbibitus, tunc facultas illius naturalis obruitur, & ita immutatur, ut non appetat niſi ſimilia humori imbibito. Et ita rectè dici poteſt, illum humorem factum fuiſſe veluti connaturalem.

Platerus & Sennertus ab hiſce difficultatibus facilè ſe expediunt, ad qualitatem occultam confugientes, huiusque perſugii occaſionem quærunt ex eo, quod ſi huiusmodi ægrotantes appeterent ſimilia cauſæ morbificæ, ex eorum uſu copioſo maxime augeretur affectus: cum tamen videamus pica laborantes gypſo, calce, carbonibus, aliisque rebus noxiſſimis ſeſe ingurgitare, ex iſſis leviffimam noxam percipere, à quibus bene ſani ad internecionem uſque læderentur. Præterea dicunt, prægnantes mulieres humores falſos & acidos ſæpe rejicere, cum tamen falſa & acida non appetant, ſed toto genere diverſa. Ac denique nullam eſſe inter carbones, calcem, carnes crudas, aliaque cum humoribus convenientiam, conſtanter aſſeverant; atque adeo in qualitatibus manifeſtis non eſſe acquieſcendum cenſent; ex iſſis ſymptomatis huius appetentiæ mirabilis cauſam deſumi non poſſe, ſed ad qualitatem quandam occultam & inexplicabilem eſſe confugiendum.

Fatetur tamen Sennertus, probabile eſſe à ſimili potius quam contraria qualitate appetentiam iſtam depravatam provenire. Quænam verò ſit illa qualitas, explicari non poſſe, cum res, quæ appetuntur, nullam cum humoribus vel dulcibus, vel falſis, vel acidis, in manifeſtis qualitatibus ut plurimum convenientiam habeant.

Hæc omnia conciliare poſſumus, dicentes, rerum abſurdarum appetentiam ab humoribus ſimili naturâ & temperie prædiſtis excitari, ſed illos humores, præter nativam temperiem, vitio quodam peculiari, è corruptelâ quadam oriundo, eſſe prædiſtos: quod vitium cum diſertè explicari nequeat, ad qualitatem occultam revocari poteſt.

Diagnosis huius affectus per ſe ſatis facilis eſt: ex ſola enim ægrotantis relatione, partem præcipuè affectam eſſe oriſcium ventriculi, notiſſimum eſt; cum illud ſit ſedes appetentiæ. Cauſa etiam ex ſuppoſitâ ſimilium appetentiâ, conjecturâ indagari poteſt. Si enim appetant carbones, ſaltem, & ſimilia: colligere poſſumus, ab humoribus falſis & exuſtis affectum dependere: quæ omnia clariùs innotefcent, ſi humorum prædictorum portio per vomitum vel alvum rejiciatur; ſi ruſtus acidi, vel nidoroſi, ſapor amarus, acidus, vel falſus adſuerint.

Quod ad prognofin ſpectat, chronicus eſt iſte affectus; non tamen ad modum periculofus ſi naturâ vel arte corpus ad priſtinum ſtatum revocetur, quod non adeò difficile contingit. Excluditur enim ſucceſſu temporis humor noxius crebris vomitionibus, vel medicamentis convenientibus evacuatur, & ſuppreſſæ menſium aut hæmorrhoidum evacuationes, quæ huic malo anſam præbebant, cum tempore reſtituuntur. Quæ tamen ſi negligantur & natura oneri ſuccumbat, graviffimi morbi ſuccedere poſſunt. Vitiatâ enim prima coctione, neceſſe eſt ſecundam & tertiam corrumpi, unde graves obſtructiones, cachexiæ & hydropes contingunt. Vel etiam, ſi humor majori copia in ventriculum feratur, & majoris malignitatis particeps ſit, cardialgias inſignes interdum producit, ex quibus lipothymia & ſyncope, & nonnunquam mors ſuccedere ſolet.

Si mulieres hoc affectu laborantes ab eduliis pravis abſtinere incipiant, & laudabilibus uti cum minori ſaſtidio; proximæ ſalutis & curationis incipientis ſignum eſt certiffimum.

Gravidæ mulieres à malacia ut plurimum liberari ſolent circa quartum geſtationis menſem; quia foetus, grandior factus, majorem humorum copiam abſumit, & ipſa mater crebris vomitionibus iſtam illuviem excludit. Quod ſi malum ulterius progrediatur, periculofum eſt. Significat enim altiùs impreſſam fuiſſe pravam iſtam

diatheſin, quæ difficili negotio exterminari valet.

Melius eſt, hoc affectu laborantes, acida & acuta appetere: pejus, ſi res plenè à natura alienas exoptent, ut docet Avic. *fen. 13. lib. 2. tract. 2. c. 10.* Majorem enim ſignificat à ſtatu naturali reſeſſum qui difficiliùs emendari valet.

Curatio huius affectus varia inſtituenda eſt, pro varietate corporum ægrotantium.

In gravidis enim mulieribus pauca celebrantur remedia, ob ſubjecti ineptitudinem, & abortus periculum. In illis tamen leviora uſurpari poſſunt & benigniora ex iſis, quæ ad ventriculum evacuandum & roborandum in curatione inappetentiæ fuere propoſita. Neque omittenda erit venæ ſectio: quæ parçâ manu celebrata, & frequenter, ſi opus fuerit, repetita, maximum ad huius affectus curationem momentum habet.

In virginibus autem chloroſi laborantibus curatur iſte affectus iſſdem remediis, quod ad ipſius chloroſis curationem ſuo loco proponentur.

Quæ verò pica contingit in viris, quod tamen rariffimum eſt, cum ab obſtructionibus hepatis & lienis dependeat, eliminabitur harum curatione, ſuis locis proponendâ.

## C A P U T I V.

### De Siti Morboſa.

**S**itis ſeu potus appetentia non minus ac fames tripliciter lædi poteſt, imminutè, abolitè, & depravatè. Imminuitur non raro à dulci & inſpido humore, ventriculi tunicas irrigante, vel ab humiditate nimia in toto corpore dominante: unde ſit, ut partes purulentam materiam à ventriculo non trahant. Aboletur verò in morbis acutis propter interceptionem primi ſenſorii, quando mens ægrotat, aut quia concidit omnino facultas naturalis, extincto propemodum calore nativo; unde Hipp. *In cauſa ſitiferâ non ſitire, malum*; cum ſitis imminuta ab iſſdem cauſis pendeat, à quibus inappetentia ciborum. Abolita verò, morborum acutorum ſit conſectatio. Neutrius tamen ratio peculiaris hîc habenda eſt. Sed ſufficiet nobis de ſiti depravata, tanquam frequentiori, ſpecialiùs agere. Quæ quidem ſitis depravata etiam bifariam dividi poteſt, quemadmodum fames, ut altera ad potulentorum varia genera feratur; altera verò ſit aucta, & potus quantitatem ac frequentiam reſpiciens. Quæ potus genera abſurda reſpicit, ad picam reſertur: quando ſcilicet ægrotantes appetunt acetum, ſuccum limonum, vel aquam falſam. Supereſt igitur, ut ſitim auctam contemplemur, quod ſymptoma frequentiffimum eſſe conſuevit, dum appetitus humidi quantitate peccat, & potus immodicè expetitur.

Cauſa illius proxima eſt defectus alimenti humidi, & ſiccitas ventriculi, aliarumque partium, quæ ſtomacho penuriam ſuam communicare valent.

Illâ autem ſiccitas, vel humoris penuria exoriri ſolet ab omnibus iſis, quæ roridam humiditatem ventriculi, totiusque corporis abſumere & exſiccare valent, quæ omnia ad calefacientia & exſiccantia referuntur. Exſiccantia, per ſe & primario exſiccant; calefacientia ſecundariò, humidum abſorbendo.

Eſt autem ſitis hæc morboſa idiopathica vel ſympathica. Idiopathica ſit, cum innata ventriculi humiditas alteratur & exhauritur ab inæquali intemperie ſicca, vel calida, vel utraque; interdum, & rariùs ſimplici; frequentius, cum materia conjuncta; cum humore ſcilicet acri, falſo, aut putrido, ventriculi tunicis impacto, vel in illius cavitate incluſo. Sympathica verò ſi ex conſenſu totius corporis, vel aliquarum partium, quarum venæ, exhausto humido, è ventriculo fugunt, ut in febris hepatis, pulmonis, & aliarum partium inflammationibus contingit; tum etiam intemperiebus calidis & ſiccis, præcipuè renum, ut videre eſt in diabete, quæ eo nomine diſſacus nominatur, propter ſitim ingentem, quæ illam comitatur.

Cauſæ externæ ſunt quacumque impenſè calefacere vel exſiccare valent, ut aër valdè calidus & ſiccus, diuturna in ſole vel ad ignem mora, uſus ciborum falſorum, acrium & aromatibus conditorum, uſus copioſus vini antiqui &



generosi, vigilæ nimia, nimia corporis evacuatio, præcipuè per medicamenta purgantia.

Hermetici sitim immodicam & præternaturalem à spiritibus quibusdam sitibundis, ex impuritatibus sulphureis genitus exoriri contendunt, qui non simplici refrigeratione & humectatione, sed spiritibus aliis sibi analogis satari volunt: quemadmodum videmus in febrium accessibus sitim intensam multo aquæ potu parum inhiberi, quæ tamen spiritibus acidis, virioli, sulphuris, salis, & similibus, cum longè minori aquæ quantitate permixtis, facilius cedat.

Diagnosin nihil habet difficile: satis enim ægri de siti urgente conqueruntur. Causæ etiam propriis signis dignoscuntur, ut calida & sicca intemperies, ventriculo, aut aliis partibus inhærens. Tum humores acres, falsi, vel amari, (quorum portio interdum excluditur, vel saltem similes saporis in ore repræsentat:) si in ventriculo contineantur, vel si per consensum aliarum partium sitis excitetur, affectuum eorundem signa sese prodent.

Quod ad prognosin attinet, sitis, quæ à causis procætarcticis excitatur, tutissima est: illa enim potu assumpto facile sedatur. Quæ verò à causis internis procedit, pro illarum varietate magis vel minùs periculosa existit.

Sitis, quæ in febribus contingit, aliisque affectibus curatu facilior, cum eorum solutione sponte evanescit. Si verò à gravibus morbis & periculosos dependeat, est valdè periculosa, ut in hydropse contingit, in quo affectu sitis potu non sedatur; sed potius magis intenditur.

Curatio sitis morbosæ frequentius occurrit in febribus, & quarundam partium inflammationibus, quæ tamen sufficienter descripta est in methodo nostra curandarum febrium, *sect. 5. cap. 2.*

Si verò sitis à sicca ventriculi intemperie, ex immoderatis evacuationibus, aliisque causis contracta sit; illius curatio perficitur vacationes illas supprimendo, tum partes inanitas restaurando remediis humectantibus.

Instituto igitur prius victu analeptico, qualis in febre hæctica, phibisi, & marasmo concedi solet, omnium præstantissima erunt duo remedia à Galen. proposita 9. meth. scilicet lac, & balneum. Quavis enim Hippoc. *Aphorism. 95. sect. 5.* lac siticulosus interdicit; illud tamen intelligendum est de iis qui ob biliosi putridique humoris copiam siti afficiuntur, in quibus lac facillimè corrumpitur: non de iis, qui siti ex siccitate & consumptione laborant. Lactis usum in curatione phthysicos edocuiimus.

Balneum verò fiat ex decocto rad. altheæ & lilior. fol. malvæ, violariæ, vel ex decocto capitis pedum & intsinorum vervecis. Aut butyrum recens, vel oleum violaceum, in aqua tepida dissolvatur pro balneo, quod tepidum esse debet, & frequenter usurpari.

In exitu balnei inungentur lumbi, dorsum, & ventriculus ol. violac. medullâ cruris vituli, & similibus, quibus immisceatur lactis muliebris, aut caprilli, quantum ebibere poterit.

Utatur interea æger syrupis, & tabellis instaurantibus, aliisque remediis, quæ in febris hæcticæ curatione latius proponuntur.

Sequens etiam opiata erit utilissima.

℞. Conservæ rud. eryngii, buglossi, ana ℥. ii. conserv. flor. violar. & burrag. an. ℥. i. confect. alkermes ℥. ss. diapenidii sine speciebus recenter preparati, ℥. ii. Cum syrupo de pomis redol. fiat opiata, de qua capiat ad magnitudinem castaneæ sitis tempore, superbibendo parum aquæ borraginis.

## CAPUT V.

### De Ventriculi concoctione læsa.

**V**entriculi concoctio, chylosis appellata, quemadmodum & reliquæ omnium partium actiones, tripliciter læditur, imminutè, abolitè & depravatè. Imminuta concoctio *βλαδυσία* dicitur: abolita, *ἀσπία*: depravata, *δυσπία*; quæ omnes differentię unico cru-

diatis nomine comprehenduntur. Hæc autem cruditas duplex constituitur. nidorosa scilicet, & acida: cruditas nidorosa fit, quando alimentum in nidorosam & ustam quasi materiam mutatur, ut per eructationem odor ovorum & piscium corruptorum, vel olei fixi efferatur: qui ructus nidorosi in calidis ac biliosis naturis frequentius contingunt. Acida verò cruditas fit, cum cibi in acidam naturam mutantur, & ructus acidi excluduntur, & hæc à frigida intemperie procedit. His & tertia addi potest cruditatis differentia, quando ob calorem debilem cibus imperfectè coquitur, & in pituitosam quandam materiam mutatur, circa tamen aciditatem.

Causæ ventriculi concoctionem lædentes, ad tria capita reduci possunt, vitium scilicet organi, objecti, & rerum externarum, seu extrinsecus advenientium.

Organi vitium omnes ventriculi morbos complectitur: sive similes sint, sive organici, sive communes, qui omnes illius actionem evertere possunt. Intemperies tamen frequentissima est læsæ concoctionis causa. Cum enim concoctio à moderato calore, rectè & secundum naturam se habente, perficiatur: sive ille à debita moderatione recesserit, coctionis læsio contingit. Si frigiditas ventriculi intemperies, quæ caloris immutationem facit, si remissior fuerit, concoctionem imminuit, bradypepsiam parit. Si verò intèrior, concoctionem abolitam & apepsiam producit. Calida verò intemperies concoctionem depravat, & dyspepsiam generat. Illæ autem intemperies interdum simplices sunt, ut in iis, qui ab ortu calore debili & ventriculi imbecillitate præditi sunt, vel calorem acrem & exurentem obtinuerunt; ut plurimum autem cum materia conjunctæ: unde in melancholia hypochondriaca pituitæ copia & fermentatio nigri humoris, cruditates, flatus, inflationes, fluctuationes, ructusque acidos excitare solent.

Vitium objecti, alimenti scilicet, quod est ventriculi proprium objectum, multis modis contingit, dum scilicet peccat in substantia, quantitate, qualitate, tempore, & ordine assumendi.

Vitiosa sunt alimenta ratione substantiæ, quæ duriora sunt, & concocti difficiliora: ut carnes cervinæ, lepore, præcipuè vetustiores, sale vel fumo indurata, panis furfuraceus, tubera, radices, legumina, & similia, quæ dyspepta nominantur.

Quantitate peccant alimenta, quæ nimiam copiam assumentur, & eo nomine à calore vinci & superari nequeunt, unde cruditates oriuntur illis maximè familiares, qui genio & crapulæ indulgent. Minor etiam, quam par sit, alimenti quantitas, speciem quandam cruditatis inducere potest, quando cibi pauciores in ventriculo, in primis bilioso, exurantur & præassantur.

Qualitate peccant alimenta, quæ nimis frigida & humida, flatuosaque existunt: vel quæ calidiora tenuiorem chyli portionem exurant, & in nidorosos vapores convertunt.

Ad hoc genus reducenda est concoquendi & condiendi ratio. Varia enim elixandi, assandi, & condiendi modi novas alimentis dispositiones inducunt, propter quas concocti facilia vel difficiliora redduntur.

Tempus & ordo assumendi præposterus concoctionem etiam vitare possunt. Ut si horam cibandi consuetam omittens, nocte intempesta, & immediate ante somnum cibus stomachum repleat: vel si post solidorum & astringentium, ut casei, pyrorum, cydoniorum, & similibus assumptionem, liquida postmodum & corruptioni obnoxia ingerat.

Res denique externæ coctionem vitare possunt, si immoderate sint. Atque ita aer frigidior, calorem nativum obtundendo, si debilior fuerit vel calidior, eundem calorem dissipando, coctionem evertere potest. Tum etiam exercitationes immodicæ, præsertim à pastu calorem nativum eliciendo à ventriculo ad partes exteriores, eumque præter modum dissipando, nec non chylum adhuc imperfectum præcipitando versus intestina: Alvi & aliorum excrementorum suppressio, aut fluxus immodicus; vigilæ immoderate, somnus diuturnus, animi pathemata graviora



graviora, præcipue mœror, & profunda meditatio statim à pastu, & similes causæ externæ, ventriculi actionem non parum vitare possunt.

Præter causas enumeratas Hermetici nonnulli recentiores aliam adducunt minus tritam, & ab antiquis minimè perspectam, quæ quidem ab iis perspicue non demonstratur: quibusdam tamen conjecturis minimè contemnendis stabilitur, cujus etiam supra in famis caninæ causis explicandis mentionem fecimus. Primum itaque statuunt coctionem ventriculi naturalem à solo calore non perfici; sed promptam illam ciborum solidorum liquationem ac dissolutionem, quâ in chylum convertuntur, ab alia causa dependere: cum experientia doceat, cibos in olla bullientes, igne luculento, etiam per plures dies continuato, nunquam talem dissolutionem pati, cum tamen ossa in ventriculis canum brevi temporis spatio dissolvantur, & in chylosum liquorem convertantur, & in ventriculis piscium, nullo calore actuali præditis, cibi quilibet ingesti eodem modo dissolvantur & concoquantur. Causam itaque præcipuam hujusmodi liquationis esse statuunt spiritum quendam, aut liquorem acidum, à liene in ventriculum transfusum, qui eximiam dissolvendi facultatem habeat. Quam sententiam ex Galenicorum doctrina eliciunt, qua sancitum est, humorem melancholicum, à liene in ventriculum transfusum, excitare appetentiam, idque vel constringendo ac corrugando tunicam internam ventriculi; vel aciditate sua vellicando. Quod quidem impugnari potest ex eo, quod si constringendo id faceret, omnia adstringentia idem præstare possent: & si vellicando, acria qualibet potentius, quam acida appetentiam excitarent. Probabilius igitur existimant, humorem illum appetentiam excitare per accidens; penuriam scilicet alimenti inferendo per dissolutionem illius, quod ingestum est, ex qua penuria appetitus excitatur. Atque ita longè nobiliorem lieni usum tribuunt, quam qui ab antiquis fuit propositus; nempe ventriculo subministrandi præcipuum coctionis instrumentum. Hujus rei conjectura satis valida ex avibus elicitur, quæ durissima plantarum semina dissolvunt, & lienem habent ventriculo undequaque circumductum, ut potentius spiritum illum dissolventem inspiret, vel liquorem acidum commodius communicet. Validum autem avibus inesse acidum illum spiritum, ostendit Helmontius proprio experimento. Refert enim, se in pueritia, cum passerem aleret, ipsi aliquando linguam obtulisse, quam ille rostro apprehendens deglutire conabatur: se verò linguae apice, passeris guttur contingente, maximam in eo aciditatem percepisse. Spiritus verò dissolvens, avium ventriculis inharens, probatur ex praxi medica, in qua gallinarum ventriculi ad juvandam concoctionem passim præscribuntur in pulveribus digestivis, quos hunc affectum præstare credibile est, ciborum dissolutionem adjuvando, cum iidem gallinarum ventriculi calculosis etiam præscribantur, quibus calculorum dissolutio maxime juvatur. Idque manifestius elicitur ex eo, quod ex avium ventriculis sal eliciatur, maximam calculos dissolvendi efficaciam præditum. Ex quo quidem sale, ventriculis avium magnam copiam infixo, natura sagax & provida spiritum elixere novit in vivente animali, cujus adminiculo, concurrente calore nativo, solidorum alimentorum dissolutionem moliri possit. Et vulgò notissimum est, ex salibus dissolventibus, puta vitriolo, nitro ammoniaco, & sale communi, spiritus elici, longè efficaciori dissolvendi vi præditos.

Ille igitur spiritus, seu liquor acidus à liene in ventriculum transfusus, dum secundum naturam se habet, bonam ac laudabilem ciborum concoctionem efficit: si verò à statu naturali recedat, ventriculi actionem evertere potius est. Sicut antea dictum fuit, ex hisce præsuppositis catinam appetentiam excitari, quando spiritus ille seu liquor acidus nimiam activitatem, & potentioram dissolvendi vim obtinuit. Sic etiam ex adverso, si vis illa dissolvens debilior efficiatur, aut omnino deficiat, coctio ventriculi imminuta, aut abolita sequetur. Hinc dicit Helmontius, Aphorismum Hippocratis primum, sect. 6.

qui sic habet: *In longis lavitatibus intestinorum, si ructus acidus superveniat, qui prius non erat, signum bonum, interpretandum esse: ut scilicet ructus acidus superveniens significet, fermentum illud acidum, quod à morbo fuerat deperditum, restitui incipere.*

Fulciamus & nos novam hanc doctrinam proprio experimento. Cum enim anno præterito 1648. alvi fluxu pituitoso & melancholico, per quatuor menses integros afflicti essemus, & ab eo ad extremam maciem & veluti marcorem perducti; quandoquidem omnia alimenta in pituitosam & mucilaginosam substantiam convertebantur, ex debilitate ventriculi ea perfectè concoquere nequeuntis; post multa remedia, per totum illud tempus usurpata, quorum maxima pars parum aut nihil profuit: tandem aceti acerrimi usui frequenti, intra paucos dies à sævo illo affectu integrè liberati sumus: cujus equidem aceti vi acidum illud naturale penè deperditum, plurimum adjutum ac restitutum fuisse conjicere possumus. Usus autem aceti fuit in pastibus cum ovis induratis, quæ fustularim dissecta aceto inungebamus, & per aliquot dies hoc solo edulio in omnibus pastibus utebamur: Tum hoc manifestè percipiebamus, quod si acetum non esset valde acre, exiguum ventriculo adjumentum ferret.

Diagnosis hujus affectus, juxta læsæ coctionis differentias, varia est. Ac primum apepsia & bradypepsia iisdem signis indicantur, per magis & minus tantum differentibus. Illa autem signa sunt ructus acidus, alimenti incocti, vel semicocti per os aut alvum rejectio, causæ ventriculi refrigerantes prægressæ, gravitas, tensio; & inflatio in regione stomachi, læsio à frigidis assumptis, urinæ tenues, aquosæ, & decolores. Interdum tamen urinæ crassæ & rubræ apparent, ex succo impuro ac sæculento, qui ob primæ coctionis imperfectionem à chylo sufficienter separari non potuit, sed ad renes usque transmissus cum seroso humore, impuras etiam urinas reddit, quales interdum, à melancholicis præsertim & scorbuticis excerni solent. Fusiores hujus urinæ explicationem, vide apud Sennertum *lib. 3. præf. part. 8. sect. 2. cap. 6.* Dyspepsiam verò seu depravatam coctionem, ostendunt ructus nidorosi, sapor similis, aut putredinosus in ore; sitis & æstuationis sensus, à calidis assumptis læsio.

Si idiopathice ventriculus laboret, propria ejusdem morbosæ dispositionis signa aderunt. Si verò sympathice afficiatur, ex propriis partium affectuum signis illa sympathia est elicienda. Si verò ex errore causarum externarum, vel objecti vitio symptoma dependeat, ex earum præsentia aut prægressa constitutione, agri vel astantium relatu, innotescet.

Prognosis hujus affectus ita instituenda est. Coctionis vitium quod à causis externis excitatur, faciliè corrigitur, causis illius sublatis, & idonea victus ratione instituta.

Facilius etiam curatur læsa concoctio, ex humoribus ab aliis partibus in ventriculum translatis, quam dum à proprio ventriculi vitio exoritur. Humoribus enim illis expurgatis, antequam morbum aliquem stabilem in ventriculo excitent, coctionis officium restituitur.

Abolita ventriculi coctio omnium deterrima est, quia totius corporis nutritio frustratur, unde morbi lethaliissimi, ut lenteria, hydrops, atrophia, & similes consequuntur.

Coctio imminuta sua etiam parit incommoda, ut colicos dolores, cachexias, ac tandem hydropis varias species.

Depravata concoctio multorum etiam malorum causa est: puta obstructionum, scabiei, febrium, & similibum.

Curatio perficitur sublatione causarum externarum, antecedentium, & conjunctarum, quæ affectum istum efficiunt, augent, vel conservant.

Ac primum advertendum erit, utrum ab aliis partibus ad ventriculum humores transferantur; & in hoc casu humores illi erunt evacuandi ac revellendi, partis mandantis affectus corrigendus, & ventriculus roborandus. Affectuum aliarum partium curationes ex propriis capitibus erunt desumendæ. Ventriculi verò roboratio ex inappetentiæ curatione desumi poterit.

Quæ



Quæ verò ex proprio ventriculi vitio coctionis læsio contingit, ea ut plurimum ab humoribus frigidis aut calidis ducit originem; atque adeò eandem curationem obtinet, quæ pro inappetentia à similibus causis oriunda fuit proposita, quam hîc frustra repetere non opus est.

Si denique Hermeticorum causa peculiaris supra proposita animadversione digna sit, illi providendum erit, primò lienis pravam diathesin corrigendo, & spiritus dissolventes restituendo substantia quadam acidâ, cujus generis sunt spiritus sulphuris, virioli, salis, succi limonum, granatorum, arantiorum, & acetum.

## C A P U T V I.

### De Singultu.

**S**ingultus est motus ventriculi depravatus, quo rem sibi noxiam expellere nititur.

A vomitu distinguitur ex eo, quod materia, quæ vomitu rejicitur, in ventriculi cavitate contineatur, & ille totus invertatur, ut materiam illam excludat, in singultu verò materia peccans tunicis ejusdem infixâ sit; ideo ventriculus sese constringat, ac fibras suas concutiat, ut eam excludat. Et ut nauseam quoque in hac definitione comprehendamus: dicimus, motus ventriculi expulivos tripliciter fieri: vel enim natura quandoque vult insurgere ad expellendum, & non potest, aut non sufficienter ad hunc motum irritatur, & tunc nausea fit: aliquando insurgit & expellit, & fit vomitus: vel denique insurgit, ut expellat, sed non potest expellere, & tunc fit singultus.

Ille autem motus convulsivus est, non autem vera convulsio, quæ solis musculis competit, & partibus voluntario motu donatis.

Causæ singultus immediatæ proponuntur ab Hippoc. *Aph. 39. sect. 6.* inanitio & repletio, sicut & convulsionis. Gal. & Avicenna tertiam addunt, nempe irritationem à materia acri. Alii anxie laborant, ut materiam irritantem ad repletionis genus trahant, quo sententiam Hipp. illæsam tueantur. Verùm ubi res ipsa loquitur perspicue, non opus est rerum evidentiis propter Authorum verba confundere & obscurare. Quid enim clarius est, quàm singultum fieri à facultate expultrice irritata? Quæcunque igitur irritationem illam efficiere possunt, erunt causæ proximæ singultus: Jam verò humores & vapores, quantitate vel qualitate peccantes, ventriculum irritare possunt ad expulsionem, & sic repletio & acrimonia erunt causæ diversæ toto genere distinctæ. Inanitio verò quomodo singultum excitare possit, non est facile explicare. Cum enim illius essentia consistat in defectu, nemo dixerit, naturam insurgere ad defectum expellendum; quin potius movebitur ad illum reficiendum ac reparandum, & sic attractionem potius, quàm expultricem facultatem movebit. Si verò interdum singultus magnas evacuationes sequatur, ut in acutis & malignis febribus, & purgatione ex helleboro contingit: id non evacuationi simpliciter tribuendum; sed potius malignæ cuidam qualitati, à morbo, vel medicamento veniri ulò impressæ.

Materia autem singultum efficiens, vel in ipso ventriculo colligitur, vel aliundè ab hepate, liene, intestinis, aliisque partibus, vel etiam toto corpore communicatur. Sic alimenta vel medicamenta aciora, humores acres, aut lumbrici mordentes in ventriculo contenti, singultum idiopathicum producant. Sympathicum verò inferunt vicinarum partium inflammationes, transmissio ad ventriculum ichore, aut vapore acri; tum etiam, quòd tumor, hepate præsertim inflammato, ventriculum comprimit: unde facultas expultrix assidue irritatur. Denique à toto corpore possunt transferri ad ventriculum humores, vel vapores acres, in affectibus totum corpus occupantibus, ut interdum in febribus acutis & malignis contingit.

Diagnosin hujus affectus per se conspicua est. Causæ verò signa ita distinguenda sunt, ut si idiopathicè contingat affectus, magis continuus sit, & humorum in ventriculo contentorum signa appareant, & affectio vomitu

fedetur. Humor verò peccans, in ventriculo collectus vomitu, aut ructu, aut oris sapore, aliisque signis internosci poterit. Si denique ab alterius cujusdam partis morbo oriuntur, ejusdem signa ex propriis capitibus erunt desumenda.

Quod ad prognosin attinet: Singultus, qui à causa aliqua procatactica, ut cibo, potu, aut frigore exoritur, periculosus non est; tum neque ille, qui crisin per vomitum interdum antecedit, sed tunc reliqua signa in bonum consentire, & salutaria esse debent.

Si quis in laboriosa febre singuliat, morbo laborat pessimo. Hippoc. *in Coacis.* Fit enim ille singultus ab humoribus acris & malignis, tunicam ventriculi interiorum vellicantibus, & facultatem illius expultricem stimulantibus. Et dicit Vallesius, se nullum vidisse servatum in extenuatis, aut febre ardente vel malignâ correptis, cui singultus supervenerit. Sic apud Hipp. 3. *Epid. sectione secunda, Ægr. 12.* Mulier, quæ in foro habitabat, die 12. frequentes singultus patiebatur, & 14. interiit. Observavit etiam Platerus, singultum, febribus ardentibus supervenientem & perseverantem, plerumque mortis esse prænuntium, eundem etiam in dysenteria esse lethalem.

A vomitu singultus & oculorum rubor, malum. Hippoc. *Aphor. sect. 7.* duq. hæc signa si vomitui superveniant in morbis acutis, & ad aliquod tempus perseverent, idè lethalia habenda sunt, quia inflammationem cerebri, aut ventriculi denuntiant: quæ inflammatio non modò ipsius singultus ac ruboris oculorum causa sit, sed etiam vomitus. Si enim vomitus excitaretur ab acris humoribus, os ventriculi ejusque tunicas mordentibus; excretis per vomitum illis humoribus, cessarent vomitus & singultus: nec à vomitu ullus vapor acer ad oculos deferretur, qui oculos rubros efficeret. At cum vomitus non solum non profuerit, sed etiam post se singultum & oculorum ruborem invexerit, certissimum est, illa tria, vomitum, singultum, & oculorum ruborem, ab inflammatione cerebri, aut ventriculi dependere. Cerebrum enim inflammatum sanguinem ad oculorum venulas exprimit præ copia, & in extimam oculi tunicam effundit; unde oculorum rubor, cui ventriculus consentiens, per nervos sextæ conjugationis admodum insignes, ab ea cerebri inflammatione facillè in vomitum ac singultum impellitur. Ventriculus quoque inflammatus vomitum, & à vomitu singultum, & unà cum singultu ruborem oculorum invehit, facto concursu sanguinis fervidioris ad oculos, propter maximum consensum, qui inter istas partes intercedit: quem facillè ostendunt suffusionum initia, imaginumque ante oculos apparitiones, quæ plerumque viato ventriculo contingunt. Unde meritò Hippocrates, *in libro de locis in homine*, à vomitu oculos maxime lædi asseruit.

A jecoris inflammatione singultus, malum. Hippoc. *Aphor. 17. sect. 8.* Singultus tum jecoris inflammationi supervenit, ut docet Galen. *in comment. Aphorismi*, quando inflammatio auctior & deterior evasit. Tunc enim magna inflammatio in hepate eò usque accrevit, ut vehementer superiori ventriculo incumbat, & singultum inducat: imò verò, affluente materia, nonnunquam inflammatio aut erysipelas gignitur in ipso ventriculo. Siminùs ab ea, ventriculi tunicis imbibitâ, morsus excitatur. (*Mel. I. 62.*)

Curatio hujus affectus ad causas dirigitur, quæ ut antè dictum est, vel sympathicè hunc affectum producant, vel idiopathicè. Sympathicè afficientes causæ sunt aliarum partium affectus, quibus curatis singultus etiam aufertur; quamvis ea remedia, quæ symptomati demulcendo idonea sunt, & inferius proponuntur, interim usurpari valeant.

Idiopathicus verò affectus fit à pituita, flatibus, bile, aliove humore acri, aut malignæ qualitatis particeps.

Qui fit ab humore pituitoso, tunicis ventriculi imbibito, curatur remediis humorem illum incidentibus, detergentibus, expurgantibus, ac ventriculum roborantibus; qualia in curatione inappetentiæ à frigida cau-  
oriundæ



oriundæ fuerunt proposita. Quibus sequentia, velut affectui magis appropriata, adjicienda sunt.

℞. Castorei 3. j. succi menthæ 3. iij. Misce, capiat æger cochl. ij. vel iij. urgente singultu. Eodemque remedio potest inungi ventriculus calide, bis aut ter in die.

Acetum scillit. sumi potest frequenter, ad materiam tunicis ventriculi impactam incidendam & resolvendam; vel illius loco oxymel scilliticum.

Caryophylli in ore frequenter detenti non parum juvant.

Utile est etiam elixir proprietatis, à Crollio descriptum.

℞. Seminis anethi 3. ij. vel iij. decoquantur leviter in vini generosi 3. viij. de quibus 3. j. capiat æger, manè & ferò. Idem semen inclusum linteolo naribus frequenter obijciatur.

In affectu contumaci pilulæ sequentes erunt efficacissimæ.

℞. Castorei & myrrhæ, ana 3. iij. salis gemmæ 3. β. diagryd. & mastiches, an. 3. j. agarici recenter trochisc. 3. iij. aloës electæ ad pondus omnium. Excipiantur succo menthæ, & fiat pilular. massa, de cujus Drach. j. fomentur pilulæ vj. deauratæ. Capiat ij. vel iij. manè duabus horis ante cibum, bis in septimana.

Simpliciores pilulæ, nec parum efficaces fieri possunt ex pulvere hieræ cum oximelite, quarum Drach. j. exhiberi poterit.

Intermediis verò diebus utetur pulvere sequenti.

℞. Sem. anethi 3. β. zedoariæ, ligni aloës, nuc. moschat. caryophyll. pulv. diambrae, an. Drach. j. Capiat manè 3. ii. cum paucò vino odorifero. Vel adde salis communis 3. iij. utatur pro condimento ciborum ordinario- rum.

Ventriculo admoveatur sequens cataplasma.

℞. Rad. aristoloch. longæ, areos Florent. baccar. lauri, fol. ratæ, & menthæ sicchor. an. Drach. iij. castorei, myrrhæ, ana Drach. ij. caryophyll. hypocist. ana Drach. vj. cum melle anthosato fiat cataplasma.

Tandem in affectu contumaci ad decoctum, guaiaci, & thymarum sulphurearum usum, tanquam remedia generosissima, confugiendum erit.

Qui à flatibus producitur, iisdem remediis curatur; quibus adduntur flatus discutientia. Admoveantur etiam cucurbitulæ regioni ventriculi, quæ instar miraculi, flatulentos infimi ventris affectus repente mitigant & tollunt.

Qui ab humore acri & bilioso oritur, præter ea remedia, quæ pro inappetentia, à calida intemperie genita, fuerunt proposita, huic etiam affectui convenientissima, curari debet phlebotomiâ (si plethora adfuerit, vomitione; aut purgatione blanda) tertio quoque die repetita in hunc modum.

℞. Rhab. elect. pulverat. & aquâ endiviæ donec mollescat irrorati 3. β. pulpæ tamarind. 3. ij. sem. endiviæ, portulac. & spodii, ana 3. j. santali citrini, & diagrydii, ana 3. i. Cum syrup. de limon. fiat massa pilular. de cujus 3. β. formentur pilulæ iv. vel v. quæ dentur manè, ut dictum est.

Aliis verò diebus sumat conservas rosar. & borrag. paucò pulvere triasantali asperfas: vel opiatam in prædictæ inappetentiæ curatione descriptam.

Emulsiones frequentes, ex seminibus frigidis paratæ, dicti humoris acrimoniam potenter demulcent, vel in affectu minus calido lac amygdal. dulcium.

Syrupus de pomis, cum syrupo cydonior. mixtus, ex cochl. exhibendus.

Jusculum affatim & sæpè propinandum.

Aqua frigida, vel calida, aut ptisana copiosè bibenda.

Oleum amygdal. dulcium, humorum acrimoniam retundit.

Foveatur regio stomachi cum spongia in aceto rosac. macerata.

℞. Cerati santalini, & unguenti rosac. ana 3. j. mastiches 3. β. cortic. citri & carnis cydonior. ana 3. j. Cum succo sempervivi, & paucâ terebinthina, fiant emplastra

Laz. Riverii Opera.

duo, quorum alterum anteriùs, alterum posteriùs stomachi sedi applicetur.

Inungatur regio hepatis unguentis refrigerantibus: Quia ab ea parte humores in stomachum confluere soliti sunt.

Si verò malignæ cujusdam qualitatis suspicio sit, theriaca, aliaque alexipharmaca erunt præscribenda, & regio ventriculi ol. scorpio. Matthioli inungenda.

A quacumque verò causa oriatur singultus, sequentia utiliter usurpari poterunt.

Primò humoris peccantis evacuatio per vomitum instituenda, si æger facile ferat. Et reiteranda vomitio, si affectum imminuat, non autem prorsus auferat; etiam fortioribus exhibitis, si necessitas exigat; quemadmodum docet Platerus in sua praxi. Cujus rei experimentum proponit in observationibus, his verbis. *Chirurgus æger factus mox singultire cepit adeò continuatis vicibus, dies noctesque ut nec dormire, nec rectè loqui, aut cibum capere posset. Ad extremum hoc pacto debilitatus, cum nihil juvisset, & jam in agone esset, dedimus illi non sine metu, ipso tamen summo perè rogante, vomitorium satis validum chymisticum, quod Medicus ad manum habebat. Unde immensam bilis æruginosæ & nigræ copiam evomuit aliquoties, cessavitque singultus, ipseque sensim convaleuit.*

Si æger vomitum aversetur, per inferiora expurgandus est.

Præparandus humor ante vacationem aut ipsius iterationem, incidentibus & abstergentibus. Postea sequentia conveniunt.

Cucurbitula admota dorso in regione ventriculi, vel etiam parti anteriori ejusdem.

Ventriculi per fasciam restrictio, quo minus dilatari queat.

Extremorum ligaturæ.

Semen anisi assumptum, quod peculiariter singultum sedare creditur.

Clysteres frequentes, qui humores noxios à ventriculo revellant.

Animalia juniora ventriculo admota.

Sternutatio materiam in ventriculi tunicis impactam excutit. Quemadmodum Chrysimachus Medicus apud Platonem, Aristophanem singultientem, qui spiritus cohibitione & aquâ frigidâ gargarisatâ curari non potuerat, sternutamento excitato curavit.

Galen. 8. de comp. medic. secundum lac. proponit medicamentum Asclepiadis: Cujus singula examinat simplicia, idque probat, quasi omnes habeat facultates ad hanc intentionem idoneas, scilicet discutiendi & evacuandi materiam noxiam per alvum & lotium, roborandi ventriculum, & postremò mitigandi acrimoniam humorum. Compositio est talis, quæ recipit costi, vel illius loco, galangæ, croci, spicæ nardi, rosar. recent. mastiches, ana 3. iij. asari, aloës, ana 3. ij. opii 3. j. cum succo psyllii fiant pastilli: de quibus detur 3. j. singulo manè.

Ad hujus imitationem brevius parari possunt pilulæ pro una dosi, ex aloës 3. j. laudani opii gr. i. ii. vel iij. Si animus sit magis purgare, addi possunt diagrydii gr. iij. vel iv.

Quàm insignes vires habeant in hoc affectu medicamenta ex aloë parata, testatur Duretus his verbis: *Permuli cum singultiendo frangerentur, ducta alvo per quinque dies, hierâ, glutinosis & nigris humoribus ejeclis, singultu finem fecerunt.*

Platerus in observationibus refert, se puerum decem annorum per octiduum dies noctesque singultientem curasse aquâ nucum viridum, cum raphano prius in aceto maceratarum destillatâ, quam vomitionis excitandæ gratia propinare solebat. Verùm etsi minimè vomuerit, tamen statim singultum desisse, & cum sub noctem denuò haustum bibisset, ab hoc symptomate penitus fuisse liberatum.

Forestus narrat, se hominem, gravi singultu laborantem, curasse unico haustu decocti seminum anethi, carvi, portulacæ, & papav. albi in cerevisia tenuiori.

Claudinus valdè commendat diaphoenicum cum philo-

N n

niò



nio Romano, ubi causa & symptoma valdè urgent.

Narcotica denique sola pertinacem singultum, & aliis remediis minimè cedentem, facilè compescunt, sensum partis obtundendo nimis exquisitum.

## CAPUT VII.

### De Nausea & Vomitu.

**N**ausea & vomitus differunt tantùm secundum magis & minùs. Uterque affectus est motus ventriculi, quo res in cavitate sua contentas expellit, vel expellere nititur. Est igitur nausea inane vomendi desiderium cum anxietate, & tenuis ac pellucidi humoris, per simplicem salivationem excretionem. Eam excitare solet quicquid ventriculo quantitate vel qualitate molestiam infert: nec tamen propter ventriculi imbecillitatem, aut orificii ejusdem superioris robur, vel materiæ crassitiem & visciditatem excludi potest.

Vomitus verò qui Græcis *ἔμετος*, vel *ἔμεσις* nominatur, est motus ventriculi depravatus & concussivus, quo vix expultrix irrita, contractis fibris partis inferioris, laxatisque superioris, materiam in capacitate contentam sibi molestam, sensibiliter per superiora violento impetu rejicit. Dicitur motus depravatus, tùm ratione objecti molestantis, tùm ratione motus ipsius, qui fit à fundo versus crificium, quasi per subversionem; cum motus ventriculo naturalis versùs intestina & pylorum compulsivus fiat.

Vomitus differentia à causis desumuntur, quæ vel internæ sunt, vel externæ. Ideò vomitus primùm dividitur in naturalem & artificialem. Naturalis rursùm vel extra constitutionem morbosam accidit, vel ipso morbo præsentem: unde triplex exturget illius differentia, ut alius sit periodicus, alius criticus, alius symptomaticus.

Periodicus est qui extra morbosam constitutionem & velut naturâ assuetâ exercetur præcautionis gratia, & certis temporum spatiis repetitur: unde apud Hippocratem legimus, antiquos bis in mense, continuis, aut interjectis diebus, vomere solitos. Et nostris etiam temporibus multi reperiuntur, quorum per quædam intervalla alii singulis mensibus, alii singulis septimanis, alii singulis diebus humorum biliosorum, & frequentius pituitosorum copiam vomitu rejicere consueverunt; quibus evacuationibus tanquam prophylacticis à multis morbis præservantur. Et hic vomitus verè symptoma non est, quia sine ullo morbo præsentem excitatur; sed potius motus naturæ nominandus.

Criticus vomitus non rarò contingit in morbis, eoque materia morbifica (priùs coctione præparata) salutiter evacuatur, vel tota; undè perfecta morbi solutio; vel majori parte, undè magna illius imminutio succedit.

Symptomaticus vomitus fit à naturâ irritatâ & debilitatâ, & sine ægri allevatione, quia vel non satis copiosè, aut confertim fit, vel continuo materiæ morbificæ affluxu fovetur & perseverat.

Aliæ vomitus differentia petuntur ab excretis. Quandoque enim materia, quæ excernitur, alibilis est, quandoque excrementitia. Alibilis materia est cibus, aut chylus, aut sanguis purus, vel permixtus. Excrementitia materia est pituita, bilis, melancholia, serum, pus, lumbrici, & similia.

Vomitus artificialis generali vocabulo à nobis appellatur, quicumque à causis externis inducitur.

Illæ autem causæ externæ, quæ vomitum excitare valent, sunt præcipuè ictus vel casus, compressio circa epigastrium, aër austrius vel contagiosus, aura venenata, foetidus odor, exercitationes violentæ & molestæ: ut succussatio equi insueta, navigatio in mari, potissimum flante austro, aspectus vel imaginatio rei foedæ & exosæ, & similes causæ externæ, quæ naturam irritando, vel humores commovendo vomitum excitare solent. Ac præ cæteris assumpta maximam vim habent ad vomitum

excitandum, non solum medicamenta, & emetica ideo nominata, & venena toto genere nobis infesta: sed etiam alimenta, vel suâ naturâ noxia, vel alicui peculiariter exosa; ut est apud Hippocr. de illo, qui ab esu fungorum vomitu vehementi excitato interiit. Idem contigit aulico Antonini Imperatoris ex caseo putri magna copia comesto. Idem præstat alimentorum qualitas pinguis & oleosa tum etiam ordo assumendi præposterus, quando humectantia & relaxantia post astringentia sumuntur, denique alimenta nimia quantitate ingesta, quantumvis euchyma & laudabilia, vomitum excitare possunt, ut crapulæ deditis sæpè contingit. Tum enim natura, nimia mole gravata, inutile pondus, cujus coctioni par esse non potest, excludere tentat; ad quam etiam exclusionem excitatur mala qualitate, quæ illis alimentis per corruptionem, ob pravam coctionem, inducitur.

Causæ internæ sunt antecedentes, vel conjunctæ.

Antecedentes vel à corpore universo, vel a peculiari aliqua parte in ventriculum confluunt. A toto corpore feruntur in plethorâ, cachexiâ, febribus, aliisque affectibus totum corpus occupantibus. A parte aliqua peculiari derivantur sæpè humores in ventriculum, ut in hepatis inflammatione, lienis aut mesenterii obstructione, suppressis menstruis, aut hæmorrhoidibus; catarrhosa constitutione, & similibus. His addenda est prava poricholidochi conformatio, quando scilicet non in duodenum intestinum, sed in ipsum ventriculum implantatur, unde picrocholi *ἀντα* nominantur, qui vomitu bilioso, propter pravam hanc conformationem, frequenter divexantur. Fit etiam vomitus interdum in peristaltico intestinorum motu, quando obstructa intestina, in colico, vel iliaco affectu, humores liberum exitum inveniunt, ad superiora propellunt. Lumbrici etiam non rarò, in ventriculum ascendentes ab intestinis, ejusque tunicam interiorem vellicantes, vomitum efficiunt. Ac denique abscessus disruptus in liene, mesenterio, aliisque abdominis partibus, vomitum purulentum & saniosum excitare solet.

Causæ vomitus conjunctæ sunt eadem supra memoratæ, quando ad ventriculum fluxerunt. Quandiu enim in aliis partibus continebantur, erant causæ antecedentes: Postquàm verò ad ventriculum translatae sunt, in eoque commorantur, causæ conjunctæ rationem obtinent. Tales causæ sunt præcipuè humores varii, quorum etiam nonnulli in ipso ventriculo generantur; pituita potissimum, cujus maximus proventus non rarò fit in ventriculo per cruditates & apestias; quando stomachus debilis alimenta probè non concoquit, eaque in pituitosum excrementum convertit. Sic etiam in ventriculo interdum generatur bilis porracea ex corruptis alimentis, ut docet Galenus *comment. in prognostic.* & hoc luculenter apparet in pueris lactantibus, qui ex lactis corruptione in ventriculo, fæces porraceas & æruginosas excernere consueverunt.

Hæc tamen bilis porracea, ex corruptis alimentis in ventriculo genita, non est ejusdem naturæ cum ea, quæ ex bile flava per aduersionem & torrefactionem generatur.

Signa vomitus diagnostica per se manifesta sunt. Causæ verò, prout variæ, sic etiam variis signis innotescunt.

Primò igitur, si ventriculi ipsius vitio vomitus contingat, ejusdem partis laborantis signa apparent: ut cibi fastidium, gravitas, tensio, & inflatio in regione stomachi, tarda & difficilis concoctio, ructus acidi, vel nidorosi, aliaque signa debilitatem & intemperiem illius partis demonstrant. Sic etiam, si ex morbo organico vel communi, ventriculo inhærente (ut tumore, vel ulcere) vomitus oriatur, eorum morborum signa sese produnt. Si verò per sympathiam totius corporis, aut aliarum partium vomitus contingat, affectus totum corpus, vel aliquam partem obsidentes apparebunt.

Totum corpus afficitur in febribus, cachexia, ictero, atrophia. Partes verò peculiare, à quibus frequentius humores ad ventriculum transmittuntur, sunt cerebrum, hepar, intestina, & uterus.



Si è cerebro humores ad ventriculum confluant, destillationis signa apparebunt. Tum etiam vomitus erunt spumosi ac pituitosi, nausea erit magis molesta, quo tempore cibis assumitur.

Si ex hepate humor transmittatur, is plerumque biliosus esse consuevit: atque adeò bilis vomitu rejicitur, & vomitus ante cibum, quàm eo assumpto, molestior est: tum aliquis affectus, ut dolor, tumor, aliusque in hepate apparet.

Si ex intestinis materia, ad ventriculum feratur, dolor colicus aut iliacus aderit, vel lumbricorum signa sese ostentabunt.

Si denique per uteri sympathiam vomitus concitetur; conceptio aderit, vel mensium suppressio, vel alia ex utero symptomata prodibunt.

Quibusdam etiam signis conicere possumus, utrùm humor in cavitate ventriculi contineatur, vel tunicis ipsius adhæreat. Si enim in cavitate sit; levissimo conatu rejicitur, & inest ventriculo tensio & anxietas ab assumpto alimento, quæ non cessat, donec humores vomitu rejecti sint qui soli plerumque excernuntur, alimentum verò retinetur. Si verò humores tunicis adhæreant, ab ingesto cibo præcipuè vomitus contingit, & alimenta sine humoribus rejiciuntur: citra verò cibum nausea admodum molestat, & quod rejicitur, crassum ac viscidum est, magnoque conatu, extruditur.

Causæ externæ ex ægrorum relatu innotescunt, ut si nimio cibo & potu sese ingurgitaverint, vel ictum aliquem gravem in illa regione acceperint, vel pravum aliquod edulium aut venenosum ingrefferint.

Imminentis denique vomitus signa proponuntur à Galen. lib. 3. de cris. cap. ultimo, qualia sunt, dolor capitis, vertigo tenebricosa, tremor labii inferioris, oris ventriculi morsus, frequens & copiosa salivatio.

Prognosis hujus affectus in hunc modum instruenda est.

Vomitus ex bile flava & pituita mixtus, qui nec valde crassus est, nec admodum copiosus, & qui duos istos humores habet exquisitè permixtos, bonus. Talis enim vomitus in substantia, quantitate, qualitate laudabilis est. Ex omnibus enim humoribus excrementitiis, pituita & flava bilis sunt omnium mitissimi. Si autem quantitate & consistentia mediocri, ac benè invicem permixti per vomitum egerantur, omnes laudabilis vomitus conditiones obtinebit.

Vomitus biliosus aut pituitosus die critico erumpentes, boni. Non solum enim vomitus permixti ex utroque humore boni sunt; sed etiam qui fiunt seorsim ex alterutro humore, si talis humor morbum committat quo æger detinetur. Sic in biliosis febribus criticè erumpens, aut pituita in pituitosis, morbi solutionem afferunt, aut saltem maximam salutis spem pollicentur.

Longo alvi profluvio laboranti spontaneus vomitus superveniens, morbum solvit. Aphor. 15. sect. 9. Fit etiam revulsio materiæ morbificæ in contrariam partem. Et illa revulsio ostendit naturam refici, ac vires resumere. Ut enim Medicus eorum, quæ ad partem aliquam fluunt, retractionem molitur, ita natura, cum prævalere incipit, humoris ad partem affectam confluentis revulsionem facit, dum illa pars refici ac roborari incipit.

Vomitus paucus & laboriosus in acuta febre, malus. Nihil enim eorum, quæ decretoria sunt, exiguè secerni convenit; sed quæ ita vacuantur omnia, duorum alterum significant; aut materiæ copiam, quam natura tolerare nequit, sed ex ea aliquid symptomaticè effundit, vel naturæ imbecillitatem, quæ superflua expellere frustra nititur.

Vomitus variegati ex multis humoribus constantes, mali; significant enim varios humores in corpore latitare, qui eo majus negotium naturæ facessunt, quò difficilior est pluribus inimicis resistere. Si enim adversus varia alimenta pugnare naturæ grave est, quantò difficilior erit, & periculo plenum, tentare varios humores præter naturæ modum existentes concoquere & edomare: præcipuè in morbis acutis, in quibus breve est tempus pugnae,

Laz. Riverii Opera.

quod deberet esse longissimum, ut major spes victoriæ ex parte naturæ haberi posset.

Vomitus porraceus, æruginosus, lividus, niger, foetidus, lethalis. Significat enim hujusmodi vomitus bilem porraceam, æruginosam, aut atram in corpore redundare. At hæ omnes biles species malignos morbos atque lethales solent producere. His verò si foetor adjunctus sit, insignem humorum corruptelam significat, cum qua natura diu consistere nequit.

Vomitus sinceri & impermixti in acutis febribus malignis. Hipp. 1. prorrh. humor enim sincerus non solum crudus est, sed etiam incoctilis: quippè qui tum actum coctionis, tum potentiam excludit. Hippocrates ἀκρῶτον vocat humorem omnem mixtionis expertem, vel omne excrementum fervidum & crudum, quod suo sero dilutum non est. Cujus generatio vel partis alicujus vitio fit, vel fervore ac incendio febrili, exhaustâ aquosâ & ferosâ parte. Ideoque in acuta febre magnum intus incendium latere ostendit, plerumque à natura invincibile. (Melet. III. 27. 28. 29.)

Quod ad curationem spectat, si vomitus ab aliarum partium affectu dependeat, non aliis indiget remediis, quàm iis, quæ morbo, à quo procedit, conveniunt.

Si verò fiat ab humoribus biliosis, pituitosis, aut melancholicis, quantitate aut qualitate suâ ventriculum stimulantibus, humores illi vomitoriis medicamentis excludendi sunt.

Si verò crassi & glutinosi sint, incidendi & abstergendi, quemadmodum in curatione innappetentiæ dictum est.

Vomitus etiam in hoc casu plurimum confert, qui provocandus est emetico mediocri, non imbecillo, quale est oleum tepens; neque etiam vehementi, quod à longinquis partibus trahat, ut quæ ex antimonio parantur. Sed illud tantum maxime convenit; quod valida detergendi ac dissolvendi glutinosum humorem virtute præditum est: talis est gilla Theophrasti, seu vitriolum album præparatum, ac paulò efficacius id præstat sal ex vitriolo ad intensam rubedinem calcinato extractum.

Si vomitoria non arideant, clysteribus frequentibus & catharticis blandis materia peccans detrahenda est, addito rhab. quod purgando astringit, & ventriculum roborat.

Sic in vomitu bilioso pilulæ sequentes præscribi poterunt.

℞. Aloës opt. aqua rosar. lotæ Drach. iij. rhab. pulv. & aqua borrag. irrorati Drach. j. Mastiches, fantali rubri, coralli præparat. an. ʒ. j. Cum syrupo rosar. solut. fiat massa pilular. cujus capiat ʒ. ʒ. vel ʒ. alternis diebus, donec sedatus sit vomitus. Vel

℞. Rhab. pulv. ʒ. j. cortic. myrobol. citrin. ʒ. j. spodii, & rasuræ cornu cervi, an. gr. vj. Fiat pulvis, qui detur bis in septimana, cum paucis julepis.

Vel fiat bolus ex hieræ picræ, aut catholici ʒ. iij. cum ʒ. j. rhab. pulverati.

In vomitu vehementissimo dentur laudani gr. (ij.) iij. cum cochiar. min. ʒ. ij. ʒ. Sedabitur vomitus; & post 5. horas purgatio fiet per inferiora. Satis magna ponitur purgantium quantitas, quia infringitur à laudano, quod ideo miscendum est cum diagridiatis & colocynthiatis. Si resistet medicamentum, clystere acriori evocandum.

Post sufficientem purgationem vomitus cohibendus erit partem roborantibus, ut syrupo cydon. de granatis acidis, conservâ rosar. veteri, vel rad. symphyti, mivâ cydon. vel julepo sequenti, si vehementissimus vomitus sit valde biliosus, ut in cholera morbo.

℞. Succu granat. acidor. ʒ. vj. succu menthæ depurati ʒ. ij. aquæ oxalidis ʒ. j. sacchari albi ʒ. ʒ. ʒ. Fiat julep. in cujus clarificatione leviter bulliant in nodulo, fantali citrini, rosar. rubr. & spodii. ana ʒ. ij. Capiat ʒ. iij. manè & serò.

℞. Terræ sigillatæ, boli armenæ, coralli rubr. margarit. præp. sem. portulac. & acetosæ, an. ʒ. j. rasuræ cornu cervi



cervi, fol. menthæ cichor. an. ʒ. j. rosar. rubr. P. ʒ. Fiat pulvis, aspergendus iusculis & panatellis, aut fumendus ex cochleari, cum pauca aqua ferrata. Ex eo etiam poterunt fieri tabellæ cum saccharo, aqua plantag. dissoluto: vel opiata cum syrupo cydon. addendo conservam rosar. aut symphyti.

Mastiches aliquot grana puriora, manè sumpta, non parum valent ad vomitum compescendum.

Balsami Peruviani gutt. iij. in ovo forbili, aut cum saccharo in formam pilularum redactæ, idem efficacius præstant.

Laudatur etiam decoctum fabarum aut lentium abjectâ priori aquâ, & addito pauco aceto. Succus cydon. crudus miraculosè vomitum sistit, si ejus cochlear j. vel ij. exhibeantur.

Camphora naribus frequenter admota, vel illita, atque etiam sumpta cum pauca aqua rosar. & tantillo pulv. diamoschi, ad idem est efficax.

Spiritus vitrioli cum aqua plantag. vel communi mixtus, & ad moderatam aciditatem exhibitus, vomitum etiam potenter cohibet.

Si verò admotum pertinax fuerit vomitus spiritus vitrioli quantitas augenda est; ut aqua valdè acida reddatur. Cum vino generoso utiliter etiam misceri potest. In spiritus vitrioli penuria acetum fortissimum usurpari potest: cujus cochlear unum vel alterum, purum, & impermixtum exhibendum est.

Salis absinthii scrup. j. cum succi limonum cochleari mixtus, remedium est præstantissimum, præsertim in vomitu, qui à febribus malignis solet contingere.

Si vomitus virès valdè dejiciat, detur laudanum cum miva cydon. vel syrupo de rosas ficcis & illicò applicetur cucurbitula ventriculo, & catap. ex fermento, pulv. absinth. & cortic. grantior. subactis cum succo menthæ.

Exterius verò regioni stomachi admoveantur foci ex spongia nova, in aqua rosacea & aceto rosarum immersa, iique subfrigidi. Vel dicta spongia bulliat in aceto forti, & calidè ventriculo applicetur. Vel componatur focus ex decocto rad. bistortæ, fol. plantag. portul. mentæ, summitatum rubi, & salicis. Deindè inungatur unguento sequenti.

℞. Acaciæ, hypocist. granor. sumach. & myrtill. an. ʒ. i. mastiches & granor. kermes, an. ʒ. j. olei myrtini ʒ. ij. ceræ q. s. Fiat unguentum. Vel sequens cataplasma admoveatur.

℞. Carnis cydonior. in aqua rosar. & aceto decoctor. aut cydoniati fortiter contusi ʒ. iij. pulveris mastiches, granor. kermes, myrtill. & sem. plantag. an. ʒ. ij. Cum succo menthæ, vel cydonior. vel syrupo absinthio, fiat instar cataplasmatidis.

Vel crusta panis in aceto rosar. macerata, & sequenti pulvere conspersa.

℞. Rosar. rub. balauftior. sem. coriandri præp. ana Drach. j. ʒ. mastiches coralli rubri, sem. acetosæ, spodii ana Drach. ʒ. fantali citrini ʒ. j. Misce, fiat pulvis.

Vel emplastrum sequens applicetur.

℞. Massæ empl. de mastiche ʒ. j. pulv. myrtill. & rad. bistortæ, ana Drach. ʒ. cum oleo lentisc. Fiat emplastrum scutiforme.

Si vomitus sit vehementissimus, & febrem symptomaticam inducat, & corpus sit plethoricum, utile est nonnunquam sanguinem detrahère, ad præcautionem inflammationis, quæ in partibus internis ex concussione illa potest contingere. Id tamen cautè agendum, & parca manu, metu dejectionis virium.

Præterea conveniunt cucurbitulæ dorso & umbilico admotæ, frictionis, & ligaturæ partium extremarum.

Fauces & collum obvolvi possunt linteis oxycrato imbutis, ut humores repellantur. Manuum injectio in aquam frigidam omnem vomitum compescit.

Ac tandem reliquis non conferentibus, ad narcotica veniendum erit, quæ omnes evacuationes citissimè cohibent.

In vomitu pituitoso (si vomitoriis prædictis sedari nequeat) exhibendæ sunt pilulæ de hiera, addito rhab. & agarico, aut cathartica huic usui idonea.

Postea ad ventriculum roborantia veniendum est, qualia in curatione inappetentiæ proposita sunt, quibus addi possunt sequentia.

℞. Conservæ rosar. & rad. symphyti, ana Unc. j. confectio. de hyacinth. Drach. iij. pulveris electuar. diambrae, & aromat. rosar. ana Drach. ʒ. trochisc. de spodio, terræ sigillatæ, & granor. Kermes, ana ʒ. j. cum syrupo cydonior. fiat opiata.

Spiritus vitrioli cum aqua absinthii, vel succo menthæ mixtus, vomitum potenter cohibet, & ventriculum roborat.

Vel aquæ imperialis cochl. j. aut duo post vomitum exhibeantur, si magna sit ventriculi frigiditas.

Exterius verò sequentia admoveantur.

℞. Absinthii, menthæ, melissæ, ana M. iij. Coquantur in ʒ. q. vini & aceti, ad tertiæ partis consumptionem. Fiat foci pro stomacho.

Postea admoveatur emplastrum prædictum, vel cataplasma ex cydoniis, substituendo pulverem nucis moschat. & caryophyll. loco myrtill. & plantag. Vel

℞. Absinthii, & menthæ viridis, ana ʒ. j. crustæ panis assatæ, & in aceto rosar. infusæ ʒ. ʒ. pulpæ cydonior. vel cydoniati Unc. ij. mastiches Unc. ʒ. macis, & nucis moschat. ana Drach. ij. Omnia pistentur fortissimè cum oleo cydonior. & fiat emplastrum.

Vel fiat cataplasma ex cydoniis in aceto fortissimo coctis & contusis, addendo parum sem. sinapi, & pulveris caryophyllorum.

Vel admoveatur crusta panis torrefacta, & in vino generoso cum succo menthæ madefacta, & pulv. nucis moschat. caryophyll. thuris, mastiches, & granor. Kermes sinapifata.

Villanovanus plurimum commendat fermentum acre, quod aceto acerrimo & succo menthæ maceratum, applicatur ventriculo, & bis aut ter renovatur. Certissimè enim sedat, post convenientes evacuationes & revulsiones.

In diuturniori vomitu, ubi magna est ventriculi laxitas, ad valdè astringentia veniendum erit, in sequentem modum composita.

℞. Rad. bistortæ, tormentillæ, cort. malorum granator. balauft. & hypocist. ana Drach. ij. fol. menth. & absinthii siccor. ana M. ʒ. granor. sumach. & myrtill. ana Drach. j. rosar. rubr. P. j. cinam. caryophyll. & mastiches ana Drach. ʒ. gallar. viridium, & nucum cupressi, ana Drach. ij. Fiat decoctum in aqua ferrata & vino rubro, in qua dissolvi possunt grana aliquot moschi, quia odorata maximè faciunt ad vomitus compescendos. Cujus decocti capiat æger manè ʒ. ij. & ex eodem foveatur regio ventriculi.

Post focium admoveatur emplastrum vel cataplasma aliquod ex supra propositis.

## CAPUT VIII.

### De Vomitu sanguinis.

**S**anguinis è ventriculo per os exclusio, quæ vomitus sanguinis vulgò nominatur, hoc cum omnibus aliis hæmorrhagiis commune habet, quod per anastomosin, rixin, diabrosin, aut diapedesin, sanguis è venis egrediat, qui quidem venarum affectus in hæmoptysis theoria pathologicè expositi fuerunt.

Causæ etiam sanguinis vomitum efficientes, cum hæmoptysis causis coincidunt.

Ac primum causa conjuncta, istas sanguinis effusiones producat, est illius quantitas, vel qualitas excelsa.

Sanguis quantitate peccans venas rumpere, aut orificia illarum aperire potest; sicque rixin, aut anastomosin efficere, quod in plethoricis corporibus, & atletico habitu præditis contingit.

Idem verò qualitate peccans, si nimirum calidior tenuiorque sit, per anastomosin effluere potest; quia calor orificia dilatat, & tenuitas efficit, ut facilius effluere possit.

Eadem



Eadem qualitates diapedesin etiam pariunt; calor enim rarefacit tunicas vasorum, tenuitas verò sanguinis efficit, ut per poros earum tunicarum facilius transfluere possit.

Sanguinis denique acrimonia venarum tunicas erodit & exulcerat, ac diabrosin producit.

Causæ antecedentes eadem sunt, quas conjunctas appellavimus, loco tantum differentes. Quando enim sanguis quantitate, vel qualitate peccans, venas immediate aperit, causa conjuncta nominatur; idem verò sanguis, in venis contentus, causæ antecedentis rationem habet.

Ad causas etiam antecedentes referuntur partes mandantes, quarum præcipuæ sunt caput, hepar, lien, & uterus.

Plerumque fertur sanguis à capite ad ventriculum, per palatum, & œsophagum: sæpè etiam catarrhus ferinus, ex pituita acri & salsa genitus, ventriculum erodit, venasque illius aperit.

Ab hepate & liene, per venas, quæ ad ventriculum feruntur, & cum illis partibus communicant.

Ab utero denique sanguis refluens in suppressione mensium, ventriculi venas aperit; ita ut quædam mulieres repetæ fuerint, quæ purgationes menstruas per vomitum sanguinis periodicum passæ fuerint.

Frequentiùs contingit sanguinis vomitus ab hepate & liene, quàm ab aliis partibus: & a liene etiam sæpiùs, quàm ab ipso hepate: majorem enim consensum habet lien cum ventriculo, quàm hepar. Patet siquidem ex Anatome, maximum ramum venæ portæ in lienem demitti, à quo venæ multæ ad ventriculum feruntur, tum ad partem superiorem, tum ad interiorem seu fundum ventriculi, & quidem insigniores; ita ut interdum flatibus & sanguine distentæ, mediis digiti crassitiem æquent, quod ex dissectione cadaverum innouit. Præterea vas breve patentissimum, ut excrementum melancholicum in statu naturali continuo in ventriculum eructat, sic in præternaturali sanguinem magnâ copiâ in illius capacitatem effundere potest. Advertendum autem hîc est, non solum per vomitum; sed etiam per alvum in hoc affectu sanguinem excludi: tum quia portio illius, qui ad ventriculum confluxit, ad inferiora deturbatur: tum etiam, quia venæ mesaraicæ aperiuntur, & intestina sanguinem profundunt; qui quidem sanguis in longo intestinorum anfractu denigratur, & picis liquidæ instar rejicitur.

Causæ externæ sunt omnia, quæ vulnerare aut contundere possunt: tum etiam ætus vehementior ob ebullitionem, quæ in sanguine commouetur, unde juvenes ad 35. annum sanguinis vomitui aliisque hæmorrhagiæ speciebus maxime sunt obnoxii. Frigus etiam immodicum, constringendo, venarum ruptionem moliri potest: id ipsum quoque efficiunt motus intempestivi & labores, ac exercitationes infuætæ, clamores, & vociferationes magnæ, quæ sanguinem in venis vehementer commouent.

Ac denique omnes causæ, quæ hæmoptoën excitare possunt, proprio capite recensitæ. Sanguis enim in venis & arteriis à quacunque causâ, siue internâ, siue externâ vehementer commotus, ad eam partem faciliùs irrumpit, quæ debilior, & illius receptioni magis disposita est. Atque ita, si ventriculus, aut venæ, quæ ad ipsum feruntur, talem dispositionem habeant, vomitus sanguinis excitabitur potius, quàm alia quævis hæmorrhagiæ species.

Diagnosis hujus affectus in eo potissimum versatur, ut pars, à qua sanguis profluit, nobis innotescat.

Si ex ipso ventriculo sanguis effundatur: situs partis, & in ea doloris aut gravitatis sensus ferè continuus illud demonstrabunt. Deindè minor est illius copia; graciles enim sunt stomachi venæ cum nausea sanguis effertur, ac in deglutendo mordacitas percipitur. Tum sanguis aliquando cum cibo, aliquando cum bile, vel pituita mixtus ejicitur.

Si à capite sanguis profluat, quædam circa fauces & palatum titillatio percipitur, pars sanguinis aliquando per nares emungitur, mucro permixta, capitis dolor, aut gravitas; recessit quæ post talem hæmorrhagiam sedatur.

Ex liene & jecore sanguis copiosior effunditur, & plerumque tumor aut dolor in illa parte apparet. Ex liene crassus, globosus, ac niger; ex jecore rubicundior, & quo-

dammodò spumofus. Præterea sanguis, quia ab hepate fluit, magis per partem inferiorem elabitur, quàm per vomitum: quia ab hepate per venas mesaraicas plerumque fluit ad intestina, & ab his, ut vomitus efficiat, ascendere debet in ventriculum. Faciliùs verò descendit in alvum, cum via sit proclivior. Contrà qui à liene fluit, per vomitum potius, quàm per intestina purgatur, quia venæ à liene ad ventriculum sunt breviores, & minùs amplæ.

Si denique vomitus sanguinis fiat à suppressione mensium, ipsa suppressio ab ægotantis relatu innotescet, & sanguinis excretio periodica erit, quæ augebit conjecturam, si nullus aliarum partium affectus conspiciatur.

Quod ad prognosin spectat, vomitus sanguinis à quacunque causa oriatur non expers periculi. Vel enim ex nimia sanguinis effusione mortis subitanæ periculum imminet, vel si in ventriculo grunescat, corrumpatur, & putrescat, lipothymias, syncopen & suffocationes parit.

Minus tamen periculosus est vomitus sanguinis ex suppressione mensium oriundus, quàm si ex hepate, vel liene procedat. Provocatis enim quomodocunque mensibus, curari solet, ut docuit Hippocr. *Aph. 34. sect. 5.* his verbis: *Mulieri sanguinem evoment, menstruis erumpentibus solutio fit.* Et in his sæpè solâ venarum inferiorum apertione menstrua provocantur, aut saltem paucis aliis remediis melanagogis adhibitis, & sic vomitus sanguinis cohibetur.

Qui ex vomitu sanguinis in hydropem ascitem prolabantur, ex eodem pereunt. Testatur Dodonæus, se neminem à tali hydropse servatum vidisse. Et docet experientia ex quacunque sanguinis profusione hydropem excitatum, esse lethaliissimum: quia ex summa caloris nativi dissipatione exoritur, quæ irreparabilis est.

Ad hujus affectus curationem opus est remediis, sanguinem à ventriculo revellentibus, ejusdem intemperiem corrigentibus, & apertionem venarum constringentibus ac glutinantibus. Quibus jungenda erunt, quæ partem primariè affectam respiciunt, à qua sanguis in ventriculum transmittitur.

Ac primum quia victus ratio in hoc affectu maximum momentum habet, illius præcipua capita hîc subnectenda.

Alimenta igitur ordinaria debent esse astringentia & emplastica, tum etiam refrigerantia, actu & potestate talia, ut hordeata, amygdalata, oryzata, panatellæ, gelatinæ, & in primis amylini sine calce paratum, cum lacte coctum, quod ad hæmoptysin compescendam eximium est; his omnibus semper aliquid succi mali punici, vel aceti rosacei addi poterit, (*at acida omnia lac coagulant. ideo cum lacte mutuenda sunt*) his accedere poterunt, ova indurata aceto intincta, mica panis aquâ frigidâ macerata, juscula pullorum cum oxalyde, perulacâ, plantagine, & granis uvæ immaturæ parata; pedes & intestina vervecum, hædorum & vitulorum, ad putriliginem usque decocta. In principio mensæ sumatur aliquid astringens, ut malum cydonium, porum, aut pyrum austerrum sub cineribus coctum, miva cydoniorum, aut gelatina ex cerasis acidis, mespillis, aut sorbis confecta.

Abstineat ager ab omnibus cibis acrioribus, salsis, piperatis, & frixis: tum etiam euchymis quæ multum sanguinis generant, nisi aliquando vires collabi videantur, ad quarum refectionem illa aliquando, sed parca manu erunt exhibenda. Parca admodum a gri nutriendi sunt, quominus enim sanguinis generabitur, eò minor erit fluxio, & partes inanitæ, sanguinem magis attrahendo, illius effluxum prohibebunt.

Potus erit perexiguus, ex aquâ ferratâ, cum paucis succo granatorum. Vinum interdendum est, nisi sit crassum & austerrum: quod nostivum appellamus, & tunc etiam febris carentia esse debet.

Aër sit frigidiusculus, extra ventorum flatus, Solis, & Lunæ radios. Somnus sit modicus, & non diurnus. Quamvis enim in somno omnes fluxiones cohiberi dicantur, hæc tamen ex diuturniori caloris concentratione renovari potest. Alvus sit semper libera, & omnia animi pathemata vitentur.



Diatâ in hunc modum institutâ , ad chirurgica & pharmaceutica remedia progrediendum est.

Ac primum venæ sectio statim celebranda est parâ manu , & repetitis vicibus , ut major fiat revulsio. Idque ex basilica cubiti dextri , si à jecore ; vel sinistri , si à lienæ malum exoriri videatur ; vel ex vena malleoli , si ex mensium suppressione profluxerit.

Fiant frictions & ligaturæ partium extremarum. Clysteres detergentes injiciantur.

Applicentur cucurbitulæ naribus , cruribus , & lumbis ; inò & hypochondriis , ut sanguis retineatur.

Camphoræ scrup. sem. exhibeatur cum oxycrati , vel aquæ plantag. ʒ. iiij. Quod remedium Rondeletius in consilio quodam , tanquam præstantissimum commendat.

Oxycrati cyathus exhibeatur , si sanguinis concreti suspicio fuerit : eo enim faciliè dissolvitur sanguis , & à ventriculi venis propellitur , eademque constringuntur.

Eodem oxycrato ventriculi regio foveatur subfrigide.

Absente vomitu , ut venæ constringantur , sequentia usurpanda.

ʒ. Album ovi n. j. aquæ rosar. & aceti , ana ʒ. j. β. Agitentur fortiter , deinde adde amyli ʒ. ij. Misce , utatur æger ex cochleari. Vel

ʒ. Corall. præpar. terræ sigillat. boli armenæ , lapidis hæmat. & trochisc. de carabe , ana ʒ. j. aquæ plantag. & syrapi myrtini , ana ʒ. ij. Misce , utatur ut suprâ. Vel prædicto pulvere utatur cum jussulis. Vel

ʒ. Succu plantag. ʒ. iiij. Exhibeatur actu frigidus , manè & serò. Testatur Galen. hec succo nihil esse præstantius , ad quodlibet sanguinis profluvium cohibendum.

Succus portulacæ & polygoni , cum saccharo sumptus , ad idem est efficax.

ʒ. Aquæ plantag. & portulac. ana ʒ. j. β. syrapi myrtini ʒ. β. syrapi de papavere ʒ. ij. vel iij. salis prunellæ ʒ. j. Misce , fiat julep. frequenter iterandus. Vel ex decocto prædictar. herbar. idem julepus utiliter componi poterit.

ʒ. Conservæ rosar. antiquæ , & rad. symphyti , ana ʒ. j. cydoniati ʒ. sem. mirobal. condit. n. j. trochisc. de carabe , & de terra lemnia , ana Drach. ij. corall. præpar. & croci Martis ana ʒ. j. Cum syrupo de ros. siccis fiat opiata , quâ utatur frequenter. Trochisci de carabe non solum astringunt , sed etiam sanguinem concretum dissolvunt , ideò frequenter usurpandi.

Syrupus corallor. utiliter etiam usurpari poterit , multò utiliùs eorum tinctura , cum succo limonum recenter parata.

Ubi magno impetu sanguis excernitur , nec prædictis remediis illius vomitus sedatur , ut mortis periculum immineat , ad narcotica veniendum est , vel assumendo ea , vel per clysterem injiciendo.

Exteriùs verò inungatur regio ventriculi ol. rosar. & myrtino , lotis in aceto : & post unctionem aspergatur pulvis coralli , boli armenæ , terræ sigillatæ. Vel inungatur unguento sequenti.

ʒ. Succu plantag. & centinod. ana ʒ. j. sem. aceti rosar. ʒ. j. olei omphac. ʒ. vj. Bulliant ad succor. consumptionem. Deinde adde sang. drac. mastiches , cortic. granat. & myrtill. ana ʒ. ij. camphoræ ʒ. j. ceræ rubræ q. l. Fiat unguentum.

Pro potu utatur aqua ferrata , cum syrupo cydonior. & spir. vit. Jussula etiam cum aqua ferrata decoquantur.

Foveantur hypochondria & lumbi subfrigide decocto plantag. & portulac. facto in oxycrato.

Manus demittantur in aquam frigidam , sic enim omnis vomitus sedatur.

Postea unguentum refrigerans Galeni in aceto lotum dictis partibus illinatur.

Celebrata sufficienter phlebotomiâ ad causæ sublationem , & integram morbi solutionem , purgatio blanda & frequens instituenda est , qua sanguis à serosis & biliosis humoribus , hunc affectum producentibus , repurgetur. Cujusmodi purgationes à Medico prudenti celebratæ miranda præstant , ut nos experientia didicimus. Debet autem fieri ex rhabarb. myrobalanis , tamarindis , & tryphera

perficâ : quæ medicamenta purgando astringunt , & humores nullo modo exagitant , ut inde non metuenda sit vomitus sanguinis concitatio. Illa autem exhiberi poterunt vel in forma boli , cum syrupo myrtino , aut de rosis siccis : vel potionis , cum decocto cichorii , acetosæ , portulac. & similibus.

Dum purgatio celebratur (quæ per tres aut quatuor dies potest continuari , parâ purgantium dosi : ) si vespertinis horis exhiberi poterit opiata prædicta , aut syrupus corall. aut aliud ex prædictis medicamentis astringentibus & roborantibus.

Denique ad præcautionem , rhab. pulv. ʒ. j. semel in septimana per longum tempus exhiberi poterit ; vel syrupus magistralis , ad hæmoptyses præcautionem descriptus. Tum reliqua ferè remedia , quæ ad illius affectus curationem & præcautionem proposita sunt , in hoc etiam casu convenire poterunt.

## C A P U T IX.

### De Cholera morbo.

**C**holera morbus est , violentissima humorum biliosorum , acrium , aut corruptorum , per vomitum & alvum excretio.

Cholera dicitur ἀπὸ τῆς χολῆς , à bile flava , ut docet Gal. ex sententia Gnidorum medicorum , 1. meth. c. 2. cum ex bile flava & humore pravo , bilem æmulante , & suprâ & infra erumpente , hoc malum oriatur. Attamen Alexander Trallianus lib. 7. cap. 14. non vult , hoc nomen ab humore bilioso esse deductum , quia non semper bilis evomitur , sed etiam sæpe serosus & pituitosus humor : sed potius ἀπὸ τῶν χολαίων , id est , ab intestinis , quæ ab antiquis χολαίdes nominata sunt ; quoniam ab intestinis & interaneis humores isti eruantur. Prior tamen etymologia magis probanda est , quia non solum à Galeno , sed etiam ab Hipp. 7. epid. textu 19. Celso lib. 4. c. 11. & Aureliano lib. 3. acutor. cap. 9. recipitur. Et quamvis biliosus humor non semper rejiciatur ; est tamen acer , mordax & corruptus , ad bilis naturam accedens.

Partem affectam alii statuunt ventriculum , alii intestina , alii ventriculum & intestina simul. Verùm Galeni sententiæ inhaerendum est , afferentis de sympt. causis c. 2. partem primariò affectam esse ventriculum , cujus facultas expultrix vehementer irritatur , ut per utrumque orificium humorem noxium expellat. Secundariò verò gulam , & intestina affici dubium non est.

Est igitur hic affectus symptoma facultatis expultricis læsæ , & vehementer irritatæ. Non potest autem dependere à retentrice debilitata , quia in ea humores paulatim effluunt , ut in-lienteria & coeliaca passione. Fateri tamen oportet , vehementiorem fieri affectum , si retentrix debilis expultrici non resistat. Concurrit etiam ad hoc opus concoctio læsa , ob quam pravi humores in ventriculo generantur , & expultricem irritant ; sed hæc causâ tantum antecedentis rationem habet. Hippocr. 4. de victus ratione in acutis , textus 204. duas proponit cholæræ species : unam humidam , alteram verò siccam. Humida est illa , quæ hæctenus descripta est , quæve solâ propositâ definitione describitur , tanquam frequentior & magis usitata. Sicca verò longè infrequentior est , fitque à spiritu flatuoso à ventriculo & intestinis exeunte , partesque , per quas transit , mordicante. Generantur isti status ; vel à ventriculi calore igneo , cibos corrumpente , & in nidorem convertente ; vel à cibis flatuosis & nidorosis , ut sunt cepæ , raphani , & similia. Sennertus aliam causam addit ab Hermeti-corum doctrina mutuata : nempe humores falsos & adustos , circa hypochondria cumulosos , & alterius humoris permixtione effervescentes. Quantam enim (inquit) spirituum copiam sales (& spiritus salini cum spiritibus acris permixti suppeditent , ex olei vitrioli , & aquarum fortium cum sale tartari mixtione apparet. Tale ergo quidpiam etiam in corpore humano accidere , & ex humoris falsi atque adusti cum aliis spiritibus commixtione magnam



magnam spiritus flatuosi copiam excitari posse, incredibile non est.

Causa proxima hujus affectus est humor biliosus, exustus, acidus, vel putrescens in ventriculo, intestinis, hepate, liene, mesenterio, vel pancreate collectus: vel alimentum pravâ substantia præditum, medicamentum vehemens & deleterium aut venenum assumptum, Hipp. 7. *Epid. ext. 90.* causas ferè omnes, à quibus pravi isti humores generantur, diligenter enumerat, his verbis: *Cholericae sursum & deorsum eruptiones è nimio esu carnis, potissimum suillæ crudioris: item ex cibis insuetis, & ebrietate vini veteris & dulcioris, & ex granis pini, locustis, nucibus rancidis, atque ex esu alliorum, porri, & caparum, maximè à lactucis coctis, brassica, & similibus crudioribus, à placentis etiam & dulciariis, & mellis, fructibus horariis, potissimum cucumere & pepone. Fiunt autem magis estate quia tunc facilius recensita corrumpuntur, vel inconfecta manent.*

Animadversione dignum est, unde tanta humorum copia derivetur, quæ per vomitum & alvum in cholera rejicitur. Vulgò respondetur, illos humores in mesenterio & locis ei vicinis contineri: nonnunquam etiam è toto corpore confluere. Quod cum veritati consentaneum sit, dicere tamen possumus, humores corruptos, in ventriculo aut partibus vicinis contentos, malignâ qualitate alios quoque humores corrumpere, eosque à naturâ irritatâ ad ventriculum & intestina protrudi: quemadmodum venenata medicamenta, ut antimonium, colocynthis, elaterium & similia, bonos humores corrumpendo, hypercatharsin efficiunt.

Signa hujus affectus diagnostica sunt humoris biliosi, acidi, vel aliis modis corrupti, per vomitum, & secessum, frequens & copiosa excretio: ventriculi & intestinorum morsus, inflatio & dolores, sitis cum æstu & anxietate: nausea vehemens, quæ frigida nonnihil sedatur; sed calefacta statim rejicitur: pulsus non rarò parvus & inæqualis: sudor interdum diaphoreticus, crurum & brachiorum convulsio, syncope, extremorum frigiditas, aliaque gravissima symptomata.

Causæ etiam hunc affectum producentes facile inter nosci poterunt. Ac primum externæ, ex ægrorum & adstantium relatu innotescunt. Si nimirum æger alimenta nimia copiâ, vel prava qualitate infecta ingesserit: si venenum aliquod, aut vehemens medicamentum hauserit. Internæ verò ex humorum, qui rejiciuntur, qualitate, eorundemque intus genitorum copia dignoscuntur. Primum esse affectum ex ventriculi vitio oriundum conjicimus, si reliquæ partes benè constitutæ sint, nulloque affectu laborent. Præterea adsunt nausea, perpetua angustia, morsus, & dolor ventriculi: materia rejicitur viridis & æruginosa. Si verò in venis sit genita, febris ut plurimum maligna adest.

Prognosis hujus affectus ita instituenda est, ut nimirum morbus dicatur acutissimus, subitam plerumque mortem inferre solitus. Si tamen ex assumptorum vitio oriatur, minus periculi est: quia iis exclusis plerumque solvitur.

Quo graviora sunt in cholera symptomata, ut syncope, convulsio, & extremorum frigiditas; eo breviores historiam, & mortem propinquiorem expectare oportet.

Hippocrates in *Concis*, cholas quasdam criticas esse docuit, quæ lypyriis febribus adveniunt, & alio modo ex illius sententiâ solvi non possunt, nisi ingenti bilis eruptione, sursum & deorsum facta: quæ tamen crises rarissimè contingunt, & valdè suspectæ esse debent, utpote bonæ crisis & salutaris conditione non habentes.

Si vomitus mitigari & sedari incipiat, si faciei color cadaverosus, & habitus Hipp. in meliorem restituatur, salutis spes affulget.

In hujus morbi curatione primum, affectu incipiente, evacuatio aliquantulum permittenda est, dum pravi & corrupti humores exierint. Tum etiam interdum eorum exclusio molienda, vomitione concitata haustu aquæ tepidæ, cum syrupo acetoso mixtæ, aut juscule pulli magna copiâ sumpto. Quod si non vomitum, humorum acrimoniam saltem contemperat. Vel dictorum humorum exclusio perficiatur rhab. exhibito cum syrupo de absinthio, in

formam pilular. redacto, necnon clysteribus nonnullis detergendi vi præditis.

Præterea clysteres pingues & lenientes identidem injiciendi, ex lacte, ol. rosato, butyro insulso, loto cum aqua rosar. vel ex decocto pupilli, carnis vitulinæ, vitellis ovor. quibus interdum, urgente affectu, narcotica permiscenda.

Clysteres etiam ex oxycrato plurimum conferunt; vel ex decocto lactucæ portulacæ, plantaginis, addito aceto, syrupo de nymphæa, & vitellis ovorum.

Internis etiam humorum acrimonia demulcenda, ut decocto portulac. & plant. cum syrupo cydonior. & de rosis siccis, & sale prunellæ, si ardor & sitis urgeant.

Ac denique vomitus cohibendus medicamentis, tam internis, quam externis, quæ pro vomitu bilioso fuerint descripta.

Inter quæ narcotica principem locum obtinent ac præcipuè theriaca recens quæ ad Drach. ij. exhibita vehementes illas evacuationes velut in momento cohibet. Idem præstat laudanum opiatum, ad gr. iv. exhibitum (*nimia dosis medicamenti, summa circumspectione proponendi, nisi Riverius habuerit aliquam præparationem mitiorem, veluti laudanum tutissimum Pharmac. Lugd. quod ad grana iiij. aut v. exhibetur. Idque notandum passim in hac praxi. Laudanum enim verum ad gr. j. aut ij. datur.*)

Si magna sit virium exsolutio (ut sæpius contingit) integra laudani dosis tuta non est: sed melius est gr. j. vel ij. tantum exhibere, & semel in die repetere, atque etiam bis, si res admodum urgeat. Sic enim impetus humorum cohibetur, & naturæ dantur induciæ, ut eos concoquere ac edomare valeat.

Cohibito vomitu & alvi fluxu, remediis supra propositis, & viribus aliquantulum instauratis cardiacis remediis, ægri à periculo liberati videntur: quod non solum astantes, sed etiam medicos interdum fallit: symptomata enim post unum aut alterum quietis, & intermissionis diem, fortiora ac vehementiora resurgunt, & ægrum à priori insultu valdè debilitatum, de medio tollunt (*maximè ex opiatis.*) Cui ingenti periculo occurrendum est, non solum vires instaurantibus, & humoris fervorem demulcentibus supra propositis, quæ etiam sedatò insultu continuari debent; sed præcipuè venæ sectione, quæ sanguinem illum torridum & æstuantem revellit, & maximè contemperat: eaque semel, bis, terve erit iteranda, si vires à prima evacuatione nullo modo debilitatæ, sed potius recreatæ appareant. Quidam prædici in ipso insultu, etiam valdè prostratis viribus, venam secare audent, quas dicunt esse oppressas non exsolutas. Attamen sine periculo tunc temporis sanguis mitti non potest. Et interdum agrotantes paulò post illam evacuationem è medio sublati sunt, non sine remedii opprobrio. Ac licet virium oppressio quædam agnoscenda sit ab humore superfluo, & naturæ infesto, in venis contento; maxima tamen earum exsolutio negari non potest, ab horrendis evacuationibus per vomitum & secessum subsecuta. Satiùs ergo est humorum impetum primum cohibere, mox pacatis symptomatibus, ad venæ sectionem confugere.

Quia verò in hoc affectu vires ex maximis evacuationibus citissimè concidunt, earum restaurationi diligenter incumbendum ex iis auxiliis, quæ in virium imbecillitatis curatione proposita sunt.

## C A P U T X.

### De dolore Ventriculi.

**D**olor ventriculi est tristis ejusdem partis sensatio, à rebus mordentibus aut distendentibus, sicque continuitatem illius solventibus excitata.

In ventriculo autem tres partes, plurimum inter se discrepantes, considerandæ sunt, orificium nempe illius superius; orificium inferius, pilorus nominatus, & reliquum corpus, totam cavitatem constituens.

Orificium ventriculi superius exquisitissimo sensu donatum est, propter nervum insignem, quem è sexta conjugatione



gatione mutuatur, & ideò dolores in eo fiunt acutissimi, quia viscus nobilissimum, sibi que vicinum, cor nimirum, in consensum trahunt; unde cardialgia & cardiogmos nominatur. Tantus enim est ille cordis cum orificio ventriculi superi consensus, ut veteres illud orificium *καρδία* nominaverint.

Si verò membranæ, ventriculi cavitatem constituentes, aut pylorus, dolore afficiantur; dolor ventriculi simpliciter nominatur, & interdum colica ventriculi, præcipuè quando à flatibus excitatur.

Proxima hujus doloris causa est solutio continui, à rebus mordentibus vel distendentibus excitata. Illæ autem res mordentes vel distendentes, præcipuè & frequentiores sunt humores, vel flatus. Quibus addi possunt lumbrici tunicas ventriculi vellicantes.

Humores acres, vel maligni, ut bilis porracea, æruginea, vel atra, pituita falsa, corrupti ichores, pus foetidum, ex dirupta hepatis aut thoracis vomica in ventriculum effusum, & quicumque alii humores acrimonia præditi, dolores in ventriculo excitare possunt.

Vapores etiam acres, ex iisdem humoribus elevati, hunc dolorem efficere consueverunt.

Flatus verò in cavitate ventriculi contenti, inflationem & tensionem dolorificam efficiunt: sed multò magis intra tunicas illius coerciti, quia affectum contumaciorem efficiunt, cum difficiliùs inde excuti valeant.

Morbi etiam, tum ipsius ventriculi, tum partium vicinarum, hunc dolorem parere consueverunt, ut intemperies quælibet excedens, tum calida, tum frigida, & multò magis inflammatio: interdum verò scirrhus, aut alius tumor durus gravantem dolorem efficiens. Ac denique vulnera & ulcera ejusdem partis, vicinarum etiam partum tumores & inflationes, ventriculum comprimendo, dolorem ipsi inferre possunt.

Humores autem & flatus, ventriculi dolorem excitantes, vel in ipso ventriculo generantur, vel à toto corpore, vel à quibusdam partibus in eum confluunt. A toto corpore in febribus, vel dum corpus pravis humoribus refertum est. Ab aliis partibus verò, scilicet præcipuè ab hepate, liene, & cerebro: ab hepate bilis, à liene melancholia, vel atra bilis: à capite pituita falsa.

Ab aliis etiam causis extraordinariis & infrequentioribus talis dolor excitari potest, ut de lapidibus in ventriculo genitis, enarrat Schenckius *lib. 3. observationum*. Et de corio lardi, fumo exsiccati, refert Fabricius Hildanus *observat. 13. lib. 4.* cujus frustum deglutitum matrona quædam in ventriculo servaverat per duos annos, continuè exercitata doloribus, idque tandem, assumpto vomitorio medicamento, vomitu rejecit, & liberata est.

Causæ externæ hunc effectum producentes, sunt alimenta vel prava qualitate infecta, aut summa acrimonia prædita, quæ per se talem dolorem inferre possunt, vel flatibus generantibus idonea, vel nimia quantitate assumpta; ita ut putrescant & acrimoniam induant: vel calidiora plus justo, ut ex iis copia bilis producat. Sic etiam medicamenta fortiora vel aciora, vel deleteria facultate prædita, vel nimia quantitate assumpta, vel non satis correctæ item venena exhibita hunc dolorem faciliè inferre possunt.

Signa diagnostica ad partem affectam & causam dirigenda sunt. Ac primùm situs doloris orificium ventriculi superius affici ostendit, quando scilicet sub cartilagine xiphoidæ percipitur. Sed multò certius hanc partem affici, & veram esse cardialgiam significant, dolor acerbissimus ab exquisito partis sensu promanans, anxietates & jactationes, ut æger in uno situ consistere non possit; quibus etiam sæpe accedunt lipothymia & animi defectiones, propter cordis consensum, cujus summa est cum ventriculo sympathia, non solum propter viciniam, sed etiam propter magnam spirituum dissipationem, quæ per istos cruciatus contingit. Interdum etiam cerebrum trahitur in sympathiam, ob insignem nervum, qui huic parti implantatur, & vapores acres, qui inde rectâ viâ ad caput elevantur, unde cephalalgia, & hemicrania, & aliquando vertigines, & epilepsia oriuntur.

In aliis verò ventriculi partibus dolores fiunt quidem acerbis, sed tam gravibus symptomatis comitati non sunt, atque adeò dolores colicos æmulantur, situ tantum doloris differentes.

Causæ istos dolores efficientes propriis signis distinguuntur, quorum magis perspicua ab excretis desumuntur. Si enim bilis, vel pituita, vel flatus, vel lumbrici per os aut alvum excernantur; facile est conjicere ab hujusmodi causis affectum dependere. Attamen etiam si nulla materiæ morbificæ excretio fiat, signis peculiaribus bilis, aut pituitæ, aut flatuum redundantiam internoscere possumus; tum etiam signa lumbricorum intus latitantium ex proprio capite erunt desumenda. Quemadmodum etiam morbi peculiare, tum ventriculi ipsius, tum partium vicinarum, hunc affectum producentes, ex propriis cujusque signis innotescunt. Colligitur etiam diagnosi humoris dolorem committentis, ex tempore invasionis incrementi, aut cessationis doloris. Quibusdam enim ante cibum dolor acerbatur, & hoc bilis dominium significat, quæ jejunii tempore exagitur, & in ventriculum attrahitur, aut magis intenditur & acrior evadit. Aliis statim ab assumpto cibo dolor commovetur, quia humores crudi & mordaces, qui antea quieti erant, & ventriculi tunicis infixi, ab assumpto cibo commoventur, vel qui in fundo ventriculi hærebant, sursum attolluntur, & orificium ventriculi afficiunt. Aliis dum cibus concoquitur, dolor exacerbatur, quia vapores acres & mordaces elevantur ex materia morbifica, à calore aucto in ventriculo tempore concoctionis. Aliis quatuor aut quinque horis à pastu, quia ex concoctione depravata cibi corrumpuntur, & corrupti ventriculum vellicant. Quibusdam denique post somnum dolor exacerbatur, & ille fit à catarrho, fluente humore à cerebro per somnum, qui majori copia cumulatus, dolorem in vigilia producit. Sedatur verò interdum dolor à cibo, quia ciborum benignitate humoris acrimonia demulcetur.

Quod ad prognosin spectat, Certum est, cardialgiam reliquis ventriculi doloribus esse longè periculosiorem, propter exquisitum oris ventriculi sensum, & maximum illius cum partibus principibus consensum.

Major vel minor causæ morbificæ pravitas, & symptomatum vehementia majus vel minus periculum portendunt.

Febris continua & acuta, cum insigni ventriculi dolore conjuncta, magnum minatur periculum, quod docuit Hippocrates *Aphor. 65. sect. 5. In febribus circa ventriculum vehemens astus & cardiogmos, malum*. Magnam enim ventriculi inflammationem vel humorum vitiosorum copiam in ventriculo contentam significat.

Ventriculi dolor, à lumbricis vel flatu oriundus, ut plurimum minus periculosus est, quia causam minus rebellem, & parti minimè affixam habet. Aliquando tamen ex lumbricis in ventriculo contentis, eumque mordentibus, gravissima symptomata oriuntur, ex quibus ægri derepente intereunt. Sic etiam ubi intemperies flatus generans rebellis facta est hæc veluti habitualis, non caret periculo, quia in hydropem siccum degenerat ex Hippocrat. *Aphor. 1. sect. 4. In Cardialgia extremorum frigiditas mortem proximam prænuntiat*.

Curatio hujus affectus pro causarum varietate maximè varianda est. Si enim ab aliarum partium affectibus oriatur, illorum affectuum therapia adhibenda est. Si verò in ipso ventriculo causa stabiliatur, dolor vel à flatu, vel humoribus acerbis & biliosis, vel ab inflammatione, aut ulcere procedit.

Qui à flatu generatur, curandus est remediis discutientibus & evacuantibus flatulentam illam materiam, tum etiam pituitam, à qua flatus concitantur.

Ac primùm injiciendus est clyster emolliens & laxans, cui statim succedat alter carminans & discutiens, ex decocto fol. origani, calamenthi, pulegii, rutæ, centaurii majoris, sem. anis. fœnic. dauci, cumini, & similium. In quibus dissolvantur benedicta laxativa, ol. anethinum, rutaecum, mel anthosatum.

Si dolor perseverat, ex oleo rutac. aut nucum. & vini generosi, aut hippocratici partibus æqualibus clyster erit componendus, addendo aquæ vitæ ʒ. ij.



Vel paretur clyster ex vino albo. cum olei juniperi, aut cinam. aut caryophyll. chymicè extracti gutt. viii. qui miraculi instar liberat.

Postea admoveatur fons sequens regioni stomachi.

℞. Rad. cyperi, galangæ, calami aromat. ana ꝑ. i. fol. menthæ, origani, pulegii, majoranæ, hyssopi, salviæ, an. M. i. sem. anisi, fœniculi, carvi, dauci & baccar. lauri, ana ꝑ. j. sem. flor. chamomil. meliloti, anthos, & lavendulæ, ana ꝑ. i. Contundantur contundenda, & incidenda incidantur, includanturque duobus sacculis, bulliant in vino generoso: dein expressi, ventriculo, & toti ventri alternatim admoveantur.

At in materia minis frigida potest parari fons sequens, maximè laudatus à Foresto, ut qui reliquis remediis non conferentibus, ægrum à dolore citissimè liberavit.

℞. Rad. althææ ꝑ. sem. rosar. rubr. flor. chamom. summit. absinthii, ana M. i. Coquantur in aqua communi, ad ℥. i. sem. in fine addendo vini Rhemensis opt. aquæ rosac. & aceti, ana parum. Fiat fons.

Post forum fiat illitus ex ol. rutaceo & anethino mixtis cum aqua vitæ, quibus aliquid addatur ol. salviæ, aut caryophyll. chymicè extracti.

Post inunctionem admoveatur emplastrum de baccis lauri: vel ejus loco cataplasma ex melle, & semine cumini.

Interim dum hæc fiunt, si nausea adsit, excitabitur vomitus blandiori vomitorio: aut catharticum exhibebitur pituitam evacuant.

Purgato corpore, exhibeatur ol. amygdal. amar. recenter express. & cum vino albo mixtum aut vinum Hipp. aqua clareta, vel aqua cinam.

Julepus sequens ad dolorem sedandum, flatus discutiendos, pituitam detergendam, & ventriculum roborandum efficacissimus est.

℞. Fol. absinthii vulg. centaurii minor. & agrimon. ana M. sem. Coquantur ad ꝑ. v. In colat. dissolve sacchari albi Unc. i. Capiat. manè per biduum.

Amatus Lusitanus valde commendat aquam à floribus chamæ. distillatam, tanquam præcipuum, leniendis ventriculi & intestinorum doloribus auxilium; cujus Unc. iiii. calidè exhibeantur. Vel in aquæ illius penuria, decoctum flor. chamæ. usurpari poterit, maximè laudatum à Foresto: Qui se mercatorem quendam, ingenti stomachi dolore affectum cum insigni clamore hoc solo decocto semel exhibito curasse refert. Quo epoto, emissis ructibus, in sudorem solutus est, & incantamenti instar omnis dolor evanuit, ut nullis aliis præsidiiis opus fuerit. Ex hoc autem decocto, cum semine anethi parato, aut etiam agarico, vel radice asari, dissolvendo oxymel, syrupum acetosum, aut rosatum solutivum, parari potest vomitorium, ab initio morbi exhibendum, quod evacuando mitigare dolorem poterit.

Docet Galen. cucurbitulam ventriculo admotam, illius dolores missimè resolvere, instar incantamenti. Hæc tamen cautio adhibenda est, ut nihil, aut parum humoris crudi in ventriculo lateat, alioqui dolorem intendit.

Utiliter etiam ad moveri potest eidem parti panis recenter è forno extractus, per medium sectus, tum per se, tum pulveribus aromaticis conspersus.

Tandem, dolore pertinaciter adhærente, confugiendum est ad balneum ex decocto herbarum emollientium, & calefacientium, quod tutissimum & efficacissimum est: flatus enim diffundendo, & per poros apertos resolvendo, à dolore liberat. Quod citius efficitur, si in ipso balneo remedium aliquod discutiens ægro exhibeatur. Concurrente enim utroque præsidio, tum interno, tum externo, opus ritè peragitur.

Balneum esse debet valdè calidum, ut facilius flatus discutiantur, & humores crassi colliquantur.

Quod si propter doloris vehementiam clysteres vel injici, vel retineri nequiverint: in ipso balneo catharticum propinandum est, & in eo per horam integram, aut dimidiam immerandum, donec vis cathartica ventriculum & viscera attingat.

Aliquando autem, ubi ex doloris vehementia pericu-

lum imminet, ad narcotica est confugiendum. Quibus prudenter exhibitis, admirandus non rarò subsequitur effectus.

Nonnulli etiam, (ut Platerus) purgantibus narcotica permiscunt, ut simul & dolor sedetur, & materia peccans educatur: quale est medicamentum Elidæi, à Foresto laudatum, quod sic habet.

℞. Diaphen. ꝑ. 6. philonii Romani ꝑ. ii. Cum aqua vel decocto chamomillæ. Fiat potio.

Dolore prorsus sublato, in iis, qui ei sunt obnoxii, semel aut bis in mense purgatio iteretur, ut proxima flatuum causa auferatur: tum remedia roborantia usurpentur, qualia in læsæ concoctionis curatione proposita sunt.

Qui verò à bile dolor excitatur, curandus est humoris peccantis evacuatione, vomitorio blando, aut cathartico medicamento, aut clysteribus frequentibus, emollientibus quidem, non acribus, aut calefacientibus.

Postmodum demulceatur humorum acrimonia, julepis refrigerantibus & incrassantibus, emulsionibus semio. frig. major. lacte recenter mulcto; oleo amygdal. dulcium recenti, vitellis ovor. & similibus.

Interim non omittantur opiata, aliaque roborantia, in superioribus curationibus descripta.

Extrinsicus admoveatur cataplasma ex mica panis in lacte decocta, additis vitell. ovor. & croco.

Vel admoveatur panis recenter ab igne extractus, per medium sectus, & in aceto madefactus.

Vel foveatur eadem pars decocto flor. chamomill. violar. & nymphææ. Aut quod multò præstantius, demergatur æger in balneum aquæ tepidæ; id enim ad hujus affectus curationem præcipuam vim obrinet.

Dolore sedato, ne forte revertatur, æger purgabitur bis in mense, & viscerum intemperies calida corrigetur victu refrigerante, & remediis convenientibus.

Qui verò dolor fit ab inflammatione, abscessu, vel ulcere, remediis in sequenti curatione proponendis oppugnabitur.

## CAPUT XI.

*De inflammatione, abscessu, & ulcere Ventriculi.*

**L**icet ventriculo, quemadmodum omnibus aliis partibus, omnia tumorum genera contingere possint, nos tamen hîc tantum de inflammatione seu phlegmone agemus, quæ frequentior est: cum reliqui tumores rarissimè eveniant, & eadem methodo qua reliquarum partium internarum tumores, curari valeant.

Est igitur inflammatio ventriculi, tumor præter naturam, à sanguine per venas quibus alitur, à venæ portæ ramis derivato, in ventriculi substantiam, ejusque membranam effuso.

Ille autem sanguis vel purus est ac sincerus, & phlegmonem propriè dictam producit; vel cum bile, pituita, aut melancholia permixtus, & phlegmonem erysipelatosam, oedematosam, aut scirrhosam efficit.

Causæ externæ plurimæ esse possunt, quæcunque videlicet sanguinem fervidiorem efficiunt, ut alimenta calidiora & meri potio: vel eum ad illam partem promovere possunt, ut contusio ventriculi, dum præsertim cibo turget. Quibus addi possunt calidissima & acerrima assumpta, ut cantharides, sublimatum, & similia.

Signa hujus affectus diagnostica sunt ingens dolor, ardens & pungens, distendens & pulsans, & in dorsum usque protensus: tumor adest actu conspicuus, imò & interdum visu. Scapulæ deorsum trahuntur; respiratio difficilis est, sicut & deglutitio, atque eructatio. Cruentum nonnunquam aliquid evomitur, febris adest ardentissima, sævissimis comitata symptomatis.

Si inflammatio est pura, à solo sanguine oriunda, mitior aliquantulum est. Si verò erysipelatosa, symptomata gravissima sunt, & speciatim febris lipyria adest, in qua exteriora rigent, & interiora uruntur, & sitis adest inextinguibilis,



guibilibus quæ etiam febris inflammationi intestinorum erysipelatosæ advenire solet.

Huic ventriculi inflammationi plurimum affinis est inflammatio, quæ vel summam jecoris partem, qua ventriculus obtegatur, vel incumbentem illi abdominis regionem occupat, quæ solâ symptomatum vehementiâ & pernicië distinguitur. Nempe ventriculum obsidens inflammatio omnia sævissima & periculosissima præ se ferre consuevit.

Ex prædictis facile est prognosin elicere, & affectum valde periculosum, imò ut plurimum lethalem nuntiare.

Periculosior tamen est, qui totum ventriculum aut superiorem ejus partem occupat; vel qui ad erysipelatis naturam accedit.

Galen. in 3. *prorrhet.* nauseam, & conturbationem ventris plurimam ac frequentem causam esse docet. Ostendit enim pravos humores ventriculi tunicis pertinaciter adherere, easque vellicare, & ad expulsionem irritare.

Si inflammatio non interimat, neque resolutione curetur, in abscessum degenerat, qui cognoscitur doloris & febris remissione, tumore perseverante.

Rupto abscessu ulcus relinquitur, quod puris excretionem per vomitum & secessum rejecti, innotescit.

At verò ulcus ventriculi non solum ex abscessu disrupto, sed etiam ab aliis causis produciitur; quæ hæc etiam numerandæ sunt, ne quippiam in illius theoria deficiat.

Causæ igitur ulceris ventriculi sunt vel internæ, vel externæ.

Internæ sunt humores acres in ventriculo geniti, vel aliunde in eum transmissi, ut bilis flava, vel atra, vel pituita falsa.

Externæ causæ sunt medicamenta acria erodentia, aut venena. Huc etiam referri possunt vulnera ventriculi malè curata quæ in ulcus degenerant: tum etiam rupio alicujus venæ insignioris quæ coalescere sufficienter non potuit, post vomitum sanguinis copiosum.

Cognoscitur ulcus in ventriculo genitum, præcipuè ex pure, quod vomitu aut secessu rejicitur. Cui signo primario alia addenda sunt. Primò enim percipitur in ventriculo dolor pungens cum ardore conjunctus, præcipuè dum quippiam, excedente aliquâ qualitate præditum, assumitur: acre scilicet, salsum, vel acidum; aut intensè calidum vel frigidum. Adsunt præterea dejecta appetentia, ructus foetidus, febris lenta & assidua.

Prognosis funesta ut plurimum instituenda est, nisi ulcus sit perexiguum, & superficiem tantum occupet, ac febrem conjunctam non habeat. Membrana enim ventriculi ulcerata, utpote pars spermatica, difficillimè coalescit: alimenta ventriculo malè affecto non bene concoquantur, & ante absolutam coctionem rejiciuntur, ulcus lancinans. Præterea medicamenta parum præstant, quia detergentia, ulceris curationi necessaria, dolorem excitant: exsiccantia verò, quæ alteram ulcerum curandorum indicationem implent, impediuntur continuò ab esculentis & potulentis & chylosâ materiâ aliisque humoribus, qui in ventriculo debili continuò restagnant.

Curatio prædictorum affectuum sigillatim instituenda est.

Ac primò inflammationis curatio inchoanda est à venæ sectione pluries repetitâ, in utroque brachio, quantum vires ferre possunt. Ac licet ob syncopen, & extremorum refrigerationem, vires ab initio dejecta videantur: illa tamen virium infirmitas est ab oppressione, quæ evacuationem postulat, atque ita venæ sectionem prohibere non debet.

Præterea apertio hæmorrhoidum, si æger huic evacuationi assuetus sit, sanguinem à ventriculo utiliter avertere poterit. Quod etiam munus utiliter præstabunt curbitulæ scapulis, dorso, & natibus admotæ, tum siccæ tum humidæ; frictions & ligaturæ partium extremarum; & calefactio earundem partium, (quæ frigere plerumque solent) admodis linteis calentibus, & inunctione olei irini, nardini, aliorumque calidorum.

Purgantia in hoc affectu improbantur, quia humores conturbant, & ad partem affectam attrahunt.

Attamen Avic. tamarindorum decoctum, aut cassiæ ʒ. ʒ. cum aqua endiviæ, vel sero lactis dissolutum commendat, singulis diebus usque ad septimum diem exhibitum: Quia molliendo, non trahendo expurgat, mitigat acrimoniâ, & lenit dolorem. Satiùs tamen est ab omni purgatione in principio abstinere. Septimo elapso, apparentibus quibusdam concoctionis & declinationis indiciis, potest etiam institui purgatio ex rhab. ʒ. i. cum santal. rubr. ʒ. i. in aqua borrag. infusa, addendo syrupi rosar. ʒ. j. vel ii. ut sordes parti hærentes paulò valentiùs ducantur.

Interim clystres mollientes, refrigerantes, & lenientes singulis diebus erunt injiciendi, quorum formula talis esse poterit.

ʒ. Juris pulli, vel decocti malvæ, & violariæ ʒ. i. cassiæ recentè extractæ ʒ. i. olei rosac. & violac. ana ʒ. ii. sacchari ʒ. i. ʒ. vitell. ovor. num. ii. Fiat clyster.

Alterantia & roborantia, per os assumenda, eadem esse poterunt, quæ in curatione doloris ventriculi ab humore biliolo fuerunt proposita.

Peculiariter autem conferre possunt syrupi de nymphaea, & de succo portulacæ, potissimum in principio, quia repellentis medicamenti vicem implere possunt.

Conferunt etiam non parum emulsionem iv. sem. frig. maj. & sem. papav. albi. dolorem enim leniunt, & calorem contemperant. Tum etiam julepi sequentes.

ʒ. Aquæ rosar. ʒ. iij. aquæ plantag. Unc. iii. succi acetosæ, vel vini granat. Unc. i. sacchari rosar. Unc. i. Bulliant parum & colentur. Capiat Unc. ii. bis, aut ter in die.

Si dolor vehementer urget syrupus de papav. exhiberi potest.

Pro potu utatur decocto hordei cum syrup. violac. & frigidum bibatur.

In progressu morbi alia medicamenta prædicta erunt permiscenda, quæ resolutionem adjuvent. In hunc finem julepi sequentes præscribi poterunt.

ʒ. Syrup. nymphaeæ, de pomis, & de succo portulacæ, ana Unc. i. syrup. de absinthio pontico Unc. ʒ. aquar. lactucæ, acetosæ, & sceniculi, ana Unc. iii. pulveris electuar. diamarg. frig. ʒ. i. Fiat julep. pro iii. dosibus, in die sumendus.

His addere licet opiatas instaurantes, narcotica, & similia. Quæ omnia varianda erunt multis modis, pro Medici judicio & prudentia.

Terebinthina cum aquâ absinthii lota, si bis, terve detur, vel resolvit, vel maturat ventriculi apostema.

Exterius verò lotus sequens in principio admoveatur.

ʒ. Rad. acetosæ Unc. ii. fol. end. cichorii, & alvæ, ana M. i. seminis lactuc. & papav. albi, ana ʒ. iii. santali albi & rubr. ana ʒ. i. florum violar. & nymphaeæ, ana P. i. Fiat decoctio, addendo aceti rosacei parum; foveatur regio ventriculi tepidè.

Vel ex aquis stillatitiis endiv. lactuc. & nymphaeæ, cum tantill. aceti, & pulv. triasantali, idem lotus parari poterit.

Post lotum inungatur eadem pars oleo rosac. & violac. invicem permixtis. vel unguento sequenti.

ʒ. Ol. rosac. Unc. i. ol. viol. aceti rosac. succi hieracii, ana Unc. ʒ. Bulliant ad succ. consumptionem, deinde adde santali rubr. ʒ. i. rosar. rubrar. ʒ. ʒ. spicæ & camphoræ, ana ʒ. ʒ. ceræ albæ q. s. Fiat unguentum.

Cataplasmata in principio non conveniunt, quia partem pondere suo gravant, & calorem retinendo inflammationem augent.

In declinatione, si contingat, & tumor resolutione finiatur. quod maxinè est exoptandum, lotus resolvens admodum poterit, in hunc modum compositus.

ʒ. Rad. ireos Florent. Unc. ii. fol. menthæ, majoranæ, pulegii, & absinthii pontici, ana M. i. seminis scævigræci & anisi, ana ʒ. ii. granor. kermes ʒ. i. florum scæchados, anthos, chamomillæ, ana P. i. Fiat decoctio, addendo sub finem parum vini albi, quo foveatur regio ventriculi.

Post lotum inungatur eadem pars oleo absinthii, nucis mosch. nardini, & similibus, quibus addita cera, &



& pulv. ireos Florent. aut cinam. potest concinnari unguentum. Emplastra verò & cataplasmata, quia pondere gravant partem, hinc non conveniunt.

Si verò tumor ad suppurationem tendere videatur, foveatur pars decocto flor. chamæm. & rosar. rubr. Postea cataplasma sequens admoveatur.

℞. Rad. althææ Unc. ii. fol. branc. ursinæ & rosar. ana. M. i. Coquantur optimè, & contundantur; deinde adde farinæ hordei, sem. lini, scœnogræci, & pulv. chamæm. ana. Unc. sem. fantali albi & rubri, ana 3. ii. Cum oleo rosar. & chamæm. & pauca pinguedine gallinæ. Fiat cataplasma sapè renovandum.

Rupto abscessu, ulcus detergetur hydromelite in potu exhibito. Cui addenda est interdum manna thuris, Galeni præcepto. Vel aqua hordei cum saccharo rosaceo, in principio, & constitutione calidiori exhibenda.

Ulcerè verò in vetustatem abeunte, sive ab hac causa, sive ab alia quavis, ut humoribus acribus, & erodentibus, vel assumptis causticis, & venenatis rebus genitum fuerit, convenient primùm jacula, herbis refrigerantibus & modicè adstringentibus alterata, hordeata, amygdalata, cum saccharo rosac. parata, lac recens mulctum cum saccharo & tantillo mellis, ac tandem chalybeatum; tum etiam aqua ferrata pro potu ordinario, aut in qua boli armenæ, vel terræ sigillatæ frustula maduerint. Cui addi poterit vinum rubrum austerum, si perexigua caliditas in parte apparuerit.

Deinde apozema sequens in usum revocetur.

℞. Hordei integri P. i. scabiosæ, agrimon. pimpinell. & capill. ven. ana M. s. sem. melon. Drach. ii. rosar. rubr. siccar. P. j. Fiat decoctio ad 1/2. i. In qua dissolve syrup. de rosis siccis 3. iii. Fiat apozema pro iii. dosibus frequenter iterandis.

℞. Ad interna etiam ulcera plurimùm confert decoctum

rad. chinæ, ubi febris absuerit, per viginti aut plures dies sumptum, leviter sudores provocando: sic enim ulcus paulatim exsiccatur. Si verò tabes & corporis consumptio timeatur, decoquatur prædicta radix in jusclo pulli gallinæ vel columbini, cum herbis prædictis & hordeo mundato.

In diuturniori ulcere potus aquar. mineralium vitriolarum, ferratarum, aut aluminosarum, quales sunt nostræ Meinenses, per mensem integrum sumptæ, non parum conferunt.

Toto morbi decursu, ad ventriculum ab illuvie repurgandum, conferunt leviora cathartica, ut rhab. tamarindi, mirobal. syrup. rosac. & catholicum, semel in septimana usurpata.

Denique ad ulceris occlusionem sequentia usurpari poterunt.

℞. Boli armenæ, terræ sigillatæ, coral. rubr. lapid. hæmat. aquâ rosar. diligenter lotor. ana Drach. ii. sang. dracon. gummi arabici, & tragacanth. ana Drach. s. sem. papav. albi leviter contusi, & affi: hypocist. thuris & sarcocollæ, ana 3. i. sacchari rosac. Unc. i. Fiat pulvis, cujus capiat Drach. i. cum aqua plantag. aut conserva rosar. singulis diebus.

Vel ex eodem pulvere potest fieri opiata cum conserva symphyti, & rosar. syrup. cydonior. aut myrtino exceptis. Vel etiam possunt fieri trochisci ex eodem pulvere cum mucilagine sem. psyllii, aut tragacanthi. Quibus omnibus vicissim uti æger poterit, ne ejusdem remedii tædio afficiatur.

Exteriùs verò, ad ulceris occlusionem, ad moveri poterit regioni ventriculi fons ex decocto absynthii, rosar. malicorii, gallar. balauftior. myrtillor. thuris, mastiches, ac similia. Ac deinde pars eadem inungenda erit unguento adstringente, vel emplastrum adstringens eidem admovendum.

## P R A X E O S M E D I C A E L I B E R D E C I M U S.

### D E A F F E C T I B U S I N T E S T I N O R U M.

#### P R A E F A T I O.

**S**U M M A totius nutritionis perfectio in tribus hisce operationibus consistit; optimâ scilicet ingestione, digestionem, & egestionem. Prima appetitum respicit: secunda concoctionem, & ad ventriculum pertinet. Tertia verò intestina: quarum egestio moderata, & secundum naturæ leges peracta, maximum toti corpori commodum asferre solet: Contra verò si deficiat, ut in astrictione alvi; vel exsuperet, ut in variis alvi fluxibus contingit, maxima inde incommoda, & gravissimi morbi emergunt. Præterea superfluum retentio in intestinis dolores colicos, iliacos, & hæmorrhoidales inferre solet. Ac denique putredines in intestinis genitæ, non solum alvi fluxus prædictos, sed etiam lumbricos generare solent. Ut hæc omnia sigillatim exponantur, universus hic tractatus undecim comprehendetur capitibus: Quorum primum erit de dolore colico: Secundum, de iliaco: Tertium, de astrictione alvi: Quartum, de lienteria & affectione colica: Quintum de diarrhœa: Sextum, de dysenteria: Septimum, de tenesmo: Octavum, de fluxu hepatico: Nonum, de lumbricis: Decimum, de fluxu hæmorrhoidali: Undecimum, de hæmorrhoidum dolore.

#### C A P U T I.

##### De dolore Colico.

**C**olicus dolor nomen desumit à parte affecta quæ est colon intestinum; quod longum & anfractuosum est, & totius fere corporis excrementis recipiendis destinatum. Illa autem excrementa, diutius retenta, dolores hujusmodi parere consueverunt.

Causæ igitur colici doloris sunt, materiæ excrementitiæ, quæcunque solutionem continui distendendo, puniendo, aut erodendo efficere possunt; eæque sunt flatus, vel humores.

Flatus ex cruditatibus, aut frigida ventriculi vel intestinorum intemperie geniti, si commodè non excludantur, propter induratas fæces, aut alias causas intestina obstruentes, magnâ copiâ in intestinis crassioribus, colo præsertim cumulantur, & dolorem intensissimum efficiunt.

Humores etiam crassi, frigidi, & pituitosi, tunicis intestinorum impacti, ejusmodi dolorem efficere possunt, tum mordendo, si acrimonia quadam aut falsedine præditi sint; tum refrigerando partem, quæ consequenter cruciatum & divulsionem patitur, quemadmodum



dum Galenus de se ipso narrat, se dolorem colicum acerbissimum patientem, pituitam vitream actu frigidam excrevisse; tum denique flatum emittendo, qui facile ex humore crasso, viscido, ac lento, à calore debili elevarunt.

Humores denique bilioli & acres, tum etiam melancholici & acidi, pungendo ac vellicando intestina, huiusmodi dolores efficiunt. In harum autem causarum actione dubitare licet, quomodo colicus iste dolor suas exacerbationes & remissiones habeat, eadem materia in intestinis remanente, quæ quoadmodum præfens est, distentionem aut morbum inferre debet. Cui dubio respondemus, materias illas interdum quietas permanere, & nullum tunc temporis, aut exiguum dolorem, efficere: interdum verò commoveri & excitari per fermentationes varias, quæ in humoribus contingunt, ut solet fieri in epilepsia, hysterici affectibus, & febrium accessionibus.

Advertendum autem est diligenter, flatum illos aut humores non tantum in cavitate intestinorum residere, tunc enim facile excluduntur ab evacuationibus, detergentibus, & carminantibus medicamentis; sed plerumque ipsis intestinorum tunicis infixos esse. Unde fit, ut non tam facile inde avelli possint, morbumque longiorem ac contumaciorem efficiant, qui prædictis remediis non adeo facile oppugnari valet, si humores crassi, pituitosi, aut melancholici, per vasa intestinorum, in eorum substantiam sensim ac paulatim confluunt, nec statim dolorem efficiunt, donec sufficienti copia cumulati naturam irritent ad expulsionem, sicque commoti & exagitati dolorem inferant; vel flatum ex ea elevarunt, qui inter intestini tunicas conclusi, eas distendunt ac divellunt facilemque exitum non inveniunt dolorem inferunt diuturnum. Bilis etiam eodem modo per vasa intestinorum, in eorum tunica effusa, illisque imbibita, dolores acerrimos excitat, qui diuturni ac contumaces esse consueverunt, quia difficillimo negotio ab intestinorum substantia avelli potest.

Est alia colicæ biliosæ species, quæ in paralyin degenerat, veteribus parum nota, quæ fit ab humore bilioso, non in colon intestinum, quemadmodum prædicta, sed in abdominis membranas repente effuso, qui eò transfertur à cystide fellea vel mesenterio, in crisi diuturna febrium, aut à vehementi iracundiâ, aliâque causa externa: quando propter obstrukciones ad vias communes effundi non potest, sed innotu præpostero ad prædictas abdominis membranas repente excutitur. Hinc dolor exoritur crudelissimus, colicum in itatus, qui tamen neque clysteribus, neque fomentis, neque aliis remediis cedit, ad plures menses perseverans. Hinc corpus contabescit, febris interdum, alicujus ex intermittentibus typum referens, molestat; estque interdum, idque sæpius, continua ac lenta, tandemque doloribus remittentibus, paralyis succedit, humore illo per abdominis membranas in spinam dorsum sensim irrepente. Illa autem paralyis partes superiores magis occupat, Crura verò & tibiæ plerumque dolent, in paucis resolvuntur omnino, bile scilicet ob levitatem superiora petente. Imò verò interdum in ipsum cerebrum irrumpit, & convulsiones epilepticas producit, unde mors ut plurimum solet succedere.

Dantur & aliæ colici doloris causæ, sed minus frequentes, nimirum calculi in intestinis geniti & lumbrici glomerati, intestina obstruentes: compressio intestinorum à tumoribus vicinarum partium, vel angustia ab inflammatione, aliisque tumoribus intestinorum, vel contorsio eorundem à flatibus excitata, quæ via est ad iliacam passionem. Interdum etiam materia, quæ colicam excitat, est venenata, maligna, & colicam pestilentem efficit, sicut Paulus Ægineta refert, colicam pestilentem in Italia exortam multas Romanorum Provincias infestasse. Omnia denique corpora dura, intestina obstruendo vel distendendo, colicum dolorem efficere valent, ut calculi in intestinis geniti, nuclei cerasorum magna copia ingessi, calculus durus, & similia. Sic refert Platerus Præfectum quendam colicis doloribus diu vexatum, convulsionibusque laborantem, post clysmatum usum casei indurati magnam copiam per alvum rejicere, qui per longum

tempus in intestinis hæserat, propterea quod antequam ægrotaret, eo sese immoderate repleverat.

Causæ externæ sunt aëris constitutio frigidior, alvum comprimens & constringens ac indurans; vel calidior, à qua fæces etiam indurantur: (Ex iis enim color omnem humiditatem exlugit) usus ciborum & potuum, hominis temperamento nimis convenientium, fructuum crudorum & stypticorum, ciborum crassorum & concoctu difficilium, quies nimia, somnus immodicus, exercitia intempestiva, immoderata Venus, aliæque causæ externæ, quæ ventriculi concoctionem invertere possunt.

Diagnosin hujus affectus in genere satis facilis est. In primis enim dolor acerbissimus est, adeo ut si levior fuerit, verè colicus appellari non debeat, ex sententia Galeni lib. 6. de locis affect. cap. 2. Deinde dolor iste interdum vagus est, & modò in hac, modò in illa parte gravius urget, ita ut nunc hepatis, nunc lienis, nunc ventriculi, nunc renum regionem occupet, nunc supra, nunc infra umbilicum appareat, ac sæpe in sinistro latere plus urgeat, ex eo, quod in ea parte sit quædam angustia, primum à Bauhino observata. Quando enim excrementa, in superiori capacissima coli parte, in globos magnos, prout capacitas illius fert, indurata, à flatu versus illam partem magna cum violentia pelluntur, fit ut non nisi magno cum dolore permeare possint: quo symptomate dolor colicus cum splenico & nephritico sæpè confunditur, ab iisque satis difficili negotio reliquorum signorum comparisonem distinguitur. Interdum verò dolor magis fixus est, & in una parte stabilis, terebro perforanti, aut palo infixio similis. Ducto in consensum ventriculo, vomitus sæpè excitatur, quo interdum pituitosa, interdum biliosa, porracea, & æruginosa rejiciuntur. Post cibum dolor intenditur, quia repletus ventriculus comprimit intestina. Alvus ut plurimum astricta est, ut nihil per alvum ægrotantes, ne flatum quidem, emittere possint. Si verò aliquid excernatur, vel sponte, vel arte, id majori parte flatulentum est, ac bovino stercore simile, & aquæ supernatans, utpote majori parte pituitosum, quia pituita, per alvum excreta, aquæ & serosis excrementis supernatare consuevit. Tanto autem interdum est supradicta alvi astrictio, ut sæviente dolore medicamenta purgantia exhibita, etiam vehementiora nihil operentur.

Signa causarum in hunc modum distinguenda sunt.

Si dolor fiat à pituitâ, non adeo vehemens est, nisi flatum habeat adjunctum, qui ex iis locis, quibus continetur, nequeat erumpere. Tunc enim gravissimi dolores fiunt, modò in una parte, ac si illa terebro vel infixio palo perforaretur, modò in pluribus, si flatum ille divagetur. Ægri à calidis juvantur; à frigidis læduntur. Præcessit victus ratio generandæ pituitæ idonea, urina crudior & albidior interdum est, non tamen perpetuò, quod juniores & inexpertos medicos fallere solet; interdum enim etiam in colica pituitosa ac flatulenta, urina flava ac rubicunda apparere consuevit, propter vehementem dolorem, qui spiritus & humores in venis & arteriis contentos accendit & inflammat. Quod sapienter annotavit Avicenna. fen. 13. lib. 3. tract. 3. cap. 11. Non oportet, inquit, ut decipiat aliquis per id, quod forte sit de sui & inflammatione, & rubedine aquæ, ut existimet, quod agritudo sit calida, illud namque est commune omnibus.

Si à flatibus colicus dolor oriatur, dolor tensivus aderit, & quædam ventris inflatio: ægri flatuum multitudinem, & ventris rugitum percipiunt; à flatuum exclusionem maxime levantur, victus ratio flatibus generandis idonea præcessit, ut aquæ frigidae potio intempestiva, usus frequens leguminum, raparum, castanearum, olerum, fructuum, & similia. Et si flatum in cavitatibus intestinorum contineantur, dolor vagus est, neque in uno loco consistit, sed per intervalla renovatur. Si verò intra eorum tunicas coërceatur, dolor fixus est, quia flatum locum mutare non possunt; continuus item & pertinax, quia flatum exitum non inveniunt.

Si colicus dolor ab humore acro & bilioso oriatur; ille acerbissimus est, vellicans, & pungitivus. Æstus adest, sitis, & plerumque febris, urinæque sunt valde biliosæ. A calidis



calidis alimentis & medicamentis malum intenditur, à frigidis verò levatur: Materiae biliosae excretionem malum imminuitur, & victus ratio bili generandae idonea praecessit.

Dolores reliquarum partium, in imo ventre contentarum, à colico dolore propriis signis facile distinguuntur, excepto dolore nephritico, cujus signa cum doloris colici signi tantam habent affinitatem, ut Medicos, non raro etiam peritissimos, in eorum distinctione errare contingat. Quod ipsi Galeno contigit, qui ut ipse fatetur, *secund. de loco aff. capit. quinto*, colico dolore vexatus, se nephritico laborare, ex lapide alteri ureterum impacto arbitratur: donec humore per alvum excreto, & inde sedato dolore, colicum esse animadvertit. Sequentibus tamen signis hi duo affectus satis dilucide invicem distingui possunt, si accuratè examinentur.

Primò, dolor nephriticus fixus in rene est, & ab eo ad testem exporrigitur, secundum longitudinem ureteris, Colicus verò vagus est, & cinguli instar medium ventrem affligit.

Secundò, à passu colicus dolor augetur, ob compressionem intestini, quae fit à ventriculo repleto: nephriticus verò neutiquam augetur, sed potius imminuitur; quia aliquid humoris alimentarii ad renes transfertur, quod dolorem aliquantulum demulcet.

Tertiò, in colico dolore vomitus est vehementior, & alvus strictior, quia colon intestinum fundo ventriculi adjacet, & intestina distenta, aut vehementer irritata sese constringunt, ut inimicum expellant. Utrunque tamen symptoma utrique affectui commune est, ut eorum intensio, & remissio difficilem habeant diagnosin: quandoquidem dolor nephriticus intensior majorem vomitum, & alvi adstrictionem majorem efficere potest, quam dolor colicus remissior.

Quartò in colico dolore, ab excretionibus per alvum & vomitum majus levamen emergit, quam in nephritico.

Quintò, in dolore nephritico urina primum clara, & tenuis, & transcolata est, postea aliquid subsidet, & tandem arenulae, aut lapilli excernuntur. At in colico urinae ab initio crassiores existunt.

Quoad prognosin spectat, colicus dolor ut plurimum, si lenior ac remissior sit, neque admodum diuturnus, neque constans in una parte, sed vagus & instabilis per vices intermittat, & alvum omnino non constringat, curabilis est, & periculo vacat. Si verò dolores sint acerbissimi, in uno loco firmiter fixi, nunquam intermittentes, nihil per alvum excernatur, urgeant vigilae, ac demum sequatur vomitus, singultus, delirium, refrigeratio extremorum, & sudores frigidi, lethalis est affectus.

Colicus dolor contumax, à materia acri & biliosa praesertim oriundus, in alios affectus, eosque gravissimos saepe degeneret, arthritidem epilepsiam, & frequentius paralyfin.

Colicus dolor epidemicus, contagiosus, & pestilens, lethalis ut plurimum esse consuevit.

Curatio hujus affectus pro varietate causarum varia instituenda est.

Ac primum flatulentae & pituitosae eadem curatio adhibenda est, quae incipit à clystere emolliente, cui postmodum succedat carminans & discutiens (qualis in dolore ventriculi à simili causa descriptus est) qui reiterandus est eadem die bis, ter, quater, donec dolor dispareat. Si tamen uno aut altero clystere alvus non deponat, ut interdum contingit, acri suppositorio sollicitanda. In uno autem praedictorum clysterum utiliter admiscetur aqua benedicta ʒ. iij. vel colocynthidis ʒ. ij. vel iij. in clystere emolliente & carminante decoquantur.

Si clysteres dolorem non solvant, iis pertinaciter insistendum non est sed satius est levi aliquo medicamento sisti: Observatum est, cum aeger quidam triginta clysteres sine fructu accepisset, alium Medicum mannae ʒ. j. β. cum ol. amygd. dulc. ʒ. ij. in jusculo gallinae pingui exhibuisse, & agrum à dolore liberasse. In dolore tamen, qui fit à pituita crassa, fortiora medicamenta exhibenda.

Postea verò fomenta, irunctiones, balnea, emplastra, aliaque remedia convenient, quae in doloris ventriculi curatione supra proposita sunt. Quibus addenda sunt

specificae nonnullae, huic affectui maxime proficuae.

Intestina lupi vino albo abluantur, postea in furno exsiccentur in vase terreo, donec in pulverem reduci queant: Hujus pulveris capiat aeger ʒ. j. cum vino albo, subito dolorem sedat.

Aqua simplex bulliat, eique ferventi adde ol. commun. quartam partem, & grana aliquot piperis crassiusculè triti: capiat aeger co. l. ij. vel iij. calidè, quantum ferre poterit. Sedatur dolor serè in momento.

ʒ. Aloës opt. ʒ. j. laudani opiat gr. ij. diacrydii gr. vj. Misce, formetur pilulae vj. deauratae: capiat aeger hora commoda (*quatuor, & nisi remiserit dolor, superstes quatuor.*) Dolorem post horam sedant, & postea humores noxios evacuant. His etiam pilulis substitui potest medicamentum ex diaphoenico & philonio Romano, in dolore ventriculi descriptum. Hipp. lib. de internis affect. proponit purgationem ex peplio & meconio.

Olei amygdal. dulc. aut amarar. recentis ʒ. vj. exhibitae dolorem demulcent, & materiam intestinis adhaerentem per inferiora deturbant.

Cum sequentibus etiam oleum mixtum utilissimum est.

ʒ. Ol. amygdal. dulc. vel alterius pro pauperibus, ʒ. iij. vini generosi unc. j. sem. tyropi papav. alb. ʒ. j. Misce, fiat potio.

Cum manna etiam exhibitum oleum amygdal. dulcium in jusculo pingui, ut supra dictum est, dolorem lenit, & materiam peccantem evacuat.

Semen ameos pulverat. cum vino exhibit. ad ʒ. j. in urgente dolore, eum subito sistit, & secundà exhibitione morbum plerumque aufert, admovendo sin ul cataplasma ex terebinth. ʒ. iij. stupis exceptum, sinapitatum piperis & sang. dracon. subtiliss. pulv. an. ʒ. j.

Galbanetum Paracelsi humori discutiendo idoneum est, si totus venter eo illinatur. Illius descriptio à Cratone talis proponi ur.

ʒ. Gummi elemi, hederæ, galbani, ol. laurini, ana partes aequales. Distillantur in arena per retortam, ferventur seorsim, primum aqua: deinde ol. clarum: tertio ol. crassum instar mellis, quo imprimis utendum est.

ʒ. Calami arom. ʒ. i. galangae ʒ. iij. flavedinis exterioris corticis aurantior. ʒ. iij. cinam. electi, sem. anisi, & foeniculi, ana ʒ. iij. cumini ʒ. vj. baccar. juniper. recent. ʒ. β. bacc. lauri ʒ. iij. Pulverentur subtilissimè, & infundantur in vini malvat. opt. ʒ. vj. Stent in infusione in loco calido per vj. dies. Postea distillantur in balneo Mariae Dosis ʒ. j. praemissis evacuationibus.

Ventri admoventur utiliter gummi caragna & tacamahaca: si prius cucurbitula magna umbilico affigatur.

Etiamsi emplastra praedicta ventri non admoveantur, omittenda tamen non est cucurbitula umbilico admota, quae ipso Galeno teste, dolorem à flatibus excitatum discutit instar incantamenti.

Si affectus sit diuturnior, decocto guaiaci, per multos dies continuato feliciter curari poterit, purgando per intervalla, & clysteres frequenter injiciendo. At si colicus dolor fiat à pituita vitrea, decoquatur guaiacum cum vino, quemadmodum usurpavit Amat. Lussit. cum felici successu. *curat. 32. cent. 1.*

Sedato dolore, apozema pituitam evacuans praescribendum est, quo reliquiae omnes educantur. Vel ejus loco decoctum galli veteris cum incidentibus, attenuantibus, & catharticis compositum. Vel julepus efficacissimus, in colica ventriculi descriptus.

Colica biliosa curatur clysteribus emollientibus, & acrimoniam humorum temperantibus.

Foveatur venter decocto emolliente & anodyno, aut quod melius erit, paretur semicupium ex eodem decocto.

Conveniet etiam cataplasma infimo ventri ex farina hordei, & sem. lini coctum in ol. chamamel.

Tum etiam epithema refrigerans hepatis regioni admotum, in hunc modum compositum.

ʒ. Succi endiviae & cichorii, ana ʒ. β. succi lactuca & aceti rosae. ana ʒ. ij. Misce, fiat epithema.

Julepi exhibeantur ex aquis papav. rhœad. lactuc. endiviae, acetosae cum syrup. violac. de pomis, & de limonibus.



Si doloris atrocitas urgeat, ad narcotica confugiendum erit.

Mitigato aliquantulum dolore, expressio rhei in aqua cichorii cum syrupo rosaceo exhibenda erit, & frequenter repetenda, donec tota humorum faburra evacuata fuerit.

Si purgatio ista benignior morbo eradicando non sufficiat, confugiendum est ad mercurium dulcem, qui aliquoties exhibitus, cum purgantibus diacrydiatis, curationem absolvit. Quibus suspectum est diacrydium, solus exhibeatur mercurius dulcis, in pilulam efformatus, cum conserva rosarum, superhausta infusione sennæ & rhab. additâ mannâ, & syrupo rosaceo.

Postea utiliter usurpantur aquæ acidulæ, & vitriolatae.

Sæviente dolore, ad balneum & laudanum confugiendum est, cui aliquando purgantia misceri poterunt, sed majori dosi, quia eorum vis retunditur à laudano.

Galbanetum Paracelsi, quamvis calidum ad humorem discutiendum idoneum est, si totus venter eo illinatur. Illius descriptio supra proposita est.

Phlebotomia in hac colicæ specie aliquando convenit, cum metus est, ne caloris vehementia sanguis incalcescat, febrisque generetur. Si verò febris adfuerit, statim celebranda est.

Urgente admodum siti, aqua frigida exhibenda est, docente Galen. *lit. 12. meth. cap. 7.* Ejusque usu testatur A-mat. Lufit. se talem dolorem subito, incantamenti instar, sustulisse. Eadem se usum feliciter, tum sumptâ, tum admota, testatur Septalius duabus historiis, *lib. 7. animadversionum practicarum* descriptis.

Ad colici doloris, qui in paralyfin degenerat, curationem, alvo variis clysteribus solutâ, primisque viis cathartico apertis, demittatur æger in balneum tepidum, ex decocto emollientium paratum, bis, ter, quater, quinquies in die ut acrimonia humoris temperetur, ac pori membranarum aperiantur. Postero die cathartico accommodato humor ille purgetur. Deinde repetatur balneum. Idque alternis diebus faciendum, si vires ægri ferre nequeant: donec expurgatis humoribus, & sedato dolore, æger in tuto sit.

Interim clysteres continuentur: præsertim qui ex lacte parantur, ad dolorem demulcendum utilissimi, quibus cassia, ol. violaceum, & liliorum admisceri poterunt.

Venter ol. chamæmel. anethino, amygdal. dulc. lilior. cum butyro frequenter inungatur.

His feri lactis & acidularum usus tandem subjicitur.

Ac denique affectu in longitudinem abeunte, ea quæ in melancholiæ hypochondriacæ curatione relata sunt, hîc aptari poterunt.

Neque omittenda est ab ipso morbi initio, phlebotomia: eaque purgationi præmittenda, ac sæpe iteranda, si sanguis prava qualitate infectus appareat, aut si dolor rheumatismi particeps esse videatur.

Denique omnia remedia, quæ in colica biliosa proposita sunt, hîc etiam aptari poterunt. Quibus non conferentibus, nonnulli Medici confugiunt ad potionem sequentem, quam licet fordidam, & delicatorem hominum ore indignam, exhibent, & dolorem statim mitigari affirmant.

℞. Stercoris equini ꝑ. j. Minutim dividatur, & infundatur in ꝑ. j. aquæ papav. rhœad. in qua spiritus vini guttæ viij. vel x. dissolutæ fuerint. Colentur cum expressione levi, & dividantur in tres doses satis amplas, sumendas horis exacerbationis doloris.

Si verò affectus in paralyfin degeneret, linienda sunt spina dorsi & partes paralyticæ balsamo resolvente, & nervos roborante, modò febris adfuerit. Si enim adsit, lana succida oleo, aut unguento digerente imbuta, partibus paralyticis alligetur, cavendo diligenter frigus, quo humor partibus impingitur, illiusque diffusio impeditur.

Galbanetum Paracelsi hîc præcipuè confert, si partibus prædictis, tum etiam umbilico admoveatur.

## CAPUT II.

## De Iliaco affectu.

**I**leos, seu Iliaca passio nomen accipit, ut nonnulli volunt, ab ileo intestino quòd ut plurimum in hoc affectu laboret, quamvis alia tenuia intestina, imò & interdum crassa eodem tentari valeant. Vel potius ab ἰλεος, quod circumvolvi & circumcingi significat; ideo Latinis convolulus, seu convolvulus nominatur, quòd in eo intestina manifestè convolvi, & motu præpostero ad superiora moveri videantur. Χρῆμα-ψος etiam nominatur, quod intestina manum admoventi chordæ quasi tensæ, & veluti convolutæ speciem repræsentent. Barbari *miserere mei* vocant: quod miserabile sit malum, & ut plurimum lethale, atque adeo miseratione divina opus habeat.

Est autem iliacus affectus, motus intestinorum præposterus & inversus, in quo alvus omnino constricta est, & quæ per inferiora dejici deberent, ad ventriculum feruntur, ac per vomitum rejiciuntur.

Notum est, intestina motum habere naturalem, quo chylus & fæces ad inferiora sensim propelluntur, qui peristalticus nominatur. Hic motus fit per fibras orbiculares & transversas, intestina contrahentes, & comparatur motui lumbricorum terrestrium, qui partes corporis successivè movent. Invertitur autem motus iste aliquando à causis præternaturalibus, ut intestinorum fibræ, quæ à superioribus versus inferiora contrahi debent, ad superiora contrahantur; & quæcunque in intestinis continentur, non versus alvum, sed versus ventriculum protrudantur; & tunc affectio iliaca generatur. Simile quidpiam in vomitu animadvertimus. Dum enim fibræ œsophagi à parte superiore versus ventriculum se contrahunt, fit deglutitio ciborum, cum verò inverso hoc agendi ordine à parte inferiore versus superiora se contrahunt, vomitus excitatur. Fit autem motus iste peristalticus inversus à facultate intestinorum expultrice vehementer irritatæ, quæ quando materias superfluas & excrementitias per inferiora deturbare non potest, eas ad superiora violento motu propellit. A deò autem violentus interdum est illæ motus, ut non solum chylus & flatus, & humores excrementitii, sed etiam fæces non rarò per vomitum excernantur, imò verò ea, quæ per anum immittuntur, ut clysteres & suppositoria, rapiantur ac vomitu rejiciantur. Sic refert Matthæus de Gradib. puellam quandam, annos natam duodecim, ileo laborantem, postquam per triduum non solum fæces, sed etiam clysteres injectos vomitu rejicisset, tandem suppositorium oblongum in anum immissum, post breve tempus vomitu excrevisse. Cum verò deinde suppositorium aliud filo ad coxam alligaretur, illud statim disrupto filo sursum ascendit ad ventericulum, idque ægra cum parte fili appensi evomit. Et cum tertio suppositorium aliud quatuor filis fortibus alligaretur, illud etiam paulò post, ruptis filis, per os, cum parte filorum rejectum fuit. Tandem cum medicus juberet, ut manè aliud suppositorium admitteret, tantâ violentiâ sursum attractum fuit, ut mater ne sursum raperetur illud extrahere coacta fuerit. Similes quædam historiæ apud autores reperiuntur, quas brevitatis causâ omittimus.

Illa autem facultatis expultricis intestinorum irritatio à pluribus causis dependet: quarum præcipuæ & frequentiores ad obstructionem referuntur. Quæcunque igitur intestina vehementer obstruere possunt, ut nihil inferiora descendere valeat, hunc affectum producere solent. Postquam enim facultas diu enixa est fæces & alias superfluitates per viam ordinariam excernere, sine suo frustrata & exclusionis necessitati satisfacere tentans, aliam viam aggreditur, & motu præpostero ad superiora propellit, ut superfluitates illæ per vomitum rejiciantur.

Causæ autem obstruentes sunt fæces induratae ac retentæ, flatus crassi, magna copia in intestinis collecti, eaque vehementer distendentes, inflamatio, aliique tumores magni, qui cavitatem internam intestini penitus occludunt, & intestini circumvolutio & complicatio, ut veluti nodus in ipso fiat: quæ quidem complicatio, & constrictio intesti-

norum



norum in hernia sæpe contingit, tum etiam in colico dolore, cui sæpe succedit ileos, quia intestina flatibus distenta se convolvunt, ut interdum veluti nodum efficiant.

Causæ verò infrequentiores, intestinorum facultatem expultricem ita irritantes, ut motum suum invertire cogantur, sunt exulcerationes insignes, aut humores acerrimi, intestina vellicantes. Quando enim fæces, aut alii humores ad inferiora delabentes partem ulceratam attingunt, eam acriter vellicant, ita ut ea irritata rem noxiam præterfluere non patiantur, sed fursùm impetu propellant: quem motum reliqua intestina per sympathiam irritata sequuntur, donec materia noxia ad ventriculum feratur, qui motum eundem sequens, prædictæ facultatis expultricis ministerio, foras eandem per vomitum expellit.

Signa iliaci affectus alia communia sunt cum dolore colico, alia verò propria.

Communia sunt dolor in regione abdominis, inflatio & distensio ventris, alvus adstricta, cibi fastidium, nausea, vomitus, inquietudo, spirandi & mingendi quædam difficultas.

Propria verò, & peculiaria passioni iliacæ sunt, dolor acutissimus & savissimus, inflatio & distensio vehemens; tumor in hypogastrio eminens & durus, omnimoda alvi suppressio, ut nihil per inferiora descendat. Progrediente malo vomitus accedit enormis, primum bilis, pituitæ, & chylosæ materiæ, ac denique stercoris, vel potius materiæ stercori similis, cibalis nempe corruptæ ac fætidæ. Rarissimè enim fæces rejiciuntur: brevi moriturus sudor frigidus copiosus, extremorum refrigeratio, cordis tremor, inquietudo, & animi deliquium succedunt.

Galenus *comment. in Aphor. 10. sect. septime*, asserit proprium & inseparabile hujus affectus signum esse, nihil per inferiora descendere. Hippocrates tamen contrarium asserere videtur *tertio Epid. sect. secund. textu. 7.* in historia mulieris vulvulosæ, quæ apud Tisamenum habitabat, dicens: *Dejectiones tenues, crudæ, paucæ.* Cui difficultati respondendum est, dejectiones quasdam emitti posse in principio morbi, ex fæcibus contentis intra intestinum affectum, quæ à natura vel arte excludi possunt per inferiora, antequam omnia intestina in consensum trahantur, & propriam naturalemque facultatem amittant. Postquam verò morbus confirmatus est, & motus omnium intestinorum peristalticus omninò inversus, nihil amplius per inferiora emittitur.

Signa causarum in hunc modum se habent. Si ileos ab inflammatione fiat (quod ut plurimum contingit) morbus est acutissimus, velociter ad statum properat, febris adest intensa, dolor vehementissimus, vomitus biliosus & pituitosus citissimè apparent, quos brevi fæcum rejectio consequitur, & reliqua signa exitalia supra proposita.

Si à fæcibus induratis alvi constrictione præcessit, per plures dies perseverans, & in principio non est dolor, postea accedit; morbus longius protrahitur, nec adeò est acutus, ut in inflammatione; nec dolor adeò vehemens, neque adeò intensa febris, inò interdum nulla.

Si à flatibus vel pituita iliacus affectus generetur, ille dolori colico ut plurimum succedit, & præcesserunt signa colici doloris, à pituita vel flatibus oriundi, superiori capite proposita.

Quod ad prognosin spectat, ileos omnis periculosus est, sed alios longè periculosior. Ille igitur est magis exitialis, cui vomitus supervenit, primum quidem materiæ biliosæ, vel pituitosæ; postmodum verò fæculentæ. Et ex his nullum salvari asserit Gal. 6. *de loc. affect. 2.* Docet tamen experientia, nonnullos evadere, quando ex fæcum retentione vel hernia intestinali affectus oritur.

Quibus in stranguria ileos supervenit, intra septem dies moriuntur nisi febre superveniente copiosior urina fluxerit. Hippoc. *Aph. 44. sect. 6.* Si stranguria fiat ab humoribus crassis & pituitosis, qui etiam magnâ copia in intestinis & in venis redundant, superveniente febre, possunt illi concoqui, liquari, & attenuari, ac per urinas excerni unde solutio ilei contingit. Licet Gal. in *comment. hujus Aphoris.* Se ignorare asserat, quæ Hipp. dixit in hoc Aphor. eaque ratione & experientiâ confirmari non posse.

Si symptomata remittant, & medicamenta vel alimenta ore assumpta, per inferiora descendant, salus expectanda est.

Curatio hujus affectus juxta causarum varietatem varianda est. Ac primum si à fæcibus induratis, vel à crassis & viscida pituita obstructio intestinorum dependeat, emollientia, & relaxantia remedia, interna & externa, erunt usurpanda.

Primo igitur injiciantur clysteres ex decocto althææ, malvæ, violariæ, chamomillæ, meliloti, cum sem. lini & scæn. vel ex ol. communi solo ad ℥. j. in quo butyri tertia pars dissolvi poterit, vel ex decocto intestinorum, & omenti vervecis, in quo dissolvatur butyrum, mel, & sal gemmæ. Quibus decoctis, si flatus adfuerint, ut plerumque solent, carminantia & discutientia addere convenit.

His demùm clysteribus emollita aliquantisper materia, purgantia prius mediocria, mox paulò vehementiora erunt admiscenda, ac tandem ad vehementissima transendum erit.

Interim fomenta & linimenta emollientia toti ventri erunt admoveenda, diuque continuanda; omentum castrati in aqua fervente calefactum, ventri applicandum; & quod utilius multò, balnea emollientia administranda, quæ erunt efficaciora, si ex oleo solo componantur.

Interiùs verò exhiberi poterit oleum amygd. dulc. vel solum, vel vino albo permixtum. Quibus, si dolor valde urgeat, syrup. de papav. alb. addi poterit, ut in colici doloris curatione dictum est.

Ac denique, si vehemens dolor & flatuum copia adfuerit, reliqua remedia, in colici doloris curatione proposita, usurpari poterunt. Non omissis purgationibus, quæ opportunè institutæ mali causam evacuant.

Quæ sit ab inflammatione intestinorum, curanda est venæ sectione frequenter repetitâ, si vires ferant, tum in brachio, tum in pede; cucurbitularum admotione inguinibus cum scarificatione. Clysteres etiam emollientes & refrigerantes injiciendi erunt, in hunc modum compositi.

℥. Rad. alth. ℥. ij. fol. malv. violariæ, an. M. j. sem. cucurbit. ℥. 6. sem. lini & psyllii, ana ℥. ii. flor. nymph. & rosar. ana P. j. flor. chamæm. P. 6. Fiat decoctio, in cujus ℥. i. dissolve ol. rosar. ℥. ij. cassiæ recentè extractæ ℥. j. Fiat clyster. In progressu verò addendum erit ol. violac. & chamæmelinum.

Prædicta emollientia in oxycrato decoqui debent.

Vel lac recentè mulctum cum paucis saccharo & albumine ovi, vel mucilag. feminis psyllii ℥. i. ad dolorem leniendum injici poterit.

Vel parari potest clyster ex lacte amygdal. dulcium, aut cremore hordei, ex illius mundati decocto expresso, addendo butyri recentis & sacchari parum.

Ex oxycrato simplici parari potest enema, & singulis diebus injici, quod ad inflammationem intestinorum cohibendam plurimum valet.

Inunctiones fiant ex oleo violato, amygd. dulc. & chamæm. additis mucilag. sem. lini, sænugr. cydonior. axungis gallinæ, anatis, butyro recenti.

Tum etiam foci admoveantur ex decocto simplicium, pro enemate supra descriptorum.

Tum ex oxycrato simplici foci in principio parari poterunt. In progressu verò prædicta simplicia in oxycrato decoquantur.

Necnon cataplasma ex residua ejusdem decocti, vel ex farina hordei, sænugr. lini, cum butyro, axungis & oleis prædictis compositum.

Ac denique balneum aquæ dulcistepidum, huic etiam affectui erit convenientissimum, in quo emollientia & refrigerantia bulliant.

Post venæ sectionem exhibeantur olei amygdal. dulc. ℥. ii. ad dolorem leniendum; & si dolor valde urgeat, ad narcotica veniendum erit.

Si vomitus non adsit, provocandus est haustu aquæ tepidæ cum ol. violaceo; eo enim purgantur superiora, & humores revelluntur ad partem affectam defluentes. In toto morbi decursu propiciandi sunt julepi, & emulsiones in ventriculi inflammatione propositæ.



Potus sit aqua hordei. Et in principio morbi abstineat æger ab omni alimento, per viginti quatuor horas, ut materiæ morbificæ portio absumatur; postea jusculum pulli exhibeatur. Summa enim cura tractandus est hic affectus, quia ut plurimum lethalis est.

Præcipuum autem curationis negotium in abstinence versetur; idque exemplo à vulneribus intestinorum deducto. Qui enim ita vulnerati sunt, penè fame conficiuntur per 40. dies. Hoc igitur affectu laborantes, per 4. aut 5. dies, tria tantum cochlearia jusculi sumant singulis diebus, ut vomitus impediatur, qui morbum graviter auget. Adde, quod alimentum exhibitum nullum solatium afferat ægrotanti; non enim in nutritionem cedit, sed planè corrumpitur & chylus à ventriculo in intestina prolapsus, excrementis retentis permiscetur, & vomitionem auget.

In potu paulò major potest esse libertas, quia facilè transit ad hepar, & illius materia morbo expugnando idonea esse potest, si oxycratum exhibeatur valde temperatum, & in parva quantitate.

Denique à circumvolutione intestinorum quandoque contingit iliacus affectus, quod rarissimum est, vel à flatibus producitur intestina contorquentibus; vel ab hernia, quæ enterocoele nominatur.

Qui à flatibus exoritur, iisdem remediis curatur, quæ ad flatulentiam colicam præscripta sunt. Si verò omnibus iis remediis, satis diu usurpatis, alvus non aperiat, sed omnia assumpta per vomitum excernantur, ut spes salutis in angustio posita sit, extremum remedium erit usurpandum, quod proponit Hipp. *de morbis*, ut scilicet follis fabrilis ano adaptetur; & eo flatus in ventrem immittatur. Postmodum clyster emolliens cum trochiscis alhandal injiciatur, ut fæces educantur. Valet hoc remedium, non solum ad ileum ex contorsione intestinorum; sed etiam ad eum, qui fit ex obstructione gravi & contumaci: dilatando enim intestina obstructionem solvit. Amat. Lusit. *curat. ult. cent. 1.* testatur se iliacum desperatum hoc remedio curasse; tum etiam Epiphanius Ferdinandus, in *suis historiis Medicis. hist. 74.* refert Neapoli filium Joannis Altimari, Medici expertissimi, qui ex colica & iliaca periturus erat, hoc eodem remedio ab orci faucibus fuisse revocatum. Verùm Aurelianus hoc remedii genus improbat ex eo, quod ventus à folle immixtus frigiditate suâ multum lædere possit. Attamen hoc incommodum evitare faciliè est, si juxta ignem follis aëre impleatur.

Aliud præterea remediū valde inusitatum à Paræo proponitur, quo multos ab ileo desperatos, imminente morte, liberatos esse refert: haussis scilicet, argenti vivi in aqua sola, libris tribus. Pondere enim suo intestinum velut vinctum expedit & evolvit, prædurasque & obstruentes fæces deorsum derurbat. Quod remedium ab aliis etiam authoribus non paucis approbatur, qui & illud innoxie sumi posse testantur.

Verùm tanta mercurii quantitas valdè permiscenda est, ne frigiditate sua calorem nativum extinguat, & sanguinem in venis coagulet. In casu igitur desperato satius est minorem quantitatem exhibere. Quidam exhibent ℥. ii. in ovo forbili, & iterandum censent, si prima exhibitio non succedat. Unius tamen uncie exhibitionem felicem successum habuisse, in observationibus nostris videre est.

Quando verò iliacus affectus præcedit à prolapsu intestinorum in scrotum, tota cura eo dirigenda est, ut illa in suum locum reponantur. Quod fiet blandâ & prudenti manu Chirurgi, locum affectum diu antea fovendo decocto emolliente, & oleis relaxantibus, clysteribus etiam emollientibus, carminantibusque frequenter injectis; ægrum ita collocando, ut caput sit valde declive, crura verò elata. Imo nonnulli, cum pedibus suspenderentur, citissime liberati sunt.

Si hernia fiat cum inflammatione intestini fotu ex aqua frigida curatur. Si flatus intestinum distendant, fotu ex spiritu vini discutiantur. Utriusque curationis exempla vide in observationibus nostris.

## CAPUT III.

## De adstrictione Alvi.

PER adstrictionem alvi non intelligimus omnimodam alvi suppressionem, qua nihil per inferiora deficitur, qualis in ileo contingit; sed tantum pigram & tardam alvi defectionem, qua fæces & cibi reliquæ rarè, nec pro assumptorum ratione excernuntur. In hac fæces necesse non indurantur, quia diutius retenta, caloris vi continenter exsiccantur, ab iisque nonnihil succi semper exfugitur per venas mesaraicas, non modò ad tenuia, sed etiam ad crassa intestina propagatas. Est symptoma facultatis expultricis imminutæ, vel retentricis auctæ. Causa tamen est multorum morborum, ideo excreta retenta in numero sex rerum nonnaturalium recensentur, quæ debitam naturæ legem non servant, infinitos morbos producant. Sicque alvus adstricta, vapores ad caput mittit; catarrhos aliosque cerebri affectus producit, ventriculi coctionem, aliarumque partium actiones perturbat.

Causæ hujus symptomatis quamplurimæ sunt. Ac primum sæcum durities & siccitas non est effectus adstrictionis alvi, ut supra dictum est, sed etiam causa efficiens, quia fæces induratae difficilior excernuntur, & facultatem expultricem non irritant. Duræ autem fiunt & sicciores, præcipue & frequentius ab hepatis calore excedente, qui omnem humiditatem in intestinis contentam potenter attrahit, & fæces sicciores relinquit. Cui rei etiam plurimum conferre potest motus vehementior, præsertim equitatio, excrementorum paucitas ex inedia proveniens, vel dum acrimoniam non habent, quâ intestina vellicare possint, quod ex cibis frigidioribus contingit, & quando flava bilis ad intestina non descendit, ut in ictero fieri videmus. Ac denique morbi intestinorum non pauci hanc alvi constrictionem efficere possunt, ut frigida & sicca intemperies, tumores, obstructions, ani stupor, & paralysis alique non pauci.

Signa diagnostica ex causarum diagnosi dependent, quæ, ex propriis fontibus haurienda. Calidæ enim hepatis intemperiei signa ex proprio capite desumenda sunt, tumores etiam, alique intestinorum morbi, propriam habent diagnosin. Ac denique causæ externæ, ut ciborum paucitas, frigiditas, equitatio, & similia, ex ægrotantis relatione innotescunt.

Quod ad prognosin spectat, constrictio alvi magis & minus periculosa est, pro majori vel minori gravitate causarum. Si enim ab inflammatione, aut alio intestinorum tumore fiat, valde periculosa est. Ab aliis verò causis oriunda, minus habet periculi. Contumax, & diu urna plerumque esse solet, quando à fæcibus induratis producitur: inde enim sæpe colici dolores excitantur, qui semel sedati, frequenter recurrunt, tum propter novam sæcum exsiccationem, tum quia, licet purgantibus alvus sufficienter soluta videatur, & excrementa liquida permulta evacuata sint; non pauca tamen interdum excrementa solida & dura in intestinis subsistunt, quæ novos dolores pariunt, & nonnisi clysteribus quamplurimis, etiam post purgationem injectis avelli possunt.

Curatio hujus affectus à causarum suarum sublatione dependet, quæ ex propriis capitibus desumenda est. Cum tamen illa curatio ut plurimum longa esse consueverit: præcipue quando à calida hepatis intemperie, aut sicca intestinorum dependet, & interim alvus adstricta gravissima parit incommoda, illius correctioni seorsum incumbendum est. Quod fiet in universum remediis emollientibus simulque alvi excretionem promoventibus, in sequentem modum.

℥. Rad. alth. & lilior. ana ℥. ii. fol. malv. alth. mercurial. viol. blanc. ursinæ ana M. j. sem. lini & foenugr. ana ℥. 8. sem. anisi ℥. i. 8. prunor. dulc. part. iii. flor. chamomil. & melilot. ana P. j. Coquantur ad ℥. j. 8. In colatura dissolve olei liliorum, & sem. lini, ana ℥. ii. butiri recentis .i. 8. catholic. duplic. & diaprun. simpl. ana ℥. vj. Fiat clyster, injiciendus quoties opus fuerit.

In



Interdum verò loco hujus clysteris utatur ægrotus sequenti.

℞. Decocti intestinorum vervecis ℥. i. butyri recentis Unc. ii. cassiæ recentè extractæ, catholici optimi, vel diaprun. simpl. ana Unc. β. sacchari rubri Unc. i. Fiat clyster.

Parari etiam potest bis aut ter in mense clyster ex oleo communi solo, ad ℥. i.

Adnitendum tamen est aliis remediis alvum mollire, quandoquidem frequentiori clysmatum usu natura segnior evadit, & tandem assuescit nunquam alvum depocere, nisi clysteribus irritata.

In hunc finem pruna dulcia, vel poma cocta, cum saccharo, per horam ante prandium erunt assumenda, ut docet Gal. 2. *de alim. facult. c. 3*. Alioquin si immediate ante prandium assumantur, nihil operantur. Vel jusculum pulli, aut commune, in quo fol. borrag. betæ, & poma aliquot bullierint, vel ol. amygd. dulc. recentè extracti sine igne cochlear. i. cum syrupi capill. ven. pari quantitate, vel cochlear. ii. syrupi sequentis.

℞. Mucilaginis sem. psylli & cydoniorum, cum aqua malvæ extract. ℥. i. β. sacchari albi ℥. i. Fiat syrupus secundum artem.

Et pruna melius operentur, vinum lymphatum ante & post eorum assumptionem hauriendum est; ita tamen ut tota illius quantitas dimidium cyathum non excedat. Idem præstabit butyrum recens per horam ante prandium assumptum, magnitudine nucis majusculæ, superbibendo vinum lymphatum.

Semel in septimana utatur aliquo ex sequentibus.

℞. Cass. recent. extract. ʒ. i. cremor. tart. ʒ. i. Cum saccharo fiat bolus.

℞. Mannæ granat. ʒ. i. β. Capiat manè cum jusculo. Vel

Olei amygdal. dulc. & mannæ granat. ana ʒ. i. dissolvantur cum jusculo, & capiat manè duabus horis ante prandium.

℞. Pulpæ cassiæ ʒ. ii. pulpæ tamarind. & mannæ gran. ana ʒ. i. fol. sennæ tenuiss. pulverat. ʒ. β. cremor. tart. ʒ. iii. Cum syrupo rosato solutivo fiat opiata, capiat Unc. β. vel Unc. i.

Vel in decocto prunorum, mannæ Unc. β. Unc. i. dissolvatur, capiat horâ unâ ante prandium, quæ omnia quemadmodum prædicta per horam ante pastum exhibenda sunt, sic enim melius operantur.

Pisana cichor. agrimon. & acetosa, in aquam fervere incipientem coniectis, & per noctem infusis, pro potu ordinario usurpata, vel sola, vel cum vino permixta, alvum liberam servat.

Jusculum sequens alvum certissimè laxat, eamque diebus sequentibus laxiorem relinquit.

℞. Fol. betæ mercurialis, an. M. i. Coquantur in jusculo communi, quod capiat per horam ante prandium.

Vel parari potest conserva rosar. laxans, è rosis pallidis non explicatis, præcisus unguibus, cum manna & saccha. anaticè sumptis dosis Unc. i.

Denique balneum, vel semicupium frequens, ex decocto herbarum emollientium paratum, ad partes omnes naturales humectandas, & alvum emolliendum, utilissimum erit.

## CAPUT IV.

### De lienteria, & cœliaca passione.

**L**ienteria est species alvi fluxus, in quo cibus non immutatus, sed prout assumptus, per alvum celeriter excernitur. In cœliaca verò passione alimenta cruda & imperfectè cocta per alvum rejiciuntur. Unde patet, duos istos affectus differre inter tantum secundum magis & minus, ut lienteria ad actionem abolitam, cœliaca passio ad imminutam referatur. Licet autem cibi vel omnino incocti, vel imperfectè cocti rejiciantur; non ideo tamen ad concoctionem læsam hi affectus referuntur, sed potius retentionem. Malè enim, vel nullo modo conco-

Laz. Riverii Opera.

quantur, quia nimis citò dejiciuntur, nec satis diu in ventriculo retinentur, ut concoctionem subire valeant. Hinc etiam colligitur, in hoc affectu, licet inter morbos intestinorum referatur, ventriculum valdè affici, & plerumque magis quàm intestina; unde Gal. 6. *de locis affect. c. 2.* lienteriam, & cœliacam passionem; tum ventriculi, tum intestinorum vitio fieri scribit.

Causæ lientericæ & cœliacæ affectionis plurimæ proponuntur ab auctoribus, quas omnes ad tria capita referre possumus; frigidam ventriculi, & intestinorum intemperiem, earundem partium irritationem, & summam facultatis retentricis debilitatem, ex gravi ac lethali morbo.

Frigida intemperies magnam crudorum, pituitosorum, ac glutinosorum humorum copiam generat, quæ ventriculi rugas obducit & oblinat, ut alimenta in eo retineri nequeant. Unde mirari licet, Gal. *Aph. 1.* in veteres Græcos invehi, qui hunc affectum lienteriam seu lævitatem intestinorum idcirco nominarunt, quod interna ventriculi superficies lævior reddita cibos non retineat: quando quidem ventriculus non tam asperitate tunicæ interioris, quàm innata sese constringendi proprietate, cibos tamdiu contineat, donec concoctio perfecta sit. Ut enim concedendum est, præcipuam retentionis causam esse facultatē: sic etiam fateri oportet, facultatem illam instrumentis indigere certo modo dispositis, sine quibus actionem exercere non potest. Atque adeò, cum tunica ventriculi interior aspera & rugosa facta sit, ut alimenta in ventriculo commodè retineantur: non est dubium quin si illa asperitas tollatur, dum rugæ implentur humore pituitoso, retentioni ventriculi lædatur, ita ut alimenta incocta præterlabantur. Simile quidpiam in utero contingit, cujus tunica interior aspera & rugosa facta est, ut semen facilius retineat ad conceptionem. At si lentis & glutinosis humoribus obducatur, non retinet, sed statim effluit: unde sterilitas non paucis mulieribus inducitur.

Advertendum tamen, si quis hanc nomenclaturam rigidè examinare voluerit, ventriculi lævitatem potius, quàm intestinorum hoc symptoma esse nominandum. Neque tamen eo omnes illius species comprehendere, sed illam tantum, quæ ab humore pituitoso producitur, quæ cum omnium frequentissima sit, reliquarum denominatio ab ea sumi potest.

Irritatio ventriculi & intestinorum ab acris humoribus fit, qui vellicando partes illas ad excretionem præmaturam excitant: quemadmodum in vesica contingit, quæ ab urinæ acrimonia vellicata, frequenti micturitione laborat, unde stranguria exoritur. Galen. 6. *Aph. 1.* dicit, ab illis humoribus acris fieri in ventriculo ulcerosam dispositionem, eo modo, quo aphthæ in ore puerorum fieri consueverunt.

Summa facultatis retentricis imbecillitas in gravibus & lethalibus morbis sæpè lienteriam efficit, ut videre est frequentius in dysenteria, quæ naturâ succumbente, in lienteriam degenerat, ventriculo in consensum intestinorum graviter affectorum pertracto, ejusque facultatibus omnino dejectis. Sic etiam in febribus malignis alvi fluxus lientericus sæpissimè contingit, in quo juscula statim ferè ac assumpta sunt, per alvum incocta rejiciuntur. Idem potest contingere à rebus venenatis, aut noxiâ qualitate præditis assumptis.

Est & alia causa à prædictis diversa, quæ peculiariter cœliacam passionem efficere consuevit, nempe obstructionis venarum mesaraicarum, quæ transitum impediunt chylosæ materiæ ad hepar; unde necesse est illam per alvum rejici. Verum ut hæc affectio fiat, oportet omnes venas mesaraicas, aut majorem illarum partem obstrui, quemadmodum contingit in pueris strumosis, quorum mesenterium glandulis innumeris refertum invenitur, à quibus venæ mesaraicæ præcluduntur: & hi continuo alvi fluxu chyloso & cœliaco laborant, multum comedunt, & in dies emaciantur, donec in marasimum incidant.

Aëtius & Celsus, multique eorum sequaces, aliam etiam lientericæ causam proponunt, nempe levem & densam cicatricem intestinis ex magna dysenteria relictam, ob quam, venarum osculis obstructis, alimenti distributio

P p

impe-



impeditur, & ita fit lenteria. Quæ tamen causa non videtur recipienda, quandoquidem oportet universa intestina fuisse ulcerata, in iis postmodum genitam cicatricem omnes propemodum venas mesaraicas occlusisse, quod rationi nullo modo videtur consentaneum: siquidem impossibile est universa intestina ulcerari, quin homo intereat.

Signa horum symptomatum præcipua ex antè dictis patent. Si enim alimenta cruda & inalterata celeriter & frequenter per inferiora descendant, lenteriam significant. Si verò aliquantulum, immutata, & nonnullam chyli speciem adepta effluant, celiacam affectionem ostendunt.

Signa verò causarum inde colliguntur, si lenteria aut celiaca passio fiat à frigida intemperie, & pituitosis humoribus, ructus addi apparent: pituitosa excrementa per alvum deiciuntur: sitis & doloris carentia: & si à capite fluat pituita, quod frequenter contingit, dejectiones sunt spumosa, major est fluxus post somnum, & aliæ causæ caput alterantes, aliæque catarrhi signa apparent.

Si verò ab irritatione proveniat, mordicatio interdum in ventriculo sentitur: calor in hypochondriis percipitur; sitis interdum urget, & dejectiones acres, ac biliosæ apparent.

Quod ad prognosin attinet, lenteria, & celiaca passio, diu perseverans, periculosa est, quia toti corpori nutrimentum subripit, unde atrophia, vel hydrops consequitur. Et si gravissimos acutissimosque morbos consequatur, lethalis ut plurimum esse consuevit.

Curatio hujus affectus pro varietate causarum illum producentium, varianda est. Ac primum qui ab humore pituitoso producitur, iis remediis curari poterit quæ pro inappetentia à frigida causa oriunda, fuerunt proposita: eligendo ea, quæ majori astringendi vi prædita sunt, ut ventris fluxum possint compescere.

Incipiendum itaque erit à purgatione humoris peccantis, medicamentis compositis ex aloë, rhab. & myrobal.

Clysteres hîc parùm conferunt, cum ventriculus præcipuè laboret; nisi immoderata dejectio accedens, ut in aliis alvi fluxibus; eos requirat. Tumque astringentes & roborantes esse debent, juxta formulas, quæ in sequentibus curationibus proponuntur.

Post sufficientem purgationem roborandus ventriculus opiat, pulveribus, fotibus, emplastris, aliisque remediis dicto loco propositis: in quibus, ut dictum est, adstringentia non erunt omittenda, ut mastiche, correx citri, fem. coriandri, rad. bistortæ, tormentillæ, corallia, &c.

Ac præter illa remedia conveniet opiata sequens ab Amato Lusitano maximè commendata, quæ senem quandam lentericum, post multa alia remedia frustra usurpata, liberatum esse refert.

℞. Conservæ ros. antiquæ ꝑ. vi. theriacæ opt. 3. vi. mivæ cydonior. quantum satis. Fiat opiata, de qua capiat 3. s. manè, nihil superbibendo.

Quæ sit ab humore bilioso, curanda erit iis remediis, quæ in diarrhœæ biliosæ curatione describuntur.

Quæ à retentricis facultatis imbecillitate oritur, in gravi & lethali, aut saltem valde periculoso morbo, curanda est primum fomentis, ventriculi regioni admotis, in hunc modum compositis.

℞. Rad. bistortæ, tormentillæ, & corticis citri sicci, ana Unc. ii. fol. menthæ, plantag. & absinthii pontici, ana M. i. nucis moschatæ, caryophyl. & cinam. ana 3. iii. ros. rubrar. P. iiii. Contundantur & incidantur, ut artis est, iisque impleantur duo sacculi interpuncti, qui macerentur in æquis partibus aquæ ferratæ, & vini rubri astringentis: vel in vino solo, si magna febris non adfuerit, & applicentur regioni ventriculi calidè per vices.

Postea admoveatur unguentum, vel emplastrum aliquod exiis, quæ pro vomitu bilioso proposita sunt.

Totus venter etiam oleis, vel linimentis astringentibus inungatur.

Clysteres injiciantur ex jusculo communi, in quo rosæ rubræ bullierint, dissolvendo saccharum & vitellos ovo-

rum: tum etiam interdum confectionem de hyacintho si æger sit valde debilis.

Ac denique per os roborantia & astringentia, in curatione vomitus proposita, exhiberi poterunt: tum etiam ea, quæ pro alvi fluxu proponuntur.

In celiaca passione alimenta cruda & imperfectè concocta per alvum rejiciuntur. Differt tantum à lenteria secundum magis & minus, iisdemque remediis profligatur.

Si verò omnino chylosæ sint dejectiones, non à vitio ventriculi, sed ab obstructione venarum mesaraicarum dependet hic affectus, qui satis frequens est, & infantibus præcipuè familiaris. Ideoque remediis obstructiones aperientibus curandus est, & hepar roborantibus, quia illius imbecillitas sæpe conjungitur, non autem adstringentibus nisi alia alvi fluxus species subsequatur. Horum materia in hepatis affectuum curationibus fusè describitur.

## CAPUT V.

### [De Diarrhœa.]

**D**iarrhœa est illa species alvi fluxus, quâ humores excrementitii sine sanguine aut alimento, & sine exulceratione intestinorum excernuntur.

Hiscæ conditionibus diarrhœa propriè dicta ab aliis alvi fluxus speciebus distinguitur: quia in lenteria & celiacâ passione alimentum incoctum, aut semiconfectum ejicitur: in dysenteria & tenesmo sanguis cum humoribus excrementitiis permiscetur, quemadmodum in fluxu hepatico & hæmorrhoidali sanguinolenta excretio reperitur.

Plurimæ sunt illius differentia, quæ ut dilucidè exponantur, ad tria capita referendæ sunt, quorum primum respicit materiam, quæ excernitur: secundum continet locum, à quo illa materia profluit: tertium verò modum & causam efficientem, quæ alvi fluxum producit.

Ratione materiæ, quæ excernitur, alvi fluxus dividitur in biliosum, pituitosum, melancholicum, & serosum.

Ratione loci, à quo humores profluunt, vel alvi fluxus provenit à toto corpore, vel ab aliqua parte peculiari, putà cerebro, ventriculo, intestinis, hepate, liene, mesenterio, utero, aliisque partibus.

Tertiò ratione modi, & causæ efficientis, alia diarrhœa est critica, alia symptomatica, alia à causa interna, ut intemperie, vel pravâ aliâ partium internarum diathesi; alia ab externâ, ut medicamento, aut veneno assumpto.

Istæ autem differentia simplices ut plurimum non reperiuntur, sed in uno eodemque alvi fluxu sæpè compllicantur. Sic alvi fluxus biliosus est ab hepate, vel toto corpore; pituitosus, à cerebro, aut ventriculo, melancholicus, à liene; serosus, à toto corpore.

Complicantur etiam ut plurimum istæ differentia varia humorum miscellâ: ita ut non rarò bilis, & pituita, & serosus humor, eodem alvi fluxu excernantur.

Est & alia diarrhœæ species, à prædictis diversa, quæ συληκτική, seu colliquativa nominatur; orta ex colliquatione substantiæ corporis & humorum, ab intensè calida partium solidarum intemperie: qualis contingit plerumque in viscerum inflammationibus, febre ardente intensiori; hecticâ, & pestilenti; in quibus materia pinguis, quasi adipe vel oleo perfusa, per alvum deijcitur.

Denique ad alvi fluxus species refertur fluxus stercorosus, in quo magna copia stercoris liquidi frequenter ejicitur, quæ ex cibis excrementitiis, in ventriculo corruptis, aut magna excrementorum copia, in intestinis cummulata, exoritur.

Diagnosin in genere manifesta est, quando scilicet per alvum deijciuntur excrementa liquidiora & frequentiora, quàm instituto naturæ conveniat.

Signa etiam differentiarum, quæ petuntur à materia, conspicua sunt; cum sensibus ipsis pateat, utrum excrementa biliosa, pituitosa, melancholica, vel serosa deijciantur.

Partes verò mandantes difficiliorem habent diagnosin, sed tamen ita distinguendæ sunt.

Si



Si à toto corpore humores profluunt, adest, vel præcessit febris continua, vel aliquis alius totius corporis affectus, ut cachexia, leucophlegmatia; vel ingestorum ciborum & potuum copia præcessit, & nullius partis peculiaris affectus innotescit.

Si autem critica sit illa diarrhoea, fit cum bonis ægri rebus ac facili tolerantia: & inde morbi solutio, aut maxima illius imminutio sequitur.

Contingit etiam interdum critica diarrhoea sine ullo morbo, in corporibus nonnullis, pravos humores cumulare solitis. Quæ cum robore insigni prædita sint, pravos illos humores, dum copiâ luxuriant & naturam gravant, per intervalla deponunt, ut docuit Gal. *meth. c. 11.* de quo alvi fluxu Celsus etiam mentionem facit *lib. 4. c. 16.* his verbis; *Una die fluere alvum, sæpe pro valetudine est; atque etiam pluribus, si febris absit, & intra septimam diem conquiescat. Purgatur enim corpus, & quod intus læsurum erat, utiliter effunditur.*

Inter criticos etiam referri debet alvi fluxus serosus, qui sine ullo morbo præcedente contingit hominibus, serum in venis plurimum redundat, indeque potissimum tempore autumnali; cum videlicet frigus autumnus nocturnum, vel matutinum, apertos ab æstate prægressa cutis & partium externarum meatus offendens, ac propterea sese altius in corpus insinuans, serosos humores in venis contentos exprimit ad inferiora, quos deinde natura, à nimia illorum copiâ gravata, per venas mesaraicas ad intestina protrudit, quamvis sæpissimè accidat eos per urinas excerni, unde contingit, multos in principio autumnus, & primis illius frigoribus, magnam urinarum copiam per aliquot dies profundere.

Si vero diarrhoea symptomatrica sit, magnam facit rem ægrotanti, vires plurimum dejicit, & morbus qui supervenit augetur, vel saltem in eodem statu perseverat.

Iste autem fluxus symptomatricus in febribus ardentibus & malignis sæpè sit colliquativus, & inde dignoscitur, quod excrementa oleo aut pinguedine perfusa appareant; tum corpus confestim emaciatur & absumitur, ac ferè in marasum deducitur.

Si à cerebro diarrhoea oriatur, dejectiones sunt spumosæ, ut docuit Hip. *Aph. 30. sect. 7.* Quod tamen non est perpetuum quandoquidem pituita potest à cerebro fluere citra flatuum permixtionem, quæ unica est spumositatis causa; tum etiam humoribus genitis aut contentis in ventriculo & intestinis possunt permisceri flatu, unde excrementa erunt spumosa, licet non à capite profluant. Ideò huic signo alia adjungenda sunt, nempe si cerebrum aliquo affectu manifesto laboret, ut catarrho, surditate, lethargo, apoplexia; aut insignis saltem capitis gravitas, aut dolor, aut somnolentia appareat, & noctu magis alvi fluxus, quam alio tempore fatiget.

Si à ventriculi vitio procedat alvi fluxus, signa aderunt, quæ vitiosam ventriculi coctionem demonstrare solent. Verbi gratiâ si alimenta corruptantur, recipiantque acrem & nidorosam qualitatem, ex qua deinde irritata facultas expultrix, cogatur ea per alvum expellere, tumque signa calidæ ventriculi intemperiei aderunt. Sicetiam, si cruda & pituitosa deiciantur, & tarda ac imminuta fuerit alimentorum concoctio, à frigida intemperie læsam ventriculi coctionem arguimus. Ac denique vitium in ventriculo residere cognoscimus, si æger antea pravis eduliis sese impleverit, quæ faciliè in ventriculo corrupti potuerint.

Ab intestinis procedit alvi fluxus præcipuè, cum illa lumbricis referta sunt, & tunc signa lumbricorum apparebunt, ex proprio capite desumenda.

Si ab hepate procedat alvi fluxus, dejectiones erunt biliosæ, quia bilis in hepate generatur, & signa calidæ intemperiei, inflammationis, obstructions, aut alterius cujusdam hepatis affectus apparebunt.

Si à liene diarrhoea procedat, dejectiones majori parte nigrae, aut ad nigrum vergentes erunt; in sinistro hypochondrio tensio, gravitas, aut dolor, & alia lienis laborantis signa conspiciuntur.

Si à mesenterio procedat, tensio vel dolor in illa parte

*Laz. Riverii Opera.*

apparebit: Verum humores in mesenterio collecti, ab hepate vel liene plerumque oriuntur.

Si ab utero procedat alvi fluxus suppressio mensium, vel symptomata affecti uteri aderunt, quæ magis sævire solent & præsertim alvi fluxus ingravescit, quo tempore menstrua fluere consueverunt.

Prognosis diarrhoeæ in hunc modum instituenda est.

Alvi fluxus, qui cum facili tolerantia contingit, & ex quo æger levamen aliquod percipit, bonus. Contra verò, qui laboriosus est ac vires dejicit, malus. Ille enim criticus censendus est, hic verò symptomatricus.

Alvi excrementa liquida, quæ in progressu morbi sensim crassescunt, bona. Virtutem enim bene operantem significant, quæ pravos humores concoquit, cum concoctio fiat incrassando.

Fluida alvi excrementa cum dolore, & laboriosa ac frequenti dejectione, mala. Significant enim maximam humorum acrimoniam, quæ intestina vehementer vellicat, stimulat, erodit.

Liquida dejectio, quæ non sentientibus effertur, valde mala. Aut enim errorem mentis & delirium significat; aut caloris nativi exsolutionem, quam sensus abolitio consequuta est.

Liquida dejectio, quæ cum morbo acuto incipit, & cum eodem perseverat, mala. Significat enim magnam materiæ morbificæ copiam, vel malignam qualitatem, quæ naturam cogit ad præcoccem istam diarrhoeam.

Si leucophlegmatia detento fortis diarrhoea supervenerit, malum solvit. Hipp. *Aph. 28. sect. 7.* Materiæ enim toto corpore restagnantis evacuatio fit. Id autem limitatione indiget. Vetus siquidem est Aphorismus, si talis alvi fluxus in morbi principio, adhuc constantibus viribus accidat: alioqui non morbum, sed ægrum de medio tollit.

Mulieri uterum gerenti, si alvus multum fluat, periculum est, ne abortiat. Hipp. *Aph. 14. sect. 5.* Alimenta enim foetus nutritioni necessaria per alvum majori parte excernuntur, & vires deiciuntur; tum vincula uterum continuo humorum in illas partes affluxu laxantur, tum foetus ac uterus tetro excrementorum continenter dejectionum vapore inficiuntur.

Alvi dejectiones vitellinae, virides, æruginosæ, lividae, nigrae, variegatae, aut valde foetidae, malae. Hæ dejectiones malae sunt propter eas rationes, quas de simili vomitu capite proprio retulimus.

Quod ad curationem spectat, cum diarrhoea symptomatrica plerumque oriatur ex pravis corruptisque humoribus biliosis, pituitosis, melancholicis, aut serosis & præcipuè biliosis, acrimoniam suam facultatem intestinum expultricem irritantibus; illius curatio ab humoris peccantis evacuatione auspicanda est: quod fiet medicamento, quod purgando stringit, ne humoribus commotis alvi fluxus nimium irritetur: & in similem modum continuari poterit.

℞. Rhab. elect. ʒ. i. myrobal. citrin. ʒ. β. santal. citrin. ʒ. β. Infundantur in aqua plantag. In expressione dissolve rhab. pulverati ʒ. β. syrupi rosat. ʒ. j. Fiat potio. Poterit addi catholicum, vel aliud medicamentum purgans, pro conditione humoris expurgandi.

• Vomitus etiam interdum convenire poterit, quia res vellit & evacuat materiam morbificam.

Si sanguis redundantis indicia fuerint & robur virium, phlebotomia initio celebranda est. Ac si febris adfuerit, sanguis detrahendus est, etiam si nulla plethora appareat.

Ante & post purgationem clysteres detergentes injiciendi sunt, quorum descriptio talis esse poterit.

℞. Hordei integri P. ii. surfuris macri & rosar. rubra. ana P. i. liquirit. rasæ & passul. integr. ana ʒ. i. Coquantur ad lb. i. In colatura dissolve sacchari alb. ʒ. i. vitellos ovor. n. ii. Fiat clyster.

Corpore sufficienter evacuato, tum medicamentis purgantibus, tum ipso alvi fluxu, astringentia & roborantia usurpanda erunt, tum per os assumenda, tum per clysterem injicienda, tum ventri admovenda: quorum formula à curatione dysenteriae erunt repetendae.



Præterea verò sequentia utiliter usurpari poterunt.

℥. Aceti chalybeati partem unam, aquæ chalybeat, partes duas, fol. & fructuum myrti, cydonior. mespilor. forborum, ana M. i. nucum cupressi part. vi. Coquantur ad medias. Colatura foveatur totus venter, tepide, frequenter.

℥. Ol. mastiches, cydonior. & myrtin. ana Unc. i. sang. dracon. thuris, gummitragacanth. ana 3. i. ceræ quantum satis. Fiat unguentum, illinendum post fotum. Vel

℥. Micæ panis assatæ, & in aceto chalybeato iusfæ, & carnis cydonior. sub cineribus coctorum, vel cydoniati, ana Unc. iii. thuris, mastiches, sang. drac. ana Drach. i. Cum syrupo de absynthio & cydonior. ana q. s. Fiat cataplasma.

℥. Mastiches 3. ii. Bulliant in ℥. iii. aquæ fontis pro potu ordinario. Præstat aqua ferrata, quia alvum turbat, sed in affectu calido non valet: in cujus curatione convenit tinctura rosarum, vel conserva rosar. cum aqua fontis permixta, vel aqua intinctionis auri, cum syrupo cydoniorum agitata.

Amatus Lusitanus refert quendam curatum diarrhœa biliosa largo frigidæ potu in æstate. Nos verò cuidam viro sanguineo, diarrhœa biliosa æstate media laboranti, cum siti intensâ, præscripsimus salem prunellæ in potu ordinario. Tum etiam julepos, cum aqua lactucæ & portulacæ, ter in die sumendos, & intra viginti quatuor horas curatus est.

Si humor fuerit valdè acer & adustus, parcius & mitioribus medicamentis purgandus est æger, alioqui affectus ingravescit; sed refrigerantibus & humectantibus temperandus est, tum etiam sanguine parçâ manu detracto.

In eodem casu plurimum confert semicupium tepidum, cujus exemplum habetur in observationibus nostris.

Folia plantaginis, in jusculis decocta, ad hunc affectum utilissima sunt.

Ne verò diarrhœa in dysenteriam transeat, ac demulcendam humoris acrimoniam, clysteres ex lacte chalybeato usurpandi sunt; tum etiam emulsiones ex seminibus frig. maj. & sem. papay. albi.

Ad eandem diarrhœam biliosam syrupus sequens erit convenientissimus.

℥. Succu cydonior. Unc. vi. succi endiviæ & acetosæ, an. Unc. iii. sem. acetosæ, & plantag. ana Drach. ii. coral. rubr. 3. i. aquæ plantag. 3. iv. Coquantur ad mediæ partis consumptionem. Colentur & forriter exprimantur. Adde sacchari parem colaturæ quantitatem, fiat syrupus, de quo capiat Drach. ii. manè & sero.

In omni autem diarrhœa, præmissis universalibus, bolus sequens usurpari poterit.

Conservæ rosar. antiquæ 3. 6. cydonior. condit. 3. i. pulveris tormentillæ 3. i. boli armeni 3. 6. cum saccharo q. s. Fiat bolus frequenter iterandus. Vel si affectus sit diuturnior, ex iisdem aut similibus, majori quantitate præscriptis opiata concinnari poterit, ad plures doses sumenda.

Vel ad potentiùs adstringendum utatur æger pulvere sequenti.

℥. Sang. drach. thuris, mastich. mumix, terræ sigill. lapidis hæmatit. trochisc. de carabe, ana Drach. i. boli arm. veri Drach. iii. Fiat pulvis, de quo capiat 3. ii. cum liquore idoneo.

Rhab. bis infusum, & postea aqua rosar. lotum bis aut ter, & exsiccatum, utile.

Tabellæ triafantali, quadruplicato rheo, bis in die exhibitæ, pondere Drach. ii. alvi fluxus materiam auferunt, & viscera corroborant.

Coryzæ (*Pulicariæ*) folia super prunas injecta, ut fumus in cathedra perforata recipiatur, specificâ vi alvi fluxui medentur. Tum si eadem herba, cum aceto trita, regioni stomachi admoveatur.

Suffitus etiam thapsi barbati in cathedra perforata receptus, insignis est efficacix, cujus exemplum habetur in observationibus nostris.

Syrupus corallorum ad diem est efficax, & multò magis illius tinctura, vel magisterium.

Conserva cynorrhoidi per se ad diarrhœam biliosam utilissima est: tum etiam si opiata astringentibus permisceatur.

Ubi verò ex fluxu frequentiori & aciori periculum est ne vires deficient, laudanum opiatum cum mastiche & terra sigillata utiliter exhibetur.

In contumaci alvi fluxu clyster ex jusculo & theriaca recenti utilis.

Pilulæ de bdellio bis aut ter in septimana, vel alternis diebus usurpatæ, ad diuturnos & contumaces alvi fluxus sistendos utilissimæ sunt.

Ad idem valet mespilorum usus frequens, ut se experientiâ comprobasse testatur Forestus *observ. 1. lib. 22.* his verbis: *Quidam diuturno alvi fluxu laborabat, & omnem suam substantiam frustra in Medicorum ope consumpserat: consilii causâ, ut ab hoc malo liberari posset, ad me accessit. Cui consilium dedi, ut mespila etiam immatura in maxima copia devoraret. Quibus comestis, alvi profluvium paucis diebus cessavit. Uti & cuidam evenit mercatori Zelando, ad Joannem Spirinchium, quendam Medicum Lovaniensem celebriorem profecto, ut ab eo curaretur. Qui cum multis mensibus laborasset profluvio, & tandem etiam dysenteria, neque ab ullis Medicis curari posset: tandem mespilis comestis, ex ejusdem Medici consilio, sanitatem consequutus est, & Medico trecentos aureos, pro sola mespilorum præscriptione numeravit, quibus solis in pristinam sanitatem fuerat restitutus. Hæc Forestus.*

Verum advertendum est, ut ante mespilorum usum corpus ab excrementis & omni cacochoymia liberum præstetur.

In diarrhœa inveterata sequentia utilissima sunt.

℥. Raf. eboris 3. iii. confect. alkerm. 3. i. sacchari aqua ros. dissoluti Unc. iv. Fiant tabellæ.

℥. Croci martis reverberati g. vi. bezoard. miner. 3. 6. conservæ ros. 3. ii. spirit. vitr. gut. iii. Misce, fiat bolus, qui detur bis in die, longè à pastu.

℥. Succu persicariæ maculatæ, & sempervivi maj. an. 3. iii. bulliant ad tertiæ partis consump. & dentur manè. Certè curant quemlibet fluxum, quantumvis inveteratum.

Mercurius diaphoreticus per aliquot dies ad gr. xii. exhibitus, omnes corporis impuritates aufert, quæ contumaces interdum alvi fluxus parere consueverunt.

Decoctum granorum juniperi, in vino paratum, per triduum exhibitum, multum confert. Tum pulvis cicadatum, cum vino albo exhibitus, ad Drach. i. Hæc duo conferunt materiam alvi fluxum committentem derivando ad urinæ vias. Paratur autem decoctum juniperi in sequentem modum.

℥. Granor. juniperi M. i. vini rubri ℥. i. 6. Bulliant ad duarum partium consumptionem, colaturam capiet manè per triduum.

Potus aquarum sulphurearum, totum corpus expurgando, & ventriculum roborando, inveteratam diarrhœam curat. Cujus rei exemplum habetur in observationibus nostris.

Si diarrhœa fiat à catarrho, cerebro prospiciendum est velut parti mandanti, iis remediis, quæ in catarrhi curatione proposita sunt. Si verò pendeat ab hepatis, aut lienis obstructione, vel imbecillitate, illis affectibus mederi oportebit, prout in peculiaribus eorum curationibus docebitur: tumque astringentium medicamentorum usus nullus, aut parçissimus esse debet. Platerus in cura hæmorrhoidum, dicit sanguinem calentem injectum mirabiliter alvum fluentem cohibere.

## CAPUT VI.

### De Dysenteria.

**D**ysenteria est frequens & cruenta alvi dejectio, cum ventris dolore ac torminibus, ab intestinorum ulceratione dependens.

Dysenterix nomen apud veteres plerumque sumitur communiter pro omni cruenta alvi dejectione: strictè tamen & propriè eam tantum alvi fluxus sanguinolenti speciem significat, quæ ab ulcere intestinorum exoritur.

Gal.



Gal. 3. de *symptom. caus. cap. 1.* quatuor cruentæ dejectionis species proponit, quibus etiam dyfenteria nomen communiter usurpatum tribuitur.

Prima est, quando propter aliquam partem præcisam corporis, aut intermissam aliquam exercitationem, aut sanguinis evacuationem per alias partes, puta nares, vel iterum suppressam, sanguinis copia luxurians, per vasa mesaraica ad intestina detruditur, & per alvum evacuat.

Secunda est, quando propter jecoris imbecillitatem sanguis aquosus, & loturæ carniū similis excernitur, quod in fluxu hepatico contingit, de quo infra tractabimus.

Tertia est, quando sanguis melancholicus & splendens ejicitur, qui propter nimiam moram in hepate aut liene ustionem concepit, & cum humore melancholico permixtus est. Splendor ustionem significat, quandoquidem sanguis, qui ex refrigeratione nigrescit, splendorem non habet, imò verò eum, quem prius habebat, amittit.

Quarta est, ubi brevibus quibusdam intervallis ægri cum humoribus & excrementis sanguinem rejiciunt, cui interdum puris aliquid admixtum est, idque cum dolore & torminibus, quibus intestinorum ulcus arguitur. Et hæc est propriè dicta dyfenteria, de qua tantum hic agimus.

Causæ internæ dyfenteriam efficientes, sunt humores acres & exulcerantes, ut bilis flava, porracea, æruginosa, & atra; tum etiam pituita falsa, ab intenso calore genita, vel putredinem in ventre aut falsedinem adepta, & ad intestina delata, ubi propter lentorem diutius hærens, assidue detergendo, tandem exulcerat.

Hinc dubium non leve proponitur ab autoribus, quomodo bilis flava interdum brevi temporis spatio dyfenteriam faciat, cum tamen non raro bilis porracea & æruginosa simplicem faciant diarrhoeam, ad longum tempus perdurantem, quæ tamen nunquam in dyfenteriam degenerat: cum bilis porracea & æruginosa ex flava generentur ulteriori adustione, & proinde majorem habeant acrimoniam.

Respondet Mercatus, cum humorum acrimonia requiri lentorem, & visciditatem, cujus ratione diutius morentur in intestinis, eaque magis corrodant. Et ita si flava bilis lentorem habeat, dyfenteriam efficit: contra verò, si porracea & æruginosa fluidior sit, & minorem in intestinis moram faciat, simplicem producet diarrhoeam. Sennertus hanc responsionem probabilem esse dicit, eam tamen omnino dubium non solvere existimat, quod sæpe alvi fluxus dentur, in quibus visciditas & lentor cum acrimonia reperiuntur, & tamen dyfenteria non excitatur. Contra verò visciditas & lentor sæpe non adsunt in biliosis humoribus, dyfenteriam excitantibus, ideò censet humores, qui dyfenteriam pariunt, peculiarem & occultam quandam qualitatem habere, quæ peculiariter intestinis insensum sunt, eaque exulcerant, sicut lepus marinus pulmonem, & cantharides vesicam exulcerant, non autem alias partes. Illam verò qualitatem malignam & intestinis ut plurimum insensam probat ex eo, quod dyfenteria plerumque contagiosa sit, ita ut miasmata ex dejectionibus in dyfenteria exhalantia, sola intestina afficiant iis, qui contagium recipiunt, non autem alias partes. Idem contingit in aliis morbis epidemicis & contagiosis, in quibus venenum grassatur parti cuidam peculiari insensum. Sic dantur pleuritides & peripneumoniae, & anginae pestilentes. Sic venenum canis rabidi soli cerebro insensum est. Id apertius in medicamentis purgantibus videre est, quæ peculiarem vim obtinent, humores in corpore commovendi, & ad intestina propellendi. Cum enim illa, non solum ore sumpta, sed etiam umbilico admota, imò vapore ipsum naribus attracto, alvum movere & purgare soleant, verisimile est, illa per poros cutis, & vasorum extremitates penetrantia, agitationem quandam & fermentationem in humoribus excitare, quæ vitiosi humores à bonis separantur, & ii deinceps, naturam stimulantem ad intestina propelluntur, vi medicamenti ad ea loca expulsionem dirigentis. Parietiam ratione, sed modo diverso, sudorifica ad cutem, & diuretica ad vesicam insita vi humores propellunt. Ex quibus licet colligere, conta-

gium dyfentericum, quoquo modo & loco intra corpus admissum, fermentationem quandam in humoribus excitare, & sibi similem dispositionem imprimere, quæ intestinis inimica, ad ea cursum humorum promovet, eaque labefactat atque exulcerat, & illa demum, tali dispositione infecta, humores & alimenta inficiunt, unde vera & propriè dicta dyfenteria emergit.

Quæritur etiam apud autores, quidnam sit illud mucosum, & album, quod magnâ copiam plerumque in dyfenteria excernitur cum sanguine, aliisque humoribus permixtum. Quidam putant esse pinguedinem intestinorum abrasam: alii mucum, quo intestina oblinuntur ad faciliorem transitum excrementorum: alii pituitam à cerebro aliisque partibus defluentem: alii pus ex visceribus manans. Nos verò statuimus, hæc mucosam substantiam nihil aliud esse, quam intestinorum excrementum præternaturale. Intestina siquidem labefactata, & à naturali constitutione dejecta, proprium alimentum ritè convertere nequeunt in suam substantiam, sed illud imperfectè assimilando, in mucosam illam substantiam commutant, quæ cum nutritioni illarum partium inepta sit, expellitur foras, & pars demum nutritionis indiget, novum attrahit alimentum, quod denuò cum perfectè transmutari non possit, ob vitium partis in substantiam illam heterogeneam mucosam convertitur, cujus magnus est proventus, quoniam pars ad sui nutritionem continuò sanguinem attrahit à venis, qui in mucosam substantiam convertitur, atque adeò pars, suo genio fraudata, novum iterum attrahit sanguinem ad sui nutritionem, quam perpetuò intendit, qui cum propter depravatam homojosin in prædictam substantiam commutetur, magnus sit mucosi illius excrementi proventus. Idem in quamplurimis aliis partibus contingit, & præsertim in iis, quæ magna & profunda ulcera patiuntur. Pars siquidem ulcerata cum ob pravam diathesin probe nutriri nequeat, sanguinem continuò attrahit à venis, qui in purulentam substantiam commutatur, unde totum corpus sensim exhauritur, & tandem contabescit. Neque solum partibus ulceratis hoc vitium contingit, sed etiam aliis, nullo ulcere aut abscessu affectis, ita ut licet excrementum prædictum puris naturam æmuletur, non sit tamen verum pus, quod non nisi ex ulcere vel abscessu procedit. Id præcipue apparet in ophthalmia, in qua oculus simpliciter inflammatione affectus, copiosum excrementum puri simile continuò emittit, quod ex sola partis intemperie & depravata homojosi procedit. Idem contingit sæpe asthmaticis & aliis, qui pulmonum affectibus laborant. Eorum enim pulmones, malè affecti, proprium alimentum malè concoquant, & in excrementum pituitosum, atque interdum puri simile convertunt, quod per anacatharsin expellitur, & tamen nullum ulcus est in pulmone, quod multi Medici etiam periti statim pronuntiant, conspectâ illâ materiâ, puris speciem referente.

Causæ externæ dyfenteria sunt, quæcumque humores acres & vitiosos generare possunt, vel jam genitis parvam illam dispositionem, dyfenteria excitandæ idoneam, inducere. Inter illas primum locum tenent cibi acriores, vel putredini valde obnoxii, ut fructus horarii, & alii omnes, qui non satis mutati devorantur. Idem præstant aquæ valde crudæ, aut minerali aliquo infectæ, in potu ordinario usurpatæ, tum etiam medicamenta assumpta, deleteriâ qualitate prædita.

Prava etiam aeris dispositio ad dyfenteriam efficiendam maximè efficax est. Sic Hip. dicit *Aph. 11. sect. 3.* si hyems plus justo frigidior & siccior extiterit, ver autem pluviosum & austrinum, æstate futuras esse dyfenterias. Et *Aph. 12.* ejusdem sectionis, si hyems admodum austrina fuerit & pluviosa, ver autem siccum & aquilonium, dyfenteria producendæ tempestates illas esse maximè idoneas.

Peculiare etiam aeris vitium, dyfenteria generandæ idoneum, reperitur in epidemica dyfenteria, quæ aliquando pestilens est, ac valde perniciofa, aliquando verò minus infert periculum, & ex qua ut plurimum ægrotantes evadunt. Ad hanc etiam classem revocandum est contagium, quod ab ægrotantium excrementis exhalat, & suam sapè labem adstantibus communicat. Imò verò, si talia excre-



menta in latrinas effundantur, multos ejusdem familiæ inficere solent.

Signa dysentericiæ diagnostica ex definitione ab initio proposita faciliè eliciuntur. Adest enim frequens & cruenta defecatio, cum dolore & torminibus ventris. His accedunt plerumque febris, vigiliæ, sitis, fastidium cibi, & alia multis morbis communia.

Quænam verò intestina, tenuia nimirum, an crassa, ulcere afficiantur, dignoscere difficilior est. Vulgò dicitur, si dolor sit supra umbilicum, tenuia intestina affici: si verò infra, crassa maximè laborare. Quod tamen rationi manifestè repugnat, cum & tenuia & crassa intestina ad partem superiorem & inferiorem circumagantur. Melius igitur elicietur ista diagnosi ex qualitate doloris, & iis quæ excernuntur. Si enim tenuia intestina affecta sint, dolor est acutissimus, ut ægri aciculis compungi videantur; quia tenuia intestina magis membranosa sunt, & sensu exquisitiori prædita. Deinde alvus statim post tormina & dolores non deponit, ac denique sanguis stercoribus omnibus permixtus est. Cum enim via à superioribus intestinis ad anum longior sit; sanguis & purulenta materia, antequam per alvum excernantur, in longiore itinere magis stercoribus permiscetur. Si verò intestina crassa afficiantur, dolor est minùs vellemens & diuturnus, à torminibus & cruciatu ventris statim fit excretio, cruor, & purulenta materia alvi excrementis supernatant, aut parum permixta apparent. In majori exulceratione veluti carunculæ excernuntur.

Signa causerum ab excrementorum colore præsertim desumuntur, quatenus illa citrina flava, viridia, albicantia, vel atra conspiciuntur. Quibus adjungenda sunt signa abundantiam in corpore humorum, quæ ab ætate, temperamento, anni tempore, & vitæ genere desumuntur.

Prognosis hujus affectus in hunc modum instituenda est. Si tenuia intestina exulcerentur, majus est periculum; substantiâ enim pollent magis nervosâ, & hepatis viciniora bilem sinceriorem recipiunt.

Dysenteria ab atra bile proveniens lethalis est. Hip. *Aph. 24. sect. 4.* qui tale ulcus ad canceri naturam accedit, qui etiam in externis corporis partibus rarò curationem admittit. Si tamen per crîsim excreta atra bilis dysenteriam movit, adeò periculosa non est. Cavendum tamen hic est, ne sanguis concretus, aut diutius retentus pro atra bile accipiat.

Dysenteria à flava bile aut cibis acerbis proveniens faciliè curabilis est.

Apituita falsa dysenteria veniens, crudelior, & contumacior est, quàm quæ à flava bile: quia propter lentorem diutius intestinis hærens, gravius affligit, & magis exulcerat.

In longis difficultatibus intestinorum cibi fastidium, malum, & cum febre pejus. Hip. *Aph. 3. sect. 6.*

Si dysenteria detento veluti carunculæ deiciantur, mortiferum. *Aph. 26. sect. 4.* profundum enim ulcus significat, quod intestini particulas abradit.

Vigiliæ immodicæ, defectiones sinceræ, nigræ, foetidæ, sanguinis excretio copiosa superveniens lienteria, singultus, vomitus biliosus, jecoris & præcordiorum dolor, sitis intensior, lethalem ut plurimum dysenteriam prænuntiant.

Podagricis, & lienosis superveniens dysenteria, bonum. Hip. *Prog. & Aph. 46. sect. 6.* hæc tamen dysenteria talis revera non est; sed potius ad simplicem diarrhœam referenda: quæ materiam morbificam, illos morbos producentem, evacuat.

Senes & pueri hoc morbo sæpius pereunt, quàm in mediâ ætate constituti. Hip. *2. progn.* Pueri quidem, quia citò dissolvuntur ob mollitiem, tum quia præceptis minùs obtemperant: senes verò quia viribus sunt exhausti, & quia magna status naturalis everfi significatur. Talia siquidem excrementa, dysentericiæ producendæ, idonea, non faciliè gignunt.

Curatio hujus affectus perficitur medicamentis humores acres lenientibus, abstergentibus, evacuantibus, ulcus consolidantibus, fluxumque constringentibus.

Humoris peccantis evacuatio statim ab initio molienda est, ut citò educatur, antequam gravius lædat: imò

verò repetenda, donec magna ex parte sublatus sit.

Et si tutum non videatur, singulis, vel alienis diebus purgare, fieri potest tertio, vel quarto quoque die. Huic usui cæteris præstat medicamentis rhabarbarum, vel in substantia cum jusculo usurpatum, vel in potionis formam, ut in diarrhœæ curatione dictum: vel in sequentem modum redactum.

4. Fol. plantag. M. ß. liquirit. ras. & passul. integr. an. Drach. iii. rosar. rubr. P. i. tamarind. Drach. vi. corticis myrobal. citrin. ol. amygd. dulc. confricat. Drach. ii. Coquantur ad Unc. iii. In colatura dissolve rhab. in aqua plantag. cum spica infusi, Drach. i. syrup. cydonior. 3. i. Fiat potio. Vel

4. Tamarindor. Unc. sem. myrobolan. citrin. Drach. ii. Coque in aqua hordei & plantag. In colatura infunde rhab. Drach. i. sem. Santal. citrin. 9. ß. Colaturæ Unc. iv. adde syrupi rosar. solut. Unc. i. Fiat potio.

Commendatur à nonnullis decoctum myrobal. in plures doses exhibitum, hoc modo paratum.

4. Corticum myrobal. chebulor. Drach. x. citrin. 3. v. passular. minor. Unc. ii. Coque omnia in aqua Unc. xxvi. ad consumptionem tertiæ partis. Postea colentur. Adde colaturæ sacchari Drach. x. Clarificetur, aromatizando cinam. Unc. sem.

Penotus sequentem potionem laudat, tanquam singulare remedium ad dysenteriam, & diarrhœam desperaram.

4. Corticis guaiaci contriti Unc. ii. Bulliant in sufficienti quantitate aquæ ad medias, cui impone rosar. rubr. balauft. sem. plantag. an. Drach. ii. Bulliant per horam. Deinde colaturæ adde rhab. pulverat. Drach. i. (ii) cathol. Drach. iii. Fiat potio.

Quamplurimi prælici rhab. torrefactum exhibent, ut vis purgans ex parte auferatur. Sed Amatus Lusitanus secundam rhabarbari infusionem usurpat, dicitque, primâ infusione omnem ejus acrimoniam auferri, & melius esse hoc modo usurpatum, quàm torrefactum: illa enim torrefactione empyreuma acquirere non pauci existimant. Præparatio autem talis est.

4. Rhab. elect. Drach. i. sem. Infundatur in aqua plantag. 3. iii. per aliquo horas. Colentur & leviter exprimantur, iterumque infundantur in novâ aqua plantag. Unc. iii. In expressione dissolve cassiæ recentè extractæ Unc. sem. Fiat potio.

Si propter humorum crudorum copiam magis purgare est animus, syrupus rosaceus, Elect. cotholic. aliaque mitiora admiscenda sunt, abstinendo à vehementioribus.

Vomitum aliquando convenire potest, si æger sit nauseabundus, & humores in ventriculo restagnare videantur: fit enim revulsio à parte affecta. Quod disertè innuit Amatus Lusitanus curat. 34. cent. 2. in scholia, his verbis: *Si ad intestina corripantem biliosum & acrem humorem, dysenteriam gignentem, Medicus per superiora retrahere posset & eum per vomitum vacuare, dubio procul ineptum esset, & contra Galeni præcepta libro artis Medicinalis & methodi suæ curativæ, per intestina ulceribus scatentia materiam ducere. At cum hæc Medicus non sic assequi possit, tamen si tentare pro ulceribus debeat, consequens medicamentis purgatoriis id efficiat, præsertim rhabarbaro.* Illud ipsum docuerat Hipp. *Aphor. 15. sect. 6.* A longo alvi profluvio habito, spontaneus vomitus superveniens, morbum solvit Galen. verò in com. hujus *Aph.* Hoc, inquit, exemplum eorum esse numero, quæ rectè fiunt à natura, quæ Medicum imitari oportet. Idem confirmat Mercatus, his verbis: *Alio humores transferes, sanguine misso, si opus fuerit, item expurganti pharmaco exhibito, vel vomitibus, maxime in falsa pituita. Nam hac una diuturnas dysenterias curari conspeximus.* Angelus Sala in dysenteria sequens præscribit vomitorium.

4. Sal. vitriol. 3. ß. vel Drach. i. syrup. cydon. & aq. beton. an. 3. i. aq. cinam. Drach. x. Misce & propina.

De phlebotomia in hoc affectu magna est dissensio inter auctores. At peritorum sententia est præsentè febre, & intestinorum inflammatione (quæ non rarò ulceri copulata est) debere celebrari eam in principio morbi, antequam vires ab alvi profluvio diuturniori fuerint attritæ:

sic



fic enim fit revulfio sanguinis, & humorum acriorum, ad intestina profluentium. Imò verò Valefcus de Larenta, & Amatus Lusitanus in antiqua dyfenteria sanguinem detrahunt. *Valde senex*, inquit Valefcus, *dyfenteria tribus jam mensibus miserè torquebatur. Vocatus in consilium, reluctans omnibus aliis Medicis, jussi venam aperire. Mox convaluit.* Amatus verò sic habet: *Ad virum illum, qui dyfenteriam diuturnam, & fortè triginta dierum, ingenti cum febre patiebatur, & post multa ac varia adhibita remedia, imbecillis & gracilis erat factus, perseverante etiam fluxu ventris multo cum sanguine, Medicus cordatus ingressus est, qui sanguinem ex basilica dextri brachii extraxit. Sed quanto juvamine, audite. Illicò, mirum dictu, sanguis cohibitus fuit, perseverante adhuc fluxu ventris. Caterum saccharo rosaceo ad aliquot dies, & nonnullis ingestis clysteribus, ac topicis astringentibus remediis applicitis, alvus in totum restricta est.*

Interim varii injiciuntur clysteres, primùm lenientes & detergentes; postea verò glutinantes & adstringentes. Non rarò autem uni eidemque clysteri omnes prædictæ indicationes permiscuntur, aut earum plures.

Clysteres lenientes & anodynî parantur ex lacte, vel solo, vel cum vitellis ovor. n. ii. aut iii. vel mucilag. seminis psylli & cidonior. Unc. iv. vel ad simul astringendum, cum sacchari aut mellis rosacei Unc. i. vel ad glutinandum, cum sevi hircini recentis Unc. ß. aut ferro, auro, vel silicibus ignitis in lacte extinctis, ut serosa illius portio absumatur, sicque glutinosum magis evadat.

In lactis verò defectu, lac. amygd. dulc. vel cremor. hord. seu oryzæ, quem oryzogalon vocant, sola vel invicem mixta, tum etiam jusculum vervecis, pulli, aut caponis, vel capitis & intestinorum vervecis, usurpari poterunt, iisque reliqua permisceri. Vulgare autem est, rosas, & caudam equinam (*equisetum*) cum capite vervecis decoquere. Vel decoctum sequens erit præscribendum.

℞. Rad. alth. Unc. i. hord. mundat. vel oryzæ P. i. sem. lini, & cydonior. ana ʒ. i. Sem. psyllii, Drach. sem. flor. cham. P. i. Fiat decoctio in lacte vel jusculo, addendo sebum, vitellos, & alia præscripta.

Vel fieri potest ex lacte solo, cum rad. alth. decocto in principio ad tergendum & dolorem demulcendum.

Dolore admodum urgente, narcotica interdum dictis clysteribus admiscenda sunt, ut philonii Persici Drach. i. vel ii. pilul. de cynogloss. ʒ. i. vel ii. syrup. de papav. Unc. i. sem. laudani opiatigr. v. vel vi. (*N. B. doses nimias esse.*)

Si inflammatio intestina obsidere videatur, quod ex dolore ventris continuo, & contrectando sese exasperante; tum etiam febre, ac linguæ siccitate dignosci poterit; iteretur phlebotomia; clysteres injiciantur ex aqua rosarum, in qua sal Saturni dissolutum fuerit, & venter oxycrato foveatur.

Idem Sal Saturni per os exhiberi poterit ad gr. x. cum conserva rosarum.

Clysteres detergentes fiunt ex decocto hordei, fursur. macri, ros. rub. cum saccharo, aut melle rosaceo.

Ad majorem verò deterfionem, & ulceris glutinationem addi poterit terebinthinæ ʒ. ß. cum vitello ovi dissoluta. In fordioribus ulceribus ad fortiora interdum detergentia erit confugiendum, ut betam & parietariam, in prædicto decocto usurpanda. Fortissima verò sunt centauryum, absinthium, gentiana, muria ex Gal. 12. meth. 1. c. & similia, quorum usus hoc tempore rarissimus est, propter dolores, qui graviore multo solent evadere.

Zacutus Lusitanus esse uti arsenico, cum felicitamen successe, ut videre est *observ. 18. lib. 2. Praxis Medicæ admirandæ*: fides sit apud Aut.

Chymici nonnulli oleum ceræ in clysteribus dissolvunt ad Drach. i. eoque ventrem inungunt.

Ad ulcus glutinandum, clysteres primò leniter siccantes & parum astringentes convenient, ad eos postmodum descendendo, qui majori siccandi, astringendique vi præditi sunt. Atque ita fient primùm ex lacte chalybeato, in quo rosæ decoctæ sint, vel ex decocto hordei, aut oryzæ torrefactæ, & rosar. rubr. P. i. addendo utrique clysteri interdum vitellos ovor. leviter assos, n. ii. aliquando

& mel. rosac. & cum magis operari vis, succi plantag. Unc. i.

Ad magis astringendum & glutinandum, in hunc modum parabitur.

℞. Radic. consolid. maj. & tapsi barbati, ana Un. i. Fol. plantag. consolid. ana M. i. rosar. rubr. hord. torrefacti, an. P. myrtillor. Drach. ii. Fiat decoctio in aqua cisternæ. In colaturæ ʒb. i. dissolve mellis rosac. ʒ. i. album. ovi. n. i. vel mucilag. gummi tragacanth. Unc. sevi hircini Unc. i. ß. succi millefolli vel Polygoni Unc. i. Fiat clyster. Vel

℞. Rad. bistort. vel tormentil. Unc. sem. rad. consol. maj. Unc. i. sol. burs. pastor. i. polygon. equiseti, pilosell. an. M. balauft. calycum glandium, nucum cupressi, an. Drach. ii. oryzæ tostæ P. i. Fiat decoctio in aqua fabrorum. In colat. ʒb. i. dissolve succi plantag. Unc. ii. vitellos ovor. assos n. ii. Fiat clyster.

Angelus Sala mirum in modum commendat clysterem sequentem.

℞. Caput vervecis per medium sectum, decoquatur donec caro ab ossibus separetur. Juri colato adde summit. hyperici M. ii. val iii. Rad. tormentill. crassomodo contusæ Unc. ii. infunde per 3. vel 4. horas supra cineres calidos. Colatura bis, terve in clysteris formam injiciatur.

Succus plantag. solus, vel lacte, & decocto hordei contemperatus, utiliter injicitur.

Gummi tragacanth. Drach. ii. vel hujus gummi in aqua pediculi rosar. & plantag. clysteribus utiliter permiscetur, cum succo plantag. etiam addito sevo hircino, efficacissimum enema componet. Loco tragacanthæ aut etiam cum illa, utiliter usurpari poterunt gummi arabicum, thus, mastiche, sarcocolla. Quæ omnia, in prædictis liquoribus soluta, glutinando operantur, nec ut valde adstringentia ulcus exasperant. Amatus Lusitanus valdè probat clysteres ex Emplastice prædictis paratos, quia internam intestinorum superficiem, contra fluentis materiæ morsum, crustæ instar obducunt, eosque ita componit.

℞. Aquæ hord. Unc. x. album. ovi optimè concussum n. i. gummi Arabici, adipis caprini, an. Unc. sem. ol. rosac. Unc. ii. bol. armen. & gum. tragacanth. an. Drach. i. Misce, fiat clyster.

At ne clysteres isti emplastici suo lentore acres materias, tanquam carcere retentas, intestinis affigant, ad clysteres detergentes deveniendum est qui non diu retinendi, tum etiam clysteribus adstringentibus detergentes identidem interjiciendi sunt.

Clysteribus adstringentibus utiliter admisceri poterunt acacia, hypocistis, sanguis draconis, lapidis hæmatitis succus rubeus, lævigatione cum aqua rosar. vel plantag. elicitus, bol. armen. terra sigill. trochisc. de succino, albi Rhafis ad ʒ. vel ii. Alii verò pulveres, qui à nonnullis præscribuntur, noxii potius sunt; cum in liquore subsideant, partemque vellicando irritent.

Imò verò satius est, etiam prædictos pulveres liquori vel decocto infundere, & factâ colaturâ injicere.

Dum clysteres injiciuntur, medicamenta, iisdem viribus prædita, per os exhibenda sunt, idque multò frequentius, quando superiora intestina ulcerata sunt, ad quæ clysterum materia pervenire nequit.

Lac caprinum, ubi magis detergere; vaccinum ubi magis glutinare est animus, cum saccharo rosac. utiliter exhibetur, modò febris absit. At chalybeatum efficacius conglutinat: illius ʒ. iii. cum succi plantag. & sacch. rosac. ana ʒ. i. præstans efficiunt medicamentum. Vel symphyti majoris radix in lacte chalybeato utiliter decoquitur, & exhibetur.

Vel fiat panis ex subtilissima & purissima hordei farina cum vitellis ovorum. Coquatur in forno post extractionem panis. Micas ejus lacti saccharato immisce, ad puliculæ consistentiam, de qua æger capiat cochlear. v. vel vi. bis aut ter in die.

Jusculum carnis vitulinæ, optimè & diu coctæ ulcerum dolores lenit.

Cremor oryzæ mundæ benè coctæ, ulcera consolidat. Refert



Refert Lertius in sua historia, multos dysentericos in longinqua navigatione fame propemodum enectos, oryza in lacte decocta, additis vitellis ovor. & succo hederæ terreftris, fuisse restitutos.

In lacte etiam amygdalino oryza poterit decoqui, & utrumque lac prius auro ustulari.

Hordei verò cremor cum saccharo paratus detergit & refrigerat.

Jusculum ex decocto pimpinellæ cum butyro paratum & per triduum exhibitum, manè & serò, dysentericæ curationem mirabiliter promovet: idque magis, si ejusdem decoctum eodem tempore pro potu ordinario exhibeatur.

Cortices duorum aurantiorum subviridium, in lb. viii. aquæ decocti, pro potu ordinario, curationē accelerant.

Rasuræ cranii humani Drach. i. bis aut ter exhibita cum jusculo, aut alio liquore idoneo, dysentericæ curationem citissimè absolvit.

Mucilaginis gummi tragacanthæ extractæ cum aq. rosar. cochlear. ii. vel gum. arab. Drach. sem. in singulis jusculis panatellis utiliter dissolvitur, tum etiam gelatinæ cornu cervi cochlear. i.

Tandem decocta adstringentia ad integram sanationem corpore benè evacuato, exhiberi poterunt. Quæ fient ex rad. bistortæ, tormentillæ, symphyti, fol. plantag. millefol. bursæ past. equiseti, pilosellæ, agrimonii, sem. plantag. acetosæ, sumach. vinaceorum, rosæ rubris, &c. in quo cisternæ, dissolvendo syrup. cydonior. myrtin. aut de ros. siccis; tum etiam interdum acaciam, hypocist. bolum armenam, aut spodium addendo.

Succus cydoniorum coctus sine additione ad consistentiam syrupi, vel rob. & ad cochleare i. vel i. frequenter exhibitus valdè prodest. Similes succi ex pyris, cornis, aliisque fructibus autleris parari possunt.

Intestina vervecis pinguis decoquantur in olla, donec jusculum redeat ad mediam scutellam, huic adde olei dulcis parem quantitatem, capiat æger per eos. Dysentericæ non valde contumacem, una vel altera exhibitione sistit.

Idem præstant oleum amygd. & aqua rosarum, pari quantitate exhibita.

Vitelli quoque ovorum indurati & in aqua rosarum dissoluti instar panatellæ condiantur saccharo, & pauca nuce moschata, & bis aut ter exhibeantur.

Succus plantag. crudus ad Unc. iii. vel iv. exhibitus solus, vel cum aliis permixtus, præstantissimus: & si inflammatio adfuerit, eam compescit.

Testatur Hollerius, hederæ terrestris succum propinatum plurimos à morte liberasse.

Julepi ex aquis, vel decoctis, & syrupis astringentibus, frequenter etiam exhibendi.

Syrupus corallorum, tinctura, & magisterium huic affectui sunt valdè idonea, quibus utatur æger ex cochleari frequenter, vel syrupis sequentibus.

℞. Syrupi de agresta, myrtini, de succo plantag. cydonior. de ros. siccis, & de succo portulacæ, ana ʒ. j. Misce ad usum dictum.

In fine dysentericæ valdè confert succus absinthii & menthæ benè depuratus, & cum saccharo in syrupum redactus: habet enim mentha, absinthio mixta, miram vim corroborandi ventriculum.

Imò verò, si dysenteria à multo fructuum usu contigerit, in ipso principio valdè conducit syrupus de absinthio cum aqua cinamomi, vel theriacali, ventriculo interim admovendo fomenta & emplastra roborantia.

Malum cydonium excavatum, cerâ albâ derasâ impletum, & sub cineribus coctum, ac postea exhibitum per aliquot dies, specificum est dysentericæ remedium.

Quercetanus idem remedium parat ex pomo curtipendulo excavato & gummi arabici ac rasura ceræ albæ, an. Drach. i. repleto & ad ignem cocto. Pomo devorato, statim exhibet haustum decocti adstringentis.

Alii usurpant pullum columbinum cerâ infarctum & assum, ac in prandio exhibitum.

Mespilorum usus dysenteriam inveteratam curat, ut testatur Forestus historiis duabus lib. 22. cap. i. propositis, qui locus supra citatus est in diarrhœæ curatione.

Brayerius verò lib. 8. de re cibaria. cap. 22. scribit, seipsum desperata dysenteria laborantem, anus cujusdam consilio, forba cruda largissimè devorasse, indeque sanitati restitutum fuisse.

Nec omittenda est illa uva quercina, à Martino Rulando descripta, quam dicit esse concretitium quiddam, in formam uvæ, ad radices quercuum sub terra tempore veris pullulans, saporis styptici, colore foris purpureo, intus candido, & quasi lactifero, quæ in æstate pereat, & quasi fiat lignea: ideòque tempore veris debeat exsicari in umbra, & deinde pulverisari, hocque pulvere nihil præstantius esse ait in dysenteria, omnique sanguinis profluvio. Illius etiam uvæ mentionem faciunt Encelius, Bauhinus, & Schenkus.

In omni fluxu à putridis humoribus, roborentur intestina pane biscocto, qui in aceto fuerit decoctus, & postea exsiccatus. Bis terve repetita ea præparatione ille pulverisetur, & jusculis indatur ad mediocrem crassitiem.

Pulveres ad eundem affectum varii etiam parantur in sequentem modum.

℞. Rad. bistort. & tormentill. ana Drach. ii. sem. acetos. & plantag. ana Drach. i. corall. rubr. & margarit. præparat. ana Drach. sem. Fiat pulvis tenuissimus, de quo capiat Drach. i. cum jusculo, vel liquore idoneo. Possunt addi huic pulveri, ad majorem adstrictionem, rosæ rubræ, myrtilli, balauſtia, cornu cervi ustum, spodium, aut trochisci de spodio; vel ad majorem adhuc adstrictionem, sanguis draconis, acacia, gallæ, bolus armena, terra sigillata, lapis hæmatites. Si simul glutinare desideres, sem. psyllii, amplum, gum. tragacanthum.

Bolus armena orientalis ad ʒ. i. cum jusculo, statim sedat dysenteriam, si purgatio sufficiens præcesserit. Vel

℞. Pulveris tragacanthæ Drach. i. nucis moschatae, coralli præparati, ana Drach. sem. Misce, capiat duas vel tres doses, cum ovo sorbili, aut cum jusculo. Vel

℞. Gummi arab. Drach. i. coralli præparati, boli armenæ, an. Drach. sem. Misce, utatur loco prædicti. Vel

℞. Cornu cervi uſti, boli armen. corall. utriusque, santalor. omnium, mastiches, an. Drach. sem. thuris, tragacanthæ, ana ʒ. sem. Misce, fiat pulvis, de quo capiat Drach. sem. frequenter.

Forestus valde commendat pulverem sequentem, aliquoties usurpatum.

℞. Myrobalan. citrin. & rhab. parum torrefact. an. ʒ. i. Fiat pulvis pro una dosi.

Hercules Saxonia sequenti pulvere dicit omnes dysenterias recentes, nisi fluxio admodum urgeat, statim & certò sanari.

℞. Ossis sepia uſti Drach. ii. spongiæ picæ imbutæ, & in ollula uſtæ, & cortic. jovor. indurator. ablata pellicula interiori, an. Drach. i. Fiat pulvis, Dosis Drach. i. in liquore idoneo.

Non minoris efficaciae, imò frequenti experientia confirmatus est pulvis granor. Actes à Quercetano descriptus in Pharmacopœa, cujus utendi modi ibidem videri potest.

Opiatæ etiam in sequentem modum præscribi possunt.

℞. Conservæ rosar. antiquæ & cydoniati, an. Unc. i. conservæ rad. symphyti ʒ. sem. corall. præparati ʒ. i. ʒ. croci Martis, bol. armenæ, terræ sigill. sem. plantag. an. ʒ. i. spodii ʒ. ii. Cum syrupo de ros. sicc. vel myrtino, fiat opiatæ, de qua capiat æger magnitudinem castaneæ, bis aut ter in die. Vel cum saccharo rosac. ad pondus omnium poterit fieri conditum ad usum frequentem.

Mycleta Nicolai ad dysenteriam & reliquos alvi fluxus utiliter usurpatur.

Sapienter monet Crato, ante septimum diem, priusquam ulcera intestinorum probè abstergantur, adstringentia per os non convenire, nec foris etiam applicanda esse. Verum post septimum à levioribus incipiendum. Montanus verò adstringentia penitus abdicat, detergentibus, lenientibus, & incrassantibus contentus. Verum materiâ inorbificâ probè evacuata, retentricis facultatis imbecillitas, quâ fluxus alvi fovetur, adstringentibus remediis opportunè tollitur.



Utile ergo fuerit, poſt purgationem ſufficientem, bolum armenam, terram lemniam, pulverem granorum aëtes, aut alia adſtringentia & exſiccantia per plures dies cum ſaccharo exhibere; uſque ad integram ſanationem. Quod ſi adſtriſtio nimia nocere videatur, purgandum iterum, & denuò adſtringendum, ac rurfus purgandum. Advertendum autem, terras prædictas dupliciter conferre, adſtringendo ſcilicet, & malignam qualitatem, quæ dyſenteriae conjuncta eſt, oppugnando. Obſtructio verò, quæ ex horum adſtringentium uſu metuitur, ſacchari admixtione prohibetur.

Ad ulcus leniendum & consolidandum electuarium ſequens utiliſſimum eſt.

℞. Mucilag. ſem. cydonior. mucilag. rad. consolidæ, & gummi tragacanthæ, extractarum cum aqua roſar. ana ℥. j. amyli ℥. j. corallii rubri ℥. ij. boli armen. præp. ℥. j. balauſt. ℥. ſ. rob de ſorbis vel cydoniati ℥. ij. ſacchari roſac. ℥. j. Fiat inſtar electuarii, doſis ℥. ij.

Narcotica per os aliquoties exhibita miranda præſtant: dolorem enim ſedant, fluxum cohibent, ſomnum conciliant, & ſic quoque vires reſciunt. At multò erunt utiliora, ſi adſtringentibus, & roborantibus permisceantur. Exempli gratia.

℞. Conſervæ roſar. antiquæ ℥. ij. laudani opiat. g. (j. ij.) iij. Confectionis alker. ℥. ſ. Fiat bolus.

In dyſenteria maligna & epidemica bezoardica & ſudorifica multum poſſunt. Compertum enim eſt, per hujusmodi remedia, evacuata materiâ, dyſenteriam ceſſare: ideòque mox à principio, & dum reliqua ſunt, humoris peccantis natura advertenda eſt. Si enim is malignus ſit, qualis in dyſenteria epidemica eſſet, fruſtrâ laboratur reliquis medicamentis, niſi ſimul, & quidem ſtatim in principio, alexipharmaca exhibeantur. Ad hunc uſum revocari poſſunt ea omnia, quæ febribus malignis conveniunt. Ac præterea, quæ diaphoretica ſunt, ut lapis bezoardicus, aqua theriacalis. Conferunt etiam plurimum cornu cervi, terra ſigillata, bolus armena, unicornu, corallium, carabe, ſcordium, hypericum, plantago, tormentilla, pimpinella, & alia innumera.

Exteriùs verò admoveantur toti ventri olea cydonior. roſac. & ſi magis adſtringendum, omphacinum, vel addita aceti tertia parte, & coquendo ad conſumptionem aceti. Si ventriculus ſimul affectus ſit, addatur maſtichinum, vel abſinthinum.

Poſt inunctionem eadem pars conſpergatur pulvere aliquo adſtringente, conſtrato ex myrtillis, cortice granator. gallis, nucibus cupreſſi, calycibus glandium, roſis rubris, balauſtiis, thure maſtiche. Cui ad majorem adſtriſtionem addi poſſunt bolus armena, terra ſigillata, &c.

Et iſdem pulveribus, oleis prædictis exceptis, additâ cera, poſſunt parari unguenta ad eundem uſum. Vel etiam unguentum comitiſſæ ſolum, aut aliis permixtum, ad moveri poſteſt.

Cataplaſma ad diarrhoeam præſcriptum hîc convenire poſteſt, tum etiam ſequens, quando potentiùs adſtringere deſideras.

℞. Bol. armen. ℥. vj. thuris ℥. ſ. ſang. drac. maſtiches, mumiæ, ana ℥. ii. Fiat pulvis, qui excipiat albumine ovi & aceto, & cum panno ventri ſub umbilico apponatur. Vel

℞. Telæ araneæ. ℥. iij. album ovi diu concuſſum, n. j. frigrantur in ſartagine, & calidè umbilico applicentur.

In dyſenteria epidemica laudatur cataplaſma ex theriaca & terra ſigillata, ventri appoſitum.

Cataplaſma ſequens, hepar roborans, à Solenandro multum commendatur in omni alvi fluxu, tam hepatico, quàm dyſenterico, & antiquâ diarrhoeâ. Neque ob adſtringentia metuendum eſſe docet, quia hepar roborantibus temperatur.

℞. Eupatorii, ſchoenanthi, ana M. j. ſpicæ indicæ P. ſem. maſtiches, macis, ana ℥. ſem. ligni aloës ℥. iij. myrobalan. chebul. & emblic. torrefact. ana ℥. j. bol. armen. terræ ſigill. lapid. hæmatit. an. ℥. vj. coriandri præpar. Unc. ſem. ſpodii ℥. ij. roſar. Unc. j. ſpecierum triaſantal. ſine camphora, ℥. ſem. ſcoriæ ferri præp. ℥. j. farinæ hordei ℥. ij. olei de maſtiche & myrtill. an. quantum ſatis. Fiat emplaſ-

Lazar. Riverii Opera.

ſtrum, quo totus venter contegatur, à cartilagine xiphoide ad os peſtinis.

Fotus etiam fieri poſteſt toti ventri, ex decocto adſtringentium, ſacto in aqua ferrata, cum vini rubri, vel aceti portione. Vel

℞. Roſar. rubr. M. ij. abſinthii, mentæ, ana M. j. nucis moſch. rad. cyperi maſtic. galangæ. an. ℥. i. Cum lintheo albo fiat ſacculus juſtæ magnitudinis, qui in vino rubro vel aceto calefactus, ventri imponatur. Vel

℞. Abſinthii, menthæ, plantag. fol. quercus, ſummitatum rubi, equiſeti, centinodiæ, ana M. j. flor. chamom. P. ii. roſar. rubr. M. ſem. myrtillor. ℥. j. ſem. ſumach. plantag. coriandri, an. ℥. vj. nuc. moſch. num. iij. Fiat decoctio in aqua chalybeata & vino rubro, qua foveatur venter.

Rulandus ventri admoveſt ſacculum ex furfuribus in aceto decoctis.

Si dolor valdè urgeat, ventri admoveantur lintea, in lacte chalybeato calente madefacta.

Quod ſi fomenta non ſufficiant, ad inſeſſus devenire poſſumus, qui à Matthæo de Gradi, Savonarola, & Jachinopræcipuè laudantur. Idemque Jachinus ad pueros maximum eſſe ſecretum aſſerit. Nam calore actuali nonnihil humores ad cutem avertunt: qualitate verò adſtringente fluxum cohibent. Iſ tamen utendum non erit, ſi corpus humoribus vitioſis reſertum fuerit; ſi dyſenteria fuerit maligna, & febrem comitem habuerit. Fiunt autem ex teneris germinibus quercuum, baccis cupreſſi viridibus, nucibus pineis viridibus, vel pini foliis & corticibus, aliſque aqua decoctis.

Ex prædictis fotuum decoctis poſſunt etiam fieri ſuffusmigia: ſi nempe eorū vaporè recipiat ager in ſella perforata.

Præcipuè commendatur ſuffitus ex decocto tapſi barbati, qui etiam in diarrhoea laudatus eſt.

Faventinus commendat ſuffumigium ex terebinthina, ſupra laminam candentem injecta, bis in die exceptum.

Idem laudat fomentum ſequens, ano admovendum.

℞. Meliſ. ℥. ſ. verbaſci M. j. Includantur ſacculo oblongo, qui poſtea in vini rubri ſtyptici, & aceti fortiffimi an. quantum ſatis, coquatur ad tertias, & calidus ano imponatur.

Rulandus verò ano admoveſt fotum ex decocto glandium in aceto paratum.

Idem Faventinus hanc lotionem proponit, tanquam ſecretum ad ſiſtendum fluxum dyſentericum.

℞. Scoriæ ferri aceto præparatæ, limaturæ chalybis aceto præparatæ, an. ℥. i. Bulliant in ℥. ij. aceti fortiffimi ad mediæ partis conſumptionem. In hoc decocto ager plantas pedum, & volas manuum detineat per mediam horam manè & veſperi.

In affectu diuturno & ubi ulcera contumacia inteſtina occupant, mercurius crudus ad eorum curationem plurimum confert, ſi cum unguento roſaceo permisceatur, eoque venter illinatur.

Huic addi poſſunt clyſteres pro ſordidis ulceribus ſuprà propoſiti.

Lac vaccinum eodem tempore exhiberi poterit cum ſyrupo myrtino.

Item baſami veri ℥. j. cum nebula exhibita, ulcera interna mirabiliter consolidat.

Ad dolores leniendos, omentum caſtrati, aut vervecis recenter maſtati, ventri admotum, & faſciis alligatum, multum prodeſt, præcipuè in pueris: ſed pluries idem remedium iterari debet.

Si hepar aut ventriculus, aut cerebrum huic fluxui occaſionem præbeant, propria remedia illis erunt adhibenda, ea perpetuò ſeligendo, quæ adſtringendi & roborandi vim habeant.

Pro potu ordinario exhibeatur aqua, cum conſerva roſar. tinctura roſ. decoctum fol. quercus, vel aqua inſuſionis terræ ſigillatæ, vel aqua ſimplex auro uſtulata, cum ſyrup. cydon. myrtino, aut de roſis ſiccis. Vel abſente febre leve decoctum maſtiches cum ſyrupis prædictis. Potus chalybeatus, ex ſententia Cratonis, exhibendus non eſt: non enim adſtringit, ut vulgò creditur, ſed turbat alvum. Alii laudant decoctum graminis, quia ſiccando prodeſt, & per urinam divertendo.



Denique observatione dignū est, quod tradunt Aëtius *lib. 3. cap. 8.* & Paulus *lib. 1. cap. 35.* inveterata alvi profluvia per venerem exsiccati. Quod prius dixerat Hip. 7. *Epid. in fine.* Impudens scortatio difficultati intestinorum medetur. Hujus rei veritatem experiētiā didicit Amatus Lusitanus *curat. 47. cent. 2.* Dysentericus, inquit, cum graviter opprimeretur, noctu cum uxore hymenæum exercuit, & illico dejectiones cessarunt, indeque sanus evasit.

Hic pro coronide addatur, quod in curatione diarrhœæ ex Platero in cura fluxus hæmorrhoidum relatum est, sanguinem fervidum injectum mirabiliter alvum fluentem cohibere, vel humanum, vel alterius animalis.

## CAPUT VII.

### De Tenesmo.

**T**enesmus est assidua desidendi cupiditas, quā nihil præter mucosum quiddam & subcruentum, aut purulentum excernitur.

Causa proxima hujus affectus est ulcus recti intestini, à quo sanies quædam aut materia purulenta continuò emanat, & facultatem expultricem irritat; unde assidua desidendi cupiditas emergit. Præterea mucosum quiddam sanguini aut puri permixtum excernitur ex depravata homiofisi partis ulceratæ, quæ proprium alimentum probè non concoquit, & sibi assimilât; sed in substantiam illam heterogeneam & mucosam convertit, ut de aliis ulceribus intestinorum in dysenteria fusiùs exposuimus. Cum verò in dysenteria theoria dubium sit nobis omnia intestina in eo affectu posse ulcere tentari, hinc sequi videtur, etiam recti intestini ulcera ad dysenteriam esse referenda. Usus tamen invaluit, ut quando solum intestinum rectum afficitur, peculiari tenesmi nomine donetur; cum tamen aliis intestinis affectis, si rectum etiam afficiatur, licet dysenteria nomen obtineat, frequens illa desidendi cupiditas reperiatur, & ita tenesmus & dysenteria sint ejusdem naturæ, & easdem habeant generationis causas, ut tota eorum affectuum differentia in loco affecti diversitate consistant. Atque ita omnes dysenteria causæ, superiori capite propositæ, tenesmum etiam producere valent, ut eas repetere non opus sit.

Ad diagnosin hujus affectus nihil aliud requiritur, quàm eum à dysenteria distinguere, quod facile obtinetur per ea, quæ in definitione proposita sunt. In tenesmo enim assidua est egerendi cupiditas: in dysenteria verò interpolata, & dilucida habens intervalla. Præterea in tenesmo post magnum desidendi conatum exiguus mucus, isque sanguinolentus, aut purulentus excernitur, in dysenteria verò, tum excrementa, tum humores, singulis dejectionibus excernuntur.

Signa causarum eadem sunt, quæ in dysenteria causis dignoscendis fuere proposita.

Quod ad prognosin attinet: Celsus *lib. 4. cap. 19.* tenesmum facile tolli asserit, & nunquam per se hominem jugulare. Gal. *tamen 5. de usupartium, cap. 4.* inter morbos, qui ventri accidunt, gravissimos enumerat. Et certè, ratione molestiæ & durationis gravis morbus dici meretur: periculosus tamen non est, nisi ab atra bile excitetur, tunc enim ad canceri ulcerati naturam accedit; præterea gravia incommoda asferre potest, ut abortum mulieribus. Sic apud Hipp. *Aph. 27. sect. 7.* Mulieri uterum gerenti, si tenesmus supervenerit, abortum facit. Assiduus enim deijciendi conatus uterum, recto intestino vicinum, maximè fatigat: deinde muscoli, sæcum exclusioni destinati, ad foetus etiam exclusionem inserviunt, ideò quando illi assidue ventrem inferiorem comprimunt, abortum faciunt. Denique ulcera recti intestini, ano vicina, si diutius durent, in fistulam immedicabilem degenerant.

Tenesmi curatio à dysenteria curatione parum abest. Atque ita primum humores acres & erodentes, ab hepate aliisve partibus profluentes, expurgandi sunt medicamentis adstringendi vi præditis, quale est imprimis rhab. quod eò usque iterandum est, donec exhausta & inhibita fluxio videatur.

Si adsit inflammatio (quæ febre potissimum dignoscitur) aut multitudo sanguinis phlebotomia usurpanda est. Imò verò, si inflammatio post venæ sectionem perseveret, ut etiam stranguriam efficiat, (quod non raro solet contingere) venarum hæmorrhoidalium apertio per hirudines erit utilissima.

Tum clysteres, nunc lenientes, cum dolor urget plurimum, nunc abstergentes, glutinantes, aut adstringentes pro variis ulceris temporibus injiciendi sunt, quorum formulæ ex dysenteria curatione desumendæ sunt.

In clysterum autem usu observandum est primò, ut sæpè in parva quantitate, scilicet ad ℥. ss. injiciantur, quia difficilè ob conatum assiduū retinentur; deinde ut canula in podicem blandissimè inseratur, ne locum irriter, doloremque augeat.

Tum pars affecta sedulo tractanda est fotibus, incessibus, suffumigiis, suppositoriis, & inunctionibus.

Fotus in hunc modum concinnari poterit:

℥. Fol. taphi barbatii, & absinthii, an. M. vj. Decoquantur in lacte recenti, & includantur duobus sacculis, qui alternatim ano & toti ventri calidè applicentur. Vel

℞. Flor. chamæmel. & ros. ana M. j. vini rubri ℔. ij. infundantur per duas horas supra cineres calidos. Foveatur anus calidè, quantum ferre potest, cum linteis quadruplicatis, Postea super spongia, in eodem liquore expressa sedeat æger, ipsamque sedendo comprimat.

Vel impleantur duo sacculi fursure tritici, & in aceto bulliant. Insideat æger, modò uni, modò alteri calido, quantum ferre potest.

Si multum sanguinis excernatur, fotus in hunc modum componi poterit.

℥. Fol. verbasci cum radic. M. ij. rosar. rubr. P. j. cortic. granat. & gallar. ana ℥. sem. Coquantur in duabus partibus aquæ ferratæ, & una vini rubri, pro fotu quem efficacior efficies, si aluminis ℥. sem. addideris.

Incessus ad dolorem leniendum fiunt ex emollientibus in aqua vel jure extremitatum vervicis decoctis: quibus, si ardor increverit, addi poterunt violæ, solanum, cucurbitæ, & melonis ramenta. Ad ulceris verò sanationem, ex adstringentibus, pro fotu suprâ descriptis, erunt cõponedi.

Suffitus ulceri exsiccando idonei sunt ex thure in ignem coniecto, vel ex decocto sabinæ facto in oxycrato, aliisque in curatione dysenteria propositis, quorum furum excipiat æger in cathedra perforata. Sequens autem maximè laudatur à Foresto.

℥. Mastiches ʒ. j. thuris ʒ. j. myrtillor. ʒ. j. ss. rosar. rubr. ʒ. ij. Fiat pulvis pro suffumigio.

Suppositoria in hoc affectu multum possunt, si blanda ac lenia sint, ne partem admodum sensibilem exasperent. Fiunt autem commodè ex sevo hirci vel capræ, in formam suppositorii secto & indito: dolorem enim sedat, & ulcus consolidat. Sed ad dolorem sedandum erunt præstantiora, si semen papaveris vel hyoscyami subtilissimè tusum permisceas, & in nodulum chartaceum suppositorii forma effundas. Longè magis, si horum loco oleorum ex dictis seminibus expressorum guttas tres cuilibet supposito addideris, vel opii gr. j. in olei amygd. dulc. ʒ. ss. dissolutum.

Ad ulcus sanandum efficacius fiet, si sevo, ut dictum, soluto, vel simplici, vel narcoticis additis, amyllum & gummi tragacanth. tritum vel infusum prius in aqua plantaginis misceas. Vel in sequentem modum componi poterit.

℥. Gum. tragacanth. quantum satis. Affunde tantillum aquæ plantag. ut intumescat tantum, neque nimium liquescat; adde mucil. sem. psyllii, aut cydon. tantundem, & vitellum ovi assum. Misce, iisque parum calentibus adde ceræ albæ liquatæ q. s. ad suppositorii consistentiam. Huic etiam narcotica addi possunt. Tum etiam; quemadmodum in prædictis, ad majorem erosionem curandam, pulveres cerusæ, tuthiæ, boli, balauftior. aliorumque citra acrimoniam siccantium; qui tamen subtilissimè lævigari debent, ne partis sensum exasperent.

Olea & unguenta admoveri poterunt, tum ventri, quæ in dysenteria curatione proposita sunt; tum ano, ut unguentum rosac. popul. vel ex mucilaginibus, vitellis ovor. oleo



oleo rosac. &c. paratum, ad inflammationem & dolorem demulcendum, aliâque in hæmorrhoidum dolore proponenda; vel ad ulceris sanationem, unguentum album Rhafis, pompholygos, in hydromelite liquatum, & alia innumera.

Denique in graviori affectu ad narcotica confugiendum est, non solum admodum, sed etiam assumpta. Cæteris autem præstat laudanum opiatum gr. (i. ij.) iij. vel iiij. (*per vias*) cum mastiche & terra sigillata exhibitum, vel clysteri permixtum ex decocto flor. chamom. parato.

## CAPUT VIII.

### De Fluxu hepatico.

**F**luxus hepaticus est, in quo serosi & sanguinei humores, loturæ carniū similes, excernuntur.

Producitur hic affectus ab hepatis imbecillitate & atoniâ propter quam bonum & laudabilem sanguinem producere non potest, sed chylosam materiam in sanguinem tenuem, & serosum convertit, qui cum alendis partibus idoneus non sit, à natura expellitur ad intestina, unde fluxus ille hepaticus contingit.

Illa autem imbecillitas & atonia à qualibet intemperie produci potest. A quocumque enim primarum qualitatum excessu robur hepatis nativum, & vis illius sanguifica dejicitur. Quod tamen dubitationem habet, ab experientia desumptam; quandoquidem videmus sæpè graves hepatis intemperies, & insignes primarum qualitatum excessus, alios morbos producere: istum verò ab illis minime induci. Contra verò fluxum hunc hepaticum sæpè apparere, sine insigni primarum qualitatum excessu. Ut igitur affectus istius natura integre stabilietur, dicendum est cum Sapientissimo Varandæo, præceptore meo, præter vulgarem intemperiem aliquid superius & majus reperiri quod istum affectum producere valeat. Et illud dicit esse occultiozem quandam intemperiem, quæ exolutionem sive consumptionem humidi primigenii, sive radicalis in hepate inducit, ad quam sequitur ipsius caloris innati maxima exolutio.

Hanc pravam diathesin & occultam intemperiem producere possunt febres ardentes & syntecticæ; intemperies viscerum calidior, oleosam substantiam colligans, occulta putredo, humorum corruptela, refrigeratio summa à pituitæ vel melancholiæ copia in corpore præter naturam cumalata, & calorem nativum opprimente ac corruptumpente. Id ipsum præstare possunt causæ externæ, ut larga frigida potio, nivis aut glaciei haustus, oleorum frigidorum ac crudorum usus immodicus, venena assumpta, & medicamenta cathartica vehementiora. Sic enim vinum meracum copiosè haustum, falsa, acrida, piperata, aliaque insigni qualitate prædita, jecoris substantiam exhauriunt & extorrent. His addere licet omnes alias causas, quæ impensè refrigerando vel calefaciendo, hepatis robur ac tonum dissolvere possunt.

Verus igitur ac legitimus fluxus hepaticus hætenus expositus est, qui hunc peculiariter habet caracterisimum, quòd in eo dejectiones liquidæ ac serosæ & loturæ carniū similes appareant. Et hic ab hepatis imbecillitate procedit, ob quam sanguificatio non rectè perficitur, vel ab intemperie maligniori calidum & humidum nativum partis vitante.

Datur verò præterea fluxus hepaticus spurius, qui à simplici intemperie, sine ullo humidi primigenii vitio procedit, à qua quidem intemperie, ipsa facultas non læditur, sed tantum illius opus corrumpitur: ita ut loco puris sanguis impurus & corruptus proveniat, vel bonus sanguis in pravam degeneret, cum in legitimo fluxu hepatico nunquam bonus & laudabilis sanguis in hepate generetur.

Corrumpitur autem, vel impurus redditur sanguis, fluxum istum spurium committens, vel ex permixtione bilis flavæ, aut atræ, alteriusque cujusdam materiæ impuræ, vel ex diuturniori in hepate locisque vicinis mora, ob quam crassior redditur, aut aduritur, aut etiâ interdum putrescit, vel propter vitium lienis, sæculentam sanguinis portionem

*Lazar. Riverii Opera.*

non trahentis. Et in hoc spurio fluxu sanguis interdum crassius, interdum niger, interdum variis humoribus, diversis coloribus infectis, permixtus excernitur.

Signa hujus affectus ex his, quæ dicta sunt, facile elici possunt.

In fluxu enim hepatico legitimo dejectiones liquidæ, & loturæ carniū similes apparent, quod in aliis fluxibus sanguineis non contingit: saltem ut in omnibus dejectionibus tales materiæ appareant, in dysenteria enim si aliquando talis excretio fit, id raro contingit, & consequenter bilis, pituita & fæces varii coloris excernuntur. Adde quod in dysenteria adsunt dolores & tormina ventris, in fluxu verò hepatico nullus est dolor.

Causarum verò signa propriis characteribus distinguenda sunt. Si enim à calida intemperie hepatis imbecillitas & omnia inducitur sit, febres ardentes aut colliquantes præcesserunt: vel vomitus æruginosi, aut dejectiones, sitis, & febris adest, corporis squalor & inappetentia & dejectiones valde fœtidæ apparent. Si verò à frigida intemperie ortum duxerit, dejectiones minus fœtent, nec sitis, nec colliquatio adest: totum corpus frigidius efficitur, & livido colore perfusum.

Interdum tamen ex humorum putredine febris exoritur, quæ dicta symptomata aliquantulum immutat: sed causæ prægressæ examinandæ sunt, quæ utramque intemperiem facile manifestare possunt. In hac etiam frigida intemperie agri maximo vini generosi ac meracioris desiderio tenentur.

Humidior verò ac ficiior intemperies ex contrariis affectibus deprehenduntur. Humidior enim plurimam ac crebram dejectionem facit, & valde tenuem: contra verò ficiior paucam & crassiorem reddit, quam tamen ingens potus cupiditas comitatur.

Causæ denique externæ ex relatione ægrotantium & adsantium facile innotescunt.

Spurius verò fluxus hepaticus omnia ferè signa habet communia cum dysenteria, nisi quod in eo nullus adsit ventris dolor, neque tormina molestant, neque ulla ramenta aut carunculæ in dejectionibus conspiciantur.

Prognosis hujus affectus nonnisi mala & ut plurimum funesta institui potest. Cum enim pars princeps gravissimè laboret, ex haustu scilicet & consumptione humidi primigenii, cujus reparatio vix separabilis est, nonnisi certum exitum ut plurimum expectandum est: præcipue quando à calida intemperie affectus ducit originem.

Quando enim in febribus hic affectus contingit, colliquationes corporis, & putredines ingentes brevi succedunt, quæ citò ægrotantes de medio tollunt. In febribus verò malignis & pestilentibus propter causæ cacoethiam, periculum augetur. Quando verò hic affectus à frigida intemperie ducit originem, diuturnior est dolor, & in hydropem immedicabilem plerumque degenerat.

Denique fluxus hepaticus spurius, licet admodum periculosus sit, minus tamen habet periculi legitimo, quia à simplici & vulgari intemperie, & prava humorum diathesi tantum exoritur, tono robore hepatis integris remanentibus, & sublatis causis sanguinem vitiantibus evinci potest.

Curatio hujus affectus perficitur remediis hepar roborantibus ejus intemperiem corrigentibus, fluxumque cohibentibus. Et quia longè frequentius atque ut plurimum à calida intemperie ducit originem, ideo huic imprimis intemperiei curationem aptabimus, cum ille, qui à frigida intemperie producitur, rarissime contingat, & eandem cum hydropem curationem desideret.

Primò igitur, quamvis nullus vacuationibus locus esse videatur, cum fluxus immodicus sui tantum cohibitionem indicet; rhab. tamen vel solum, vel cum myrobalanis exhibitum, juxta formulas in dysenteria curatione propositas, interdum prodesse poterit, quia hepar roborat, idque imprimis, si quædam impuritates dejectionibus permixtæ videantur. Imò verò nonnulli ægrotantes rhab. Scrup. j. cum conserva rosar. in multos dies exhibitio. liberati sunt.

Clysteres hîc parum profunt, cum hepar affectum sit. Attamen ex lacte chalybeato, vel decocto leniter adstringente, interdum injici poterunt, ne intestina nimis relaxentur.



At julepi hepar roborantes, ejusque intemperiem corrigentes, in hunc modum componi poterunt.

℞. Rad. cichor. gramin. acetos. ana Unc. j. fol. endiv. agrim. cichor. plantag. cuscute, ana M. j. absinthii pontici M. β. fantali rubr. Drach. j. rasur. eboris & spodii, ana Scrup. ij. coriandri præparati Drach. i. rosar. rubr. P. i. Coquantur ad ℔. j. ℔. In colatura dissolve syrupi cydoniorum & acetos. simp. ana Unc. j. fiat julep. pro iv. dosibus, serò & mane sumendis. Vel

℞. Aquæ plantag. Unc. iij. syrup. de rosas sic. Unc. j. spiritus viirioli q. s. ad moderatam aciditatem. Fiat julep. frequenter iterandus.

Poterit etiam æger uti frequenter ex cochleari syrupis frequentibus.

℞. Syrupi myrtini, cydonior. & de rosas sicis, ana Unc. j. syrup. de cichor. simpl. aut compos. cum rheo, Unc. i. sem. Misce.

Fiat syrup. præstantissimus ex tinctura rosar. facta in aqua rosar. & cum saccharo rosar. redacta in syrupum.

Pulvis etiam frequens ad Drach. sem. vel Drach. i. semel aut bis in die, in ovo forbili, jusculo, aut alio liquore idoneo usurpari poterit.

℞. Sem. plantag. & acetosæ, ana Drach. j. Sem. endiv. portul. cuscut. coriand. præp. ana Scrup. j. Rosar. rubr. trochisc. de spodio, cum tragacanth. torrefacto, ana Drach. sem. pellicul. interiorum ventricul. Gallinæ exciccatar. Scrup. sem. Fiat pulvis tenuissimus.

Vel tabellæ triafantali duplicato rheo ad ℥. ii. pro dosi exhibitæ ad hepar roborandum erunt utilissimæ, tum etiam opiata sequens.

℞. Conserv. rad. cichorii, ℥. j. conserv. rosar. veter. ℥. β. pulpæ passular. corinth. ℥. vj. croci Martis ℥ij. coralli præparati. rasuræ eboris & cornu cervi, ana ℥. j. cum syrupo de ros. sicis, fiat opiata, addendo spirit. vitrio. ℥. ℥. De qua capiat magnitudinem castaneæ tribus horis ante passum. Potest etiam addi hepar lupi præparatum, quod ab authoribus commendatur tanquam specificum.

Passulæ majores vel corinthiæ, quia hepatis amicæ, in hoc affectu commendantur, idè magna copia cum seminibus sunt comedendæ. Quod ut commodius fiat, prius in mortario erunt contundendæ.

Vel rob passulatum fieri potest, coquendo eas in vino rubro, vel alio generoso, si calor non obstitit, & postea succum ex iis exprimendo, rursusque in formam rob decoquendo. Quod simplex usurpari poterit, vel cum sequentibus componi in formam opiata.

℞. Passular. corinth. ad ℥. β. Coquantur ad pultis consistentiam in vino veteri. Transfundantur setaceo, & colaturæ admisce corticis citri condit. pistati Unc. sem. pulv. electuar. triafantal. & diamarg. frig. ana Drach. j. coralli præp. & rosar. rubr. ana ℥. iv. jecoris lupi præp. Drach. iij. Fiat opiata.

Syrupus corall. ad hepar roborandum & fluxum cohibendum præstantissimus est. At longè præstantior illius tinctura. Cui etiam substitui poterit extractum vel magisterium in aqua planag. exhibitum.

Succus ex furculis tenuioribus uricæ per se ad ℥ij. vel cum aqua & aceto exhibitus manè per triduum, fluxum sistit, & sanguinem corruptum purificat.

Quia verò in hoc affectu corpus valdè absuitur, destillatum restaurans fluxus etiam cohibendo idoneum, vel per se frequenter exhibendum, vel omnibus cibariis permiscendum est.

℞. Caponem pinguem & perdicem, iisque deplumatis & exenteratis, repleantur ventres fol. cichorii, agrim. & carnis testudinum ana M. j. conservæ ros. ℥. iii. sem. plantag. coriand. præp. ana ℥. ij. myrobolan. citrin. ℥. i. fol. sanguinaræ, M. β. trochiscor. de carabe, & spodio, ana ℥. iv. pulv. elect. de gemmis, triafantali, diamarg. frig. an. ℥. i. Irrorentur omnia vino styptico, & simul in ventres avium immissa coquantur in aquæ ℥. iv. ad mediæ partis consumptionem vase clauso. Postea reponantur omnia in alembicum vitreum cum vini optimi Unc. iij. Distillantur in balneo Mariæ ad usum dictum.

Pro potu utatur æger tinctura rosar. vel decocto ci-

chorii & graminis, cum syrupo cydonior. addendo aliquot guttulas spiritus viirioli.

In cibis hordeata & amygdalata, ac præcipuè oryzata conveniunt.

Exterius verò applicentur ventri eadem remedia, quæ in dysenteria curatione præcipua sunt: addendo hepatica nonnulla, ut absinthium, rosas, fantala omnia, spodium, &c. Quæ inunctiones ventris ad hepatis usque regionem debent pertingere.

Hepati verò sequens epithema admoveri poterit.

℞. Fol. endiv. & cichorii, ana M. j. cuscute & absinthii utriusque ana M. β. rosar. rub. P. j. fantali rub. ℥. j. sem. spodii Scrup. ij. Coquantur ad ℥. j. sem. In colatura dissolve aceti rosar. ℥. ij. Iterum bulliant leviter & colentur. Fiat epithema.

Eadem pars sequenti unguento illinatur.

℞. Cerati santalini ℥. ij. olei cydonior. & absinthii, ana Drach. iij. Misce. Fiat linimentum.

Denique si vigilæ plurimum ægrotantem infestent, ut non raro solet contingere, quia hic fluxus noctu solet ingravescere, ad narcotica erit deveniendum, qualia in superioribus alvi fluxibus fuerunt.

## C A P U T IX.

### De Lumbricis.

**Q**UAMVIS lumbrici in variis corporis partibus generantur, quia tamen id rarissimè contingit, & frequentissimè in intestinis magnus fit eorum proventus, idè nos tantum de his hoc loco agere institimus.

A nonnullis ambigitur, ad quod genus affectum præter naturam lumbrici referendi sint: omnem tamen dubitationis ansam facile auferre possumus, dicentes, pro diverso respectu ad omnia genera referri posse. Prout enim intestina vellicant & pungunt, vel obstruunt, alioque morbos producant, causæ morbosæ dici possunt. Prout verò sunt substantiæ superadditæ iis, quæ naturaliter in intestinis contineri debent, inter morbos in numero aucto toto genere præter naturam à Galeno recensentur, quemadmodum & calculus: ac denique prout excernuntur per alvum præternaturaliter, aut etiam per os, ad vitium excretorum sunt referendi.

Tria lumbricorum genera proponuntur à Galeno comment. Aph. 27. sect. 3. teretes seu rotundi, qui in tenuibus intestinis frequentius generantur, unde sæpè in ventriculum ascendunt, ascarides, seu tenues lumbrici, filorum particulas referentes, qui in parte inferiori crassorum intestinorum, & juxta sphincterem musculum residere solent: & lati lumbrici, fasciæ etiam nominati, quia lati & longi sunt instar fasciarum, quibus infantes obvolvuntur. Ista species rarior multò est cæteris, & medico, praxin exercenti, vix ter aut quater in vita videre contingit. Magnæ tamen de eo apud autores habentur controversiæ, aliis scilicet asserentibus esse vermem unicuique: aliis verò ex plurimis vermiculis simul unitis compositum: quos vermiculos cucurbitinos appellant, & lati lumbrici particulas esse asserunt; alii verò quartam lumbricorum speciem faciunt, cucurbitinos continentem, quorum rationes & experimenta sigillatim recensere, & toties ab aliis decantata repetere, instituti nostri ratio non patitur; sed ea curiosus lector apud Rondeletium, Platerum, Sennertum, aliosque innumeros videre poterit.

De causâ etiam lumbricorum efficiente admodum controvertitur, aliis calorem putredinosum, aliis nativum accusantibus, aliis utrumque vicissim concurrere asserentibus. Primi, omnia insecta ex putredine secundum Aristotelem exoriri contendunt. Secundi asserunt, calorem putredinosum esse intensum, igneum, & destructivum, atque adeo corporis viventis generationi non esse idoneum. Terti, ut pugnantes hæc sententias concilient, dicunt, à calore putredinoso materiam disponi ad generationem vermium, eamque ita præparatam à calore nativo per viam concoctionis in lumbricos converteri. Quæ tamen conciliatio subsistere non potest. Siquidem ex axio-

mate



nate physico, ejusdem est materiam disponere & formam inducere, atque ita præparatio materię & inductio formę, ab eodem agente proficisci debet. Deinde in cadaveribus generantur vermes, in quibus nullus est calor natus. Dicendum itaque est, calorem qui putredinosus est, respectu materię putrescentis, fieri nativum respectu lumbrici: quia calor naturalis & putredinalis differunt tantum gradibus. Sed ad diversorum animalium generationem diversi caloris gradus requiruntur, atque adeo calor, qui putredinosus est respectu nostri, potest esse naturalis respectu alterius animalis. Sic calor, qui leoni naturalis est, nobis febrilis, & per consequens putrefactivus. Multi confugiunt ad calorem Solis, qui est causa universalis omnium generationum. Sed agnoscenda est perpetuo causa peculiaris, à qua immediate producitur effectus, concurrente & cooperante causa generali. At longè gravior hęc etiā occurrit difficultas, ex eo, quod vulgatissimo theoremate sancitum sit, nihil posse seipso nobilius generare, atque ita calorem non esse præcipuum agens in generatione lumbricorum, qui ad substantię categoriam referendi sunt, calor verò est accidens, & quicquid de sole dicatur, perpetuo forma lumbrici, utpote forma viventis, nobilior est forma solis, quę tantum est forma mixti. Hęc dubitatio in gravem illam atque prolixam de generatione æquivocā disputationem nos conjicit; in cujus ambagibus præstantissimi quidam philosophi integris voluminibus sese exercuerunt, ad quos lectorem remittimus, & in primis Fortunium Licetum *lib. de spontaneo viventium ortu*. Sufficit hoc loco dicere, multorum opinionem eo deduci, ut credant multiplicia rerum semina in variis substantiis, latitare quę juxta varias illarum permutationes in lucem emergunt, prout videlicet materia per putredinem, aut aliam quamvis alterationem, ad hanc vel illam formam recipiendam magis disponitur, & semen illi dispositioni magis analogum suscitatur in actum, formamque sibi propriam in materiam introducit. Hęc sententia non valde recedit à veteri philosophia, quę docet formas educi è potentia materię. Sed hitiusus esse existimant, semina rerum in materia recondere, quę verè sint efficientia, quàm solam materię potentiam agnoscere, quę nullam habet efficiendi vim. Cum illa enim materię potentia inquirendum est aliquod efficiens, quod formas illas educat, aut potius in eam introducat.

Causa materialis lumbricorum vulgatissima est pituita dulcis putredinem concipiens, cujus putredinis ope eam acquirit dispositionē, ut in lumbricos transmutetur. Verū nullo modo necessarium putamus ut alimenta, vermibus generandis idonea, in pituitam prius convertantur. Ex eis enim immediate, dum putrescunt, vermes generari possunt, quemadmodum videmus in carne, caseo, castaneis, pomis, pyris, cerasis aliisque innumeris fructibus, vermes per putredinem produci. Ita fit in corpore nostro præcipue puerorum, qui ingluviei maxime dediti sunt, prædictis alimentis sese ingurgitant, & plerumque nova assument, antequam priora fuerint concocta. Hinc fit, ut illa putredinem concipiant, ex qua lumbrici oriuntur.

Hoc verò tyrones advertant, quod in praxi quotidie observatur, pueros lactantes, quibus carnes exhibentur, à lumbricis maxime infestari, propterea quod tenelli eorum stomachi solidum illud alimentum concoquere non possint, atque ideo corrumpitur, & in lumbricos facessit. Adde quod lac citissime conficiatur in ventriculo, confectum ad intestina deferatur, quod si carnem admixtam habeat, quę tam citò confici non potuit, secum simul ad intestina ducit, ibique putrescit, & in lumbricos convertitur.

Observent etiam juniores, ex lacte solo nunquam lumbricos generari: in ut quoties de morbo infantis alicujus ambigitur, utrum scilicet ex lumbricis laboret, (quos mulierculę perpetuo accusant, omnesque morbos infantiles ac pueriles ad lumbricos referunt, quemadmodum omnes mulierum affectus utero adscribuntur: ) Medicus certò pronuntiare possit, infantem illum, si lacte solo vescatur, neque carnem aut jusculum ex ea gustaverit, lumbricis non laborare. Hoc docuit disertè Gal. *Comment.*

*Aph. 26. sc. 7. 3.* dicens in pueris lac fugentibus vermes non generari. Cujus rei ratio perspicua non est. Multi dicunt in pueris lactantibus, calorem non esse satis fortem ad lumbricorum generationem. Et fulcitur responsio auctoritate Galeni dicentis *loco citato*, ad generationem lumbricorum requiri calorem fortem; unde fieri dicit, ut lumbrici magis generentur in pueris adultioribus, quàm in infantibus, quod docet Hipp. *Aph. prædicto*. Cui tamen doctrinę ipse Hip. refragari videtur *5. de morbis*, dicens in pueris, dum utero clausi sunt, generari vermes: at illi non habent intensiorem calorem pueris lac fugentibus. Et idem Hipp. aliam reddit rationem, cur in pueris in utero conclusis vermes generentur; quia inquit, *feces in iis retinentur, postquam verò in lucem exierunt, non generant, quia in iis amplius feces non retinentur*. Quod tamen satisfacere non videtur, siquidem in puerulis extra uterum fæces sæpe retinentur, & lumbrici tamen in iis non proveniunt, quamdiu solo lacte utuntur. Cum igitur prædictę rationes solida ingenia non expleant, novas hac in re sapientum cogitationes expectamus, & interim quid nobis videamur, paucis aperiemus, id doctiorum criterio libenter subjicientes. Dicimus igitur lac putrescens aciditatem contrahere, quę inepta sit lumbricorum generationi, imò verò illi fortiter obsistat: acida enim omnia vermes enecare, notissimum est. Hinc succus limonum ad hanc rem utilissimus & usitatissimus est. Et in potu ordinario aqua spiritu vitrioli acidula reddita, in hoc affectu mirabilis est.

Inter causas materiales lumbricorum dulcia primum locum obtinere vulgò existimant. Quod tamen dubitatione non caret, cum vulgari axiomate sancitum sit, dulcia bilefcere, & bilem amaritudine lumbricos enecare. Huic tamen dubitationi facile est respondere: in corporibus biliosis, & caloris acrimonia præditis, dulcia facile bilefcere, quia ulteriori coctione amaritudinem contrahunt, ut in coctione artificiali quotidie experimur. Verum in aliis temperamentis minùs calidis dulcia non bilefcunt, sed potius in pituitam convertuntur, dum à ventriculo citius, quàm par sit, attrahuntur ad intestina, & ita cruda ac semicocta putrescunt, ac lumbricis generandis materiam idoneam præbent.

Sed manet adhuc difficultas de saccharo & melle, quę cum substantiam habeant putredini minimè obnoxia, imò verò cætera omnia, quantumvis putredini obnoxia, ab ea præservent; prohibeatur tamen eorum usus iis qui lumbricis laborant. Itaque dicendum, ex saccharo & melle lumbricos non generari, cum habeant substantiam incorruptibilem; sed jam genitos excitari ac commoveri, quia lumbrici, dulcia maxime appetentes, ad mellis & sacchari occursum sese exagitant, & versus ventriculum feruntur, necnon citissimum incrementum capiunt, unde symptomata emergunt, lumbricorum confectaria.

Signa lumbricorum præsentium, & in intestinis latitantium varia sese offerre solent: non omnia quidem in omnibus, sed plura in pluribus. Frequentiora tamen, & magis ordinaria sunt, oris fœtor peculiaris, ad aciditatem vergens. (Ideo mulierculę nostrę acidum anhelitum vocant) & dejectiones stercorei bubulo similes, ac griseo colore infectę, ita ut argillam dissolutam repræsentent. Alia signa infrequentiora sunt febres continuę, quę pluries in die exacerbantur ex motu vermium, cum anxietate, sudore frigido interdum & animi deliquio, nausæa, vomitu, & siti inexplebili. Pulsus est inæqualis, genę alternatim rubent, aut livescunt, oculi splendent, narium pruritus adest, dentium stridor, & interdum tremor. Tussis adest sicca & exigua; saliva præter solium ex ore effluit. Interdum etiam capitis gravitas & sopor, interdum deliria, interdum convulsiones epilepticę. Dolor in ventre plerumque affligit morsum & erosionem repræsentans: interdum etiā venter inflatur ac distenditur, instar hydropicorum; interdum horrida est in somno experscencia, nonnulli in somno tremunt, ac surgunt, atque iterum sopiuntur; interdum totum corpus præter rationem decrescit, & nonnunquam æger fame caninā laborat, atque insatiabili,



quod in lato lumbrico magis contingit, qui omnia alimenta assumpta devorat & absumit. Præterea vermes cucurbitini, si excernantur, latorum sunt indicia. Ascari-des verò ex pruritu ani molesto cognoscuntur, & fæces non rarò iis conspersæ apparent.

Pro coronide, inter signa lumbricorum in corpore latentium, censei debet gingivarum erosio vel putredo, quod sequenti observatione confirmatur. Puer quidam erosione gingivarum à longo tempore gravissimè vexabatur. Multa variaque remedia, tam interna, quàm topica ipsi præscripta & adhibita fuerunt: frustra tamen omnia. Tandem vitam cum morte commutavit. Aperto corpore tanta inventa est abundantia vermium, ut aliquibus in locis intestina eroderent, multique in vacuo ventris reperti fuerint.

Quod ad prognosin spectat, lumbrici plures paucioribus sunt deteriores, majores minoribus. Non rarò periculosi sunt, & graves morbos accersunt, ut febrem intensam & inordinatam, syncopen, aphoniam, delirium, epilepsiam, colicam, caninam appetentiam.

In morborum principio vermes prodire, malum, tam vivos, quàm mortuos, potissimum si soli, & sine stercore exeant. Vivi enim summam cruditatem, aut alimenti penuriam significant: mortui verò magnam putredinem, à qua enecantur.

Lumbrici in declinatione morbi, & jam coctione apparente, cum excrementis exeuntes, salutem portendunt: ostenditur enim tum naturam excrementis dominari.

Curatio lumbricorum ad eorum expulsionem dirigenda est, cum sint toto genere præter naturam. Illa autem expulsio commodè perficitur catharticis medicamentis, quæ vermes enecat & expellunt, tum etiam putridam materiam, ex qua generantur, evacuant.

At verò inter purgantia præstantissimum est rhab. quod etiam præsentis alvi fluxui & feбри convenit. Illius tamen exhibitionem præcedere debent lumbricos enecantia, aut saltem quæ ipsos ad inferiora intestina detrudant, per os assumpta; tum quæ eosdem deorsum evocant, per clysterem injecta. Quorum formulæ vulgò in hunc modum habentur.

R. Aquar. gramin. & portul. & ana ℥. j. sem. syrup. de limon. ℥. j. confect. de hyacinth. ℥. j. pulveris contra vermes ℥. j. fiat potio, quæ detur statim, & paulò post clyster sequens injiciatur.

℥. Hord. integr. fufur. macri rosar. rub. an. P. j. liquirit. raf. & passul. mundat. an. ℥. ss. coquantur ad ℥. sem. vel quartaria pro puerulo. In colatura dissolve sacchari rub. ℥. j. vitellum ovi n. j. Fiat Clyster. Potest addi cassia vel catholicum, si magis laxare est animus.

Quibus remediis semel aut bis usurpatis potio sequens propinanda est.

R. Rhab. electi ℥. j. fantali citrini ℥. ss. Infundantur in aquæ graminis aut portulacæ ℥. ij. vel iij. In expressione dissolve rhab. pulverati, & pulv. contra vermes, ana ℥. j. syrup. rosar. ℥. j. Misce, fiat potio. Vel

℥. Rhab. pulverati, & corallinæ, an. ℥. ss. plus minus pro ætate; aquæ gramin. ℥. ij. syrup. violac. ℥. j. Fiat potio.

Si febris magna non adest, hieræ picræ ℥. ij. plus minus, potioni admiscendæ sunt: illa enim propter amaritudinem lumbricos potenter enecat & expellit.

Si verò prædictis remediis non cesserit affectus, ad sequentia transeundum est.

R. Rad. gram. & acetos. an. ℥. j. fol. endiviæ, cichorii, acetosæ, portulacæ, an. M. j. summatum hyperici, scordii, & centaurei minor. an. P. j. corallin. ℥. iij. Coquantur ad ℥. j. In colatura dissolve syrup. de limon. ℥. iij. fiat julepus pro iij. aut iv. dosibus bis in die sumendis.

℥. Unguenti de arthanita ℥. iij. mercurii crudi ℥. j. Misce, inungatur totus venter.

Deinde purgatio repetenda est, imò frequenter iteranda, donec impuritati corporis sit satisfactum.

Imò verò prædicto decocto fenna, agaric. rhab. &c. addi poterunt, & tunc semel tantum in die erit exhibendum.

Rondeletius valde probat electuar. diacarth. tanquam

remedium potentissimum ad vermes dejiendos & pituitam expurgandam, ac etiam chylum corruptum, ex quo generantur & nutriuntur vermes, tum etiam infusionem agarici in oxymelite. Quæ remedia præcipue convenient si febris non adfuerit.

Quia verò sæpè nisi magno labore, & longo tempore, verminosi affectus in nonnullis pueris expugnari possunt, quam plurima remedia, eaque præstantissima, ab Authoribus inventa & usurpata sunt, tum interna, tum externa.

Inter interna primum recenseri debent pulveres varii, quorum formulas apud autores passim videre est.

Ad præcipuos verò sequentes referendi sunt, quorum dosis erit à scrup. j. ad ℥. j. pro ætate puerorum, cum liquore idoneo.

℥. Sem. fantonici, quod contra vermes vulgò vocant Unc. sem. corallinæ ℥. iij. rasuræ cornu cerv. ℥. ij. Fiat pulvis. Vel

R. Sem. contra vermes, corallinæ, & cornu cervi, ad summam albedinem usti, ana partes æquales. Vel

℥. Pulv. hieræ simp. ℥. ij. sem. contra vermes, scordii, centaur. minor. corallinæ, an. ℥. j. Fiat pulvis.

℥. Rhab. & agarici, an. ℥. j. trochisc. alhandal. ℥. j. diacryd. ℥. ss. corallinæ, cornu cervi usti, ana ℥. ss. myrrhæ, zedoar. flor. tanaceti, an. ℥. j. salis absinthii & tartari, ana ℥. j. Fiat pulvis tenuissimus.

Hi autem pulveres, ex calidioribus medicamentis compositi, in calidis naturis & febricitantibus, rarò & in minori dosi usurpentur.

Mulierculæ vulgò pueris, à lumbricis male habentibus, exhibere solent sem. contra vermes saccharo incrustatum, vel nudum semen melli permixtum. Quod remedium præstantissimum est, si quidem lumbrici, dulcium rerum avidi, mel devorant, & cum melle semen, quo interficiuntur.

Quia verò semen illud valde calidum est, temperari potest, si in acetum infundatur per duas horas; postea verò cum melle cocto misceatur ad formam opiatae, quam Amatus Lusitanus prædicat, tanquam primum adversus lumbricos remedium.

Cornu cervi ustum à Foresto maximè laudatur, cum passulis, aut alio quovis modo exhibitum, ut nonnulli hoc solo remedio curati sint. Iis præcipue convenit, qui lumbricis cum alvi fluxu laborant. In qua affectuum complicatione commendat etiam succum plantaginis, & decoctum centinodæ, in potu exhibitum. Quibus addi possunt topica ventri admota, partim astringendi, partim lumbricos enecandi virtute prædita.

Vulgò etiam usurpatur à mulieribus oleum commune, cum vino exhibitum. Illud autem lentore suo, animalium eorum, quæ sola transpiratione vivunt, spiracula occludens, ipsa suffocat & interimit. Vinum etiam, acrimoniâ suâ eadem interficit. At præsentè febre, melius est oleum cum succo limonum, vel granatorum admiscere, vel quod multò præstantius est, oleum amygdal. amar. cum prædictis succis, vel aqua florum aurantiorum.

Stocherus in Empirica sua, oleum è ligno exsiccatò coryli seu avellanæ, per descensum paratum laudat, si una vel duæ guttæ puero exhibeantur: grandioribus verò tres, vel quatuor cum mica panis. *Immediatè, inquit, interficit, & educit per secessum, imò verò lumbricos & pediculos extra corpus levi contactu enecat.* Volunt autem Authores peritissimi, hoc oleum, à ligno corylino extractum, esse oleum illud Heraclinum, quo Martinus Rulandus pueros à lumbricis ferè in momento liberabat, labra & umbilicum eodem illinendo, ut passim in illius centuriis videre est.

Nos autem experti sumus, oleum juniperinum, ad guttam unam exhibitum cum jusculo, puerulis hisce lumbricis laborantibus, multum opulari, modò febris absit.

At reliquis omnibus remediis fortè præstaret mercurius crudus, si eum per eos exhibere auderemus; quod tamen magnorum virorum suffragia fieri posse testantur. Quorum nonnulla in medium proferant: ut qui hoc remedii genus tentare voluerint, id minimè sine autore fecisse existimentur.



Mathiolus epist. 4. ad Stephanum Laureum, medicum Cæsareum: Cum, inquit, argentum vivum nulli ullâ leviserâ facultate (ut Dioscorides inquit) interimat, quam quod suo ingenti pondere intestina laceret: nihil sanè vendendum videtur, minima quantitate id posse moliri unquam, præsertim cum sua gravitate & spherica forma facile è corpore per inferiora labatur. Idcirco mirari non debemus, si Brassavolus, tam clarus ætatis nostræ Medicus, ad necandos interaneorum vermes, dari pueris argentum vivum nullo incommodo, scriptum reliquit; & eo tam feliciter usus sit alius quidam clarissimus Medicus Patavinus, quam parandi dandique rationem minimè unquam docere voluerit. Atqui ego, etsi hoc medicamento nunquam sum usus, vidi tamen dari sæpe illud, scrupuli, vel sesquidrachmæ pondere, à Gloritiensibus obstetricibus, ægrè parturientibus mulieribus, nullo prorsus incommodo, sed felici semper eventu.

Fallopianus tract. de morbo gallico, cap. 76. Si bibatur, inquit, argentum vivum, illud non facit, quod unctum. Vidi mulieres, quæ libras ejus bibebant, ut abortum facerent, & sine noxa. Ego exhibeo in vermibus puerorum, & nullum parit symptoma; solum necantur vermes.

Platerus in curatione lumbricorum: Argenti vivi, inquit, guttam unam vel alteram, vel ʒ. ʒ. aliqui deglutient dum propinant: quia vermes, quibus maxime adversum, citò fugat, potestque innoxie, ut alibi etiam dictum, sumi.

Apud Fabricium Hildanum observ. 72. cent. 2. in qua describitur historia cujusdam mulieris, lumbricis laborantis, à Giberto Saraceno, ad dictum Fabricium missa, sequentia habentur, post quorundam remediorum enumerationem. Hisce additum est ex hydrargyro præstantissimum: medium. Illud enim ad sesquidrachmam purum, & per corium trajectum hausit, & ab eo infestare cessarunt cum dira hæc animalia.

Joannes Baptista Zappata lib. de secretis mirabilibus. c. 5. insignes proponit historias lumbricis laborantium, mercurii usu sanatorum, in quibus infinita alia remedia, tum aloë & absinthium, frustra usurpata fuerant. Illius autem exhibendi modus duplex ab eo proponitur. Primus talis est.

ʒ. Arg. vivi ʒ. j. pro pueris verò ʒ. j. vel ij. benzoini ʒ. ʒ. aquæ vitæ rectificatæ guttas iv. vel v. Misceantur simul in mortario vitreo cum pistillo vitreo. Postea adde conservæ rosar. aut violar. q. s. ad incorporandum, ut fiat bolus, quem capiat æger manè per se, vel in pane hostiario. Secundus talis est.

ʒ. Sacchari valde rub. (Thomæ) parum, aquæ commun. guttas iij. vel iv. Misceantur in mortario vitreo ad consistentiam mellis. Deinde adde arg. vivi quantitatem dictam. Incorporantur simul, addendo ol. amygd. dulc. guttas vj. aut vij. quæ impediunt, ne mercurius vivificari possit. Misceantur omnia. Tandem cum pauca conserva rosar. fiat bolus.

Baricellus in hortulo geniali, hæc habet. Hydrargyrum, quod à multis venenum existimatur, felicissimo successu contra vermes exhibetur, tantæque certitudinis illud in Hispania reputatur, ut mulieres tenellis pueris, qui lactis vomitu laborant, ad quantitatem granorum iij. in propria substantia propinare audeant. Hac autem via morbus cessare videtur frequentatis experimentis. Ego quidem viduam mulierem curavi, quæ novem dierum spatio vomitibus continuis ex vermibus laboraverat, & ferè triduo nec comederat, nec cibum retinere valuerat. Huic cum hydrargyri ʒ. ij. cum tantillo cydonii mortificato propinasse, absque ulla molestia per alvum centum & plures emisit vermes, & eadem die liberata est, & sollicita exercuit domi & foris negotia, magna profectò parentum admiratione, cum prius debilis: & bono semper eventu, domique continuo aquam habeo, in qua hydrargyrum infusum retineo, illamque puculis pro vermibus libentissimè concedo: nec adhuc quempiam ex illo noxam accepisse expertus sum. Usus est hoc remedio ad vermes enecandos, Mathiolus, Horatius Augenius, & plerique alii celebres viri, qui omnes hujus auxilii maxime extollunt beneficia. Datur pueris in substantia ʒ. j. grandioribus ʒ. ij. vel ʒ. j. Corrigitur illud & mortificatur in

mortario vitreo saccharo rubro, & tandiu conteritur, ut in partes insensibiles dissolvatur. Ne autem in pristinam formam redeat, olei amygdal. dulc. guttulas binas addere oportet, & sic cum saccharo rosar. violato, vel cydoniato, jejuno stomacho, languentibus propinatur. Hæc Baricellus.

Sanctorius in meth. vitand. error. lib. 5. cap. 1. Nisi, inquit, in lumbricis necandis ad valida præsidia confugiamus, ut ad aloem non lotam, vel ad mercurii ʒ. j. cum aloë & terebinthina, ad pilulæ perexiguæ formam recepta, nihil sit.

Qui mercurii crudi usum reformidant, eodem præparato uti possunt, nempe mercurio dulci, non solum ter, ut vulgò fit; sed etiam sexies sublimato. Ulteriori enim præparatione malignitas illius magis retunditur, admixtis aliquot granis diagrydii, ut citius è corpore eliminetur, simulque lumbricos, eorumque materiam expellat.

Quantitas autem illius augenda vel minuenda est pro ratione ætatis. Exempli gratia pueris, octo aut decem annos natis, ita præscribi poterit.

ʒ. Mercurii dulcis gr. xij. diagryd. gr. (iij.) v. vel vj. fiat pulvis qui detur cum pomo cocto, saccharo consperso, vel panatella saccharata.

Pro potu ordinario, aqua supra laudata erit utilissima, ex hydrargyri infusione parata, vel in qua hydrargyrum per horam integram in ampulla vitrea semiplena agitatum fuerit.

Utilis etiam est aqua, in qua stannum fusum sæpe extinctum fuerit. Si verò hydrargyro uti lubeat, satius est aquam cum eo parum ebullire, sic enim efficacior reditur.

Non minoris fortè est efficacis aqua fontis cum spiritu vitrioli aut sulphuris guttis aliquot acidula reddita: sunt enim acetositates illæ specifica materia, quæ moriuntur vermes. Aqua verò, prout puer est grandior, magis vel minus acida est efficienda.

Vulgo autem usurpatur pro potu ordinario, decoctum graminis, aut coriandri præpar. cum syrupo limonum, aut granatorum mixtum. Vel decocto graminis saccharum cum aceti tantillo admisceri poterit.

Dum prædicta remedia usurpantur, clysteres toto merbi decursu frequenter injiciendi sunt. Primum attrahentes lumbricos, ex dulcibus compositi, ut ab initio dictum est. Qui non solum ex decocto liquiritiæ, passularum, & ficuum parari possunt, sed etiam ex jusculo pulli, admixto saccharo & melle rosaceo, vel ex lacte, si febris absuerit, alioqui facile corrumpitur.

At si lumbricos, in crassis jam intestinis esse conjiciamus, quia tunc vix amplius in tenuia possunt ascendere, medicamenta illos enecantia per clysterem infundere possumus, in hunc modum composita.

ʒ. Rad. gram. Unc. j. fol. betæ, malv. mercurial. & portul. an. M. ʒ. corallinæ P. j. coriandri præpar. & sem. contra vermes seu santonici, an. Drach. ij. In ʒ. ij. aquæ fiat decoctio. In colaturæ ʒ. j. dissolve olei rosar. Unc. ij. cassiæ recentè extractæ ʒ. vj. hieræ picræ ʒ. ij. mellis violacei ʒ. j. Fiat clyster.

Si fortiorem desideres

ʒ. Rad. gentian. Unc. j. absinth. vulgaris, & abrotani, ana M. j. centaur. min. M. sem. lupinor. Unc. i. sem. Santonici. ʒ. ij. Fiat decoctio. In colaturæ q. s. dissolve olei absinthii ʒ. j. salis ʒ. j. sem. Fiat clyster, qui iterandus est, & in posteriori, ut vermes enecati educantur, dissolve benedictæ laxativæ, & hieræ picræ, ana ʒ. iij. vel ʒ. ʒ.

Si præsens sit alvi fluxus, clyster sequens injiciendus est.

ʒ. Rad. tormentillæ, & aristol. rotund. an. ʒ. j. ʒ. cortic. granat. & mirobalan. an. ʒ. j. lentium P. j. baccarum myrti ʒ. j. rosar. rubr. P. j. Fiat decoctio. In colatura dissolve olei menthæ, vel absinthii ʒ. j. Fiat clyster.

Exterius verò ventri admoveri solent topica varia, non solum antea proposita, sed etiam sequentia.

ʒ. Rad. gentian. ʒ. j. rad. aristoloch. ʒ. vj. cort. aurant. ʒ. j. colocynthid. ʒ. j. cornu cervi usti ʒ. ij. croci ʒ. ʒ. Fiat pulvis, qui subigatur cum oleo de absinthio, vel amygd. amar. & additâ cerâ, fiat unguentum.

Item



Item oleum simplex cum pulpa colocynthid. decoctum efficacissimum est.

Item oleum de absinthio & hyperico toti ventri manè & serò admovendum.

℞. Ol. absinthii, menthæ, & amygd. amar. ana 3. ℞. succi absinthii, rutæ, ana g. ii. tormentillæ, dictamnii albi, zedoar. ana 3. ℞. fellis bubulli 3. iii. aloës, 3. j. Pulveriscentur & cum modica cera fiat unguentum. Vel

℞. Colocynthid. Drach. vi. Terantur, & cum felle bovis & vino imponantur umbilico. Quo remedio & vermes interficiuntur, & venter solvitur.

℞. Myrrhæ 3. vij. mastich. 3. viii. aloës hepat. 3. xviii. salcomm. 3. i. Conversa omnia destillantur per retortam, lento igne, & magna diligentia. Exibit primò aqua deinde oleum. Quo si illinatur infantium umbilicus, omnem putredinem corrigit, quæ in eorum mesenterio restagnat.

Cataplasma etiam in hunc modum concinnari poterit.

℞. Farinæ lupinor. 3. ii. myrrhæ, aloës ana 3. ii. fellis bovis quantum satis, olei de absinthio 3. ii. Fiat cataplasma ventri admovendum.

Si alvi fluxus diutius perduraverit, cataplasma sequens admoveri poterit.

℞. Ol. cydonior. & absinthii ana 3. i. succi portulacæ cum aceto extracti Unc. i. sem. farinæ lentium Unc. i. farinæ lupinor. Unc. sem. corallii rubr. cornu usti, ana 3. iii. Incorporentur simul, & cum pauca terebinthina fiant ad formam cataplasmatidis.

Ex sola hiera picra cataplasma conflatum efficacissimum est.

Fotus etiam interdum adhiberi possunt, quando magna ventris inflatio & tensio apparet, in hunc modum compositi.

℞. Fol. absinthii, abrotani tanaceti, scordii, malvæ, violariæ, ana M. i. lupinor. contusor. Unc. sem. centaur. P. i. Coquantur in aqua & aceto. Foveatur totus venter calidè frequenter.

Denique ad latos lumbricos, & ascarides, clyster ex amaris compositus erit utilissimus. Cui addi debent purgantia toties repetita, donec corporis impuritas, ex qua illi generantur, exsiccata fuerit.

## CAPUT X.

### De Hemorrhoidum fluxu immodico.

**L**icet moderatus hæmorrhoidum fluxus salutaris sit, & à multis morbis, iisque gravissimis hominem præservare, ac liberare soleat, quemadmodum docet Hip. in Epidemiis, & Aphorismis; nempe pleuritide, peripneumonia, nephritide, mania, melancholia, aliisque innumeris. Immoderatus tamen periculosissimus est, alioque morbos perniciosos inducit; nempe totius corporis imbecillitatem, omnium viscerum, & præsertim hepatis refrigerationem, atrophiam, cachexiam, & hydropem, propter caloris nativi deperditionem, effusio vitæ thesauro, & totius corporis somento.

Ille autem fluxus immodicus easdem habet causas quæ alia sanguinis profluvia excitare solent; sanguinem nimirum quantitate, vel qualitate peccantem. Dum quantitate peccat, & magna copia ad venas hæmorrhoidales defertur, eas impensè dilatat, & oscula illarum aperit, quod quidem fit tunc temporis, robore facultatis expultricis: sed nimia interdum copia sanguis ad eas venas propulsus, retentricem opprimit, unde fit, ut illa in officio suo deficiente, fluxus fiat immodicus, qui artis ministerio cohibendus est. Dum verò sanguis qualitate peccat, acrimoniâ, vel tenuitate nimia facultatem irritat expultricem, quæ non solum inutilem, sed etiam utilem sanguinem per illas venas excrenit. Sanguis autem huiusmodi fluxum immodicum efficiens, acrior redditur ex permissione bilis, aut feri acrioris.

Cognoscitur immodicus hæmorrhoidum fluxus ex viribus prostratis, & imbecillitate, quam æger percipit, & ex diuturnitate fluxus, ac copia sanguinis excreti; tum

etiam sædo totius corporis colore, ad citrinum vergente, ut ægri ictero labrere videantur.

Si à sanguinis quantitate procedat, affectum præcessere causæ sanguinem multiplicantes, & patientes in principio leviter serunt, alacrioresque fiunt: postmodum verò, perseverante fluxu, debilitantur, ac vires eorum maxime deiciuntur.

Si verò à sanguinis acrimonia, vel tenuitate nimia fluxus immodicus oriatur, causæ bilem generantes aut serum acre multiplicantes præcesserunt: temperamentum corporis adest biliosum & exustum, sanguis magno impetu effunditur, & effusus admodum rubicundus, rutilus, ac veluti flammeus apparet, cum aliàs, si sola quantitate peccet, subniger, & melancholicus esse soleat.

Prognosis ex prædictis sufficienter colligitur, cum graves affectus, qui fluxum hæmorrhoidum immodicum consequuntur, enumeravimus.

Quod ad curationem, sanguis immodicè fluens cohibendus, aut saltem moderandus est, quod fiat revellentibus, derivantibus, incrassantibus, & adstringentibus remediis.

Ac primùm phlebotomia, in omni sanguinis profluvio revulsorium est remedium. Idè in profluvio hæmorrhoidum sanguinis ex vena brachii erit detrahendus, majori quidem copia, si plenitudinis quædam signa appareant, & nondum maxima sanguinis quantitas per hæmorrhoidas effluerit. Alioquin in exigua quantitate, & partitis vicibus tantum erit detrahendus.

Sanguinem etiam per dictas venas effluentem revelant frictions, & ligaturæ partium superiorum: tum cucurbitulæ scapulis, mammis, & hypochondriis admotæ, quæ ad maiorem revulsionem in scapulis scarificari poterunt. Omnibus autem locis prædictis plures, & frequenter erunt admovendæ.

Purgatio etiam blanda humores biliosos, sanguinis impetum conciliantes ad intestina derivat, eaque fieri debet ex purgantibus, adstringendi vi præditis, ut rhabbaro, myrobalanis, & tamarindis, qualis ad vomitum sanguinis fuit proposita. Docetque Mercurialis, tamarindos præcipuè, ad compescendum huiusmodi sanguinem fluentem, miram quandam potestatem habere, tam decoctos, quam in substantia usurpatos. Imò pruna nostratia acidula, quæ aliquo modo tamarindos æmulantur, frequenter usitata ante alios cibos, huic rei etiam conducere. Illorum præterea usus erit convenientissimus, ut alvus laxa servetur; ac si non suffecerint, alia etiam addenda erunt, quæ ad alvi adstrictionem fuerunt proposita: quandoquidem usu medicamentorum adstringentium alvus constipatur, & in conatu, qui ad fæcès duriores expellendas necessarius est, hæmorrhoides magis aperiuntur, ac copiosum sanguinem effundunt.

Postmodum ad ea remedia veniendum est, quæ sanguinem incrassant, & venas laxiores constringunt: qualia sunt, quæ ad sanguinis vomitum, & sanguinis sputum, in forma julepi, pulveris, opiata, aliorumque supra proposita sunt. Deveniendum etiam ad narcotica, ut ibidem dictum est, si maxima necessitas postulaverit.

Ac præter illa remedia, valdè laudantur ab auctoribus pilulæ de bdellio: quas tamen rejicit Rondeletius propterea, quod vero bdellio Pharmacopœi careant, & illius loco myrrham usurpent, quæ sanguinis fluxum promovet. Verum huic obsistit Solenander, illiusque experientiæ propriam opponit, asserens se in usu harum pilularum, ut sunt præscriptæ, atque cum usitato bdellio compositæ, effectum quem promittunt, tam evidentem comprehendisse, ut de compositione dubitare vix queat. Nisi quis putet ab adjectis siccantibus & adstringentibus hoc qualecumque, quod recipiunt myrrhæ, obtusum superatumque esse. Hic addere possumus, Bauderonium in Pharmacopœa, aliosque recentiores asserere, verum hodie bdellium, Dioscoridis descriptioni conveniens, ex Judæa nobis afferri, & à myrrha non difficile distingui. Illarum pilularum usus talis esse poterit.



## Cap. X. De Hæmorrh. fluxu immodico. 313

℥. Pilular. de bdellio 3. i. trochisc. de carab. & de terra sigillata, an. 3. i. Cum mucilag. sem. cydonior. extractâ cum aqua rosacea, fiat massa pilularum, de qua capiat 3. i. bis in die, ante prandium & cœnam.

Topica remedia eodem tempore usurpanda sunt, in varias formulas redacta.

Fotus ex verbasci seu tapsi barbati decocto in aqua ferrata, vel vino adstringente parato, convenientissimus est: hæc siquidem planta hæmorrhoidum fluori & dolori appropriata est. In usu verò fomenti diligenter observandum, ut frigide vel saltem temperatè admoveatur.

Magis composita decoctio in hunc modum præscribi potest.

℥. Radicis bistortæ lb. 3. folior. plantaginis, verbasci, summitatum rubi, & quercus, ana M. ii. 3. granorum summach. balaustior. gallar. viridium, & malicorii, ana M. i. myrtillor. 3. sem. rosarum rubrar. P. ii. aluminis 3. i. Coquantur in tribus partibus aquæ ferratæ, & una vini rubri austeri pro fotu.

Martinus Rulandus fomentum laudat ex duobus facculis, alternatim calidè admotis, ex rubro panno conflatis & glandibus contusis, ac quercus foliis repletis, & in forti aceto multum decoctis, quibus ocyus fluxus consistit.

Ex decoctis superioribus, aucta dosi simplicium, potest fieri infusus, quo utatur æger subfrigide, ut de fomento dictum est.

Unguentum Comitissæ ad fluxum cohibendum utilissimum est, eoque inungi debent dorsum & hæmorrhoides, vel in rem præsentem tale componi poterit.

℥. Olei rosar. omphacini, & myrtillorum, ana 3. ii. succi plantaginis & tapsi barbati, ana 3. i. sem. aceti vini rubri 3. i. Bulliant ad succorum consumptionem, deinde adde boli armenæ, sanguinis draconis, thuris, & scoriz ferri subtilissimè pulverat. an. 3. i. ceræ q. f. Fiat unguentum.

Rondeletius magis probat unguenta, quæ sine oleis parantur, quia magis adstringunt, eaque in hunc modum parat.

℥. Succu plantag. bursæ pastoris, & tapsi barbati, ana 3. ii. syrup. acetosi simplicis 3. iii. Coquantur simul leviter. Postea misce sanguinis draconis 3. i. boli armenæ, terræ sigillatæ, & radicis bistortæ subtilissimè pulverat. ana 3. i. sem. cerussæ lotæ 3. ii. Misceantur ad formam linimenti.

Si hæmorrhoides sint exulceratæ, sequens parari poterit.

℥. Olei rosac. Unc. ii. thuris & aloës, ana 3. sarcocollæ, sanguinis draconis, boli arm. an. 3. sem. spodii, carabes, an. 3. i. an. yli 3. iii. succi plantag. Unc. i. Fiat unguentum.

Pinguedo anguillæ, quæ dum torretur, exsudat, unguentis addita, proprietate quadam agens, illa efficaciora reddit.

Cataplasma etiam dictis partibus utiliter admoveatur, in hunc modum compositum.

℥. Boli armenæ, aloë, mastiches, thuris, sanguinis draconis, an. 3. sem. off. myrobalan. indorum, & gallarum, ana 3. i. Subigantur cum albumine ovi, & succo plantag. fiat cataplasma.

Vel pili leporis combusti, & tela araneorum minutissima, misceantur cum albumine ovi, & fiat cataplasma, quod ipsi venæ apertæ, si appareat, utiliter admovebitur, aut in podicem blandè iaseretur.

Suppositoria huic usui sunt valdè idonea, quia penitiùs in partem demittuntur. Horum autem forma talis est.

℥. Colophoniz, thuris, ana Drach. iii. boli armenæ Unc. sem. cerussæ, plumbi usli, ana 3. i. acaciæ 3. sem. Subtilissimè trita excipiantur sevo hircino pro formandis suppositoriis.

Injectiones per syringam in anum fiunt ex succo plantaginis, aliisve supra dictis, ad fotum propositis. Sanguis cujusvis animalis recenter extractus, & adhuc fervidus injectus, mirabiliter sanguinem ex alvo profluentem cohibet.

Pulmo arietis adhuc calens & cruentus, podici subjec-

Lazar. Riverii Opera.

tus, magnam in sistendo sanguine habet efficaciam.

Suffitus etiam in eundem finem utiliter usurpantur, ex decoctis fotuum prædictorum parati. Quibus etiam addi possunt, qui in dysenteriz curatione fuerunt propositi. Tum etiam sequens.

℥. Thuris, aloës, mastiches, rosar. rubr. myrtillor. & absinthii, ana 3. sem. trochisc. de carabe 3. i. Fiat pulvis crassior, carbonibus injiciendus. Cujus fumus recipiendus est in cathedra perforata, per infundibulum amplum, cujus angusto orificio aptetur tubulus ex ligno vel argento, in anum demittendus.

Suffitus ex decocto tapsi barbati omnium ferè utilissimus est.

Si venæ ipsi fluenti remedia applicari possint, reliquis ea præferenda sunt. Ideoque, ut illa apparere possit, æger supra mensam collocatus podicem exprimere debet, quasi dejicere velit, donec conspicua sit; adhibito insuper, si opus fuerit, instrumento ad eum nonnihil invertendum. Tuncque venæ cataplasma prædictum, ex telis aranearum & pilis leporinis, vel bolus armenæ, alumen, aut vitriolum ustum. Oleo etiam vitrioli venam tangere efficax est remedium, vel in extremo periculo, aquâ forti appellatâ.

Quibus non conferentibus, Hippocrates libro de victus ratione in acutis, & libro de Hæmorrhoidibus, deligationem, sectionem & ustionem hæmorrhoidum proponit, unicâ servatâ; quæ tamen operatio, tanquam laboriosissima, & valdè periculosa, nostris temporibus obsolevit. Quamquam Massarias hanc semel operationem se vidisse referat, cujus historiam proponere erit utilissimum: siquidem ex ea operandi modus, ejusque eventus apertè docetur. Ea autem talis est: *Federicus Corsicus Vinceminus laboraverat primum dolore, deinde immoderatâ fluxione hæmorrhoidum. Et cum ille multa præsidia expertus fuisset frustra, tandem Patavium se contulit, ubi Medici communi consensu statuerunt sanguinem esse cohibendum. Sed cum ille varia præsidia, tum interna, tum externa, ab iis viris proposita, frustra expertus fuisset: uno verbo, cum nullum suis malis remedium inveniret, statuit hanc manus operationem experiri. Cum autem apud nos nullus esset Chirurgus idoneus, advocato Chirurgo Neapolitano, qui hanc rem profitebatur Fabricio, hæmorrhoides incisa, ligata, & combusta fuerunt. Summa autem hujus administrationis est hujusmodi. Hominem primum accommodatè vinciant, ut nullo modo possit dimoveri. Deinde extrema capita hæmorrhoidum quotquot illa fuerunt, ab intestino excoriant leviter, & separant; tum propria quadam aeu, forti obducta filo, ferè ad extremum tota perforant, & strictè obvinciunt, consumuntque. Hoc pacto, demum, forcipe amputata venarum portiuncula, quæ ex futura superest, ignito ferro eam comburunt. Opus sanè est dolorificum & fastidiosum. A ligatura, sectione, & ustione Federico febris atque insignis dolor supervenere. Sed nonnulla sua præsidia adhibente Chirurgo, ille paucis diebus, & à febre, & dolore, & sanguinis fluxione, non sine multorum admiratione, liberatus, integram suam sanitatem visus est recuperasse. Verumtamen non est prætermittendum, cum ille sibi nimium fideret, neque solum prætermisisset sectionem venæ & purgationem, ut necessarium fuerat; sed & nullam probam vivendi rationem servasset, proximo anno febre pestilenti correptus obiit. Unde observandum venit diligenter Hipp. præceptum Aph. 12. sectionis sextæ, ut una hæmorrhoids aperta servetur. Nisi, ut docet Aëtius, maluerit æger, quæ à suppressione imminent pericula, victu frugali, exercitio, venæ sectione, & purgatione cohibere.*

In ordinaria autem curatione, quæ per medicamenta fit, hepatis & lienis ratio habenda est, cum venæ mesaraicæ visceribus hisce inferantur, præsertim si hæc calidiora sint, aut debiliora. Ideoque non inutiliter epithemata atque unguenta refrigerantia & roborantia applicantur, qualia in fluxu hepatico fuerunt proposita, & fusius in earum partium calida intemperie & inflammatione describentur. Aliquando etiam obstructions viscerum & venarum mesaraicarum huic malo dant originem. Quæ omnino solvendæ sunt, ut æger ab hoc affectu liberetur.

R r

Et



Et nos aliquando fluxum hunc communem pilulis ex chalybe, in hepatis obstructione descriptis, prorsus sustulimus.

Toto autem curationis tempore utatur æger, pro potu ordinario, aquâ ferratâ, vel decocto millefolii.

Eodem tempore, præ cæteris omnibus, summâ curâ sanguinis vitium emendandum est, quod primaria hujus fluxus causa esse videatur. Ideo si acer & biliosus fuerit, infuso rhei & tamarindorum sæpe repetito, corrigendus est. Si calidus & tenuis, & incraffantibus & refrigerantibus. Si aqueus, desiccantibus. Si multus victu tenui. Nam frustra de sistendo fluore consilium suscipitur, nisi mali origo prius tollatur. Quod abundè observavit Solenander *conf. 22. sect. 4.* sequenti historia. *Memini (inquit) me Annam, ex Ducibus Clivensium prognatam, gravissimo hæmorrhoidum, diuturnoque fluxu, curantem, magnâ diligentiâ, summoque nisu, quia videbam viribus labefactis, spiritibusque dissolutis summum discrimen imminere, profluvium obfirmasse. Verum, cum illa inde primo die recreata, sequentibus mirificè gravari, & circa præcordia tumere ac inflari inciperet, revocatus sexto die, coactus venis reclusis profluvium rursus movi. Neque potui securè & tuto restringere prius, quam corpori, lenibus vacationibus, hepaticæ necessariò aliis alterantibus atque roborantibus prospexissem.*

Curato tandem hæmorrhoidum fluxu, de præcautione cogitandum est, ne iterum redeat. Quod fiet victus ratione convenienti, phlebotomiâ bis aut ter in anno usurpatâ, purgatione usuali ex syrupo magistrali, aut alio medicamento, cum caustico tibiæ admoto, aliisque hujusmodi, quæ varianda sunt juxta varias corporum dispositiones. Præterea aquæ minerales vitriolæ, aluminosæ, & ferratæ erunt convenientissimæ. Fonsæca commendat ad præcautionem hujus affectus decoctum lentisci, vel ejusdem infusionem in vino, paratam hoc modo.

℞. Resuræ lentisci ℥. ii. Infundantur in libris xii. vini per 24. horas in loco tepido. Deinde colentur, & de hoc vino bibat pro potu ordinario per mensem integrum. Habet enim vires sistendi hæmorrhoides, tum etiam ventriculum roborandi.

## CAPUT XI.

### De dolore Hæmorrhoidum.

**V**ENÆ hæmorrhoidales, in recti intestini extremitatem & anum desinentes, sæpe tumore afficiuntur, ex quo gravissimus dolor non rarò excitari solet.

Fit autem ille tumor ex eadem causa, quæ fluxum hæmorrhoidum excitare potest; sanguine videlicet quantitate, vel qualitate peccante; qui si viam non inveniat & venarum illarum extremitates aperire nequeat, in iisdem congeritur, easque replendo tumorem efficit cum inflammatione & dolore, qui acerbitate sua omnes intentiones curationis ad se trahit. Causa autem præcipua, cur sanguis ex illis venis effluere nequeat, est ejusdem crassities, quippe qui melancholicus est: dicuntur enim vulgò hæmorrhoidales venæ, præcipuè internæ, humorem melancholicum à liene excipere, & interdum expurgare.

Multæ proponuntur ab autoribus hæmorrhoidum differentiæ, à magnitudine, numero, figura & loco desumptæ: unde aliæ magnæ, aliæ parvæ, aliæ plures, aliæ pauciores, aliæ uvis, moris, verrucis, aut vesicis similes, unde uvales, morales, verrucales, aut vesicales nominantur: aliæ denique internæ, vel externæ dici consueverunt.

Ex his diagnosi facilè elicitur. Siquidem ex tumore, in ani extremitatibus apparente, ejusdemque magnitudine, colore, & consistentia, variæ illius differentiæ cognoscuntur. Præterea tamen ab aliis affectibus distinguendæ sunt, qui ano accidere consueverunt, quales sunt rhagades, condylomata, thymi, fici, alique.

Rhagades sunt ulcera quædam in fissuras diducta, iis ferè similes, quæ in manibus & labiis à vehementi frigore excitantur. Nullam habent cum hæmorrhoidibus similitudinem, sed eas cum subsequenter paucis exponimus, ut omnes affectus anum obsidentes, cum hæmor-

rhoidibus innotescant: licet illi ad morbos externos propriè referendi sint.

Condylomata sunt tumores quidam pelliculæ ani, quæ cum natura suâ rugosa sint, si ad eam confluentibus humoribus, ruga aliqua intumescat, affectio illa dicitur condyloma. Distinguitur ab hæmorrhoidè, quoniam hæc major est, nigra, & rotunda, venam aliquam occupans, cum illa sit oblonga, concolor, & venas non attingens.

Thymi sunt tubercula carnosæ, quæ non modò in ano, sed etiam in pudendo virili ac muliebri solent exoriri, verrucæ consimilia, & florum thymi formam referentia, unde nomen sortita sunt. Parvi sunt hujusmodi tumores, colore candido, vel subrubro, & doloris expertes, cum hæmorrhoides sint majores, nigriores, & ut plurimum dolorosæ.

Fici sunt etiam tubercula carnosæ, sed magnitudine thymos superantia; tum etiam livida, & dolorosa, ideò hæmorrhoidibus similia sunt. Sed ab iis distinguuntur, quod carnosæ omnino sint; hæmorrhoides verò venarum extrema dilatata, & sanguine turgida repræsentent. Adde, quod fici plerumque ulcerentur, & malignitatem quamdam præ se ferant, quæ tanta interdum est, ut canceri naturam accedant.

Hujusmodi fici finitimæ sunt carunculæ illæ, quæ ano subcrescere solent, cristarum nomine donatæ, in Italia familiares; apud nos verò infrequentes; quandoquidem ex impuro, & præpostero concubitu solent exoriri. Pulorum Gallinaceorum cristas referunt, unde habent similitudinem, distinctioneque ulteriori non indigent. Hoc saltem pro coronide dicendum, prædictos omnes affectus ano innascentes, solâ chirurgiâ sanari, ut peculiaris eorum Therapeia proponenda non sit.

Quod ad prognosin tumentium hæmorrhoidum spectat: illæ ut plurimum periculosæ non sunt. Aliquando tamen adeò gravem inflammationem concipiunt, ut gangrenæ periculum immineat, aut saltem pro doloris acerbitate, ægotantem vehementer excrucient.

Hæmorrhoides si suppurentur vut exulcerentur, fistulam sæpe in ano relinquunt, eamque ut plurimum incurabilem, propter partis mollietatem, & summam humiditatem, quæ ulceris exsiccationem difficillimè patitur.

Ad hujus curationem primò sanguis detrahendus est ex venis brachii, ut fiat revulsio à parte affecta. Quâ sufficienter celebratâ, derivationis gratiâ vena malleoli etiam aperienda est.

Cucurbitulis etiam idem beneficium consequimur, ad motis hypochondriis, ad revellendum; coxis verò, ad derivandum.

Purgantia potentiora in hoc affectu non conveniunt; quia humorem ad partem attrahunt, & tumorem iritant; Attamen alvus continuò emollienda est, quia dura excrementa, & cum aliquo conatu emissæ, dolorem exasperant. Ad alvi autem lenitionem infusum cassiæ, manè & serò exhibitum, maximè conveniet, in hunc modum paratum.

℞. Folior. lactucæ, buglossi, & summitat. malvæ, ana M. i. liquiritiæ ras. & passul. mundatar. ana ℥. ss. Folior. buglossi, borragin. & violariæ, ana P. i. Coquantur ad ℥. viii. In Colatura infunde cassiæ recenter extractæ ℥. i. Colentur & clarificentur, addendo postmodum syrup. violacei ℥. i. Capiat bis in die, ut dictum est.

Interdum etiam, ad humoris acrimoniam demulcendam, emulsiones quatuor seminum frigidorum, cum prædicto decocto extractæ, exhiberi poterunt.

Interim topica varia parti admovenda sunt, ad dolorem leniendum, inflammationem auferendam, & tumorem discutiendum. Oleum amygdal. dulcium recenter extractum, parti dolenti admotum, dolorem demulcet. Idque multo efficacius præstant olea ex nucleis malorum persicorum, vel ex feminibus cucurbitæ, papaveris, & hyoscyami.

Præ cæteris autem efficacissimum est oleum buxi, est enim narcoticum. Et sicuti dentium dolores quosvis ad miraculum sedat, ita & reliquos dolores, ac præsertim hunc hæmorrhoidalem mitigat, si illius gutta una supra



# Cap. XI. De Dolore Hæmorrhoidum. 315

supra hæmorrhoides apponatur cum stylo, gossipio involuto; aut si cum oleo feminis lini misceatur, ea proportionem, ut prædicti olei ʒ. ʒ. olei buxi ʒ. recipiat.

Quercetanus valde commendat oleum nucum exprefsum in quo millepedes seu aselli bullierint. In oleo communi, eoque dulci possunt etiam aselli decoqui, & dolorem mirabiliter sedant.

Oleum ovorum simplex, vel in mortario plumbeo agitat, ad idem est efficax.

Linimenta & unguenta ad eundem usum varia præscribi possunt. Quorum alia dolorem tantum leniunt; alia tumorem etiam discutiunt, & exsiccant, alia ulceratis hæmorrhoidibus medentur. Eaque cum linteis, lanâ, aut gossipio parti admovenda sunt.

℞. Vitellum ovi n. i. olei rosac. vel viol. quantum sufficit. Fiat linimentum. Cui si unguentum populeum addatur, efficacius erit ad dolorem sedandum: tum etiam in dolore acerbiori apii. grana aliquot admisceri poterunt. Vel

℞. Axungia gallinæ ʒ. ʒ. pulpæ pomi cocti sub cineribus ʒ. i. croci orientalis ʒ. ʒ. unguent. popul. ʒ. ʒ. vitellum ovi n. i. Fiat linimentum. Vel

℞. Olei violac. ʒ. ii. unguenti populei ʒ. ʒ. Cum ovo integro fiat unguentum. Vel album ovi, cum lacte muliebri agitatum, parti admoveatur cum pannis lineis hoc liquore imbutis.

℞. Mucilag. sem. psyllii ʒ. ii. olei violac. ʒ. iii. Fiat linimentum. Vel

℞. Mucilag. sem. psyllii & scœnugr. extract. cum vino, ana ʒ. ii. butyri recentis ʒ. iii. sevi hœdini ʒ. i. Agitentur simul in Mortario plumbeo. Fiat linimentum.

Vel butyrum solum, in mortario plumbeo ductum ad Solem, donec nigrescat, est egregium remedium.

Pomata etiam recens, parti admota, est valde anodyna. Vel

℞. Succi portulacæ & mellis, an. ʒ. iv. Misceantur in mortario plumbeo, ad formam linimenti. Vel

℞. Unguenti rosac. ʒ. ii. mercurii crudi. ʒ. ii. Fiat linimentum. Vel

℞. Drachyli albi cum oleo chamæmel. mollificati ʒ. ii. croci ʒ. i. opii gr. iii. Fiat unguentum.

Horstius plurimum commendat linimentum ex linaria herba, & floribus coctis cum adipe porcino. Cum expresso, & parumper refrigerato, vitellum ovi permiscet, idque cum lana vel gossipio dolenti parti applicat. Dicitque hoc linimentum ejusmodi dolores ad miraculum usque confestim sistere, seque illud accepisse à Joanne Vullio, celeberrimo in Hassia Medico, qui principi suo Hassiæ Landgravio, tanquam secretum eximium, revelare noluit, donec ipsi annuatim bovem saginatum promitteret.

Ad tumorem discutiendum simul & dolorem leniendum sequentia linimenta utiliter usurpari poterunt.

Porrorum radices, sub prunis cum stupis madefactis decoctæ, & cum butyro pistatæ, dolorem & tumorem auferunt. Idem præstat cepa rubra cum pulpa lilii decocta, & cum oleo myrtino pistata & subacta. Vel

℞. Ol. nucl. persicor. & olei amygd. amarar. ana ʒ. ii. styracis liquidæ, bdellii, ana ʒ. ii. Omnia dissoluta in oleo corporentur in mortario, fiat linimentum.

Balsamum sulphuris, ex floribus sulphuris & spiritu terebinthinæ paratum, præstantissimum est ad dolorem sedandum, & tumorem discutiendum: tum etiam ulcera earum partium mundificat & detergit. Idque potentiùs, si loco spiritus terebinthinæ, oleum hyperici & ovorum substituat. Cum etiam in tumentibus & valdè inflammatis hæmorrhoidibus, loco prædicti spiritus, oleum rosaceum, aut violaceum subrogari poterit.

Cataplasmata etiam ad eisdem usus commodè usurpantur. Ex quibus vulgatissimum est, ad omnes dolores ex inflammatione demulcendos, cataplasmata de mica panis, compositum ex medulla panis albi in lacte decocti, addendo oleum rosaceum, & vitellos ovorum.

Aquapendens commendat cataplasma ex plantagine, parietaria, & malva, in aqua coctis, & cum oleo rosaceo decoctis & subactis; cui interdum, cum magis exsiccare

Laz. Riverii Opera.

est animus, farinam hordei & nilii admiscet. Si verò dolor urgeat, lac omne adjicitur. Idem etiam laudat cataplasma ex radicibus porrorum, in oleo communi, aut myrtino coctis; tum etiam ex scrophulariâ in aqua decoctâ.

Folia sambuci viridis coquantur ad putrilaginem in aqua communi. Postea extendantur super pannum, magnitudine volæ manus. Applicentur calidè, ægro prono existente, prius tamen parte affectâ oleo communi illita. Renovetur sæpe applicatio, & continuetur per multas horas. Ante applicationem foveatur pars decocto eorundem foliorum.

Eadem folia sambuci contusa, & frigidè admota, tertia applicatione dolorem sedant.

Portulaca etiam contusa, & admota, dolorem sedat, tumorem imminuit, ulcera consolidat, & excrescentias carneas absumit.

Cepa alba sub cineribus cocta, & cum butyro recenti subacta instar cataplasmat, dolorem sedat, & tumorem discutit.

Fotus admoventur eidem parti, ad dolorem sedandum, ex decocto tapsi barbati, malvæ, bismalvæ, parietariæ, feminis lini, scœnugræc. althææ, flor. chamæm. & anethi, in lacte parato. Vel lactis defectu, idem decoctum parari potest in hydrelæo, vel jusculo intestinorum vervecis.

Infessus ex eodem decocto, auctâ quantitate simplicium parari potest.

Aqua frigida sola pro fotu utilissima. Infessus in eadem præstans, hyeme sit tepida.

Fotus etiam utilissimus fit ex aqua rosarum, in qua sal saturni dissolutum fuerit; præsertim, si pars admodum inflata mata fuerit.

Ad tumorem discutiendum convenit fotus ex alumine, in vino rubro decocto.

Polypodium quercinum & hypericum coquatur in æquis partibus aquæ & vini, prono corpore decocto instilletur in hæmorrhoides, guttatim ex spongia expressa. Hæmorrhoides sensibilibus detumescunt.

Ad idem conferunt aquæ thermales, pro fotu cum spongiis admotæ, vel infessus in iisdem calidiuscule.

Aquapendens admovet spongiam ex aqua calcis expressam, & supra partem alligat.

Suffitus ex decocto supra dicto, dum fervet, exceptus, vel ex paucioribus, aut solo tapso barbato, in lacte cocto, cum tritico secalino, dolorem quoque compefcit. Vel

℞. Sempervivi maj. M. ii. Decoquantur in vino albo, & fumum excipiat æger in sella perforata.

Ad hæmorrhoides absumendas & exsiccandas convenit suffumigium ex pulveribus lolii, tapsi barbati, scrophulariæ, super prunas coniectis. At efficacius fiet suffumigium, si sulphur simul uratur. Imò verò ex sulphure solo suffumigium paratur, & per tubulum exceptum hæmorrhoides cæcas & latentes potenter exsiccant. Suffitus ex lapide pyrite, in aceto extincto optimus ad hæmorrhoides absumendas.

Ad easdem hæmorrhoides cæcas & latentes mirum in modum confert injectio sequens, frequenter usurpata.

℞. Succi plantaginis & olei violac. ana ʒ. iv. balsami naturalis ʒ. ʒ. Misce, fiat injectio in anum.

Amatus Lusitanus curatione 91. censur. 2. suppositorium sequens hisce verbis prædicat. *Romana, quæ pontem sancti Angeli habitat, cum uteri procidentiam pateretur, de dolore hæmorrhoidum querebatur. At cum illi multa & selecta medicamenta admota essent, quibus non juvabatur, ad balanum ex sevo hircino cum opio confectum confugimus quo dolor evanuit, nec postea rediit. Ac postea calidis roborantibus locum, prout post admota stupefacientia fieri solet, fovimus.*

Idem Amatus curatio 6. centur. 3. sequens topicum commendat his verbis: *Reverendissimus ille, qui ab hæmorrhoidum dolore graviter cruciabatur, post varia & multa à Medicis tentata præsidia, hoc remedio à nobis præsentato usus fuit, & brevi ab illo infestissimo dolore liber evasit. Habet autem remedium sic:*

℞. Arantium pomum, & id cultro excava, in quo oleum rosaceum, & pseudonardi, lavendulæ dictæ, semina infunde;

Rr 2



& ad cineres calidos admove, & calidum applica, & sæpè innova, est enim mirum.

In communi usu est pulmo hœdinus, ex animali adhuc calens parti appositus; vel illius lamina, inter duas patinas calefactæ, cum tantillo aquæ etiam admoventur. Sic enim dolor admodum demulcetur.

Ad hæmorrhoides ulceratas conveniunt tum balsamus sulphuris prædictus, tum unguenta sequentia.

℥. Olei ovor. recentis ℥. ii. Agitentur in mortario plumbeo, & applicentur.

℥. Ol. rosar. Unc. iv. cerussæ Unc. i. lithargyri Unc. sem. ceræ novæ Drach. vi. opii, gr. iv. Fiat unguentum. Vel

℥. Thuris, myrrhæ, croci ana ℥. i. opii, gr. ii. vitellum ovi n. i. olei rosar. & mucilag. femin. psyllii, ana q. s. Fiat unguentum.

Si non facilè resolvi possint, post convenientes revulsiones aperiendæ sunt, confricando panno asperiori maderfacto in succo ceparum, in quo dissoluta fuerit aloës Drach. i. Est secretum Hartmanni. Promptius tamen &

cum minore dolore scalpello, aut hirudinibus admodis aperiuntur.

Per os etiam assumuntur specifica nonnulla, ad dolorem sedandum, & hæmorrhoides absumentas idonea; quorum præcipua hæc sunt.

Decoctum millefolii in potu ordinario per triduum exhibitum, hæmorrhoidum dolorem feliciter solet discutere.

Semen trifolii hæmorrhoidalis ad ℥. i. cum vitello ovi, per plures dies exhibitum, ad idem est efficax.

Tapfi barbati pulvis exhibitus cum lacte, vel alio modo, valdè probatur ad hæmorrhoides tumentes absumentas. Pulvis millefolii & tormentillæ idem præstare valent.

Succus tapfi barbati per se, vel cum saccharo rosaceo, aut penidiato mixtus, vel cum saccharo in syrupum redactus, ad idem utilis est.

Denique pilulæ de bdellio, frequenter usurpatæ, tumentes hæmorrhoidas absument, earumque causam insensibiliter detrahunt.

In iis, qui huic affectui valdè obnoxii sunt, causticum tibie utilissimè admovetur.

# PRAXEOS MEDICÆ

## LIBER UNDECIMUS.

### DE AFFECTIBUS HEPATIS.

#### PRÆFATIO.

**H**EPAR, quemadmodum aliæ partes, omnibus morborum generibus obnoxium est. Quatenus enim ex partibus similaribus componitur varias patitur intemperies: quatenus verò est pars organica, tumoribus, & obstructionibus afficitur: ac denique solutione continui, vulneribus putà, & ulceribus tentari solet. Et quamvis hydrops totum abdomen occupet, ut in ascite, & tympanite, vel etiam corpus, ut in anasarca: prima tamen illius radix ut plurimum à vitio hepatis dependet. Nos hîc affectus præcipuos, & qui frequentius in Praxi Medica occurrunt, exponere aggredimur, eosque sex capitibus comprehendimus: quorum primum est de calida hepatis intemperie. Secundum, de hepatis inflammatione, abscessu, & ulcere. Tertium, de obstructione. Quartum, de ictero. Quintum, de scirrbo. Sextum, de hydrepe.

#### CAPUT I.

##### De calida Hepatis intemperie.

**C**ALIDA hepatis intemperies in quamplurimis hominibus accusatur, eaque serè congenita, & à primis generationis principiis oriunda. Quæ cum in latitudine sanitatis posita sit, de ea hîc non agimus: sed tantum de præternaturali & morbosâ, quæ hepatis actiones manifestè lædit.

Illam autem intemperies vel simplex, vel composita esse potest; vel sine materia, vel cum materia conjuncta. Ut plurimum tamen conjunctam habet materiam, quandoquidem calida hepatis intemperies calidos ac biliosos humores producere consuevit.

Causæ hujus intemperiei sunt calidior aër, exercitationes immodicæ, vigilæ immoderatæ, ira frequens, & alia animi pathemata graviora, & præsertim alimenta vel medicamenta calidiora frequenter assumpta, vel aromatis condita, & vinum meracum ac potens largius potum. His accedit partium vicinarum caliditas, sicut in febribus vehementioribus à calore cordis & ipsum hepar incalescit.

Signa diagnostica calidioris hepatis intemperiei sunt,

cibi fastidium, & præcipuè carnis, sitis, alvus adstricta, calor vehemens in toto corpore, præcipuè in volis manuum ac pedum: macies totius corporis: ægri à calidis læduntur, juvantur à frigidis; & si præterea calidiores humores exsuperent, bilis per vomitum, aut secessum interdum excernitur, oris amaror adest, & plerumque febris.

Quod ad prognosin attinet: Calida hepatis intemperies non valde periculosa est, cum hepatis constitutioni non ita adversetur: sed multorum morborum, non solum propriorum, verum etiam aliarum partium causa esse solet. Difficilis etiam est curationis, præsertim si ventriculus frigidus sit, ut plerumque contingit. Illa enim, quæ ad hepar refrigerandum exhibentur, ventriculo nocent, & illius intemperiem intendunt.

Curatio omninò consistit in correctione illius intemperiei, per refrigerantia remedia, & biliosi humoris, qui ab ea producitur, eamque vicissim fovet, aliorumque morborum causa existit, evacuatione.

Ac primum venæ sectio hepar maximè refrigerat, biliosi sanguinis portionem educit, & obstructiones à bile solvit. Mittendus igitur sanguis est à basilica dextra, quantitate plenitudini ac virium robori respondente, vel una vice, vel per intervalla, pro affectus magnitudine & duratione; idque præmissis clystere, vel medicamento primas vias expurgante.

Deinde bilis, quæ in hoc intemperamento continuo luxuriat, educenda est cholagogo medicamento benigniori, per intervalla repetito; aut apozemate in plures doses exhibitum, aut syrupo magistrali, aut etiam syrupo de cichorio composito quadruplicato rheo, qui convenientissimus est. Siquidem innoxie biliosos humores expurgat, jecur refrigerat & corroborat, ejusque obstructiones aperit.

Dictorum remediorum formulæ tales esse poterunt.

℥. Senæ mundat. & tamarindor. ana ℥. sem. femin. anisi Drach. i. fol. cichorii, & acetosæ, an. M. i. liquirit. ras. Drach. iii. flor. quatuor cordial. ana P. sem. Coquantur in aquæ q. s. ad Unc. vi. In colatura dissolve rhab. in aqua cichorii cum spica infusi Drach. i. sem. Cathol. depl. Drach.



# Cap. I. De Calida Hepatis intemperie. 317

Drach. iii. syrup. ros. Unc. i. Fiat potio, detur manè cum regimine.

Pro delicatioribus sunt potiones clarificatæ, à recentioribus inventæ, quæ julepi formam referunt, ac gustui parum ingrata. In iisque dupla purgantium quantitas præscribitur, eo quod de eorum vi clarificatione plurimum amittatur, ita ut robustiora corpora nunquam sufficienter evacuent, in hac potissimum regione, quæ propter intemperiem siccam, humores minus fluidos minutque purgantibus obsequentes efficit. At verò Lutetiæ, in aliisque regionibus multò humidioribus, hujusmodi medicamenta feliciter operantur. Horum igitur potionum clarificationum sequens esto exemplum.

℞. Sennæ mundat. Unc. i. sem. anisi ℥. i. sol. cichorii, & capill. ven. ana M. i. liquirit. rasæ Unc. v. Coquantur in aq. q. s. ad ℥. x. In colat. infunde rhab. elect. drach. ii. cassiæ recenter extractæ, & cathol. dupl. ana Unc. i. tamarindorum contusor. Unc. sem. coriandri Drach. i. syrup. rosacei Unc. i. Colentur & clarificentur, ut artis est, & fiat potio.

Apozema bilem evacuans ita componi poterit.

℞. Rad. acetosæ, gramin. cichorii, & oxylapathi, ana ℥. i. fol. endiviæ, cichorii, dentis leonis, & capillor. ven. ana M. i. sem. iv. frig. maj. ana Drach. iii. liquiritiæ rasæ Unc. i. flor. cichorii, buglossi, & violar. ana P. i. sennæ mund. ℥. ii. tamarind. Unc. i. macis & caryophyll. ana Drach. i. Coquantur ad ℥. i. r. In colat. dissolve expressionem Unc. sem. rhab. in prædicto decocto cum cinamomo infusi, syrup. de cichorio compositi, & rosati solutivi, ana Unc. ii. Fiat apozema clarificatum, & aromat. Drach. ii. santali citrini, pro iv. dosibus matutinis.

Syrupus magistralis componi potest ex materia prædicti apozematis, triplicatâ dosi purgantium, & addita sacchari quantitate decocto æquali.

Usitatissimus apud nos est syrupus ex succis, summæ efficaciz ad chronicos omnes morbos, qui à calida hepatis intemperie, & bilis flavæ, aut exustæ proventu oriuntur, & in sequentem modum præparatur.

℞. Succor. recenter expressorum & per residuum depuratorum ex foliis endiviæ, cichorii acetosæ, sumariæ, borrag. & buglossi lb. iii. succi pomor. redolentium recenter expressi & depurati ℥. ii. polypod. querc. recentis ℥. β. sennæ mundat. Unc. viii. epithymi Unc. iii. agarici recenter trochiscat. Unc. β. macis & caryoph. ana Drach. β. Infundantur, & decoquantur, ut artis est. donec colaturæ lb. i. β. supersit. In aqua dissolve rhab. elect. in prædictis succis cum spica infusi & expressi. Unc. i. sacchari albi ℥. i. β. Fiat syrupus perfectè coctus, clarificatus, & aromat. Drach. ii. pulv. electuarii triasantali, qui servetur in vase vitreo. Dosis Unc. ii. vel iii. bis aut ter in die cum jusculo pulli, foliis endiviæ, cichorii, & acetosæ alterato, vel cum sero lactis.

Ad hepatis refrigerium sequentia utilissima sunt. Ac primum pro potu ordinario usurpatur vel pisana vulgaris, ex hordeo & liquiritia confecta; vel addita graminis aut acetosæ radice. Vel hujusmodi decocta permiscuntur syrupo de limonibus, aut capill. ven. Vel iis, qui palato sunt delicatiori, simplex aqua fontana, prædictis syrupis permixta exhibetur. Quod si potentius refrigerandum sit, addi possunt spiritus sulphuris aut vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. Et in vehementiori æstu additur etiam salis prunellæ Drach. i. Fit etiam ad sitim potus gustui gratissimus ex conserva rosar. cum aqua fontis permixta & colata. Cui adduntur spiritus sulphuris aut vitrioli guttæ aliquot: iisque gratam aciditatem & colorem rubellum, vino persimilem, acquirit. Hinc substitui poterit tinctura rosarum, in hunc modum composita.

℞. Rosar. rubrar. siccar. Unc. i. aquæ tepidæ ℥. iii. spiritus sulphuris, aut vitriol. Drach. i. β. Infundantur per iii. aut iv. horas. Colaturæ adde sacchari albi quartaria iii. Servetur ad usum.

Ad eisdem usum refertur julepus Alexandrinus, qui vulgò sic parari solet.

℞. Aquæ fontis ℥. j. aquæ rosar. succi limonum, &

sacchari albi, ana Unc. iv. Coquantur lentò igne, dum desumpaverint.

Posteriora duo remedia duobus modis solent usurpari: vel pro potu ordinario, vel in forma julepi bis, aut ter in die sumendi.

Varii etiam julepi hepar refrigerantes, præscribi solent, quorum sequentes formulæ exempli loco esse poterunt.

℞. Radicis acetosæ, cichorii, graminis, lapathi acuti ana ℥. i. sol. endiviæ, cichorii, acetosæ, capill. ven. ana M. i. flor. cichorii, buglossi & borrag. ana P. i. Coquantur ad ℥. i. In colatura dissolve syrupi de limonibus Unc. iii. Fiat julepus clarus pro iii. dosibus, bis in die sumendis. Si magis refrigerare studeas, adde singulis dosibus spiritus sulphur. aut vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. Potest enim misceri salis prunellæ Drach. i. ad majus refrigerium.

In herbarum penuria componantur julepi ex aquis stillicitiis. V. g.

℞. Aquarum endiviæ, acetosæ & cichorii, ana Unc. iii. syrup. de limon. & granatorum, ana Unc. i. sem. Fiat Julep. pro iii. dosibus.

Possunt etiam parari julepi ex succis efficacissimi, & gustui gratissimi: quorum hoc, omnium loco, esto exemplum.

℞. Succi pomor. redolent. recenter extracti, & per residuum depurati Unc. iv. succi limon. Unc. iii. aquæ rosaceæ Unc. ii. succi malor. granat. Unc. i. sacch. albi ℥. ℥. sem. Fiat julep. pro iii. dosibus.

Juleporum loco juscula medicata delicatioribus exhibentur, ex herbis prædictis cum pullo gallinaceo parata. Quibus ad majus refrigerium salis prunellæ ℥. i. addi potest, vel acidula redduntur guttis aliquot spiritus vitrioli.

Sanguis cichorii & chamædryos, ad sanguinem depurandum, obstructions referandas, & hepar refrigerandum utilissimus est, in syrupum reductus in hunc modum.

℞. Aquæ cichorii in B. M. paratæ q. v. folio. cichorii, partes duas, chamædri partem unam. Macerentur simul, & digerantur per triduum in B. M. postea exprimantur: liquori adde nova folia cichorii, chamædryos; digerantur iterum per triduum, deinde exprimantur, & infusiones illæ octies, vel decies repetantur. Liquor evadet rubeus instar sanguinis, cui adde sacchari partem liquori quantitatem, & fiat syrupus.

Præterea opiata & tabellæ, hepar refrigerantes & corroborantes, ita componi poterunt.

℞. Conservæ flor. cichorii, violarum, nymphææ, & buglossi an. Unc. i. pulv. elect. triasant. Drach. i. sem. Cum syrupo de limon. fiat opiata, qua utatur æger frequenter.

℞. Tabellarum triasantali duplicato rheo Unc. iv. capiat tabellam unam pond. Drach. ii. singulis diebus, manè, duabus horis ante pastum.

Conserva ex fructu cynorrhodi, seu rosæ caninæ, optinè mundato, & cocto cum saccharo, ad formam cydoniati, hepar potentissimè refrigerat, si ea utatur æger loco opiatæ prædictæ.

Tinctura corallorum, cum succo limonum parata, hepar refrigerat & corroborat, si ejus cochlearia duo singulis diebus exhibeantur, aut saltem bis in hebdomada.

Balneum aquæ tepidæ, frequenter usurpatum, totum corpus refrigerat & humectat multò potentius, & utiliùs quovis alio remedio, in emaciatis præsertim corporibus.

Serum lactis ad idem est efficax, si ad 15. dies, aut phures usurpetur. Elicitur autem commode per lactis ebullitionem, affundendo parum aceti vel succi limonum, & postea colando. Amatus Lusitanus ipsum præparat in hunc modum.

℞. Seri lactis ℥. i. syrupi acetosi valdè acidi Unc. iii. Misce, & facta una ebullitione, capiat more aquar. mineralium, scilicet per duas aut tres vices, postea deambulando. Antiqui eo utebantur ad heminas, hoc est ℥. v. Quercetanus verò in hunc modum præparat.

℞. Seri lactis ℥. ii. succi limon. ℥. ii. succi pomor. redolent.



redolent. recenter extracti Unc. iii. Omnia simul cum albumine ovi prius agitata ad ignem clarificentur addendo parum sacchari. De colatura cape Unc. vi. vel viii. continuando per 15. aut 20. dies.

At si emaciatum & consumptum fuerit corpus, lac integrum, & præsertim asininum, in plures dies exhiberi poterit.

Decoctum chinæ, cum succo limonum paratum, huic etiam ului confert: præsertim si obstructions adsuerint. Cujus compositio talis esse poterit.

℞. Rad. chinæ tenuiter incisæ Unc. i. aquæ fontis ℥. vi. succi limon. Unc. iii. Macerentur per 24. horas, deinde coquantur ad 3. partis consumptionem: postea colentur per manicam Hippocratis. Capiat Unc. v. manè & vesperi, vinumque eo diluatur.

Denique aquæ minerales vitriolatæ, utpotè aperiendi & refrigerandi vi præditæ, quales sunt nostræ Meynenses, erunt utilissimæ.

Perseverante affectu, hæmorrhoides per hirudines aperiantur, semel aut bis in mense.

Ac tandem exterius regioni hepatis epithemata & unguenta refrigerantia admoveantur. Epithemata fiunt ex aquis acetosæ, cichorii, rosar. plantag. aceto, & caphura; quibus ad robur partis additur pulvis trium santalorum. Unguenta verò sunt, rosaceum, refrigerans Galeni, & ceratum santalinum.

## C A P U T II.

### De Hepatis inflammatione, Abscessu, & Ulcere.

**H**epatis inflammatio est tumor calidus, ex sanguine extravasato, & in illius substantiam effuso, oriundus.

Prout autem sanguis vel purus est ac sincerus, vel aliis humoribus permixtus, sic varias tumoris differentias producit. Si enim à sanguine puro, phlegmonem exquisitam parit. Si verò ab eodem cum bile, pituita, aut melancholia permixto generetur, phlegmonem erysipelatosam, œdematosam, aut scirrhosam generat. Et vice versa, si prædicti humores sanguini prædominantur, erysipelas phlegmonosum, œdema, aut scirrhum pariter phlegmonosum efficit.

Est & alia differentia ratione loci, in quo fit inflammatio, prout illa vel partem gibbam hepatis occupat, vel cavam. Quod tamen ita accipiendum est, docente Galeno 5. de locis affect. cap. 7. ut in neutra hepatis parte, exquisite distincta, inflammatio possit consistere, ut altera integra, & omnis mali immunis conservetur: quia visceris caro continua est in omnibus suis partibus, ideò una patiente, altera etiam quodammodo afficitur.

Præterea animadversione dignum est, quod docuit Galen. 13. meth. c. 24. Cavâ hepatis parte laborante, inflammationem necessariò venis mesenterii communicari, quæ ex vena porta oriuntur. Et docet experientia, in iis qui ex tali inflammatione perierunt, abscessum non solum in hepate, sed etiam in mesenterio repertum esse.

Notandum etiam est ex Hipp. Aph. 45. sect. 7. inflammationem aliquando solam membranam, hepar vestientem occupare: aliquando verò ipsam hepatis substantiam, & proprium parenchyma. Quorum, inquit, hepar suppuratum aduritur, si pus purum fluxerit, & album, evadunt in tunica enim his pus continetur. Si verò qualis amurca fluat, percunt. Galen. in comment. sic loquitur: Quibus in tunica est pus, nihil patiente substantia hepatis salvantur omnes: quibus verò usque ad carnem hepatis, corruptio pertingit, non absque ratione moriuntur.

Causæ hujus affectus immediatæ sunt sanguinis quantitas nimia, vel ejusdem effervescencia, tenuitas & acrimonia, commotio & exagitatio in venis, in quibus propter dictas causas faciliè extravasatur, & in partes magis dispositas effunditur. Hepar autem magis dispositum redditur ad sanguinem influentem recipiendum, si calidius sit, vel dolore aliquo tentetur: calor enim & dolor attrahunt, vel denique, si nativâ quadam, aut ascititiâ imbe-

cillitate laboret; quia omnes partes humore aliquo gravatæ, ad debiliores sese exonerant. Ad harum etiam causarum numerum referri debet hepatis obstructio, quæ facit, ut humores crassi retineantur, putrescant, & dolore præternaturali inflammentur.

Causæ verò externæ plurimæ esse possunt: ut nimia corporis calefactio, ex immodico motu, Sole, vel igne acquisita: cibi calefacientes, acres, vel aromatibus conditi: vini generosi potus immodicus, effrænata Venus, excandescencia, percussio, casus circa hepatis regionem. Idem præstant medicamenta calefacientia, regioni hepatis præposterè admota: sicut refert Fabricius Hildanus, cuidam intemperie frigida ventriculi laboranti, emplastra & unguenta calida ex pipere, cardamomo, oleo garyphylorum, & similibus admota fuisse, atque inde inflammationem hepatis excitatam. Hepar enim ventriculum contegit, ut medicamenta ventriculo admota ipsum primò afficiant.

Idem præstare possunt cucurbitulæ regioni hepatis admotæ. Cujus etiam rei exemplum affert idem Fabricius Hildanus, de quodam hæmorrhagia narium laborante, qui cum magnæ cucurbitulæ ad hepatis regionem admotæ fuissent, sanguis quidem substituit; sed hepatis inflammatio sequuta est.

Signa diagnostica hujus affectus plurima proponuntur à Galeno aliisque authoribus, quæ hîc sigillatim exponenda sunt; quandoquidem sæpè in recta illius diagnosi errare Medicos contingit.

Primum signum est Gravitas in dextro hypochondrio, quæ à repletionem & distensione hepatis contingit, quandoquidem viscus suapte natura amplum, & valdè compactum, si humore multo repleatur, summam gravitatem nanciscitur, quæ ab ægotante præcipuè percipitur, dum sese ab uno latere in aliud convertit.

Secundum signum est dolor, qui aliàs in uno, aliàs in duobus & tribus locis percipitur. In ipsa hepatis regione dolor percipitur gravativus. Aliquando etiam in nothis costis, isque tensivus, quando inflammatio ligamenti hepatis suspensorii communicatur, quæ costis nothis connectuntur. Aliquando etiam dolor communicatur jugulo per continuationem membranarum quæ communionem habent cum membrana hepar vestiente.

Tertium signum est febris, quæ noctu ut plurimum exacerbatur, & magis vel minus acuta est pro ratione humoris peccantis: in biliosa enim inflammatione ardentissima est, in pituitosa mitis, & in sanguineâ medio modo se habet.

Quartum signum est difficultas spirandi, propterea quòd hepar diaphragmati contiguum est, eique alligatur; atque adeò gravitate suâ illud deorsum trahit, tum magnitudine & intumescentiâ illud etiam comprimit; ita ut utroque modo liberum ejus modum impediatur.

Prædicta signa univoca sunt, & pathognomonica. Multò verò alia dantur æquivoca, & ad certam diagnosis stabilendam non parùm conferentia; qualia sunt tussis sicca, & molesta: pulsus durus, inæqualis, & quodammodo ferratilis: color linguæ primùm ruber, deinde niger: cibi fastidium vehemens: sitis inextinguibilis: vomitus biliosus, & interdum pituitosus: color totius corporis pallidus, ad ictericum vergens: urina rubra, flammea, & acris: decubitus supinus facilis, difficilior supra latera, quia in dextro decubitu hepar premitur à ventriculo; in sinistro tenditur & suspenditur: alvus adstricta, à calore omnem humiditatem chylosæ materiæ absorbente: interdum tamen liquida est, si nimirum inflammationi summa hepatis imbecillitas conjungatur; tunc enim liquida excrementa dejiciuntur, & loturæ carniū interdum similia.

Signa differentiarum ita instituenda sunt: si gibba, vel convexa hepatis pars afficiatur, tumor adest in dextro hypochondrio tactui conspicuus, & figuram hepatis, instar semilunæ referens: dolor inter respirandum major, & usque ad dextram juguli partem protensus, ut detrahi videatur; tussis & respiratio crebrior, & gravitas major.



## Cap. II. De Hepat. Inflam. Abscess. & Ulc. 319

Si verò cava hepatis pars laboret, tumor ad tactum non est adeò conspicuus. Attamen quia, ut antea diximus una pars hepatis inflammari non potest, quin alia etiam aliquid patiat, dolor aliquis in visere tangendo & comprimendo percipitur: deinde quia hæc pars ventriculo incubat, majus adest cibi fastidium, major vomitus, sius, & ventris laxitas, ex corruptis alimentis in ventriculo propter viciniam graviter affecto.

Signa causarum in hunc modum se habent. Si inflammatio à puro sanguine oriatur, rubor adest faciei interdum purus, interdum verò subfuscus: pulsus magnus, mollis, & undosus, urina rubea & crassa; corporis habitus carnosus, dulcedo quædam in ore; ætas juvenilis; victus præcedens plenus, & liberalis.

Si verò bilis prædominetur, color est citrinus in facie, pulsus, velox, durus, & inæqualis; urina tenuis, intense citrina, & interdum flammea: habitus macilentus & extenuatus, oculi concavi: oris amaror: vomitus biliosus: præcesserunt causæ bilem multiplicantes.

Quia verò inflammatio musculorum abdominis cum hepatis inflammatione magnam habet similitudinem, ideò hæc ab illa propriis signis distinguenda est.

In musculorum abdominis inflammatione cutis circumtensa est, ut si quis digitis apprehensam attrahere velit, ea minimè sequatur. Rectorum musculorum tumores oblongi, & per totum ventrem extensi, umbilicum comprehendunt. Sic etiam aliorum musculorum inflammatio, eorum figuram quodammodò repræsentat. Contrà verò hepatis inflammatio partis laborantis figuram & circumscriptionem præ se fert: tum si muscoli manibus tractentur, tactui cedere videntur, & tumor profundior apparet. Præterea totius corporis color est magni momenti ad hosce affectus distinguendos: siquidem in musculorum inflammatione vividus permanet, & ferè in naturali statu constitutus: at hepatis in inflammatione pallidus & citrinus apparet, ad ictericum vergens. Hujus rei insigne exemplum habetur apud Gal. 5. de loc. aff. c. 7. de quodam Stefano, qui cum ab aliis Medicis judicatus fuisset abscessum habere in hepate: Galenus vocatus, ex sola faciei inspectione statim pronuntiavit, non esse abscessum in hepate, & ventre postmodum explorato, in musculis abdominis latere comperuit. Hoc autem ita judicavit, quòd æger non haberet faciem ita immutatam, ut in hepatis inflammatione vel abscessu esse debuisset. Simile exemplum habetur apud Valeriolam lib. 4. observationum cap. 5. de quadam muliere quæ ab alio Medico judicata fuerat habere tumorem phlegmonosum in hepate. At ille. *Quum verò, inquit, agra me ad curam adhibuisset, non pati illam secundum hepar phlegmonosum tumorem judicavi; sed in musculis supra positis:* Et paulo post: *Ut primum ad hanc vocatus, locum tango, invenio in hypochondrio dextro tumorem oblongum, qui se ad umbilicum proferebat: tumor porro sese mox tactui offerebat: color in facie rubicundus, vividus, roseus, ex rubeo & albo mixtus, per omnem morbi decursum in eodem statu permanens, urina optimæ consistentiæ, coloris, atque contentorum apparebant. Ex quibus omnibus deprehendi non jecur in hac, sed solum musculos abdominis supra positos morbo teneri. Ubi namque hepar afficitur, vitium in facie colorem apparere necessario oportet.* Ex colore namque plurimos, secundum hepar laborantes, deprehendisse Galenū, ipsemet testis est lib. 5. de loc. aff. cap. 7. hepaticorum enim color ad citrinitatem & albedinem, cum fusco quodam virore plerumque inclinat.

Præterea pleuritidem ab hepatis inflammatione distinguere satis operosum est: quemadmodum apud Galen. 5. de loc. aff. cap. 7. videre est in historia Siculi Medici, qui in seipso deceptus est, se pleuritide laborare arbitratus ex eo, quod illi adest febris, respiratio parva & frequens, tussis exigua, & dolor inferiores costas attingens. Galenus tamen, eum hepate tentari, cognovit ex alvi dejectionibus, quæ loturæ carniū erant consimiles. Tales enim dejectiones fluxum hepaticum constituunt, & hepar maxime laborare ostendunt. Verum ille ad signum facere perpetuò non potest ad distinguendam pleuritidem ab hepatis inflammatione: siquidem, docente Galeno, loc. citato de-

jectiones hujusmodi liquidæ & cruentæ accidunt tantum in hepatis inflammatione, quando cum ea summa debilitas conjuncta est; alioqui unum ex signis hepatis inflammationis, ab eodem Galeno propositum, est alvus adstricta. Ideò deficiente illa hepatis imbecillitate, quærenda sunt alia signa, quibus pleuritidem ab hepatis inflammatione distinguere possimus. Si itaque inflammatio pleuram versus dextrum hypochondrium occupet, dolor erit vehementior & punctorius, difficultas spirandi major, nulla erit coloris faciei mutatio, tussis vehementior ac molestior est, non planè sicca; sed plerumque, saltem procedente malo, cruento sputo aut aliquantum saltem colorata conjuncta; ac denique pulsus durus est ac ferrinus. In hepatis autem inflammatione dolor minor est, cum gravitatis sensu conjunctus, color corporis ad flavum accedit, tussicula adest arida, dilucida habens intervalla: pulsus minus durus: tumor denique aliquis in dextro hypochondrio apparet.

Denique, si inflammatio sit in mesenterio, tumor infra regionem hepatis apparebit: coloris mutatio in facie nulla erit; alvi dejectiones erunt liquidæ, in quibus primò tenuis & cruda quædam sanies conspicitur: postea materia quædam concocta puris speciem referens, præsertim ubi sanationis spes est.

Prognosis hujus affectus ita instituenda est.

Omnis hepatis inflammatio periculosissima est, plerumque lethalis, si non citò jugulat, in hydropem, aut atrophiam terminatur. Unica autem salutis spes in virium robore consistit, ex Gal. 10. meth. cap. 5.

Inflammatio gibbam hepatis partem occupans, periculosior est ea, quæ cavam obsidet, propter majorem viciniam cordis, septi transversi, & venæ cavæ.

A bilioso succo inflammatio proveniens periculosior est ea, quæ à puro sanguine sit; quia febris intensior, & reliqua symptomata graviora.

In hepatis inflammatione singultus, malum, ex Hipp. Aph. 17. sect. 7. Indicat enim augmentum inflammationis, ejusque malignitatem, quæ ventriculum per consensum vehementer afficiat.

Alvi fluxus, hepatis inflammationi conjunctus, lethalis est, nisi materia, quæ excernitur, concocta appareat, & fluxus ille criticè auferatur.

Si inflammatio hepatis per resolutionem discuti non valeat, quod rarissimè contingit, in abscessum degenerat, si facultas valida sit; alioquin in gangrænam sphacelum convertitur. Et suppuratio ut plurimum intra viginti dies contingit. Et ille abscessus etiam periculosissimus est, ab eoque pauci evadunt. Si tamen exiguus sit, particulam tantum hepatis exiguam occupans, & pus album ac æquale per alvum vel urinas effluat, liberantur. Sic etiam, tumore extimam & convexam hepatis superficiem occupante, ita ut in summa cute eminentiam faciat cum quodam fluctuationis sensu, cauterio actuali aperiri potest, & si pus album & purum effluxerit, evadunt; in tunica enim pus continetur: sin qualis amurca, intereunt.

Rupto abscessu, si æger superstes fuerit, ulcus remanet, quod etiam Medico curanti magnum facit negotium. Ac nisi superficialium sit, in hydropem, aut marasimum ægrotantem perducit.

Potest etiam ulcus in hepate fieri ab humoribus acris & erodentibus, præsertim biliosis, per hepatis substantiam diffusis, qui sensim putrescentes, malignam & virulentam qualitatem acquirunt.

Hujus ulceris, sine præcedente inflammatione, ex humorum acrimonia geniti diagnosi difficillima est. Quibusdam tamen signis internosci poterit. Ac primum dolor quidam ulcerosus in hypochondrio dextro percipitur æger sensim contabescit: & si ulcus sit in cavo hepatis, dejectiones alvi purulentæ apparent. Interdum & quippiam cruentum excernitur, cum dolore intestinorum, ob materiæ acrimoniam, ut dysenteriam æmuletur, quæ ab hoc affectu distinguitur ex eo, quod sensus gravitatis & punctiois circa hepar hæreat. Interdum verò jecoris portiunculas per alvum excretas fuisse, ab authoribus observatum. Si verò in parte gibba ulcus lateat, urina purulenta



rulenta apparet, absque ullo affectu renum aut vesicæ indicio. Febris in progressu morbi, lenta oritur typum non fervans, quæ tandem in hecticam degenerat. Color faciei citrinus apparet, & nonnunquam pustulæ parvæ, ex humorum aduisione, in ea efflorescunt. Ciborum omnium præcipuè carnis, magnum est fastidium; fœtor anhelitus adeit; ac tandem frequens animi deliquium accedit.

De prognosi simul dictum est, quod hæc affectio febrem lentam & hecticam accersat.

Præterea, nisi ulcus exiguum sit & superficiale, & inter initia curetur, exitiale est.

Periculosiores sunt hepatis exulcerationes, quæ inflammationes & abscessus sequuntur, quàm quæ sine iis incipiunt.

Curatio inflammationis hepatis eadem ferè instituenda est, quæ in ventriculi inflammatione fuit proposita, & imprimis, quod ad phlebotomiam attinet, purgationem, & alterantia remedia, in principio morbi exhibenda.

Clysteres etiam frequenter injiciendi, quales in ventriculi inflammatione descripti sunt.

At in progressu julepi refrigerantes, detergentes, & aperientes erunt propinandi, quales superiori capite fuerunt descripti. Cavendo tamen, ne admodum dulces sint: nam dulcibus hepar inflammatum in majorem molem attollitur, ut docet Trallianus *lib. 4. cap. 10.*

Pro potu utatur æger decocto hordei & graminis, cum tantillo liquiritiæ, vel syrupo violaceo, aut capil. ven.

In declinatione adduntur prædictis julepi radices apii, & petroselinii, sol. agrimonii, capil. ven. &c.

Ac tandem terebinthina cum aqua agrimonii vel petrosel. lota, bis, aut ter exhibita, morbi reliquias abstergit.

Si verò morbus sit contumacior, & diutius protrahi videatur, apozema ex aperientibus & laxantibus erit præscribendum in sequentem modum.

℞. Rad. apii, petrosel. ana Unc. ii. polipodii querc. recent. Unc. ii. folior. agrimon. pimpinel. cerach. capill. vener. ana M. i. sem. anisi, fœniculi, & petrosel. ana ʒ. i. florum chamom. violar. ana P. i. fennæ mundat. ʒ. i. Coquantur ad ℥. i. β. In colatura dissolve rhabarb. in aqua cichorii cum spica infusi ʒ. ii. syrupi acetosi simpl. ʒ. iv. Fiat apozema pro iv. dosibus alternis diebus sumendis.

Exteriùs verò varia conveniunt topica, toto morbi decursu admovenda. Ac primum ab initio morbi conveniunt epithemata, linimenta, & cataplasmata refrigerantia, fluxionem inhibentia, quorum compositio talis esse poterit.

℞. Aquar. endiviæ, cichorii, acetosæ, plantag. & rofar. an. ʒ. ii. aceti rosac. ʒ. i. pulveris electuarii trium santalor. ʒ. i. β. camphoræ ʒ. β. Fiat epithema admovendum regioni hepatis, tepide, frequenter. Vel

℞. Flor. endiviæ, cichorii, scariolæ, plantag. buglossi, borrag. & flor. nymphææ, ana M. i. absinthii Roman. M. sem. rofar. rubrar. P. ii. santali rubri & citrini ana ʒ. ii. Coquantur ad ℥. i. semis in colatura dissolve aquæ rofar. ℥. β. aceti rosacei Unc. i. camphoræ ʒ. i. Fiat epithema.

Si magis refrigerare est animus prædictarum herbarum succi alterutri epithemati addi possunt.

℞. Olei rofar. ʒ. ii. olei de absinthio ʒ. sem. Misce, abluantur oxycrato, & inungatur eadem regio post usum epithematis. Vel

℞. Olei rosac. & myrtyni, ana ʒ. ii. succi endiviæ & cichorii, ana ʒ. i. aceti ʒ. sem. Bulliant ad succorum consumptionem; deinde adde pulv. santali rubri, & rofar. rubr. ana Drach. i. ceræ albæ quantum satis. Fiat unguentum.

Vel unguentum rosac. solum, aut refrigerans Galeni oxycrato lotum potest ad moveri.

In progressu morbi, mitescente febre ac dolore, resolventia refrigerantibus permiscenda sunt, æquali, vel inæquali doli, prout morbus ad statum, aut declinationem magis vel minus accedere videtur, quæ à Medico prudenter temperari debet. Ut tamen eorum materia innotescat, nonnulla exempla annotabimus.

℞. Ole. rosac. ʒ. ii. ol. de absinth. i. ol. chamom. ʒ. β. pulv. trium santal. ʒ. i. spicæ nardi ʒ. β. ceræ q. f. Fiat linimentum.

℞. Dactyl. mundat. n. x. passular. integrar. Unc. iii. Coquantur in oxycrato, postea contundantur, addendo flor. chamomil. melilot. rofar. rubrar. P. i. spicæ nardi, schœnanthi, an. ʒ. i. sem. apii, petrosel. an. ʒ. β. endiviæ portul. ana ʒ. i. olei de absinth. & rofar. ana ʒ. i. farinæ hordei ʒ. ii. Fiat cataplasma.

Vel minus calidum sic parabitur.

℞. Farinæ hordei Unc. iii. santali rubri Unc. ii. olei rofar. Unc. iii. Misce, cum decocto endiviæ & cichorii, fiat cataplasma.

In declinatione, febre profligatâ, resolventia erunt admovenda, additis erollientibus, ne qua durities supersit, & nonnullis adstringentibus, ad robur partis conservandum.

℞. Rad. althææ ʒ. iii. rad. cyperi & calami aromat. ana ʒ. sem. fol. malvæ, violar. agrimon. ana M. i. absinthii utriusque ana M. i. sem. lini, fœnugr. anisi & fœniculi, ana ʒ. sem. flor. chamæm. melilot. anethi, ana P. i. spicæ nardi schœnanthi, mastiches, ana ʒ. i. sem. Fiat omnium decoctio, quâ foveatur pars affecta calidiuscule.

℞. Ol. chamæmel. lilior. & amygd. dulc. ana ʒ. i. olei de absinthio & nardo, ana ʒ. β. pulv. schœnanthi, rosatæ novellæ, & absinthii ana ʒ. i. ceræ q. f. Fiat linimentum in declinatione usurpandum.

Si durities partis persistat, gummi ammoniacum in aceto dissolutum prædicto linimento addere conveniet, vel etiam sequens emplastrum erit admovendum.

℞. Empl. de meliloto, & dyachylonis ireati, ana ʒ. i. Misce, extendantur super alutam. Fiat emplastrum ad formam semilunæ, admovendum parti affectæ. Vel

℞. Gummi ammoniaci in aceto remollii Unc. i. laudani & mastiches, ana ʒ. ii. olei absinthii & ceræ, ana q. f. Fiat emplastrum.

Si inflammatio ad suppurationem vergat, quod cognoscetur ex febris & doloris intensione, juxta *Aphor. 47. lib. 2.* maximum est periculum, & pauci evadunt. Attamen suppuratio adjuvanda est emplastris prædictis, quæ materiam resolubilem solvent, & suppurabilem suppurabunt, tum etiam admotis cataplasmatibus emollientibus: intus verò exhibendo jus pulli, alteratum malvâ, althæâ caricis, prunis. Rupto abscessu, si pus album effluat per alvum, aut urinas, abstergendum est aquâ hordei vel sero lactis, cum melle rosaceo, tum iis remediis, quæ ad ulceris ventriculi curationem proposita sunt. Si verò suppuratio vergat in partem externam, cultello ignito aperienda est, secundum Hippocratem. Et si pus effluat album & coctum, spes est sanationis. Si verò rubrum, fœculentum & fœtidum, tendit æger ad interitum.

### CAPUT III.

#### De obstructione Hepatis.

**H**epatis obstructio est angustia & oclusio præternaturalis propaginum venæ portæ & cavæ, quandoque etiam ipsius parenchymatis, transitum humorum naturalium, alimentique distributionem impediens, a materia ipsarum cavitatem opplente producta.

Hinc patet, obstructionem esse morbum organicum, nempe in via, & meatu obructo, qui sanguinis distributionem impedit ad membra nutrienda. Viæ autem illæ & meatus non solum venæ sunt, per totum hepatis parenchyma dispersæ; sed etiam pori, & meatus insensibiles, quibus tota hepatis, sicut & reliquarum partium substantia referta est, quibus ab humore præternaturali oclusis, nec calor hepatis instituit ventilari, nec halituosa & tenuia excrementa evacuari possunt.

Materia obstructionem efficiens, ut plurimum est humor crassus, viscidus, & lentus, qui liberè præterfluere non valens, in meatibus illis subsistit, & à calore partis magis ac magis incrassatur, ita ut obstructiones, quo diuturniores sunt, eo contumaciores evadant.



Interdum etiam humorum quantitas & copia obstructionem efficere solet, ut docuit Galen. 11. meth. c.2. his verbis: *Jam verò obstructionum ipsarum alia est, quæ ex abundantia; alia, quæ ex qualitate succorum, scilicet qui aut leniti, aut crassi sint, incidit. Præferatur autem inter remedia in ea quam copia facit, sanguinis missio: in ea quæ ex humoris qualitate consistit, attenuantium usus.*

Illa autem obstructio, à copia humorum oriunda, præcipuè in vasis & cavitatibus contingit, quando illa nimis repleta ita distenduntur, ut non possint se se contrahere ad exclusionem materiæ contentæ; quemadmodum sæpè observavimus vesicam à nimia urinæ copia ex diuturniori illius retentione distentam, se se contrahere non posse; unde urinæ suppressio, aut difficilis illius exclusio succedit.

Non solum autem humores, sed etiam interdum status crassi & copiosi, qui non facile discuti possunt (quod illis non pateat exitus, ut in colico dolore contingit) obstructionis causa esse possunt, docente Galen. 3. de locis aff. Quæ tamen causa rarissima est, & à nonnullis absolute negatur.

Humor crassitie obstruens est in primis pituita, quæ facile crassitiem, & visciditatem contrahit. Hanc sequitur melancholia, quæ frigiditate, crassitie, & fœculentiâ obstructionem parere potest. Sanguis verò ratione quantitatis & crassitiei idem præstare valet. Ac denique bilis, in hepate diutius hærens, crassescit, & perniciosas obstructions parit. Causæ antecedentes & procatacticæ sunt, quæcunque humores crassos & viscosos producere valent: ut aër crassus & nebulosus, cibi crassi, succi viscididi, ac difficilis coctionis & distributionis, adstringentes, frigidi, ad esum parum apti; ut pyra, cydonia, sorba, mespila, fungi, caseus, legumina, caro bovina & porcina, pisces viscosi, & fumo indurati, panis non probe coctus, rapæ, castanæ, vinum crassum, rubrum, stypticum & cerevisia crassa.

Mala autem hepatis dispositio, frigida præsertim intemperies, etiam ex laudabili cibo obstructions gignere potest, si nempe oblatum chylum non bene concoquat; sed eum in materiam tartaream & mucilaginosam convertat. Ventriculi etiam intemperies causa obstructionum esse potest, dum chylum crudiores generat, qui ab hepate postmodum rectè subigi non valet; siquidem vitium primæ concoctionis non corrigitur in secunda.

Signa hujus affectus diagnostica in varias particulas dividenda sunt, ut alia morbi speciem, alia partem affectam, alia causam morbum producentem significant.

Signa morbi speciem indicantia, omnibus partibus naturalibus, obstructionibus obnoxiiis, communia sunt. Indicant enim solum obstructions in imo ventre latitantes, & ita hæc diagnosi obstructionibus lienis & mesenterii præsertim cognoscendis inserviet.

Obstructions igitur in dictis partibus latitantes ostendunt alvi excrementa à naturali statu recedentia præsertim liquidiora, humida, alba, chylosa, & interdum sanguinolenta: urina alba, tenuis, aquosa & velut transcolata; quia partes crassiores propter obstructions transire non possunt, sed sola aquositas tenuior impermixta præterlabitur; potest tamen esse citrina, si caliditas adsit: difficilis respiratio, præcipuè si æger concitatiore gressu ambulet, vel montes, aut scalas ascendat; qui partes obstructæ diaphragma deorsum trahunt, ejusque liberum motum impediunt: faciei color pallidus, macies, & scintilles totius corporis, pulsus inæqualis; ac denique gravitatis sensus in hypochondriis illi persimilis, quem percipiunt ii, qui sese cibis plurimis impleverunt. Ideò Hippocr. 4. de victus rat. in acut. gravitatem illam vocat satietatem hypochondriorum, affectionem hypochondriis tribuens, quæ propriè ventriculo debetur. Quotiescumque enim hepar & lien pravis humoribus replentur & intumescunt, ab assumpto cibo, etiam levissimo, & in pauca quantitate ingesto, comprimuntur, & gravitatem inferunt, similem gravitati eorum, qui immodicè cibis & potibus se se impleverunt. Hoc signum hypochondriorum obstructionem tam certò indicat, licet

nullus dolor, nec tumor in illis partibus appareat, ut Prosper Martianus comment. in libr. Hippocr. prædictum, asserat se hoc solo signo, viscerum obstructions, ante hypochondriorum contrectationem, affirmare non dubitasse.

Partem affectam indicant, cum signis prædictis, tensio & renitentia in dextro hypochondrio, & aliquandò dolor in eadem parte, isque gravativus & obtusus, qui à sumpto cibo ingravescit, præsertim si ab hujus ingestione vehementior exercitatio subeat: tussis interdum sicca, respiratio difficilis propter majorem cum diaphragmate viciniam, & gravius visceris pondus, quam reliquarum partium.

Signa causarum sunt: Si fiat ab humoribus dolor magis gravans, tensivus, & fixus: & si à flatibus, acutior, & vagus: Si à frigidis humoribus, major gravitatis sensus in dextro hypochondrio, color faciei albidior, nulla febris, neque sitis, victus ratio frigida, crassa, & vita otiosa pressit. Si à calidis humoribus, gravitas minor adest, major sitis, facies citrina à bile, rubra à sanguine, febris, & dolor interdum pungitivus, & victus calidus præcessit.

Prognosis hujus affectus in hunc modum instituenda est.

Obstructio recens facile tollitur, inveterata difficulter.

Obstructio hepatis etsi citò penitusque tollatur, infinita mala inferre consuevit, nempe humorum putredines, febres, inflammationes, alvi fluxus varios, diuturnos, ac vehementes; quia aliæ entia ad partes nutriendas penetrare nequeunt, colicam, icterum, cachexiam, hydropem, scirrhum, aliosque infinitos morbos, ut Avicenna obstructionem ægritudinum matrem vocaverit.

Obstructio, quæ sit ab humoribus, deterior est, quàm quæ à flatu generatur.

Quæ à crudis & pituitosis humoribus, vel à flatu producit, febre superveniente interdum dissolvitur: siquidem calor febrilis flatum discutit, pituitam attenuat, & fluidiorem reddit, ac resolvit.

Curatio obstructionis auspicanda est ab universali totius corporis evacuatione, quæ sit primùm potione purgante ægrotantis naturæ appropriatâ; mox, si quædam plethoræ indicia appareant, nisi corpus sit valdè emaciatum, detrahendus erit sanguis ex basilica dextra.

Postea verò sequens apozema erit præscribendum.

℞. Rad. apii, petrosel. fœniculi in vino albo per noctem infusar. an. Unc. i. rad. chelidon. maj. Unc. ij. rad. filicis; enulæ camp. cortic. rad. cappar. mediani fraxini, & tamarisci, an. Unc. sem. fol. absinth. agrimonii, capilli ven. chamædr. summitatum hyperici & centaur. min. an. M. j. semin. apii petrosel. anisi & fœniculi, an. Unc. sem. fennæ mundatæ, polypod. querc. & medullæ semin. carthami, an. Unc. ij. epithymi cretici Unc. i. zinzib. & caryophyl. an. Drach. j. florum tamarisci; calendulæ cicerum rubror. an. P. i. Fiat decoctio ad quartaria 5. In colat. dissolve syrupi de 5. radicib. & rosar. solut. an. Unc. ij. Fiat apozema clarificatum, & aromat. Drach. ij. cinam. elect. pro iiij. dosibus matutinis, addendo unicuique dosi crystalli tartari Drach. j. salis absinthii & tamarisc. an. scrup. sem.

In ultima dosi dissolve (si priores sufficientes non purgaverunt) elect. de citro solut. & diacartham. ana Drach. i. sem.

Prædicto decocto interdum additur vinum album, interdum aceti parum, pro ægri natura.

Si æger fuerit delicatior, & apozematis usum ferre nequeat, in ejus locum sequentia juscula erunt usurpanda.

℞. Rad. apii, petrosel. & asparagi an. Unc. sem. fol. agrimon. hyssopi, capill. ven. an. M. j. crystalli tartari Drach. i. Bulliant cum pullo gallinaceo, vel cum frustulo colli vervecini. Fiat jusculum, quod capiat manè per ix. dies.

Melius est crystallum tartari in jusculo jam confecto & colato dissolvere, quia in decoctione refrigerat, con- crescit iterum majori parte, & ab ea separatur. Imò verò,

S s dum



dum exhibetur cum iusculo, moveri debet diligenter, cochleari argenteo, immediate priusquam assumatur, alioqui bona illius pars fundo scutellæ relinquitur.

Alternis iusculis infunde, & leviter decoque, fennæ mundatæ Unc. β. sem. anisi. Drach. j.

Quandiu utitur æger remediis prædictis, vel etiam post eorum usum, quoties opus videbitur, foveatur regio hepatis manè, horâ unâ ante haustum apozematis, & vesperi horâ unâ ante cœnam, fotu sequenti.

℞. Rad. althææ & bryoniæ. an. Unc. i. sem. rad. ebuli. cypri. eryngii, cortic. rad. capparis, & mediani tamarisci, an. Unc. i. Fol. malvæ, althææ, violariæ, agrimonii, Chamædr. menthæ, & absinthii, ana M. i. Sem. lini, fœnugræci, & baccar. juniperi. an. Unc. sem. Coriandri, & fantal. citrin. an. Drach. iij. flor. genistæ, sambuci, chamæm. & melilot. an. P. i. Fiat omnium decoctio in duab. partib. aquæ chalybeatæ, & ana vini albi, sub finem additi. Colaturæ adde acetis β. Foveatur pars, ut dictum est.

Post fotum inungatur eadem regio unguento sequenti.

℞. Ol. lilior. de capparib. an. Unc. iij. succi rad. bryoniæ, & apii an. Unc. iij. Bulliant ad succorum consumptionem, addendo unguenti de althæa, & gummi ammoniaci in aceto soluti. & trajecti, ana ℥. i. Sem. dauci, & spicæ nardi, ana ℥. i. sem. Cera flavæ. q. s. Fiat unguentum, quo utatur æger, ut dictum est, addendo acetrosæci parum, unctio-nis tempore.

Post horum remediorum usum, ad obstructionum reliquias conterendas, & partis robur instaurandum, convenit opiata sequens.

℞. Conservæ fol. absinthii capill. ven. & flor. tamarisci, ana Unc. i. conserv. rad. enulæ camp. & cortic. c. tr. conditi, an ℥. β. myrobalan. condit. n. i. nucis moschat. condit. ℥. iij. coctæ. alkerim. Drach. ij. pulver. elect. diarrhod. abbat. tis ℥. j. salis absinthii, & tamarisci, an. ℥. iij. croci ℥. j. ambræ griseæ ℥. β. Cum syrupo condituræ citri, fiat opiata, de qua capiat magnit. castaneæ singulis diebus manè, duabus horis ante pastum, superbibendo vini Hippocr. parum.

Plurimum etiam conferent balnea tepida in quibus emollientia & aperientia bullierint.

Si obstructiones contumaciores sint, pilulæ sequentes in usum veniant.

℞. Aloës optim. succo absinthii diligenter nutritæ, Unc. sem. gummi ammoniaci aceto soluti & trajecti ℥. iij. myrrhæ electæ in vino calente solutæ, & trajectæ, Drach. ij. pulver. electuar. triafant. & cryst. tart. ana ℥. i. agarici recenter trochisc. & rhabarb. elect. ana Drach. ij. salis absinthii & tamarisci ana Drach. sem. croci. Scrup. sem. Cum syrup. rosar. solut. fiat massa pilular. de qua capiat Drach. sem. duabus horis ante prandium, bis in septimana.

Loco apozematis prædicti, decoctum galli veteris utiliter substitui poterit, in diuturnis & contumacibus obstructionibus.

℞. Polypod. querc. & sem. carthami, ana Unc. i. summ. thymi & epithymi, ana P. i. Sem. anisi, fœniculi, carvi, ana Drach. ij. fennæ mundat. Unc. ij. crystall. tart. Unc. sem. Contundantur omnia, misceantur, iisque impleatur venter galli veteris eviscerati. Coquantur in tribus aquæ partibus, & una vini albi, donec galli caro ab ossibus separetur. Fiat iusculum, quod capiat æger in quatuor doses matutinas.

Vel quod melius erit, ex quarta prædictorum simplicium parte, fiat decoctio pro una dosi, in singulos dies usurpanda.

Huic etiam iusculo addi possunt herbæ & radices aperientes in parva quantitate.

Ad obstructiones inveteratas, maximè commendat Quercetanus in Pharmacopœa pulver. rad. aronis compositum, cujus Drach. ij. cum liquore idonea ad aliquot dies exhiberi possunt.

Sed præ cæteris omnibus medicamentis, ad delendas obstructiones inveteratas, maximè conferunt remedia ex tartaro, vitriolo, & chalybe conflata.

Ex tartaro sunt crystallus, sal, & spiritus, & cum variis medicamentorum formis exhibentur.

Crystalli tartari usus supra propositus est in apozemate, & iusculis medicatis, tum ex pullo gallinaceo, tum ex Gailo veteri conflatis. Circa hoc medicamentum juniores medici monendi sunt, id majoris esse efficaciam quàm vulgò creditur, quandoquidem illi in usu prædicto rarò animadvertimus, propter incuriam Pharmacopœorum, & fraudem pseudochymicorum, seu plebeiorum illorum destillatorum, qui chymica medicamenta Pharmacopœis vendunt, quorum nullum ferè sincerum est, sed omnia adulterata. Incuria Pharmacopœorum majori parte talis est, ut crystallum tartari à destillatoribus illis emere malint, quàm propriâ manu conficere (quamvis nulla medicamentorum præparatio in tota arte facilius reperitur) quia vilissimo pretio illis venditur, & non nisi majori sumptu ipsimet præparare possent: libra siquidem illius, septem vel octo assibus tantum ab illis impottoribus venditur. Ex hoc solo, Pharmacopœi fraudem arguere deberent, damnum potius inde emergere videntes, quàm lucrum aliquod, si fideliter præparetur. Fraus verò in eo ve satur, quod impostores illi parum tartari, & multum aluminis decoctis suis admisceant, non quòd tartarum carius vendatur, sed quòd exiguam crystallorum copiam præbeat; alumen verò totum in crystallos abeat. Hinc medici suo fine fraudantur, cum alumen astringendi vi præditum sit, aperiendi facultati, quæ ab illis desideratur, contraria. Aliud præterea damnum huic medicamento inferitur, quòd nimirum crystalli hujusmodi eliciantur per decoctiones factas in cacabis æneis, à quibus maligna æris qualitas medicamento imprimitur. Notissimum enim, & vulgatissimum est Pharmaciam præceptum, ne acila in valis æneis decoquantur, quia faciliè penetrant, & quandam æris tincturam maximè noxiam attrahunt. At crystalli tartari acidissimi sunt, & à nonnullis acidum tartari nominatur. Qui tamen error ut plurimum ab ipsis Pharmacopœis committitur, & omnes ferè eorum, qui hos crystallos propriâ manu præparant, valis æneis utuntur; ut viderim interdum apud quosdam Pharmacopœos, crystallos tartari colore cæruleo infectos, à viridi æris ex vase cupreo attracto. Plurimum ergo Medici & scientiæ, & existimationi suæ, & ægrorum salutis consulunt, si Pharmacopœos cogant crystallum tartari propriâ manu, & in valis vitreis, ferreis, aut terreis vitreatis conficere.

Sal tartari maximam habet deobstruendi vim, & apozemati, opiatis, ac pilulis aperientibus utiliter admisceri potest. Sed præcipuus illius usus est in pituita laxante, quæ fit ex fennæ Drach. ij. in aquæ frigida Unc. viij. infusus, cum ℥. i. vel Drach. sem. salis tartari, à quo fennæ tinctura potenter extrahitur, ut pituita hæc multò potentius purget, quàm pituita vulgaris, & ad multos dies continuata, omnes obstructiones solvat, quò affectu non rarò quartanas contumaces hujus pituitæ usu per xv. dies continuato, radicitus curatas videmus. Si salis tartari metuatur acrimonia, corrigi potest spiritu sulphuris, aut vitrioli, ut pro Drach. sem. salis, sint guttæ xv. spiritus.

Spiritus tartari usus ex hydropis curationibus in observationibus nostris descriptis elici potest, sub nomine spiritus diurectici.

Ex vitriolo verò, oleum tantum & spiritus usurpantur in apozematis, syrupis, aliisque remediorum formulis. Exemplo esse poterit sequens syrupus, in omnibus jecoris, mesenterii, & venarum obstructionibus perutilis, quo plurimi per diuturnas febres in cachexias, ac hydropes devoluti, pristinam sanitatem rursus adepti sunt.

℞. Rad. apii, enulæ camp. asparagi, eryngii, ana Unc. ij. fol. agrim. ceterach capill. ven. cuscutæ, cardui bened. ana M. i. summit. absinthii pontic. & centaur. min. ana M. sem. granorum alkekingi Unc. i. aquæ fontis ℥. vi. Coquantur donec colaturæ ℥. ij. supersint. In quibus dissolve succorum cichorii, & pimpinellæ depuratorum, ana ℥. j. fumar. & lupul. ana Unc. vj. fœniculi & petrosel. ana Unc. iij. acetis scillitici ℥. i. β. sacchari albi ℥. v. Fiat syrupus, cui adde



adde olei vitrioli q. s. ad gratam aciditatem, de quo capiat æger cochlearia iij. ante jentaculum, & totidem ante prandium & coenam.

Vitrioli autem efficaciam ostendunt aquæ naturales acidæ & vitriolatæ, quarum usus frequentissimus & utilissimus est, in omnibus morbis ab obstructionibus oriundis.

At spiritus vitrioli cum sale, aut spiritu tartari permixtus, valdè commendatur à Spagyricis, ex iisque conficiunt tartarum vitriolatum, & mixturam spirituales ex spiritu vitrioli, tartari, & theriacali aqua conflata, quæ cum aliis multis aperientibus admisceri possunt.

Denique ex chalybe varia præparantur medicamenta, tum à Dogmaticis, tum à Spagyricis, quæ evidenti effectui obstructiones brevi solventia, omnes coëgerunt ad usum eorum frequentem, etiam illos, qui omnia remedia ex metallis petita, tanquam naturæ nostræ minimè analogæ, atque adeo infesta respuunt & abominantur. Illa autem medicamenta, ex chalybe parata, componuntur in formam vini, syrupi, opiata, pilularum, & tabellarum.

Vinum chalybeatum hoc modo confici potest.

℞. Limaturæ chalybis Unc. iv. rad. eryngii, enul. camp. ana Unc. i. s. fantali citr. Unc. i. coralli rubr. ras. eboris an. Drach. vj. caryoph. nuc. moschat. cinam. an. Drach. ij. flor. genistæ, anthos, & epithymi, ana P. ij. vini albi generosi lb. vj. Macerentur per octiduum in B. M. vel retrofurnum. Deinde transcolentur per manicam Hipp. ut vinum optimè clarificetur; de quo capiat æger 3. ij. vel iij. manè duabus horis ante pastum, per xv. dies, aut plures, si opus fuerit. Vel in hunc modum fieri poterit.

℥. Chalyb. præp. cum sulphure 3. j. rad. enul. camp. & cort. med. tamarisci, ana Unc. s. sennæ Unc. iij. epithymi. Unc. j. fæculæ, brionæ & cinam. ana Drach. ij. pulv. trium fantalor. Drach. j. s. aquæ agrim. & vini albi, ana lb. j. Infundantur per triduum in B. M. Colaturæ capiat Unc. iij. vel iv. tribus horis ante pastum.

Vulgò autem usurpatur infusio limaturæ chalybis facta in vino albo vel clareto, pro potu ordinario, cum multa aqua permixta, per duos vel tres menses continuanda.

Syrupus ex chalybe ita præparatur.

℥. Limaturæ chalybis, in aceto maceratæ. Unc. ij. cort. med. tamarisci Unc. sem. ceterasch. M. sem. cinam. Drach. ij. aquar. absinth. & agrim. ana lb. sem. vini albi lb. j. infundantur per dies sex in loco tepido. Colaturæ adde sacchari lb. j. Fiat syrupus, capiat æger 3. ij. vel iij. manè, singulis diebus.

In prædicta præparatione chalybs maceratur in aceto ad Solem, donec acetum exsiccet; idque tertio repetitur, postea levigatur super marmore.

Hujusmodi syrupus purgans & efficacior evadet, si cum saccharo dissolvatur aquæ cisternæ lb. i. in qua sennæ 3. iij. rhab. Unc. s. per noctem maduerint.

Pulvis ex chalybe talis erit, ex Quercetani Pharmacopœa depromptus.

℥. Limaturæ chalybis communiter, vel cum sulphure præparatæ, Unc. i. fæculæ. rad. aronis 3. i. s. ambra grisea 3. s. [pro pauperibus species cordiales loco ambrae sufficient] corall. & margarit. præparat. ana 3ij. succini præp. & cinam. ana 3. iv. sacchari q. s. ut fiat pulvis gustui gratus, cujus capiat cochleare semis vel 3. ij. cum vino per xv. dies.

Ex eodem pulvere, cum saccharo in aqua naphæ dissoluto, & confectione alkermes, possunt fieri tabellæ gustui gratissimæ, eodem modo sumendæ. Vel

℥. Chalybis præp. cum sulphure Unc. sem. Confect. alkermes 3ij. ambra grisea 3. j. sacchari in aqua naphæ & rosac. dissoluti Unc. iv. Fiant tabellæ, capiat 3ij. singulis diebus manè.

Loco pulveris potest usurpari extractum chalybis, cum vino albo paratum, pro delicatioribus

Opiatæ ex chalybe variis modis fiunt. Præstantissimæ sunt sequentes.

℥. Conservæ flor. tamarisc. & capill. ven. ana Unc. i. sem. Conservæ rad. enulæ camp. Drach. vi. chalybis præp. cum sulphure vel aceto Drach. ij. Salis tamarisc. Drach. i. spiritus vitrioli 3. sem. cum syrupo condituræ citri fiat

Laz. Riverii Opera.

opiatæ, de qua capiat Drach. ij. aut iij. singulis diebus, manè. Vel

℞. Limaturæ chalybis lb. s. vini albi lb. i. sem. Misce in vase vitreo. Vas igni apponito, mollissimè fervere finito, semper agitando sursum, & deorsum, usque ad x. vel xi. ebullitiones, quousque spumofum sursum feratur. Tunc spumofam & pinguem chalybis partem, quæ fervore separatur, simul cum vino in aliud vas transpone. Atque id quater fac prædicto modo, infundendo novum, & servando. Deinde separatam vinum ex 4. ebullitionibus igni appone lento, donec leviter fervens, mellis crassitudinem acquirat, & servetur in usum qui talis est.

℥. Chalybis prædicto modo præparati Drach. vj. sem. petrosel. dauci, specier. diacucurmæ; & diarrhod. abbatis, ana Drach. i. Cinam. Drach. sem. Cum melle despumato fiat opiatæ, de qua capiat Drach. iij. vel Unc. sem. singulis diebus manè. Vel

℥. Chalyb. præparat. cum sulphure Unc. Sennæ mundat. rhab. elect. & agarici recenter trochiscat. ana Drach. ij. diarrhod. abbatis Drach. j. croci 3. j. Cum syrupo rosato solut. fiat opiatæ, de qua capiat Drach. ij. manè, tribus horis ante pastum, continuando per xv. dies.

Pilulæ ex chalybe reliquis remediis non cedunt, & in modum sequentem concinnari possunt.

℥. Chalybis præparat. cum sulphure Unc. sem. aloës optim. Sennæ mundat. Agaric. recenter trochiscat. & rhab. elect. ana Drach. i. pulv. elect. diarrhod. abbatis Drach. sem. croci 3. sem. Cum syrupo rosar. so ut fiat pilul. De cujus Drach. i. formentur pilulæ vj. deauratæ, quas capiat manè singulis diebus, tribus horis ante pastum, continuando per xv. dies.

Hæc pilulis addi possunt, pro specie morbi, & ægrotum opportunitate, gummi ammoniacum, sagapenum, opopanax, myrrha, gentiana, aristolochia, mastiche, nux moschata, aliaque.

In omnibus medicamentis chalybeatibus hoc perpetuò observandum, ut post eorum assumptionem deambulatione corpus exerceatur, ut hujus beneficio medicamenti vires in actum melius reducantur, ac in partes obstructas transmittantur. Eaque deambulatio continuanda est per duas horas. Quibus transactis capiat æger jusculum, in quo herbae & radices aperientes nonnullæ decoctæ fuerint.

Præter omnia prædicta remedia Chymici commendant purgationes mercuriales, ex mercurio dulci, præsertim cum pilulis ordinariis, vel per extracta paratis, quia mercurius valdè penetrat, & obstructiones aperit.

Bezoardicum minerale plurimum etiam commendatur, & cum mercurio dulci exhibitum miranda præstat. In hunc autem modum præscribi poterit.

℥. Bezoard. min. gr. xij. mercurii dulcis gr. vj. conservæ rosar. Drach. i. vel Drach. ij. Fiat bolus, qui detur per plures dies.

Si obstructio hepatis reperiatur in corpore bilioso, cum calida & sicca partis intemperie, aperientia frigida, aut temperata erunt usurpanda. Qualia proponuntur in curatione affectionis hypochondriacæ, inter effectus lienis à nobis explicandæ.

Pro potu ordinario utatur æger aqua ex infusione chalybis parata, cum vino tenui. Vel utatur levi decocto marisci, agrimon. ceterach. capill. ven. pimpinellæ; iisque simul mixtis, aut seorsim usurpatis, etiam cum vino.

Quicquid laudant infusionem ligni nephritici pro potu ordinario; alii decoctum rad. cynosbati, quod potenter aperit, & roborat, eoque solo multos à gravibus affectibus liberatos contendunt.

Potentius autem operatur infusio limaturæ chalybis facta in vino albo, vel rubro tenui, cum aquis prædictis, aut etiam aquæ simplici permixta. Hoc enim solo remedio quam plurimæ virgines à chlorosi liberantur. Et adhuc potentius operatur vinum istud chalybeatum, si præter potum ordinarium, meracum manè sumatur ad 3. iij.



## CAPUT IV.

## De Ictero.

**I**cterus est color flavus totius corporis, à bilis in cutem universam effusione proveniens.

Est igitur symptoma qualitatis mutata: verum statim sese offert difficultas illa vulgarissima, ab omnibus promota Pathologicis exagitata, quod ille color flavus in cornea visionem immediatè lædat, efficiens nempe, ut omnia objecta appareant flava. Quæ ut uno verbo expediatur, missis aliorum ambagibus, dicendum est, esse morbum in numero aucto; cum enim cornea debeat esse omnis coloris experta, ut species objectorum puras & immutatas transmittere possit; si colore aliquo extraneo præternaturaliter afficiatur, laborat morbo in numero aucto eorum, quæ necessaria sunt ad naturalem illius constitutionem.

Authores duplicem Icteri speciem faciunt, flavum scilicet & nigrum. Icterus niger à liene dependet, & rarissimus est. Ideo hic affectus hepatis exponentes, de flavo tantum agimus.

Effusio bilis in cutem à multis causis producitur, quæ quidem ad tria capita reduci possunt, pravam scilicet diathesim, vesicæ felleæ obstructionem, & biliosi humoris pravitatem.

Prava hepatis diathesis varia esse potest, ut intemperies, inflammatio, obstructio, scirrhus, & quæcunque partem ita debilitare possunt, ut bilis excrementitia à sanguine separari non valeat; sed cum eo ad totum corpus distribuatur.

Obstructio cystidis felleæ, bilis com meatum impedit ad intestina; unde illa in hepate restitat, & inde cum sanguine corpus universum pervadit. Hæc autem obstructio fit vel pituita crassa, interdum à bile crassa & copiosa, interdum à calculis, qui sæpè in cystide fellea generantur. Potest denique fieri vesicæ felleæ, aut illius meatuum angustia, à compressione partium vicinarum inflammatione vel scirrho laborantium.

Pravitas humoris biliosi consistit vel in quantitate nimia, quæ non potest regi à natura, neque à massa sanguinis secerni; aut etiam quâ ita repletur vesica fellea, ut non possit sese contrahere ad illius expulsionem: Vel in prava qualitate, quæ humores corrumpeo debitam eorum secretionem impedit, vel etiam interdum naturam ad subitam illius propulsionem irritat, ut Ictero critico & symptomatico contingit. Corruptio contingit febribus putridis biliosis; tum etiam ex veneno assumpto, aut morsu quorundam animalium venenatorum, quo totus sanguis in biliosam naturam commutatur.

Signa Icteri flavi per se manifesta sunt, color scilicet flavus in toto corpore, maximè in albis oculorum conspicuus: quem sequitur corporis pruritus, segnities, linguæ amaror, vomitus biliosus interdum, & singultus.

Signa causarum ex propriis fontibus desumenda sunt. Si enim calida hepatis intemperies, inflammatio, obstructio, aut scirrhus huic malo originem dederint, eorum affectuum diagnosi ex propriis capitibus desumenda est.

Obstructionem cystidis felleæ peculiariter indicant fæces albæ, & alvus adstricta, ex bilis defectu, quæ fæces colore flavo vel rufo tingere consuevit, & facultatem expultricem intestinorum excitare, ut se habeat instar clysteris naturalis. Urinæ sunt colore flavo intensè saturato, ad rubrum vergente, infectæ; quæ linteum immersum colore flavo imbuunt.

Si à pravitate humoris biliosi fiat, fæces alvi sunt valdè coloratæ, tum etiam urinæ; præsertim si febribus putridis succedat, quando Icterus est symptomaticus; tumque febris post Icteri adventum perseverat. Si verò criticus sit, febris cessat; cum alvi excrementa, & urinæ benè coloratæ apparent. Causæ externæ, ut venenum assumptum, & morsus animalium venenatorum, ab ægro & assistantibus referendæ sunt.

Prognosis Icteri varia instituenda est, pro varietate cau-

sarum. Curatu facilior est, qui ab obstructione vesicæ felleæ producitur, quia illius meatus intestinis proprios sunt, & materiæ illis adhærescentes ad ea facile decutiant, modò obstructio non sit à calculo, qui cum dissolvi non possit, morbum facit incurabilem.

Icterus ab inflammatione, aut scirrho hepatis proveniens, periculosissimus est: illa enim plerumque in abscessum; hic in hydropem degenerat.

Quibus in febribus morbus regius ante diem septimum accidit, malum. Hipp. *Aph. 62. sect. 4* cui Aphorismo opponitur alia ejusdem Hippocratis sententia, quæ habetur *4. de victus ratione in acutis*, his verbis: *In febre biliosa morbus regius, ante septimum diem natus, cum rigore morbum solvit; sine rigore, pestiferum.* Huic etiam sententiæ ratio adstriplatur. Cum enim die tertîa, quartâ, & quintâ contingant crises salutares per sudores, urinas, & alvi fluxum, quid ni etiam Icterus criticus in eisdem diebus poterit contingere; Et testatur experientia, à multis probatis authoribus proposita, sæpè Icterus ante septimum diem salutariter contingere. Illi autem authores prædictum Aphorismum ita interpretantur, quod nempe Hippocrates per diem septimum intelligat quamvis diem criticum: septimum enim enumerat, tanquam nobilioris criticismis, ut præ aliis omnibus intelligatur. Verè autem criticus ille audiendus est, quem legitima concoctio, materiæ febrem efficientis præcessit.

Curatio Icteri ad causarum sublationem dirigenda est. Si enim à calida hepatis intemperie, aut aliquo ejusdem visceris tumore oriatur, illorum affectuum curationes ex superioribus capitibus depromendæ sunt. Qui verò in febribus putridis contingit, si criticus sit, nulla curatione indiget. Si verò symptomaticus sit, curatio illius dependet à curatione morbi à quo exoritur.

Qui verò à cystidis felleæ obstructione dependet, illius ablatione curandus est: quæ convenienter perficietur remediis superiori curatione propositis. Quibus suppositis, nonnulla etiam huic affectui magis propria & specifica subnectenda sunt.

Primò igitur humoris peccantis portio educetur bolo sequenti.

℞. Elect. de succo ros. & diaprun. solut. ana Drach. iij. rab. pulv. Drach. i. croci ʒ. sem. Cum saccharo fiat bolus, qui semel atque iterum exhiberi poterit, si caco-chimia urgeat. Vel apozema aperiens & purgans erit exhibendum.

Quod ad phlebotomiam spectat, licet ea improbetur à Gal. quemadmodum ratione ipsius affectus non prodest, tamen si multitudo sanguinis in venis contineri videtur, illius imminutio utilissima est.

Post universales evacuationes sequens infusum per sex, vel septem dies usurpatum, ictericum affectum plerumque radicitus evellit, si recens adhuc, ac minimè inveteratus sit.

℞. Rad. rub. tinctorum ʒ. ʒ. fol. chelidon. maj. M. i. Summit. absinthii pontici, centaur. min. an. P. i. cinam. ʒ. ʒ. croci ʒ. sem. Infundantur per noctem cum ʒ. viij. vini albi. Colaturæ adde sacchari albi ʒ. sem. Capiat manè tribus horis ante pastum.

Vel potest fieri sequens decoctum.

℞. Chelidon. cum toto M. i. Fol. & flor. hyperici an. M. ʒ. rasuræ eboris pulv. stercoris anseris, an. ʒ. iij. croci ʒ. ʒ. Pulvis stercoris anseris & crocus ponantur in nodulo & omnia coquantur ex æquis partibus vini albi, & aquæ absinthii, ad ʒ. i. In colat. dissolve sacchari Unc. i. Detur in tres doses matutinas, quæ postmodum iterari poterunt.

Ad hunc usum valdè commendat Quercetanus stercus anserculi, verno tempore herbam pascens: tum etiam stercus album gallinæ exsiccatum, & ad ʒ. ʒ. vel ʒ. i. exhibitum per aliquot dies; dicitque horum aëreorum animalium stercorea esse nitro sulphurea, & miram habere incidendi, attenuandi, ac dissolvendi facultatem.

Commendat Dioscorides succum marrubii ad morbi regii curationem, & post eum recentiores, ac præsertim Forestus, qui nonnullos refert usu syrupi ex succo marrubii fuisse persanatos, cum multa alia remedia frustra usurpata fuissent.



Gefnerus laudat radicem utricæ, in hunc modum præparatam.

℞. Rad. urticæ ℞. i. croci ℞. i. Contundantur diligenter, & cum vino albo succus extrahatur, de quo capiat æger 3. iv. per 4. aut 5. dies manè, postea tegatur, ut fudet.

Dum interna remedia exhibentur, illinatur regio hepatis sequenti linimento.

℞. Succor. apii, petrosel & cichorii ana 3. i. aceti albi 3. sem. olei tamarisci Unc. ij. Bulliant ad consumptionem succorum & aceti Mox adde fantali citrini, & spicæ nardi, ana 3. i. ceræ q. s. Fiat linimentum.

Sublatis obstructionibus, flavus ille color brevi evanescet, discusso humore cuti imbibito, per solum nativi caloris ministerium. Ut tamen promptius evanescat, parari potest balneum aquæ tepidæ, corpus in eo confricando sacculo farinæ hordei & fararum referto.

## CAPUT V.

### De scirrho Hepatis.

**S**cirrhus Hepatis est tumor durus, renitens, & indolens, ab humore crasso, in hepatis substantia impa-  
cto, atque indurato genitus.

Duplex autem est scirrhus, exquisitus, & non exquisitus. Exquisitus tantum propositâ definitione comprehenditur, qui indolens est, & sensus omnino expers.

Non exquisitus verò quemdam habet doloris sensum, & fit à materia minus indurata. Uno verbo, est scirrhus incipiens, & nondum confirmatus: exquisitus verò est confirmatus; ita ut differant tantum per magis & minus.

Duobus modis in hepate scirrhus generari solet, per fluxionem scilicet, aut congestionem humoris crassi & glutinosi in partis substantia, vel ab inflammatione, aliisque tumoribus induratis, per resolutionem partium tenuiorum humoris illos committentis, relicta ac superflua parte crassiori.

Materia prioris est humor pituitosus, aut melancholicus, vel ab aliis partibus transmissus, vel in ipsa visceris substantia, ex prava homioiosi genitus & coacervatus. Hunc humor produciendo non parum facit victus ratio prava, ex crassis, frigidis, ac viscosis alimentis constans: pituitosum aut melancholicum temperamentum, & nativa hepatis angustia. Unde Gal. 13. *meth.* scirrhum in hepate, liene, & renibus facile generari docet. In hepate quidem, quod viæ strictæ sint, & sanguine crasso nutriatur. In liene verò, quod sanguinem crassum recipiat. In renibus denique, quod sanguine crasso nutriantur.

Posterioris scirrhi, seu alius tumoribus succedanei causæ sunt, immodicus discutientium medicamentorum usus, vel etiam repellentium, quæ refrigerando & constringendo materiam incrassant, ejusque resolutionem impediunt. His accedunt materiæ morbificæ frigiditas propria, & crassities quæ resolutioni non cedit, vel partis imbecillitas, quæ diaphoresin sufficienter promovere non potest. Ac denique victus ratio refrigerans & incrassans.

Signa scirrhi in hepate geniti sunt durities & renitentia in dextro hypochondrio, hepatis circumscriptionem referens, & multò major quàm in obstructione: gravitas in eadem parte, & ponderis sensus, præcipue quando magna sit respiratio: febris carentia, & dolores, quibus distinguitur ab inflammatione, aut saltem dolor est exiguus in scirrho non exquisito, difficilior decubitus in latus sinistrum; quoniam hepar durum & grave ventriculum comprimit, eique dolorem infert: color faciei pallidus, & quasi virescens, quia sanguis laudabilis in hepate scirrholo non generatur. Corpus etiam emaciatur, quia neque hæmatosis, neque anadolis rectè perficiuntur.

Prognosis hujus affectus à Galeno proponitur 2. *ad Glau.* cap. 4. his verbis: *Scirrhus inferibilis curationem non recipit: qui verò difficulter sentit, non incurabilis quidem est, non tamen facile curationem admittit.* Idem Galen. cap. 5. *ejusdem libri:* Scirrhum, inquit, jecoris ab initio sanavimus sæpius, ubi verò ad plures dies fuerit extensus neque ipse potui sanare, neque alium vidi, qui posset.

Scirrhus inveteratus & incurabilis in hydropem insanabilem degenerat: & pereunt quidem nonnulli tempore longo, alii verò breviori, quibus scilicet alvi fluxus supervenit, & diutius perseverat. Scirrhus ictero succedens, aut illum generans, perniciosus. Unde Hippoc. *Aph.* 42. *sect.* 6. morbo regio laborantibus, si fiat hepar durum, malum.

Scirrhi curatio fiet primùm, causæ antecedentis ablatione per apozema in obstructione hepatis descriptum. Cui etiam alia remedia, obstructionibus referendis idonea, subjici utiliter poterunt.

Postmodum verò materia indurata emollientibus & aperientibus discutienda est. In hunc finem maximè convenient pilulæ ex chalybe supra descriptæ, præcipue si iis addantur bdellium, ammoniacum, & sagapenum.

Si verò durities contumacissima fuerit, sequentes pilulæ ad multos dies erunt usurpandæ.

℞. Gummi ammoniaci in aceto soluti & trajecti, atque iterum inspissati 3. ij. bdell. i, styracis, an. 3. iv. Misce, capiat 3. j. alternis diebus.

Intermediis verò diebus utatur opiata, vel tabellis roborantibus & aperientibus, in obstructionis curatione descriptis.

Sequentes verò pilulæ, ad scirrhum emolliendum ac dissolvendum, mirabilis sunt efficaciæ.

℞. Aloës optimæ, & gummi ammoniaci in aceto soluti, & trajecti per setaceum, atque iterum inspissati. an. Unc. sem. mercurii dulcis Drach. ij. diacredii 3. j. Cum oxymel. scillit. fiat massa pilular. de qua capiat Drach. sem. quatuor horis ante prandium, singulis diebus per 20. aut 30. dies.

Zacutus Lusitanus *obs.* 41. *lib.* i. *Praxis admir.* refert, scirrhum contumacem, conservâ marrubii 40. diebus usurpatâ, curatum fuisse.

Quidam Practici commendant usum terebinthinæ in hunc modum præparatæ.

℞. Terebinthinæ lotæ cum vino albo Unc. i. 8. sacchari pulverati Unc. sem. Capiat. 3. i. singulis vel alternis diebus; est enim remedium aperiens, urinam movens, & alvum emolliens.

Toto curationis decursu utatur æger pro potu ordinario vino albo, aut clareto tenui, ex infusione chalybis parato.

Tum etiam aliæ chalybis præparationes supra descriptæ, hic etiam maximè convenire poterunt.

Exterius verò ad moveri debent fomenta, unguenta & emplastra, in sequentem modum composita.

℞. Rad. althææ, & bryoniæ & lilior. ana Unc. j. fol. malvæ, violar. parietariæ, absinth agrimonii, ana M. j. Sem. lini, fœnugr. aneth. ana Drach. sem. flor. chamæ. meliloti, rosar. ana P. j. Coquantur in tribus partibus aquæ, & una vini albi, sub finem additi, vel in aqua & aceto. Colaturâ foveatur regio hepatis manè & serò.

Si scirrhus sit contumacior, addantur decocto ra l. ireos nostrat. cucumer. agrest. & ebuli. Et paretur decoctio in aqua decoctionis intestinorum vervecis vino albo.

℞. Ol. lilior. chamæ. meliloti & amygdal. dulc. ana Unc. j. ol. rosat. & absinthii, ana Unc. sem. gummi ammoniaci in aceto soluti 3. ij. ceræ 3. ij. Fiat linimentum, quo inungatur dicta pars post fotum.

Si fortius linimentum desideres,

℞. Succor. bryon. & cucumeris agrest. an. Unc. ij. ol. de capparib. & tamarisci, ana Unc. ij. vini albi Unc. j. Bulliant ad succor. & vini consumpt. deinde adde absinthii pulverat. Drach. ij. gummi ammon. in aceto soluti, Unc. sem. ceræ parum: fiat linimentum.

℞. Massæ empl. de mucilag. Unc. j. empl. de meliloto Unc. sem. gummi ammoniaci liquati in succo absinthii Drach. ij. Maraxentur cum oleo absinthii & liliorum: Fiat emplastrum ad movendum post inunctionem.

Utinam etiam parti admoventur folia hyoscyami in aceto decocta, addito oleo amygd. amarar. & in formam cataplasmati relacta.

His etiam addere licet semicupia, ex emollientibus, digerentibus, & roborantibus parata, qualia pro potu descripta



descripta sunt; iisque alternatim æger uti poterit.

Ac denique causticum tibiæ dextræ inurendum, ut materiæ peccantis portio per id loci derivetur.

## CAPUT VI.

## De Hydropæ.

**D**Uæ hydropis differentiæ reperiuntur apud Hippocratem, universalis scilicet, & particularis. Universalis dicitur ille, qui totum corpus, vel abdomen universum occupat. Particularis verò, qui unicam tantum corporis partem. Unde hydrops capitis, pectoris, & uteri, de quo hic non agimus; sed tantum de universali.

Hujus autem hydropis universalis tres proponuntur species à Galeno, ascites, tympanites, & anasarca seu leucophlegmatia.

Ascites est tumor abdominis, ab humore seroso in illius capacitatem collecto, oriundus.

Neque solum abdomen ut plurimum intumescit, sed etiam pedes, tibiæ, femora, & scutum eodem tumore plerumque afficiuntur. Quinimò ascites non raro à pedum tumore incipit, qui postmodum tibiæ, deinde crura, ac tandem abdomen ipsum invadit.

Humor autem ille serosus, seu aquosus, quatenus aquæ naturam retinet, frigidus quidem est: sed quatenus etiam falsedinis est particeps, calorem in se habet, qui tum è viscerum vicinia augetur, tum etiam, & multò insensius, ex putredine, quàm diuturnâ morâ contrahit; unde febris exoritur, & sitis à vaporibus falsis ac putridis, os ventriculi inficientibus, excitatur.

Contingit autem interdum, ut humor ille aquosus non in cavitate abdominis, sed in vesiculis quibusdam, partibus ventris inferioris adnatis, contineatur. Cujus rei historiæ proponuntur à Schenkio *lib. 3. observat.* & Mauritio Cordæo *comm. 3. & 5. in Hippocr. lib. 1. de morbis mulierum.* Censuit Galenus (eumque sequuta est tota ferè Medicorum, tum antiquorum, tum neoteriorum cohors) omnem hydropem fieri ab hepate frigidiorè, & hæmatosin non exactè perficiente, ita ut pro laudabili sanguine, multam aquam, pituitam aut flatum generet. Quæ sententia, ut de anasarca verissima est, & omnium consensu receptissima, sic de ascite & tympanite à recentioribus non paucis controvertitur, propterea quod in multorum hydropicorum dissectionibus hepar incolume & illæsum inventum sit, ut ex plurimis historiis constat ab authoribus propositis. Præterea Hippocr. 2. *Prorrhet.* disertè asserit, hydropem fieri vel ab hepate, vel parte inani. Per partem verò inanem intelligit totum illud spatium, quod à costis ab illa extenditur, & partes in eo contentas. Idem Hippocr. 4. *de morb. & 1. de morbis mulierum*, hydropem ex liene describit. Quibus auctoritatibus vulgò responderi solet, hepar perpetuò affici, primariò, vel secundariò: ita ut nunquam hydrops contingat, quin hæmatosis vitietur, & loco laudabilis sanguinis, aquosus generetur. Verùm duæ rationes hanc doctrinam acriter urgent: prima desumpta est ab experientia suprâ proposita, quòd nimirum si necessarium esset hepar perpetuò affici, in dissectione cadaverum nunquam illæsum reperiretur. Secunda, quòd si hepar sanguinem aquosum generaret, ille in totum corpus distribueretur, quemadmodum in anasarca sanguis pituitosus in omnes partes transfertur. Neque sufficiens ratio reddi potest, cur serosus humor, in hepate genitus, in solum abdomen, non in alias partes deferatur.

Quod ad frigidam hepatis intemperiem spectat, illa etiam impugnatur Tralliani, Avicennæ, & aliorum auctoritatibus: qui statuunt, etiam à calida intemperie hydropem excitari, & non nisi refrigerantibus remediis curari. Quod etiam Hippocratis auctoritate fulciri potest ex 2. *Progn. mutuata.* *Hydrops*, inquit, *morbo acuto superveniens, malus, febrem enim non tollit.* Si igitur hydrops supervenit, perseverante febre, manifestum est, calidam intemperiem permanere. Neque mihi unquam placere potuit, quòd vulgò dicitur à Galeni mancipiis: à calida

intemperie calorem nativum dissolvi, ac plurimum imminui, & calorem illum imminutum frigiditatis nomine donari. Sic enim in febre hectica, & febribus aliis diuturnis, in quibus calor nativus plurimum imminuitur, frigida intemperies esset perpetuò accusanda, & symptomata, quæ illas sequuntur, huic intemperiei essent adscribenda, non autem caliditati. Unde magnam confusionem in symptomatum causis inquirendis excitari, quis non videt.

Inter recentiores Carolus Piso, quem sequutus est Senertus, in veras hydropis ascitis causas altius penetravit, statuitque hunc generari ex materia serosa in potu & cibis humidioribus contenta, quæ ab aliqua causa præternaturali in venis portæ & cavæ diutius retenta, in totum corpus non distributa [ut in statu naturali fieri consuevit] in abdominis capacitatem effunditur. Retinetur autem humor ille serosus in venis, & ad totum corpus non distribuitur, ex læsa, vel impedita facultate attractrice partium, ad quas deferri solet, vel ob errorem externum.

Partes autem præcipuæ, quæ primum serosam materiam attrahere solent, sunt hepar & lien. Illa enim viscera chylosam materiam ad se trahunt, in qua substantia humida & aquosa ciborum & potuum continetur. Tum etiam lien potulentam materiam ad se trahit puram & impermixtam, ut docuit Hippocr. & testatur experientia, eos qui potui maximè indulgent, illius portionem effatu dignam emittere per urinas statim à passu, quod fieri dicunt authores peritissimi; à liene aquosam illam materiam attrahente, antequam ciborum concoctio in ventriculo peracta sit.

Læditur autem hepatis & lienis attractio à variis causis, præcipuè ex defectu seu imbecillitate caloris nativi. Debilitatur autem calor nativus à frigida vel calida intemperie, & à suffocatione.

Frigida intemperies à nimio alimentorum refrigerantium usu, larga sanguinis evacuatione, spiritus confestim exhauriente, vel quavis alia causâ excitata, cum per se calori adversa sit, etiam nativum hepatis & lienis calorem obtundit, ejusque actiones lædit.

Calida verò intemperies nativum calorem dissipat, unde ille debilior factus, actiones hepatis & lienis minus foeliciter exercet. Inducitur autem calida illa intemperies à febribus ardentibus, vini meracioris largo potu, ciborum & medicamentorum calidorum usu nimio.

Denique debilitatur calor nativus per suffocationem, quando sanguis nimia copiâ redundat in venis, præcipuè impurus, qualis cumulari solet in mensium, vel hæmorrhoidum suppressione: per illas siquidem evacuationes corporis impuritates expurgari solebant, quæ iisdem suppressis retentæ, totam sanguinis massam inficiunt.

Læditur etiam, vel impeditur prædictorum viscerum attractio ab obstructionibus, quæ liberum materiæ serosæ transitum intercipiunt. Sic scirrhum hepatis & lienis hydrops consequitur; non tantum quòd illæ partes debilitatæ sanguinem laudabilem generare nequeant, sed præcipuè, quòd totam illam materiam, quæ potu assumitur, attrahere non valeant, & ad alias partes transmittere.

Hic objici potest, in hydrope totum corpus nutriri sanguine in hepate genito, ex chylosa materia, quam ad se necessariò attrahit. Cum autem chyli portio, ex qua sanguis generatur, crassior sit serosâ materiâ nihil impedit, quò minus serosa illa materia etiam attrahatur. Respondemus primum hepar melius attrahere, quòd sibi familiarius est & idoneum, ut in sanguinem convertatur; illud autem attrahit minori copiâ quàm par sit, propter attractricis imbecillitatem, unde totius corporis macies exurgit, & cum ea chyli portione, sibi magis analogâ, portionem etiam serosæ substantiæ pro vehiculo trahit; reliquam verò in venis mæsaraicis & epiploicis relinquit, quæ ibi moram faciens, in abdominis capacitatem sensim effunditur.

Non negamus tamen, in hydrope sanguificationem lædi. Præsentem enim frigidiori, aut calidiori intemperie, aut gravi obstructione, vel scirrhu, non potest esse sanguificatio integra. Sed negamus illam esse proximam & immediatam hydropis causam; imò potius confectarium quid,



quid, & interdum hydropis effectum, cum scilicet aqua in abdomine contenta corrumpitur, sibi inuicem viscera corrumpit.

Post hepar & lienem, serosam materiam, ad venam cavam translatam, attrahunt renes, & totum corpus à superflua illius copiâ liberant, ita ut si functio eorum cessaverit maxima feri copia in venis retineatur; quæ in abdomen effusa, hydropem ascitem brevi producit. Cessare autem potest renum attractio ex multis causis, frigidiori intemperie, tumoribus, ulceribus, & obstructionibus, quæ functionem eorum imminuere, abolere, vel interciperi valent.

Denique ob errorem externum feri distributio impeditur, quando magna copia aquæ frigidæ hauritur, quæ non possit regi à naturâ, & in venas sufficienter distribui. Sic refert Carolus Piso, quendam adolescentem tertianâ laborantem, cum in paroxysmo aquam intemperantiùs bibisset, in ascitem incidisse, à quo tamen unius tabellæ diacarthami usu liberatus est aquâ in abdomine restante confertim redditâ. Si tamen diutius continuatus fuerit nimius ille aquæ potus, hydropem inducit non adeò faciliè curabilem, propterea quod graves inde fiant obstructiones, & frigida inducatur viscerum intemperies, calore nativo admodum labefactato, unde hydrops curatu difficilis emergit.

Per quas autem vias serosa illa materia è venis in capacitatem abdominis transferatur, à nonnullis dubitatum est. Quibus tamen simpliciter satisfieri posset, dicendo ex doctrina Hippocratis, in corpore vivente omnia esse transfluxibilia & permeabilia, ita ut urgente necessitate non solum humores tenues ac serosi, sed etiam crassiores per meatus insensibiles partium transmittantur. Sic in pleuritide sanguis & pus, densam pleuræ membranæ pulmonem vestientis substantiam penetrant, ac per anacatharsim expelluntur. Sic in tibiæ ac cruris fracturâ, quæ illæsis musculis & cute contingit, sanies ex osse fracto manans, prædictarum partium substantiam penetrat, & inficit lintea fasciarum. Sic in hydrope ipso, sæpè ingens aquæ quantitas unâ die per alvum excernitur, exhibitio hydragogo potentiori, quod fieri non potest, nisi aqua in abdomine contenta tunicas intestinorum pervadat.

Neque obstat, quod à Fernelio objicitur, frustra conditas fore à natura tot patentes vias, si per cæcos meatus humores transferri possent.

Respondemus in motu humorum ordinario & naturali, totius corporis nutritioni destinato, necessarios esse ductus, per quos illi continuò, faciliè, affatim fluere possint: Sed in casu extraordinario & urgente, providam naturam vias extraordinarias invenire, per quas materias noxias excernat, aut saltem in locum minus incommodum deponat.

Objicit iterum Fernelius, in iis, qui ex urina per 20. dies suppressa extincti sunt, aquæ nihil deprehensum esse per cæcos illos ductus in abdomen defluxisse.

Respondemus, naturam non semper eodem modo operari circa causas præternaturales, neque humores noxios ad eadem loca deponere, sed ad eas partes præsertim, quæ magis dispositæ sunt eorum receptioni, utpote imbecilliores. Sic in urinæ suppressione, serosus humor per venas & arterias patenter decurrit, easque implet, & si quædam pars debilior reperiatur, in eam impetu ruit: unde fit, ut quidam comatosi, alii orthopnoici, alii ex alterius partis insignis læsione moriantur. Sic etiam nihil impedit, quin si partes abdominis, ad quas venarum & artieriarum extrema defluunt, debiliores reperiuntur, humor serosus in illius capacitatem transferri valeat.

Neque verum est, quod Fernelius adstruere velle videtur, nunquam hydropem ex urinæ suppressione exoriri. Imò multoties ab hac causa produci, ratio & experientia docent; quemadmodum nos supra ostendimus, ex læsa renum attractione, ab aliquo insigni illius vitio, hydropem contingere.

Hoc tamen advertendum est, urinæ suppressionem feri redundantiam efficere in venâ cavâ magis quàm in portæ ramis, per quos in primis humorem aquosum

in abdominis capacitatem effluere, ex sequentibus apparebit.

Possit igitur satisfieri quæstioni propositæ, simpliciter dicendo, per cæcos & insensibiles partium ductus serosos humores transferri in abdominis capacitatem. Facile tamen est ductus conspicuos & patentes indicare, per quos liber est humoris serosi à venis in capacitatem illam commeatus.

Horum autem ductuum notitiam nobis indicavit Hippocrates. *Aphor. 55. sect. 7.* Quibus, inquit, *jecur aqua repletum in omentum eruperit, his venter aqua repletur, & moriuntur.* Cujus Aphorismi sensus talis est (à Galeno non satis perspectus) aquam ab hepate in ramos venæ portæ per omentum sparsos influere, & cum illi repleti fuerint; vel tunicis eorum rarefactis per diapedesin, aut osculis patefactis per anastomofin, in cavitatem abdominis deferri. Idem in liene potest contingere, & fortè frequentius; cum lien aquam magnâ copiâ è ventriculo trahat, ut ex multis Hippocratis locis innotescit. Et ex liene in omentum traduci, constat ejusdem Hippocr. sententiâ, 4. *de morbis* proposita, his verbis; *In ventriculo autem etiam potus jectur, quo cum expletus fuerit, ab eo lien recipit, & ad venas omentum transmittit.* Ex prædictis videre est, per omenti venas, præcipuè quæ Epiploicæ & Gattrepiploicæ nominantur, aquam in abdomen effluere; quamvis per alias etiam venas exstillare possit.

Præter causas hydropis prædictas, quæ frequentiores sunt & magis ordinariæ, aliæ dantur minus frequentes, ab Authoribus relatæ, & quibusdam observationibus confirmatæ, quæ scilicet ex peculiari quorundam partium vitio contingunt, non solum hepatis, & lienis; sed etiam mesenterii, pancreatis, ventriculi, intestinorum, renum, vesicæ & uteri: læsâ nimirum illarum partium homiofi à gravi quodam affectu, ut proprium alimentum corrumpant, & in serosum humorem colliquatione quadam convertant. Sic apud Gal. *comment. Aphor. 55. sect. 7.* vesiculæ hydatides in hepatis superficie interdum excitantur, quæ disruptæ, serosum humorem profundunt in capacitatem abdominis, ex cujus collectione hydrops emergit. Sic Fernelius existimat, hepar valdè exsiccatum findi, & rimis quibusdam dehiscere instar terræ siccæ, ac per illas rimas serum continuò effluens abdominis capacitatem replere. Alii verò dicunt, ex intestinis hydropem fieri posse si illa perforentur, & homo statim non moriatur: sed humor aquosus in abdominis capacitatem ex iis stillet. Tum etiam ex renibus si valdè ulcerentur, & per ea ulcera serosus humor erumpat. Sic refert Platerus, in quodam hydropico utrumque renem multis ulceribus perforatum fuisse, unde sanies & serum in abdominis cavitatem effluerat. Hydropis denique ex uteri vitio prognati habetur historia apud Sennertum, ex Joanne Heinzio, de ancilla quâdam hydropicâ, cujus viscera omnia salva inventa sunt, exceptis testibus, qui tumidi sunt reperti ad magnitudinem capitis infantis recens nati, tum etiam lividi, fungosi, & plurimis ulceribus conspersi, ex quibus serosa materia hydropem committens effluerat.

Hydrops tympanites à tympano nomen habet; siquidem abdomen instar tympani tensum est, & si manu percutiatur, sonum consimilem edit: tensio autem illa est à flatibus in abdominis capacitatem conclusis. Aliquando tamen contingit, flatum tympanitem efficientes non in capacitatem abdominis, sed in cavitatibus intestinorum contineri, quod observavit Platerus, dicens in quibusdam, qui tympanici putabantur, post mortem dissectis, nullum flatum è ventris cavo erupisse, nec ventrem subfeditis; sed intestina præsertim tenuiora, flatibus adeò distenta & convoluta profuissse, ut in ventrem denuò reponi nequirent.

Observandum autem est, rarò flatum tympanitem efficientem, solum in abdomine contineri; sed plerumque aquæ permixtum, quemadmodum etiam in ascite non aqua sola, sed flatum etiam in abdomine continetur, & uterque à prædominante nomen mutuatur. Si nimirum major flatum, minor aquæ copia collecta sit; dicitur

tympan-



tympanites : si verò aqua flatibus prævalet, ascites nominatur : si denique æqualis utriusque portio cumuletur, ambigit inter utrumque, ut dubitare liceat, utrum ascites, vel tympanites talis hydrops dici debeat.

Flatuum causa materialis est humor crudus & crassus, sive pituitosus ille sit, sive melancholicus, qui à calore exagitatus & attenuatus vapores crassos emittit, qui difficillimè discutiuntur, & illi vapores flatus nominantur.

Humor autem ille crudus & crassus in ventriculo & intestinis aliqua ex parte residet, sed multò magis intra diaphragmatis & intestinorum membranas continetur, unde difficiliùs quàm è cavitatibus partium prædictarum, evelli potest. Hujus rei fortem conjecturam facit Aphorismus Hipp. 11. sect. 6. *Quibus tormina, & circa umbilicum labores, & lumborum dolor, qui neque medicamentis, neque aliter solvuntur, in hydropem siccum firmatur.* Cum enim mesenterium parte anteriore intestinis alligetur, posteriore verò lumbis; faciliè videre est, dolores ad umbilicum & lumbos spectantes, ex mesenterio prodire. Adde, quod dolorum contumacia causam denotet in profundo corporis & partium substantia conclusam, quæ nullo modo deturbari valeat. Si enim in ventriculi & intestinorum cavitatibus contineretur, faciliùs excludi posset.

De causa verò efficiente discrepant inter se authores, aliis frigidam intemperiem accusantibus, aliis verò calidam. Qui frigidam intemperiem accusant, se fautorem habere putant Galenum, dicentem flatus generari à calore debili. Quibus respondendum est calorem posse dici debilem respectu materiæ, quæ ab eo non potest discuti ac resolvi. Sed hoc potius adscribendum est ipsius materiæ defectui, non caloris, qui sæpè intensior est ac præternaturalis. Et certè agnoscendum est cum doctissimis Authoribus, materiam tympaniti generandæ magis idoneam esse humorem melancholicum adustum & atrabiliarium, qui à calore viscerum torrefaciente generatur. Qui quidem calor eandem materiam exagitat, & ex ea flatus crassos ac difficilè resolutibiles educit.

Hydrops anasarca fit ab humore pituitoso, in totum corporis habitum effuso, qui ideò tumidus & albus apparet, unde leucophlegmatia nominatur. Generatur autem humor ille pituitosus ab hepate frigidiori, quod pro laudabili sanguine crudum & pituitosum producit, qui cum substantiæ partium in homioiosi sufficienter agglutinari nequeat; portio illius crudior, & nutritioni inepta, refert in partibus, easque tumidas reddit, hincque anasarca seu leucophlegmatia exsurgit.

Affectus incipiens dicitur cachexia, quæ ab eadem causa procedit & eadem habet generationis principia; ita ut faciliè cachexia in leucophlegmatiam degeneret, cum differant tantum secundum magis & minus.

Causæ antecedentes sunt, quæcumque hepar impensè refrigerare valent, illiusque vim concoctricem plurimum infringere ut alimenta frigida & humida largiùs assumpta, suppressiones mensium & hæmorrhoidum, obstructions & tumores frigidi, quales sunt scirrholi: tum etiam hæmorrhagiæ copiosæ, aliorumque humorum magnæ ac diuturnæ evacuationes, à quibus calor nativus plurimum imminuitur.

Signa hydropis, & cujusque illius speciei, ex prædictis satis manifesta sunt. In ascite enim aquosus humor in abdomine contentus, indicatur ex abdominis mole grandiori, tumore molliore ac latiore, qui per latera compressus, fluctuationis sensum manifestum repræsentat, & æger ipse dum se se in alterutrum latus convertit murmur velut fluctuantis aquæ percipit, tum universa ventris moles in latus illud provolvitur. Hinc pedes & scrotum intumescunt; superiores verò partes graciliores evadunt ac contabescunt; urinæ sunt paucae, crassæ atque interdum rubræ, quia exigua feri quantitas ad renes & vesicam transit, in iisque diu moratur & in illa mora crassescit ac coloratur. In progressu morbi difficultas respirandi adest, ob aquæ copiam diaphragmati incumbentem, præcipuè æger decumbit, ut ea de causa erectus manere ac sedere cogatur. Sitis etiam adest molesta, ex humoris falsedine, cui ventriculus natat. Ac denique febris continua & lenta

excitatur ex ejusdem aquæ putredine, quæ viscera omnia sibi innatantia tandem labefactat & corrumpit.

In tympanite verò, venter percussus instar tympani sonum edit; moles abdominis minùs gravis est, quam in ascite: tormina præcesserunt circa umbilicum, & lumborum dolor; ægro supino jacente venter distentus ac durus manet, neque dum se convertit æger, ad latera devolvitur.

In anasarca denique non solum venter, crura, & tibiæ, sed etiam manus, brachia, pectus, facies, & totum corpus intumescit, & ubicumque digito premitur, vestigium relinquit. Color cutis pallidus & cadaverosus; carnes molles & laxæ; urinæ tenues, albæ, respiratio difficilis, febris lenta non rarò consequitur.

Quod ad prognosin attinet, omnis hydrops periculosus est, & curatu difficilis: eoque difficilior, quò magis inveteratus. Sed inter species anasarca minus habet periculum: ascites verò & tympanites inter se ambigunt: ut nunc hic, nunc ille periculosior sit, pro majori vel minori gravitate causarum, à quibus dependet. Sic ascites à scirrho hepatis oriundus, aut ab ulcere alicujus partis internæ, periculosior est tympanite: si verò a nimio aquæ potu, aut obstructionibus non adeò inveteratis, minus infert periculum.

Hydrops faciliùs curatur in servis, quàm in liberis: in rusticis, quàm in nobilibus: quia cum desiderat famem, sitim, & multa alia tædia longamque patientiam, promptius succurritur his, qui faciliè coguntur, quàm quibus noxia libertas est.

Hydrops à duritie lienis minùs periculosus est, quàm à duritie hepatis: quia lien minùs princeps membrum est, quàm hepar.

Hydrops morbo acuto superveniens, malus: neque enim sedat febrem, sed dolorem admodum infert ac mortem. Hipp. *Prognost.*

Quibus hepar aqua plenum erumpit in orientum, iis venter aqua impletur, & moriuntur Hipp. *Aph. 55. sect. 7.*

Ab aqua inter cutem habitata, si aqua, quæ in venis est, in ventrem confluerit, morbi fit solutio. Hipp. *Aph. 14. sect. 6.* Hic aphorismus priori contrarius videtur. Sed contrarietas solvitur, dicendo Hippocr. in priori per ventrem intelligere capacitatem abdominis; in hoc verò, alvum. Si nimirum aqua per alvum affluerit, morbi fit solutio. Quæ sententia clariùs explicatur ab eodem Hipp. in *Coacis*, his verbis: *Incipiente hydropo alvi profluvium, sine apesia, seu cruditate proveniens, morbum solvit.* Notanda est illa conditio, *incipiente hydropo*: nam si morbo inveterato contingat profluvium alvi, non est adeò tutum: quia ut plurimum vitium aliquod, per morbi longitudinem contractum, in visceribus relinquitur, ut scirrhus, aut substantiæ corruptela, quod novæ aquæ proventum efficit, & mortem tandem inducit. Unde idem. Hipp. in *Prorrhet.* eos qui ab hydropo servari debent, & *σπλάγχνης* esse debere affirmat, hoc est, sana & integra viscera habentes, seu à gravioribus illis affectibus immunia. Alioqui si uum scirrhus, aut hepatis corruptione contingat alvi fluxus, citissimè moriuntur, docente Galeno 2. ad *Glaucanem*, cap. 5. & Avicenna, qui sic loquitur: *Constrictio anhelitus, & solutio ventris, in tribus diebus mortem significant.*

Urinæ paucitas in hydropicis mala, & quò minor illius quantitas redditur, eò deterior est morbus, quia materia potulenta in ventrem confluit, & nihil ferè illius ad renes pervenit. Hinc Hipp. in *Coac. hydropico febriculoso* *urina pauca turbataque, lethalis, Contra verò, si urinæ quantitas augeatur, bene sperandum.* Quod eleganter à Celso proditum est. *Et tum demum, inquit, secundæ valetudinis spes est, cum plus humoris per urinam excernitur, quàm assumitur. Ideò bonum est singulis diebus urinam & potum metiri: tum etiam ventrem, lino circumducto, præsertim dum remedia usurpantur, ut videamus, num ille decrescat, quod in bonis habendum est. Si verò augeatur, non obstantibus remediis, res in angustia est.*

Abcessus, vel maculæ in hydropicorum cruribus erumpentes, lethales. Hoc confirmat Hipp. 7. *epidem.* historiâ Biontis,



Biontis, & Ctesiphontis, quorum iste, oborto abscessu in genu sinistro, & suppurato, obiit. Huic verò, paulò ante mortem collectio cum rubore aliquantulum livido in femore dextro apparuit.

Hydropici, qui remediorum efficaciam liberantur, si in eundem affectum reciderint, desperati sunt. Hippoc. in Coac. Significatur enim vitium aliquod immedicabile intra viscera latitare, quod evacuatis aquis, novam earum generationem promovet.

Si æger *εὐσταθής* sit, & bonis visceribus, ac constantibus viribus, cibum libenter assumat, bene concoquat, nec ab eo ingesto affligatur, bene spiret, non doleat, neque tussis, neque sitis adsit, lingua ne in somno quidem non inarescat, alvus medicamentis celeriter moveatur, extra purgationem non admodum cita sit, & naturaliter excernat, urina pro victus ratione mutationem subeat, lassitudinis expers sit: si hæc omnia adsint, æger bene se habet: si plurima, aliqua convalescentiæ spes est: si nulla, res desperata est.

In sicco hydrope stillicidium urinæ malum est Hippocrates in Coacis.

Tympanites in corpore atrabiliario, aut qui sit ab atrabile multa in corpore redundante, lethalis est, & frustra illi remedia adhibentur.

Si leucophlegmatia detento fortior diarrhœa supervenit, morbum solvit Hipp. Aphor. 29. sect. 7. Talis autem diarrhœa morbo incipiente, aut saltem non inveterato fieri debet, & viribus adhuc constantibus. Si enim ægro jam debili existentē contingat, periculosa est.

Hydropis curatio versatur in materiæ heterogenæ evacuatione, sive illa in abdomine, sive in toto habitu contineatur; causæ illam materiam producentis ablatione, & viscerum, præsertim hepatis, roboratione. Causæ autem præcipuæ, & magis ordinariæ, sunt obstructions graves & contumaces, tum etiam scirrhi: quorum affectuum curationes ex propriis capitibus desumendæ sunt. Si verò illæ sufficiant, ad sequentia hydropi magis appropriata erit progrediendum, eaque pro varietate causarum, & corporum ægrotantium, à prudenti Medico erunt varianda.

Ac primum purgatio solemnis instituenda est, per apozema aperiens, phlegmagogum, & hydragogum in hunc modum compositum.

℞. Rad. eryngii, rubiæ tinctorum, apii, petrosel. & enulæ camp. an. ʒ. j. rad. valerianæ, asari, ebuli, & ireos nostratis, an. ʒ. ss. cortic. rad. cappar. median. fraxini, & tamarisci, an. ʒ. vj. fol. agrimon. ceterach. capill. ven. chamædr. hyperici, absinthii, centaur. min. an. M. j. soldanellæ M. ss. Sem. dauci, petrosel. maced. & fœniculi, an. ʒ. ss. liquiritiæ ras. & passul. mund. ana ʒ. j. fennæ mundat. Unc. j. ss. agarici in nodulo ligati ʒ. iij. Sem. ebuli. & rad. jalapæ, ana drach. j. Sem. zinzib. & caryophyll. an. ʒ. j. flor. genistæ, sambuci, & tamarisci, an. P. j. Coquantur in æquis partibus aquæ chalybeatæ, & vini albi, sub finem additi, ad lb. j. ss. In colat. dissolve syrup. de cichorio compositi cum rheo Unc. iv. fiat apozema clarum & aromat. ʒ. iij. cinam. pro iv. dosibus matutinis.

Post purgationem universalem utatur æger semel in septimana pulvere sequenti.

℞. Sennæ mundat. turbith. gummosi, hermodactyl. Sem. ebuli, jalapæ, mechoacan. an. Drach. j. cremor. tart. ʒ. ij. guttæ gummi Drach. sem. pulv. diambriæ, diarrhod. abb. & sem. fœnic. an. ʒ. j. sacchari canti Drach. iij. fiat omnium pulvis, cujus ʒ. ij. vel ʒ. ij. ss. infundantur per noctem in vini albi ʒ. iv. Capiat manè vinum & pulverem.

Syrupus rhamni cathartici, ex succo fructus illius cum saccharo compos. ad Unc. j. exhibitus, aquas mirabiliter educit. Sumendus est immediatè ante prandium.

Vel utatur syrupo magistrali, ex decocto apozematis conflato, aucta dosi purgantium, vel etiam sequenti.

℞. Succ. rosar. pallid. lb. ij. succor. rad. ebul. ireos nostratis, fol. cichorii & agrim. an. lb. ss. Sem. ebuli, rad. mechoac. & rhab. elect. ana ʒ. ij. spicæ nardi ʒ. iij. fantali citrin. ʒ. ii. crystalli tart. ʒ. j. sem. Infundantur per noctem, & post levem ebullitionem colentur. Deinde adde sacchari albi parem colaturæ quantitatem. Coquantur in syrupum, cui adde salis absinthii Unc. sem. Capiat ʒ. ij.

Laz. Riverii Opera.

cum iulculo aperiente, semel in septimana.

Vel loco syrupi, aut alternatim cum ipso pilulæ sequentes usurpari poterunt, quæ simul humores noxios expurgant, & obstructions referant.

℞. Aloës opt. succo absinthii diligenter nutritæ Unc. sem. Gummi ammoniaci in aceto soluti & trajecti, myrrhæ electæ & croci Martis cum sulphure parati, an. drach. iij. salis absinthii, tamarisci, an. Drach. ij. diacrydii & trochisc. alhandal. an. Drach. j. croci, zinzib. & salis gemmæ an. ʒ. j. Cum oxymelite scillit. fiat massa pilul. de qua capiat Drach. sem. bis in septimana, duab. horis ante prandium.

Vina etiam purgantia ad hydropis curationem valdè commendantur, quorum variæ extant formulæ. Hæc efficacissima est.

℞. Rad. asari & mechoac. ana Unc. ij. rad. ireos nostrat. cort. rad. ebuli & sambuci, an. Unc. j. rad. enulæ camp. Unc. sem. absinthii sicci & epithymi, ana P. i. fennæ mundat. ʒ. j. soldanellæ ʒ. ij. trochisc. de rhab. & eupator. ana ʒ. i. macis, & cinam. ana Drach. ss. scammonii ʒ. iv. vini albi libr. ij. ss. Infundantur per triduum in B. M. vase probè clauso. Servetur sine colatura. Capiat ʒ. ii. vel iij. manè, aut ter in septimana.

Inter remedia, aquis extrahendis idonea, maximè laudatur succus ireos nostratis, cum vino albo extractus, qui ad Unc. iij. exhiberi potest; alvum enim & urinas potenter movet. Quia verò asperitate sua faucibus & ventriculo molestus est cum manna, aut melle permisceri solet. Massarias ita præscribit.

℞. Succ. ireos recenter extracti Unc. iij. mannæ calabriæ ʒ. i. ss. Misce, fiat potio.

Platerus in observationibus: *Hydropico*, inquit, *cuidam propinavi succum ireos, ut biberet ad ʒ. ii. addito melle, unde plurimum & sæpius minxit & deiecit. Et postquam repetisset bis vel ter, detumuit venter, pedesque subsederunt, sicque sanatus est.*

Rhabarbarum à nonnullis commendatur, quia purgans humores noxios hepar valdè roborat. Et Stocherus se multos curasse refert usu rhab. ad ʒ. j. vel ij. tertio, aut quarto quoque die exhibitum cum decocto aperiente. Tum etiam apud Scholtzium in Epistolis, habetur insignis historia cujusdam hydropici solo usu rhab. perfectè sanati, quod singulis diebus deglutiebat ea quantitate, quæ necessaria videbatur ad alvum subducendum.

Trochisci de rhab. ab omnibus authoribus laudantur. Et Matthæus de Gradi. refert, ducem quendam Mediolanensem hoc solo remedio fuisse curatum, cujus Drach. ij. sumebat bis in hebdomada.

Iisdem trochiscis se alium hydropicum curasse testatur Michaël Paschalius, quos in pilulas efformabat propter amaritudinem.

Chymici extractum hellebori nigri, aquilam coelestem, & mercurium vitæ commendant, eaque aliis medicamentis vulgaribus permiscunt, unde copiosa sequitur ferofi-humoris evacuatio. Sed viribus admodum robustis opus est ad horum medicamentorum vehementiam tolerandam.

Mitiùs operatur mercurius dulcis, & mercurius diaphoreticus. At sine manifesta evacuatione, antimonium diaphoreticum, cum sale petræ ad albedinem calcinatum, ac multò efficacius diaphoreticum ex butyro antimonii paratum, omnes hydropis species curat.

Verùm in omni purgantium administratione observandum est, purgantia, saltem validiora, non esse frequentius usurpanda, ut docet Galen. 9. *κατὰ τὴν φύσιν*, quia corpus debilitant, ut postea major aquarum proventus exoriat. Ideo roborantia & aperientia frequentius quàm purgantia erunt præscribenda. Et experientia nos docet, evacuationem in hoc morbo, quæ fit per urinas, melius succedere eâ, quæ fit per alvum.

Purgationum vice clysteres injici possunt, quibus flatus discutiantur, aquæ educantur, & venter imminuatur, in hunc modum compositi.

℞. Fol. malvæ, mercurial. brassicæ rubræ, ana M. i. soldanellæ M. ss. sem. anisi, carvi, & anethi, ana ʒ. iij. flor. chamom. melilot. stœchad. & genistæ, ana P. j. Coquantur ad lb. j. In colat. dissolve catholici ʒ. j. hieræ picræ ʒ. ss. T r olej



olei anethi, liliorum, & mellis comm. ana 3. ii. Fiat clyster, bis in hebdomade injiciendus. Vel

℥. Fermenti acrioris 3. β. salis comm. P. i. Coquantur in aquæ q. f. In colat. dissolve urinæ pueri impubis 3. iv. olei rutacei 3. iij. mellis despumati 3. j. Fiat clyster, quem valde commendat Valeriola.

Sequens verò clyster insignem aquarum copiam educit.

℥. Pulpæ colocynth. 3. j. Infunde per noctem in vini albi 3. iij. Colaturæ adde decocti intestinorum vervecis ℥. j. olei communis 3. ij. salis petrae fusi 3. j. aceti fortis cochl. j. Fiat clyster. Vel

℥. Pulpæ colocynthid. 3. j. furfuris macri M. j. Decoquantur in vino albo, & fiat clyster. Vel

℥. Sem. carth. Unc. j. agarici opt. 3. β. pulpæ colocynth. 3. iij. fol. centaur. minor. chamædr. & absinthii utriusque, ana M. β. Coquantur ad ℥. i. In colat. dissolve olei chamœmel. rutæ, & de cappar. an. 3. j. mellis rosæ. 3. ij. Fiat clyster. Vel

℥. Decocti emollient. ℥. i. vini emetici turbidi 3. iv. diaphoen. 3. j. Fiat clyster.

Venæ sectio in hoc affectu meritò rejicitur, nisi fiat à suppressione mensium, vel hæmorrhoidum. Et tunc etiam, non nisi ab initio morbi, vena est aperienda, antequam hepar frigidam diathesin contraxerit.

Cauteria, velicatoria, & scarificationes in hydropicis gangrænam sæpè afferre solent, quia calor partium pusillus facilè extinguitur. Ideoque satius est, ab hujusmodi remediis prorsus abstinere, licet nonnullis aliquando profuerint.

Paracentesis etiam rarò, aut nunquam celebranda est, quia ex eo pauci evadunt, præsertim cum ægri, & affines illorum, eam operationem fieri nolint; nisi confirmato morbo; quando videlicet, corruptis visceribus, nulla salutis spes est. Ideo ut plurimum, secundo, aut tertio ab operatione die intereunt. Prudentiores volunt apertionem esse faciendam in principio, vel augmento morbi, antequam viscera labem contraxerint. Sed neque tunc temporis necessaria est, cum aliis remediis, iisque tutioribus, morbus adhuc levior curari valeat.

Inter evacuantia remedia huic affectui proficua recensentur sudorifica, quæ ut in anasarca perpetuò profunt, sic in tympanite ascite aliquando nocent, si nempe hepatis siccitas, ut non rarò fit, morbo originem dederit. Adde, quòd in hydropicis sudorem elicere ut plurimum impossibile sit. Si tamen illa hepatis siccitas abfuerit, sudorifica in omni specie hydropis convenire possunt, præcipuè in declinatione morbi ad serosi humoris reliquias per habitum discutiendas. Sic Valeriola refert à se curatum asciticum decocto ligni sancti per 40. dies exhibitò. Utile autem erit, idem decoctum cum aqua chalybeata, & vini albi portione componere. Chymici commendant antimonium diaphoreticum.

Martinus Rulandus sudorificum parat ex baccis juniperi, quæ cum urinas etiam movendi vim non exiguam habeat, utraque ratione plurimum prodesse poterunt. Illius compositio talis est.

℞. Granor. juniperi contus. M. iij. Vini generosi q. f. Decoquantur ad medias, & exhibeantur Unc. vj. singulis diebus manè, corpusque optimè regatur.

Horatius Reserus apud Scholtzium, se multos pueros, & nonnullas mulieres, anasarca laborantes curasse gloriatur usu syrupi sancti Ambrosii, qui sudorificus est, illiusque descriptio habetur in veteri dispensatorio, quod Luminare majus appellatur, quæ ita se habet.

℥. Milii excorticati Unc. ij. aquæ fontis ℥. β. Bulliant donec Unc. iij. vel iv. illius aquæ supersint. Quæ percolata, cum æquali vini albi generosi portione misceatur, deturque calidum hydropico: copiosissimè enim sudabit, si texeris diligenter.

At verò cæteris præstant medicamentis, quæ per urinas serosos humores evacuant, & felicior ut plurimum curatio hac viâ solet succedere.

Inter præcipua habetur succus chærefolii, cujus Unc. ij. exhibentur manè cum vino albo per plures dies.

Vina aperientia diuretica in hoc casu plurimum etiam conferre solent; quorum exemplum tale esse potest.

℥. Rad. enulæ camp. apii, fœniculi, iridis, siccarum ana unc. j. sem. rad. valerianæ, gentianæ, asari, scillæ, ana Drach. j. corticis med. sambuci & ligni sassafras, ana Drach. vj. fol. absinthii, agrim. chamædr. capill. ven. siccor. ana Drach. ij. summit. centaur. min. & flor. genist. ana Drach. j. sem. petrosel. ammeos anethi, ana Drach. i. sem. cinamoni Drach. ij. spicæ nardi Drach. sem. Conquassentur omnia, & infundantur in vini albi mensuris ij. vel iij. per aliquot dies. Deinde hoc vino utatur omni manè.

In eundem usum referri potest vinum chalybeatum compositum, in obstructione descriptum.

Inter diuretica etiam censendum est decoctum juniperi suprâ relatum. Quod etiam, si nimia ejus caliditas timeatur, in aqua parari poterit, eique spiritus vitrioli tantillum admisceri.

Fonseca commendat usum terebinthinæ cum aqua hordei lotæ, ejusque 3. sem. exhibet bis in septimana.

Ac denique spiritus salis, tartari, & vitrioli, iusta dosi exhibiti, cum apozemate, aut alio decocto aperiente, per aliquot dies, miranda præstant, quia summa tenuitate præditi in omnes corporis meatus facilè penetrant, eosque aperiant. Idem præstant sales absinthii, juniperi stipitem fabarum; & similes cum vino albo exhibiti. Vel salium defectu lixivium ex eorum cineribus parata sufficiant.

Mathiolus ad cap. 87. lib. 2. Dioscorid. Lixivium, inquit, ex vino albo, & juniperi cinere paratum 4. aut 5. unciarum pondere potum, valentissimè urinam pellit, ita ut nonnullos viderim hydropicos hoc tantum auxilio sanatos.

Præterea in toto curationis decursu roborantia hepar nunquam omittenda. Quia frustra aquas educimus, nisi novam earum generationem inhibeamus. Quod non nisi hepar reficiendo, & ad pristinam temperiem revocando consequi possumus.

Inter præcipua roborantia recenseri debet aqua cinamomi; Cujus cochlear unum manè vel antè cœnam interdum exhiberi poterit.

At maximè laudatur à Gal. 8. κατὰ τὸ πῶς electuarium cyphoides, ab Arabibus de vino appellatum. Cujus Unc. sem. manè exhiberi poterit, illius compositio ab Hollerio correctâ ita se habet.

℥. Passul. corinth. mundat. ℥. sem. Coquantur in vino veteri generoso ad pulvis consistentiam. Tufas excerne per setaceum. Tum admisce conservæ anthos, cortic. citri conditi, cinam. acuti in ter. an. 3. i. pulver. aromat. ros. diamarg. calidi, diacinam. ana Scrup. ij. ligni aloës odorif. 3. sem. croci 3. sem. Misce, fiat electuarium molle.

Opiata ad obstructiones hepatis præscripta hinc etiam erit utilissima.

Plurimum etiam valet conserva absinthii pontici, ex una parte comarum illius, & tribus sacchari partibus composita. Cujus usû nonnullos hydropicos percuratos fuisse testatur Mathiolus, cap. de absinthio.

Posterius opiatam componit ex conserva rosar. specifico stomachico, croco martis, & ol. vitrioli quo solo remedio se hydropicos curasse gloriatur. Specificum autem stomachicum est antimonium fixum.

Cæterum in potu hydropicorum maximum versatur curationis momentum. Illius idcirco curam exactam habere opus est, ut parcissimè bibat æger, & sitim toleret; quantum potest. Multos enim omnimodâ potus abstinentia & assorum usu, sine alio remedio convaluisse, notum est. Pro potu utatur æger vino enulato, vel absinthite, vel juniperino, vel chalybeato, vel prædictis etiam chalybeatis. Jubet Avicenna, ne aquam quidam videant hydropici. Si tamen nimia calefactio aut exsiccatio metuat, vel æger sit abstemius, uti poterit decocto juniperi, ligni sancti & sassafras, vel decocto rad. rubiæ tinctorum, quæ urinas potenter movet; iisque vel solis, vel cum vino albo permixtis. Cum autem, ut antea dictum est, potus abstinentia maxima esse debeat, sitis tamen admodum urgeat; illa per vices fallenda est, vel oris collutione cum aqua chalybeata & aceto, frequenter mandendo grana aliquot mastiches, vel quidvis ejusdem facultatis. Aquam enim plurimam in os eliciet. Non ut quibusdam videtur, è capite solo, sed ex ventriculo, & ex abdominis



minis capacitate, sicque multis est hominibus profutura.

De cibis, hoc tantum dicemus sicciores esse eligendos, & dulcia, ut pestem, esse fugienda.

Dum remedia interna celebrantur, externa etiam admistranda sunt. Illa enim non parum conferunt ad ventris tumorem discutiendum. Ad hanc rem componuntur fomenta, sacculi, unguenta, cataplasmata, & emplastra, quorum præcipua in hunc modum se habent.

℞. Rad. althææ, liliorum, cyperi, cortic. rad. cappar. mediani fraxini, tamarisci, ebuli, & serpentariæ major. ana ʒ. iij. fol. absinthii, agrimonii, majoranæ, origani, calamenti, pulegii, rutæ, chamædr. chamæm. abrotani & sambuci, ana M. j. Sem. petrosel. aneti, & cumini, an. ʒ. j. Flor. chamæm. melilot. & genistæ, ana P. iij. spicæ nardi schoenanthos, nucis moschat. caryophyll. & cinam. ana ʒ. sem. salis & aluminis; ana lb. ʒ. Fiat omnium decoctio in lixivio facto ex cineribus quercus vel sarmentorum, qua foveatur totus venter calidè ante cibum, cum spongiis in ea imbutis & expressis. Vel

℥. Urinæ pueri mund. lb. iv. salis prunellæ ʒ. iij. Bulliant ad tertiæ partis consumptionem pro fotu.

Aquapendens aquam calcis prædicat, in qua spongiam novam, quæ totum abdomen comprehendat, exprimit, eamque superligat. Sic enim aquas hydropicorum insensibiliter absumit, & frigidam humidamque ulcerum intemperiem tolli, & lienem induratum aliquando sanari asserit. Claudinus verò calcem in aqua thermali falsa, sulphurea, aut nitrosa extinguit, spongiam in ea expressam fasciis arctè ventri alligat, & diu ibi detinet, subindeque permurat. Sacculi parari possunt ex materia prioris fomenti, in vino albo decoqui, & calidè ventri admoventi.

Post fotum liniatur venter ol. anethino, rutaceo, irino, cum pulvere ammoniaci, galangæ, aneth. baccarum lauri, & similibus.

Inunctio ex ol. scorpion. Mathioli, cum pauco oleo rorismarini utilissima est.

Multa unguenta, & linimenta componunt ex purgantibus validioribus, quæ hydropicorum aquas potenter detrahunt, & distentum abdomen remittunt.

Verùm illa periculosa sunt. Inferta namque musculis & membranis vis purgatoria, lethale sæpè alvi profluvium ciet.

Post linimenta, vel etiam iis omissis, cataplasma vel emplastra imponi poterunt. Sequens præstantissimum est.

℞. Rad. cucum. agrest. optimè contusæ, & in aceto scil. per 24. horas macera. lb. j. mellis despumati lb. ij. Misce, & bulliant ad consistentiam cerati, & in fine adde eumini subtiliter pulverati ʒ. iv. Fiat emplastrum abdomini applicandum, & singulis diebus renovandum. Vel

℥. Stercoris bovini siccati lb. j. sulphuris vivi, & sem. cumini pulverat. ana ʒ. ij. sapæ vel urinæ pueri q. s. Fiat cataplasma.

Cataplasma ex raphanis contusis, umbilico & lumbis admotum, alvum & urinas movet.

Galenus commendat cataplasma ex cochleis cum suis testis contusis, quod ventri admotum ibi detinendum est, donec sponte cadat; aquas hydropicorum potenter absumit. In emplastri formam redactum tale componitur à Valeriola.

℞. Stercoris vaccini lib. j. sterc. caprini lb. sem. Bulliant simul in aceto fortissimo, & in mortario contundantur, addendo sulphur. vivi ʒ. iij. alumin. ʒ. j. succor. thymelææ & ebuli recent. extractorum, an. ʒ. iij. farin. lupin. & orobi, an. ʒ. ij. pulver. soldanell. quart. j. anisi marathri, cumini, an. ʒ. ij. salis comm. torrefacti ʒ. iij. terebinth. ʒ. iv. picis navalis ʒ. vj. Misce, fiat emplastrum.

Observatione dignum est, quod sibi experientiâ compertum esse testantur Uviersus & Varignana, bufonem sylvestrem, qui in nemoribus repetitur, per ventrem sectum & renibus obligatum aquas hydropicorum per urinas educere, & cum amplius evacuare volumus applicationem esse renovandam.

Petræus verò refert ejusdem bufonis pulverem in clybano siccatum & calcinatum ʒ. sem. pondere in vino, vel alio liquore propinatum, per urinas hydropem mirificè expellere. Cujus experimenti inventor primus, mortis accelerationem in eo quærens insperatò convaluit. See

Laz. Riverii Opera.

quens etiam ceratum ex bufone paratum utilissimum est.

℞. Bufonum lb. ij. succi ebul. lb. ij. olei lib. j. ceræ lb. ʒ. Bulliant in olla lutata ad mediæ partis consumptionem, Colentur, fiat ceratum, quod extenditur supra alutam, & regioni lienis applicetur, aquas omnes evacuat.

Toto curationis decursu roborantia ventriculo admoventa sunt. Et in primis hepatis, dum tumor subsidere incipit, aut non est adeo insignis, ut topicorum penetrationem ad hepar impedire queat.

℞. Ol. flor. arantiorum ʒ. j. olei de spica ʒ. iij. unguenti rosac. cerati stomachici Gal. ana ʒ. ij. ol. mastich. stillatitii ʒ. ij. absinthii still. ʒ. j. ol. nucis moschat. ʒ. j. sem. Ceræ albæ parum. Misce, fiat linimentum ventriculo applicandum.

℥. Comas absinthii pontic. ʒ. iij. marrubii, rorism. ana Drach. ij. rosar. rubr. P. ij. flor. chamæm. fol. lauri, ana M. ʒ. cortic. arantiorum, ligni aloës odorif. ana Drach. iij. rad. cyperi, schoenanthos, spicæ nardi, ana ʒ. sem. cum vini optimi partibus duabus, aquæ absinthii & agrim. ana parte unâ, fiat decoctio, qua foveatur regio hepatis cum spongia vino absinthite elota.

℥. Unguenti rosac. cerati fantal. Unc. iij. rosar. rubr. sem. endiviæ & acetosæ, ana Drach. j. spicæ nardi schoenanth. absinthii ficci, styrac. calamit. ana Scrup. iv. ol. mastich. vel de absinthio q. s. Fiat linimentum applicandum eidem parti post fotum.

Ut plurimum in hydrope crura, tibiæ, & pedes oedematoso tumore afficiuntur, ad eumque discutiendum conveniet lixivium, in quo rad. ebuli & enulæ camp. folia rorism. majoran. thymi, lauri, origani, sal, & alumen incosta fuerint.

Quamvis autem ut plurimum proposita curatio usurpanda sit, aliquando tamen minùs conveniens est, quando nimirum hydrops in calido & sicco temperamento, à causis calefacientibus, calorem nativum dissipantibus, productus est, quemadmodum in febribus biliosis & vehementibus solet accidere. Tum enim hepatica frigida cum aperientibus minus calidis conveniunt, qualia in febribus diuturnis usurpari solent. Tum etiam syrupus magistralis suprâ descriptus, ex succis rosar. cichorii & agrim. compositus, in hoc casu maximè conveniet.

Pro potu sumatur decoctum rad. cichorii, & calcitrapæ, gustui non ingraturum, vel aliorum aperientium temperatorum; sed liberaliore quantitate, quam quæ suprâ proposita est, quæ nimirum sitim leniat, jecoris ardorem temperet, idque resiccatum humectet. Quam doctrinam quamvis ab Avicenna, Tralliano, aliisque sancita est, quia tamen à nonnullis paradoxa videtur, & magni est in usu practico momenti, non erit inutile insigni exemplo confirmare, à Baptista Montano relato *conf. 263.* his verbis: *Vidi, inquit, Venetiæ religiosum quemdam Ordinis Prædicatorii, hydropicum ex ascite & tympanite, qui fuit curatus. Adfuerunt mecum excellentissimi Medici plurimi, scilicet Papiensis, Eugubinus, Trincaveila, & alii. Habebat is, ut dixi, ascitem cum tympanite, & tabem cum febre hectica. Oportebat eum exsiccare & humectare. Quare eramus in maxima discordia. Ego volebam, ut multum biberet, sed quæ aperirent, quia habebat plurimas obstructions, præterea ut humectaretur, quia ad tabem pervenerat. Ordinabam ego syrupum acetosum, cum omnibus quæ provocant urinam. Eugubinus nolebat quicquam esse bibendum, & narrabat de quodam historiam, qui per sicca fuit curatus. Papiensis, ut litem dirimeret, conclusit neque liberaliter, neque omnino nihil esse bibendum. Res extrahebatur usque ad nossem. Deducebant nobiles unumquemque Medicum ad suam cymbam. Ibi tum Papiensis, quod antea dissimulaverat, conversus ad magnificum quemdam, dixit: Si vultis curare hunc dominum, profectò non aliud erit faciendum, quàm quod consuluit Baptista Montanus.*

In hoc etiam casu maximè convenient medicamenta ex chalybe, tartaro, & vitriolo, quia citra insignem calefactionem potenter aperiunt & urinas movent.

At cæteris remediis palmam præripiunt in hoc casu aquæ minerales acidulæ & vitriolatæ, quæ viscera potenter deobstruunt, aquas per urinas evacuant, & viscerum intemperiem corrigunt, Unde experientiâ constat, multos




hydropicos queta nnisaquarum Spadanarum usu percurari.

Narrat Avicenna *cap. de cura ascitis*, historiam mulieris cujusdam, *quam hydropisis attrivit*, ut ipse loquitur, & *magnificata est super eam*, & *ipsa mulier comedit quantitatem malorum granatorum, tam maximam, quod ejus relatio est incredibilis, & sanata est.*

Et Varignana refert ex Plateario, quòd quædam vetula coxit in olla succum plantaginis ad medietatem, &

dedit hydropico de causa calida, ad bibendum quotidie, & sic curatus.

Quibus exemplis patet, hydropem aliquando refrigerantibus curari. hisque addere possumus Christophori à Vega testimonium, qui *lib. 3. art. medic. sect. 8. cap. 12. Tympanitem*, inquit, *vidimus à calida jecoris intemperie natum, quem refrigerantibus curavimus, jecori superponentes succum endiviæ, & cichorii, cum paucò aceto, & cichorium edendum dantes, atque endiviam.*



# PRAXEOS MEDICÆ

## LIBER DUODECIMUS.

### DE AFFECTIBUS LIENIS.

#### PRÆFATIO.



**Q**UAMVIS lien omni morborum genere, tam simili, quam organico, & communi affici valeat: eos tamen solummodo, qui in praxi frequentius occurrere consueverunt, explicare decrevimus, & sex capitibus comprehendere. Quorum primum erit de inflammatione. Secundum, de dolore. Tertium, de obstructione & tumore, seu inflatione. Quartum, de scirrho. Quintum, de melancholia hypochondriaca. Sextum, de scorbutica affectione.

#### CAPUT I.

##### De inflammatione Lienis.

**I**Nflammatiō lienis ejusdem est naturæ cum hepatis inflammatione. In eo tantum differt, quod rarius sit à sanguine puro; frequentius à sanguine melancholico. Eadem etiam habet causas, tam conjunctas, quam antecedentes. Diagnōsis verò diversa est.

Signa igitur inflammati lienis sunt, tumor & dolor in sinistro hypochondrio, qui interdum ad diaphragma & sinistrum humerum extenduntur, gravitas etiam adest, & pulsatio in eodem hypochondrio: febris assidua, cibi fastidium, sitis, lentor nigricans linguæ adhærens, molestus dexter decubitus, propter visceris gravitatem ventriculo incumbens: interdum etiam sinister, si tumor ingens fuerit, quia comprimitur tunc à ventriculo & hepate: tumor interdum lienis figuram retinet, interdum totum sinistrum hypochondrium implet, interdum etiam infra umbilicum apparet, multiplicatâ materiâ, & inflammatione vicinas partes, præcipuè umbilicum, occupante.

Intensiora autem & remissiora prædicta signa apparent, cum aliqua etiam varietate, pro varia humorum miscella. Si enim sanguini melancholico bilis admixta sit, urinæ sunt rubicundiores, os amarescit, sitis intensior, febris ardens, & tertio die ingravescent, vigiliæ tensæ, & interdum deliria. Si sit admixta pituita, color est pallidus, febris & sitis minor, & dolor remissior. Si verò sanguis melancholicus purus sit, durities major est, color corporis nigricat, interdum urina: aliaque dominantis melancholiæ indicia apparent.

Prognōsis ferè eadem est, quæ hepatis inflammationis; attamen paulò minus periculosa, cum hepar sit nobilius. Si ægrum non interimat, vel crisi terminatur, vel resolutione solvitur, vel suppuratione, vel induratione, qua ad scirrhum degenerat. Crisi bona sæpè contingit per hæmorrhagiam naris sinistræ, urinæ, vel alvi profluvium.

Curatio hujus affectus eadem instituenda est, quæ in

hepatis inflammatione fuit proposita; si sequentes tantum adhibeantur differentiæ.

Primò, quòd venæ sectio, liene inflammato, in brachio sinistro celebranda sit, & non tam frequenter, ut in hepatis inflammatione: quia hepar, fons sanguinis, largiori indiget evacuatione. Quod verò de apertione salvatellæ ab Authoribus circumfertur, quam lienem peculiariter exonerare aiunt, superstitiosum quibusdam, & jam ferè in usu practico obsolevit. Utilius enim multò è basilica vena, ad omnes implendas indicationes, sanguis detrahitur, ex multorum opinione.

Secundò, quòd topica, quæ in inflammatione hepatis hypochondrio dextro admovebantur, hîc sinistro applicentur.

Tertiò, quòd in dictorum topicorum usu, adstringentia non sunt tanta cura, & tam diu continuanda: quia cum lien sit pars minus princeps, illius robori tantoperè studendum non est.

Reliqua ex inflammationis hepatis curatione desumantur.

#### CAPUT II.

##### De dolore Lienis.

**D**OLOR interdum lienem affligit citra febrem & duritiem, quæ tactui renitatur, isque a flatu exoritur, qui non solum lienis substantiam, quæ ferè insensilis est, sed etiam membranam ipsum vestientem distendit.

Ab inflammatione faciliè distinguitur, per febris & renitentis absentiam. Difficilius verò à colico dolore, quia colon intestinum spleni subjicitur & incumbit: distinguantur tamen, quod dolor splenicus gravis sit, & in uno loco fixus; colicus verò distendens, acutus, mobilis, & ad totum ventrem excurrans.

Curatio hujus doloris perficitur clysteribus carminantibus, purgatione convenienti, fomentisque emollientibus ac discutientibus, aceto adjecto. Tum etiam linimentis compositis ex ol. lilior. chamæm. capparum, ab sinthii, cum modico spicæ & aceti.

Si post horum remediorum usum dolor persistat, cucurbitula sinistro hypochondrio erit admovenda, modo nulla inflammationis aut fluxionis suspicio fuerit.

#### CAPUT III.

##### De obstructione, & tumore, seu inflatione Lienis.

**L**ien obstructionibus obnoxius est non minus, quam hepar, imò & frequentius; quandoquidem crassiori sanguinis



sanguinis parti recipiendæ destinatus est, ac magis fœculentæ, quæ idèd facilius in venis illius retinetur, vel in meatibus insensibilibus hæret, propter molliem & laxitatem partis, crassorum humorum receptioni magis idoneam. Et quando humor crassus substantiæ lienis hæret, tumorem in parte efficit, ac inflationem. Et quidem si humor ille diuturnâ morâ crassescat ac duritiem nanciscatur, scirrhum generare solet, quandiu verò liquidior manet admixtione pituitæ, ad œdematosi tumoris naturam accedit, qui illis præcipuè familiaris est, qui in locis palustribus humidisque degunt: vel qui frigidis alimentis vescuntur, aut frigidæ potu largiori utuntur. Si verò tumor ille mollior & laxior fuerit; inflatio simpliciter appellatur, cujus causa est materia partim pituitosa, partim flatulenta. Hujusmodi obstructionibus, tumoribus, & inflationibus affecti, lienosi vulgò nominantur.

Causæ lienis obstructiones generantes, eadem omnino sunt, quæ in hepatis obstructione fuere propositæ, & hanc vel illam partem afficiunt, prout magis, vel minus dispositæ sunt ad eas recipiendas. Non rarò autem utrumque viscus simul afficitur. Vix enim humores crassi possunt in uno viscere luxuriare, quin portio eorum ad aliud quoque deferatur.

Distinguatur obstructio lienis ab obstructione hepatis, ex situ partis affectæ. Gravitas enim percipitur in sinistro hypochondrio, & interdum dolor, præsertim in cursu, vel concitatione ambulatione, aut equitatione, & contractando hypochondrium, tensio & renitentia quædam invenitur; tum color faciei lividus percipitur, & reliqua melancholiæ dominantis indicia apparent.

Affectus est pertinax & diuturnus, ob partis molliem & laxitatem, cujus ratione ab humore imbibito sese facile expedire non potest; & si in vetustatem abeat, nec citò curetur, in scirrhum degenerat.

Curatio eadem competit, quæ in hepatis obstructione fuit proposita, addendo ea, quæ peculiariter lienem respiciunt, & humori melancholico præparando expurgandoque dicata sunt.

His autem pilulæ de ammoniaco sequentes, tanquam efficacissimæ, addendæ sunt, & in frequenti usu habendæ.

℞. Ammoniæ pinguis in aceto scillitico soluti Unc. j. extracti aloës Unc. semis, CrySTALLI tart. Drach. j. myrrhæ, croci, ana 3. sem. masticis benzoini, salis fraxini, & absinthii ana 3. j. Cum oxymel. scillit. fiat massa pilular. Dosis Drach. sem. bis in septimana, purgationibus interjectis.

In apozematis, aliisque aperientibus remediis liquidioribus, oxymel simplex, & scilliticum utiliter dissolvuntur, ad crassos & terrestres humores potenter dissolvendos.

Præ cæteris autem remediis, quæ ex chalybe componuntur, ad lienis obstructiones referendas sunt efficacissima.

Imò verò pro potu ordinario aqua ferrata, vel chalybeata usurpanda est, quæ lienem imminuere, ut inquit Celsus, ex eo cognoscitur; quòd ea animalia, quæ apud fabros ferrarios educata sunt, exiguos lienes habent.

Fomentis acetum addatur loco vini albi, quòd majorem penetrationem conciliet, quæ necessaria est in humore crassiori. Adde quòd Galen. in affectibus lienis acetum valdè commendat, in remediis tum internis, tum externis usurpatum.

Cataplasmatis addatur cicuta, tanquam efficacissima ad tumores emolliendos & discutiendos.

Efficax fit cataplasma ex nicotiana viridi, cocta in oleo & vino albo.

Ex oleo etiam cocto cum nicotiana & vino albo, ad vini consumptionem, fieri potest litus admodum efficax. Amatus Lusit. curat. 61. cent. 5. curationem proponit obstructionis lienis, à quartana febre relicta, quæ sublata est decocto rad. chinæ, per 20. dies, post convenientes purgationes usurpato.

**M**ateria lienis obstructionem efficiens diuturnâ morâ crassescit magis ac magis, & scirrhosam duritiem contrahit. Cum autem eadem sit natura scirrhi, lienis & hepatis; quæcumque de hepatis scirrhi à nobis dicta sunt, in hunc etiam locum transferri possunt.

Diagnosis etiam scirrhi lienis eadem est, cum scirrhi hepatis diagnosi, nisi quòd in illo durities & renitentia percipiuntur in sinistro hypochondrio.

A tumore flatuoso, seu inflatione distinguitur, quòd in scirrhi major sit gravitas, quàm in flatuoso tumore, qui etiam digitis compressis cedit, & murmur ac sonum edit, qui in scirrhi non reperiuntur.

Si à sola melancholia fiat, insignia atque evidentia prædominantis melancholiæ signa apparent: Si verò pituitam admixtam habeat, cachexia pituitosa in toto corpore apparet.

Prognosis etiam eadem est cum hepatis scirrhi prognosi; nisi quòd lienis scirrhus faciliorem aliquantulum curationem obtineat; propterea quòd viscus ignobilius fortiora citra noxam toleret remedia.

Ac denique curatio scirrhi lienis eadem omnino est cum ea, quæ pro hepatis scirrhi fuit proposita.

Quia tamen per gradus ineunda curatio est, & à mitioribus ad valentiora progrediendum, ea prius remedia usurpanda erunt, quæ obstructionibus hepatis & lienis convenire diximus. Et inter medicamenta chalybeata ibidem laudata, maximè conveniunt pilulæ ex chalybe, de ammoniaco, aliisque compositæ, in obstructione hepatis descriptæ.

Ex remediis verò pro hepatis scirrhi propositis, magno in pretio habendæ sunt pilulæ ex aloë, ammoniaco, & mercurio dulci; quæ tamen non abundè satisfaciunt. Opiata sequens utramque paginam implebit, nisi morbus sit prorsus incurabilis.

℞. Gummi ammon. opopanac. & bdellii, an. 3. ij. Dissolvantur in vino albo, colentur, & coquantur: deinde adde confect. hamech. & diaphoen. an. 3. ij. catholici dupl. 3. s. pilular. foetid. 3. ij. Fiat opiata de qua capiat 3. s. addendo mercurii dulcis gr. xx. continuando per plures dies consequentes, sicque tumor & durities evanescent.

At præter illa remedia & præcepta in prædictis curationibus proposita, sequentia in hoc morbo observanda sunt.

Primò quòd de sanguinis missione valde dubitetur. Hæc tamen difficultas resolvitur, concludendo eam convenire posse in principio. At morbo inveterato minime prodesse.

Secundò, inter specifica remedia commendantur à Solenandro & Fonseca urtica mortua, quæ Geliopsis dicitur, seu lamium Plinii. Itali herbam lienis vocant. Hanc cum vino tenui decoctam ad 3. j. exhibent, vel Pulveris illius Drach. j. cum eodem vino, aut alio liquore idoneo, felicissimo successu.

Tertiò, præter fomenta ibi enumerata, Aquapendens in Chirurgia, abdominis fotum, ex spongia in aqua calis expressa admotum prædicat, eoque scirrhum lienis & hydropem curatam asserit.

Quartò, præter unguenta, dictis locis proposita, sequens, tanquam mirabile, laudatur ab Amato Lusitano, cujus usu se scirrhum lienis, curasse gloriatur, idque à Medicis Ferrariensibus accepisse refert.

℞. Ol. commun. lb. iij. medullæ crurum bovis lb. j. butyri recentis lb. s. succi bryoniæ: & cyclam. an. lb. j. Bulliant lento igne ferè ad consump. succorum. Colaturæ adde ceræ citrin. 3. viij. ceterach. cortic. capparis, tamarisci, Sem. agni casti, an. 3. ij. Misce, fiat unguentum.

Ita describitur ab Amato. Sed nimia est illius quantitas pro unico ægrotante. Poterit ergo imminui in hunc modum.

℞. Ol. com. 3. iij. medullæ cruris bovis 3. j. butyri recent. 3. sem. Bulliant lento igne ferè ad consump. succor. Colaturæ adde cort. citrin. 3. j. pulv. ceterach. cort. capp. tamarisci, & Semin. agni casti, an. 3. ij. Fiat unguentum.



Quintò cataplasmata sequentia maximæ sunt efficacix.

℞. Rad. cucumer. agreß. ℥b. j. fol. malvæ & violar. ana M. ij. Coquantur ad putrilaginem. Contundantur & trahantur per setaceum: deinde adde ol. de cappar. & tamarisci an. Unc. j. aceti scillitic. parum. Fiat cataplasma.

℞. Fermenti acrioris ℥b. ij. Coquantur in æquis partibus olei & vini ad formam cataplasmatiss.

Denique præter emplastrum in scirrho hepatis propositum, sequentia erunt efficacissima.

℞. Gummi ammon. ʒ. iv. Dissolvantur in aceto forti, postea colentur & bulliant ad consumptionem aceti; deinde adde ceræ parum. Fiat emplastrum.

℞. Cicutæ M. iv. ammoniaci ℥b. ʒ. Infundantur aceto dies octo, deinde bulliant dum ammon. solvatur, hinc per pannum lineum valide exprimatur; iterumque expressus liquor ebulliat parum, adjecta cerâ, ol. amygdal. fiat emplastrum.

℞. Succu malvæ, nasturtii aquatici, caulium, & rad. silicis, an. ʒ. ij. gummi ammoniac. Unc. iv. aceti parum. Dissolve simul lento igne, postea coquantur; postremo colentur, tandem recoquantur ad syrupi consistentiam, & cum ʒ. j. ol. de capparibus, & ceræ q. s. fiat spanadrap. regioni lienis applicandum, & tertio quoque die renovandum.

Aquapendens loco citato, lienes induratos sequenti emplastro plures sanatos fuisse asseverat, quod sit ex duabus partibus ammoniaci ex aceto dissoluti, una succi nicotianæ, unâ, resinæ pini, terebinth. & succi ebuli, unâ ol. de cappar. & ceræ novæ q. s. ad emplastri seu cerati formam adipiscendam.

## CAPUT V.

### De Melancholia Hypochondriaca.

**L**icet omnes partes hypochondria constituentes; in hoc morbo afficiantur, lien tamen pars affecta præcipua censetur, cum sit humoris melancholici conceptaculum, ut non ineptè inter morbos lienis collocari valeat.

Fit igitur hæc affectio à melancholia præternaturali, quæ atra bilis nominatur, & ex aliis humoribus exustis ac torrefactis generatur, præcipuè sanguine, aut bile, aut melancholiâ naturali.

Hic tamen humor melancholicus, purus ac sincerus non est, sed plerumque aliis humoribus, iisque vitiosis permixtus, putà biliosis, pituitosis, ac serosis, ex quibus magna symptomatum varietas exurgit, inferius referenda. Generantur verò humores isti vitiosi in liene, præsertim calidiori intemperie affecto: tum etiam in hepate pariter intemperato, unde fit, ut cibum & potum crudum & non satis cocta ad se trahant, & quidem tenuem & aquosam chyli partem maturius, crassam verò tardius: hinc postea crassior, vehiculo destituta, in venis mesaraicis subsistit, ibique diutius hærens ulterius incrassatur, sæpeque aduritur, & postmodum ad prædicta viscera perveniens, non rectè concoquitur. Adde quod concoctio illorum viscerum quæ in statu naturali per elixationem fieri debet, ab iis intemperatis per assationem potius fiat; unde humorum adustio major consequitur. Fieri tamen potest, ut citrà viscerum intemperiem hæc affectio generetur, ex pravis scilicet alimentis, & sanguini melancholico producendo idoneis. Imò verò ex ipso sanguine laudabili, diutius in vasis retento, & quantitate superfluo, quod in suppressione mensium & hæmorrhoidum contingit, qui quidem sanguis, in prædictis vasis diutinam moram trahens, exurit, & atræ bilis naturam induit.

Oriri etiam potest hæc affectio ex vicio ventriculi, alimenta probè non concoquentis, sed ea in nidorofam cruditatem convertentis, ex qua deinde in hepate & liene vitiosi illi succi generantur. Imò verò Gal. 3. de loc. affect. c. 7. Dioclem sequutus, censuit propriam melancholiæ hypochondriacæ sedem esse in ventriculo, ex eo quod ut plurimum in hoc affectu ventriculi laborantis indicia appareant. Veritati tamen magis consonum est, ventriculū frequentius secundario affici, hepatis aut lienis vitio ipsi communicato ut in sequentibus clariùs ostendemus.

Colliguntur autem vitiosi illi humores in venis & arteriis quæ in infimo ventre continentur, ramis præsertim venæ portæ majoribus, splenicis, mesentericis, epiploicis, gastricis, & gastrepiploicis, in quibus magis & sæpè horrendas fermentationes patiuntur: unde anathymias tetraæ & malignæ ad cerebrum, cor, & diaphragma elewantur, quæ symptomata varia in iis partibus excitant, inferius enumeranda.

In ipsis etiam visceribus humores prædicti continentur, liene præsertim, & pancreate, glandulisque in mesenterio residentibus, quarum omnium partium substantia mollis & spongiosa, prædictis humoribus faciliè imbutur, & semel imbibitos difficillimè deponit. Præterea glandulæ per totum mesenterium dispersæ, ut venis & arteriis fulcimento & firmamento sint, & obstant, ne illæ à repletis intestinis, vel aliâ de causa comprimantur: Si autem præter modum intumescant, ipsa vasa comprimunt, & liberum humorum comœatum impediunt: unde obstructions in illius ductibus generantur.

Pueri & adolescentes huic affectui minimè obnoxii sunt, propter humidum temperamentum, humori melancholico generando ineptum: sed ætati consistenti frequentissimè contingit, quia humores in juventute à calore acriore aduruntur, & ubi calor ille deferbuit, tenuioresque partes exhalant, magnus sit humoris melancholici proventus. Causæ hujus affectus antecedentes & procatarticae sunt: primò, cibi pravi succi, concoctu difficiles, & qui generando humori melancholico idonei sunt, ut panis furfuraceus, aut non bene fermentatus; aut crusta ejus, legumina, caseus, ova indurata & frixa, aves aquaticæ, carnes bovinæ, cervinæ, leporinæ, & omnes sale & fumo induratae, aliaque innumera alimenta, crassiori & duriori substantiâ prædita.

Secundo, animi pathemata gravia & diuturna, præcipuè mœror & mœstitia, ad hunc effectum generandum maximam vim habent; ab iis enim maxima sit spirituum dissipatio, cujus ratione coctiones debilitantur, & magnus sit crudorum proventus, quæ à visceribus calidioribus exustæ, in humorem atrabiliarium degenerant.

Tertiò, quies & otium huic malo producendo occasionem præbent, quia efficiunt ut plurima excrementa in corpore retineantur, in primis si meditationes plurimæ ac lucubrationes accedant. Unde literati, qui vitam sedentariam agunt, huic affectui maximè obnoxii sunt.

Denique suppressio mensium & hæmorrhoidum, non solum ratione quantitatis, ut antea dictum est, sed etiam qualitatis, morbum hunc producere potest. Cum enim per venas hæmorrhoidales sanguis melancholicus à natura evacuari soleat, & cum eo multi humores falsi & adusti; tum in purgationibus mensstruis multi etiam humores vitiosi educantur: si evacuationes illæ substerint, fit refluxus illorum humorum ad hypochondria, qui huic morbo occasionem præbent.

Diagnosis hujus affectus ex symptomatis petenda est, quæ illum consequi solent, eorumque maximus est numerus: etenim omnes propemodum corporis partes in hoc affectu labem aliquam percipiunt, quando is ad summum exaltationis gradum pervenit. Eorum seriem explicare aggredimur, hoc priùs admonendo, non omnibus ægris contingere, sed alia his, alia illis pro varia humorum peccantium natura, & variis partibus, quæ afficiuntur.

Primò igitur ventriculus ut plurimum laborat, non quidem primario affectu, at Galenus ex Diocle censuisse visus est; sed potius secundario; quando scilicet sanguis, pro nutritione ventriculi è venæ portæ ramis effluens, non bene se habet, unde ventriculus malè nutritur, malè alimentum concoquit, idque in alienam ac vitiosam substantiam convertit. Hinc reciproca quædam & circularis noxa exoritur, dum hepar & lien pravum sanguinem ventriculo nutriendo suppeditant: & ventriculus demùm pravum chylum generat, ex quo iterum sanguis vitiosus producit.

Ventriculus igitur in hoc affectu plerumque cibos malè concoquit, & bonam eorum partem in materiam nunc aqueam, nunc acidam vel acerbam, nunc viscidam mutat:



## Cap.V.De Melancholia Hypochondriaca. 335

mutat, quæ cum ab intestinis & venis mœfæicis, utpotè alendo inepta, non attrahatur; in ventriculo moratur, & nunc sursum repens, linguam & os saliva & humiditate aquea replet, ut continuò ægri exspuere cogantur, sæpe etiam per vomitum humores illos in ventriculo collectos rejicere.

Sæpe etiam materia in ventriculo contenta ebullit & fermentatur: unde flatuum copiâ excitatur, qui non solum ventriculum, sed etiam vicinas partes distendunt, ac tantam in præcordiis molestiam pariunt, ut ægri interdum in lipothymiam incidant. Interdum verò flatuum illorum pars per superiora & inferiora rejicitur, pars verò per insensibilem transpirationem discutitur, aut eorum materia per vomitum excluditur.

Advertendum tamen est, non omnia, quæ vomitu rejiciuntur, in eo generari; sed etiam non rarò à liene, aliisque partibus transmitti. Humores etiam interdum evomuntur, tanta aciditate præditi, ut stuporem dentibus afferant, quos è liene in ventriculum per vas breve transfundi, minimè dubium est.

In aliis sanguis è liene in ventriculum per vas breve, cum humore atrabiliario, aliisque vitiosis humoribus transmittitur: quia partium per vomitum partim per secessum rejicitur, ut in vomitus sanguinis theoria fusiùs exposuimus.

Ructus etiam frequentes hoc affectu laborantibus, tum etiam rugitus & murmura hypochondriorum solent contingere, propter copiam flatuum, qui ex crudis, ac melancholicis humoribus generantur: unde ab antiquis hic morbus affectio flatuosa nominatus est. Quomodo autem flatus ex melancholico humore suscitentur, id in tympanite dictum est.

Dolores etiam non rarò in ventriculo & hypochondriis ab iisdem flatibus excitantur, & interdum ad dorsum & lumbos extenduntur, ut nephriticos æmulentur; præsertim, si urina rubra & crassa, hypochondriacis familiaris, excernatur.

Alvus adstricta sæpè in hoc affectu; quòd nimirum cibus in materiam viscidam ac glutinosam commutetur, quæ cum intestinis hæreat, alvi constrictionem parit, cum facultas expultrix viscidum illum humorem excernere nequeat, nisi à medicamentis adjuvetur. Quo fit, ut hujusmodi melancholici frequentius cathartici, aut enematis alvum relolvere cogantur.

Alvi fluxus etiam interdum contingit, si humores acrimoniam acquirant, & bilem, aut fervidam melancholiam admixtam habeant.

Æstus in hypochondriis percipitur, & inflammatorius quidam affectus, cum ardore & fervore interno, nunc in uno, nunc in utroque hypochondrio ægros affligente, ex humoribus calidis ac fervidis, in iis contentis. Et solet iste calor ac æstus se magis exerere, quando humores illi calidi ab aliqua causa interna, vel externa commoventur & exagitantur; ita ut ex vaporibus inde elevatis facies incalcescat, ac rubore suffundatur, imò verò interdum febris ephemera excitetur, ex iisdem vaporibus in totum corpus diffusis.

Urina in hoc affectu varia est, nunc tenuis, nunc crassa. Tenuis quidam, quando humores crassi urinæ vias obsident, per quos illa quodammodo transcolatur, ut partes tantum tenuiores & serosæ permeare valeant. Crassa verò, rubra, & turbida ob materiæ crassæ admixtionem, quæ multo sale saturata est, & ideò tartarea nominatur, tum in fundo matulæ instar sedimenti crassioris colligitur: vel etiam quædam illius portio matulæ parietibus adhæret, instar arenularum rubrarum, quæ multis calculi metum incutiunt, quamvis immeritò, cum hujusmodi arenulæ non in renibus, sed in hepate generentur, ex materia adusta & salina. Cujus rei indicium est, quod hujusmodi arenulæ, digitis attritæ, faciliè dissolvantur, salis instar; quod in arenulis, à renibus oriundis, non contingit.

Cordis palpitatio in hoc affectu interdum accidit, ob vapores ad cor ascendentes, quos dum expellere nititur, ipsum violenter, & inordinatè movetur: & tunc ægri se in magno vitæ periculo constitutos existimant, & auxilium anxie requirunt.

Pulsatio in sinistro hypochondrio nonnunquam percipitur, quando scilicet humores fervidi in iis locis exagitantur, & vapores inde excitari arteriarum systolen & diastolen majores efficiunt; ita ut tum ab ægrotantibus, tum ab adstantibus, manum hypochondrio admoventibus pulsatio illa percipiatur, quæ tum in primis commovetur, quando ægri ab ira, motu vehementiore, aut meri largiore potu incalcescunt. Et hæc in primis palpitatio in arteria cœliaca fit, quæ insignior est in illa parte. Aliquando etiam continua est indefinens in morbo inveterato, & quocumque tempore manum admoventis, perpetuò pulsationem advertit, quod morbum habitualement & incurabilem significat. Continuum autem illam pulsationem interdum sequitur aneurisma, ex arteriæ cœliacæ, aut alterius cujusdam arteriæ insignioris dilatatione, à sanguine fervidiori in iis contento, qui valdè attenuatus, & multis ac fervidis spiritibus permixtus, arteriam continuo dilatat ac distendit; donec aneurisma integrum contraxerit, quale observavit Fallopius lib. de tumoribus prætern. cap. 14. in vetula quadam, cujus cadavere aperto, inventum est aneurisma in abdomine, in quod pugnum immittere potuit, & immisit. Ubi obiter notanda est summa naturæ providentia, quæ arteriæ disruptionem præcavens, ex nimia dilatatione, tunicam illius adeò induraverat, ut ossea appareret, sicut annotavit Fallopius loco citato. Pareus etiam lib. 6. sui operis, cap. 28. similem historiam refert aneurismatis, non quidem in abdomine, sed in thorace reperti: scilicet in arteria venosa, quæ in eam amplitudinem distenta erat, ut manum in pugnum complicatam capere potuerit; tum etiam tunica illius interna ossea evaserat. Et nos etiam similem casum ante duos annos in hac urbe vidimus, nempe aneurisma in pectore, ex arteriæ dilatatione, quæ pueri quindecim annorum pugnum recipere poterat: tunica verò arteriæ cartilagineam crassitiem ac duritiem acquisierat.

Vapores autem tetri, ab hypochondriis elevati ad partes superiores, quamplurima symptomata producant. Ad palatum enim, & linguam transmissi, eas partes exsiccant, & sitim levem inducunt: diaphragma verò & pulmonem obsidentes, difficilem respirationem efficiunt, dum verò ad membranas cerebri feruntur, dolores capitis inducunt, & dum cerebrum ipsum impetunt, aurium tinnitus, oculorum caliginem, vertiginem, metum, mœsticiam, deliria melancholica diversa inferre consueverunt. Quod si vapores illi summam acrimoniam, aut malignitatem induant, epilepsiæ causa efficiuntur: si verò iidem vapores nervos occupent, in iis etiam convulsiones generant: ac sic virtute narcoticâ præditi sint, torporem & paralyin spuriam inferunt, tum etiam comatosos affectus, & apoplexiam, si cerebrum penitus invadant. Si autem vapores illi calidi & sicci fuerint cerebrum exsiccant, & vigilias molestas, aut somnos perturbatos, insomniæque terrifica efficiunt. In primis verò vigilias post mediam noctem plerosque infestare solent. Etiam si enim post cœnam ad mediam noctem, aut paulò ulterius satis benè dormiant; postea tamen evigilant, & alii duabus vel tribus horis vigilant, & iterum manè circa horam tertiam vel quartam dormire incipiunt; alii verò iterum dormire non possunt. Quorum eventuum ratio talis reddenda est, quòd nimirum, dum chylus ad partes secundæ concoctioni destinatas vel inservientes defertur, tum humores vitiosi in membris & vasis latentes agitentur, ex iisque vapores eleventur, qui venas arterias ad caput delati vigilias excitant, & si brevi discutuntur, somnus iterum revertitur, si verò diutius perseverent reliqua noctis pars insomnis transigitur.

De his omnibus symptomatis antea dictum est, & iterum repetendum, omnia in omnibus non reperiri; sed plura, vel pauciora, pro humorum & partium affectarum varietate.

Hoc etiam annotandum est, non esse de essentia melancholiæ hypochondriacæ, ut in hypochondriis tensio, durities, dolor & tumor percipiantur, cum mali fomes plerumque in ramis venæ portæ & arteriis vicinis hæreat, & inde vapores ad cor cerebrum transmittat. Sæpè ta-

men



men tensiones in hepate vel liene reperiuntur, quæ humores in illis partibus hærentes significant. Si verò nullæ adfuerint, signum est humores vitiosos in venis mesenterii, omenti, pancreatis, & ventriculi latitare. Ventriculum autem præcipuè affici demonstrant peculiaria illius symptomata, ut ructus acidi, nidorosi, nausæ, vomitus, aplepiæ, interdum alvi fluxus.

Quod ad prognosin attinet, affectus iste ut plurimum lethalis non est, sed longissimus esse consuevit, & sæpe toto vitæ decursu perseverat, unde vulgò dicitur opprobrium medicorum, ex eo, quòd non satis feliciter curatio succedat: & si tandem post multa remedia ægri convalescere videantur; postea tamen intra paucos menses malum recrudescit, & omnia symptomata redintegrantur. Dicitur etiam flagellum medicorum, quia hujusmodi melancholici nova quotidie postulant remedia, iisque statim satiantur, & assiduis querimoniis Medicos infestant, eosque sæpissimè mutant.

Hæmorrhoidum fluxus, melancholiâ hypochondriacâ laborantibus superveniens, plurimum juvat, modò fuerit moderatus: si enim diutius duret, periculum portendit.

Urina crassior melior est in hoc morbo tenui & aquosâ, quæ crassos humores in corpore retineri arguit. Nigræ quoque urinae sine febre sæpè hunc morbum solvunt.

Alvum in hoc morbo laxam habere, bonum; adstrictam verò habere, malum. Vomitus quoque cum *spica* sæpè utilis; diu verò perseverans, perniciosus.

Vertigo, & diuturnus capitis dolor in melancholia hypochondriaca, in epilepsiam, vel cæcitatem, vel apoplexiam degenerat.

Curatio hujus affectus in tribus potissimum indicationibus versabitur: obstructionum apertione, intemperiei viscerum correctione, & humoris peccantis evacuatione, non omisiss roborantibus, quæ distarum partium vires reficiant & instaurent. In hunc finem sequentia remedia, adhibito sapientis Medici judicio & delectu, usurpari poterunt.

Præmissis clystere sequens potio primùm exhibeatur.

℞. Sennæ mundatæ Unc. ℥. seminis anisi & crem. tart. an. 3. i. fol. borrag. fumar. acetosæ, an. M. ℥. liquirit. 3. iij. Coquantur ad 3. iij. In colatura dissolve rhabar. in aqua buglossi cum spica infusi 3. j. sem. Cathol. dup. 3. iij. syrup. de cichor. compos. 3. j. Fiat potio, cui addere utiliter licet in valde melancholicis confect. alkermes 3. j.

Postridie potionis phlebotomia celebranda ex alterutro brachio, prout hepar, aut lien magis laborare videbuntur; sed præcipuè è sinistro.

Postea sequentium jusculeorum usum æger ægrediatur.

℞. Radic. asparagi, gram. & cichor. an. 3. sem. fol. agrim. ceterach. capil. ven. buglossi & cichor. ana M. ℥. Cremor. tart. Drach. j. Coquantur cum pullo gallinaceo & fiat jusculum per x. aut xij. dies continuandum. Ad magis refrigerandum, & efficacius obstructions aperiendas, utiliter addi possunt spirit. vitrioli gutt. v.

Prædictis etiam simplicibus addi possunt in diuturnis obstructionibus, rad. chinæ, lignum sassafras, santalum album, rad. apii, filicis maris, fol. betonicæ, scabiosæ, semen coriandri præp. passulæ & similia.

Si alvus sit adstricta, aut cacochymia copia, in tertio quoque jusculo sennæ Unc. ℥. cum sem. anisi utiliter infundi poterit.

Vel loco jusculei ad materiam peccantem potentiùs educendam apozema sequens erit convenientissimum.

℞. Rad. buglossi, asparag. cichor. & acetos. ana 3. j. cortic. median. fraxini & tamarisci, ana 3. ℥. fol. agrim. ceterach. capill. vener. cuscute, cichorii, fumarie, lupulor. buglossi. & borrag. ana M. j. Sem. quatuor frig. maj. anisi & foeniculi, ana 3. ij. uvarum corinth. 3. j. sennæ mundat. & polypod. querc. recent. ana 3. ij. epithymi 3. j. agarici recent. trochisc. & rhabar. elect. seorsim infusor. cum cinam. ana Drach. ij. macis & caryophyllor. ana Drach. j. flor. iv. cordial. ana P. j. Coquantur ad ℥. i. ℥. In colatura dissolve syrupi de cichorio compos. cum rheo & rosar. solut. ana Unc. ij. Fiat apozema cla-

rificatum, & aromat. 3. ij. santali citrini, pro iv. dosibus matutinis.

Loco apozematis utiliter subrogari potest decoctum galli veteris, in hunc modum compositum.

℞. Rad. asparagi, brusci, cortic. rad. capparis, & mediani tamarisci. ana Unc. sem. fol. agrimon. ceterach. capil. ven. ana M. j. sem. anisi, citri, & card. bened. ana Drach. j. sennæ mundat. Unc. sem. polypod. querc. & epithymi, ana Drach. iij. cinam. Scrup. i. Crystal. tart. 3. j. Coquantur omnia secundum artem cum media parte galli veteris: fiat jusculum, quod capiat manè per iv. dies.

Post sufficientem purgationem, balneum, a quæ tepidæ convenientissimum est per aliquot dies usurparum, utiliter in eo coquantur herbæ refrigerantes, cum bona quantitate pomorum redolentium. Vel fieri non rarò solet ex hordeo & amygdalis confusis, sacculo inclusis, & in aqua decoctis. Frequenter iterandum est, si tempus anni fuerit opportunum, quando quidem Gal. refert 8. de loc. affect. 6. cap. 6. solis balneis aquarum dulcium se multos melancholicos curasse absque alio medicamento. Si tamen æger ferre frequenter nequeat integrum balneum, semicupium subrogari poterit.

Et ne lotio frequens ventriculo noceat, sub ingressu balnei inungetur ventriculus oleo nucis moschatæ, aut alio simili linimento.

Ab exitu balnei inungatur hepatis regio cerato santalino, vel unguento rosaceo, in oxycrato lotis.

Post ultimum balneum proritentur hæmorrhoides, subditis balanis acrioribus, vel anum confricando foliis ficulneis, aut pannis lineis asperioribus, affixis partibus eminentioribus hirudinibus duabus a it tribus. Extrahantur sanguinis 3. iv. vel vi. Eademque hæmorrhoidum provocatio vere & autumno, imò interdum singulis mensibus iterari debet.

In iis, qui assueti sunt pati fluxum hæmorrhoidum, qui tamen jam diu suppressus sit, & ubi hæmorrhoides non apparent, admotâ ano cucurbitulâ patefunt.

Si postquam hirudines saturatæ ceciderunt, sanguis nimium profluat, ut non rarò contingit, sistetur luto, aut carbonis pulvere, aut araneorum telâ, aut gypsi pulvisculo, aut pulveribus adstringentibus albo ovi & stupis exceptis. At si hæmorrhoides commodè aperiri nequeant, oportunum erit ex venis inferioribus sanguinem detrahere, ut sanguis faculentus per ea loca derivari queat.

Cauticum, tibiæ sinistrae inustum, ab humoribus excrementitiis lienem, aliæque viscera repurgat, ideoque non erit omittendum.

Quia verò hic affectus contumacissimus esse consuevit, & post universales evacuationes novus parvorum succorum cumulus temporis progressu solet succrescere, purgationes periodicæ instituendæ sunt, ut per intervalla ab eorum noxa corpus liberetur. Quod commodissimè fiet syrupo magistrali, in sequentem modum composito.

℞. Succor. recent. expressi. & per residentiam depurat. ex fol. borrag. buglossi. endiviæ, cichor. fumar. & oxalidis ℥. iij. succi pom. redolent. recent. expressi & depurati ℥. ij. polypod. querc. ℥. ℥. sennæ mund. 3. viij. epithymi 3. iij. agar. recent. trochiscati 3. j. zinzib. & caryophyll. ana 3. j. Infundantur & decoquantur, ut artis est, donec colaturæ supersint quartaria quinque. In quibus dissolve expressi onem 3. j. rhab. in prædictis succis cum cinam. seorsim infusi, sacchari albi quartaria quinque. Fiat syrup. perfectè coctus, clarif. & aromatiz. 3. ij. pulv. elect. triasant. qui servetur in vase vitreo, & de eo capiat æger 3. ij. bis aut ter in mense, cum jusculo pulli vel hœduli; fol. endiviæ, acetosæ, borrag. pimpinel. alterato.

Vel loco syrup. pilulæ usurpari poterunt, hyemis præsertim tempore, quales in hepatis obstructione fuerunt propositæ, vel si earum nimia caliditas metuatur, sequentes magis correctæ in eundem usum componi poterunt.

℞. Polypod. querc. Unc. sem. Rad. asari, summit. genistæ, ana Drach. j. passul. corinth. Drach. iij. crystal. tart. Drach. j. ℥. flor. buglossi. & borrag. an. P. sem. Coquantur in aquæ font. q. s. De colat. opt. clarif. cap. ℥. sem. succi pomor. redolent. opt. depurat. Unc. iv. quibus infunde sennæ



# Cap. V. De Melancholia Hypochondriaca. 337

fennæ mundatæ. Unc. j. turbit. & agar. ana Drach. iij. macis, caryophyll. cinam. & epithymi, ana Drach. j. Digerantur per quatrimum in B. M. postea colentur, & exprim. Colat. adde extracti aloës, facti in aqua endiviæ & acetosæ, Unc. j. myrrhæ in vino ad ignem dissolutæ colatæ. 3. ij. salis tart. 5. i. Evaporentur omnia, & inspissentur ad lentum ignem, addendo sub finem, dum ferè evaporata erit materia, specier. diarrhod. abbat. latif. Gal. & trochisc. diallacca, an. 3. 6. Reducantur in massæ pilularis consistentiam, de qua capiat a ger 3. 6. semel in septimana, duabus horis ante pastum.

Pereda, sequenti pulvere multos melancholicos curatos esse testatur, eumque benedictum & divinum appellat.

24. Epithymi 3. 6. lapid. lazuli opt. & agar. recenter trochisc. ana 3. ij. scammon. 3. j. caryophyl. numero xx. Misce fiat pulvis, de quo capiat 3. ij. bis aut ter mense, cum sero lactis, vel aqua borraginis.

Si purgantia medicamenta satis frequenter exhiberi nequeant, aut agri morbi diuturnitate fracti assumere nolint; consultissimum erit, clysteres alternis diebus injicere, ut vapores sursum se effrentes revellant, & humoris peccantis portio educatur. Si enim intestina penitus subierint, à venis mesaraicis majorem illuviei partem exhauriunt. Novimus enim quemdam nobilem virum, affectione hypochondriacâ diu & graviter affectum, qui ex clysteribus frequenter injectis ita levatus fuit, ut omnino curatus videretur: cum multa alia remedia frustra usurpata fuissent.

Dum purgationes periodicæ usurpantur, intermediis temporibus curandum est, ut corpus universum balneis humectetur, aut saltem semicupis, vel fomentis, quibus & humoris peccantis inclementia fratur, ejusdemque reliquæ conteruntur, & corpus humidius, ac fluidius redditur.

Roborantia etiam intermediis temporibus usurpanda sunt, quæ simul obstructionum apertioni inserviant, eaque frequenter componi solent in formam opiata; vel electuarii solidi, in tabellas redacti, in hunc modum.

24. Conservæ rad. buglossi 3. 6. conservæ flor. borrag. viol. ana 3. j. conservæ ros. & cortic. citri conditi, ana 3. 6. myrob. condit. numero j. confect. alkerm. 3. iij. rasuræ eboris, cornu cervi, & lapidis bezoard. an. 3. j. pulver. elect. latif. Gal. & diarrhod. abbatis, ana 3. ij. coralli præpar. & margarit. præp. ana 3. 6. ambre grise. 3. 6. moschi opt. g. v. fol. auri numero iij. Cum syrupo de pomis vel condituræ citri, fiat opiata, de qua capiat magnitudinem castaneæ horis duabus ante pastum, singulis diebus, superbibendo vini albi parum.

Simplicior & gustui gravior opiata fit ex parte una confect. alkerm. & quatuor partibus conservæ flor. borrag. Ad potentiùs obstructiones aperiendas, si calidiora non multum metuantur, addi possunt opiata conservæ flor. tamarisci, rad. enulæ campanæ, fol. absinth. capill. ven. & sales absinth. tamarisci, &c.

Tabellæ in sequentem modum componi poterunt.

24. Pulv. diambre diamoschi dulcis, & latif. Gal. an. 3. j. confect. alkerm. Drach. iij. sacch. aqua borrag. & rosar. soluti Unc. iv. Fiant tabel. deauratæ pond. 3. j. Capiat unam, singulis diebus, horis duabus ante pastum. Vel gustui gravior ita parantur.

24. Confect. alkerm. 3. ij. ambre grise. scrup. j. sacch. aqua borragin. & rosarum dissoluti Unc. iv. Fiant tabellæ.

Ambra grisea sola ad gr. v. vel vj. singulis diebus exhibita, cum vino, aut aquâ rosarum, spiritus & calorem nativum vivificat, & cor maximè exhilarat.

Authores nonnulli lapidis bezoardici usum valdè probant adversus omnes morbos melancholicos, utpote qui vires cordis mirum in modum reficiat, ejusque g. v. vel vj. cum aqua rosar. aut alio liquore exhiberi debent.

Corpore sufficienter expurgato, tempestate idoneâ, nimirum vere aut æstate, serum lactis utiliter exhibitur per 15. aut 20. dies: sic enim viscerum obstructiones aperiuntur, & calida eorum intemperies emendabitur. Extrahetur autem serum lactis per ebullitionem & clarificationem, eique commodè infundentur per noctem epithymi 3. ij. vel 3. 6.

Lazar. Riverii Opera.

Quantitas illius ad robur ventriculi metienda est. Si tamen facillè venas jam aliquatenus apertas pervadere queat, & per alvum & urinas deijci; in maxima quantitate exhibitum, instar aquæ mineralis, ut in calida hepatis intemperie docetur, multum proderit: hac cautione adhibita, ut ventriculus muniatur sacculis, aliisque remediis infra describendis, & vespertinis horis opiata roborans singulis diebus exhibeatur. Loco autem epithymi aliquando permiscetur sero succus cichorii & borraginis, aut alii refrigerantes & appropriati, in hunc modum.

24. Sero lactis caprilli lb. iv. vel v. succi limon. recent. Unc. iv. succi pomor. redol. noviter extracti 3. vj. conservæ rosar. aut viol. aut sacchari albiss. 3. j. cum duobus albumin. ovor. clarificentur. Capiat mane poculata tria, vel quatuor, vel plura, si stomachus ferre soleat.

In corporibus valdè emaciatis, referatis aliquantisper obstructionibus, lactis asinini usus convenire poterit, cum sacch. rosaceo, & si obmurmurantia sint hypochondria, tantillum aromatici rosati, vel diarrhod. abbatis erit utilissimum.

At cæteris remediis præstant aquæ minerales acidulæ & vitriolatæ, quæ viscerum intemperiem corrigendo, obstructiones referant potentissimè. Tales sunt in Occidentia nostra Meynenses, & Vellenses. Illæ magis refrigerant: hæ calidiores quidem, at obstructionibus tollendis, & humori terreno attenuando ac detergendo, multo efficaciores.

De potu aquarum thermalium non levis est inter Authores discrepantia. Nonnulli, ut Sennertus, omnino probant, quod hujusmodi aquæ ob mineralia, à quibus suas vires habent, & primas vias eluant, & vitiosos humores qui in iis hærent, per alvum & urinas educant ventriculum calefaciant, hepar & lienem roborant. Calefactionem autem, & exiccationem ab hujusmodi aquarum externo usu, non autem interno esse metuendam. Alii, ut Claudinus, omnino rejiciunt, propter dictam exsiccandi vim. Alii denique nec omnino rejiciunt, nec omnino admittunt hujusmodi aquarum usum, ut Montanus, qui eas convenire sentit, propter frigiditatem ventriculi, quæ hujus affectus comes est individua, & obstructiones. Ratione autem hepatis calidioris, & fervidi sanguinis, vult muniendum esse hepar & lienem unguento refrigerante Gal. Tum etiam universam lumborum regionem eodem unguento inungendam. Hoc modo ait non nocere aquam, quia magis figitur in ventriculo & locis frigidioribus, alia verò visera solum pertransit, nec in iis moram facit. Nos verò earum aquarum usum convenire posse censemus, si ventriculus frigidior magnam crassæ & viscidæ pituitæ copiam cumulet, & non admodum insignis fuerit hepatis caliditas. Cujus partis noxa majori ex parte declinari poterit, si non solum unguentum prædictum admoveatur, sed etiam juscula refrigerantia post ejectas aquas exhibeantur, & post integrum earum usum balnea refrigerantia & humectantia per aliquot dies usurpentur.

Non parum præstare consueverunt ad obstructiones hypochondriacas aperiendas medicamenta ex chalybe composita, qualia in obstructionibus hepatis & lienis fuerunt proposita, vitando tamen ea, quæ multum calefacere aut exsiccare valent. Imò verò, in corporibus calidioribus conveniet chalybem cum sulphure aut aceto præparatum, conservæ borraginis & cichorii, ad formam opiata permiscere.

In delicatioribus, conveniet syrupus ex chalybe, prædicto loco descriptus, aut spuma, quæ manet in vase vireo post vini pluries chalybeati evaporationem, cum dictis conservis permixta.

At cæteris omnibus remediis palmam præripit sal, seu vitriolum martis, quod obstructiones aperit, viscera corroboret, eorumque calidam intemperiem emendat. Dosis illius est à gr. xij. ad xx. cum liquore idoneo, syrupo, aut conserva. Sed quia sapor illius admodum ingratus est, soleo ego id in pilulas reducere cum mucilagine gummi tragacanthi. Usus illius debet esse diuturnus: & ideo magna illius quantitas habenda est, quæ facillè comparari

V u

non



non potest, modo à Beguino aliisque descripto. Nos facillimam illius compositionem paucis cognitam hîc subnectemus.

℞. Spiritus sulphuris ℥. β. spiritus vini ℥. j. ponantur in sartagine nova, & munda, & affere contegantur: intra quindecim dies fiet per se salina concretio, quæ Soli postmodum exponenda est, ut omninò exsicceetur, movendo interdum cum spatula ferrea. Hyeme poterit exsiccare supra ignem levissimum, aut in hypocausto. Sal probè exsiccatum in phiala vitrea recondatur, benè obturata, nam aëri expositum, facîle humectatur. Pilulæ etiam ex eo compositz cum truciagine tragacanthi duriores fieri debent, addendo pulverem ipsius tragacanthi, ac postmodum in phiala recondi, alioqui humescerent. Per mentem unum vel plures potest continuari hujus remedii usus, non solum innoxie sed semper cum utilitate summa.

Ad obstructions sensim aperiendas, & humorem melancholicum sensim expurgandum ac contemperandum, laudat Fonsæca pilulas sequentes, quas diatartarū appellat.

℞. Sennæ pulverat. & salis tartari, an. ʒ. j. cinam. q. ulver. ʒ. sem. Cum syrupo de limon. fiat massa, cujus capiat pilulas iij. pond. ʒ. sem. per horam ante cœnam, ut bis, aut ter desiciat. Habet enim sal tartari magnam vim domandi humores melancholicos & atros; nam trahit ad se proprietate quâdam acetositates, ut videre est, quando permiscetur aceto, aut spiritui vitrioli, quorum aciditatem tollit. Sciendum autem est, Fonsæcam per salem tartari crystallum intelligere. Attamen non minùs efficaciter senna infundi poterit cum sale tartari, & guttis aliquot spiritus vitrioli in liquore idoneo.

Ad dictas obstructions aperiendas, nonnulli Authores commendant decoctum radicis chinæ ut in obstructione lienis dictum est; quod à prudenti Medico utiliter interdum in usum revocari poterit.

Alii verò laudant succum absinthii concretum in forma pilularum, per se vel cum gummi ammoniaco exhibitum, cui statim oxymel, factum ex decocto rad. asari ac liquirit. superbibatur. Alii verò testantur decocto absinthii, aut vino absinthite per 30. vel 40. dies usurpato melancholiam hypochondriacam fuisse curatam.

Succus buglossi non quidem ad obstructions aperiendas, quemadmodum absinthium, sed ad humorem atrabiliarium contemperandum efficacissimus est. Idèò illius ʒ. ij. cum sacchari ʒ. ij. vel cum vini optimi æquali portione per x. aut xij. dies manè utiliter exhiberi poterunt.

Inter præcipua hujus curationis hoc habendum est, ut alvus semper laxa fervetur. Idèò æger plura medicamenta habere debet familiaria, quibus frequenter utatur ante cibum, modò hoc, modò illud, ne ullum ei veniat in fastidium. In hunc finem usurpari poterunt syrupus magistralis, & pilulæ prædictæ, tum etiam ea, quæ ad alvum adstrictam supra descripta sunt. Quibus addere licet ex Montano, terebinthinam cypriam, quam deglutiendam esse præcipit ad quantitatem avellanæ, tribus horis ante prandium, semel, aut bis, aut ter, singulis septimanis. Nam præterquam quod alvum mollem efficit, ventriculum etiam purgat, obstructions aperit, urinam provocat, calefacit ventriculum, neque propterea hepar lædit; imò & illi mirum in modum confert aperiendo, abstergendo & mundificando.

Pro potu ordinario uti poterit aqua extinctionis auri, vel infusionis tamarisci, agrimon. pimpinellæ, cum vino tenui simplici, vel medicato, tempore vinderiarum cum rad. buglossi & borrag. adjectis floribus anthos in parva quantitate, & santalo albo.

Decoctum radicis cynosbati pro potu ordinario à quibusdam plurimum laudatur; aperit enim & roborat partes omnes naturales.

Decoctum ligni nephritici viscerum obstructions citra ullam manifestam corporis alterationem referat. At frequentius usurpatur aqua ex infusione chalybis parata. Quæ omnes aquæ vel decocta vino commodè misceri possunt.

Dum remedia interna proposita, aut eorum nonnulla usurpantur externa etiam admovenda sunt, nimirum fo-

menta & unguenta hypochondriis, qualia ad obstructions hepatis & lienis descripta sunt, vitando calidiora.

Ventriculo etiam roborantia admovenda sunt, quoniam illa pars in hoc affectu perpetuò laborat. Idèòque fomenta, unguenta, emplastra, & scuta, in affectibus ventriculi proposita, in usum revocari poterunt. Tum etiam interna, quæ hepar minùs calefacere possunt, ac præcipuè pulvis pepticus à passibus sumendus. In paroxysmo, quando vapores ab hypochondriis elevati, cor, cerebrum, aliasque partes afficiunt, & gravia symptomata producant, ut animi defectiones, palpitationes, tremores, convulsiones, dolores capitis, & similia; ea remedia usurpanda sunt, quæ in syncope, & affectu hysterico usurpari solent. Ac inter cætera laudanum prudenter usurpatum, miranda præstat.

## CAPUT VI.

### De Scorbutica Affectione.

**S**corbutus septentrionalibus regionibus familiaris est & non paucis earum plagis endemius. In nostris verò meridionalibus hætenus serè incognitus: ita ut omnes Medicinæ practicæ scriptores, qui medicam artem exercuerunt, nullam illius mentionem faciant, & nos etiam ipsam penitus omittere debere videamur, qui in hujus libri præfatione protestati fuimus, nos morbos tantum lienis ustiores, & qui frequentius in praxi occurrere consueverunt, esse descripturos. Verum usus nos docuit, hanc nostram regionem hoc affectu non omninò carere, qui si omnibus circumstantiis stipatus non sit, quæ ab Authoribus septentrionalibus referuntur, quædam tamen symptomata præ se ferat, ad illius naturam stabiliendam sufficientia. Si quidem prædicti Authores unicum symptoma, scorbutum peculiare, sufficere aiunt, ad morbum istum detegendum. Nos verò sæpè hujusmodi symptomata non pauca in plurimis ægrotantibus animadvertimus. Quia tamen scorbutus hîc regionibus, ut antea dictum, non est familiaris, & non ab illo prorsus immunes esse omnes Medici nostrates existimant; nolimus eum absolute scorbuti nomine donare; sed satius esse duximus, affectionem scorbuticam appellare, quæ scilicet ad scorbuti naturam proximè accedat, verus tamen scorbutus non sit.

Est autem scorbutus nihil aliud, quàm affectio hypochondriaca, peculiarem quemdam malignitatis gradum adeptæ, à qua quidem malignitate nonnulla symptomata oriuntur supra illa, quæ in affectione hypochondriaca solent contingere. Illa verò malignitas fit ex humoris melancholici corruptione, non qualibet, siquidem sæpè corrumpitur ac putrescit humor melancholicus, ex quo alii affectus producuntur, non autem scorbutus, ut febris quartana, & abscessus mesenterii, aliarumque partium; sed peculiari & propriâ, cum tali malignitate analogâ. Hæc autem malignitas innoscit ex contagio, quod in hoc affectu reperitur, siquidem contagiosum esse, ab omnibus Authoribus, qui de eo scripserunt, sancitum est. Quemadmodum autem omnes malignitatis gradus & species, in humoribus latentes, ex quibus varii morbi producuntur, nos latent & humanam cognitionem effugiunt, sic malignitas scorbutica etiam occulta est. Et certè mirum est, quanta morborum varietas emergat ex variis malignitatis gradibus, in humores introductis; ex quibus febres malignæ & pestilentes, variolæ, morbilli, cancer & elephantiasis, lues venerea, alique quamplurimi ac diversissimi affectus oriuntur. Et speciatim elephantiasis ex malignitate quadam peculiari, in humore melancholico residente, ducit originem. Scorbutus etiam ex peculiari malignitate, in eodem humore melancholico latente producitur: cum tamen isti duo morbi toto cœlo differant inter se, & nemo possit varios illos malignitatis gradus explicare.

Magnam scorbuti & melancholiæ hypochondriacæ similitudinem ostendunt symptomata varia, utrique affectui communia. Omnia enim symptomata, superiori capite



capite à nobis enumerata, quæ in melancholia hypochondriaca reperiri docuimus, in scorbuto etiam reperiri solent, ut cruditates ventriculi, dyspepsia, salivationes frequentes, vomitus materiae pituitosæ, acidæ aut nidorosæ, murmura & rugitus hypochondriorum, eructationes, & flatuum per inferiora explosiones, sanguinis vomitiones, & per alvum excretiones, dolores ab iisdem flatibus in ventriculo & hypochondriis excitati, alvus adstricta interdum, & aliàs alvi fluxus, æstus hypochondriorum, urina nunc tenuis, nunc crassa, cordis palpitatio, pulsatio sinistri hypochondrii, sitis, & oris siccitas, difficilis respiratio, dolores capitis, aurium tinnitus, oculorum caliginæ, vertiginæ, metus & mœstitia, & deliria melancholica diversâ, convulsiones, epilepsia, torpores, comatosi affectus, vigiliæ, somni perturbati, & insomnia terrificæ. Quorum omnium symptomatum rationes, superiori capite propositæ, in affectiōe scorbutica, etiam hîc militare poterunt.

Si verò præter symptomata prædicta alia etiam appareant, quæ in melancholiâ hypochondriacâ non reperiuntur, neque ab Authoribus illi tribuuntur, neque ad aliam affectiōem cum hypochondriaca complicatam revocari possunt; magna debet esse scorbuti conjectura. Horum autem symptomatum præcipua in hunc modum se habent, quæ in uno ægrotante omnia non reperiuntur; sed unicum sufficit, ad iudicandum, talem morbum ad scorbuticam affectiōem accedere.

Primum igitur, atque evidentissimum scorbuti signum est, affectio gingivarum, oris, & dentium. In gingivis contingit rubor, pruritus, ac putrefactio, & ex iis plerumque sanguis effunditur, necnon terribilis odor expirat. Quæ affectiōes interdum faucibus & palato communicantur, tum etiam dentibus, qui vacillantes, ac nigredine infecti redduntur.

Secundum, atque evidens scorbuti signum petitur à maculis, crura & tibias invadentibus, quæ in principio rubræ, & in progressu purpureæ, lividæ ac nigrae apparent. Nonnunquam verò in tibiis spatia latiora, imò verò interdum totam partem occupantia, livida, vel cum nigrore aut livore purpurea apparent. Fiunt autem huiusmodi maculae, ex serosa atque ichorosa sanguinis parte ad corpus alendum inutili, quæ idcirco à natura extra venas in cutem protruditur per nausiosin venarum, ut loquitur Hippocr. *lib. de fracturis*. Quod quidem frequentius in tibiis & cruribus contingit: quia natura vitiosos humores ad partes ignobiliores ac remotiores expellere consuevit. Aliquando tamen, ubi major est materiae copia in dorso, brachiis, cervice, ac facie efflorescunt.

Tertium signum est, difficilis respiratio, & pectoris angustia, quæ fit plerumque è crassis vaporibus, ex hypochondriis elevatis, ac diaphragma impetentibus: tum etiam ex tumoribus atque inflammationibus earundem partium, à quibus diaphragma comprimitur: præsertim verò à tumore pancreatis, quod ut plurimum in hoc affectu humore illo crasso ac melancholico impletur: unde ægri nihil de thorace conqueruntur, sed locum affectum, in quo gravitatem sentiunt, & cuius causâ difficile spirant, sub diaphragmate & ventriculi regione ostendunt, ut diligenter annotavit Eugalenus, qui in hoc morbo sese plurimum exercuit, & multas circa illius phænomena, collegit observationes. Huius tamen gravitatis causam, nempe tumorem pancreatis, non annotavit: neque ullus alius eorum, qui de scorbuto scripserunt, illius mentionem facit. Nos tamen cum observavimus in Domino Audeyer, in Senatu Gratianopolitano Præside, quem affectiōe scorbuticâ laborare existimavimus, ut in prolixiori ejus historia videre est, à nobis relata in observationibus nostris, *cent. 3. observat. 85*. Cum autem valde macilentus esset ac strigosus, facile fuit, summos digitos profundius adigendo duritiem ac renitentiam, eamque dolorificam percipere in ea regione, in qua pancreas situm est: & partem contrectando, æger ipse pronuntiabat, difficilem respirationem, ac pectoris angustiam, qua ipse continuo premebatur, inde totam exoriri.

Quartum signum est, lassitudo, spontanea & gravitas

*Lazar. Riverii Opera.*

corporis, præcipue verò in cruribus, quæ fit à serosis ac vitiosis humoribus per venas ad habitum corporis, & musculorum genus delatis.

Quintum signum petitur ex urinis, quæ quidem variæ sunt, ut in melancholia hypochondriaca; sed in hoc differunt, interdum quod claræ & rubræ sint instar lixivii, ab humoribus falsis, magnâ copiâ admixtis. Illa autem rubedo eò intensior est, & ad fuscum declinans, quod major falsæ materiae quantitas permiscetur. Quemadmodum enim lixivium eò majorem rubedinem acquirit, quod plures falsæ & adustæ partes ipsi intunt: sic etiam urinæ, quod plus falsi & adusti humoris iis admiscetur, eò rubicundiorum colorem acquirunt. Interdum verò sunt admodum crassæ, sedimentum rubrum ac crassum instar farinæ laterum habentes. Ac tanta interdum est materiae hujus crassæ & tartareæ copia & acrimonia, ut urinæ ardorem atque stillicidium excitet, præcipue is, quibus suppressio hæmorrhoidum malo originem dedit; tum etiam post subsidentiam urinæ, tertia vel quarta pars matulae, crassâ illa, mucosâ & nigricante materia repleatur quæ incautioribus calculi, aut ulceris vesicæ suspicionem parit.

Sæpe etiam ita variant urinæ sine causa manifesta, ut quæ hodie turbidæ ac crassæ, cras tenues & aqueæ appareant; hodie pallidæ, cras citrinæ, aureæ, vel rubræ.

Sextum signum ex pulsu desumitur; qui nunc debilis est & inæqualis, ac ferè formicans, ut mirum sit, hominem cum tali pulsu vivere posse; nunc magnus & durus, absque inflammatione. In eo etiam hoc notatur, quod imminente animi deliquio, in summis illis angustis, quibus ægri sæpè divexantur, pulsus major ac fortior fit, quàm aliis temporibus. Quod procedit ex contentione cordis, vapores crassos, à quibus tunc temporis maximè affligitur, expellere conantis.

Septimum signum petitur ex doloribus varias corporis partes affligentibus. Adest enim interdum dolor crurum obtusus, aliquando tensivus, plerumque *δυσχρόν* aliàs dolores excitantur in furis, aliàs circa talos, aliàs in plantis pedum; aliàs circa manuum & digitorum extrema: aliàs in genuum, vel coxæ, aliarumque partium articulationibus, cæterisque corporis partibus, prout humores falsi, acres, & serosi ad eas deferuntur; nonnunquam ventris dolor contumax & acerbus ægrotantem exercet, qui colicam biliosam æmuletur; fitque à prædictis humoribus in peritoneum effusis. Isti autem dolores, præsertim quibus brachia, coxas, & tibias occupant, dolores illos æmulantur, qui lue venereâ infectos affligere solent, & Medicis faciliè imponere possunt, in hac potissimum regione in qua scorbutus rarissimus est, lues autem venerea frequentissima. Verum distingui possunt ex eo, quod dolores venerei plerumque internodia occupent, seu medias artuum partes, & si diu perseverent, exostoses in iis partibus generentur; tum etiam alia luis venereæ symptomata adsint, aut aliàs adfuerint, ut gonorrhœa, caries pudendi, humo venereus, & similia; aut impurus concubitus præcessit. Dolores autem scorbutici quascunque partes indifferenter invadunt; alia adsunt scorbuti indicia, aut saltem temperamentum melancholicum admodum prædominatur, & res certò denominari poterit, si æger constanter asseveret, se cum impuris mulieribus rem non habuisse. Quod suspicionem nostram confirmavit in Magistratu Nemausensi qui gravissimis pedum, tibiæ, & crurum doloribus diu affectus fuerat, & ad extremam maciem deductus, ut in marasimum omnino incidisse crederetur, & cum nulla remedia per longum tempus usurpata ipsi profuissent, nos ex temperamento illius valde melancholico, & quibusdam aliis signis, præsertim quod castissimam vitam egisset, & quod à multis annis sanguis illi è gingivis per intervalla fluere consuevisset, scorbuticum affectum esse coniecimus, & antiscorbuticis remediis, per aliquod tempus usurpatis, omnino convaluit.

Interdum etiam in hypochondriis dolores isti resident; interdum verò lumbos afficiunt, ut ægri quasi elumbes reddantur ac vix progredi, & sese loco movere possint.



possint, Unde à nonnullis hic affectus lumbago nominatus est.

Quandoque verò dolores isti nephriticos æmulantur, & cum iis urinæ impensè rubræ, aut etiam acres minguntur, & nisi diligenter considerentur, pro cruentis habentur, & è renibus à calculo læsis provenire creduntur: cum tamen ex materiâ tartareâ & scorbuticâ, à liene vicinifque partibus ad urinæ vias effusâ proveniant.

Nonnullos etiam, atque eos præcipuè, qui ex suppressione hæmorrhoidum hoc malum contraxere, capitis dolor & calor circa vespèram infestant, ex vaporibus ad caput ascendentibus, & postea totâ nocte, calor quidam præter naturam, instar febrilis, in toto corpore sentitur, qui manè per sudores evanescit.

Dolor dentium aliquando frequens, ac præter rationem recurrens, hunc affectum comitatur, qui non eodem loco persistit; sed vagus est, nunc dentem hunc, nunc illum invadens ac relaxans: qui rursus sponte firmanitur, dolore ac tumore discusso.

Latera etiam interdum invadit scorbuticus iste dolor, pleuritidem eimentitus, à qua tamen facillè distinguitur, quòd febris non adsit, aut saltem admodum lenta: respiratio parum læditur, nulla tussis, nulla anacatharsis, neque dolor est continuus; sed per intervalla recurrens.

Articulos etiam invadere dolores istos scorbuticos, antea dictum est. Sed quomodo à vera arthritide distinguantur, explicare oportet. Arthritis enim scorbutica, fixa & permanens non est, atque in uno & eodem loco consistens; sed per varios articulos vagatur, & ab uno in alium atque alium ejusdem vel oppositi lateris transfertur: interdum etiam evanescit, ac subinde revertitur, ut qui jam à dolore prorsus liberatus, & integræ sanitati restitutus videbatur, iterum, & ex improvviso, dolore, cum & sine tumore, corripitur. At vera arthritis locum rarò mutat & ad solutionem usque, partem quam apprehendit obsidere non desinit. Habet etiam hoc peculiare arthritis scorbutica, quòd plerumque cum levi paralyti juncta sit, ob quam membrum affectum movere ægri nequeunt, & illâ cessante, dolor cesset; eoque redeunte, revertatur.

Octavum signum desumitur ex variis motus læsionibus. Interdum enim contingit in hujusmodi ægrotantibus spuria quædam paralytis, cujus exempla quædam in observationibus nostris proposuimus; & à vera paralyti distinguitur, quòd hæc permanens sit, neque ulla habeat intervalla: in illa verò, sæpè accidit, ut qui heri pedem vix loco movere poterat, hodie cruribus insistat, & levi adminiculo nixus ambulet, paulò post verò omni motu iterum privetur. Deinde cum ea conjunguntur sæpè motus tremuli & convulsivi, quod in verâ paralyti non contingit. Fit autem hujusmodi paralytis à materia quadam ichorosa, vel vaporosa ac musculos invadente. Quod si materia illa acrimoniæ particeps fuerit, partes nervosas vellicando, tremores & convulsiones efficit.

Non solum autem in parte aliqua peculiari convulsiones contingunt; sed etiam interdum in toto corpore, epilepsiæ characterem referentes, vaporosâ, aut ferosâ materiâ, acrimoniâ atque malignitate præditâ, ad cerebrum elevatâ, quæ discussa sæpè inducias dat, atque iterum collecta, novas convulsiones inducit.

Contractio membrorum in hoc affectu etiam contingere solet, interdum omnium, ut ægri nullum articulum habeant, quem extendere valeant: aliàs verò unum, aut alterum, & hoc præcipuè in cruribus contingit, tendinibus, ad crus movendum destinatis, duris ac rigidis in poplite evadentibus. Talis autem contractio inde exoritur, quòd tartareus humor, multo fero dilutus, ad nervos & tendines deferatur: parte verò ferosâ & tenuior, succellu temporis discussâ, crassiores exsiccentur & indurentur, unde contractiones nervorum ac tendinum efficiuntur.

Interdum etiam contractio in oesophago contingit, ut ægri cibum cum summa difficultate deglutiant, & in strangulationis metu versentur. Quod fit ex vaporibus stypticis, oesophagum contrahentibus.

Nonum signum desumitur ex alvi fluxu, vel simplici, vel sanguineo. Simplex à vulgari alvi fluxu in eo tantum

distinguitur, quòd excrementa in eo crassiora reddantur & majori parte stercoreosa, ac ciborum assumptorum quantitatem superantia, cum vulgaris alvi fluxus liquidior sit, & ex solis ferè humoribus compositus. At sanguineus alvi fluxus à dysenteria distinguitur, quòd sine ventris dolore ac torminibus efferatur: fitque à sanguine crasso & sæculento, qui per arterias mesaraicas in intestina effunditur. Interdum etiam venæ hæmorrhoidales sanguinem istum sæculentum recipiunt, & per alvi fluxum evacuant. At si diu talis alvi fluxus perseveret, venæ illæ varicosæ evadunt, & dilatatae non solum copiam sanguinis, sed etiam multos alios humores tartareos & mucilaginosos educunt.

Decimum signum est, oris gravis anhelitus, qui omnibus scorbuticis familiaris est, ut testatur Eugalenus: ita ut astantes eum vix ferre possint, & nares avertere cogantur.

Undecimum signum est horror frequens, quem nullus, aut minimus calor sequitur, & eodem die bis, ter, vel etiam pluries invadit.

Duodecimum signum petitur à febribus intermittentibus quæ interdum scorbuticis accidunt, & characteres habent à vulgariis febrium characteribus longè diverfos. Pulsus enim in iis debilis est, tardus, inæqualis, præsertim in declinatione: in vigore enim plerumque magnus & durus esse consuevit. Præterea in principio accessionum tantæ plerumque fiunt membranarum in variis partibus, cruribus præsertim, vellicationes, ut carnes lacerari atque divelli videatur: quibus interdum motus convulsivi junguntur. At licet nonnunquam quotidianæ, tertianæ, aut quartanæ typum servant; sæpè tamen rariores & inordinatos paroxysmos habent, ut semel tantum, aut bis in mense sine certis periodis invadant.

Decimum tertium signum petitur ex tumoribus, qui in variis partibus varii contingunt, nunc duri, nunc molles, & vesicarum speciem referentes, nunc ad erysipelatis naturam accedentes.

Decimum quartum signum est atrophia, quæ tanta interdum in hoc affectu contingit, ut nihil præter ossa & pellem in ægris remaneat, hique sceleton repræsentent, præsertim affectu diu perseverante. Quod fit à vitioso sanguine, & à naturali statu valdè recedente, ita ut partibus alendis assimilari nequeat.

Plura alia scorbuti signa proponuntur ab Eugaleno, Sennerto, aliisque, quorum nonnulla quam plurimis aliis morbis communia sunt, quæ nos suppressenda censuimus, ne confusio quædam in hac diagnosi inducatur. Ac licet, ut ab initio diximus, scorbutus in hac regione familiaris non sit ut in Polonia, aliisque locis septentrionalibus, ita apud nos ferè sit incognitus; si quis tamen, in Medicina facienda, omnia melancholicorum symptomata penitus investiget, quosdam reperiet ad scorbuticam affectionem accedentes, in quibus nonnulla ex superioribus symptomatis scorbutò peculiaribus apparebunt.

Quod ad prognosin spectat morbus iste curatu difficilissimus est, quemadmodum omnes ab humore melancholico oriundi. Sed hic multò magis, in quo humor melancholicus pravam atque malignam qualitatem adeptus est, quæ corporis œconomiam crudeliùs evertit, & maximam remedium partem contemnit.

Periculosus etiam est, quia ægros non rarò in atrophiam aut hydropem deducit, alios morte subitanea, per apoplexiam, syncopen, aliosque acutissimos morbos subripit.

Curantur tamen non rarò, qui pro deploratis habebantur, magis in hoc morbo, quam in aliis quam plurimis. Et nos vidimus nonnullos, in omnimodam atrophiam perductos, ex diuturnis doloribus, aut contumaci alvi fluxu sanguineo quos affectus ex multis circumstantiis scorbuticos censuimus, feliciter convaluisse.

Præterea sæpè deludit pulsus, qui in febrium paroxysmis præcipuè tam frequens, parvus, & inæqualis interdum fit, ut æger intra paucas horas moriturus videatur, qui tamen finito paroxysmo surgit è lecto, & ad consuetam unia revertitur, ut peculiariter annotavimus in studioso

Hollando,



Hollando, ad quem vocati, in vigore paroxysmi eum brevi moriturum existimavimus. Postquam verò eum postridiè benè habentem vidimus, reliquis morbi circumstantiis diligentius examinatis, eum scorbuto laborare comperimus, quem ille ex patria sua, in qua frequentissimus est, ad nos attulerat.

Curatio hujus affectus eadem instituenda est, quæ in hypochondriaca melancholia fuit proposita: quandoquidem, ut ab initio dictum est, ab eodem humore generatur, sed à statu naturali magis recedente. Ideò plerumque potentioribus indigent remediis. Quia tamen hæc est generalis medendi regula, ut omnis curatio à lenioribus incipiatur, ad fortiora postmodum progrediendo, si illa non suffecerint, optimum erit in hoc affectu integram melancholiæ hypochondriacæ curationem instituere, & remedia, proprio capite à nobis descripta, sigillatim usurpare: quandoquidem morbus iste chronicus & contumax, non nisi longo remediorum usu evinci potest. Et si morbum penitus extirpare nequiverint, ad ea tandem veniendum erit, quæ proprietate specificâ illum oppugnare creduntur. Non erit tamen inutile, etiam ab initio nonnulla eorum illis admiscere.

Illa autem remedia specifica, antiscorbutica dicta plurima proponuntur ab authoribus, qui de hoc morbo scripserunt: quorum vis præcipuè dependet à sale quodam volatili, cujus magna copia in iis reperitur, & cujus operâ humorem illum crassum terrestrem, ac tartareum attenuant, fluxiliorem reddunt, ac tandem discutiunt. Imò verò virtutem quandam alexipharmacam habent, contra venenum illud scorbuticum, humori melancholico impressum. Inter illa autem primo loco laudatur cochlearia Batavica, quæ in nostris regionibus non reperitur. Alia verò sunt, nasturtium utrumque (præfertur tamen aquaticum) beccabunga, seu anagallis aquatica raphanus ruscianus, chelidonium minus, absinthium, & fumaria. Quibus etiam adduntur alia quamplurima, sed minoris efficaciam; suntque ea omnia, quæ melancholicum humorem præparare, corrigere, & edomare valent. Unde non sine ratione dictum est à nobis, curationem, adversus melancholiam hypochondriacam institutam, hæc etiam plurimum conferre. Illa autem sunt carduus benedictus, ceterach. & capillares omnes, hyssopus, chamædrys, betonica, agrimonia, borrago, buglossum, radices enulæ campanæ, asari oxylapathi, polypodium quernum, cortices capparum, fraxini, & tamarisci, flores ejusdem tamarisci, sambuci, & epithymum.

In harum autem plantarum delectu hoc perpetuò ob-

servandum, ut illæ, quæ calidiores sunt, minori dosi usurpentur; frigida verò, aut temperata semper admisceantur: idque ut plurimum in majori dosi, præsertim in nostris plagis meridionalibus, in quibus humor melancholicus adustus est, & ad atræ bilis naturam accedit. Ac præter capillares herbas, borraginem, buglossum & agrimonia, supra enumeratas, ubi febris adest, aut calor major metuitur, addi possunt endivia, cichorium, acetosa, succus citri, limonum, aurantiorum, imò & spiritus sulphuris, aut vitrioli; aut etiam serum lactis.

Ex prædictis autem plantis quamplurimæ remediorum formulæ parari possunt, quæ omnes à Sennerto collectæ sunt, ab omnibus Authoribus excerptæ: quas unusquisque pro arbitrio suo imitari poterit. Hoc saltem diligenter annotandum, quod ab omnibus Authoribus proponitur, plantas prædictas efficacius operari, si expressus earum succus usurpetur, vel in conservas redigantur: quia sal illud volatile, in quo tota earum efficacia residet, per decoctionem evanescit: tum si planta exsicceatur, majori parte resolvitur.

Nos verò formulas sequentes feliciter usurpavimus.

℞. Succorum depuratorum nasturtii aquatici & beccabungæ, an. ʒ. j. succi fumarie ʒ. ij. sacchari albi ʒ. iij. fiat potio. Vel

℞. Succi fumarie & nasturtii aquatici, an. ʒ. ij. Misce. Vel

℞. Succorum acetosæ, fumarie & nasturtii aquatici, an. ʒ. ij. Misce.

Succus acetosæ augeri potest, si impensius refrigerare est animus: tum succus limonum, aliique refrigerantes addi possunt.

Major erit remedii efficacia ad dissolvendum tartarum illud tenax & glutinosum, si sal tartari addatur ad ʒ. i. cum spiritu sulphuris aut vitrioli ad ʒ. j. vel ʒ. ʒ. Et quia in usu hujusmodi remediorum purgationes frequenter usurpandæ sunt, optimum erit in prædictis succis sennæ ʒ. j. vel ʒ. ij. per noctem infundere, singulis vel alternis diebus, vel tertio quoque die exhibere.

His verò chalibeata remedia per vices adjungere, operæ pretium est, qualia in melancholiæ hypochondriacæ curatione proposita sunt: tum etiam opiata roborantes & aperientes, aliaque remedia ibidem descripta interferenda, pro prudentis Medici arbitrio.

Ac denique aquæ minerales, acidulæ, & vitriolatæ, convenienter, & debito tempore usurpatæ, ad hujus affectus curationem plurimum conferre poterunt.

## P R A X E O S M E D I C A E LIBER DECIMUS TERTIUS.

### DE AFFECTIBUS MESENTERII PANCREATIS ET OMENTI. P R A E F A T I O.

**I**N explicandis Mesenterii, Pancreatis, & Omenti affectibus, Autores admodum steriles sunt: & major pars illorum penitus eos omiserunt, quod cognitum difficillimi sunt, & majori parte non nisi ex dissectis cadaveribus innotescant; ut ex historiis constat à Schenkio, Sennerto, aliisque collectis. Frequentissimi tamen esse consueverunt. Unde verè Fernellius asserit, sæpè in Mesenterio latere plurimorum morborum causas, ut cholerae melancholicæ, diarrhææ, dysenteriae, cachexiæ, atrophiae, languoris, lentarum, errantiumque febrium, vomitionum, dolorum colicorum, tumorum, & abscessuum. Sylvius verò Mesenterium infinitorum morborum parentem nominavit: ab aliis autem, Medicorum nutricula

vocatur. Idem de pancreate & omento dici potest. Sunt enim partes illæ ignobiliores, & velut corporis sentina, ad quam membra nobiliora excrementa sua deponunt. Licet autem prædictæ partes, quemadmodum & reliquæ totius corporis, omnibus morborum generibus affici valeant, similaribus, organicis, & communibus, variaque inde symptomata emergant: Nos tamen iis tantum inherentes, quæ ad usum praxeos maxime faciunt, univèrsam hunc tractatum quinque comprehendemus capitibus, quorum, Primum crit de obstruptione: Secundum, de inflammatione. Tertium, de abscessu, scirrho, & ulcere Mesenterii. Quartum, de morbis Pancreatis. Quintum, de morbis Omenti.



## CAPUT I.

*De Obstructione Mesenterii.*

**O**bstusiones in mesenterio ab iisdem causis generantur, quæ in hepatis & lienis obstructionibus propositæ sunt; sed frequentius & facilius contingunt propter venarum mesaraicarum angustiam, & præcipue lactearum, quæ chylosam materiam devehunt ad secundæ concoctionis officinas: & cum illa materia chylosa crudiori & crassiori succo sæpè referta sit ut illa liberum com meatum non habens, in illis venulis hæreat, & obstructiones pariat. Venæ etiam mesaraicæ obstruuntur ab humoribus crassis, ab hepate, liene, aliisque partibus transmissis, ibique diutius remorantibus, in qua mora maiorem in dies crassitiem acquirunt, ita ut interdum tumorem scirrhum generent. Humoribus etiam interdum flatus crassi commiscuntur, qui gravissimorum symptomatum causæ esse solent. Ad obstructionem etiam, vel potius angustiam illarum venarum referimus compressionem, quæ fit à glandulis per totam mesenterii substantiam dispersis: illæ enim præter modum incrementum, ut in strumosis dispositionibus contingit, venas mesaraicas comprimunt, & tum chyli, tum sanguinis com meatum impediunt.

Signa obstructionum diagnostica in tres classes dividenda sunt, ut in hepatis obstructionibus factum est, quæ scilicet morbi speciem, vel partem affectam, vel causam eum producentem significant.

Signa morbi speciem indicantia, id est, obstructiones in hypochondriis latitantes, tum etiam earum causas, communia sunt obstructionibus hepatis, lienis, & mesenterii: ideo ex diagnosi obstructionis hepatis repetenda. Quæ verò mesenterium peculiariter affectum significant, sunt tensio & renitentia in medio ventre, & sub ventriculo, ac regione umbilicali gravitatis sensus in eadem regione, & interdum dolor obtusus, nonnunquam etiam acutissimus, quando flatus in iis partibus continentur: dolor etiam aliquando in dorso percipitur, propterea quod mesenterium huic parti alligetur: murmura & rugitus in ventre fiunt, ructus excitantur, vapores in caput attolluntur, unde varia symptomata contingunt: ac denique ea omnia quæ in melancholia hypochondriaca accidere consueverunt, mesenterii obstructiones indicant: quandoquidem illa ab huiusmodi obstructionibus producit ac fovetur.

Quod ad prognosin attinet, affectus ex se periculosus non est, quia pars ignobilis gravia mala ferre potest sine vitæ periculo: deinde remedia generosa ad illius curationem adhiberi possunt, quæ convenienter administrata, exoptatum effectum ut plurimum consequuntur: nisi melancholia hypochondriaca inde exorta fuerit, quæ opprobrium Medicorum vocari consuevit, propter rebellem humoris melancholici naturam. Cum tamen hæc pars sensu exquisito donata non sit, & obstructiones plerumque grave incommodum ægrotantibus non afferant; sæpè negliguntur, & aliorum morborum maximè periculorum causæ esse solent.

Curatio huius affectus eadem instituenda est, quæ in hepatis obstructionibus fuit proposita, eaque inde erit repetenda.

## CAPUT II.

*De inflammatione Mesenterii.*

**C**um Mesenterium, ut antea dictum est, sit velut sentina, ad quam partes nobiles superfluitates suas deponunt, quæ postmodum per vomitum aut secessum à naturâ excluduntur, ut in nonnullis videre liceat, insignem vitiosorum humorum copiam, per intervalla vomitu aut secessu excerni: si vacuationes illæ impediuntur obturatis viis, per quas ferri solebant, vel alia quapiam causâ, humores illi retenti, & diu in parte commorantes, calorem præternaturalem concipiunt, unde putredines,

inflammationes, febres variæ, & abscessus oriuntur. At inflammatio specialiter concitatur, quando sanguis, in venis mesaraicis cumulat, per alicujus rami apertionem in mesenterii substantiam effunditur: cum autem in iis venis propter obstructiones maximè cumuletur, ideo omnes causæ ad inflammationis causas etiam referri poterunt.

Ad hanc etiam inflammationem efficiendam plurimum confert humorum congestorum acrimonia & erosio: lapsus aut percussio regionis hypogastricæ: facultatis hepatis attractricis, concoctricis, aut retentricis debilitas: corporis calefactio nimia, vel refrigerantium usus intempestivus: motus criticus naturæ, in febribus malignis, aut variolis, humores peccantes in hanc sentinam demandantis: diarrhœa, vel dysenteria, intempestivè suppressæ.

Signa inflammationis mesenterii diagnostica sunt febris languida, occulta & lenta, absque siti, gravioribus symptomatibus, anorexia, tensionis & gravitatis sensus subter ventriculum, citra magnam duritiem, & quæ non nisi pressu dignoscitur: citra dolorem etiam, saltem effatu dignum, & quia pars obtuso sensu donata est: egestionis chylosæ, quas plerumque ichor tenuis consequitur, sine ullo doloris sensu, modò seorsim ac sincerus, modò facibus permixtus.

Mitiora sunt omnia symptomata prædicta, si mesenterium solum inflammatione afficiatur: si verò hepar, aut lien, aut intestina simul inflammatione tententur, vehementiora sunt omnia symptomata, ac præterea peculiariora prædictarum partium affectarum signa apparebunt, ex suis capitibus desumenda. Cum enim huius partis inflammationes & abscessus maximè lateant, si solitarii sint, propter obtusum partis sensum, & quia nullam in corpore edit actionem, cujus læsio internosci valeat, sed usum tantum habet, chyli, & sanguinis distributioni inservientem, ideo oblique magis, quam directè & artificiosâ conjecturâ internoscendi sunt: si himirum præsentè febre, aliisque symptomatis, nulla affecti hepatis, lienis, aut intestinorum signa appareant. Speciatim verò intestina simul cum mesenterio inflammari, ostendit febris hemitritæa, quam observavit Spigelius plerumque ab harum partium inflammatione exoriri. A musculorum etiam abdominis inflammatione discernitur hic affectus, quod tumor ac dolor secundum eorum ductum, & figuram, ac positum procedant. Plerumque verò illi musculorum abdominis tumores oblongi sunt, aut per totum ventrem diffusi, & partes externas magis occupantes, ut levi contactu statim percipiantur, & insignem dolorem ac febrem inferre soleant.

Denique distinguendus est hic affectus à diaphragmatis tumoribus, qui paucissimis hætenus Medicis innotuerunt. In illis autem perpetuò insignis est respirandi difficultas hypochondria revulsa, pulsus durus ac parvus, citra omnem tumorum in hypochondriis sensum, aut apparentiam. Tum si tumor fiat à materia calida, febris acuta, dolor intensus, deliria, & convulsiones insequuntur, quæ symptomata in mesenterii inflammationibus solitariis nunquam contingunt.

Quod ad prognosin attinet: periculosissimus est hic affectus, qui plerumque in abscessum degenerat, vel putredo ac corruptio mesenterio inducuntur. Sæpè etiam materia morbifica aliò à natura transmittitur, non tamen planè tollitur, unde malum recrudescit, & sæpè ad multos annos, & per totum vitæ tempus perseverat, nunc febre redeunte, nunc eadem in colicos dolores permutata, ac inflammatione, vel phlogosi saltem redeunte.

Curatio inflammationis mesenterii, ab hepatis & lienis inflammationis curatione absimilis non est, illa ideo è suis capitibus huc erit transferenda.

## CAPUT III.

*De abscessu, ulcere, & scirrho Mesenterii.*

**I**nflammatio mesenterii sæpè in abscessum degenerat. Omnis tamen abscessus mesenterii non fit ab inflammatione; sed plerumque à vitiosis humoribus, in ea parte cumulat ac putrescentibus: ita ut huiusmodi abscessus sensum



senfim producantur sine febre præcedente, aut alio gravi symptomate, quemadmodum videmus in aliis partibus atheromata, fteatomata, & melicerides, & alia abscessuum genera, sine inflammatione præcedente generari. Et dum illi abscessus disrumpuntur, evacuato pure, ulcus remanet, quod difficilem curationem recipit. Si verò illi humores valde pituitosi sint, aut melancholici, & putredini ac corruptioni resistent, concrefcunt non raro & indurantur, atque in scirrhum degenerant: imò verò interdum lapideam duritiem acquirunt, prout multorum observationibus constat, lapides in mesenterio fuisse re-  
pertos.

Diagnosif abscessuum mesenterii interdum facilis est, interdum verò difficillima. Si enim ab inflammatione ejusdem partis fiat, eâ antea præceptâ signis superiori capite propositis, & diutius perseverante, indicium est, inflammationem discuti non potuisse, sed fuisse suppuratam, atque in abscessum conversam. At verò, quando abscessus ab humoribus pravis, in mesenterio diu commorantibus, ac tandem putrescentibus exoritur, difficillima est illius diagnosi, ita ut plurimi Authores, qui talium abscessuum observationes scripserunt, eos non nisi post mortem & dissecta cadavera, innotuisse referant. Licet enim ut plurimum tactu dignosci valeant, aliquando tamen tam altè sepulti sunt, ut neque ipso tactu deprehendi possint, & partis sensus adeò est obtusus, ut nullo dolore sese interdum probat. Quia tamen ista variis modis contingunt, in sequentem modum distinguenda sunt.

Si abscessus mesenterii tumorem habeat conspicuum; ille primum ab inflammatione & scirrho discernendus est. Ab inflammatione distinguitur, si ab ea ortum non duxerit, nulla adest febris, aut certè perexigua, nulla etiam præcessit, neque alia signa, quæ inflammationem indicare potuerint. Si verò inflammationem sequatur, non aliter distingui potest, quàm duratione ac perseverantia: si enim inflammationis signa per 30. aut 40. dies, aut amplius perseveraverint; signum est eam in abscessum abiisse. A scirrho verò distinguitur per duritiem, quæ maxima est in scirrho, in abscessu verò quædam mollities apparet; tum etiam ex doloris carentia omnimoda, cum in abscessu aliquis semper dolor persentiat, saltem ex violenta compressione. Præterea ille tumor ab aliarum partium tumoribus discernendus est per situm, quemadmodum supra de inflammatione mesenterii dictum est.

Si verò abscessus in mesenterio lateat, sine ullo tumore conspicuo, nulla dari potest certa illius tecmasis: artificiosa tamen conjectura ad magnam illius suspicionem pervenire possumus: si nimirum cibi fastidium, nausea, vel vomitus adsit, citra ventriculi vitium manifestum; & magna veluti satietas post assumptum cibum, etiam paucissimum, lassitudines totius corporis ac languores sine causâ manifesta, alvus vel suppressa præter consuetudinem, vel fluidior, ex qua foetidissima excrementa de-  
jiciuntur, & interdum sanguinolenta, citra ullam dysenteriae suspicionem. Quibus addere licet vigilias continuas, & si somnus aliquando irrepperit, eum ægri difficilè ferunt, & animi exsolutionem ad sudores frigidos incur-  
runt. Ac licet interdum nulla febris, nullusque dolor appareat; ut plurimum tamen febris quædam lenta conspicitur, cujus si nulla causâ manifesta appareat, ab hoc malo dependere conjiciendum est, si nonnulla ex signis propositis adjuncta fuerint. Tum etiam, si abdomen violenter comprimatur, dolor aliquis interiùs ab ægrotante percipitur. Verum quidem est, in partibus etiam sanis dolores excitari vehementi compressione, attamen si dolor major in una parte abdominis percipitur, quàm in alia, ita ut cum omnes partes illius & omnia loca sigillatim contrectantur, dum manus contrectans ad certum & peculiarem locum pervenit, in eo perpetuò, & contrectatione iteratâ, major dolor percipitur, magnam facit conjecturam abscessus in eo loco latantis.

Si verò tandem purulenta materia excernatur, tunc abscessus latens fiet manifestus. Ut plurimum autem per alvum pus excernitur, variis conditionibus donatum, pro varia partis affectæ & vicinarum diathesi. Hinc modò pus

sincerum & albicans, magnâ copiâ, nulloque doloris sensu, per vasa mesaraica & in intestina profunditur: modò abscessu ad crassiora postrema intestina vergente, fœcibus alvi permixtum redditur: modo ad renes propellitur, & cum urina excernitur, modò inter peritonæum & abdominis musculos copiosè profusum, vel in cavitatem ventris, rupto peritonæo profluit, vel per abscessum exterioris erumpit: ita ut interdum magna puris copia per umbilicum effundatur, & nonnunquam vermes ex mesenterii corruptelâ geniti pure emittantur. Et quidem per alvum excretum pus (quæ via frequentior est) modò sincerum, ut antea dictum est, modò sanguini, aut saniei permixtum apparet: modò sanguis niger ac foetidus, modò alia materia nigra aut variis coloribus infecta excernitur. Utrùm verò purulenta materia à mesenterio, hepate, aut alia parte procedat: ex propriis cujusque partis affectæ signis innotescet.

Rupto abscessu, & puris affluxu perseverante, ulcus in mesenterio latere certissimum est, quod interdum brevi curatur, interdum diutissimè permanet, & nonnunquam partem universam in putredinem ac sphacelum perducit.

Quod ad prognosin attinet: Abscessus mesenterii periculosissimus est. Si enim in parte diutissimè affervetur, ut sæpè contingit, malignam acquirit putredinem, & vel parti gangrænam inducit, vel ægrum in tabem, aut hydropem præcipitat. Si verò rumpatur, & ulcus citò non curetur, pravamque conditionem acquirat similem habet exitum, gangrænam, atrophiam, aut hydropem inducens. Interdum etiam, rupto abscessu, & pure valde corrupto in abdominis capacitatem effuso, æger subitò perimitur. Scirrhus verò mesenterii minùs periculosus est, & si recens fuerit, curationem admittit. Si verò admodum inveteratus sit, in hydropem ægrotantem perducit.

Curatio horum affectuum juxta eorum diversitatem varianda est. Ac primum abscessus jam genitus, sui apertionem & evacuationem indicat: eaque molienda erit aperientibus & purgantibus medicamentis, qualia in obstructionibus hepatis & lienis proposita sunt, non omittis externis emollientibus & relaxantibus, fomentis, cataplasmatibus, & linimentis, quæ materiam abscessus attenuant & vias relaxant, ut commodiùs evacuatio puris obtineri valeat.

Aperto abscessu, ulcus detergendum & consolidandum est. Cui usu plurimum conferre poterunt remedia in ulceribus ventriculi, hepatis, renum, & uteri proposita: quorum delectum prudens Medicus habere poterit, pro varia corporum & affectuum diathesi.

Scirrhus verò mesenterii iisdem remediis curandus est, quæ pro hepatis & lienis scirrho proposita sunt.

## CAPUT IV.

### De morbis Pancreatis.

**P**ancreatis actionem antiqui Anatomici nullam agnov-  
erunt, sed usum tantum, ut vasa fulciat, ne ruptionis periculo sint exposita, & ut ventriculo sit pulvinaris instar, ne nimium repletus à vertebrarum duritie lædatur. At recentiores Anatomici actionem ipsi, eamque magni momenti tribuerunt; nimirum primam chyli præparationem, illiusque defæcationem; ut magis elaboratus hepatis subministretur. Cujus rei conjecturam manifestam exhibere videntur venæ lacteæ quæ in pancreas omnes deferuntur, ac in illius substantiam variis anfractibus dif-  
feminantur. Præterea in medio pancreatis ductus potens reperitur, qui ad intestina protendit, per quem chyli excrementa repurgari, rationi consentaneum est: Idèò pancreas suos etiam patitur morbos, qui maximam toti corpori noxam inferre possunt; ac præsertim obstructions atque tumores, quemadmodum mesenterium: quando materia chylosa crudior ac crassior, neque satis in ventriculo elaborata, ad ipsum transfertur, ab eoque liberum non habet effluxum.

Scyrrhum pancreatis observavit Riolanus in Augusto Thuano



Thuanus, qui sui temporis historiam Latino idiomate elegantissime scripsit) qui cum per quatuor annos inter alia symptomata gravitatis sensum in regione stomachi continuò perciperet, præcipuè dum flaret, vel ambularet; hypochondria verò nec tumida, nec dura apparent; post obitum tandem pancreas inventum est, hepar magnitudine æquans, totumque scirrhum, multis globulis, specie ovi columbini refertum.

Cum autem pancreas à ventriculo tegatur, tumores illius difficillime tactu deprehendi possunt. Et hæc causa est, cur eorum mentio vulgò à praelicis nulla fiat, & qui eos observarunt, post obitum tantum & dissectis cadaveribus deprehenderint. Non exigua tamen eorum conjectura haberi potest ex iis, quæ in Thuanus Riolanus notavit, si nempe ponderis & gravitatis sensus in regione ventriculi percipiatur, & nullus tumor, nullaque durities in hypochondriis appareant, alia tamen obstructionum latentium indicia adsint; qualia in hepatis, lienis, ac mesenterii obstructionibus proposita sunt. Quibus etiam signis addi possunt dolor, & alia symptomata ventriculi, propter viciniam patientis, respiratio difficilis, ob diaphragmatis compressionem. Quibus signis aliàs coniecimus nos, D. Audoyerum, in Senatu Gratianopolitano Præsidem, scirrhum habere in pancreate, eumque etiamnū tactu deprehendere potuimus, manu ad latera ventriculi versus medium profundius adacta, cum esset valdè macilentus: & duritiè in ea parte animadvertimus, quæ digitis compressa dolorem ipsi non mediocrem inferebat: quæ historia fusè à nobis descripta est observatione 65. centur. 3. Et in Scorbuti diagnosi hoc p. 404. annotavimus (quod à nullo hæctenus eorum, qui de scorbuto scripserunt, est animadvertum) in omnibus propemodum scorbuticis tumores huiusmodi pancreatis generari, cum in iis angustia, oppressio, & gravitas in regione ventriculi percipiatur; & hoc signum veluti pathognomonicum scorbuti, ab Egaleno, Sennerto, aliisque proponatur.

Abscessum etiam in pancreate reperiuntur historiarum nonnullæ apud Authores reperiuntur, qui vivis ægrotantibus detecti non fuerant. Attamen ex symptomatis, quibus affecti fuerant, aliquatenus internosci possunt, quorum nonnulla cum prædictis, scirrhum ejusdem partis indicantibus, communia sunt; iisque addi possunt febris lenta, abscessuum internorum (saltem majori parte) communes individua; vigiliæ juges, ac somni brevissimi, ab iisque labores, liporhymia & sudores frigidi.

Curatio obstructionis, scirrhi, & abscessus pancreatis eadem esse debet cum ea, quæ iisdem morbis, hepar, lienem, & mesenterium affligentibus descripta est, & idè ex illis capitibus erit depromenda.

## CAPUT V.

## De Affectibus Omenti.

Cum Omentum pars mollis sit & adiposa, & recipiendis humoribus, aliunde confluentibus, propter laxitatem maximè idonea, pluribus etiam morbis, non minus ac mesenterium atque pancreas; obnoxium est, qui tamen ab Authoribus non describuntur, quia vix ac ne vix quidem in viventibus discerni queunt, sed ex apertione cadaverum tantum innotescunt, ut ex historiis quibusdam in observationibus propositis, videre est. Sic narrat Vesalius, se in dissecto cadavere omento vidisse, adè tumefactum, ut quinque librarum pondus æquaret, cum naturaliter sese habens vix libræ semis pondus excedat. Rousselus lib. de partu Casarco, refert Lutetia in aperto cadavere insignem abscessum in omentum fuisse repertum. Riolanus in Antropographia, se omentum nobilis adolescentis 19. annos nati vidisse testatur, multis glandulis refertum, quibus insignem humorem illuviem exceperat, mesenterio & pancreate ex abscessu putrefactis, & liene valdè imminuto ac penè consumpto. Nos verò in Canonico Monspelienfi omentum vidimus scirrhum, totam Epigastrii regionem occupans, & quatuor digitorum transversorum crassitudinem æquans: ille autem tumor, lienis colorem referebat, ut verisimile fuerit, humorem melancholicum à liene in eam partem translatum & cumulatum fuisse, cum æger temperamento valde melancholico donatus fuisset, & via patentissima sit per ramos splenicis, à liene ad omentum: per quos etiam ramos in hydropè non rarò, (ut docuit Hippocrates) aqua fertur à liene ad omentum, à quo in capacitatem abdominis sensim exsillat.

Cum autem omenti tumores à mesenterii tumoribus nullà arte distingui valeant: idè certa illorum diagnosi statui non potest. Verum quidem est tumores omenti primo contactu facilius percipi, cum peritonæo immediatè subjectum sit, mesenterium verò profundiorè obtineat situm: sed tumores mesenterii grandiores ad peritonæum ascendunt, imò verò cum eo & muscoli Epigastrii ita interdum uniuntur, ut suppuratione facta per umbilicum aut partes alias externas expurgentur.

Hæc tamen diagnosi difficultati curationis non officit, quandoquidem omnibus tumoribus ejusdem speciei ventris inferioris partes occupantibus, eadem adhibetur medela: quæ tamen in omento infelicius succedit, quandoquidem non habet vias ita idoneas, quemadmodum reliquæ partes, per quas expurgari valeat.

# P R A X E O S M E D I C Æ

## LIBER DECIMUS QUARTUS.

## DE AFFECTIBUS RENUM ET VESICÆ.

## PRÆFATIO.

**R**ENES & vesica varios & omnis generis patiuntur affectus: similes, organicos, & communes, ex quibus varia etiam symptomata, tum in actionibus lesis, tum in viis excretarum, oriuntur. Nos horum affectuum præcipuos novem capitibus complectemur. Quorum primum erit de calculo renum & dolore nephritico. Secundum, de calculo vesicæ. Tertium, de inflammatione renum & vesicæ. Quartum, de mictu sanguinolento. Quintum, de ulcere renum & vesicæ. Sextum, de diabete. Septimum, de urinae incontinentia. Octavum, de ischuria, & stranguria. Nonum, de dysuria, seu ardore urinae.

## CAPUT I.

## De Dolore Nephritico, &amp; calculo Renum.

**D**olor nephriticus ille nominatur, qui renes aut ureteres affigit. Apud vulgus colica nephritica dicitur propter maximam affinitatem, quæ ipsi cum colico dolore intercedit, ita ut sæpè non parùm difficile sit utrumque affectum invicem distinguere, ut diagnosi patebit.

Multi-



Multiplex hujus doloris causa statuitur: frequentissima tamen est calculus, aut pituita crassa, Calculus in rene moram trahens, dolorem, aut nullum, aut obtusum efficit, propterea quod renum substantia obtuso sensu donata sit. Si verò in caput ureteris demittatur, vel illius canalem subeat, eumque distendat, neque ad vesicam propter magnitudinem propelli valeat, tunc dolores atroces movet, & ægotantem mirum in modum excruciat. Pituita verò crassa, ureteribus impacta, eos etiam distendit, & dolorem nephriticum producit.

Minus verò frequentes causæ, sunt grumus sanguinis, ureteribus impactus, vel pus crassius, è renibus, aut aliis partibus superioribus in ureteres deductum. Interdum enim status in ureterum cavitates sese insinuant, & dolores atrocissimos inducunt.

De calculo, doloris nephritici præcipua causa, & magis ordinaria, quamplurimæ apud auctores agitantur controvertiæ, quas accuratè persequi instituti nostri ratio non patitur. Sed ea tantum attingemus, quæ ad illius naturam & causas stabilendas necessaria sunt.

Ac primum dubitatur, sub quo affectuum genere calculus constituendus sit. Galenus inter morbos in numero collocat eorum, qui sunt toto genere præter naturam, quemadmodum & lumbricos. Licet enim propriè morbus in numero respiciat partes viventes, quorum numerus auctus, vel imminutus, morbum istum organicum constituit; ea tamen, quæ præternaturaliter addita sunt numero eorum, ex quibus corpus naturaliter componitur, ad morbos in numero referri debent; ita ut etiam qualitates nudæ interdum ad morbos in numero referantur, quando immediatè actiones lædunt, ut color flavus in oculo icterici, sonitus excedens in aure, & sapor amarus in lingua.

Plerumque tamen calculus inter causas morbificas collocandus est, quatenus obstructionem, vel distensionem parit.

Inter symptomata etiam collocari potest, excreta scilicet & retenta. Si enim in renibus, ureteribus, aut vesica retineatur, cum excerni melius foret; ad præternaturaliter retenta revocandus est: dum verò excernitur, ad excrementum toto genere præter naturam est referendus.

At verò circa calculi causam tum materialem, tum efficientem, major est difficultas. Galenus cum affectis censuit, causam calculi materialem esse materiam pituitosam, crassam, viscidam & lentam, concretioni idoneam, & ut recentiores loquuntur, sæculentam, limosam & tartaream: efficientem verò calorem, materiam illam exsiccantem & indurantem, atque in lapidem tandem convertentem: Quæ doctrina gravissimis impugnatur rationibus.

Primo enim, si ex materia pituitosa, viscida, & crassa calculi generarentur, in cerebro & ventriculo frequenter producerentur, in quibus talis pituita maxime redundat. Neque sufficit dicere, in illis partibus calorem non esse sufficientem ad concretionem efficiendam. Siquidem ex Hippocratis & Galeni doctrina, calor remissus, actione diuturniori sufficit ad concretionem efficiendam. Et hæc ratio petitur, cur senes ad calculorum generationem sint magis dispositi, cum juvenes habeant renes longè calidiores; quia nimirum materia calculi diutius moratur in renibus senum propter imbecillitatem facultatis expultricis; & ita diutius coquitur à calore renum, ab eoque tandem induratur, licet longè remissior sit.

Secundò ex Aristotel. 2. meteor. cap. 4. quæ concrescunt à calore, liquantur ab humido: sic lutum, à calore satis induratum, in humido liquatur. Calculus autem nunquam dissolvitur in aqua. Neque obstat dicere, fortem calorem tantam concretionem efficere, ut in humido solvi nequeat; quemadmodum in lateribus contingit, qui probè cocti in fornace, postmodum in aqua non solvuntur. Nam primum in corpore humano tantus calor non reperitur, deinde laterum concretio, ab aqua non solubilis, minimè dependet à calore intensiori, sed potius à dispositione argillæ, ex qua lateres conficiuntur quæ habent materiam, lapideæ consistentiæ & indissolubili acquirendæ idoneam. Lutum enim ex terra vulgari conflatum, quantumvis coquatur

Lazar. Riverii Opera.

in fornace, nunquam lateritiæ consistentiam acquirit; sed perpetuò in humido liquecet.

Tertiò ex eodem Aristotele loc. citat. calor, concretionem efficiens, debet esse ficcus: hoc enim præstat per exsiccationem, & partium humidarum resolutionem. At perpetua fit humiditatis serosæ effusio in renes, & vesicam. Ergò talis exsiccatio & induratio in iis partibus non potest fieri.

Quartò, in fluviis & fontibus lapides generantur, in quibus nullus est calor, imò verò in cavernis & speluncis frigidioribus nonnullis, aqua stillans condensatur in lapidem: unde pyramides & aliæ figuræ exurgunt: Ergò alia causa efficiens inquirenda est præter calorem, & alia materia, præter humorem viscidum ac glutinosum.

Quintò, Pituita indurata gypseam induit naturam, & semper friabilis est, ut in tophis articularum videre est. At calculi non raro silicei sunt, quam consistentiam ex pituita obtinere non possunt. Neque tantus calor in corpore humano reperitur, qui siliceam illam consistentiam tali materiæ indere possit.

Omnium sæculorum Medicos decepit mucosa illa pituita, quæ in multorum calculosorum urinis reperitur, ipsamque proximam calculi materiam esse putaverunt; in quo tamen longè à veritate aberrarunt. Nam primò, in renum calculo mucosæ illæ urinae ut plurimum non apparent; sed frequentius in calculo vesicæ. Si autem hæc esset calculi materia, in utriusque partis calculo æqualiter apparet. Ergò ex affectu vesicæ proprio & peculiari hæc materia maxime dependet. Est nimirum vesicæ malè affectæ excrementum: hæc autem vesicæ affectus talis est. Docuit autopsia, in eorum cadaveribus, qui ex calculo vesicæ obierant, & humorem illum mucosum diu multumque cum urinis excreverant, vesicæ corpus carnosum evasisse, & digiti, aut pollicis crassitiem adeptum esse, ita ut totam illius cavitatem interdum impleat & ipsum calculum proximè amplectatur, donec tandem urinam supprimens, ægrum miserè jugulet: In iis verò, qui urinam tenuem, claram & aquosam reddiderant, vesicæ substantia membranosa, & in statu naturali constituta apparuit. Quorum eventuum ratio desumitur ex Hipp. Aph. 66. sect. 5: Si in vulneribus prævis & magnis tumor non appareat, ingens malum. Rationem reddit Galenus, quia suspicio oritur, humores qui ob dolorem ad vulnera defluunt, jam ad partes principales transire. Præterea omnibus partibus insitum est, docente eodem Gal. lib. de differ. febr. cap. 11. ut quæcumque robustior est, id quod noxium est, aut superfluum, ad debiliorem transmittat, nec cesset illa transmissio, donec ad imbecillissimam ventum sit. Cum autem pars vulnerata admodum debilis sit, ac proinde ad excipiendos humores maxime disposita: si illi ad eam non deferantur, signum est alias partes admodum esse debiles, quæ talem transmissionem moliri nequeant, aut alias esse vulneratâ debiliores, ad quas humores deferantur. Non solum autem humores vitiosi ad partem vulneratam deferuntur; sed etiam sanguis laudabilis, quem natura majori copiâ ad partem afflictam transmittit, ut illi suppetias ferat quantum potest. Hæc omnia locum habent in vesica à calculo oppressa. Calculus grandior, aut inæqualis, vel aculeis præditus, vesicæ tunicam interiorem vellicat: unde dolor, & imbecillitas parti accedit. Natura verò illi suppetias ferens, solito copiosorem sanguinem ad eam mittit: tum reliquæ partes robustiores, superfluitates suas ad eam deponunt. Hosce humores vesicæ substantia concoquit & assimilat, quantum potest, sicque ex copiosiori sanguine copiosius sumens alimentum accrescit, & crassior atque carnosior evadit. Cum autem totum sanguinem affluentem, multò minus humores vitiosos sibi assimilare nequeat; inde multa exoritur excrementorum illuvies, quæ ex propria partis naturâ, pituitosam illam ac mucilaginosam formam induere consuevit. In iis autem calculosis, qui urinam claram, tenuem, & aquosam reddunt, vel quiescens calculus dolorem non parit, qui talis attractionis causa sit; vel aliæ sunt partes vesicæ debiliores, ad quas reliqua membra sese exonerant.

Quia verò hæc doctrina præconceptam multorum



ſæculorum opinionem diruit, luculento uteri exemplo roboranda eſt. Uteri ſubſtantia, ſicut & veſicæ, membrana eſt: at in prægnantibus tota penè carnea evadit, atque tam craſſa, ut poſtremis menſibus duorum digitorum craſſitiem æquet. Quia natura toto geſtationis tempore multum ſanguinem ad uterum mittit, foetus nutriendi gratiâ, qui cum à foetu totus non abſumatur, portio quædam illius utero apponitur, & inde cum foetu ad partum uſque continuò augetur. Idem in veſica contingit, quamvis præternaturaliter, (cùm in utero naturaliter id fiat) ut quando major ſanguinis quantitas ad eam confluit, portionem illius in propriam ſubſtantiam convertat, & illa inde majorem craſſitiem acquirat. Si verò contingat, extra gravitatem, uterum intemperie aliqua inſigni, aut alio quovis affectu laborantem, debiliorem reddi; tum humores ſuperſui ab aliis partibus ad eum tranſmittuntur, qui cum ſufficienter aſſimilari nequeant, multa inde emergit excrementorum illuvies, quæ per fluorem muliebrem, ſeu menſtrua alba quotidie expurgatur. Et ille fluxus albus mulierum eſt proprium uteri excrementum, quemadmodum mucilaginosa urinae portio eſt excrementum veſicæ. Idem in renibus contingit, quamvis non adeò frequenter, ut quando à calculo, eorum ſubſtantia in paſſo dolor atque imbecillitas iis inducitur, ad eos natura multum ſanguinem multosque humores dimittat, qui cùm parti aſſimilari nequeant, ſaltem majori parte, in excrementum craſſum ac mucilaginofum convertuntur, quod magnâ copiâ cum urinis excernitur, idque adſtantes, ac Medici vulgares purulentam materiam eſſe putant, quæ tamen merè pituitosa eſt, aut ſaltem exiguo puri permixta, quando ſcilicet à calculo per attritionem ulcus in renibus genitum eſt.

Recentiores nonnulli, prædictis rationibus convicti, cauſam materialem calculi ſtatuerunt ſuccum lapideſcentem; efficientem verò ſpiritum quendam lapidificum. Succum lapideſcentem vocant humorem quendam innatâ & peculiari vi præditum, ut in lapidem convertatur. Hunc verò probare contendunt ex generatione lapidum, quæ fit in majori mundo. Siquidem quamplurimis hiſtoriis conſtat, à non paucis Authoribus collectis, aquas quorundam fontium in lapides & ſaxa converti; alias quæcumque injiciuntur, ligna, ſtirpes, animalia intra paucos dies, cruſſâ lapideâ obducere; liquores in quorundam montium cavernis, in ſtrias & columnas converti, ac denique videmus quandam vini portiunculam, lapideam duritiem acquirere, quæ doliorum parietibus adhæreſcit, & tartarum nominatur; tum etiam in iſtis urinis, quæ claræ ac limpidæ redduntur, poſtquam refrigeratæ ſunt, in lapideam quandam ſubſtantiam concreſcere, & matulæ parietibus adhærere. Quamvis autem peculiaris illa materiæ aptitudo, ut in lapidem convertatur, ſatis cognita non ſit, nonnulli tamen eam inveniriſſe putant, dicentes; hoc ex ſalibus provenire, cum terrea quadam portione permixtis. Sales quidem ſoli ſerè concreſcunt; ſed in humido etiam facile ſolvuntur, ac ſi cum materia terreſtri aut lutosa ſibi analoga conjungantur, cauſæ efficientis vi lapideam naturam acquirunt. Sic videmus in vino, ſalem iſtum, cum materiæ ſæculentæ portione mixtum, in lapideam duritiem juxta dolium concreſcere: tartarum enim calcinatum totum ſerè in ſalem abit, quod oſtendit, illud ex ſale poſſimum coagmentari. Sic etiam in urinis, plurimum ſalem in ſe continentibus, præcipue illis, quibus limosa & lutosa materia permixta, tartaream ac lapideam materiam concreſcere videmus, matulæ parietibus adhærentem. Hæc autem ſalina materia, quæ cum urinis permixta, provenit ab eſculentis & potulentis, quæ huiusmodi ſalibus abundat, qui corpore bene ſe habente foras ejiciuntur, neque in renibus retinentur, abſente præfertim cauſa efficiente, quæ ſive potens fuerit in ipſa materia, ſive ex propria renum diatheſi dependeat, calculorum concretionem promovet in renibus & veſica.

Cauſam igitur efficientem calculis vocamus ſpiritum lapidificum. Fernellius verò appellat calculoſam diſpoſitionem quæ renibus inſita eſt, hæreditario jure ut plurimum adepta, cùm iſte affectus inter hæreditarios principem fe-

rè locum obtineat. Nos verò ſatius eſſe ducimus, cauſam iſtam efficientem ſpiritum lapidificum appellare, qui multò latius patet, quàm calculoſa illa Fernellii, arenosaque renum diſpoſitio. Nam primò, in iis qui talem à natura, aut hæreditario jure, renum diſpoſitionem non habent, calculi etiam generabuntur, ſi alimentis continuò, & maximâ copiâ utantur, quæ plurimum ſucci lapideſcentis in ſe contineant, aut aquas bibant, tali ſucco abundantes, quia illis aquis aut cibis non ſolum adest cauſa materialis; ſed etiam ſpiritus lapidificus illius inſitus eſt, qui ſeminis inſtar, lapidis formam inducit: unde non male Hermetici cauſam lapidum efficientem ad propria ſemina referunt, quæ in materia diſpoſita, ſuæ ſpeciei lapidem producant.

Præterea à ſpiritu quodam lapidifico calculos generari, oſtenditur hiſtoriis luculentis, à variis Authoribus relatis hominum, brutorum, aliarumque rerum à ſpiritu quodam è terra expirato, in lapides & ſaxa converſorum. Sic apud Aventinum lib. 7. *Annal. Bavaric.* legere eſt, anno 1343. ex terræ motu plures, quàm quinquaginta ruſticos, item vaccas emulgentes, cum iſtis vasis extinctos diriguſſe, & corpora in ſalinas ac lapideas ſtatuas redacta fuiſſe. Sic narrat Ortelius in *deſcriptione Ruſſiæ*, de pecudum gregibus & armentis illic petrefactis. Sic refert Camerarius de aura meridionali, certis anni temporibus ſtante, in locis montanis Provinciæ Chilenſis in Armenia, cujus afflatu integræ equitum turmae in ſtatuas lapideas ſubitò converſæ ſint, ſteteruntque in via, eo aciei ordine, quo ante metamorphoſin erant diſpoſitæ.

Ille autem ſpiritus lapidificus non ſolum in calculoſorum renibus reſidet, ſed etiam in ſucco lapideſcente, ab eſculentis & potulentis ſeparato: ita ut, dum potentior non eſt, utriusque concurſus neceſſarius ſit: unde multi reperiuntur, qui cibis utentes ad calculi generationem aliquantulum idoneis, calculos producant, concurrente calculoſa renum diſpoſitione, vel ſpiritu lapidifico renibus inſixo. Si verò renes à ſpiritu illo immunes ſint, ex talibus cibis calculi non fiunt, quia vis illorum lapidifica ſatis potens non eſt, ut ſine renum concurſu, materiam illam in lapideam duritiem convertere valeat. Contrà verò, ſi vis lapidifica longè potentior ſit in iis, quæ aſſumuntur, & frequens ſit eorum uſus, calculi producentur, etiam ſi renes tali diſpoſitione, aut ſpiritu lapidifico orbat ſint. Sic videmus in quibuſdam locis, ubi aquæ vel vina ſucco lapideſcente plurimo abundant, maximam incolarum partem calculis laborare, ut de Ciconibus apud Ovidium videre eſt his verſibus:

*Flumen habent Cicones, quod potum ſaxea reddit  
Viſcera, quod totis inducit marmora rebus.*

Et vice verſâ, ſi vis illa lapidifica in renibus calculoſis maximè vigeat, ex quibuslibet alimentis, quanquam laudabilibus, calculos generabit. Sic ante triennium mihi videre contigit virum quendam, qui per tres aut quatuor menſes plus quàm duodecim calculos exiguos ſingulis diebus cum urinis reddebat, cum tamen toto illo tempore ſolis juſculis, aut panatellis lecto affixus, & graviter laborans veſceretur.

Cauſæ calculi antecedentes & procatacticæ, vel ad materiam calculi ſuppeditandam faciunt, vel reſpiciunt conſtitutionem renum, ob quam calculi facilius concreſcunt.

Materiæ calculi generandæ ac cumulandæ plurimum conferunt ventriculus, hepar, lien, & renes. Ventriculus primùm, ſi non bene concoquat, crudus chylus in hepar deducitur, indèque impuri ac terreſtres ſucci cum ſero in renes derivantur. Hepar calidius materiam chyloſam torref, & calculo generando idoneam reddit: tum etiam frigidius ſanguinem crudum producit, huic etiam operi aptiſſimum. Lien debilis vel obſtructus, aut quoquo modo intemperatus, ſæculentam ſanguinis partem ſufficienter non expurgat, ejuſque portionem ad renes amandat, quæ ad calculoſam materiæ elaborationem facilius diſponitur. Ac denique renes, præter cauſam conjunctam, quæ eſt calculoſa diſpoſitio, duplici nomine cauſæ antecedentis rationem habere poſſunt, ſcilicet ratione temperaturæ, vel conformationis. Ratione temperaturæ cali-



calidioris, materiam calculosam attrahunt impensius, eamque magis incrassant: ratione verò conformationis, si venæ emulgentes laxiores sunt, ut materiæ illæ crassæ & tartareæ facilius in renibus recipiantur, ureteres verò angustiores, ut & vasa serosam materiam ad eos transmittentia, ut materiæ illæ crassæ liberum exitum non habeant, sed in renibus retineantur.

Præcipuè verò materiam calculi suppeditant alimenta crassa & viscosa, falsòque excremento referta, ut carnes bubulæ, porcinae, leporinae, anserinae, & quæ fumo aut sale conditæ sunt: pisces saliti duriores, & ostracei, & anguillæ; legumina, caseus, omniaque lacticia, ova indurata, castaneæ, pyra, cydonia, mespila, panis azymus, & oryza, vinum crassum, austrium, & nigrum, vel novum & nondum factum: aquæ lacustres, aut succo lapidescente refertæ.

His addantur alimenta valdè calida, ut piper, zinziber, allia, cepæ, vinum verum & potens, quæ hepar & renes impensè calefaciunt: diuretica nimis fortia, quæ materiam morbificam potenter ad renes deturbant: vestimenta densiora, lecti plumei nimis calefacientes, balnea, venus immoderator, quæ renibus est inimicissima, exercitium vehemens, præsertim à pastu, nimia repletio, aut fames diuturna, ira vehemens, & alia animi pathemata.

Signa calculi diagnostica, seorsim spectata, æquivoca sunt, & aliis morbis communia: si tamen omnia simul & conjunctim considerentur, certam diagnosin efficient.

Primum signum est, dolor fixus & stabilis, circa lumborum regionem, qui ut plurimum gravativus est, quando calculus infixus est parenchymati: illud enim obfusiori sensu donatum, gravantem dolorem percipit. Quoties verò calculus in caput ureteris sese insinuat; tunc dolorem acutum & pungentem excitat, qui dolor nephriticus appellatur, tamdiu perseverans, quamdiu calculus ibi hæret: neque ægrum excruciare desinit, donec calculus aut in vesicæ cavitatem protrusus fuerit, aut in renis cavum remeaverit.

Secundum signum est, urina cruenta, quæ fit ex apertis venulis aut erosis, in renis substantiam dispersis, ab attritione, quæ fit à calculo, ipsius parenchymati in hærente. At si paucissimus sanguis excernatur, colorem sanguinis amittit, cum urina permixtus, & urina lixivium repræsentat. Perpetuum non est istud signum, & ab aliis causis non raro dependet: At quando apparet, unum ex præcipuis est, quod dolorem nephriticum à colico distinguit. Excitari autem solet ab equitatione, ambulatione multa, & alia quavis exercitatione vehementi; quia tunc calculus, si asper & angulosus sit, è sua sede dimotus, tenerrimam renis carnem proscindit ac dilacerat.

Tertium signum est, urina tenuis, aquosa & pauca, circa initium paroxysmi nephritici, quam interdum suppressio integra consequitur, si ambo ureteres fuerint obstructi. At dum solvitur paroxysmus, & calculus ureteri impactus in vesicam demittitur; urina crassæ, turbidæ, & copiosæ excernuntur, arenosum sedimentum habentes.

Quartum signum est, arenularum & lapillorum frequens excretio. De calculis res ipsa loquitur: Si enim æger nonnullos antea excreverit, quantumvis exiguos, quoties doloribus affligitur, à calculo affectum provenire certa conjectura est. At de arenulis non adeò certò pronuntiare licet. Plurimos siquidem videre est, qui totâ vitâ multas arenulas cum urinis profundunt, nunquam tamen calculo laborant. Non rarò enim arenulæ proveniunt ab humorum adustione, quæ in hepate ac venis fit; & ille vitri parietibus adhærent, nec in fundo subsident, ut illæ, quæ è renibus proveniunt. Præterea digitis contritæ dissolvuntur, & salinam substantiam referunt, cum aliæ digitis non cedant, & dissolvi nullo modo valeant. At denique, cum hujusmodi arenulæ salinam habeant substantiam, in calida urina dissolvuntur, neque ullo modo in ea apparent, dum adhuc calida est: postquam verò refrigerit, coalescunt, & matulæ parietibus adhærent, non secus ac crysalli tartari, quæ in aqua calente dissolutæ, dum illa refrigeratur, concrescunt, & vasis parietibus adhærent, ita ut valdè similis sit hujusmodi arenularum & crysalli tartari natura.

Laz. Riverii Opera.

Quintum signum est, & omnium certissimum, calculus excretus. Si enim aliquod signum ex superioribus, quantumvis æquivocum, appareat, & aliàs calculus ab ægro excretus fuerit; calculosum esse affectum, certò pronuntiare possumus.

Sextum signum est, stupor cruris è directo renis laborantis. Calculus enim grandior nervum illum comprimit, qui in musculos lumbares inferitur, renibus substratos & ab Anatomicis *Ææs* nominatos, qui musculi ad coxam deferuntur, motui ejusdem inservientes. Talis stupor percipitur ex sessione supra femur ob compressionem, vel etiam in brachio, ex decubitu supra illud diuturniori.

Septimum signum est, testis retractio, ejus lateris, in quo dolor est. Renes enim & ureteres, doloris acerbitate irritati, sese vehementer contrahunt, simulque vasa spermatica, & partes omnes vicinæ contrahuntur, quæ quidem vasa testiculum sibi annexum sursum retrahunt, ut inguini aliquando infixus videatur. Et ista partium prædictarum retractio usque ad vesicam & intestina extenditur: Siquidem in summa doloris acerbitate, urinæ & alvi excretio supprimitur, ita ut tunc temporis medicamenta purgantia nihil operentur, contractione illa ejus actioni obstitente.

Octavum signum est, nausea & vomitus ob connexionem renum cum ventriculo per membranam à peritonæo mutuatam, & per nervum sextæ conjugationis, cujus duo rami à stomacho in tunicam renum interiorem deferuntur. Ideò cum partes illæ sentientes vellicantur in renibus, ventriculus compatiens ad rei noxiæ exclusionem irritatur, & primum pituitam rejicit, mox bilem flavam, ac postmodum æruginosam, si malum protrahatur: quandoquidem ex diuturnis doloribus & vigiliis sanguis in venis alteratur, & portio illius magis disposita in bilem æruginosam commutatur.

Denique dolor nephriticus cum colico dolore tantam habet similitudinem, ut Galenus ipse in eorum distinctione deceptus fuerit, sicut à nobis relatum est, in colici doloris diagnosi. Ubi etiam signa proposuimus, quibus hi duo affectus à se invicem distingui valeant, ut non opus sit ea hic repetere.

Signa hætenus proposita æquivoca esse diximus, & vix unicum eorum certam diagnosin posse constituere. Alia tamen nonnulla à quibusdam Authoribus proponuntur: quæ adhuc magis sunt æquivoca, & valdè incerta; sed cum aliis juncta diagnosin adjuvant, illa idèò enumerare non erit inutile.

Hipp. Aphor. 34. sect. 7. *Quibus, inquit, bullæ in urina natant, nephritica mala, diuturnamque ægritudinem significant.* Fiunt enim hujusmodi bullæ à crassis humoribus flatu crassiori refertis, qui vel in renibus congeruntur, vel aliunde in eos transferuntur. Materia autem illa calculis gignendis idonea est, & non nisi longissimo tempore edomari potest, unde diuturnam ægritudinem significat. Galenus in *comm. hujus Aphorism.* dicit, ab acrimonia urinarum aperiri ora arteriarum, ad renes appellantium, atque ita prodire spiritum aliquem, qui urinæ permixtus, bullas facit. Attamen verisimile non est, ex arteriis spiritum tam crassum & stabilem emanare posse, ut urina etiam refrigerata per longum tempus permanere valeat, quemadmodum videmus bullas hujusmodi per multas horas urinis innatare. Deinde apertis arteriarum osculis ab urinæ acrimonia, sanguis ab iis etiam efflueret. Imò verò orificia venarum tenuiori tunica constantium, facilius aperirentur, & ita perpetuò urinæ cruentæ cum hujusmodi bullis apparerent.

Idem Hipp. Aph. 76. sect. 4. *Quibuscumque cum urina crassa caruncule parvæ, ac veluti capilli quidam exeunt, iis è renibus excernuntur.* Carunculæ ab ulcere renum exeunt, de quibus infra dicemus. Filamenta verò à Gal. in *comm.* referuntur in crudam lentamque pituitam, calore renum intensiori, in oblongam & teretem figuram conglobatam. Attamen idem Gal. 6. loc. *affect. c. 3.* palam profiteatur, se post anxiam & tædiosam venationem, causam tantæ longitudinis nescire. Avicenna dicit filamenta suam fortiri longitudinem in vasis renum vel aliis; cum enim



per diuretica sanentur, fateanturque ægrotantes, se ex renibus laborare, in renibus formam nancisci credibile est. Actuarius præcisè ad ureteres refert. Quando enim renum sinus pituita abundat, cum urina ad ureteres labitur, & lentore suo insigni uteribus adhærens, tum præ calore crassescens, longam ac teretem effigiem, pilo consimilem, acquirit. Fernelius verò scribit, se animadvertisse, ea filamenta è vasis parastatis derivari, in quibus teretem & pilarem formam sortiuntur, ex feminis materia quæ vi morbi sensim defluens, calore crassescit: apparere autem plurima in iis, qui foedâ, exulceratâque gonorrhœâ non ita pridem affecti fuere, & iis mulieribus, quibus albicantes menses profluunt, aut uterus foedâ colluvie turget, idem & sæpenumerò in urina, quæ prima redditur à concubitu. Alii denique arbitrantur, crassos ejusmodi, & lentos humores, è quibus ista filamenta nascuntur, in venis quidem primicis procreari, sed consistentiam & effigiem pilorum accipere in angustis renum meatibus, per quos veluti per cribri foramina capillaria trajiciuntur, postea verò descendere in ureteres, in quibus adhuc magis exsiccantur, donec à lotionè in vesicam protrudantur, neque ob tenacitatem disrumpuntur.

Quidquid sit: cum ex communiori Authorum sententia constet, hæc filamenta, à pituita crassa in renibus genita, vel ad eos ab aliis partibus transmissa, provenire certum est, eam in calculum coagmentari posse, si causa efficiens, calculis generandis idonea, concurrat, atque adeo ista filamenta signum calculi æquivocum suppeditare.

Quod ad prognosin spectat, calculus renum valdè periculosus est; gravissima enim mala, ut inflammationem, exulcerationem, dolores atroces, vigilias, virium dejectiones, febres, urinæ suppressiones, aliaque symptomata perniciose inferre consuevit.

Si affectus hæreditarius sit, à parentibus contractus, incurabilis est.

Cum vitia renum & vesicæ in senibus difficulter curentur, ex Hipp. *Aph. 6. s. 6.* calculus renum in ea ætate, curatu difficilis, vel potius insanabilis est.

Si dolor nephriticus ad plurimos dies perseveret, neque ullis medicamentis curari valeat, mortis adest periculum, eaque jam in propinquo est cum frigiditas partes extremas, & sudor frigidus faciem occupat. Urinæ, quæ primum tenues, postmodum verò crassæ apparent, & arenæ in fundo resident, morbi solutionem portendunt.

Calculus cum ulcere renum conjunctus, incurabilis est. Illa enim, quæ lapidem frangunt, ulcus valdè exasperant.

Curatio doloris nephritici & calculi; renibus aut ureteribus inhærentis, perficitur viarum dilatatione ac relaxatione, calculorum, aut alterius materiæ, dolorem efficientis, exclusione, causæ antecedentis revulsione ac sublatione, doloris ipsius mitigatione. Quibus indicationibus sequentibus satisfiet remediis.

℞. Rad. althææ, & lilior. ana. ℥. i. fol. malvæ, violar. parietar. branch. ursinæ, an. M. i. semin. lini, & fœnugræci, ana Unc. ℞. ficuum pinguium par. ii. flor. cham. & meliloti, ana P. i. Coquantur ad ℔. i. In colat. dissolve cassiæ, & catholici, ana Drach. vi. ol. lilior. & violar. an. Unc. i. ℞. butyri recentis Unc. ii. Fiat clyster, injiciendus statim.

Rejeto clystere, aperiatur vena Basilica cubiti dextri vel sinistri, & mittantur sanguin. Unc. viii. vel ix. pro viribus aut plenitudine ægrotantis: maximè enim necessaria est phlebotomia ad præcavendam inflammationem, quæ à dolore perseverante excitari potest.

Post venæ sectionem clyster sequens injiciatur.

℞. Flor. chamæm. & melilot. summit. anethi, parietariæ, rutæ, an. M. ℞. Sem. anisi fœniculi, cumini, ana Unc. sem. Fiat decoctio ad ℔. i. In qua dissolve diaphœn. Unc. sem. terebinth. vitello ovi dissolutæ Unc. i. ol. anethini, & scorpionum, ana Unc. ii. Misce, fiat clyster.

Ad magis emolliendum, & dolorem leniendum, ex oleis componi potest in hunc modum, præmisso laxante.

℞. Olei anethini & chamæmel. an. ℔. sem. ol. amygdalar. dulcium ℥. ii. olei rutacei Unc. i. Misce, fiat clyster.

Eodem tempore socus admoveantur parti dolenti, ex

decocto primi clysteris, (additis feminibus anisi & fœniculi) facto in hydrelæo, cum spongiis in eodem expressis.

℞. Ol. scorpionum compositi ℥. ii. butyri recentis, axungia gallinæ, ol. lilior. & amygd. dulcium, an. Unc. i. Fiat linimentum, quod illinatur post solum. Vel tale cataplasma admoveatur.

℞. Fol. malvæ, pariet. an. M. ii. petroselini cum rad. M. i. rad. raphani Unc. ii. Decoquantur ad putrilaginem, & contendantur addendo cepas sub cineribus coctas n. ii. ol. lilior. amygd. amar. & butyri recentis, an. Unc. ii. Fiat cataplasma, quod duobus linteis raris inclusum, ventri applicetur calidè secundum longitudinem ureteris: & quoties refrixerit, recalcet in sartagine.

Applicari etiam solet placenta ex parietaria, vel sola, vel ovis permixta, frixa in sartagine, cum oleo chamæmel. amygdal. amar. scorpionum, linteo raro obvoluta.

Vel fieri potest etiam placenta ex cepis minutim dissectis, in sartagine frixis, cum axungia porci, aut oleis prædictis, additis ovis v. vel vi. calide applicanda.

Quia verò magna crudorum humorum saburra hunc affectum plerumque comitari solet, post aliquot clysteres injectos, (qui subindè repetendi sunt, dolore perseverante) purgans aliquod medicamentum exhibendum est, præcipuè in forma boli, ne tam facilè revomatur, quia hujusmodi ægrotantes plerumque solent esse nauseabundi.

℞. Cassiæ recentè extractæ & ol. amygdal. dulcium Unc. i. diaphœnici ℥. iii. rhabar. pulv. ℥. i. Cum pulvere liquiritiæ, & tragacanth. fiat bolus.

Si æger non possit bolum devorare, dissolvantur purgantia in decocto malvarum.

Diligenter autem animadvertendum est, purgans medicamentum non esse exhibendum priusquam dolor fuerit aliquantulum remissus. Nam dolore valdè urgente, catharticum exhibitum, etiam vehemens, sæpè non purgat, quia tunc temporis omnes partes sese contrahunt, & medicamento non opitulantur.

Attamen eo tempore vomitus poterit convenire, quo etiam saburra humorum educitur, & fit revulsio à parte affecta, & non rarò natura ipsa per se, urgentibus doloribus, hanc molitur evacuationem, eaque absoluta, levamen subsequitur.

Vomitorium blandum ita componi poterit, quod & dolorem demulcebit.

℞. Aquæ tepidæ Unc. iv. ol. crudi Unc. i. syrupi acetosi simplicis Unc. i. ℞. Fiat vomitorium.

Si vehementioribus uti lubeat, ad salem vitrioli, aut mercurium vitæ confugiendum erit, quibus se nephriticos dolores citò fugavisse Angelus Sala gloriatur.

Ante & post purgationem, per os exhibenda sunt, quæ vias laxant, & dolorem leniunt. Cui usui confert syrupus de althæa Fernelii, frequenter exhibitus. Sed quia hic syrupus paratus semper non habetur in officinis, simplicior in hunc modum parari poterit.

℞. Rad. althææ Unc. iii. Coquantur ad ℔. i. In colatura dissolve sacchari ℔. sem. Utatur frequenter.

Julepus sequens ad vias leniendas frequenter exhibendus.

℞. Hordei integri P. i. cicer. rub. P. ℞. Sem. malvæ & althææ, an. ℥. ii. sem. quatuor frig. maj. an. Drach. i. ficuum pinguium paria iv. sebesten paria iii. liquirit. ras. Unc. sem. Coquantur ad ℔. i. sem. In colatura dissolve syrupi capil. ven. Unc. iv. Detur in quatuor doses, bis aut ter in die.

Pro potu decoctum ex rad. alth. Unc. i. sem. hordei P. ii. liquirit. Drach. vi. in aquæ ℔. v. ad ℔. i. consumptionem, erit utilissimum.

Vel fiant juscula ex malva, althæa, & ciceribus rubris, cum multo butyro & modico sale; vel eadem decoquantur in jure pingui.

Vel exhibeantur emulsiones ex quatuor semin. frig. majoribus paratæ.

At præ cæteris remediis vias emollit, & laxat, doloremque lenit ol. amygdal. dulcium, recentè extractum, quod ad ℥. iii. vel. iv. per se, vel cum vino albo, aut decocto malvæ, althææ, liquirit. & cicer. rubrorum exhiberi poterit. Vel fiat potio ex olei amygdal. dulc. & amararum partibus



partibus æqualibus, quia amygdalæ amaræ ad expellendum calculum etiam conferunt.

Postero die, ab hac venæ sectione, vena etiam poplitis, aut malleoli aperienda est, è directo partis affectæ. Sic enim ab ipsa fit derivatio, ex eaque ut plurimum ægotantes levamen maximum solent percipere. Quod præceptum ab Hipp. nobis traditum est 6. epid. part. 1. Aph. 6. & ab Aëtio lib. 11. c. 5.

Imò verò, affectu ulterius procedente, apertio hæmorrhoidum erit utilissima, juxta Aph. Hipp. 11. sect. 6. Melancholicis & nephriticis hæmorrhoides supervenire, bonum.

Nam ex eodem ramo splenico venæ sparguntur ad renes, vesicam, & hæmorrhoides.

Si fomentis, linimentis & cataplasmatibus prædictis dolor non satis leniatur, in femicupium æger demittendus, ex decocto emollientium compositum, addito vino albo; hoc enim mitescet dolor ut plurimum, saltem quamdiu æger in eo residet. Non tamen frequentius ægri demergendi sunt, quandoquidem vires diuturniori balnei usu admodum exsolvuntur.

Ac denique dolore nimium sæviente, ex quo vigilæ diuturnæ, ac virium exolutio sequitur, ad narcotica confugiendum est, & philonii romani 3. ii. clysteri admiscendæ, vel laudani opiat gr. v. aut vi. Vel ejusdem laudani gr. i. ii. iii. aut iv. per os exhibenda. Vel denique fyrupi de papavere alb. 3. i. in julepo convenienti.

Prædictis topicis usurpatis, in dolore diuturniori, non parum proderit emplastrum de meliloto, cum ol. chamæmel. vel anethino malaxatum.

Hicce remediis, aut etiam eorum nonnullis methodicè usurpatis, dolor nephriticus ut plurimum curari consuevit, iterata etiam purgatione, si opus videatur, aut medulla cassiæ frequenter exhibita. At verò si post eorum usum dolor adhuc exacerbetur, certum erit, calculos grandiores renes & ureteres obstruere, qui diureticis remediis calculum frangentibus & expellentibus, deturbandi erunt. Quorum tamen remedium delectus habendus est, ut primò mitiora usurpentur & magis temperata antequam ad aciora veniatur, quæ sanguinem & renes inflammare valent. Ubi etiam corporis habitus ratio incunda est. Nam obesum corpus magis tenuantia; gracile verò, minus perferre potest.

Horum autem remedium, calculos imminuentium, frangentium, vel expellentium materiam, infinita penè reperitur apud Authores. Nos selectiorem tantum hic proponemus.

℞. Rad. apii, petrosel. brusci, gram. & asparagi, ana Unc. i. rad. malvæ & althææ, ana Unc. 3. fol. parietariæ M. ii. sem. anisi, fœniculi, anethi, carvi, dauci, ameos, carthami, rutæ, cumini, & bacc. lauri, ana 3. ii. chamomill. meliloti, anethi, & stœchados, an. P. i. Coquantur in vino albo ad medias. In colat. ℥ i. dissolve butyri recentis 3. iv. mellis rosæ 3. ii. sacchari rubri 3. i. benedictæ laxativæ 3. 6. vitellum ovi numero i. olei nucum, anethi, vel lini Unc. iii. Misce. fiat clyster, qui retineatur duabus horis, si fieri possit.

℞. Aquar. fragariæ, & saxifragæ, an. Unc. ii. vini albi generosi Unc. vi. ol. amygd. dulc. Unc. ii. spirit. vitrioli 3. i. Misce pro tribus dosibus. Prima detur calidè quantum ferre potest. Post horas sex detur secunda pari modo. Si etiam hæc inefficax, (quod rarò contingit) tertia propinetur.

Paratu facilior fit julepus ex aqua saxifragæ, & syrupo violaceo; cum spirit. vitrioli guttis 15. aut 20.

℞. Succ. parietariæ sine igne extract. Unc. iii. succi limonum recentis, & olei amygd. dulcium extracti sine igne, ana Unc. 3. Misce, fiat julep. qui detur tribus aut quatuor vicibus manè, & serò. Vel

Succi limon. & vini albi, ana Unc. ii. sacchari canti Unc. 3. Capiat loco julepi.

De succo limonum hoc notandum est, cautum esse debere illius usum, quia frequentius, aut nimia copiâ exhibitus, aphthas facit in ventriculo unde lienteria succedit. Pilulæ sequentes sunt efficacissimæ.

℞. Salis prunellæ, crysalli tartari, salis baccarum hederæ, & fol. nasturtii, ana partes æquales. Cum syrupo ali-

quo appropriato, vel terebinthina fiat massa pilul. de qua capiat 3. i. singulis diebus manè.

Pulvis sequens à Quercetano valde commendatur in Pharmacopœa.

℞. Tunica interioris ventriculorum gallinæ, & stercoreis albi ejusdem, ana Unc. sem. pulveris pelliculæ interioris, quæ in putaminibus ovorum reperitur. Drach. ii. sem. herniariæ, cinam. ana 3. iv. nucleor. mespil. 3. ii. 6. anisi, fœniculi ana 3. i. Reducantur in pulverem tenuissimum, de quo capiat 3. 6. vel i. cum vino albo.

Cinis corticum ovorum adustorum, à 3. 6. ad 3. i. exhibitus, cum vino albo, potenter expellit calculum in urinæ meatibus hærentem.

Sanguis hirci præparatus, ab omnibus, tum antiquis, tum neotericis commendatur, tanquam remedium excel-lens ad dissolvendum calculum. Dosis illius erit à 3. 6. ad 3. i. Aqua ex sanguine hirci destillata, per vitrea organa, in B. M. miranda præstat. Sed hircus per mensem nutriendus est saxifragâ, pimpinellâ, baccis juniperi, petroselino, aliisque diureticis, sine ullo potu.

Hartmannus urinam hirci, tanquam stupendum remedium, commendat his verbis: *In obstructione renum, à calculo totali, vel etiam, ubi ureteres & vesica à calculis, in eam regionem detrusis, omnino fuerint obstructi, ut ne gutta quidem urinæ prelabi possit. præstantissimum est, si urina hirci, recentissime ex vivente adhuc hirco cum vesica extracta, potanda detur, & omentum cum intestinis, ventri. pubi, & peritonæo fuerit applicatum. Sic enim calculus repente consumitur sine lesione vasorum, & patiens liberabitur.*

Pulvis millepedum ad dissolvendos calculos præstantissimus est, illiusque usus docebitur in calculo vesicæ.

Infusum etiam millepedum, in vino albo paratum, & diu continuatum, ad idem est efficax.

Vinum alkekengi ab Arnaldo Villanovano maximè commendatur, eoque materiam calculosam ita educi refert, ut manu colligi possit. Fitque hoc vinum, contundendo fructus alkekengi cum vino albo, & colaturam exhibendo.

Sequentia verò in communem usum revocari poterunt.

℞. Lapides Judaici, pulv. lithonriptici Justinii, ana 3. i. nucleor. persicorum, gummi tragacanthi, & nucleor. ceraforum, ana 3. 6. Reducantur in pulverem, & cum terebinthina fiat bolus, qui detur in tres doses, manè & serò sumendas.

℞. Raphani acerrimi derafi 3. ii. vini albi 3. iv. Macerentur per aliquot horas deinde fortiter exprimantur. Colaturam capiat æger bis aut ter, horis convenientibus.

Aqua fabinæ ad 3. i. vel 3. ii. sumpta, calculum & arenulas potenter expurgat.

℞. Rad. bifmalvæ in vino albo mundat. 3. vi. rad. bardanæ & graminis, ana 3. iv. rad. asari, petroselini, valerianæ, fœniculi contusarum, ana 3. ii. fol. capill. veneris, saxifragæ, pimpinellæ, virgæ aureæ, betonice, ana M. iv. Sem. basilici, bardanæ, cardui benedicti, sileris montani nucleor. mespil. & persicor. ana 3. i. milii solis 3. i. lapidis lycii Judaici, ana 3. i. 6. terebinthin. 3. iv. sanguin. hirci præparati 3. ii. 6. croci 3. ii. vini albi 3. iv. Contundenda contundantur, & misceantur omnia. Distillantur in B. M. Hujus aquæ capiat æger 3. ii. tribus horis ante cibum, superbibendo vini albi 3. iv.

℞. Cortic. rad. card. asinini 3. i. liquirit. 3. ii. Coquantur ad 3. vi. Colaturam capiat per multos dies. Calculos, & arenulas, renibus inhærentes, mirabiliter expellit.

℞. Ceparum albarum minutim concisarum ℥ iv. sacchari albi ℥ ii. vini albi ℥ i. 6. Distillantur in B. M. ad siccitatem. Dentur, manè, 3. ii. vel tres per multos dies.

Apud practicos commendatur cinis scorpionum, ad 3. i. exhibitus, cum aqua graminis, parietariæ, aut vino albo; cujus tamen usus rarissimus est. At frequentius usurpatur oleum scorpionum Mathioli, cujus 3. i. per os exhibita, cum prædictis liquoribus, calculi excretionem egregiè accelerat.

Chymici suos sales ad calculorum exclusionem maximè prædicant. Inter quos non infimum locum obtinet sal sili-quarum & stipitum fabarum, cujus 3. 6. cum vino albo



egregiè operatur. Idem præstat tartarum vitriolatum, eadem dosi. Ab iisdem etiam laudantur spiritus salis, vitrioli, & mercurius dulcis, cum propriis vehiculis usurpati.

Exteriùs verò calculorum exclusio adjuvari potest, si tota renum & ureterum regio, calentibus manibus, oleo scorpionum inunctis, assidue perfricetur.

Tum cucurbitulæ plures, à rene affecto ad pubem descendendo, secundum longitudinem ureteris, sine scarificatione applicentur.

Illinatur denuò, eadem pars ol. scorpionum Mathioli aut cantharidum subtilissimè pulverat. portiuncula addatur. Vel fiat linimentum ex olei ceræ, de lateribus, & scorpionum partibus æqualibus, maximè penetrans & summae efficaciae; modò renum inflammatio non timeatur.

In usu medicamentorum calculum frangentium & expellentium, observandum est, non semel ea aut bis esse usurpanda; sed pluries, donec viæ obstructæ fuerint reseratae. Dum autem exhibentur, renes & vesica fovendi sunt balneis, fomentis, unctionibus & cataplasmatibus, quò faciliori negotio operentur. Nec non liquores aliqui tenuium partium, quale est vinum album vinosum, propinandi sunt per vices, usurpanda interna emollientia laxantia & vias lenientia, ut viæ magis dilatentur, & aliorum remediorum acrimonia.

Hiscè remediis curatur dolor nephriticus, & calculorum dissolutio atque exclusio promovetur. Quia verò huic affectui dispositi & curati, sæpe solent recidere, ideo illius prophylaxis instituenda est, ut quantum fieri potest recidiva inhibeatur.

Ac primum, si plethora adfuerit, vel calida hepatis & renum intemperies, confert venæ sectio vere & autumno celebrata, præmissio clystere, aut leviori aliquo cathartico. Deinde materia calculo generando idonea evacuanda est antequam ad renes deducatur. Quod fieri poterit vomitu bis aut ter in mense excitato, in iis qui faciliè vomunt.

Vel purgatio instituenda est bolo ex cassia, diaphoenico & rhab. composito, in curatione descripto: aut convenienti alio medicamento, singulis mensibus, aut bimestri, vel trimestri spatio, secundum agri habitum & humorum copiam, idque in ultima lunæ quadrâ commodius fiet.

Vel si cacochymia magis urgeat, apozemate conveniente, vere, autumnove usurpato, expurganda erit. Eo enim non tantum antecedens causa & remota subtrahitur, sed etiam conjunctæ portio quædam; tum obstructions viscerum, quæ hunc affectum frequenter comitari solent, admixtis incidentibus & detergentibus, convenienter dissolvuntur.

Vel apozematis vice decoctum galli veteris usurpari poterit, in hunc modum compositum.

℞. Polypod. querc. sem. carthami, ana ℥. i. β. thymi, & epithymi, ana ꝑ. i. sem. cumini, anisi, anethi, fœniculi, carvi, cardui benedicti, ana ℥. ii. fol. fennæ ℥. i. β. turbith. gummosi ℥. β. cinam. ℥. i. crysalli tartari ℥. ii. Contundantur & misceantur simul, ex qua mixtura venter galli veteris eviscerati impleatur, deinde coquantur, donec galli caro ab ossibus separetur. Colatum jusculum capiat quatuor dosibus matutinis.

Vel usurpari poterit pulvis sequens, à Solenandro commendatus, cujus usu testatur multos à doloribus nephriticis fuisse præservatos, imò verò liberatos; nam dolore præsentem eum exhibet cum successu.

℞. Fol. fennæ Unc. ii. rhab. opt. ℥. β. turbith. ℥. β. hermodactyl. ℥. ii. polypod. ℥. β. cinam. zinzib. milii solis, saxifragæ, sem. genistæ, ana ℥. i. Pulverentur subtilissimè. Dosis autem à ℥. i. ad ℥. i. β. cum vino albo, vel rubello tenui, semel in mense.

Carolus Piso pulveris sequentis singulares effectus prædicat.

℞. Anisi, marathri, carvi, cumini, ana ℥. i. coriandri præparat. ℥. β. liquir. sem. bardanæ: ana ℥. i. sem. Cinam. galangæ, ana ℥. i. Sem. milii solis, genistæ ana ℥. β. pulv. diatrag. frig. ℥. ii. diacrydii ℥. i. fennæ orientalis ad pondus omnium, fiat pulvis. Dosis ℥. i. cum jusculo cicerum rubrorum.

Vel syrupus magistralis in hunc modum componi poterit.

℞. Rad. asparagi, gram. althææ, brusci, & petroselinii, ana ℥. i. fol. betonica, pimpinellæ, saxifragæ, parietariæ, adianthi, polytrichi, ana M. i. Sem. ocymi, petrosel. macedonici, milii solis, genistæ, bardanæ fileris montani, ana ℥. ii. liquiritiæ rasæ, passularum mundatarum & polypod. querc. ana ℥. i. fiat decoctio ad ℥. i. β. In colat. infunde fennæ mundatæ ℥. iv. agarici albi ℥. ii. zinziberis ℥. ii. bulliant parum, & fiat expressio. In qua dissolve sacchari albi ℥. i. Fiat syrupus perfectè coctus, de quo capiat ℥. ii. semel aut bis, in mense, cum decocto hordei, graminis, & cicerum rubrorum.

Vel in magna cacochymia fiant pilulæ ex aloë & agarico, quarum duæ vel tres assumantur alternis diebus, ante prandendum.

Post purgationem quædam diuretica usurpanda sunt, ut materia mucilaginosa, tum etiam arenulæ, circa vias urinarias oberrantes, educantur.

In hunc finem parari possunt decocta ex diureticis in syrupo magistrali descriptis composita, & cum saccharo in julepi vel apozematis formam redacta. Vel etiam cum pullo gallinaceo, vel carne hœdina, aut vervecina, parari possunt juscula in multos dies sumenda, bis in anno post purgationes universales.

Tum post singulas purgationes nonnulla ex sequentibus usurpari poterunt, & semel aut bis in hebdomade continuari.

℞. Caudicum & flor. fabarum ℥. iii. calcitrap. ℥. i. Contundantur, addendo sacchari canti ℥. i. succi limonium ℥. i. succi aurantiorum ℥. β. Decocti malvæ & althææ facta forti expressione ℥. ii. mellis ℥. i. distillantur lento igne, & non permittatur comburi, neque liquores ex toto consumi. Hujus aquæ capiat æger ℥. iv. manè, ut dictum est.

℞. Nucleor. mespil. & pulver. elect. diatrag. frig. ana ℥. i. rad. ononidis sicca. liquir. ras. sem. melonum, & milii solis, ana ℥. ii. sem. saxifragæ, genistæ, raphani, brusci, calcitrap. ana ℥. i. sem. althææ & asparagi, ana ℥. i. sacchari canti ℥. ii. Fiat omnium pulvis, de quo capiat cochlear i. manè, ter singulis mensibus, nempe circa novilunium plenâ lunâ, & mediâ; superbibendo parum vini albi, aut decocti cicerum rubrorum, rad. eringii & glycyrrhizæ, fortiter postea se agitando aut deambulando.

Carolus Piso eximie laudat pulverem sequentem, eumque cum pulvere purgante, supra ex eo descripto, usurpatum plures pyxides fragmentorum lapidum excussisse refert, in quodam Præside Lotharingo.

℞. Sem. althææ & violarum, ana ℥. β. sem. milii solis, & rad. liquir. ana ℥. i. lapidis Judaici & lapid. spongiæ, ana g. vi. pulv. ossis dactylorum, mespilorum, ceraforum ana ℥. ii. Sem. melonum ℥. ii. fiat pulvis, dosi ℥. i. sumenda cum pane azymo, vino albo madefacto, tribus diebus interlunii cujusque, & superbibendo jusculum cicerum rubrorum alteratum rad. althææ, fœniculi, eringii, ononidis, petroselinii, & granis juniperi contusis, addendo vinum album, mel, butyrum, & succum limonium.

Electuariû sequens à Zapata describitur insignis efficaciae.

℞. Sem. hyperici probe exsiccati, & in tenuissimum pulverem redacti ℥. ii. conservæ rosarum, aut violar. ℥. i. Misce, fiat electuarium, de quo capiat æger ℥. β. manè biduum, tribus horis ante pastum, duabus primis septimanis, postea, semel in septimana per 15 dies; ac deinde semel in mense, vel per longiora intervalla, secundum affectus urgentiam.

Conserva rosarum melior, quia corrigit odorem terebinthinæ à semine hyperici impressum: licet conserva violarum renibus magis conveniat.

Tabellarum sequentium usus poterit esse tutissimus & efficacissimus.

℞. Quatuor sem. frig. major. mundat. glycyrrhizæ rasæ, ana ℥. i. sem. pimpinellæ, ocymi, petrosel. macedon. nucis moschatae, ana ℥. β. pulv. aromat. rosar. ℥. ii. sacchari in aqua alkekengi dissoluti Unc. iv. Fiant tabellæ pond. Drach. iii. Capiat unam manè tribus horis ante pastum, superbibendo aquæ ononidis, aut herniariæ ℥. iv. cum vini albi ℥. ii.

Vinum



Vinum alkekengi in curatione descriptum, si per intervalla exhibeatur, omnem materiam calculorum educere aufferit Villanovanus.

In omnium diureticorum usu hoc perpetuò observandum, ea non esse frequenter usurpanda, quia trahunt ad partem affectam: idè semel aut bis in mense, vel aliquando per majora intervalla exhibere sufficiat, corpore tamen prius purgato, ne aliarum partium cacochymia ad renes deducatur.

Attamen terebinthina in usum frequentiore venire poterit. Refert enim Amatus Lusitanus *curatione* 68. *centur.* 2. monachum quendam, cum articulari morbo, simul & nephritico corripì soletet, & nullo remediorum genere, multis frustra tentatis, convalesceret, tandem terebinthina usu intra sex menses liberum à dictis morbis evasisse. Deglutiebat autem singulis diebus terebinthina particulam nucis magnitudine saccharo admixtam. Ratio autem, cur terebinthina frequentius usurpata non noceat, sicut alia diuretica, ea est, meo iudicio, quia urinas amovendo simul alvum laxat, ita ut crassiores humores per alvum deturbentur, qui ab aliis diureticis ad renes deducerentur.

Vulgò autem usurpatur terebinthina per intervalla, quemadmodum alia diuretica, tum sola, tum aliis medicamentis admixta, in hunc modum.

℞. Terebinthinae in aqua saxifragæ, vel parietariæ decies lotæ ʒ. β. Cum saccharo fiat bolus. Vel

℞. Cassiæ recentè extractæ ʒ. vi. terebinthinae ʒ. β. pulv. liquirit. ʒ. ii. Misce, fiat bolus. Vel

℞. Terebinthinae ʒ. β. pulv. lithontriptici ʒ. ii. Misce, fiat bolus. Vel

℞. Terebinthinae ʒ. β. rhab. pulv. ʒ. i. Misce, fiat bolus. Vel

℞. Terebinthinae ʒ. iv. Inuratur in lamina ferrea candente, ut possit in pulverem reduci, cujus dosis erit ad ʒ. ii. cum liquore idoneo.

Zacutus Lusitanus *obser.* 58. *lib.* 2. *Prax. admir.* balsami naturalis vires ad calculos expellendos mirè prædicat, eoque liberatum esse virum sexagenarium, qui per dies octodecim urinae suppressionem à copia calculorum passus fuerat. Is primò guttulas aliquot balsami cum oleo amygdalino, hauriens, dosin utriusque augendo, singulis diebus, ita ut tandem ad balsami ʒ. i. & olei amygd. ʒ. iii. ascenderit, intra decem dies calculos sex excrevit; & ejusdem auxilii beneficio in posterum præservatus est, dimidiam ol. amygdalini unciam, sex balsami guttulis permixtam jejuno stomacho absorbens cujus præsidii ope, sabulosam urinam excernens, in multos annos vitam producit. Si balsamum orientale desit, Peruvianum erit usurpandum. Idem Zacutus in eadem observatione, aquam nicotianæ prædicat his verbis. *Memini me pluries calculos magnos, renum cavo tenaciter impositos, usu stillatiæ aque ex nicotiana viridi extractæ, in potum exhibitæ, per urinam deturbasse. Si ea desit, ejus decocto utere cum utilitate multa.*

Sapientissimus Varandæus, præceptor meus, mirum in modum probat ad prophylaxin hujus affectus, usum aquarum nostrarum Balercucanarum, cujus etiam nos admirandos sæpè vidimus effectus. Hujus autem verba summo iudicio exarata, & ex diuturnâ magni illius viri experientia deprompta, hic subnectimus. *Nullum est, inquit, me quidem iudice, potentiùs præstantiusve remediù, post accuratam corporis purgationem, ad vias istas excrementis suis liberandas & mundificandas, quàm potus aquarum nostrarum Balercucanarum; suo enim calore, ex biuminali vena profectus, fundunt liquantque quoscunque crassiores mucus, & ipsos calculos, si adhuc sint teneriores; nitrosâ autem substantia abradunt quasi & detergunt sordes istarum viarum, & quantitatem mirabili quæ assumuntur, solent impuritates non tantum intestinorum, sed etiam renum & vesicæ quasi torrente quodam abripere. Unde incredibile est dictu, quantam viderimus ex calculosis istis hominibus salutem illarum potui, cum urinis deturbatam. In quibus autem timuimus calefactionem viscerum, præscripsimus tunc temporis vini abstinentioniam, juseula quoque pullo- rum refrigerantibus temperata, julepos temperantes, & similia. Quibus ita consideratis, non veremur etiam piui-*

*tos ac pingues hominès ( dummodò summissis viribus ) in balneum dictarum thermarum precipitare, semel tantum in die circa auroram, munitis prius renibus & hepate, propriis quibusdam inunctionibus, atque etiam duplici linteo involutis: ut deinceps sudoribus concitatis, viisque istis relaxatis, excrementa hujusmodi copiosè vacuentur. Licet etiam postea, dum erunt domi, si ista videatur, commendare quidquid empyreumatis contraxerint, usu balnei domestici ex aqua dulci, & refrigerantibus ac humectantibus parati.*

Conferunt etiam non parum, ad hujus affectus præcautionem, aquæ minerales acidulæ vitriolatæ. Quia non solum materiam mucilaginosam atque tartaream, ex qua coagmentantur calculi, dissolvunt, & arenulas deturbant, sed etiam hepatis & renum calidam intemperiem corrigunt; idèque in calidioribus dictarum partium intemperaturis hujusmodi aquæ erunt convenientissimæ.

Cum autem naturæ calidiores à prædictis remediis diureticis, majori ex parte calidis, aliquantulum lædantur; eorum loco alia magis temperata illis substitui poterunt, quorum præcipua sunt.

Aqua foliorum, & filiquarum fabarum recentium, vel aqua herniariæ.

Aqua limonum destillata etiam commendatur. Limones integri in taleolas dividuntur, & destillantur in B. M. ad magis refrigerandum, cum lacte destillantur utiliter.

Conserva fructus cynorrhodi, quæ diuretica est; attamen refrigerat, & à Cratone in hoc casu laudatur.

Conserva flor. althææ, vel malvæ, quæ leniendo & humectando vias urinarias, arenularum exclusionem adjuvat.

Succus portulacæ inspissatus, & in pilulas redactus ʒ. i. pondere exhibitus, renes potenter detergit.

Flores granatorum exsiccati, & ʒ. i. pondere sumpti calculosam materiam expurgant.

Idem præstat sponsia bedegaris exsiccata, pari pondere cum liquore idoneo propinata.

Butyrum recens cum saccharo canto partibus æqualibus mixtum, quotidie manè sumptum jejuno stomacho, vias urinæ lenit & abstergit, ac calculi generationem impedit.

Idem præstant amygdalæ amaræ, si quotidie x. aut xii. comedantur.

Nec minoris sunt efficaciæ nuces avellanæ ante pastum comestæ quæ à Cratone commendantur, dicente se comperit habere, non paucos, sævis cruciatibus calculi diu affectos, usu avellanarum liberatos. Quod quidem disertè confirmat Amatus Lusitanus *curat.* 73. *cent.* 7. ubi sic loquitur: *Vir, qui nephritum patiebatur, & de renibus non raro lapillos rubentes per virgam mittebat, multum querebatur, lumborum namque & illorum, imò totius ventris dolores & rugitus sæpe sentiebat. Pro quibus abigendis symptomatis, multis est usus remediis, frustra tamen. At cum præter spem, ex cujusdam commendatione, avellanas in victu uteretur, liber & sanus à tantis affectionibus evasit. Confecerat autem illi vir quidam si morbum profligatum vellet, avellanas cum internis suis membranulis comederet initio prandii & cænæ. Caterum ille remediù considerans familiare, non solum initio mensæ eas comedebat, sed medio & fine. Quarum assiduo usu ita valuit, ut nunquam postea morbum persenserit. Addit Amatus Lusitanus in scholio. Non solum vir hic, de quo agimus, per avellanarum esum sanus ex hac mala affectione fuit, sed plures alii. Sunt autem avellanæ hæc vulgares ponticæ nuces dictæ, quas Avic. inter eas medicinas, quæ lapidis renum materiam absumunt, reponit. Sed qua facultate operentur, dubium est. An sorte sua siccitate, & facultate in membranula interiore comperita? Sed non desunt alii, qui hoc operari sua nuclei parte oleosâ contendunt.*

Chynici spiritum salis laudant, illiusque guttas aliquot manè cum jusculo, aut alio liquore exhibent.

Aqua tepida excocta à Zechio commendatur, sex, vel septem unciarum pondere, ante omnem cibum bis, aut saltem semel in die pota. *Nihil enim, inquit, adeò renes ab excrementis vacuos temperatos reddit. Igneus enim eorum calor aquæ tepore tandem exstinguitur, ita ut in posterum calculos procreare non possint.*



Pro potu utatur æger vino tenui & paucifero, cum decocto radicis eringii. Quod quidem decoctum pro potu ordinario à Cratone commendatur: Et nos egregios illius vidimus effectus. Sed eryngium marinum vulgari multo præstantius est.

Nonnulli à calculo præservati sunt usu ad potum ordinarium vini expressi ab uvis acidulis, quæ vulgò apud nostrates *untes* nominantur, ita ut vineam ex illis uvis ad hunc usum de industria condiderint.

Ad prophylaxin etiam hujus affectus non parum conducit, renum intemperiem calidiorem corrigere, cui rei proderunt remedia calida in hepatis intemperie descripta, quæ etiam renum intemperiem emendare valent. Præterquam quòd caliditas immodica renibus non rarò ab hepate communicatur.

Inter cætera verò serum lactis, per mensem integrum, verno tempore usurpatum, præstantissimum est. Tum etiam aquæ minerales, acidulatæ, & vitriolatæ, omnia viscera interna potenter refrigerant.

Inter externa balneum aquæ dulcis tepidæ frequenter usurpatum, & natatio in flumine, æstatis tempore crit convenientissima.

Epithema sequens renibus etiam frequenter admoveri poterit.

℞. Aquarum lactucæ, nymphææ, & rosar. ana ℥. iii. aceti rosacei ℥. ii. Misce, admoveantur valde tepidè, manè & serò.

Convenit etiam sequens linimentum, præcipuè hyemis tempore.

℞. Ol. rosac. nymph. & violar. in aceto & aqua rosac. lotarum, ana ℥. i. mucilag. althææ extractæ in aqua parietariæ ℥. vi. ceræ tantillum, fiat linimentum pro unctione renum, manè & vesperi.

Temperatur & renum caliditas immodica, laminâ plumbeâ perforatâ, & supra regionem renum continuò gestatâ.

Ac denique, quia ventriculi cruditates materiam suppeditant calculis generandis; illius etiam ratio habenda est, & roborandus ventriculus sumptis & admotis, in illius partis imbecillitate descriptis.

## C A P U T II.

### De Calculo Vesicæ.

**Q**Uamvis ordinis ratio postulare videatur, ut omnes renum affectus seriatim persequamur: tamen ordo doctrinæ postulat, ut calculo renum, vesicæ calculum subnectamus; cum eadem utriusque sit natura & conditio, & maxima pars eorum quæ de calculi renum generatione diximus, etiam calculo vesicæ conveniant.

Causæ igitur materiales & efficientes calculi vesicæ eadem omnino sunt, quas ad calculi renum productionem concurrere suprâ retulimus. Hæc tantum in eorum generatione differentia annotanda est, quod pueri magis calculo vesicæ laborent, senes verò calculo renum magis afficiantur. Cujus eventus ratio à Galeno tradita est in 6. *epid. sect. 3.* quia nimirum crassities urinarum, quæ in pueris frequenter ob ingluviem contingit, à calore illorum blando dissolvitur, ac simul diffunditur, nec in renibus moram trahit, adjuvante facultate expultrice renum, quæ fortior est in ea ætate: sed lapsa in vesicam, ibi residet, ac moratur diutius, quia pueri ludicris intenti, & diuturno somno indulgentes, longiora faciunt meiendi intervalla. Adde, quòd urina minus acris vesicæ expultricem non irritat, donec copiâ gravans efficiatur: & sic sæx ista retinetur, neque potest deinde commodè expurgari per exiguum adhuc urinae canaliculum. Præterea vesica ab urinae copiâ valdè distenta, non potest tam exactè sese contrahere, ut tantam urinam evacuet, sed aliqua ejus portio in fundo remaneat, quæ est crassa illa sæx, calculis coagmentandis idonea. Senes contra frequenter emingunt eam materiam, quæ in vesica continetur, ampliorque ductus patet ad ejus expulsionem. In renibus autem crassamentum illud moratur, quia viscidius est, neque potest dissolvi ab effecto calore, aut transcolari ob siccitatem, &

quasi ariditatem, in renibus jam contractam; unde Hipp. in *Concis.* vult lapidem in vesica non generari à decimo quarto ætatis anno usque ad sexagesimum, nisi prius extiterit.

Fernelius novam de calculi vesicæ ortu opinionem proposuit, dicens: omnem calculum, in vesica contentum, rudimentum è renibus traxisse, & in vesica postmodum incrementum sumpsisse. Quando nimirum calculus è renibus excidit per dolorem nephriticum, si grandiusculus sit in vesica subsistit, ibique novæ materiæ appositione sensim accrescit. Afferit etiam, se in contritis vesicæ calculis nucleum quandam in medio reperisse, è renibus exturbatum, diversè à reliquo integumento coloris & substantiæ. Neque unquam se aliquem offendisse, calculum in vesica habentem, qui nephriticis doloribus antea divexatus non fuerit.

Verum hæc sententia à probatis Authoribus non paucis rejicitur, qui sua experimenta prædictis contraria afferunt: quamplurimos nimirum calculos, ex puerorum vesicis extractos, se vidisse afferentes, nucleos habentes, à reliquo integumento, nec colore, nec substantia, ullo modo dissimiles. Et certè vulgaris experientia nobis apertè demonstrat, pueros calculo vesicæ laborantes, nunquam doloribus nephriticis affectos fuisse quod sæpissimè contingeret, si calculorum rudimenta à renibus extruderentur. Verum quidem est, in adultioribus non rarò calculos è renibus deturbatos, in vesica contineri, & per novæ materiæ additionem paulatim crescere. Sed illud semper ita fieri, negandum est, & constanter afferendum, quamplurimos calculos exordium sumere in ipsa vesica.

Diagnosis calculi vesicæ difficillima est, præcipuè in principio, quando calculus exiguus est; gravior enim factus, satis evidentes notas præ se fert. Nos verò eam, quantum artis beneficio præstari potest, elucidabimus.

Primum signum est: Dolor in collo vesicæ qui circa finem mictionis exasperatur, & ad glandis extremum exporrigitur, omnino similis illi, qui in dysuria contingit, & ab ea vix distinguitur in principio, donec illa signa apparere incipiunt.

Secundum signum: Pruritus in pudendo, qui ægros cogit illud sæpe scalpere & contrectare, ac veluti dilcerpere, molestiam illam auferre conantes.

Tertium signum: Pondus in peritonæo & tota penis regione, cum dolore gravante, quod fit à calculo grandiori.

Quartum signum: in calculo grandiori summa mingendi difficultas, cum summo conatu, parturientium more, & urinae stillicidio, guttatim effluentis, cum micturitione frequenti.

Quintum signum: Urinae suppressio inter mingendum, ut in medio cursu subito supprimatur, calculo ad vesicæ orificium cum urina delato, illudque obturante.

Sextum signum: Faciliior exitus urinae, resupinato corpore, quia calculus in ea positura à canali vesicæ longius recedit. Tum quando urina inter mingendum supprimitur si corpus resupinetur & concutitur, liber fit urinae exitus calculo ad vesicæ fundum translato.

Septimum signum: Frequens virgæ erectio, quæ tum à retentione urinae procedit, tum à phlogosi vesicæ quæ calculi attritione inducitur.

Octavum signum: Tenesmus ac frequens desidendi cupiditas, quæ mingendi cupiditatem sequitur, propter consensum sphincteris ani & vesicæ. Uno enim irritato, alter etiam irritatur, quia ramos recipiunt ab eodem nervo.

Nonum signum est, quod ægri quiescere non possint, & in uno loco manere; sed valde inquieti sint, crebrò moveantur, & crura alternatim exagitent: & si major sit calculus, vix recti stare possint, equitare, vel ambulare per salebrosa loca, quia tunc temporis cervix vesicæ à lapide connoto valde contunditur.

Decimum signum est, quod ægri à nullo remedio levantur, sed ut plurimum pejor habeant. Quia medicamenta, quæcumque urinae vias pervadunt, vel novam materiam ad vesicam deducendo, malum augent, vel pituitam abstergunt, quæ lapidi circumducta, eum mitiorem reddit, & contris denudatus acrius mordet tunicam vesicæ interiorem.



Undecimum signum ex eo depromitur, quod cum æger doloribus nephriticis obnoxius sit, & in fine paroxysmorum calculos excernere soleat, quos eorum dolorum causas fuisse certum est, si aliquando post dolores illos calculum nullum excreverit, ut antea solebat; signum est, eum calculum, qui dolorem efficiebat, in vesicam fuisse detrusum, in eaque retentum; ubi sensim excrementum sumit, & prædicta symptomata sensim inducit. Ideo si quis à dolore nephritico liberatus, nullum calculum excreverit, & post aliquod tempus urinæ difficultate urgeri incipiat, maxima est retenti calculi conjectura.

Duodecimum signum desumitur per Hippocr. *Aphor. 79. sect. 4. Quibus in urinis arenosa subsident, his vesica calculo laborat.* Qui Aphorismus multorum ingenia torfit. Galenus in illius commentario dicit, eum manifestè mancum esse, quod Hippocrates dimidiam illius partem omiserit: sive enim in renibus, sive in vesica calculi generentur, arenosa cum urinis simul egrediuntur. Et ipse Hippocrates huic contradicit Aphorismo lib. de internis affectionibus, ubi veteres Medicos reprehendit, putantes arenam esse signum calculi in vesicâ. Cardanus in comment. ejusdem Aphorismi testatur, se ab annis triginta arenulas primò rubras, postmodum verò albas, quotidie & copiosè excrevisse, sine ulla calculi renum aut vesicæ suspitione. Afferit etiam, vix è decem unum reperiri, qui arenas cum lotio non excernant; raros tamen esse, qui renum calculo laborent, ac rariores multo qui vesicæ. Referunt etiam, Hispanos magna ex parte arenas cum urinis excernere, qui tamen parùm lithiasi obnoxii sunt.

Nos superiori capite arenas diffinximus, quæ calculum significare possunt, ab iis, quæ nullo modo inducant. Sed diximus, esse signum valdè æquivocum. Fit enim plerumque, ut robore facultatis expultricis arenulæ illæ penitus excludantur, nec ullo modo retineantur in renibus & vesica. Et quamvis hujusmodi arenulæ certius indicarent; nunquam tamen soli vesicæ tribui possent. Atque adeò Aphorismus, ut verba illius sonant, semper falsitatis convincitur.

De hujus Aphorismi interpretatione lis maxima orta est inter Beverovicium & Salmasium (viros doctissimos, & in Authorum sententiis obscurioribus, aut mutilatis, restituendis peritissimos) quæ integra utrinque peperit volumina. Nostrium non est, neque instituti nostri ratio patitur, in iis diutius immorari: hoc unice statuentes, pro omnium criticarum dissensionum resolutione, Authorum sententias, quæ prima fronte veritati & quotidianæ experientiæ contrariæ videntur, ad eum perpetuò sensum esse retrahendas, qui veritati magis conformis & consentaneus est, etiam si termini sententiarum eum sensum pati non possint, qui in tali casu censendi sunt supposititii, & ab aliis (fortè imperitis) adjecti: aut forte illas sententias integras esse ab aliis insertas, ut sæpè Galenus dicit de quibusdam Hippocratis sententiis, quas ab aliis adjectas pronuntiat, utpote Hippocratis majestatem præ se minimè ferentes. At verò Beverovicii interpretatio, circa arenosam subsidentiam, ad mentem Hippocratis non videtur instituta, neque magni usus in actu practico. Primò non videtur menti Hippocratis respondere, qui in præcedentibus Aphorismis signa desumit ex urinæ contentis: quod suum propositum sequens, sumit etiam signum ex arenulis in urina subsidentibus, quas dicit calculum vesicæ significare. At Beverovicium, sensum illum invertens, dicit: Hippocratem esse intelligendum de arenulis, quæ per urinas antea excerni solebant, si subsistant in vesica, id est, retineantur, & non ampliùs excernantur, signum est illas arenulas retentas calculum in vesica coagmentare. Hæc interpretatio, ut dictum est, menti Hippocratis non respondet; deinde nihil confert ad usum praxeos. Illi enim, qui arenulas cum urinis emingere solent, quædam habent intervalla, in quibus tamen non fit calculus in vesica. Neque magnam habet vim, quod Beverovicium notat, in aliis Aphorismis Hippocratem, ubi ponit signa ex urinæ contentis desumenda, non uti verbo subsidentia, sed potius excretionis. V. g. Qui

Laz. Riverii Opera.

pus aut sanguinem mingant. Quibus cum urina crassa sursuosa exeunt, &c. At hîc utitur nomine subsidentia, ut aliud quippiam significare videatur.

Verùm nos ad usum artis omnia revocantes, dicimus Hippocratem in hoc Aphorismo non potuisse uti nomine quodam, excretionem tantum significante, quia distinguere debebat illas arenulas, quæ calculum significant, ab illis, quæ nullo modo eum indicare possunt; illæ autem arenulæ (ut cap. superiori diximus) subsident in fundo matulæ; aliæ verò minimè, sed tantum matulæ parietibus adherent; & ideò rectè Hippocrates, ut illas arenulas ab his distinguat, dicit. Quibus sabulosa subsident, quia aliæ arenulæ, quæ non subsident, non sunt calculi indicia.

Quandoquidem igitur hîc Aphorismus ad veritatem, & usum artis revocandus est, quantum fieri potest, existimamus interpretationem à Joanne Zechio (in artis operibus exercitatissimo) propositam reliquis omnibus esse anteponendam; cujus beneficio signum pathognomonicum stabilitur calculi vesicæ, & magnus Aphorismi usus elicitur in Medicina faciendâ, cum secundum omnes alias interpretationes inutilis reddatur. Atque ut debitus honor Zechio reddatur apud eos, qui ejus operibus carent; operæ pretium duximus, ipsa illius verba transcribere, quæ habentur in libro consultationum medicarum, consultatione 58. Hippocrates, inquit, *Aphor. 79. sect. 4. à nullo, neque ab ipso Galeno hæcenus, ut decet explicatus, hanc protulit sententiam. Quibus in urina sabulosa subsident, his vesica calculo laborat. Quam quidem sententiam, si ea ratione admittamus, quam interpretes Galenus sequitur, falsam prorsus esse, ex eo facile constat, quod infiniti ferme homines urinam sabulosam, toto eorum vitæ tempore mingere observentur, (& unus ex illis sum) citra tamen ullam vesicæ lithiasis suspitionem. Quo fit, ut non possim non valde Galenum, tantum virum, & omnes alios post ipsum scriptores admirari, quippe qui tanti momenti ad Medicinam faciendam Aphorismum, vel non intellexerint, quod quidem vix adduci possum ut credam, vel saltem ob aliquam in eo ambiguitatem dissimularint. Totâ autem propositæ difficultatis explicatio ex illius verbis, sabulosa, proprio significato palam desumitur: etenim hac voce, sabulosa, Græcè. Ἀμύδεια nihil aliud summus Hippocrates intelligere voluit, quam sabulum crassum cui veluti terra pinguis sit admixta. Hoc est, lutosum, sive argillosum quid, veluti eorum mucus, matulæ fundo tenaciter inhaerescens. Signum sanè lapidis majoris in vesica concreti pathognomonicum. Sed quoniam in rebus humanis nihil est perpetuum, mirari non oportet, si interdum consimili affectu laborantes hoc signo destituantur, quod lapis in vesica sit exiguus, ut in Illustrissimo, ac Reverendissimo Cardinali Paleoto observavimus. Causam autem hujus cœnosi excrementi alias fusiori sermone explicavimus. Hactenus Zechius. Ubi autem cœnosi illius excrementi causam reddiderit, compertum nobis non est. Nos verò eam dilucidè exposuimus capite superiori, ubi ostendimus, mucosam illam materiam, esse vesicæ malè affectæ propriam excrementum, quando nimiam sanguinis copiam & superfluos humores ad se transmissos concoquere, & assimilare non potest, eosque in mucilaginosam istam materiam convertit; & illam pravam vesicæ diathesim à calculo ut plurimum excitari. Relegantur illa hoc loco, quia ad eorum, quæ supra dicta sunt, intelligentiam plurimum faciunt.*

Sed una adhuc remanet difficultas, quod nonnulli aliquid quando materiam pituitosam & mucilaginosam quotidie cum urina excernant, quamvis à calculo vesicæ immunes sint. Et refert Cardanus loc. suprà cit. Leonem quendam, monachum Divi Augustini, tantum pituitæ lentæ in matula concreta sæpè illi ostendisse, ut ovum anseris magnitudine superaret; & tamen lapidem nunquam habuisse.

Cui dubio respondemus materiam mucilaginosam, è vesica procedentem, in eo distingui ab illa, quæ ex aliis partibus procedit, quod quæ à vesica, magis tenax & glutinosa sit, ita ut fundo matulæ aut vitri euroscopi tenaciter adhæreat, nec post urinæ effusionem vehementi concussione excuti valeat. Quæ verò est ab aliis partibus, fundo matulæ



non adhareat; sed eâ inversa statim cum urina effluat. Hoc usus nos docuit, quod è nullo Auctore hætenus est animadvertum. Illa autem glutinositas major in excrementis vesicæ, à propria illius natura dependet, quæ membranea est, & glutini huic producendo idonea, quemadmodum videmus, ex pellibus membraneis aliorum animalium, gluten seu collam confici firmissimam, ad varios usus mechanicos idoneam.

Hanc autem materiam glutinosam seu argillosam, ut vocat Zechius, à prava vesicæ dispositione ex calculo contracta provenire, nos inde probare possumus, præter ea, quæ superiore capite dicta sunt, quod aliàs observavimus puerum duodecim annorum calculo vesicæ laborantem, qui quotidie cum urina mingebat materiam glutinosam, fundo vitri adhærentem. Postquam verò calculus sectione ademptus esset, puer ille per mensem integrum eandem materiam post sectionem cum urina excrevit, postmodum verò nihil tale emisit. Quod apertè demonstrat, illam materiam ex vesicæ mala dispositione prodiiisse, quæ cum non illicò post exsectionem curari potuerit, sed per aliquod tempus perseveraverit, illa etiam continuaverit materiæ glutinosæ excretio; sed vitio vesicæ curato, nunquam amplius apparuit talis materia, quod ostendit eam non aliunde, quàm è vesica provenisse.

Sciendum etiam pro coronide, hanc quidem materiam mucilaginosam, prædictis conditionibus stipatam, quoties apparet, calculi vesicæ præsentiam indicare; non tamen contra, quando non apparet, ejusdem absentiam significare: quia sæpè contingit, ut calculus levis & politus, & nulla asperitate donatus, aut quantitate minor, vesicam tantopere non offendat, ut inde prava illa diathesis oriatur, & tunc urinæ claræ perpetuò redduntur. Signum igitur istud pathognomonicum dici potest, quatenus præfens calculi vesicæ præsentiam indicat; quamvis absens ejusdem absentiam non significet.

Neque præterea digna esset viro cordato hæc obiectio, vel potius cavillatio, quod ex nostra observatione supra proposita, talis materia cum urinis excreta sit, quamvis calculus non esset in vesica, qui antea per excisionem ademptus fuerat. Sufficit enim, calculum antea & nuperrimè adfuisse, qui hujus affectus causa fuerit. Atque adeò talis materia significat calculum, qui vel jam adest, vel nuperrimè adfuit.

Ultimum difficillimæ istius diagnosis signum petitur ab exploratione, quæ fit per catheterem, & digiti in anum immiſsionem; ad quam tandem confugiendum est, ut illa omnino indubia reddatur. Quod etiam intelligendum est de iis, quæ ut plurimum contingunt; non de iis quæ semper. Aliquando enim calculus substantiâ mucosâ, vel etiam cystide obvolutus est, ut certa illius exploratio fieri non valeat, & lithotomos aliquando in eo decipi videamus. Quod tamen de cathetere præcipuè audiendum est: nam exploratio, quæ fit per immiſsionem digiti in anum, longè certior est, & non solum calculum adesse ostendit, sed etiam illius differentias quoad magnitudinem, figuram, & numerum patefacit.

Prognosis hujus affectus, non nisi laboriosa & periculosa institui potest. Laboriosa quidem ex eo, quod minimi tantum calculi per angustum vesicæ meatum excludi possint; grandiores verò, si duriores ac veluti silicei, conteri ac dissolvi nequeant; si verò molliores, gypsei aut tophacei, aut alio quovis modo friabiles; dissolvi quidem possunt longo efficacium remediorum usu, quem ut plurimum ægrotantes ferre nequeunt, & idè talis curatio rarissimè succedit, ita ut sapissimè ad sectionem veniendum sit, quæ quàm plena sit terroris, quotidianus eventus docet, cum plurimi ex illa operatione moriantur. Unde Hippocr. in juramento discipulos suos monet, ne hanc sectionem aggrediantur, sed etiam lithotomis perficiendam relinquunt. In mulieribus tamen facilius est operatio, & periculi expertus, quod latiore meatum urinarum, & nulla sectione, sed simplici dilatatione perficiatur.

Curatio calculi, in vesica concreti, easdem habet intentiones, quæ supra in renum calculi curatione propositæ

sunt, ut nempe materia illius antecedens evacuetur, revellatur, ejusdemque generatio prohibeatur, materia verò conjuncta, seu calculus ipse imminuatur, atteratur, & dissolvatur. Quibus intentionibus profunt remedia, etiam ibidem proposita.

Ex quibus maximæ est efficaciæ aqua ex cepis destillata, cujus usu per 40. dies continuato, nos calculum sabæ magnitudine superantem è vesica excretum vidimus.

Attamen & gravissimorum Auctorum sententia, & quotidiana experientia docet, medicamentis ore assumptis vix ac ne vix quidem calculum vesicæ dissolvi posse. Unde fit, ut ad lithotomiam seu calculi chirurgicam extractionem, ut plurimum confugiendum sit. Quia tamen nonnullæ inveniuntur historiæ, calculo laborantium per medicamenta curatorum, nos præcipuas hæc annotabimus, ut cuique liberum sit, efficaciora experiri remedia, priusquam periculosissimæ & terroris plenæ Chirurgiæ sese committat. Adde, quod reperiantur aliquando calculi tam molles & arenosi, aut recenter concreti, ut eos dissolvere non sit impossibile. Nam durorum & siliceorum dissolutio minimè sperabilis est.

Horatius Augenius tom. 2. *epist. medicinalium*, lib. 9. *epist. 8.* Ego, inquit, bis in hunc diem calculum vesicæ fractum vidi primo casu, mox deliberatione atque maturâ consultatione additâ. Casus fuit. Filium Janeti, Pontificii Typographi, Romæ expurgandum susceperamus, ut postea tutior ad ipsam sectionem accederet. Tentaverat enim antea omnia remediorum genera, tum à Medicis Venetis, tum Florentinis præscripta. Cum verò nullam utilitatem subsequi deprehenderet, secari cupidus, Sacerdotem jussit accedere, ut si ex sectione moreretur, animæ fuisset consultum. Requisitus fuit ex Societate Jesu, qui auditâ confessione ab ægroto, & cognito morbi genere, proponit illi pharmacum, ut dicebat, magni usus, de quo & in seipso, & in aliis periculum fecisset. Experiri placuit, neque facti pœnituit. Nam qui proximè incidi debebat, liber ab omni calculo nono die fuit. Pharmacum autem à Jesuita ei datum, hoc erat.

℞. Pulv. mille pedum Drach. i. ad summum ℥. iv. aquæ vitæ Unc. sem. juris cicerum rubrorum Unc. ix. vel x. capiat horis ante prandium quinque.

Ego verò juvenem annorum 18. calidi & sicci temperamenti totius corporis curaturus, duxi imminuendam quantitatem aquæ vitæ, & ubi singulis diebus datum alteri fuit antidotum, huic alternis dari jussi, & pro refrigeratione totius corporis, aquæ fabarum & fragorum, ana Unc. v. propinari inter medio die, cum gutt. vi. olei de calcantho, & Unc. i. julepi violati. Hoc autem modo pharmacum præbebam.

℞. Pulv. asellor. præpar. ℥. i. aquæ vitæ ℥. ii. decoct. cicer. rubr. Unc. viii. Misce, capiat horis sex ante cibum. Hæc Augenius.

Sennertus *cap. de calculo vesicæ*, memorabilem historiam refert Wilhelmi Laurembergii, Professoris Rostochiensis, ab eodem acceptam, qui provecta jam ætate calculo vesicæ affectus, ac sectionis auxilio periculosissimo sese committere nolens de aliis remediis cogitare cœpit. Primò ergo liquorem illum nephriticum celeberrimum, magnoque apud Principes, in pretio & usu habitum, expertus est, qui ita paratur.

℞. Salis tartari albi Unc. i. Affunde aquæ petrosel. ℥. i. Misce, & per chartam bibulam cola, & liquori color croceus corticibus aurantium concilietur. Usurpavit etiam gemmam illam indicam, Igiada Hispanis dictam, ad calculum frangendum celeberrimam. Sed utriusque remedii nullam vim deprehendit. Ergò inter reliqua, quæ ad calculum comminuendum commendatur, pharmacum ex asellis experiri voluit, quo duos adolescentes vesicæ calculo laborantes feliciter sanatos esse Horatius Augenius proficitur.

Ad cujus imitationem, præmissis universalibus, & exquisita victus ratione instituta, accepit asellor. præparat. ℥. i. spiritus juniperini ℥. ii. juris cicer. rub. Unc. x. quo manè & assumpto, prima secunda vice à sumpto medicamento, tribus, aut quatuor horis, quandam pectoris compressio-



nem percepit, & quasi imminens animi deliquium, ut necesse haberet theriacæ Drach. i. potioni admiscere. Atque ita remedio hoc totos 15. dies usus est. Sed toto hoc spatio ne nimium sabuli expurgari reperit. Itaque alia addenda ratus, sequenti medicamento usus est.

℞. Asellor. præp. Unc. ii. leporis præpar. sang. hirci præpar. spongiæ rosar. sylvestrium, femin. viol. purpur. ana Unc. i. specierum lithontrip. ʒ. ii. Misce, fiat antidotum. Cujus accepit ʒ. ii. decocti diuretici ʒ. x. spiritus juniperi ʒ. ii. Quod medicamentum ubi manè hora quinta hausisset, secunda vice, post horas plus minus quatuor, sub pubis ossè, ad regionem ossii vesicæ, magnos sentire cœpit dolores. Paulò post parum urinæ profluebat, & cum ea lamellæ exiguæ, instar squamæ picis subrubeæ, quæ licet aliquam visciditatem habere viderentur, ad tactum tamen in sabulum resolvebantur, ita ut manifestè appareret, tunicam vel crustam esse à majore calculo solutam. Cujus medicamenti usum cum continuaret, interdum quarto, nonnunquam quinto die, hujusmodi lamellæ crassiores, & fragmenta sæpè grandiuscula profluxerunt, præsertim ubi lavacro aquæ dulcis uteretur. Cum verò & à calculo & ab ejus fragmentis orificium vesicæ esset fauciatum, ad leniendum dolorem medicamenti usus est.

Atque horum medicamentorum usu 17. septimanarum spatio à calculo liberatus est. Decoctum hoc fuit.

℞. Rad. glycyrrhizæ, ʒ. iv. althææ, gram. ononidis, ana ʒ. ʒ. baccar. halicacabi, num. xx. cicer. rub. ʒ. iv. uvar. passar. ʒ. i. sem. quatuor frigid. major. ana ʒ. i. hordei M. ii. Coque in aquæ alkekengi, ononidis, fragorum, flor. fabarum, ana ʒ. i. sem. Colaturæ adde syrupi de althæa ʒ. iv.

Millepedes ita præparantur.

℞. Asellor. vivorum ʒ. ii. Abluantur aqua ononidis, & sordibus purgentur, deinde vino Hispanico Petroniano dicto, inebrientur, eoque sensim effuso, concipiantur in ollas vitreatas, quantò plures, tantò melius, cum in unam ollam coniecti, citra combustionem vel putrefactionem difficulter exsiccare possit. Hæ ollæ, luto diligenter occlusæ, in furnum, à panis coctione calentem, collocentur, ut moderato calore exsiccentur, & in pulverem redigi possint. Huic pulveri rursùm affundatur sensim vinum Hispanicum, quantum imbibere poterit, & rursùm exsiccentur. Itaque imbibitio & exsiccatio tertio repetatur. Quartâ vice hoc liquore irroretur.

℞. Aquæ fragor. ʒ. iii. spiritus vitrioli ʒ. ʒ. Misce.

Iterum pulvis exsiccentur, & tenuissimè contritus in vitro usui servetur.

Præter dicta remedia, usus aquæ sanguinis hirci destillatæ, vel urinæ hirci recenter macerati, tentari potest, modo in calculo renum proposito.

Si medicamenti calculus frangi nequeat, ad operationem devenire, quantumvis periculosissimam, necessitas exigi, ne æger gravissimis & diuturnis doloribus tandem conficiatur. Ea autem peritum artificem & valde exercitatum desiderat, ut debite administretur: sic enim ut plurimum solet succedere, nosque quamplurimos hoc modo sanatos vidimus.

Medici autem hac in parte est, ante operationem corpus præparare per venæ sectionem, purgationem, vitamque idoneam, prout rei status indicabit. Notandum autem, minimè periculosam esse in mulieribus calculi extractionem, quippe quæ solâ meatus urinarii, qui brevissimus est, dilatione perficitur.

Si æger curationem per sectionem reformidet; aut desit peritus Chirurgus, interim, ne lapis vesicæ cervicem, in quam sæpè incumbit, asperitate sua exulceret, lenientia remedia usurpanda sunt, qualia pro ardore urinæ infra describentur.

Quod si fortè lapis, in cervicem vesicæ impactus, urinam suppressit, supino decubitu, eruribus elevatis, & corpore agitato decutiendus est, dein fotu aut incessu emolliente, tum cathetere intromisso, qui lapidem in capacitatem vesicæ impellat.

## C A P U T III.

### De inflammatione Renum & Vesicæ.

**Q**uia inflammatio renum & vesicæ iisdem curatum remediis, idèò utramque in eodem capite includimus, quamvis in diagnosi quandam habeant differentiam, quæ in sequentibus explicatur.

Est autem inflammatio renum & vesicæ, tumor illarum partium, ex effluxu humoris sanguinei vel biliosi, in propriam illarum substantiam effusi.

Non admodum frequens est partium illarum inflammatio, ob substantiam earum solidam ac densam, interdum tamen fieri solet, quia renes carnosio præditi sunt parenchymate, sanguini recipiendo idoneo. Vesica verò, licet exanguis & membranosa sit, cum tamen sanguinem ad sui nutritionem, per venarum propagines recipiat, non est dubium, quin illo nimia copiâ influente & extravasato, inflammatio fieri possit; quemadmodum in aliis corporis membranis, ut meningibus cerebri, pleurâ, mediastino, aliisque contingit.

Dicimus istas inflammationes ex affluxu humoris sanguinei, vel biliosi produci: quandoquidem pituita & melancholia in sanguine redundantes, illum crassiores reddunt, quominus densam earum partium substantiam subire possint: aut saltem exigua debet esse crassorum istorum humorum portio, sanguini permixta, ut hunc affectum producat, quod etiam rariùs contingit.

Causæ hunc affectum producentes, ex rebus naturalibus, non naturalibus, ac præternaturalibus desumuntur.

Ex parte rerum naturalium, infirmitas illarum partium congenita; & à parentibus contracta, vel magna substantiæ laxitas, fervor, & caliditas excedens illis ab ortu impressa, cujus ope humores copiosos attrahunt; ætas juvenilis & fervida, ad inflammationem inducendam plurimum conferunt.

Ex parte verò rerum non naturalium, ad hujus effectus productionem plurimum possunt. Venus immodica, partes istas maxime debilitans, & plurimum sanguinem aliosque humores ad eas alliciens, crapula, & usus vini generosioris ac meracioris; tum ciborum fætorum & piperatorum, animi pathemata graviora, supinus decubitus in culcitra molliori; exercitationes vehementiores, aut labores insueti, insignium evacuationum suppressiones, ut mensium, hæmorrhoidum, aut hæmorrhagiæ è naribus, quæ causas internas, plethoram scilicet & cacochymiam multiplicat, & humores ad interiora viscera quasi refluxu quodam propellant.

Res denique præternaturales, ad hujus affectus productionem concurrentes sunt, ictus, aut vulnera, renum, aut vesicæ regioni inflictæ, compressio nimia, aut contusio illarum partium, febres continuæ, impuritates omnium vasorum, vel aliquarum partium, suam illuviem expurgantium per urinæ vias, ut pleuritide, empyemate, lienis obstructione, mesenterii infarctu, & similibus contingit: ac denique ipsarum partium affectu peculiares, ad inflammationem in iis accensendam, plurimum conferunt, ut calculus, dolor vehemens, à quacumque causa excitatus, exulceratio, urinæ ardor, vel suppressio, & similia.

Signa inflammationis renum diagnostica sunt: Dolor in renum regione gravis, & aliquando pulsans, si locus, in quo sunt arteriæ, afficiatur: & ille dolor ad partes vicinas extenditur, ut ægri neque sese erigere, neque pedibus inniti valeant: tum etiam difficile in latus oppositum sese convertere, neque in illud, neque in ventrem decumbere possint, quia suspenditur pars inflammata, idèò perpetuò in dorsum residere coguntur, & si sternutatio, vel alia corporis commotio accadat, dolor valde exasperatur. Stupor, aut etiam dolor in crure ejusdem lateris percipitur, ob nervi, qui inde ad crus tendit, condolentiam. Dysuria etiam laborant ægrotantes, ob ardorem urinæ communicatum, & ichores ei permixtos, à parte inflammata exsudantes. Urina in principio tenuis est & flava, in progressu verò rubicunda & crassior evadit, febris

Y y 2 assidua



assidua & acuta ægrotantem affligit, quam sæpe sequuntur vigilie, deliria, aliaque graviora symptomata, nausea & vomitus sæpe affligit, quo biliosa, pituitosa, ac varia rejiciuntur.

Colon intestinum aliquando inflammatione afficitur, quæ si eam partem occupet, quæ renibus vicina est, similia parit symptomata: in eo tamen distinguitur, quod in renum inflammatione dolor ad costas nothas, dorsum, & vesicam se extendat; coli verò inflammatio magis versus ventrem, & major apparet mutatio in alvi dejectionibus, quàm in renum inflammatione.

In vesicæ verò inflammatione dolor pubis regionem occupat & perinaeum, in quibus etiam partibus calor, & interdum rubor apparet. Ardor urinæ perpetuus est, sed illa etiam suppressitur adstricto vesicæ ductu à tumore partis. Rectum intestinum affligitur propter viciniam, unde crebra desidendi cupiditas cum ardore procedit, aliquando etiam alvi suppressio, intestino à vesica inflammata compresso. Adsum etiam alia symptomata communia, quæ in renum inflammatione enumerata sunt, ut febris, vigilie, delirium, sitis, & alia hujusmodi.

Prognosis horum affectuum non nisi mala, & valde anceps proponi potest. Internæ enim inflammationes, præcipuè in partibus ad vitam necessariis, perpetuò mortis periculum minantur. Magis autem lethales sunt, si ils delirium, aut convulsio, aut gravia alia symptomata succedant. At si sudores frigi si ac perfrigerationes extremorum appareant, mors in propinquo est.

In renum inflammatione, si hæmorrhoides superveniant, bonum.

Si renum inflammatio suppuretur, rupto abscessu per urinæ vias pus evacuetur, salutis spem præbet. Si verò per emulgentes ad hepar & intestina viam molietur, periculosa est.

Levis vesicæ inflammatio, cum hypostasi in urina alba & æquali, spem salutis pollicetur.

Vesicæ inflammatio solvitur aliquando erysipellate in cute repente oborto, & urinâ copiosè emissa.

Curatio inflammationis in renibus & vesicâ perficitur remediis revellentibus, derivantibus, refrigerantibus, ac modicè repellentibus, anodynis, resolventibus, vel suppurantibus, si opus fuerit, aliisque, quorum materia, & utendi modus sequentibus exponetur.

Ac primùm phlebotomia maximè necessaria est, aperiendaque basilica, respondens affectui reni, ter, quater, & pluries, modò vires consent, idque donec fluxio subsistat, quod ex doloris remissione cognoscitur. In vesicæ verò inflammatione eligenda est pars dextra, propter hepar, ex quo velut sanguinis fonte, præsumitur ejusmodi materia profluere.

Demprâ sanguinis multitudine, & factâ revulsione sufficienti per venas superiores, inferiores etiam aperiendæ sunt, derivationis gratiâ, in poplite, vel malleolo, tum etiam hæmorrhoides aperiendæ, potissimum si tumefactæ, aut prominentes appareant.

Ad revulsionem etiam non parùm conferre poterunt cucurbitulæ superioribus & inferioribus partibus admotæ, cum scarificatione, frictiones, & ligaturæ dolorificæ extremarum partium, ad revocandos versus exteriora humores.

Ante & post venæ sectionem, clyster emolliens & refrigerans injiciatur, ac moderatè laxans, ejusque parva sit quantitas, ne tumorem comprimat hanc formâ.

℞. Rad. alihææ ℥. i. fol. malvæ. violar. lactucæ, ana M. i. prun. dulc. paria iv. hord. mundat. & flor. violat. ana P. i. Fiat decoctio ad ℥. viii. vel x. In colat. dissolve cassiæ, vel diaprun. simplicis ℥. i. ol. violac. ℥. iv. vitellos ovorum num. ii. Fiat clyster.

Sanguinis fervor inhibeatur julepis & emulsionibus, in hunc modum compositis.

℞. Aquar. endiviæ, lactucæ, & portulacæ, ana ℥. iv. syrupi granat. ℥. ii. syrupi nymphææ ℥. i. Misce, fiat julep. pro iii. dosibus, manè & serò sumendis. Vel

℞. Rad. acetosæ ℥. ii. fol. malvæ, plantag. portulacæ, & endiviæ, ana M. i. summitat. papav. albi M. ℥. Sem. anisi

& lactucæ, ana ℥. i. flor. borrag. violar. & nymphææ, ana P. i. Coquantur ad ℥. i. β. deinde adde succi granat. ℥. iv. Vel

℞. Amygdal. dulc. excorticat. ℥. j. pineorum recentium ℥. ℥. Sem. lactucæ, acetosæ, portulacæ, & papaveris albi ana ℥. iii. Contundantur, ut artis est, sensim affundendo aquæ hordei, vel lactucæ, aut portulacæ ℥. i. β. In colat. dissolve sacchari rosacci ℥. i. Fiat emulsio pro iii. dosibus, in qua omissa fuerunt semina frigida majora, quia diuretica cum sint, aliquid versus istas partes deducere possent, præcipuè dum fluxio adhuc est in motu: nam in declinatione ex usu esse poterunt. Utiliter etiam addetur emulsioni syrupus de papav. alb. ad fluxionem potentius cohibendam.

Per clysteres etiam partes inflammatæ refrigerari poterunt, paratos ex decocto julepi prædicti, cum olei rosar. aut violar. ℥. iii.

In principio harum inflammationum purgatio non convenit, quia metus est, ne exagitati humores magis præcipitentur ad partes affectas; ita ut etiam alvi fluxus ingens, eo tempore superveniens, cohibendus sit propter eandem causam. At sedatâ aliquantulum inflammatione, & inclinante morbo, purgatio convenire poterit, ex benignioribus composita, ut mannâ, cassiâ, rhab. tamarindis, diaprun. simpl. catholicon & syrupo rosaceo, cum decocto lactucæ, portulacæ, aliorumque refrigerantium, in julepis descriptorum. Vel ex prædictorum nonnullis bolus componi poterit.

Exterius verò, ab ipso morbi initio, adhibenda erunt medicamenta refrigerantia, & modicè repellentia, ut epithemata liquida ex aquis vel succis plantaginis, acetosæ, endiviæ, solani, rosarum, cum pauco aceto, santalo rubro, & camphora. Linimenta ex oleo rosaceo, omphacino, violac. crato santal. unguento albo refrigerante, vel populeone, solis aut mixtis, addito pauco aceto; quæ applicari debent partibus prædictis singulis horis subfrigidè.

Vel poterit fieri linimentum ex ovo integro fortiter agitato, affundendo parum olei, & aceti rosacei.

Vel poterit parari optimum ex oleo rosaceo omphacino, cum aceto & succo polygæni, aut portulacæ, cui etiam adde, si lubet, recentem ovi vitellum. His imbuti panni admoveantur subfrigidè.

Si dolor acerbissimus urgeat, non erit alienum in hujusmodi epithematis & linimentis parum opii & croci dissolvere.

Poterit etiam fieri cataplasma ex farina hordei, cum succo intybi, portulacæ, & solani, adjecto oleo rosaceo, unguento populeone. Sed illud frequenter immutandum est priusquam incalcescat.

Hæc autem tria diligenter observanda. Primò non esse diu immorandum in istis refrigerantibus, ne impediatur materiæ conjunctæ diaphoresis, vel ne tumores isti scirrescant. Secundò, in vesicæ inflammatione minùs adstringentia & refrigerantia esse admovenda, ne accadat ischuria, quod symptoma per se est valdè frequens in hoc malo, ac valdè periculosum. Tertiò, cataplasmata in vesicæ inflammatione minùs convenire, quàm unguenta & linimenta, quia partem pondere suo gravant, ita ut difficilius multo dilatari valeat.

Postquam igitur per brevissimum spatium refrigerantibus hisce remediis usus fueris, iis dimissis, post iteratam scilicet phlebotomiam, & fluxione magnâ ex parte cohibitâ, ad emollientia, leniter resolventia, & chalaistica dicta veniendum. Talia erunt fomenta ex decocto rad. althææ, fol. malvæ, violar. parietar. sem. lini, sænugr. malvæ, bombacis, cum flor. chamæm. meliloti, anthos & rosar. ad robur partis servandum.

Deinde admovenda erunt linimenta ex oleo lilior. & rosar. cum pauco chamæmelino.

Inter chalaistica autem, & anodyna simul, non est præstantius ullum, cataplasmate de mica panis, quod in hunc modum componitur.

℞. Medullæ panis albiss. ℥. i. Coquantur in lacte caprillo ad pulvis consistentiam. Deinde adde vitellos ovorum n. iii. olei rosac. Unc. iv. croci ℥. sem. Fiat cataplasma, sæpè immutan-



immutandum. Poterit addi tantillum opii & camphoræ, si dolor fuerit acerbior.

In vesicæ inflammatione, si metus sit gangrenæ, conveniet cataplasma corroborans ex farinis fabarum, orobi, lupinorum, in vino decoctis.

Ubi jam maxima pars inflammationis sedata videtur tum purè solventibus decoctis & linimentis utendum, ut reliquæ absumantur, quod est maximè optandum.

In toto morbi decursu, symptomatibus gravioribus, ut feбри, dolori, vigiliis, suppressæ urinæ, & alvo, ventriculo, aliisque partibus compatiens, erit accuratè prospiciendum.

Et quidem quod ad febrem, dolorem, & vigilias attinet; certum est, vacuantia & alterantia proposita plurimum facere, ad illorum mitigationem. Illis tamen addi possunt epithemata, linimenta, & oxyrrhodina, quæ hepatis, cordis, & cerebri regioni admoveri solent; necnon summâ urgente necessitate, narcotica, tum assumpta, tum per clysterem injecta.

Peculiariter verò ad vesicæ dolores leniendos parari possunt glandes anodynæ, vel noduli, ex vitellis ovorum cum paucò opio, & succo hyoscyami, vel similibus confecti, in anum immittendi.

Ischuriæ verò aut dysuriæ, vesicæ inflammationi frequenter accidere solitæ, remedia ex propriis capitibus erunt desumenda.

Si renum inflammatio propositis remediis discuti non potuerit, sed ad suppurationem tendat, quod dignoscetur ex febris, doloris aliorumque symptomatum augmento, tum etiam horrore & vomitu, pondere circa partem majore, tum præcipuè apparente, cum æger in partem sanam inclinat, motus naturæ adjuvandus est admotis cataplasmatibus ex radicibus & herbis emollientibus, sem. lini, flor. chamæ. Quibus coctis, tuis, & cribatis, adduntur farinæ, butyrum, axungia, & olea, iisdem viribus prædita. Quibus nisi abscessus ruptus cum urinis sese expurget, pus in abdominis capacitatem irrupit, unde mors repentina, vel febris hæctica succedit. Aliquando tumor foras prodit, tumque vel cauterio potenciali, vel scalpello aperiendus est.

Contingit etiam aliquando, tumores istos indurari, & scirrhomatam naturam adipisci, cessante febre, dolore tamen perseverante, cum ponderis sensu majore & circumjectarum partium quodam stupore. Quod malum plerumque insanabile est, in cachexiam & hydropem hominem conjiciens. Tentanda tamen illius curatio est emollientibus, incidentibus & digerentibus remediis, qualia in scirrhi hepatis curatione fuerunt proposita.

## CAPUT IV.

### De Mictu Sanguineo.

**S**anguis à multis partibus ad urinæ vias transferri potest, & urinæ permisceri, eamque sanguinolentam reddere; sed cum id rarò contingat, & nos hic tantum renum & vesicæ affectus lucubremus, de illa tantum urinâ cruentâ agere instituiamus, quæ è renum, aut vesicæ vitio contingit. Effluit autem sanguis ab illis partibus, quemadmodum ab omnibus aliis (ut in hæmorrhagia narium, hæmoptysi, vomitu sanguinis, & fluxu hæmorrhoidali diximus) per anastomosis, rixin, aut diabrosin, rarissimè verò per diapedesin venarum, quæ ad illas partes deferuntur.

Causæ frequentiores sunt, sanguinis copia vel acrimonia, vel calculus renibus impactus: à copiâ sanguinis præsertim ruptio venarum potest contingere; ab acrimonia, erosio, vel apertio, seu anastomosis; & calculo etiam erosio, seu attritio venularum, & ipsius renum parenchymatis, quando calculus impactus per equitationem, ambulationem celerem, aut alium quempiam motum celerem commovetur, & in eo motu partes illas asperitate sua dilacerat.

Aliæ autem causæ propter repletionem, aut sanguinis copiam, ruptionem vasorum efficere possunt, ut casus,

ictus, ponderis gravioris elevatio, vel gestatio, motus corporis vehemens, & similia.

Qui à plethora inducitur fluxus sanguinis per urinas; non semper morbosus est, aut symptomaticus: sed interdum contingit bonis ægri rebus, naturâ onus superfluum per illas vias deponente, sicut refert Aræteus, nonnullos per quosdam circuitus sanguinem non ingere, eoque circuitu cessante, capitis dolores, oculorum caligines, & vertigines excitari.

Vesica etiam sanguinem effundere potest, si à calculo asperiori vulneretur, aut humore acri erodatur; sed paucæ est illius quantitas, quia vesica membranosa est & exsanguis. Si autem sphincter musculus afficiatur, aut virgæ canaliculus; inde copiosior sanguis emanare potest; ut in effusa nata venere interdum contingit, in primis si inflammatio ex gonorrhœa adfuerit.

Diagnosin hujus affectus respicit illius speciem, partem affectam, & causam illam committentem. Affectus speciei sensibus obvia est. Facile enim est sanguinem urinæ permixtum agnoscere; est enim loturæ carniæ similis; & interdum exigui quidam thrombi in ejus fundo resident. Alia verò urina lixivio similis est quando diutius moratur in vesica, siquidem illa mora sanguis denigratur. Partem affectam situs doloris ostendit. Si enim in regione lumborum percipiatur, renum affectum significat; si verò in regione hypogastrii, vesicam. Deinde sanguis, è renibus profluens, urinæ exquisitè miscetur, ex vesica verò purus frequenter & impermixtus effunditur. Hanc diagnosin expressit Hippocr. duobus Aphorismis, nempe *Aph. 78. sect. 4. Quicumque sponte & repente sanguinem mingunt, iis in renibus venula rupta significatur; & Aphor. 80. ejusdem sectionis: Si sanguinem mingant, aut grumos, vel stillicidium urinæ habeant, & dolor in immo incidit ventrem & perinæm, & perinæm; ad vesicam labor est.*

Si à calculo mictus sanguinis procedat, illius signa apparebunt, capite proprio relata. In horum defectu conjiciendum est, sanguinis copiam vel acrimoniam hunc effectum producere. Copia sanguinis, ex signis plethoræ apparebit; acrimonia verò, ex signis biliosi aut melancholici humoris, in corpore dominantis; tum etiam pituita salsa, quæ per urinas excernitur, gravem dysuriam & mictum sanguinis efficere consuevit, quod in senibus frequentius contingit, huic pituitæ salsæ generandæ valde obnoxii. Et hac ratione præsertim discernitur mictio sanguinolenta, quæ fit ab acris humoribus, ab ea quæ fit à calculo, quod in hac nephritici dolores, aut etiam lapillorum excretiones præceterant; in illa vero æger nunquam antea calculo laboravit, & urinæ claræ ac limpidæ, nullis heterogeneis contentis infectæ apparent. Et non solum ab exercitiis immodicis, quod utrique causæ commune est; sed etiam à solis animi pathematis affectus excitatur, quando ab humoribus acris procedit, qui ab hujusmodi pathematis maximè commoventur, ita ut huic affectui obnoxii post iram, aut moerorem, aut animi contentionem gravem, in mictum sanguinis plerumque soleant incidere.

Quod ad prognosin spectat, copiosa vel frequens sanguinis per urinas evacuatio valde periculosa: potest enim in tabem & hydropem ægotantem deducere. Si verò diuturna sit, ulcus excitare potest in ea parte, unde sanguis emanat. Si assatim sanguis una vice mingatur, metuendum est, ne periculosa excitet ischuriam in vesica concrefcens; vel alia gravia symptomata pariat, in eadem pravam induens qualitatem.

Curatio hujus affectus pro varietate causarum varianda est.

Ac primum, si à sanguinis copiâ, vel acrimoniâ producat, curandus est primum phlebotomiâ è directo renis affectu celebratâ, parca manu & frequenter, ut major fiat revulsio. Cui etiam conferre poterunt cucurbitulæ, frictions, & ligaturæ in partibus superioribus. Imò si sanguis copiosè fluat, cucurbitulæ hypochondriis erunt admovendæ.

Ad derivationem verò, sectio malleoli, & apertio hæmorrhoidum convenire poterit.



Quando humores serofi aut biliofi sanguinis excretionem promovent; illi expurgandi erunt purgationibus in hæmoptoë propofitis, per intervalla repetitis. Quibus etiam fequentia pro Medici arbitrio, fubrogari poterunt.

℞. Rhab. parum torrefacti pulverat. Drach. i. coralli præparat. ℥. fem. feri caprilli, aut aquæ plantag. Unc. iii. Fiat potio.

℞. Caffiæ recenter extractæ Unc. fem. pulpæ tamarind. Drach. vi. boli armen. orient. ℥. fem. Cum faccharo fiat bolus.

Post debitas revulfiones & evacuationes, vel etiam dum illæ celebrantur, fi res urgeat, ad ea veniendum eft quæ cohibere fanguinem, ac venas constringere & glutinare poffunt. Quæ tamen ftatim, apparente fanguinis fluxu ufurpanda non funt; ne citius quàm par fit cohibitus, incraffatus alicubi grumefcat. In hunc ufum maximè commendatur fuccus plantaginis recenter extractus, ad ℥. iv. vel v. manè & ferò fumptus, qui etiam ad quamcunque hæmorrhagiam utiliffimus eft. Si tamen nimia ventriculi refrigeratio timeatur, cum faccharo nonnihil decoquendus eft.

Lac ovillum maximè laudatur à Forefto lib. 24. obferv. 13. Sæpè, inquit, fanguinis mictum folo lacte ovillo, nempe fumendo ℥. iv. lactis & ℥. i. boli armeni veri, curavi.

Hoc idem expertum à Gatina: qui tamen præcipit, ne poft ejus affumptionem aliquis dormiat, neque fe exerceat. Laudant etiam Hollerius, & Duretus, ex Hipp. & Avicennâ.

Decoctiones etiam ex centinodiâ, equifeto, portulaca, & fummitatibus rubi, ad hanc rem funt efficaces, additâ tertiâ parte fucci granatorum acidorum, vel cydoniorum.

Vel ad fervorem fanguinis temperandum, utatur apozemate in plures dofes, manè & ferò, in hunc modum compofito.

℞. Folior. lactucæ, portulacæ, plantag. & consolidæ major. ana M. i. Sem. frigid. major. & minor. ana ℥. i. jubar. par. iii. liquorit. ℥. fem. flor. nymphææ, violar. & rofar. ana P. i. Fiat decoctio ad ℥. i. fem. In colat. diffolve gummi tragacanthi Drach. i. fem. fyrupi violac. & de rofis ficcis, ana ℥. i. fem. falis prunellæ Unc. fem. trochifc. alkekengi fine opio Drach. fem. Fiat julep. pro quatuor dofibus.

Ad magis incraffandum, & fanguinem potentius cohibendum, poterit addi prædicto apozemati fyrupi de papav. alb. Unc. i.

Pulveres etiam, fanguinis fluxum cohibentes, ut coralli rubri, lapid. hæmat. boli armen. terræ figillatæ, exhiberi poffunt cum aqua rofar. & plantag. aut decoctis prædictis.

Si morbus fit diuturnior, opiata in hunc modum parari poterit.

℞. Confervæ rofar. & rad. fymphyti major. ana Unc. ii. terræ figillatæ, boli armen. fanguinis draconis, coralli rubr. lapid. hæmat. & trochifc. de carabe, an. ℥. i. hyociftidos, granor. Kermes, & fem. plantag. ana ℥. i. Cum fyrupo de papavere & myrtino, ana part. æqual. fiat opiata, de qua capiat magnitudinem caftanæ, manè & ferò, fuperbibendo parùm aquæ plantaginis.

Affectu etiam perfeverante, convenientiffimum erit, ægro per intervalla exhibere decoctum myrobalanorum, in fero lactis aut alio liquore paratum.

Hollerius affirmat, & cum eo Duretus, ad mictum fanguinis curandum trochifcos Gordonii effe inflar omnium.

Chriftophorus à Vega trochifcos de carabe commendat cum aqua plantaginis exhibitos: iisque, femel tantum hora fomni exhibitis, fe hunc affectum curaffe affirmat.

Pro potu ordinario conveniet infufum lentifci cum vino mixtum, quod etiam manè inflar juleporum exhiberi poterit. Hujus compofitio talis erit.

℞. Lentifci ficci minutim conciffi Unc. i. aquæ fontis ℥. iv. Infundantur per horas xii. in B. M. valdè tepido vafe benè claufe. Colatura fervetur ad ufum dictum.

Quia verò fanguinis gumi nonnunquam in vefica retineri folent, & faviffima fymptomata inducere; pro illorum diffolutione conveniet poftca tepida adhibita per

intervalla, eff aqua malvæ & aceto non valdè acri. Acetum verò fit in minima quantitate, ut vix guftu fentiat.

Exteriùs verò topica admoventur regioni lumborum, refrigerationi & conftriktioni renum idonea.

℞. Rad. bifortæ & fymphyti major. an. Unc. i. folior. plantaginis, portulacæ, equifeti, polygoni bursæ paftoris ana M. i. malicorii. Unc. ℥. granor. fumach. myrtillor. hypociftid. an. Drach. ii. calycum glandium, fantali rubri & citrini: an. Drach. i. rofar. rubrarum P. iii. Coquantur in aqua ferrata & pauco aceto. Colatura foveantur renes tepidiufculè.

Ex eodem decocto poterit fieri iniectiones, auctâ dofi fimplicium.

℞. Unguenti comitiffæ & refrigerant. Gal. ana Unc. i. fem. Abluantur oxycrato diligenter, & inungantur lumbi frequenter. Vel ad magis constringendum.

℞. Succu plantaginis, fanguinariæ, ana Unc. ii. aceti Unc. fem. olei omphacini Unc. i. Bulliant ad fuccorum confumptionem. Deinde adde fanguinis draconis, maffiches, cortic. granator. ana Drach. ii. camphoræ Drach. fem. unguenti comitiffæ Unc. iv. ceræ q. f. Fiat linimentum, addendo aceti parùm, unktionis tempore.

Lamina etiam plumbea, multis foraminibus perforata, & fupra renes geftata, huic ufui erit valdè idonea.

In eo fanguinis mictu, qui fiet ex humorum acrimonia, jecoris ratio ineunda eft, epithematis & unguentis illius regioni applicitis.

Quando à calculo & arenulis fit fanguinis mictus, præmiſſis evacuantibus, revellentibus, & acrimoniam demulcentibus propofitis, ad ea deveniendum eft, quæ leniter abftergendo, renes ab infarctu liberare poffunt. Ejusmodi funt fequentia.

℞. Maſſæ pilular. de terebinth. cum rhab. ℥. i. Capiat Drach. fem. manè cum fyrupi de althæa cochlear. ii. alternis diebus.

Diebus verò vacuis ab ufu pilular. fumat æger alternatim pulverem & morſulos fequentes.

℞. Glycyrrh. rafæ Drach. ii. fem. iv. frig. major. mundat. ana Drach. i. fem. portulacæ, lactucæ, ana ℥. fem. trochifcorum de carabe, ac cornu cervi uſſi præparat. ana ℥. i. facchari ad pondus omnium. Fiat pulvis tenuis, de quo capiat ℥. i. cum aqua malvæ, in qua ſemen cydoniorum aliquandiu infuſum erit.

℞. Amygdalar. excorticat. & pineor. mundat. ana drach. fem. Semina althææ, alkekengi, ana ℥. i. Sem. lactucæ, Papaveris albi, ana ℥. fem. amyli, tragacanth. ana Drach. fem. glycyrrhiz. Drach. ii. facchari Unc. vi. Cum aqua parietariæ fiat confectio in morſulos. Capiat manè & vespèri Unc. fem.

Efficaciora diuretica non conveniunt, utpote quæ fanguinis fluxum promovere valent.

Ac denique aquæ vitriolatæ, ad fanguinem cohibendum, renes refrigerandos, & calculos expellendos, funt efficaciffimæ.

## CAPUT V.

### De ulcere Renum, & Veficæ.

**U**lcus in renibus & vefica à tribus excitatur cauſis; abſceſſu diſrupto, poſt inflammationem ſuppuratam: humorum acrimoniâ, qualis eſt ea, quæ mictum cruentum efficit, quæ intenſior facta aut durans diutiùs, eas partes exulcerat: aut à calculo aſpero, dictas partes erodente. Poſtrema hæc cauſa frequentior eſt, ac ferè ordinaria; reliquæ verò infrequentiffimæ.

Inter ſigna diagnoftica, primum ac præcipuum eſt, puris excretio cum urina, quæ diutiùs perfeverans, ulcus in partibus urinariis latens certiffimè offendit. Utrum verò renes, an vefica ulcere afficiantur, cognofcitur ex ſitu doloris, prout vel in regione lumborum, vel in pube, aut perinæo infeſtat. Præterea puſ à renibus procedens, melius coctum eſt: album ſcilicet, lævè, & minimè foetidum quia parenchyma renum carnoſum melius concoquit: tum puſ copioſius eſt, ac urinæ magis permixtum, quæ lacti ſimilis



## Cap. V. De Ulcere Renum & Vesicæ. 359

similis profunditur, donec longè post mictionem pus ab ea separetur, & in fundo resideat. E vesica verò emanans purulenta materia, pauca est, neque multum urinæ permixta neque adeò concocta; sed cruda, variegata, & graveolens: pars enim exsanguis, & debili calore prædita, materiam sufficienter elaborare nequit. Ex collo autem vesicæ, aut meatu urinario, sincerum pus, absque urinâ sæpè excernitur. His adde, quod in ulcere vesicæ, aut illius cervicis, perpetua adsit dysuria, & continuus doloris sensus partem istam infestans, quod in ulcere renum minimè fieri solet, sed dilucida sunt dysuriæ & doloris intervalla.

Profundiori ulcere existente, sanguis interdum copiosus effunditur, qui difficilè cohibetur, sæpiùsque ramenta partium, cum pure vel sanguine excernuntur, nempe carunculæ ex renibus, minutulæ ut plurimum, aliquando crassiores, quæ per ureteres difficilè transitum habentes, dolore nephriticum pariunt: è vesica verò squamulæ seu pelliculæ membranosæ, ac veluti fursuracæ crustulæ dimanant.

Ac denique in ulcere vesicæ diuturno & calloso mucosa illa pituita producitur, quæ in calculo vesicæ descripta est.

Quod ad prognosin attinet, cum omnia ulcera interna periculosa sint; ista etiam fomidolosa & curatu difficillima censenda sunt, quandoquidem perpetuus fit ad eas partes humorum affluxus. Licet enim serum suapte naturâ detergendi vi præditum sit; hoc tamen locum habere potest in statu naturali, quando serum alienis qualitatibus infectum non est: si verò pravi humores, acres, & falsi cum eo permisceantur, exulcerationem efficere, eamque fovere possunt.

Recentia renum & vesicæ ulcera curationem recipiunt: inveterata verò incurabilia sunt.

In senibus non curantur renum & vesicæ ulcera: in juvenibus aliquando; sed non nisi magno labore.

Ulcerata, quæ à calculo fiunt & foveantur non nisi priùs extracto calculo curari possunt.

Doctores aliaque symptomata, quæ ulcera prædicta comitantur, vigilias pariunt, corpus consumunt, homoque tandem in cachexiam vel atrophiam deducitur.

Curatio ulcerum renum & vesicæ, quemadmodum, & omnium aliorum ulcerum, detersione, exsiccatione, seu consolidatione perficitur. Inter hunc finem sequentia utiliter usurpari poterunt.

Ac primùm si plethora adfuerit, vel in parte affecta inflammatio quædam, phlebotomia celebranda est; primùm in brachio, postea verò in poplite.

Postmodum purgatio instituenda est, eaque frequenter repetenda, ut vitiosi humores, toto corpore redundantes & ad partem affectam confluentes, educantur. Quæ tamen fieri debet medicamentis blandioribus, tantum lenientibus, ut cassiâ, mannâ, syrupo rosar. rhab. & agarico in formam boli, aut aliam solidiorem redactis; quia in forma liquida ad vias urinæ faciliùs deferuntur, ejusque acrimoniam augent. Sic opiatæ sequens usurpari poterit.

℞. Polypod. querc. & glycyrrhiz. ras. ana ʒ. ʒ. sem. quatuor frig. major. an. Drach. i. flor. viol. & borrag. an. P. sem. jujubar. par. vi. prunor. damasc. par. iii. passular. minor. Unc. sem. fennæ mundat. ʒ. ii. ʒ. Infundantur in aqua hordei noctem. Manè bulliant & colentur. Postea dissolve mannæ, in q. s. decocti solutæ & colatæ Unc. i. sem. cassiæ recenter extractæ Unc. iii. Coquantur ad opiatæ consistentiam, addendo in fine rhab. pulver. ʒ. sem. Dosis erit ʒ. i. semel in septimana, duabus horis ante pastum. Vel

℞. Cassiæ ʒ. ii. mannæ ʒ. sem. pulpæ sebest. & tamar. ana Unc. i. mucil. sem. psyllii Drach. vi. quatuor sem. frig. major. ana Drach. i. succi liquir. Drach. ii. Cum syrup. rosar. solut. Fiat opiatæ.

Utiliores erunt opiatæ prædictæ, si addatur mercurius dulcis, aut alius optimè præparatus. Siquidem mercurius eximiam vim habet omnia ulcera interna & externa mundificandi ac consolidandi.

Inter purgantia recensetur terebinthina. & in hoc affectu valdè commendatur, quia simul alvum laxat, & ulcus abstergit. Eaque cum pulvere liquiritiæ exhibenda est ad

Unc. sem. cum aqua plantaginis lota. Præcipuè verò convenit, quando urina valde crassa mucosa est.

Vomitum in hoc affectu valdè commendat Avicenna, cap. de ulceribus renum: *Melius, inquit, quo renum ulcera curantur, est vomitus, propterea quod mundificat & evacuat, & trahit ad contrarium partis renum.* Aëtius verò cap. de suppuratis renibus: *Si quis, inquit, omni mense audacter vomat, fortè & renum ulcus, & quidquid inde mali accidere posset, dissolvit.* Hos sequuntur neoterici complures, quorum nonnulli aquæ & olei tepentis ante pastum exhibitione vomitum excitant. Quæ solo remedio sæpè repetito, referunt hunc affectum curatum fuisse. At Rondeletius vult à cibo id fieri, cum à cibo melius vomant, & aquam tepidam exhibet, cum pauco oleo, simul inungendo os ventriculi oleo lilior. ad ejusdem relaxationem. Advertendum tamen, vomitum proritandum esse in iis tantum, qui faciliè vomunt; nam vehemens vomitus ulcus irritat.

Post debitas evacuationes & revulsiones, ad detergentium usum progrediendum est. Quorum præcipua sunt serum lactis, matutinis horis in magna copia exhibitum, hydromel tenue, quod etiam mane sumi poterit ad Unc. vi. vel viii. & in potu ordinario usurpari. Decoctum hordei & liquiritiæ cum saccharo, eodem modo etiam usurpatum. Cui pro potu hydrosaccharum simplex substitui poterit. In hydromelite autem, si caliditas illius metuatur, semina frigida majora, vel ad magis leniendum, radix liquirit. & summit. malvæ, coqui poterunt. Lac etiam asinum non solum detergit ferosa sua parte; sed & caseosa consolidat. Non tamen exhibendum præsentè febre. Vel ad detergendum simul & leniendum, decoctum sequens componi poterit.

℞. Rad. althææ Unc. sem. fol. plantag. agrim. capill. ven. & summitatum malvæ, ana M. i. sem. malvæ & melonum, cum corticibus contusor. ana Unc. sem. granor. alkekeng. Drach. vi. liquirit. ras. Unc. i. hord. integri. P. i. Coquantur ad lb. ii. In colat. dissolve mellis rosar. Unc. iii. sacchari canti Unc. ii. Fiat julep. de quo capiat Unc. viii. manè per decem dies. Quæ ad renum, vesicæ, & uteri affectus exhibentur, magnâ dosi sunt præscribenda, ne eorum vis in media via dissipetur.

Loco istorum omnium, utiliter usurpari possunt aquæ minerales, aluminosæ & ferratæ, quales sunt aquæ nostræ Meynenses. Quarum diuturno usu corrigi potest intemperies calidior, ulcus mundificari & ad cicatricem perducere.

Nonnulli commendant ad ichores ulcus foveantes, absumendos, interneque ulcera expurganda & consolidanda (in agris potissimum temperamenti pituitosi: vel si lue venereâ aliquando infecti fuerint, & febris ac sanguinis fluxus non adfuerint,) decoctum sudorificum ex rad. chinæ, saltæ parillæ, aut ligno sassafras, vel etiam guaiaco, per triginta, aut etiam plures dies exhibitum, cum decocto secundario, ad potum ordinarium, victuque tenui & exsiccante. Intereâ tamen, ne viscera nimis inflammantur usu istius decocti, jusculis refrigerantibus, circa vesperam exhibitis, & inunctionibus renum, ex unguentis refrigerantibus, temperari possunt.

Tutius & utilius in quolibet casu decoctum sequens usurpari poterit.

℞. Rad. sassafras. Unc. iii. ras. ligni lentisc. Unc. ii. ligni sassafras Unc. i. rasuræ eboris, & cornu cervi, an. ʒ. vi. jujubarum & sebest. an. Unc. sem. ligni nephrit. Unc. iv. hord. mund. ʒ. ii. Infund. per hor. xii. in aquæ fontis lb. v. Coquantur ad lb. iii. pro vi. dosibus bis in die sumendis, aromatizentur ʒ. ii. cinamomi.

Post usum detergentium, ubi ulcus satis mundificatum fuerit, (quod cognoscitur, quando pus cum urina minore quantitate excernitur, idque album, & æquale, ac minimè foetidum,) ea quæ exsiccant, astringunt, glutinant & consolidant, exhibenda sunt; quales sunt trochisci sequentes.

℞. Bol. arm. terræ sigill. coralli rubr. ana ʒ. iii. gummi arabic. & tragacanth. ana Unc. sem. Cum aqua agrimon. fiant trochisci pond. ʒ. ii. Capiat unum manè & serò cum lacte ovillo ustulato, vel decocto symphyti majoris.

At



At reliquis præferuntur, imò instar omnium habentur, ad ulcera renum & vesicæ detergenda & conglutinanda, trochisci Gordonii, qui simul dolorem leniunt, & ardorem urinæ contemperant. Eorum dosis est ad ʒ. ii. vel iii. cum hydromelite, vel decocto hordei, quando magis est detergendum; vel cum lacte caprillo, aut potius ovillo, cum magis glutinandum est.

In eundem usum opiata sequens potest usurpari :

℞. Conservæ ros. antiquæ Unc. iii. sem. portulacæ, plantag. myrtill. boli armen. terræ sigill. sang. draconis, ana ʒ. i. rasuræ eboris, & trochisc. alkekengi, ana ʒ. sem. cum syrup. de ros. siccis, fiat opiata, de qua capiat magnit. castaneæ bis in die.

Julepi verò consolidantes in hunc modum componi possunt.

℞. Rad. symphyti major. Unc. ii. fol. plantag. & pilosellæ, ana M. i. summit. malvæ & capill. ven. ana M. sem. liquirit. ras. Unc. sem. amyli, gummi arabici, tragacanthi, boli armen. ana Drach. i. Sem. lactucæ & portul. ana ʒ. i. sem. ros. rubr. P. i. Fiat decoctio in aqua pluviali ad ℥. i. sem. In colat. dissolve sacchari Unc. iv. penidiati ʒ. ii. Fiat julep. de quo capiat Unc. iii. manè per x. aut xii. dies.

Pilulæ etiam sequentes non parum conferre poterunt.

℞. Terebinth. aquæ plantag. lotæ Drach. i. succi liquirit. & gummi tragacanth. an. ʒ. ii. boli armen. & trochisc. alkek. ana Scrup. sem. Cum succo equiseti, fiant pilulæ, capiat Drach. sem. manè & serò.

Majoris sunt efficaciæ in sequentem modum compositæ :

℞. Rad. althææ, & symphyti maj. siccar. an. Drach. ii. gummi arabici, cerafi, & prunor. ana Drach. i. olivani, myrrhæ, ana ʒ. iv. sem. papav. alb. & alkek. ana ʒ. i. ʒ. camphoræ ʒ. ii. Terantur omnia subtilissimè, & additâ tertiâ parte ponderis omnium cerussæ antim. seu diaphoretici vulgaris fixissimi, cum f. q. terebinth. Venetæ, fiat massa pilul. de qua capiat Drach. i. manè, & serò, longè à pasto, superbibendo parum aquæ potus ordinarii.

Si dolorifica sit operatio terebinthinæ, ejus loco succus liquiritiæ sumatur, in aqua parietariæ dissolutus, ad formandam massam.

At præ cæteris lac vaccinum, recenter mulctum, ad cyathi unius quantitatem, cum boli armeni veri ʒ. ʒ. hauustum singulis diebus matutinis, maximè conferre testatur Forestus, ad ulceris consolidationem. Dicitque hoc unum esse ex arcanis Præceptoris sui Helidæi, quod ulcus expurgat, & simul consolidat.

Quercetanus in Pharmacopœa, commendat aquam ad gonorrhœam. Quæ cum ulcera ex gonorrhœa contracta consolidat, idem in renibus præstare potest.

Hartmannus verò laudat opiatam confectam ex conservæ ros. partibus duabus, & pulveris sem. hyperici parte una in fine curæ per aliquod dies vesperi exhibitam. Idem curationem ulcerum feliciter absolvi posse asserit usu mercurii dulcis ad ʒ. ii. vel iii. in aqua plantag. quotidie semel atque iterum exhibiti.

Majoris est efficaciæ mercurius diaphoreticus, exactâ ac frequenti calcinatione paratus, ut fixus tandem evadat, & igni satis valido resistat; qui omnibus ulceribus internis persanandis, iustâ dosi, ac diu usurpatus, mirabiliter conducit.

In ulceribus admodum inveteratis decoctum aristolochiæ rotundæ, in vino albo paratum, & saccharo addito, multum confert.

Præterea animadversione dignum est quod scribit Garcias ab Horto, in urbe Goa aloën probè tusam, & cum lacte mixtam, iis propinari, qui ulcere renum aut vesicæ laborant, vel qui purulentas excernunt urinas, & ægros illicò curari.

Exteriùs verò, ad consolidationem ulceris adjuvandum, sequens unguentum admovei poterit.

℞. Succu plantag. & solani, ana ʒ. iv. ol. rosac. omphacini ʒ. iii. aceti ʒ. i. lithargyri tenuiss. pulverati ʒ. i. ʒ. cerussæ lotæ ʒ. ʒ. tuthiæ subtilissimè pulveratæ ʒ. ii. Sang. Drac. ʒ. i. Reducantur omnia ad formam nutriti.

Sequens etiam admovei poterit, absente inflammatione.

℞. Olei rosac. mastich. & lentisc. an. ʒ. ii. myrrhæ, aloës, sarcocollæ, sang. draconis, an. ʒ. i. amyli, tragacanth. an. ʒ. iv. styrac. calamit. ʒ. i. cetæ albæ q. f. Fiat unguentum.

In ulcere vesicæ peculiariter conveniunt injectiones, bis in die usurpatæ, primum detergentes, ex hydromelite, sero lactis, aut decocto hordei, cum pauco melle rosaceo, postea verò adstringentes & consolidantes ex aqua ferrata, in qua rad. symphyti, myrrha, alumen, sarcocolla, & tragacanthum bullierint. Maximè verò conferent trochisci Gordonii in lacte dissoluti.

Fabricius Hildanus ulcus insigne vesicæ, injectione sequenti, cum nonnullis aliis remediis, curavit, *obs.* 69. cent. 3.

℞. Rad. consolid. major. ʒ. i. hordei integri M. i. fol. agrimonii, veronicæ, scordii, alchymillæ, faniculæ, ana M. ʒ. Coquantur ad ℥. i. In colat. dissolve mellis rosac. ʒ. ʒ. Misce, fiat injectio.

Advertendum, injectiones istas non tantum per syringam immittendas esse, ut vulgò fit, quia in vesicæ cavitate non penetrant, obstante musculo sphinctere exquistè clauso; sed immisso in vesicam catheteti syringa aptanda est, sicque injectio ad locum affectum faciliè deferetur.

Quia verò in hujusmodi ulceribus dolores plerumque infesti esse solent, eorum mitigatio, toto curationis decursu, quoties urgebunt, molienda est anodynis, interiùs, & exteriùs usurpatis. Interna erunt syrupus de papavere, laudanum opiatum; & huic usui peculiariter destinati trochisci alkeken. Tum etiam emulsionem sem. frig. cum sem. papav. albi; addito, si opus fuerit, ipso papaveris syrupo; ac denique conservâ florum althææ, frequenter exhibitâ.

Exteriùs verò fomentum sequens admovei poterit regioni renum.

℞. Rad. althææ ʒ. ii. fol. malvæ, parietariæ, violariæ, an. M. i. sem. lini, sœnugr. alkek. an. ʒ. iii. flor. chamæm. meliloti, nymphææ, an. P. i. Fiat decoctio, quâ fovetur pars cum filtris, non autem cum spongiis, propter falsedinem, quàm à mari habent.

Post solum linimentum sequens admoveatur.

℞. Olei violac. & amygd. dulc. an. Unc. i. ʒ. olei rosac. ʒ. i. mucilag. semin. althææ & sœnugr. an. ʒ. ii. croci ʒ. i. Fiat linimentum.

Ad vesicæ dolores sequens injectio parabitur.

℞. Sem. sœnugr. & cydon. an. ʒ. i. Macerentur per horam in ℥. i. ʒ. decocti hordei. Postea per linteam exprimantur. Fiatque mucilago satis liquida. Cui adde ol. amygd. dulc. ʒ. ii. mellis ros. collat. ʒ. i. Misce, fiat injectio.

At verò lac tepens, recenter mulctum, frequenter injectum, præstantissimum est anodynum. In quo trochisci Gordonii dissolvantur, omnes scopi, tum doloris sedandi, tum ulceris curandi adimpleri poterunt.

## CAPUT VI.

### De Diabete.

**D**iabetes est celerrima ac copiosissima potus non transmutati per urinas emissio, quam sequitur sitis intensa ac indefinens, & totius corporis colliquatio.

Dicitur diabetes ἀπὸ τοῦ διαβαίνω, à permeando seu transeundo, ob celerem urinæ transitum, seu translationem, sicut aqua per siphonem trajicitur, quam Mechanici, teste Columella, διαβρίτω vocant. Dicitur etiam διψασις, à siti inextinguibili, & hydrops ad matulam, propter urinæ copiam, quæ assidue profunditur. Rarissimus est affectus, quem Gal. se bis tantum vidisse refert 6. de loc. affect. cap. 3.

Causa proxima & immediata hujus affectus ex eodem Gal. loco citato, & omnibus illius sequacibus, est calida renum intemperies, cujus operâ serum hi è vasis copiosissimè trahunt, & ad vesicam transmittunt, tantam ejus copiam retinere nequeunt; vasa exhausta à corde eandem trahunt materiam; Cor ab intestinis & ventriculo, unde sitis continua exoritur; potusque ingens cupiditas, qui simul atque assumptus est, à venis, & renibus denuò abripitur,



abripitur, & copia sua expultricem irritans, ac retentricem gravans; denuò ad vesicam deturbatur.

Nonnullis hæc causa videtur insufficiens, cum calida renum intemperies frequentissimus sit affectus, diabetes verò rarissimus, idè aliquid aliud valdè infrequens hîc contingere aiunt, nempe humorem acrem, aut salsum, renum parenchymati imbibitum, id est, bilem aut pituitam falsam, quæ virtutem partis attractricem continuo irritat, quemadmodum in februm biliosarum paroxysmis continua sitis urget, quæ nullo potu sedatur, ex humore bilioso, tunicis ventriculi impacto, aut vaporibus biliosis, à partibus vicinis (ubi bilis restagnat, & in paroxysmo febrili commoveretur) elevatis, & ventriculum impetentibus. Quæ sententia probabilis est: Illi tamen hoc addi posse existimamus, non solos renes in hoc casu tentari, cum bilis, & alii humores adusti, in hepate primum generentur, atque ita eos non posse magna copia in renes influere; quin hepar eadem intemperie, eodemque vitio afficiatur. Imò verò, si ulterius nobis in re obscura, & in naturæ silentio recondita, per analogisimum ratiocinari liceat; possumus dicere, venenatam quandam qualitatem, huic symptomati generando idoneam, præcipuè concurrere. Cum enim illud serpentis genus, quod dipsas appellatur, & in Lybya præsertim reperitur, morfu suo venenum quoddam in homines insinuet, à quo sitis inextinguibilis inducitur, simile etiam venenum in corporibus nostris, ex certa ac peculiari humorum corruptelâ, generari poterit, ad similem sitim inducendam idoneum: cum ipso Galeno Authore, venena varii generis in corporibus nostris generari possint. Et magis adhuc præcisè, si venenum in corporibus nostris generari possit, maximam & horrendam potus aversionem inferens, quod in hydrophobia contingit, ut ægri ne visum quidem aquæ, alteriusque rei potulentæ, ferre queant: quidni etiam aliud venenum, contrariis dotibus præditum generari poterit, ut summam, & incompossibilem potus appetentiam excitet? Inde etiam ratio desumi potest, cur iste affectus adeò rarus sit: quia nimirum rarissima est talis veneni generatio, cum tamen bilis & pituitæ falsæ productio, & morbi ab iis oriundi frequentissimè contingant. Ac denique, sicut fames canina diabete comparatur, quod in ea sit insatiabilis ciborum cupiditas, & occultæ cuidam qualitatî à cordationibus adscribitur; sic etiam immane istud potus desiderium, qualitatî cuidam peculiari & occultæ adscribi potest.

Signa hujus affectus diagnostica ex iis, quæ dicta sunt, satis elucescunt, quando scilicet immodicum adest urinæ profluvium, cum siti immensa, quæ assumpto potu nihil sedatur, quia statim atque assumptus est, subito rejicitur, & totum corpus celeriter contabescit: cum materia enim potulenta humiditates corporis alibiles simul excernuntur, factâ totius corporis colliquatione. Licet autem non rarò urinæ profluvia copiosa contingant in febribus acutis, aliisque casibus; illa tamen ad diabete referenda non sunt, quoniam in iis symptomata prædicta, ut sitis inexhausta, corporis colliquatio, aliæque non reperiuntur.

Prognosis hujus affectus non nisi funesta institui potest: malum enim incurabile est, nisi in principio curatio adhibeatur, & hominem ad tabem celerrimè deducit. In senibus etiam periculosior est, tum etiam, si post immodicam venerem, aut febres chronicas contingat.

Illius curatio consistit in calida renum, aliorumque viscerum intemperie corrigenda, eorundem imbecillitate ac laxitate reparanda, humorum ad eos confluentium tenuitate incrassanda, & maligna qualitate oppugnanda. Quæ omnia sequentibus auxiliis præstari poterunt.

Venæ sectio in principio morbi, viribus adhuc satis validis existentibus, revulsione & refrigerationis causa convenire potest, parvâ quantitate, & partitis vicibus celebrata. Si tamen vires jam dejectæ fuerint, aut hic affectus alteri succedat, non erit locus huic remedio.

Evacuatio excrementorum, per mollientes & lenientes clysters molienda est, in hunc modum compositos.

℞. Fol. lactucæ, portulacæ, malvæ, & plantag. ana. M. j. Lazar. Riverii Opera,

hordei mundati, & ros. rub. an. P. j. Fiat decoctio ad ℞. j. sem. In colat. dissolve diapruni simpl. Drach. vj. mellis rosac. & ol. omphacini, an. Unc. ij. Fiat clyster frequenter injiciendus.

Tum etiâ purgatio blanda instituenda est; cum medulla cassiæ, & pulpa tamarindorum, vel decoctio plantag. portul. lactuc. tamarind. & myrobal. cum syrupo rosaceo.

Vomitus etiam à nonnullis commendatur ex decocto feminis raphani & ebuli, cum oxymelite; qui vacuat, & revellit à partibus urinariis.

Ad intemperiem autem dictarum partium corrigendam, & humores incrassandos, conveniunt julepi ex aquis vel decoctis lactucæ, portulacæ, plantag. cum syrupo myrthino, cydon. & similibus, atque etiam de papavere, in modica quantitate; addendo pulverem diatragacanthi frig. trochiscos terræ sigillatæ, & similia.

Vel ad magis adstringendum in hunc modum componi poterunt.

℞. Rad. consolid. major. & plantag. ana Unc. j. fol. plantag. M. j. balaustr. & myrobal. citrin. ana 3. j. sem. plantaginis & portulacæ, ana 3. sem. rosar. rubr. P. j. Coquantur ad ℥. j. In colatura dissolve syrapi cydonior. 3. iij. Fiat julep. pro iij. dosibus.

In eundem finem pulvis, vel opiata confici poterit; in hunc modum.

℞. Sem. plantag. portulac. coriandri præp. & rosarum rubr. ana Unc. j. coralli præp. boli armen. margaritarum præp. & radices tormentillæ, ana ʒ. j. nucis moschat. 3. sem. Mitce, fiat pulvis.

℞. Conservæ ros. antiquæ Unc. iv. boli armeni, coralli præpar. & cornu cervi usti, an. ʒ. j. Cum miva cydonior. fiat opiata.

Erastus valde commendat syrupum ex radice symphiti majoris, & prunis sylvestribus confectum: quem se summa cum felicitate in affectibus huic malo simplicibus usurpasse testatur.

Narcotica etiam, ut theriaca recens, syrupus de papavere, & laudanum opiatum, prudenter usurpata, in hoc affectu plurimum prodesse poterunt.

Perseverante affectu, lac ovillum, aut bubulum, aut asinum erit convenientissimum: modò prius serum absumatur, injectis frequenter silicibus candentibus. Eoque æger uti poterit mane, prout in aliis affectibus dictum est.

Sudorifica etiam ab Authoribus commendantur, quibus serofus humor ad corporis superficiem evocatur. Ea tamen suspecta merito esse debent, quandoquidem summam cum diureticis cognationem habent, viscerumque intemperiem augent. Si tamen iis locus aliquis unquam esse videatur, ex temperatioribus, utpote rad. chinæ, aut falsæ parillæ, cum foliis endiviæ, borrag. acetosæ, decoctum parari poterit. Imò verò in consumptis fieri poterit ex decocto pulli, aut gallinæ junioris, ut simul nutritioni corporis consulatur. At verò tutius esse censemus, externis remediis sudores elicere, putà vapore decocti convenientis, in ligneo instrumento, (ut vulgò fieri solet) nudo corpore suscepto.

Prædictorum sudorificorum loco maximè conveniunt diaphoretica, quæ simul malignam qualitatem oppugnare possunt: qualia in febribus malignis proposita sunt, ex quibus ol. vitrioli præcipuum est, quia ad sitim extinguendam, fluxum cohibendum, & malignitatem infringendam præstantissimum est.

Pro potu utatur æger aqua ferrata, cum syrupis acidis & adstringentibus vel decocto prunorum sylvestrium, & corticis interioris quercus. Quo remedio ferè solo se hunc morbum in puero curasse testatur Erastus.

Exterius verò admoveatur fons regioni lumborum, ex decocto rad. acetosæ, fol. plantag. cortic. granat. sem. sumach. & similibus, quibus aceti parùm addatur. Vel quod utilius erit; paretur infusio ex eodem decocto.

Eademque pars inungatur unguento rosaceo, santalino & comitissæ, simul mixtis, vel sequenti linimento.

℞. Olei rosac. & myrtin. ana 3. j. santali rubri, rosar. rubr. & corall. rubr. ana ʒ. j. succi plantag. 3. j. ceræ q. s. Fiat unguentum.



Denique symptomata hunc affectum comitantia, ut sitis, vigilia, consumptio, aliaque, remediis propriis capitibus descriptis mitigantur.

## CAPUT VII.

## De Urinæ incontinentia.

URINÆ incontinentia in retentricis vesicæ actionis latione consistit; quemadmodum diabetes in vitio attractricis, & dysuria expultricis. Illa verò duobus modis solet contingere, vigilantibus nempe, tunc causa gravior est, aut dormientibus, quod levius esse consuevit, quandoquidem tunc temporis functiones animales minus liberè exercentur. Et hoc etiam duobus modis fit, nempe debilitate & laxitate muscoli sphincteris vesicæ, quod pueris omnibus lactentibus, multis decrepitis, & quibusdam adultis accidit, aut imaginationis errore: non pauci enim reperiuntur, qui vel nimio potu, aut exquisiore sensu vesicæ, aut acriori urinâ lectum pertingunt, concurrente quodammodo voluntatis imperio, dum per somnum imaginantur, se in parietem, aut alium locum utinam effundere, & huic vitio ita assuefunt, ut sine ulla vesicæ aut sphincteris ejusdem prava diathesi id fiat, neque tam medicamentis liberentur, quàm prava illius imaginationis mutatione, ut in pueris flagro, vel in adultis, locus ille, quem per insomnia permingere putant, rebus quibusdam pretiosis aut venerandis exornetur, & illis sæpè spectandus proponatur.

Affectus autem præternaturalis, & verè morbosus, urinæ incontinentiam committens, in musculo sphinctere consistit, qui sympathice afficitur, vel idiopathice. Sympathice quidem variis modis, ut quoties accidit summa torius corporis inbecillitas, & caloris nativi exsolutio, sicut in morti proximis; vel quando totum corpus, aut diridia illius pars afficitur paralyfi, aut illæ tantum nervorum propages, quæ ab ossæ sacro exortæ, tamen vesicæ communicant. Fit etiam aliquando hæc muscoli resolutio, ob simplicem condolemiæ & vicinitatem, ut in gravidis mulieribus, & recti intestini affectibus.

Idiopathice verò musculus sphincter variis modis afficitur: per vulnera scilicet illi inflicta, ut in lithotomia contingit; aut ulcera profundiora, illius contractionem & occlusionem impediunt. Potissima tamen causa & frequentissima est frigida & humida intemperies, quæ ad partem istam debilitandam & relaxandam aptissima est. Ad quam intemperiem producendam plurimum conferunt nativum temperamentum frigidum & humidum, ætas puerilis aut senilis; sexus muliebris, & morbi totius corporis, aut quarundam partium, à frigida & humida intemperie oriundi: quibus addi possunt causæ externæ, huic intemperiei producendæ idoneæ, sæpè aliàs recensitæ.

Hic tamen dubitare licet, quomodo contrarii affectus ab eadem causa producantur; Hippocr. enim in *Coacis*, à frigida intemperie urinæ suppressionem fieri pronuntiat: *Ex refrigeratione*, inquit, *interceptio urinæ pessima*. Incontinentia verò interceptioni contraria est. Dicendum est, quando frigida intemperies solum vesicæ sensum imminuit, vel abolet; fieri suppressionem urinæ, quia vesica non irritatur ad expellendum: si verò facultas motiva lædatur, quæ est in musculo sphinctere, ab eadem intemperie fieri incontinentiam, eo musculo relaxato.

Signa hujus affectus diagnostica, alia sympathicum affectum demonstrant, quæ desumenda sunt ex affectibus incontinentiæ urinæ producendæ idoneis, suprâ commemoratis, quæ si adsuerit, inde affectum exoriri conjiciendum est: illis autem absentibus, de idiopathico affectu cogitandum est: qui si à vulnere, ulcere, aut alio affectu conspicuo sphincteris procedat, facile cognoscitur; at verò, si nihil horum appareat, ad intemperiem partis frigidam & humidam animus convertendus est: eadem deprehendi poterit ex causarum tam internarum, quàm externarum constitutione, & affectibus, qui ab illis dependent: quales sunt totius corporis mollities, color albicans, ner-

vosi generis, & partium genitalium laxitas, ætas puerilis, aut senilis, cacochymia pituitosa, & similia.

Quod ad prognosin spectat, affectus iste in senibus immedicabilis est, ob exsuperantem humiditatem, & caloris nativi exsolutionem, quæ irreparabilis est.

In febre acuta, excretio urinæ involuntaria, admodum periculosa est: vel enim à delirio procedit; vel à summa facultatum omnium exsolutione, quæ caloris nativi extinctionem consequitur.

In pueris curatur urinæ incontinentia ætatis mutatione, cujus beneficio humiditas superflua sensim absumitur, & partes laxiores constringuntur. Si verò ante 25. annum non curetur, immedicabilis est.

Curatio incontinentiæ urinæ, ad frigidam, & humidam intemperiem, & muscoli sphincteris laxitatem corrigendam dirigenda est. Quæ enim per syn pathiam ab aliis primariis affectibus procedit, ad illorum affectuum curationem referenda est. Tum etiam, quæ a vulneribus, ulceribus, aliisque affectibus conspicuis exoritur, ab eorum curatione dependet. Hanc itaque curationem ita proponemus, ut tum pueris, tum grandioribus sufficere valeat; modo remedium delectus à perito Medico habeatur. Ut nempe leviora tantum in pueris usurpentur, & pro majori vel minori annorum numero, eorum quantitas & efficacia augeatur, vel minuat.

Prinò igitur phlebotomiæ locus hic rarò esse potest, cum frigida intemperies & pituitosa illuvies hunc affectum producat. Nisi fore totius plethora in juvenili corpore eam suadere videatur.

Purgatio autem in hoc affectu semper necessaria est, eaque componatur ex phlegmagogis medicamentis, quibus astringentia quædam misceantur, non solum alterantia, sed etiam purgantia, ut rhab. myrobalani, & similia.

Postea verò, ad exsiccandam materiam illam pituitosam, partemque relaxatam constringendam, pulveres, opiata, vina medicata, & similia usurpari possunt, in hunc vel similem modum composita.

℞. Nucum cupressi, & myrtill. torrefact. rasuræ eboris, coriandri præp. coralli rubri, & Karabes, an. 3. ij. spodi. 3. j. rad. cyperi & galangæ, ana 3. . Cum syrupo condituræ citri fiat opiata, de qua capiat magnit. castaneæ, manè & serò, superbibendo parum vini rubri.

Vel pulvis ex prædictis, aut eorum nonnullis conflatus à 3. s. ad 3. j. cum vino rubro exhibeatur, bis in die, longè à pastu.

℞. Rad. consolid. major. 3. s. rad. cyperi, galangæ, ana 3. j. fol. plantag. equiseti, pentaphylli cum rad. an. M. j. nucum cupressi, calycum glandium, an. 3. iv. sem. rutæ, agni casti, thuris, & rasuræ eboris, ana 3. s. rosar. rubr. P. j. vini rubri ʒ. iij. Infundantur per 14. horas. Colentur per manicam Hippocratis, addendo cinam. 3. s. sacchari q. s. Fiat claretum, de quo capiat ʒ. iij. vel iv. bis in die.

Multa & specifica proponuntur ab Authoribus, ad hujus affectus curationem maxinè conducentia. Gal. in *medicamentis localibus*, & in *lib. de facili parabilibus*, laudat cerebrum, & testiculos leporis combustos. Item cochleam cum suâ testâ combustam potandam ex herb. Recentiores sterco leporis præbent, cinerem narium tostorum, ungulam apri torrefactam, cinerem ossium dactylorum, avellanas assas, pulverem corticum ovorum. Sed præ cæteris laudatur pulvis agrimonii, & tunica interioris ventriculorum gallinæ exsiccata; quæ seorsim, vel simul mixta exhiberi possunt cum vino rubro.

Testatur Solenander, se felicissimum vidisse successum ex medicamento, à Giberto Horstio Hollando, Medico Romano celeberrimo, in usum revocato. Accipiebat guttur galli, urebat, ut non consumptum; sed tostum exsiccatumque teri posset. Exhibebat pulvisculum ante coenam, cum tantillo vini rubri, & si æger vino uti non posset, cum haustu oxycrati dulcissimi: idque per aliquot dies iterabat.

In grandioribus, ratione causæ antecedentis, ad exsiccandum totum corpus, conveniunt decocta sudorifica per xx. dies usurpata, ex ligno guaiaco, aut sassafras parata. Quibus & substitui poterunt stuphæ, laconica, & in primis



primis thermæ sulphuræ & nitrosæ, quales sunt nostræ Balerucanæ.

Pro potu utatur æger vino rubro austero meraciori, vel paucâ aquâ ferratâ dissoluto. Hydropota verò solâ aquâ ferratâ, vel in qua semen coriandri, aut tantillum mastiches bullierit. Vel denique, ad magis adstringendum, aquâ, in qua tegulæ recentes ignitæ extinctæ fuerint. Eademque aquâ omnes cibi decoqui possint. Parum autem bibendum est, præsertim in cœna. Tum sub ingressu lecti urinam reddat æger, ac rursus mediâ nocte excitetur ad mingendum, necnon & ante auroram. Hoc non minimum facere poterit ad mingendi in lecto consuetudinem immutandam.

Exterius verò, pubi, scilicet & perinæo, topica admoveantur, quæ calefaciant, robovent, & exsiccent, in hunc modum composita.

℞. Rad. enulæ camp. calami arom. rad. acori, cyperi, an. ʒ. β. fol. menthæ, salviæ, origani, calamenti, absinthii, an. M. ʒ. nucum cupressi, myrtill. gallar. & balaustior. ana ʒ. j. rosar. rubr. P. j. Coquantur in æquis partibus aquæ abrot. & vini rubri ad ℥. ij. In colat. dissolve salis & aluminis, an. ʒ. j. Foveatur regio pubis & perinæi calidè, manè & serò.

Vel ex eodem decocto, auctâ dosi simplicium, fieri poterit infessus, per multos dies usurpandus.

Post solum, vel semicupium, inungi poterunt eadem partes linimento parato ex oleis, vulpino, rutaceo, irino; unguentis, martiato, aregon. cum pulvere mastiches, cyperi, myrtillorum.

Vel admoventi potest utiliter storax liquida, vel balsamum indicum, paucò vino dissolutum: vel pro ditioribus moschi & zibetæ grana aliquot, in oleo moschate-lino dissoluta.

Vel emplastrum sequens dictis partibus applicetur.

℞. Ladani, mastiches, an. ʒ. ij. ligni aloës. styrac. calamita, cinam. terebinth. an. ʒ. j. myrtillor. rad. cyperi, an. ʒ. β. succi menthæ & equiseti cum vino rubro extract. q. f. Fiat emplastrum.

Denique si fluxio à capite in partes inferiores delabi videatur, quæ infirmitatem illam conciliet; derivetur errhinis, masticatoriis, caustico, occipiti vel brachio admoto, aliisque remediis, in catarrhi curatione propositis.

## CAPUT VIII.

### De Ischuria, & Stranguria.

URINÆ suppressio omnimoda *ischuria* ab Authoribus nominatur, imminuta verò mingendi actio, *stranguria* dici solet: quamvis hoc vocabulum latius multò pateat, & simpliciter omne urinæ stillicidium comprehendat: quod si absque dolore fiat, & urina stillatim effluat, etiam cum aliquo conatu, imminuta est ischuria, si verò fiat cum dolore, ad dysuriam potius, seu urinæ ardorem referenda est.

Ischuria igitur, seu omnimoda urinæ suppressio, duplex statuitur: vera scilicet, seu legitima, quæ fit vesicâ plenâ existente, & notha, seu spuria, quæ fit cum vesica vacua est, nihilque ad eam à renibus descendit.

Vera & legitima ischuria à tribus causis dependet: quarum prima est, sensus abolitus in vesica, propter nervi, qui ad eam deferuntur, paralytin & obstructionem, aut spirituum aversionem; quorum defectu efficitur, ut vesica stimulum non sentiat, & ad expulsionem non irritetur, ut in deliriis, & soporosis affectibus contingit.

Secunda causa est, frigida vesicæ intemperies, à causis refrigerantibus, seu internis, seu externis contracta, quatenus sensum vesicæ hebetat, ejusque expultricem debilitat.

Tertia causa est, angustia cervicis vesicæ, urinæ exclusionem præpediens. Hujus autem angustiae tres assignantur causæ à Gal. 1. de loc. affect. c. 1. Aut enim musculus, cervicem vesicæ circumdans, in tantum tumorem attollitur, ut meatus inde occupetur: ut si vel inflammatione, vel scirrho, vel abscessu, vel alio quopiam tumore affectus sit; aut in meatu caruncula quædam adnascatur ex

Lazar. Riverii Opera.

præcedente ulcere; vel callus, aut alia quædam res, ex crasso lentoque humore, paulatim, longo temporis tractu generetur. Obstruitur etiam meatus à calculo crudo crassoque humore, grumo sanguinis, vel pure.

Præterea exitum urinæ intercludit compressio cervicis vesicæ, à tumore partium vicinarum incumbentium, nimirum uteri, ex foetu grandiore turgidi, intestini recti facibus duris impleti, vel ani grandioribus hæmorrhoidibus tumefacti.

Fit etiam interdum hæc suppressio à nimia urinæ copiâ, diutius retentâ, quæ totum vesicæ corpus ita distendit, ut ad expellendum sese contrahere nequeat, ex qua tensione meatus etiam contrahitur & obturatur. Repletur autem vesica ab urina nimis diu retentâ, duobus potissimum casibus. Primò, quando sanus aliquis, urgentibus negotiis, in foro, senatu, concionibus, comitiis, convivio, curru, aliisque casibus, ob loci & temporis non satis idoneam opportunitatem, urinam sponte suppressit. Deinde vesica nimis repletur & distenditur, ut contrahere se amplius nequeat, dum urinæ stimulus non percipitur, propter obtusum vesicæ sensum, affectis nervis, qui ad vesicam deferuntur: cum tamen illi, qui musculo sphincteri constringendo dicati sunt incolumes remaneant, quod cuidam accidisse testatur Gal. 6. de loc. affect. cap. 4. luxatis spinæ vertebrae.

Notha verò ischuria illa nominatur, in qua urina suppressitur, vesicâ vacuâ existente, quia nihil feri ad eam defluit & descendit. Causa, cur nihil feri ad vesicam descendat, duplex est; vel quia renes urinæ materiam non attrahunt, deorsumque demittunt; vel quia ureteres non suscipiunt. Renum igitur attractrix, vel expultrix læditur. Attractrix læditur, vel læsâ facultate, vel errore objecti. Facultas læditur à valida intemperie, frigida præsertim; vel impeditur ob aliquam obstructionem, in renibus, aut venis emulgentibus residentem. Fiunt autem illæ obstructiones à calculo, pituita crassa, vel pure, ab aliqua parte superiore ad illas vias confluente. Fit etiam interdum obstructio venarum emulgentium à repletionem nimia, ex sanguine, & sero copioso in iis collecto; cujus rei historiam habemus in observationibus nostris, observ. 1. cent. 1.

Objecti vitio renum attractio læditur, cum serum vel absuntur, ut in febribus ardentibus; vel ad alias partes transmittitur, ut in hydrope contingit.

Expultrix similiter læditur ab iisdem causis, intemperie scilicet, obstructione à calculo, sanguinis grumo, pure, pituitâ crassâ, vel ab inflammatione.

Ureteres serum non suscipiunt; nec ad vesicam demittunt, propter inflammationem, vel obstructionem à calculo, sanguinis grumo, pure vel pituitâ crassâ, vel ob compressionem à tumoribus partium vicinarum.

Notandum est, utrumque renem aut ureterem debere esse affectum, ut omnimoda urinæ suppressio contingat: alterutro enim aperto & libero existente, urina fluere potest.

Causæ omnes prædictæ, si graviores sint, integram urinæ retentionem facere possunt, quæ ischuria nominatur; si verò remissiores, partialem tantum & imminutam excretionem efficiunt, quæ stranguria dicitur. Uterque autem affectus, ab iisdem causis, secundum magis & minus tantum differentibus, dependet.

Dignoscitur vera & legitima ischuria ex pondere & tensione hypogastrii, ac tumore circumscripto, vesicæ figuram referente. Causæ illius dignoscuntur ex rebus prægressis & concomitantibus. Si enim fiat ex quantitate urinæ collectæ copiosiori, quæ vesicæ contractionem impediat, ex relatu ægrotantis percipitur, illum ob diuturniorem equitationem, loco, aut personarum præsentiam & dignitatem, mictionis officium longiori temporis spatio omisisse, & nullum antea in illis partibus affectum habuisse. Si verò delirio, paralyti, aut alio affectu laboraverit; ex iis, qui in causis enumerati sunt, merito urinæ suppressio erit referenda.

Adstrictiones, quæ fiunt à tumoribus illarum partium aut vicinarum, vel aliis causis supra propositis, ex propriis illorum.



illorum affectuum indiciis innotescunt. Obstructiones verò canalis vesicæ dignoscuntur immissa candelâ, vel cathetere: quæ si penetrare non possunt, sed in via subsistunt, calculum, aut carunculam, aut aliam quampiam materiam obstruentem adesse demonstrabunt. Et illæ materiæ ita distinguuntur: quod nimirum, si calculus adsit canali impactus, dolores nephritici præcesserunt; si ille à renibus sit deciduus, aut si in vesica genitus, vel diu commoratus fuerit, signa præcesserunt calculi vesicæ, saltem leviora, qualia suo loco proposita sunt. Si caruncula urinæ com meatum impediât, præcessit gonorrhœa virulenta, aut ulcus in meatu virgæ, longo tempore materiam purulentam emittens. Si denique sanguinis grumus, pus concretum, vel pituita crassa obstructionem efficiat, portiunculæ quædam eorum per virgam excretæ, immisso catheteri adherentes, satis patefacient.

Spuria verò ischuria ex eo cognoscitur quod nulla tenio, nullusque tumor aut pondus existat in pubis regione, sed potius vacuitas quædam in ea percipitur: nullum adeest mingendi desiderium, nullaque irritatio in vesica; & immisso cathetere, liber canalis aditus reperitur, & nulla urina educitur. Præcesserunt autem signa calculi in renibus, aut ureteribus; inflammationum, aut magnæ plenitudinis; aut potus largior præcessit, quem non sequuta est urina copiosa, unde venarum nimia repletio potuit contingere, aut denique febris ardens, vel hydrops præsens ferossæ materiæ aversionem testantur.

Prognosis quod attinet, urinæ suppressio valde periculosa est, si septimum diem excedat, plerumque certum affert interitum: serum enim retentum in venis, jecur opprimit, sanguinem inficit & inquinat, ac in totum corpus regurgitat, suffocationis periculum infert, & ad cerebrum delatum, comatosum affectum inducit.

Suppressio urinæ, quæ ob fauciatam spinam, aut casum, aut vertebræ luxationem accidit, incurabilis est.

Si odor urinæ naribus & ore ægrotantis emittatur, lethale prorsus est.

Urinæ suppressioni si tenesinus supervenerit, in septimo moriuntur. Eidem singultus superveniens, mortem proximam denuntiat.

Curatio suppressionis urinæ, siue illa totalis sit, siue partialis, ad causarum sublationem dirigenda est. Ac primum illa, quæ spuria dicitur, & à renum aut ureterum affectibus dependet, ex inflammationis doloris nephritici, aut calculi renum curatione desumenda est. Quæ verò fit à repletionem venarum emulgentium, larga sanguinis missione & hydragogis medicamentis curanda est. Legitima verò ischuria curatur remediis, causas eam producentes auferentibus. Ac primum, si fiat à vesicæ, aut partium vicinarum inflammatione; remedia ex vesicæ inflammationis curatione mutuanda sunt.

Si verò suppressio fiat à calculo, vesicæ cervici impacto, sequentibus remediis auferenda est.

Primò æger supinus collocetur, cruribus elatis, mox plurimum diuque concutatur, ut calculus in vesicam relabatur: Et si hoc modo deturbari nequeat; immisso cathetere impellatur. Si verò calculus altius penetraverit in penis meatum, omnimoda illius exclusio procuranda est, digitis molliter impellendo, & deducendo ad extremum virgæ: tum virgam in aquam tepidam, aut in lac tepidum demittendo, aut ægrum in semicupium mergendo, ut meatus laxetur, & amplior fiat. Si verò neque foras extrahi, neque intrò impelli valeat, docent Practici, ligato pene, in superiori & inferiori loco, partem sectione factâ aperire, & calculum eximere.

Obstructio verò colli vesicæ, quæ ab inflammatione fit, propriis inflammationis remediis curabitur. Interim tamen, si urina diutius retineatur, candela cerea, oleo amygdal. dulcium illita, blande immitti poterit, omnino vitando catheterem, ne dolore excitato inflammatio augeatur.

Quæ verò à caruncula fit urinæ suppressio, carunculæ ipsius extirpatione curatur. Hæc autem remediis appropriatis perficitur, per candelam ceream immisis, quæ à perito artifice, in hujusmodi Chirurgia apprime exercita-

to, administranda sunt. Urgente tamen symptomate, quandoquidem caruncula interdum intumescit, & totum canalem obstruit, necessitas cogit, immisso cathetere urinam educere, quamvis periculum sit, ne irritata pars magis intumescat. Prius tamen tentandum est revulsione per venæ sectionem, & vomitoriis celebratis, tum repellentibus pubi & perinæo adhibitis, carunculæ inflationem imminuere, ut retentæ urinæ via patefiat.

Si à pituita crassa oriatur urinæ suppressio, convenit primum purgatio ex diaphœnicone, cum Rhab. in boli formam redactis; ac deinde terebinthina, cum pulvere liquiritiæ frequenter exhibita, postmodum radicem aperientium decoctum, cum oxymel. aut syrup. byzantino exhiberi poterit. Non omisis interim clysteribus, fomentis, & semicupis emollientibus & aperientibus: Eaque omnia convenient, quæ ad calculum dissolvendum & expellendum fuerunt proposita. At inter cætera peculiari efficaciam sequentia conferre experientia docuit.

℞. Benedictæ laxativæ ℥. i. trochil. de myrrha ℥. ij. decocti sabinae Unc. iij. Misce, fiat potio, quâ urinæ suppressio in quadam muliere brevi curata est.

Si redundantis pituitæ copia toto corpore, vel capite luxuriare videatur, purgatio universalis per apozemata, ad tres vel quatuor dies instituta ab ipso morbi principio, erit utilissima, præmissâ phlebotomiâ.

Non parum etiam huic affectui prodesse potest julepus ex succo parietariæ, fœniculi marini, & limon. cum ol. amygd. dulcium, in curatione calculi renum descriptus.

Syrupus Fernelii de raphano, ad Unc. ij. per vices exhibitus, est etiam utilissimus.

Refert Dodonæus libro conserv. cap. 47. quendam octogenarium, lixivio ex ovorum testis in cinerem redactis, cum vipo Rhenano perindixtis, semel tantum assumpto, ab urinæ stillicidio integrè fuisse liberatum.

Arnoldus Villanovanus vinum alkekengi commendat sequenti historiâ, in libro de venis conscriptâ. *Fuit tempore meo Cardinalis quidam, qui jam per quatrimum urinæ abnegationem passus est turgidus, & ut dicitur, desperatus, nullis aliis proficientibus medicinis: qui de consilio parvi Medici per potum vini alkekengi liberatus est, & soluta est urina in quantitate, ut impleteretur quasi concha una. Ex eo solo experimento, Medicus ille cum parva scientia & pauper, factus est magnus & dives, & multis quidem Deus gratiam, & afferi utilitates, & contra, & totum est, quia iudicia Dei abyssus multa.* Fit autem hujusmodi vinum, ut ibidem docet Arnoldus, accipiendo fructus alkekengi ꝑ. aut 7. aut plures, contundendo cum vino albo; postea colando & exhibendo.

Asell. etiam, cum vino albo triti & exhibiti, ad urinam provocandam efficacissimi sunt. Oleum scorpionum Matthioli, ad gutt. v. vel vj. exhibitum, cum jusculo, aut alio liquore, urinam potenter educit.

CrySTALLI mineralis usus frequens suppressam urinam movet, præcipuè ubi metuitur inflammatio, quæ ab ipsa urinâ diu retentâ sapissimè concitatur in tunica interiori vesicæ.

Spiritus salis idem præstat, & multò efficacius.

Ex vulgaribus succus parietariæ depuratus ad Unc. iv. exhibitus, cum sacchari Unc. ii. multum prodest. Illi admisceri potest sal prunellæ, vel spiritus salis.

Si hujusmodi suppressiones urinæ, à materia pituitosa oriundæ frequenter recurrant, nihil erit præstantius aquis thermalibus nitrosis & sulphureis, quales sunt nostræ Balneucanæ, quæ tum potu, tum balneo materiam illam mucilaginosam dissolvere, abstergere, & absumere facile poterunt.

Quidam vir nobilis hujus urbis, ab urinæ suppressione multos dies perseverante, post alia remedia, frustra tentata, sequenti clystere injecto, & per duas horas retento, liberatus est.

℞. Rad. apii, petrosel. brusci, gram. asparagi malvæ, bifmalvæ, ana ℥. ij. parietar. M. ij. Sem. anisi, fœniculi, anethi, carvi, dauci, ameos, carthami, rutæ, cumini, & baccarum lauri, ana Unc. sem. flor. chamæm. melilot. aneti & fœchad.



# Cap. IX. De Dysuria, seu ardore urinæ. 365

ſcœchad. an. P. ij. Cœquantur in vino albo, ad media. In colaturâ ſſ. j. diſſolve butyri recentis Unc. iv. mellis roſac. Unc. ij. ſacchari rubri Unc. j. benediſt. laxat. Unc. ſ. vitell. ovi, num. j. olei nucum, anethini, & ſem. lini, an. Unc. j. Fiat clyſter.

Chymici ſua etiam remedia ad hunc affectum prædicant, nimirum ſpiritus ſalis, vitrioli, ſulphuris, & terebinthinæ, quos ad ʒ. ſ. exhibent cum aquis appropriatis vel juſculo pulli. Commendant & ſalem tartari, & ſalem ſtipitum ſabaram, à ʒ. ſ. ad ʒ. j. exhibitum.

Necnon, ad revulſionem humorum à parte affecta, vomitorios uſurpant, eorumque beneficio non paucos fuiſſe conſeſſim liberatos gloriantur.

Toto curationis occurſu fomenta, linimenta, cataplaſmata, ſemicupia, aliaque externa uſurpanda ſunt, quæ non alia eſſe debent, quàm quæ ad dolorem nephriticum ſuprà fuere propoſita. Inter cætera valet cataplaſma parietariæ frixæ cum butyro, vel melius cum oleo ſcorp. Item veſica oleo ſemiplena: melius erit, ſi in hoc oleo cantharides coquantur.

Vulgo admovetur regioni pubis & lumborum cataplaſma ex cepis frixis cum axungia porci, additis oleis quibuſdam.

At longè efficacius operantur cepæ albæ crudæ in mortario tuſæ, addito oleo in formam cataplaſmatis, renibus admotæ, atque ureteribus, & regioni pubis.

Cataplaſma ex raphanis contuſis idem præſtare poteſt.

Quando à grumo ſanguinis iſchuria producitur, illius diſſolutioni incumbendum eſt, exhibitis iis; quæ id præſtare apta nata ſunt. In hunc cenſum referantur trochiſci de carabe, coagulum hœdi, leporis munia, oxymel ſimplex & ſcilliticum, ſyrupus acetofus, & ſimilia. Exteriùs verò ſtercus bubulum mira præſtat, juxta ſententiam Aëtii *tetrab. 3. ſem. 2. c. 27.*

Cum denique à pure urinæ ſuppreſſio, aut ſtillicidium producitur; tergentibus & incidentibus opus eſt, qualia potiſſimum in renum & veſicæ ulcere propoſita ſunt.

## C A P U T IX.

### De Dysuriâ, ſeu Ardore Urinæ.

**D**Yſuria, ſeu urinæ difficultatis nomine omnem dolorificam miſtionem intelligimus, quam etiam nomine ardoris urinæ recentiores enuntiare ſolent. Cum ſtranguria ferè confunditur à quamplurimis Authoribus, qui in hanc dolorificam etiam miſtionem conſtituunt; ſed etiam à dyſuria in hoc tantum diſferre volunt, quod major urinæ quantitas in dyſuria excernatur, minus verò in ſtranguria, quæ etiam ea ratione urinæ ſtillicidium nominatur. Verum maluiſmus nos, clarioris doctrinæ gratiâ, urinæ quantitatem imminutam, quæ ſine dolore fit, ſtranguriam nominare, & ſub uno capite cum iſchuria comprehendere, ex eo, quod utrique eadem curatio adhibenda fit, omnem verò miſtionem dolorificam ſub dyſuriæ nomine in hoc capite explicare, propterea quod ab iſdem cauſis omnes producantur, iſdemque remediis curentur.

Cauſa proxima & immediata miſtionis dolorificæ eſt ſolutio continui in muſculo ſphinctere, vel canali veſicæ. Atque adeò quæcumque ſolutionem continui in illis partibus inferre valent, dyſuria ſeu ardorem urinæ excitare poſſunt.

Inter illas cauſas, præcipua & magis frequens eſt urinæ acrimonia, aliquando ſimplex, & ſine aliorum humorum permixtione, quam viſcerum, vel totius intemperies calidior, vel acriorum & calidiorum ciborum uſus excitavit; ſæpiùs verò ex permixtione humorum acriorum, ut bilis, & pituitæ ſalfæ, comparata. Aliquando pus, ex renibus aut veſica ulceratis emanans, talem urinis conciliat acrimoniam. Nonnunquam etiam materia alba & quaſi lactea, cum urina copioſè emittitur, ardorem urinæ inducit: quam quidem materiam vulgus Medicorum purulentam eſſe exiſtimat, & à renibus oriundam. Quam ſententiam reprobat *Sennertus*, huic innixus rationi,

quod nimirum, etiamſi toti renes in pus reſolverentur, non poſſet tanta ejus copia, quanta interdum per aliquot ſeptimanas ſingulis diebus excernitur, inde ſupeditari. Sed arbitratur ipſe, hanc materiam provenire ex vitiata coctione, primò quidem ventriculi, deinde etiam hepatis; cum error primæ coctionis non poſſit corrigi in ſecunda, unde chylus, & poſtea etiam ſanguis crudus relinquitur, neque a partibus ſalis & tartareis mundatur, quæ in prima coctione ſeparari debent, & illæ poſtmodum à renibus attractæ, ad veſicam tranſmiſſæ, dolorem inter mingendum pariunt. In eam ſententiam ſe deductum eſſe proſitetur ex eo, quod vir quidam doctus, qui per aliquot ſeptimanas ardore urinæ laborabat, & urinam quidem ſatis copioſam, ſed tali materiâ albâ ita reſertam, ut dimidium urinalis occuparet, cum maximo dolore excernebat, & variis adhibitis remediis nihil levaminis ſentiebat, tandem ſolius vini malvatici potu curatus fuit.

Calculus etiam in veſica latens, ubi inter mingendum cervici veſicæ alliditur, dolorem excitat; quod etiam præſtare poſſunt arenulæ craſſiores, canalem in exitu vellicantes.

Inflammatio denique, vel ulcus iſtarum partium, urinæ ardorem excitat: quando quidem ſenſus exquisitior ab illis affectibus redditus, ab urina etiam bene temperata graviter afficitur, quemadmodum videmus, partes externas inflammatas aut ulceratas, ab objectis etiam proportionatis, vel levi contactu dolore affici. Sic in gonorrhœa, quamdiu adeſt proſtatarum inflammatio, ardor urinæ continuo percipitur.

Diagnofis hujus affectus ex ſe manifeſta eſt: dolor enim inter meiendum tam evidens eſt, ut ægri non raro ex illius moleſtia ejulare cogantur. At ſigna cauſarum ita diſtinguenda ſunt.

Si ex urinæ acrimonia procedat, illa tenuis apparebit, ac intenſo colore, atque interdum flammeo prædita; vel admixto bilioſæ, pituitosæ, aut purulentæ materiæ conſpicua fiet: viſcerum aderit intemperies, vel alimenta calida & acria: aëris æſtus, & ſimiles cauſæ caleſcipientes præceſſerunt.

Calculi denique, & inflammationes illarum partium ex propriis ſuis locis innotefcent.

Quod ad prognofin attinet, hic affectus per ſe periculolus non eſt, ſed magnam affert laboranti moleſtiam: & pro varia cauſarum diſpoſitione difficilem non raro curationem recipit; in ſenibus præſertim, qui ſi decrepiti ſunt, morbo commoriuntur. Atque in quacunque ætate ſi diutiùs perſeeveret, veſicam tandem & illius cervicem exulcerat.

Curatio primùm ad cauſæ ablationem dirigenda eſt. Atque ita ſi à calculo, inflammatione, vel ulcere veſicæ, aut cervicis illius dyſuria oriatur, ex propriis capitibus eorum affectuum curatio deſumenda eſt, leniendo tamen ſymptomati, quæ inferiùs proponuntur, plurimum conferre poterunt.

Quæ verò ab urinæ acrimonia & humoribus calidioribus, ei permixtis oritur; ſequentibus remediis oppugnanda eſt.

Ac primùm phlebotomia, ad hepatis aliarumque partium intemperiem corrigendam neceſſaria eſt. Eaque pluries repetita, pro plethoræ magnitudine aut inflammationis periculo, ex brachio dextro primùm, ad evacuationem & revulſionem, poſtmodum verò, ex venis inferioribus, ad derivationem à parte affecta, cujuſratione Hipp. eumque ſequutus Galenus, in omnium partium infra renes poſitarum affectibus, venas inferiores aperire præcipiunt.

Purgatio etiam in hoc affectu convenit, ſed ex lenientibus tantum & refrigerantibus compoſita, alioquin ardorem urinæ maximè exaſperaret. Ideoque multi bolum ex caſſia ſimplici non audent tranſcendere. Et illa certè reliquis præferenda. Magis tamen refrigerans efficietur, ſi pulpa tamarindorum etiam adjiciatur. Vel dilutum caſſiæ, ex decocto lactucæ, portul. & ſummitatum malvæ paratum, ad plures dies exhiberi poterit, ut acres humores in partes urinarias confluentes, ad inteſtina ſenſim derivetur.



Sitamen humorum pravorum copia in maiorem purgationem postulare videatur; ad sequentem potionem transire poterimus.

℞. Fol. lactucæ, portulac. plantag. & summit. malvæ, ana M. ℞. tamarind. ℞. mirbal. citrin. ʒ. j. Coquantur ad ʒ. vj. In colatura infunde cassiæ recentis extractæ ʒ. j. Colentur iterum, & postea dissolve rhab. in aqua lactucæ cum fantal. citrin. infusi ʒ. j. ℞. mannæ & syrup. ros. an. ʒ. j. Fiat potio.

In diuturna dysuria conveniet opiata purgans, in ulcere vesicæ descripta.

Vomitus, blandis remediis concitatus, præstantissimus est: revellit enim à parte affecta, & incommoda arcet, quæ à purgantibus per inferiora induci consueverunt. In his igitur erit proritandus, qui sine magno labore illum ferre possunt, & semel, aut bis in septimana iterandus.

Per clysteres etiam frequenter injectos, non solum humores acres ad intestina derivari, sensimque expurgari, sed etiam vesicæ, partiumque annexarum intemperies atque inflammationes demulceri poterunt, quorum formula talis esse poterit.

℞. Rad. althææ ʒ. j. fol. malvæ, violariæ, lactucæ, an. M. j. flor. nymphææ, & hordei mundati, an. P. j. Coquantur ad lb. i. In colatura dissolve cassiæ recentis extractæ ʒ. j. ovum integrum unum, olei violac. ʒ. ij. Fiat clyster.

Mucilagines sem. althææ, cydonior. scœnogr. clysteribus utiliter admisceri possunt, ad dolorem leniendum.

Verum ad contemperandum dolorem & ardorem, clysteres ex lacte puro, vel cum prædictis admixto, efficaces esse consueverunt, ut quosdam viderimus ægrotantes, qui in diuturnis doloribus ex hoc solo remedio, & semicupio, de quo postea dicetur, levamen susceperint.

Per os autem exhibenda quamplurima, quæ in usu practico comperta sunt, non parum conferre ad ardorem urinæ demulcendum, & partium affectarum intemperies corrigendas: quorum præcipua sunt quæ sequuntur.

℞. Aquar. portulac. lactucæ, rosarum & nymphææ, an. Unc. j. syrupi violacei & nymphææ, an. ʒ. vj. salis prun. ʒ. j. Miscæ, fiat julep. sæpe iterandus. Vel

℞. Rad. althææ ʒ. j. fol. lactucæ, endiviæ, portulac. & summit. Malvæ, an. M. j. sem. melon. cucurbitæ, malvæ, lactucæ, & papav. albi, ana Drach. iij. jujubar. sebesten, an. par. vj. violar. ros. & nymphææ, an. P. j. Coquantur ad ℥. j. β. In colatura dissolve syrupi violac. jujubini, & de papavere alb. ana Unc. j. sem. Salis prunell. Unc. sem. Fiat julep. pro iv. dosibus, bis in die sumendis.

Emulsiones etiam usurpari poterunt, quamvis sint diuretica, quia refrigerant, & vesicæ meatus leniter expurgant, in hunc modum compositæ.

℞. Quatuor sem. frig. major. & papav. albi, an. Drach. iij. amygdal. dulc. excortic. & in aqua frig. infusar. Unc. β. Contundantur in mortario marmoreo, sensim affundendo decocti hordei excorticati, liquir. portulac. & summit. malvæ ℥. j. sem. Fiat emulsio pro iij. dosibus, addendo unicuique dosi syrup. violac. Unc. j. salis prunellæ Drach. j. Si dolor sit acerbior, aliquid syrupi de papavere admisceri potest. Tum etiam gummi arab. pulv. Drach. j. utiliter additur, vel syrup. alth. Fern. de mucilaginibus.

Juscula etiam parari possunt in hunc modum.

℞. Rad. althææ Unc. sem. malvæ M. j. liquirit. Unc. β. Sem. cydon. Drach. j. Bulliant cum jusculo pulli vel gallinæ. Fiat jusculum, per plures dies iterandum.

Conveniet etiam non parum serum lactis caprilli, ma-

gno hauustu exhibitum, ut in calida hepatis intemperie dictum est.

Imò & majori efficacia, absente febre, lac integrum præsertim asininum, propinari poterit; quod non solum detergit, sed etiam dolorem mulcet, & humorum acrimoniam contemperat.

In diuturno autem affectu, aquæ minerales, refrigerantes, præsertim aluminosæ & ferratæ, aut parum vitriolatæ, plurimum conferunt. Experimentiâ enim compertum est, aquas nostras Meynenfes simili virtute præditas, hujusmodi affectus, quamvis inveteratos, interdum sustulisse.

Loco juleporum prædictorum, simplex malvæ decoctum cum syrupo violaceo usurpari poterit, quo seipsum Forestus *obs. 4. lib. 25.* & gravissima dysuria liberatum refert: dicitque nihil æquè juvisse, ac dictum decoctum, eoque se alios ægros similiter laborantes curasse.

Idem Forestus *obs. 3. ejusdem libri*, dicit quendam Jacobum Joannis, Pharmacopœum, aqua rosacæ cum albumine ovi concussâ, & ad medium scutellæ ebibita, seipsum & alios curasse.

Tradit etiam ibidem Forestus, senem quendam Delphensem, decocto flor. chamæmeli cum lacte bubulo, ex mulierculæ consilio fuisse curatum.

Aminatus Lusitanus *curatione 56. cent. 6.* dicit quendam mulierem, dysuria laborantem, quæ multis remediis ibidem recensitis curari non potuerat, usu conservæ florum malvæ fuisse persanata. Sumebat autem illius conservæ ʒ. j. manè & vesperi, superbibendo aquæ malvæ. ʒ. iij. Et idem *curatione sequenti 59.* dicit, senem quendam, ab excreto lapillo dysuria laborantem, eadem conserva, eodem modo usurpata, intra triduum fuisse liberatum, conserva flor. althææ est ejusdem, vel majoris efficaciæ.

Quidam Practici commendant trochiscos alkekengi ad Drach. j. cum liquore idoneo exhibitos, quia diuretici sunt, urinæ acrimoniam obtundunt, & stupefaciunt.

Dolore admodum urgente, non inutile est, dum urina redditur, penem demergere in lac tepidum, vel decoctum malvæ, & sem. papav. albi. Imò & aqua sola tepida non parum conducit ad hujusmodi dolorem & ardorem minuendum.

Pro potu, leve decoctum malvæ, cum syrupo violaceo, aut conserva rosarum agitatam, erit utilissimum.

Ad eundem verò ardorem leniendum, sunt etiam injectiones in vesicæ ductum, ex lacte, emulsione semin. frigid. aqua plantag. sero lactis, quibus addi potest liquor albuminis ovi probè concussi, vel trochiscor. alkekengi ʒ. j.

Externa etiam remedia ad hujusmodi ardores temperandos non parum conducunt, qualia sunt balnea, vel semicupia, & fomenta pubi & perineæo admota, ex decocto herbarum refrigerantium parata. Linimenta ex oleo rosac. nymphææ, unguento rosaceo, refrigerante Galeni, populeone, cum caphura, & mucilag. psyll. extr. in aqua plantag. Renibus etiam & jecori adinovenda epithemata refrigerantis, & linimenta prædicta; tum ea, quæ ad jecoris, & renum intemperiem calidiorem supra proposita sunt.

Quando humores acres & biliosi fluunt ab hepate, ad eorum derivationem conveniet causticum tibie dextræ, tum apertio hæmorrhoidum, quæ omnibus renum & vesicæ affectibus utilissima est, juxta Aphor. 11. sect. 6, quandoquidem ab eodem ramo splenico ad renes, vesicam, & hæmorrhoides venæ disseminantur.



# P R A X E O S M E D I C Æ

## LIBER DECIMUS QUINTUS.

### D E M O R B I S M U L I E R U M .

#### P R Æ F A T I O .

**M**ORBI mulierum appellantur ij, qui mulieribus proprii sunt, & à vitio illius partis emanant, quæ mulieribus propria est, uteri nimirum, de quo non sine ratione dixit Democritus in epistola ad Hippocratem, eum sexcentarum, & innumerarum calamitatum autorem esse. Nos igitur, ut affectus uteri præcipuos, & in Praxi Medica frequentius occurrentes, quadam methodo exponamus, eos ita dividemus, ut alii à vasis uteri dependant, alii in ipso uteri corpore, illiusque cavitate resident; alii verò præcipuam illius actionem, & opus nobilissimum nempe generationem respiciant. A vasis uteri male affectis & causis præternaturalibus ea obsidentibus, dependent chlorosis; mensium suppressio, & fluxus immodicus; fluores albi, seu fluor muliebri; furor uterinus, & hysterica passio. In ipso uteri corpore, illiusque cavitate resident inflammatio, ulcus, scirrhus, cancer, gangrena & sphacelus, hydrops uteri, procidentia & clausura. Illi autem affectus generationi quidem officere possunt, sed tantum per accidens. Affectus verò, totum generationis opus, nempe conceptionem, graviditatem, & partum respicientes sunt, sterilitas, morbi acuti & chronici prægnantium, abortus difficilis, fœtus mortuus, secundinæ retentæ, fluxus lochiorum immodicus, suppressio lochiorum, tormina à partu, & morbi acuti puerperarum. Quos omnes affectus brevissimâ ratione, quantum rei dignitas ferre poterit, elucubrare aggredimur.

#### C A P U T P R I M U M .

##### De Chlorosi, seu pallidis Virginum coloribus.

**H**ic affectus ab Hippocr. Chlorosis, & recentioribus febris alba, febris amatoria, morbus virgineus, pallidi virginum colores, & icterus albus appellatur.

Definiri potest, vitiosus corporis habitus, ab obstructione venarum hepatis, lienis ac mesenterii, & præcipue earum, quæ sunt circa uterum, quam sequuntur plerumque gravitas membrorum, palpitatio cordis, difficultas spirandi, rerum absurdarum appetitus, & alia symptomata.

Pendet igitur hic affectus immediate ab obstructionibus partium infimi ventris, præcipue earum venarum, quæ sunt circa uterum, quæ liberum sanguinis affluxum ad uterum impediunt, unde ille, copiâ luxurians in virginibus, quando menstruæ purgationes apparere incipiunt, si ab illis obstructionibus impediuntur, sanguis refluit ad partes superiores, & cor, hepar, lienem, diaphragma, aliasque partes opprimit, earumque calorem nativum obruit, & vasa obstruit, unde vitiosa fit in visceribus concoctio, & hinc crudi humores in toto corpore cumulantur, qui ad habitum corporis delati, cachexiam excitant; in reliquis verò partibus varia symptomata producant. In hypochondriis enim viscerum intumescantiam pariunt, à qua diaphragma comprimitur, unde difficultas spirandi emergit. Quia verò sanguis crassus, & flatulentus spiritus, per venæ cavæ & magnæ arteriæ ramos ad cor deferuntur, quorum noxam excutere contendens, ne suffocetur, frequentî arteriarum motu elevatur, palpitatio cordis emanat, quam etiam temporum pulsationes frequenter consequuntur. Præterea cibi fastidio huiusmodi virgines frequenter corripiuntur, quia ob malam concoctionem, & distributionem, ventriculus magnâ crudorum excrementorum copiâ refertus est. Quæ excrementa vitiosam, ex peculiari quadam corruptelâ,

qualitatem adepta, pravorum eduliorum, imò rerum absurdarum minimè alibilium appetentiam inducunt, ut salis, aromatum, gypsi, carbonum, cinerum, & similium qui affectus pica & malacia nominantur, & à nobis inter affectus ventriculi, capite proprio fusè explicantur.

Causæ obstructionum, quæ in venis uteri & hypochondriorum contingunt, sunt humores crassi, viscosi & crudi ex prava plerumque victus ratione geniti. Virgines enim istæ largo aquæ frigidæ potu hora somni, vel manè jejuno stomacho utuntur; aliæ acetum, olera, fructus immaturos, vel ipsam nivem & glaciem avidissimè devorant; unde calor partium nativus obruitur, & magnus fit crudorum excrementorum proventus: aliæ nimio somno indulgent, aliæ otio immodico, ut quæ suendi causa, pulvinaribus toto die affixæ, maximo sæpe frigore torquentur: aliæ intempestivis vigiliis & exercitationibus utuntur, ut choreis, statim à pastu, quas in longam noctem cum suis amatoribus perducunt, quibus ut plurimum accedunt gravissimæ curæ, & varia animi pathemata, ex quibus coctiones ordinariæ plurimum evertuntur, & multa cacochymia inducitur.

Diagnosis ex sequenti symptomatum serie manifesta evadet.

Primò sese offert faciei, & totius corporis color pallidus & subalbidus; interdum verò plumbeus, lividus, aut virescens. Cum enim in hoc affectu humores crudi, pituitosi, ac serosi abundant, & ad habitum corporis deferantur, colorem toti corpori inducunt, & si pituita, bilis, aut melancholia permisceatur, color inde subflavus, virescens, aut lividus efficitur.

Secundò, inflatio & quædam intumescantia in facie & palpebris, apparet, præcipue post somnum; quia per noctem conclusus calor plures vapores elevavit, quàm dissipare potuerit. Crura quoque & pedes, præcipue circa malleolos intumescunt, totumque corpus laxum & molle evadit, ob eandem pituitosorum ac serosorum humorum abundantiam.

Tertiò gravitas & segnities totius corporis adest, crurum ac pedum tensiva lassitudo, devolutis sua gravitate humoribus ad partes illas decliviores.

Quartò, respiratio difficilis est, præsertim cum se vehementer movent, aut loca alta & acclivia conscendunt. Tunc enim sanguis crassus incalescit, ex eoque multi vapores elevantur qui difficultatem spirandi pariunt.

Quintò, cordis adest palpitatio & pulsatio in arteriis temporum, dum corpus commovetur & exagitur, propter eandem evaporationem, quæ ab humoribus crassis excitatur, aucto per exercitationem calore.

Sextò, dolor capitis gravans ac diuturnus sæpe ægrotautes affligit, & interdum in occipito, dum uterus compatitur; in sincipite verò ac fronte, dum ab hypochondriis magni vapores elevantur.

Septimò, pulsus est celer & frequens, ut febricitare videantur, & ideò hic affectus dicitur febris alba, propter illam pulsus frequentiam, quæ talis efficitur, quia cum facultas vitalis debilis sit, unde pulsus parvus emergit, natura parvitatem frequentiam cogitur compensare.

Octavò, somnus gravis est ac profundus, ita ut ad meridiem usque somnum producant, nisi expergiscantur, qui à vaporibus crassis ac copiosis, ex illuvie pituitosa elevatis excitatur.

Nonò,



Nonò, ingens adest ciborum, præcipuè, euchimorum fastidium, propter maximam humorum crudorum in ventriculo ac vicinis partibus collectionem; qui humores, deteriore tandem conditionem adepti, picam, & rerum absurdarum appetitum inducunt.

Denique malo ingravescente, & multiplicatis obstructionibus, suppressio mensium tandem consequitur, quæ profectum affectum, ac veluti confirmatum ostendit.

Quod ad prognosin attinet: Affectus iste ut plurimum periculosus non est, & ad longum tempus perseverat. Si tamen nimium negligatur, & alias radices agere permittatur, ita ut magna nutritionis depravatio contingat, partium naturalium graves affectus, ut scirrhi, alique tumores, tum etiam propriæ substantiæ corruptiones contingunt, quæ per hydropem, febres longas, aliosque graves casus ad interitum perducunt.

Quando levior est affectus & à venarum uteri obstructionibus potissimum oriundus, in juveniculis virginibus conjugio feliciter curatur.

Mulieres, quæ diutius hoc affectu laborarunt, aut steriles fiunt; aut prolem morbosam, debilem, ac parum vitalem edunt.

Magna salutis spes eludet, quando menstrua statas periodos repetunt, & debitâ quantitate & qualitate donatâ progrediuntur.

Curatio hujus affectus perficitur obstructionum apertione, vitiosorum humorum ex toto corpore vacatione, & intemperiei viscerum correctione, eorumque roboratione.

Obstructiones auferuntur iisdem remediis, quæ in obstructionum hepatis & lienis curationibus fuere propositæ, additis nonnullis, quæ uterum respiciunt, & ad venarum ejus obstructiones referendas magis appropriata sunt.

Prinò igitur medicamentum purgans exhibendum est, laborantis naturæ & temperamento congruum, ex benignioribus compositum, ut primam tantum regionem evacuet, idque præmissis clystere, si alvus non sit libera.

Postea verò venæ sectio erit celebranda, si affectus non fuerit inveteratus admodum, & puella valde exsanguis vel ad cachexiam inclinans. Vena autem brachii ab initio erit aperienda, quamvis menstrua suppressa fuerint. Si enim ex pede sanguis tunc temporis detrahatur, majores fient venarum uteri obstructiones, aucta earum plenitudine. Ex brachio denique sinistro sanguis detrahetur, si lien magis obstructus sit: è dextro verò, si hepar obstructiones magis invaserint.

Educta ea sanguinis quantitas, quæ necessaria fuerit; solennis purgatio instituenda est apozemate aperiente & purgante, quale in obstructionis hepatis curatione fuit propositum. Cui addentur herbæ utero peculiæ, ut artemisia, matricaria, pulegium: & si lien obstructus fuerit, addi etiam poterunt, quæ illum peculiariter respiciunt, ut cortex capparis ceterach, scolopendrium. Si verò biliosum fuerit temperamentum, & calidioris & siccioris hepatis indicia apparuerint; calidiora omnia simplicia apozemati erunt detrahenda, & aperientia frigida eorum loco substituenda.

In puellis delicatioribus, loco apozematis iuscula, in dicta curatione obstructionis hepatis descripta, usurpari poterunt, ejusdemque simplicia immutari, ut de apozemate dictum est.

Interim foras & linimentum, dicto loco descripta, ad moveri debent, non solum regioni hepatis; sed etiam lienis & uteri.

Peractâ solemnî purgatione, paretur sequens balneum, ad vasa aperienda & relaxanda, & materiam obstructionum fundendam, atque digerendam. Cujus tanta est efficacia, ut aliquando viderimus, quibusdam ægrotantibus menstruas purgationes in tercio aut quarto balneo profluere incepisse, quæ longum tempus antea delituerant.

℞. Rad. althææ, liliorum, enulæ campanæ, bryoniæ, cucumeris agreßus, ana ℥. ij. foliorum malvæ, violariæ, mercurialis, pulegii, matricariæ, melissæ, ana M. iv. feminis lini & scenug. leviter contusi, ana Unc. ij. Coquantur in aqua fontis pro balneo, quod ingredietur tepide, bis

in die sine sudore, longè à passu, per biduum, singulis diebus decocto renovato.

Postdie ultimi balnei, si mensium suppressio adfuerit, aperiantur venæ inferiores, & emittatur sanguis ad Unc. ij. Idque bis, aut ter repeti poterit eo tempore, quo menses fluere solebant. At si nunquam adhuc apparuerint, quo tempore ægra magis affici & gravis laborare solita est.

Absolutis hisce remediis, ad viscera roboranda, & obstructionum reliquias conterendas, conveniet opiata aperiens & roborans, dicto loco descripta. Cui similiter sæcula bryoniæ & sal artemisiæ utriusque ad Drach. ij. addi poterunt.

Quia verò non rarò adeò contumaces sunt obstructiones, ut primis remediis non cedant; in hoc casu syrupus magistralis parari poterit, ex materiâ apozematis præscripti, auctâ purgantium dosi, quo utetur ægra bis aut ter in mense.

Pilulæ etiam usuales erunt efficacissimæ, quales in dicta obstructionis hepatis curatione fuerunt propositæ: quibus utiliter addentur remedia, ex tartaro vitriolato & chalybè composita, ibidem descripta.

Zacutus Lusitanus *observ. 99. lib. 2.* proponit historiam cujusdam mulieris, quæ chlorolim per decennium cum mensium suppressione passa erat, & variis purgantibus & aperientibus remediis, quibus chalybs etiam accesserat, curari non potuerat. Hanc ipse curavit conservâ artemisiæ, triginta dierum spatio exhibita, superbibendo aquam stillatiam sabinæ, in qua per noctem rhabbarum maderat.

Idem Zacutus *observ. 117. lib. 3.* aliam proponit historiam cujusdam virginis, quæ multo sale sese ingurgitans ex diuturno atque assiduo illius usu incidit in diarrhœam biliosam, cum tabe implicatam. Quam ipse curavit post totius providentiam, lacte caprino chalybeato, & frigidis hepati applicitis.

In contumacissimis & diuturnis obstructionibus, causticum tibiarum dextræ, vel sinistræ, ( prout hepar, aut lien afficitur ) inustum, plurimum conferre poterit.

Referatis magnâ ex parte obstructionibus, humores pituitosi ac serosi, tum in venis residui, tum præcipuè in habitu corporis stagnantes, per sudores resolvendi sunt. Cui usui conveniet decoctum guaiaci, in naturis frigidioribus, vel radices chinæ ac falsæ parillæ, in calidioribus per quindecim aut viginti dies exhibitum. Hâc cautione adhibita, ut quarto aut quinto quoque die, intermisso sudore, catharticum detur, quod humorem circum viscera collectum, præparatum, ac concoctum ( ad sudores ineptum ) per alvum detrahat. Alioqui intus si resistet, ibi obdurefcens & putrescens, febris & aliorum morborum occasio erit. In eundem finem thermæ sulphuræ usurpari poterunt, quales sunt nostræ Balerucanæ, tam potu, quàm balneo. Potu enim istarum aquarum, expeditis prius & liberatis viis, remediis antea propositis, detergitur excluditurque humor, in prima & secunda corporis regione contentus, per alvi & urinæ profluvium: tertia verò regio, excitatis à balneo sudoribus, ab humorum sarcina liberatur.

Ac denique congressus, si legitimè fieri possit, post deobstruentium remedium usum erit utilissimus, illo enim calor naturalis in partibus naturalibus multum excitatur, quo uteri vasa impensè dilatantur. Et docet experientia, interdum primâ conjugii nocte pallidis istis mensium fluxum excitari, aliis verò, quæ optimâ fruuntur valitudine, tempus consuetum anticipari.

## CAPUT II.

### De suppressione Mensium.

**M**ensium suppressio adesse dicitur, quando in scæmina, ætate matura, quæ nec lactat, nec gravis est, sanguinis per uterum evacuatio, quæ naturaliter singulis mensibus fieri consuevit, rariùs aut parciùs procedit, aut omninò supprimitur.

Causa illius suppressionis vel ad uterum referenda est, vel



vel ad vasa illius; vel ad sanguinem, qui per illas fluit, aut fluere debet.

Uteri varii morbi suppressionem istam efficere possunt: intemperies nimirum frigida & sicca, densando & constringendo corpus uteri: vel calida & sicca, partem eandem exsiccando, vel ejusdem alimentum exurendo, unde pravi humores generantur, qui parti infixi liberum mensium effluxum prohibent: Morbi etiam organici ejusdem partis nempe inflammatio, vel scirrhus, distorsio osculi interioris, vel compressio, facta à tumoribus partium vicinarum, aut omenti crassioris, ipsius uteri densitas & crassities nimia, ulcera, & cicatrices, ab iis relictæ, aut ex laceratione cotyledonum, in violento abortu.

Vasa uteri non raro obstructions patiuntur, quæ frequentissima est causa mensium suppressionis, ab humoribus frigidis & crassis oriundæ. Interdum etiam à constrictione earum venarum suppressio hæc contigit, quæ fit à partibus vicinis distentis vel tumefactis, ut de ipsius uteri adstrictione dictum est.

Sanguis quantitate, qualitate vel motu peccans, causa esse potest suppressionis mensium. Quantitate peccat aucta vel imminuta. Aucta, si nimia copia in venis redundet: tunc enim venas nimium distendit, ut sese contrahere nequeant ad expulsionem: quemadmodum vesica nimis repleta urinam emittere nequit ob eandem distensionem, imminuta verò, quia paucus & imminutus sanguis in corpore retinetur ad illius nutritionem.

Sanguis qualitate peccat, dum crassior & viscidior est ex se & propria natura propter frigidam hepatis aliarumque partium intemperiem, vel ex humorum crassorum pituitosorum scilicet aut melancholicorum permixtione, unde plerumque obstructions oriuntur.

Motu verò peccat, cum per alias vias excernitur, ut per nares, vomitum, sputum, urinas, hæmorrhoides, & multas alias partes. Vidi puellam, pustulam habentem in capite, quæ singulis mensibus aperiebatur, & satis copiosum sanguinem fundebat. Multas verò vidimus sanguinem periodicè per pulmonem rejicientes, quæ evacuatio purgationis menstruæ vicem gerebat.

Causæ externæ, suppressionem sanguinis promoventes sunt, aer frigidior & siccior, ut Aquilonia tempestas; ingressus præceps in aquam frigidam, aut nimia in ea mora, præcipue dum fluunt purgationes menstruæ, cibi pauciores vel copiosiores, crassiores & frigidiores, vel adstringendi vi præditi; calidiores etiam id faciunt, ut nimius salis usus, & aromatum, exsiccando hepatis, aliarumque partium substantiam, & sanguinem ipsum absumendo atque exassando, unde crassitiem acquirit, obstructionibus efficiendis idoneam: exercitationes vehementes, & vigilie immodicæ sanguinem valde absumentes: somnus diuturnus & otium immodicum, calorem nativum enervans & cruditates multiplicans: excreta & retenta, naturæ limites excedentia, ut hæmorrhagia narium, aut hæmorrhoidum, diarrhœæ, aliæque evacuationes diuturnæ per vomitum, urinas, aut sudores. Ac denique animi pathemata graviora, ut iracundia vehemens, timor subitus, moeror perseverans, zelotypia gravis, & similia.

Diagnosis suppressionis mensium ex ipsius ægrotantis relatu mutuanda est. Sed quia illa vel à causis præternaturalibus procedit; vel à naturalibus, puta graviditate; signa utriusque suppressionis distinctiva proponenda sunt, ne Medicus à mulierculis, graviditatem ex illegitimo concubitu contractam tegere conantibus, decipiat, neve remedia menses provocantia gravidæ mulieri temerè præscribat.

Primò igitur gravidæ ut plurimum naturalem retinent colorem, qui in aliis valde immutatur, & pallidus ac fœdus efficitur.

Secundò, symptomata, quæ gravidis in principio accidere solent, in dies paulatim mirentur contra verò in simplici mensium suppressione quò diutius menses subsistunt, eò magis symptomata augentur.

Tertiò, in gravidis post tertium mensem, motus & situs infantis sensibilibiter percipitur, admota ventri inferiori manu: in aliis verò sentitur quidem aliquis tumor; sed

Laz. Riverii Opera.

œdematosus, ac minimè durus qui circumscriptionem non habet semper cum utero limitatam.

Quartò, si osculum uteri interius à perita obstetrice tangitur, non ita exactè clausum, ut in gravidis, percipitur sed potius durum contractum, & quodam dolore affectum.

Quintò, gravidæ ut plurimum hilares sunt & parum in animi pathematis mutantur: contra verò in suppressione mensium plerumque mœstæ fiunt, & tristitia afficiuntur.

Signa causarum in hunc modum se habent.

Uteri vitia, quæ suppressionem mensium efficere valent, sequentibus capitibus erunt explicanda; maxima tamen pars eorum ex relatu ægrotantis, inspectione item & contactu earum partium percipi potest.

Obstructions & angustiae vasorum uteri cognoscuntur ex labore & molestia, quæ in lumbis & partibus utero vicinis, instante potissimum menstruæ purgationis tempore percipiuntur, & quid tunc temporis effluat, mucosum, subalbidum, aut subnigricans apparet. Affectus verò partium vicinarum, quæ uteri os aut venas occludere possunt, ex propriis signis apparebunt.

Sanguis in venis redundans sese evidenter profert ex venis admodum distentis in cruribus & brachiis. Tum si foemina carnosior & rubicundior evaserit; cibisque lautioribus sese per multum tempus impleverit. Defectus verò sanguinis erit conjiciendus, si foemina obesior fuerit; si febrem diuturnam, longam inedia, aut cibi fastidium passa fuerit. Prava verò sanguinis qualitas, ex pravo corporis habitu, hepatis aut aliarum partium vitio, & præsertim ex ipsius sanguinis consideratione, & si tantillum ex eo effluat, innotescet. Motus verò sanguinis præposterus, quando nempe per alias vias effluit, per se satis sensibus manifestatur.

Quod ad prognosin attinet: mensium suppressio periculosissima est, ex eaque multi atque gravissimi morbi oriuntur, & quidem alii in ipso utero, ut tumores, abscessus & ulcera: alii in toto corpore variisque partibus, ut febres, obstructions, cachexiæ, cibi fastidium, hydrops, cardialgia, tussis, difficilis respiratio, lypothymia, ophthalmia, mania, melancholia, capitis dolor, arthritis, & alii non pauci. Progressum noxarum, quæ ex suppressione mensium oriuntur: eleganter proposuit Hippocr. lib. de morbis mulierum, his verbis: *Tertio mense post suppressa menstrua, incipiunt sentire suffocationes & horrores, lumborum gravitatem, & quandoque febrem. Quod si suppressio diutius perseveret; jam illi obdurefcit venter, urina copiosior mingitur, cibus fastidium & vigilie ingravescunt; ita ut inter dormiendam dentibus strideat; & si adhuc retineantur, quinto mense his omnibus, & maxime doloribus urgebitur gravius, sed sexto mense insanabilis morbus redditur, qui antea curari poterat. Et cum hoc anxia sit, & animo inquietur, pituitum vomit: sitis magna vexatur, dolebunt partes ventris & pectoris: febris accedit, supprimenturque alvi excrementa atque vesica, spina dorsi dolore vexabitur, estque & quasi balbuties. Posthac autem intumescent crura, pedes, venter, & urina mingitur rubra sanguineaque, & dolor totum occupat corpus, maxime, colulum, spinam, & inguina, atque sic moriuntur: scilicet ex hydrope.* Hæc Hippocrates. In hoc contextu dubium facit quod dicit author sexto mense morbum esse insanabilem: contrarium enim docetur experientiâ: & ipse Hipp. 4. epid. refert ancillam quandam, cui per septennium suppressa fuerant menstrua, illis tandem redeuntibus, sanitati fuisse restitutam. Conciliari potest Hipp. cum seipso, dicendo, ultra sex menses morbum esse insanabilem, quando menstrua in ipso corpore, aut cavitate uteri retinentur; quia ibi putrescunt aut suppurantur, ut in retentis lochiis contingit: hoc tamen non de quacumque suppressione esse intelligendum.

Minus periculosa est illa suppressio, quæ à multitudine sanguinis laudabilis exoritur, vel à pinguedinis copiâ, hæmorrhagiâ, & vacationibus aliis: causæ enim illæ; si non multum invaluerunt, tolli facillè possunt.

Difficilius verò curatur, quæ à succorum gravitate, vasorum obstructione, vel angustia dependet: quia rebellis iste

A a a

humor



humor, in penitiores illos meatus insinuatus, non nisi multis remediis, & diuturnâ operâ, cujus mulierculæ sunt impatientes, educi potest.

Suppressio mensium, quæ ex proprio uteri affectu proficiscitur, omnium pessima est: quia pars illa, per idiopathiam læsa, difficilè curari potest, ob perpetuum excrementorum affluxum, quorum receptioni ea maximè disposita est: ita ut corporis torius sentina ac cloaca à nonnullis non inetur.

Curatio hujus affectus pro causarum varietate variè instituenda est. Ac primum, si à nimia copia sanguinis suppressio oriatur, illius quantitas minuenda est phlebotomiâ in brachio largâ manu celebratâ. Si enim venæ inferiores prius aperirentur; traheretur magis sanguis versus uterum: ubi majorem obstructionem & vasorum distensionem efficeret, cum raptionis eorundem, aut etiam uteri inflammationis periculo.

Sublatâ plethorâ, & sanguinis multitudine, sanguis ad inferiora retrahendus est, apertis venis inferioribus circa illud tempus, quo antea laborans purgari consueverat: tum etiam frictionibus, ligaturis, cucurbitulis, tam siccis, quàm scarificatis.

Hiscæ præmissis, partes uterinæ emolliendæ & relaxandæ sunt fomentis, semicupis, & inunctionibus humectantibus & emollientibus. Quibus, si affectus pertinacior fuerit, addere poteris purgationes hystricas, & particularia medicamenta, mensis moventia, quæ in posterum proponuntur: eligendo ex iis, quæ mitiora & magis temperata fuerint.

Si propter sanguinis penuriam menstrua non procedant, ut post febres diuturnas, magnas evacuationes, & in quâvis corporis insigni extenuatione; eorum provocatio molienda non est, priusquam convenientibus alimentis purâ analeptis, corpus instauratum fuerit, & sufficiens sanguinis copia procreata, ac morbus omnis, quia extenuationis causa esse potest, debite expugnatus. Quibus præstitis, ut plurimum contingit, menstrua sponte profluere. Quod si non fiat, & natura sui muneris oblita ad pristinum officium non revertatur; apertis venis inferioribus erit incitanda, cum aliis remediis supra descriptis ita tamen ut quantitas sanguinis, qui educetur, valde sit moderata, metu virium jam dejectarum; & ne ægra in tabem præcipitetur. Hic autem diligenter est advertendum, quamvis corporis extenuatio penuriam sanguinis non indicaret; sed eam tantum, quæ magnis evacuationibus, aliisque causis consummentibus succedit. Fit enim interdum, ut menses suppressi, & in venis retentis, pravam accersant qualitatem, ob quam alendis partibus minimè idoneus sanguis efficiatur; unde corporis macies & extenuatio succedunt. Licet verò multo sanguine, pravo tamen refertæ manent, & tum temporis venæ sectio, etiam largâ manu celebratâ, plurimum conferre solet. Quod quidem luculento Galen. experimento confirmatur, qui comment. 3. in lib. 6. epid. Ego, inquit, cuidam mulierculæ, jam octo menses purgationis menstrua suppressione laboranti, extenuatissima cum esset, haud exiguo detracto sanguine, brevissimo tempore proprium habitum restitui, sicut & alias non paucas eodem modo ad sanitatem reduxi. Sed quod illi mulieri accidit (neque enim erat ignobilis) fuit valde celebre. Ipsi quidem rescissa vena est, Medicis ex remedio futuram utilitatem firmiter polliceri verentibus; quin etiam nonnulli mihi adversari audebant; non solum propter mulieris maciem, sed etiam propter inappetentiam, ex venæ sectione sequituram esse novam affirmantes. Profecto hæc melius est longiori sermone persequi, quam utrius Prodicî Hippocrates mentionem fecerit diligenter invenire conari. Verum recentiores Medici ad magis sophist. cam doctrinæ speciem destituerunt, agrotis eventum diligenter observare, & ipsorum affectus causasque, ex quibus curationis inventio acquiritur, indagare negligentes, quæ & ipsa per experientiam judicantur: In muliere sanæ, quam memoravi, primò die sanguinis sesquilibrium detraxi, rursùm postero die libram unam, tertio non multò plus semilibrâ, erant enim uncie octo. Hæc Galenus. Quibus patet, in mulieribus, mensium suppressione laborantibus: etiam

extenuatis, sanguinem largâ manu interdum esse detrahendum: quamvis hujus sæculi mulieres tantam sanguinis evacuationem, quæ Galeni temporibus educebatur, ferre minimè valeant.

A motu sanguinis præpostero suppressio mensium contingit, quando is per narium hæmorrhagiam, vomitum, aut sputum, aut hæmorrhoidas, aliæque loca non naturalia excernitur, ejusque curatio perficitur, repellendo sanguinem à partibus, per quas fluit præternaturaliter: eundemque retrahendo ad uteri vias. Primum perficitur (dum sanguis per superiora loca irrumpit) lotione brachiorum, capitis, & faciei, ex aqua frigida, & privatim exercitiis earundem partium, præcipuè cantus, & vociferationis. Secundum verò absolvitur venæ sectione partium inferiorum, factâ biduo; aut triduo, antequam sanguis erumpat; cucurbitulis femoribus & suris adhibitis, interdum siccis, sæpè etiam cum scarificatione: provocatione hæmorrhoidum, frictionibus, ligaturis, deambulationibus, fomentis, semicupis ex herbis aperientibus, inunctionibus, pessariis, clysteribus uterinis, aliisque infra describendis. Præcipuè verò commendatur balnei naturalis usus, sulphurei ac bituminosi, quod laborans pluries ingrediat, longè à passu, dummodò aqua hypochondriorum regionem non superet: eodemque tempore superiores partes flabello refrigerandæ sunt, ne calido balnei aëre etiam incalescant.

Si per hæmorrhoides fluat sanguis, & ab utero avertatur, difficillima erit curatio. Si enim trahentibus ad inferiora utaris, eadem ad sedem trahent. Si verò adstringentia sedi adhibeas: ea etiam propter viciniam repellent, quæ feruntur ad uterum. Hæc igitur una medendi ratio conferre poterit, ut postquam trahentibus ad inferiora usus fueris, localia utero adhibeas, quæ humorem commotum magis ad uterum alliciant.

At verò omnium frequentissima est illa mensium suppressio, quæ fit ab obstructionibus venarum uteri. Cujus curatio eadem propemodum est cum ea, quæ in pallidis virginum coloribus fuit proposita, nonnullis tantum additis, quæ uterum magis specificè respiciunt.

Primo igitur ea omnia sigillatim usurpari poterunt, quæ ad chlorosis curationem fuere descripta. Et ut plurimum contingit, ut referatis viscerum obstructionibus menses spontè profluant. Quorum tamen eruptionem adjuvare poterunt quæ motum humorum ad inferiora promovent, ut sectio venarum inferiorum, circa consuetam menstruorum periodum celebrata: vel vicariæ ejus cucurbitulæ, coxis & suris admotæ, tum siccæ, tunc scarificatæ: frictiones earundem partium & ligaturæ dolorificæ.

Si rebellior affectus prædictis remediis non cedat, ad ea progrediendum est, quæ peculiari virtute & proprietate specificâ menses promovere valent, quæ sub variis formulis usurpari solent. Ac primum pulveres efficacissimi, & gustui gratiores ita comparantur.

℞. Cinam. & succini an. ʒ. i. croci ʒ. ʒ. Misce, fiat pulvis sumendus aliquot matutinis. Vel

℞. Pulv. radic. rubiæ tinctorum, & sacchari pulverisati an. ʒ. i. Misce, dividatur in tres partes, quarum una detur tempore mensium, cum vino calido, summo mane in lecto, in quo maneat ægra bene cooperta per horas quinque. Si non fluxerint menses, rursus sub secunda periodo exhibeatur secunda pars. Si adhuc non apparuerint, rursus sub tertia, Vel

℞. Rad. aristol. rotundæ ʒ. ʒ. fol. sabinae siccor. ʒ. i. ʒ. dictam. cretici & trochiscor. de myrrha, sive assa foetida ob foetorem, an. ʒ. i. cinam. elect. ʒ. ii. sacchari albiss. ʒ. ii. Fiat omnium pulvis subtilissimus, de quo capiat ʒ. ii. manè per aliquot dies; cum jusculo cicerum rubrorum, in quo cinam. ʒ. ii. croci ʒ. ʒ. bullierint.

Pilulæ præstantissimæ in hunc modum componuntur.

℞. Trochisc. de myrrha Drach. i. castorei ʒ. ʒ. Cum succo artemisias, fiant pilulæ parvæ.

Inter familiaria remedia & euporista habentur flores lavendulæ; cum melle per multos dies comesti vel conserva flor. lavendulæ ad Drach. ii. exhibita.

Maximas autem habet vires sanguis hirci sylvestris



rum etiam domestici, ad menses suppressos educendos juxta præparationem & dosin, in pleuritidis curatione propolitam.

In calidioribus naturis cremor tartari per plures dies usurpatus in jusclo, vel decocto aliquo melanagogo, menses suppressos promovet.

At maximè laudantur pilulæ Montagnanæ, quæ ita se habent.

℞. Trochisc. de myrrha 3.i.β. sem. petroselini, castorei, cinam. ana 3.i. mosch. gr.x. Cum succo apii formentur pilulæ xxii. deauratæ, capiat duas manè, vel in ingressu lecti per aliquot dies. Vel

℞. Rad. rubiæ tinctorum & aristol. rotundæ, ana 3. ii. agar. & cinam. ana 3.i. croci 3.i. Cum succo artemisiæ fiat massa pilularum, cujus dosis est Drach. i.

Fermentum vetus à multis commendatur magnitudine castaneæ cum pari sacch. quantitate, per tres dies continuos exhibitum. Magis tamen proderit, si pulvis trochisc. de myrrha, dictamni, aut similis permisceatur.

Decocta usitatissima sunt, eorumque utilissima in hunc modum se habent.

℞. Rad. petrosel. & rubiæ majoris, an. 3. ii. cicerum rubr. P. iii. Coquantur ad tb. i. β. In colatura dissolve pulveris cinam. 3. i. croci 3.β. mellis q. s. Misce, capiat 3. vi. calidè, manè, bis in die, antequam menses prorumpant, vel etiam iis fluere incipientibus, si lentè procedant. Vel

Rad. apii, asparagi, foeniculi, an. Unc. i. fol. matricariæ, capill. veneris, nepetæ, pulegii, ana M. i. Coquantur ad tb. ii. Colat. Unc. iv. adde syrupi de artemisia 3. i. Bibat calidum bis in die, ut suprâ. Vel

℞. Rad. cyperi, angelicæ, valerianæ & rub. tinct. ana 3.β. fol. artem. pulegii sabinæ, an. M. . Sem. dauci, & feseleos, ana. Drach. i. dictam. cretici. Drach. i.β. cinam. electi 3. iv. croci 3. i. Fiat decoct. ad Unc. iv. In colat. dissolve syrup. de artemis. & hyssop. ana Unc. β. Fiat julep. pro dosi unica, quæ alternis diebus exhibeatur.

Quercetanus in Pharmacopea duo decocta valde commendat: quorum primum se habet.

℞. Milii solis, anisi, visci quercini, ana Drach. iii. dictamni cretici 3. i. croci 3. i. Contundenda contundantur, & macerentur per viginti quatuor horas, in vino albo generoso. Dein parum bulliant. De hoc decocto exhibe Unc. iv. Alterum decoctum ita describitur.

℞. Splenem bovis integrum. Hunc in frusta incisum in phialam vitream capacem injice, ita ut ad medietatem usque impleatur; addendo cinam. crasso modo contusi 3. i. caryophyll. 3.β. croci 3. ii. vini albi optimi q. s. ad humidandam solum materiam. Vas probè clausum ponatur in M. B. ferventissimo, adeo ut ebulliat per viginti quatuor horas, donec splen in particulas minutissimas coctus & consumptus fuerit, magnæque juris exquisitissimè cocti & fragrantissimi copia restet, de quo ægra capiat manè Unc. iv. continuando per quatuor, aut quinque dies, cum menses fluere debent.

Aquæ stillatiæ cæteris liquoribus præferendæ sunt, utpotè gustui gratiores, & quæ propter substantiæ tenuitatem facilius penetrant ad vasa uteri obstructa. Præ cæteris sequens à Mercato, Roderico à Castro, & Sennerto commendantur.

℞. Panem ferè ad fermenti naturam redactum. medio-criter coctum & calidum, cui ablato cortice adde mellis 3. xii. pulveris seminum urticæ, dauci, ameos, anisi, & foeniculi, ana 3. i. trochisc. gallæ mosch. myrrhæ rubæ, an. 3. i. cotulæ foetidæ 3. β. infundantur omnia in tb. iii. infra scriptæ decoctionis, quæ recipit phaseolorum rub. cicerum rub. an. P. β. seminis juniperi unc. i. rad. rubiæ, rusci: raphani sylvestris, asparagi, apii, & petrosel. an. Unc. sem. chamæd. recentis M. i. ameos, anisi, foeniculi, an. Unc. ii. Coquantur omnia secundum artem Deinde in B. M. stillatium liquorem extrahes, cujus Unc. ij. summo manè laboranti porriges. Addi etiam potest syrupus capill. ven. de duabus rad. de artemis. Dos is etiam sequentibus diebus augeri potest, si ventriculus non offendatur.

Guajaci, aut sassafras decoctum in pituitosis corpori-

Laz. Riverii Opera.

bus utile est, etiam cum dictamno cretico; si per duodecim, aut quindecim dies sumatur, sine sudoris provocatione. Illius experimentum refert Jacchinus in nonum Rhafis cap. 66. Ego, inquit, lignum Indicum coxi & adjunxi dictamnum. Unde mulieri, quæ jam per quinque annos nihil purgabatur, & sterilis erat, & purgationem evocavi, & partum.

Chymici commendant tartarum vitriolatum, spiritum tartari, mixturam spiritualem, sales artemisiæ, melissæ, radic. chelidoniæ, valerianæ.

Aqua theriacalis sequens ad hunc usum mirè est efficax.

℞. Theriacæ vet. Unc. v. myrrhæ rubræ Alexandrinæ Unc. ij. β. cinam. electi, croci orientalis, an. Drach. sem. camphoræ Drach. ij. Affunde optimum vini spiritum, ad eminentiam trium digitorum, & in leni calore tincturam extrahe. Cui per inclinationem effusæ adde spiritus tartari sextam partem. Dos is cochlear i. cum vino, aut aqua appropriata.

Dum prædicta remedia usurpantur clysteres frequenter injecti maximè conveniunt, ob incumbentem recto intestino uterum; & ita componi possunt.

℞. Rad. lil. Unc. i. ireos, valerianæ, an. Unc. β. mercurialis M. ij. artem. sabinæ, an. M. j. flor. chamæm. lavendulæ, ana P. j. sem. carvi, nigellæ, an. drach. j. Coquantur ad tb. j. In colatura dissolve hieræ simplicis & benedictæ laxativæ, an. Unc. β. olei cheirini Unc. ij. elect. de baccis lauri, Unc. sem. Misce. fiat clyster.

Imò verò purgationes, per intervalla repetitæ, erunt præstantissimæ, quæ variis modis institui possunt.

Ac primum laudantur maximè à Galen. pilulæ de hiera simplices & compositæ, quia præterquam quod educant convenienter humores superfluos, habent etiam facultatem vias aperiendi, & expurgandi uterum. Vel

℞. Aloës Drach. ij. massæ pilul. coch. min. 3. j. Cum succo sabinæ formentur ex 3. j. pilul. xv. de quibus exhibeantur n. vii. ad x. ante prandium, tercio quoque die. Vel

℞. Aloës Drach. j. Rhab. elect. 3. j. β. diagrid. 3. j. myrrhæ rad. asari, an. Drach. β. spicæ 3. j. Cum syrupo de artemisia fiat massa pil. Dos is à 3. ii. ad Drach. j. Vel

℞. Massæ pilular. cochiar. minor. Drach. sem. mercurii dulcis gr. xx. Cum syrup. ros. solut. formentur pilulæ v. vel vj. capiat summo mane.

Exteriùs verò mensium suppressorum provocatio adjuvari solet topicis sequentibus, ad vias dilatandas, humores attenuandos, & facultatem expultricem excitandam.

℞. Rad. bryoniæ, lilior. cyperi, valerianæ, angelicæ, asari, ireos & petroselini, an. 3. i. fol. artemis. lauri, rutæ, sabinæ, thymi, rorisinar. pulegii, nepetæ, malvæ, mercurialis an. M. j. flor. sambuci, cheiri, chamomillæ, an. P. ij. juniperi, 3. ij. Coquantur in aqua & vino albo. Colatura foveantur venter & inguina cum spongia.

Eodem decocto, aucta dosi, potest parari semicupium, in quo ægra umbilico tenus sedeat, & herbæ coctæ sacculo inclusæ ventri applicentur. Caveat tamen à sudore, qui menses potius sistit.

℞. Ol. lil. aneth. & rutacei, an. 3. sem. vini generosi, 3. iij. junci odorati, rad. cyclam. angelicæ, aristol. utriusque. fol. sabinæ, an. 3. sem. Bulliant ad vini consumptionem. Coletur & exprimatur oleum, quo inungatur regio pubis & pudendorum, calidè post fotum, vel semicupium.

Suffitus humidi fiunt ex vapore decocti fots & semicupii, quod modicè calens operiatur patellâ perforata, cui annexi debet fistula oblonga, quæ collum matricis attingat excipiatque funum manè & serò vestibus contexta.

Siccus suffitus ita confici potest.

℞. Caryophyll. cinam. macis, an. 3. ii. bacc. juniperi 3. sem. seminis nigellæ 3. i. styrac. calam. 3. ii. Fiat pulvis crassior qui carbonibus injiciatur, fumusque excipiat, ut suprâ. Vel

℞. Styrac. calamit. 3. ii. thuris 3. i. benjoini, alyptæ mosch. ana 3. sem. Caryoph. ligni aloës, cinam. an. . ii. Cum mucilag. gummi tragacanth. extracta cum aqua cinam. fiant trochisci pro suffumigio.

Pessaria in hunc modum fieri poterunt.

Aaa 2

℞. Fol.



7. Fol. mercurial. contuf. M. j. pulveris hieræ picræ, & benedictæ laxativæ, an. 3. ij. pulv. arift. longæ 3. j. mellis & fucci mercurialis q. f. Fiat peflarium. Vel

8. Agarici, myrrhæ, ana 3. ij. galbani 3. fem. Croci 3. j. Cum melle defpumato fiat peflarium, quod linteo raro inducatur, & non diù in utero relinquatur, metu inflammationis.

Pillulæ cochæ minores, in parvi peflarii formam redactæ, menses egregiè movent.

Injectiones etiam in uterum fieri folent, quæ metrenchytae, feu clyfteres uterini appellantur: abluunt enim fordes uteri parietibus adhærentes, & orificia vasorum interna referant. Parantur autem ex decocto totius præscripti, demptis acrioribus, vel ficuum pinguium cum artemifia, pulegio, mercuriali; vel ex solo fucco mercurialis depurato, in quo parùm benedictæ laxativæ fit diffolutum. Ad acriora enim afcendere nefas eft, metu inflammationis. Inò post ufum iftorum, quæ intus per horam tantùm unam morari debent, utile erit decoctum malvæ, hordei, & violarum injicere, vel parum hydromel. fero caprillo diluti.

In affectu inveterato cauteria tibiis admota, plurimùm conferre poterunt. Quamvis enim illa à Sennerto reprobentur, ex eo quòd ab utero potiùs derivent; & humoribus, qui cum fanguine ex utero fluere folent, aliam viam concilient, & inclinationem eorum ad uterum prohibeant. Attamen maximè prodeffe, Mercurialis, Varandæi, & aliorum frequentibus experimentis comprobatum eft. Per ifta enim ulcufcula fupflui humores perpetuo vacuantur, & humorum curfus ad inferiora dirigitur. At tantùm abeft, ut humorum fupfluatorum derivatio ab utero fluxum mensem avertat; quin potiùs eum provocet, fanguinem puriorem & naturæ regimini magis obedientem efficiendo, qui cum dictis humoribus ad cauteria retrahitur. Adde, quod ifti humores, nifi per has vias reducantur retenti in venis, obftructiones gement, & ita fuppreffionem augeant. Exiftimamus tamen, reftitutis menftruis purgationibus ad naturalem ftatum, cauteria effe occludenda, ut natura per uterum fupflua excludere affuefcit.

In prædictorum remediorum ufu quædam præcepta notatu digniffima obfervanda funt.

Primum, Nunquam utendum effe remediis menses moventibus, nifi præmiſſis evacuationibus univerfalibus: ne humores, ad venas uteri copioſius promoti, obftructiones augeant, aut valdè attenuati ad partes alias irruant & gravia mala producant. Quemadmodum narrat Schenkius in obfervationibus, quendam Medicum Venetum mulieri, fuppreffione menſium laboranti, non evacuata priùs pituitâ venas obſtruente, apozema quoddam dediffe, quo affumpto paulò poſt illa in paralyſin incidit.

Secundum, in menses moventium exhibitione à levioribus effe incipiendum, ad validiora fenſim progrediendo.

Tertium, Medicamenta menses moventia in majori copia effe exhibenda, quia eorum virtus retunditur in via à ventriculo ad uterum.

Quartum, Medicamenta prædicta effe exhibenda vel horis matutinis jejuno ventriculo, vel etiam aliquando ſub ingreſſu, aut egreſſu balnei: ita enim in calidum ac ſolutum corpus illabens medicina, vires ſuas potenter exerit: & multò adhuc efficacius, ſi ante venarum inferiorum aperturem illa exhibeantur.

Quintum, Peflaria, & clyſteres uterinos nuptis & viro utentibus duntaxat præſcribi debere: virginibus verò formæta, inſeſſus & fuſſumigia ſufficere.

Sextum, In bilioſis, aut melancholicis temperamentis, calidiora omnia medicamenta effe devianda, ac mitiora tantùm uſurpanda, iſſque aperientia temperata & humectantia atque emollientia effe permiscenda.

### C A P U T III.

#### De fluxu menſium immodico.

**M**enſium fluxus moderatâ quantitate, ac debito tempore procedens, naturalis eſt; ſi verò quantitatis

modum excedat, vel frequentius redeat, vel diutius perſe-veret: immodicus ac præternaturalis cenſendus eſt.

Cauſæ menſium fluxus immodici eadem ſunt, quæ in hæmoptiſis productione concurrere, ſuo loco diximus: nempe anafſtomofis, diapedeſis, diareſis, & diabroſis, quæ ſiunt à ſanguinis quantitate nimia, caliditate, tenuitate, vel acrimonia, icſtu, vel caſu, aut vulnere, quæ in hæmoptiſis theoria fuſius expoſita ſunt, ut hic repetere non opus ſit. Ideò lectorem ad dictum caput perlegendum remittimus.

Diagnosis ad dictum affectum, illiusque cauſam dirigenda eſt. Fluxum menſium immodicum & præternaturalem oftendunt, difficilis tolerantia, virium lapſus, inappetentia, cruditas & cachexia, color cadaverofus, pedum intumeſcentia, & alii affectus graviores, qui caloris nativi exſolutionem conſequitur.

Cauſarum verò diagnosis in hunc modum inſtituenda eſt.

Per diapedeſin ſanguinem fluere oftendunt, rarus corporis habitus & carniū mollities, cibi & potus uſus, ſerum multiplicare idonei: ac præſertim ipſe ſanguis dilutus ac ſerofus, qui facilè in linteis dignoſcitur.

Per anafſtomofin, vel thixin ſanguinem fluere oftendunt, vulnera, caſus, aut contuſiones prægreſſæ, ſaltus, clamores, & geſtatio ponderis inſoliti in corpore plethorico, & multo ſanguine reſerto, vel ingens æſtus, frigus immodicum, coitus immoderatus, iracundia inſignis, & ſimilia. Idem contingit poſt partus laborioſos, vel ab imperita obſterrice miniſtratos, poſt abortus, vel diuturnam menſium ſuppreſſionem, quæ collectum nimia copia ſanguinem, confer-tim deinde affluere facit.

Diabroſin, ſeu ulcerationem in utero factam indicant; ſanguis paulatim exſtillans, cum ſenſu doloris & acrimonia, humores ſalti & acres in corpore redundantes. Sanguis verò affluens primo ſanioſus, ichorofus, nigricans, aut flavus profunditur: poſtmodum verò, ſi ulceratio augeatur, fruſtula quædam partis deraduntur, à quibus deinde magna ſequitur ſanguinis effuſio, quam ſiſtere difficile eſt. Præceſſerunt cauſæ cacoſymiam generantes, ut uſus ciborum acrium, ſalſorum, putridorum, & ſimilium.

Prognofin quod attinet: Omnis hæmorrhagia copioſior vel diuturnior periculofa eſt, præcipuè ex utero, quæ non ſolum individuo, ſed etiam ſpeciei noxia eſt.

Diapedeſis omnium minimè periculofa eſt, quia minorem efficit caloris & ſpirituū jaſturam, diutius tamen perdurat, propter crudioris & ſereſioris ſanguinis proventum.

Rhix & anafſtomofis majus inferunt periculum, quia magnam ſubito profundunt ſanguinis copiam: citius tamen curantur, quia corporibus benè ſanis & plethoricis ut plurimum contingunt.

Diabroſis verò omnium difficillima eſt, quia in ulcere fit ſubſtantia deperditio, quæ novum iſtarum partium coalitum impedit.

Si virium debilitas & ſymptomatum vehementia nullo modo minuantur, ſed in dies augeantur, ægræ interitum portendit.

In ſenefcente muliere menſtruorum nimius fluxus plerumque incurabilis & lethalis eſt.

Curatio menſium fluxus immodici eadem ferè effe debet, quæ ad immodicum hæmorrhoidum fluxum fuit propoſita.

Primò enim phlebotomia revulſionis gratiâ in brachio celebranda eſt, partitis vicibus, & digito per vices foramini admoto. Magnâ copiâ ſanguis detrahendus eſt, quantum vires ferre poſſunt. Teſtatur Hollerius *com. aphor. 50. ſect. 5.* ſe multas vidiffe mulieres, quæ detracto multo ſanguine è vena, convaluerunt, cum nullis aliis remediis poſſet reprimi fluxus ſanguinis.

Frictiones, ligaturæ, & cucurbitulæ ad revulſionem etiam conveniunt, ut in dicta curatione, præcipuè verò mammis, juxta Aphor. Hippocr. citatum: *Mulieri, inquit, ſi placet menſtrua ſiſtere, cucurbitulam quàm magnam ad mammæ appone.* Si tamen admotâ cucurbitulâ difficultas ſpirandi oriatur, ſubito auferenda eſt.

Purgatio pariter eadem, ut in dicta curatione, convenire poteſt: eaque ſemel, aut bis in hebdomada erit repetenda do-



## Cap. III. De fluxu mensium immodico. 373

donec impuritati viscerum & venarum sit provisum. Sublatis enim biliosis & serosis humoribus, qui sanguinem fluidum reddunt, ipse sponte consistit. Si serum magis abundare videatur, radix mechoacan. cum rhabbarbo conveniet.

Purgatio etiam per vomitum potenter revellit, & ab Hipp. laudatur 2. de morb. mulierum. Blanda autem debent esse vomitoria, & frequenter iterata, aut etiam digito in os immisso vomitus provocari poterit. Imò verò sufficiet, eritque utilissimum, ante prandium vomitum ciere, attamen non vomere, sed solum id tentare.

Postmodum julepi, pulveres, opiatae, pilulae, aliàque remedia incrassantia & adstringentia, in dicta curatione proposita, hic etiam convenient, additis etiam narcoticis, si urgeat necessitas. Quibus sequentia utiliter addi poterunt, à doctissimis viris experta.

24. Cortices duorum ovorum recentium ustos, thuris, massiches, ana Unc. sem. margarit. præparat. corall. rubri præp. carabes, ana 3. ii. lapid. hæmatit. smaragdi præp. ana 3. sem. farinae hordei sine furfure P. ii. albumina ovorum numero 1 v. & si opus fuerit, adde parum aquæ chalybeatae; & fiant duæ placentæ, quæ in furno coquantur, ut possint in pulverem redigi. Dosis à 3. sem. ad 3. i. cum jusculo pedum vervecis summo mane. Hoc pulvere multas mulieres hoc affectu satis antiquo curatas fuisse testatur Joannes Michaël Paschalius. Laudatur quoque pulvis solus corticis ovi ad 3. i. exhibitus in aurora per aliquot dies, & habetur pro secreto.

Forestus sequentem pulverem commendat, quem dicit esse unum ex arcanis præceptoris sui Helidai. Accipit turturæ moderatè pinguem, ab intestinis repurgatam, & lotum vino rubro adstringente, & aquâ rosaceâ. Deinde massiches 3. i. in ventre ponit, & assuit, ne elabi possit, atque in veru ad ignem rotat, & inter assandum, loco butyri, aceto rosaceo aspergit, pinguedinemque ex eo defluentem colligit, & usui servat. Post perfectam assationem, turturæ in ollam novam vitream conjicit, luto philosophico obturatam; & in furnum calidum demittit, ut turturæ perfectè exsiccare possit; quem postea in pulverem redigit. Cujus cochlear unum exhibet omni mane, cum aqua plantaginis, aut decocto adstringente. Et pinguedine reservata regionem renum, pubis, & inguinum iungit.

Nostrates mulieres vulgare habent remedium ex floribus chameleontis, quibus lac condensare solent. Exhibent cum jusculo, aut alio liquore. Aliæ utuntur coagulo hœdi, vel leporis ad 3. sem. quod & sanguinem fluentem sistit, & concretum in utero dissolvit.

Succus plantaginis inter aliqua remedia præstantissimum censetur à Gal. si recenter extractus ad 3. iii. vel iv. exhibeatur.

Solenander dicto succo colophoniam addit, & infallibile remedium asserit, his verbis: *Ad constringendam menstruum rubrum antiquum; Accipe succi plantaginis cyathum unum. Impone Drach. i. colophonie pulverisatæ, & tribue agræ. Id fiat quater, & erit curata infallenter, Deo dante.*

Succus millefolii huic usui etiam convenientissimus est, si ejus 3. ii. vel iii. exhibeantur cum syrupo coralliorum, aut alio convenienti.

Succus urticæ prædictis non cedit, vel etiam efficacior est: exhiberi potest, vel aliis permixtus: vel ex iis fieri potest syrupus ad usum frequentem.

Aqua ex tenerissimis & rubentibus quercûs foliis extracta prædictum profluvium sistit.

Sequens autem aqua valdè efficax à Mercato in hunc modum componitur.

26. Panem ex amylo, farina hordei, & oriza confectum. Affunde aquæ chalybeatæ lb. vii. Quibus adde rosar. rubr. sicc. P. iii. succi plantag. lb. i. rad. consolidæ major. virentis & conquassatæ 3. i. caudæ equinæ M. i. carnis pirorum agrestium & cydoniorum, an. 3. ii. portulacæ M. ii. boli armen. 3. i. balauft. & santal. omnium: an. 3. sem. Destillantur omnia per alembicum, hujus aquæ capiat 3. iii. cum syrupo de portul. aut de rosis siccis 3. sem.

Pro foemellis delicatioribus poterunt parari juscula ex

decocto pedum vituli, & fol. plantaginis, vel sanguinariæ. Vel ad incrassandum sanguinem, poterit fieri jusculum ex aqua rosarum pura, & vitellis ovorum recentibus. Iisdem quoque confert conserva fructus cynorrhodi, frequenter exhibita, præsertim si calida hepatis intemperies adfuerit.

Ad omne sanguinis profluvium Practici utuntur oxycrato, largo haustu per os exhibito. Verum in mensium fluxu pertimescendum est, quia utero (utpote parti membranosa) est inimicum.

Inter specifica recensentur radix filipendulae, & cortex radices mori, quorum pulveres exhibentur ad 3. i. cum liquore idoneo.

Flores nucum, quando sunt maturi & cadere incipiunt, collecti, & in pulverem redacti, exhibeantur ad 3. i. cum vino calido manè per plures dies. Ex hoc medicamine omnes habentes fluxum menstruum sanantur, ut testatur Solenander. Specifica etiam vi suffocationibus uteri medetur.

Spica nardi tenuissimè pulverata & sumpta ad 3. i. cum liquore idoneo, menstrua cohibet; tum etiam, si ex ea nasale componatur.

Lac chalybeatum per plures dies epotum in affectu inveterato multum prodest: humorum enim acrimoniam contemperat, eosdemque incrassat, corpus reficit, & fluxui resistit. Hoc commendat Avicenna, Rhasis, aliique Arabes, & Augenius ad cælum extollit. Cavendum tamen ab eo est, ubi aliquid vitiosi humoris in corpore superesse suspicio fuerit.

Aquæ minerales acidulae, vitriolatae, ferratae, vel aluminosae, in fluxu diuturno cohibendo, causis ejusdem auferendis, & visceribus roborandis, plurimum conferunt.

Chymici tincturam coralliorum valdè commendant, tum etiam vitriolum Martis, & multa alia è suis Authoribus repetenda.

Pro potu utatur ægra decocto massiches, vel millefolii, vel lentisci sicci. Vino etiam lignum lentiscinum infundi poterit, eique nigro & austero, quo maxime viscera roborantur, & fluxiones cohibentur.

Diligenter observandum est, in affectu inveterato, multum adstringentia & incrassantia non esse diu usurpanda: Periculum enim est, ne meatus offendant; occludant, & constringant; atque ita obstructions generent, & visceribus præcipuis (quæ insigne damnum in hoc affectu recipere solent,) plurimum officiant, Sed multò præstabilius est, hepar roborantibus insistere: quæ quidem adstringunt; attamen tam moderatè, ut adstrictione obesse nequeant.

Ludovicus Septalius lib. 7. Animad. medic. art. 144. decoctum corticum aurantium, tanquam remedium certum, ita commendat, ut propria ejus verba transcribere non inutile fuerit. Post, inquit, *hujusmodi remedia ex ratione facta, cum ea quæ aut incrassandi facultate, aut adstringendi maxime conveniunt; unum in præsentia omittendum nullo modo esse censui, quo infinitas propemodum mulieres ab hoc morbo liberavi, inter secreta aliquando reservatum, post adolescentibus, qui sub nostra tutela ad præxin medicam addiscendam exercentur, etiam communicatum; nunc omnibus ad communem utilitatem, commune factum: quo ferè nunquam frustratus sum, modò exulcerato aliquo vase in utero fluxus is menstruum aliquam non habeat occasionem. Est autem omnino euporiston, & facillimè parabile: Recipio autem aquæ lb. vii. In qua incoquo cortices trium aurantium aridorum, aliquanto adhuc subviridium, aut illos in phylliras incido, & excoquo ad duarum partium consumptionem, & facta colatura 3. viii. vel ix. potandas manè do. Quod si valentius medicamentum parare hoc ipsum volo, manipulum herbæ pilosellæ in fine excoquendum addo. Validius adhuc redditur, si in aqua Villensis decoctio fiat, aut si in octo libris aquæ fiat, ubi duæ tertiæ partes per collationem absumptæ fuerint, & excolatum reliquum chalybe indito ignito sæpius, adhuc magis roboretur.*

Exterius verò topicis medicamentis fluxus mensium immodicus cohiberi solet.



Ac primum fomenta in hunc modum parari poterunt.

℞. Rad. bistortæ, tormentillæ, & corticum granatorum, ana. Unc. f. Fol. plantaginis, centinodiæ, burfæ pastoris, equiseti ana. M. i. nucum cupressi, balaustior. granatorum myrti, sumac. ana, Unc. i. Bulliant in aqua ferrata & vino austero. Colaturâ foveatur regio pubis valdè tepidè.

Item spongia marina in aceto forti bulliat, quæ suprâ pubem mulieris posita, menstrua potenter sistit.

Semicupium ex priori decocto totûs paratum, aucta dosi, etiam convenit. Sed cavendum ne calidum administretur, sed tantum subfrigidum: alioqui calore suo vasa uteri magis aperiet. Efficacissimum est balneum decoctionis aluminis, sed sterilitatem inducit.

Linimentum, vel unguentum post fotum vel semicupium, admoveendum est pubi, perinæo & lumborum regioni, in hunc modum compositum.

℞. Ol. mirtini, de mastiche, & cydoniorum, ana ℥. i. boli armenæ, sanguinis draconis, & karabes, ana ℥. i. aceti cochlear. i. Fiat linimentum.

Vel admoventi poterit unguentum Comitissæ, aut unguentum de bolo, recenter dispensatum, vel ceratum sequens summè efficax.

℞. Picis navalis ℥. sem. thuris masculi ℥. i. mastich. ℥. sem. terebinthinæ ℥. i. sang. draconis, rosar. rubr. ana Drach. ii. Fiat ceratum, renibus applicandum.

Emplastra etiam umbilico & lumbis utiliter admoventur, ex massa emplastri contra rupturam, pro matrice, de mastiche, solis, aut simul mixtis: vel ex massa emplastri de Vigo pro fracturis, quod præstantissimum est & absque calefactione operatur.

Cataplasmata sequentia multò efficacius operantur, & in largo sanguinis profluvio, unde vitæ periculum imminet, plurimum possunt.

Parantur autem, si vel bolus armena cum succo plantaginis & paucò aceto incorporentur & admoveantur. Vel pulveris gypsi lb. i. cum gummi arabic. torrefacti ℥. x. & quatuor albuminibus ovorum incorporetur, & placentulis gossipii emplastrentur partes prædictæ. Dicit Solenander hoc cataplasma omnem muliebrem fluxum sistere uno die.

Benignius operatur, & specificâ quadam vi potius, quàm adstrictione, cataplasma ex urtica cocta in sartagine: pubis regioni admotum.

Injectiones etiam fiunt in uterum per metrenchytem ex succo plantaginis solo; qui valdè est efficax, & à Practicis celebratus. Ex succo polygoni idem præstari poterit. Tum iisdem succis addi interdum solent mucilaginis gummi tragacanthæ ℥. i. amyli ℥. i. aquæ peculi rosarum ℥. iii. Et in uterum infunduntur. Vel

℞. Fol. Polygoni, plantag. millefolii, burfæ past. caudæ equinæ, ana M. sem. Coquantur ad lb. sem. In colat. dissolve acaciæ Drach. ii. sang. dracon. boli armen. & lapid. hæmat. an. ʒ. j. Misceantur, fiat clyster uterinus.

Suffitus ex aceto suprâ laminam candentem effuso, & in sella perforata receptus, utilissimus est. Vel in hunc modum componi poterit.

℞. Thuris, mastiches ana Drach. ii. myrtillorum, ladani an. Drach. i. succini, rosarum rubr. balaustiorum, an. Drach. sem. Cum infusione tragacanthæ in aqua rosarum, fiant trochisci pro suffumigio.

Suffitu ranarum combustarum testatur Joannes Michaël Paschalius, se foeminam quandam curasse, quæ septem ferè mensibus hoc fluxu laboraverat. Idem etiam, suffitum ungulæ mulæ hunc fluxum mirificè sistere, expertum esse scribit.

Pessaria adstringentia hic etiam usurpantur. Quæ tamen parum utilia sunt, cum vix ad officia venarum aperta possint pertinere. Si tamen venæ cervicis uteri apertæ sint locum habere possunt, & in hunc modum componi.

℞. Succu plantag. vel centinodiæ ℥. ii. pulv. trochisc. de carabe, & acaciæ, an. drach. i. Misceantur cum albumine ovi & panno serico involvantur. Fiat pessarium. Vel

℞. Pulv. hypocistidis acaciæ boli armenæ, sang. draconis d. consolidæ, arnoglossæ, gallarum, an. drach. sem. Succu

portulacæ, vel plantag. vel syrup. de rosis siccis, aut myrtillorum, q. s. Excipiantur bombace.

Parantur etiam pessaria ex foliis portulacæ, plantag. aut polygoni, vel alterius herbæ convenientis contusæ, & in linteo involutæ; aut ex unguento Comitissæ lanâ excepto, & utero indito.

Neque omittenda est lotio tibiarum in aqua frigida, aut decocto adstringente, à Practicis usitata, quo cohibendo mensium fluxui non parum confert.

Circa topicorum administrationem hoc advertendum, ne scilicet adstringentia medicamenta, saltem fortiora admoveantur, priusquàm revulsiones sufficientes celebratæ fuerint, præsertim illa, quæ venæ sectione perficitur. Periculum enim est, ne tumores in utero, aut graviores alios effectum concitent. Ideò semper quantum morbus dare inducias poterit, tum revellentibus, tum incrassantibus atque adstringentibus internis curatio tentanda est, priusquàm ad topica illa deveniatur.

Suprà descripta curatio fluxui mensium aptari poterit, si ab anastomosi, si ab drapedesi, si ab rhixi, seu ruptione vasorum dependeat; adhibito iudicio. At si ab erosionem, seu exulcerationem oriatur, illius curatio erit instituenda, prout in ulceris uteri curatione docebitur.

In toto morbi decursu, dum prædicta remedia usurpantur, viscerum roborationi, & correctioni sanguinis incumbendum erit, quemadmodum in fluxu hæmorrhoidum dictum est.

Ac denique sedato symptomate, prophylaxis ibidem instituta, hic etiam conferre poterit.

#### C A P U T I V.

##### De Fluore muliebri.

**F**luor muliebris, uteri profluvium, seu menstrua alba dictus, fit, quando humores excrementitii ex utero profluunt, vel continente, vel saltem nullo ordine, nullòque circuitu.

Illi autem humores excrementitii modò albi sunt & pituitosi, sero lactis, aut hordei cremori persimiles: modò pallidi, aut flavi, aut virides, ex bilis permixtione: modò aquosi, ex serosis humoribus: modò subnigri, ex humore melancholico admixtò: modò acres & erodentes ut partes uterinas exulcerent: modò tetri & graveolentes, modò nullo odore molesti.

Fœminas adultiores; & ætate maturas, plerumque malum hoc solet corripere: virgines tamen ab eo non semper sunt immunes, quod perperam nonnulli asserere ausi sunt viarum angustiam accusantes, & temerè pronunciantes, corruptas esse virgines, quibus fluores albi promanant. Etenim si virgines satis amplas habeant uteri venas, ut per earum ductus menses ordinarii fluere valeant: quidni etiam fluores albi per easdem vias stillare poterunt, cum sæpè materia illius floris ipso sanguine tenuior: & fluidior sit, utpotè serosa, vel biliosa? Idipsum confirmat experientia à doctissimis Medicis prolata, & quotidiano usu à nobis etiam confirmata: castissimas atque integerrimas virgines, de quibus nulla corruptionis suspicio esse potuit, hunc affectum passas esse. Et testatur Fernelius se puellam vidisse octavo ætatis anno, hoc malo obsessam, ac diu postea graviter afflictam.

Generantur autem humores isti excrementitii, vel in toto corpore, vel in aliqua parte principali, vel in ipso utero.

Si à toto corpore isti profluant humores, vel ex pravo alimento: vel ex vitioso & habituali totius corporis temperamento generantur, & ad uterum confluunt, tanquam totius corporis sentinam, ac veluti cloacam, ad quam reliquæ partes sese exonerant.

Partes verò peculiare quarum consensu in hoc morbo uterus afficitur, potissimum sunt cerebrum, ventriculus, hepar, lien, mesenterium, & vesica, quæ sua excrementa ad partes debiliores, & receptioni magis dispositas, mandant.

In utero generantur humores isti excrementitii, quia propria



propriū: alimentum cominutare nequit, ob debilitatem retentricis, aut concoctricis, idē illud majori parte in excrementitium humorem facefcit, cū imperfectē conficiatur, vel potiū corrumpatur. Imperfectē conficitur, in frigida uteri intemperie: corrumpitur, in calidiori. Et cū uterus ex concoctionis defectu nutritione suā frustretur, novum alimentum continuō attrahit, quod in excrementum conversum, ab eo tanquam inutile expellitur, ac nova omninō fit attractio, unde continuus & copiosus fit pravi illius humoris per uterum effluxus. Debilitatur uterus, & horum excrementorum receptioni magis idoneus redditur, à graviditate, partu, abortu, contusione, inflammatione, abscessu, aut exulceratione.

Diagnosis ad ipsum affectum, partem affectam, & causam illum producentem dirigitur.

Affectus ipse ex ægrotantis relatu facilē dignoscitur, eūque non rarō varia symptomata consequuntur: nempe color faciei pallidus, appetentia dejecta, nausea, spirandi difficultas, virium dejectio, oculorum tumor & inflatio, mœror & tristitia, urinæ crassæ & turbidæ, aliæque non pauca, quæ pro humoris peccantis diversitate varia esse solent, ut inferiūs distinctē magis explicabitur.

Partem affectam & locum, in quo humores excrementitii fluorem istum efficientes generantur, sequentia indicabunt.

In toto corpore materiam istam generari, indicant lassitudo, spontanea & gravativa, à qua levatur ægra, copiā humoris excretā, & rursus gravari incipit novā collectā materiā, venarum plenitudo, torpor pedum, manuum ac crurum, quæ signa plenitudinem præcipuē ostendunt. Cacoehymiam verō in toto corpore redundare significant pravus totius corporis habitus, manuum & pedum inflationes, pruritus & mordacitas in toto corpore, si humor acrimoniæ sit particeps, & alia non pauca.

In aliqua verō parte peculiari materiam peccantem ostendunt symptomata, & excrementa cuique parti propria & particularia. Verbi gratia, jecoris dolor, calor, aut tumor, & cum excrementis biliosis, jecur esse affectum significant: eadem verō symptomata in sinistro hypochondrio apparentia, cum excrementis, humorem melancholicum referentibus, ex liene fluxum procedere ostendunt. Pituitosa excrementa, nausea, inappetentia & aliquando ingens fames, frequens ciborum corruptio, & ructus acidi, vel nidorosi, certa sunt affecti ventriculi indicia.

Dolor capitis, spumosa excrementa, consueta per os & nares evacuatio suppressa, à capite humores affluere testantur. Si nulla prædictarum partium læsarum signa appareant ab ipso utero fluxum procedere conjiciendum est. Præterea fœmina est boni coloris, materia fluens pauca est, cū solius uteri sit excrementum. Præcesserunt causæ, uterum labefactantes, ut partus laboriosus, vel abortus, casus supra ventrem aut dorsum, coitus immoderatus præsertim si fœmina nimis juvenis conjugio tradita sit; tumores, ulcera, aliique affectus uterum obsidentes, quorum signa propriis capitibus proposita sunt.

Humorem verō, fluxum istum efficientem, testantur in primis colores humoris effluentis in linteis, quibus ille excipitur, si, ut docet Hippocrates 2. *de morbis mulierum*, lintea illa arefacta simplici aqua laventur, ac in umbra exsiccentur. Tunc enim manifestē colorem referunt humoris in excrementis dominantis; quibus addi possunt, ex semeiotica generali, signa humoris, in toto corpore redundantis.

Signa denique proponenda sunt, quæ istum affectum à consimilibus distinguere valent. Consimiles autem sunt, excretio materiæ purulentæ ex matricis ulcere, & gonorrhœa.

A materia purulenta distinguitur, ex ipsius ulceris signis, proprio capite describendis, tum etiam, quia pus ipsum longē est crassius & albicans, & minoris quantitatis, si ritē concoctum sit, si verō saniosum & ichorosum fuerit, quodam cruore perfusum est & interdum filamentis partium, & cum insigni doloris sensu exire solet: tum etiam mulieres, ulcera patientes in utero, aut illius cervice, non admittunt coitum, nisi cum molestia, quæ affectum ipsum

exasperat: quæ verō muliebri profluvium patiuntur, liberē, & patienter venereos amplexus sustinent. In gonorrhœa verō materia effluit in minori copia, crassie majore, albedine splendidiorē, & longioribus intervallis, ac rarissimē foetet; tum si gonorrhœa sit virulenta, ex impuro concubitu contracta, ex ardore urinæ, pudendi ulcusculis, aliisque signis malignitatem indicantibus, innotescet.

Prognosis hujus affectus ex una parte bona est ex altera verō mala. Bona dici potest, quatenus ut plurimum vitæ periculum non infert: mala verō, quatenus affectus est contumax ac diuturnus & curatu difficillimus: siquidem humorum superfluatorum affluxus, qui semel hanc viam affectavit, difficillimē avertitur, cū uterus, ut antea dictum est, sit sentina totius corporis, per quam, etiam in statu naturali, humores superflui singulis mensibus expurgantur.

Si gravior evadat affectus; multa alia mala inducere potest, nempe sterilitatem, uteri procidentiam, exulcerationem, cachexiam, hydropem, tabem.

Fluxus lividus cruentus, aut foetidus, deterior est albo, pallido, minimē foetido.

Quō diutiūs duraverit hic affectus; eō curatu difficilior est.

Vetulas hoc malum plerumque ad mortem comitatur, ob pituitæ copiam, & facultatis concoctricis imbecillitatem.

Curatio hujus affectus incipienda est ab universalis humoris peccantis evacuatione, quæ illius naturæ conveniat. Et quia hujusmodi fluxus à pituitosis & serosis humoribus plerumque fieri consuevit, illos humores purgantia medicamenta erunt præcipuē usurpanda: iisque chologoga aut melanagoga erunt admiscenda, prout biliosi, aut melancholici humores admixti fuerint. Præscribi ergo poterit apozema conveniens alterans simul & purgans, pro quatuor aut quinque dosibus, pro solemnī evacuatione; hoc continuō advertendo, medicamentis purgantibus quædam adstringentia, & roborantia esse permiscenda, ne humores commoti versus uterum magis præcipitentur.

De venæ sectione dubitatur, an scilicet in hoc affectu conveniat. Cū enim hic fluor à cacoehymia dependeat, & illa, per phlebotomiam, ad venas attracta, massam sanguinis inquinare possit, nullus videtur esse venæ sectioni locus. Adde, quod in chronico hoc affectu vires valdē deiciantur, & corpus non rarō ad tabem perducatur, hincque venæ sectione ampliūs labefactandum, & alimento suo fraudandum non videatur. Ita tamen deciditur. Quod si fluor iste non sit purus & solitarius, sed sanguini aliquo modo permixtus, & subruer appareat: tunc celebrari potest venæ sectio; tum etiam, si insignior sit jecoris caliditas, & biliosi succi acrimonia huic fluxui conjuncta. In aliis verō casibus, præsertim quando hic affectus inveteravit, melius est à phlebotomia abstinere.

Ligaturæ in superioribus partibus, & cucurbitulæ scapulis & dorso ad revulsionem erunt utilissimæ, tum præcipuē frictiones, ex linteis primū mollioribus, mox asperis, quibus quotidie Galen. utebatur in uxore Boëti, quam intra tredecim dies curavit, ut ipse refert, *lib. de præcognitione ad Posthumum*, c. 8.

Ac præter purgationem universalem suprā propositam, usuales etiam purgationes administrandæ sunt, & frequenter repetendæ, ut magis illa excrementorum illuvies sensim educatur, & natura assuescat humores per alvum expurgare, qui ante ad uterum confluebant. In hunc finem syrapi magistrales, pilulæ, & opiata usuales componi poterunt: ægrotantis temperamento, & humoribus peccantibus congruæ. In affectu pituitoso laudat Mercatus syrupum ex decocto ligni guajaci cum senna, turpetho, & agarico, tum etiam pilulas sequentes.

4. Pilul. de hiera 3. i. agarici trochiscat. 3. i. β. Cum melle rosaceo fiant pilulæ xxv. quarum summo mane capiat laborans sex, aut septem, tertio quoque die, postea verō earum tres tantum, quinto, aut sexto quoque die. Vel ad magis adstringendum simul & purgandum, in quocumque temperamento, ita confici poterunt.

24. Rhab.



℞. Rhab. electi, succo rosarum frequenter irrigati 3. ij. bytomal. citrinorum, chebulorum, & indorum, infusorum in succo rosar. an 3. j. mastiches 3. j. spicæ 3. β. Cum syrupo rosaceo, fiat massa pilularum, cujus dosis erit 3. j. bis in septimana.

In fluxu seroso radix jalappæ est præstantissima, eaque in hunc modum usurpari poterit.

℞. Rad. jalappæ subtilissimè pulverisatæ 3. β. cinam. pulverisati 3. β. Misceantur, & cum jure pulli fiat potio, quam sumat sub aurora.

Pisana laxans, per mensem quotidie exhibita, contumax uteri profluvium curavit, quod aliis remediis non cesserat, ut in Observationibus nostris videre est.

Vomitum etiam in hoc affectu maximè commendatur, in iis præsertim, qui faciliè vomunt; quia humores crudi qui circa ventriculum cumulari solent, evacuantur, tum etiam ab utero potenter revelluntur. Inter idonea medicamenta, ad concitandum vomitum, laudatur diasarum Fernelii, cujus 3. sem. data cum aqua mulsâ vel cum oxymelitis 3. j. & jure pulli tepido, bis, aut ter in mense, sine ullo labore vomitum ter, vel quater movet.

Post sufficientes purgationes, ad discutiendas humoris superflui reliquias, sudores excitari poterunt, quibus etiamnum fiet conveniens revulsio fluxionis, ad uterum decumbentis. Huic rei conveniet decoctum guajaci & sassasras in pituitosis, vel chinæ & salsæ parillæ in biliosis, & melancholicis; additis etiam herbis refrigerantibus, vel temperatis, ne magis isti succi exasperentur, & aciores evadant. Vel provocabuntur sudores herbarum calidarum decocto, ut nepetæ, calamenthi, fœniculi, hyssopi, enulæ, chamom. anethi & sin illum, cujus evaporatio in folio idoneo recipiatur. Ex quo etiam decocto balneum fieri poterit, à quo sudores excitentur. At in calidioribus naturis sufficit balneum aquæ dulcis tepidæ, in quo modici tantum sudores blandique provocentur.

Thermæ etiam sulphureæ sudores potenter excitant, & hujus morbi reliquias absument: harumque usu nonnullas mulieres curatas vidimus, quæ aliis remediis restitui nequiverant.

De diureticis non levis est difficultas, an scilicet huic affectui convenient? Illa enim non solum urinas; sed etiam menstrua provocant, calefaciendo scilicet & attenuando humores, in venis contentos. Attamen ab omnibus Authoribus approbantur, & à Gal. ipso, qui iis usus est in uxore Boëthi. Et ratio est, quia diuretica urinas primariò provocant, menses verò secundariò, & quasi accidenti. Deinde renes continuò serosam materiam attrahunt, uterus verò excipit tantum. Unde credibile est, maximam istarum humiditatum partem ad vias urinæ profecturam.

Diureticum autem, in dicta muliere à Galeno usurpatum, fuit decoctum asari & apii, in aqua communi, attamen magis temperatum efficitur in aqua cichorii.

Magis compositum decoctum in hunc modum parari poterit.

℞. Rad. asari, apii, an. 3. j. fol. calamenthi, soldaneliæ, an. M. j. fol. sambuci M. sem. polypod. & sem. carthami, an. 3. sem. Coquantur ad ℔. j. Colaturæ dentur 3. v. mane. Et si purgans efficere volueris, adde decocto aliquid agarici, vel turpethi in ligatura inclusi.

Dubitarum de causticis tibiæ admovendis. Cum enim humores alliciant ad inferiora; fluorem istum uterinum augere possunt. Attamen in diuturnis affectibus convenire, experientia docuit, quod per hæc emissaria inutilis materię portio educatur.

Si humores biliosi & acres in vitio fuerint, non solum exhibenda sunt purgantia cholagoga sed etiam alterantia, refrigerantia, incrassantia, & leviter adstringentia, quales sunt julepi sequentes.

℞. Fol. cichorii cum rad. indiviæ, borrag. lactucæ, & portulacæ, an M. sem. jujubarum, & sebesten recentium ana num. vi. sem. quatuor frig. major. & papav. albi, an. Drach. f. rosar. rubr. P. j. Coquantur ad ℔. j. In colat. dissolve syrup. cydon. vel de rosis siccis 3. iij. Fiat julep. pro iij. dosibus.

Si verò humores melancholici redundant remediis

etiam, illos respicientibus, alterandi & expurgandi sunt.

Utique autem causæ maximè conferre poterit lactis chalybeati usus per 40. dies exhibitum mane ad 3. iv vel v. Cui addi poterit circa finem tantillum boli armenæ, aut terræ sigillatæ.

In toto curationis decursu advertendum est, an aliqua pars corporis vitio aliquo laboret, ut possit esse pars mandans illius fluxionis; atque ita illi parti erit medendum.

Si enim à cerebro fluentes humores huic morbo originem dederint; remedia ad eam partem dirigenda sunt, præcipue fluxionem revellentia & derivantia, ut cucurbitulæ scapulis & dorso admotæ frequenter; errhina, masticatoria; vesicantia, & caustica occipiti, vel brachio innesta, quorum vicem, & multò efficacius subeunt setacea. Refertque Fabricius Hildanus, curat. 41. cent. 1. se mulierem quandam, diuturno fluxu muliebri laborantem, & inde ortam sterilitatem, adhibito setaceo curasse.

Si à ventriculo, hepate, aut alia quadam parte humores defluant; illi remedia appropriata adhibenda sunt.

Corpore præparato, & materiâ morificâ magnâ ex parte vacuatâ, vel derivatâ, ad roborantia & adstringentia veniendum est. Quæ tamen nunquam sunt adhibenda, donec antecedens materia probè evacuata & derivata sit, Alioqui humores illi retenti ad partes nobiliores ruunt, & graviora symptomata excitant. Quemadmodum scribit Gal. loco citato, uxori Boëthi contigisse, cui ab usu adstringentium præpostero venter intumuerat, retentis serosis humoribus, qui antea evacuari solebant. Illud etiam advertendum, ut dum utimur adstringentibus, materia antecedens aliò divertatur, illiusque generatio prohibeatur remediis prædictis. Inter præcipua roborantia theriaca recensetur, in corporibus pituitosis usurpanda, cui conserva rosarum & absinthii admisceri poterit. Vel opiata sequens erit componenda.

℞. Conservæ anthos 3. i. conservæ rad. acori vulgaris 3. ij. specier. diarrh. abbat. & aromat. rosar. an 3. j. coralli rubri præparati 3. β. theriacæ 3. ij. Cum syrupo condit. cortic. citri. fiat opiata. Vel

℞. Conservæ rosar. antiquæ rad. symphyti, buglossi & cortic. citri, ana 3. i. coralli rubri usti, rasuræ eboris, boli armenæ, terræ sigillatæ, sang. drac. ana 3. i. Cum syrupo de rosis siccis fiat opiata.

Pulvis ex salvia, fassap. & balauft. sumptus mane singulis diebus, cum jusculo, est remedium aulicatum mulierum.

Zecchius sequentem opiata commendat, à se cum felici successu sæpe usurpatam.

℞. Gummi arabici, tragacanthi, ana 3. ij. coralli utriusque, cinerum putaminum ovorum, cornu cervi: seminis anethi, succini, an. 3. iv. mellis rosar. q. f. Fiat opiata, cujus 3. β. horis duabus ante cibum devoranda exhibeatur. Deinde statim superbibat ægra aquæ plantag. 3. iv. cum vini rubri 3. i.

Julepi fieri possunt ex aqua rosar. centinodiæ, plantag. cum syrupis myrtino, de rosis siccis, & similibus, adjectis quibusdam pulveribus, ex supradictis.

Mercurialis decoctum foliorum quercus cum coagulo leporis se in frequenti usu habere testatur, eoque se multas mulieres hoc affectu laborantes curasse, idque remedium ita parat.

℞. Decocti fol. quercus 3. v. vel vj. coaguli leporis 3. i. Capiat per viij. vel x. dies.

In affectu bilioso sequens syrupus roborans, adstringens, & refrigerans parari poterit.

℞. Aquæ rosar. ℔. jv. spiritus vitrioli q. f. ut aqua reddatur acidula, ac vix talis sentiat ad gustum, rosar. rubr. siccarum. P. iij. Infundatur frigidè per biduum. Colaturæ adde sacchari rosacei q. f. ut fiat syrupus.

Ac denique adstringentia medicamenta, in mensum fluxu immodico descripta, huc transferri poterunt.

Pro potu ordinario conveniet bochetum ex rad. chinæ vel ligno lentiscino cum vino adstringente.

Dum adstringentia & roborantia uterum per os exhibentur, topica & externa admovenda sunt, videlicet fots, semicupia, unguenta, emplastra, injectiones, suffitus, & pessaria, qualia in fluxu mensum immodico præscripta sunt.

Ante-



Antequam autem adstringentia hæc topica in usum revocentur, uterus probè detergendus est. Alioqui impuritates illæ in eo retinerentur, quæ sursum remeantes, graviorum morborum causa essent. In detergendo autem habenda est ratio humoris morbifici. Alia enim detergentia debentur humori pituitoso, alia humori bilioso.

Si humor sit biliosus, fiant injectiones ex aqua hordei, fero lactis, aqua saccharata. Si verò pituitosus sit, parentur ex hydromelite, vel decocto absinthii, matricariæ, & similia.

Pessarium detergens etiam fieri poterit ex theriaca & terebinthina; vel ex foliis mercurialis contulis, & panno lineo raro involutis.

Hicce uterum ante adstringentia, donec uterus probè deterfus fuerit. Quod cognoscetur ex nullo, aut paucis humorum per eam pattem transitu.

Ab usu detergentium, suffitus primum administrandi sunt, quia uterum exsiccant & roborant. Ilique commodè parabuntur ex thure, ladano, mastiche, santalis, nucemofchata, rosis rubris. Postmodum verò ad alia adstringentia progrediendum erit.

## CAPUT V.

### De furore uterino.

**F**Uror uterinus est species maniae, ab intenso & effrenato coeundi appetitu orta, qui mentis de sede sua deiecit; ita ut laborantes obscœna & impudica verba effutiant, abjectâ omni verecundia venerem furiosè expectant, & ad eam viros invitant.

Producitur immodicus iste coeundi appetitus à feminis copiâ, acrimoniâ, & fervore, naturæ leges excedente, quæ in vasis feminalibus immodicè turgens, genitalia vehementer excitat ad veneris appetitum, eaque veluti inflammant. Ex ea verò materia vapores ad cerebrum demittuntur, qui rationem perturbant, eaque de sede sua deiciunt, quamvis ipse coeundi appetitus immodicus, sine vaporum concursu, per se rationem superare possit & obnuere, quemadmodum omnia pathemata vehementiora idem præstare possunt, præsertim amor immodicus, qui eroticus affectus nominatur.

Illas autem qualitates acquirit semen, quando nimis retinetur in corporibus salacibus, & multo calore præditis; atque adeo hic affectus virginibus, aut viduis junioribus proprius est; quamvis etiam nuptis contingere possit, quæ scilicet ignavos habent conjuges, aut non satis admatos ut vasa spermatica sufficienter deplere, aut appetitum venerium satiare nequeant.

Quidam volunt semen etiam putrescere, & malignam qualitatem induere, quæ gravia ista symptomata producat. Verum non facile iis est differentiam ostendere, quæ inter hunc affectum & hysterica passionem intercedit, quæ à femine corrupto, & malignitatem adepto producitur. Licet enim varii putredinis gradus, varios etiam malignitatis gradus efficiant, unde magna symptomatum varietas exurgit; sufficiunt tamen qualitates manifestæ, nempe feminis copia excedens, caliditas, acrimonia, & turgentia nimia, cum phlogosi partium genitalium ad istum affectum generandam.

Causæ verò, calidum istud semen acre, & copiosum producentes sunt, ætas juvenilis, temperies sanguinea & biliosa, vel melancholiæ adustæ particeps; cibi euchymi & opipara mensa, idque magis, si edulia aromatibus condiantur; odor ipse aromatum frequens, ut moschi, zibetæ, & similia, somni longiores, & in lecto, plumis mollioribus referto, blanditiæ amassorum, lectio librorum impudicorum, choreæ, & aliæ voluptates, in adolescentium consortio susceptæ.

Diagnosin hujus affectus ex iis quæ dicta sunt, facile elici potest. Sed quia sensum & per gradus apparere solet, illius progressus exponendus. In principio igitur, dum adhuc mentis compotes sunt, moestiores ac taciturniores evadunt, seu cum oculorum jactatione, ac lascivia, & faciei rubore, qui per intervalla intenditur, præcipuè verò rei veneris factæ commemoratione, ad quam respiratio & pulsus

Lazar. Riverii Opera.

immutantur, per sympathiam cordis, unde Galenus se ex pulsu cognovisse gloriatur furibundos mulierum amores; quod ejusmodi amantes varias subito mutationes in pulsu patiantur, dum objecta expetita illis offeruntur, vel in memoriam revocantur. Postmodum verò, dum malum exacerbatur, incipiunt rixari & lachrymari, ac subindè in risum effundi, multa colloqui inconcinne & imprudenter, ex quibus nihil certi colligas. Deinde resipiscunt, donec alter paroxysmus, ex materiæ motu inordinato & sine ulla certa periodo redierit. Hoc furore percitæ mulieres, morbo ad statum progressu, viros ad coitum palam & coram omnibus invitant, rem veneream proprio & vernaculo nomine passim inculcantes.

Quod ad prognosin attinet: Morbus iste curabilis est, si maturè medela adhibeatur. Si verò diutius perseveraverit, & firmas radices egerit, in veram maniam degenerat.

Magna saluti spes est, quando longiora incipiunt esse intervalla, aut quando corpus emaciatum instaurari incipit & commemoratio rei veneris, coram illis facta, eas non amplius multum afficit & perturbat.

Curatio hujus affectus ita dirigenda est, ut calida intemperies tum viscerum, tum uteri præsertim, tum sanguinis, & seminis corrigatur, & humores acres ac materia feminalis evacuentur: Quod quidem sequentibus remediis perfici poterit.

Ac primum phlebotomia, pluries repetita, quantum vires ferre possunt celebranda est; ut tota humorum massa, & ipse uterus refrigerentur, & sanguis fervidus ab uteri venis revellatur.

Si verò mensium suppressio adfuerit, tundendæ postmodum erunt venæ inferiores, ut cursus ille naturalis humorum concitetur.

At si versus hæmorrhoidales venas sanguis pergere videatur, quod ex tumore & rubore illarum dignoscitur; admonis hirudinibus, aperiendæ sunt.

Postmodum purgatio instituenda est, ex benignioribus compositæ, bilem, aut melancholiam educantibus, prout alteruter humor redundaverit.

Purgationi succedent julepi præparantes humorem peccantem, refrigerantes scilicet, & leviter aperientes, per triduum usurpandi.

Mox purgans validius exhibendum erit, ad humores illos penitus infixos evellendos. Cui usui conferre poterunt illa medicamenta purgantia, quæ in maniae curatione fuerunt descripta, quæ per intervalla erunt repetenda.

Iterata purgatione, ad uterum & universum corpus refrigerandum, humorisque fervorem temperandum; sequens balneum erit utilissimum; idque pluries in morbi decursu erit repetendum.

℞. Fol. lactucæ, salicis, nymphææ, vitis, portulacæ, umbilici veneris, an. fasc. i. flor. violar. nymphææ, & rosar. an. M. ii. Coquantur omnia pro balneo, quod ingrediatur ægra tepidè, sine sudore, bis in die, longe à pastu.

Quia verò balneum integrum tam facile ad multos dies continuari nequit; saltem semicupium ex prædicti decocti portione, imo verò ex aqua simplici paratum frequenter iterandum est, & valde tepidè administrandum: summa etenim hujusce curationis in eo consistit, ut uterus valde refrigeretur. Quod confirmatur insigni experimento, ab Harvæo proposito, in tractatu de partu nobilis foeminae, à furore & melancholia uterina, ultra decennium delirantis, cui postquam omnia frustra tentata essent, contigit uteri prolapsus, qui non fuit repositus, donec à frigore externo illius intemperies deferbuisset. Successit res ex sententia, brevique planè convaluit, atque uterus demum loco suo restitutus est.

Ad ulteriorem corporis refrigerationem, serum lactis, per multos dies exhibitum, convenire poterit.

Denique ea omnia, quæ ad maniam & affectionem hypochondriacam proposita sunt, in hoc affectu etiam conferre poterunt, prout bilis, aut melancholia illi dederit originem.

Quibus omnibus addi possunt quæ proprietate specifica semen extinguere ac refrigerare valent, in quorum numero sequentia recenserentur debent.

Bbb

℞. Fol.



℥. Fol. nymphaeae falicis, viticis, ana M. iv. fol. lactucae, portulacae, umbilici veneris, ana M. i. fem. quatuor frigid. major. lactucae & papav. albi, ana ℥. β. anethi ℥. ii. flor. nymphaeae & violarum, ana M. i. Contundantur omnia recentia, & irrorentur succo limon. & destillentur in B. M. ac singulis aquae libris addatur camphorae ℥. i. Capiat ℥. i. frequenter.

Vel ex praedictis simplicibus, vel eorum nonnullis potest fieri decoctio, & saccharo dulcorari ad plures doses, addendo camphorae parum.

Vel fiat emulsio ex sem. frig. major. lactucae, & papav. albi extracta cum aquis nymphaeae, lactucae, & falicis; cum syrupo violaceo.

Opiata in hunc modum praescribi poterit.

℥. Conservae flor. nymphaeae, violar. & viticis, seu agni casti, ana ℥. β. conservae rosar. ℥. sem. caudicum lactucae condit. ℥. i. coralli & smaragdi praepar. an. ℥. i. Cum syrupo violac. & nymphaeae, fiat opiata.

In summa delirii vehementia somnum conciliantia utilissima sunt, tam interna, quam externa, prout in phrenitidis & maniae curatione descripta sunt.

In toto morbi decursu, clysteres refrigerantes & blandè purgantes usurpandi sunt, cavendo ab acrioribus & vehementer purgantibus, quae materiam in utero, aut in ejus vasculis contentam exagitant, unde symptomata exacerbari solent.

Injectiones etiam fieri possunt in uterum ex decoctis herbarum, pro balneo aliisque remediis praescriptarum, quibus utiliter sal Saturni addi poterit.

Clysteres frequentes ex oxycrato ad hoc quoque conferre poterunt.

Exterius etiam linimenta refrigerantia, lumbis, pubi, & perinaeo admovenda sunt, ex ol. nymphaeae, unguento rosac. vel albo refrigerante, cum succis solani, hyoscyami, nymphaeae dissolutis, addendo parum camphorae.

Tum lamina plumbea perforata supra renes continuò gestanda.

Ratione causae conjunctae, quandoquidem seminis illius acrioris & corrupti evacuatio morbum solvere potest; optimè consultum foret, in morbi principio, antequam deliria sint valde conspicua, aut in eorum intervallo, si satis dilucidum extiterit, hujusmodi virgines viro juveni ac valido jungere: Sic enim satiato utero, & effusa materia, quae in vasculis illius continetur, eas curari contingit.

Si verò non ita facile nuptiae celebrari valeant, aut vitae conditio id minimè patiatur; consulunt nonnulli, ut à perita obstetrice fiant frictiones & contrectationes partium genitalium, quarum ope excernere possunt magnam istius seminis copiam. Sed quia illud nefas est, sufficiet, dum agra est in balneo, perficere leniter longè à pudendis uteri partes, ut aquae tepore illo attemperentur, & maiore laxiores fiant, discutianturque sua sponte seminale excrementum, ita ut manus nihil aliud praestet, quam levem aquae subingressum ad penitiores uteri partes, quòd tantum aqua operetur, quantum aliud auxilium ex iis, quae adversus semen pugnant.

Ad eundem usum pessaria componi poterunt ex foliis mercurialis contusis, cum pauca myrrha, aut pulvere aristolochiae. Quae supponi debent, dum agra est in balneo, ne nimium incalescat uterus, & post unius horae spatium auferri. Moxque fiat injectio in vulvam ex sero lactis, vel decocto hordei, cum pauco succo solani, semper vivi, aut cicutae, quae in hoc affectu peculiariter commendatur.

Ad semen expurgandum sequens bolus erit utilissimus.

℥. Terebint. Venet. ℥. iii. agarici trochiscat. Drach. β. sem. dauci, cannabis, pul. ligni aloës, ana gr. viii. Cum sacch. fiat bolus.

Si affectus perseveret, applicentur cauteria cruribus. Nihil enim praestantius est, quam materiam ad inferiora per illos fonticulos derivare.

Quòd si lienis tumores & obstructions supervenerint, ut saepe fit, illis diligenter erit providendum propriis remediis.

Quia denique in hoc affectu cerebrum & cor graviter afficiuntur, ob vapores ab utero sursum elatos, utrique

providendum erit: cerebro quidem frictionibus, ligaturis ad interiora, cucurbitulis supra coxas & inguina frequenter admotis; cordi verò epithematis, tam liquidis quam solidis, in virium imbecillitate praescriptis.

## CAPUT VI.

### De Hysterica passione.

**D**um semen & sanguis menstruus praeter naturam retinentur in mulieribus, putrescunt ac corrumpuntur, necnon malignam & venenatam qualitatem acquirunt: unde vapores maligni elewantur, & ad varias corporis partes deferuntur, propter mirum consensum, quem uterus habet cum omnibus propemodum corporis partibus. Inde verò varia accidunt symptomata, tam diversa ut jure dixerit Democritus in *Epistola ad Hippocratem*, sexcentarum ærumnarum innumerarumque calamitatum autorem esse uterum; & ipse Hippocrates scripserit, *lib. de morbis virginum*, multis & incomprehensibilibus serè affectionibus premi miserimas mulieres, Nos illas omnes affectiones hoc capite explicare aggredimur, & unico hystericae passionis nomine comprehendimus, Galenum imitantes, qui *lib. de loc. affect. c. 5.* dicit, hystericam passionem unum quidem nomen esse, varia tamen & innumera accidentia sub se comprehendere. Quamvis neotetici serè omnes suffocationem hystericam sub titulo hystericae passionis explicant, symptomata peculiare generis nomine donantes, propterea, quòd omnium frequentissimum & molestissimum esse consuevit. In hoc tamen maxime superflui esse videntur Authores praecipui, qui de morbis mulierum scripserunt, quòd diversis capitibus varios ex utero affectus exponant, nempe hystericam suffocationem, capitis dolores, convulsiones epilepticas, cordis palitationes, articularum in hypochondriis & dorso pullationes, ventriculi, hepatis & lienis affectus ex utero oriundos, & varios in variis partibus dolores ab eodem concitados, quòd omnes illi affectus ab iisdem causis oriuntur, & iisdem remediis curari debeant, ita ut Authores praedicti in variis capitibus eadem saepius non sine lectorum tædio, repetere cogantur.

Nos igitur, ut breviter & methodicè omnes istos affectus exponamus, operæ pretium ducimus, causas eorum universales praemittere, ut deinceps sigillatim ostendamus, quomodo illi affectus ab his causis oriuntur.

Diximus itaque ab initio, duas causas praecipuas horum omnium affectuum esse, semen muliebre, & sanguinem menstruum, dum praeter naturam retinentur, & corrumpuntur, malignamque ac venenatam qualitatem acquirunt, ex quibus maligni vapores elewantur, variasque partes afficiunt. Cui doctrinae generatim propositae, duo alia maximi momenti adjungenda sunt, quorum primum est, non solum semen & sanguinem menstruum hystericas affectiones producere, sed etiam varios humores excrementitios, in uterum confluentes, qui diuturnâ morâ putrescunt, & tetros vapores emittunt. Hujus rei fidem faciunt vetulae non paucae, quae sanguine menstruo & semine destitutae, hystericis tamen affectibus sunt plurimum obnoxiae. Alterum est, quòd non solum vapores, ex praedictis substantiis elevati, hystericos affectus producant, sed etiam isti humores, qui liberum exitum non invenientes per vias uteri (ad quem, veluti sentinam, natura humores superfluos deponit,) ob suppressionem mensium, vel fluoris uterini, ad partes superiores regurgitent, easque inficiant prava illa qualitate, quam in vasculis uteri, diuturniori morâ, aut per contagium seminis aut menstrui corrupti contraxerunt.

His ita constitutis, videndum est, quomodo hysterici affectus à praedictis causis excitentur, à suffocatione incipiendo, quae omnium praecipua & magis frequens hujusmodi muliercularum affectio esse solet, multisque aliis, iisque gravissimis, plerumque stipatur symptomatis. Nam praeter laesam respirationem, quae interdum etiam aboletur, totius corporis refrigeratio locis & pulsus interceptio, imò interdum motus & sensus abolitio contingit, ut aegrae quasi mortuae



mortuæ jaceant, & quædam pro mortuis habitæ, ſepul-  
turæ deſtinatæ fuerint, cùm tamen poſtea revixerint.

Invadit autem hoc malum per paroxyſmos, qui nunc  
frequentiùs, nunc rariùs redeunt, nunc brevior, nunc  
longior tempore durant, pro materiæ copia, quæ nunc  
citius, nunc tardiùs colligitur, nunc etiam citius, nunc  
tardiùs diſcutitur. Habent enim ejusmodi cauſæ in corpore  
humano ſua digeſſionis & exaltationis tempora, quæ  
ubi attingunt, ſubito & quaſi in momento ad agendum  
erumpunt. Imò verò collecti antea in corpore hujusmodi  
humores, in corpore aliquandiu latere poſſunt, donec, à  
cauſâ aliquâ interna vel externa commoti, venarum au-  
ram in alias partes effundant. Frequentiſſimæ autem &  
notiſſimæ cauſæ hujusmodi commotionem & agitationem  
efficientes, ſunt res odoratæ, naribus admotæ, vel ali-  
menta dulcia aſſumpta, à quibus promptiſſimè mulieres,  
affectibus hyſtericis obnoxie, paroxyſmum incurrunt:  
quod etiam non raro præſtant ira vehemens, terror, alia-  
que animi pathemata graviora.

Varii autem ſunt hujus affectionis gradus, pro varia  
materiæ morbiſicæ copia & malignitate. Aliquando enim  
ſuffocatio & reſpirationis læſio levis eſt, & cito ſolvitur,  
aliquando gravis, ut omnino auferatur, & alias affectio-  
nes hyſtericas, ut vomitum, deliria, convulſiones, ſyn-  
copem adjuncas habeat.

Communiter tamen ex ſemine corrupto graviora exci-  
tantur ſymptomata, quam ex ſanguine menſtruo, aut aliis  
humoribus corruptis. Quanto enim ſemen, propriam ſer-  
vans naturam, eſſentiæ ſuæ bonitate menſtrum ſuperat;  
tandem etiam, ex ſuperveniente corruptione, in majorem  
& deteriorem venenositatem degenerat.

Aliæ etiam hujus ſuffocationis hyſtericæ differentiæ ad-  
notandæ ſunt; quòd nimirum aliquando mulieres hyſte-  
ricæ magnam reſpirationis difficultatem patiantur; alias  
ſeſe ſtrangulati dicant, quaſi fauces illis ſune conſtringe-  
rentur; alias verò reſpiratio maximè imminuatur aut abo-  
leatur, ſine ulla moleſtia aut ſuffocationis ſenſu. Cujus di-  
verſitatis ratio inde petenda eſt, quòd ſimplex ſuffocatio &  
reſpiratio difficilis pendet à flatuum copia, qui interdum  
magnâ copiam cumulantur in mulieribus hyſtericis; præ-  
ſertim, quando hyſterica paſſio hypochondriacæ juncta  
eſt, qui quidem ſtatus diaphragma & pulmonem compri-  
munt, ut in aſthmate flatulento contingit. Senſus verò  
ſtrangulationis, in quo potiſſimum fauces conſtringi viden-  
tur, à peculiari auræ venenatæ indole dependeat: quem-  
admodum alia venena reperiuntur in macrocoſmo, quæ  
hanc fauces conſtringendi & ſtrangulationem efficiendi  
vim obtinent, ut de quadam fungorum ſpecie notum eſt.  
Varias autem eſſe venenatas illas qualitates, quæ in hyſte-  
ricis mulieribus generantur, ſatis innuit Galen. 6. de loc.  
aff. cap. 5. dum hujus vaporis malignitatem torpedinis  
veneno, phalangi morſui, & ictui ſcorpionis comparat:  
quæ venena, etſi mole ſint exigua, viribus tamen maxi-  
ma, in corpus humanum recepta. exiguo temporis ſpatio  
illud graviſſimè afficiunt; & vehementiſſima ſymptomata  
inducunt. Imminuta verò aut abolita reſpiratio ſit ab iſſe-  
dem vaporibus, narcoticâ quadam vi præditis; qui cordi  
maximè & ſpiritibus vitalibus adverſi, actionem eorum  
impediunt, unde ſequitur totius corporis refrigeratio ex  
defectu ſpiritus influentis, & reſpirationis ceſſatio defi-  
ciente uſu. Cùm enim reſpiratio ad cordis refrigerium ne-  
ceſſaria ſit: dum ab aurâ iſtâ venenatâ cor impenſè refri-  
geratur; non indiget illo refrigerio, ſibi per reſpirationem  
communicato, & ita ceſſat reſpiratio, ceſſante uſu.  
Dicere etiam poſſumus, auram illam venenatam & nar-  
coticam cerebrum impetere, & ſpirituum animalium in-  
fluxum impedire, unde motus diaphragmatis & muſcu-  
lorum reſpirationi inſervientium, impeditur. Adde quòd  
deſtructo ſpiritu vitali, animale etiam deſtrui neceſſe  
ſit, qui ex eo generatur.

Dubium ſolvit Galenus loc. cit. ex eo deductum, quòd  
paſſim circumfertur: hominem vivere non poſſe ſine reſpi-  
ratione, atque adeò mulieres hyſtericas reſpirationis abo-  
litionem pati nullo modo poſſe. Dicit enim, ex ſumma  
cordis refrigeratione tolli reſpirationis neceſſitatem, quæ

Lazar. Riverii Opera.

ſi urgente corde impediretur, promptus ſequeretur interi-  
tus, ſed exiguum calorem, qui adhuc ſuper eſt in corde,  
ſola tranſpiratione ſoveri, quemadmodum animalia, in  
latibulis per hyemem degentia, ſolâ tranſpiratione vivunt,  
quia frigidiffima ſunt, & exiguum habent calorem, qui  
reſpiratione non indiget.

Præter cauſam ſupra commemoratam hyſtericæ ſuffo-  
cationis, nempe vaporem malignum & venenatum, qui-  
dam aliam addunt, ſcilicet uteri aſcenſum ad partes ſupe-  
riores, quo ventriculus ac diaphragma comprimuntur, &  
inde non ſolùm ſuffocatio hyſterica, ſed etiam alia ſymp-  
tomata emergunt. Hunc uteri aſcenſum propoſuit Hip-  
pocrates lib. de natura muliebri, his verbis, *Converſi uteri  
impetunt hepar, & ad præcordia irruunt, ſurſum enim ad  
humiditatem feruntur, à labore nimium reſiccati. Hepar  
autem gratiſſi humeris ſons eſt.* Fernelius verò l. 9. patho-  
logiæ, c. 16. hunc uteri aſcenſum ſe frequenter tactu de-  
prehendiſſe affirmat, eumque inſtar globi cujuſdam in  
ventriculum elatum ac graviter opprimentem, unde ſæpè  
manu depreſſus eſt, manifeſteque in propriam ſedem pro-  
pulſus. Idem teſtatur Euſtachius Rudius lib. 2. Præctica  
cap. 51. ſe nimirum propriis manibus uterum ipſum uſque  
ad umbilicum, & nonnunquam ſupra ipſum elevatum  
contrectaviſſe, & in propriam ſedem paulatim propellen-  
do deduxiſſe. Galenus verò 6. de loc. aff. cap. 5. hanc ſen-  
tentiam oppugnat, docetque, etſi uterus aliquo modo  
moveri poſſit atque aſcendere, id tamen per exiguum eſſe:  
neque fieri ullo modo poſſe, ut uterus uſque ad ventricu-  
lum aſcendat, tantum abeſt, ut illum prætereundo, ad  
ſeptum tranſverſum pertingere poſſit. Ratio firmiſſima ex  
Anatome petitur. Siquidem uterus quatuor, validiſſimus  
ligamentiſ in ſua ſede ita firmatur, ut ſurſum tanto ſpatio  
attolli minimè valeat. Ad hanc tamen reſpondent hujus  
opinionis deſenſores, in procidentia uteri ligamenta illius  
ita laxari, ut extra pudenda prodire ſoleat; atque adeo  
quantum deſcendit ad inferiora: tantum poſſe aſcendere  
ad ſuperiora, ligamentiſ ita relaxatis. Reſpondemus: uteri  
procidentiam fieri paulatim, & longiſſimo tempore; per  
emolliitionem & humectationem ligamentorum, à diu-  
turno humoris pituitoſi deſluxu excitatam: uteri verò aſ-  
cenſum, quem vocant, fieri in momento, & citiſſimè re-  
ſtitui ac ceſſare. Et omnino neceſſarium foret antea rela-  
xata fuiſſe illa ligamenta, atque adeò uteri prolapſu labo-  
rarent omnes mulieres, quæ huic aſcenſui obnoxie eſſent;  
quandoquidem ceſſantibus cauſis, quæ illum aſcenſum  
promovere poſſunt, ſponte & proprio pondere uterus ad  
inferiora prorugret, & continua procidentia laboraret.

Difficilius eſt reſpondere autopiæ à Fernelio, Rudio,  
aliſque propoſitæ, qui ſe manu propria uterum percepſiſſe  
aiunt, globi inſtar, ad umbilicum, & ulterius aſcenden-  
tem, & compreſſione ad ſuum locum propulſum. Ad hoc  
reſpondet Sennertus, corpus illud, quòd tactu deprehen-  
ditur, non ipſum uterum eſſe; ſed teſtes, & vas illud cæ-  
cum quòd tuba Fallopiana dicitur, & Fallopio invento-  
re, qui tubæ extremo orificio id comparavit. Cùm enim  
teſtes uteri ſunt penduli, & corpus tubæ fiſtuloſum, la-  
xum, & vagum, dum ſemine corrupto & humoribus vi-  
tioſis, ac flatibus replentur & turgescunt; per hypogaſtrium  
hinc inde moveri, & ad umbilicum uſque aſcendere poſ-  
ſunt. Talem autem tumorem rotundum in teſtibus & tu-  
ba uteri poſſe contingere, qualis interdum in foeminis de-  
prehendiur, docere poteſt Rioliſi obſervatio in Anthro-  
pographia propoſita, ubi reſert, ſe in hyſtericis virgini-  
bus teſtes deprehendiſſe pugno grandiores, ſeroſo ſemine  
turgentes, quin etiam tubam uteri amplificatam & valde  
dilatatam. Veſalius verò ſimile quippiam obſervavit in  
nobili quadam puella, uteri ſtrangulatu laborante, in qua  
alter teſtis inſtar majuſculæ pilæ protuberabat, croceo  
humore, ſimulque graviſſimè olente, ac venenofum quid  
& tetrum ſpirante reſertus, qui humor conterminas ſedes  
tingebat, non ſecus, ac colon inteſtinum, qua ſub jecore  
fertur, à cyſtide fellea luteum reddi cernimus.

Verum non valde recedit Sennertus à prædictorum ſen-  
tentia. Poſito enim, quòd ille aſſerit, teſtes & tubam uteri  
dum ſemine corrupto & humoribus vitioſis, ac flatibus re-



plentur & turgescunt, per hypogastrium hinc inde moveri, & ad umbilicum usque ascendere posse: cum partes illæ utero sint contiguæ, per hypogastrium, & ad ipsum uterum moveri nequeunt, quin simul uterus moveatur, atque adeo toti utero ex partibus suis integrantibus eique connexis composito, motus iste facile tribui potest. Deinde, si testes & tuba uteri, dum vitiosis humoribus aut flatibus replentur, variè commoveri possunt, quidni etiam uterus, iisdem humoribus aut flatibus refertus, iisdem motibus cieri potest? Convincit quidem ratio Sennerti à Galeno mutuata, uterum quatuor ligamentis constrictum ad diaphragma non posse ascendere, imò ne quidem ad ventriculum; sed ad umbilicum usque proferri posse, ubi Authores prædicti globum illum perceperunt, negandum non est: tum quia ligamenta illa aliquantulum extendi possunt à materia turgente; tum quia uterus, dum inflatur, locum ampliorem occupat, & versus umbilicum percipi potest. Sive igitur totus uterus, sive partes illi annexæ, nimirum testes & tuba uteri sursum moveantur, semper ascensum uteri nominare possumus, doctrinæque Hippocratis adhærere.

Dolor capitis ex utero variis modis contingit: interdum enim totum caput obsidet, aliàs sinciput, aliàs occiput invadit, aliàs circa oculos percipitur, ut è sede sua quasi erupturi videantur.

Fiunt autem isti dolores à prædictis vaporibus acerbis & malignis ad caput elevatis, & partes illius membranofas vellicantibus: humores etiam pravi, ab utero translati, hunc dolorem excitare possunt. Sanguis enim vitiosus, ex vasis uteri regurgitans, & præsertim tenuior ac ferofior illius portio ad caput usque ascendit, & in membranofas partes effusas, dolores illos procreat, qui dolor interdum pungens & ulcerosus est, ex vaporum aut humorum acrimonia; interdum tensivus, à copia & multitudine, tensionem efficiens; interdum verò pulsatorius, quando vapores aut humores per arterias feruntur, vel quando arteriæ partis alicujus capitis peculiaris sanguine fervido replentur.

Epilepsia ex utero ab iisdem vaporibus acerbis & malignis excitatur, qui cum insignem acrimoniam atque malignitatem adepti sunt, partes nervofas vehementius & acerbius feriunt; unde fit, ut illæ contrahantur, & ad exclusionem rei noxiæ motibus convulsivis agitentur.

Palpitatio cordis ab iisdem vaporibus sæpè contingit ex utero ad cor elevatis, illiusque facultatem expultricem irritantibus.

In arteriis etiam dorsi & hypochondriorum pulsatio contingit, ex sanguine fervido, ex utero in ilias arterias translato, easque distendente, unde pulsatio major fit, quæ partes vicinas feriens, pulsationis sensum in iis inducit. Fiunt tamen interdum hujusmodi pulsationes in melancholia hypochondriaca, quæ in horum affectuum diagnosi erunt distinguendæ.

Varii etiam in ventriculo, hepate, & liene affectus oriuntur ex utero. Ventriculi læsiones dejectam appetentiam, vel eandem intensiorem, vel ad absurda propensam, vel singultus, vomitus, aut ructus, aut cardialgiæ excitant. Quæ omnia symptomata à prædictis vaporibus, in ventriculum transmissis, per arterias hypogastricas & cœliacas, vel alios cœcos ductus excitantur. Varia autem illa symptomata vapores isti inducunt, pro diversa eorum natura, diversoque putredinis & malignitatis gradu. Prout enim calidi sunt, inappetentiam & sitim excitant. Si verò frigidi fuerint, coctionem lædunt. Absurdorum verò appetentia & maligna humorum & vaporum qualitate dependet, ut in pica à nobis ostensum est: ac pro diversa malignitatis specie fit, ut appetitus magis ad hanc, quam ad illam rem feratur, ut aliæ carbores, aliæ gypsum, salem, cinnamomum, aliaque absurda appetant. Ex certa etiam malignitatis specie dependet quorundam eduliorum peculiaris aversio, & quod mirabilius est, in quibusdam apparuit potus omnimoda aversio: sicut narrat Ludovicus Mercatus de illustri quadam muliere, potum omnino aversante, & de alia, quæ licet potum sibi porrigi expeteret, cum tamen vomitu rejiciebat, simulque gravibus aliis symptomatis vexabatur. Ubi conjicere licet, humores

pravos in ea muliere malignitatem fuisse adeptos, illi consimilem quæ in hydrophobia generari solet. Negandum tamen non est, partium diversitatem, ad quas humores illi & vapores maligni deferuntur, non parum conferre ad symptomatum varietatem efficiendam. Si enim ad os ventriculi ferantur, appetentiam lædunt & cardialgiam inducunt. Si in ventriculi cavitatem effundantur, ructus & vomitus excitant. Si ventriculi tunicis hæreant, nauseam perpetuam inducunt. Si acrimoniâ insigni prædiæ sint, singultus aut dolores efficiunt; qui etiam dolores à copia gravante ac distendente exoriri possunt.

Hepatis læsiones ex sanguine menstruo retento, & per venas ad eam partem resfluente, facillè generantur, hinc morbus virgineus à sanguineo pravo ab utero in hepar, & ab hepate in totum corpus effuso generantur. Hinc tumores, febres aliique affectus quamplurimi in toto corpore, variisque partibus oriuntur, cum omnes ab hepate nutrimentum capiant.

Si verò sanguis ille vitiosus ab utero in lienem resfluat, tumores, obstructions, & affectiones melancholicæ atque hypochondriacæ excitari solent.

Ac denique mulieres varios in lumbis, cruribus, aliisque partibus dolores patiuntur, ex vitiosis humoribus atque vaporibus, ab utero ad eas translatis. Quæ omnia symptomata, ex utero oriunda ab aliis naturæ consimilis: aliunde provenientibus, ab aliis causis productis, sequenti diagnosi distinguuntur.

Primò igitur diagnosi hysteriæ suffocationis ab iis, quæ supra relata sunt, majori parte desumi potest. Apparent enim in ea symptomata enumerata, non omnia quidem in omnibus; sed quædam in his, alia in illis, variâ causarum dispositione. Illa autem symptomata sunt læsa respiratio, in qua nonnunquam strangulæri videntur, aliàs verò respiratio imminuitur, aut aboletur, sine ulla molestia aut suffocationis sensu; totius corporis refrigeratio; vocis & pulsus interceptio, interdum etiam motus & sensus abolitio: interdum deliria, convulsiones, syncope, vomitus & singultus prædictis sociantur.

Verùm ad clariorem diagnosin signa prius proponenda sunt, quæ affectum imminem indicant: qualia sunt, murmur abdominis cum ructu vel nausea, lassitudines, oscitationes & pandiculationes, à materia statulenta, quæ ab utero in varias partes elevari incipit; tristis aspectus & pallor faciei, à retractione caloris nativi versus suos fontes excitatus.

Ingravescente affectu sensus strangulationis urgere incipit, quasi ex grandiori bolo devorato, quem in faucibus se habere putant. Postmodum respiratio intercipitur, & suffocatio augetur. Ac tandem actiones omnes vitales & animales depravantur, imminuuntur, vel abolentur. Hinc deliria, convulsiones, aliaque symptomata gravia. In quibusdam uterus sensibiliter agitur, & quali conglobatur & in variis abdominis partibus globi instar percipitur. Declinante verò affectu, seu paroxysmo hysterico, humor quidam è locis muliebribus effluit, intestina obmurmurant, oculi attolluntur, genæ rubore suffunduntur, actiones animales resituuntur, corpus incalescit, suspiria profunda emittuntur, sicque ægra sensim resituitur.

Ex signis propositis affectio hysterica à cognatis & consimilibus affectibus, puta syncope, apoplexiâ & epilepsia facillè distinguitur. Differentia tamen, quæ inter illos affectus intercedit, peculiariter annotanda est.

Ac primum tribus signis generalibus conjicere possumus symptomata quæ hysterica passioni & prædictis affectibus sunt communia, ab utero dependere potius, quam a primario cordis aut cerebri vitio. Quorum primum est, quod si ægra hysterici affectu sit obnoxia, & prædicta symptomata pati non rarò consueverit, dum illa de novo adveniunt, de alio affectu cogitandum non sit. Secundum est, quod mulieres, dum symptomata illa pati incipiunt, de utero malè affecto conquerantur. Tertium est, quod hysterica mulieres foetidis, naribus admotis, & suaveolentibus, in pudenda immisissis, magnum levamen percipiant, quod in aliis affectibus non contingit.

Peculiariter verò à syncope distinguitur hysterica affectio



fectio, quod in illa respiratio & pulsus omnino amittantur; in hac verò aliquantulum remaneant, licet valde imminutè, donec ad extremum periculum pervenerint. Secundò, syncope promptius invadit, & quasi derepente corripit ægrotantem. At in hysterico affectu signa evidentia procedunt futuræ accessionis. Tertiò, pallor faciei major est in syncope, minor autem in hysterica suffocatione. Imò verò, nonnullæ mulieres hysterica in paroxysmo faciem habent rubicundam, & tunc hoc solo signo affectus certissimè distinguitur. Quartò, in syncope ut plurimum sudores frigidi & diaphoretici apparent, qui in suffocatione hysterica non reperiuntur. Quintò syncope brevior est, & citò ad salutem, vel ad mortem terminatur, hysterica verò suffocatio diuturnior est ad diem unum, vel plures interdum perseverat. Hoc tamen advertendum est, syncopem cum hysterico affectu aliquando complicari, quando nimirum cor gravius afficitur, vel vires admodum debilitatæ sunt ex diuturniori affectu; & tunc mixta esse possunt utriusque affectus symptomata.

Ab apoplexia distinguitur suffocatio uterina: primò quod in hac parte non sint ita resolutæ, neque sensus tactus omnino abolicus sit, ut in apoplexia, sed si pungantur, aut pili avellantur, manu sufficienter indicant, se dolorem sentire. Secundò, in apoplecticis stertor perpetuò apparet: in hoc uteri affectu minimè. Tertiò, hystericae mulieres post accessionem, meminerunt eorum quæ dicta, aut facta sunt, quod in apoplexia non contingit.

Ab epilepsia distinguitur: Primò, quod convulsivi motus non perpetuò conjuncti sint cum hysterica suffocatione, nec, ubi adsunt ita universales sint, ut in epilepsia, sed unum vel alterum tantum membrum concutiant. Secundò, pulsus in epilepticis major est etiam, quàm in statu naturali: in hystericis verò contrario modo se habet. Tertiò, in epilepsia spuma circa os apparet, in hoc verò affectu minimè. Quartò, epileptici non meminerunt eorum, quæ circa ipsos facta sunt; quod in hystericis fieri dictum est. Quintò, hystericae mulieres in fine paroxysmi ut dormientes excitantur, cum murmure ventris inferioris, quasi utero quiescente, & in suam sedem redeunte, & interdum magna humoris copia per uterum effluente, quæ in epilepticis non contingunt.

Oportet etiam inquirere, quomodo hystericae mulieres à mortuis distinguantur, cum plurimis historiis proditum sit nonnullas pro mortuis habitas, & sepulturæ destinatas aut sepultas fuisse. Id quidem Authores variis modis explorant. Vel enim lanam carptam aut plumas leviores ori admovent, quæ si non moventur, agram pro mortua habent, vel speculum tersum ori apponunt, quod halitu emissu infici debet, si ægra vel tantillum spiret: vel cyathum aqua plenum pectori imponunt, & si aqua nullo modo moveatur agram pro mortua habent. Hæc signa ut plurimum locum habent; sed perpetua non sunt, nec omnimodam certitudinem præ se ferunt, cum antea dictum sit, quasdam mulieres hystericas solâ transpiratione vivere, instar animalium, in latibulis degentium hyemis tempore, & omnino abolitam in iis esse respirationem. Quod licet rarissimè contingat, cautio tamen illa observatione digna est, ne mulieres affectu hysterico defunctæ, ante tertium diem sepeliantur, aut saltem, donec foetere incipiant.

Signa causarum etiam proponenda sunt, quæ ternario numero fuere comprehensæ, illæ sunt semen retentum & corruptum: sanguis menstruus, item retentus & corruptus & cacochymia in uteris vasibus aut cavitatibus contenta.

Si à femine retento vel corrupto hic affectus oriatur aderunt, vel præcesserunt omnes causæ; quæ illud augere, coacervare, & corrumpere in vasibus poterunt, ut florens ætas, Veneris matura, ut illi prius assuevit, quàm postmodum interniserit, temperamentum sanguineum, vita otiosa, & voluptatibus dedita: victus lautus & opiparus, tum usus ciborum facillè corruptibilium. In his si contingat hysterica passio, mensstruis commodè fluentibus, concludendum erit, à retento femine dependere.

Si à sanguine mensstruo retento & corrupto affectio hysterica dependeat; illius suppressio, aut imminutio aderit, atque insufficiens expurgatio, muliere interim suffi-

ciente coitu utente. Et suppressionem illam quædam symptomata sequuntur, ut melancholia, iracundia, torpor, somnolentia, capitis dolor, mammarum inflatio, gravitas lumborum, & crurum.

A cacochymia verò exoriri affectum uterinum ostenditur, si mensstruis commodè fluentibus, cum sufficienti Veneris exercitio hic affectus contingat, & mulier senio vicina sit aut valde cacochymia, vel aliquo alio uteri affectu laboret.

Aliorum verò symptomatum, ex utero provenientium, & supra descriptorum diagnosi paucis proponenda est.

Dolor capitis ex utero proveniens, cognoscitur ex eo, quod menses non debitè procedant, dolor præcipuè infestet, vel augeatur, instante vel apparente fluxu mensstruorum & uterus non rectè se habeat. Distinguere etiam possumus, an vapor vel humor hunc affectum excitet? Si enim dolor gravativus non sit, & per intervalla recurat, à vapore fieri certum erit. Si verò continuus sit, cum gravitate conjunctus, humorem in parte contentum indicabit: qui si biliosus fuerit, dolor mordax, pungens, & acutus: si pituitosus, torporem inducet: melancholicus, tristitiam.

Cordis palpirationem, & articularum in hypochondriis & dorso pulsationes, ventriculi, hepatis, & lienis affectus, tum etiam dolores varios, ex utero provenire conjiciendum erit, si alia uteri affectus signa, & symptomata supra enumerata simul adfuerint. Tum etiam, si graveolentia naribus, & suaveolentia pudendis admovendo, quodam modo niteant.

Quoad prognosin attinet. Rarò hic affectus interficit ægrotantes, sed valde chronicus esse consuevit. Aliquando tamen propter syncopem supervenientem, aut insignem convulsionem, vitæ periculum ægrotantes incurrunt. Tum etiam si affectus sæpius repetat & difficilè solvatur, periculum est, ne respiratione toties læsa, calor nativus suffocetur & vita deficiat.

Illæ passio hysterica est deterior, in qua plures partes in contentum trahuntur: cum etiam illa, quæ à femine corrupto exoritur, vel diuturnâ suppressione mensium.

In senioribus vix curatur hic affectus, propter insignem cacochymiam, quæ se fecere solent. In juvenibus plerumque cessat, quando parere incipiunt.

In prægnantibus & puerperis periculosum est malum. In illis quidem propter metum abortus in his verò, ob virium post partum imbecillitatem.

Sternutatio hysterica mulieri superveniens, bona, Robur enim significat cerebri: & illo motu maligni vapores cerebrum obidentes, discutiuntur: tum humores vitiosi, in utero contenti evacuantur.

Curatio hysterici affectus duplex instituenda est: una in paroxysmo, altera extra paroxysmum. In paroxysmo vapores illum efficientes discutiendi & revellendi: humores in utero contenti, unde vapores illi elewantur, evacuandi, & uterus ad propriam sedem, quando ad ea dimovetur, ut sapè fit, juxta doctrinam Hippocratis reducendus. Quæ omnia sequentibus remediis impleri possunt.

Primò itaque ægra in lecto ita collocanda est, ut cervicem & scapulas acclives & elatas habeat. Inguina verò, & femora declivia; ita enim uterus facilius reducitur.

Postea verò fieri debent ligaturæ dolorificæ partibus inferioribus, tum etiam frictiones celebrandæ earundem partium: nec non cucurbitulæ coxis admovendæ. Tum etiam cucurbitula magna, pectini admoda, multum prodest; Cavendo tamen, ne supra umbilicum applicetur: quod multi imperitè faciunt, sic enim uterus sursum retrahi ur, ubi convulsionem adsunt, vel animi deliquia, frictiones asperæ conveniunt in plantis pedum, etiam cum sale & aceto; tum etiam avulsionem pilorum capitis & pudendorum, contusiones digitorum, inelamationes altâ voce, & alia hujusmodi.

Utile etiam, plantis pedum admovere cataplasma epispasticum in hunc modum compositum.

℞. Fol. artemis. matricar. rutæ, ana M. j. salviæ M. sem. stercor. columb. pulver. ʒ. iij. sap. ois nigri Unc. j. β. succini, thuris, mastiches pulverat. an. ʒ. j. β. succi rutæ, & oxycrat. q. s. Fiat cataplasma.



Eodem tempore foetida & graveolentia naribus admoventur, ut plumæ perdicum combustæ, vetera coria usta, & sulphur accensum; oleum gagatinum, pomum ex assâ foetidâ, castoreo, galbano, rutâ: malaxatis cum syrupo artemisiæ, vel aceto; sarta ex ruta, tanaceto, absinthio. Ab iis tamen, quæ ex jam dictis fortiora sunt, abstinendum, si scemina epileptica fuerit, quia ab iis cerebrum offensum agitur, unde humores in illius ventriculos præcipitantur ac symptomata ingravescunt.

Fumus tabaci, ori & naribus ægrotantis insufflatus, eam à paroxysmo citissimè liberat.

Contrà verò suaveolentia utero admoventa, ut moschi aut zibetæ grana aliquot, cotone involuta.

Naribus pulvis sequens insuffletur.

℞. Piperis albi, sinapi, pyrethri, castorei, an. ʒ. j. Fiat pulvis tenuissimus.

Si mulier valdè summo sepulta videatur; proritetur sternutamentum (juxta *Aph. Hip. 35. sect. 5. Mulieri, quæ hysterici molestatur aut difficulter parit, superveniens sternutatio, bonum.*) Quod quidem etiam à prædicto pulvere non raro proritatur. Sin minùs; tantillum hellebori albi, aut euphorbi correcti adjiciatur.

Naribus quoque oleum succini, vel etiam gagatinum illiniri poterit.

At verò clysteres laxantes & caëminantes præ cæteris remediis conferunt, ad discutiendos vapores tetros paroxysmum producentes, quorum formula talis esse poterit.

℞. Fol. mercurial. pariet. artemisiæ, pulegii, rutæ, calamenti, ana M. j. Sem. carvi, cumini, & baccarum lauri, ana ʒ. ii. Coquantur ad lb. i. ʒ. In colat. dissolve hieræ picræ, & bened. laxat. an. ʒ. vi. olei rutacei ʒ. iij. camphoræ ʒ. ʒ. Misce, fiat clyster.

Si primus clyster non sufficiat; iterandus erit ex eodem, aut simili decocto, dissolvendo diaphoenici ʒ. x. terebinthinæ, vitello ovi dissolutæ ʒ. j. cum oleo prædicto, camphoræ in oleo nenuph. solutæ ʒ. sem.

Ac denique perseverante affectu, tertius merè hysterici & discutiens, non autem purgans injiciendus est, qui valdè efficax ita componi poterit.

℞. Olei rutac. ʒ. iv. aquæ vitæ ʒ. i. vini generosi quartaria iij. galban. ʒ. ij. Misce, fiat clyster, qui injiciatur, præmissis clystere laxante.

Clyster ex oxycrato hystericum paroxysmum statim cohibet; vapores illum efficientes comprimendo & coagulando.

Idem præstat oxycrati ejusdem cyathus, ore assumptus.

Consultunt etiam Authores ventrem supra umbilicum fascia fortiter alligare, ut reducatur uterus, & vaporum ascensus prohibeatur.

De venæ sectione est magna dubitatio, utrum scilicet in ipso paroxysmo conveniat; Cum enim tum ingens adsit virium dejectio, & aliquando de vita dubitatio, & refrigeratio totius corporis, à malignis vaporibus cor & cerebrum infestantibus, qui nullo modo per venæ sectionem excludi possunt: non est dubium, quin ex usu illius, accessionis tempore, maximum imminet periculum. Huic sententiæ adspiciuntur Varandæus & Sennertus. Contra verò Mercatus & Rodericus à Castro statuunt, in talo venam esse aperiendam, quando effectus producitur à sanguinis mensuræ copia, atque retentione: & nullo alio remedio vires onere pressas, vias nimia redundantia obcæcatas, & suffocationis periculum, levare posse. Siquidem in hoc casu neque foetida, neque odorata, neque cucurbitulæ ægram à paroxysmo suscitare solent. Philippus Hæchstetterus *observationum parte secundâ*, nonnullis historiis ostendit venæ sectionem in pede plurimum profuisse. Ita ut virgo quædam monialis, quæ aphona & convulsa per biduum fuerat, post duas horas à venæ sectione fari cœperit, comedere, ac bibere. Existimamus nos, venæ sectionem posse celebrari, si pulsus fuerit validus, & manifestæ plenitudinis notæ appareant. Si verò pulsus languidus appareat; esse abstinendum, & intervallum esse expectandum, in quo tutius sanguis detrahi possit.

Emplastra utiliter sub umbilico admoventur solent, ex massa emplastri ceronei composita, quod emollit & discutit,

atque melius est emplastro pro matrice vulgari, quod aliquantulum adstringit; & sic vapores & humores malignos retinere potest. Fiunt etiam emplastra ex galbano & assâ foetida, vel ex gummi caragna & tacamacha, vel solis vel admixtis quibusdam aromatis. Exempli gratia.

℞. Gummi caragnæ ʒ. sem. pulv. nucis mosch. & caryophyl. an. ʒ. ʒ. olei succini gutt. iv. terebinth. ʒ. j. Fiat empl. Hujusmodi emplastra ad formam scuti fieri debent, & in parte acuta, aquæ ad vulvam vergere debet, apponenda gr. aliquot moschi, vel zibetæ, ut gratum odorem utero inspirent, ipsumque retrahant. Moschi, gr. iij. excipiantur cotone, paucis oleo humectato, & intrudantur in foramen umbilici. Deinde admoveatur emplastrum parvum ex galbano liquato. Hoc quædam mulieres pro secreto utuntur.

Vel camphoræ g. iv. dissolv. in ol. amyg. dulc. & umbilico indantur, admoto desuper emplastro diapalmæ.

Si statuum copia affectum fovere videatur; convenient fons & semicupia, ex decocto fol. rutæ, artemisiæ, thymi & calamenti, sem. fœniculi, anisi, cumini, baccarum lauri, flor. chamæm. anethi & similibus.

Sacculi etiam parari poterunt, quibus includuntur cuminum, anisum, semen dauci, fel. ruta, surfur, & bene calidi applicentur, ac sæpe iterentur. Vel

℞. Olei rutacei ʒ. iv. spiritus terebinth. ʒ. ʒ. Misce, immergatur panis recenter è furno extractus, & umbilico applicetur.

Inunctiones quoque ventris inferioris, & totius uteri regionis, pectinis, & lumborum, non erunt inutiles: eò quod vias dilatent, vapores attenuent & discutiant. Eæque parantur ex oleo nardino, de spica, anethino, sesamino, de croco, & lilior. & amygdal. dulcium.

Maximè commendant Authores suffuturi ex verrucis, quæ tibiis equorum adnascuntur: quæ in calente furno exsiccentur, & in pulverem redigantur, ac naribus suffumigium fiat, tanquam præsentaneo remedio, & magnâ adstantium admiratione. Solent mulieres ferè in instanti à paroxysmo liberari.

Si à semine retento affectus oriatur; nihil coitu conducibilis est, cum mulier fuerit excitata, si viro conjuncta sit.

In coitus penuria multi consulunt pudendorum confrictionem atque titillationem ab obstetrice factam, immixtis digitis in uteri cervicem, oleis aromaticis perunctis. Verum, cum id sine scelere fieri nequeat, à Medico Christiano nunquam est præscribendum.

Ad vapores istos malignos, paroxysmum hystericum producentes, discutiendos, multa per os exhiberi solent, è quorum numero sunt theriaca vetus, ad ʒ. j. exhibita cum aqua artemisiæ, pulegii, melissæ, trochisci de myrrha ad ʒ. ij. vel ol. succini ad gutt. v. vel sex cum iisdem liquoribus.

Pilulæ in frequenti usu esse consueverunt, quarum præcipuæ ita componi possunt.

℞. Castorei, myrrhæ & assæ foetidæ, an. ʒ. j. sæculæ bryoniæ ʒ. ʒ. sum. rutæ & croci, an. g. vij. Cum syrupo de artemisia fiant pil. xij. Capiat tres vel quatuor: quas si ægra devorare nequeat, dissolvantur in aqua artemisiæ.

Ad vehementissimum paroxysmum sequentes utilissimæ sunt, eumque certò sedare.

℞. Assæ foetidæ ʒ. j. castorei g. vj. laudani g. iij. Fiant pil. tres, vel iv. Capiat statim.

Pilulæ foetidæ majores, licet purgantes sint, tamen in paroxysmo utiliter exhibentur ad ʒ. ʒ. Blandè enim evacuant, nec nisi sedato prius paroxysmo purgare consueverunt, ita ut ad operationem nullum sit metuendum periculum.

Aquæ etiam multæ exhiberi solent in paroxysmo: nimirum aqua vitæ, cinamomi, vel theriacalis.

Vel aqua specifica in hunc modum componi poterit.

℞. Rad. zedoar. sem. dauci, rad. levistici, an. ʒ. ij. myrrhæ rubræ, castorei, an. ʒ. ʒ. rad. pœoniæ, ʒ. iv. visci querc. decrescente lunâ collecti ʒ. iij. Præparatis affunde aquæ matricariæ lb. iv. sem. Spiritus vini lb. sem. Digerantur per triduum, postea destillentur, Dosis cochl. j. per se, vel cum aqua conveniente.

Paratu facilior, & gustui gratior, neque minùs efficax ita componi poterit.

℞. Sac-



℥. Succor. melissæ, borrag. depurator. an. ℔. ii. croci opt. 3. i. Infundantur, & destillantur in balneo. Dosis coch. i. cum jusclo. Hæc potiuncula in communi usu habetur.

℥. Aquæ cinam. 3. 6. aquæ naphthæ 3. iv. castorei g. iv. Misce fiat potio.

Oleum succini, ad gutt. iii. vel iv. exhibitum, cum aqua flor. arantiorum, vel alia specifica, paroxysmum hystericum citissimè discutit.

Potio sequens plurimum conferre solet, ut in observationibus nostris videre est.

℥. Aquæ artem. ros. & flor. arant. an. 3. i. aquæ cinam. 3. iii. confect. de hyacintho 3. i. pulver. elect. diamarg. frig. 3. 6. croci g. iv. Fiat potio.

Aqua naph. sola ad 3. iii. vel iv. utiliter exhibetur. Sed cum moscho & sang. draconis permixta, miranda præstat, quod testatur Solenander his verbis: *Mulier quædam sævis-  
simis symptomatibus affligebatur, dolore capitis, ructu, contra-  
ctione corporis, dolore inguinis, stridore dentium, aliquando  
in terram cadens sine voce, ore clauso, ut aperire non posset;  
atque ex matricis vitio omnia. Remediis multis frustra factis,  
supervenient mulier quædam vetula dedit tredecim grana  
moschi, & totidem sanguinis draconis vulgaris ex 3. vi. aquæ  
flor. arantiorum: sanata est, nec unquam in postcrum istos  
dolores passa est. Idem medicamentum in simili casu à me ex-  
hibitum semper profuit, exhibitum autem aliquoties.*

Ungula alces ad hunc affectum est etiam utilissima juxta experimentum Appolonii Menabei, tract. de alce c. 10. his verbis: *Contra matricis suffocationem unguem alces  
præsentaneum esse remedium, & ab aliis audivisse, & peri-  
culo facto me cognovisse fateor. Nam accersitus, ut medicam-  
entum adhiberem cuidam mulieri, suffocatione oppressæ,  
data hujus unguis rasura cum radice zedoariæ, aliisque au-  
xiliis ex arte adhibitis, optatum finem cum honore sum con-  
sequutus. Cum præterea intelligerem, eandem sæpe numero  
eo ipso morbo tentari, ut partem hujus ungui collo appensam  
jugiter portaret, injunxi. Quod cum sedulo fecisset, quam-  
diu ego interfui, tribus nempe mensibus, ea semper molestia  
caruit, unde mihi multoties gratias egit.*

Camphora accensa & in aquam conjecta, ibique ma-  
nens, donec extingatur, præstans est remedium, ad 3. i. exhibita, ut & aqua illa pota.

Juli, seu catuli nucis juglandis, in epistolis à Laurentio Scholtzio collectis, epistola à Thoma Moufero ad Petrum Monavium scripta, hoc elogio commendatur. *In uteri  
strangulatu habeas singulare remedium. Julos, sive canlos  
juglandis in pulverem exsiccatos contunde. Dentur ad 3. iii.  
cum guttulis duabus olci succini. In eo affectu nihil unquam  
novi præstantius.*

In forma pulveris duo parari possunt remedia efficacis-  
sima, & à nobis pluries experta.

Unum fit ex secundina primi partus in camino exsicca-  
ta, & in pulverem redacta. Cujus dosis est 3. i. in liquore idoneo, confectim liberat à paroxysmo.

Alterum fit duabus partibus sulphuris, & una nucis moschatæ. Rediguntur in pulverem & 3. i. pondere ex-  
hibentur.

Pulvis gagates ad 3. sem. vel 3. i. exhibitus multum  
potest.

Pulvis granorum actes seu sambuci Quercetani, cum  
vini cyathis sumptus 3. i. pondere epilepsiam hystericam  
submovet, illiusque recursum impedit secunda exhibi-  
tione.

In pulveris illius defectu, fuligo camini exhiberi potest,  
eadem dosi, in ovo forbili.

Quia verò uterus non rarò pravis & excrementitiis hu-  
moribus refertus est: unde tetri vapores eleventur: illius  
expurgationi incumbendum est, quod commodissimè fiet  
peffario sequenti.

℥. Diaphœnici 3. i. pulv. hieræ picræ 3. 6. terebinthi-  
næ 3. iii. Excipiantur stupis, & fiat peffarium.

Pro potu ordinario bibat ægra leve decoctum cinamo-  
ni, vel carvi, vel anisi.

De vino est controversia, an in paroxysmo hysterico sit  
exhibendum. Hipp. 1. de naturâ mulierum, commendare  
videtur. Illiusque sententiæ ratio maximè favet. Nam

summa corporis refrigeratio, & virium languor, non pos-  
sunt melius sublevari, quàm exhibito vino generoso. Avi-  
cenna tamen omnino prohibet. Et certè, quia hic affectus  
ut plurimum dependet à retento semine, vel sanguine, &  
vaporibus tetris, qui ab utero eleventur: vinum tenuitate  
suâ & summa penetrandi vi materiam morbificam magis  
exagitat. Unde communi experientiâ videmus, mulieres  
hystericas ex usu vini in ipso paroxysmo male se habere.  
Ut hæc difficultas dirimatur, dicimus: vinum ordinariè  
non esse exhibendum tempore paroxysmi, sed tantum  
extraordinariè: quando scilicet ratione virium summè  
collapsarum, complicatæ syncopes, vel instantis mortis,  
cogimur ad præsentaneum illud auxilium recurrere, jam  
omnibus aliis frustra tentatis.

In hac curatione diligenter advertendum est, in præ-  
gnante muliere, hysterico affectu laborante, prudenter  
remedia esse administranda; neque vehementiora illa ac  
valde foetida esse exhibenda, ne abortus concitetur; &  
externis remediis magis, quàm internis, rem esse absol-  
vendam.

In curationis decursu, cordis & cerebri ratio habenda  
est, & si valdè opprimi videantur, propriis remediis illis  
subveniendum est. Cordi, admovendo epithema ex vino  
& aqua florum arantiorum & imperiali, aut ex theriaca  
in vino dissoluta, aut animalia calentia eidem applicando.  
Capiti verò, usurpando ea remedia, quæ in soporosis af-  
fectibus suere proposita.

Extra paroxysmum curatio in prophylaxi, versatur, ut  
accretionis reditus impediatur, aut saltem retardetur.  
Quæ quidem causarum ablatione, & uteri corroboratio-  
ne perficitur.

Primo igitur, tempore convenienti, præcipuè vere, vel  
autumno, solennis evacuatio instituetur, incipiendo à po-  
tione purgante, vel alio medicamento, agrotantis naturæ  
congruo, additis perpetuò quibusdam hystericis.

Deinde, si sanguis redundare videatur, mittendus erit  
primùm ex brachio, postea verò ex pede; eligendo, quan-  
tum fieri potest, tempus remedium inter duas purgatio-  
nes mensiuas.

Postmodum verò, ut pravorum humorum illuvies suf-  
ficienter præparetur & expurgetur; componendum est  
apozema alterans, aperiens, & purgans, ad quatuor, vel  
quinque doses exhibendum.

Si natura ad sanguinis evacuationem per hæmorrhoi-  
des inclinare videatur; aperiendæ sunt, admotis hirudi-  
nibus. Easque in hoc affectu plurimum profuisse testatur  
Mercatus consilio 13. & 14.

Post universam purgationem, ad materiæ morbificæ  
reliquias discutiendas, conveniet decoctum sudorificum,  
per plures dies exhibitum ex ligno sassâras, aut guajaci-  
no cum semine fœniculi, rutæ, & viticis puratum.

In eundem usum maximè convenient thermæ sulphu-  
reæ & bituminosæ, quales sunt nostræ Balerucanæ, qua-  
rum usu multas optimè habere quotidiana experientia  
patefacit.

In affectu diuturno, præter dicta remedia conveniunt  
purgationes frequentes, per pilulas usuales, syrupos, aut  
potiones. Quorum remediorum formulæ ita componi  
possunt.

℥. Agarici trochiscati 3. i. 6. hieræ diacolocinth. 3. i. sem.  
dauci, viticis, an. 3. i. myrrhæ, castorei, diagridii, an.  
3. 6. terebinth. q. f. Fiat massa pilul. de qua capit 3. sem.  
vel 3. ii. bis aut ter in mense.

Syrupus sequens à Mercato maximè laudatur, tanquam  
mirabilis, & omnibus hystericis mulieribus maximè pro-  
ficuus, conf. 13.

℥. Succu mercurialis, & lactis seminis carthami, an. 3.  
vi. aquæ scorzonæ 3. vii. sacch. q. f. ut fiat syrupus. Cui  
adde, dum coquitur, in ligatura, confectiois de hya-  
cintho, alkerimes, & pulveris electuar. de gemmis, an.  
3. ii. Dosis ii. vel iii.

℥. Rad. bryoniæ 3. iii. fol. sennæ 3. 6. agarici 3. ii. zin-  
zib. 3. i. cinam. 3. i. Infundantur per noctem in aqua fon-  
tis. Incolat. dissolve syrup. rosac. 3. i. Fiat potio, fumen-  
da bis, aut ter in mense.



Pilulæ foetidæ majores, bis in mense ad 3. 6. exhibitæ, sunt utilissimæ.

In iis quæ facillè vomunt, utile est vomitum proritare semel aut bis in mense, in hunc modum.

℞. Agarici trochiscati ʒ. i. ʒ. oxymel. ʒ. i. aquæ melissæ, & artemisæ, ana ʒ. iii. Fiat vomitorium.

Chymici sal vitrioli in aqua appropriata exhibent à 3. ʒ. ad 3. i. & hysteris affectibus specificum prædicant.

Post singulas evacuationes roborantia nonnulla exhibenda sunt, qualis esse poterit opiata sequens.

℞. Conservæ anthos betonicæ, melissæ ana ʒ. i. ʒ. pulv. electuar. diamoschi, & diacalaminth. an. ʒ. 6. Cum syrup. de artemis. fiat opiata.

Theriaca sola huic usui est aptissima, quæ in calidioribus naturis temperari poterit admixtis conservis nymphææ, capill. ven. & simil.

Sed longe efficacior est pulvis sequens, qui diuturnas & contumaces affectiones hystericas sanat, si frequenter assumatur 3. i. pondere cum vino, aut pane hostiario, vel in boli formam redactus, cum syrupo artemisæ.

℞. Rad. gentianæ, dictamni albi, tormentillæ, pyrethri, rhapon. bistortæ, aristolochiæ rotundæ, carlinæ, baccarum lauri, angelicæ, imperatoriæ, Sem. coriandri præp. Sem. anisi, gran. juniperi, mastiches, boli armenæ orient. terræ sigillatæ, an. ʒ. ii. ʒ. croci orient. ʒ. ii. ʒ. Fiat pulvis tenuiss. in vase bene clauso reservandus.

Neque omittenda sunt illa medicamenta, quæ virtute specifica hysteris affectibus mederi consueverunt. Quæ quia majori parte odore ac sapore ingrata sunt, in forma pilularum frequentius exhibentur, quarum exemplum tale esse poterit.

℞. Assæ fetidæ ʒ. 6. castorei, myrrhæ, galbani, sagapeni ana ʒ. i. Cum melle mercuriali fiat massa, de qua capiat ʒ. ʒ. vel ʒ. i. frequenter.

Platerus etiam ex vehementer odoratis pilulas componit in hunc modum.

Moschi gr. vi. benz. ʒ. 6. sacchari ʒ. i. Cum aqua cinnam. fiant pilulæ ʒ. ʒ.

Aquæ hysteriæ supra descriptæ, in paroxysmo exhibendæ, extra paroxysmum etiam utiliter usurpari poterunt, fumendo cochlear i. vel ii. manè per intervalla.

Matthiolus bryoniæ radicem valde prædicat his verbis: *Bryonia mulieres, vulvæ strangulationi obnoxias, mirum in modum juvat, adeo ut eas à strangulatu liberet & sanat. Equidem novi mulierem, quotidie ferè, per annos hoc morbo vexatam, quæ tandem à quodam vulgari herbario edocta; ut vinum album biberet, in quo vitis albæ radice ʒ. i. efferebisset dormitum itura, semel in hebdomada: cum hac medicina per annum usa fuisset, optimè ex illo morbo convaleuit.*

Hepar lupi exsiccatum, & 3. i. pondere exhibitum, epilepsiam hystericam præcavere potest, si ter aut quater exhibeatur post usualem purgationem.

Chymici ad hunc effectum vitriolum Martis commendant, ejusque granum unum, vel duo, cum dupla sacchari portione exhibent, per multos dies, cum vino, aut liquore idoneo.

Imo verò ad gr. xii. xv. & xx. exhiberi potest cum conserva idonea; vel in pilulas efformari cum mucilagine gummi tragacanthi.

Cremor tartari frequenter exhibitus huic etiam affectui curando utilissimus est.

Hæc duo remedia non solum aperiendo, sed etiam refrigerando conferunt. Sæpè enim calida intemperies in hoc affectu, utero infixæ est, à sanguine intra illius venas retento & excalefacto oriunda: quemadmodum dicit Galenus, in melancholia hypochondriaca esse phlogosin in hypochondriis, à sanguine, in iis propter obstructions retento & supercalefacto: idè ea, quæ uterum refrigerare possunt hic maximè convenient; qualia sunt semicupia, oxycratum ore assumptum, & per clysteres injectum, & similia quibus addere licet historiam ab Hervæo relatam in tractatu & partu mulieris, hysteris symptomatibus nulli remediorum generi cedentibus, diù laborantis, quæ tandem post multos annos ab uteri prolapsu sanitatem recuperavit. Quia nimirum uterus aëri externo expositus

refrigeratus est; sicque phlogosis illius & calida intemperies repressa.

Ipsius etiam chalybis usus à quibusdam Practicis maximè commendatur, tamquam omnibus affectibus uterinis opportunissimus. Cujus præparationes defumentur ex curatione obstructionis hepatis.

Cauteria cruribus admotæ maximè etiam conferunt. Ab utero enim pravos humores derivant, ratione venarum, quæ utero & cruribus communes existunt.

Neque negligenda amuleta de collo suspensa supra regionem umbilici, quemadmodum antea monuimus, ungulam alces hoc modo conferre. Alii laudant radicem peucedani gestatam. Et nostrates mulieres non infelicitè gestare solent frustulum assæ foetidæ, linteo raro inclusum. Alias vidimus, quæ vulpis veretrum exsiccatum cum testiculis, de collo suspensum, supra umbilicum gerebant, & sese hoc modo ab insultibus hysteris præservabant.

Aliæ gestant frustulum carnis lupinæ exsiccatæ, vel hepatis lupi, non sine fructu.

Quod ad remedia externa attinet, post singulas purgationes, aut saltem semel in mense, octo vel decem diebus ante purgationem mensuram convenient fatus, aut semicupia, ut colliquatus humor, morbi causa, per referatas vias facilius effluat. Et parari poterunt ex rad. althææ, lilior. bryoniæ, ireos, rubiæ, valerianæ, angelicæ, fol. artemisæ, nepetæ, matricariæ, melissæ, baccis lauri, & similibus.

Ad materiæ morbificæ reliquias discutiendas, & uterum roborandum, post forum, vel infessum, emplastrum sequens sub umbilico admoventi poterit.

℞. Gummi tacamahacæ & caragnæ ana ʒ. ii. alyptæ moschat. ʒ. ʒ. Sem. agni casti ʒ. i. ʒ. santal. omnium, an. ʒ. 6. terebint. ladani, ceræ, ana q. s. Fiat emplastrum.

Si à semine retento hic affectus oriatur, usurpantur illa remedia, quæ ad semen extinguendum & discutiendum supra in furoris uterini curatione descripta sunt.

## C A P U T VII.

### De uteri inflammatione.

**U**teri inflammatio est tumor illius partis, à sanguine in illius substantiam effuso.

Illa autem inflammatio vel totum uterum occupat, vel aliquam illius partem. Et vel à puro sanguine producitur ac phlegmone simpliciter appellatur; vel bilem ipsi permixtam habet, & phlegmo dicitur erysipelatodes: vel jungitur cum pituita, aut melancholia; & phlegmo œdematodes, aut schirroides nominatur.

Causæ ad hunc effectum producendum aut promovendum idoneæ, variæ esse possunt: temperamentum scilicet sanguineum, plethoricum, aut biliosum; naturalis uteri laxitas, & viarum amplitudo; aër impensè calidus humores inflammando, vel frigidus, constringendo, & profluentia menstrua, vel fluere parata coercendo; vehemens exercitatio, coitus immoderatus, ictus vel casus supra regionem uteri; animi pathemata graviora, præsertim iracundia, alimenta acriora & calidiora, & quæcunque alia assumpta acrimoniâ insigni, atque erodendi facultate prædita, ut de cantharidibus auctiores referunt, quas non solum vesicæ, sed etiam utero valde insensas asserunt; pessaria acriora diutius usurpata: medicamenta cathartica aut alterantia, qualia plerumque usurpantur à sterilibus mulieribus undecunque exquisita; mensium retentio plethoram augendo, vel nimia profusio vasi relaxando, & motum humorum à toto corpore in hanc partem promovendo: cucurbitulæ etiam pubis regioni admotæ attrahere possunt violenter ad regionem uteri, in eaque cohibere sanguinem, & alios humores. Idem præstare possunt partus laboriosus, abortus, contrectatio violenta partium genitalium ab obstetrice imperita, & gestatio foetus molesta.

Signa diagnostica sunt, rumor, calor, & dolor in regione uteri cum febre continua. Sed quia rectum intestinum & vesicæ eandem regionem occupant: ideo aliis signis uteri inflammatio distinguenda est: qualia sunt mensium suppressio, aut diminutio, eorumque color pallidus, aut citrinus,



ac dolorifica excretio; & in mensum absentia ichores quidam fetidi ac putridi refudant, & locos muliebres irri-  
gant. Quorum etiam investigatio claram affert diagnofin. Oſculum enim interius tumidum, retractum, & dolorifi-  
cum apparebit: cervix uteri rubicunda & inflammata erit,  
tumentibus venulis per eam diſperſis.

Si totus uterus laboret, omnia ſymptomata erunt vehe-  
mentiora. Si magis uteri cervicem inflammatio teneat; ca-  
lor & dolor maximè ad inguina & pudendum extendun-  
tur. Si anterior pars laboret, major erit veſicæ ſympathia: ſi  
poſterior, rectum inteſtinum magis laborabit, & dolor ad  
lumbos exporrigetur. Si pars dextra, aut ſiniſtra inflam-  
metur, tumor & dolor circa alterutrum inguen apparebit,  
& crus ejuſdem lateris gravitate quadam afficietur.

Signa cauſarum ita investiganda ſunt. Si à ſanguine  
puro inflammatio fiat, omnia ſymptomata ſunt mitiora: ſi  
verò bilem admixtam habet; febris eſt ardentior & omnia  
ſymptomata ſunt vehementiora. Si verò ſanguis pituito-  
ſus ſit, aut melancholicus; febris erit minùs acuta, ſed  
morbus diuturnior ac contumacior. Tum etiam ad iſtam  
diagnofin referenda erunt ſigna humoris, in toto corpore  
prædominantis.

Si inflammatio in ſuppuratum abeat; dolor & febris  
augentur, & horrores ſæpe ſine ordine oriuntur, plerum-  
que tamen circa velperam recurrunt. Omnia etiam reli-  
qua ſymptomata intenduntur. Suppuratione factâ omnia  
mitescunt, & tumor magis attollitur; ex quo interdum  
alvus, aut urina ſupprimitur. Si verò inflammatio ſine ſup-  
puratione diſcutiatur; tumor imminuitur, ſymptomatibus  
mitescentibus.

Si denique in ſcirrhum degeneret; febris, dolor, &  
reliqua ſymptomata imminuuntur, tumore perſeſcente,  
& duritiem majorem adipiſcente: tum etiam pondus &  
gravitas permanent non ſolùm in utero: ſed in partibus  
etiam circumjacentibus, ut ægra corpus difficile movere  
queat.

Prognofis hujus affectus bona inſtitui non poteſt, quia  
periculoſiſſimus eſt, & ut plurimum lethalis. Majus tamen  
vel minus periculum portenditur, pro magnitudine morbi,  
cauſæ, ſymptomatum in hunc modum.

Si inflammatio totum uterum occupat, morbus eſt  
deploratus: ſi verò aliquam tantum partem; ſalutis ſpes  
adeſt.

Si mulieri gravidæ in utero ſit eryſipelas, lethale, ex  
Hipp. Aphor. 43. ſect. 5. foetus enim propter inſignem in-  
flammationem emoritur, unde ſequitur abortus, qui in gra-  
viſſimo morbo accedens, matrem jugulat. Gal. in comment.  
hujus Aphor. dubitat, num hæc ſententia de omni inflam-  
matione pronuncianda ſit, & num, utero inflammationem  
patiente, foetus poſſit aliquando vivere.

Inflammatio uteri facile in gangrænam degenerat: quia  
uterus, veluti totius corporis cloaca, excrementorum illu-  
viem recipit, à quibus calor nativus facile ſuffocatur.

Uteri inflammationi delirium, convuſio, ſingultus, ex-  
tremorum frigiditas, ſudor diaphoreticus ſuperſeſcens,  
mortem brevi adventuram portendunt.

Si inflammatio uteri ſuppuretur, ſolutio illius ſperanda  
eſt: ſed ulcus ſordidum ſequetur, à quo ægra lentâ febre  
contabefcit, vel in hydropem incidit.

Si inflammatio in ſcirrhum mutetur: malum diuturnum  
evadit, & ſæpe hydropem accerſit.

Ad curationem hujus affectus, ſanguinis ad uterum  
fluxus revellendus, repellendus, & derivandus eſt: qui fluxit  
& in parte continetur, reſolvendus: Et, ſi tumor ad ſuppu-  
rationem vergat, ea adjuvanda eſt, ruptoque abſceſſu, pus  
evacuandum. Quod fiet ſequentibus remediis.

Præmiſſo igitur clyſtere emolliente & refrigerante,  
mittitur ſanguis è baſilica lateris magis affecti, vel ab  
utraque, ſi totum uterum tumor occupet: & phlebotomia  
reiteretur bis, ter, quater, pro ægræ viribus & phlegmo-  
nis magnitudine.

Poſt ſufficientem revulſionem, & tranſacto morbi au-  
gmento, ubi nulla ampliùs ſuſpicio ex fluxionis adhuc  
ficientis: venæ inferiores aperiendæ ſunt ad derivationem  
à parte affecta. Quo ſenſu audiendus eſt Gal. lib. de ſang.

Lazari Riverii Opera,

miſſione, & 13. meth. cum docet; in uteri inflammationibus  
venas poplitæ & iliacæ eſſe aperiendas. Attamen quam-  
diu aliqua revellendi indicatio perſeſerat, ſatius eſt venas  
brachii aperire.

Ad revulſionem etiam conveniunt frictions & ligatu-  
ræ ſuperiorum partium, item cucurbitulæ ſcapulis, lumbis,  
& dorſo admotæ.

Si vitioſi humores, præcipuè biliſi in corpore abun-  
dent, qui reliquorum humorum influxu quaſi vehiculum  
ſint: ii lenibus medicamentis evacuandi, ut ſyrupo roſa-  
ceo & violato ſolutivo, mannâ, rhab. catholicone, vel elec-  
tuariò lenitivo: fortiora enim humores nimium commo-  
vendo fluxionem excitarent.

Vomitória autem, licet præſcribantur ab Avicenna,  
minimè convenire videntur. Si enim blanda & mitiora  
ſint; nihil penè evacuant. Si fortiora, magnam corporis  
agitationem efficiunt, unde humores commoti magis in  
partem irruere poſſunt.

Propter inſignem febrem refrigerantia medicamenta  
uſurpanda ſunt, ut julepi & emulſiones: quibus, ſi immen-  
ſæ vigilæ, dolor, & inquietudo ægrotantem vehementer  
afficiant; narcotica erunt permiscenda, quæ etiam ſorſim  
exhiberi poterunt.

Poſt primas evacuationes, topica admoveantur imo  
ventri, inter umbilicum & peſtinem, & circa renes: pri-  
mò repellentia & refrigerantia, in forma linimenti, epithe-  
matis, & cataplaſmatis.

Linimentum ſit ex oleo roſaceo, loto in acetò, vel un-  
guento roſaceo, cerato ſantalino, refrigerante Gal. addito  
paucò acetò.

Epithema fiet ex aquis, vel decocto plantaginis, ace-  
toſæ, ſolani, ſummitat. papav. albi & roſarum, addendo bo-  
li armænæ, ſang. drac. vel terræ ſigillatæ tantillum.

Cataplaſma parabitur ex mica panis albiſſimi cum lacte  
cocto, cui parum olei roſacei, ſucci hyoſcyami, vel ſolani,  
cum vitellis ovorum addatur. Vel ex farina hordei, ſemin.  
lini, ſœnugr. cum oleo roſaceo, quibus etiam prædictæ  
plantæ contuſæ addi poterunt.

Injectiones in uterum fieri debent, in hunc modum  
compoſitæ.

℞. Fol. plantag. nymphææ, ſolani, endiv. an. M. j. roſ.  
rub. P. ij. Coquantur ad tertias, & adde olei myrtini ℥. j. ace-  
ti ℥. 6. Fiat injectio.

Ex iſdem herbis contuſis, cum oleo roſaceo & acetò,  
fieri debent peſſaria, & in uterum immitti.

Neque verò diutius utendum eſt repellentibus & refri-  
gerantibus, ne tumor indureſcat, & in ſcirrhum degeneret:  
Ideòque repellentibus emollientia & reſolventia permis-  
cenda: ea cautione, ut quò longiùs phlegmone à principio  
diſtat, major ſit quantitas digerentium. Sic prædictis reme-  
diis malva, althæa, artemiſia, ſœnug. chamomilla, melilotus,  
(auctâ, vel imminutâ, eorum doſi) admilcri poterunt.

Interim ſi alvus eſt dura, emollienda eſt, blande purgan-  
tibus. Imò verò, ad temperandam inflammationem, cly-  
ſteres refrigerantes frequenter injecti plurimum prodeſſe  
poterunt, cum uterus recto inteſtino incumbat. Eorum  
autem minima ſit quantitas, ut diutius retineantur, & ne  
uterum comprimant: quorum tale ſit exemplum.

℞. Rad. althææ ℥. j. fol. malvæ, viol. lactucæ, an. M.  
j. ſolani M. 6. flor. violar. roſ. an. P. j. prunor. acidor. num.  
x. Coquantur in aqua hordei. Colat. ℥. vj. adde olei ro-  
ſacei ℥. iij. Fiat clyſter.

Si dolor valdè urgeat, prædictis clyſteribus addi pote-  
runt vitelli ovorum, axungia gallinæ, lac muliebre, mu-  
cilago ſem. ſœnugræci, lini, vel malvæ, imò & tantillum  
opii, cum paucò croco.

Tum etiam ſiant injectiones in uterum ex lacte capril-  
lo vel ovillo, cum opii & croci an. g. iij. vel iv. & pauca  
aqua roſarum.

Vel peſſariis addatur opii modicum cum paucò croco,  
vitellis ovorum, & oleo roſaceo. Vel etiam ſiant peſſi ex  
philonio Romano cum cotone. Vel ſotus anodynus in  
hunc modum paretur.

℞. Althææ cum rad. malvæ viol. aa. M. j. chamomillæ,  
meliloti, roſar. an. P. j. Coquantur pro ſotu.

Ccc

Incl-



Inclinante affectu, purgatio iteranda est blandioribus catharticiis. At affectu ad resolutionem vergente (quod ex remissione symptomatum, & minori partis gravitate dignoscetur,) discutientia majori copia prædictis remediis addentur. Vel fiat tale cataplasma.

℞. Pulveris rad. althææ .i. fl. chamomillæ, meliloti an. 3. ij. fol. artemisiæ, pulv. farinæ hordei, & fabarum, an. 3. sem. Coque parum in vino austero; adde pinguedinis porcine recentis, olei chamæmel. & liliorum alborum, an. 3. i. Fiat cataplasma.

Fotus & infusus resolyentes hinc etiam conferre poterunt.

Si tumor resolvi nequeat, sed ad suppurationem vergere videatur, adjuvanda est hæc sequenti cataplasmate.

℞. Pulveris rad. althææ, flor. chamom. meliloti, farinæ sem. lini, fœnugræci, an. 3. i. ficuum pinguium numero viii. Coquantur ad pultis consistentiam. Deinde ad vitellos ovorum num. iv. croci Scrup. β. olei lilior. & butyri recentis an. 3. i. Fiat cataplasma.

Confecto pure, quod ex caloris & doloris remissione, ac quadam inundatione, tangendo dignoscitur, abscessus disruptio procuranda est motu corporis, tussis, sternutatione, cucurbitulis admotis, injectionibus detergentibus & attenuantibus, vel pessariis rumpendi vim habentibus. Exempli gratia.

℞. Adipis asserini 3. sem. terebinth. 3. ij. pulveris, sem. rutæ, nitri, rad. iris an. 3. β. Misce, & cum lana fiat pessarium.

Rupto abscessu, puris expurgationi & ulceri deterfioni ac consolidationi incumbendum est, prout in ulceris uteri curatione jam describenda docebitur.

## CAPUT VIII.

### De ulcere uteri.

**I**Nflammationem uteri suppuratam sequitur ulcus, quod etiam ab aliis causis dependet, quæcumque scilicet in utero erosionem efficere consueverunt.

Causæ igitur illius sunt abscessus disruptus, humores acres in uterum confluentes, acria & erodentia medicamenta in uterum immissa, vel etiam assumpta, ut de cantharidibus supra relatum est.

Causæ antecedentes sunt illæ omnes, quas inflammationem efficere posse supra docuimus: ut partus difficilis, violentus & effrænis concubitus, fluor muliebri acrior & diuturnus, vulnera, casus, & contusiones, præcipuè gonorrhœa virulenta, ac lues venerea, cujus contagium utero, illiusque cervici faciliè communicatur.

Differentiæ petuntur à loco, magnitudine, figurâ, & complicatione cum aliis affectibus.

Ratione loci, nempe variarum uteri partium: modò ulcus cervicem uteri occupat, & internum illius orificium, modò in fundo residet, quòd rarius contingit. Aliquando & frequentius internam uteri superficiem obsidet; aliquando, sed rarius externam invadit: unde fit nonnunquam, ut pus, ab huiusmodi ulceribus emissum, per vesicam vel intestina vacuetur; vel si in cavitate abdominis subsistat, abscessus circa inguina appareant, de quibus loquitur Hipp. *Aphor. 45. sect. 5.*

Ratione magnitudinis: quædam magna, quædam parva: multum scilicet vel parum spatii occupantia, in utero dicuntur. Quæ si sint parva, & superficialia; parum à scabie & pruritu differunt: si verò magna & gravia, ac veluti depascentia, nomæ ab Hipp. non inantur.

Ratione figuræ: ulcera dicuntur rotunda, oblonga, sinuosa, aut fistulosa.

Ratione complicationis cum aliis affectibus, dicuntur phlegmonosa, cancrosa, scirrhusa, dolorifica, saniosa, virulenta, & contagiosa.

Signa diagnostica ulceris, in utero geniti, sunt dolor & mordicatio in utero, vel illius cervicis, & purulentæ materiæ ex utero emissio. Quæ diagnosi amplius illustrabitur, si causæ ulcus producentes supra relatæ præcesserint.

Si ulcus cervicem uteri occupet; ipso visu apprehendi-

tur, immisso speculo matricis: tum etiam contactu, manu obstetricis, vel in concubitu, in quo ægra dolorem percipit molestum. Si verò ulcus fuerit in uteri fundo, dolor percipitur versus regionem pubis, & excrementa profluunt copiosiora.

Si ulcus penetret ad extremam superficiem; urinæ, aut dejectiones purulentæ apparent, vel fluctuatio quædam in abdomine percipitur, vel tumor versus inguina, in quibus abscessum minatur.

Si ulcus simplex fuerit & benignum; pus effluit paucum, album, & minimè fœtidum. Si verò fuit malignum & depascent; sanies erit viridis, livida, & varii coloris, cum fœtore, & magno cruciatu effluens.

Si ex lue venerea duxerit originem; præcessit gonorrhœa, vel adhuc præfens est, & alia luis venereæ indicia apparebunt.

Prognosis desumitur ex Hipp. *lib. 1. de morb. mulier.* nulum scilicet ulcus uteri esse contemnendum, quia fit in parte exquisito sensu prædita, quæ sympathiam habet cum præcipuis corporis nostri partibus, & ab iis illuviem excrementorum recipere valde disposita est.

Si uteri ulcera cancrosa, phagedænica, sinuosa, aut fistulosa evaserint, sunt ut plurimum insanabilia, & toto vitæ curriculo miserè ægotantes crudeliter exercent.

Ulcera cervicem uteri occupantia, facilius curantur, quia remedia iis mediataè admoveri possunt.

In mulieribus, quæ ab hoc morbo convalescunt, perfectæ valetudinis signum est, quando concipere incipiunt, & semen virile commodè recipere, aut menstrua convenienter, & sine dolore effundere.

Curatio ulceris uterini eò dirigenda, ut humorum acrium ulcus vel generantium vel solventium defluxus prohibeatur, & ulceris deterfio ac conglutinatio procuretur. Ad quem finem sequentia in usum revocari poterunt.

Ac primum, si corpus sit plethoricum, vel ulcus conjunctam habeat phlogosim, venæ sectio ex brachio celebranda est, eaque toties repetenda, quoties novæ fluxionis periculum instare videbitur. Tum præcipuè instante purgatione menstrua maximè convenit, ut illa imminuatur, quæ ulceri materiam suppeditare solet, & aliorum humorum in uterum effluxum promovere.

Purgatio etiam maximè necessaria est, ut à cacochymia corpus liberetur, Eaque institui debet ex benignioribus catharticiis, ut fennâ, rhabarbaro, tamarindis, myrobalanis, catholico, & similibus; quæ frequenter iteranda est, ut vitiosi humores ab utero avertantur: eaque tanti est hac in re momenti, ut testetur Forestus *observat. 48. lib. 28* Joannem Thiengium, Medicum Amstelodamensem, nobilem matronam ab ulcere uteri saluti restituisse, cui dabat de quarto in quartum diem 3. v. decocti fennæ, epithymi, rosar. rubr. myrobalanorum Indorum, saccharo dulcorati, & abstergentia decocta in uterum injiciebat.

Ad usum frequentem syrupus magistralis componi poterit in hunc modum.

℞. Rad. synphyti majoris, & polypod. quer. recentis, an. 3. i. corticis citri sicci 3. vi. fol. plantag. vincæ pervincæ, faniculæ, acetosæ, capill. veneris, an. M. i. liquiritiæ rasæ, & passularum mundatarum, an. 3. i. fennæ mundat. 3. vi. sem. carthami contusi 3. ii. agarici recenter trochiscati in ligatura positi 3. x. sem. melon. & anisi, an. 3. iij. flor. cordialium, anthos, & epithymi, an. P. i. Fiat omnium decoctio in aqua hordei. In cujus portione infunde rhabarbari electi 3. β. cinnamoni 3. i. In colat. lb. i. β. dissolve syrupi rosar. solut. 3. iij. sacchari q. s. Fiat syrupus perfecte coctus, de quo capiat 3. ij. vel iij. bis, aut ter in mense, cum decocto agrimonii, & plantag. vel infuso rhab. in aqua endiviæ.

Si ægra faciliè vomat, purgatio per vomitum erit præferenda, quia humores ab utero revellit.

In purgationum intervallis decoctum vulnerarium diù usurpandum est, quod in hunc modum componi poterit.

℞. Fol. agrimon. pimpinellæ. centinodiæ, plantaginis, an. M. β. rad. chinæ 3. iij. sem. coriandri 3. i. passul. min. 3. β. santali rubri 3. i. Coque in jure pulli gallinacei. Colat. capiat manè & serò. Vel

℞. Fol.



℥. Fol. artemis. plantag. millefolii an. M. i. rha-  
pon. 3. sem. vitidis 3. i. Coque in mensura vini albi, & dulcor-  
rentur saccharo. Capiat 3. ij. aut iij.

Si febris urgeat, & magna saniei copia excernatur; se-  
rum lactis erit utilissimum, manè ad 3. vij. vel plures exhi-  
bitum, addendo mellis rosacei, vel sacchari parum.

Si corpus tabescere incipiat, cum vestigio febris hecti-  
cæ; lac, præsertim asininum, cum saccharo rosaceo, per in-  
tegrum mensem exhibeatur.

Sudorifica, absente inflammatione, & calidiori intem-  
perie, etiam conferre poterunt ad ulcus exsiccandum,  
revellendosque humores serofos versus habitum corpo-  
ris.

Terebinthina lota in aquâ utero convenienti, ut arte-  
misia, matricaria, vel ulcerii donea, ut Plantag. rosarum,  
cum saccharo rosaceo sumpta per intervalla, ulcera de-  
tergit, & consolidat.

Pilulæ de bdellio ad 3. i. pro una vice exhibitæ, vel  
singulis, aut alternis diebus, ad 3. i. valdè etiam conferunt,  
& si sanguis fluat, eum compescunt.

Vel recentes eodem modo usurpandæ, sic parari pote-  
runt.

℥. Bdellii 3. ij. myrrhæ, thuris, an. 3. i. sarcocollæ, sty-  
racis, succini, myrobalanorum chebulor. an. 3. 8. coralli ru-  
bri 3. ij. Cum syrupo de papav. fiat massa pilularum, cui  
in dolore vehementi tantillum opii admisceri potest.

Trochisci alkekengi cum opio, dolore urgente, etiam  
soli pulverati propinantur.

Ad dolorem etiam leniendum usurpari possunt eadem  
remedia, quæ uteri inflammatione pro eodem symptomate  
fuerunt proposita.

Pulvis sequens ad ulcus exsiccandum erit non parum  
efficax.

℥. Acaciæ, hypocist. an. 3. i. sanguinis draconis, amyli,  
radicis plantag. aristolochiæ rotundæ, an. 3. 8. boli armen.  
3. i. mastiches, sarcocolæ, an. 3. 8. Fiat pulvis tenuissimus,  
cujus dosis erit 3. i. cum aqua plantag. rosarum, vel chaly-  
beata.

Zacutus Lusitanus *observ.* 87. & 88. lib. 2. opiatam &  
aquam proponit, quibus se desperata uteri ulcera ad cura-  
tionem perduxisse testatur. Earum descriptiones ex dictis  
locis repetere quis poterit.

Ad ulceris deterfionem, exsiccationem, & congluti-  
nationem variæ parantur injectiones. Quæ tamen usur-  
pandæ non sunt, quin prius inflammatio auferatur, quæ  
non rarò hujusmodi ulceribus solet esse conjuncta; si-  
mulque dolor demulceatur, qui non solum valdè mo-  
lestus est, sed etiam partem irritando fluxionem augere  
solet.

Ratione igitur inflammationis illius & acrimoniæ, inji-  
ciuntur prius in uterum emulsiones seminum frigidorum,  
serum caprinum, vel lac integrum, aut solum, aut cum  
succo plantaginis, & burse pastoris permixtum, vel si  
necessitas urgeat: decoctum capitum papaveris & sum-  
mitatum malvæ. Quidam Practici solâ aquâ repente plu-  
rimùm juvari existimant hujusmodi ægrotantes si frequen-  
ter injiciatur. Nec immeritò. Sic enim fervor & inflam-  
matio temperatur, dolor demulcetur, & sordes ulceri ad-  
hærentes abluuntur. Valescus de Taranta etiam frigidam  
probat, his verbis: *Novi, inquit, aliquas mulieres se sen-  
tientes habere hujusmodi ulcera. Lavabant ea cum aqua fri-  
gida, mundabant deinde, & cum pannis lineis exsiccabant,  
& in matricem mittebant frequenter. Atque iisdem præfidiis  
sæpè mutatis, hæc ipsa ver se sæpè ad integram curationem  
sufficiebant.*

Ablatâ intemperie calidâ, & dolore sedato, aut saltem  
magna ex parte imminuto, ad detergentia veniendum est,  
a mitioribus ad fortiora progrediendo.

Mitiora sunt serum lactis cum saccharo, decoctum hor-  
dei cum saccharo, vel melle rosaceo, majoris deterfionis  
gratiâ, vel hydromel simplex.

Paulò validior erit decoctio ex hordeo, lentibus, fabis  
non excorticatis, & foliis apii, parietariæ, plantaginis  
parata, addito melle rosaceo.

Ubi valdè fordium est ulcus, decoctum vulnerarium  
*Lazari Riverii Opera.*

aqua catapultarum vulgò dictum, principem locum obti-  
net; cujus compositio talis est.

℥. Rad. gentianæ, rha-  
ponti, zedoariæ, & aristolochiæ  
rotundæ, an. 3. i. vini albi 8. vj. Bulliant ad tercia partis  
consumptionem. In colat. dissolve sacchari albi 8. sem.  
Servetur ad usum.

Vel sequens decoctio parari poterit.

℥. Hordei integri, furfuris macri & r. sar. rubr. an. P. i.  
fol. agrimon. absinthii, caprifolii & apii an. M. i. fabarum  
& lentium an. 3. ii. liquirit. ras. radic. ireos Florent. & zedo-  
ariæ, an. 3. i. Fiat omnium decoctio addendo circa finem  
parum vini albi.

Si ulcera admodum fœtida, & putrilagine infecta fuerint,  
decoctioni addi poterit parum unguenti Ægyptiaci, colly-  
rii Lanfranci, vel pulveris Mercurii dulcificati.

Ubi ulcus probè deterfuitur atque mundificatum fuerit;  
ad exsiccantia & solidantia veniendum est, quorum for-  
mula talis esse poterit.

℥. Rad. consolidæ major. bistortæ, an. 3. i. fol. plantag.  
caudæ equinæ, burse pastoris, saniculæ, pilosellæ, millefo-  
lii, an. M. i. rosar. rubr. M. sem. Coque in mensura aquæ  
pro injectione.

Prædictæ, aut simili injectioni, pulvi sarcoticus sequens  
admisceri poterit.

℥. Rad. ireos, aristolochiæ, consolidæ major. an. 3. sem.  
myrrhæ 3. i. aloës 3. iij. Fiat pulvis, cujus 3. sem. misceatur  
in qualibet injectione.

Terebinthina lota cum aqua plantagin. ad 3. ij. & dislo-  
luta cum melle, & ovi vitello, injectioni mixta valdè pro-  
dest: idque magis, si pulvis sarcoticus etiam addatur.

Unguenta pompholygos, de cerusa, de plumbo, similiter  
cum injectionibus, an. 3. vj. pro una dosi mixta usurpantur.  
Sed reliquis præstat oleum ex vitellis ovorum in mortario  
plumbeo agitatum.

Suffumigia ad ulcera profunda versus uteri fundum  
inhærentia penetrant, eaque desiccant; quæ ita parari  
poterunt.

℥. Thuris, myrrhæ, mastiches, styracis, calamitæ, gummi  
juniperi, ladani, an. 3. j. terebinth. q. s. Fiant trochisci pro  
suffumigio.

In ulcere contumacissimo cinnabaris addita suffumigio,  
omne feret punctum.

Thermæ quoque siccantes, sulphureæ, & aluminosæ,  
in ulceribus diuturnis usurpantur, eoque mulieres despe-  
ratas tanquam ad extremum remedium, Medici ablegare  
solent.

Emplastra etiam convenientia epigastrio applicare non  
inutile fuerit. Siquidem eorum vires ad interiora usque, per  
insensibiles meatus deferuntur.

Si ulcus sit in collo uteri, linimentis inungendum est  
detergentibus & exsiccantibus. Detergentia in hunc mo-  
dum componi poterunt.

℥. Succii apii 3. ij. mellis rosac. 3. j. sem. terebinth. 3. sem.  
farinæ hordei, vel orobi q. s. Leviter bulliant, & fiat instar li-  
nimenti. Vel

℥. Aristolochiæ rotundæ 3. 8. marrubii, centaur. min.  
agrim. an. M. sem. Coquantur in s. q. hydromel. Colaturæ  
adde pulv. rad. ireos Florent. 3. ij. farinæ orobi, mellis de-  
spumati, an. q. s. Fiat linimentum.

Admoveretur etiam unguentum diapompholygos, ad-  
dendo thus, mastychem, myrrham, aloën, prout ulceris  
ratio requirit.

Ulcere sufficienter mundato, exsiccans & cicatricem  
inducens unguentum admovendum est, cujus forma talis  
esse poterit.

℥. Tuthiæ lotæ 3. 8. lithargyri, cerussæ, sarcocollæ an.  
3. ij. olei & ceræ q. s. Fiat unguentum.

Interdum contingit ulcera uteri ad rectum intestinum  
penetrare, interdum verò ad vesicam: quòd ostenditur pu-  
re per illas partes excreto.

Si per intestinum rectum pus effluat, clysteres lenientes,  
detergentes, exsiccantes usurpandi sunt, quales in dysente-  
riæ curatione suère propositi.

Si verò per vesicam pus effluat, convenient diuretica  
leviora, & refrigerantia, quæ vacuent istas sordes in vesti-  
cam



cam transmissas, & ulceris curationem promoveant: quales sunt emulsiões sem. frig. major. quibus succedent terebinthina, aliaque remedia, pro ulcere vesicæ præscripta.

Si ulcus in fistulam degeneret, quod præcipue contingit, dum exterius versus coxam aperitur, quamvis etiam in ipso utero, ejusdemque cervice idem fieri possit: advertendum erit, utrum magis conducat ægrotanti, meatum jam assuetum relinquere intactum per quem natura vacuationem excrementorum multiplicium molitur, vel ejusdem curationem suscipere: Illud si magis è comodo ægrotantis sit, cura, saltem palliativa dicta, instituenda per purgationes frequenter repetitas, & sudorifica bis singulis annis exhibenda, tum injectiones detergentes & roborantes, atque emplastra diapalmæ, divinum, & similia superimponenda. Si verò sanatio sperari possit, eadem remedia usurpanda sunt, quæ ad aliarum fistularum curationem adhiberi solent.

Si à lue venerea in pudendo, vel sinu uteri fiant ulcera, citra universam hujus luis curationem sanari minimè possunt. In qua perficienda, per varios modos, ille, qui per suffumigia cinnabaris fit, maximè confert: non solum enim ea conducent ad luem illam è toto corpore auferendum; sed etiam peculiariter, si uteri sinu excipiantur, ut hæc ulcera citius sanentur, efficient. Tum etiam in cura quæ per inunctionem hydrargyri fit, unguenta mercurialia in penitiora illa loca erunt demittenda.

In quibusvis uteri ulceribus, si pruritus molestus illius cervicem afficiat, ut non raro solet contingere, ob humoris acris & falsi in eam partem defluxum; ad eum demulcendum conveniet pessarium imbutum unguento enulato cum mercurio; aut Ægyptiaco dissoluto in aqua marina, aut aqua aluminosa, aut butyro recenti, in quo hydrargyrum extinctum sit, addito sulphure.

## CAPUT IX.

### De scirrho uteri.

**S**cirrhi in utero geniti natura differentia, & causæ eætem sunt quæ in hepatis scirrho fuere propositæ, ut eas monstrâ hic repetere non opus sit, sed inde erit depromenda.

Inter causas tamen antecedentes hæc uteri scirrhi propria est, eaque satis frequens dum scilicet mulieres, fluxum menstruorum aut lochiorum patientes, sese imprudenter aëri frigido exponunt, aut aquam frigidam potant: unde sequitur fluxus cohibitio, sanguisque retentus crassescit & condensatur, ac tandem in parte tumorem scirrhum producit.

Signa scirrhi in utero geniti sunt, durities & renitentia in uteri regione, illius circumscriptiōnem referens, gravitas in eadem parte, & ponderis sensus, præcipue quando agra fiat, quasi uterus prolapsurus sit in pudenda, sedentibus verò aut decumbentibus, gravitate suâ rectum intestinum premit, febris carentia, & doloris, quibus distinguitur ab inflammatione, aut saltem dolor est exiguus in scirrho non exquisito, cum in vero nullus sit. Si inflammationi succedat, cessat febris & dolor, manente duritie & renitentia. Si in ipso uteri corpore sit; regionem pubis contrectando facile cognoscitur: si verò in cervice, digiti contactu explorari potest. A mola distinguitur ex causis præcedentibus: tum quòd in mola, menses si fluant, inordinate fluunt; in scirrho autem si fluant, ordinem servant, in mola etiam mammarum lacte turgent, in scirrho autem extenuantur.

Quod ad prognosin attinet: omnis scirrhus curatu difficillimus est. Durities enim valida, semel contracta vix emolliiri potest. Adde, quòd calor natus in parte scirrhi affecta admodum debilis sit, ut ægrè materiam crassam, & ferè lapideam discutere possit.

Magnus & contumax scirrhus hydropem tandem accersit.

Scirrhus uteri, si calidioribus, & nimium humectantibus remediis tractetur, in cancerum degenerat.

Curatio hujus scirrhi ad duo dirigenda est: scilicet ad causam antecedentem & conjunctam.

Ratione causæ antecedentis, phlebotomia instituenda est. Primum è venis brachii, si affectus non fuerit admodum inveteratus. Postea verò, ex venis inferioribus, præcipue quando suppressa sunt menstrua.

Hæmorrhoidum apertio hic etiam utilissima est. Nam & sanguinem sæculentum evacuant; & ab utero derivant, propter venarum communionem, quam habent cum utero.

Purgatio etiam necessaria est, per intervalla repetita, ex medicamentis, melancholiam educentibus, usurpando primum mitiora, mox ad fortiora transeundo.

Purgantibus autem præmittenda erunt præparantia humorem melancholicum, & aperientia, in forma apozematum, juleporum, aut jusculorum, juxta dispositionem ægrotantis.

Ac præter aperientia vulgaria, etiam remedia ex chalybe usurpanda sunt, quibus validissimi isti infarctus rebellium & crassorum humorum, in utero aliisque partibus dissolvuntur.

Ut verò humores superflui ab utero deriventur; utiliter admoventi poterunt cauteria cruribus, tandiu gestanda, donec purgationes mensuræ (quæ ut plurimum in hoc affectu supprimuntur,) ad consuetum ordinem, ratione temporis, quantitatis & qualitatis, redierint.

Ratione causæ conjunctæ emollientia & resolventia medicamenta exterius admovenda sunt, in hunc modum composita.

℞. Rad. althææ & liliorum, an. Unc. ii. fol. malvæ, violariæ althææ, brancæ ursinæ, an. M. i. fol. artemisiæ, neptæ, an. M. ß sem. lini, & fœnug. an. ʒ. i. flor. chamæm. & meliloti, an. P. i. Fiat decoctio, quâ foveatur regio pubis & inguinum, cum sponsa in ea imbuta & expressa.

Ad magis emolliendum, potest fieri decoctio in aqua; & oleo dulci, vel in decocto intestinorum vervecis.

Possunt etiam addi decocto ut potentius evadat, radices bryoniæ, & cucumeris agrestis. Nam à mitioribus incipiendum est, ad validiora progrediendo.

Ex eodem decocto, auctâ dosi simplicium, potest parare semicepium, quod huic rei est efficacissimum, & fortius potentius.

Clysteres etiam frequentes, tum injectiones in uterum, ex eodem decocto erunt conficiendæ, quibus olea liliorum, chamæmel. aut amygdalarum dulcium addi poterunt.

℞. Olei lilior. & amygd. dulc. an. ʒ. iij. mucilag. sem. fœnugr. extract. cum vino albo ʒ. i. pingued. gallinæ, anseris, & anatis an. ʒ. i. ß. butyri recentis, & axungia porci, an. ʒ. ij. ceræ & terebinth. q. s. Fiat unguentum.

Sequens verò in omni scirrho probatur, & à Rhafi describitur 7. ad Almanforem.

℞. Bdellii, ammoniaci, galbani, an. partes æquales. Terantur in mortario cum oleo de been, & liliorum. Deinde adde mucilaginum sem. fœnug. lini, & ficuum parem quantitatem. Fiat unguentum.

Ex eadem materia additâ cerâ, fit etiam emplastrum efficacissimum, admovendum regioni uteri ante & retro. Vel admoveatur emplastrum diachylum ireatum.

Cataplasma fiet ex residua decocti foci prædicti contusâ & per setaceum trajectâ, addendo farinam sem. lilii, fœnug. an. ʒ. i. ficuum, num. vj. pulveris rad. iridis ʒ. ij. croci ʒ. ß. pingued. gallinæ, olei amygd. dulc. an. q. s. Fiat cataplasma.

Lutum bituminosum thermarum sulphurearum & bituminosarum, utiliter instar cataplasmati admovetur.

Suffitus ex lapide pyrite candente, in aceto extincto, miris laudibus effertur à Galeno, ad omnes tumores scirrhusos dissolvendos, ita ut instar incantamenti, operetur. In dicto aceto saturicia & parietaria incoqui poterunt. Advertendum tamen est, ne lapis pyrites sit plumbarius, quia maximè nociturus esset.

Ac denique omnia remedia tam interna, quàm externa, quæ supra in hepatis & lienis scirrhi curationibus fuere proposita, hic etiam conferre poterunt.

Hæc



Hæc tamen medicamenta in toto curationis decursu, summo iudicio ac prudentia moderanda sunt: ne vel induretur scirrhus; vel, quod multò peius est, in cancrum degeneret. Quod omnes Practici verentur, ex incauta, vel diuturniore auxiliorum administratione, à qua melius est per intervalla desistere, ut eorum successus advertatur. Frustrà enim pugnatur, quando scirrhus, omninò indolens, lapideam naturam adeptus est.

CAPUT X.

De cancro uteri.

**C**ancer uteri est tumor durus renitens, in uteri corpore vel cervice, dolorem acerbissimum, punctorium & lancinantem præ se ferens.

Fit ab humore atrabilario in ea parte collecto, vel à scirrho malè curato, qui faciliè in cancrum degenerat, in ea præcipuè parte, ob sanguinis copiosum affluxum, qui in venis scirrhi vicinis retentus, nec sufficienter per menstruas purgationes evacuatus, adurit & malignam corruptionem acquirit.

Duplex vulgò statuitur: ulceratus, & non ulceratus. Quandiu materia morbifica minoris acrimoniæ, & malignitatis particeps est, cancrum efficit non ulceratum. Acrior verò facta per putredinem, vel adustionem, tumorem exulcerat, & cancrum producit.

Diagnosis ex definitione proposita faciliè elicitur. Si enim tumor durus ac renitens in uteri corpore, aut cervice percipiatur, qui dolorem punctorium ac lancinantem efficiat; cancrum esse pronunciare possumus. Evidentiùs tamen distinguitur, si oculis percipi possit, ut quando est in uteri cervice, speculo matricis adhibito: apparebit enim tumor inæqualis ac tuberosus, livescens, aut nigricans, venarum propaginis, quasi radicibus circumseptus. Si verò ulceratus sit; saniem quandam emittit fulvam; aut nigram & graviter olentem, interdum etiam sanguinem, ob erosionem venarum, quæ in partem decurrunt, tantâ copiâ nonnunquam, aperto aliquo vase insigniore, ut ægra vitæ periculum incurrat. His accedit febricula, anxietas, nausea, pudendorum ardor, & similia.

De prognosi hoc tantùm pronunciare licet, cancrum esse incitabilem, sive ulceratus, sive non ulceratus sit. Quod quidem ut de omni cancro, etiam partes externas obsidente verum est; sic potiori jure de eo, qui uterum occupat sentiendum est, ob continuam superfuitatem illuviem, quæ ad eam partem decurrit.

Cum igitur curatio integra sperabilis non sit; ad alteram quæ palliativa dicitur, confugiendum est. Eaque eò dirigenda, ut cancri non ulcerati ulceratio prohibeatur, & ne ulceratus majus incrementum suscipiat, & in utroque doloris atrocitas temperetur. Quod fiet primùm universalibus corporis evacuationibus, & aliis remedijs, quæ humorem melancholicum & atrabiliarium alterent, evacuent, ejusque generationem impendant. E quorum numero sunt missio sanguinis ex brachio, malleolo, hæmorrhoidibus; potiones, apozemata, julepi, juscula, lac, serum lactis, aquæ minerales frigida, & alia hujusmodi, quæ ad cujuslibet cancri, in quamcumque parte siti, curationem à Practicis vulgò præscribi solent. Et purgationes præsertim frequenter iterandæ sunt, ut antecedens cancri materia subtrahatur.

Tum etiam admovenda erunt topica, quæ moderatè refrigerent & adstringant, sine ulla mordicatione: linimentorum formâ in primis usurpantur, quorum præcipua ita componi poterunt.

℞. Ol. myrthini & rosar. an. ℥. ij. succi solani & sempervivi an. ℥. i. Agitentur omnia in mortario plumbeo, cum pistillo plumbeo, donec nigrescant. Deinde adde lithargyri & cerussæ in aqua scabiosæ lotor. an. ℥. iij. tutiæ præp. ℥. ij. camphoræ ℥. β. Fiat linimentum, quo illinatur ter aut quater in die. Vel

℞. Ol. ex vitellis ovorum, & rosar. an. ℥. i. sem. sacchari Saturni ℥. i. Agitentur in mortario plumbeo, donec colorem mutant.

Sequens cæteris præcelit, còque tumores mammarum, qui canerosi putabantur, protèus curati sunt.

℞. Ol. ex vitellis ovorum ℥. ij. succi solani & veronicæ, vel sempervivi, an. ℥. sem. mercurii crudi ℥. ij. Agitentur mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, donec crassum linimentum acquirant.

Linimenta prædicta in uterum immittenda sunt cum turundis oblongis, vel candelis cereis linteolo obvolutis. Injectiones tamen multò faciliùs immitti poterunt, in hunc modum compositæ.

℞. Aquæ hord. lb. sem. aquæ solani, & plantag. an. ℥. ij. aquæ veronicæ ℥. i. trochiscorum alb. Rhaf. Drach. ij. sacch. Saturni Drach. i. Fiat injectio.

Si dolor atrociter urgeat, adde Unc. iv. injectioni, syrup. de papavere unc. i.

Foveatur etiam pars affecta aquis plantaginis & solani, vel eorum decoctis, quibus addi poterunt folia nymphææ, papaveris albi, rosæ rubræ, & camphora. Quod etiam decoctum injici frequenter poterit in uterum: fietque multò efficacius, si in mortario plumbeo agitetur, vel saccharum Saturni eidem permisceatur.

Inter specifica commendantur ranæ lotæ & coctæ, & cataplasmatibus loco impositæ, vel earum decoctio per injectionem adhibita. Tum etiam decoctum, aut succus cancrorum fluviatilium in uterum injectus. Sicut & herba Roberti sumpta vel admota.

Si cancer ulceratus sit, linimentis prædictis mineralium dosis augeatur, iisque cinis cancrorum fluviatilium utiliter addi poterit. Injectionibus verò trochisci albi Rhafis, & aqua hordei cum superiori injectionis materia, permisceri.

Si dolor valdè urgeat: fomenta ex malva, althæa, nymphæa, papavere, hyoscyamo, coriandro viridi, anetho, semine psyllii, lacte, croco, & similibus, per intervalla usurpanda, vel cataplasmata ex eis parata imponenda. Ex quibus etiam decoctis injectiones & semicupia parari poterunt.

Hæc tamen omnia aliquando non sufficiunt ad immanissimum dolorem placandum, qui interdum nullum quieti, & somno locum relinquit. Unde cogimur non rarò ad narcotica recurrere, quæ in hoc affectu propter intensum humorum fervorem, minùs nocent. Et vidimus nos mulierem, cancro in mamma laborantem, quæ singulis noctibus, per quatuor menses laudani gr. ij. vel iij. innoxie & cum maximo solatio sumebat.

Si ex cancro ulcerato multus sanguis prodeat; ut sæpè fit, injiciatur in uterum succus plantaginis cum tantillo thuris.

CAPUT XI.

De uteri gangræna, & sphacelo.

**G**angræna est corruptio; seu morificatio partis incipientis: ubi autem omninò corrupta & emortua fuerit, sphacelus, seu tyderatio nominatur.

In mulierum genitalibus faciliè hic affectus generatur, propterea quòd istæ partes humidiores sunt & molliores, totiusque corporis excrementa faciliè recipiant.

Inflammationi, abscessui, ulceri vel cancro malè curatis sapissimè succedit, quando calor vitalis partis suffocatur, aut destruitur. Suffocatur in magnis inflammationibus, quando plus sanguinis affluit, quàm insitus calor partis digerere, aut in pus commutare valeat. Destruitur vel à frigida intemperie, illum extinguente, vel à calida dissipante ac resolvente.

Cognoscitur gangræna incipiens ex eo, quòd calor insolitus in parte percipiatur; horror ac tremor invadant cum pulsu languido ac frequenti, & animi deliquio. Et cum ut plurimum cervicem uteri magis hic affectus invadat, atque adeò pars affecta oculis explorari possit, ea mollis, livida, nigra, & cadaverosa apparet, ut sine sensu pungi ac secari valeat, tùm foetidum ac cadaverosum halitum expirat.

Quòd ad prognosin attinet, malum hoc gravissimum est ac periculosissimum, imò ut plurimum lethale. Observa-



tum tamen à quamplurimis Authoribus, utrum putredine, & gangrænâ corruptum vel sponte cecidisse, vel sectione ablatum fuisse, cum incolumitate mulierum: quas Authorum observationes magno numero colligit Senen-  
xius *lib. 4. observationum.*

Curatio perficitur iisdem remediis, quæ ad aliarum partium gangrænas adhiberi solent, si gangræna sit in cervice uteri, vel ad externas partes vergat; ut scarificationibus, & ablutionibus, decocto absinthii, myrrhæ, & similibus; unguento Ægyptiaco, cataplasmate de tribus farinis dicto, quod sic habet.

℞. Farinæ hordei, fabar. orobi, an. Unc. ij. oxymel. ℥. i. Coquantur ad formam catapl. Cui si addatur farina lupinorum, myrrha, aloë, & absinthium, efficacius erit.

Quod omnino corruptum & emortuum est, amputandum sectione; aut in uteri procidentia, ligaturâ in dies magis ac magis coarctatâ, & constrictâ. Quarum operationum exempla quamplurima à Schenckio collecta *lib. 4. observationum.*

Refert etiam Wierus in observationibus, à se curatam mulierem annorum 25. cui æstuante caniculâ tuberculum quoddam in sinu muliebri, ex violento forsan mariti concubitu, productum fuerat. Illi autem cum imperitus Chirurgus cataplasmata minus idonea admovisset, intra dies non multos, pars universa putrescere, nigrescere, & emori cœpit, & incredibili celeritate anum versus malum progressum est. Ipse autem sequenti methodo ejus curationem instituit. Primo solani, & plantaginis succum uberrimum, syringua in utrumque meatum ter vel quater in dies iniecit, deinde horis illis intermediis lini hapaum iis succis, admixto aceto, imbutum applicuit, qui ex succis eodem rursus permaduit liquore. Ac in ejusmodi repetitâ aliquoties applicatione perseveratum est, donec restingeretur fervor, & desineret putrefactio. Assumebat interim quoque potionem, singulis diebus ter, ex decocto acetosæ, scabiolæ, pimpinellæ, prunor. damasc. summit. borrag. bugloss. flor. calendulæ, cum aqua, saccharo, & aceto, ad syrupi acidi longi formam apparatus. Victus erat paucus, sed refrigerans & acidus, putredinis occasionem præscindens. Tertio die incendii furia sævitiaque putredinis remisit. Quare carnem nigram mortuam, que exiguo forcipe attrahi circumquaque à vivo sine doloris sensu, separari, resecarique jussit. Inde reliquum ad vivum usque Ægyptiaco unguento absumpsit. Eodemque modo ad cicatricis inductionem, ut in aliis ulceribus, progressus est.

Toto curationis decursu cordis roborationi incumbendum est, tam assumptis, quàm admotis. Tum etiam enemata emollientia, abstergentia, & refrigerantia frequenter infundenda, quæ propter viciniam parti affectæ plurimum opitulantur.

## CAPUT XII.

### De uteri inflatione & hydropo.

**U**teri inflatio, & hydrops ab omnibus propemodum Authoribus confunduntur: ita ut inflationem vocent illum hydropem, qui sit à flatibus; cum hydrops simpliciter dictus ab humore aquoso generetur. Distinguuntur tamen, & datur quædam uteri inflatio, quæ hydrops dici non debet, quando nimirum à flatu subito irruente uterus inflatur ac distenditur, unde dolor intensus excitatur, quem admodum in colico dolore contingit; atque adeo si illa inflatio non diu perseveret, sed brevi discutiatur, hydropis nomen non meretur: talis sæpè accidere solet in hysteriis affectibus.

Duplex igitur hydrops uteri statuendus est, unus à flatibus, qui tympaniti assimilatur; alter verò à seroso humore, qui asciti analogus est. Quidam tertium addunt à pituita, ut etiam leucophlegmatiz similem speciem constituat, quæ in usu practico rarò contingit. Nos tamen nobilem mulierem vidimus, quæ unâ die tantam pituitæ crassæ copiam ex utero excreverat, ut sex vel septem librarum pondus æquare potuerit: quæ procul dubio pituita diutius retenta, hydropem uteri producere potuisset.

Flatus & serosus humor, uteri hydropem efficiens, vel in cavitate uteri, vel intra membranas illius, aut vesiculas continetur. De cavitate uteri est aliqua dubitatio, quomodo flatus & humores in ea contineri valeant; cum facilis pareat exitus per uteri osculum & cervicem. Respondemus, orificium uteri internum pluribus modis occludi posse, vel à pituitâ crassâ, illi parti impactâ & induratâ, vel à tumore scirrhotico, vel aliquâ aliâ causâ. Mercatus censet, pituitam mucosam excerni per orificia venarum, quæ purgationi menstruæ destinatae sunt, & ex illa pituita fieri quandam pelliculam, totam uteri superficiem internam obducentem, in qua pellicula serum & flatus contineatur. Aëtius verò putat, ex illa pituita per venas uteri transmissâ, quosdam produci folliculos, quibus serosus humor contineatur. Fernelius verò putat, sine osculi vitio, & ex simplici illius constrictione, aquam in utero contineri posse. Omnes isti modi recipiendi sunt, & variis exemplis confirmari possunt.

Ac primum flatuum in cavitate uteri contentorum exempla referuntur à Sennerto *praef. lib. 4. part. 1. sect. 2. cap. 10.* quorum primum desumitur à Valeio de Tarenta, cujusdam Judææ Ulyssiponensis, quæ cum prægnantem se esse putaret, eo tempore, quo partus adventurus putabatur, magna flatuum copiâ exclusâ uterus detumuit. Secundum est ex Matthæo de Gradi, qui idem propriæ uxori contigisse refert. Alia etiam exempla ex Dodonæo, Thadæo Duno, & aliis desumpta, similes casus ostendunt, & in usu practico talia videre non rarò contingit. Quibus addere licet historiam, à nobis infra in curatione ex Solenandro relata, mulieris, quæ ex suffitu nucis moschatæ flatum emisit ex utero, cum strepitu, instar sclopeti.

Aquæ verò seu materiæ serosæ, in uteri cavitate contentæ, exempla proponuntur ab eodem Sennerto, ex Rhasi, qui vidit foeminam, ex cujus utero viginti quinque cotylæ aquæ effluerunt: tum etiam ex Jacobo de Patribus, & Dodonæo, simile quippiam referentibus. Vesalius verò foeminam dissecuit, in cujus uteri cavitate serosæ materiæ plusquam sexaginta mensuræ Augustanæ, quæ singulæ tres capiunt libras, repertæ sunt: os verò uteri mirum in modum occalluerat.

Interdum verò aquam intra vesiculas contineri in utero, plurimi testantur Authores, qui hujus rei exempla viderunt in quibusdam mulieribus, quæ tales vesiculas aqua plenas per uterum excluderant. Ex eorum numero sunt Aëtius, Valeriola, Christophorus à Vega, Mercatus, Platerus, & Fabricius Hildanus.

Aliquando etiam hydrops uteri cum gravitate complicatur, ut de propria uxore narrat Fabricius Hildanus cujus venter in monstrosam magnitudinem intumuerat, & tempore partus primum aquæ libras octodecim excrevit, post semihoram verò iterum libras novem, & consequenter puellum sanum & robustum peperit. Similis casus habetur apud Schenckium, sed eventu contrario mulieris, quæ à partu foetus vivi ventris tumorem retinuit, qui successu temporis, magis ac magis increfcens agram de medio sustulit, utero verò aperto, ingens aquæ copia in eo reperta est.

Denique ex sola osculi uteri constrictione, sine peculiari illius vitio, aquæ in utero retentæ exemplum habetur apud Fernelium *lib. 6. pathol. cap. 15.* cujusdam mulieris, hydropo uteri correptæ, quæ, quoties appetebat menstrua purgatio, omnem aquarum illuviem ex utero profundeabat, pelvésque sex vel octo complebat aqua citrinâ ferventissimâ, dum uterus totus subsideret. Collecta proximo mense par colluvies, stato tempore proflebat.

Causa mediata inflationis & hydropis uteri est caloris nativi imbecillitas, quæ vel in hepate & liene residet, ex quibus partibus flatus, pituita, aut serosi humores in uterum transmittuntur, vel in ipso utero, unde prædictæ materiæ in eadem parte, per congestionem, cumulantur.

Causæ autem, quæ calorem nativum debilitare valent, vel per se, vel per accidens, quamplurimæ sunt, ex rebus præsertim non naturalibus petita. Sic aer frigidior, præfer-



cim post partum imprudenter utero receptus; gravissima est hujus affectus causa; quem etiam producere potest, si fluentibus menstruis importunè aëri occurratur: demersio frequens in aquam frigidam, præcipue fluentibus mensibus, idem præstat: tum etiam ciborum frigidorum, aut flatulentorum, ut fructuum, olerum, leguminum, & acetii usus diuturnus: aquæ frigida potus copiosus & intemperativus: somnus longior & profundior, partus vel abortus laboriosus, ipse frequenter recurrens, mensium fluxus immodicus, calorem nativum exhaustiens; vel suppressio, eundem suffocans. His adde peculiare uteri morbos, ut tumores, ulcera, & similia, quæ calorem partis resolvunt; vel etiam osculum uteri occludunt; & sanguinis menstrui atque excrementorum humorum exitum impediunt.

In diagnosi hujus affectus multa inquirenda sunt. Primò, quomodo iste hydrops uteri particularis ab universali totius corporis distinguatur. Secundò, quomodo species illius diversæ dignoscantur, utrum à flatu, sero, vel pituita producat. Tertiò, utrum à primario ipsius uteri affectu; vel ex vitio aliarum partium oriatur. Quartò, utrum materia peccans in cavitate uteri, vel intra membranas illius, aut vesiculis contineatur. Quintò, quomodo ab aliis uteri tumoribus. Sextò, quomodo à graviditate. Septimò, quomodo à mola distinguatur.

Quòd ad primam quæstionem attinet: Ab hydrope abdominis universali distinguitur ex eo, quòd in hydrope uteri tumor fundum ventris magis occupet, hydrops verò universalis abdomen universum æqualiter distendat; Præterea, in hydrope uteri non tam citò apparent pallor & extenuatio totius corporis, quemadmodum in hydrope universali, in quo etiam plerumque sitis & linguæ siccitas conspicua est, non autem in hydrope uteri, tum etiam in eo reliqua omnia symptomata sunt longè mitiora. Durities etiam & renitentia quando fit à flatibus; aut fluctuatio, quando ab aqua generatur, tantum spatium non occupat: quemadmodum in hydrope universali. Ac denique in eo aliquid flatus per intervalla ex utero erumpit; aut tantillum aquæ effluit; quæ manifestè ostendunt, flatum vel aquam utero contineri.

Secundæ quæstioni satisfaciendum in hunc modum. Species hydropsis uteri ita invicem distinguuntur. Si à flatibus excietur; imus venter percussus, sonitum edit, venter doloribus premitur pungitivis, qui interdum per septum transversum, ventriculum, lumbos, umbilicum, aliasque partes excurrunt; nonnunquam flatus per uteri cervicem evidenter erumpunt. Sentiunt quoque sæpe numero mulieres uterum ad ventriculum, instar globi cujusdam efferri. Respiratio interdum difficilis est, & agra à somno excitata, sæpe cum anxietate spiritum ducere cogitur. A cibo & potu quocunque malum exacerbatur. Frequenter eructant & à ru stumelius habent. Suffocationem uteri sæpe incurrunt. Dolorem interdum in regione hypogastrica percipiunt, ut admotam manum ferre nequeant. Hæc signa inflationi uteri etiam conveniunt, cum illa fiat quoque à flatibus: & in eo tantum differunt inter se hi duo affectus, ut antea diximus, quòd inflatio brevior sit durationis, hydrops verò à flatibus, multò longioris.

Si verò uteri hydrops ab humore seroso fiat, regio illa mollis & flaccida apparet; cum flatus tensionem efficiant: gravitas major adest in parte, & sonus veluti fluctuantis aquæ: aliquid aquæ nonnunquam è pudendis extillat. Ac denique, si à pituita oriatur, major erit mollities & flacciditas partis, quæ in dies incrementum sumit & partes circumstantes, nempe hypogastrii, perinæi, ac lumborum, tumore oedematoso affectæ conspiciuntur.

Ad tertium quæsitum ita respondemus. Si apparentia sint totius corporis malè affecti indicia, ut per febres acutas diuturnas, hæmorrhagias immoderatas, fluxiones à capite graviores, ventriculi imbecillitates, lienis, vel hepatis tumores, aliosque earum partium affectus contumaces, cum quibus uteri hydrops inceperit, & cum iis incrementum susceperit; maxima erit conjectura, uterum ab illis partibus per viam rheumatismi, materiam hydropsis suscipere. Si verò toto corpore, satis benè valente, tumor

ille acciderit, & particularibus ipsius uteri affectibus successerit, quales sunt partus laboriosi, suppressiones mensium, vel nimia eorum profusiones, ulcera, tumores phlegmonosi, vel scirrholi; conjiciendum erit, hydropem uteri à peculiaribus illis dispositionibus dependere, & materiam illum producentem, per congestionem ex depravata illius homioiosi cumulari.

Quarto quæsitum satisfiet, dicendo, materiam, quæ in uteri cavitate continetur, multò ampliorem tumorem efficere, quàm dum intra membranas continetur. Deinde, quando fit ex serosa materia, major fluctuatio percipitur, quàm ubi intra membranas coercita est. Si verò quædam vesiculæ, aquâ repletæ, ex utero deiciantur, signum erit certissimum, serosum humorem in vesiculis contineri.

Ad quintum quæsitum respondendum est, hydropem uteri à tumoribus ejusdem partis phlegmonosis, vel erysipelatosi distingui, ex eo, quòd in hisce febris adfit & dolor, ad levissimum contactum sese exasperans: tum inflammatio usque ad partes genitales exporrigitur. A tumoribus verò scirrholis & cancris distinguitur, quòd in eo non sit tanta durities, quæ digitis comprimentibus resistat; sed potius cedat, ac veluti in foveam deprimatur.

Sexto quæsitum satisfaciendum est in hunc modum. In graviditate tumor non est tam æqualis ac depressus; sed acuminatus, & fastigium atque eminentiam quædam circa umbilicum præ se ferens. Secundò, in gravitate post aliquot menses, mulieres melius se habent ut plurimum; quia grandior foetus majorem humorum partem absumit, qui in primis mensibus laborem faciebant. At hydrops, quò ulterius progreditur, eò majores procreat molestias. Tertiò, in graviditate foetus commotio manifestè percipitur post tertium mensem, vel quartum; quòd in hydrope non contingit. Fit tamen aliquando, ut quando hydrops à flatibus exoritur, palpitatio quædam in utero sentiatur. Sed illa à motu infantis facile distinguitur, qui magis æqualis est, & plures ventris partes occupare solet. Quarto in graviditate mammae intumescunt, in hydrope verò extenuantur, ac graciliores evadunt.

Ad septimum quæsitum respondemus in mola gravitatem quandam à mulieribus in ventre sentiri, quæ in hydrope uteri non apparet; & quando agra decumbunt in aliorum latus, pondus eas percipere in illud lapidis instar devolvi. Deinde, in mola fluxus mensuum effrænes per intervalla, tertio scilicet aut quarto quoque mense contingunt; quòd in hydrope uteri non fit. Ac denique, in mola mammae intumescunt, & aliquando lac in iis apparet, cujus rei contrarium accidit in hydrope.

Quòd ad prognosin attinet; Simplex uteri inflatio, quia diuturna non est, periculo vacat. Si tamen citò non curetur, in verum hydropem degenerare potest.

Hydrops uteri, si ab humore benigno & minimè corrupto producat; solet quidem malum esse diuturnum: successu tamen temporis curationem recipere potest, imò interdum ex utero aqua spontè effluit, & mulier convalescit.

Si verò humor pravus sit, acer, aut putridus, quòd ex symptomatibus gravibus innotescit; morbus periculosus est, & plerumque lethalis. Si enim à proprio uteri vitio affectus dependeat, integram denotat functionum naturalium istius partis ruinam, undè universalis hydrops tandem accersitur. Si verò uterus per consensum aliarum partium patiat; hepatis nempe, lienis, aut ventriculi, eo major erit labes, & inde totius corporis ruina impendet. Hinc rectè Aëtius, qualis est uterus in muliere, tale est ut plurimum reliquum corpus.

Si flatus aut aqua in uteri cavitate contineantur, facilius curatur, quàm si intra membranas, aut vesiculas concludantur.

Hujus affectus curatio iisdem ferè remediis perficitur quæ ad hydropsis & chloroseos curationem fuere proposita. Quibus etiam peculiaribus quædam, huic affectui magis appropriata, subnectenda sunt. Ad primum, quòd ad phlebotomiam spectat, in affectu recenti, & suppressione mensium producta, & plenitudine aliquâ adhuc apparente, illa convenire poterit. Alioqui noxia futura est, cum calor



calor nativus admodum debilitatus atque imminutus sit, & contumaces obstructions, ab humore frigido producta, hydropis universalis metam incutiant.

Purgatio verò omnino necessaria est, eaque frequenter repetita, quemadmodum in prædictis affectibus præcepimus.

Post sufficientem purgationem aperientia, diuretica, & menses moventia erunt usurpanda, in prædictis etiam locis descripta, quibus addi poterunt sequentia.

℞. Rad. apii & rubiæ tinctor. an. ʒ. i. fol. fabinæ, matricariæ, pulegii, an. P. j. sem. dauci ʒ. j. Coquantur in jussculo pulli columbini, colaturam capiat manè per plures dies.

Ante jussculi assumptionem una è sequentibus pilulis deglutatur.

℞. Castorei opt. myrrhæ, rubiæ tinctor. an. Drach. β. croci ʒ. j. Cum succo limon. formentur pilulæ ix.

A quibus medicamentis valido exercitio utendum est: Quo quidem non solum excrementa in visceribus & in corporis ambitu concepta, calore mediante, dissipari possunt; verum & totum id, quod in utero continetur, ruptis exercitii vehementiâ pelliculis, foras evocari potest.

Si mulier facile vomat; bis in septimana utiliter vomitus provocabitur. Quo non solum humores ad uterum confluentes, revocabuntur & educuntur; sed etiam dictæ pelliculæ utero inhærentes, & interdum aquosum humorem continentes, motu & agitatione vehementi disrumpi forsan poterunt, unde humoris noxii fluxus consequetur.

Ad dictum humorem in utero contentum discutendum, bolus sequens erit efficacissimus.

℞. Boracis mineralis Drach. β. croci ʒ. β. Cum succo fabinæ, fiat bolus, bis in septimana sumendus.

Sudorifica etiam in hoc affectu non parum proficua sunt: iis enim humores serosi & pituitosi sive in utero, sive in toto corpore contenti, discutiuntur & evacuantur.

Interim innatus ventriculi calor roborabitur, tam assumptis, quam admotis; in affectuum illius partis curationibus descriptis.

Exterius verò topica remedia admovenda sunt, ad uterum roborandum & humores in eo contentos discutiendos idonea.

Ac primum parari poterunt fomenta & semicupia, ex decocto radicum bryoniæ, cucumeris agrellis, foliorum ebuli, mercurialis, sambuci, origani, calamenti, absinthii, rutæ, salviæ, majoranæ, thymi, lauri, pulegii, artemisiæ, seminum genistæ, dauci, cumini, anisi, feniculi, baccar. lauri & juniperi; florum chamomillæ, meliloti, rorismarini. Ex quibus etiam fieri poterunt sacculi, decocti in vino albo. Vel decoqui poterunt prædicta, aut eorum nonnulla in lixivio cinerum farmentorum.

Ut autem melius operentur prædicta fomenta applicanda sunt ante & retro; ægræque sudare debet, si possit in lecto, vel stuphâ commodè paratâ. Quod quidem semicupii beneficio præstari etiam poterit.

In hydrope flatuoso fetus sicci magis erunt proficui ex sacculis paratis ex milio, sale, cumino, furfure, in sartagine torrefactis & vino irroratis.

Post forum liniatur infimus venter oleo nardino, anethino, rutaceo, absinthite, abrotani. Quæ si arte chymicâ fuerint elicitæ, multò efficaciora futura sunt.

A litu admovebitur emplastrum de baccis lauri: vel cataplasma ex stercore vaccino, ovillo, seminibus apii, petroselinii, cumini, & melle cocto.

Et ad eundem usum commendatur pellis recen. mactatæ, ovis, vino meraciori calido irrorata, & ventri calidè admota.

Clysteres frequenter injiciendi sunt, ex decocto absinthii, origani, pulegii, rutæ, centaurii & similibus. Vel ex oleo rutæ, nucum, anethi, & vino albo, aut Hippocratico, aut malvatico. In quibus dissolve benedictam laxativam, diaphœnicum, hieram diacolocynthidos, terebinthinam, confectio-nem è baccis lauri, mel anthosatum, & similia.

Injectiones in uterum, humoribus in eo contentis evacuandis, plurimum conferre poterunt, in hunc modum compositæ.

℞. Rad. asari ʒ. iij. fol. pulegii, calamintillæ, an. M. sem. fabinæ P. j. mechoacan Drach. j. sem. anisi, cumini, an. ʒ. j. sem. Coquantur, & in colat. Unc. vj. dissolve olei iini & sambucini, ana unc. j. Fiat injectio.

Ad eundem finem pessaria conficiantur ita parata.

℞. Colocynth. & mechoac. ana ʒ. j. salis nitri ʒ. β. mellis cocti q. s. Fiat pessarium. Vel

℞. Rad. cyclam. & fulæ, an. ʒ. j. sem. nigellæ romanæ ʒ. β. mellis q. s. Fiat pessarium. Vel

℞. Elaterii ʒ. β. caricarum contusar. q. s. Fiat pessarium.

Quando inflatio sit à flatibus, maximè conducit suffitus ex nuce moschata, à Solenandro commendatus, his verbis: *Mulier quædam puerpera se intempestivius ante tempus debuit ventis committens & aëri, incidit in intolerabiles dolores, neque potuit restitui. Tandem supervenit obstetrix vetula bene exercitata. Jussit sibi afferri nuces tres myristicas grosse contusas. Tum supponebat scilicet testam cum carbonibus ignitis ægræ mulieri, & statim insperso nucum myristicarum pulvere, testam ita supposuit, ut inspersi pulveris suffitus exciperet pudendis, per infundibulum inversum. Per superiora eodem tempore eundem suffitus excepit. Qui ubi penetrasset, mulier statim exclamat. Necessario reddenda mihi alvus. Qua voce vix edita, auditus est sibilus & strepitus, qualis eliditur, cum pulvis tormentarius, alicui pyxidi angustæ inclusus, accenditur. Qui spiritus ubi elisus proruperat, ipso proximo momento mulier sanitati restituta est. Ista experientia monitus, in simili casu, aliquoties postea, idem remedii genus admotum, utile & proficuum inveniri saepe numero.*

In eodem casu utiliter admoventur cucurbitula umbilico, cum multa flatumina, flatus enim egregiè discutit.

In affectu verò humoralis cauteria cruribus admoventur, ut per eos fonticulos uteri sentina sensim exhauriatur.

Sic etiam thermæ sulphuræ & nitrosæ à plerisque laudantur, tam potu, quam balneo. Dummodò insignis fervor jecoris, aut totius corporis, non sit illi conjunctus.

Ad uteri dolorem, in hoc affectu sæpè infestantem, commendat Amatus Lusitanus aquam vel decoctum florum chamæmeli, ad ʒ. iv. vel v. exhibitum.

Ac denique, si à partu inflatio contingat, non opus est alia purgatione, quam eâ, quæ per uterum fit. Quæ si non satis procedat, juvanda est pessariis attrahentibus, & cucurbitulis, femoribus affixis, cæterisque remediis, in mensium suppressione descriptis. Et si flatus adfuerit: suffitus ex nuce moschata supra propositus, erit opportunissimus.

### C A P U T XIII.

#### De uteri procidentia.

**Q**Uando uterus situm suum naturalem amittit, & versus pudenda prolabitur, uteri procidentia, seu prolapsus nominatur.

Varie sunt illius differentiæ, secundum magis & minus tantum differentes. Interdum enim sola cervix interior, provolvitur in vulvam: alias totum uteri corpus procedit, sed non prominet extra vulvam, & in illius margine apparet osculum uteri interius, instar glandis virilis, aut ovi anseris perforati. Alias fundo etiam inverso prominet extra vulvam, instar seroti virilis, aut ovi struthiocameli, cum tamen rugosus sit, ac superficie inæquali præditus; ac denique aliquando ita relaxatur, ut ad femora usque devolvatur.

Causa proxima uteri procidentie est ligamentorum, illius corpus, & cervicem in suo loco naturali continentium, ruptio vel relaxatio.

Ruptio ligamentorum fieri potest ab omnibus causis violentis, ut ictu, casu, saltu, oneris gravioris sublevatione, vel gestatione, compressione abdominis violenta, tussu vehementi & diuturniori, & sternutatione violenta, præcipue in puerperio, alvi compressione forti, partu difficili, avulsione violenta scetus aut secundinæ, conatu vehementi



menti uteri ad expellendum aliquid sibi moleſtum, ut fœtum mortuum, molam, aut ſecundinam; tunc enim contin- git utero, docente Galeno l. 3. de facult. nat. quod duo- bus Athletis, cum ſeſe mutuò deſicere conantur, uterque in terram prolabitur; his adde frequentem cucurbitula- rum admotionem femoribus, & quantlibet corporis & animi agitationem vehementem.

Relaxatio ligamentorum excitatur etiam ex variis cau- ſis, ut catarrho diuturniori, cruditatibus variis, quæ in uterum velut ſentinam totius corporis amandantur. Hinc mulieres, quæ fluore albo diutius laborant, vix hoc ma- lum evitare poſſunt, præcipuè ſeniores, quæ illi maximè ſunt obnoxia. His accedunt cauſæ externæ, ut balnei uſus frequentior, & præſertim in aqua frigida; ær auſtrinus & humidior, præcipuè poſt partum in utero ſuſceptus: alimenta humidiora, potus uberior; otium, ſomnus pro- lixior, & omnes aliæ cauſæ, quæ humoris pituitoli pro- ventum, ejuſque in uterum confluxum promovere poſ- ſunt.

Signa diagnoſtica ſenſibus ipſis patent. Uterus enim in pudendo obviuſ fit inſtar ovi gallinacei, vel anſerini, aut glomeris ſili, cum ſenſu ponderis pudendo incumbentiſ, dum erecto corpore ſtant. Dum verò ſedent, aut alvum exonerant, dolor vehemens percipitur circa regionem pudendi & offis ſacri. Si multum promineant, dolor & ardor major ſentitur; urina paulatim egreditur & vulvam in tranſitu mordet.

Cauſæ procidentiam excitantes ita diſtingui poſſunt. Si à laxitate ligamentorum fiat, ſenſim generatur, minorem habet dolorem, & præceſſerunt purgamenta alba, vel aliæ cauſæ uterum humectantes, ejuſque ligamenta relaxantes. Si verò fiat à ruptione ligamentorum, dolor eſt vehementior, & ſanguis interdum erumpit; ac præceſſerunt cauſæ, quæ violenter ligamenta rumpere potuerunt.

Quòd ad prognòſin attinet, affectus per ſe periculofus non eſt; valde tamen turpis & moleſtus, progreſſionem, ac deambulationem liberam, conſeſſionem & convenientem menſtruorum expurgationem impediens.

Interdum tamen mortem inferre poteſt, ſi dolor, febris, convuſſio, aut alia quædam gravia ſymptomata accedant.

Interdum etiam ab æris intemperie, aut violentâ im- pulſione corrumpitur, & gangrænâ afficitur, quæ partem amputare cogit.

Recenſaffectus, in quo uterus non validè prominet fa- ciliuſ curatur, quàm ſi inveteratus ſit, & magis egrediatur.

In junioribus faciliuſ, quàm in adultioribus uterus in proprium locum reſtituitur.

Quæ à ruptione ligamentorum orta eſt procidentia, in- curabilis eſt.

Ad curationem, uterus in ſuum locum naturalem re- trudendus eſt, ibidemque continendus; & ligamentorum vitium corrigendum. Si nempe diſrupta fuerint, aggluti- nantibus; ſi relaxata, exſiccantibus, adſtringentibus, & roborantibus. Quæ omnia ſequentibus præſidiis perfici poterunt.

Primò itaque, quò uterus in ſuum locum faciliuſ re- ponatur, alvus & veſica exonerandæ ſunt, ne cervicem uteri comprimendo, illius reductionem impédiant: ſi- quidem cervix uteri recto inteſtino incumbit, ſibiſque in- cumbentem habet veſicam.

Poſtmodum verò mulier in dorſum ſupina recumbens, divaricatis cruribus, genibuſque ſuſum attractis manibus uterum introrſum premat, ſuſumque in cervicem truden- do, ſicque invertendo adigat, donec in ſinum uſque omnia remearint. Vel, ſi agrè ſuccedat, obſtetricis opera id per- agat, ut bacillo craſſiori obtuſo linteis involuto hoc faciat, quo & in ſinum profundiuſ, quàm ſolis manibus poteſt repelli. Aut ut minùſ lædatur peſſarium ex panno lineo ſæpiuſ convolutò, filoſque ſtriçtè ligato paretur, & huic uſui accomodetur.

Ac ſi prolapſus uterus intumuerit, ita ut ſinum denuò ſubire non poſſit, tumor ante omnia erit tollendus. Et ſi inflammatio ſit, quæ huic ſanandæ competunt, erunt adhi- benda. Si alia inflatio: quæ eam diſcutiunt, uſurpanda: potuſ nimirum, inſeſſus, inunctiones emollientes & re-

ſolventes. Rodericus à Caſtro tumentem uterum betæ decocto abluit, deinde aceto & ſale ſubindè inſperſo, ac ſic imminuto tumores reducit.

Idem Rodericus ſcribit, ad uteri repositionem pluri- mum conferre, ſi Medicus, vel Chirurgus cauterium ac- tuale, aut aliud ferrum candens manu oſtenderit, & in ute- rum inferere velle ſingat. Ita enim natura contrahitur, & cum ea uterus ipſe, tum etiam quæcumque alia pars extra prominens. Refert enim quendam exercitatiſſimum Chi- rurgum inteſtina per vulnuſ abdominiſ exeuntia, hac in- duſtria repoſuiſſe, cum reliqua remedia non proſuiſſent, Candens etenim ferramentum magnum coram patiente manu geſtans, vulnere applicaturum ſe finxit. Cuius rei ſubito terrore inteſtina è veſtigio in ſuum locum retracta fuère.

Avenzoar. 2. Thezir, tract. 5. cap. 4. quiſpiam non abſi- mile proponit. In principio, inquit, quando apparet hæc agriſudo, Medicus eam leniter poteſt curare. Et reduci- tur omnibuſ iſtis modis, videlicet manu, ſi viſ; & ſi non, fac eam ſupinam jacere, & fac quòd aliquiſ ſedeat ſuper peçtuſ ſuum, & aliuſ ſuper crura, & fac eam terrere, po- nendo circa pedes ejus aliqua reptilia, ſicut ſunt mures & lacertæ aut ranæ, vel hiſ ſimilia: ex quibuſ multum terre- fiat, & velit fugere, trahendo pedes & crura ad ſe: & inde omnia membra, & corpus totum ſimul contrahantur. Et hac de cauſa matrix intrò redibit ad ſuum locum.

Zacutus Luſitanuſ Avenzoarem ſecutuſ; ſequentem hitoriam obſerv. 86. lil. 2. proponit. Cum, inquit, accederem ad ſœminam, quæ ab anno & dimidio uterum prolapſum habebat, cum duritiæ ſumma: difficile videbatur ob ten- ſionem poſſe ad ſuum locum reduci, maxinè cum dicat Avenzoar, in principio hoc opuſ celebratum eſſe, cum adhuc uterus non contraxit callum. Multa ſum præſidia pro hoc morbo curando machinatuſ. Inſeſſiones adſtrin- gentes, peſſaria, emplaſtra, conſeçtiones. Tandem labo- rioſè luçtatuſ nihil proſeci. Ad hoc præſidium accedo: Suppono mulieris cruribuſ mures filo alligatoſ. Quibuſ poſitiſ & per femora vagantibuſ ſœminæ metuſ ingens incutitur, & repente (mirabile viſu) uterus in propriam ſedem reducitur. Hoc factò, emplaſtro contra rupturam uteri regioni, & inguinibuſ appoſito, à malo in poſterum tuta remanſit.

Antequam uterus reponatur, priuſ inungendus eſt mu- cilagine rad. conſolidæ, vel inuſione gummi tragacanthi. Poſtea aſpergendi pulveres, qui aſperitatem nullam ha- beant, ne uterum, aut illiuſ cervicem lædant, ſed glutinandi magiſ, quàm adſtringendi vi polleant. Qualis eſſe pote- rit in hunc modum præſcriptuſ:

℞. Thuris, maſticheſ, & ſarcocollæ lacte muliebri nu- tritæ, an. 3. i. mumia, gummi arabici, acaciæ, hypociſtidis, an. Drach. ſem. Fiat pulviſ tenuiſſimuſ, inſpergenduſ, ut dictuſ eſt.

Idem pulviſ ad formam unguenti admoveri poterit, ſi cum dictiſ mucilaginuſ, aut oleo hypericoniſ, aliòve conſolidante permiſceatur.

Poſtquam uterus convenienter fuerit repoſituſ, omni arte in ſuo loco continenduſ eſt, muliere in lecto remanen- te, aliquantulum inclinata, & cruribuſ extenſiſ, molliter. & ita coaptatiſ, ut unum alteri incumbat. Ac per aliquot dieſ in hoc ſtatu maneat, immiſſo etiam lanæ, aut bombaciſ, vel etiam ſpongiæ fruſtulo in ſinum vulvæ, quò irrigatuni fuerit vino aſtero, aut aqua roſacea, in quibuſ acacia, aut hypociſtiſ diſſoluta fuerit.

Ad hujuſmodi retentionem juvandam, cucurbitulæ ſub mammiſ & umbilico, cum multa flamma, frequenter erunt admovendæ.

Tum etiam bene olentia naribuſ erunt admovenda, & foetida genitalibuſ ſubjicienda, niſi mulier hyſtericæ ſuf- focationi ſit obnoxia.

Foveantur dictæ partē decocto adſtringentium, in vi- no rubro, & aquâ ferratâ parato.

Semicupium etiam ex eodem decocto à Practiciſ uſur- patur. Quòd tamen cautione indiget. Periculū enim eſt, ne ex illo ſitu uterus denuò provolvatur extra ſuam ſedem, potiſſimum in principio, dum adhuc recenſ eſt affectuſ. Ubi



autem diutius ægotantem detinnerit, cæque convenienti subligaculo præmunita fuerit, non parum conferre poterit.

Post fœnicupium, suffitus etiam erit utilissimus, ex thure, mastiche, sandaracha, & rosis rubris paratus. Alii verò commendant tanquam specificum, suffitum ex pelle anguillæ sale conditæ.

Injectiones in uterum multò efficacius operabuntur remediis, quæ exterius admoventur: eæque componentur ex decocto fœtus, aut fœnicupii.

Linimenta & emplastra hæc etiam convenient, qualia in fluxu mensium immodico, & fluore albo fuere descripta, & infra etiam ad abortum præcavendum proponuntur.

Per os assumptis medicamentis adstringentibus & roborantibus, uteri retentio etiam adjuvari potest. Est inter illa pulvis sequens sæpe sumptus, huic affectui peculiariter accommodatus.

℞. Rad. tapfi barbati 3.ii. fol. myrthi, sem. passinac. domestica, an. 3.i. rasuræ cornu cervi 3.ß. cineris conchar. 3.i. coralli rubri Drach. ii. Fiat pulvis. Dosis 3.i. cum vino austero.

De adstringentibus hisce medicamentis tam internis, quam externis, hoc observandum; cautè esse usurpanda si menstrua statis periodis adhuc profluant, ne supprimantur, & graviora mala inde oriantur. Tempus autem huiusmodi remediis magis idoneum est, ubi fluxus menstruus præterit.

Illa remedia per duodecim aut quindecim dies erunt continuanda. Sin-ülque cura est habenda, ne alvus pigrior fiat, aut laxior. Si enim fæces duræ sint, uterus in iis egerendis facile præcipitatur, & fluida nimium alvus ligamenta uteri relaxat.

Dum prædicta remedia usurpantur, causæ antecedenti occurrendum est, iis, quæ humores pituitosos, uteri ligamenta relaxantes evacuare & discutere valent.

Ac primum purgationes convenientes instituere oportet. Quæ tamen non sint perturbantes, violenter operantes, ne uterum de novo præcipitent adductis in eas affatim partes humoribus.

Nonnulli vomitum probant, quod humorum fiat re-vulsio ad superiora. Et eo nomine quidem esse proficiuus, in alia ratione esse metuendus. Quod nimirum magno conatu perficiatur, & non minus quam sternutatio uterum propellet. Imo verò docuit experientia, nihil esse efficacius ad partum difficilem & fœtum citò excludendum, quam vomitorium exhibitum.

Post sufficientem purgationem, decoctum guajaci per tres hebdomadas exhibendum est, ut singulis diebus mane sudor eliciatur. Vespere autem fœtus imo ventri adhibeatur ex salvia, origano, majoranâ, thymo, matricariâ, tanaceto, absinthio, ruta, rosis rubris, radicibus cyperi, calamenti, nucibus cupressi, & similibus, decoctis in aqua fabrorum, & vino rubro. Post fœtus, suffitus, & linimenta supra descripta adhiberi poterunt.

Doco sudorifici, vel etiam post usum illius thermæ sulphuræ, quales sunt nostræ Balerucanæ, erunt præstantissimæ, earumque usu multas convalescere comperitum est.

Ut autem à procidentia, quæ facile iterum recurrit, fœmina secura sit: aut si nulla perfectæ curationis spes sit, subligaculum adhibendum; quod vulgò *Zona Hippocratis* non inatur. Hoc enim munitur mulieres, sine prolapsus periculo ambulare, & munia quotidiana exercere possunt; tum uterus ab externo frigore defenditur. Paratur autem ad eum fere modum, quo fasciæ ad herniam parari solent.

Pessaria quoque in deploratis uteri procidentis utilissima sunt, quæ à nonnullis componentur ex subere satis oblongo, & cera superinducta. Alii ex sola cera conficiunt, & ex iis nonnulli formâ rotundâ, alii ovali, quadratâ, triangulari, aliâve formâ, quæ in ipsam uteri cavitatem inducuntur, & nunquam eximuntur, atque uterum in suo loco retinent: ita tamen, ut mulieres omnia munia conficiat exerceant, cum viris sine incommodo coeant, concipiant, utero gerant, & pariant. Quod pluribus exemplis confirmatur à Francisco Rosseto de partu Cæsareo *sect. 6. cap. 5.* & Baubino in *Appendice ad Rossetum*. Quæ omnia

ad verbum transcripta sunt à Schenkio & Sennerto, capitibus propriis, ubi videri possunt.

## CAPUT XIV.

### De uteri clausura.

**V**irgines, uteri clausurâ laborantes, atretæ, seu imperforatæ nominantur. Illa autem clausura in tribus locis fieri solet: scilicet in osculo uteri interno, in ejusdem cervice, & in osculo anteriori, quod vulva nominatur. Generatur verò aut à prima conformatione, quando membrana quædam uteri orificio aut cervici obtenditur: vel à vulnere, aut ulcere præcedente, quibus coalescentibus, fit partium cervicis uteri, aut labiorum coalitus, vel à tumoribus, meatum interiorem obturantibus. Vel denique à compressione strictura, aut distorsione, quæ pudendi virilis & seminis ingressum, tum etiam menstruam purgationem præpedire solent.

Diagnosis ex parte facilis est, ex parte verò difficilis. Si clausura sit in cervice, aut orificio uteri; non animadvertitur, nisi dum menstrua erumpere incipiunt, aut fœminæ generationis operi incumbunt. Adveniente nimirum menstruæ purgationis tempore, dolores, & tormina in regione uteri certis periodis sentiuntur, cum ponderis sensu: nullus tamen sequitur mensium effluxus. Conjecturam augebit, si virgo bene habita sit, nullaque cachexia, aut obstructionibus affecta. Perseverante affectu, intumescit uterus, ut virgines gravide videantur, & interdum totum corpus, quod etiam livore quodam, ex redundantia sanguinis infectum apparet. Si verò clausura cervicem uteri occupet; in primis coitibus dignoscitur, quando scilicet pudendum virile non admittit.

Si denique orificium uteri clausum sit, difficilè cognoscitur, id tamen peritæ obstetricis manu aliquo modo explorari potest, illiusque conjecturam faciet, si semen virile post ejaculationem statim egrediatur.

Quod ad prognosin attinet; si clausura sit in orificio pudendi, curatu facilis est, levi sectione resolvitur. Si verò peniores partes occupet, longè difficiliorem curationem admittit.

Quando à membrana meatus clauditur, facilius curatur: quando verò à materia carnosa sit coalitus, ut post ulcera contingit, curatio est difficilior.

Clausura, interius uteri orificium occupans, incurabilis est: chirurgica enim instrumenta illic aptari nequeunt.

Curatio uteri clausuræ, cum à Chirurgia maxima ex parte petatur, ideo eam paucis expediemus.

Si à primo ortu clausura uteri contracta fuerit, simplici sectione aperienda est. Cujus modus amplâ narratione describitur à Sennerto *cap. proprio*.

Si verò ex ulcere clausura ortum duxerit, ut in lue venerea contingit; advertendum est, an sit tantum carnis excrescentia, meatum non omnino claudens: an integer parietum cervicis, aut labiorum coalitus. Si enim caro tantum excreverit, tentandum est, præmissis evacuationibus convenientibus, primum, carnis augmentum prohibere siccantibus & discutientibus medicamentis: postmodum, carnem eandem imminuere medicamentis ex thure, aristolochiâ, cortice thuris, rosis, balaustis, mastiche, myrrha, aloe, & similibus. Quæ si non sufficiunt, ad carnem absummentia minus dolorifica transeundum est, ut alumen ustum, unguentum Ægyptiacum, & similia. Ac tandem, si ne hoc quidem modo consumptio obtineri possit; caro in gyrum præcidenda instrumento illo, quo polypi tolluntur. Si verò cervix uteri omnino coaluerit, tentandum est ulcus novare, & medicamentis prædictis carnem superfluam tollere. Sin minus, sectio instituenda eo prorsus modo, quo naturalis cervicis uteri coalitus curatur.

Si à tumore aliquo meatus uteri occludatur, propria remedia illi decernenda sunt: qualia in uteri inflammatione, scirrhus & cancro fuere proposita.

Si fiat à compressione cervicis uteri, vel osculi illius interioris, causa comprimens auferenda, quæ varia esse potest, nimirum



nimirum calculus vesicæ, tumor recti intestini, omentum pinguius, crura, aut femora distorta ac divaricata, quorum curationes è suis locis repetendæ.

In strictura, quæ potissimum fit à duritie, vel siccitate, agendum est humectantibus, emollientibus, & laxantibus, fémicupis, fotibus, linimentis & pessariis: sicque relaxatæ parti immittatur canula plumbea vel ex cera alba optimè concinnatâ, & butyro, aut oleo emolliente irrigata, quam perpetuò gestet, vel saltem noctu, dum decumbit, & interdum immittatur pessus, ex cotone convenienter constructus, & inunctus unguento de althæa, vel simili.

In distortionem, eadem ferè curandi methodus observanda est, saltem canula ita sit conformata, ut in contrariam partem distortionis molliter deflectat: Sic uteri cervix ad locum debitum paulatim reducetur.

## C A P U T X V.

### De Sterilitate.

**S**terilitatis nomen non adeò strictâ significatione hoc loco usurpatur, ut tantum omnimodum concipiendi defectum & integram abolitionem significet; sed in ampla & lata: ut omnem concipiendi impotentiam, omneque impedimentum comprehendat. Quando nimirum mulier eâ ætate quâ ad concipiendum habilis esse debet & viri consuetudine utens, non concipit. Et talis defectus *azoria* seu *azoria* nominatur.

Hæc autem sterilitas, seu concipiendi impotentia, à pluribus causis excitatur: quas omnes, clarioris doctrinæ gratiâ ad quatuor capita revocare possumus, juxta quatuor operationes naturales, quæ ad conceptionem perficiendam requiruntur. Quorum prima est, ut mulier in congressu venereo virile semen in utero recipiat: secunda, ut semen receptum debito tempore retineat; tertia, ut illud utero foveat & conservet: quarta, ut debitam materiam suppeditet ad embryonis conformationem & incrementum necessariam. Hinc quatuor conceptionis impedimenta oriuntur: si nempe mulier semen non recipiat, non retineat, non conservet & non nutriat.

Receptio seminis impeditur à pluribus causis, ex rebus naturalibus, non naturalibus, & præternaturalibus repetitis. Inter res naturales primùm recensetur ætas juvenula, in qua, ob exiguitatem & stricturam partium genitalium, mulier virile pudendum admittere non potest, aut certè nisi cum summo dolore, qui eam concubitum averfari cogat. Eundem affectum præstat ætatis proventus, siquidem in virginibus senioribus partes genitales, defectu exercitii venerei, macidæ ac viætæ factæ sunt, ac strictiores redditæ, ut penem virilem facile postmodum admittere non possint. Quæcumque etiam naturâ claudæ, distortæ cruribus, vel depresso coccyge existunt, vix possunt commodam in concubitu figuram præstare, quæ ad seminis debitam receptionem necessaria est. His adde pinguedinem nimiam, quæ vias uteri angustat, & aqualiculo prominentiore, justum & commodum viri cum femina congressum impedit. Ac denique temperies uteri frigidior torpidas mulieres reddit, ut nulla propemodum voluptate in coitu fruantur, aut tardius saltem excitentur, ita ut internum uteri orificium tempestivè non aperiatur, ad semen virile recipiendum.

Inter res non naturales animi pathemata principem locum obtinent, ac in primis odium inter conjuges, quo mulier ab hujusmodi voluptate averfa, non suppeditat spiritus sufficientes, quibus turgere debent genitalia tempore congressus, ut matrix quasi gestiens semini virili accurat, idque benignè excipiat, attrahatque in civitatem suam, simulque proprio semine, in ea voluptate effuso, perfundat & irriget atque ex amborum commixtione conceptio oriatur.

Res verò præternaturales, quæ seminis receptionem impedire possunt, in morbofis dispositionibus versantur, quæ partibus genitalibus, aut illis vicinis, advenire solent: ut tumores, ulcera, obstructions, adstrictiones, clausuræ, distortionem, calculus vesicæ, & alia hujusmodi.

Secundum mulierum vitium, conceptionem impediens, *Lazari Riverii Opera.*

quando scilicet semen non retinetur, vel à nimia uteri humiditate dependent, quando scilicet uterus multis excrementitiis humoribus refertus est, à quibus laxior factus, non debite constringitur ad semen receptum exactè retinendum, vel orificium illius laxius redditum, non potest sese sufficienter constringere, ad semen retinendum; quod præcipuè contingit ex abortu, vel partu laborioso, in quo fibræ uteri divelluntur, & nimium laxantur, cum orificio interno. Illa autem humiditas immodica & à proprio temperamento, & à causis externis humidioribus, ut balneo, otio, victu humidiori, vel præcipuè à fluore albo excitari potest: qui quidem fluor albus, sive fluor muliebris, frequentissime accidit, cum uterus sit veluti cloaca, ad quam omnes corporis partes suas superfluitates deponunt; ita ut hæc omnium frequentissima & magis ordinaria sterilitatis causa esse solent.

Tertia verò causa conceptionem impediens, quando nimirum semen non nutritur sufficienter in utero, ab iis dependet quæ semen corrumpere apta sunt, ut intemperies uteri quælibet, frigida nimirum, quæ semen extinguit: calida, quæ spiritus dissipat: humida, quæ debitam seminis crassitudinem diluit: & sicca, quæ semen absorbit: atque ita semen, ab hujusmodi intemperiebus corruptum à naturali sua constitutione dejectum conceptioni ineptum efficiatur. His addunt Authores maleficia & incantationes, à quibus conceptionem impediri posse, apud omnes in confesso est. Res etiam externæ, alimenta & venena, idem præstare possunt, quæ ab Authoribus recensentur. Nempè inter alimenta, acetum, mentha, & sisymbrium aquaticum, fabæ, & similia. Inter venena verò, aut saltem deleteriam quandam qualitatem, ad sterilitatem inducendam obtinentia, lapis gagates; vulva capræ; aut mulæ: noctiluca, sapphirus, smaragdus & similia; Ac denique morbi maligni, & labe quadam venefica inquinati, semen maximè corrumpere ac generationi ineptum reddere valent, ut phthisis, elephantiasis, lues venerea, ulcera foetida & cancrofa.

Quarta denique sterilitatis causa, quando scilicet foemina debitam materiam non suppeditat, ad embryonis conformationem & incrementum, ex seminis aut sanguinis menstrui defectu dependet. Sic nimis juvenula & vetula non concipiunt propter utriusque materiæ defectum. Ætas autem conceptioni idonea vulgo definitur à decimo quarto anno ad quinquagesimum. Imò verò licet materiæ illæ non deficient, si dispositiones pravæ adeptæ sint, generationis incapaces fiunt. Præterea autem illæ dispositiones à variis intemperiebus, aliisque morbis induci possunt, tum etiam ex prava victus ratione, illauidabilem sanguinem producentis. Si foeminæ, multis fructibus crudis, & aquæ frigida potu sese ingurgitantes, serosum sanguinem cumulant, generationi ineptum. Fateri autem oportet, nonnullas mulieres concepisse, quibus numquam menses effluerant, ut ex plurimorum Authorum observationibus colligitur. Verum dicendum est, quòd si in illis mulieribus materia defuerit ad menstruas purgationes efficiendas, non defuit tamen ad conceptionem, sed tanta illius copia colligebatur, quanta superesse solet mulieribus, quæ purgantur, licet non suffecerit ad menstruas purgationes.

Causis hæctenus propositis adjungi debet certa feminum, virilis & foeminei improporatio, qua fit, ut rectè invicem commiscantur, & in unam embryonis generationem conspirare nequeant: licet in neutro conjugum aliquis defectus sensibilis appareat. Et contingit interdum, ut idem vir cum alia muliere, & eadem mulier cum alio viro prolem suscipiat, cum tamen simul junctis steriles permanferint. Fit etiam, mulier per decem aut plures annos viro cohabitet, & non concipiat: postea verò concipere & parere incipiat: cujus eventus causa est mutatio temperaturæ, quæ progressu ætatis fit, ob quam semen aliam temperiem recipit, quæ cum antea seminis virilis temperaturæ improporionata esset, per ætatis mutationem proportionata evasit. Illa autem improporatio in eo præcipuè versatur, quando viri valde intemperati cum mulieribus, eodem intemperaturæ excessu laborantibus conjunguntur, puta calidiores viri cum foeminis calidioribus, frigidiores



cum frigidioribus: ista enim intemperamenta nullam mediocritatem conciliare possunt duobus feminibus, & aliis causis ad generationem necessariis. Quidam etiam ad qualitates occultas confugiunt, ob quas semina convenire aut discrepare asserunt, etiam si nullus primarum qualitatum excessus appareat.

His etiam addunt Auctores occultam quandam dispositionem, qua nonnullæ mulieres steriles redduntur, licet nulla causa manifesta appareat.

Signa diagnostica sterilitatis, juxta quatuor propositas causarum classes percurrenda sunt.

Ac primum causæ, feminis receptionem impediētes, difficilem non habent diagnōsin, & ipsis sensibus conspicuæ sunt. Facile enim dignoscitur ætas tenerior, aut provec-tior, mala partium uteri vicinarum conformatio, ut quando mulieres claudæ sunt, vel crura distorta, aut depressam coccigem habent, & pinguedinem nimiam. Frigiditas verò uteri in tertia causarum classe indagabitur. Odium inter conjuges, ex eorum, & adstantium relatu innotescit. Morbi etiam particulares, feminis receptionem impediētes, ut tumores, ulcera, obstructions, adstrictiones, clausuræ, distorsiones, partium genitalium exploratione, ab Obstetrice, vel Chirurgo innotescunt.

Ex causis, feminis retentionem impediētib; quæ secundam classē constituunt, humiditas nimia in tertia classe exponetur. Abortus verò, & partus laboriosus, ex mulieris relatu dependent.

Tertiæ classis causæ quæ scilicet semen corrumpere valent, accuratiorem requirunt diagnōsin, quam nos in hunc modum persequimur.

Frigida uteri intemperies inde cognoscitur, quòd fœmina coitum non appetat, minorique in eo voluptate afficiatur: facies illi mollis, albicans, & obscura est, stupido sensu prædita est circa pectinem, lumbos, & crura, crudum ac tenue semen excernit, & cum exigua voluptate, menses supprimuntur, vel parvè atque inordinate procedunt, suntq; pallidi ac decolores. His accedit prægressa victus ratio refrigerans, in fructuum & olerum usu diuturno, & largo frigida potu consistens.

Humidiorem uteri intemperiem arguunt, laxus & molli: fœminæ habitus, vita sedentaria; fluores albi frequentes ac sermè assidui, menses copiosi, tenues, & aquosi coitus inappetentia, lumborum gravitas, ad abortum proclivitas, urinæ copiosa, & victus ratio humidior.

Calida intemperies cognoscitur ex habitu virili ac robusto, qualis in virginibus existit, facie rubicunda, pilis ac superciliis nigris, voce forti ac virili: his addatur iracundia frequens, ad omnes actiones promptitudo nimia, sitis inextincta, urina flava, menstruum paucitas, color ruber, obscurus, calor & acrimonia, ut sæpè pudenda exulceret, pruritus genitalium, magis ad venerem proclivitas, prompta & celer feminis excretio in coitu, pollutiones frequentes, ac libidinosa insomnia.

Siccā verò uteri intemperiem significant mensium paucitas, oris uteri siccitas, pruritus & fissuræ, quæ rhagades nominantur, pauca in coitu feminis excretio; ex nimio coitu molestia, corporis gracilitas.

Si ex maleficio feminis corruptela & sterilitas contingat, aberunt omnia alia signa, quæ causas manifestas indicare possunt; aderit autem aliquod divortium inter conjuges, cujus neuter rationem satis appositè reddere potest, imò & interdum feminis utriusque ejaculatio rarò, difficulter & cum labore fit.

Alimenta aut venena, semen extinguētia, si assumpta fuerint; ex diligenti mulierum interrogatione, & adstantium relatu perdiscendum est.

Ac denique morbi maligni semen extinguere valentes, ut elephantiasis, lues venerea propriis signis innotescunt.

Quarta sterilitatis causa, quæ in menstrui sanguinis defectu, aut prava qualitate præcipuè consistit, dignoscitur primò, ex nimia totius corporis pinguedine, ad cujus nutritionem sanguis absumitur, & fœtui alendo non suppeditatur. Idem ostendunt corporis gracilitas & summa macies. Cum enim sanguis non sufficiat ad corporis nutritionem, vix superasse poterit ad fœtus incrementum.

Ac denique ea omnia, quæ sanguinem absumere & multum imminuere possunt, si præcesserint, vel affuerint, ejusdem penuriam in corpore significant: ut labores immodici, vigiliæ immodicæ, jejunia austera, larga hæmorrhagia, febres acutæ, vel diuturnæ, ulcera fistulosa, & cauteria multum fluentia.

Nimia etiam sanguinis quantitas interdum feminis atque embryonis nutritionem impedit. Obruitur enim semen à nimia illa copia, nec vim suam plasticam exercere potest. Hoc contingere solet in mulieribus plethoricis ac rubicundioribus, genio & crapulæ indulgentibus, quibus uterus perpetuo quasi madore proliuit.

Prava verò sanguinis qualitas, seu cacochymia, ex pravo mulieris habitu, menstruum colore, aliisque conditionibus alienis, & pravi victus ratione prægressa innotescet.

Seminum utriusque conjugis impropertio difficile cognoscitur. Si ambo calidiori admodum, aut frigidiori temperamento præditi sunt: ex illa intemperie impropertionem provenire conjicimus, si aliæ sterilitatis causæ manifestæ non appareant.

Difficilius adhuc cognoscitur sterilitas, quæ ab occulta quadam dispositione dependet, nullis illius causis manifestis apparentibus. Apud Authores tamen multa reperiuntur experimenta, quibus internosci possit, an mulier à nativa constitutione sterilis sit. Quæ licet omnimodam certitudinem non habeant, coguntur tamen interdum Medici ea in usum revocare, in gratiam Principum, & Magnatum, quibus licet sterilitatis causâ divortium facere.

Hippocrates *Aphor. 59. sect. Si mulier, inquit, non conceperit, scire autem velis an conceptura sis: pannis circumetam infernè suffias. Et si odor videatur per corpus ire ad nares, & os: scito, quòd ipsa ex se ipsa sterilis non est.*

Idem Hippocrates fœminam fœcundam dignosci putat, si caput allii derafum & purgatum in uterum subdatur. Si postridie odor ad os pervenerit, eam ad conceptionem aptam: sin minus ineptam esse.

Vel galbanum ad ignem emollitum, sericoque inclusum, muliebris uteri orificio nocte indito, caputq; totum linteolo odorato obligato: manè si vertex mulieris galbanum redolet: mulier probè purgata fœcunda erit.

Idem experieris, si parum balsami, aquæ admixtum: & bombace exceptum, in uterum immiseris, & femori alligaveris, quod si tunc uterus traxerit, fœcunditatis est probatissimum signum.

Amatus Lusitanus sequens, ut probatissimum laudat, Capit coaguli leporis 3. i. quam aqua calida dissolutam mulieri in aqua calida existenti, jejuno ventriculo propinat. Si mulier tunc dolores ventris sentit, fœcundam: sin minus, sterilem illam pronunciat.

Multi quoque ex urina sterilitatem colligere volentes eam hordeo affundunt. Hoc intra decimum diem si germinet, pro fœcunditatis nota: si non germinet, pro sterilitatis certo argumento agnoscunt.

Alii denique siliquis, vel fursuri urinam affundentes sterilitatis notam ex eo observant, si vermes in eo generari videant.

Pro huius diagnosi coronide advertendum est ac diligenter inquirendum, num viri culpa aut defectu generatio impediatur. Frustrà enim mulier multorum remediorum usu torqueretur. Sterilitas à viro procedens dignoscetur ex morbis partes genitales illius obfidentibus, ut erectione læsa, feminis defectu, testiculorum tumoribus, gonorrhœa, aliisque. Hujus etiam rei conjecturam faciet, si vir timidus extiterit & effœminatus, frigidus naturâ sit, & barbâ careat, tardè semen excernat, idque frigidum habeat, taleque ab uxore excretionis tempore in utero sentiat, nullam, aut exiguam habeat coitus appetentiam, & quàm minimam in eo percipiat voluptatem. Ac denique si causæ præcesserint, quæ semen infœcundum reddere valeant.

Prognosis juxta causarum supra enumeratarum seriem instituenda est.

Ac primum ætas tenerior conceptionem non impedit, nisi ad tempus, & illa ætate adultiore expectanda est: Ætas verò provec-tior omnimodam conceptionis desperationem indu-



inducit. Si tamen adhuc menstrua procedant ordinatis periodis, quædam superesse potest conceptionis spes; sed admodum exigua, in his mulieribus in primis, quæ quadragimum ætatis annum exceſſerunt: quia licet mulieres, quæ juniores pepererunt, in ea etiam ætate concipere soleant, illæ tamen, quæ nunquam gravidæ fuerunt, exiguum spem habere debent in ea ætate concipiendi, quia uterus tandiu otiosus, marcidus ac vietus factus est, & ad concipiendum inhabilis.

Quæ à prava membrorum conformatione sterilitas inducitur, ut in iis, quæ claudæ sunt, aut crura distorta habent, vel coccygem depressam, incurabilis est.

Si verò à nimia pinguedine, aut aliqua uteri intemperie, non admodum inveteratâ, sterilitas procedat, curatio sperabilis est, maciem inducendo, & intemperiem corrigendo.

Illæ verò, quæ ab aliis morbis inducitur, ut tumore, ulcere, obstructione, fluore albo, mensium defectu, uteri prolapsu, phthisi, elephantiasi, lue venerea, aliisque, curatio faciliior aut difficilior est, prout dicti morbi faciem aut difficilem curationem admittunt.

Ad curationem hujus affectus, quæcumque ex causis prædictis eum producere valent, earum remotioni incumbendum est.

Ad primum angustia partium genitalium ob ætatem juveniculam, curatione non indiget; siquidem ætatis progressu ad convenientem amplitudinem reducitur. Interim tamen coitus abstinentia est necessaria, ab illo enim præmaturo partes istæ à naturali constitutione deiciuntur.

Quæ verò à parva statura, aut ætate provectiore procedit, incurabilis est. Tentari tamen potest, emollientibus & relaxantibus medicamentis adhibitis, si adhuc menstruæ purgationes profluant.

Nimia obesitas extenuante victûs ratione, & convenientibus evacuationibus erit corrigenda.

Si ex prava victûs ratione sterilitas dependere videatur, ut in gulosis, ebriosis, aut hydropotis, ad exactam vivendi normam hujusmodi mulieres reducendæ sunt, omnisque excessus tum cibi, tum potus, penitus circuncidendus.

Virgines, & robustiores mulieres, ad naturam virorum quodam modo accedentes ut reddentur aptæ generationi, effoeminandæ sunt omni artificio, & ad mores sexui congruos efformandæ, interdictis omnibus eduliis crassioris succi, laboribus, & exercitationibus, ac procurato convenienti menstruorum fluxu, ut illius immoderata copia enerventur ac mollescant. Tum si menstruorum fluxus ad id non sufficiat; frequenti purgatione, ac venæ sectione imminuantur humores, & balneis sæpius iteratis, aliisque alterantibus totus habitus humidior & frigidior reddatur.

Si ab uteri clausurâ, distortionem, obstructionibus, tumoribus, aut ulceribus sterilitas producta fuerit, illis providendum est remediis, in eorum curationibus propositis.

Quæ ab occulta quadam dispositione, eaque nativâ dependet; incurabilis est, eaque sedulo exploranda, ne frustra remedia usurpentur.

Si à maleficio, aut incantatione, aut occulta pharmacorum vi sterilitas inducta fuerit; perexiguus est medicinæ locus, sed ad preces, atque orationes confugiendum est quæ à viris pietate præstantibus ardenti animo fusæ, divinum auxilium eliciunt.

Adversus tamen pharmaca occultâ vi sterilitatem inducentia, nonnulla proponuntur ab Authoribus amuleta quæ proprietate quadam malignæ huic qualitati adversantur. Unde voluit Cardanus priapum lupi gestatum omnes illas fascinationes dissolvere. Alii valdè commendant adamantanem & hyacinthum, Antiqui hypericum vocabant fugam dæmonum. Eadem vis etiam tribuitur scyllæ, eryngio, rutæ, sagapeno ab utroque conjuge gestatis. Deinde huic negotio plurimum conducere certum est, ut hujusmodi fascinari confidenti animo ista conentur maleficia & incantationes aspernari. Tum, (si auctor maleficii ignoretur.) ut locorum mutatione, domos, cubilia, vestes, & suppellectilem relinquunt, in quibus vis illa venefica & fascinatoria sæpè absconditur.

Si calidior intemperies sterilitatis causa fuerit; eadem

curatio adhibenda est, quæ in calida jecoris intemperie fuit proposita. Quòd si major fuerit caliditatis excessus, ad ea erit recurrendum, quæ pro furore uterino fuere descripta. In quibus tamen remediis caphura non admittenda est, quia fecunditati plurimum nocere creditur.

Siccitas immodica conceptionem impediens, curabitur victu analeptico; & si major sit consumptio, ad curam hædiorum erit revocanda, videlicet lactis usum, balneum frequens, & similia.

At verò, omnium frequentissima sterilitatis causa est frigida, & humida intemperies totius corporis & uteri, quam fluores albi sæpissime comitantur, eorumque curatio specialis ex proprio capite desumenda. Peculiariter verò dictis intemperiebus sequentia adhibebuntur remedia, quæ à prudenti Medico variari poterunt; ita ut magis vel calefaciant vel exsiccent, prout vel frigiditas, vel humiditas magis in vitio fuerit.

Ac primum humores pituitosi, in corpore reſtagnantes; evacuandi sunt purgantibus medicamentis, diureticis & sudorificis. Necnon revulsiones quædam instituendæ sunt, cauteriis brachiis, cervici, aut cruribus adhibitis. Tum partes principes roborandæ theriacâ, mithridatio, tabellis aromatici rosati, confectioe alkermes, & similibus. Nec non purgationes per intervalla repetendæ, si cacochymia redundare videatur.

Postmodum ad ea veniendum est, quæ proprietate specificâ uterum roborare conceptionem adjuvare, & veneri stimulos addere nata sunt, quorum innumeræ apud Authores describuntur formulæ. Nos præcipuas hic seligimus.

Ac primum opiata in hunc modum componi poterit.

℞. Rad. eryngii & satyrionis saccharo condit. an. ʒ. i. zinziberis viridis conditi ʒ. ʒ. avellan. nucleor. pini, pistacior. an. ʒ. vi. nucis moschat. saccharo condit. num. i. fem. erucæ & nasturtii, an. ʒ. ij. cineris priapi tauri, renum. scincor. & rasuræ eboris, an. ʒ. i. confect. alkermes ʒ. iij. diambrae, & diamoschi dulc. an. ʒ. i. ʒ. ambr. ʒ. ʒ. Cum syrupo condituræ cortic. citri, fiat opiata de qua capiat ad quantitatem unius castaneæ sub introitu lecti, bis aut ter in septimana, superbibendo vini generosi vel Hippocratici parum.

In forma pulveris sequentia exhiberi poterunt.

℞. Sem. erucæ, sileris montani, an. ʒ. ʒ. rasuræ eboris, cinam. nucis moschat. an. ʒ. i. moschi (in iis quæ ferre eum possunt gr. iij. fantali albi ʒ. iij. Misce, fiat pulvis, detur ʒ. i. ex vino generoso. Vel

℞. Sem. erucæ, pastinacæ sylvestris, cinam. nucis moscha. pulveris diambrae & diamoschi, an. ʒ. i. matricis leporis, testiculi apri priapi cervi, caryoph. an. ʒ. vi. moschi. ambræ. an. gr. vi. sacchari ad pondus omnium. Misce fiat pulvis dosi ʒ. ii. cum vino generoso.

Summæ efficacis creditur secundina mulieris exsiccata & in pulverem redacta, ad ʒ. i. exhibita.

Alii pro secreto habent pulverem ex hepate & testiculis porcelli, quem solum scropha edidit: eumque sterilitatem arcere asserunt, tam in viris; quàm in mulieribus.

Matthioli in Dioscoridem ammi semen prædicat his verbis. *Ammi legitimi semen, quod ex Alexandria affertur, mirifice præstat ad mulierum sterilitatem. Nam compertum est, hujus tantum seminis auxilio plures prolificas effectas. Siquidem, si propinetur manè, drachmæ pondere, ex vino moraco, aut carniū jure, in tenuem pulverem contritum, alternis diebus, tribus horis ante cibum, futuram pollicetur prolem. Sed oportet maritum cum uxore rem habere iis tantum diebus in quibus illa semen non ebiberit.*

In quibus mulieribus viscerum calefactio timetur, rasura eboris erit utilissima, ad ʒ. i. cum vino albo sumpta, per quatuor aut quinque dies, post purgationem menstruam.

Essentia satyrionis à Crollio descripta hîc maximè excellit, si ea ad ʒ. i. vel ij. usque ad ʒ. i. in vino malvatico exhibeatur.

Ejusdem satyrionis sal est etiam valde efficax, ad ʒ. ʒ. cum vino malvatico, post purgationes menstruas exhibitum.

Decocta varia in eundem usum componi solent. Efficacissima sunt quæ sequuntur.



℥. Rad. eringii ʒ. j. artemisiæ, nepetæ, an. M. j. Coque in vino albo. Detur cyathus unus; manè & vespri cum ʒ. i. triphæræ magnæ sine opio, per dies novem.

Quercetanus sequens maximè commendat.

℥. Testiculorum arietis præparatorum in vino, & exsiccatum, matricis leporis, eodem modo præparatæ, & exsiccatæ, macis, cinnam. caryophyll. zinzib. albi, sem. ammeos, an. ʒ. ij. croci ʒ. j. ʒ. medullæ nucum communium, avellandarum, pistaciorum, an. ʒ. ij. Contundenda contundantur: & tandem coquantur in ʒ. ij. vini malvatici ad tertiæ partis consumptionem. Hujus decocti capiat post mensium fluxum ʒ. ij. vel iv. manè tribus horis ante cibum, idque tribus diebus consequentibus; quartâ verò marito jungatur.

Aqua stillatitia sequens valdè efficax.

℥. Cinnam. caryophyll. nucis moschat. macis, an. ʒ. i. cubebæ, piperis longi, galangæ, zedoariæ, sem. ammeos, felseleos an. ʒ. ʒ. gr. juniperi. ʒ. j. vini albi generosi, aquæ rosinar. majoranæ, melissæ, an. q. s. Stent in digestionem sex diebus, & postea destillentur, ac manè & vespri cochlear, ii. vel iij. exhibeantur.

Pena & Lobelius majoranæ tenuioris, delicatioris, & minutæ vocatæ oleum stillatitium coagulo leperino permixtum, & muschi tantillo, tanquam arcanum proponunt, conceptui faciliando, nulli referandum.

Si mulier salviæ hortenensis succi heminam cum modico sale potaverit, quartâ mēstruæ purgationis die, deinde post horæ quadrantem viro se commiscuerit, infallibiliter eam concipere multi graves viri testantur. Quo remedio etiam, post magnam pessilentiam, Ægyptias feminas ad multam sobolem pervenisse, Aëtius testatur.

Prædictis remediis internis topica erunt adjungenda in quorum usu diligenter erit observandum, prius quàm de exsiccatione, adstrictione, & corroboracione uteri cogitemus aut attrahantur prius & expurgentur sordes, in illius cavitate contentæ; ne vel in partes nobiles resuant, vel illius substantiæ magis affigantur. Prius igitur uterum expurgantia immittenda sunt, in hunc modum composita.

℥. Diaphœnic. & hieræ picræ, an. ʒ. ʒ. terebinthinæ & mellis mercurialis, an. ʒ. j. castorei ʒ. j. Misce, & ad convenientem consistentiam artificiosè reducantur, & fiant pessaria in uterum immittenda. Vel

℥. Hieræ picræ ʒ. ʒ. agarici troch. pulver. ireos Flor. an. ʒ. j. mithridatii veteris & diaphœnici, an. ʒ. ij. Cum succo mercurialis, fiat pessarium, linteo obvolutum, quod immitti debet hora somni, & per duas aut tres horas detineri.

Si uterus magna excrementorum copia luxuriat, pessariū validius immittendū erit, præmissa injectione sequenti.

℥. Fol. absinthii, artemis. mercurialis, & rutæ, an. M. j. ʒ. pulpæ colocynth. ʒ. j. agaric. trochisc. ʒ. ʒ. zinzib. & myrrh. an. ʒ. j. Fiat decoctio in aqua & vino albo ad ʒ. j. in qua dissolve mellis rosat. ʒ. ij. Injiciantur hujus decocti ʒ. iij. in uterum, continuando per tres aut quatuor dies mane, & dum ibit cubitum, post fluxum menstruum. Postea immittatur pessarium sequens.

℥. Hieræ picræ, & benedictæ laxat. an. ʒ. j. pulpæ colocynth. agarici trochisc. an. ʒ. ʒ. spicæ nard. sem. nigellæ rom. & fol. fabinæ pulv. an. ʒ. j. Incorporentur cum melle anthosato, & includantur panno serico. Fiant pessaria, quorum unum immittatur in vulvam, dum ibit cubitum, & ibi maneat per 2. horas, deinde abluatur pars vino albo.

Ad uterum roborandum, adstringendum & exsiccandum sequentia usurpari poterunt.

℥. Rad. aristol. rotundæ ʒ. ʒ. ligni aloës ʒ. iij. nucum cupressi, & rad. cyperi, an. ʒ. ij. calami aromat. ʒ. j. fol. dictamni cretici, saturiæ & fol. myrti, an. M. j. myrrhæ electæ styrac. calamit. & benjoini, an. ʒ. ij. ʒ. flor. stœchad. anthos, & majoran. an. P. j. Coquantur in f. q. vini albi generosi. In colat. ʒ. j. ʒ. dissolve trochisc. de alipta moschata ʒ. ij. ambra griseæ & moschi, an. g. vij. zibetæ gr. v. Fiat injectio manè & serò calidè per aliquot dies.

Ante, vel post injectionem, suffumigium sequens usurpari poterit.

℥. Trochisc. galliæ & aliptæ moschat. an. ʒ. ij. styrac. calamit. benjoini, & ladani puri an. ʒ. ʒ. ligni aloës & rhodi.

an. Drach. i. sem. nigellæ rom. cubebæ. & caryophyll. an. ʒ. iv. succini & gummi tacam. an. Drach. i. ʒ. macis ʒ. ʒ. Fiat omnium pulvis ex quo cum aqua flor. aurantiorum, in qua aliquantulum fuerit guni trag. formentur trochisci, quorum unus aut alter prunis injiciatur, & fumus excipiat per infundibulum.

Pauperes suffumigentur cum æquis partibus myrrhæ, thuris, ligni aloës, styrac. benjoin. cinnam. & caryoph. Post injectionem & suffumigium, sequens immittatur pessarium.

℥. Thuris, mastiches, an. ʒ. ii. trochisc. galliæ & aliptæ moschat. an. ʒ. iv. rad. bistortæ, nucum cupressi, rasur. eboris & rosar. rub. an. Drach. i. styrac. benjoini & ladani, ana ʒ. ii. calami aromat. & cyperi, an. Drach. ʒ. Malaxentur cum aqua flor. aurantiorum, deinde cum panno linco raro formentur pessaria duo debitæ magnitudinis, quorum unum immittatur sub introitu lecti, illito illius apice oleo nucis moschatae cum zibeta permixto.

Cæterum de allio hortenensi refertur, si cum oleo de spica conteratur, & in linteum rarum, oblongi sæculi modo conformatum, intrudatur, ac in vulvam profundè pellatur, cessantes menses potenter moveri, & uterum mira voluntate affici ac repurgari: ut hinc multis facta sit via ad conceptionem, diu ante desperatam.

Ante injectiones roborantes & suffumigia potest usurpari semicupium, per horam, ante lecti introitum, idque in hunc modum compositum.

℥. Rad. bryoniæ, imperat. valerian. ireos, enulæ campan. an. ʒ. iij. fol. majoran. artemis. nepetæ, pulegii, mercurialis, salviæ, lauri, an. M. iv. baccar. lauri & juniperi, an. ʒ. i. Coquantur pro semicupio.

At verò pro balneo thermæ sulphuræ & bituminosæ præstantissimæ sunt, & ad eas quamplurimæ mulieres, tanquam asylum, confugiunt.

Post balneum & suffitum, regiones pubis & perinæ inungendæ sunt sequenti linimento.

℥. Olei nardini & moschatellini, an. ʒ. i. ol. cheirini ʒ. ʒ. pulv. electuarii diambrae & diamoschi, an. Drach. i. ʒ. stirac. liquidæ Drach. i. zibetæ ʒ. ʒ. moschi, ambra griseæ an. g. vi. ceræ albæ parum. Misce, fiat linimentum, quo inungantur dictæ partes, & in terius inungatur zibeta, aut balsamo Indico naturali. Vel tempore coitus viri penis zibetâ inungatur.

Tandem emplastra perinæ & lumborum regioni applicentur, quæ gestentur continuo, vel singulis noctibus, usq; ad ultimam, quâ menses erumpere solent septimanam. Eaque in hunc modum parabuntur.

℥. Massæ emplastri pro matrice ʒ. iv. massæ emplastri de mastiche ʒ. ii. gummi tacamahacæ, & caragnæ, an. ʒ. i. pulv. rad. tormentil. & bistortæ, an. ʒ. iij. pulv. myrti. ʒ. ii. pulv. aromat. rosat. ʒ. iv. Malaxentur cum ol. cydonior. admixta ʒ. i. ol. nucis moschat. Extendatur super alutam, & formentur duo emplastra: quorum unum sit rotundum, pectini admovendum: alterum quadratum, lumbis applicandum.

## CAPUT XVI.

*De morbis acutis & chronicis prægnantium.*

**M**orbi acuti & chronici prægnantium non aliam habent essentiam, aliavivè diagnosis, ac dum non prægnantes, aut etiam viros obsident, ideoque peculiarrem eorum theoriam proponere non opus est, sed illa ex propriis capitibus repetenda.

Prognosis verò illorum morborum eadem non est, quandoquidem in gravidis longè periculosiores sunt, & sæpissimè lethales. Sic apud Hipp. *Aph. 31. sect. 5. Gravidam mulierem morbo acuto corripit, periculosum.* Sive enim cum febre morbus sit, duplex impendet à morbo periculum, ut docuit Gal. in *comm. hujus Aph.* unum à febre ipsa, foetum perimente, alterum à victu tenui, qui ad morbi acuti curationem necessarius est, foetui autem alendo non sufficit. Sive autem sine febre acutus morbus fuerit; ut epilepsia, apoplexia; tetanus, morbi magnitudini ac vehementiæ mulier



mulier & fœtus resistere nequeunt, neque vehementia remedia, quæ ad illorum morborum curationem requiruntur, ferre possunt. Sciendum tamen est, istam prognosin non esse perpetuæ veritatis. Multas enim mulieres morbis acutis laborantes evadere, tum Authorum testimoniis & exemplis, tum quotidianâ experientia notum est.

Chronici verò morbi, ut febres intermittentes, catarrhi, tenesimi, aliique, abortus periculum imitantur, & si eum non inferant, vix ante partum curari possunt, sed usque ad tempus illius perseverant.

Morbi acuti, & chronici, in primis & ultimis gestationis mensibus periculosiores sunt, quàm in mediis. In primis enim mensibus vincula, quibus fœtus utero alligatur, sunt imbecilliora, ut faciliùs divellantur; & fœtus tenerior à causis illis præternaturalibus faciliùs opprimitur. In postremis verò mensibus, sexto nimirum, septimo, & octavo, fœtus grandior multo indiget alimento, quo in morbis prædictis destituitur. Adde, quòd prædicta ligamenta non adeo firmiter hæreant, quemadmodum in tertio, quarto, & quinto mense, in quibus minus est periculum abortus. Ideo Gal. fœtum in utero egregie comparat fructibus ab arbore pendentibus, qui in ortus sui principio tenerrimos habent pediculos, ut faciliè à vento aut quavis alia commotione violentâ excuti possint: dum verò ad maturitatem accedunt, minùs firmiter hærent, quàm in mediis temporibus.

Curatio etiam prædictorum affectuum in prægnantibus satis insignem habet diversitatem circa diætam, & magna remedia, venæ sectionem scilicet & purgationem, quibus addi possunt medicamenta, per alias vias evacuantia, nimirum menses moventia, diuretica, & sudorifica: quia metus est, ne ab huiusmodi evacuationibus abortus concitetur. De his ergo tantum hic agere constituimus, reliqua ad peculiariora cuiusque morbi capita rejicientes.

Quòd ad diætam spectat. Illa in morbis acutis non adeo tenuis imperanda est prægnantibus mulieribus, ne fœtus genio suo fraudetur: neque tamen adeo liberalis concedenda, ut eâ febris promoveatur; sed mediâ quadam viâ incedendum est: eâ tamen cautione adhibitâ, ut in primis gestationis mensibus tenuior victus instituat, in postremis verò paulò crassior & copiosior, quia fœtus eo tempore majori indiget alimento. Si tamen in eâ diætâ aliquid peccandum sit, satius est ad paulò pleniorum victum accedere, quàm nimis exquisitum, ex matris enim & fœtus viribus præcipuè salus speranda est.

Circa venæ sectionem, statim opponitur Aphorismus Hipp. 21. sect. 5. *Mulier utero gerens sanguine ex vena misso, abortit, & præcipuè si fœtus sit grandior.* Et ratio redditur à Galeno in comment. quia sanguine detracto fœtus suo fraudatur alimento, unde abortus consequitur. Ex altera verò parte in pluribus prægnantium morbis, præcipuè verò acutis; ut pleuritide, peripneumonia, febre continua, & similibus, phlebotomia esse necessariam, & posse administrari, non solum primis, sed etiam mediis; imò & interdum postremis graviditatis mensibus, usu quotidiano ostenditur. Eâque omiſsa, tum mater, tum fœtus in summum vitæ discrimen conjiciuntur. Et huic posteriori sententiæ saniores Medici suffragantur, neque ab Hippocratis & Galeni mente dissentiant. Eâ enim tantum de causa mulierem gravidam sectâ venâ abortire voluerunt, quia extracto sanguine subtrahitur alimentum fœtui. Si igitur talis venæ sectio dari potest, qua fœtui alimentum non subtrahatur, nullum ex ea imminet abortus periculum. Talis autem datur primùm prioribus gestationis mensibus, dum fœtus est minor, & minori alimenti copiâ indiget: tunc enim ipsi alimentum non subtrahitur, præsertim si quædam plethoræ indicia apparuerunt. Sicque à primo mense usque ad quintum venæ sectio tuto administrari poterit. In mediis verò & postremis mensibus majori circumspectione opus est, quia fœtus major, majorique egens alimento, non ita tuto phlebotomiam ferre potest. Attamen si mulier sanguine abundet, & copiosa admodum fiat venæ sectio, tuto potest mitti sanguis, quia hinc sedabitur morbus. Nec tantum alimentum fœtui subtrahetur, ut hinc mulier abortum incurrat. Si autem aliter videtur sensitse Hippocrates, animadvertatur quod modo longè

diversò nos venam secimus ac antiqui faciebant, qui ad liras, nos vero ad uncias mittimus. Imò vero ad præservandas mulieres ab abortu nullum est præstantius remedium, quando is contingit ex nimia sanguinis copia, fœtum obruente & suffocante, in fœminis, quæ extra graviditatem mensurâ temporibus copiosè per plures dies expurgantur. Sic Petrus Salius Diverſus l. de morbis particularibus c. 22. *Tessor ego, inquit, me plurimas ab abortu, in quem frequenter inciderant, sola sanguinis missione, primis mensibus facta, præservasse.* Non ita tamen censendum est de hac sanguinis missione, vel moderata, vel parca, in utero gerentibus administranda, ut unquam non veniat in usum, si copiosè fiat. Interdum enim in ultimo mense copiosa sanguinis missio facta non spernendum attulit juramentum. Et ego aliquando hanc venæ sectionem copiosè factam in ultimo mense, instante partus tempore, dum vero gerentes ardenti conflarentur febre, plurimoque abundarent sanguine, tentavi, & hinc remissionem febris, ac partus accelerationem sperans, utrumque ex sanguinis missione consequutus. summa cum utilitate administravi, fœtumq; & matrem una periclitantem ex hoc solo remedio salvavi. Quod remedium in aliquibus prætermisum, & à Medicis, verba solum Hippocratis & non ipsam rem ponderantibus neglectum, fuit in causa, ut conceptus sæpe unâ cum matre, à plenitudine & fervore sanguinis suffocatus, miserabiliter perierit. Hæc Salius. Amatus Lusitanus curat. 57. sect. 1. mulieri, annos octodecim natæ, semestram uterum gerenti, & causone laboranti, quater venam aperuit cum felici successu. Et Rod. à Castro lib. 3. de morbis mulierum cap. 21. scribit, se mulieri Ulyſſiponenſi in octavo mense pleuritide correptæ, & ab aliis Medicis pro deplorata relictæ, quater etiam sanguinem misisse, eamq; convaluisse, ac filium sanum peperisse. Ac deniq; si nobis aliquid ex propriis experimentis depromere liceat, sequentem historiam, quæ insignis est & notatu dignissima hic annotabimus. Uxor Joannis Vecules civis Monspelienſis, tres abortus consequenter passa fuerat variis temporibus gestationis: dum quartò grævda esset, circa finem mensis secundi, correpta est iisdem ventris & lumborum doloribus, qui aliorum abortuum prodromi esse consueverunt. Vocatus ad eam, & advertens mulierem sanguine temperamento præditam, & plethoricam; statim sanguinè mitti jubeo ad ʒ. iij. & intra dimidiam horam prædicti dolores omnino quieverunt, & mulier tam bene habuit, ut reliqua remedia, ad præcautionem abortus à me præscripta, admittere noluerit. Illa autem symptomata apparuerant eo prorsus tempore, quo ipsi extra graviditatem mensurâ purgationes pati consueverat. Tertio demùm graviditatis mense eadem periodo, similia redeunt symptomata. Illa me, statim vocatum, rogat, ut iterum venæ sectionem præscriberem, cum præterio mense adeo præsentaneum levamen ab ea percepisset. Me igitur votis ipsius annuente, sanguis de novo mittitur pari prorsus eventu. Quarto itidem mense, quinto, sexto, septimo, & octavo, iisdem symptomatis periodicè recurrentibus, iterata phlebotomia mulier statim liberata. Ultima phlebotomia celebrata fuit octo diebus ante principium noni mensis, cum eodem fructu: & circa finem noni mensis dicta mulier peperit filium vitalem & bene habitum.

Non est tamen, quòd hisce exemplis persuasus junior Medicus, audacior fiat in sanguine mittendo, postremis gestationis mensibus. Sed morborum & mulierum habitus diligenter oportet circumspicere, ut illis remedia convenienter aptari valeant. Hoc perpetuò in memoriam revocans, peccata omissionis leviora esse peccatis commissionis, & satius esse in re dubia infra subsistere, quàm ultra debitos limites progredi. Attamen ubi manifestas sanguinis mittendi indicationes intuetur, præmonitis adstantibus, multò majus ex morbi sævitia, quàm ex venæ sectione, tum abortus, tum vitæ matris ac fœtus imminere periculum; audacter sanguinem detrahèt, hoc nihilominus advertendo, ut sanguinis missio sit parciore, non copiosa, quæ fœtui alimentum subtrahere possit. Et si multitudo sanguinis largiorem ejus detractionem desideret; partitis vicibus, non semel id exequendum erit.

Prædictus igitur Hippocratis Aphorismus non absolutè venæ sectionem interdicat; sed tantum admonet, ut Medici cautiore sint in ea celebranda. Quod à Cornelio Celsò



Celfo eleganter proditum est libro 2. cap. 10. his verbis: *Antiqui primam ultimamque aetatem sustinere non posse hoc auxilii genus judicabant. Persuaserantque sibi, mulierem gravidam quæ ita curata esset, abortum esse facturum. Postea vero usus ostendit, nihil ex his esse perpetuum, aliisque potiores observationes adhibendas esse, ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest enim non quæ aetas sit, nec quid in corpore intus geratur; sed quæ vires sint. Ergo si juvenis imbecillis est, aut si mulier, quæ gravida non est parum valet: male sanguis emittitur. Emoritur enim vis, si quæ supererat, & hoc modo erepta est. At firmus puer, & robustus senex, & gravida mulier valens, tuto curantur.* Hæc Cels. Recentiores quidam auli sunt venas inferiores aperire in gravidis mulieribus, ad curationem epilepsiæ ex utero, bubonis veneri & pestilentis, imò & abortus præcautionem, ut videre est apud Zac. Lusit. in *Prax. Med. mirab. observ.* 23. lib. 1. & *observ.* 130. & 131. lib. 2. Qui propriis & aliorum experimentis ostendere nititur, eam phlebotomiam posse tuto celebrari. Quæ prudentibus Medicis pensanda relinquo.

Diximus ab initio hujus capituli, nullam esse diversitatem in affectibus prægnantium curandis, nisi circa magna remedia, quæ in iis ita determinanda est, ut nimirum affectus qui non gravidas occupant, ut vomitus, inappetentia, & similes, in non gravidis magis indigeant purgatione, quam venæ sectione, quia fiunt à cacochymia in ventriculo, & toto corpore redundante: in prægnantibus verò magis egeant phlebotomia; quia fiunt ex sanguine retento ab ipso graviditatis initio. Et docuit experientia, vomitum, quæ prægnantes frequenter infestare solet, primis gestationis mensibus, à purgationibus exacerbari; à venæ sectione verò plurimum sublevari; imò verò in totum auferri, si usque ad solutionem symptomatis singulis mensibus uteretur.

Purgationis verò usum in gravidis mulieribus definivit Hippocr. *Aphor.* 1. *sect.* 4. *Utero gerentes, inquit, sunt medicandæ, si materia turget, quarto mense, & usque ad septimum. Sed minus, à juniore autem sætu, & seniori cavere oportet.* Gal. in *comm.* dicit eandem esse proportionem foetus, & fructuum arborum. Hi siquidem in prima generatione debilioribus pediculis continentur, & ideo facile decidunt, quando vehementior ventus ipsos concusserit. Postea verò aucti difficilem habent à plantis dissolutionem. Sicut rursus cum perfecti sunt, sponte sua, sine vi extrinseca decidunt. Eodem modo mulieres primis & ultimis mensibus abortu patiuntur, quia in illis foetus minus firmiter utero alligatus est. Attamen nostro hoc sæculo purgationes quædam et ferè graviditatis mense administrari solent, in morbis qui ab excrementorum dominatu & cacochymia producuntur, turgente, vel concoctâ materia; quotiescunque majus impendet periculum ex parte illius cacochymiae, morbum committentis, quam ex commotione, à purganti medicamento excitata. Audaciores hac in parte Medicos fecerunt blanda & innoxia medicamenta, quibus hodie utimur, ut sunt rhabarb. myrobalani, cassia, manna, fenna, agaricus, & similia. Attamen habenda perpetuo ratio sententiae Hippocratis, tutiusque mediis mensibus; cautiùs verò primis & ultimis purgantia medicamenta esse exhibenda. Præterea pilularum usus in gravidis perpetuo debet esse suspectus; tum quia corpus magis conturbant, tum etiam ratione aloes, qui propter insignem amarorem foetui insensa est, & ora venarum aperire creditur. Quod si aliquando illius usus necessarius videatur, in gravioribus ventriculi affectibus, qui prægnantes non raro primis gestationis mensibus infestare solent, lavetur diligenter cum aqua rosacea, ut ejus acrimonia tollatur, vel admiscetur, adstringentibus & roborantibus, ut rhabarbaro, massiche & similibus.

Evacuatio autem, quæ fit per clysteres, non omnino tuta est, quia comprimendo uterum potest abortum excitare. Ubi igitur illa opus fuerit, & in mulieribus assuetis huic remedium generi, in minori quantitate componi debent, & ex iis, quæ molliendi & leniendi potius, quam validè purgandi facultate prædita sunt.

Denique de sudorificis, diureticis, & menses moventibus ita pronuntiandum est, menses moventia propriè dicta in gravidis nunquam esse usurpanda, Diuretica verò, quia

menses quoque movere apta sunt, debent esse suspecta: & si morbi necessitas aliquando eorum usum postulet, leviora erunt eligenda. Ac denique sudorifica tutius administrari poterunt, quia per habitum corporis humores educunt, unde nullum imminet abortus periculum: ita ut nonnullæ mulieres in media graviditate à lue venerea, illaeso foetu, liberatae fuerint.

## CAPUT XVII.

## De Abortu.

**A**Bortus est immaturi foetus exclusio, atque adeo, foetus mortuus in utero, non dicitur abortus, donec excludatur. Sive ergo foetus vivus sive mortuus excludatur, qui nondum maturus est, neque debitum accretionis, quam in utero recipere debet, terminum attigit, abortus dicendus est.

Causæ abortus aliae internæ sunt, aliae externæ.

Internæ ad quatuor capita referri possunt, nempe ad humores, ad foetum, ad uterum, & ad morbos matris.

Humores abortum efficere possunt, dum quantitate, vel qualitate peccant.

Quantitate peccant excedente, vel deficiente.

Quantitas excedens reperitur in plethora; sanguis enim copiosior quam ad foetus nutritionem requiritur, ad uteri venas fluit, & insular purgationis menstruæ excluditur, simulque foetum elidit.

Quantitas deficiens humoris alibilis ex iis causis procedit, quæ foetui alimentum subtrahere valent, ut inedia, sive voluntaria sit, sive coacta, ut cum gravidæ omnem cibum adversantur, aut vomitu rejiciunt, tenuis diæta in morbis acutis, immodica sanguinis evacuatio per nares, hæmorrhoides, profluvium uteri vel phlebotomia immodica, und. Hipp. *Aph.* 34. *sect.* 4. *Mulieris utero gerentis si alvus multum fluat, periculum est, ne abortiat.* Huc referenda est summa totius corporis gracilitas, in qua tantum sanguinis non suppetit, ut foetui alendo sufficiat. De quo Hipp. *Aph.* 44. *sect.* 5. *Quæ præter naturam tennes uterum gerunt, abortiunt, donec habitiores evaserint.*

Ratione foetus, abortus accidere potest, si sit nimis grandis, ut propter molem utero contineri non possit. Hinc sæpe contingit parvas mulieres abortum pati, præsertim si viris grandioribus jungantur, quorum soboles magnum incrementum capessit, & non habet satis amplum locum ad illud perficiendum, und. Hipp. *lib. de superfæt.* *Mulier, inquit, si quæ concipiat quidem, & frequenter, sed sætus bimestres, trimestres, aut quadrimestres, & vetustiores statotempore, semper, & certo excuit, illud est referendum ad uteri angustiam, quæ augescentem sætum amplius continere non potest.* Numerus etiam excedens abortum efficere potest ut si duo, tres, vel plures in utero contineantur, periculum est, ne uterus, nimia sarcina gravatus, illos præmaturè excludat: unde frequens fieri solet gemellorum abortus. Mortuus etiam foetus ad hanc classem referri potest, ad cujus exclusionem natura continuo insurgit.

Ratione uteri abortus contingit, si non sit satis amplus & capax, ut sufficienter dilatari possit pro incremento foetus, quemadmodum supra relatatum est ex Hipp. *de superfæt.* Tum, etiam si aliquid præter naturam in utero succreverit, ut inflammatio, tumor scirrhus, abscessus, mola, & quamplurimi alii morbi. Ac denique si uterus sit humidior & laxior, ut foetum satis commodè continere nequeat.

Ratione morborum matris, duplici ratione abortus contingere potest. Primò, cum morbi foetui communicantur, à quibus extinguitur, vel ita debilitatur, ut conveniens nutrimentum, aut incrementum recipere nequeat, quales sunt febres continuæ & intermittentes, lues venerea & alii complures. Secundò, cum à dictis morbis magnæ evacuationes, aut graves corporis commotiones excitantur, ut hæmorrhagiæ copiosæ; à quacunque corporis parte fiant, alvi profluvia, gravis syncope, epilepsia, vomitus, & tenemus: qui supra omnes alios morbos abortum efficere con-



consuevit ; quandoquidem à frequenti ac ferè continuo egerendi conatu qui tenesmus perpetuò comitatur , musculi abdominis assiduè contrahuntur , & uterum magis comprimunt , quàm intestinum rectum , cui superjacet , & continuam illam compressionem foetus exclusio tandem subsequitur.

Causæ externæ , abortum promoventes , aliæ foetum enecant , aliæ cibum illius subtrahunt , aliæ foetus acetabula , quibus utero alligatur , dissolvunt.

Foetum enecant animi commotiones graves : ut ita , tristitia , terror , &c. cibi ardentè expetiti & denegati , medicamenta cathartica fortiora , menses moventia , partum abjuvantia : quæ foetum expellere nata sunt , & quæ proprietate specificâ foetum enecare creduntur , odore tetrici & præcipuè fumus extinctæ lucernæ.

Cibum foetui subtrahunt inedia , & immoderata sanguinis evacuatio , præcipuè dum foetus est grandior , docente Hippocr. *Aph. 60. sect. 5.*

Uteri acetabula dissolvunt , exercitatio vehemens , saltatio , cursus , equitatio , aut vestitio durior : qualis est carrucarum ; gravioris oneris gestatio , aut è terra elevatio , casus violenter concutiens , ictus ventris foetum contundens , abdominis motus vehemens à tussi , vomitu , alvi fluxu , sterminatione , convulsione , clamore & immoderatâ venere , aut petulante . Ac denique motus brachiorum vehemens , aliquid violenter attrahendo , rotam agitando , aut aliquid simile agendo , abortum maximè promovere potest.

Signa abortus præsentis per se manifesta sunt . Abortum verò præcedentia & illum futurum demonstrantia hæc sunt : lumborum coxarumque gravitas insolita , & ad motum segnitias , appetentia dejecta , rigor , aut horror per vices recurrens , capitis dolor præsertim circa oculorum radices ; laterum , ventrisque superioris constrictionis ; mammarum detumescencia , & extenuatio . Unde ex Hipp. *Aph. 37. sect. 5.*

*Si mulieri utero gerenti mamma subito extenuentur , abortus sequitur.* Significat enim mammarum illa extenuatio sanguinis defectum in venis , utero & mammis communibus , ob quem foetus periclitatur . Si verò à causa aliqua externa abortus concitetur , unde sequatur violenta foetus agitatio & vasorum disruptio , cum dolore illarum partium ; spiritus & sanguis ad partes genitales ruunt , quibus mammae destitutæ , extenuantur . Præterea lac copiosum è mammis effluens , partum imbecilem , & hinc metum abortus indicat , ex Hipp. *Aph. 52. sect. 5.* Si verò dolores frequentes , & ferè continui , renes & lumbos excrucient , qui versùs pubem & os sacrum exporrigantur , cum quodam ex utero egerendi conatu ; certum imminens abortus indicium est . Dolores enim illi membranas & ligamenta , à quibus foetus utero alligatur , tendi ac divelli significant . Quod si dolores illos & conatus sanguis purus vel serosus , vel aqua ex utero profluens subsequatur ; abortum inflare , & disrupta vasa ac membranas , atque os uteri apertum esse significat . Eodem tempore situs foetus mutatur , & qui antea sublimis & fastigiatus , ventris medium occupabat , jam conglobatus , versùs pudenda provolvitur ; tum etiam non rarò gravia symptomata consequuntur , ut rigores , tremore , cordis palpitationes , animi deliquia , hæmorrhagiæ copiosæ .

His addere licet , quod docuit Hippoc. *2. epid. text. 71.* quod si à causis externis violentioribus putà ictu , vel casu , & similibus vehemens dolor & perturbatio in gravida excitentur ; statim , vel saltem eadem die sequitur abortus . Si verò minor fuerit vis causæ externæ , ad tertium diem abortum differri posse , quo elapso cessat abortus periculum , quia vulnera hujusmodi tertio , ad summum quarto die recrudescere solent , vel admodum mitigari , unde foetus de novo in utero confirmatur & retinetur . Quod præceptum maximi in praxi momenti , ut prægnantes mulieres post violentum causæ alicujus externæ insultum , lecto per triduum aut amplius quiescant , & remedia abortum prohibentia usurpent .

Prognosis abortus varia institui potest in hunc modum .

Ex abortu mulieres magis periclitantur , quàm ex vero partu ; quia violentior est , ac tempore alieno fit . Ut enim in fructibus maturis pediculi ab arbore laxantur , & fru-

Laz. Riverii Opera,

ctus sponte decidunt : ita in partu naturali vasa & ligamenta , quibus foetus utero alligatur , spontè laxantur & solvuntur , quæ in abortu abrumpi necesse est .

Quamplurimæ mulieres propter abortum steriles evadunt , ob insignes lacerationes , quæ uteri dispositiones omninò evertunt .

Insignes hæmorrhagiæ , ad quas syncope , deliria , & convulsiones sequuntur , mortem inferre solent . Et testatur Aretæus , semillas vidisse servatas ex iis , quibus in abortu , aut post abortum convulsiones supervenerunt .

Inflammatiō uteri ex abortu contracta , ut plurimum lethalis . Sanguis enim , in uterum magnâ copiâ profluens , non expurgatur ; sed in eo putrescit , & ad superiora regurgitat , unde febres æstuosæ , palpitationes cordis , cordialgiæ , aliæque symptomata supra enumerata .

Abortus in primipara periculosior , quia inassueta doloribus , & angustiores habens istas vias , diutius ac vehementius torquetur .

Mulieres admodum graciles aut crassæ in abortu magis periclitantur : aliæ quidem , propter infirmitatem : hæc verò , propter constrictionem viarum , per quas excluditur foetus .

Abortus periculosior est sexto , septimo , & octavo mense , quia tunc grandior foetus majori cum molestia & difficultate excluditur .

Fæminæ quæ laxiorem & humidiorē uterum habent , sine noxa ut plurimum abortiunt , primis potissimum mensibus , quia partes istæ faciliè cedunt , unde minor sequitur molestia .

Hippocrates *2. epid.* asserit : abortum sexaginta dierum masculinum conferre in mensium suppressionibus . Per mensium suppressiones intelligit tantum imminutiones , quando scilicet mulieres sufficienter aut commode non purgantur menstruis periodis . Per hujusmodi enim abortum aperiuntur viæ illæ obstructæ ; & sanguinis allicitur versùs uterum , qui parcius antea fluebat . Hujus Hippocratis sententiæ veritatem observasse videntur nostrates mulierculæ , quæ in abortu paucorum mensium , vernaculo sermone , & velut adagiali pronunciant : *La femme avortade ex miege empreignade* , id est , fœminam abortum passam semi imprægnatam esse .

Curatio abortus in præservatione posita est : qui enim jam factus est , restitui non potest . At quæcunque eum consequuntur symptomata , cum symptomatis enixarum ; communia sunt . Illa autem abortus præcautio duo præcipua habet capita . Unum , extra graviditatem , alterum in graviditate .

Extra graviditatem omnes pravæ corporis dispositiones , quæ abortum concitare solent , removendæ sunt : ut plethora , cacochymia , & peculiares uteri morbi , v.g. intemperies , tumores , ulcera , & similia .

Plethora , & nimia sanguinis copia , uteri venas referat ; aut foetum intus suffocat . Huic , si pura & simplex fuerit plethora , sanguinis missio medetur , quæ illius redundantia satisfaciatur .

Cacochymia verò aut biliosa est & acrimoniæ particeps ; ut venarum orificia aperiat : aut naturam stimulando , ex pultricem excitet , quæ etiam foetus unâ cum noxiis humoribus excludatur : aut propter excrementorum copiam , in prima regione cumulatam , ventrem distendendo , foetum suffocat : aut in toto corpore sanguinem vitiat , & foetui alendo inutilem reddit : aut nimia humiditate foetus retentionem impedit , vel uteri acetabula mucore plena reddit .

Huic cacochymia medebitur etiam phlebotomia , sed parcius manu celebrata , cum præcipuum curationis caput sit , frequenti purgatione supervacanea corporis excrementa detrudere . Quibus interjiciuntur ea , quæ viscerum intemperies humorum acrimoniam , si adfuerit , demulcent , vel tenuitatem in crassant . Aut si humores pituitosi luxuriant , sudorificis , diureticis , aliisque remediis erunt discutiendi . Hic tamen sedulò observandum in quacumque cacochymia cauteria mirum in modum prodesse ad præcavendum abortum : quod speciatim annotat Zac. Lusit. his verbis , *Felicissimo experimento observavi , frequentè abortu ex vitiosis humoribus , ad uterum à toto demandatis suisque pravâ facultate , vel copiâ satum enecantibus hoc solo presentaneo auxilio impediri . Fæminæ plu-*

Ecc

res



*res hac ipsa de causa frequenter abortiebant. Ex iis quædam fœtum septimestrem, quadrimestremve, lacerum tamen & omni putrilagine infectum sæpius enixa, non nisi hoc præsidio, tam in brachiis quam cruribus, semper tamen ad originem fluxionis celebratio, à tantis malis levare potuerunt, & debito ac constituto tempore fœtus sanos, & nulla labe fœdatos in lucem edidere.*

Peculiaria uteri vitia, ut nimia humiditas, tumores, ulcera & similia, erunt auferenda remediis, propriis cuiusque affectus capitibus descriptis.

In graviditate, si eadem causæ adfuerint, major est difficultas; quia prægnantes non ita facillè quæcunque ferre possunt remedia. Ne tamen, auxiliis destitutæ, in summo abortus & vitæ periculo versantur: quædam remedia usurpanda sunt.

Præsentem igitur plethora, etiam in gravida muliere, sanguis detrahendus est, primis potissimum mensibus: idque bis aut ter, si opus fuerit. Hoc perpetuò observando; ne magnâ copiâ unica vice detrahatur. De qua sanguinis missione fusiùs egimus præcedenti curatione.

Ubi verò insignis cacochymia redundaverit, purgatio blanda frequenter iteranda est, mediis præsertim mensibus gestationis. Et si intemperies humida, catarrhosa, mucosa, vel flatuosa infestaverit; ad diætam sudorificam in robustioribus, saltem leviorē, transcendere aliquando licet.

Interim toto gestationis decursu adstringentia & roborantia, quæ abortum prohibere nota sunt, in usum revocanda sunt. Quorum non pauca in fluxu mensium immodico descripta sunt, hisque frequentia utiliter addi poterunt.

℞. Granor. tinctor. rad. tormentillæ, an. ʒ. iij. mastiches ʒ. i. ʒ. Fiat pulvis, de quo per intervalla detur ʒ. ʒ. vel quantum in cuspidē cultri contineri poterit. Vel

℞. Coralli rubri Drach. ij. gr. Kermes, ossium dactyl. ana Drach. j. rasuræ eboris Drach. ʒ. margarit. non perforat. ʒ. i. Fiat pulvis.

Vel grana aliquot mastiches singulis diebus mane devorentur.

Notræ mulierculæ frequenti usu habent semen plantaginis, quod manè ad Drach. ʒ. circiter assumunt, cum vino diluto, ovo, aut jusculo, vel per se; singulis fere diebus toto gestationis tempore, non sine fructu.

In eundem usum componuntur opiatæ valde efficaces, quarum exemplum sequens esse poterit.

℞. Conservæ ros. ʒ. ij. cortic. citri condit. ʒ. vi. myrobal. condit. pulpæ dactyl. an. ʒ. ʒ. coralli præp. marg. præp. & rasuræ eboris. an. ʒ. i. Cum syrupo cydon. fiat opiata, de qua capiat magnit. castaneæ frequenter.

Si forma liquida magis arrideat, decoctum tormentillæ cum conserva rosarum utiliter exhibeatur.

Tabellæ sequentes sunt utilissimæ. Siquidem roborant, & corpus ab excrementis sensim liberant; licet aliquando sensibiliter non evacuent.

℞. Macis, trium fantal. rhab. fennæ, coral. margaritar. an. ʒ. i. sacchari in aqua ros. dissoluti ʒ. iv. Fiant tabellæ, pond. Drac. iij. Capiat unam bis in septim. per se, vel in paucō jusculo dissolutam.

Exteriùs verò admovenda erunt unguenta & emplastra, in hunc modum composita.

℞. Picis navalis ʒ. ʒ. thuris ʒ. i. mastiches ʒ. ʒ. sanguinis dracon. & ros. rubr. an. Drach. ii. Fiat ceratum. Vel

℞. Olei myrtini & mastich. an. ʒ. i. fantali rubri, citrini, hypocistidos, acaciæ, an. ʒ. ʒ. spodii, rosar. rubrar. an. Drac. ii. boli armen. tertæ sigillat. rasuræ eboris, an. ʒ. ii. terebint. cum aqua plantag. lotæ ʒ. i. ceræq. ʒ. Fiat ceratum, quod superextendatur linteō, & renibus applicetur.

Emplastra componuntur ex massa emplastri pro matrice & contra rupturam, regioni pubis & lumborum applicanda, vel in sequentem modum.

℞. Massæ empl. pro matrice ʒ. iij. rad. bistortæ, acaciæ, hypocist. cortic. malor. grana. an. ʒ. ʒ. ladanii Drach. vi. Malaxentur cum succo cydon. & fiat massa emplastri ad usum dictum.

Circa emplastra hoc animadvertendum, ea non diù esse gestanda, sed per intervalla removenda. Alioqui diutius lumbis affixa adeò renes calefaciunt, ut miseræ

mulieres aliquando urinæ ardore afficiantur; vel calculos, arenulas, & interdum sanguinem mingant.

Neque omittenda sunt ea, quæ ex proprietate fœtum retinere dicuntur ut lapis melachites & aëtites de collo suspensus, magnes umbilico admotus, corallis jaspides, smaragdi, ossa de corde cervi legitima, & similia sub axillis gestata, vel de collo suspensa.

Zacutus Lusit. observ. 15. lib. 2. Praxis adm. inter cætera commendat zonam, ex corio equi marini confectam; & illius defectu corium lupi utiliter usurpari posse asserit.

Ut autem horum remediorum fœlix possit esse eventus, summa quies imperanda est; tum corporis, tum animi: tum etiam coitu abstinentia, qui uterum vehementer exagitat. Dum enim se uterus aperit ad comprehensionem seminis, quo maximè oblectatur, fœtum recentem, & nondum firmiter adhærentem propellit.

Si verò non obstantibus remediis prædictis, propter causæ vehementiam, siue illa interna fuerit, siue externa, abortus immineat; sequentibus auxiliis illi erit succurrendum. Ac primùm dolores & tormina, quamprimum apparuerint in ventris fundo, versùs pubem, in lumbis & osse sacro, eorum sedationi incumbendum est, tam sumptis quàm admotis, pro varietate causarum adhibitis. Si enim ob cruditates & flatus excitetur abortus, (quod est frequentissimum, quando incipit à causa interna,) exhibendus erit pulvis ex aromatico rosato, & sem. coriandri compositus. Imo aqua imperialis exhiberi poterit, si major sit pituitæ & flatuum congeries.

Eodem tempore applicentur abdomini carminantia, ut sacculi ex sem. anisi, fœniculi, fœnugræci, floribus chamom. sambuci, anthos, & stæchados compositi. Vel placenta rosacea frixa in sartag. cum vino generoso, & pulvere nucis mosch. & coriandri conspersa. Vel omentum vervecis recenter mactati, aut pulmo ejusdem calidè admotus.

Si hisce dolores non cesserint; injiciatur clyster ex vino & oleo confectus, in quo philonii Rom. Drach. ii. dissolvi poterunt. Aut etiam narcotica per os, in minori dosi exhibeantur, ad frænandum flatuum & humorum impetum ut in colico dolore fieri consuevit.

Si verò propter dolores contumaces, aut causæ externæ violentiam sanguis apparere incipiat, revellentia remedia administranda sunt, ut frictions superiorum partium, & ligaturæ dolorificæ. tum cucurbitulæ scapulis. sub mammis & utrique hypochondrio admovendæ. Inò verò, si mulier fuerit plethorica; non erit abs re sanguinem detrahere, tum apparente sanguine, tum præcipuè antequam appareat, & partitis vicibus, non assatim educere.

Quæ si non sufficiant, fluxu sanguinis perseverante, ad adstringentia veniendum est & incrassantia, tum alimenta, tum medicamenta, atque ita pulveres & opiatæ suprâ descriptæ exhiberi poterunt. Tum etiam succus plantaginis recenter extractus, nec non syrupus de papav. ad Unc. j. cum pulvere boli armenæ, aut sanguinis draconis.

Exteriùs verò ad moveri poterunt fœtus adstringentes & roborantes, ex corticibus granat. nucibus cupressi, calycibus glandium, balauistiis, acinis uvarum, & similibus, in aqua fabrorum & vino rubro decoctis.

Vel sacculus rosæ & balauistiis impletus coquatur in vino rubro, & ventri calidè applicetur.

His etiam accedere possunt cerata & emplastra prædicta; Vel, ad magis adstringendum, fiat cataplasma ex pulveribus adstringentibus, cum terebinthina & albuminibus ovorum, quod extendatur super stupas, & alterum applicetur umbilico, alterum renibus calidè. Stupæ, applicandæ umbilico, madeant in vino: applicandæ renibus, in aceto.

Sequentia duo remedia pro secreto habentur, & fœtum certò retinere creduntur, si, antequam fœtus à coryledonibus divulsus fuerit, usurpentur.

℞. Folia aurinu. xii. spodii ʒ. i. geminatrium ovorum non subventaneorum. Misceantur probè, donec aurum sit in minutissima divisum. Postea dissolvantur in dimidio cyatho vini albi, & detur per triduum.

Eodem tempore sequens cataplasma admoveatur.

℞. Thuris masculi pulverati Unc. ii. albumina ovorum nu. v. Agitentur simul super prunas, semper movendo ne



concreſcant; Addendo terebinthinam, ne nimis adhæreant. Poſtea ſtupis excipiantur, & quantum ferre poterit, calidiſſima umbilico applicentur bis in die, manè & ſerò, per triduum prædictum.

## C A P U T XVIII.

### De partu difficili.

**P**artus difficilis appellatur, qui debitas, atque ordinarias naturæ leges non ſervat, ſed longius tempus inſumit, & dolores ſubito vehementiores, aliaque ſymptomata graviora comitantia habet.

Plures illius cauſæ assignari poſſunt, tum internæ, tum externæ. Internæ dependent vel à matre, vel ab utero, vel à foetu.

Ex parte matris partum difficilem reddere poteſt, debilitas totius corporis, vel nativa, vel propter ætatem, ut in juvenculis & vetulis, vel ob morbos, quibus in graviditate mulier afflicta fuit, aut adhuc affligitur. Ad hoc etiam conferre poteſt macies & ſiccitas nimia totius corporis, vel pinguedo & craſſities vias uteri comprimens, & anguſtiores efficiens; oſſium uterum ambientium mala conformatio, ut in claudicantibus; ſtatus inteſtina diſtendens; calculus, aut tumor præter naturam veſicam occupans, uterumque comprimens & pulmonis, aliarumque partium reſpirationi inſervientium præva conſtitutio, quia ſpiritus cohibito ad foetus excluſionem valdè neceſſaria eſt.

Ex parte uteri, varii illius morbi partum difficilem reddere poſſunt: ut tumores, ulcera, obſtructiones, adſtrictiones, obturationes, à cauſis præternaturalibus oriundæ.

Ex parte foetus contingit partus difficilis, quando virium aliquid in eo reperitur ratione ſubſtantiæ, quantitatis, figuræ, & illi adjuutorum.

Ratione ſubſtantiæ vitium in foetu eſt, quando mortuus eſt, aut putrefactus, aut labe aliqua infectus, aut aliquo morbo debilitatus, ut nihil virium conferre poſſit ad ſuam excluſionem.

Ratione quantitatis foetus partum non adjuvat, quæ vel continua eſt, vel diſcreta. Ratione quantitatis continuæ vitioſus eſt, ſi grandiori corpore aut capite præditus ſit, unde laborioſa excluſio ſequitur. Ratione quantitatis diſcretæ: ut quando plures ſunt in utero. Sic partus gemellorum laborioſior ut plurimum eſſe conſuevit.

Ratione figuræ, ſeu ſitus in utero, partus difficilis variis modis contingit: ut quando foetus pedibus, aut manibus præviis exire conatur; vel unum tantum pedem, aut manum alterutram exerit: vel duplicatus egredi conatur, nates aut ventrem ad uterum oriſicii offerens.

Ratione adjuutorum foetus contingit difficultas in partu, quando membranæ foetum obvolventes tenuiores ſunt, ut citius quàm par ſit, diſrumpantur: unde ſequitur præcox aquarum effuſio, ſicque reſiccatum manet uteri oriſcium tempore excluſionis foetus. Vel quando craſſiores ſunt & denſiores, ut facile à foetu diſrumpi nequant.

Externæ cauſæ dependent ex rebus neceſſariis & contingentibus. Res neceſſariæ ſunt illæ, quæ non naturales vulgò nominantur. Sic aër frigidus & ſiccus, & ſtatus Aquilonaris, parturientibus valdè inſenſus eſt, quia totum corpus conſtringit, ſanguinem, & ſpiritus ad interiora repellit, & infanti à tepentibus illis locis executi valde noxius eſt. Aër etiam fervidior ſpiritus diſſipat, & foetus ac foetæ vires exhaurit; inflammationem febrilem facile inducit, in corpore jam cacochymo, & exagitato.

Alimenta cruda, aut concoctu difficilia, aut adſtringentia magnâ copiâ, ante partum aſſumpta, difficilem eum reddere poſſunt, debilitato ventriculo, & conſtipatis viis communibus, quæ hæc maximè patere debent.

Somnolentia & ſupor, matris & foetus, impetum retardant, & naturam invalidam oſtendunt.

Motus parturientis intempeſtivus partum maximè retardat, cum illa, ubi opus eſt, ſtare, ambulare, decumbere, vel in ſella obſetricis ſedere renuit, vel importunè agitur; unde contingit, foetum vel non poſſe exire ſecundùm debitam figuram, vel illam amittere ob matris motus præpoſteros.

*Laz. Riverii Opera.*

Excretorum retentiones tempore partûs, ut urinæ veſicam diſtendentis; fæcum induratarum in recto inteſtino, & hæmorrhoides valde tumentes, uteri cervicem coarctant, & naturam à conatu parturiendi avertunt.

Ac denique animi pathemata vehementiora, ut timor, triſtitia, iracundia, partus facilitatem plurimum impedire poſſunt.

Ad res contingentes referuntur iſtus, caſus, vulnera, quæ partui plurimum nocere poſſunt: tum etiam adſtantes, qui parturientem adjuvare debent, validæ nimirum mulieres & famulæ, quæ illam ſublevent & fulciant, dum eſt in ipſo eſſu, & præſertim obſetrix perita, quæ univerſæ huic actioni præſidere debet. Si enim illa in officio ſuo erraverit, partus difficultatem inferre ſolet. Interdum enim obſetrices juſto citius parturientes incitant ad conatus expulſionis, & ſpiritus cohibitionem, dum adhuc ligamenta foetus utero firmiter adhærent; unde virium exſolutio ſubſequitur, quæ poſtmodum in ipſa partus hora non ſufficiunt. Inò verò, dum obſetrices parturientibus præmaturè perſuadent, tempus pariendi inſtare; ſit, ut illæ omnes vires ad excernendum foetum intendant, & ſæpenumero valis violenter divulſis, in non leve diſcrimen præcipitentur.

Cognoſcitur partus difficilis, tum ab ipſa parturiente; tum ab adſtantibus, & præcipuè ab obſetrice. Ac primùm, ſi longiori tempore maneat fœmina in laboribus partus v. g. per duos, tres, quatuor, aut plures dies, cum vere naturalis partus intra 24. horas perfici debeat. Deinde, ſignum difficilis partus eſt, ſi dolores partus ſint languidi, & per longa intervalla recurrant, & dolores ad dorſum potius, quam verſus pudenda vergant. Cauſæ verò difficilis partus ex ipſarum parturientium relatu & ipſa autopſia majori ex parte dignoſcentur. Sed debilitas ægræ, macilentia, aut pinguedo nimia, ex habitu corporisprehenduntur. Morbi uteri propriis indiis dignoſcentur. Foetus debilitas ex debili & tarda motione dignoſcitur. Foetus verò mortui ſigna capite ſequenti innotefcent. Magnitudo foetus ex parentum ſtatura colligi poteſt, præſertim cum vir magnæ corpore præſtitus, cum puſilla muliere conjunctus eſt. Quando verò hæc deficiunt; & matris conatus ſatis validus eſt, foetusque ſeſe commovendo ſufficienter exitum affectat, partus tamen difficilis ac laborioſus eſt; indicio eſt, ſecundinam eſſe fortiorem, quæ non facile diſrumpi valeat. Cujus rei conjecturam augebit, ſi aqua & humiditas in labore non profluit. Præpoſtera foetus figura ab obſetrice deprehenditur, & reliqua, ut dictum eſt, ipſâ autopſia innotefcunt.

Prognofis quod attinet. Partus difficilis ex ſe periculoſus eſt, & in eo interdum mater, interdum foetus, & interdum uterque extinguitur.

Si mulier quatuor diebus in partu laboret, vix fieri poteſt, quin foetus moriatur,

Affectus ſoporofi & convulſiones in partu difficili ſupervenientes, ſunt ut plurimum lethales.

Sternutatio in partu difficili ſuperveniens, bona, ex Hippoc. *Aphorismis*.

Ad curationem partus difficilis, primò, omnes cauſæ quæ illum retardare valent, quantum fieri poterit, auferendæ. Deindè, partum adjuvantia remedia methodice adminiſtrando.

Ac primùm vulgare eſt apud mulieres aquæ cinnamomi cochl. i. aut alterum exhibere. Vel ipſe cinnamomi pulvis cum pauco croco, vel conſect. alterm. 3. β. cum juſculo propinari poterit. Tum etiam crocus ſolus ad 3. β. in ſingulis juſculis, aut ſingulis horis, cum modico vino ſumptus, utiliſſimus eſt. Vel

℥. Olei amygd. dulc. & vini, ana 3. ii. croci & cinnamomi, ana gr. xii. conſect. alterm. Drach. ſem. ſyrupi capill. ven. 3. i. β. Miſce, fiat potio.

Si hæc non ſufficiant, & validioribus agendum ſit; ſequens potio erit efficaciffima frequenti uſu à nobis comprobata.

℥. Diſtami cretici, ariſtoloſch. utriuſque, & trochiſchorum de myrrha, ana 3. β. croci & cinnam. ana gr. xii. conſect. alterm. Drach. ſem. aquæ cinnam. 3. β. aquæ naphæ & artemiſiæ, an. Unc. i. ſem. fiat potio.



Inter efficaciora recensentur oleum succini, cinnamomi, & extractum croci; quæ in exigua quantitate multum operantur: scilicet extractum croci ad gr. v. vel vi. oleum cinnamomi ad gutt. iv. vel oleum succini ad gutt. xii. vel xv. cum vino, jussulo aut alio liquore.

Sternutatio partum accelerat ex Hipp. *Aphor. 53. sect. 5. Difficiliter parienti superveniens sternutatio, bonum.* Illa provocabitur pulvere sequenti.

℞. Hellebori albi Drach. sem. piperis longi ℥. i. castorei gr. v. Fiat pulvis, qui suffletur in nares ad pisi magnitudinem.

Idem Hippocrates aliud præscribit remedium *lib. 1. de morbis mulierum*, quod ab omnibus ferè Authoribus prætermisum. Illud autem est sectio venæ inferioris, his verbis proposita. *Si verò, inquit, prægnans multo tempore cohibeatur, & parere non possit, sed diebus pluribus ex partus dolore laboret, sit autem juvenis, & in vigore & multo sanguine referta; secare oportet venas in malleolis, & sanguinem detrabere; virium respectu habito.* Quamvis à Practicis nostris nunquam in usum revocetur hujusmodi remedium & videatur maximè reformidandum; cum in partu vires unicè necessariae sint, quæ à venæ sectione infringi possunt: Tamen, si à plethora difficultas pariendi oriatur, quod innuere voluit Hippoc. cum dixit: *si mulier sit juvenis, & in vigore, & multo sanguine referta;* non est dubium, quin maximè conferre possit, cum venæ, plurimo sanguine refertæ, omnes vias interiores angustiores efficere soleant. Unde fit, ut in dolore nephritico similis phlebotomia sæpe miranda præstet, & calculorum tum in renibus, tum in ureteribus contentorum exclusionem faciliat.

Non solum autem internis remediis propositis; sed etiam externis, partus difficilis adjuvari poterit.

Obstetrix itaque uterum parturientis frequenter inungat oleo lilior. amygd. dulc. sem. lini & similibus.

Tum etiam foveatur venter inferior decocto emolliente, ex rad. alth. lilior. fol. malvæ, violar. artemis. sem. lini, fœnugr. flor. chamom. meliloti.

Clysteres acres injiciantur, quorum irritatione expultrix etiam uteri stimulabitur, & depleta intestina ampliorum locum utero relinquent.

Umbilicus inungatur oleo succini. Quidam fel gallinæ nigræ laudant, eidem parti admotum.

In usum etiam venire possunt ea, quæ proprietate specificâ partum juvare creduntur: ut lapis ætites, vel magnes, styrax, calamita, & reliqua, coxis alligata.

Hartmannus oculos leporis, mense Martio captos, laudat: Qui studiosè eximendi, ne comprimantur nimis, & cum pipere in orbe exsiccandi. Horum unus ventri (vertici) cum pipere ita alligetur, ut venter (vertex) à pupilla tangatur, & foetus, sive mortuum, sive vivum educet. Quo facto mox amoveatur, ne uterum planè propellat. In mola etiam valere asserit.

Cavendum etiam est, ne puerpera gemmas in annulis aut alio loco gesset; sed omnes deponat: nam multæ ex iis proprietate specifica, foetum retinere creduntur.

Si foetus debilior videatur, reficiendus est: tum roborantibus matri exhibitis, ut vino calente, confectioe alkermes, aqua cinnamomi: tum externis, ut crustâ panis, aut placenta rosacea, pulvere nucis moschat. cinnam. caryophyl. granor. Kermes sinapifata, & aquâ imperiali, aut vino repente irrigatâ. Vel frustulo carnis vervecinæ parum asso supra craticulam, & aquâ rosacea vel flor. arantio. irrigato, omento vervecis nuper mastati adhuc calente, & similibus.

Si præpostero modo foetus egredi incipiat, ut brachio uno aut pede primum emisso, vel altero quopiam modo, obstetrix nullo modo talem partum exipiat; sed in uterum retrudat, & ad legitimam formam convertat. Quod fiet, puerperam in lecto supinam collocando, capite demisso & clunibus elatis. Postea ventrem ipsius, versùs præcordia blandè comprimendo, & in uterum foetum ipsum compellendo. Postea verò obstetrix alia forma exeundi occasionem infanti ministret artificiosâ manu procurans, ut faciem tergo matris obvertat, dein nates & crura versùs matris umbilicum elevet, & ad legitimum partum acceleret.

Sublata omni partus spe, aut etiam matre jam morti

proxima, nonnulli Authores ad sectionem Cæsaream accedunt, de qua Franciscus Rossetus elegantissimum edidit tractatum. ubi multis rationibus & exemplis conatur ostendere, illam posse aliquando succedere. Attamen, quia hæc operatio est periculi & terroris plena; raro aut nunquam tentanda est Medico prudenti, si nomini suo consulere voluerit.

## CAPUT XIX.

### De fœtu mortuo.

**I**N partu difficili, ob magnos & diuturnos labores, fœpè foetus extinguitur. Interdum etiam ante labores partus ex causis præternaturalibus, quales sunt eæ, quæ abortum provocare consueverunt, eum mori contingit, & si nondum determinatum pariendi tempus attigerit, abortum facit: si verò ad illud tempus pervenerit; facit partum difficilem, quia ad legitimum & naturalem partum foetus cum matre cooperari debet, ut è carcere suo egrediatur.

Omnes igitur causæ, partum difficilem efficere valentes, si majores & graviores sunt, foetum extinguere possunt. In primis verò foetus extingui solet, si adeò præpostera figurâ prodeat, ut nullo modo excludi possit, neque ab obstetrice, neque à Chirurgo extrahi: aut in meliorem situm converti. Cum hoc modo in orificio hæreat, & omnem matris conatum eludat; sic, ut in illis conatibus variisque motibus & compressionibus, interdum mater & foetus, interdum mater sola, & interdum foetus solus moriatur. Admiratione dignum est, quod refert Fabricius Hildanus de duabus mulieribus, & partu laborioso extinctis in quibus uterus disruptus inventus est, & caput infantis in ventris capacitatem demissum. Unde colligere est, quantus sit valdè foetus impetus ad sui exclusionem molendam.

Cognoscitur foetus mortuus, quando motus illius cessat, quem priùs in utero aut mater ipsa sentiebat; aut obstetrix percipiebat, admotâ manu, aut aliis rebus repentibus & roborantibus, quibus illius vis sopita solet excuscitari; major præterea ponderis sensus cum dolore abdomen infestat, quando fœmina de latere in latus sese convertit, foetum ex una parte in alteram instar lapidis dilabi percipit: ventris inferioris frigiditas tactu deprehenditur, extincto calore nativo, & dissipatis spiritibus quæ in foetu continebantur: oculi redduntur concavi & perturbati: facies & labra pallent: partes extremæ frigidæ ac lividæ apparent: mammae flaccidæ evadunt, ac tandem, putrescente foetu, ichores fœtidi & saniosi ex utero emanant: abdomen ob vapores elevatos inflatur, teter odor & graveolens spiritus, non solum ex ore matris, sed etiam à toto corpore exhalat. Si ante foetum secundina excludatur, certissimum est foetus in utero mortui indicium.

Quod ad prognosin spectat; periculosissimus est foetus in utero mortuus, & nisi maturè excludatur, febres. lipothymias, sopore convulsiones, & mortem inferre solet.

Aliquando tamen foetus in utero mortuus per longum tempus servari potest, ut plurimis historiis à variis Authoribus relatis constat: quas tanquam raros casus magno numero collegit Schenkius, & transcripsit Sennertus, multarum mulierum, quæ foetus in utero mortui & corrupti officula, per uterum, alvum, vesicam, & tumorem in abdomine apertum excreverunt.

Nos unam vidimus, quæ omnia foetus ossa per umbilicum excrevit, & postea coalescente umbilico, perfectè restituta est.

Curatio tota versatur in foetus exclusione, vel extractione. Cum enim maximum vitæ periculum immineat ex longiori foetus mortui in utero morâ; quamprimum ex signis propositis certò concluditur, foetum esse demortuum, ad illius exclusionem properandum est. Illa autem iisdem remediis promovetur, quæ ad juvandum partum fuerunt proposita. Ex iis tamen fortiora & efficaciora eligenda sunt quibus



quibus nonnulla majoris adhuc efficaciz addi poterunt in hunc modum.

℥. Fol. fabinæ siccor. rad. aristol. rot. trochif. de myrrha, castorei, an. 3. i. cinnam. 3. ℥. croci 3. i. Misce, fiat pulvis, de quo capiat 3. i. cum aqua fabinæ. Vel

℥. Dictamni cretici, fabinæ, boracis, an. 3. i. mirthæ, rad. asari, cinnam. croci, an. 3. ℥. Misce, fiat pulvis, dosi 3. i. cum dicto ac simili liquore.

Interim admoveantur pudendo, pubi, & perinæo fatus emollientes prædicti, addendo rad. bryoniæ, cucumeris agreßis, ireos Florent. aristol. rot. & flores genistæ.

Post fatus inungantur eadem partes unguento de arhanira, vel sequenti.

℥. Aristol. rot. colocynth. & agarici, an. drach. i. gummi ammoniaci in vino soluti, & fellis tauri, an. 3. ii. ol. cheirini q. s. Fiat unguentum.

Pessarium etiam in vulvam immittatur.

℥. Rad. aristol. rot. ireos, hellebori nigri, colocynth. myrrhæ, an. 3. i. galbani, opopanacis, an. 3. ℥. cum felle bovis, fiat pessarium. Vel

℥. Ammon. opopan. castor. serap. hellebori nigri, staphis, aristol. rot. pulpæ colocynth. scam. an. 3. i. euphorb. 3. i. Cum succo rutæ, cyclam. cucum. agr. & felle taurino fiat pessarium.

Zacut. Lusit. observ. 154. lib. 2. Prax. adm. foetus novimestrem, in utero mortuum, & gravissima symptomata excitantem, exclusum fuisse testatur hujus pessarii vi, & balnei oleaginei, cum decocto medicamentorum aperientium, & vias dilatantium commixti.

Suffitus ex galbano, vel ungula asinæ per infundibulum recipiatur.

Si res cunctetur diutius, utile erit, constantibus viribus, catharticum medicamentum exhibere, quo simul educuntur vitiosi humores, qui in hoc statu facile & citò colliguntur, & consequenter foetus propellitur.

Angelus Sala in triumpho emeticorum testatur, se felicissimo cum successu pluries in hoc casu exhibuisse mercurii vitæ g. iv. vel v. idque remedium potentissime foetus mortuum excludere & reliquis remediis prævalere. Quod tamen, propter vehementem suam operationem, summa cautione & Medici prudentiâ indiget.

Si medicamentis diu tentata foetus mortui educio obtineri nequiverit, ad Chirurgam operationem veniendum est. Eaque sit, vel instrumentis, quemadmodum à Paulo Aegineta describitur, vel manus solius ministerio, prout docetur à Carolo Stephano, Bauhino & aliis; quæ omnia à Schenkio & Sennerto diligenter transcripta sunt.

## CAPUT XX.

### De secundina retenta.

**I**N partu naturali secundina ut plurimum statim post foetum excludi solet: aliquando tamen in utero retinetur, unde gravissimum imminet vitæ periculum.

Causæ istius retentionis internæ sunt, nimia tunicarum illarum densitas & crassities: propter quam uteri parietibus firmitus adherent, earundem intumescencia ab humorum affluxu, qui in partu laborioso concitatur, virium exolutio ex partu laborioso facta, ut non sufficiant ad secundinarum exclusionem, & oris uteri oclusio, post foetus ejectionem. Causæ verò externæ sunt aëris frigiditas, cujus vi secundina repellitur, & uteri orificium occluditur, odoramenta quædam, quibus uterus sursum allici, vel exagitari potest: animi pathema grave: ut timor, vel terror subito adveniens, morositas parturientis, quæ in eo situ permanere non vult, vel eos conatus præstare, qui ad hoc opus perficiendum requiruntur; infantis pondus nimium, quo ex improvise umbilicus disrumpitur, remanente intus secundinâ, & imperitiæ obstetricis error, quæ vasa umbilicalia citius refecuit, aut non tenuit sinistra manu, ut debeat: si enim dimittantur, retrahuntur ad uterum, & in eo cum secundinis latent; quæ earum extractioni inservire debebant.

Diagnosi secundinæ in utero retentæ per se facilis est: aliquando tamen frustulum illius separatur, & in utero remanet, cujus notitia non est adeo facilis. Cognosci tamen potest ex eo, quod uterus post partum adhuc in excernendo laborat, quamvis leviores sint illius conatus: doloris & caloris sensus in utero percipitur, & post aliquot dies teter ac cadaverosus ab utero exhalat.

Periculosissima est secundinæ retentio, & si per aliquot dies in utero moretur, foedam putredinem acquirit; unde febris acuta, nausea, lipothymia, dyspnoea, sudor diaphoreticus, extremorum frigiditas, hysterica suffocatio, epileptici insultus, & mors tandem subsequitur.

Hippocrates 2. epid. exemplo uxoris cujusdam coriarii, innuit bonum esse, si sanies copiosa brevi per pudendum effluat; spes enim est, membranas illas putrefactas, vel marcore consumptas, sexto, vel septimo die effluxuras.

Secundina retenta iisdem remediis expellitur, quæ ad foetus mortuum fuere proposita, quibus addere licet nonnulla specifica ab Authoribus tradita.

Gesnerus & Augenius plurimum laudant equi castrati testiculos, frustulatum incisos, & furno siccatos. Illorumque pulveris datur, quantum tribus digitis capi potest, cum jure pulli, idque, si opus sit, bis aut ter repetatur.

Rulandus olei juniperi guttas xxx. feliciter exhibuit.

Alii jubent puerperam dentibus cepam comprimere; succumque deglutire, idque ter, quaterve dentibus in cepam adæctis, succoque semper elicitò ac deglutito, repetere: postea vini calidi cyathum superbibere, unde citò liberatur.

Forellus refert de obstetrice quadam, quæ à Judæo Medico secretum sequens acceperat. Sumebat folia levistici viridia, contundebat, & succum exprimebat cum vino Rhenano optimo, ejusque cyathum propinabat.

Angelus Sala mercurium vitæ commendat, ut in foetus mortui educatione.

His addenda erunt sternutamenta, suffitus, fomenta, linimenta, aliaque tum externa, tum interna, suprâ descripta in partu difficili.

Sequens decoctio à muliere quadam nostrate usurpata miranda præstitit.

℥. Aceti rosæ. lb. viii. vel x. folior. lauri & baccarum ejusdem, an. M. iii. placentam rosaceam, ex aqua destillata relictam, in frusta dissectam, num. 1. Bulliant in lebe, & ex decocto laventur diu coxæ & tibiæ calide ab inguinibus ad pedes usque, ex eo uterus spontè apertus est, ac secundina decidit. Huic decocto commodè addi poterit myrrhæ & aristol. utriusque, an. 3. i.

Inter alia verò remedia multum potest manus periti Chirurgi in uterum immitti, antequam inflammatio, vel inflatio augeatur. Sic enim apprehensas secundinas & molliter circumductas, poterit extrahere, mulieremque à tot symptomatis & remediorum molestiis liberare.

Si nullo modo secundina educi potuerit, sed firmiter utero hæreat, & in eo putrescat; suppurantia in uterum immittenda sunt, admixtis detergentibus, ut id, quod putrefactum est, sensim educatur. Ad id laudat Rondeletius unguentum basilicum, præsertim si dissolvatur in decocto sequenti.

℥. Fol. malvæ cum rad. M. iii. rad. aristol. utriusque an. 3. vi. sem. lini & foenugr. ana 3. sem. violariæ M. i. florum chamom. & centaur. min. an. M. 6. Fiat decoctio in aqua: admiscendo, si magna suppuratione opus est, aliquid olei: si verò majori deterfione, unguenti Ægyptiaci parum.

## CAPUT XXI.

### De fluxu lochiorum immodico.

**F**Luxus lochiorum immodicus non ex quantitate, aut tempore durationis æstimandus est; quia pro diversis naturis, ætatibus ac vitæ generibus, varius admodum est; sed ex difficili tolerantia, & virium dejectione, quæ ex eo contingit.

Causæ illius sunt, vasorum apertio nimia, vel laceratio



in partu difficili, vel secundinarum violenta extractio, vel sanguinis copia major, quæ per totum gestationis tempus in uteri venis collecta fuit, vel ejusdem tenuitas & acrimonia, quæ vasorum oscula nimium aperit, & naturam ad excretionem stimulat.

Cognoscitur fluxus lochiorum immodicus ex viribus, ut dictum est, quæ exhaustis spiritibus dejiciuntur, tum sanguis grumofus effluit: isque accedit cibi fastidium, dolor in hypochondriis, cum ventris tensione, pulsus debilis & frequens, visus obtenebratio, aurium tinnitus, animi deliquium & convulsio.

Cum omne sanguinis profluvium periculosum sit, ex eo, quod sanguis vitæ nostræ thesaurus sit; fluxus lochiorum immodicus magis periculosus est, propter labores partus prægressos, à quibus facta est virium resolutio. Major autem, vel minus adest periculum, pro majoris vel minoris sanguinis effluxu, & symptomatis levioribus aut gravioribus, quæ illi superveniunt, unde apud Hippoc. *Apb. 35. sect. 5. Si muliebri profluvio convulsio, aut animi deliquium superveniat; malum.*

Curatio sanguinis fluxus immodici in illius cohibitione tota versatur. Summa tamen cautio adhibenda est, ne quod per hujusmodi purgamenta excerni consuevit, intus retineatur, & gravissimorum affectuum causa evadat. Atque adeò, si affectus non vehementer urgent, à levioribus incipiendum erit, ad potentiora, si opus fuerit, sensim progrediendo.

Ac primum sanguinis impetus cohibendus est alimentis incrassantibus, ut panatellis, gelatinis, oryza, amylo, cum jusculis pedum vituli, pyris, cydoniis coctis, carnibus assis, succo granatorum aspersis.

Cibus paulò copiosior exhibeatur: non tamen unâ vice, sed potius frequenter, cum hoc modo calor, & spiritus, qui expulsionem in utero adjuvant, ab utero ad ventriculum avocentur, & vires instaurentur, vitelli ovorum huic usui conveniunt; nam & facile coquantur, & calorem ad ventriculum avocant.

Potus sit aqua ferrata, vel extinctionis auri, vel in qua parum mastiches bullierit. Deinde sanguinem ad partes superiores revellentia remedia usurpanda sunt, ut frictiones ligaturæ partium superiorum, cucurbitulæ sub mammis, & utrique hypochondrio admotæ.

Utile etiam est manus fovere in vino calente, in quo confectio alkermes vel theriaca dissoluta fuerit.

Tum etiam venter fasciâ mediocriter constringatur: quia hoc modo comprimuntur vasa, & fluxus immodicus impeditur.

Lumbis admoveantur lintea oxycrato madefacta, quibus sanguis in vena cava contentus temperatur, illiusque motus inhibetur.

Si fluxus valde immodicus sit, viresque dejiciat, ut vitæ periculum immineat; ad fortiora remedia confugiendum est. Et inter alia sequens potio ut plurimum succedit.

℞. Aquar. plantag. naphæ, & rosar. an. ʒ. i. Syrupi corall. vel illius defectu, de rosis siccis ʒ. i. salis prunellæ ʒ. i. Sang. dracon. ʒ. ʒ. Fiat potio.

Si diutius duret fluxio, pulvis, vel opiata ad plures doses præscribi potest in hunc modum.

℞. Lapidis hæmatitis ʒ. iv. pulv. boli armen. coralli rubri, margarit. præpar. an. ʒ. j. Sem. plantag. coriandri præpar. & granor. sumach. an. ʒ. ii. Misce, fiat pulvis tenuissimus, de quo capiat ʒ. i. cum decocto centinodiæ & syrupo cydoniorum.

℞. Conservæ rosar. & rad. symphyti, an. ʒ. i. boli armen. trochisc. de carabe & corall. an. ʒ. i. cum syrupo corallior. vel de rosis siccis, fiat opiata, de qua capiat ad magnitudinē castaneæ, superbibendo parum aquæ potus ordinarii.

Exteriùs verò fatus & unguentum utiliter admovebuntur, quorum formula talis esse poterit.

℞. Summit. lentisci rubri, plantag. cupressi, olivæ, & polygoni. an. M. i. rosar. rub. P. ii. granor. myrri ʒ. i. ʒ. nu. cum cupressi num. vi. corticum granat. P. i. Coquantur in aqua chalybeata & vino rubro adstringente, & colatura foveantur partes muliebres, valde tepidè & ferè subfrigidè.

℥. Unguenti comitissæ ʒ. ii. succi plantag. ʒ. i. Agitentur simul, & fiat linimentum, applicandum post fatus.

Injectio in uterum etiam potest fieri ex succo plantag. à Galeno laudato ʒ. *methodi*, vel decocto fatus prædicti.

Reliquis remediis non conferentibus, venæ sectio in cubito, præsentaneum est remedium, si paulatim & per quædam intervalla sanguis educatur. Sic enim multas deploratas convaluisse experientia docuit.

Ac denique, perseverante affectu, omnia remedia, quæ pro fluxu mensium immodico sunt descripta, hic etiam convenire poterunt.

Inter remedia autem, pro fluxu mensium immodico proposita, habentur cataplasmata, regioni pubis & lumborum applicanda, quibus sequens addi poterit, fluxui præsertim lochiorum immodico maximè conveniens.

℥. Fuliginis camini durissimæ ʒ. viii. Subigatur cum aceto fortissimo, & fiat cataplasma renibus applicandum.

De somno peculiariter hic annotandum, dum sanguis copiosè effluit, eum esse penitus arcendum. Multæ enim ex eo de medio tolluntur, quia calor ad interiora retractus, majorem fluxum efficit. Et si aliquando is concedendus sit; aliquis ex ministris semper adesse debet, qui ægroantis pulsum & respirationem observet.

Denique si grumi sanguinis in utero subsistant, ibique dolorem & tensionem excitent; danda opera, ut maturè educantur, ne putredinem contrahentes, tetros vapores transmittant ad cerebrum & cor, febremque concitent. Ideò puerpera, si vires ferant, levi deambulatione uti debet, vel erecta aliquandiu stare, aut in sella perforata sedere, quasi vellet dejicere. Quod si non sufficiat; decocto hordei tepido, cum pauco oxymelite, vel melle rosaceo in uterum injecto, dissolvendi sunt. Cautè tamen hic agendum est, ne, dum grumi educuntur, sanguis de novo concitetur.

## C A P U T XXII.

### De suppressione lochiorum.

**B**onus ac felix puerperii successus ex convenienti lochiorum effluxu præcipuè dependet, quandoquidem impuritates, quæ per novem gestationis menses in venis uteri, ac toto corpore colliguntur, per istas evacuationes expurgari solent. Si verò illæ supprimantur, aut imminuantur, infinita mala & pericula inde oriuntur, nempe febres acutæ, phrenitides, mania, melancholiæ, angina, pleuritides, peripneumoniæ, uteri inflammationes, & alii tumores ut plurimum maligni.

Causæ istius suppressionis aut imminutionis sunt sanguinis crassities, vasorum angustia, vel obstructio, quæ liberum effluxum impediunt; aer frigidus incautè utero susceptus, quia vasorum orificia constringit, refrigeratio pedum, & aquæ frigida potus, metus, terror, tristitia, & alia animi pathemata, quæ sanguinem ab utero avertunt.

Diagnosis istius suppressionis per se manifesta est. Imminutio verò ex quantitate sanguinis effluentis desumenda non est, quandoquidem mulieres aliæ plùs, aliæ minùs sanguinis superflui habent. Sed integra illius cognitio ex symptomatis supervenientibus elicitur; qualia sunt, ventris intumescencia, dolor imum ventrem, lumbos, & inguina occupans; faciei rubor, spirandi difficultas, oculorum perturbatio, rigores, febres, animi deliquia, & alia symptomata suprâ enumerata.

Prognosis elicitur ex symptomatis propositis, quæ huic affectui supervenire diximus. Cum enim majori parte periculosa sint; causam etiam eorum valdè periculosam arguunt.

A prædicto periculo liberantur puerperæ, si quædam alia evacuatio fiat, quæ lochiorum vicem aliqua saltem ex parte supplere valeat, ut hæmorrhagia narium, aut hæmorrhoidum: urinæ profusio cum fuliginoso sedimento, aut sudor copiosus. Aut si post aliquot dies ex utero livida, nigra, & graveolentia effluere incipiant. Metuendum tamen est, ne ex corrupto sanguine ulcera in utero excitentur.



Curatio suppressiois lochiorum, in eorum provocatione tota consistit, eaque mollienda est remediis, quæ sanguinem ad inferiora provocant, & uteri vasa aperiunt.

Ac primum clysteres emollientes, laxantes, & aperientes injiciendi sunt, in hunc modum compositi.

℞. Rad. althææ & lilior. an. ʒ. i. aristol. utriusque, an. ʒ. iii. fol. malvæ, althææ, parietar. mercurial. an. M. i. Sem. lini & fœnugr. an. ʒ. sem. flor. chamom. & sambuci, an. P. ii. Coquantur ad ℥. i. In colat. dissolve olei aneth. & lilior. an. ʒ. i. hieræ simpl. ʒ. sem. unguenti de athena ʒ. i. Misce, fiat clyster.

Friciones fiant in cruribus, deorsum versus; ligaturæ dolorificæ digitorum pedis. Cucurbitulæ admoveantur inguinibus & coxis: nonnullæ scarificentur.

Si hæc non sufficiant; aperiatur venæ poplitis, aut utriusque cruris: vel etiam hæmorroidum, si natura eò vergere videatur.

Si febris excitetur ex lochiorum suppressione, venæ sectio in brachio celebranda est, ut in morbis puerperarum dicetur.

Fotus sequens ventri inferiori & pudendo admoveatur.

℞. Rad. althææ, lilior. bryon. angelic. & aristol. utriusque an. ʒ. i. fol. Mercurial. artem. pulegii, fabinæ, calamen. an. M. i. Sem. lini & fœnugr. an. ʒ. i. flor. chamom. melii, sambuci, tanacetii, an. P. i. Contundantur & incidantur ut artis est: & imponantur duobus facculis, qui decoquantur in aqua fontis, & applicentur calidè per vices.

Post fotum inungantur dictæ partes oleo lilior. amygd. dulc. & sesamino, addito croco.

His autem addi possunt pessaria & suffumigia, in suppressione mensium proposita, à mitioribus incipiendo.

Per os exhibeatur decoctum rad. aperitivarum, cinnam. & cicerum rubrorum cum pauco croco. Vel

℞. Rad. aperitiv. an. ʒ. ii. fol. betonic. endiv. capill. ven. M. i. schœnanth. P. i. sem. anisi & fœnic. an. ʒ. i. cicerum rubr. cochl. i. Coquantur ad ℥. i. sem. Colaturæ adde aquæ cinnam. drach. ii. syrup. de ʒ. rad. ʒ. iii. Dentur ʒ. iv. bis in die.

Antequam febris augeatur, exhibere aliquando licet trochisc. de myrr. Drach. i. cum vino albo vel aqua fœnic.

Forellus etiam præfente febre, sequenti utitur decocto.

℞. Hordei mund. M. i. glycyrrh. ras. ʒ. sem. schœnanthi ʒ. i. sem. Coquantur ad ℥. i. pro iii. dosibus.

Debilibus verò schœnanthi ʒ. i. in jure pulli bulliri jubet, & exhibet.

Purgatio etiam convenire potest, septem vel novem diebus à partu, ex infusione rhab. agric. aut sennæ; vel cum jusculo laxante ex herbis, ac rad. aperientibus cum senna parato; vel cum mannæ ʒ. i. sam. in jusculo dissolutæ.

## CAPUT XXIII.

### De Torminibus à partu.

**T**Ormina puerperis adeò frequenter contingunt, ut paucissimæ ab iis immunes sint. Attamen horum dolorum ratione, Medicorum opem implorare non solent, quia intra biduum aut triduum cessant. Si quando tamen acerbiores sint, aut diutius perseverent; Medicos vocare coguntur, qui antequam remedia præscribant, eorum causas perlustrare valent.

Causæ igitur præcipuæ torminum & dolorum, qui à partu contingere solent, sunt sanguinis copia, crassities, acrimonia, & vasorum angustia. Cum enim venæ uteri per novem menses ab ordinaria sanguinis excretionem cessant, & ille intereà magnâ copiâ congestus fuerit, necnon diuturniori morâ crassitiem & acrimoniam adeptus; dum per angustas vias transit, dolores parit, qui per intervalla recurrunt; quoties uterus novam sanguinis excretionem molitur, eaque peractâ cessant, donec iterum alius sanguis egredi conetur.

Fiunt etiam interdum hujusmodi tormina à flatibus, aut frigore in utero suscepto: sed minùs frequenter.

Distinguuntur hi dolores ab aliis, qui ventrem infe-

stare solent, ex continuitate & intervallis, quæ excretionis sanguinis interpolatas sequuntur. Et ipsæ mulieres eos faciliè distinguunt.

Sanguis crassior in grumos faciliè concrevit: tenuior vero ex tenuitate, & colore vivido, aut subflavo cognoscitur.

Si à flatu oriatur dolor; ille magis vagus est, plures ventris partes occupat, neque sequitur excretionem sanguinis intervalla. Si aer frigidus in utero admixtus fuerit: ex iis, quæ circa ægram acta sunt, deprehendi poterit.

Periculosi non sunt hujusmodi dolores; sed plerumque maximè molesti. Ideò quamprimum tollendi, aut demulcendi saltem.

Curatio hujusmodi torminum eò dirigenda est, ut vasa uteri laxentur, sanguinis crassities attenuetur, acrimonia temperetur. Quæ omnia sequentibus præfidiis obtineri poterunt.

Ac primum puerperæ venter fasciâ leniter constringatur, ut uterus subsideat; neque huc illuc commoveri possit, ut à partu non raro propter subitam evacuationem solet contingere.

Deinde olei amygdal. dulc. recenter extracti ʒ. ii. aut iii. cum syrupi violacei ʒ. i. sem. vel vini hippocratici ʒ. ii. exhibeantur.

Clysteres injiciantur ex lacte cum saccharo & vitellis ovorum.

Vel parari possunt ex decocto flor. chamæm. & vitello ovorum.

Inungatur venter oleis carminantibus & aperientibus; ut oleo anethino, rutaceo, jasmino, vel sequenti magnæ efficacæ, quod ad hunc usum tempore idoneo componi debet & in officinis asservari.

℞. Rad. aristol. rot. iridis, pœoniæ, an. ʒ. i. cyperi ʒ. ʒ. folior. siccor. artemis. matricar. origani, calamenti, pulegii, dictamni cretici, absinth. fabinæ, rutæ, betonicæ, salviæ, an. M. i. flor. anthos, stœchados, lavendulæ, chamæm. anethi, hyperici, sambuci, an. M. ʒ. granor. lauri, & juniperi an. ʒ. ʒ. cumini, sem. rutæ, pœon. dauci, & agnicasti, an. ʒ. iii. caryophyll. nuc. moschat. cinnam. zinzib. an. ʒ. ii. styrac. & myrrhæ, an. ʒ. i. Omnia confusa & incisa misceantur, & macerentur in olei veteris ℥. vi. addendo vini albi parum. Et ponantur in vase fictili benè clauso, spatio unius hebdomadæ, & fiat bullitio supra cineres calidos, spatio quatuor, aut quinque horarum, & postea exprimatur oleum, ac recondatur ad usum. Si non habetur paratum urgente necessitate, bulliant simplicia dicta in æquis partibus olei & vini albi ad vini consumptionem, postea exprimatur oleum.

Fotus etiam fieri potest ex decocto artemisiæ, matricariæ, melissæ, fol. lauri, calament. Sem. dauci, cumini, carvi, flor. cheiri & chamomillæ, in aqua & vino albo, vel lacte parato. Vel sequens cataplasma admoveatur.

℞. Cepas in aqua benè coctas num. iii. vel iv. Contundantur in mortario, addendo sem. lini, & cumini contusor. an. M. i. flor. chamom. tantumdem, farinæ hordei q. s. ut fiat cataplasma. Et si opus sit, adde parum aquæ, in qua cepæ decoctæ fuerint. Extendatur super linteam, & umbilico calidè applicetur.

Utile etiam est, pelle vervecinâ ventrem munire cum adhuc calet, & recens detracta est: hujus enim calor, nostro affinis, doloris causam concoquit & mitificat: tum etiam impedit, ne cutis abdominis contrahatur in rugas.

Per os verò sequentia exhiberi possunt.

℞. Sem. dauci pulverat. ʒ. i. vini albi ʒ. iii. Misce, detur calidè bis in die.

℞. Nucis moschat. anisi, cinnam. an. ʒ. i. Misce, fiat pulvis, detur cum vino albo. Vel

℞. Nucleorum dactylorum & persicorum, an. ʒ. sem. nucis moschat. ʒ. iv. pulv. diamarg. calidi ʒ. ii. anisi ʒ. i. cinnam. ʒ. ii. croci ʒ. ʒ. sacchari ad pondus omnium. Fiat pulvis tenuissimus cujus dentur ʒ. ii. cum vino albo, bis aut ter in die, si urgeant dolores.

Forellus decoctum flor. chamom. in cerevisia, vel decoctum artemisiæ, & chamæm. in jure pulli propinavit felici successu.



Præstat mox a partu jus galli veteris tribus diebus summo manè, jejuno stomacho, porrigere cum modico cinnamomi & croci.

Sequens pulvis, statim post partum sumptus, à torminibus manè præservat. Ita, ut si primiparæ exhibeatur, sequentibus partibus nullo modo à dictis doloribus torqueri credatur.

℞. Rad. consolidæ major. exsiccatae ℥. i. nucl. persicor. nucis mosch. an. ʒ. ii. succini ʒ. β. ambræ griseæ ʒ. sem. fiat pulvis, de quo capiat ʒ. i. cum vino albo, & si febris adfuerit, cum jusclo.

Pro potu ordinario utatur ægra decocto rad. petros. aut artemisiæ, & cinnamomi.

Si à biliosis & acris humoribus tormina generentur, eodem ferè modo curantur, quo dolor colicus à bile. E. g.

℞. Syrupi violac. borrag. an. ʒ. i. mucil. de sem. cydoniorum, aquâ viol. extract. ʒ. sem. aquæ borrag. scorzonæræ, an. ʒ. iij. Misce, fiat julep. pro ii. dosibus. Vel

℞. Ol. amygdalar. dulc. ʒ. ii. syrup. viol. ʒ. i. aquæ borrag. ʒ. sem. Misce, pro uno haustu.

Externa quoque medicamenta vias laxantia & emollientia adhibeantur, quæ eâdem operâ dolorem sedant.

Enixas post partum sæpè dolor exercet in inguine, ex utero in illo conglobato. Curatur admovendo umbilico emplastra ex galbano & assa foetida, in cujus medio grana aliquot moschi ponantur.

## CAPUT XXIV.

### De morbis acutis puerperarum.

**Q**UOD suprâ de morbis acutis prægnantium diximus, id nunc de morbis acutis puerperarum possumus repetere: non aliam scilicet habere essentiam, aliamve diagnosis, ac dum non puerperas, ac etiam viros obsident. Ut hîc peculiarem eorum theoriam proponere non opus sit, quæ ex propriis capitibus facilè desumi poterit.

Illi autem morbi accuti ut plurimum sunt febres continuæ, tum essentielles, ut synochus putrida, tertiana, continua, & reliquæ: tum symptomaticæ, quæ inflammationes internas, ut pleuritidem, peripneumoniam, hepatidem, phrenitidem, & alias comitantur.

Est tamen peculiaris febris species, quæ omnibus propemodum puerperis contingit, *febre lactis* vulgò à mulieribus nominata, eaque circa tertium, aut quartum puerperii diem accidere solet, cum lac in mammis copiosius generari incipit; oriturque ex sanguinis ab utero ad mammas refluxu ejusdemque motu & agitatione. Quæ quidem febris inter ephemeræ plurium dierum recensetur, neque ullis indiget remediis, quia intra triduum vel quatrimum, nempe circa nonum diem sudore solvitur. Distinguitur à putridis, quod ferè circa quartum diem invadat, mammæ lacte repleri incipiant, & duritie, dolore, ac calore affici, cum dorsi & scapularum gravitate & calore, tum puerperia rectè fluunt, quod in putridis rarissimè contingit.

Febres autem putridæ puerperis supervenientes, à tribus causis oriuntur: nempe lochiorum suppressione, aut imminutione, pravorum humorum congerie gestationis tempore cumulata, ac in partu agitata, aut diætæ erroribus. Nonnulli addunt fluxum lochiorum immodicum, qui potius signum est latentis cacochymiae, febrem excitantis, illius verò causâ propria esse non potest.

In suppressione lochiorum sanguis, & vitiosi humores, qui per gestationis decursum cumulati sunt, ad venas majores regurgitant, ibique putrescunt, & interdum ad hepatis, lienem, aliasque partes feruntur, in iisque inflammationes concitant. Aut si in venis uteri morentur, putredinem concipiunt, atque ita febrem pariunt, etiam in iis foeminis, quæ antea inculpatâ valetudine frui videbantur.

Si verò ritè fluentibus lochiis febris oritur; illa vel ex bilioso humorum apparatu, vel ex diætæ erroribus provenit. Pravi humores, ex partus laboribus ac doloribus agitati, calorem & putredinem facilè concipiunt, febremque excitant. Diætæ errores variis modis contingere pos-

possunt. Ac primùm in victu, in quo puerperæ plurimum peccare solent, pluribus & copiosis ferculis sese ingurgitantes quæ sufficienter concoqui non possunt, & in corpore putredinem contrahunt. Alter error committitur, dum puerperæ frigido aëri sese imprudenter exponunt, præcipuè urgente febre ex lacte, quæ per sudores & diaphoresin solvi consuevit. A frigore autem ambiente incautè admissio diaphoresis impeditur: unde fit, ut febris illa, quæ per se salutaris erat & paucis diebus cessatura, in putridam periculosam mutetur.

Est & alia causa satis frequens febris puerperarum, cum videlicet secundinæ integræ non excluduntur; sed quædam illius portio intus remanet. Id potissimum contingit in hepate uterino, cujus portio interdum utero annexa relinquitur, eaque putrescit, unde lochia virescentia, male olentia & cadaverosa promanant: & nisi intra paucos dies ab utero separetur & excludatur; in maximum vitæ discrimen ægrotantem præcipitat, cum ipsi utero sphacelissimum inducere valeat.

Si sanguinis grumi, vel aliud quid præternaturale, post partum, in uteri cavitate remanserit, illud inde dignosci potest, quod cervix uteri mollis & aperta remaneat, nec internum illius orificium claudatur, neque sursum uterus retrahatur: cum, omnibus rite se habentibus post partum, uterus sursum trahatur, illiusque cervix atque orificium brevi tempore claudantur. Hujus rei experimentum proponitur ab Harvæo, tractatu de partu, de muliere, quæ febre maligna cum summa virium jactura laborans abortivit, & post exclusionem foetus integri atque incorrupti, prostratistamen viribus, cum pulsu vermiculante & sudoribus frigidis, moribunda videbatur. Ipse verò uterum explorans, ejus orificium laxum, molle, & patentissimum deprehendit, unâ cum malè olentibus lochiis: & digitis immisiss, molam, ovi anserini magnitudine foraminibusque aliquot (atram, viscidam & foetentem putrilaginem in se habentibus) præditam extrahit, statimque inde à prædictis symptomatibus liberata est, & brevi convaluit.

Contingit etiam in nonnullis, orificium uteri statim à partu adeò constringi, ut detentus intra uterum sanguis, subito grumescens & putrefactus, sævissima inducat symptomata. Cumque nullâ arte exitus ei parari possit, præsentaneam mortem inferat. Refert tamen Harvæus loco citato historiam mulieris à se curatæ, cum tali affectu laboraret. Pudendi labra tumida erant & fervida; orificium uteri durum & clausum. Ipse verò instrumento ferreo immisso per vim aliquantulum aperuit, ut injectionem per syphunculum admitteret: indeque grumescens, ater, foetidusque sanguis ad libras aliquot effluxit, cum præfenti ægræ levamine.

Prognosis harum febrium in eo tantum differt à prognosi similium febrium, quæ non puerperis contingant, quod ex laboribus partu vires sint magis dejectæ, & ex suppressione lochiorum major in venis humorum redundantia, & utrinque majus impendeat periculum.

Ad prognosin etiam facit, & crises imprimis prævidendas, celebris illa quæstio, an computatio dierum morbis debeat fieri à principio morbi, an à die partus. Cujus decisio paucis stabilienda est in hunc modum. Si partus fuerit naturalis, nullis symptomatibus gravibus committatus, & lochia optimè procedant, morbus verò post aliquot dies accedat, computatio non debet fieri à die partus, sed à die febris, quæ ab aliqua causa, eaque præternaturali, fuit concitata: nempe humoribus pravis intus latentibus, vel aliqua causa externa. Si verò partus fuerit difficilis & præternaturalis; febris verò post tres aut quatuor dies oriatur, computandum est à die partus: quia tunc cœpit totius corporis œconomia everti, humorumque perturbatio fieri, quam deinceps febris consequitur. Sic in gravibus vulneribus, capitis præsertim, licet febris non invadat, nisi post quartum, vel quintum diem; computatio tamen fieri solet à die accepti vulneris, quia tunc temporis humores commoveri cœperunt, & ad febrem disponi.

Curatio istarum febrium ab aliarum curationibus non differt, nisi circa magna remedia, venæ sectionem scilicet &



& purgationem, in quarum administratione non exigua est difficultas, quam tamen nos breviter diluere conabimur.

Quod ad venæ sectionem spectat, in acutis puerperarum affectibus celebrandam, tanta est Authorum dissensio, propter pugnantem invicem indicationes, ut vix duo reperiantur, qui in eandem omnino sententiam coeant. Nos eam, quæ ad sapientiorum mentem magis accedit, & in usu pratico feliciter succedit: omissis ambagibus, sequentibus theorematibus hic proponemus.

Morbus acutus puerperam aggreditur, vel in principio puerperii, vel in medio, vel in fine.

Si contingat in principio, & mulier copiosè purgetur; nulla alia tentanda est sanguinis evacuatio, quam quæ à natura rectè & convenienter operante dirigitur. Si verò lochiorum expurgatio supprimatur, aut minuatur; secuntur venæ inferiores & copiosè sanguis mittatur, quoniam tunc temporis copiosa esse debet, ex præscripto naturæ lochiorum evacuatio.

Si medio tempore morbus acutus superveniat, duo consideranda sunt. Unum, an materia morbifica in uno loco particulari contineatur & conculcetur; an sit per venas dispersa. Alterum, an mulier convenienti expurgetur mensurâ, vel non. Si morbus fiat à materia sparsa; ut in febribus, & mulier non perfectè purgetur, venæ inferiores aperiendæ sunt; quia & materia morbifica minuetur & naturalis fluxus provocabitur. Si verò mulier sufficienter expurgetur, morbusque invaleseat, nec evacuatio naturalis morbo satisfaciatur; venæ inferiores etiam aperiendæ sunt, tantumque detrahendū, ut ex duabus evacuationibus perficiatur, quod morbus exigit, ut docuit Gal. 9. *meth. c. 5.*

Si febris admodum intensa, magnumque incendium adfuerit, id fiat, quod in morbis à materia, in loco particulari conculcata & putrescente agendum esse, jam dicturi sumus.

In morbo acuto particulari, ut pleuritide, peripneumoniâ, anginâ, & similibus, advertendum est, an fluxio tantum fieri incipiat; ita ut morbus sit tantum imminens, vel incipiens, & perexigua sanguinis quantitas in parte collecta sit; Tum enim venæ inferiores aperiendæ sunt, ut revulsione factâ ab oppositâ distantissima præposterus ille humorum motus inhibeatur. Si verò jam bona ex parte fluxio facta sit; & inflammatio genita, eaque valdè urgeat sive mulier expurgetur sufficienter, sive non; statim venæ superiores aperiendæ sunt, è directo partis affectæ, quia talis exacuatio à parte affecta sanguinem educit. At si venæ inferiores aperiuntur, quæ nec proximæ sunt parti affectæ, nec ab ea evacuari possunt: & virtus ab evacuatione labefactabitur, & materia loco particulari conculcata non minuetur. Atque ita vel totum ferè sanguinem educes, ad revellendam materiam morbificam à parte affectâ, vel prius mulier à morbo perimetur quàm facta fuerit revulsio sufficiens. Neque metuendum est misso sanguine à venis superioribus, ne retrahatur sanguis ab utero, quia in illis casibus partes superiores sanguine abundant. Et quavis multus extrahatur, non ita inaniuntur venæ ut aliunde novum sanguinem attrahere cogantur. Ad majorem tamen cautelam non erit

inutile, antequam sanguis mittatur, frictiones celebrare in cruribus, & consequenter ligaturas dolorificas facere in medio ipforum, quæ detineatur, donec missus fuerit sanguis, & paulò post venæ sectionem solvantur, ac subinde cucurbitulas iisdem partibus applicare, vel saltem frictionem repetere. Hinc habere poterimus materiæ peccantis educationem, & naturalis fluxus conservationem.

Idem faciendum est in febribus ardentibus & vehementibus. Quia, licet materia sit sparsa, attamen incendium tantum est circa cor & viscera, ut minoris & longinquæ venæ apertione non ita extinguere possit, sicut proximæ & majoris, qualis est basilica.

Hæc curandi methodus non solum in puerperis, sed etiam in reliquis mulieribus, morbo acuto correptis, & menstruas provocationes patientibus, observari potest.

Si in fine puerperii morbus acutus inciderit; idem agendum est. ut in medio, iisdem conditionibus observatis: hoc animadverto, ut, quò magis distat mulier à principio, eò tutius venæ superiores aperiiri valeant, quò autem illa vicinior est, etiam medio tempore, id ipsum à majori cum præmeditatione exequamur. Et si morbus non instet, neque urgeat illius acuties, ac naturalis expurgatio copiosa fuerit, prorsus abstinemus. Si verò purgatio fuerit imminuta venas inferiores, ad supplementum debitæ quantitatis secabimus. Si tamen oppositum contigerit; servetur id, quod urgente acuto morbo agendum esse diximus.

Purgationis verò usus in puerperis, morbo acuto correptis, sequentibus concludetur theorematibus.

Dum lochia naturaliter profluunt, nunquam purgatio administranda est: periculum enim est, ne ab opere suo natura divertatur.

Si verò puerperia præ naturam se habeant, considerandum est, an quantitate peccent, vel qualitate.

Si quantitate peccaverint, eaque imminutâ, & mulier vel omnino nihil, vel insufficienter purgetur; postquam omnia remedia, promovendis hujusmodi purgamentis idonea, frustra usurpata sunt, & materia morbifica concocta apparet, transactis octo, decem, vel duodecim diebus à partu, secundum majorem vel minorem morbi urgentiam, leviori pharmaco purgatio institui poterit, à vehementioribus prorsus abstinendo.

Si lochia qualitate peccent, ita ut fluxio albida, vel alterius coloris non naturalis prodierit, coctâ existente materiâ ultimo puerperii tempore tuto purgatio administrabitur.

In genere autem hoc perpetuò observandum, quo longius puerpera distat à die partus, eò tutius medicamentum purgans posse administrari: & contrâ, Nam experientia docuit, mulieres purgamentorum suppressione laborantes, si post septimum, aut nonum diem alvi fluxu corripiantur, ad plurimum liberari. Si verò primis diebus, videlicet secundo, tertio, vel quarto diarrhoea acciderit, ut plurimum interire.

Atque ita (Deo sit laus & honor) affectuum mulierum curationes absolutæ sunt.

## P R A X E O S M E D I C A E

### L I B E R D E C I M U S - S E X T U S.

#### D E A F F E C T I O N I B U S A R T I C U L O R U M E T R H E U M A T I S M O.

#### P R A E F A T I O.

**L**ICET omnes Articulorum affectus ab iisdem causis dependeant, & ratione tantum loci affecti inter se differant; iisdemque remediis curari soleant; nonnulla tamen re-

Laz. Riverii Opera,

peritur differentia inter ischiadem, & aliorum articulorum dolores, ob partium ischii articulum componentium stru-

FFF

lis



lis remediis diversitatem obtinet: ideo seorsim de dolore ischiadico agere constituimus. Et quia Rheumatismus cum arthritide magnam habet affinitatem; illius ideo expositionem hoc in loco subnectere visum est. Atque adeo Liber iste tribus absolvetur capitibus, quorum primum erit de arthritide: secundum, de dolore ischiadico: tertium de Rheumatismo.

## CAPUT I.

## De Arthritide.

**A**rthritis est dolor articularum, ex intervallis ferè invadens, ab humorum influxu excitatus.

Partes dolore affectæ sunt, membranæ, tendines, nervi; omnesque partes nervosæ, articulis vicinæ, quæ ab humore in eas influente distenduntur, vel ab ejusdem acrimonia punguntur & vellicantur. Ligamenta verò ab ossibus oriunda sensus expertia sunt. Rarò autem cavitates influunt; nec nisi in affectus diutissimè perseverante, & ubi ampliores sunt cavitates, ut in dolore ischiadico diuturno, in quo nonnumquam os femoris excidit, laxatis ligamentis, aliisque partibus articulum connectentibus; & tunc articuli cavitas mucosâ pituitâ repletur, ut est apud Hipp. Aph. 50, sect. 6.

Quæritur hoc in loco: cur ab humoribus, in partes nervosas & membranosas influentibus, easque distendentibus aut vellicantibus, non fiat convulsio? Respondemus: partes, quæ in arthritide magis afficiuntur, esse membranosas, quæ cum motui nullo modo inserviant, convulsionem efficere non possunt, quantumvis distendantur, aut vellicantur. Licèt autem tendines & nervi, motui dicati, etiam dolore afficiantur, convulsionem tamen non pariunt, quia ut fiat convulsio, debent muscoli retrahi versus suum principium, & illa retractio debet fieri per contractionem nervorum, qui in eos inseruntur. Quando verò a musculis egressi sunt, aut ad extremitatem eorum pervenerunt, licèt distendantur, musculos contrahere non possunt.

Quatuor arthritidis differentiæ ab Authoribus vulgò constituuntur, ex diversis articulis affectis repetitæ: chiroagra, cum manum dolor occupat: ischias, cum coxendicem invadit: gonagra, cum genua: & podagra, cum pedes hujusmodi dolores afficiunt. Reliquorum verò articularum dolores generico arthritidis nomine donantur: licèt Paræus propria iis nomina imposuerit, à partibus affectis desumpta; dolorem in maxillæ articulis residentem syagonagram appellans; in cervice, trachelagram; in spina dorsi, rachysagram; in humero, homagram; in cubito, pechyagram. Sed istæ nomenclaturæ in usum medicum relatæ non fuerunt. Ideò sufficit, aliarum partium dolores ad commune & genericum arthritidis nomen referre.

Aliæ præterea dantur arthritidis differentiæ, quod alia sit generalis, omnes aut saltem plurimos corporis articulos occupans: alia particularis, uni tantum articulo inhærens: alia insita & congenita, à parentibus hæreditario jure contracta: alia adventitia, à causis externis & erroribus, in victu commissis inducta.

Humores autem, arthritidem efficientes, non solum in articulos, sed etiam interdum in alias partes, ut caput, dentes, latera: imò & partes internas, ut jecur & lienem, influere possunt, in iisque varios dolores excitare, qui tamen arthritici dicendi non sunt, quamvis à materia arthritidem efficiente generentur.

Omnes autem dolores, articulos occupantes, arthritidis nomen non merentur: sunt enim interdum tumores in articulis, præcipuè in genibus, à quibus etiam dolores excitantur, ab humoribus crassis, pituitosis, & melancholicis profecti & diutissimè perseverantes, qui ad dolores arthriticos non referuntur, sed diversam omnino naturam sortiuntur. Quæ diversitas ex peculiaribus arthritidis characteribus, in diagnosi describendis, clariùs innotescet.

Causa proxima & immediata arthritidis est humor serosus, suâ vel quantitate partes sensiles, articulos ambientes, distendens, vel acrimonia vellicans. Serosam esse illam materiam inde colligitur, quòd humores crassiores in articulos tam faciliè confluere non possint, & tumorem in articulis magis conspicuum efficerent, qui perexiguus esse

solet, imò verò in principio nullus apparet, licèt dolor acerbissimus excitetur. Adde; quòd ille tumor nunquam suppuretur, ceu aliis humoribus crassioribus sæpè contingit, si tantillum sanguinis secum admixtum habeant. In arthritide autem sanguis ad articulos attrahitur, qui ex inflammatione partis innotescit: nunquam tamen suppuratio contingit, propter feri prædominium, quod suppurationi resistit.

Illud autem serum rarò purum atque sincerum est; sed alios humores, aut ichores eorum, secum admixtos habet: unde diversitas insignis exoritur, pro majori vel minori humorum permixtorum acrimoniâ; quibus major vel minor dolor excitatur. Tumor aliquando est notabilis magnitudinis, aliquando vix apparet: color alius est rubicundus, aliis flavus, aliis albus: in quibusdam malum citò solvitur, in aliis longius protrahitur: interdum caliditas ingens & fervor partem affectam occupat, aliàs nulla aut perexigua apparet: quandoque calida admota profunt, aliàs verò nocent, & frigida conferunt. Negandum tamen non est, serum per se majorem vel minorem acrimoniam habere, prout magis vel minus salis secum admixtum habet. Cum enim serum salia heterogenea, quæ ex alimentis in corpore cumulantur, dissolvere, & in sese recipere soleat; (hinc omne serum falsum est,) prout major, vel minor salis copia in eo recipitur, & prout salia illa majorem vel minorem acrimoniam obtinent; major vel minor dolor excitari consuevit.

Quia verò in arthritide, quemadmodum in omni fluxione, quatuor considerantur; materia fluens, pars mandans, pars recipiens, & viæ, per quas fit fluxio: postquam materiam fluentem exposuimus, de reliquis est agendum.

De parte mandante est aliqua dissensio. Fernelius omnem arthritidis materiam, quam pituitosam, & tenuem esse vult, à capite defluere existimat. Non quidem à cerebro ipso, cujus excrementa vel per nares excernuntur, vel per palatum effluentia, ad os, fauces, asperam arteriam, aut ventriculum propelluntur; sed ab externis capitis partibus, & extra calvariam positis. Cum enim venæ quamplurimæ, ab externis jugularibus deductæ, eò excurrant, excrementa sua tenuia ac serosa ibi deponere asserit, & cum capitis cutis crassa densaque sit, & humores per eam faciliè non expirent, temporis progressu ibi cumulari, & per summa corporis sub cute ad articulos defluere existimat. Alii verò caput quidem fluxioni arthriticæ originem agnoscunt; sed à partibus illius interioribus, cerebro nimirum, effluere censent. Alii denique à visceribus, infimo ventre contentis, putà hepate, liene, utero, aliisque, tum etiam à toto corpore, humores illos noxios per venas & arterias in articulos defluere pronunciant. Quæ omnes sententiæ, meo quidem judicio, ex parte veræ sunt, & parte verò falsæ. Veras esse censemus in eo, quòd humores, arthritidem committentes, à capite per internas & externas partes, & à visceribus, totoque corpore, per venas & arterias defluere pronunciant. Falsas verò asserimus in eo quòd vel solas capitis partes externas vel internas tantum, vel sola viscera inferiora materiam arthritidis suppeditare voluerunt. Cum enim totum corpus conflatile sit, possunt omnes partes humores superfluos ad articulos transmittere, si illi eorum receptioni dispositi sint. Dispositio autem articularum, humoribus illis recipiendis idonea, (ut partis recipientis conditionem, hîc datâ occasione explicemus,) est eorundem imbecillitas, vel nativa, à parentibus jure hæreditario contracta, vel adscititia, à causis præternaturalibus, inferiùs exponendis, oriunda. Cum igitur certissimo theoremate ab omnibus Medicis receptissimo sancitum sit, partes robustiores excrementa sua deponere in debiliores: asserendum est, omnes partes prædictas superfluitates suas in articulos posse deponere, si illi imbecilliores facti sufficienter resistere nequeant. Et ut sigillatim opiniones prædictæ confutentur: Fernelius quidem satis perspicuè ostendere videtur, humorem extra calvariam collectum, per summa corporis, & sub cute in articulos defluere, cum interdum dolor in capite incipiat, inde ad cervicem, humeros, ac tandem in articulos excurrat. Sed nunquam



ab aliis locis, aliisque partibus humores in articulos deferri, nullo modo probet, neque ullus post ipsum probare poterit. Sic etiam qui à solo cerebro fluxiones huiusmodi fieri dicunt, contra sensum pugnare videntur. Cum enim partes articulos ambientes, venas & arterias recipiant, per quas sanguis nutritionis causâ ad eas transfertur, quidni etiam serofus humor, in maioribus vasis collectus, ad easdem partes, per easdem vias deferri poterit; Hoc docuit præcisè Gal. *comm. aph. 20. sect. 3.* Ubi docet in tuberculis & doloribus articulorum profundum corporis expurgari vitiosis humoribus à partibus principalibus ad ambitum corporis protrusis. Hoc etiam ostendit febris, quæ in arthritidis principio sæpe excitari solet; fit enim illa à serosa illuvie, in venis contentâ, & commotâ, atque ebulliente, quando natura ad illius exclusionem sese accingit, & cum foras omnino eam transmittere nequeat, ad partes ignobiliores & debiliores deponit. Tertia verò sententia, quam Sennertus defendit, à ratione etiam aliena est, & in eo peccat, quod numquam à cerebro fluxiones podagricas fieri contendat. Cum enim ad omnes alias partes, tum internas, tum externas, fluxiones à cerebro decumbant; quomodo articuli ab iis poterunt esse immunes; Et si humores, catarrhum efficientes, per venas & arterias defluunt non rarò, unde febres catarrhales passim oriuntur; humores verò, in venis & arteriis contenti, (ut ipse Sennertus asserit) ad articulos faciliè confluunt; demonstrativè concluditur, fluxionem fieri à cerebro in iuncturas. Illum prætereà humorum defluxum à cerebro per venas, ostendit copiosa urinarum profusio, quæ fit non rarò, cerebro ab insolatu, aut nimio frigore commoto. Tunc enim humores serosi, in cerebro collecti, agitantur à causis illis procatarrhicis, & ad venas arteriasque propelluntur per quas ad renes & vesicam confluunt, unde copiosa illa urina promanat.

Causa interna, proxima & immediata arthritidis sufficienter hætenus exposita: jam ad causas externas & procatarrhicas transeundum est, quas in tres classes, clarioris doctrinæ gratiâ, distribuere possumus. Prima est earum, quæ materiam generandæ arthritidi idoneam suppeditant. Secunda earum, quæ articulos debilitant & relaxant. Tertia denique earum, quæ humoris morbifici affluxum ad articulos promovent.

Ad primam classem referuntur, quæcunque crudorum ac serosorum humorum, omnisque cacoehymiae proventum adjuvare possunt, ut alimenta crassa, concoctu difficilia, ac valde excrementitia, crapula, & ebrietas frequens, Venus immoderata, unde arthritidis Bacchi & Veneris filia dicitur; otium, & vita sedentaria, ac consuetarum exercitationum intermissio, somnus longior, & vigiliæ intèpestivæ; evacuationum consuetarum, sive naturalium, sive artificialium intermissio; metus, tristitia, & sollicitudo diuturna.

Ad secundam classem referuntur labor & motus vehemens, Veneris usus frequens, illius præsertim quæ corpore erecto exercetur: articulorum refrigeratio & humectatio: balneatio frequens: articulorum contusio, luxatio, fractura.

Ad tertiam classem referuntur aër frigidus, humores exprimens, & calor, eosdem fundens ac liquans & exagitant, meatusque aperiens: cibi acres & falsi humores attenuantes: vinum tenue ac generosum, exercitium immodicum, Venus effrænata, ira vehemens, aliaque animi pathemata immoderata.

Signa diagnosticæ alia imminens, alia præsentem arthritidem significant.

Imminens signa sunt: sensus in articulis solito exquisitior, ut à levissima causâ lædantur: putà novi calcei compressione, ambulationem longâ vel levi aliquo ictu, aut ad lapidem aliudve corpus duriusculum illusione. Febris plerumque arthritidis invasionem antecedit, quæ fit à serosis humoribus, aliisque, in venis & arteriis contentis, commotis, & exagitatis, dum natura eos ad partes illas ignobiliores expellere nititur. Viciniorem verò arthritidis insultum, & quasi incipientem significant torpor & formicationis sensus in articulis, & quidam in iis fervor, præter consuetudinem invadens.

Laz. Riverii Opera.

Præsentem arthritidem significat dolor, jam actu articulum excrucians, quem plerumque tumor & rubor comitatur: si statim à principio non appareat, paulò post saltem excitatur. Pedis pollicem, & præcipuè sinistrum, dolor frequentius invadit & ad alios articulos non rarò postmodum exporrigitur. Febris ante dolorem apparens interdum perseverat: interdum non antecedit, sed cum dolore invadit.

Signa causarum etiam advertenda sunt. Licet enim humor, arthritidem efficiens, à prædominio serofus sit: aliorum tamen humorum cum sero permixtorum notitia necessaria est, ut iis remedia aptari valeant.

Ac primum bilem cum sero redundantem significant, dolor vehemens lancinans, tumor exiguus, color subrubeus aut subpallidus, calor magnus, & febris in statu perseverans, febris intensa, urina tenuis, flava, subrubra, auxilium à frigidis, læsio à calidis.

Pituitæ cum sero redundantis signa sunt, tumor partium affectarum subluxus, qui impressis digitis foveam relinquit: dolor minùs acerbus, urinae crassæ ac perturbatæ, læsio à frigidis, auxilium à calidis, calor ferè nullus, color albus, è naturali parùm recedens.

Melancholiæ redundantis signa sunt, color partis obscurus ad livorem tendens, dolor profundus, urina tenuis & aquosa, lassitudo totius corporis, ejusdemque temperamentum, ad melancholicum accedens.

Quod ad prognosin attinet: Arthritis periculosa non est; sed dolorum vehementiâ molestissima, & duratione contumacissima, ut totâ vitâ plerumque perseveret, ægroque ad senectutem comitari soleat, imò verò longævitatem nonnullis conciliet, ex eo, quod natura humores vitiosos, ex quibus alii morbi periculosiores generari poterant, ad articulos per certa intervalla propellit; sicque partes nobiliores à pravis humoribus liberat.

Contingit tamen non rarò in corporibus debilioribus, vel jam senio confectis, ut, quando natura humores noxios intus coacervatos expellere non valet morbi inde lethales mutantur: ut febres acutissimæ, viscerum inflammationes, apoplexiæ, convulsiones, phrenitides, orthopnoeæ, cordis palpitationes, alique gravissimi affectus.

Licet diathesis arthritica, visceribus penitissimè infixæ & nativæ articulorum imbecillitas radicatus extirpari nequeant, possunt tamen arthritidis insultus maximè retardari: ita ut nonnulli solâ vini abstinencia, alii purgationibus usualibus frequenter iteratis, per multos annos sese ab arthriticis doloribus servaverint.

Hippoc. 2. *Proorrhæi*, multos arthriticos sanari posse affirmat, eosque ab illis, qui sanari non possunt, distinguit his verbis. *De podagra hoc dico: quicumque, aut senes sunt, aut circa articulos callos omphaceos habent, aut ærumnose vivunt, siccam alvum habentes: hi omnes sani fieri non possunt humanâ arte quantum ego novi. Sanat quidem hos optime dysenteria, si supervenerit; sed & aliæ eliquidationes valde profunt, quæ ad infernos locos repunt. Qui verò juvenis est, & circa articulos nondum callos habet concretos, & accuratè vivit, & laboris amans est, & alvum bonam habet ad obediendum, pro studiorum ratione: hic sanè Medicum intelligentem nactus sanari poterit.*

Insanabili etiam arthritidi meritò ea annumerari decet, quæ hæreditaria est.

Si podagricis varices supervenerint, solvitur podagra, ex Avicenna; quia humores ad articulos fluere consueti, ad exteriores cutis partes derivantur.

Si arthritis suas periodos servare consueta non revertatur; gravissimos & sæpè lethales morbos portendit, nisi materia morbifica diligenti prophylaxi sublata fuerit. Si enim ob debilitatem naturæ materia intus cummulata non expellatur, maximos morbos & periculosissimos producit.

*Quibuscunque morbi podagrici sunt, ii sedatâ 40. diebus inflammatione finiuntur.* Hippocr. *Aphor. 49. lib. 6.* In partibus enim exiguo calore præditis, materia morbifica non nisi longo tempore discuti potest. Certa tamen & perpetua non est illa periodus ad Hipp. proposita: nonnulli enim citius, alii tardius sanantur; quod dependet ex



materiæ morbificæ quantitate, crassitie, vel contumaciâ, partium affectarum robore aut imbecillitate, & ægrorum obsequio, in victus ac remediorum administratione.

Omnis arthritidis curatio in eo consistit, ut humoris ad articulos influxus inhibeatur; qui jam influxit, & articulis inhæret, submoveatur, & dolor interim, si acerbus fuerit, leniatur. Quæ omnia sequentibus remediis præstari poterunt.

Ac primum sanguinis detractio erit convenientissima, si illius penuria non adsit, & humor pituitosus non abundet; quia ab humoris in articulos fluentis motu sanguis exagitur, & quasi ebullit, & à dolore in partem affectam attrahitur: illius ideo revulsio necessaria est, quæ fit ex opposito partis affectæ: atque ideo, si brachium dextrum afficiatur, in sinistro vena secanda; si dexter pes laboret, vena dextri brachii aperienda. Idem quoque de brachio & pede sinistro dicendum. Est autem sanguis detrahendus statim ab ipso morbi initio, & quantum opus est, si vires ferant, unicâ vice detrahendum. Sin minùs, iteratis vicibus, donec plenitudini sit satisfactum.

Hoc præ oculis semper habendum est copiam sanguinis detractionem in iis qui illam faciliè ferre possunt, morbum maximè abbreviare; si statim ab initio celebretur, aut partitis saltem vicibus.

Purgatio etiam quamprimum, & in ipso paroxysmi initio instituenda est: sic enim fluens & fluxurus humor ab articulo viis avocatur, & ad intestina attrahitur. In ista autem purgatione duo notatu digna observanda sunt, à Solenandro, practico insigni, pluries annotata.

Primum est, ut purgatio illa fiat non blandiori aliquo & leniente medicamento, quo humores magis commoventur quàm evacuantur, & in articulos præcipitantur; unde dolor & tumor acerbior iis sæpè solet succedere; sed aliquo ex fortioribus, quod humorem commotum evacuet, & ab articulis avertat. Alterum est, ut exhibito medicamento, artus supra genua & cubitos obvolvantur aliquo defensivo, quo humor fluens, si quis assumpto medicamento commotus est, intercipitur, ut minùs, minoreque impetu in articulos decumbat.

In eum usum ex bolo, muli corio, balauistiis, radicibus bistortæ, vel tormentillæ, rosæ, cum albumine ovi & aceto conficit unguentum, idque inductum fasciis palmum latis & mediocriter longis, supra dictis locis obvolvitur. Si nec ista ad manus sunt; simplici poscâ tinctas circumdat, atque quod minimum est, diem totum relinquit. Ubi autem fluxio est vehemens; fasciæ inducit linimentum ex bolo, sanguine draconis, albumine ovi & oleo rosæ. omphacino; vel priùs sine oleo compositum, cui, ne siccatum & induratum dolores excitet, parum olei prædicti, aut unguenti Comitissæ addendum erit.

Ad hanc autem purgationem exequendam, præscribetur à perito Medico medicamentum, ægrotantis naturæ, & humoribus in toto corpore redundantibus accommodatum, vel aliquod ex specificis purgantibus, quæ in præseruatione proponuntur.

Evacuatio, quæ fit per vomitum, hîc etiam utilis est, in iis, qui faciliè vomunt: qui breviori via humores evacuat, atque adeò non ita metus est, ut ad partem affectam ruant. Blanda autem vomitoria exhibenda sunt, quæ tantum partes ventriculo vicinas evacuant. Si enim vehementia sint, & à venis attrahant humores, eosdem ad articulos præcipitare poterunt. Tum post vomitiones purgatio per inferiora etiam molienda est: imò si unica non sufficiat, erit iteranda.

Post sufficientem purgationem, sudorum provocatio maximè conferre poterit. Sic enim serosa materia per habitum corporis discutietur. Verùm, cum in arthritidis invasione fiat quasi quædam ebullitio, & plerumque febris adsit; calida sudorifica non convenient, sed tantum temperata, ex quibus commendat Sennertus cornu cervi vel crudum, vel sine unctione præparatum, aut solum, aut cum aqua cardui benedicti. Tum etiam antimonium diaphoreticum. In affectu diuturno & absente febre, decoctum chinæ, salsæparillæ, aut sassafras potest exhiberi, & herbis refrigerantibus, ut cichorio, endiviâ, acetosâ, borragine,

alterari. Vel solummodò post deterfum sudorem, juscum pulli, prædictis alteratum, assumatur.

Martinus Rulandus sequenti sudorifico usus est feliciter.

℞. Summit. centaur. min. M. ii. rad. asari ʒ. ii. Bulliant in aquæ ℞. x. ad medias, & colentur. Capiat ʒ. viii. calidè manè, per aliquot dies, & sudet.

Forestus verò laudat decoctum radices bordanæ seu lappæ majoris, quò indicat, discutiat, sudores & urinas moveat. Refertque quemdam arthriticum, in lecto decumbentem ut nullum membrum movere posset, bibisse cerevisiam calidam, in qua radix lappæ majoris cocta erat; quâ epotâ, cum nullis remediis à Medicis curari posset, plurima minxit alba, instar lactis, & à doloribus liberatus fuit.

Hercules Saxonia panis, recenter è furno extracti, decem aut duodecim ordines, secundum omnem corporis circumferentiam admovet, quibus sudor copiosè provocatur, & dolores auferuntur.

Convenit etiam non parum stupha humida ex decocto ebuli lauri, salviæ, rorismarini, & similibus, cum vino albo parata, ut illius decocti fumum recipiat æger in doliolo, unde copiosus sudor excitatur.

Aquæ etiam thermales balneo sudores provocant, & materiam, in articulis contentam, promptè discutunt. Ideò, cum ægri eas adire nequeant, aqua earum transferri solet, & in lebetæ calefieri pro balneo. Eraustus *conf. 15.* hoc reliquis præfert ad mitigandos dolores, sed in qua tantum salis incoquit, ut gustus clarè salsedinem percipiat.

In principio fluxionis, temporibus vacationum intermediis, quæ eam sistant, exhibenda sunt: qualia sunt quæ in calidi catarrhi curatione proposita sunt: præcipuè verò julepi ex aquis vel decoctis & syrupis refrigerantibus & incalescentibus.

Imò verò interdum necessitate urgente narcotica exhibenda sunt, nam & fluxionem sistunt, & dolorem atrocem mitigant. Ex his theriaca recens erit opportunissima, & sæpè iterari poterit sine periculo ad ʒ. ʒ. vel ʒ. i. Cui utiliter ad fluxionem cohibendam, tantillum boli admisceri poterit. Hujus tamen loco laudanum opiatum, aliaque narcotica substituere non erit inconveniens.

Post debitas evacuationes celebratas, aliaque interna exhibita, quæ causam antecedentem respiciunt, ad topica deveniendum est, quæ dolorem demulcent, & causam conjunctam discutunt. Quæ statim usurpanda non sunt, antequam universalia prædicta præmissa fuerint, alioqui plus damni, quàm commodi afferre solent. Vel enim materia, quam natura ad articulos expellere conatur, ad interiora repellitur, unde gravia symptomata excitantur, vel articulis impingitur, dolorque exasperatur, vel pars effœminatur laxaturque, atque ita fluxus augetur.

Quæ cum vulgò non observentur, & topica non satis tempestivè & cautè adhibeantur, plus plerumque damni, quam utilitatis inde ægri percipiunt. Topica autem ista vel dolorem solum respiciunt, vel causam simul doloris humorem scilicet qui affluxit, doloremque & tumorem excitat.

Dolorem lenientia hîc maximè necessaria sunt, quia symptoma gravissimum vires dejicit, & humores ad partes affectas attrahi. Præterea usu anodynorum partes relaxantur; & humor, qui antea ad profundiores circa articulum partes fluebat, ad exteriores & ambientes diffunditur. Unde arthritici dolores, antequam pars intumescat, sunt vehementissimi: mitigantur verò, ubi pars intumescit. Anodyna autem medicamenta, partibus arthritide laborantibus admovenda, plurima proponuntur ab Authoribus. Præcipua verò sunt, quæ sequuntur.

Lac tepens parti dolenti admotum, cum pannis lineis in eo intinctis, dolorem demulcet; tum etiam si pars eo irroretur, præcipuè cum primum ex mamma detrahatur, quòd maximè commendat Amatus Lusitanus *curat. 4. 1. cent. 6.* his verbis: *Qui podagra ingentes dolores patiebatur, capram intra cubiculū suū adducere, & ex ea lac supra membrum dolens, & malè affectum emulgere curabat: quo dolores evidenter imminui sentiebat. Nec quidem injuriâ. Nam lac sic recens emulsum, dolores demulcet, & mitigat, ac remittit. Est*

autem



*autem remedium Turcarum Principibus commune, & familiare satis, à te qui lucrum, & honores petis, in pretio habendum.*

Ex eodem lacte paratur cataplasma de mica panis, quæ in eo incoquitur, addendo vitellos ovorum, & tantillum croci.

Folia etiam hyoscyami, aut violariæ, in lacte vel poscâ decoquuntur, & parti utiliter admoventur.

Paratur etiam cataplasma ex pulpa rad. althææ, cum lacte permixtâ.

Ex pulpa cassiæ fit etiam cataplasma, vel solâ, vel cum lacte, aut oleo rosaceo, aut sequentibus permixtâ.

℞. Medullæ panis albi in lacte decoctæ ℥. ss. medullæ cassiæ ʒ. iii. Fiat cataplasma. Vel

℞. Medullæ cassiæ ʒ. iv. theriacæ recentis ʒ. ss. farinæ hordei & avenæ, an. ʒ. iii. micæ panis albi ʒ. iv. lactis vaccini ℥. ii. vel iii. Coquantur omnia in formam cataplasmat, quod applicetur calidè partibus dolentibus. Si addideris vitrioli calcinati, & subtilissimè pulverati ʒ. ss. vel ʒ. i. multò præstantius efficies.

In principio arthritidis, quæ pedis pollicem tantum adoritur, sequens admoventum erit.

℞. Album ovor. num. ii. salis triti parum, aceti ros. gutt. aliquot. Excipiantur stupis, & applicentur.

Alia etiam sunt cataplasmata summæ efficacix, in hunc modum composita.

℞. Aquarum verbasci albi & filicis totius an. ℥. ss. vitrioli calcinati subtilissimè pulverati ʒ. i. ss. farinæ ʒ. iv. croci ʒ. ii. Fiat cataplasma.

℞. Malvæ cum radicibus quantum vis. Coque in fictili novo, cum æquis vini & aceti partibus, ad tertiæ partis consumptionem: deinde adde furfuris secalis crassioris q. s. ad conficiendum cataplasma. Quod bene subactum, & panno lineo inductum applicetur partibus dolentibus calidum, quantum ferri potest. Hoc maximè commendat Solenander.

Refert Forestus, miraculo sum esse cataplasma, compositum ex lenticula aquatica, & floribus chamæm. in lacte coctis, addendo farinæ hordei parum.

Montagnana in acerbissimis doloribus sequens præstantissimum esse affirmat.

℞. Vitell. ovor. num. x. Conquassentur in frixorio, cum ℥. ss. olei rosacei. Coquantur leviter ad inspissationem, addendo croci ʒ. ii. & calidum applicetur.

Admoventur à plerisque in principio fluxionis cataplasma ex sale & fuligine, cum albuminibus ovorum subactis.

Vel ex flor. chamæm. ʒ. ii. rosar. rubr. ʒ. i. ss. flor. verbasci ʒ. ss. Pulverisentur & coquantur in lacte dulci ad cataplasmat, addendo vitell. ovor. num. iii. vel iv.

Vel ex farinæ hordei, & fabarum, an. M. i. flor. chamæm. & ros. an. M. ss. aquæ verbasci, fol. salicis, an. q. s. vel aquæ plantag. & vini, an. q. s. Incorporentur omnia simul in formam cataplasmat.

Fomenta etiam, partibus dolentibus admovenda, varia componi possunt in hunc modum.

℞. Fol. verbasci ℥. vi. vini rubri ℥. ii. Trita macerentur per aliquot dies. Destilletur aqua, quâ foveantur partes dolentes tepidè, cum linteis eâ imbutis. Vel

℞. Flor. verbasci q. s. Iis ampulla vitrea impletur; & orificio obturato Soli exponatur: sic enim in liquorem diffluunt, qui linteo parti affectæ impositus dolorem lenit.

Sal Saturni in spiritu vini tenuissimo dissolutum mirè dolores sedat.

Aqua spermatis ranarum mense Majo destillata, partibus dolentibus imposita, mirè dolores lenit, & partis inflammationem ac ruborem temperat. Cum illa etiam sequentia utiliter admisceri poterunt.

℞. Aquæ spermatis ranarum, tapsi barbati, & filicis, an. ℥. i. ss. In quibus infunde tuthiæ, litargyri, an. ʒ. i. vitrioli calcinati, aluminis, an. ʒ. i. Foveantur partes dolentes tepidè.

Acetum ex infusione litargyri paratum, & nonnihil evaporatum, ut omninò dulcescat, admodum prodest arthritidi calidæ,

Oleum ex pedibus vituli extractum, ad dolores arthriticos sedandos præstantissimum est, & hoc modo elicitur.

Pedes vituli contundantur, & ossa confringantur. Deinde coquantur ad putrilaginem. Oleum aquæ supernatans misce cum aqua vitæ & sale, iisque partes dolore affectæ illinantur.

Olea & pinguedines à plurimis etiam usurpantur. Sed cum inflammatio quæ in membris, arthritide laborantibus, contingit, ad erysipelatis naturam ut plurimum accedat; pinguis illa plus nocere, quàm prodesse non rarò possunt cum poros obstruendo humorem noxium intus retineant & ita dolorem augeant.

Quemadmodum refert Sennertus, virum quendam arthriticum, summo cum fructu uti solitum ad dolores sedandos; caseo ovillo planè recenti imposito, verum sæpè renovato. Quamprimum enim a calore partis calefactus pinguescere, & quasi butyrum fundere caseus incipiebat, dolor intendebatur. In quibusdam tamen corporibus oleum rosaceum, & similia convenire poterunt, saltem cum aliis medicamentis permixta: quandoquidem pro variis hominum naturis varia conferre solent. Ideo ingens remediorum numerus habendus est, ut passim immutari valeant: quia vix ullum inveniri potest adeò efficax, ut omnibus æquè profit. Exempli loco sequentia habeantur.

℞. Medullæ pannis albiss. ℥. ss. Coque in lacte recenti ad pultis consistentiam. Deinde adde mucilaginis sem. althææ ʒ. ii. farinæ seminis lini, fœnugr. an. drach. ii. pulv. flor. chamæm. meliloti, an. ʒ. i. croci drach. i. ros. unc. i. Misce, fiat cataplasma.

Vel cataplasmati de mica panis suprâ descripto oleum rosac. admisceri poterit.

Linimenta & unguenta etiam parari solent ad dolorem demulcendum.

℞. Vitell. ovor. num. ii. vel iii. dissolvantur cum oleo rosac. vel violac. vel vino, & tepidè applicentur.

Balsamum Saturni cum ol. violato, vel rosar. paratum, dolorem sedat efficacissimè.

℞. Cerussæ ʒ. ii. Dissolve in aqua endiviæ, & modico aceti. Fiat liquidum unguentum.

Ex eadem cerussa fit emplastrum magnæ efficacix, quod ab initio morbi admoventi potest, etiam tumore atque inflammatione præsentè: ejusque compositio talis est.

℞. Ol. commun. ℥. i. vini ℥. i. ss. Bulliant ad mediam vini consumptionem. Deinde adde cerussæ subtilissimè pulveratæ ℥. i. camphoræ ʒ. ii. Coquantur ad emplastri consistentiam. Ubi magna est inflammatio, loco vini acetum est reponendum. Extendatur emplastrum super lintea, ut commodiùs partes obvolvantur.

Catellus vivus, parti laboranti admotus: dolorem valè de demulcet.

Dolore admodum sæviente, ad narcotica licet confugere: quamvis ea diù parte retinenda non sunt; cum calido nativo & nervis sint inimica.

℞. Fol. hyoscyami M. ii. solani, sempervivi, an. M. i. caput papaveris hortensis P. i. rad. mandragoræ ʒ. i. florum chamæm. violar. an. P. i. Fiat decoctio in aqua vel lacte, quâ foveatur locus.

Residentia pistetur, addendo farinæ sem. lini ʒ. ss. farinæ tritici ʒ. ii. ol. chamæm. ʒ. iii. Fiat cataplasma. Vel

℞. Spiritus Vini, per croci infusionem flavescens unc. iv. camphoræ ʒ. i. Bulliant parum. Deindè dissolve opii drach. i. Eoque liquore pars dolens illinatur. Tutum & efficacissimum est remedium.

Folia nicotianæ recentia, contusa, & admota, dolorem arthriticum sedant; & vim quandam narcoticam obtinere dicuntur.

Causam verò dolorem efficientem quod attinet: fluenti in partem debentur repellentia; fluxa verò derivantia & resolventia.

Attamen repellentia hic improbantur; saltem sola, & sine aliorum permixtione adhibita. Nam si humorum in partem influxum omninò impediunt, metus est, ne illi ad partes internas retrocedentes periculosos affectus inducant nisi ad aliquem alium articulum transferantur. Adde quòd



humor jam influxus ad partem intimiùs impingatur, unde dolores acerbiores excitantur. Attamen, si maximus in principio fiat humorum, præcipuè calidorum, affluxus, ex quo doloris acerbitas metuenda sit; cum quadantenùs reprimere conveniet, admotis repellentibus: non solis, sed cum anodynis permixtis, post universales & sufficientes evacuationes. Tunc enim nimis laxantia humorum affluxum promovent. Itaque prædictis cataplasmatibus, aliisque remediis, plantaginem, lactucam, portulacam, sempervivum & similia addere licebit, ut & aceti tantillum. Exempli gratia.

℞. Farinæ hordei ℥. iii. Coque in oxycrato, adde vitellos ovor. num. ii. croci ʒ. i. Fiat cataplasma. Vel

℞. Ros. rubr. M. i. fabar. hord. & fœnugr. an. ʒ. i. fantali rubr. ʒ. i. β. chamom. P. i. Coctis & contusis addantur vitell. ovorum num. ii. aceti ʒ. iv. ol. rosacei q. s. Fiat cataplasma.

Inter derivantia remedia locum habent hirudines, parti dolenti admotæ, post sufficienter evacuatum corpus, tunc enim valdè profunt, præsertim, cum venæ in parte affecta distentæ, & sanguine turgidæ apparent.

Resolventia verò medicamenta sub variis formis usurpari solent: aquæ nimirum, olei, unguenti, balsami, fomenti, suffitus, cataplasmatibus, emplastris, & similibus, in sequentem modum composita.

℞. Vitrioli albi, & viridis, an. ʒ. i. camphotæ ʒ. ii. aquæ vitæ & vini albi, an. ℥. i. Misceantur, atque cum intindis pannis applicentur.

In urina calx viva extinguitur, & cum ea per residentiam aut colaturam depurata, locus dolens foveatur. Idem ex calce & aceto factum probatur.

Martinus Rulandus in centuriis suarum curationum: aquam suam antipodagricam mirè prædicat, cujus descriptionem nunquam proposuit. Eam autem ita se habere existimant Libavius, Petrus, aliique.

℞. Aquæ fontis ℥. i. aquæ fortis ʒ. β. sublimati ʒ. i. Bulliant per horæ quadrantem. Hoc liquore panni linei madefacti partibus dolentibus tepidè applicentur.

Quercetanus in Pharmacopœa sequentes proponit.

℞. Muriæ, salis, & urinæ pueri, ana partes æquales. Destillantur, aquâ foveantur partes cum linteis, sæpè renovandis.

℞. Folior. & flor. sambuci viridum, an. ℥. i. Contundantur & macerentur in aqua vitæ, idque per duos dies vel tres. Destillantur per vas vitreum vel cupreum, ad siccitatem.

℞. Spiritus vini rectificati ℥. ii. mellis purissimi ℥. i. Destillantur in balneo vaporoso. Sic duos destillabis liquores. Primus est aqueus. Secundus multò fortior, & sulphureus quem seorsim reserva. Magmati sive remanentiæ adde croci orientalis integri ʒ. i. sem. terebinthinæ Venetæ ʒ. ii. castorei ʒ. vi. tartari ad albedinem calcinati ℥. sem. salis fusi Unc. i. phlegmatis vitrioli à suo spiritu non separati ʒ. iv. lixivii sarmentorum ℥. ii. Macerentur per xxiv. horas. Deinde destillantur ad siccitatem. Liquor, qui inde emanabit, servetur etiam seorsim. Fæcibus remanentibus affunde priorem aquam reservatam. Macerentur & destillantur. Tandem omnes liquores destillatos misce, & denuò per balneum vaporosum destilla. Hanc dicit Quercetanus esse miræ facultatis, & sibi communicatam à quodam Germano celeberrimo, tanquam singulare donum, affirmante hanc esse ipsam aquam Martini Rulandi. Sequæ eximios illius effectus vidisse testatur in sedandis arthriticis doloribus, si linteola in eadem mediocriter calefacta & demersa membro dolenti applicentur.

Idem Quercetanus in consilio de arthritide, gloriatur se sibi reservare aquam suam antipodagricam, tanquam veterano militi aliquid athletici artificii. Quam dicit fieri ex aqua fontana simplici, in qua iteratè & aliquoties extinguit quædam metalla, cui addit duas substantias metallicas, quæ vel per os ritè præparatæ dari solent: quarum spiritus impressi in aqua prædicta, vim ei tribuunt penetrandi ad radices usque morbi, atque verè resolvendi & attenuandi materias tartareas, gypseas, atque sales in juncturis concretos, à quibus tam intolerandi dolores excitantur.

Huic fortè non absimilis, nec inferior est, quæ sequitur.

℞. Calcis vivæ ℥. iv. Extinguatur in aquæ fluvialis s. q. & relinquatur in cella vinaria, trium dierum spatio, ut melius sal extrahatur ex calce. Postea parùm bulliant, & colentur per manicam Hippocratis. In colat. ℥. xx. extingue septies, aut novies, primò laminas chalybis ignitas; secundò laminas cupri ardentes; tertio vitriolum ad albedinem calcinatum ad ʒ. x. quartò antimonium liquefactum in crucibulo ℥. β. quinto lithargyri vel cerussæ in crucibulo calefactæ ℥. β. mercurii præcipitati albi, unica lotionem loti ʒ. i. β. aeris usti subtiliter triti ʒ. β. Post extinctionem horum mineralium, aqua superseadeat in cella vinaria decem dierum spatio. Postea parùm bulliat, & coletur per manicam Hipp. Hac aqua calente linteæ duplicata imbuantur, & applicentur frequenter.

Inter foci paratu faciles commendatur ille, qui fit ex sale ammoniaco septies sublimato, & in vino aut aqua rite dissoluto. Vel ex urina juvenis bene sani usque ad medietatem cocta, & cum linteis admota.

Scribit Solenander *conf. 24. sect. 4.* quemdam senem podagricum sibi hoc modo facere medicinam solitum. Cum tumor & dolor magnus, locusque rubeus erat; accipiebat salem, cinerem, urinam pueri, & acetum. His commixtis madefactum & expressum pannum laneum album, applicabat aliquoties, sicque dolor magna ex parte sedabatur.

Quemadmodum antea diximus, olea anodyna in arthritide parùm convenire, idem de oleis solventibus hic dicendum est, qui poros cutis occludunt, sicque liberam transpirationem impediunt, & calorem augment, sicque propter viscidam suam substantiam ad intimas articulorum partes penetrare possunt, ut humores salios, acres, & tartareos in iis latitantes temperent ac resolvant. Attamen si prædicta olea per retortam destillantur, huic usui maximè idonea, utpote valdè penetrantia, ac minimè viscida efficiuntur. Ex illis præstantissima sunt oleum cheirinum, hyperici, & de vitellis ovorum, quæ simul mixta, & per retortam destillata, dolori sedando, ejusque causæ discutientiæ utilissima sunt.

Oleum etiam scorpionum Matthioli, modo prædicto destillatum, præstantissimum est.

Oleum ceræ ad idem etiam est efficax.

At cæteris omnibus præfertur, & non solum à Chymiatris, sed etiam à Doctoribus dogmaticis, ut Cratone, Platone, aliisque laudatur oleum ex ossibus humanis, eodem modo paratum, quo oleum de lateribus conficitur: nimirum ossa humana non humata, confracta, & ignita in oleum vetus injiciuntur. Postea verò oleo imbibita contundantur, & in retortam conijciuntur, sicque vi ignis extrahitur oleum.

In ossium humanorum defectu, aliorum animalium ossa subrogari poterunt.

Sequens etiam erit valde utile.

℞. Mastiches, thuris, myrrhæ, ammoniaci, opoponacis, bdellii, mumizæ, an. ʒ. ii. vitriol. ℥. ii. mellis ℥. ii. tartari unc. i. sem. spiritus vini ℥. iv. Destilletur oleum, ex quo penna illinatur pars dolens.

Ad dolorem sedandum & materiam arthritidis resolvendam, laudatur etiam liquor limacum, in hunc modum compositus.

In manicam Hippocratis conjice limacum integrorum M. i. Tum super illos injice salis communis M. i. super sale seminis ebuli subtilissimè triti M. i. sic vicissim, limaces, salem, semen, donec omnium sigillatim quatuor vel quinque strata confeceris. Manica dependeat in cella vinaria humida. Et post paucos dies destillabit ex ea liquor lubricus & pinguis, quem soli exponito per quatrimum, & locum affectum eo illinito.

Unguentum resolvens in hunc modum componi poterit.

℞. Chamæpit. absinthii vulgaris & summit. roris. an. M. i. flor. chamom. meliloti, rosar. an. P. i. ol. & vini an. ℥. sem. bulliant ad vini consumpt. Expressioni adde ceræ q. s. ad unguenti consistentiam. Inungatur calidè pars affecta. Intra 24. horas pars intumescit; & dolor cessat.

Catapla-



Cataplasmata item resolventia, & dolorem sedantia varia confici possunt. Præcipua verò sunt hæc.

℥. Furfuris tritici ℥. i. solis 3. i. sapæ q. f. Decoquantur ad formam cataplasmati. Vel

℥. Farinæ fabar. ℥. sem. Decoquantur in vino, q. f. addendo aquæ vitæ & butyri parum. Fiat cataplasma. Vel Ebuli folia tenera, aut sambuci contusa, applicentur, vel cum butyro frixa in sartagine, in formam placentæ.

Radix bryoniæ, contusa cum aqua vitæ, est etiam valdè efficax.

A nonnullis etiam commendatur radix aronis, cum ftercore vaccæ permixta.

Sequens verò à Solenandro laudatur, quod sine insigni calefactione resolvit, dolorem sedat, & articulos roborat. Potestque tutò post paroxysmi principium, circa quantum morbi diem applicari.

℥. Pulv. ros. rubr. 3. ii. mastiches 3. i. camphoræ 3. 8. farinæ hordei ℥. 8. Coquantur in vino albo continuè agitando, donec inspissetur, & calidum applicetur.

Emplastrum demùm magno usui esse solent. Præcipua verò sunt hæc.

℥. Thuris, mumiz, colophoniz, an. Unc. i. mastiches, myrrhæ, coralli albi, an. Unc. 8. axungiz humanæ 3. vi. gummi ammon. & bdellii aceto solut. an. 3. iii. terebinth. Unc. 8. olei vulpini & rosac. an. q. f. Fiat emplastrum.

℥. Rad. ireos Florent. & hermodactylorum pulverat. an. 3. vi. emplastri oxycrocei, & de mucilag. an. Unc. ii. resinæ pini 3. i. Malaxentur simul, addendo ol. lumbric. q. f. Fiat massa emplastri.

Emplastrum diapalma seu diachalciteos maximo in usu est, vel solum, vel additâ camphorâ, in hunc modum.

℥. Massæ emplastri diapalmæ ℥. sem. camphoræ, 3. ii. Misceantur simul, & applicentur partibus affectis. Vel in formam sparadrap.

℥. Massæ emplastri diachalcit. ℥. 8. de sulphure. 3. i. styrac. calamit. & benjoini, an. 3. sem. gumm. tacam. Unc. ii. olei hyperici & lumbric. an. Unc. i. styracis liquid. Unc. i. sem. ceræ novæ q. f. Liquefactis omnibus simul immergatur tela bis aut ter, quæ polita & siccata servetur ad usum.

At verò idem emplastrum cum sequentibus permixtum, inter excellentissima remedia arthritica censerì debet.

℥. Emplastri diachalc. vino rubro austero soluti, & ad vini consumptionem cocti ℥. i. myrtill. ros. rubr. mastiches, tartari vini rubri pulverat. an. 3. ii. chamæp. & chamæm. odorati veri pulverat. 3. ii. Fiat emplastrum, applicandum, ubi tumor valdè imminutus fuerit.

Tandem in dolore diuturno & valdè contumaci. à materia præsertim frigida oriundo, confugiunt nonnulli ad vesicatoria, partibus affectis admota. Eorum mentionem facit Sennertus, sed quæ anodynus permisceantur. At emplastro vesicatorio, quod in nostris officinis habetur, solo & impermixto sapientissimus Varandæus, præceptor meus, feliciter usus est; eoque curavit magnum & contumacem tumorem genu occupantem, cum alii Medici multas purgationes, & diætam sudorificam, nec non topica permulta frustra usurpassent.

In omnium autem prædictorum remediorum usu hoc unicè annotandum est ut à juvantibus & lædentibus sumatur indicatio, quandoquidem variæ sunt hominum naturæ, varia temperamenta, & varii generis excrementa in iis colliguntur, unde summa in morbis varietas solet exoriri. Ideò, quod uni prodest, alteri sæpè est inutile. Quod maxime usu venit in arthritidis curatione. Eaque ratione unicuique practico medicamentorum sylvâ habenda est, ut si unum frustra tentetur, ad aliud atque aliud confugere possit: ea semper seligendo, quæ rationali methodo magis consentanea videbuntur.

Quando arthritidis tophacea & nodosa est, difficillimè curatur, præsertim si inveterata sit. At nodi recentes emollientibus & resolventibus fomentis, unguentis, & emplastris dissolvi possunt. Specifica verò sunt quæ sequuntur.

Gal. valdè commendat emplastrum compositum ex casco veteri & acri, cū decocto pernæ suillæ salitæ subacto.

Alii pedes suillos salios decoquant, quousque in mucilaginem convertantur. Postea admiscant casei antiqui par-

tes duas, pulver. nasturt. partem unam; ut fiat emplastrum. Vel

℥. Succu nicotianæ 3. iii. ceræ citrinæ unc. ii. resinæ pini 3. i. sem. terebinth. unc. i. olei chamom. q. f. Fiat ceratum molle. Vel

℥. Beccarum Orientalium (quas Galli vocant, *coques de Levant*) myrrhæ, an. ℥. 8. Pulverentur & simul misceantur cum aceto forti in formam cataplasmati.

Gummi ammoniacum in aceto dissolutum potenter emollit.

Rulandus tumores istos duos inungit manè, meridiè & vespertî oleo seu balsamo sulphuris calente; & desuper emplastrum diasulphuris calens applicat.

At unicè confert emplastrum sequens, quod præter doloris sedationem, etiam ex articulis materiam tophaceam extrahit.

℥. Vitrioli rom. ℥. i. aluminis rupei ℥. sem. salis 3. iv. Hæc omnia conjunctim calcina in catino terreo evaporando salem, donec spiritus etiam exhalare cœperint. Quibus odore perceptis statim desiste à calcinatione, & refrigerant omnia, ac pulverentur.

℥. Hujus pulver. & farinæ hord. ana partes æquales; misce cum fæcibus vini ad formam pultis, quam supra laciniam extende, ad spissitudinem cultri, & applica loco affecto. Exsiccata massam cum fæcibus vini iterum dissolve, & applicare perge, donec primum, discussus dolor, postea verò ex articulis ipsis contortis omnes topi consumpti fuerint. Interim tamen sæpe fit, ut cutis aperiatur, quod formidandum non est. Vel enim sponte sua postea ulcera cœunt, vel cerâ saltem emplastri loco impositâ consolidantur, ipsis articulis denuò mobilibus & agilibus redditis.

Si denique nimis inveterata arthritidis & prorsus nodosa fuerit; præcedenti cura mitigatio quidem dolorum speranda est, sed topi vix cedunt; idèo caustico leviori cutis aperienda, deinde emplastro attractivo ex gummatibus topi eximendi.

Articularis doloris jam præsentis curatio prædictis perficitur. Sed quia hic affectus per intervalla, præcipuè vere & autumnò, redire solet: illius prophylaxis instituenda est. Quæ quidem eò respicere debet, ut materiæ ad articulos ruituræ collectio impediatur: aut si quæ collecta sit auferatur. Ac denique ne articuli tam facillè humorem influentem recipiant, impediatur materiæ collectio, optima victus ratione, & remediis, viscerum intemperiem corrigentibus. Materia collecta auferetur remediis evacuantibus. Et articuli non tam facillè recipient, si roborantibus confirmantur.

Diætam quòd attinet, licèt ea in hoc casu maximi, imò præcipui sit momenti, instituti nostri ratio eam describere non patitur.

De potu tantum dicemus, vinum arthriticis esse maxime noxium, multosque ejus abstinentiâ penitus fuisse liberatos. Si tamen æger propter alia valetudinis incommoda non possit ab eo omnino abstinere; bibat pauciferum seu aquosum & valdè dilutum. Hollerius loco vini commendat mellicratum valdè dilutum, scilicet ex aquæ partibus 40 vel 48. & mellis parte una, quod tamen non convenit picrocholis & sitibundis.

Bochetum sequens omnibus naturis convenit, & plurimis valdè profuit.

℥. Rad. falsæ paril. 3. ii. liquirit. Unc. i. cinnam. & sem. anisan. 3. 8. Fiat pulvis tenuissimus. Cujus cochl. i. misceatur cum ea aquæ quantitate, quæ pro uno passu sufficit. Agitentur in duobus vasis ter, aut quater, postea colentur pro potu ordinario, singulis passibus item iterando.

Vacuationes verò quòd attinet, phlebotomia primum instituenda est, præsertim vere & autumnò; in iis, qui sanguine abundant, ejusque effervescentiæ obnoxii sunt.

Purgatio verò non solum vere & autumnò, sed etiam quater in anno, imò & singulis mensibus in valdè cacochymis celebranda est. In quem usum multæ purgantium formulæ circumferuntur, huic affectui specificæ: Præcipuæ verò quæ sequuntur, à prudenti Medico ita usurpandæ, ut plerumque immutari debeant, tum ratio-



ne materiæ, tum ratione dosis, juxta varia ægrorum temperamenta.

℥. Sennæ mundat. turbith. hermodactyl. & rasuræ cranii non humati, an. Drach. i. diagrydii ʒ. i. Fiat pulvis, de quo capiat Drach. i. cum aquâ vivæ arthriticæ, vel jusculo. Vel

℥. Salsæ parill. Unc. i. sennæ mundat. Drach. vi. turbith. hermodactyl. julappæ, mechoacan. Unc. ʒ. agaric. trochif. ʒ. ii. diagrydii, cinnamom. an. Drach. ʒ. Fiat pulvis. Cujus Drach. i. infundatur in vino albo per noctem. Capiat æger mane vinum & pulverem.

Elektuarium caryocollinum à Petro Bayro miris laudibus effertur, & ab omnibus Practicis approbatur, ejusque descriptio habetur in Pharmacopœa Bauderonii. Datur ad Unc. ʒ. Sed in calidioribus naturis illius usus poterit esse noxius.

Rhasis pilulas suas laudat eo encomio, quod *incedere non valentes faciant ire pedes*. Illæ autem ita se habent.

℥. Aloës optimæ Unc. sem. rosar. rubr. ʒ. ii. hermodactyl. alb. à cort. exterioribus mundatorum ʒ. i. ʒ. diagrydii ʒ. i. cum aqua vivæ arthriticæ & melle rosar. fiat massa pilul. Cujus dosis erit ʒ. i.

Utiles etiam sunt, quæ sequuntur.

℥. Aloës, hermodactyl. an. ʒ. ʒ. chamæpit. Drach. ii. chamædr. stœchad. arabic. an. ʒ. i. sem. hyperici ʒ. ʒ. Cum terebinth. Veneta, fiat massa pilul. quia minùs purgant frequentius exhiberi poterunt.

Per vomitum etiam facta evacuatio in præservatione magno successu adhibetur, si æger eum faciliè ferat. Quod indicavit Alsharavius insignis Medicus, his verbis: *Vomitus, inquit, utilior est laxativo, ad eradicationem grossorum humorum, qui sunt ab infra genu, & usque ad pedem; sicut in dolore sciatico & dolore genuum, & similibus.*

Provocari autem poterit vomitus singulis mensibus per biduum sequens, quia secundus dies prioris reliquias extrudit. Hunc autem meliùs succedere quidam observant, cum Luna in signo aliquo ruminante, ut Tauro vel Capricorno reperta fuerit. A cœna autem provocare utile est, ingestis priùs cibis variis pinguibus, acribus, aliisque in magnâ copiâ. Postea ventriculū fricando, & digitos in fauces immittendo. Quod si non sufficiat, vomitorium exhibendum est, præsertim ex radic. asari & genistæ decocto conflatum, quæ alioqui in arthritide curanda idonea esse solent.

Illæ etiam, quæ per sudores fit evacuatio, sanguinem à serosis excrementis repurgat, & causam arthritidis antecedentem educit. In hunc usum institui poterit diætâ sudorifica, vere & autumnō, ex decocto salsæparill. chinæ, saffras, aut etiam guajaco, prout ægri temperies suadere videbitur.

At sine sudorum provocatione per simplicem diaphoresim, materiam morbosicam educens decoctum, à recentioribus quibusdam Practicis in usum revocatum est cum eximio fructu. Illius compositio, & utendi modus talis est.

℥. Rad. salsæ parill. antimon. crudi, & putaminum nucum. ana Unc. vi. rad. chinæ Unc. i. ligni brasiliæ parum, aquæ ʒ. ix. Bulliant ad medias; antimonium, & putamina pulveriscentur, & nodulo includantur, qui in olla suspendatur, ne fundum attingat. Colaturæ capiat bonum haustum manè, tribus horis ante pastum; post meridiem quatuor horis à prandio, & tribus horis post cœnam per xv. dies, præmissâ venæ sectione & purgatione universali.

Et residentia, cum pari aquæ quantitate, fiat bochetum, ad quartæ partis consumpt. pro potu ordinario, addendo coriandri & liquirit. q. f. ad saporis gratiam.

Ad arthritidem præcavendam, ejusque radices in visceribus latentes extirpandas, quidam Practici commendant usum antipodagricorum; per annum integrum exhibitorum, quibus multos in integrum fuisse liberatos pronuntiant. Ex multis eorum formulis sequens præcipua est.

℥. Salsæ parillæ ʒ. iv. sem. hyperici, fol. chamæp. & chamæd. an. ʒ. iii. aristol. rotund. ʒ. vi. angelicæ ʒ. iii. ciñam,

ʒ. ii. caryophyll. ʒ. iv. croci ʒ. ii. Omnia in tenuissimum pulverem redacta incorporentur cum mellis Hispanici cocti q. f. Fiat opiata qua utatur æger per annum integrum, sumendo singulis diebus veris, autumnī, & hyemis ʒ. i. ʒ. æstate tantum ʒ. i. & abstineat omnino diebus canicularibus. Vinum bibat valdè dilutum, & abstineat à venere.

Horum antipodagricorum instar forsitan esse poterit decoctum chamædryos, quod propterea Carol. V. Imperatori à Genuensibus Medicis valdè commendatum erat: & testatur Solenander plurimos, qui hoc medicamentum per sexaginta dies bibissent, penitus fuisse liberatos. Hujus decocti compositio talis est.

℥. Chamædryos dum floret, lectæ, & benè asservatæ M. i. vini mediocris maturi ʒ. iii. Coque in duplici vase per hor. quinque. Colati vini capiat æger haustum, corpore ad sudorem composito, præmissâ purgatione.

De calidis autem istis medicamentis hîc notandum; ea non solum calidis naturis non prodesse; sed etiâ immedicabiles resolutiones, aut alia incommoda inducere, ideoque summa cum præmeditatione esse exhibenda.

Tutiùs, & forsitan utiliùs, usurpari poterit opiata sequens, quæ minùs calefaciendo, totum corpus sensim, & per epicrasin ab omni superfluitate illuvie repurgat.

℥. Sennæ mund. ʒ. ʒ. turbith. hermodact. an. ʒ. vi. ligni guajaci, saffras, & rad. salsæp. an. ʒ. sem. rad. chinæ ʒ. i. sem. ligni nephritici ʒ. ii. trium santal. an. Unc. i. sem. anisi ʒ. ii. mellis optimè depurati Unc. xiv. Fiat opiata. Dosis Drach. i. per integrum annum, exceptis diebus canicularibus.

Inter vulgares homines quidam pro magno remedio prophylactico habent, ut tres alliorum bulbi integri manè deglutiantur, continuando per mensem integrum. Etenim ventriculū calefaciunt, & roborant, citra hepatis, aliorumque viscerum calefactionem: nam integri cum facibus excernuntur, sed cocti, & pituitâ viscidâ obvoluti, quam à ventriculo, & intestinis deturbant.

In arthritide biliosa aquæ acidulæ, vitriolatæ, & refrigerantes plurimùm conferunt. Ita ut earum usu plures ab eâ immunes per longum tempus evaserint.

Ad eundem finem laudatur ab Hipp. lib. de morbis; usus lactis asinini, quod etiam pluribus arthriticis multum contulisse experientia docuit.

Ac denique omnia remedia, quæ calidiori hepatis intemperiei corrigendæ, eique visceri roborando idonea sunt, hîc etiam convenire poterunt, prout supra in ejusdem intemperiei curatione descripta sunt.

Si verò serosus humor, à cerebro defluens, ut plerumque fit, huic affectui dederit originem; cerebri ratio habenda maximè est: ut nimirum intemperies illius corrigatur, & humores in eo geniti deriventur & discutiantur. Quibus usibus convenient cauteria, vesicatoria, errhina, masticatoria, pulveres, cucuphæ, suffitus, aliaque remedia, in affectuum cerebri curationibus proposita.

Ultimum præcautionis caput est, ut articuli roborentur, ne tam facile humorem influentē recipiant. Advertendum tamen, roborantia medicamenta, non solum frustra, sed etiam noxiè usurpari, nisi materia antecedens, & fluxivus humor remediis prædictis sollicitè auferatur. Alioquin hæc roborantia vel humorum ad articulos influxum impedire nequeunt; vel si impediunt, ad partes nobiles refluent humores isti, & multò graviora mala concitant.

Inter præcipua roborantia vinacea numeranda sunt, quæ materiæ morbosicæ reliquias discutunt, calore actuali adstringendi vi partes maximè roborant. Duretus in Hollerium ea ita commendat. *Sed mirifice prodest vinaceorum usus tempore vindemiarum, si vinacea exportentur ex torculari in horreum, & stragulis operta incalescant. In his æger contineat pedes, tibias, crura, aut brachia, vel etiam totum corpus. Postea verò addit Gallico idiomate; Je l'ay pratiqué cent fois, il n'y a rien de meilleur sous la chappé du Ciel.*

Solenander verò *conf. 21. sect. 4.* hoc remedium sequenti elogio prædicat. *Sed inter optima remedia, & tutissima, quæ partes etiam affectas roborant, ac calorem innatum foveant, hoc ponendum, diligenter singulis annis, cum amplius fieri nequeat*



nequeat usurpandum. *Videlicet ut tempore vindemæ immergantur pedes atque manus affectæ vinaceis, post expressi-  
nem calentibus adhuc, vel musto calefactis: mane per dies  
quindecim. Ac possem nominare virum præstantem, cui hoc  
medicamentum communicavi, atque ab eo præclaro munere  
sum donatus; qui planè incedere non poterat, & isto reme-  
dio, beneficio Dei, restitutus est. Quò autem uvæ ma-  
tutiores sunt, eò plus adjumenti usus affert.*

Thermæ sulphuræ, & nitrosæ, quales sunt nostræ Ba-  
lerucanæ, non solum sudores evocando, ut antea dictum  
est, materiam arthritidis discutunt, sed etiam roborando  
articulos ad præcautionem non parum conferre possunt;  
quemadmodum super modum embrochæ, vel ducæ ca-  
piti admoveantur. Earundem thermarum lutum partibus  
infirmis applicatum, eas etiam corroborat.

In thermarum defectu lotiones pedum, aut fots alia-  
rum partium parari poterunt, ex decocto herbarum ner-  
valium, additis quibusdam adstringentibus, ut balaustris,  
myrtillis, nucibus cupressi, alumine, & sale, cum aqua  
ferrata & vino rubro.

Commendantur etiam inunctiones frequentes usurpatæ  
in hunc modum compositæ.

Ol. myrtini vel rosacei Unc. ii. salis 3. i. Misce, fiat li-  
nimentum. Vel

4. Ol. omphacini Unc. ii. mastichini Unc. i. salis torre-  
facti 3. ii. boli armen. 3. iii. sang. dracon. hypocist. thuris,  
mastich. an. Drach. i. sem. Terantur singula per se potius  
subtilissimè, tum oleis misceantur in formam unguenti.

Non parum etiam utile est ad articulos roborandos em-  
plastrum diachalciteos, seu diapalma impositum: estque  
utile in omni arthritide, à quocumque humore ducat ori-  
ginem. Scribitque Solenander *conf. 25. sect. 4.* se novisse  
quosdam, qui aliàs frequenter podagræ paroxysmis tenta-  
ri consueverant, usu hujus emplastri continuò, & purgan-  
tibus per intervalla assumptis, quinquennium integrum  
ab istis doloribus liberatos fuisse. Atque emplastrum hoc  
non inquinat, non pruritum aut pustulas excitat, neque  
odore, aut aliâ qualitate molestum est. Aptatur autem ad  
formam membri. In pedibus ex aluta tenui fiunt calcei,  
qui hoc emplastro obducti pedibus aptantur. Eadem aluta  
emplastro hoc oblita carpis, & aliis partibus applicari po-  
test. At verò idem emplastrum diachalciteos, in vino de-  
coctum, & cum pulvere myrtill. rosar. mastiches, tartari,  
chamæpit. & chamomillæ permixtum, quale supra in cura-  
tione descriptum est, ad eosdem usus multò præstantius  
est. Et nos vidimus arthriticos, qui hujusmodi empla-  
strum in pedibus & carpis continuò gestarunt, felicissimo  
successu.

## C A P U T II.

### De dolore ischiadico.

**D**olor ischiadicus ab aliis arthritidis speciebus in eo  
præcipue differt, quod in his dolor solos articulos  
occupat; in illo verò non in sola est coxendice, sed etiam  
summam natem, & lumbos & os sacrum occupat, & in  
femur, tibiamque ad extremum pedem exporrigitur. Quod  
fit propter nervos à lumbis & osse sacro emergentes, qui  
ad coxendicem feruntur, & inde ad femur, tibiam & pe-  
des disseminantur.

Causa hujus doloris eadem est, quæ in aliis arthriti-  
dis speciebus fuit propofita.

Diagnosis ex loco affecto desumitur, unde etiam nomen  
habet: dolor enim præcipue ischii regionem occupat. Hoc  
etiam habet peculiare, quòd nullus tumor, nullaque in-  
flammatiò, aut coloris mutatio appareat, quemadmodum  
in aliis arthritidis speciebus fieri solet, qui humores as-  
fluentes, in partes profundiores & ampliores, multaque  
carne contextas sese insinuant, & usque ad corporis su-  
perficiem, ipsamque cutem non diffunduntur.

Prognosis doloris ischiadici hoc habet peculiare, quòd  
diu perseverans, coxæ luxationem inferat: humor enim  
serofus & pituitosus in articuli cavitatem, quæ amplissima

Laz. Riverii Opera.

est, sese insinuat, & si diu in ea moretur, pars illius tenuior  
discutitur, crassiori remanente, quæ mucosa redditur, & li-  
gamenta, articuli ossa connectentia, emollit, ac relaxat, ut  
os coxæ ex alveo suo exeat, unde luxatio contingit, ex qua  
etiam claudicatio sequitur, & cruris totius tabes atque  
atrophia; quia os è sede sua elapsum musculos, venas, &  
arterias comprimit, unde motus impeditur, & sanguis ac  
spiritus in partes inferiores commodè fluere non possunt.  
Prædictam doctrinam confirmant duo Hipp. Aphorismi,  
nempe *Aph. 39. sect. 6. Quibus diurne coxendicum dolo-  
re infestati coxa excidit, rursusque incidit, iis mures fa-  
perveniunt.* Et *Aphor. 60 ejusdem sectionis; Quibus diu-  
turno coxendicum dolore infestatis coxa excidit; iis crus  
contabescit, & claudicant, nisi urantur.*

Curatio doloris ischiadici cum reliquarum arthritidis  
specierum curatione multa habet communia, in multis  
tamen differt, propter loci affecti structuram & amplitudi-  
nem; ideo à prædictis distinguenda fuit, & seorsim in hoc  
capite describenda.

Ac primum præmissis clystere, aut levi pharmaco, ve-  
na brachii ejusdem lateris aperienda est; ad revellendum:  
postea verò ad derivandum secari debet in poplite, aut  
juxta malleolum anteriorem illa vena, quæ ob insignem  
utilitatem quam affert in hoc affectu, ischiadica nominatur,  
quæ & sæpe sola secta hunc affectum sanat.

In crure dolente secari solet, licet & in sano apertam  
admodum profuisse, subitoque omnem dolorem sustulisse  
visum fuerit.

*Gal. lib. de venæ sect. 4. c. 18. Memini, inquit, ischia-  
das uno die, factâ ex cruribus evacuatione, curasse, nem-  
pe ubi non ex frigore, sed impletis sanguine, quæ in coxa  
sunt, venis, provenissent; quare secta in poplite vena illis  
commodior est, quam in malleolo.*

Et hæmorroidibus etiam sanguis per hirudines educ-  
tus mirum in modum ischiadicis opitulatur, quòd sanguis  
in coxendicum venis contentus educatur: harum enim par-  
tium maximus est per venas consensus.

Purgationes fortiores hic locum habent: nam leviores,  
humores magis ad partem affectam præcipitant. Ideo con-  
veniunt maximè pulv. arthritici, caryocollinum, pilulæ  
de hermodactylis, & similia. Chymici purgationes mer-  
curiales & antimoniales in robustis corporibus feliciter  
aliquando usurpant.

Mercurius dulcis cum scammonio, vel aliis purganti-  
bus exhibitus, satis frequenter, humorem ischiadem effi-  
cientem potenter eradicat.

Vomitoria à multis præferuntur purgantibus per al-  
vum, cum per locum à parte affecta remotiorem humores  
vitiosos evacuent. Asarum reliquis præfertur à Ronde-  
letio.

Post sufficientem purgationem, ad topica veniendum  
est. Et quidem repellentis quòd attinet, illa minimè con-  
veniunt, quòd metuendum fit, ne humores ad partem  
affectam magis promoveantur; sed statim initio resolen-  
tia admovenda sunt: primò mitiora & minùs calida, ne  
magis humores ad partem attrahant; postea vehementio-  
ra, in hunc modum.

Rad. bryoniæ lb. ii. rad. ebuli lb. i. baccarum juniperi  
lb. 3. fol. ivæ arthriticæ, menthæ, major. salviæ, rorisma-  
rini, flor. chamom. meliloti, an. M. iv. Fiat decoctio pro  
semicupio, quod ingrediatur bis in die, per biduum,  
aut triduum. In principio parari poterit decoctum ex aqua  
sola, postea ex aqua & vino albo.

Ex eodem aut simili decocto potest foveri pars dolens  
calidè frequenter.

Sacculi etiam parari poterunt ex sale, milio, & fufu-  
re, frixis in sartagine cum vino generoso, & calidè  
applicari.

Vel componi etiam poterunt sacculi efficaces, ex solis  
granis juniperi contusis, & prædicto modo in sartagine  
calefactis.

Inunctiones etiam convenient ex ol. chamom. aneth.  
lilior. irino, nardino, & rutac. quæ partes exteriores  
relaxando, motum humorum ad eos conciliabunt, ut sic  
internæ minùs afficiantur.

G g g

Oleum



Oleum fcorpionum Matthioli inunctum, est etiam valdè efficax.

Ad potentiùs resolvendum aqua balsami Guidonis, inunctione admota, erit præstantissima.

Unguentum de althæa partes exteriores laxat, & materiam morbificam blandè discutit: ideò circa initia eo inungi poterit totum crus, & tibia usque ad extremum pedem, juxta ignem luculentum.

In progressu verò sequens potentiùs & calidiùs admove-  
veri poterit

℞. Ol. lumbric. de lateribus, & de terebinth. an. 3. ii. ol. vulpini 3. j. gummi ammoniac. & sagapeni aquâ vitæ solutor. an. 3. vi. castorei pinguis 3. iii. euphorbii 3. ii. ceræ q. s. Fiat unguentum.

Sapo durus, cum spiritu vini dissolutus, optimus, inunctiones factâ ad ignem.

Oleum de lateribus solum, post sex cucurbitulas parti dolenti, & in ambitu ejus admotas, calidè impositum postea regendo linteis valdè calidis, contumacem dolorem ischiadicum una die curavit.

Lacuna *Comm. in Diosc.* unguentum sequens tanquam mirabile commendat.

℞. Succor. rad. & fol. ebuli, an. 3. i. olei chamom. 3. vi. Bulliant ad succor. consumptionem. Deinde adde ceræ q. s. aceti guttulas aliquot ad penetrationem. Fiat unguentum.

Cataplasma ex iberide multum laudatur ab Authoribus, quod hæc planta huic affectui curando sit valdè efficax. Id componi poterit in hunc modum.

℞. Iberidis M. iv. Coquantur in vino, & contundantur, addendo farinæ lupin. orobi & fabar. an. 3. iii. pulver. rutæ siccæ, flor. chamæm. & rad. costi, an. 3. i. ol. terebinth. Unc. sem. ol. lumbric. q. s. Fiat cataplasma.

Platerus primum prodesse testatur, si salvia recens in tegulam cavam ignitam posita, sæpeque, ne aduratur, agitata, & hoc modo semicocta, aceto perfundatur, tegulaque linteis obvoluta sub ægri coxa ponatur, vaporque indè excitatus excipiat.

Non parum etiam conducit panis recenter à forno extractus, valdè calens, per medium sectus, aquâ vitæ irroratus & admotus.

Ad materiam morbificam foras extrahendam convenit cucurbitula in summa parte doloris, quæ ad os sacrum pertinet, quater repetita sine scarificatione.

Ad idem valdè conferunt hirudines octo vel decem parti affixæ, quæ à Paulo & Aureliano probantur. Et Zacutus Lusitanus sedecim horarum spatio dolorem ischiadicum sustulisse asserit, qui omnibus aliis remediis auferri non poterat.

Emplastra verò in frequentissimo usu sunt, & hac in re plurimum profunt. In eorum tamen usu hoc perpetuò observandum, quemadmodum de aliis in genere dictum est, ut primò mitiora admoveantur, quæ si parùm profuerint, ad vehementiora transcendere poterimus. Quem etiam ordinem nos in eorum formulis describendis observabimus.

℞. Picis navalis 3. ii. sulphur. commun. subtilissimè triti 3. iii. mastiches 3. ii. terebinth. 3. β. Misce, fiat emp.

℞. Picis navalis 3. ii. gummi ammoniac. bdellii in aceto dissolut. an. 3. i. sulphuris vivi, turbit. hermodact. an. Unc. sem. castorei. Drach. i. terebinth. parùm, ceræ q. s. Fiat emplastrum.

℞. Gummi ammoniaci & sagapeni in aceto dissol. & denuò inspissat. an. 3. ii. empl. diachylon cum gummi 3. i. β. Liquefiant omnia simul. Deinde adde cinnabaris, & æris usti, an. Unc. i. auripigmenti & viridis æris, an. 3. ii. Fiat massa emplastri. Si vesicæ excitentur, ponatur linteum inter partem & emplastrum.

Si malum pertinaciter hæreat, ad vesicatorium transeundum est, quod parti admotum materiam morbificam evellit. Emplastrum igitur vesicatorium applicandum est, vel solum, vel, ut mitiùs agatur, cum aliquo ex prædictis, æquis partibus permixtum: sic enim per longius tempus in parte poterit detineri. Vel sequens de novo dispensari poterit.

℞. Picis navalis, ceræ, picis albæ, an. Unc. i. sem. colophonæ, thuris, mastiches, an. 3. ii. euphorbii, ladani, sul-

phuris vivi, opopan. ammon. ac bdellii, galbani, sagapeni, an. 3. β. styrac. calamit. benjoin. ana 3. ii. cantharid. 3. iii. galangæ, caryophyll. an. 3. ii. styrac. liquid. q. s. Fiat empl.

In diuturno affectu causticum tibie lateris dolentis materiam morbificam derivat, & morbum interdum tollit. Zecchius admovendum esse vult parti tibie exteriori. Si verò suspicio fuerit catarrhi à cerebro defluentis, alterum etiam occipiti admovendum est. Id enim aliquando ischiadicum dolorem antiquum curavit, qui nullis aliis remediis vinci potuerat. Tum denique alia remedia cerebri intemperiem corrigentia non erunt omittenda.

Zacutus Lusit. cauterium retrò aures inustum, quando fluxio à capite irrumpit, cum miro successu in usum se vocasse asserit, & peculiari historiâ confirmat *chf* 160. lib. 2.

Toto curationis decursu clysteres frequentes injiciendi sunt, ut materia morbificæ portio ad intestina lerivetur. Tum etiam ad doloris causam proximam discutiendam sequens aliquando profuit.

℞. Vini generosi ℔. sem. ol. nucum & rutac. an. 3. iii. ol. terebinth. Unc. sem. Misce, fiat clyster, injiciendus quoties dolor urget.

Clyster verò sequens humores à parte affecta potenter extrahit, propter viciniam, quam habet cum intestinis.

℞. Pulpæ colocynth. Drach. i. furfuris macri M. i. vini albi ℔. i. sem. Coquantur ad ℔. i. Ex colatura fiat clyster, qui servetur per horam.

Dolor ischiadicus interdum è bile, & humoribus calidis generatur, qui quidem dignoscitur, cum dolor est acerbissimus, & pungitivo similis, exacerbationes alternis diebus sæviores efficiuntur, habitus est gracilis, temperamentum biliosum, ætas juvenilis, regio & tempestas calida, dolor à calefacientibus exacerbatur, morbi præcesserunt biliosi, victus calefaciens, exercitatio vehemens: tunc enim ad bilem & calidam intemperiem remedia dirigi debent. Ideò convenient venæ sectio, purgationes chologogæ, nunc lenientes, nunc etiam vehementer purgantes, additis diagrydiatis, ut materia morbifica educatur; julepi refrigerantes, clysteres mollientes, & refrigerantes, lac, aliaque remedia in calida hepatis intemperie propo-  
sita. Hoc perpetuò caventes, ut aperientia vitentur, incrassantia potius eligantur, qualia in catarrho calido & tenui propo-  
sita fuerunt.

Dolore acerbiori existente, narcotica exhiberi possunt, præsertim syrupus de papavere, quo dolor sedatur & fluxio cohibetur, humoris incrassatione.

At longè potentiùs operatur laudanum opiatum ad gr. ii. iii. vel iv. exhibitum, quod etiam in clystere ex jusculo, vel lacte dissolutum; præmissio alio laxante, dolorem sæpè in momento sedat.

Topica erunt mitiora, ut ol. lilior. violac. chamæmel. & amigd. dulcium: cataplasmata ex lactuca, solano, endivia, farina hordei, cum oleis prædictis; & circa declinationem fomenta, linimenta, emplastra mitiora, & minùs calefacientia.

Materia dolorem ischiadicum efficiens aliquando suppuratur, in abscessum convertitur, quod docuit Hipp. 3. *epid. in historia Eupolemi*, qui talem abscessum passus est, & ex eo tabidus interiit. Si abscessus aperiatur, ulcus remanet: solidum & cacoëthes, quod etiam ad tabem perducit. Eam tamen cum ulcere curatam sæpè à se fuisse gloriatur Zacutus Lusitanus, *observ.* 126. lib. 1. decocto ligni sancti, & radice falsæparillæ. Quæ observatio legenda, & sedulò meditanda est.

### CAPUT III.

#### De Rheumatismo.

Post arthriticos affectus, propriè dictos, de Rheumatismo agere operæ pretium est, propter magnam analogiam, quæ inter hosce affectus intercedit: quæ sane tanta est, ut vulgus Medicorum, qui Rheumatismi naturam ignorant, eum arthritidem universalem nominare soleant. In utroque enim affectu dolor articulorum reperitur; sed



in hoc differunt, quòd arthritide soli articuli doleant; in Rheumatismo verò non solum articuli, sed etiam totum corpus, media scilicet inter articulos spatia, musculi nimirum, eorumque membranæ, ac præsertim periostia, totiusque corporis habitus: imò verò interdum corporis partes internæ, ut ventriculus, intestina, uterus, pulmo, rheumaticos affectus experiuntur.

Licet autem catarrhus rheumatis nomine donetur apud Græcos; differt tamen ab eo rheumatismus; quia in genere quidem fluxionis est, sed alterius naturæ ab ea fluxione, quæ vulgò catarrhus nominatur, qui quidem à cerebro tantum exoritur, & unam aut alteram solummodò partem infestat, cum rheumatismus ab internis visceribus, tum venis & arteriis procedat, & in corpus universum effundatur.

Hic affectus, morbus novus non est, attamen à veteribus non est sufficienter descriptus. Illius delineatio habetur apud Hipp. lib. de loc. in homine, & apud Galen. 1. de differ. febr. & 1. de compos. med. secundum genera. Sed omnium maximè insignis ac perspicuus locus hunc affectum explicans 1. in lib. 1. de differ. febr. cap. 7. continetur, his verbis: *Hujusmodi quapiam ratione provenire scito rheumaticos nominatos affectus, toto videlicet corpore infirmo, principibus verò illius partibus, paululum licet insit sanguinis. gravari tamen solitis, eumque ad carneas cutis partes protudentibus.* Unde legitimam rheumaticæ affectionis naturam in eo sitam esse constat, juxta Galeni doctrinam, quòd corpus universum ea impotentia sit affectum, ut ubi principem ejus partem aliquo sanguine gravari contingeret, licet non sit in copia plurimum excedens, ad carnosas partes, & habitum transmittat.

Illud autem crudè & simpliciter admitti non potest, quod dicitur à Galeno, partes principes, sanguine gravatas, eum à carneas cutis partes mittere. Inde enim inflammationes & tumores in illis partibus exorirentur. At constat experientiâ, in rheumatismo nullum tumorem, nullam inflammationem, nullamque coloris mutationem in partibus dolentibus ut plurimum apparere.

Causa igitur proxima & immediata hujus affectus est humor serosus, qui propter tenuitatem partes in tumorem non elevat, & propter substantiam minimè suppurationi idoneam, nullum unquam abscessum producit, sed tantum dispositionem quandam inflammatoriam ex feri fervore oriundam.

Origo autem primaria hujus affectus hepati ascribenda est, quod fervida intemperie affectum, atque debilius redditum alimentum non satis nutritioni conveniens generat, & totum corpus partis imbecillitate afficit, ut ita superfluitatum receptioni reddatur maximè idoneum. Ex ea lem verò hepatis intemperie ac imbecillitate, multus fit pravorum humorum proventus, qui in venis & arteriis diutius retenti, pravam quandam acquirunt corruptelam, ibique colliquantur, & in feri, atque ichorum naturam abeunt, & tanquam onus grave expelluntur à natura ad partes ignobiliores; cum satis robusta non sit, ut eos extra corpus omninò eliminare valeat. Illi autem humores serosi & ichorosi, summâ acrimoniâ præditi, partes, ad quas deducuntur, lancinant & pungunt, unde dolores & cruciatus oriuntur. Licet autem hepar primariam hujus affectus originem præ se ferre à nobis censeatur; à cerebro tamen humores istos interdum immediatè defluere ex eo patet, quòd sæpe dolores in cervice incipiant, postmodum verò ad humeros & brachia descendant. Verum prima humorum acrium generatio fuit in hepate fervidiori, qui ad cerebrum translati, confluunt postmodum in subjectas partes.

Quamvis autem modo veluti critico humores isti à venis expellantur; motus tamen eorum non est ita subitus, sed lentè & paulatim efficitur: cum nempe humores illi pravi & corrupti in venis fervent & ebulliunt, ac postmodum à venis sensim expelluntur, ac veluti evomuntur, unde nautiosis venarum, satis appositè, motus iste appellari solet.

Humorem autem serosum esse causam præcipuam horum dolorum, multiplici ratione convincitur. Primò, quòd

nullam coloris mutationem, nullumque tumorem, ut plurimum partibus inducit, licet aliquando, cum humor valde copiosus est, in exiguum ac prærubrum tumorem partem elevet, qui tamen facillè discutitur. Secundò, quòd dolores isti admodum mobiles sint, & nunc hanc, nunc illam partem invadant, & ab uno loco in alium subito mutantur, priori subito immuni reddito, ac dolore omninò vacuo: quæ repentinæ mutationes non nisi ab humore mobili, summaque tenuitate prædito, fieri possunt. Tertio, quòd sudoribus sæpe morbus iste terminetur. Quarto, quia pleonexiæ serosæ multa in hisce ægrotantibus apparent indicia; nempe urinæ tenues ac copiosæ, potius quantitatem excedentes, & magna feri copia in sanguine detractò apparens.

Licet autem serosus humor sit causa præcipua & frequentissima dolorum qui in Rheumatismo contingunt; non est tamen à ratione alienum, flatus aliquando concurrere ad eorum productionem. Cujus rei conjecturam facere potest subita doloris permutatio de loco in locum, & quòd non sit pondus, aut gravitas in partibus dolentibus. Hæc est Avicennæ sententia, qui hunc affectum describere videtur, illiusque generatione: flatibus tribuere. *fen. 1. lib. 3. tract. 2. cap. 7.* his verbis: *In dolore facto ex flatibus, extensio augetur, & gravitas minuitur: & aliquando est cum punctione, quandoque etiam cum corrosione; & in flatuoso dolore videm gravitas nulla est. Et quandoque etiam cum ipso fit permutatio doloris frequens de loco ad locum.* Hæc Avicenna: quibus sententia subjungit, quæ ad rheumatismi descriptionem propius accedere videntur. *Et flatus est quandoque in tunicis membrorum, & villis, sicut in colica flatuosa; aut in tunicis musculorum, & sub membranis, & super ossa; aut in circuitu musculorum, inter carnem mollem & cutem; aut in ipso membro latitans, ut in musculis in pectore.*

Si quis verò objiciat, morbos à flatibus oriundos non tandiu durare, cum flatus facillè discutiantur; Respondemus. flatum in partibus dolentibus contentum facillè discuti, unde frequens dolorum permutatio contingit, sed mineram adesse in venis, ex qua fieri potest continua flatuum elevatio, qui postmodum ad partes prædictas deferuntur. Minera autem flatibus generandis idonea est humor crassus, viscidus, & pituitosus, quem in rheumatismo laborantibus sæpissime redundare ostendit sanguis ipse detractus, qui non rarò crassus & glutinosus est, pituitam crudam & putridam referens.

Diagnosin hujus affectus, ex iis quæ dicta sunt, facillè elici potest: paulò uberius tamen explicanda est. Primò igitur partes doloribus affectæ, nempe musculi, eorumque membranæ & periostia hunc affectum à reliquis omnibus distinguunt. Licet enim dolores venerci, artus & internochia occupent, & maximè periostia; differunt tamen in eo, quòd non adeò universaliter corpus totum infestent, neque tam continui sint, noctu tantum, & parùm interdiu excruciantes, neque ut plurimum à consuetis officiis ægrotantes avertunt: cum rheumatismus ipsi lecto penitus affigat, ut sese vix commovere valeant, neque à ministris, nisi cum maxima molestia, & dolorum exacerbatione, moveantur. Ac denique alia luis venereæ signa adsunt, vel præcesserunt, ut gonorrhœa, bubo venereus, caries putendi & similia.

Alia etiam symptomata, hunc affectum concomitantia, ad illius diagnosin plurimum conferre possunt. Admota enim manu partibus dolentibus, caloris & acrimoniæ sensus percipitur, febris ut plurimum adest, sed ea perexigua, interdum verò nulla. Sanguis, qui detrahitur plane corruptus est, crassus & glutinosus, tum post multas phlebotomas sero copioso distillat, ita tamen mutatus, ut sanguinis speciem amiserit. Postquam cessavit, vel intermisit dolor, nulla remanet imbecillitas in parte, ut in arthritide contingit. Purgantia medicamenta, & topica, ab initio usurpata, nihil prosunt, imò morbum & dolorem augent: in declinatione verò utraque sunt proficua.

Quod ad prognosin attinet, affectus iste rarò, aut nunquam vitæ periculum infert, sed longitudine suâ magnam parit molestiam, adducens enim vel tres menses perseverat,



si sit sine febre; imò verò interdum, præcipuè si non rectè curetur, ad annum, vel plures annos extenditur. Franciscus Portus, quieleganti carmine decadem medicam scripsit, agens de rheumatismo, refert seipsum per biennium ferè hunc morbum expertum esse, quem tandem superavit adnitentibus sex Medicis Parisiensibus, illius temporis illustrioribus, Basino, Ellino, Belliquerco, San-Jacobæo, Seguino, Hollerio.

Si cum febre rheumatismus oriatur; brevior esse solet, sed diris cruciatibus & acerbioribus ægrum exercet: & tunc intra 20. vel 40. dies solvitur, aut maximam saltem partitur imminutionem.

Rheumatismus aliis morbis superveniens, ut apoplexiæ, & convulsioni, periculum imminuit, translata materiâ morbifica à partibus internis ad habitum corporis.

Sudores, in declinatione morbi advenientes, salutare.

Urinæ crassæ & multæ, in declinatione prædeuntes, morbi solutionem afferunt.

Ad curationem hujus affectus, materia morbifica revellenda, mitiganda, & evacuanda est, viscerum intemperies corrigenda, omniumque partium, tam mandantium, quam recipientium robur conservandum est.

Quæ omnia sequentibus remediis præstari poterunt.

℞. Fol. malvæ, violar. betæ, lactuc. borrag. an. M. j. sem. anis. 3. ij. Coquantur ad quart. v. In colatura dissolve mellis viol. & butyri retent. an. 3. ij. Fiat clyster, injiciendus hora commoda, & iterandus singulis, vel alternis diebus per integrum morbi decursum.

Rejeto clystere, vena aperienda est alterutrius brachii, & detrahendæ sanguinis 3. viij. vel ix. Non refert, ex quo brachio sanguis primùm detrahatur, quandoquidem pluries iteranda est phlebotomia, atque adeò utriusque brachii venæ sæpius erunt pertundendæ. Singulis igitur diebus ab initio sanguinis detrahendus est, donec morbus remiserit, & dolores imminuti fuerint. Nec refert si per 10. 12. aut etiam plures dies sanguis detrahatur, quando quidem iste morbus hoc habet peculiare, ut ex frequenti venæ sectione vires non deiciantur, sicut in aliis morbis solet contingere. Ideoque mihi in usu est, in hujusmodi affectionibus, dum venæ sectionem adeò frequentem præscribo, ne ægrotantes, vel adstantes terreantur à toties repetita phlebotomia, hanc restrictionem addere, ut continuetur singulis diebus missio sanguinis, donec imminuti fuerint dolores, aut vires multum debilitatæ. Cum autem hujus evacuationis usum continuando, virium dejectio inde non emergat, eam ægrotantes liberè patiuntur, ejusque frequenti iterationi facilem assensum præbent. Facilem autem illam tolerantiam facit sanguinis conditio, qui in hoc morbo admodum putridus semper educitur. Copiosæ hujus sanguinis evacuationis utilitatem ostendit experientia; si quidem ex ea sedulò continuata morbus qui longus esse consuevit, ut in prognosi dictum est, intra satis breve spatium non rarò evincitur. Et docet eadem experientia, hæmorrhagiam largam, huic morbo supervenientem eum omnino resolvere. Hoc subinnuere visus est Hippocr. Aphor. 74. sect. 4. *Quibus speratur abscessus futurus ad articulos, eos liberat ab abscessu urina multa, crassa, & alba, qualis in laboriosis febribus quarto die quibusdam incipit fieri: si verò etiam ex naribus fluxerit sanguis, brevi admodum solutio fit.* Humor enim decubitus, qui ad articulos fiunt, cum rheumatismo quandam habent analogiam. Tum etiam idem Hippocrates quandam rheumatismi adumbrationem proponere videtur 2. Prorrhæ. Illiusque generationem suppressæ hæmorrhagiæ consuetæ adscribit, his verbis: *Quibus circa articulos dolores fiunt, & tumores, & sedantur non podagrico modo: in iis comperies viscera magna, & in urina subsidientiam albam, & quæ sequuntur, postea addit: Fit autem hic morbus iis, quibus in pueritia & juventute sanguis ex naribus fluere solitus, desit.*

Dum phlebotomiæ celebrantur, clysteres (ut antea dictum est,) singulis vel alternis diebus usurpandi, tum etiam julepi exhibendi, qui viscerum intemperiem corrigere, & humorum acrimoniam atque agitationem cohibere valent. Huic usui maximè conducit aqua papaveris rhœæ,

dos, quæ cum valdè proficua sit in hoc affectu, sola exhibenda est manè & serò ad Unc. vj. cum syrupo limon. vel granat. ad formam julepi; quanquam sine syrupo non minoris sit efficaciam.

Pro potu ordinario ptisana ex hordeo, gramine, & liquiritia, vel ex decocto rad. acetosæ, vel tinctura rosarum usurpari poterit: à vino prorsus abstinendo, quod omnium fluxionum vehiculum est maximum.

Purgatio in hujus affectus principio, augmento, & statu nullum affert auxilium; imò verò noxia est: fluxiones enim irritat, & dolores intendit quemadmodum in omnibus inflammatoriis dispositionibus evenire solet. At in declinatione necessaria est, & multoties celebranda, idque blandis medicamentis, ut per epicrasin cacochymia in universo corpore reflagrans educatur. Ad hunc finem potio sequens præscribi poterit.

℞. Sennæ mundat. & tamarind. an. 3. β. semin. anis. & cremor. tart. an. 3. j. fol. acetos. M. β. Coquantur ad 3. v. In colatura dissolve mannæ & syrup. rosac. an. 3. j. Fiat potio per intervalla iteranda pro arbitrio Medici curantis.

Si forma boli magis arrideat, ita componi poterit.

℞. Cassiæ recenter extractæ 3. vj. cathol. duplic. 3. iij. rhabarb. pulv. & cremoris tart. 3. j. Cum saccharo fiat bolus.

Si efficacius purgare desideres; adde bolo, vel potioni rad. jalap. 3. j.

Si purgationes istæ non sufficiant ad affectum (sæpe admodum contumacem) prorsus eradicandum; ad vehementiora purgantia, ut electuar. diaphœnic. diaprun. solut. & alia hujusmodi confugiendum erit, modò febris absit. Ego semper hunc affectum sustuli postquam prædicta remedia rem absolvere nequiverant, mercurio dulci sexies sublimato, aliquoties exhibito ad gr. xx. cum scammonii vel resinæ jalappæ gr. x. Cujus curationis exemplum videre est in observationibus meis, nempe *observ. 41. cent. 3.* & unicus clyster ex vino emetico paratus hunc affectum curavit in nobili muliere, ut habetur *observ. 22. ejusdem centuriæ.*

De sudorificis idem dicendum est, quod de purgantibus jam dictum: ea nimirum in principio, augmento, & statu non esse proficua, imò verò plurimum nocere; quod vulgares Medici experiuntur, qui veri catarrhi specie delusi & morbi contumaciâ pertæsi, ad sudorifica confugiunt, unde morbus geminatur, & dolores intenduntur. Attamen in declinatione, post debitas purgationes, nullâ febre præsentē, plurimum conferre possunt: eaque parari possunt ex decocto chinæ, vel falsæ parillæ: vel prolici possunt sudores in laconico, cum vapore spiritus vini, aut decocto alicujus appropriati.

Post sufficientes evacuationes, imò dum illæ celebrantur, partium principum, & totius corporis roborationi incumbendum est, quam indicationem Galenus 1. de diff. febr. c. 9. ubi rheumaticam affectionem exponit, reliquis præferendam asserit his verbis: *Merito ergo in his curandis scopus est non evacuatio, sed totius corporis roboratio.*

Quod quidem ita intelligendum est, non quod nulla omnino competat evacuatio, (idem enim Galenus hujus affectus curationem orditur à missione sanguinis, ac si excrementa pravam qualitatem habuerint, etiam adhibet purgationem,) sed quod magis & frequentius roborantibus, minùs verò, & parcius purgantibus agendum sit. Certum tamen est, partes non posse roborari, nisi prius excrementorum illuvies, quâ onerantur, expurgata fuerit.

Illæ autem roborantia refrigerandi vi prædita esse debent; siquidem (ut antea dictum est,) fervida hepatis intemperies primam huic morbo originem præbere solet. Horum maxima supellex apud Authores invenitur. Ex his nos quatuor proponemus, quæ efficaciora, & minus ingrata existimavimus.

Primum est tinctura corallorum, cujus 3. ij. æger sumere poterit, manè, duabus horis ante pastum singulis diebus, vacuis ab aliorum remediorum usu.

Quia verò tinctura corallorum diù servari nequit ad usum longiorem in syrupum reducitur cum saccharo:



cujus cochlearia duo manè sumi poterunt : sed multo minor est illius efficacia, quàm tincturæ simplicis.

Secundus est conserva fructus cynorrhodi, quæ gustui gratissima est, hepar refrigerat, & levi adstrictione corroborat. Hanc sumere potest æger ad nucis magnitudinem, manè & serò.

Tertium est electuarium triasantali quadruplicato rheo in tabellas redactum, cujus 3. ii. singulis diebus sumi poterunt, superbibendo parum aquæ potus ordinarii.

Quantum est tinctura rosarum, cujus cyathum unum æger haurire debet semel, bis, ter, in die, longè à pasto. Illius præparatio talis est.

℞. Rosar. rubrar. siccar. 3. j. aquæ tepidæ ℥. iii. spiritus sulphur. aut vitriol. 3. i. ℞. Infundantur per horas vi. Colaturæ adde sacchar. albi ℥. 6. Servetur in vase vitreo ad usum.

Prædicta remedia, vel eorum nonnulla alternatim usurpabuntur, ne natura eisdem assuescat.

Curato affectu, prophylaxis ad aliquod tempus est necessaria, ne novâ accumulata materiâ recidiva contingat. Illa igitur præcipuè versabitur in purgatione periodicâ, semel aut bis in mense iteranda, quod commodè fiet syrupo Magistrali sequenti, qui magis alterando & roborando hepar, quàm purgando proderit.

℞ Succor. recenter expressor. & per residentiam depuratur. ex foliis endiv. cichor. agrimon. fumar. lupulor. & bugl. ℥. iii. succi pomorum redolentium recenter expressi. & depurati. ℥. ii. sennæ mund. 3. vi. epithym. 3. ii. rhabarb. elect. & agarie. recenter trochisc. an. 3. i. macis & caryoph. an. 3. 8. Infundantur, & decoquantur, ut artis est; donec colaturæ supersint quart. v. in quibus dissolve sacchar. albi quart. v. Fiat syrupus perfectè coctus, de quo capiat 3. ii. semel aut bis in mense, cum jussulo pulli, aut vituli, foliis borrag. pinpin. ceterach. & agrimon. alterato.

Venæ secti, etiam vere & autumnò erit convenientissima.

Præterea ad hepatis fervorem temperandum utilissimum erit balneum aquæ tepidæ, quod per totam æstatem frequenter erit iterandum: velut commodius usurpari valeat, semicupium sufficiet.

In eundem finem conserva cynorrhoidi, aut opiata iisdem facultatibus prædita, & tabellæ triasantali, frequenter usurpari poterunt.

His accedet optima victus ratio ex cibis boni succi & concocti facilibus, ut perdicibus, capis, pullis gallinaceis, & pipionibus; præcipuè verò jussulis & consummatis. jurebus carniū expressis, & similibus, quæ omnia sumenda sunt in mediocri quantitate, ut facilius concoqui valeant.

## P R A X E O S M E D I C A E LIBER DECIMUS-SEPTIMUS.

### D E F E B R I B U S.

#### P R A E F A T I O.

**M**AGNA à non paucis Authoribus circa febrium theoriam & therapiam volumina conscripta inveniuntur; in quibus controversiæ innumerae, & arduæ disputationes agitantur. Quæ, ut in scholis utilissima sunt, imò & necessaria; ita plerisque Medicis extra Academias artem exercentibus, tedium pariunt. Illi siquidem brevem atque dilucidam morborum theoriam expetunt, quæ eorum naturæ, causis, & signis, t. m. diagnosticis, quàm prognosticis intelligendis, & curationi (cui toti incumbunt) ritè obeunda sufficiat. Nos in toto hoc opere, votis eorum satisfacere conantes, omnes controversias ablegavimus, earum tantum, quæ ad praxin maxime necessaria visa sunt, decisiones breviter exponentes. Quod etiam in febrium expositione observavimus: & prætermis omnibus controversiarum ambagibus, quæ in scholis ad nauseam continuò tractantur, ea tantum quæ ad praxin maxime faciunt, exposuimus. Hunc verò Librum clarioris doctrinæ gratiâ in tres sectiones distribuimus, generalem illam divisionem sequentes, quâ febres dividuntur in simplices, putridas, & pestilentes. Atque adeò hujus Libri Sectio prima, febrium simplicium; Secunda, putridarum, Tertia verò, pestilentium explicationem continebit.

#### S E C T I O P R I M A.

##### De Febribus simplicibus.

#### P R A E F A T I O.

**F**ebri, quæ simplex nominatur, in tres species subdividitur, quarum alia dicitur ephemera; alia synochus simplex, seu imputris; alia verò hectica. Ideo hujus sectionis tria erunt capita. Primum, febris ephemeræ: Secundum, synochi simplicis: Tertium, hecticæ naturæ & curationem explicabit.

#### C A P U T P R I M U M.

##### De Febre ephemera.

**F**ebri ephemera plerumque generatur à causis externis, & corporis animique motibus vehementibus, ut ira, curis, labore, dolore, vigiliâ & inediâ, quibus spiritus inflammantur: Item somno & mœrore, quibus humores & vapores calidi intus coercentur: Item calefactione, à Sole, igne, hypocausto, quibus fervidus aer inspiratione attractus, & per insensiles poros admissus, spiritus inflamat: Item crapulâ, & præsertim cibo potuque calidiori, magnâ copiâ sumpto, ut piperatis, & vino generoso, quibus vapores suscitantur plures, quàm exhalare queant. Item excrementorum calidiorum retentione, non solum fecum & urinæ; sed præcipuè fuliginum, quæ per halitum excludi solent, si pori insensiles claudantur à frigore, balneo aluminoso, & similibus.

A causis etiam internis generatur febris ephemera: ut bubone, aliisque crurum, aut brachiorum tumoribus, præcipuè dum suppurantur; extremitatum erysipellate, quando materia calido loco conclusa, non sua putredine, sed tantum qualitate cor afficit. Item vasorum obstructione levi, quâ fuligines retentæ febrem accendunt; ut in distillationibus solet fieri, dum illæ in calidis naturis, aut densiori corporis habitu contingunt. Hanc febrem significant tum ex enumeratis causa aliqua prægressa; tum pulsus celer, frequens, magnus, respiratio etiam magna & frequens, capitis dolor, frigoris & humoris absentia, nec non lassitudines spontaneæ, aut inappetentiæ. Aliquando tamen rigor aut horror adesse potest, in iis videlicet, quæ à solis ardore, vel frigore initium habent. Calor etiam adest tangentibus suavis, ac blandus, urina concocta, naturali similis, nisi ab obstructione, vel cruditate immutetur. Intra 24. horas plerumque solet terminari, cum molli sudore, licet ali-



quando ad tertium diem extendatur : quem si transgrediatur, in synochum simplicem, aut putridam, vel hecticam degenerat.

Ad illius curationem Antiqui maximè utebantur balneo aquæ tepidæ, cujus etiam in statu sano usus erat frequentissimus. Sed cum nostris temporibus abierit in consuetudinem; in huiusmodi febre etiam obsolevit, & minimè tutus habetur, propter pléthoram, cacochymiam, putredinem, aut fluxionem, quæ in talibus corporibus possunt existerre, aut timeri ne accendant.

Potius curatur huiusmodi febris victu refrigerante & humectante, ut cremore hordei, iusculis refrigerantibus potu hydrosacchari, ptisanæ vulgaris, aut aquæ fontanæ, cum syrupo limon. aut capill. ven. permixto.

At verò pro causarum varietate curatio aliquantulum varianda est. Sicque ephemeræ ab æstu, vel Solis ardore, competit victus refrigerans : translatio ægri in locum frigidiorum; & oxyrrhoidinum fronti, sincipiti & temporibus admotum, si dolor adfuerit, qui ab insolatu ut plurimum generari solet.

Si à frigore producat præsertim cum æger ab exercitio æstuans in aerem frigidiorum repente sese contulit; sudor provocandus est, maximè in fine accessionis.

Si à cutis densitate & pororum occlusionem; eadem debetur curatio, & utrique huic causæ vinum oligophorum valdè dilutum concedendum est, quia meatus aperit, & sudoris provocationem adjuvat.

Si à labore duxerit originem, quies imperanda est, & victus uberior, ac concoctu facilis concedendus. Si à lassitudine; frictiones celebrandæ. Iræ, animi tranquillitas & hilaritas opponenda est, bilisque frænanda cibo & potu refrigerante. Tristitiæ eadem animi recreatio convenit, & vini tenuis usus. Si à vigiliis febris duxerit originem, somnus erit conciliandus. Si ab inedia, victus euchymus & refrigerans instituendus. Si à crapula vel cruditate, inedia & cibi abstinentia conferet, non omisso stomachum roborantibus, sumptis & admotis : necnon clystere molliente & laxante cruditatis portio erit auferenda; Si corruptio metuatur; vomitus proritandus est, vel purgatio instituenda. Si fiat obstructio; advertendum est, num pléthora, vel cacochymia redundet: hisque phlebotomia, aut purgatio decernenda est. Et si obstructio facili non resolvatur, in alias febres morbus degenerat, quarum curationes suis locis erunt describendæ.

## CAPUT II.

### De Syncho simplici.

**C**Ausæ ephemeram excitantes si incidant in corpus plethoricum, & denso habitu præditum, febrem synochum inducunt. Solus tamen sanguis abundans venas infarciens, pluresque vapores produciens, quàm expirare valeant, hanc febrem producere potis est.

Hanc significant corporis habitus crassus, tumidus: color corporis & faciei rubicundus, capitis dolor tensivus; somnolentia, pulsatio temporum, inquietudo, pectoris angustia, respiratio difficilis & frequens, pulsus magnus, æqualis, frequens, plenus, venæ sanguine turgidæ, unde lassitudo tensiva oritur; urina crassa, colore à naturali parùm recedens, sed paulò rubicundior; calor ad tactum mitis, halituoso vapore perfusus, febris æqualiter procedit: nempe vel in eodem tenore persistit; vel decrescit paulatim, vel crescit æqualiter non per intervalla remittit. Unde tres illius petuntur differentiæ. Quæ enim continuò augetur, epacmaistica: quæ continuò decrescit, paracmaistica: quæ eundem tenorem servat, homotonos seu acmaistica nominatur. Ad quartum diem extenditur, & aliquando ad septimum, tum hæmorrhagiâ, vel sudore terminatur, ac si ulterius protrahatur, in Synochum putridam degenerat.

Illius curatio sanguinis evacuatione, refrigeratione, & meatuum aperture perficitur. Galenus 9. *meth. c. 4.* duobus remediis eam absolvit, missione sanguinis ad animi deliquium, & aquæ frigidæ largo potu.

Venæ sectio in hoc affectu absolutè necessaria est, cum à sanguinis copia generetur: eaque statim celebranda quacumque horâ vocatus fuerit Medicus, nisi ventriculus cibus refertus fuerit, quorum concoctio expetenda est per aliquot horas. Et licet copiosè sanguis mittendus sit, dicatque Gal. *loci supra citato*, se plerisque hac febre laborantes subito curasse, phlebotomia usque ad animi deliquium institutâ, quam sequebatur alvi fluxus, vomitus biliosus, & sudor copiosus. Attamen nostris hisce temporibus obsolevit longior illa sanguinis evacuatio, quæ non vacat periculo, cum referat ipse Gal. *lib. de cur. rat. venæ sect. c. 12.* tribus Medicis contigisse, talem phlebotomiam celebrantibus, ut pro animi deliquio mors adveniret. Satiùs igitur repetitis vicibus eam sanguinis quantitatem educere, quæ ad morbi curationem necessaria est.

Ante venæ sectionem, si alvus non sit libera, aut intestina cruditatibus scateant; clyster emolliens & laxans injiciendus est.

Aquam frigidam quod attinet, eam Galenus tantâ copiam exhibendam esse præcipit, ut æger palleat, tremat, & toto corpore refrigeretur: sicque alferit eam calorem igneum extinguere, solidas partes roborare; inutiles humores per alvum, per urinas, & per sudores externere. Ad illius autem exhibitionem multas cautiones adhibendas præcipit, nempe, ut in vigore febris, concoctionis lignis apparentibus, exhibeatur; ut æger per sanitatem frigidæ assuetus sit, firma habeat viscera, & succi plena; corpus eusarcum & quadratum; viribus polleat validis atque constantibus, non sit refertus crassis viscidisque humoribus, neque tumorem aliquem habeat in visceribus, neque ventriculus, gula, aut nervosum genus debilia sint. Alioqui si conditiones istæ defuerint, periculum est, ne in spirandi difficultatem, hydropem, tremorem, convulsionem, lethargum, aut alium gravem affectum præcipitur. Obsolevit etiam hoc remediis genus nostro hoc sæculo, cum omnes istas condiciones observare difficile sit, & ex præpostero illius usu tanta imminuantur pericula. Satiùs enim est aliis remediis sanguinem, & totum corpus refrigerantibus, iis, que tutioribus uti; ut julepis, & aperientibus emulsionibus, epithematis, linimentis, & omnino victu refrigerante. Julepi parantur ex decocto hordei, aut acetosæ, & cichoraceorum, vel aquis cichorii, indiviæ, acetosæ, lactucæ, additis syrups de cichorio simpl. limon. granat. oxyfaccharo, &c. Quibus etiam, ad maiorem aperiendi & refrigerandi vim in iis conciliandam, guttulæ aliquot spiritus vitrioli, aut sulphuris addi possunt. Si aquæ destillatæ crudiores videantur; leviter bulliant cum modico specierum trasantali, vel diamargariti frigidi.

Emulsiones in hunc modum parari poterunt.

℞. Amygd. dulc. excorticat. & macerat. in aqua ros. ʒ. i. quat. sem. frig. maj & papav. albi, an. ʒ. ii. Contundantur in mortario marm. sensim affundendo aquæ hordei ʒ. i. ʒ. ii. In colat. dissolve sacchari rosac. ʒ. iii. Fiat emulsio pro tribus dosibus, bis in die sumendis. Quæ maximè conveniet, & julepis præferetur, si vigiliæ adfuerint.

Epithemata, cordi & hepati admovenda, in hunc modum parantur.

℞. Aquæ rosar. buglossi, & lactucæ, an. ʒ. iii. aceti rosac. ʒ. i. pulv. elect. diamarg. frig. ʒ. i. sem. camphoræ g. vi. Fiat epithema, admovendum regioni cordis.

℞. Aquar. endiv. cichor. acetosæ, an. ʒ. iii. aceti rosac. ʒ. i. sem. trium santal. ʒ. ii. sem. Fiat epith. admovendum regioni hepatis.

Linimentum refrigerans hepati & lumbis admovendum, ex oxyrrhodino, unguento rosaceo, refrigerante Galeni, vel cerato santalino, oxycrato ablutis.

Si morbus protrahi videatur, à phlebotomia purgatio instituenda est, ne serosa & biliosa excrementa putrescant, indeque putrida febris oriatur. Remedia tamen usurpanda, quæ citra calorem & agitationem id præstent, ut cassia, manna, syrupus rosac. tamarindi, catholicon, & similia.

Huic accedat conveniens victus ratio: nempe refrigerans & humectans, eaque tenuis, ex iusculis cum herbis refrigerantibus paratis; prunis & pomis acidis coctis, cremore hordei, vel panatellis.



Potus sit decoctum hordei, aqua simplex cocta, vel in quam panis immersus sit; vel cum syrupo capill. ven. limonum aut granat. permixta.

## CAPUT III.

### De Febre hectica.

**H**ECTICA febris, seu habitualis, occupat partes solidas, quæ corporis habitum constituunt, & vulgò dicuntur spermaticæ, vel carnosæ: tum etiam ratione illarum partium magis fixa est & radicata quàm aliæ, quæ sunt in spiritibus aut humoribus. Eam quoque ob causam habitualis dicitur, quòd in habitu consistat, ac difficilè à subiecto removeri possit.

Multiplices habentur hujus febris divisiones. Primò enim alia est hectica primaria, quæ à principio invadit: alia secundaria, quæ in aliis febribus succedit. Secundò, febris hectica vel simplex est & solitaria; vel febris putrida complicata. Tertiò, alia à corde incipit: alia ab aliqua parte, ut pulmone, hepate, liene, renibus, utero, aliisque partibus inflammatis, ulceratis, corruptis, aut aliquo alio gravi morbo obfessis. Et hæc febris quamvis  $\frac{2}{3}$  habeat in corde & toto corpore, symptomatica tamen vulgò dicitur, propter primam originem, quam ab aliis partibus sortita est.

Tres hecticæ gradus constituuntur à Galeno. Primus est ipsum febris hecticæ initium, in quo vix corpus extenuatur: rorida tamen corporis humiditas effervescit, absumitur, & exsiccat. Secundus complectitur augmentum, in eoque est evidens corporis extenuatio, & carnosæ atque adiposæ substantia colliquatur. Tertius statum morbi, & postremum illius tempus continet: nunquam enim vergit ad declinationem, cum in eo gradu sit incurabilis, tum namque substantia corporis fibrosa & membranosa consumitur, corpusque ita extenuatur, ut facies Hippocratica sit, & ossa pellibus tantum circumtectæ appareant. Postremus iste gradus marasmus nominatur, vel potius hectica marasmodos: cum in vero marasmo frigiditas cum siccitate conjungatur.

Causæ febris hecticæ dividuntur in externas & internas. Ad externas referuntur, quæcunque reliquas etiam febres generare possunt, si continua & vehemens sit calefaciendi actio, vel corpus huic febre concipiendæ aptum occurrit. Tales sunt calor Solis, aut ignis, exercitium vehemens, cibi & potus calefacientes, excretiones immodicæ, ut in diarrhœa, & dysenteria; animi pathemata vehementiora, ac denique inedia in corpore bilioso, calido & sicco; cum dicat Galenus: Diatritarios hujusmodi corpora in febres ardentes & hecticas, abstinentiâ cibi triduanâ perduxisse.

Causæ internæ sunt febres ardentes & pestilentes, quæ humidum cordis absumunt celeriter. Tum febris lenta diuturna. Tum etiam affectus peculiaris alicujus visceris: ut inflammatio, ulcus, vel putredo alicujus humoris in eo contenti: vel denique ipsius membri corruptio, quæ febrem lentam & hecticam facere solent.

Horum affectuum, membra peculiariora obsidentium, & febrem hecticam producentium exempla habemus satis manifesta. Nam quòd inflammationes attinet: Galenus ex inflammatione septi transversæ hecticam vidisse refert. Ex ulcere verò hecticam complicatam in phthisi quotidie animadvertimus. Putredo humoris, in viscere contenti, fit in obstructionibus magnis vel abscessibus frigidis. Membri denique corruptio in pulmone sæpè contingit; aliquando in jecore, in hominibus vinosis, & qui calidis multis utuntur aromatibus: Sanies enim quædam in hepate gignitur, quâ illius substantia corrumpitur. Hanc febrem se aliquando vidisse Fernellius affirmat, & signa illius esse dicit, quòd vinum avidissimè cupiant, carnes verò maximo odio prosequantur.

Cognoscitur febris hectica simplex, quòd continua sit, sine ulla accessione, semper sibi similis, non crescens, nec decrescens, nisi quòd augeatur una, duabus, aut tribus horis à cibo. Calor in hypochondriis primo tactu mitis, post

acer, mordax, aridus. Pulsus parvus, frequens, & celer, febrem non percipiunt ægri, pigri sunt, & ad motum desides, & cum difficultate moventur, eò quòd virtus languet. Arteriæ calidiores sunt partibus circumstantibus, quòd tactu post lotionem ex aqua frigida dignoscitur. Urina naturali similis est, tum colore, tum sedimento. In progressu oleosa supernatant, & sedimenta farinacea sunt, quòd est signum colliquationis.

Speciatim verò non solum singulos gradus; sed etiam imminens febrem hecticam ita dignoscere possumus.

Imminens febris hectica dignoscitur, si causæ prædictæ præcesserint: nempe si febris ardens in corpore calido, sicco, raræ contexturæ, aëre æstuante præcesserit; periculum est, ne æger in febrem hecticam incidat. Et remedia eam præcaventia usurpanda sunt.

Primus hecticæ gradus, si cum putrida fuerit conjuncta, difficillimè dignoscitur: si sola sit, non facilè. Prima die omnia signa ephemeræ: die sequenti augetur ariditas, non calor. Tertiâ die non repetit, non aucta evidenter, non diminuta. Ac tandem unâ, aut duabus horis post cibum, caliditas nonnihil aucta apparet.

In secundo gradu æger non percipit se febricitare, quamvis percipiat alterationes à cibo. Ariditas manifesta est, pulsus minor & celerior, cum duritie quadam.

Tertii gradus signa sunt manifestissima: oculi concavi, sordes in iis siccae. & squalor, ossium prominentia conspicua, vividus flos coloris extinctus, universa arida præcordia vehementer contracta, ut videantur carere intestinis. Pulsus sentitur sub ventriculo in omnibus extenuatis.

Quia verò febris putrida cum hectica non rarò copulatur: utraque exactè distinguenda est, cum maximè sit incuratione momenti, quæ admodum varia tunc temporis existit. Hæc autem complicatio dignoscetur, comparando signa hecticæ proposita cum signis febris putridæ, quæ infra suo loco describentur.

Primus gradus facilè curatur. Tertius, ut dictum est, incurabilis est. Secundus medio modo se habet, & quo magis accedit ad primum, vel tertium, ita facilius, aut difficilius curatur. Frequentius accedit febris hectica à decimo octavo anno ad trigésimum quintum: eo enim tempore calor intensior est, faciliusque marcorem inducit. Qui verò ante hanc ætatem, vel paulò post, hecticâ corripuntur; facilius evadunt ac nonnunquam curantur; vel longo tempore palliatione vitam protrahunt, præcipuè verò mulieres.

Ad curationem hujus febris primum advertendum est, num hectica pendeat à partis alicujus morbo: tunc enim curatio ad eum morbum dirigenda est. Tum etiam, num simplex ea sit, an complicata cum febre putrida. Et in hoc casu, putrida primum tollenda est venæ sectione & purgatione, nec non remediis aperientibus, & putredinem inhibentibus, febre interim hecticâ non neglectâ. At verò, si simplex & solitaria sit febris hectica; solis refrigerantibus & humectantibus, nec non analepticis curatio absolvitur, quorum materia ex diætâ & pharmaciâ erit desumenda.

Diætâ, ut in omnibus chronicis affectibus multum potest, in hoc præsertim plus præstat, quàm medicamenta. Illa idcirco exactè præcipienda est, ut scilicet ad totius corporis refrigerationem & humectationem dirigatur. Aër itaque, si naturâ suâ mediocriter frigidus sit, vel temperatus, tali utendum est: sin minus, corrigendus, ita ut ad frigidum & humidum declinet: Ea ratione Galenus 10. meth. c. 8. æstatis tempore, aëre existente calidiori, ægrum degere præcipit in loco subterraneo, qui frigidissimus sit & maximè perflatus, & ad Septentrionem vergens. Quò solo remedio nos hecticum, extremâ macie confectum, intra mensem restitutum vidimus. Deinde caliditas aëris in conclavi alteranda est aquâ frigidâ de vase in vas transfusâ, cujus etiam strepitu somnus conciliatur: tum etiam pavimento aquâ frigidâ subinde asperso, vel herbis refrigerantibus in illo frequenter sparsis: turbâ quoque hominum ingredi prohibita: nam hoc quoque cubiculum calefacit. Quando verò aër frigidissimus est,

eum



cum esse admittendum Galenus præcipit, quatenus respirando attrahitur, ut qui calorem cordis maximè refrigeret; quamvis minimè conferat, quatenus extrinsecus ægrum contingit, quòd cutis poros condenset, & transpirationem prohibeat. Attamen majus fore ex frigida inspiratione commodum affirmat, quàm ex cute condensata incommodum, præsertim cum illud vitari possit, operimentis corpus probè muniendo. Adverte tamen si febris hæctica fuerit ex ulcere pulmonis, aërem frigidum non convenire, ratione ulceris, sed temperatum; in activis, ad calidum vergentem: in passivis, siccum. Quà ratione Galenus phthisicos mittebat ad Tabias, montem Vesuvium dictum, ubi aër siccior erat.

Cibi esse debent refrigerantes & humectantes, citoque nutrientes: juscula pulli, gallinæ, capi, vituli, hœdi, vervecis, vitelli ovorum cum hordeo mundato, lactuca, portulaca, endiviâ, borrag. acetosa, carnes vituli, hœdi, porcelli, phasiani, perdicis, lepusculi, & similibus: panatellæ, hordeata, avenata, oryzata, cum saccharo, & paucis amygdalis, vel potius cum sem. frig. majoribus. Carnes elixæ præferuntur assis, quæ facilius inflammantur, & in bilem vertuntur: elixa magis humectant. Si tamen assis æger delectatur; ea minùs coquenda sunt, & temperanda succo limonum, citri, arantiorum, vel omphacio insulso.

Pisces usurpari poterunt, quia refrigerant & humectant. Sed eligendi saxatiles & qui tenera carne sunt præditi, in mari, aut aquis puris natantes.

Inter fructus poma laudantur, quia frigidum sanguinem generant. Conveniunt quoque pyra, pruna, damascena, & briniolensia, cocta cum saccharo: tum etiam passulæ mundatæ quæ in sequentem modum præparatæ, alunt citra calefactionem.

℥. Passul. mundat. ℔. j. Temperentur in aqua endiviæ, buglossi, & rosar. & abluantur diligentissimè, ut vis laxandi amoveatur. Postea in iisdem aquis decoquantur leviter, addito paucis saccharo ad perfectionem, cum quo servantur usui, iisque utatur æger manè & post singulos pastus.

Quia verò hæctici infixum habent solidis partibus calorem, quo alimenta facilè & promptè dissipantur, illis ideo præscribere solent practici alimenta solida & viscosa, extremitates animalium, carnes limacum, cancerorum, testudinum, ranarum. Cum enim illæ carnes viscosæ sint & humidæ; facilè agglutinantur partibus, nec facilè absumuntur à calore febrili: sicque partium solidarum siccitatem remorantur. Non desunt tamen, qui hæc alimenta rejiciant, quia ægrè concoquuntur, & magnum ventriculo negotium faciunt. Quod dissidium ita conciliatur. In hæctica incipiente, dum adhuc robusta est facultas coctrix, conveniunt hæc alimenta crassa & viscosa. In confirmata verò non sunt exhibenda: quòd difficilè concoquantur. Adde, quòd ita præparata & elaborata exhibeantur, ut facilè concoqui possint, nempe vel elixantur ad consumptionem, vel contusa ex illis parantur. Inter alia testudines terrestres maximè laudantur, ad hæcticas febres, non solum simplices, sed tabificas; & variis modis præparantur. Vel enim in aqua decoquuntur, donec dissolvantur. Mox corticibus abjectis, caro ab ossibus separata rursus coquitur, cum cichorio, acetosa, borragine, hordeo mundato, & prunis in hæctica simplici. Ac in hæctica pulmonis coquitur cum foliis rubi, portulacæ & plantaginis. Jus bibatur, & carnes edantur per dies viginti. Vel contusum ex iis paratum, vel conficiuntur pastili ex carne testudinum cocta in aqua hordei cum amygd. dulcibus, pineis, sem. frigidis & saccharo, qui leviter concoquuntur in furno, & in prandio ac coena exhibentur. Formula talis esse poterit.

℥. Carnis testudinis in aqua hord. elixatæ, ℥. jv. amygd. dulc. infus. in aqua ros. ℥. vj. pineor. eodem modo infus. ℥. ij. quat. sem. frig. maj. an. ℥. j. anisi non pulverati, sed in furno leviter cocti ℥. j. sem. cinnam. ℥. ij. sacchari in aqua ros. dissoluti ad pondus omnium, fiant morsuli.

Loco testudinum usurpatur pulpa caponis & perdicis, sitque confectio, quæ vulgò *pasta regalis* nominatur, ad hæcticos instaurantos idonea, in hunc modum.

℥. Pulpæ caponis & perdicis elixatæ, an. ℥. jvj. amygd. dulc. in aqua ros. macerat. ℥. jv. pineorum ℥. j. sem. papav. albi ℥. ii. gummi arabic. & tragacanthæ, an. ℥. i. manus Christi perlætæ ℥. ii. Cum pauca aqua rosarum, fiat pasta regalis, auro obducta.

Iis qui infirmiores habent ventriculum, gelatinæ jura & destillata instaurantia exhibentur. Gelatina in hunc modum parari poterit.

℥. Caponem electum, poplitem vituli, vel femur vervecis, pedes vituli nu. 2. aut vervecinos nu. 9. Coquantur in aqua fontana ad sufficientem consumptionem. Jusculum coletur per expressionem, & pinguedo removeatur. In colat. dissolve sacchari albi ℔. i. albumina ovorum. 6. croci, vel cinnam. parum. Agitentur simul. Postea bulliant leviter, ac transmittantur per manicam Hippocratis bis aut ter. Tandemque jusculum excipiat in vasculis, ubi concreset in gelatinam. Si croci aut cinnamomi sapor displiceat, vel magis refrigerantem gelatinam desideres, adde eorum loco succum limonis vel citri unius.

Jura instaurantia variis modis parari possunt. Hoc cæteris longè præstat.

℥. Caponem benè habitum. Deplumetur, exentretur, ac in frusta dividatur, à quibus pinguedo & pellis detrahantur. Adde, si vis, carnem vituli aut vervecis etiam in frusta divisam, & ab omni pinguedine liberam. Ponantur in olla vitreata, in cujus mediò sit craticula ex ligno aut alia materia confecta, super quam frustula dicta ita concinnentur, ut ollæ fundum vacuum remaneat. Postea olla optimè clausa suo operculo, probè lutato cum farina, aqua subacta ponatur in B. M. bulliente per quinque horas. Distillabit in fundum jus limpidum, cujus cochlearia duo vel iii. cum jusculis, aut per se, ter aut quater in die exhiberi poterunt.

Hujusmodi carniū distillationes per descensum factæ hæcticis instaurantis sunt valdè idoneæ. Quæ verò per ascensum fiunt, licèt spiritus reficiant, minimum tamen nutriunt, ac solidam substantiam non restaurant.

Potus sit aqua hordei, vel sola, vel cum syrupo acetoso, aut granatorum mixta, vel aqua panata cum paucis saccharo. Si tamen ventriculus admodum infirmus fuerit; vinum aquosum & valdè dilutum concedendum est, quod coctionem, & distributionem juvat. Galenus 10. meth. cap. 5. & 6. aquam frigidam exhibet, eaque se multos à marasmo præservasse gloriatur. Attamen in illius exhibitione maxima cautio adhibenda est. Dum enim corpus valde extenuatum est, metus est ne pusillus calor omninò extinguatur; Idcirco imminente hæctica tantum conferre potest, aut in ejus principio, & in assuetis, & in corpore adhuc satis copioso sanguine referto.

Motus corporis non convenit; sed quies potius imperanda est, quamvis ante cibum, si vires ferant, idoneum esse possit leve aliquod exercitium, aut ejus loco molles frictiones, non multæ, institui possunt, præcipuè statim à somno, incipiendo ab inferioribus partibus; nam internos humores ad exteriora evocant. Et fricandus tantum æger, donec levis rubor apparere incipiat: nam si ulterius pergatur, corpus exsiccabitur. Coitus in primis fugiendus est, quo corpus maximè resolvitur.

Somnus nec longior, nec brevior sit. Nam longior viscerum calorem auget, recurrente ad interiora calore: brevior corpus magis exsiccatur. Minùs tamen incommodi ex paulò longiori, quàm ex justo breviori oritur; quia somnus valdè humectat, quod in hac febre maxime expetendum est. Dormiat æger in molli strato, eoque laneo, non plumeo, commodamque latitudinem habente. Lintea sæpe immutet; quæ aquâ rosarum antea irrorata fuerint.

Alvus si pigrior fuerit, proritetur glande aut clystere ex jusculo pulli cum hordeo, malva, & violaria parato: addendo cassiam, mel violaceum, butyrum, & vitellos ovorum.

Denique animus in tranquillitate & hilaritate servandus est, fugiendo vehementes animi perturbationes: ut iram, tristitiam, metum.



Ex pharmacia desumuntur medicamenta, hecticis idonea, tum interna, tum externa. Inter interna, primum purgantia consideranda sunt: cum adjectio hinc magis necessaria sit, quam detractio, vix ea convenire possunt, nisi hæctica putrida adjuncta sit. Si tamen prima regio excrementis referta videatur, propter cruditates à debili ventriculo productas; tunc purgatio insitui poterit cassia, manna, aut syrupo rosaceo. Imò verò aliquando, si vires non sint debiles; exhiberi poterit infusum rhei: cum decocto prunor. tamarind. myrobal. buglossi & violar.

Alterantia verò medicamenta in formam juleporum, jusculorum, & emulsionum redigi poterunt in hunc modum.

℞. Aquar. endiv. lactucæ, acetosæ, an. ℥. iv. syrupi violacei, nymphaeæ, pomor. an. ℥. i. Misc. Fiat julep. pro tribus dosibus bis in die sumendis, & per plures dies continuandis. Vel

℞. Hord. integ. P. i. fol. endiv. cichor. lactucæ, pimpinellæ, ana M. i. flor. borrag. buglossi. violar. & nymphaeæ, ana P. i. prunor. damasc. par. iii. Coquantur ad ℥. i. β. In colat. dissolve syrupi de cichorio simplicis, & de nymphaea, ana ℥. ii. Fiat julep. pro iv. dosibus.

Ex iisdem simplicibus cum pullo gallinæ, vel gallinæ juniori decoctis parari potest jusculum ad eundem usum. Vel

℞. Rad. chinæ ℥. i. β. hordei integri P. ii. quat. sem. frig. maj. ℥. β. Contundantur, iisque impleatur venter capri, aut pulli junioris. Fiat jusculum; cui adde sacchari ros. ℥. β. Capiat per longum tempus. Reficit, & impinguat.

℞. Amygdal. dulc. excortic. & in aqua frigid. infusar. ℥. i. sem. quat. frig. maj. & papav. alb. ana ℥. i. Contundantur in mort. marmor. sensim affundendo aquæ hord. ℥. i. In colat. dissolve manus Christi perlata ℥. iv. Fiat emulsio pro tribus dosibus.

Si intensius refrigerare est animus: adde unicuique dosi julepi, vel emulsionis, salis prunel. ℥. ii. vel ℥. j.

In usu refrigerantium hoc observandum, ni potentiora statim, & frequenter usurpentur, calorem enim debilem possent extinguere. Utilius autem est sensim; quam subito refrigerare. Humectantia verò semper tutiora sunt, quam refrigerantia, quia lente suas exercent operationes.

Dum prædicta remedia usurpantur, viscerum corroboratio incumbendum est opiata convenienti, quæ in hunc modum confici poterit.

℞. Conservæ flor. borrag. buglossi, & violar. ana ℥. i. conservæ flor. nymph. ℥. β. pulv. electuar. diamarg. frig. ℥. iv. rasuræ eboris, ossis de corde cervi, ana ℥. β. margarit. præp. & corall. præp. an. ℥. i. fol. auri, num. iii. Cum syrupo de pomis, fiat opiata.

In summa extenuatione, clysteres nutrientes frequenter injiciendi sunt, ex jusculo pulli, vel capitis vervecis, cum saccharo & vitellis ovorum. Eorum autem quantitas exigua esse debet, alioqui compressis intestinis vim expultricem irritant.

At inter cætera remedia, hecticis maximè idonea, lac principem locum obtinet, cum omnibus dotibus præditum sit, quæ in hoc morbo desiderari possunt, quippe quod refrigerandi & humectandi vi præditum est: multum nutrit; & facillè distribuitur. In illius usu eadem cautiones adhibendæ sunt quæ in phthiseos curatione fuerunt propositæ.

Inter remedia externa balneum aquæ dulcis primas obtinet; potenter enim refrigerat & humectat, partesque externas relaxat, ut promptius alimentum excipiant. Apud veteres balneorum usus erat frequentissimus, & quatuor partes habebant. In prima, nonnihil calidâ, exuebantur. In secunda erat solum aquæ calidæ. In tertia solum aquæ frigidæ. In quarta verò sudores, & madores abstergebantur. Galen. 10. meth. c. 19. harum balnei partium usum ita moderatur, ut ægri in primam partem balnei deducantur, quæ vapore balnei incalescat, ut pori aperiuntur, deinde oleo dulci perfusi, in aqua calida immergantur ad corporis humectationem: post repente in aquam frigidam injiciuntur, subitoque educantur, exsiccentur oleoque inungantur, ut poris condensatis humiditas inducta retineatur.

Lazar. Riverii Opera.

At verò cum jam diu obsoleverit illa antiquorum in balneorum usu diligentia, à Practicis etiam nostris derelicta est illa hecticorum balneandorum methodus, quæ nec fastidiosa judicatur. Si quidem metuendum esset, ne frigida occursu repentino corpus læderetur, ægerque subitum contrariarum qualitatum occursum ægrè ferret. Consultius enim, & compendiosius ab iis factum est, dum ægros in balneum aquæ moderatè calidæ conjiciunt, manè, depositis excrementis naturâ vel arte, duabus vel tribus horis post assumptum jusculum, vel lac, vel vitellos ovorum: in quo tamdiu æger immorari debet, donec spontè tepescat; ac tandem refrigeretur. Cum enim Galenus balneum frigidum post calidum adeò necessarium censuerit, ut calidum sine frigido nihil prodesse existimet: frigida vices suppleantur, si tamdiu æger in balneo moretur, donec spontè tepescat, & refrigeretur. At si nimis tardè hæ mutationes fiant, ut æger tædio afficiatur; aquæ frigida affusione balneum ad libitum tepescere & refrigerari poterit. Hæc tamen cautio adhibenda est, ut cum triplex qualitas in eodem balneo haberi possit, æger in calida parùm immoretur, in tepida diutius, in frigida minimum.

Licet autem antiqui ex aqua simplici balnea parare consueverint, utilius tamen est ea magis humectantia efficere, decoctis in iis herbis emollientibus & humectantibus, ut malvâ, althæa, violaria, &c. vel hordeo & amygdalis contusis præcipuè æstatis tempore, quia balneum, ex decocto herbarum citius corrumpitur. A balneo æger linteis medioculis molliter detergendus est. Postea verò inungendus oleo violaceo, amygdal. dulc. cum butyro insulso. Postmodum ubi parùm requieverit, jusculum, vel aliud ferculum ei exhibendum est.

Balneum ex hydrelæo à Zacuto Lusitano maximè laudatur observ. 35. lib. 3. Praxis admiranda, eoque asserit juvenem quendam curatum fuisse, cui balneum ex aqua simplici, & lac caprinum nihil profuerant. Tantæ utilitatis rationem ex eo desumit, quod balneum ex aqua dulci paratum, cui olei copia adjuncta sit, tenas partes emollit, fittas & arefactas humectat, & poros obstructos, ac præ siccitate convenientes aperiendo, ad extimas, maximèque distantes corporis partes, alimentum attrahit.


Quando æger non potest uti balneis, admoveantur epithemata cordi, & hepati, in hunc modum composita.

℞. Aquæ rosar. nymphaeæ: & portulac. ana Unc. iij. succi granatorum ℥. i. pulv. electuar. diamarg. frig. ℥. ii. ossis de corde cervi ℥. i. camphoræ g. iv. Fiat epithema, cordi admovendum.

℞. Aquar. endiv. lactucæ, & cichorii, ana Unc. ij. acetî rosac. ℥. i. trium santal. an. ℥. ij. spodi ex ebore ℥. i. Fiat epithema, hepati admovendum.

Poterit etiam inungi regio hepatis unguento rosaceo, vel cerato santalino. Verum oleis & unguentis parcius utendum, quia febrem aliquando augere possunt.

Inter symptomata, quæ huic morbo supervenire solent, præcipuum est alvi fluxus, qui ægros ad interitum solet perducere. Qui quidem frænandus est decocto hordei excorticati & tosti, pro potu ordinario, syrupo cydoniorum, rosar. fittarum, lacte chalybeato, oryzâ coctâ in lacte, & similibus.



## S E C T I O II.

### De Febribus putridis.

#### P R Æ F A T I O.

**F**ebres putridæ dividuntur in continuas, & intermittentes. Continuæ generantur, quando putridus vapor, seu calor præter naturam, qui è putrescentibus humoribus oritur, continuo cor affligit, calorémque continuum in eo excitat, unde etiam febris calor in universum corpus continuo diffunditur. Intermittentes verò fiunt, quando iidem vapores per intervalla quædam ad cor deferuntur.

Continuæ rursus dividuntur in essentielles, seu primarias & symptomáticas. Primariæ, seu essentielles dicuntur, quando

H h h

putredo



putredo in venis communibus, & extra partes privatas accenditur. Symptomaticæ verò, quando in parte peculiari inflammata putredo, aut suppuratio fit: è qua ob vasorum communionem vapor putridus cordi continuò communicari potest; quales apparere solent in pleuritide, peripneumonia, hepatide, aliarumque partium internarum inflammationibus. Continuæ primariæ rursus duplices sunt. Aliæ enim sine ulla exacerbatione, aut remissione, à principio ad finem porriguntur, & *συνόχοι* seu continentes appellantur. Aliæ verò manifestas habent exacerbationes & remissiones, & *συνεχῆς* seu continuæ, generis nomine solent appellari. Et illæ rursus ab exacerbationum, & remissionum diversitate, in tres species dividuntur. Aliæ enim tertianæ continuæ dicuntur, quæ tertio quoque die exacerbantur. Aliæ quotidianæ, quæ singulis diebus. Aliæ verò quartanæ, quæ quarto quoque die reduplicantur. Intermittentes etiam in tertianas, quartanas, & quotidianas dividuntur, prout earum paroxysmi tertio, vel quarto quoque die, vel singulis diebus regredi consueverunt. Aliæ etiam dantur febrium differentiarum, quæ vel accidentales sunt, vel ex prædictarum compositione ortæ, quas omnes singulatim & breviter explicabimus.

## CAPUT I.

## De Febribus putridis continuis.

**E**T si variæ sint febris putridæ continuæ species, earum tamen omnium curationem simul describere statuiamus, eò, quòd eadem fere omnibus convenient remedia, quorum nonnulla secundum magis & minus tantum varianda sunt: quod ex Medici iudicio, & artis usu magis, quàm præceptis particularibus dependet. Nos tamen, quantum fieri poterit, in quo unaquæque differant, suis locis annotabimus.

Febres continuæ primariæ, seu essentielles, generari solent ex putredine humorum, qui in venis & arteriis maioribus continentur. Et pro varia humorum putrescentium natura variæ species emergunt.

Synochus putrida nullis paroxysmis, aut exacerbationibus distinguitur; sed illius universum tempus una veluti accessione consumitur, quæ à principio ad finem pertingit. Ejusque, sicuti & simplicis, tres constituuntur differentiæ. Quarum prima est, quæ à principio ad finem æqualis perdurat. Secunda, quæ paulatim augetur. Tertia, quæ paulatim decrescit. Prima acmaistica, seu homotonos nominatur, fitque toto morbi decursu, cum par est modus putredinis. Secunda epacmaistica dicitur, cum plus putrescit, quam dissipatur. Tertia paracmaistica appellatur, cum minus putrescit, quàm dissipatur. Licet autem hujusmodi febres continuò crescant, aut decrescant, aut eulem tenorem fervent; hoc tamen non impedit, quin illæ quatuor habeant tempora, si ad salutem terminentur; sed alia longiora, alia breviora, si juxta symptomatum vehementiam considerentur. Sic enim homotonos brevissimum habet principium & augmentum; longum verò statum. Epacmaistica longum habent augmentum: paracmaistica longam declinationem, reliqua autem tempora citissime transiunt. Sciendum autem est, febrium putridarum tempora dupliciter considerari; vel quoad symptomata, vel quoad coctionem, & cruditatem; quæ duo in aliis febribus plerumque coincidunt: in synochis verò non item. Earum enim tempora non tam ex symptomatum incremento & decremento, quàm ex signis concoctionis æstimari debent, quæ in urinis præcipuè apparent.

Duæ autem synochi, seu continentes febris species à Galeno proponuntur. Una ex sanguine putrescente, de qua agit 2. *meth. cap. 1. & 9.9.* tum etiam 9. *meth. c. 3. & 5.* Altera ex bile putrescente in maioribus vasis, de genere febrium ardentium: quam explicat 2. *de diff. febr. c. 1. & 2. de cris. cap. 6.* Prima dicitur synochus sanguinea, altera verò synochus biliosa. Licet enim tota humorum massa, in venis contenta sanguinis nomen obtineat; quatuor tamen illius partes agnoscuntur, quorum magis temperata, sanguis speciatim nominatur: calidior, bilis; crudior & frigidior pituita: crassior autem & feculentior, melan-

cholia. Jam verò, si pars illa magna temperata; quæ sanguis propriè dicitur, reliquas copiam superet, & tota massa putredinem concipiat; synochus sanguinea efficitur. Si verò tenuior sanguinis pars, & calidior, quæ flavæ bilis naturam æmulatur, reliquas partes superet, & putredinem concipiat; synochus biliosa exoritur.

Ab iisdem causis synochus putrida generatur, quæ synochum simplicem solent producere. Sicque non solum coctio: sed vasorum etiam obstructio, à multo sanguine, & crassis ac lentis humoribus impactis, hanc febrem efficere solet. Cum enim per hujusmodi obstructions fuliginosorum vaporum transpiratio impediatur; putredo generatur in sanguine, intra venas redundante.

Tertianæ continua, quæ tertio quoque die magis affligit, à sanguine cacochymo bilioso, in vena cava putrescente, ducit originem. Illiusque causæ sunt ea omnia, quæ humorem hunc multiplicare possunt: ut hepatis calida & sicca intemperies, alimenta calida & sicca, ætas juvenilis: inedia, aut victus tenuis & parcior, exercitatio vehementis & frequens, calida & sicca aëris constitutio, vigilie nimie, & similia.

Quotidiana continua, (quæ barbaris *latica* nominatur, quòd latentem atque absconditum quendam calorem habeat) à pituitoso sanguine, intra venas putrescente producit, & ideo singulis diebus suas habet exacerbationes. Corpora pituitosa solet adoriri, ut infantium & puerorum, tum etiam senum, necnon eorum, qui habitu sunt corporis obeso, otio, & crapulæ dediti, locaque humida inhabitant. Minus frequens esse solet hæc febris, quia pituita difficilius putrescit.

Quartana continua, quæ quarto quoque die intenditur, fit à sanguine melancholico, in venæ cavæ ramis putrescente. Eamque omnia efficere possunt, quæ humorem melancholicum generare, eique putredinem inducere valent. Rarissima tamen esse consuevit.

Differentiæ febrium accidentales à pravis symptomatibus desumuntur, quæ essentialibus complicari solent, ab iisque denominantur. Inter eas recenseri solent, febris ardens, colliquans, horrida, asôdes, elôdes, syncopalilis, epiala.

Causus, seu febris ardens propriè ea dicitur, ex Galeno 3. *Epid. com. text. 34.* quæ duobus hisce symptomatibus perpetuò comitata est, calore scilicet ardente, & siti inextinguibili, quantumvis ægri bibant. Dividitur autem ab eodem Galeno 4. *de vict. art. in acut. l. 13.* in legitimam, & notham. Legitima, seu exquisita est, quæ dicta duo symptomata semper evidenter conjuncta habet. Notha verò, in qua illa symptomata sunt minus vehementia, sitisque est minus intensa, nec corpus ita uritur. Legitima, & propriè dicta, fit ab humore bilioso, intra majora vasa cordi vicina putrescente. Notha verò fit à bile, cui pituita permixta, vel pituita falsâ, in iisdem vasis putrescente. Hinc patet, febrem ardentem legitimam nihil aliud esse, quàm febrem tertianam continuam, cujus materia acrior & copiosior sit, & maioribus vasis cordi maximè vicinis contineatur, cum materia tertianam continuam simpliciter efficiens, sit in vasis cordi remotioribus. Rursus, exquisita febris ardentis duæ sunt species. Una, quæ à principio ad finem unicam duntaxat accessionem obtinet, quam synochum biliosam supra nominavimus, & synochus ardens etiam nominatur, quæ fit, cum bilis putrescens vasa omnia cordi propinquissima occupat. Altera, quæ plures in se continet accessiones, & ardens periodica dicitur, fit ab eadem bile, contenta in vasis cordi vicinis, sed non omnibus, aut non ita propinquis, quemadmodum in synocho ardente. Ita ut tertiana continua, synochus ardens & ardens periodica, inter se tantum differant, prout bilis magis, aut minus acris, copiosa, & cordi vicina est.

Febris colliquans est etiam de genere ardentium, quæ propter calorem ingentem, confestim pinguedinem, carnem, partiumque solidarum substantiam, vel aliquando humores venis contentos colliquat, atque dissolvit per insensibilem transpirationem, sudores, urinas, aut dejectiones. Excitari solet à materiâ tenui, acri, & biliosa, quæ vehemens concipit



## Sectio II. Cap. I. De Feb. putridis continuis. 427

concipit incendium. Eique non raro adjunctam esse malignam & pessilentem qualitatem, docet Gal. *comm. in 3. Epid. sect. 37. sect. 3.*

Horrida febris, *φωβὸν* Græcis appellata, ea dicitur, in quâ horrores frequenter solent accidere. Fitque ex mixtâ materiâ, biliosâ scilicet, & pituitosâ, & serosâ, quæ cum inæqualiter moveatur, horrores istos excitare solet: nempe vel succensâ bile, humores crudos putrefaciente & commovente; vel tenui acri & serosâ materiæ portione, partes sensibiles, & membranofas vellicante, vel denique natura crudum humorem frustra excutiente. Hinc retracto ad centrum calore, frigent extremâ: mox eodem emicante, incallescunt.

Affodes etiam febris ad ardentem referenda est, in qua ægri jactantur; & frequentibus inquietudinibus anguntur, graviter morbum ferentes, cum nausæa ut plurimum, & vomitû. Quia exoriri solet ex affectione ventriculi, ab acri & bilioso humore, ejus orificium, vel tunicas mordente.

Elodes dicitur illa febris, in qua sudores perpetuò funduntur: fitque ab ingenti humorum putredine, aut malignitate, substantiam corporis dissolvante.

Syncopalis febris ea dicitur, in qua syncope, aut animi deliquium frequenter ægrotantem corripit. Duæ illius species ponuntur ab Avicenna. Altera, ex bile tenui, acri, & venenatâ. Altera, ex pituita multâ, aut crudorum humorum copiâ. Prior syncopalis minuta appellatur, quia fit ab humore paucio, sed tenui, & venenato. Posterior ab eodem vocatur syncopalis humorosa, sive repletionalis, quia à multa crudorum humorum copia generatur. Idcirco ad pituitosas febres referri consuevit. Et ab aliis tantum differt, quòd in hac major crudorum & pituitosorum humorum copia redundet. Et præterea conjuncta est oris ventriculi debilitas, ex qua in primis ægri frequenter in syncopen incidunt.

Epiala febris dicitur à Gal. 2. *de differ. febr. c. 3. lib. de inæquali intemper. cap. 8.* quando eodem tempore, per universi corporis minimas particulas, calor & frigus sentiuntur. Quamvis enim unâ & eadem pars contrariis alterationibus affici nequeat: id tamen, quod de febre epiala dicitur, de minimis particulis quoad sensum, non autem revera minimis intelligendum est. Hanc febrem duobus modis fieri docet Galenus. Altero quidem, à pituita vitreâ cum bile amarâ permixtâ, & in universum corpus diffusâ. A bile enim calor; à pituita, frigoris sensus infertur. Altero autem, à pituita vitreâ solâ, sed partim putrefactâ, partim putredinis experte. Cum enim pituita vitrea frigidissima, item crassa & lenta sit; non promptè putrescit, nec tota simul, sed tantum per partes; ita ut una ejus portio putrida sit, altera imputris remaneat. Istius igitur pituitæ per sentientes partes delatæ portio, quæ nondum putrescit, utpote frigidissima, frigoris sensum inducit: ea verò, quæ putredinem concepit, calor sensum infert. Atque ita corpus universum eodem tempore calorem & frigus percipit. Platerus etiam, febris epialæ generandæ modum excogitavit, quando scilicet febres intermittentes eodem die concidunt, ut frigus posterioris accessionis incipiat, antequam calor prioris desinat: vel etiam, quando intermittentes cum continuis concurrunt, ut unius febris calor cum alterius frigore eodem tempore possit coincidere.

Dantur etiam aliæ febrium continuarum accidentales differentiæ, quæ cum ad febres symptomaticas referri soleant, in earum expositione jam delineanda discutientur.

Quamvis autem symptomaticarum febrium curatio, è morborum particularium, ex quibus oriuntur, curatione dependeat; earum tamen ratio proponenda est, ne cum essentialibus confundantur.

Illæ igitur febres symptomaticæ nominantur, quæ ab humorum accensione & putredine, in aliquo viscere contentâ, oriuntur. Cujus generis esse solent febres illæ, quæ sequuntur pleuritidem, peripneumoniam, phrenitidem, anginam, hepatitidem, aliasque partium internarum inflammationes, ulcera, vel abscessus.

Advertendum autem est diligenter, (quod maximi est in praxi momenti, & à paucis animadversum) non omnes perpetuò febres, quæ cum partium inflammationibus con-

junguntur, esse symptomaticas, sed quasdam etiam esse essentielles, quibus inflammationes prædictæ succedere soleant. Fit enim plerumque, ut sanguis corruptus, aut pravis humoribus refertus, postquam febrem excitavit, exagitetur à natura, & tanquam sibi noxius expellatur ad partes debiliores, aut humori recipiendo magis idoneas: unde in iis inflammatio producit; quæ febrem istam non efficit, sed illi potius succedanea est. Sic nobis frequenter in usu practico videre licet ægrotantes, ab initio febre continua laborantes, per unam aut alteram diem; antequam dolor lateris & alia pleuritidis signa appareant. Sic multi tertio, vel quarto febris die, in phrenitidem incidunt: sic arthritici ferè omnes, antequam dolore, tumore, & inflammatione articularum afficiantur, febre continua per unam aut alteram diem laborare solent. Sic; qui erysipelate tentantur, febre aliquandiu afficiuntur, antequam erysipelas appareat. Idipsum ostendit urinarum dispositio, quæ in hujusmodi inflammationibus notas putredinis in venis contentæ manifestas producit. In principio enim crudæ apparent, in progressu verò signa coctionis in dies incrementis ostendunt. Tum sanguis è vena admodum corruptus interdum educitur. Quæ non fierent, si febres ejusmodi essent tantum symptomaticæ, aut ab illis inflammationibus simpliciter dependentes.

Illæ autem febres, sive symptomaticæ sint, sive primariæ; & comitatæ partium inflammationibus, suas habent differentias accidentales. Si enim inflammatio sanguinea sit; febris illa phlegmonodes nominatur: si biliosa, erysipelatis naturam referens, typhodes nominatur. Peculiariter verò erysipelas ventriculi & intestinorum, febrem lypyriam accersit, in qua exteriora rigent, & interiora uruntur. Incendium enim internum, sanguinem & spiritus ad locum inflammatum attrahit: unde calor ita intenditur, ut interiora uri videantur, cum siti inextinguibili: exteriora verò frigore afficiantur, calore & spiritu destituta.

Lenta febris etiam ad symptomaticas referri consuevit, quæ oritur ex latente obstructione, ac putredine, visceri adeò contumaciter adhærescente impactaque, ut substantia visceris plerumque labefactetur. Ea, cum putredinis portio in venas affundatur, sanguinique permisceatur, febrem excitat lentam, & adeò mitem, ut nullo gravi symptomate ægro molesta sit, & æger vix se febrile sentiat. Putredinis tamen aliquæ notæ in pulsibus & urinis apparent. Interdum verò ex visceris alicujus putredine, ac corruptione exoritur febris lenta, quòd per venas, visceri insertas, putridi & calidi vapores ad cor expirent. Frequentissimè autem talis febris in phthisicis excitatur, quæ in hecticam degenerat. Fit etiam interdum: cum hepatis aut lienis substantia putredinem concepit; vel cum circa mesenterium, omentum, aut pancreas, aliasque partes putredo incidit; vel etiam interdum, cum foetus, aut secundina in utero putrescit. Hicque febres, non solum lentæ; sed etiam aliquando acutæ, pro ratione putredinis diversâ oriuntur. Ac denique ad hoc febrium lentarum genus referuntur illæ febres, quæ in cachecticis reperiri solent, & virginibus chlorosi laborantibus; easque Fernelius ex serosâ pituitâ in corpus effusâ levi putredine provenire statuit.

Præter hæcenus enumeratas febrium continuarum differentias, quæ frequentissimæ sunt, & vulgò ab Authoribus proponuntur, dantur etiam nonnullæ, à causis peculiaribus & extraordinariis oriundæ, quæ in usu practico interdum solent apparere. Exemplo esse poterit casus à Zecchio relatus *conf. 46.* de quodam infante, vix secundum ætatis annum agente, & febre continuâ laborante cum gravissimis symptomatibus, nempe inquietudine, motibus convulsoriis & nausæa continuâ; cui etiam malum morem esse conjunctum inde conjiciebatur, quòd tam gravia symptomata febri non responderent. Omnes etenim partes externæ frigebant, licet internæ urerentur, quod ex calore circa thoracem in hypochondria, nec non ex arida nigraque lingua intelligi facile poterat. Cujus causa erit sanguis putrescens in ventriculo contentus. Cum enim huic infanti loquela impedita fuisset, ob innaturalem linguæ cum partibus subjectis colligantiam, & præsertim cum ea membrana,



quæ frænum dicitur : ideo nuper illi à Chirurgo lingua cultello à subjectis partibus separata fuerat. In quo opere aperta vena aliqua sanguinè in ventriculum effuderat, qui illic putrescens, calidos, putridos, ac veluti venenatos vapores in cor & cerebrum expirando, omnium commemoratorum symptomatum causa fuit. Quomodo autem causa hæc animadversa, & sublata fuerit, operæ pretium est ex Zecch. hist. hic recensere. *Si quando, inquit, in appendice hujus consilii, mecum ipse diligētius considero, quàm difficile sit morbos internos, eorumque causas interiores assequi, in eā sententiam facile descendo, Hippocratem 2. de morb. vulgaribus, sect. 4. non sine maxima præmeditatione scriptum reliquisse, in omnibus obscuris morbis tractandis oportere Medicum diligenter investigare primum morbi insulsum, hoc est, primam occasionem, unde quis egrotare coperit. Illinc enim & morbi causæ cognitio ut purimum dependet. Ecce exemplum. Nobilissimi infantis morbus sanè acutissimus, unā cū causa obscurus admodum erat, nisi mihi, de pueri & nutricis vita & conditionibus diligenter percontanti, ab ejus parentibus significatum fuisset, quod duobus diebus ante primum morbi insulsum à Chirurgo quodam sectapilli fuit membrana, quæ lingua cum partibus subjectis alligabatur. Rursus interroganti, num ab opere statim primum collocaverint infantulum, atque nū sanguis ab ore fluxerit, utrumque negarunt. Unde statim conjeci ego, sanguinem à loco vulnerato in ventriculum præcipitatum, ibique putrescentem, morbi, & symptomatum commemoratorum causam extitisse. Nec mea me fefellit opinio, quandoquidem oleo amygdal. dulcium, ad ciendum vomitum propinato; sanguinis corrupti grumos permultos excrevit. Atque statim (DEO immortalis favente) remissa fuit febris, cessarēque cæperunt symptomata omnia. Unde valenter & avidè matris nutricis lac exsugere cepit, totāque sequenti nocte placidè dormivit, neque in posterum quicquam mali persensit.*

Signa febrium putridarum continuarum diagnostica, alia continuitatem, alia putredinem, alia peculiare earum differentias ostendunt.

Continuitas facilè dignoscitur ex eo, quod febris assidua sit, & ad apyrexiam non desinens.

Putredinem verò significant, calor acrior & mordacior, quam reliquarum, acri & mordaci fuligine, ex putridis humoribus exhalante, productus. Pulsus non solum magnus & frequens, ac non raro inæqualis; sed etiam hoc habet peculiare, ut systole velocior sit, quàm diastole: quia expulsio fuliginosorum excrementorum magis urget, quàm refrigeratio. Urinæ initio crudæ, aut partim concoctæ. Exacerbationes certis temporibus factæ, quod tamen in synochis locum non habet. Rigor in primâ invasione apparens. His accedunt symptomata varias febres putridas plerumque comitantia, ut nausea, vomitus, gravitas corporis, dolor capitis, delirium, vertigo, singultus, anxietas, morsus oris ventriculi, sitis, asperitas & nigrities linguæ, tensio hypochondriorum, aliaque. Hanc autem præcesserunt lassitudo spontanea, motus gravis, somnus turbulentus, vigiliæ, hypochondriorum tensio, difficilis spiratio, capitis dolor & pulsatio, nausea, inappetentia, excrementa foetida & copiosa, crebra pandiculatio & oscitatio, aut eorum nonnulla.

Peculiares verò febrium putridarum continuarum differentiarum sequentibus signis distinguuntur.

Synochus putrida eadem habet signa, quæ in simplici fuerunt proposita, sed vehementiora: calor enim acrior est, vigiliæ, dolor capitis, sitis, inquietudo, aliaque symptomata vehementiora. Tum pulsus inæqualis est: ut major systole, quàm diastole appareat, urinæ crudæ, rubræ, crassæ.

Biliosam febrem indicant calor deurens, pulsus valde frequens & velox, urina acris, flammea, initio semper cruda, sine sedimento, nausea, vomitus biliosi & dejectiones, magna anxietas, sitis ingens, oris amaritudo, linguæ ariditas & nigrities, vigiliæ, delirium, lassitudo ulcerosa præcedens, calor faciei pallidus, aut citrinus, ætas juvenilis, temperamentum calidum & siccum, tempus æstivum. Victus ratio calida & sicca, vacuationes biliosæ suppressæ. Tertia verò continua à synocha biliosa distinguitur, quod illa tertianas habeat exacerbationes, hæc verò illis

omnino careat; & eodem tenore procedat.

Quotidianam continuam indicant, calor initio magis vaporosus quàm mordax, post nonnihil acer, sed inæqualis; propter humoris crassitiem, quæ difficulter dissolvitur, urinæ initio albæ, aquosæ, & conturbatæ, post nonnihil rubræ, & crassæ, pulsus rarior, tardior & minor, quàm in reliquis febribus; sitis nulla, aut exigua; sudor rarus, nisi adsit pituita salsa, facies subtumida, laxa & sublivida, somnolentia, inappetentia; excretiones pituitosæ, temperamentum frigidum & humidum; ætas senilis, tempus hyemale, victus frigidus & humidus, pituitæ evacuatio suppressa, quotidiana exacerbatio.

Quartanam continuam significant calor minus acer, quàm à bile, sed acrior quàm à pituita; similiter quoque sitis major, quàm in quotidiana, minor quàm in tertiana; pulsus initio tardus, rarus, languidus: post validior, crebrior, valde inæqualis. Urina in principio tenuis, post varia: corpus aridum & macilentum, color fuscus aut obscurus, temperamentum frigidum & siccum, ætas inclinata, tempus autumnale, aut magnas inæqualitates habens: vita multis curis & sollicitudinibus implicata, hæmorrhoidum fluxus suppressus, tumor lienis, exacerbatio quartana.

Causi seu febris ardentis signa pathognomonica sunt antea proposita: nempe calor corporis deurens, & sitis inextinguibilis. Hoc tamen annotandum est: si tussis aliqua supervenerit, sium inde minui, ab humore scilicet qui ex vicinis locis attrahitur: quamvis nunquam durante febre, illa auferatur. Signa verò assidentia sunt ea omnia, quæ febrem biliosam indicare supra declaravimus. Ea tamen, quæ notham ardentem significant, prædictis multò remissiora sunt.

Colliquantem febrem significant, subita corporis consumptio atque emaciatio: oculi concavi, collapsa tempora, nares acutæ: dejectiones rubræ, pingues, foetidæ, viscosæ, corpulentæ, sinceræ, biliosæ, & spumosæ: urinæ pingues & oleosæ.

Febres horridæ & affodes cognoscuntur per ea quæ in earum descriptionibus proposita sunt.

In febre elode madet continuò lento humore cutis, & calor ad tactum non multum acer est. Distinguitur malignitas à copiosa putredine, quod in causâ maligna urinæ ferè naturales, vel ab illis non admodum diversæ appareant; vel quædam urinæ innatent instar telæ aranearum, quando sit colliquatio pinguedinis: vel si cum urina corpuscula ervi, vel hordei speciem referentia prodeant, quæ carnis colliquationem denotant: vel denique urinæ multitudo: per multos dies apparens quando sanguis & humores colliquantur. His omnibus accedit maxima virium exolutio: pulsus parvus, contractus, neque valde frequens est. In magna putredine urinæ crassæ & confusæ, pulsus magnus, mollis, frequens.

Synopalem febrem significant lipothymia & animi defectus, frequentes, Minuta verò, ab humorosa distinguitur: quod in illa biliosæ, in hac pituitosæ febris signa supra recensita appareant.

Epiala febris ex eo solum dignoscitur, quod eodem tempore calor & frigus in toto corpore persentiantur.

Febres denique symptomaticæ, tum etiam comitatæ cognoscuntur ex iis, quæ in earum historia proposita sunt.

In singulis autem febrium putridarum continuarum speciebus signa prognostica describenda sunt, quibus earum eventus prælagiri possit.

Ac primum, quod ad synochum putridam spectat, cum illa de genere sit febrium acutarum, periculo non vacat, Attamen si concoctionis signa evidenter appareant die quarto, & nullus committatur error, salutariter die septimo terminabitur. Si verò tardius signa concoctionis appareant, ad undecimum vel decimum quartum extendi poterit. Si verò concoctionis signa nulla appareant, egriq; tornatilem faciem, seu instar sphaeræ turgidam habeant, morbi longitudinem significat. Urina quantò rubicundior ab initio, cæteris paribus, tantò securior, & citò morbum solum iri significat, si in ea signa concoctionis appareant: at cum cruditatis signis mortis periculum minatur, præcipue si vires sint debiles. Urina alba, pessima, mortem;



## Sectio II. Cap. I. De Feb. putridis continuis. 429

temque ut plurimum portendit. Ex synochi differentiis paracraftica securior, acraftica periculofior, epacraftica periculofiffima. Præterea synochus exquisita & benigna ritè curata, fecura: non exquisita, & malignitatis particeps, cum sævis symptomatis, & virium debilitate, periculofa.

Biliofa verò febres quatenus acutæ, sunt etiam periculofæ: idque magis vel minus, pro majori vel minori intemperie, symptomatum vehementiâ, & virium robore. Intemperies æffimatur non solum absolute ex ipso caloris gradu, sed etiam comparatè, ad statum ægrotantis naturalem: ut quò major est ab eo recessus, majus imminet periculum. Sic febris ardens in fene, vel hyemis tempore adveniens, lethalis est ut plurimum. Symptomatum vehementia consideratur in actionibus animalibus, vitalibus, & naturalibus, excrementis, qualitatibus mutatis, & propriis accidentibus: quorum enumeratio integrum opus exigit, prout à nobis exposita sunt in sectione tertia nostræ Semeioticæ, ex Hippocratis Aphorismis prognosticis, prorheticis, & Coacis prænotionibus de prompta, quæ in hunc locum facillè transferri possunt. Ac denique vires cum symptomatum vehementia comparandæ sunt. Si enim validæ sint, & adversus hostium sævitiam sufficere posse videantur; bene sperandum est, sin minus, meritò metuumdum.

Quotidiana continua longa esse consuevit, ob humoris crassitiem & contumaciam: si tamen plures evacuationes accidant in illius decursu, brevior esse solet. Periculum illius metiri oportet, comparatione factâ symptomatum vehementiæ cum virium robore. Ac præcipue metuendum est, ne in cachexiam aut hydropem degeneret; propter hepatis & lienis obstructions, quæ in hisce longis febribus contingunt.

Quartana continua primaria rarissima est: interdum tamen intermittens in eam degenerat, tuncque ut plurimum lethalis est.

Febris colliquans, horrida, asôdes, elôdes, & synco- palis, quia nomina sua mutuuntur ex pravis symptomatis, quibus stipatæ sunt, ideo ratione illorum periculofissimæ sunt, & lethales ut plurimum.

Febrium denique symptomaticarum prognosis ex partium affectarum præstantiâ, symptomatum vehementia, & virium robore desumenda est.

In omni autem febrium putridarum curatione indicationes desumendæ sunt à febre, ejus causâ, & viribus. Priora duo sui ablationem indicant: tertium sui custodiam. Hæc fient trium communium instrumentorum therapeuticorum ministerio: diætâ nimirum, chirurgia, & pharmacâ.

Diætâ in omnibus febribus biliosis debet esse refrigerans & humectans; in pituitosis & melancholicis magis calefaciens & attenuans. Aër igitur frigidus & humidus fit, qui inspiratione ad cor attractus, illius incendium maximè contemperat. Attamen ad illius occursum corpus denudare nefas est, cum diaphoresis maximè necessariâ impediatur, & fuligines ac sudores intro repellantur. Interim tamen stragulis levibus mollibusque æger operiendus, neque nimis integumentis onerandus; tum plumea strata auferenda, laneis tantum utendo; quibus etiam, magno urgente æstu, coria infernere conveniet. Lectus sit spatiosus, ut in eo æger locum mutare possit. Ejusdem linteamina, & indusia frequenter mutanda, contra vulgî opinionem, modò non sint recenter lota, aut lotionem redoleant, & non instet crifeos tempus, in quo nihil movendum, ne naturæ motus perturbetur. Radii solares à conclavi arcendi, hominumque frequentia vitanda. Aqua de vase in vas sæpius transfundenda. Pavimentum cubiculi aquâ cum aceto, aut aquâ rosaceâ conspergendum; vel herbis floribusque frigidis, ut foliis vitis, salicis, nenupharis, cannarum, floribus rosarum, violarum, & nymphææ, quæ in loco frigido asservuntur, & sæpius in die mutantur, hæc enim siccata calefaciunt: Si nimia frigiditas sit, ut in hyeme, igne sine fumo aliquantulum contemperanda est. In febribus tamen pituitosis aër modicè calidus & siccus esse debet.

Alimenta quòd attinet, victus tentis esse debet in acutis febribus. Et in eo ita severa fuit antiquorum diligentia, ut potissimam curationis partem in illo constituerent, ægrisque, febre acutissima laborantibus victum tenuissimum imperarent, ac solâ prisana hordei ægros nutrent, utpotè febricitantibus maximè conveniente cum refrigeret & humectet, simulque extenuet & aperiat, nullamque evacuationem cohibeat. Duplex autem prisana erat. Una simpliciter dicta, sive prisana integra non colata; altera colata, quæ cremor hordei nominatur. Hordeum à corticibus mundatum, in aqua simplici coctum, & in massam conglobatum, est prisana integra: hæc postea, cum expressione colata, cremor, aut succus hordei dicitur.

At nostris temporibus, in hac saltem regione, mulierum contumaciâ, & Medicorum indulgentiâ factum est; ut in quibusvis febribus, quantumvis acutissimis, juscula semper concedantur ex decocto carniû gallinæ, capi, vervecis, eaque ut plurimum tertiâ, aut ad summum quartâ quaque horâ exhibeantur. Æstate verò pulli gallinacei; aut carnes hoedinae, prædictis addi solent. Tum etiam per vices, ex pullo solo cum herbis refrigerantibus, ut lactucâ, endiviâ, acetosâ, portulacâ, juscula conficiuntur. Vel ordinariis etiam jusculis succus limonum, aurantiorum, aut granatorum, vigente magno ardore febrili, aut intensa putredine, permiscuntur.

Præterea in febribus minus acutis panatellæ exhibentur bis aut ter in die, ex pane loto cum jusculo confectæ. Hordeata etiam aliquando usurpantur, ex prisana colata antiquorum, cum jusculo carniû prædictarum, & saccharo parata, vel etiam sine jusculo, additis amygdalis dulcibus. Sed plerumque ea ventriculum gravant, ideoque jusculorum simplicium, & panatellarum usus commodior visus est: cum tamen utilissimum sit hordei mundati tantillum cum carnibus decoquere, & inde juscula parare.

In longis febribus plenior victus carnibus pullorum, vituli, gallinæ, capi, perdicis, vervecis, aut earum con- tusis, & consummatis, similibusque convenit.

Circa tempus exhibendi cibos hoc in primis observandum ut numquam tempore exacerbationis, sed in remissione febris exhibeantur. Si verò exacerbatio longior fuerit, in declinatione ipsius æger cibandus erit.

Pro potu vulgò usurpatur in omnibus febribus continuis prisana recentiorum, ex decocto hordei & liquiritiæ parata. Cui, si febris ardentior sit, addi potest aliquid lactucæ, acetosæ, tamarindorum. Frequentius tamen addi solet rad. graminis, vel acetosæ, quæ aquam vini colore eleganter inficit. In longis verò febribus addi possunt rad. fœniculi, petroselinî semen anisi coriandri aut cinnamom. Posteriora tamen tantum addenda sunt, quoties ventriculus debilis à potu offenditur.

℞. Prisana vulgaris ex hord. & liquir. ℥. ii. spir. sulph. q. s. ad gratam acid: cornu cervi ab alb. calcin. ℥. i. Utatur pro potu ordinario, vas usûs tempore agitando.

Usurpatur etiam aqua panata, vel sola, vel saccharo dulcorata, vel modico aceti permixta, vel aqua simplex decocta, ut cruditas ipsius auferatur, cui interdum permiscetur saccharum: tum aliquando nonnihil succi vel syrupi limonum, granatorum, berberis, aut cerasorum, vel spiritus vitrioli aut sulphuris, quod sufficit ad gratam aciditatem; vel salis prunellæ tantillum, si potentius refrigerandum sit.

Laudatur aqua, in qua macerantur tamarindi, berberes, aut pruna.

Decoctum prunorum brinolenfium gustui gratissimû est. Vel coquitur hordeum cum tamarindis, & sub finem addito fantalo citr. & cinnam. aromatizatur. Qui potus non solum sitim sedat, sed alvum laxat, hepar refrigerat & corroborat.

℞. Sacchari Uncias viijj. salis prunellæ Unciam j. fiat pulvis, permiscendus prisanae pro potu ordinario. Cui etiam, siti admodum urgente, spiritus vitrioli admisceri poterit.

De spiritu vitrioli & sulphuris hoc diligenter advertendum, in febribus putridis magnum esse illius usum, quin insignem vim habet refrigerandi, aperiendi, putredini

H h h 3 refi-



resistendi, inflammabilitatem humorum prohibendi; & sitim sedandi. Attamen in pleuritide, peripneumonia, hæmoptoe, phthisi, cæterisque pulmonis affectibus (nisi à crassa pituita vasa illius obstruente ortum habeant) ventriculi inflammatione, dysenteria, sanguinismictu, renum & vesicæ ulceribus, plurimum nocere & ab eo abstinendum esse.

In febribus, à bile valde tenui & calida, aut tenui acrique destillationi conjunctis, acida non conveniunt, sed potius leviter incrassantia, ut syrupus violaceus, & de rosæ siccis, cum aqua hordei, vel panatâ, vel coctâ simpliciter permixtus.

Ubi humores crassi lentique abundant, syrupus acetosus loco prædictorum crit utilissimus.

Solent etiam interdum conservæ rosarum, violarum, buglossi, aquæ coctæ, vel aquæ hordei misceri, & per manicam Hippocratis trajici, pro potu ordinario, cui aliquot guttæ spiritus vitrioli utiliter addi possunt. Vel paratur tinctura rosarum, colore, & sapore jucundissima in hunc modum.

℞. Rosar. rubr. siccarum ℥. i. aquæ tepidæ lb. iii. Spiritus sulphuris; aut vitrioli ℥. i. ℥. Infundantur per iii. aut iv. horas frigide. Colaturæ adde sacchari albi ℥. iv. aquæ rosar. ℥. ℥. Fiat julep. clarus pro potu ordinario.

Julepus Alexandrinus non parum etiam utilis & jucundissimus est, qui ita componitur.

℞. Aquæ fontis ℥. i. aquæ rosar. succi limon. & sacchari albi, an. ℥. iv. Coquantur lento igne dum spumaverint.

Quoddam ad reliqua diætâ spectantia attinet, somnus maximè utilis est, vigiliæ noxiæ. Nimius tamen somnus calorem nativum obruit, & excrementorum evacuationem impedit. Quies necessaria est in febribus acutis, in longioribus verò levis exercitatio utilis. Danda etiam opera est, ne ea quæ secundum naturam expelli debent, retineantur, licet omnis immodica evacuatio, quæ vires exhaurit, cohibenda, omnesque vehementes perturbationes eliminandæ.

Inter chirurgica præsidia phlebotomia principem locum obtinet. Non solum enim plenitudinem evacuat, sive ad vasa sit, sive ad vires, sive in toto, sive in aliqua parte: sed etiam influxum humorum obstruentium revellit, totum corpus refrigerat & perspirabile reddit, putredinem arcet, & putrescentium humorum concoctionem adjuvat. Statim igitur, & ab initio morbi sanguis detrahendus est (nisi virium infirmitas prohibeat, ut in febre syncopali, aliisque casibus) idque alvo prius laxata, enemate aut supposito. Quantitatem sanguinis indicabit plethora, vires, ætas, anni tempus, consuetudo, aliæque circumstantiæ. Veteres in synocho putrida, & ardente febre, sanguinem mittebant ad animi deliquium. Sed multò tutius est (ut in synochi simplicis curatione à nobis dictum est,) partis vicibus quantitatem necessariam educere, quàm ægrum subito in vitæ discrimen conjicere. Avicenna in febre ardente, & tertiana continuâ venæ sectionem prohibet, nisi urina crassa rubraque fuerit. Metuit siquidem, ne bilis magis effervescat, cujus frænum sanguinem esse dicit. Verùm à sapientioribus exploditur hæc sententia, cum hujusmodi febres hæmorrhagiâ sæpe à natura ipsâ judicentur; tum phrenitides interdum, aliasque inflammationes producant. Denique, cum phlebotomia potenter refrigeret, ebullitionem potius cohibet, quàm excitet, cum non solus sanguis, sed bilis etiam ei permixta, educatur, ita ut in ea malsâ, quæ superest in venis majoribus, eadem maneat sanguinis ad bilem proportio, quæ prius inerat. Imò verò, cum vena secatur, si vegetæ sint ægri vires, & sanguis confertim erumpat, solus putris, & naturæ mollestinus excernitur, remanente in venis puriore; quod à paucis Authoribus est annotatum, quamvis in usu practico passim observetur. Si enim sanguis è vena guttatim effluat, purissimus est, quia motu proprio è vena egreditur. At si cum impetu erumpat, impurius & putris apparet, naturâ deteriore massæ sanguinis partem expellente. Parcius tamen sanguis mittendus est in naturis admodum biliosis, æstate mediâ & sub caniculâ, quàm in aliis naturis, & temporibus. In pituitosis verò & melancholicis febribus

minori copiâ sanguis mittendus est, & perpetuò summa ratio habenda & coindicantium & contraindicantium, cum febres quotidianæ ut plurimum contingant in pueris aut senibus, regione frigidâ, aut tempestate hybernâ, quæ sanguinis quantitatem à morbo vel causâ morbificâ indicatam imminuunt. Quando febris fit à nimio labore, parcius mittendus sanguis. Si ex nimio veneris usu febris contingat, phlebotomia perniciofa.

Circa tempus venæ sectionis advertendum est, non statim ab assumpto alimento venam esse aperiendam, sed peractâ ventriculi concoctione, & alvo ab excrementis liberâ. Præterea tempore remissionis febris, sanguis est detrahendus, non autem in vigore illius: tunc enim natura vim impetumque morbi, ac venæ sectionem ferre nequit. Quod ad iterationem phlebotomiæ spectat: si ea ad evacuationem necessaria est; eodem die instituenda: si revulsionis causâ, diversis diebus. Nam ubi evacuandum est, præcipuè in acutis, subito corpus in alium statum transferendum: tum sæpe accidit, ut morbus mox principium percurrat, ut postea venæ sectione non ita commode ui liceat. In revulsionem verò respicimus ad motum humoris, quia rectius fit, si diversis vicibus & intervallo interjecto, natura contrario motui quasi affuescat. Intervallo enim temporis sanguis in partes effusus regurgitat in venas, & iteratâ venæ sectione utiliter extrahitur. Iterandam esse venæ sectionem intelligimus, si sanguis primò detractus valde putris fuerit, ejusque in venis magna copia superesse videatur.

Imò verò licet sanguis ab initio purus, ac minimè corruptus appareat, non tamen desistendum est ab illius detractioe, quin potius ea continuanda est, donec impurius & corruptior appareat. Et certe utilissimè observari potest in febribus acutis præceptum ab Hippocrate traditum 4. *de victus rat. in morbis acutis*, in pleuritidis curatione, ut scilicet sanguinis detractioes continuentur usque ad coloris mutationem; ut si ab initio corruptus educatur, continuetur evacuatio, donec purior appareat: & contra si ab initio laudabilis prodeat; eò usque educatur, donec impurus & corruptus extrahatur.

Est tamen quædam diversitas adhibenda in utroque casu. Si enim ab initio sanguis laudabilis educatur, iteratio debet fieri ex eadem vena; ut sanguis putridus in profundo corporis residens citius educatur. Si verò ab initio sanguis putridus educatur, ex altero brachio sanguis detrahendus, & consequenter ex utroque brachio alternandæ sunt phlebotomiæ.

Si verò symptomata demonstrent putredinem subesse in interiore ramo venæ cavæ descendentes; ut æstus & dolor lumborum, urinæ rubor & crassities; post duas aut tres phlebotomias in brachiis celebratas, è saphena sanguinem mittere conveniet, eamque evacuationem bis aut ter repetere.

Si in postremis sanguinis missionibus portio quædam laudabilis appareat, ita ut non adeo putridus videatur ut antea signum est naturæ restaurantis & resituentis novum sanguinem, & probum in putridi vacuati locum. Contra verò, si quod magis educitur, eò deterior appareat; signum est, morbum in pejus ruere, & putredinem augeri, unde partium interiorum narcosis metuenda est.

Vena in cubito vel basilica, vel mediana ut plurimum secanda est, ex brachio dextro frequentius, ex sinistro verò interdum, cum videlicet major tensio in sinistro hypochondrio, quàm in dextro percipitur. Aliquando tamen in pede vena utiliter aperitur, si revellendum sit, & vires sint debiles, & materia caput petat, & capitis dolor ac vigiliæ infestent.

Frictiones in febribus putridis raro usurpantur, nisi in syncopalibus: quarum curationem, in symptomatum curationibus, in fine hujus capituli trademus.

Cucurbitulæ verò frequentius usurpantur, præcipuè cum scarificatione: & sunt vicariæ venæ sectionis, quando vires, aut ætas illius usum non permittunt.

Pharmaceutica remedia duplici genere comprehenduntur, quorum alia evacuantia, alia alterantia nominantur. Sub evacuationibus comprehendimus purgantia, vomitoria



## Sect. II. Cap. I. De Febr. putrid. continuis. 43 I

toria, sudorifica, diuretica. Sub alterantibus verò refrigerantia, attenuantia, incidentia, aperientia, roborantia. Quorum omnium compositionem & usus, juxta praxeos ordinariæ methodum, seriatim describemus.

Atque ut à purgantibus incipiamus, maximè contrahitur apud Autores, an illa in principio febrium putridarum exhibenda sint. Quod dissidium, nullis disputationum ambagibus, ita resolvendum est. Ratione materiæ febrem putridam continuam immediatè producentis, quæ in venis majoribus continetur, purgationem in principio non convenire, nisi ea turgeat, id est, ita exagitetur à natura irritata, ob pravam ejus qualitatem, eamque expellere conante, ut inde excretioni magis disposita sit, & ex illa turgentia metuendum sit, ne in aliquam partem nobiliorem irruat; quod tamen quia rarò contingit, ut plurimum illius concoctio expectanda est, antequam per medicamenta purgantia ejusdem evacuatio suscipiatur. Ratione verò materiæ in prima regione contentæ, si plurima illa sit, quæ febrem augeat, naturam gravet, eamque à materiæ in venis contentæ concoctione avertat, purgantia, altero à venæ sectione die exhiberi poterunt, sed leviora, quæ primam tantum regionem evacuent. Humores autem vitiosos & excrementitios in prima regione, hoc est, ventriculo, intestinis, mesenterio, aut circa præcordia redundare, cognoscimus ex nausæa, oris amaritudine, siti, dolore stomachi, aut alterius partis in ventre inferiori contentæ, alvi fluxu, aliisque symptomatis, quorum ratione aliquando purgatio ipsi venæ sectioni præmittenda est. Erunt autem hujusmodi medicamenta, cassia, manna, tamarindi, catholicum, electuarium lenitivum, diaprunum simplex, syrupus rosaceus, de cichorio compositus cum rheo; quæ variis modis concinnari poterunt in hunc modum.

R. Cassiæ recentis extractæ ʒ. j. pulpæ tamarind. ʒ. ʒ. Cum saccharo fiat bolus. Vel

R. Catholici ʒ. vj. electuarii lenit. vel diaprun. simpl. ʒ. ʒ. cremoris tartari ʒ. j. Fiat bolus. vel

R. Fol. endiv. cichor. acetos. an. M. ʒ. tamarind. ʒ. ʒ. Coquantur ad ʒ. vj. In colat. dissolve catholici ʒ. ʒ. manna & syrupi rosac. an. ʒ. Misce, fiat potio.

Si medicamentum paulò fortius desideres, addere potes rhab. ʒ. j. vel ʒ. jv. in aqua endiviæ, vel cichorii, infusum cum santalo citrino. Imò vero & interdum, si febris non sit intensior, sennæ ʒ. jj. vel jjj. decocto addi poterunt.

Quidam rhabarbarum rejiciunt, quia calefacit: tum etiam mannam, & syrupum rosaceum, quia dulcia cum sint, faciliè in bilem vertuntur. Verùm aquis vel decoctis refrigerantibus rhabarbarum infusum, vel manna, aliæque dissoluta, nullum asserre possunt incommodum; præcipuè si dictis decoctis addantur tamarindi, qui ad hunc usum maximè commendantur, vel pulpa eorum simul exhibeatur.

Nonnulli utuntur in biliosis febribus sero lactis caprini, idque appositè: nam & ardorem febrilem temperat; & bilem evacuat, & viscera corroborat. In cyatho uno sero lactis infundatur per noctem rhab. ʒ. j. vel ʒ. j. ʒ. Vel addunt syrupi rosac. ʒ. jj. aut tres, exhibent manè, & postea alias duas libras propinant, ne totum serum medicamenti sapore inficiatur.

Purgationem, quæ fit in principio febrium putridarum, vulgus Medicorum vocat minorativam, eam verò, quæ fit concoctâ materiâ, eradicativam: quæ etiam in principio convenit (ut dictum est) ex sententia Hippocratis, si materia turgeat. Illa autem turgescencia, seu orgasmus materiæ morbificæ cognoscitur ex eo quòd æger percipiat in variis partibus dolores leves ac fugaces, admodumque mobiles. Varias etiam patitur in facie, aliisque partibus, coloris mutationes, ut nunc rubeat, nunc palleat aliquam faciei partem. Ac denique anxietatibus & inquietudinibus maximè torquetur.

Illud tamen Hippocratis præceptum de purgatione in turgescencia materiæ, in praxi ordinaria non observatur; sed potiùs apparente humorum orgasmo ad phlebotomiam tutius confugimus, sicque faciliùs præcavimus, ne humores commoti irruant in aliquam partem nobilem, qui à me-

dicamento purgante magis exagitari, promptius in eam præcipitari possunt.

Aliquando etiam in principio harum febrium vomitus provocandus est, cum videlicet ægrum nausæa aut vomitus valde urget: tunc enim natura per superiora materiam morbificam evacuare nititur, & Medicus illius motum adjuvare debet. Sæpèque accidit, ut magna materiæ copia in ventriculo & vicinis locis contineatur, quæ per vomitum quamprimum educenda est, cum nulla tam copiosa & excrementitiæ materiæ concoctio expectari queat; & quodcumque ingeritur, in humorem consimilem immutetur, peccantem materiam augeat. Rectè enim annotavit Fernel. lib. 3. meth. med. c. 3. omnem illuviem in ventriculo, liene, pancreate, mesenterio, & cavis hepatis contentam, per vomitum commodè expurgari, quæ interdum medicamentis per inferiora purgantibus, etiam pluries exhibitis, deturbari nequiverit. Et non rarò fit ut materiâ per vomitum rejectâ, febris ab initio tollatur, quæ longa alioqui futura esset, materiâ illâ in penitiores corporis partes transmissâ, & sanguini permixtâ.

Ex vomitoriis autem medicamentis, cum triplex eorum gradus constituatur, mitiora eligenda sunt, ut aqua hordei tepida cum oleo amygdalino, vel communi, vel cum aceti albi exigua quantitate. Item syrupus acetosus, aut oxymel simplex, cum jure pulli, vel decocto sem. anethi, raphani, atriplicis, quibus etiam oleum addi potest. Quæ omnia ad ʒ. j. vel majorem quantitatem exhibenda sunt, nam in minori quantitate assumpta retinentur in ventriculo. Cum autem debiliora hæc vomitoria non sint valde efficacia, ad mediocria aliquando confugere licet, quæ in tertiana intermittentis curatione infra proponuntur.

Clysteres verò non solum in principio morbi, ante venæ sectionem, sed etiam toto illius decursu injiciendi sunt singulis, vel alternis diebus, si alvus liberè non fluat, compositi ex decocto emollientium & refrigerantium, ut hordei, prunor. malvæ, violariæ, mercurialis, brancæ ursinæ, atriplicis, lactucæ, endiviæ, sempervivi, nymphæ: dissolvendo catholicum, cassiam, diaprun. simpl. saccharum rubr. mel violaceum, mercuriale, ol. nymphæ, violac. &c. In febre tamen intensiori satius est olea non addere, quia faciliè inflammantur.

Nota primò, sempervivi majoris in decocto unius clysteris, squamas tres, vel iv. tantum esse præscribendas, quia potissimè refrigerat, & majori copiâ usurpatum intestina labefactare posset.

Nota secundò, in omni febre biliosa clysteres non actu calidos, sed levè tantum teporem adeptos, esse injiciendos.

In pituitosis febribus fiunt decocta ex herbis emollientibus, cum sem. anisi, fœniculi, carthami, flor. chamom. & meliloti; dissolvendo hieram, diaphœnic. mel rosaceum, mercuriale, oleum chamæmel. anethinum, vel commune. Cum verò, ut supra annotatum est, integra & absoluta purgatio, quam eradicativam nominant, non nisi concoctâ materiâ instituenda sit, Medicus ab ipso morbi initio post primam venæ sectionem, & primarum viarum evacuationem, ea medicamenta usurpare debet; quæ humores crudos præparant ad concoctionem & evacuationem, simulque calorem febrilem contemperant; putredinem arcent, & obstructions referant, qualia sunt julepi, juscula, emulsiones, aliæque infra recensenda.

Julepi componuntur in materia biliosa, ex syrupis de limonibus, granatorum, de agresta, acetosa simplici, de succo acetosæ, de cichorio simplici, oxysaccharo, cum aquis endiviæ, & graminis, & cichorii.

Vel meliùs ex decoctis rad. acetosæ, cichorii, fol. acetos. capill. ven. scariolæ, dentis leonis, seminum frigidorum, tamarindorum, cum syrupis prædictis.

Interdum verò ad intensiùs refrigerandum, sal. prunellæ additur ʒ. i. pondere pro unaquaque julepi dosi vel spiritus vitrioli aut sulphuris q. s. ad moderatam aciditatem.

Acida in biliosis febribus nunquam omittenda; quia amara dulcificantur per acida: quæ si intensa sint in suo gradu, ut spiritus vitrioli, aut sulphuris, ipsius aloës, & colocynthidis amaritudinem delent. Bilis autem flava, suo amarore spoliata, mortua est & innoxia.

Ex



Ex succis etiam parati possunt julepi, summæ efficacæ, & gustui gratissimi, in hunc modum.

℞. Succī pomor. redolent. recenter extracti, & per reficientiam depurati ℥. iv. succi limon. ℥. j. aquæ rosar. ℥. ij. succi granat. ℥. j. sacchari albiss. lb. β. fiat julep. clarificatus pro ℥. j. dosib.

Si bilis valde acris & tenuis sit, quæ orgasmum faciat, diarrhoeam, aut gravem aliquam aliam fluxionem pariat; incrassantes julepi componendi sunt ex aquis lactucæ, portulacæ, papav. rhœad. nymphææ, rosar. cum syrupis violaceo, jujubino, de rosis silch, de succo portulacæ, papav. rhœad. papav. albi, vel ex decoct. lactuc. portul. plantag. flor. nymphææ, papav. rhœad. & viol. cum syrup. præd.

Notandum tamen syrupum violaceum, aliosque dulciores, solos non esse exhibendos: tum quia lavant stomachum: tum etiam, quia antequam in venas penetrent, ventriculi calore in vaporem calidum convertuntur, qui postea sitim intendit. Idcirco aliquid syrupi cujusdam acetosi semper admiscendum, ut facilius penetrent venas, & magis calori febrili resistant.

In progressu febris, apparente concoctione, decoctis prioribus adduntur rad. asparagi, liquiritiæ, folia agrimon. n. pimpinellæ, hepaticæ, capill. ven.

In febribus pituitosis & chronicis magis incidentia, attenuantia, & aperientia præscribuntur, à debilioribus tamen incipiendo, qualia sunt syrupus acetosus, capill. ven. byzantinus, cum decoctis, agrimon. capill. ven. betonicæ, liquirit. passul. In progressu verò prædictis adduntur syrupi de duabus, & quinque radic. acetosus composit. de hyssopo, oxymel. simplex & composit. Decocto verò adduntur rad. 5. aperitivæ, fol. hyssopi, cardui bened. & (si materia sit valde impacta, viscida, & lenta) chamædryos, & centaurii minoris. Quibus si sal tartari, & spiritus vitrioli addantur, felicius operantur.

In febribus melancholicis adduntur, quæ vim aliquam humectandi obtinent, ut syrupus violac. buglossi, borrag. de pomis circa initia: Postea verò de fumaria, de epithymo de 5. rad. oxymel scilliticum, cum decoctis primùm buglossi, borrag. ceterach. capill. ven. fumar. lupulorum, deinde cuscute, scordii, centaurii min. corticum capparum, fraxini, & tamarisci.

Ac denique in nothis febribus, ex variorum humorum miscella oriundis, prædicta remedia commiscenda sunt, ita tamen, ut eorum, quæ prædominantem humorem respiciunt, major quantitas præscribatur.

Pro delicatioribus juscula medicata, juleporum loco, præscribi solent: tum etiam, ne ægri ejusdem remedii diutius usurpati tædio afficiantur; eaque componuntur ex prædictis rad. & herbis, gustui gratiora eligenda, cum pullo gallinaceo, vel frustulo gallinæ, aut capi: iisque interdum quando magis refrigerandum est, salis prunellæ drach. j. spiritus vitrioli guttæ aliquot addi possunt.

In febribus tamen lentis & diuturnis, à contumacibus obstructionibus productis, chamædryos, licet amara, cum cichoraceis, in jusculis decoqui potest, & Montanus in consiliis decoctionem cichorii, & chamædryos in jusculis velut admirandam prædicat, in iis, quibus febris longa cum obstructionibus conjungitur.

In febribus pituitosis decoctum chamæm. præstans, ex Zacut. observ. 29. prax. admir. lib. 3.

Emulsiones etiam hic locum habent, & julepis gratiores ut plurimum esse solent. Tum maximè usurpantur, ubi febris siccam viscerum intemperiem habet comitem, vel catarrhum tenuem, vel pulmonis, & partium spiritualium phlogosin; vel denique, ut remediorum formulæ immutentur, ne æger longioris juleporum usus tædio afficiatur. Harum autem emulsionum compositio in præcedentibus curationibus descripta est.

Aqua frigida, magnâ copiâ exhibitâ, in febribus etiam putridis continuis, à veteribus usurpari solebat, & à recentioribus quam pluribus laudatur. Verùm, quemadmodum in synocho simplici suspectum illius usum esse diximus, sic jam prudenti Medico consultius fore dicimus, ab ea abstinere, propter rationes dicto loco propositas.

Conferet tamen aliquando in magno æstu febrili aquæ

frigida bonum haustum ad ℥. x. vel xij. cum guttis aliquot spiritus vitrioli exhibere: ab ea enim iidem interdum affectus producuntur, quos Galenus aquæ frigida tribuit, ad lb. j. vel jv. exhibitâ. Cum tamen inde ea pericula metuenda non sint, quæ Galenus ipse ex præpositâ magnâ illius aquæ frigida copiæ exhibitione sæpe contingere fatetur. Spiritus enim vitrioli facit, quo minùs aqua obstructiones augeat; quin potius eas aperit, & cito penetrat; atque viscera pervadit, nec moratur in hypochondriis, ut aqua frigida simplex, sed aquis mineralibus & acidulis valde affinis evadit, quæ licet magna copiâ sumantur, non gravant hypochondria, & citissimè rejiciuntur; necnon obstructionibus referendis opportunissimæ sunt.

Ad vires reficiendas, quæ in omni febre vehementi plurimum deiciuntur, conveniunt opiata, & condita roborantia, composita ex conservis rad. buglossi, fol. acetosæ, acetosellæ, stipitem lactucæ, flor. buglossi, borrag. violar. cichorii, rosarum, pulpæ citri, quæ vulgò acidum citri nominatur. Quibus adduntur pulveres coralli, margarit. rasuræ eboris, cornu cervi, diamarg. frig. triasantal. diarrhod. abbat. confect. alkermes, de hyacintho; quæ vulgò in sequentes, aut similes formulas redigi solent.

℥. Conservæ flor. borrag. bugl. & rosar. ana ℥. j. confect. alker. 3. j. pulv. electuar. diamarg. fr. rasuræ eboris, coralli præp. & margarit. præp. ana ʒ. β. sacch. ros. ad pondus omnium, folia auri num. j. Fiat conditum, auro coopertum, quo utatur frequenter ex cochleari per se, superbibendo parum aquæ potus ordinarii, vel cum eadem aqua pro potu admisceatur, vel cum jusculis.

℥. Conservæ cichorii, acetosæ, lactucæ, & acidi citri, ana ʒ. β. pulv. santali citrini, & margarit. præp. ana ʒ. j. spiritus vitrioli ʒ. β. cum syrupo violaceo, fiat opiata.

℥. Conserv. flor. buglossi, rosarum & violar. an. ʒ. j. aquar. endiviæ, acetosæ, & borrag. ana ʒ. j. j. Misceantur simul. Calefiant super cineres, per colum trajiciantur. Deinde adde confect. alker. 3. j. pulv. elect. diamarg. frig. ʒ. β. coralli præpar. margarit. præp. & rasur. eboris, ana ʒ. j. syrupi de limon. & granat. ana ʒ. j. j. Misce. Detur singulis vicibus cochleare.

Pro delicatioribus, & in magna virium exsolutione julepus sequens gustui gratissimus componi poterit.

℥. Aquar. acetosæ, naph. hæ, & rosar. ana ʒ. j. β. syrupi de limon. granat. an. ʒ. β. confect. alker. 3. j. Misce. Utatur ex cochleari frequenter.

Usurpatis per aliquot dies remediis alterantibus, & humores noxios præparantibus ac concoquentibus, & eorum purgationi incumbendum est inclinante febre, & quando concoctionis signa apparent, vitando dies críticos. Idque paulò fortioribus medicamentis, quàm quæ in principio usurpanda jubemus, cujus generis sunt senna, rhabarbarum, agaricus, catholicon duplex & similia, quorum materia & dosis peccantibus humoribus, & naturis ægotantium, à perito Medico erunt accommodandæ. Nonnulli etiam ad diagrydiata audent transcendere, ut diaprun. solut. diaphenicum, electuarium de succo rosar. aut diacarthami. Quæ tamen in febribus continuis rarissimè usurpanda sunt, cum scammonium humores maximè inflammare soleat, & sitim vehementer excitare; idque præcipuè in febribus ardentibus, quibus plurimum noxia sunt, diagrydiata medicamenta. Imò verò rhabarbarum, etsi benignum, ac præstantissimum medicamentum, in valde biliosis febribus apud nonnullos suspectum est, propter calefaciendi, & exsiccandi vim, quâ insigniter præditum est. Quamvis illius noxa magnâ ex parte præcaveri valeat, ut antea dictum est, ejus infusione factâ in aquis refrigerantibus, eamque permiscendo cum decocto tamarindorum, & herbarum refrigerantium, addendo cassiam, syrupum rosar. de cichor. compos. & similia.

Si febris protrahatur, purgatio erit identidem repetenda, interjectis præparantibus & concoquentibus, donec tota illius minera sublata fuerit. Alioqui, si ante integram febris solutionem à purgatione cessetur, periculum erit recidivæ. Quod tamen præceptum restrictione quadam indiget. Si enim post repetitas pluries purgationes febris lenta per-



## Sect. II. Cap. I. De Febr. putrid. continuis. 433

perseveret, quæ ægrum sensim absumat, & in tabem præcipitare videatur; optimum erit purgationes intermittere, & febrem solâ victûs ratione, alterantibusque remediis oppugnare. Contingit enim aliquando, ubi prava quædam est viscerum affectio, diurnitatis febris causa, ut quandiu medicamenta exhibentur, tamdiu morbus persistat. Fatigatur enim natura, quæ deinde vires resumens morbi causam concoquit, & concoctam expellit.

Si tamen febris lenta ab obstructionibus oriatur, qualis in pueris sæpissimè contingit, frequens purgatio, eaque levissima, per epicrasin humores educens, morbum auferre solet, si præsertim ex rhab. componatur, quod & obstructiones aperit & viscera corroborat. Cujus elogium à Montano celebratum, *cons. 10. de febribus hic transcribi meretur. Ille curam proponens pueri, febris lentâ ex obstructionibus laborantis: Inter reliqua, inquit, quod semper certâ fide à me longo experimento probatum est, laudo, ut singulis diebus sumat infusionem rhab. in aqua endiviæ. Nunquam enim vidi febrim ex obstructione, hoc remedio non esse sublâtam, si modo pertinaciter quispiam in ejus usu perseveraverit. Quandoque enim crassissimos humores impactos & obstructiones, quæ ob caloris imbecillitatem, facile tolli non poterant, ex rhab. assumptione curatas vidi. Consuevi igitur accipere libram aquæ endiviæ, in qua drachmam rhab. infundo. in panno lineo involutam. Deinde singulis diebus 3. iv. illius infusionis, facta aliqua expressione: accipi jub. o circa auror. m: & est ejusmodi dosis puerorum: neque desisto ab hac potione, priusquam videam omnino & febrem, & obstructiones fuisse sublatas. Auferuntur enim proculdubio si reliqua rectè sunt; & curationi consentiant.* Hæc Montanus. Apud nos autem in communi usu est bochetum rhabarbari, quod hujusmodi pueris, febre lentâ cum obstructionibus laborantibus, feliciter exhibemus pro potu ordinario. Et fit rhab. drach. semis, vel drach. i. (prout puer ægrius, vel facilius saporem ferre potest) crassiusculè tritam, & nodulo inclusam infundendo in aquæ fontis lb. ij. vel iij. frigidè per diem integrum. Ejusque usus continuatur per mentem, aut diutius, si morbi contumacia id postulet. Etque interdum, si febris admodum remissa sit, & corpus pituitosum, aliquid vini additur ad ingratum rhab. saporem corrigendum.

Post purgationem materiæ morbificæ, natura plerumque in morbi declinatione per urinas excernere reliquias consuevit, quod ex iis copiosioribus, vel crassioribus colligere licet. Illius motus adjuvandus est diureticis medicamentis, iisque temperatis: quales sunt emulsiones, & aperientia in julepis & jusculis suprâ descripta: quibus, si febris admodum remissa sit, aliquid radic. fœnic. & petroselinii, vel fol. absinthii, addi poterit. idque præsertim in febribus pituitosis, ut quotidiana continua.

Si verò natura ad habitum corporis materiæ morbificæ reliquias propellat; sudorifica usurpanda sunt: non calida illa quidem, quæ magis propriè sudorifica sunt, sed alia temperata, quæ eadem ferè sunt cum diureticis: & prout attenuandi vi prædita sunt, humores disponunt, ut facilius à natura per locum sibi magis convenientem expelli valeant. His tamen addi possunt aquæ cardui bened. scabiosæ, spiritus virioli, aliæque, in febribus malignis fufius describenda.

Præter interna remedia, extrinsecus etiam varia adhibentur, ad calorem febrilem contemperandum, partium principum robur confirmandum, vel poros cutis relaxandos, & fuliginem, caloremque febrilem foras attrahendum, Epithemata nimirum linimenta, aliæque cordi, hepatis, aliisque partibus admovenda. Quæ calori temperando destinata sunt, nonnisi in statu, aut declinatione admovenda, dum calor ad exteriora sese diffundit; non in principio, vel augmento, dum circum viscera adhuc residet, nec etiam instante crisi.

Cordi epithema admovendum, in hunc modum componi poterit.

℞. Aquar. buglossi, acetosæ, nymphææ, rosar. an. 3. iii. aceti rosac. vel succi limon. 3. i. pulv. electuar. diamarg. frig. & triasantal. an. drach. i. camphoræ, & croci, an. g. v.

*Laz. Riverii Opera.*

Misce. Fiat epithema, applicandum tepidè cum panno scarlatino.

Ad magis roborandum, & odoris gratiam epithemati conciliandam, adde aquæ naphthæ 3. iii. confect. alker. drach. i.

Ubi magis roborare est animus, epithemata solida cordi applicantur, in hunc aut similem modum composita.

℞. Conservæ buglossi, & rosar. an. 3. i. confect. alker. drach. ii. pulv. electuar. diam. frig. drach. i. sem. Cum succo limon. vel aqua rosar. Fiat epithema solidum applic. post liquidum.

Vel formâ linimenti magis cardiacum ita paratur.

℞. Confect. alker. & de hyacinth. an. 3. iii. pulv. elect. triasantali, & diamarg. frig. an. 3. ii. Cum aqua rosar. fiat instar linimenti, quo illinatur regio cordis.

Ad roborandum quoque, & fuligines, caloremque febrilem foras evocandum, maxinè conveniunt pulli columbini, per spinam secti, & regioni cordis applicati. qui etiam non rarò sinapisari solent pulveribus cardiacis; ut diamarg. frig. & triasantali. Vel antequam applicentur, regio cordis confectioe alker. & linimento cardiaco illinitur.

Hepati quoque epithemata ad moveri solent, in hunc ferè modum composita.

℞. Aquar. endiviæ, cichorii, acetosæ rosar. an. 3. iij. aquæ lactucæ 3. ii. aceti rosac. 3. sem. pulv. electuar. triasan. 3. i. sem. spodii drach. sem. camphoræ scrup. sem. Fiat epithema.

Ad potentiùs refrigerandum, ex succis aliquando epithema confici poterit, in hunc modum.

℞. Succu cichorii, endiviæ, an. lb. sem. succi lactucæ, & aceti rosac. an. 3. ii. pulv. trium fantal. 3. ii. Misce. Fiat epithema.

Non solum autem hepatis, sed etiam universæ hypochondriorum regioni epithemata refrigerantia adhibere utilissimum est: illa enim non solum pepasimum promovent, sed etiam viscerum intemperiem emendant, & impediunt, ne partes principes in marasimum lethalem incendant.

Eadem hepatis regio ungenda erit sequenti linimento, quod etiam renibus atque lumbis applicari poterit.

℞. Unguenti ros. 3. i. sem. Cerati fantalini 3. i. succi endiviæ 3. i. sem. ol. rosac. & ceræ, an. q. s. ut fiat linimentum. Cui addatur aceti rosac. parum unctionis tempore.

Testibus etiam refrigerantia utiliter adhibentur, propter maximum consensum, qui inter his cum partibus principibus intercedit: illis idè refrigeratis, totius corporis incendium magna ex parte restinguitur. Ad hunc usum tale epithema componi poterit.

℞. Aquar. nymphææ, plantag. rosar. & cichorii, an. 3. iii. aceti rosac. unc. i. sem. vini unc. ii. Misceantur, hisque immergatur linteum, quo actu frigidus testis involvantur.

Manuum & pedum refrigerationes maximum quoque juvamentum afferunt, ob eundem consensum, quem habent cum toto corpore propter arterias, & venas, & nervos, quæ ad illas partes delinunt.

Neque timendum est, ne excrementorum distillationem impediunt. Si quidem pauca sunt, quæ ex illis partibus effluunt; & idè majus ex refrigeratione juvamentum, quàm nocumentum emergit.

Manibus itaque contrahantur pilæ marmoreæ, eburnæ, æneæ aut plumbeæ. Vel macerantur manus in aqua frigida, cui vini & aceti tantillum mixtum sit. Plantis pedum admoventur folia lactucæ nymphææ, aqua & aceto immersa. Vel ad utrarumque partium lotionem decoctum sequens parari poterit.

℞. Fol. lactucæ, violar. sempervivi, portulac. fol. vitis salicis, an. M. i. cap. papav. num. xii. vel fol. ejusdem (si adsint vigiliæ) M. i. aceti 3. i. vini albi 3. ii. aquæ fontis q. s. Fiat decoctio. Cui adde, si lubet, lixivii parum ad corroboracionem articulorum. Hoc laventur manus & brachia, pedes, & tibiæ tepidè, bis in die, aut semel horâ somni.

Advertendum porrò est, antiquos balneis aquæ dulcis frequenter usos esse in febrium putridarum curatione,



ut videre est apud Gal. *lib. de core, cap. 7. 11. math. c. 9. & 10. com. 1. ad Glauco. cap. 9.* Eaque vel frigida administrabant in febre vehementissimâ, ut ardente exquisitâ; vel tepida in declinatione febrium, & concoctionis signis apparentibus. Verum nostrâ ætate, non sine periculo huiusmodi balnea administrari possunt, & in uno tantum casu conveniunt; quando scilicet febris in diuturnitatem abit, & corpus calidum & siccum ac squalidum occupans, in hecticam degenerare posse videtur.

Hoc etiam pro coronide addendum, solutâ per crism febre, materiæ mortificæ reliquias purgatione esse auferendis, præcipuè si per sudorem, aut hæmorrhagiam facta fuerit crisis. Hisce enim evacuationibus tenuior tantum materiæ portio educitur, crassior verò relicta novum concipit incendium, & recidivam efficit. Sola itaque crisis, quæ fit per alvi fluxum, solet esse secuta. Cui tamen non ita fidendum est, ut ab omni purgatione prorsus abstineamus. Sordent enim adhuc præcordia, & affluens alimentum corrumpunt, unde aut recidiva oritur, aut alterius morbi causa. Itaque multò satius est (quod à recentioribus nonnullis fuit observatum) semel atque iterum repetito blando cathartico, ita reliquias omnes abstergere, ut omnes recidivæ metus, omnique morbi alterius occasio tollatur.

## C A P U T II.

### *De Symptomatis febres putridas comitantibus.*

**O**Mnes ferè Authores, qui de Febribus scripserunt, symptomata febres comitantia, vel illis supervenientia, eorumque curationes, in fine operis descripserunt, ut omnibus febrium generibus optimè accommodari valeant. Quod eorum consilium tamen si minime improbandum censeo; attamen commodius multò ad praxeos usum censuerim, si illa febribus putridis continuis immediate subnecantur, cum in iis potissimum & vehementia esse soleant, & peculiare medelas exposculent.

Quamvis igitur plura symptomata, multis ex supra enarratis remediis, causæ, morboque accommodatis, emendari soleant, non pauca tamen ipso morbo molestiora, peculiarem curam requirunt, quæ hîc summam describenda est.

Dolor capitis, vigiliæ & deliria, iisdem propemodum remediis curantur, revellentibus, repellentibus, derivantibus, resolventibus, & anodynis. Revellentia sunt clysteres, emollientes & laxantes, purgationes blandæ, phlebotomia, cucurbitulæ, lotiones pedum. Repellentia sunt frontalia, oxyrhodina, unguenta, vel linimenta. Derivantia sunt sectio venæ frontis, vesicatoria. Ad resolventia referuntur olea nonnulla, & animalia capiti admoda, quæ etiam sunt anodyna. Per usum autem prædictorum remediorum exhibentur julepi & emulsiones, ad humores calidos & acres temperandos ac demulcendos. Hisce omnibus accedunt narcotica, non nisi maximâ urgente necessitate, & reliquis non conferentibus, usurpanda. Quorum omnium medicamentorum materia in phrenitidis, & doloris capitis à causa calida curatione, descripta reperitur. In eorum tamen administratione hoc unice observandum, ne instante crisi in usum vocentur: motum enim naturæ perturbare, & crisin impedire valerent. Quod tum de cæteris, tum de narcoticis præsertim est audiendum.

Ad vigiliæ & deliria plurimum confert cataplasma plantis pedum admotum, ex cucurbitis recentibus contusis, foliis sempervivi majoris, lactucæ, & similibus etiam lotiones pedum, ex decocto herbarum refrigerantium. Sic enim frigiditas per nervos cerebro communicatur.

Convulsionem in febribus, præcipuè malignis, aliquando contingunt, à malignis vaporibus cerebri meninges vellicantibus. Quibus mederi oportet clysteribus revellentibus ac cucurbitulis; tum exhibendo frequenter in julepis, aut jusculis pulverem epilepticum, de gutteta vulgò dictum, aut alium consimilem. Ac denique, inungendo spinam dorsî oleo chamæ. violac. amygdal. dulcium, & de nucis indicâ.

Somno profundo febribus supervenienti eadem adhibentur remedia, quæ in sopororum affectuum curatione fuere descripta; hoc tantum observando, ut, quæ intus assumpta nimis calefaciant, minimè usurpentur.

Sitis febricitantium sedatur præcipuè potu refrigerante & humectante. Attamen; si intensior sit, ut potus moderatus ei non sufficiat (immoderatus enim plurima infert incommoda, & ægrum non raro in vitæ discrimen præcipitat,) aliis auxiliis fillenda atque demulcenda est.

Primò itaque frigidus aer inspireretur, æger in silentio maneat, ore clauso per nares expiret, & somno indulgeat.

Deinde abluatur os aquâ hordei tepidâ, aut aquâ in qua decoctæ sint jujubæ, febesten, pruna, lactuca, portulaca, & similia.

Teneat in ore æger frustum rad. liquirit. à cortice mundatæ, & in oxycrato maceratæ. Vel colluat os aquâ hordei; aut simplici, cum modico aceti, aut cum succo granatorum, limonum, vel tantillo spiritus vitrioli.

Vel teneat in ore acinos granatorum, aut laminam mali citrii, limonis, vel aurantii, maceratam in aqua rosarum, saccharo adjecto; vel stolones lactucæ, endiviæ aut portulacæ, folia acetosæ, taleolas anguriæ, cucurbitæ, cucumeris, in aqua frigida prius maceratas. Vel cerasa acida, vel ribes vel tamarindos, vel frustulum crystalli, vel prunorum acidorum nucleos quibus nonnihil pulpæ adhæreat, vel similia.

Utile est etiam ad sedandam sitim saccharum, aqua rosarum madefactum cum spiritu vitrioli, atque iterum efficcatum.

Si levioribus hisce sitis tolli nequeat; permittendus est potus, non initio exacerbationum, neque in augmento; nisi paucissimus; sed in vigore, & potissimum ubi ad declinationem vergit: tunc enim largior potus calorem foras diffundit, & sudorem aliquando movet, præcipuè in febrium intermittentium paroxysmis, in quorum declinatione ad satietatem non raro potum haurire convenit. Varia potus materia in huiusmodi febribus conveniens superiori capite descripta est.

Si verò sitis ab humore bilioso, in ventriculo contento, ducit originem; is per vomitum, aut dejectionem expurgandus est. Vomitus provocabitur, si æger sit nauseabundus, syrupi acetosi simpl. ʒ. j. ʒ. cum aqua hord. aut decocti raphani ʒ. v. Sin minus, purgetur bolo ex cassiæ ʒ. j. & pulpa tamarind. ʒ. iii. vel mannæ ʒ. ii. in decocto prunorum & tamarindorum dissolutis, vel potione sequenti.

℞. Cassiæ recentè extractæ ʒ. vj. mucilag. sem. psyllii ʒ. ʒ. decocti hord. prunor. & tamarind. ʒ. jv. syrupi rosar. ʒ. j. Misce. Fiat potio.

Linguae & faucium ardor, siccitas, & scabrities curatur variis remediis, dictis partibus admotis, in ore detentis, in hunc modum compolitis:

℞. Mucilag. sem. cydonior. ʒ. j. mucilag. sem. malvæ ʒ. ʒ. specier. diatrag. frig. & sacchari candi an. ʒ. j. sacchari albi q. s. Fiat eclegma. Vel

℞. Mucil. sem. psyllii, aut cydon. extract. cum aqua lactucæ, vel rosar. ʒ. ʒ. syrupi violac. limon. aut granat. Unc. j. Misce. Capiat parum per intervalla, & in ore detineat. Vel

℞. Sem. cucumeris ʒ. ʒ. sem. cydon. ʒ. ii. gummi tragacanth. ʒ. j. ʒ. Contundantur semina, & gummi dissolvatur in albumine ovi. Misceantur omnia, & fiant trochisci in ore detinendi.

℞. Sem. psyllii cydon. an. ʒ. j. ʒ. gummi tragacanth. ʒ. sem. sacchari candi drac. iii. Cum mucilag. gummi tragacanth. fiant trochisci. Vel linteo raro includantur, ut fiant noduli, qui macerentur in aqua rosar. & in ore teneantur.

Si profundius asperitas hæserit, fiat gargarisma ex decocto hordei. rad. althææ, fol. lactucæ, portulac. flor. violac. addito melle rosar. syrup. violar. vel saccharo cando, vel oxymel. simpl. & similia.

Si fordes linguae adhæreant, ut plerumque fit: sæpè detergenda est linteo asperiori intincto oxycrato. Cui etiam succus sempervivi, & sal prunellæ interdum addi poterit.

Si ardor sit intensior, cum insigni linguae nigredine, magis



## Se&ct. II. C. II. De Sympt. febr. putrid. comitant. 43 5

magis refrigerantia humectantibus permisceantur, in hunc modum.

℞. Succorum lactucae, sempervivi, limonum, an. ℥. j. mucilag. sem. cydon. sacchari candi, an. ℥. 6. sacchari albi q. s. Fiat looch. Vel

℞. Sempervivi recentis M. j. aceti rosac. ℥. iij. aquae hordei ss. j. Coquantur ad tertiæ partis consumpt. In colat. dissolve salis prunellæ drach. j. 6. alum. ʒ. j. syrup. viol. & de moris, an. ℥. j. Fiat gargarismus. Vel sal prunellæ solum in aqua sempervivi dissolvitur, eoque utilissimè lingua & fauces abluuntur: necnon ejus particula absorbere potest, ut ad œsophagum simili ardore affectum pervenire possit.

Exteriùs verò guttur & collum illinantur ol. violac. & butyro recenti, in aqua rosarum lotis quibus veluti ustum guttur humectari possit.

Ad refrigerandum ad moveri possunt, unguentum rosaceum, refrigerans Gal. & similia. Sed multò efficacius admoventur folia lactucae, portulacæ, trita, ac duobus linteis inclusa. Vel millepedes contuli eodem modo ad moveri possunt.

In magno pectoris ardore, qualis in febribus solet contingere, totum pectus inungendum est oleo violaceo, nymphaeæ, & amygd. dulcium. In d. verò, æstu plurimum urgente, fomenta eidem parti ad moveri debent ex decocto hordei, lactucae, nymphaeæ, borraginis, violar. & similibus composita, quibus irrigationes ex oleis prædictis debent succedere; quandoquidem, ex præscripto Galeni & Avicennæ, in hujusmodi febribus, magna cura thoracis, utpote calori fornacis, habenda est. Ea verò remedia, juxta Tralliani præceptum, rarò frigida, quia intra calorem repellunt; nec tepida, quia laxant; sed actu calida, potentia verò frigida ad moveri debent.

Dolor lumborum in febribus excitatur à sanguine fervido & copioso in vena cava ebulliente. Sedari autem debet clysteribus emollientibus & refrigerantibus emulsionibus, ex seminib. frigidis paratis, addendo sal prunellæ inunctionibus eorum partium ex unguento refrigerante Galeni, cum succo sempervivi majori, & camphorâ, vel unguento populeone, vel ol. rosac. nymphaeæ, & papaverino, vel epithemate ex aqua plantaginis rosarum, aceto, oleo rosaceo, & camphorâ, vel oxymethino ex aqua rosarum; oleo rosaceo, & aceto parato, quæ omnia actu frigida æstate, sub tepida aliis temporibus ad movenda sunt.

Inquietudines, quæ in febre affode & paroxysmis tertianæ intermittentis solent contingere, curantur præcipuè purgatione humoris biliosi, ventriculum, aliasque partes sensibiles vellicantis, idque per vomitum aut secessum, prout natura hanc vel illam viam magis affectare videtur: tum clysteribus ad inferiora revellitur. Mox quies omni arte procuratur & potus frigidus exhibetur, necnon julepi refrigerantes, quibus interdum syrupus de papavere, vel laudani tantillum utilissimè permiscuntur. Etiam in vigore paroxysmi syrupi de papav. ʒ. j. utiliter exhibetur.

Syncope in febribus syncopalibus vulgò dictis solet contingere: quarum duo genera constituuntur, ut superiori capite dictum & una dicitur syncopalis minuta, altera verò humorosa. Quarum curationes, utpote ab aliarum febrium putridarum curationibus longè diversas prædicti symptomatis ratione, huic loco reservavimus.

Syncopalis minuta, quæ à biliosis humoribus, acribus, & venenatis generatur, in hunc modum curanda est. Aer sit frigidus & humidus; parumque adstringens, ut exsolutio prohibeatur. Victus tenuis, refrigerans, & instaurans, ex jussulis pullorum cum acetosa, portulacâ, &c. decoctorum, quibus addi potest aqua rosar. succus granat. & parum sacchari. Panis infusus succo granatorum, vel aurantium exhiberi poterit, si victus paulò plenior sit concedendus, necnon cremor hordei, aut panatella cum succo granatorum, aut limonum. Tum jura restaurantia, ex carnibus expressis, cum dictis succis. Robustioribus exhibentur vitelli ovorum cum omphacio, testes gallorum, carnes pullorum, gallinæ, perdicis, iisdem succis alteratae.

Potus tempore pastus, si non adsit inflammatio alicujus

Laz. Riverii Opera.

visceris; sit vinum aquosum non vetustum, nec vaporosum. Extra pastum aut si aliqua sit inflammatio, aqua hordei, aut aqua panata, cum syrupo granat. limon. acidi citri julepo rosac.

Somnus extra paroxysmum convenit, in eodem nocet. Ac denique maximè fugienda, quæ iram, tristitiam, & similes concitant.

In paroxysmo flabellis refrigerantibus, & irrorationibus odoriferis, spirituum resolutio supprimenda est. Facies aspergenda aquâ frigidâ, vel rosar. cum aceto. Eadem quoque testes in viris, & mammae in mulieribus frigidè foveri poterunt.

Si calor cum spiritibus è corde ad exteriora non revocetur; revellendus est frictionibus extremorum, ac vellicationibus: tum nares sæpè apprehendantur, pili vellantur, nomine proprio sæpè æger inclametur. Detur mica panis succo granat. infusa, aut vinum tenue odoriferum, aqua rosar. dilutum: Et urgente necessitate, aqua cinnam. cum aqua rosarum. Interim jura restaurantia non omittantur, quibus confectio alkermes, aliæque admisceri poterunt. Potiones quoque cordiales sæpè ex cochleari exhibendæ, in hunc modum compositæ.

℞. Aquæ ros. ʒ. ij. aqua naph. h. hæ. ʒ. j. aquæ cinnam. ʒ. 6. confect. alker. ʒ. j. margarit. præp. & coralli præp. an. ʒ. sem. manus Christi perlata ʒ. vi. Misce. Fiat potio ex cochleari sumenda. His accedere possunt opiatae, & condita, superiori capite descripta.

Medulla panis adhuc calentis aqua rosar. & aceto irroretur, & ori, naribusque admoveatur.

Cordi epithemata refrigerantia, & roborantia applicentur.

Ad poros densandos, & impediendam dissolutionem, involvatur æger linteis, consperso pulvere rosar. balaustrorum & santalorum; vel irrorentur lintea aquâ rosar. cum modico aceto.

Totum corpus, præcipuè dorsum, illinatur sequenti linimento.

℞. Ol. rosar. omphac. an. ʒ. j. sem. myrtill. cydon. mucilag. sem. psyll. an. ʒ. vi. gummi arab. dissoluti in aqua ros. ʒ. ij. ceræ albæ. q. s. Fiat linimentum.

Ventriculi ratio præcipuè habenda est, quod in eo præcipuè humor noxius cumuletur. Illinenda autem est illius regio oleo rosaceo, & cydon. tum imponatur panis tostus maceratus succo cydonior. & granat. acidorum. Vel in magno urgente æstu foveatur tepidè decocto portulacæ & rosarum, vel etiam succo solani, portulacæ, uvæ acerbæ, adjecto ol. rosac. & cydoniorum.

Sublata syncope, & relictis viribus, ad febrem, ejusque causam tollendam convertendus est animus. Quod fiet alterantibus & evacuantibus quæ febribus ardentibus idonea superiore capite descripsimus.

Syncopalis humorosa, quæ ab humorum pituitosorum & crudorum multitudine produciitur, contraria ferè est curatio ei, quæ minutæ adscripta. Siquidem aer debet esse temperatus, ad calidum inclinans, lucidus, purus, & siccus, Cibi boni succi, & facili concoctionis, præparati cum hyssopo, fœniculo, aliisque. Potus sit vinum tenue, & oligophoron. Somnus & vigiliæ moderatæ.

At frictiones in primis maximè commendantur à Gal. 12. meth. cap. 1. eæque ab initio morbi celebrandæ sunt linteis asperioribus supernè deorsum, primùm in pedibus & cruribus; post in brachiis; humeris, & dorso. Lintea prius suffiantur styrace, ligno aloës, thure, caryophyllis, &c. ubi à frictione artus abundè incaluerint, inungantur oleo anethino, chamæmelirino: costino, aliisque resolventibus. Hujusmodi frictiones plurimum laudantur, quia calorem cum spiritibus, ac materiam noxiam, vires suffocantem, ad exteriora evocant.

In paroxysmo æger excitandus est narium apprehensione, aurium frictione, pilorum avulsione, inclamatione &c. Præterea ori & naribus odorata admoveantur, ut aqua cinnam. flor. aurantium, acetum infusionis caryoph. mica panis intincta vino Hippocratico, quæ etiam per os exhiberi potest; aut ipsum Hippocraticum solum, aut aqua cinnamomi, aut potio cardiaca sequens.

l i i 2

℞. Aquar.



24. Aquar. melissæ, rorism. & flor. aurant. an. ʒ. j. aquæ cinnam. ʒ. sem. confect. alkerm. ʒ. j. syrupi condituræ cort. citri & caryophylli nostratis, an. ʒ. j. Misce. Fiat portio quæ detur ex cochleari frequenter. Opiata etiam in hunc modum componi poterit.

25. Conservæ flor. buglossi, anthos, & cort. citri condit. an. ʒ. sem. nucis moschat. condit. ʒ. iij. confect. alkermes ʒ. ij. specier. diambrae, diamoschi dulcis, an. ʒ. j. cum syrupo condit. cort. citri. fiat opiata.

Cordi admoventi possunt epithemata, & pulli columbini; ventriculo & testibus fomenta aliâque administrari, quæ in virium imbecillitate fuere proposita.

Dum hæc fiunt, ad frictiones identidem redeundum est, quæ nunquam in hoc affectu sunt omittendæ.

Refectis aliquantum viribus, materia morbifica educenda est per clysteres & purgationes, (in quibus hiera cum agarico, ratione ventriculi, multum prodest) quæ blandæ & frequentes esse debent, interjectis tamen præparationibus idoneis.

Inappetentia omnibus propemodum febribus communis est. Dum enim ventriculus calida intemperie afficitur, fames imminuitur, & sitis augetur. Aliquando tamen ita dejicitur appetentia, ut, ægri vix juscula haurire possint. Fitque illud cibi fastidium à vitiosis humoribus, in ventriculo collectis, aut illius tunicis inbibitis, vel corruptis malignisque vaporibus, ventriculum obsidentibus. Curari debet evacuatione causæ morbificæ, per vomitum aut feces, idque ab initio diluto rhab. & tamarindorum. In declinatione verò, si febris non sit valida, cum hiera picrâ in decocto hordei, cicerum, absinthii, aliorumque detergentium dissolutâ. His succedere debent clysteres detergentes, qui consecutione quadam à ventriculo revelant. Præterea exhibenda sunt frequenter acida & refrigerantia, ut syrup. limon. granat. cerasa acida, &c. per se, vel cum aqua frigida exhibita. In declinatione, aut cessante febre, syrupus de absinthio pontico utiliter dari poterit, vel solus, vel cum syrupis, aut succis acidis permixtus. Cibi offerantur ægro magis grati. Ut enim docet Hippocr. *aph.* 38. *sect.* 2. paulò deterior, sed suavior cibus & potus, meliori, sed insuaviori præferendi. Per rara autem intervalla cibus non multus assumatur, frequentior enim & copiosior inappetentiam vel sanis inducit. Conduciantur verò cibi, modò tussis absit, omphacio, aceto rosac. succo limon. Si æger ita abhorreat ab omnibus cibis, ut nihil omninò assumat; injiciantur clysteres nutrientes, bis aut ter in die; eductis prius excrementis clystere detergente. Solutâ omninò febre si remaneat inappetentia, æger modicè se exerceat, utatur capparibus, saxifraga, olivis, locum mutet, & migret ad aërem frigidiorum. Ac tandem, si hæc non sufficiant, utatur vino absinthite, & pilulis de hiera, quæ humores ventriculi tunicis impactos potenter abstergunt.

Singultus & vomitus febribus superveniens, variis oppugnant remediis, quorum materia ex singultu & vomitu curationibus, à nobis descriptis, erit repetenda, & singulis febricitantibus, hisce symptomatis correptis, cum delectu ac judicio accommodanda. Cavendum tamen maxime est, ne vomitus criticus ulla ratione cohibeatur. Singultus interdum ex immodico refrigerantium usu procedit, ut testatur Lemnius, referente Schenkio, his verbis: *Singultus in febribus nonnunquam sequitur intemperatum refrigerantium usum juleporum. Quomodo affectos inconsultâ temeritate Medicorum plures vidi, idque symptoma contra omnium opinionem vini potu sustulimus.*

Fluxus alvi, febribus putridis superveniens, si criticus sit, cohibendus non est: neque symptomaticus statim initio, si vires admodum non dejiciat, ne humor vitiosus ad partes principes recurat. Quando cohibendus est, id fit purgatione blanda, & simul adstringente, clysteribus detergentibus & roborantibus; assumptis & admotis incrassantibus roborantibus & adstringentibus. Quæ omnia ex diarrhœæ curatione erunt desumenda, à levioribus incipiendo, & ad fortiora, si necessitas urgeat, paulatim progrediendo.

Si vires, si critici non sint, sed symptomatici, viresque

maximè dejiciant, cohibendi erunt aëris refrigeratione, conspergendo aquam frigidam, folia falicis, & vitis supra pavimentum; & si opus sit, fenestras aperiendo, corporis eventilatione paulatim facta levibus integumentis, ac molli culcitra detractâ: Item facie oxycrato frequenter conspersâ: ac denique usu medicamentorum frigidorum adstringentium: qualia sunt epithemata refrigerantia cordi, hepati, ac toti ventri admovenda, & subinde immutanda. Unguenta ex oleo rosac. myrtino, mucilag. & pulv. adstringentibus composita, toti corpori, & præsertim spinæ dorsii applicanda. Pulveres ex rosis, balauistiis, malicorio, myrtillis, mastiche, terrâ Samiâ, &c. collo, thoraci, alis, & inguinibus inspergendi: vel æger involvatur linteo irrorato oxycrato cum pulveribus prædictis, cavendo tamen, ne inflammatio aliqua, aut tumor aliquis præter naturam in hypochondriis lateat, tunc enim ab adstringentibus, saltem validioribus, est abstinendum. Sudor abstergendus non est; sed sinendus, ut ad poros cutis concrefcens alium affluere prohibeat.

Per os verò exhibenda incrassantia abstergentia, & roborantia, ut hordeata ex decocto lactucæ, & sem. frig. parata, juscula instaurantia cum succo granatorum, agrestis, pulveribus corallor. margarit. rasur. eboris, santalorum, aut balaustiorum. Julepi ex aquis rosar. lactucæ, portulac. cum syrupo granat. de rosis siccis, aut cydonior. Opiatæ ex conservâ rosarum, corallis, margaritis, terrâ sigillatâ, pulv. diamarg. frig. triasantali, &c.

#### A P P E N D I X.

In febrium acutissimarum & perniciosarum curatione hoc diligenter advertendum: rarissimè eas fieri sine interna & peculiaris visceris cujusdam affectione; & plerumque inflammatione. Quare nunquam omittenda cura hypochondriorum, capitis thoracis, uteri, renum & vesicæ: ut omni ratione investigemus, quæ harum partium insigne laboret, & ei, quoad fieri potest, subveniatur.

### C A P U T III.

#### De Febre tertiana intermittente.

**F**ebbris tertiana intermittens fit à bilioso humore excrementitio in prima corporis regione contento ac putrescente.

Alla autem vel legitima est & exquisita; vel illegitima, notha, seu spuria.

Legitima seu exquisita horis 12. terminatur, & producit à bile naturali putrescente. Notha verò seu spuria paroxysmos habet 12. horas excedentes. Quod si 24. horas excedat, tertiana extensa nominatur. Fitque vel à bile præternaturali putrescente; vel à naturali, aliis humoribus, præsertim pituitæ, permixtâ.

Item tertiana alia simplex est, alia duplex, alia triplex. Simplex dicitur, cujus paroxysmi tertio quoque die, hoc est alternis diebus, recurrunt. Duplex verò, quando paroxysmi singulis diebus invadunt. Et quamvis in hoc è quotidiana non differat, utroque tamen distinguitur per signa propria, bilem, aut pituitam redundantem indicantia, quæ suis locis exponuntur. Aliquando tamen in tertiana duplici duo paroxysmi eadem die apparent, altera die remanentelibera: idque recentiores nonnulli vocant duas tertianas, & à tertiana duplici distinguunt. Quæ tamen dictio exigui momenti. Triplex tertiana fit, quando duorum dierum spatio tres apparent paroxysmi. Rarissima est hæc febris. Unum tamen illius exemplum proponitur à Galen. 2. *de cris. cap.* 9. Et nos aliud vidimus anno 1637. In quodam viro nobili, qui singulis 16. horis febris tertianæ paroxysmum patiebatur. Et singuli paroxysmi intra 10. aut 12. horas per sudores judicabuntur. Fiunt autem diversi hi paroxysmi à diversa materia, in diversis locis putrescente, ita ut unaquæque peculiarem locum obtineat.

Humores autem, febres tertianas producentes, in prima potissimum regione cumulantur: hepate nimirum cystide felleâ, ventriculo, mesenterio, pancreate, aut venis illarum partium.

Earum



## Sectio II. Cap. III. De Febre tertiana intermit. 437

Earum causæ sunt omnes, quæ bilem excrementitiam generant: nempe calida & sicca hepatis intemperies, ætas juvenilis, aëris constitutio calidior, vigiliæ, curæ, iræ, jejunia, ciborum calidorum usus, exercitatio nimia. His accedunt ad tertianæ nothæ productionem, causæ, pituitam & melancholiam generantes. Hinc illi, qui calidiori hepate præditi sunt, & ex crapula, ac prava victûs ratione; multas cruditates generant, ex bilis cum crudis humoribus permixtione, tertianis nothis obnoxii sunt. Hinc etiam æstatis tempore crudi humores, ex caloris nativi imbecillitate, fructuum esu, & nimio potu geniti, bili permixti, tertianas nothas pariunt.

Signa diagnostica tertianæ exquisitæ sunt, quod hæc febris statim cum insigni rigore incipiat, quod à quotidiana distinguitur, in qua levis tantum horror, aut frigefactio apparet. Deinde rigorem sequitur calor intensus, acer & mordax, sitis intolerabilis, respiratio magna & frequens, vigiliæ, capitis dolor, & interdum deliria. Rigorem etiam sequitur interdum vomitus biliosus, vel alvi fluxus. Urina aliquando flava est rufa, vel rubra. Accessiones ultra 12. horas non extenduntur, & sudoribus terminantur. Præterea præcesserunt causæ, bilem generantes, supra enumeratæ.

In tertiana notha signa omnia prædicta sunt remissiora, quam in exquisita; sed intensiora, quam in quotidiana. Et prout major vel minor pituitæ copia bili admixta fuerit; paroxysmi ad tertianæ exquisitæ, vel quotidianæ paroxysmos magis vel minus accedunt, tum ratione intensioris symptomatum, tum ratione durationis ipsius paroxysmi. Ita ut tertianæ nothæ paroxysmi ad sexdecim, octodecim, & plures horas extendantur. Quamquam interdum possunt esse breviores, ob materiæ paucitatem, & intra octo, decem, aut duodecim horas terminari.

Prognosis desumitur ab Hippocr. *Aphor. 50. sect. 4. Tertianæ*, inquit, *exquisitæ septem circuitibus, ad summum, judicantur. Et Aph. 43. ejusdem sectionis. Febres quocumque modo intermiserint, periculum abesse significant.* Quod tamen intelligendum est de tertianis febribus, omnis malignitatis expertis. Dantur enim tertianæ malignæ, & pestilentes, quæ quamvis evidentes habeant intermissiones, ægrotantes tamen non raro de medio tollunt. Præterea multa febris tertianæ possunt supervenire, quæ vitæ periculum inferre possunt, quamvis febris ex se periculosa non sit.

Scribit Haly, & vulgatissimâ docetur experienciâ tertianâ laborantibus, si ulcera, ut pustulæ in labiis & naribus erumpant, finem febris prælagire. Est enim quædam veluti crisis, quæ ad illas partes fit.

Alvi fluxus, febris tertianæ superveniens, materiâ jam concoctâ, eam solvit. Et hæc unica est via, quâ hujusmodi febres perfectè judicantur. Cum enim illarum focus in cystide fellea, vel hepate vel mesenterio, aliisque partibus primæ regionis contineatur; etiam si quæ singulis accessionibus effertur exhalatio, in habitum corporis irrepsens, vel sudoribus, vel insensibili transpiratu, vel papulis expurgetur; manet tamen crassamentum: quod nisi beneficio naturæ, vel medicamentorum per alvum expurgetur; aut febris diuturnæ, aut obstructionum aut recidivæ, aut aliorum morborum contumacium causa esse solet.

Breves & securæ esse solent febres intermittentes, si bonus sit totius corporis habitus, si viscera benè sint affecta; si ver aut ætas adsit; æger non multo utatur alimento, & parcè bibat. Contra verò longiores & contumaciores esse solent, si prava adsit jecoris, aut lienis affectio; si æger abundet humoribus pituitosis, aut melancholicis; si hyems, vel autumnus vigeat; si æger multo utatur alimento, aut potu multo calore opprimat.

Curatio, ut in aliis febribus, ad febrem, ejus causam, & vires dirigenda. Febris indicat refrigerantia: causa, eadem refrigerantia, tum concoquentia, & evacuantia: vires roborantia.

Ac victûs ratio primùm instituenda est refrigerans & humectans, eandem prorsus in tertiana exquisita, quæ in febribus continuis fuit proposita. At in tertiana notha,

eaque simplici, paulò plenior victus imperandus est, præcipuè si illa in longitudinem abeat: tunc enim solida alimenta exhibenda sunt die intermissionis, & quinque vel sex horis ante accessionem: In tertiana verò duplici quemadmodum in tertiana exquisita, solis jusculis, aliisque forbilibus alimentis æger nutriendus est.

Potus gratissimus in tertiana notha, ex Foresto.

℞. Aquæ fontis lb. ii. cinnam. ʒ. sem. sacchari Unc. iii. Hæc cruda per manicam Hippocratis trajiciantur.

In accessione autem alimentum exhibendum non est, juxta sententiam Hippocr. *Aph. 11. sect. i.* Natura enim, ut docet Galen. *in comment.* cibi concoctione avocatur à concoctione humorum morbificorum, adde quod in accessione tetro vapore universum corpus perfundatur, qui cibum recenter sumptum labefactat, & maxima parte corrumpit. Attamen, si accessio adeò longa fuerit, vel corpus ægrotantis adeò calidum & siccum, gracile, & raræ texturæ; ut facillè dissolvatur, & ad finem paroxysmi sufficere non valeat, etiam in accessione cibandus æger est, quod melius fiet in statu, quam aliis temporibus. Quamvis etiam in principio, & augmento, urgente necessitate, cibus offerri possit. Si enim Galen. *10. meth. cap. 5.* hac febre laborantes calido & sicco temperamento præditos, quibus adversissima est inedia, ne in syncopen inciderent, etiam in principio accessionum cibare coactus est. Ad ejusque imitationem Amatus Lusitanus *cur. 98. cent. 4.* picrocholo, & meram bilem evomenti, unde syncope oriebatur, panem lotum, agrestâ aspersam, paroxysmi initio exhibuit, sicque prædicta symptomata inhibuit.

Illud præterea tum in hac, tum in aliis febribus intermittentibus est observandum, ut æger ante paroxysmum, neque potum, neque cibum assumat, neque somno indulgeat. Utiliter tamen alvum deponet, injecto clystere, si opus fuerit, modò ille ante initium paroxysmi injiciatur.

Institutâ igitur victûs ratione idoneâ, ad materiæ morbificæ evacuationem statim progrediendum est; quæ cum in primis viis hæreat, non solum clysteribus, sed etiam medicamentis assumptis, alvum laxantibus, tum vomitoriis edacenda est.

Clysteres, in tertiana exquisita fient ex decocto emolliente & refrigerante, cum cassia, catholic. diapr. simpl. aut solutivo. In notha verò fiet decoctio ex emollientibus & incidentibus, dissolvendo diaphoen. mel. rosac. &c.

Alvum laxantia medicamenta in tertiana exquisita erunt eadem, quæ in febribus continuis fuere proposita. In notha verò addantur agaricus, senna, catholicum, diaphoenicum, aliæque ex curantis Medici judicio, juxta varias ægrorum constitutiones eligenda. In quacumque verò specie cremor tartari utiliter medicamentis addi poterit, qui obstructions aperit, potenter detergit, & nihilominus refrigerat. Medicamenta purgantia die intermissionis exhibenda sunt, idque matutinis horis, ut vulgò solet fieri, si intermissio in eas horas incidat. Alioqui tempus inter duas accessiones medium eligendum. Et quâvis horâ diei ac noctis exhiberi potest medicamentum, modò illa ab accessionibus plurimum distet, & ventriculus assumptum prius alimentum concoxisse videatur.

In tertiana autem duplici difficile est horam exhibendi medicamenti eligere, cum non raro tres aut quatuor tantum horæ duobus paroxysmis intercidant. Imò interdum adeò longi sunt paroxysmi, ut alter incipiat, antequam prior desierit, unde febres subintrantes non inantur. Tunc enim occasio præceps exactam Medici diligentiam postulat. Commodior autem exhibendi medicamenti hora ita eligenda est, ut in tertiana duplici non subintrante, in fine paroxysmi exhibeatur, ea ad sequentem paroxysmum distantia, ut antequam ille invadat, operatio medicamenti absoluta sit. In febre autem subintrante exhiberi debet medicamentum in declinationis principio, simulatque taniillum remittere incipit. Et in utroque tribus horis ab assumpto medicamento jusculum exhibendum est: ita tamen ut tres aliæ supersint horæ ab assumpto jusculo, antequam paroxysmus invadat. Atque adeò sex horis ad minimum exhibendum est medicamen ante proximum paroxysmum.



Quod ad vomitoria spectat: ea, quæ de iis in continuorum febrium curatione dicta sunt, hic etiam commodius aptari possunt; cum humorum illuvies in ventriculo, mesenterio, & cavis hepatis contenta, quæ huiusmodi febres solet producere, per vomitum aliquando educatur, quæ tamen interdum medicamentis, per inferiora purgantibus, etiam pluries exhibitis, deturbari nequiverit, ut rectè Fernellius annotavit. Atque ita, si in principio paroxysmi æger vomitibus torqueatur, tunc naturæ motum rectè sequetur Medicus. Et cum mitiora vomitoria plerumque non sufficiant, ad mediocria veniendum est: quale in primis est asarum, cujus in pulverem redacti ℞. ij. vel ℞. exhibetur cum jusculo: aut alio liquore convenienti. Alii decoctum illius exhibent; quod paratur ex ℞. iij. rad. asari decocti in jusculo pulli, vel aqua hordei & passulorum. Chymici vitriolum album præparatum, & sallem vitrioli usurpant, tum etiam aquam benedictam, quæ ex croco metallorum fit. Quæ quidem ut & cætera medicamenta ex antimonio desumpta sicuti materiam in primis viis stabulantem nonnunquam feliciter evacuant; ita prudentem & peritum, qui ea exhibeat, Medicum desiderant. Alioqui sunt veluti culter acutus in manu infantis, aut gladius in manu furiosi.

Expurgatis primis viis, uno saltem medicamento, vena aperienda est die intermissione. Imo verò, corpus si sit plethoricum, & urinæ rubræ, ac crassæ appareant, curatio utiliter à phlebotomia inchoabitur: melius enim postmodum purgatio procedet.

Si sanguis valde calidus, adustus, aut putridus appareat phlebotomia erit iteranda: quod tamen à Medici judicio pendere debet, juxta propriam ægrotantis constitutionem.

Post purgationem & phlebotomiam, præparationi humorum incumbendum est per julepos, in febribus continuis propositos, quorum materia varianda est, prout pituita, melancholia bili permixta est, ut etiam dicto loco annotatum est.

Interim verò, cum prædicta remedia fiunt, calor febrilis temperandus est epithematis refrigerantibus, cordi & hepati admotis, qualia in febribus continuis fuere proposita. Hac cautione adhibita, ut nonnisi in summo febris vigore, aut potius in declinationis principio admoveantur. Hepati etiam, & lumbis unguentum rosaceum aut refrigerans Galeni applicari poterit.

Clysteres emollientes & refrigerantes in fine paroxysmi, ut ante illius invasionem, erunt utilissimi.

Præparatâ materia, per aliquot dies, usu juleporum, purgatio iterum instituenda est, ex senna, rhab. catholico-ne, syrupo rosaceo; addendo agaricum, si redundet pituita. Et si æger sit robustus, addi potest diaprun. solut. electuar. de succo rosar. vel diaphoenicum.

Purgato iterum, post usum juleporum; corpore si accessiones redeant, & ad longius tempus continuari videantur signum est, humores crassos, & pertinaciter inhaerentes, febrem fovere, & obstructions producere, quorum ratione abstergentia, aperientia, & incidentia usurpanda sunt. Eorum autem præcipua sunt absinthium, quod valde commendatur à Galen. 1. ad Glau. cap. 9. & centaurium minus, quod ratione virtutis eximiae, quam habet in curandis febribus *febrisfuga* nominatur. Quia tamen ea calida sunt frigidorum commixtione temperari possunt in hunc modum.

℞. Rad. gram. cichorii & asparagi an. Unc. i. fol. agrimon. acetosæ, cichorii, endiviæ, ana M. i. absinthii vulgaris, & centaurii min. ana. M. sem. Coquantur ad ℞. i. In colat. dissolve syrapi limon. ℞. iij. Fiat julep. pro tribus dosibus matutinis.

Finitis julepis purgans medicamentum iterum exhibendum est. Vel vomitorium, si natura per illam viam evacuationem affectet, Tunc enim, apparentibus scilicet concoctionis signis, hujusmodi febres feliciter per vomitum non rarò curantur. Et Galen. ad Gl. uc. cap. 10. multos solo vomitu ab hac febre curatos esse scribit. Imò verò quotidiana docet experientia, aquam benedictam hujusmodi febres ut plurimum eradicare, nisi contumaces

viscerum obstructions obstant. Multa hujus rei experimenta proposita sunt à Martino Rulando, in centuriis curationum. Sed vehemens est, ut antea dixi, medicamentum, nec nisi summa cautione exhibendum. Quidam hujus aquæ ℞. i. cum infusione unc. semis fol. sennæ exhibent; sicque magis per secessum, quam per vomitum operatur.

Alii usurpant guttam gummi, alii mercurium dulcem cum scammonio. Quæ remedia cum potenter evacuent, febres huiusmodi sæpissime eradicant; sed robustioribus tantum corporibus exhibenda.

Hisce remediis ut plurimum febres tertianæ, non solum legitimæ, sed etiam nothæ solent succumbere. Si tamen adhuc pertinaciter obstant, (ut sæpè fit) solennis purgatio instituenda est apozemate per triduum propinato, ex materia juleporum addendo sennam, rhabarbarum, agaricum, syrup. ros. de cichor. comp. & similia. Imò verò licet ante hujus apozematis usum tertiana febris soluta sit, utilissimum est apozema exhibere, si spontaneum alvi profluvium non contigerit. Infida enim est illa solutio, & recidivam minatur, cum reliquæ evacuationes, quæ per sudorem, aut insensilem transpirationem fiunt, portionem tantum humorum tenuiorem evacuent, crassiori intus remanente quæ nonnisi per alvum educi potest.

Antequam apozema exhibeatur, si tensio sit in hypochondrijs, admoveatur fons emolliens, attenuans, & roborans in hunc modum compositus.

℞. Rad. althææ gram. & asparagi, ana Unc. i. rad. enulæ camp. & cortic. median. tamarisci, an. Unc. sem. fol. malvæ, violar. agrimon. capill. ven. & absinthii, an. M. i. sem. lini & fœnugr. an. Unc. i. flor. chamom. melilot. rosar. an. P. ij. Coquantur in tribus aquæ partibus, & unâ vini albi sub finem additi, cum aceri Unc. ii. Foveantur hypochondria calidè, manè, & serò per biduum ante usum apozematis.

Post fotum illinantur eadem partes sequenti linimento.

℞. Ol. lilior. amygd. dulc. & tamarisci, an. Unc. i. unguenti de althæa U. ii. ceræ partim. Fiat linimentum.

Si non obstantibus hisce remediis, pertinax febris in longitudinem abeat, & facies tumida, ac subpallida appareat; tum pedes vesperi intumescant; his remediis ægri tractandi sunt, quæ ad hepatis obstructions vulgò præscribi solent. Inter cætera verò maximè laudatur à Montano decoctum cichorii, & chamædrios in jusculo, quod dicit esse admirandum in febribus longis ab obstructione pendentibus.

Notandum tamen est, febris tertianæ longitudinem à calida & sicca jecoris intemperie aliquando foveri, quæ humorem biliosum, novarum accessionum fomitem, continuo producit. Quod sæpè observatur in multis, qui sicco & squalido corporis habitu præditi, & omnino biliosi, citra tensionem viscerum, & citra humoris copiam, per tres aut quatuor menses, calidiori præsertim anni tempore, tertianam passi sunt. His valida purgantia, valde aperientia, & calefacientia nocent. Sed victu refrigerante & humectante, julepis & jusculis simili facultate præditis, tractandi sunt. Et superflui humores clysteribus emollientibus & refrigerantibus, cassiâ, tamarindis, catholico-ne; & syrupo rosac. sensim expurgandi, Sed præsertim balnea aquæ tepidæ hic miranda præstant, calidam & siccam intemperiem visceribus impressam extinguendo. Iis utatur æger die intermissione citra sudoris profusionem.

Interdum etiam febris tertianæ longitudo à prava quadam diathesi visceris, alicujus jecoris præsertim, aut mesenterii dependet: quæ purgationibus quantumvis repetitis, curari nequit, quia prava illa qualitas in viscere remanens, humorem novum quotidie accumulat, quia accessiones fovet. Quæ quidem prava qualitas diureticis, sudorificis, aliisque resolventibus aufertur.

Hisce facultatibus prædita sunt absinthium, centaurium minus, carduus bened. rad. dictamn. pimpinella, tormentilla, aliæque, ex quibus fiunt decocta, pulveres, & similia, per plures dies exhibenda ante accessionem.

Vulgò exhibetur theriaca ad Drach. i. cum vino albo, ante accessionem, tribus vicibus repetendo.

Alii



## Sectio II. Cap. III. De Febre tertiana intermit. 439

Alii nucem juglandem cum saccharo aut melle conditam, eodem modo exhibent.

Ubi theriacæ caliditas timetur, sola primum exhibetur, & desuper aquæ plantaginis cyathus propinatur. Hoc frequenter utebatur Varandæus, præceptor meus; tanquam specifico.

Idipsum præstare potest vini Hippocratici cyathus unus, ante accessionem exhibitus, eoque remedio gratissimo multi curati sunt.

Sedulo tamen advertendum est, ut hæc omnia remedia, nonnisi præmissâ diligenti purgatione exhibeantur.

Zecchius in frequenti usu habebat pilulas sequentes, quæ & ad aperiendas obstructions, hepar roborandum, & viscerum dyscrasias tollendas, sunt efficacissimæ.

℞. Trochisc. de rhab. de eupatorio, & de absinthio, an. Drach. sem. pulver. elect. diarrhod. ʒ. j. Cum syrupo de absinthio, fiat massa pilular. de qua capiat drach. j. manè per triduum superbibendo jusculum ex cichoraceis & capillaribus paratum.

Montanus verò exhibebat per multos dies trochiscorum de absinthio, vel de rhab. scrup. j. cum jusculo, in quo hordeum, radix petrosel. cichorium, & borrag. bullierant.

Exteriùs illinatur hepatis regio, manè & vesperi, ante cibum, linimento parato ex cerati santalini Unc. ij. succi cichorii Unc. sem. succi absinthii drach. ij. & aceti rosac. momento.

Ventriculi pariter regio hoc illinatur linimento.

℞. Ol. nardini de absinthio, & cydon. an. Unc. sem. galliæ mosch. ʒ. j. ceræ albæ q. s. Fiat linimentum.

Præter remedia hæcenus proposita, quæ regularem & methodicam curationem respiciunt, multa alia dantur specifica & empyrica, tam interna, quam externa: tum à practicis laudata, tum apud vulgus usitatissima; è quorum infinito propemodum numero, nos hæc selectiora proponemus. In horum autem remediorum album referenda sunt ea, quæ suprà ad corrigendam pravam diathesin, jecori, aut mesenterio impressam, & febres longas efficientem, sunt proposita. Quibus sequentia cum fructu addi poterunt.

Ac primum spiritus sulphuris in tertiana legitima, vel ad legitimam plurimum accedente, post venæ sectionem, & purgationem, in vigore paroxysmi, cum aqua portulacæ exhibitus, ardorem febrilem potenter extinguit, & si humor sit tenuis, eum per sudores expellit, ut novis paroxysmis materia non suppetat, & ita interdum morbus radicatus evellatur. Ejus datur à ʒ. β. ad ʒ. cum aquæ portulac. Unc. jv.

Aliquando verò dictus spiritus cum sale absinthii miscetur, qui magnæ etiam est efficaciæ, ad curandas febres intermittentes. Compositio talis est.

℞. Salis absinthii Drach. β. spiritus sulphuris ʒ. j. aquæ card. bened. Unc. jv. Misce. Capiat ager instante accessione, & postmodum pluribus vestibus tegatur.

Aliqui succum plantaginis depuratum, & epotum ad Unc. jv. per horam ante accessionem, tertianam febrem sanare afferunt. Alii cum aceto, & croco exhibent in hunc modum.

℞. Succi plantag. Unc. jv. aceti rosac. Unc. semis: croci gran. jii. Misce, capiat duabus horis ante accessionem.

Manardus præ cæteris remediis commendat decoctum chamom. vel aquam ejus distillatam, ad unc. jv. per horam ante accessionem exhibitam.

In vulgari usu habetur, & sæpè feliciter succedit potiuncula, confecta ex aquis rosarum, plantag. & aqua vitæ, singulis ad cochlearis mensuram, exhibenda ante accessionem.

Exteriùs verò sequentia usurpantur.

℞. Fol. hyssopi, & tanacetii minutim incisor. ana P. j. myrrhæ Drach. ij. macis, nucis mosch. caryophyll. & cinnam. ana. Drach. sem. terebinth. Venetæ, & succi tanacetii, an. Unc. j. Misce. omnia, & extendantur suprà placentam rosaceam frixam in sartagine cum vino generoso; quæ panno lineo involuta, applicentur calidè regioni ventriculi, per horam ante accessionem. Vel

℞. Absinthii, menthæ viridis, an. lb. j. crustæ panis affatæ, aceto rosac. infusæ lb. β. pulpæ cydon. vel cydonii cum melle confecti Unc. ij. mastiches Unc. sem. macis, moschar. ana Drach. ij. Omnia pistentur fortissimè cum ol. cydonior. Fiat cataplasma, quod calidè applicetur antè paroxysmum, sudorem provocat, & ventriculi dolorem aufert. Vel

℞. Nucis moschatæ, caryophyll. & cinnam. an. ʒ. jii. myrrhæ & zinziberis, an. Drach. ij. Fiat pulvis, qui excipitur pice liquida, & fiat emplastrum, admovendum regioni stomachi.

Hepati quoque sequens cataplasma utiliter admoventi poterit.

℞. Santali albi, & rubr. an. Drach. j. farinæ hordei ʒ. jii. aloës ʒ. sem. flor. violar. & rosar. siccar. an. ʒ. j. Cum succo absinthii & aceto, fiat cataplasma, applicandum regioni hepatis, horâ unâ ante accessionem.

Neque omnino rejicienda sunt ea remedia, quæ vulgò carpis applicari solent. Non solum enim hisce vulgi opinio expletur, quòd plerosque hisce remediis sanatos existimet. Sed etiam aliquid præstari possunt, vires suas cordi communicando, per arterias insignes, quæ ad carpos decurrunt. Horum verò præcipua, sunt quæ sequuntur.

℞. Fol. plantag. & chelidon. maj. ana M. j. telæ araneæ, sem. urticæ, fuliginis camini, & salis communis, ana Drach. j. aceti fortiss. q. s. Fiat cataplasma, applicandum carpis paulò ante accessionem, & ter, aut quater iterandum.

Auricula muris contusa, cum sale, & aceto, carpis admota ante accessionem, maximè à nonnullis creditur efficaciæ.

Ab aliis laudatur sempervivum minimum, seu mamilla muris eodem modo parata.

Alii folia burfæ pastoris cum sale & aceto trita commendant.

Platerus corticem interiorem ramorum nucis, aceto maceratam, carpis applicat, & se feliciter hoc remedio usum testatur.

Alii denique vesicas excitantia, ut allia, cepas ranunculam & similia applicant, quæ minùs tuta, & valdè incommoda sunt.

### CAPUT IV.

#### De Febre quotidiana intermittente.

**Q**uotidiana intermittens ita appellatur, quòd illius paroxysmi singulis diebus repetant. In quo tamen cum duplici tertiana, & triplici quartana convenit; sed propriis signis ab iisdem distinguitur. Karissima est hæc febris, atque ex sexcentis ægrotis, febriles accessiones singulis diebus patientibus, vix unus quotidianâ laborat.

Generatur hæc febris à pituita putrescente, in prima corporis regione. Ideoque ea omnia, quæ pituitam in corpore cumulare possunt, hujus febris causæ esse possunt. Qualia sunt viscerum temperies frigida & humida, ætas senilis aut puerilis, vita otiosa, tempus hyemale, alimenta frigida & humida, somnus longus, & similia.

Signa diagnostica ea sunt, quæ pituitam in corpore redundantem significant: ut corporis moles ampla, mollis, & obesa, color albus, aut pallidus, sensus hebetes, somnus profundus, insomnia aquarum. Tum hæc febris ut plurimum nocturnis horis solet invadere, idque sine rigore, sed cum frigore tantum, aut levi horrore, quando quidem materia benigna, & naturæ non adeò insensa, minùs ipsam lacessit, ideoque calor non cum impetu, ut in tertiana, sed sensim ad interiora revocatur. Transacto frigoris tempore, calor sègniter accenditur, & inæqualiter, ut modò frigus, modò calor sentiatur. Calor deinde mitis est, ac minimè deurens, sitis exigua. Urinæ in principio albæ, tenues & crudæ, in progressu verò crassiores & coloratiores apparent. Pulsus parvus, rarus & tardus. Præcordia intumescunt, & magna ex parte inflantur ac distenduntur. Paroxysmi ad 12. horas extenduntur, & non desinunt in integram *ἀναψύξιν*: quia hæc febris similis est igni in lignis



lignis viridibus accenso, qui & tardè accenditur, & multum fumi relinquit. Aliquando paroxysmus ad 24. horas extenditur, & febris continua apparet.

Hæc autem signa plurimum evariant, & intensiora vel remissiora apparent, prout pituita vel simplex est, vel aliis humoribus permixta; tum etiam pro varia specie pituitæ putrescentis. Unde ex Galen. *lib. de pleuritide, cap. 11.* à pituitâ falsâ, siticulosi: ab acida, famelici: à dulci, somnolenti: ab insipida inappetentes fiunt. Sic etiam quæ ab acidâ aut vitreâ pituitâ febres producuntur, cum rigore solent invadere.

Febris hæc perpetuò longa esse consuevit, ob materiæ morbificæ crassitiem & contumaciam, & ad 40. dies interdum ad 3. aut 4. menses extenditur. Nec periculo vacat, cum in cachexiam, hydropem, lethargum, aliosque gravissimos affectus degeneret. Major vel minor longitudo ex cruditis & concoctionis signis indicabitur; tum etiam ex evacuationibus, quas plerumque natura per vomitum, alvum aut sudores molitur. Illæ enim apparentes, breviorum morbum significant. Si verò natura nihil molitur, longiorem.

Quotidiana diurna periculosior est nocturnâ, ut docuit Hippoc. 3. *Epid. sect. 5. text. 64.* Diurnam appellat, quæ interdiu incipit, & noctu intermittit; nocturnam, contra. Cujus prognostici ratio est, quia diurnæ longiores habent accessiones. Cum enim ad noctem usque extendantur, in qua densatur corporis habitus, fit, ut vapores putridi intus retineantur, nec tam liberè transpirent; unde longiores fiunt accessiones, ut ipse asserit Hippoc. ad tabem sapissimè perducunt. Adde quòd, cum intermissio noctu contingat, noctu etiam cibare ægrum cogamur, quod intempestivum est, & ægrum vigilare cogit, quo tempore dormire deberet: unde plurimum læditur, debilitatur, totaque illius œconomia subvertitur.

Curatio eadem ferè adhibenda est, quæ in tertiana notha & diurnâ fuit proposita. Ita tamen ut inter præparantia humores, & obstructions aperientia, feligantur ea, quæ majorem attenuandi & incidendi vim obtinent. Tum, etiam in hac febre peculiaris ventriculi ratio habenda est qui plerumque graviter laborat: ideoque roborantibus tam internis, quàm externis reficiendus est. In primis autem maximè conducit cataplasma ex menta & absinthio, in febris tertianæ curatione propositum.

Zacutus Lusitanus duo remedia proponit, quibus se febres pituitosas contumacissimas expugnasse gloriatur. Unum est decoctum chamæmeli, in hunc modum compositum.

℞. Flor. chamæm. P. jij. comar. absinthii pontici, P. jj. Coque in fb. jiiij. aquæ, ad mediæ partis consumptionem. Colaturæ adde sacchari alb. ℥. jv. Capiat mane Unc. v. vel vj. singulis diebus.

Alterum est decoctum chinæ & guajaci ad xxv. dies exhibitum: quod licet à Medicis timeatur in hujusmodi febribus, propter nimiam calefaciendi & exsiccandi vim; maximè tamen commendatur ab iis, qui de Indicis aromatis peculiaribus libellos scripsere. Advertendum autem est Zacutum Lusitanum in regione frigida & humida Medicinam exercuisse, ubi tutius hæc remedia usurpari possunt. Ideòque in aliis calidioribus, nonnisi corporibus valdè pituitosis & cachecticis exhibenda.

## CAPUT V.

### De Febre quartana intermittente.

**Q**uartana febris illa est, quæ paroxysmos habet quarto quoque die recurrentes, fitque ab humore melancholico in prima regione putrescente.

Humor autem melancholicus alius naturalis est, ex crassiori & terrestriori alimenti portione genitus, frigido & sicco temperamento præditus; Alius præternaturalis, ex bilis adustione oriundus, atque adeò calidus & siccus. Hinc duæ quartanæ species oriuntur. Quæ enim à melancholia naturali fit, legitima quartana nominatur: quæ verò à præternaturali, spuria. Quamquam spuria etiam gene-

rari possit à melancholia naturali cum bilis portione admixta.

Rursum febris quartana alia simplex est, alia duplex, alia triplex. Simplex est, cum unus tantum paroxysmus quarto quoque die contingit. Duplex verò, quando paroxysmi duo per duos dies continuos accidunt, tertius autem dies paroxysmo vacuus est. Triplex denique est, quando singulis diebus paroxysmi contingunt, quemadmodum in quotidiana & duplici tertiana. Hæc autem duplices & triplices quartanæ fiunt ab humore melancholico, in variis locis putrescente.

Signa diagnostica sunt primùm ea, quæ humorem melancholicum in corpore redundantem significant. Quibus addendus est quartanarius circuitus, tanquam signum pathognomonicum: Sed & forma paroxysmi, ab aliarum febrium paroxysmis diversa, ejus diagnosin constituit. Incipit enim cum oscitatione, pandiculatione, & gravitate totius corporis; quàm sequuntur frigus, postmodum horror & rigor, quo ossa confringi videntur: unde dolor, qui à quartanariis percipitur, *ὀστέονος* nominatur. Calor etiam paulatim accenditur in materia frigida & crassa. Pulsus rarior & tardior, quàm in reliquis febribus. Urinæ in principio albæ, tenues, aquosæ, in progressu verò coloratiores & crassiores redduntur. Talia autem signa in quartana legitima apparent. In spuria verò vehementia symptomatum major humorem tenuiorem & calidiorem significat. Attamen non in eo solum spuria quartana à legitima distinguitur, quod in illa calor, sitis, vigiliæ, & alia symptomata vehementiora sint; sed etiam, quòd legitima primo & per se affligere incipit, nulla alia febre prægressa. Spuria verò aliis febribus tum continuis, tum intermittentibus succedit, ex humoris adustione, dictas febres committentis, qui per illam adustionem in melancholiam præternaturalem degenerat.

Duplex quartana per accessionum periodos facile diagnostitur. Triplex verò à tertiana duplici quotidiana distinguitur, non solum signis, humorem redundantem indicantibus, & paroxysmorum forma; sed etiam, quòd antequam fiat triplex, apparuit primum simplex, aut duplex quartana. Nunquam enim, aut perquam rarissimè febris quartana à triplici incipit; sed simplex, aut duplex, in eam degenerat.

Quòd ad prognosin attinet; febris hæc legitima esse consuevit, & quæ autumno incipit, ut plurimum tota hyeme perseverat, nec nisi accedente vere finitur. Imò nonnullæ ad annum unum, vel plures extenduntur. Æstivæ tamen breviores sunt. In omnibus autem perpetuò concoctionis signa sunt attendenda, quæ eam brevi solum iri significant: & cum his urinæ etiam nigrae bonis ægri rebus apparent.

Quartana legitima longior est spuria: quia hæc fit ab humore tenuiori, illa à crassiori.

Tutissima esse solet, præsertim legitima, nullo gravi alicujus visceris affectu comitata. Spuria verò periculosior est. Tum si hepar, aliave pars præcipua, grave aliquod damnum patiat, in hydropem degenerat.

Senes, qui sexagesimum ætatis annum superant, febre quartana affecti, ut plurimum moriuntur: quandoquidem calor eorum debilis, materiam adeò contumacem superare non potest.

Febris quartana intermittens, in continuam mutata, ut plurimum lethalis est. Quia fit mutatio illius febris, quæ foras movetur, in eam, quæ intrò. Quod hyeme maximè contingit, dum excurrentibus succis frigus se opponit, eosque in intima corporis penetralia repercutit. Id etiam contingit medicamentorum purgantium, acriorum, & vehementiorum intempestivo usu. Inde enim ex simplicibus quartanis duplices, triplices, & continuæ generantur.

Quartana, epilepsiæ superveniens, eam solvit, juxta Hippoc. *Aphor. 70. sect. 5.* A quartana correpti non admodum convulsionibus capiuntur. Si verò prius capiantur, & quartana supervenerit, liberantur. Ratio autem hujus rei est, quam proponit Galen. in *Comment.* quia materia crassa, epilepsiam efficiens, longo hujus febris calore attenuatur & concoquitur. Necnon concussione totius



## Secl. II. Cap. V. De Febr. quartana intermit. 441

totius corporis, quæ in rigore sit, facilius excutitur. Adde-  
re possumus pravos humores in cerebro, aliisque parti-  
bus, aut etiam in venis latitantes, ad hypochondria, &  
ignobiliores partes, ubi est quartanæ minera, transferri &  
prædictas partes deferere.

Dysenteria, febris quartanæ superveniens salutaris jux-  
ta sententiam Hipp. *Aphor. 48. sect. 6. Lienosis difficultas in-*  
*testinorum superveniens, bonum.* At in quartana utpluri-  
mum lien malè afficitur, & melancholicus humor quar-  
tanæ, lieni affecto, communis est. Hoc tamen intelligen-  
dum est de dysenteria, quæ intra breve tempus finitur:  
quæ enim longior est lethalis esse consuevit, ut habetur  
*Aphor. 43. ejusdem sectionis. Qui lienosi difficultate inte-*  
*stinorum corripuntur, iis supervenientem longam dysente-*  
*riam aqua inter cutem, aut laxitas intestinorum excipit, &*  
*moriuntur.*

Hæmorrhagia è naribus, febris quartanæ superveniens,  
pessima est. Quia humor, quartanam efficiens, nequit per  
nares evacuari propter crassitatem & frigiditatem. Et cum  
talis evacuatio symptomatica sit, & diu perseverans, hy-  
dropem accersat, statim cohibenda est, apertâ vena basi-  
licâ, è qua sanguis putris emanat, cum è naribus purus  
excernatur.

Curatio quartanæ duplex instituenda est & ad duas il-  
lius species referenda. Longè enim diversa esse debent quæ  
spurix, ab iis, quæ legitima debentur remedia.

Atque ut à quartana legitima incipiamus; ad illius cau-  
sam expugnandam statim animus convertendus est speretâ  
etiam ipsâ febre. Cum igitur illius causa sit humor frigi-  
dus & siccus, crassus & terrestris, calefacientia, hume-  
stantia & attenuantia usurpanda sunt. Tum etiam oppor-  
tunis temporibus materia peccans erit evacuanda, quod  
tamen nonnisi longo tempore præstari potest, propter  
summam humoris contumaciam, & morbi longitudinem.  
Antequam verò ea remedia in usum vocentur; victus ra-  
tio idonea præscribenda est. Utatur igitur æger cibus bo-  
ni succi, facilis coctionis, tenuis substantiæ & mediocri-  
ter calefacientibus atque humectantibus, ut carnibus ju-  
niorum animalium, & avium montanarum, ovis recen-  
tioribus & forbilibus, piscibus saxatilibus. Conceduntur  
in statu & declinatione pisces saliti, cappares & olivæ.  
Gal. 1. *ad Glauco.* etiam piper & sinapi concedit. Ex herbis  
commendantur borrago, buglossum, pimpinella, spinacia,  
radix fœniculi, petroselinum, ac præ cæteris rapæ; quæ in  
aqua prius coquendæ postmodum in jusculo pingui, quod  
quartanariis utilissimum est. Crato in consiliis à Scholzo  
collectis, se multos quartanarios curasse gloriatur secun-  
do raparum decocto, saccharo & butyro permixto. Ex  
fructibus poma, pruna cocta, passulæ, ficus pingues,  
amygdalæ, dactyli, nuclei pinei; Ac denique, ad con-  
diendos cibos conveniunt, cinnamomum, nux moschata,  
crocus.

Abstineat ab iis alimentis quæ crassa & tenacia sunt,  
ac tardiores exitum habent, ut carne porcina, bubula,  
cervina, leporina, & avium palustrium. A leguminibus,  
brassica, pane furfuraceo, caseo, nucibus, castaneis, & carni-  
bus multo sale conditis, aut fumo induratis, & fructibus  
& oleribus crudis, aceto & omphacio, quia humorem me-  
lancholicum fermentare creduntur, quemadmodum omnia  
acida.

Potus sit vinum album, optimè defecatum, aut rubel-  
lum, tenue & oligophorum, cum aqua, in qua cortices ta-  
marischi, aut folia agrimonij maduerint; vel decocto falsæ  
parillæ, vel aqua hordei chalybeata.

Exigua sit alimentorum quantitas, quæ vires tantum  
conservare valeat; nimia enim ciborum copia cruditates  
generat, quæ diuturnitatem febris conciliant. Maximè verò  
parcè bibendum est, cum nihil hanc febrem magis con-  
tumacem reddat, quàm nimia potus & humidorum co-  
pia: iis enim lien repletur ac distenditur. Crato, potum  
omniò interdicit in paroxysmo, quod maximè conferre  
curationi asseverat. Die paroxysmi æger cibandus est  
sex horis ante illius invasionem. Postea verò nihil sumat,  
donec finitus fuerit. Somnus prolixior utilis est, quia  
humeat; vitandus tamen est initio accessionis. Levis

Lazari Riverii Opera.

exercitatio ante cibum diebus intermissionis confert aut  
ejus loco frictiones totius corporis, depositis prius alvi  
excrementis. Alvus si spontè non fluat, glande, aut cly-  
stere excitetur. Hilaritas denique concilietur, nœstia  
arceatur.

Instituta in hunc modum victus ratione idonea, ab  
initio evacuatio levis instituenda est clystere injecto, &  
medicamento exhibito. Clyster in hunc modum parari  
poterit.

℞. Rad. buglossi unc. ii. herbarum quatuor emollien-  
tium. mercurialis, betæ, ana M. j. prunor. dulc. par. v. 4.  
sem. frig. maj. & anisi, ana drach. ii. epithymi dracc. iiii.  
Coquantur ad lb. j. sem. In colat. dissolve cathol. unc. j.  
olei violac. & chamæm. ana unc. j. sem. sacchari rubr.  
unc. j. Fiat clyster, injiciendus, pridie sequentis potionis,  
horâ commodâ.

℞. Sennæ mundat. ʒ. ʒ. Sem. anisi ʒ. fol. borrag. & fu-  
mar. ana M. ʒ. liquirit. ʒ. iiii. Coquantur ad ʒ. v. In colat.  
dissolve mannæ, & syrupi rosac. ana ʒ. i. Fiat opiata.

Gal. 1. *ad Glauco.* 11. præcipit, ut ab initio febris hæc  
blandis & benignioribus medicamentis tractetur; alioquin  
periculum est, si fortiora usurpentur, ne ex quartana sim-  
plici duplex, aut triplex, vel etiam continua efficiatur.

Post primam istam purgationem sanguis detrahendus  
est, è basilica sinistra. Si tamen hepar affectum sit; è bra-  
chio dextro etiam detrahi potest. Ridendaque est eorum  
sententia, qui expectandam esse volunt concoctionem, ut  
sanguis mittatur, quod tunc temporis fluxilior & tenuior  
sit: Melius enim concoquitur & præparatur, si prius  
quantitas illius imminuta fuerit. Neque etiam audiendi  
sunt, qui sanguinis missionem non admittunt in quartana,  
nisi illius redundantia per venarum turgescientiam, aliæque  
signa apparuerint. Perpetuò enim ab initio est plethora  
ad vires, ni quartana aliis febribus longis successerit. Ac  
summa commendatione dignum est Galeni præceptum  
1. *ad Glauco.* quo vult, ut si sanguis primò detractus niger &  
impurus appareat, major illius copia educatur: si verò ru-  
ber & purus sit; parca manu detrahatur, neque amplius  
phlebotomia iteretur. Dies accessionibus vacui sanguinis  
missioni, quemadmodum & purgationi, opportuni sunt.  
Nonnulli tamen ipso accessionis die sanguinem detrahunt  
quinque aut sex horis ante invasionem illius. Quod satis  
commodum est, cum tunc temporis humores moveri in-  
cipientes, facilius educantur. Zacutus Lusitanus venæ se-  
ctionem, in plenilunio celebratam, plurimum conferre  
asserit. Tunc enim ob lunæ vim humor ille terrenus ebul-  
lit, & fluxilior fit, promptiusque venâ sectâ educitur. Hoc  
que remedio eo tempore celebrato, plures levatos, alios à  
morbo prorsus immunes evasisse testatur qui pluribus aliis  
auxiliis non cesserat. Botallus verò contra Galeni, om-  
niumque Medicorum placita phlebotomiam frequenter  
iteratam, quartanam curare asserit, etiam quæ hydropem  
minetur, suamque sententiam rationibus & exemplis con-  
firmare nititur. Quæ tamen veluti paradoxa rejicienda est  
cum per refrigerationem, quæ toti corpori, multo sanguine  
detracto, inducitur, materia morbifica crassior & contu-  
macer evadat.

Hæmorrhoidum fluxus in febribus quartanis utilissi-  
mus est, & multi quartanarii hac evacuatione liberantur,  
Cum enim venæ hæmorrhoidales sint rami venarum me-  
saraicarum, in quibus morbi hujus materia continetur;  
dum aperiuntur, causam morbi proximam evacuant. Si  
igitur fluxus hæmorrhoidum contingat iis qui ei assueti  
sunt, impediendus non est. Si verò parciore fuerit; ad-  
juvandus. Tum etiam, si natura eo inclinare videatur  
(quod per ani pruritum aut tumorem, aut guttas aliquot  
sanguinis emanantes cognoscimus,) proritandus est,  
affixis hirudinibus.

In quibus verò hæmorrhoides numquam fluere consue-  
verunt, malleoli vena, post brachii phlebotomiam, utiliter  
aperitur: unde sæpè febris mox cessat, vel ut citius des-  
inat, unâ cum aliis remediis usurpata, efficere potest. Id-  
que imprimis mulieribus, quibus menstruæ purgationes  
suppressæ sunt, aut parcius fluxere.

Apertio salvatellæ manus sinistrae ab antiquis & neoteri-



cum non paucis probatur, & quartanam curare dicitur. Ab aliis verò quamplurimis rejicitur, quod nulla ratione fulciatur, cum sit ramus à venis brachii productus. Attamen cum pluribus experimentis à nonnullis celebretur; non omnino negligendam censemus. Alii autem in ipso lunæ coitu aperiendam statuunt. Alii verò, inclinante lunâ, duabus horis ante accessionem, & per tres vices, tribus accessionibus consequentibus; quod nonnullis feliciter successit.

Post primas illas evacuationes, humorum concoctioni & præparationi incumbendum est, julepis quibusdam, in hunc aut similem modum compositis.

℞. Rad. asparagi, brusci, cichorii, buglossi macerat. in vino albo, ana ℥. j. cortic. tamarisci ℥. ℔. fol. borrag. buglossi, ceterach, capill. ven. fumarie, chamædr. chamæpit. an. M. j. liquirit. ℥. i. flor. iii. cordial. ana P. j. Coquantur ad ℔. i. ℔. In colat. dissolve syrupi byzantini, & capill. ven. ana ℥. ii. Fiat julep. pro iv. dosibus matutinis, quæ etiam ulterius continuandæ sunt ad multos dies: materia enim contumax longa indiget præparatione. Vel si æger sit delicatior, juscula componenda sunt ex portione simplicium prædictorum, gustui gratiora seligendo, iisque utiliter, tum etiam julepis, cremor tartari addi poterit.

Præparantibus hisce remediis purgantia interferenda sunt, ut tertio vel quarto quoque die, catharticum aliquod exhibeatur: hac cautione adhibitâ, quandiu materia est valde cruda, mitiora usurpentur: crescente verò coctione, paulò validiora. Purgantium autem materia notissima est, ut peculiari illius enumeratione non opus sit.

Utile est aliquando apozema præparans simul & vacuans in quatuor, aut quinque doses præscribere, ut bona materiæ morbificæ portio educatur. Quod componi poterit ex materia juleporum prædictorum, additis purgantibus: Attamen si humorum crassities & contumacia, cum frigida viscerum intemperie, morbi longitudinem & hydropem minari videantur; ad potenter incidentia confugiendum est, ex quibus apozema sequens componi poterit.

℞. Rad. 5. aperit. in vino albo maceratarum, ana ℥. j. rad. enulæ camp. gentianæ, aristoloch. & asari, an. ℥. ℔. fol. chamædr. agrim. lupulor. borrag. ceterach, absinthii, & centaurii min. ana M. j. liquirit. raf. & passul. mundat. an. ℥. i. fennæ mundat. ℥. i. ℔. epithymi ℥. i. agarici recenter trochiscati ℥. iii. zinzib. & caryophyll. an. ℥. j. Coquantur ad ℔. j. ℔. In colat. dissolve syrupi de cichor. compositi cum rheo 7. v. trochiscor. de capparibus, salis absinthii & tamarisci, ana ℥. j. Fiat apozema pro quinque dosibus matutinis.

In chronico hoc morbo obstinata perseverantia necessaria est, ut continua remediorum vicissitudo illius causam concoquat & expurget. Unica enim fere hæc causa est, cur multi quartanarii incurati maneant. Siquidem, post paucorum remediorum usum, tædio affecti, reliqua prorsus abjiciunt & dedignantur.

Ad diuturniorem igitur usum purgantia quædam usualia habenda sunt, frequenter iteranda. Eaque in syrupi magistralis, aut pilularum usualium, aut aliam quamvis formam concinnari possunt.

Syrupus magistralis ex materia apozematis, triplicatâ purgantium dosi, componi poterit.

Pilulæ usuales ita præscribi poterunt.

℞. Aloës opt. succo absinthii diligenter nutritæ ℥. ℔. gummi ammoniaci aceto soluti, & iterum inspissati, drach. ii. myrrhæ electæ drach. j. ℔. turbith. gummosi & agarici recenter trochiscati, an. drach. ii. diacrydii ℥. j. salis absinthii & tamarisci, an. ʒ. ii. croci ʒ. ℔. cum oxymel. simpl. fiat massa pilular. de qua capiat drach. sem. vel ʒ. ii. bis in septimana.

Si æger calidiori temperamento præditus sit: sequentes pilulæ usurpari poterunt.

℞. Polypod. quer. ℥. sem. rad. asari, sem. genistæ, an. ℥. i. passul. corinth. ℥. i. crystalli tartari drach. j. sem. flor. buglossi & borrag. an. P. sem. Coquantur in aquæ fontis f. q. de colat. optimè clarif. cap. ℔. sem. succi pomor. redo-

lent. optimè depurati ℥. iv. Quibus infunde fennæ mundat. ℥. j. turbith. & agarici, an. ℥. iii. macis, caryophyll. cinnam. & epithymi, ana drach. j. Digerantur per quatuordecim in B. M. Postea colentur & exprimantur. Insuper adde extracti aloës cum aqua endiviæ & acetosæ parati ℥. j. myrrhæ, vino ad ignem dissolutæ & colatæ drach. ii. salis tartari drach. j. Evaporentur omnia, & inspissentur ad lentum ignem, addendo sub finem specierum diarrhod. abbat. & lætif. Gal. ʒ. j. salis absinthii & tamarisci, an. drach. sem. extracti croci ʒ. sem. Fiat massa pilular. ad usum dictum.

Purgans etiam medicamentum valde familiare, & paratu facillimum, sed utilissimum, componi potest ex decocti absinthii ℥. ii. in quibus fennæ drach. ii. infusæ fuerint, fumendo per intervalla.

Purgantia hæc medicamenta exhiberi solent pridè paroxysmi, quia ægri tunc temporis robustiores sunt. Non pauci tamen ante paroxysmum ea exhibenda esse contendunt, quia per accessionem agitata materia, facilius ad expulsionem redditur. Hanc sententiam fulciunt autoritate Hippocratis, lib. de affectionibus qui pharmacum deorsum purgans exhibendum esse vult in ipsa apprehensione. Et quamvis ex Gal. sententia, liber ille Hippocratis non sit, sed generi illius Polybi; non tamen idcirco fidem ei derogandam esse volunt, cum & Polybus ille vir doctissimus fuerit, & experientia frequens huic sententiæ subscribat; prout ab Arculano Gentili, Amato Lusitano, aliisque proponitur qui horis quatuor ante accessionem exhibendum esse medicamentum præceperunt. Quod tamen maxima cautione & Medici prudentia opus habet; cum inchoatam evacuationem superveniens horror intercipiat, & in accessione fiat humorum motus, pharmaci motui contrarius, unde ingentes turbæ ægrotantis corpore excitari possunt. Ideo nonnisi in robustioribus corporibus hæc methodus tentanda est.

Major & communior est Medicorum consensus in vomitoriis medicamentis, initio paroxysmi exhibendis, quia natura eo tempore ad eam evacuationem magis procliva est. Neque dubium est, vomitum, principio paroxysmi excitatum, & pluries, cum paroxysmi incipiunt, repetitum, mitiorem, breviorémque morbum efficere. Vomitoriorum materia in febris tertianæ curatione exposita est. In febre tamen quartana asarum reliquis præferendum est, ad drach. j. in pulver. redactum, & cum vino albo exhibitum, ac ter aut quater repetitum.

Temporibus purgationum intermediis clysteres frequentes injiciendi sunt, qui naturam ad intestina humores noxios expellere assuefaciunt, & aliquid de materia morbificâ, in venis mesaraicis, contentâ sensim educunt.

Perseverante morbo, cum plerumque diuturnus sit, & pertinax, interdum quiescere oportet, & à remediis per mensem, aut circiter abstinere, ut interea natura, diuturno remediorum usu fatigata, sese recolligat, & humoris morbifici concoctioni incumbat. Postea verò ad præparantia & purgantia redeundum erit.

At verò in morbo diuturno iisdem perpetuò remediorum formulis insistendum non est, ne iis natura assuescat, ægri verò nimio eorum tædio afficiantur. Tum quia à mitioribus ad validiora; tum purgantia, tum aperiencia transiendum est. Variæ purgantium formulæ supra propositæ sunt. Aperiencia verò, præter julepos & apozemata prædicta, sequentia in progressu morbi usurpari poterunt, concoctionis signis apparere incipientibus.

℞. Vini albi ℔. iii. rad. enulæ camp. unc. ii. cortic. rad. cappar. ℥. ℔. summitat. absinthii vulgaris sicci ℥. j. Infundantur per triduum in B. M. Serventur omnia simul, & hujus vini capiat æger ℥. ii. vel tres, singulis diebus, manè horis duabus ante pastum. Sequentes verò pilulæ, vel seorsim, vel simul, cum vino prædicto usurpari poterunt.

℞. Rad. gentianæ ℥. ii. aristoloch. rotund. ℥. i. sem. artemisiæ ℥. i. bryoniæ siccæ ℥. iii. myrrhæ, croci, ana ℥. j. rad. asari drach. ii. aloës ℥. i. Cum oxymel. scillit. fiat massa pilular. de qua capiat ℥. i. singulis diebus per se, vel paulò ante assumptionem vini prædicti.

Hisce pilulis chalybs præparatus utiliter addetur, si æger post



## Sectio II. Cap. V. De Feb. quartana intermit. 443

post earum assumptionem deambulare valeat. Chalybis enim usus in omnibus febribus chronicis utilissimus est, obstructions contumaces, quæ illas fovere solent, potenter dissolvendo.

Vel ad aperiendum simul & roborandum opiata frequens utiliter præscribi poterit.

℞. Conservæ rad. enulæ camp. conservæ fol. absinthii, & capill. ven. ana ℥. i. cortic. citri condit. ℥. β. confect. alkerim. 3. iii. myrobalanos condit. num. ii. pulv. elect. diarrhod. abbat. 3. ii. salis absinthii & tamarisci, ana drach. i. croci 3. ii. Cum syrupo condit. citri fiat opiata, de qua capiat ad magnit. castaneæ, singulis diebus; manè, duabus horis ante prandium. Vel si manè æger sumat alia remedia; poterit capere opiatam, duabus horis ante coenam.

Ad idem commendatur tanquam remedium præstantissimum extractum chamædryos, cum sale tamarisci permixtum, in formam pilularum.

His accedunt discutientia & diaphoretica, quæ in declinatione morbi, ad illius reliquias discutiendas, apparentibus concoctionis signis utilissima sunt: Non solum enim dictas morbi reliquias discutiunt, sed etiam intemperiem, longo morbo contractam, corrigunt, habitum corporis malum emendant, ac ventriculū, hepar, aliaque viscera, diuturnitate morbi debilitata, corroborant. Ex his primum locum obtinet theriaca, ab antiquis & neotericis ad hunc usum commendata. Exhibetur horâ unâ ante paroxysmum 3. i. pondere, cum vino aut decocto chamædryos, Vel si nimia caliditas timeatur, cum decocto agrimonii, succo, vel aquâ plantaginis. Reiterandum est medicamentum per plures paroxysmos. Potest etiam exhiberi manè extra paroxysmum, per aliquot dies: Sed paulò ante paroxysmum felicius operatur; quia augmentum frigoris prohibet, humorēque febris causam, jam effervescente incipientem, commodius discutit, & hoc modo paroxysmum vel imminuit, vel si materia paucior sit, prorsus tollit. Hæc tamen summa cautio adhibenda est; ne theriaca, vel similia medicamenta calidiora: cruditis temporibus exhibeantur, fundunt enim humores putridos, unde confusio, & febris incrementum; ita ut quartana simplex in duplicem & triplicem, imò verò continuam aliquando degeneret. Quemadmodum contigit Eudemo Peripatetico, ut refert Galen. *lib. de præcogn. ad Post. cap. 2. & 3.* In quo quartana simplex, exhibitâ à Romanis Medicis intempestivè theriacâ, in triplicem versa est. Postmodum tamen, apparentibus concoctionis signis, exhibitâ eadem theriacâ, à Galeno curatus est.

Ex aliis diaphoreticis commendantur à nonnullis radices, chinæ, falsæparillæ, quarum decoctum primum & secundarium, per 20. dies exhibitum, contumaces quartanas interdum curat. Efficacius autem operatur, si decocto primum purgantia misceantur.

Alia etiam remedia ante paroxysmum exhibentur, quæ huic febre creduntur specifica, & versus declinationem usurpata, sæpissimè paroxysmos inhibent, & quartanam curant. Horum autem præcipua hæc sunt.

℞. Fol. plantag. recentium M. i. acetosæ recentis M. β. aceti & theriacæ, ana quart. i. Destillantur, & hujus aquæ capiat æger 3. iii. dimidiâ horâ ante paroxysmum. Vel

℞. Sacchari candi 3. iii. zinzib. 3. ii. camphoræ 3. i. Fiat pulvis, Detur drach. i. cum aqua calida.

Crocus in pulverem redactus ad 3. β. cum vino albo exhibitus, ante accessionem, eam valdè imminuit.

Semen rutæ sylvestris, ante paroxysmum, exhibitum cum vino albo, curat.

Heurnius asserit, sequentibus trochiscis unicâ exhibitione, etiam hyemis tempore, multos fuisse liberatos à febre quartanâ.

℞. Seminis rutæ, petroselinii, myrrhæ & theriacæ recentis, an. Drach. i. opii 3. β. Fiant trochisci parvi. Dabis unum cum aqua, ante paroxysmum: Narcotica equidem eximiam vim habent, ad cohibendum paroxysmum: Sed nisi major humoris morbifici portio antea evacuata sit, & obstructions plurimum imminutæ, noxam inferre possunt.

Lazar. Riverji Opera.

sunt, cum humores vitiosos in corpore retineant, & obstructions, aliòsque morbos graves generent. Attamen in exigua quantitate exhibita, & aperientibus, incidentibusque permixta, uti in hisce trochiscis, minùs nocere possunt.

Ad cohibendum etiam paroxysmum, horâ unâ ante illius invasionem, purgantia leviora utiliter exhibentur, quæ sollicitando naturam potius, quàm purgando, humores revellunt. Eo nomine talia præscribi possunt.

℞. Sennæ mundat. polypod. querc. thymi, epithymi, ana drach. i. flor. borrag. P. i. Fiat decoctio ad 3. iv. Capiat horâ unâ ante paroxysmum. Vel

℞. Sennæ mundat. 3. iij. turbit. drach. i. cinnam. drach. β. croci & zinzib. ana 3. β. sacchari ad pondus omnium. Fiat pulvis, dividendus in tres partes. Capiat unam ante paroxysmum, cum vino albo.

Quercetanus in Pharmacopœa maximè laudat pilulas de sagapeno Camilli, quarum unam tantum exhibet initio paroxysmi, continuando ad aliquot dies; & paulò post inungendo spinam dorsi linimento composito ex theriaca, aqua vitæ, & oleo laurino vel de spica. Tum duabus aut tribus horis, post pilularum devoracionem, exhibendo jusculum, cum rad. aperientibus, borragine, buglossio, thymo, & pomo curtispiculo paratum.

Dictæ autem spinæ inunctiones, ad rigorem leniendum utilissimæ sunt, & frequenter usurpandæ, etiam si prædictæ pilulæ non exhibeantur. Sunt enim in frequenti usu, quando rigor & vehemens & importunus est. Fiuntque hujusmodi inunctiones non solum ex prædictis; sed etiam aliis quamplurimis medicamentis, ut oleo anethino, chamæmel. irino, costino, rutaceo, de piperibus, aliisque calidioribus cum aqua vitæ, theriacâ, caryophyllis, castoreo, sinapi, pipere, aliisque permixtis. Efficacius autem operantur hæc linimenta si horâ unâ ante paroxysmum spina ad ignem inungatur; deinde æger in lectum calidum deferatur, & lateres calentes, vino perfusi odorifero, ac linteis involutis plantis pedum, volisque manuum admoveantur.

Dum prædicta remedia usurpantur, lienis cura specialis habenda est, quoniam ea pars in hoc morbo perpetuò afficitur. Ideoque diù continuari poterunt fomenta, linimenta, & emplastra, quæ ad lienis obstructions vulgò præscribi solent.

Imò verò interdum balneum aquæ tepidæ, post plures evacuationes, apprimè conducit, non solum ad lienem emolliendum, sed etiam ad totum corpus humectandum & concoctionem materiæ morbificæ adjuvandam. Diebus intermissionis usurpari poterit, cavendo tamen diligenter, ut tepidum saltem administretur. Si enim calidius fuerit; periculum est, ne fusi humores in varias partes præcipientur, & periculosissimos abscessus producant.

Denique non omninò negligenda sunt, quæ carpis admoveeri solent cum etiam non infimæ notæ Authores illis aliquid tribuant. Rondeletius enim sequenti remedio magno cum successu se usum esse asserit.

℞. Folior. sambuci, salviæ, pedis columbini, rutæ, an. M. β. calthæ tertiam partem salis m. i. & vini parum. Omnia simul trita carpis admoveantur ante accessionem. Crato radices urticæ contusas, & cum aceto maceratas, brachiorum & pedum arteriis applicat. Et refert Sennertus, civem quendam, cum toto autumno, & hyeme quartana laborasset, tandemque acutissimos in sinistra scapula dolores perferiret, mulieris cujusdam persuasû, ranunculum carpo applicasse, & pustula excitata, febre & dolore liberatum fuisse.

Spuria quartana iisdem ferè remediis curari debet, quæ pro tertianæ curatione fuere proposita; addendo decoctis juleporum & apozematum ea quæ humorem atrabiliarium peculiariter respiciunt. His etiam accedere poterunt omnia remedia magis temperata, & minùs calefacientia, quæ pro quartana legitima hæcenus fuere proposita.

Convenient itaque in principio borrago, buglossum, fumaria, lupuli, acetosa, cichorium, ceterac. scolopendria, agrim. poma redolentia. Quorum decocta, aquæ stillatiæ,

K k k 2

&



& interdum succi depurati julepi, apozematis, aut syrapi magistralis formâ præscribi poterunt.

In progressu verò prædictis addere licebit cortices radicis capparum, median. tamarisci, enulam campanam, polypod. absinthium.

Dum utitur æger hisce præparantibus, purgantia frequenter interjicienda sunt, eaque usurpanda pridie accessionis & bis in septimana iteranda. Ad hunc usum variae formulæ componi poterunt. Sed pro delicatioribus præparata laxans, syrupus de pomis Sapor, seu compos. aut jusculum pulli, borragine, buglosso, & pimpinella alteratum, cum fennæ ʒ. iii. vel unc. ʒ. utiliter usurpari poterunt.

Venæ sectio non omittatur in principio, & sanguinis copia detrahatur, quæ sanguinis quantitati, & qualitati, & ægrotantis ætatis temperiei convenire videbitur.

Si morbus in longitudinem abeat, ubi sanguinis fervor se remiserit, vomitoria utiliter usurpari poterunt; in iis præcipuè qui nauseam & vomitum in accessionum initiis patiuntur. Inter vomitoria febris quartanæ proficua asarum (ut supra dictum est) principem locum obtinet, in vino albo ad drach. i. exhibitum, & pluribus vicibus repetitum, si unâ aut alterâ exhibitione morbus discussus non fuerit.

His accedent foci & linimenta hypochondriis adhibita, ad pravam viscerum diathesin corrigendam, (quæ novam continuè accessionibus materiam suppeditat) humorumque valdè impactum emolliendum & attenuandum; quæ in hunc modum præscribi poterunt.

℞. Rad. althææ, lilior. enulæ camp. cortic. rad. cappar. & median. tamarisci, an. ʒ. i. fol. malvæ, althææ, parietariæ, borrag. buglosi, pimpinellæ, absinthii. ana M. i. sem. lini, & petrosel. ana ʒ. ʒ. flor. chamom. meliloti, anethi, ana P. i. Fiat decoctio in tribus partibus aquæ, & unâ vini albi sub finem addit. quâ foveantur hypochondria, bis in die longè à pastu.

℞. Unguenti de althæa ʒ. i. ʒ. olei lilior. chamæm. rosacei, & absinthii ana ʒ. sem. Fiat linimentum, applicandum post forum.

Vel olea sola utiliter apponentur cum lana succida.

Ac denique balneum aquæ tepidæ, vel solius, vel in qua emollientia & temperantia bullierint, vel ex hordeo & amygdalis, ut vulgò solet fieri ad hunc affectum expugnandum erit convenientissimum. Siquidem viscerum intemperiem corrigit, atræ bilis siccitatem ac fervorem emendat, dura emollit, vias referat & laxat, crudos humores coquit. Quapropter frequens illius usus erit convenientissimus, adhibitis cautionibus, quæ supra enumeratæ sunt.

Illius autem operatio maximè juvabitur, si sub ingressu balnei præparantia medicamenta, & obstructions referantia exhibeantur, Inter quæ primas obtinet decoctum absinthii, & enulæ campanæ, quod omnibus humoribus contumacissimis præparandis accommodatissimum est, modò nimius viscerum fervor non contra indicet. Quo in casu aliorum supra enumeratorum admixtione temperari poterit.

Cum verò hæc fiunt, leves purgationes frequenter iterandæ sunt, ut supra monuimus. Et in vera declinatione, coctionis signis apparentibus, etiam specifica, in quartana legitima descripta, in usum vocari poterunt.

In toto autem morbi decursu thoraci prospiciendum est, ne æger in tabem præcipitetur: humor enim peccans vim erodendi habet.

## CAPUT VII.

*De Febribus compositis, seu complicatis, & speciatim de hemitritæo.*

**G**AL. lib. 2. de crisib. c. 7. & 9. lib. 2. de diff. febr. c. 7. & Avic. fen. i. lib. 4. tract. 4. c. 19. multas proponunt febrium compositiones. Quatenus scilicet vel complicantur putridæ cum non putridis, ut dum hæcticæ putrida complicatur, vel putridæ cum putridis, idque pluribus modis. Nempè vel continuæ cum continuis, vel intermittentes cum intermittibus, vel intermittentes cum continuis.

Continuarum duarum compositio apud Autores controvertitur, & in praxeos usu vix advertitur.

Intermittens complicatur cum altera intermittente, vel ejusdem generis, vel diversi. Ejusdem generis intermittens compositæ sunt tertiana duplex, aut triplex, item quartana duplex, aut triplex, quæ suis locis fuerunt expositæ. Diversi generis sunt, quando tertiana cum quotidiana aut quartana complicatur, quod etiam rarissimè in usu practico observare licet.

Intermittentes cum continuis duobus modis complicantur: nempè tertiana intermittens cum quotidiana continua; vel quotidiana intermittens cum tertiana continua. Et utraque hemitritæus nominatur, quæ in duas species prædictas dividitur.

Illam tamen verè & propriè hemitritæus est, quæ sit ex tertiana intermittente & quotidianâ continuâ: atque adeò sit ex flava bile extra, & pituita intra vasa putrescente. Ab Hipp. & Galen. in 1. epid. horrida nominatur, quia non solum horrorem facit initio accessionis, sed etiam toto morbi decursu, & præcipuè in principio & augmento, coeuntibus in unum duabus accessionibus, febris tertianæ scilicet & quotidianæ cum multis reduplicationibus, quæ nihil aliud sunt, quàm motus horridi inæquales, eadem accessione certis intervallis recurrentes, ob mutam pugnam duarum febrium: in qua si pituita superaverit; sequuntur horrores, extremorumque perfrigerationes. Deinde verò, vincente bile, corpus calefit, & febris ad vigorem tendere videtur; cum rursus, redeunte ad pituitam victoria, denuò refrigerentur, horréantque: & pugna hæc durare consuevit, donec febris ad vigorem pervenerit. Hinc fit ut alternis diebus tantum isti rigores appareant, dum scilicet paroxysmus tertianæ urget, & cum quotidiana conjungitur.

Dum verò quotidiana sola urget, nullus solet fieri horror. Notandum tamen est, quasdam reperiri febres malignas: quæ sine commixtione tertianæ, & quotidianæ, sine ullo concursu bilis & pituitæ horridæ sunt, in iisque horrores contingunt ex vaporibus acerbis & malignis, qui ex materia corruptâ febrium malignarum eleantur, & partes sensiles feriunt ac vellicant.

Hæc autem semitertiana propriè dicta, vel exquisita est, in qua æqualis bilis & pituitæ putrescentis copia redundat, qualis jam descripta est; vel notha, quæ rursus duplex est. Vel enim bilem habet exsuperantem, vel pituitam. In illa, si aora sunt tertianæ symptomata, in hac, quotidianæ. Atque ita, si bilis exsuperat, horridior fit tota febris, & aliquando rigorem sibi associat, tum fervidior fit hujusmodi febris, & aliquid bilis per vomitum, alvum, aut sudores excernitur. Pituita verò prævalente, frigus vehementius extremas occupat partes, & pauci adsunt horrores, ac pulsus magis, & diutius comprimitur, tardiusque accessio invalescit, ac longum post tempus consistit, non tamen, aut sitim, aut magnum affert incendium.

Dignoscitur, ista febris ex iis, quæ dicta sunt, quod continua & horrida sit; cum multis reduplicationibus, maximisque symptomatibus, quod accessio diebus imparibus invadat cum horrore: partibus verò, cum aliquo tantum frigore extremorum. Pulsus in ea frequens & inæqualis. Urinæ crudæ tenues & decolores, interdum turbidæ sunt, cum nullo, aut malo sedimento. Differentiæ verò dignoscuntur ex iis, quæ propofita sunt, æqualem vel inæqualem bilis & pituitæ quantitatem indicantibus.

Quod ad prognosin attinet, periculosa est ista febris, & in ea ventriculus, partisque nervosæ plurimùm afficiuntur. Et consecrariam habet linguæ siccitatem, sitim, animi defectionem, vigiliam, & interdum delirium ac soporem. Inter acutos morbos, ratione bilis, & inter chronicos, ratione pituitæ, ab Hippocr. numeratur in 1. epid. Et dicit Avic. ad mensē usque septimum interdum prorogari, necnon in morbos chronicos ac febrem hæcticam interdum desinere.

Curatio hujus febris ex iis desumenda est, quæ ad tertianam & quotidianam expugnandam necessaria sunt. Et cum continua sit, eâ methodo erit tractanda, quam ad







factantur. Quandoque enim tam remissa est putredo, ut ferè nulla sit; maligna verò qualitas admodum intensa: tumque fit febris, quæ nec ægro, nec adstantibus videtur molesta; sed mitis omnino primo aspectu videtur, cum tamen exitialis admodum sit. Aducta enim maligna qualitate, vires deiciuntur, corque omnino æger obruitur: Hæcque non solum ægris & adstantibus, sed etiam ipsis interdum Medicis imponit; cum ullo nec cruditis, nec pravitate humorum signo præfente, pulsu etiam in statu ferè naturali constituto & corporis calore ad tactum, prima fronte, miti ac blando apparente, ad interitum ducat. Simile quippiam in prima etiam differentia solet contingere cum scilicet summæ malignitati conjuncta est. Evieta enim opportunis remediis putredine, ac signis futuræ salutis apparentibus; mors tamen interdum à non superatâ malignâ qualitate subsequitur.

Ac denique differentia febris pestilentis desumuntur ab adjunctis: eæque plurimæ sunt & evidentissimæ. Nullum enim est prævum symptoma, nec ullum morborum exitialium genus, quod cum hac febre interdum non jungatur. Symptomata sunt, dolores capitis, vigilæ, deliria, sopores, sitis, nausea & vomitus, appetitus dejectio, syncope, virium languor, singultus, inquietudines, alvi fluxus, sudores & similia, quæ aliis etiam febrium generibus sunt communia.

At unicum datur symptoma, febris pestilenti proprium & peculiare, quod in reliquis febribus non contingit: maculæ nimirum purpureæ in toto corpore, ac præcipuè lumbis, pectore, & dorso apparentes, moribus pulicum plerumque similes, quæ peticulæ, seu petechiæ ab Italis vulgò nominantur: & febres hoc comitatæ symptomate, purpuratæ, seu petechiales appellantur. Neque enim in omnibus febribus pestilentibus apparent, hujusmodi maculæ purpureæ; sed quando apparent, febris pestilentis indicium præbent certissimum. Purpureas autem maculas nominavimus, quia ut plurimum colore purpureo infectæ sunt. Non rarò tamen violaceæ, virides, lividæ aut nigrae apparent, & tunc longè deteriores, majorémque malignitatem significant. Licet autem ut plurimum hujusmodi maculæ pulicum moribus similes sint, majores tamen aliquando sese produnt, ut referant vibices, seu livores flagellis inductos, tumque deteriores sunt. Aliquando verò amplissimæ sunt & partes integras, magnamque corporis partem; brachia nimirum, crura vel dorsum occupant, tumque partes rubore infectæ apparent; qui intra paucas horas sæpè evanescit, atque iterum revertitur, quasi per paroxysmos, dum febris suas patitur exacerbationes, in quibus sanguis ebulliens, ad superficiem corporis, exhalationes tenuiores emittit, à quibus nulla fit cutis elevatio; sed ea tantum rubro colore inficitur. Non rarò tamen ex hujusmodi ebullitionibus cutis in variis partibus elevatur cum rubore quodam, & tumores quosdam in cute efficit molles & latos, qui intra paucas horas evanescunt, & vulgò ebullitiones sanguinis nominantur. In his atque prædictis est semper aliqua malignitas, sed tam levis, ut nullum minetur periculum, nisi morbi progressu intensior evadat. Differunt autem maculæ prædictæ, pulicum moribus simillimæ, ab exanthematis, quæ etiam in hujusmodi febribus interdum apparere solent, eaque annotavit Hipp. in *Epidemiis*; habentque eminentiam, & sunt de genere tumorum, qui ad suppurationem, vel exulcerationem quandoque deveniunt. Maculæ autem purpureæ nullam (ut dictum est) habent eminentiam, & antiquis incognitæ, posterioribus tantum sæculis à recentioribus descriptæ sunt.

Quod ad morbos attinet, qui febris pestilenti conjunguntur, idem quod de symptomatibus dictum est affirmare licet: plurimos nempe morbos exitiales cum his febribus conjungi, nempe phrenitides, anginas, pleuritides, peripneumonias, hepatis inflammationes, dysenterias, aliosque quamplurimos. Sed præcipui morbi, qui in febre pestilenti reperiuntur, duo sunt, nempe bubo pestilens, & carbunculus, qui intensissimam esse indicant venenatam qualitatem, & non nisi in vera peste reperiuntur, eamque ut plurimum comitari solent, ita ut ipsius pestis nomine

apud vulgus indigitari soleant.

Causæ febrium pestilentium aliæ sunt internæ, aliæ externæ. Internæ aliæ immediatæ, aliæ mediatae.

Immediata hujus morbi causa (ut antea monuimus) est corruptio humorum putredini conjuncta. Ex corruptione, pravam & venenatam acquirunt qualitatem: ex putredine verò febris generatur.

Causæ verò mediatae sunt plethora; cacochymia, & obstructions. Plethoram autem non ad vasa sed ad vires intelligimus, quæ cum non ita à natura regatur, facile corruptionem & putredinem concipit. Cacochymia verò, seu pravorum humorum copia, facile corrumpitur atque putrescit. Obstructions denique, omnia febrium genera producere aptæ sunt: quatenus humores, in loco calido & humido conclusi; si non liberè transpirent, facile putrescunt. Causæ internæ mediatae ab Autoribus vulgò morbosus apparatus nominari solent; & tanta est illius efficacia, ut solus interdum febrem pestilentem remissionem, quæ maligna simpliciter, aut purpurata vulgò nominatur, producere valeat, absque causæ externæ & communis interventu. Videmus enim sæpè; in constitutione minime epidemica, & nullo morbo populariter grassante, quosdam ex prava humorum conditione febribus hisce correptos; quæ multis malignarum febrium symptomatibus, etiam maculis purpureis, stipatæ sunt.

Circa obstructionem hoc advertendum; eam quidem necessariò concurrere, tanquam causam præcipuam in febribus malignis quæ fiunt à causis internis, & sporadicæ sunt: Epidemicas verò, quæ fiunt à causa communi, pestilenti scilicet aëris flatu, vel per contagium generantur, non necessariò talem habere causam. Ex sola enim aëris corrupti inspiratione, vel ex solo contagio concipitur venenata qualitas, qua humores corporis, à propria natura deffectantes, sponte in putredinem dilabuntur. Quemadmodum enim fructus horariorum, aliæque res facile putrescibiles, licet maxime persentent, à putredine tamen vindicari non possunt; sic etiam humores, cum qualitatem illam perniciosam conceperint, proclives in putredinem redduntur: ita ut, etiamsi nulla sit præsens obstructio, in putredinem, febrem necessariò incidant. Attamen inductâ hoc modo humoribus putredine, cum illi à natura amplius non regantur, obstructions plerumque generare solent, quibus febris intenditur; sicque in his febribus obstructio concurrat, quæ licet ab initio causa febris non fuerit; subsequitur tamen, & à causis labe pestilenti infectis fovetur.

Causæ externæ febrium pestilentium sunt sex res non naturales, quæ ut necessariæ sunt, ita necessariò corpus nostrum alterant: & quando à statu naturali valde recedunt; malignas & venenatas qualitates in nobis generant. Ex his principem locum obtinet aër ambiens, qui prout causa communissima est, ita morbi communes ab illius vitio ut plurimum exoriri solent.

Vitiosus autem fit, hominibusque noxius, triplici potissimum ratione. Prima, si salubribus ventis non diffletur. Secunda, si putrium ac foetidarum exhalationum inquinamento polluitur. Tertia, si primarum qualitatum excedente, vel præpostera conditione ita homines afficiat, ut inde pravæ & malignæ humorum putredines generentur.

Prima satis evidens est. Si enim aër non diffletur, & ventis agitetur, facile corrumpitur. Unde Hipp. 3. *Epid.* pestilentem constitutionem gravissimam describens: *sine aura*, inquit, *usque annus hic fuit*.

Secunda verò efficacissima est & frequentissima, quando scilicet putridi, tetri & maligni vapores aëri commiscuntur, eumque inficiunt, qui à variis rebus excitari solent stagnis videlicet, lacubus, paludibus, piscinis, aliisque locis quietis aut cœnoso humore refertis, vel in quibus linum, aut cannabis maduerit. Vel ex cloacarum, sterquiliorum, & angiporum foetore. Vel à strage cadaverum insepulcorum; vel ex antris & specubus, in quibus aër diutissime conclusus foedam acquisivit putredinem; terræ motu, aut alio casu apertis.

Tertia verò ratio; quæ in primarum qualitatum excessu, inæqualitate, vel præpostera conditione consistit, variis modis



modis potest contingere, ac præcipuè, quando in caliditate & humiditate plurimum excedit. Illæ enim qualitates, quando extraneæ sunt & adventitiæ ac supra statum naturalem auctæ; sunt principia putredinis. Hinc constitutio austrina, per aëris tempestates diu perseverans, apud Hippocratem in *Epidemiis*, fuit causa præcipua omnium febrium pestilentium, quæ ibi describuntur.

Sicca verò aëris constitutio, licet ex sententia Hipp. sit humidiori salubrior, quia tamen omnis qualitatum excessus naturæ nostræ inimicus est, certum est; sicciorem constitutionem valdè excedentem & extraordinariam, febres pestilentes producere, præsertim si cum caloris excessu juncta sit. Hujus exemplum habetur luculentum apud Livium *lib. 1. dec. 4.* ob nimium scilicet squalorem Romæ pestem fuisse factam, quòd siccitate eo anno plurimum laboratum fuerit, neque coelestes modò aquæ parcè descenderint; sed terra quoque ingenito humore egens, vix ad perennes aquas suffecerit. Hæc autem sicca constitutio eatenus febres pestilentes inducit, quòd humores supra modum exusti in anthracum, carbunculorum, atque adeò pestilentis febris materiam degenerant, & admodum inspissati graves obstructions producant, ex quibus maligna putredo in materia alioqui disposita facillè generatur. Adde, quòd immodica hæc aëris siccitas fruges corrumpat debitam iis denegans maturitatem: cum videlicet eas à terra citius evocat, nutrimentum deinde uberius, post parcius largitur, unde inæqualiter concoquantur, cum extrinsecus sint adustæ, intrinsecus verò adhuc planè crudæ, instar carniū, nimia ignis violentia adustarum: sic indigestionis variarumque cruditatum causa existunt.

Frigiditatem etiam immodicam pestilentes febres producere probatur ex Hipp. *1. Epid. sect. 5. tempest. 2.* quo loco inquit: *In Theso paulo ante Arcturum, & sub Arcturo multa & magna spirante Aquilone pluvie.* Ubi ex nimia frigiditate, illius tempestatis venenositatem & malitiam venantur. Tum apud Liv. *lib. 5. dec. 1.* pestilentem constitutionem à vehementi frigore exortam, legere est, his verbis: *Insignis annus hyeme gelidâ ac nivosa fuit, adeo ut via clausa, Tiberis innavigabilis fuerit. Tristem hyemem, sive ex intemperie cæli raptim mutatione in contrarium facta, sive alia de causa, gravis pestilensque omnibus animalibus æstus excipit.* Et hujus eventus ratio in promptu est, quòd nimium prohibito naturali effluxu, ex cuius densitate; ob ambiens aëris frigus factâ majorem fieri putrefactionem contingit, & gravius venenum; hincque periculosiores febres; quàm æstivis temporibus, in quibus ipsa aëris conditio, hæt quodam modo præstet mali principium, meatus tamen reddit patentiores, per quos facillè quod putrescit, exhalat, naturales ac præternaturales effluxus promptè expirant.

Inæqualitates temporum, harum febrium causæ esse consueverunt; quando scilicet modò calor, modò frigus, modò siccitas, inodò humiditas sibi invicem succedunt, vel frequenter recurrunt, vel diutius durant. Ut quando post diuturnos æstus, frigus glaciale irruit; vel post longas pluvias extrema siccitas suboritur, aut contrâ. Vel cum præposero ordine hyeme calet, aut friget æstate. Hæc autem temporum inæqualitates ad febrium pestilentium generationem conferre possunt; quia in iis maxima humorum conturbatio, ex qua pravam acquirunt conditionem, & naturali statu valdè alienam, morbisque malignis producendis idoneam. In illis præcipuè corporibus, quæ per illorum temporum lecursum, ex pravâ victus ratione, plethoram, cacochymiam, vel insignes obstructions contraxerunt.

Ad hoc etiam causarum genus aeris nimirum vitium, referuntur maligni syderum influxus, qui aerem immutando, variis modis corpora viventium afficere consueverunt. Hujusmodi esse aiunt coeli planetarum superiorum, Saturni Jovis, & Martis in signis humanis, qualia sunt Virgo & Gemini, ac tum potissimum cum Mars dominatur. Ab iis autem morbi inferuntur non alia ratione, quàm per aëris mutationem, quæ tanta esse debet, ut ejus naturam ac substantiam corrumpat. Illa verò immutatio duobus modis fit; uno per qualitates manifestas,

quando scilicet a syderum influxu aer ad caliditatem & humiditatem, aliòsque primarum qualitatum excessus tantoperè & tam diu immutatur, ut inde tandem propriâ sui stantiâ vitiosus evadat: Altero per qualitates occultas, quando scilicet ab oculis syderum vi, absque insigni primarum qualitatum excessu, aëris substantia ita immutatur, ut certum quemdam corruptionis gradum acquirat, vitæ nostræ inimicum. De primo nullus dubitat, cum ex communi Philosophorum consensu satis constet, hæc inferiora gubernari à superioribus constellationibus. Et quæ admodum aëris alterationes, quæ quatuor anni temporibus contingunt, ab annuo Solis motu oriuntur: sic maxima annorum diversitas, quæ unus valdè humidus, alter valde siccus existit, cum Sol eundem singulis annis in Zodiaco cursum teneat: non potest nisi à variis syderum aspectibus dependere. Alter verò modus, quia occultus est, non æquè facillè ab omnibus conceditur. Attamen communi Astrologorum sententiâ sancitum est, astra triplici ratione agere in hæc inferiora: motu, lumine, & influentiâ. Motus & lumen hæc inferiora alterant secundum primas qualitates, & præcipuè calorem. Influentia verò, tum primas illas qualitates, (frigiditas enim verbi gratiâ, quæ inducitur à Saturno, non potest à motu & lumine dependere) tum etiam latentes & occultas qualitates inducunt. Cum enim morbi pestilentes sæpè eveniant, nulla factâ in aëre, quoad primas qualitates, insigni mutatione; sed iis grassantibus aer purus admodum appareat, & purior interdum, quàm sub aliis constitutionibus non pestilentibus, neque præcesserint tempora admodum calida & humida ex quibus insignes putredines solent exoriri; conjiciendum est, à maligno quodam syderum influxu morbos istos pestilentes originem traxisse. Adde, quòd pestes media hyeme sævire soleant, quas nulla in primis qualitibus insignis alteratio præcessit. Tunc enim occultis syderum viribus hujusmodi morbi assignandi sunt, cum illo ex Astrologorum sententiâ, vim habeant corrumpendi aërem, non factâ in eo insigni aliqua mutatione, secundum primas qualitates. Et illud est divinum in morbis, quod agnovit Hippocrates, & Galeno interprete, in aëre quidem est, sed à calo & minis manifestis causis producit. Tum etiam ab eodem Hipp. innuitur *2. Epid. sect. 1.* quando dicit, *morbum & tempus sibi invicem correspondere, nisi quid in superiori natura innovetur.*

Neque obstat, quod ex Platonis sententiâ *Epinomide* adducitur: nempe, calum & syderum concursus semper bonum in hæc inferiora influere, ab iisque non nisi conservationem ac beneficium inferri. Et Arist. *9. Metaph. c. 10.* dicit, in his quæ sempiterna atque ætherea sunt neque malum, neque errorem, aut corruptionem inveniri, Averroës verò *1. Cæli. cap. 24. Corpora*, inquit, *cælia continent elementa, conservant ipsa; & universaliter sunt eis quasi forma.* Unde colligitur, non posse eadem veneno & maligna qualitate afficere. Adde quòd, si ex astroorum influxu morbi pestilentes excitarentur; illi eodem tempore mundum penè universum afficerent, cum illi influxus causæ universales sint, & cælorum circumactione, omnes mundi plagas afficiant. At hujusmodi morbi aliquam tantum regionem peculiariter invadunt. Ac denique, si astra dicerentur malefica, Deus, qui ea creavit autor maleficii dici posset, quod est impietate plenissimum.

Hæc, inquam, propositæ veritati nihil officiunt, iisque in hunc modum satisfieri potest. Omnes substantiæ creatæ duobus modis considerantur: vel quatenus entia sunt, & ad complementum universi, & perfectionem concurrentia, & tunc omnia bona sunt: ens enim & bonum reciprocantur, nihilque à Deo opt. max. omnium bonorum autore, creatum est, quod malum simpliciter dici debeat. Vel considerantur ratione operationum, & tunc possunt dici malæ, quatenus alteri creaturæ damnum inferunt, ex insita antipathia & inimicitia. Quamvis autem hujusmodi antipathia penè innumeræ in mundo reperiantur, non desinunt tamen omnes dici bonæ, ratione sui autoris, nimirum Dei, & ratione universi, cujus perfectio in varietate potissimum consistit.



consistit. Præterea rerum creaturarum operationes duobus modis malæ dici possunt, absolute & simpliciter, vel secundum quid. Absolute malæ dicuntur, quando omni tempore, in omni loco, & occasione perpetuò malum efficiunt. Et nulla potest reperiri creatura, quæ hoc sensu mala sit. Secundum quid malæ dicuntur, quando uni nocent, & alteri profunt. Et sic nihil adeò noxium reperitur in rerum natura, quin ex alia parte suos etiam habeat usus quorum gratia creatum est. Sic omnia venena, quamvis homini, aut aliis animalibus noxiosissima, tamen convenienter usurpata, multa bona & comoda iisdem afferre solent. Et in re medica nullum ferè reperitur adeò lethale venenum, quin ex eo, artis peritia, salutare medicamentum eliciatur.

Ac denique astrorum actiones in hæc inferiora duobus modis considerantur, vel respectu totius mundi sublunaris elementa omniæque mixta continentis: & tunc cælorum ac syderum actio simpliciter benefica est, generans, conservans, vivificans, omniæque alia beneficia præstans, quæ ad conservationem universi necessaria sunt. Et hoc sensu verissimum est, hæc inferiora à cæli syderumque influxu foveri ac conservari. Vel considerantur respectu peculiaris naturæ ac conditionis, hujus, vel illius elementi, hujus, vel illius viventis. Et tunc non est inconveniens dicere, dari quosdam influxus alicui elemento, vel viventi, hoc vel illo modo, secundum aliquam sui partem affectis, noxios atque perniciosos: quod quidem ex ipsorum astrorum vitio minimè dependet, (sunt enim perfectissimæ cujusdam naturæ,) sed potius ex rerum his subjectarum imperfectione, quæ insignem mutationem sine propriæ substantiæ corruptione pati minimè possunt. Variæ autem illæ astrorum naturæ, & variæ qualitates ex vario eorum concursu in hisce inferioribus productæ, à summo rerum opifice constitutæ sunt ad conservationem universi, quod tam variis, & tam invicem repugnantibus naturis conflatum, tantâ etiam in astrorum influxibus diversitate indiguit, ut omnia in quodam veluti æquilibrio conservaret. Ex qua tamen influxuum diversitate vix fieri potest, quin aliqua rerum adeò inter se diffitarum pericula interdum patiantur, non in tota, aliqua specie (quod tenderet ad destructionem universi,) sed tantum in aliquibus individuis, minori resistentiâ præditis, & ut plurimum malè affectis, & in aliqua tantum aëris parte maligni influxus receptioni magis expósito. Unde concludendum est, ea vitia præcipuè dependere ex defectu rerum inferiorum. Siquidem multa loca videre est, adeò perfecta aëris conditione, & æquabili hominum temperie donata, ut quantumvis maligni astrorum concursus influant, nunquam tamen pestiferâ lue tententur.

Ad idem causarum genus referri solent luminarium defectus & eclipses, insolita meteora, & præsertim cometa, qui nunquam apparere solent, quin morbi epidemici ac pestilentes, variæque in mundo mutationes subsequantur, prout multarum historiarum experimentis confirmatum est. Unde ille pervulgatus Claudiani versiculus.

*In celo nunquam spectatum impune cometam.*

Cujus rei testis luculentissimus fuit cometa ille crinitus, qui anno 1681. versus Orientem apparuit die 27. mens. Novembr. & deinceps toto ferè mense Decembr. conspectus est mobilis & fulgidus. Illius pars densior, & solidior Soli obversa ortum intuebatur, & tum claro splendore, tum magnitudine in arcum compacta & conglobata Venerem longè superabat. Reliqua ejus pars tenuior, minus à Sole, illustrata, propter tenuitatem suam in barbæ protensæ modum diffusa procedebat, & versus Occasum porrigebatur. Primum apparuit hic cometa sub Libra circa Æquatorem; sed primario & peculiari motu inde ferrebat ad Septentrionem, per pedes Virginis, per medium Bootem, & caudam Ursæ majoris. Ac tandem paulatim, decrescente lumine, dissipatâ materiâ, disparuit inter Ursam majorem & Draconem. Motu communi syderum ferrebat ab ortu ad occasum, sed paulò velocius stellis moveri videbatur. Nam primis apparitionis suæ diebus oriri solebat paulò ante horam quintam matutinam; postea verò, horâ quartâ & ante quartam oriebatur, atque ita dein-

ceps, donec mediam noctem & concubitum ortu suo anteverteret. Hunc verò cometam morborum malignorum & pestilentium, necnon etiam bellorum, quibus universa penè Europa hæctenus devastata est, prælagium ac prænuncium fuisse, credere non alienum est.

Quamvis autem aër inter causas mediatas febrium pestilentium & malignarum principem locum teneat; certum tamen est, alias res non naturales ad earumdem generationem etiam concurrere, prout jam breviter & sigillatim exponere aggredior.

Secundum post aërem locum obtinent alimenta; quandoquidem ex parva victus ratione contrahitur morbosus apparatus, qui est causa sine qua non, & efficiens interna febrium malignarum pestilentium. Unde à Gal. *lib. de cibis boni & mali succi*, & 1. *de diff. febr. c. 3.* ex pravis aut corruptis alimentis morbos pestiferos exoriri, demonstratum est. Illa autem alimenta prava dici consueverunt, & horum morborum causæ multis nominibus.

Primò quidem, quando fructus terræ & arborum, ex prava anni constitutione, putà humidiori, vel sicciori, vel nebulis corruptis, è cœnosis putridisque locis emissis; vel aliqua tempestate, aut maligno denique syderum influxu corrupti, prava succos ingesti producunt.

Secundò, quando magna adest annonæ caritas & penuria; unde vulgare illud, *ὄλοιμός μὲν ἀντὶ λιμὸν πεστὶς ποστὶ σέμναι*. Tunc enim inops plebecula vilioribus pravisque alimentis sese implere cogitur, unde prava exoritur cacochymia. Et quod multo deterius est, quando penuriæ copia illicò succedit, sese enim tunc multis cibis subito ingurgitant, qui à languente partim calore rectè concoqui nequeunt, & inde malignam contrahunt putredinem.

Tertiò, quando alimenta, quæ naturâ suâ bona sunt, aliqua ratione putredinem quandam, aut pravam qualitatem acquirunt. Talia sunt triticum, hordeum, legumina, & aliæ fruges, quæ vel diutius asservatæ, vel malè expositæ loco humidiori, aut aliter malè affectæ, rubiginem, aut qualitatem quandam putredinosam acquisierunt. Tales sunt carnes diutius asservatæ, aut malè olentes, vel quæ non manu hominis, sed vi morbi extinctæ sunt: quemadmodum narrat Julius Obsequens, in Insula quæ Lipatâ appellatur, cum mare ab Ærææ montis ignibus, ex terræ motu magnâ vi evomitis, incaluisse, piscisque concoxisset, iisque ad litus rejectis cum incolæ avidius vescerentur, gravem pestilentiam fuisse subsequutam.

Neque minor est in potu efficacia, quando vina putrida & corrupta sumuntur, vel aqua bibitur ex putridis & cœnosis lacubus, aut alio quovis modo infestis. Quemadmodum historiarum fide proditum est, numerosos exercitus ex hujusmodi aquarum usu, popularibus morbis fuisse devastatos.

Duæ res non naturales hæctenus expositæ, nempe aër & alimenta, præcipuam vim obtinent ad febrium malignarum generationem. Reliquæ verò quatuor, nimirum excreta & retenta, motus & quies, somnus & vigilia, animi pathemata, minoris sunt efficaciam, & concurrunt tantum ut causæ adjuvantes, vel corpus disponentes ad malignam putredinem concipiendam, ut ex earum expositio- ne statim apparebit.

Retentiones mensium in mulieribus, aut alterius vacuationis consuetæ in viris, ut hæmorrhoidum, & hæmorrhagiæ, & alvi fluxus, qui in nonnullis per intervalla solent contingere, si in constitutione epidemica accidunt, morbum malignum solent producere. Illa enim, quæ tanquam superflua, & naturam onere gravantia excernuntur, si intra corpus retineantur, facili concipiunt putredinem. Sic nimia evacuationes aut sanguinis, aut aliorum humorum, corpus maximè debilitant, efficiuntque ut calor nativus imbecillior factus, aeris vitiosi, aut pestilentis inquinamenta faciliè recipiat.

Quòd ad motum & quietem spectat; certum est, nimium otium efficere, ut calor nativus liberam ventilationem minimè recipiat, atque adeo humores putredinem concipiant. Sic nimia exercitatio poros valde aperit & calorem dissolvit, unde fit ut corpus debilius redditum, & magis penetrabile, contagii seminaria faciliè recipiat.



Nimius etiam somnus multum faciat excrementorū proventum, & corpus replet humiditatibus, quæ facillimè putrescunt. Nimia verò vigiliæ cruditates generant, & illæ facile putrescunt, quia calore nativo satis commodè non reguntur: tum quia ex iis multæ sunt obstructions, à quibus prohibita transpiratio, & tādē putredo generatur.

Denique animi pathemata corpus vehementer exagitate solent, humoresque conturbare: atque adeo ad hanc luem capeffendam maximè disponunt, atque in primis timor & tristitia, quæ spiritus vitales introrsum revocatos quasi suffocant, unde cordis vires ita franguntur, ut minùs veneno resistere, primisque morbi insultibus obfistere valeant. Imò verò humores commoti in venis, & vehementer conturbati, à naturali constitutione deiciuntur, malignamque putredinem concipiunt. Adeo ut nonnulli existimaverint, in obsidionibus & castris, morbos pestilentes non tam ex pravâ victus ratione, & cadaverum foetore, quàm terrore, metu, anxietate, & mortis formidine provenire, quæ humores exagit & eòsque tumultuari ac fluctuare faciat.

Signa febris pestilentis alia futurum morbum indicant, alia præsentem demonstrant, alia præteritum commemorant. Quæ omnia proponenda sunt, quia à primis præservatio desumitur, à secundis curatio, ab ultimis præcautio quædam in iis, qui nondum febre pestilente correpti sunt.

Quæ futuram febrem pestilentem prænunciant, à tribus desumuntur; nempe à corporis dispositione, præsentia causarum & à quibusdam mediis dispositionibus.

Corpora ad febrem pestilentem disposita sunt, quæ pravos congesti succos ex prava victus ratione, & præpostero sex rerum non naturalium usu antea enarrato. Vel quæ plethorâ onerata plurimum se ingurgitant, aut intempestivè, ac inordinatè se replent, Præterea quidem cacochymia & plethoræ expertes, ad hunc morbum concipiendum sua disponunt corpora dum molestissimis pathematis animum excruciant, vel immodicæ veneri indulgent, ab hisce enim duabus causis frequentius multò febris pestilens produci consuevit; quandoquidem ab iis, etiam in bonos humores corruptela facilè inducitur. Animi enim accidentia spiritus à propriis distrahunt operationibus. Venus nimia omnes virtutes labefactat. At distractis spiritibus, viribusque labefactatis humores in alienam transeant naturam, corruptelam quandam consequuti.

Demùm quibus membra principalia imbecilla, aut labe quadam affecta fuerint, sive ab ortu, sive à pravo victu, aut aliâ quapiam causâ externa, qui calido & humido temperamento præditi sunt, qui rariori, aut densiori habitu corporis donati, omnes febri pestilenti concipiendæ dispositi sunt. Siquidem corpora calida & humida, putredini obnoxia; rara, omnibus injuriis patent, densa non liberè transpirant.

Præsentia causarum, quæ febrem pestilentem producere possunt, eam futuram portendunt: atque adeo præpostera tempestatum conditio; annonæ caritas, bella, aliæ causæ suprâ enarratæ, quando apparent, hunc morbum imminere significant.

Mediæ dispositiones sunt, quando præsentē corporis dispositione, & causis suprâdictis, videmus in homine inconstitiam insolitam, timorem inexplicabilem, calorem facile immutatum, ad oblata non bene se habere, insomniis pravis perturbari, lassitudine sponteâ, siti vigiliis, nausæa infestari: facilè erit conjicere febrem pestilentem imminere: hæc enim omnia indicant, humores alienam naturam adipisci, & corruptelam concipere, à qua febris pestilens oriatur.

Præsentem febrem pestilentem declarantia signa exactè proponenda sunt. Ideo omnes fontes percurrendi, ex quibus morborum diagnosi elici potest. Qui quidem fontes è triplici genere symptomatum desumuntur, quia symptomata sunt affectus morborum, & causæ non nisi per suos effectus commodè significari possunt. Atque adeo alia signa ab actionibus læsis, alia ab excretis, alia verò à qualitatibus mutatis erunt desumenda. Quibus fontibus

Lazar. Riverii Opera.

quartus erit adjungendus ab effectibus supervenientibus desumptus. Ad quorum rectam intelligentiam sequentia præmittenda sunt.

Primò sciendum est, eadem serè symptomata febrem tum pestilentem propriè dictam, tum malignam simpliciter significare, & utriusque signa secundum majus tantum & minus inter se differre: ita ut in pestilenti sit major symptomatum sævities, in maligna verò minor. Esse tamen nonnulla accidentia, quæ magis propria sunt uni, quàm alteri, ut suis locis indicabimus.

Secundò notandum est, nullum dari signum harum febrium verè pathognomonicum, quo scilicet posito, febris pestilens necessario ponatur, & sublato auferatur; nedum bubonem, aut carbunculum in verè pestilenti; cum in multis etiam verà peste laborantibus non appareant, & dantur bubones ac carbunculi malignitatis expertes. Neque maculas purpureas in febre maligna, quamvis illa à pluribus Medicis purpurata nominetur; cum in multis eâ laborantibus nusquam compareant, & interdum erumpere soleant in mulieribus; mensium suppressionem patientibus & in nonnullis pueris, ob levem quandam sanguinis ebullitionem, nullâ tamen apparente febre, quod nobis in utriusque non rarò videre licuit. Attamen, ex omnium signorum syndrome & collectione, certa harum febrium diagnosi facilè stabiliri potest.

Tertiò advertendum est, omnia signa à nobis proponenda, in omnibus agrotantibus non reperiri, sed partem tantum eorum, quæ tamen sufficiat ad morbi speciem, ad amissam constituendam. Pro varia enim corporum dispositione & morbi intensione, aut remissione, nunc hæc symptomata, nunc illa magis elucere solent.

Denique sciendum est, febris pestilentis & malignæ signa (quamvis in aliis etiam febribus reperiantur,) fieri tamen quodam modo pathognomonica in hac febre, duplici ratione. Primò, quia in hisce febribus peculiarem quandam conditionem præ se ferunt, quæ in aliis febribus non reperitur. Nam capitis dolor, nausea, vomitus, caloris modus, & cætera signa, dum pestilentibus febribus accidunt, peculiarem conditionem & malignam acquirunt; quâ differunt à seipsis, dum in aliis febribus apparent; quod vel mediocriter exercitatis in operibus artis innotescit. Secundò quia symptomata inter se non servant eam proportionem in his febribus, quæ in vulgaribus reperitur: ita ut calor ad tactum mitis, pulsus non valde immutatus, exiguam febrem ostendant: cum iis tamen dolor capitis ingens, vigiliæ & interdum deliria, aliæque symptomata, febrem ardentem consequi solita, plerumque conjungantur. His positis signorum seriem describamus ab actionibus læsis incipientes.

Quia igitur cor in hoc affectu potissimum afficitur à maligna & venenatâ qualitate; ideo illius actio nimirum pulsus, variis modis immutatur, pro temporum varietate, ac diversa morbi conditione. Interdum enim in principio est serè connaturalis; & sanorum pulsui simillimus, ut docet Gal. 3. de præsig. c. 4. In progressu tamen & morbi augmento, frequens, parvus, debilis, & inæqualis apparet. Frequentia tamen perpetuò major erit quàm pro ratione caloris adaucti: quia cor laceffitum à maligna qualitate, sese magis exagitat; quam eventilandi caloris necessitas requirat.

Hanc etiam febrem significare valent cardialgia, seu oris ventriculi dolor, quem tanquam malignum damnaverat Hipp. 1. progn. his verbis. *Oris ventriculi dolor cum præcordio distento, & capitis dolore, malignum.*

Sitis aliquando magna, quæ superat caloris febrilis copiam ac modum; aliquando verò ejusdem carentia, cum intensa febre, & linguæ siccitate, utrumque enim malignitatis est indicium.

Ingens ciborum inappetentia, quâ multa omnia alimentorum genera, non secus ac ingratißima medicamenta, horrent. Hæc autem solet exoriri à malignis vaporibus ventriculum afficientibus.

Nausea aut vomitus, ab eadem causâ in principio præcipuè morbi eveniens, isque tam diversus, ut nonnulli assumptum alimentum statim evomant; alii statim



quidem ab assumpto iusculo, at non iusculum ipsum sed varios humores rejiciant, alii quævis alimenta probè retinentes, aquam, julepos, emulsiones, omnem denique potulentam materiam assumptam statim emittant: superfluitate interim siti ingente, cum lingue siccitate & nigredine.

Horror frequens & inordinatus, sæpius in die contingens, ab halitibus acerbis; mordacibus & à natura nostra alienis ad partes sensiles delatis, excitatus, qui in aliis febribus putridis rarò contingit, quoniam in ipsis halitus eandem non obtinent malignitatem. In febribus tertianis intermittentibus, malignitate præditis, ex horrore & frigore, malignitatis signum interdum desumi potest. Contigit enim aliquando, ut in principio paroxysmi, accedente levi frigore, aut horrore, tanta caloris retrocessio accederet, ut caro prægelida esset facièsque moribundi similis appareret, pulsusque adeo exiguus, ut omnino nullus videretur. Subsequebatur postea calor, qui tamen nec in augmento, nec in statu ad tactum validus, nec acer percipiebatur, in dō caro vel tepido calore prædita, vel subfrigida usque ad declinationem perseverabat. Pulsus accenso calore magis apparebat, sed parvus, inæqualis, frequens, & admodum debilis erat: multaque alia febrium pestilentium symptomata comitabantur, quæ satis confirmare poterant, non solum continuas, sed etiam intermittentes dari febres pestilentes, ut antea monuimus.

Totius corporis lassitudo, gravitas, & veluti membrorum contractio in principio morbi apparent, ob prædictos vapores in totum corpus delatos.

Capitis dolores, vigiliæ, & deliria, quæ omnia sunt ab eadem causâ, vaporibus scilicet acerbis & venenatis: qui prout cerebri membranas impetunt, dolorem capitis efficiunt: prout verò ipsam cerebri substantiam calefaciunt, & exsiccant; si levis sit alteratio, vigiliæ tantum efficiunt: si verò intensior, etiam deliria produciunt. Ad hæc verò symptomata multum confert, præter calorem & siccitatem, venenata qualitas: quando quidem in febribus vulgaribus talia symptomata non fiunt, nisi multò major sit intemperies. Dolor verò in hac febre hoc sibi peculiariter vendicat, ut varius admodum sit, nec semper eundem locum affigens. Interdum enim sinciput tantum, aliàs occiput, frontem, aut supercilium lancinans dolor occupat. Interdum & alias partes, ut scapulas, latus, dorsum, aliâve corporis partem. Interdum eidem parti continuò affixus, aliàs locum mutans, & nunc hanc, nunc illam discrucians.

In nonnullis sopores & comatosi affectus contingunt, iis scilicet qui habent cerebrum pituitosis excrementis refertum: quæ quidem pituitosa excrementa vaporibus calidis, ex partibus inferioribus elevatis, liquantur, & functiones cerebri impediunt.

Urina aliquando urinæ sanorum similis, quando scilicet humores plus peccant malignâ qualitate, quam putredine: & primis interdum diebus talis perseverat, postea fit crassa & perturbata. Interdum in statu concocta apparet, licet ad interitum ruant agrotantes. Interdum tenuis est & cruda, nullam continens sedimentum, aut illud excrementi potius naturam referens, quam veri sedimenti. Frequentius tamen crassa & turbida apparet, ac intensioris coloris; & crassum, rubrum, ac conturbatum, diffusumque habens sedimentum. Ac denique omnes pravæ urinarum dispositiones in hoc morbo possunt contingere, pro variis humorum putrescentium ac corruptorum alterationibus.

Alvi fluxus biliosi, qui vel ex se oriuntur, vel à levi causâ irritantur, vel levi clystere, aut pharmaco, & postea contumaciter perseverant, multòque ad interitum perducunt. Sic refert Hip. 3. *Epid.* in pestilenti constitutione ibi descripti plurimos alvi fluxu & dysenteria fuisse sublatos. A maligna enim qualitate humores ferociore redditi, naturam impensè stimulant & irritant, ita ut hæc eos per vias ejicere conetur. Illis autem alvi excrementis ingens factor inesse solet, ex ingenti putrilagine, humores occupante.

Lumbricorum copia, in principio potissimum hujus morbi, excerni consuevit: insignis enim putredo humores

maximè disponit, ut ex iis lumbrici generentur.

Sudores frequentes, pravi, minuti, & inutiles principio morbi producti.

Calor ad tactum mitis ac blandus, ut vix febrile videantur: unde Galenus 9. *de simplic. c. de bolo Armena*, & Avicenna *sen 4. libr. 1. cap. de febre pestilenti*, doceant, febres pestilenter calorem mitem & placidum frequenter habere. Et ratio est, quia febres hujusmodi magis sunt à maligna & venenata qualitate, quam à vulgari intensiori, vel putredine.

Oculorum rubor in hoc affectu frequentissimè apparet, quia à vaporibus acerbis, sursum elevatis, cerebri meninges quandam veluti inflammationem concipiunt, eamque tunica adnata, quæ ab iis ducit originem, faciliè communicant.

Denique maculæ purpureæ, pulicum morsibus similes, peticulæ, vel petechiæ à recentioribus appellatæ; propriè & peculiariter febrem malignam significant. In nullo enim alio febris genere reperiuntur, utpote, quæ ex prava & venenatâ sanguinis, vel aliorum humorum qualitate putredini conjunctâ oriuntur. Apparent tamen aliquando in aliis affectibus, citra febrem pestilentem, maculæ quædam, prædictis consimiles, sed è diversissima causa prodeuntes, nempe à sanguinis tenuitate nimia, qui à calore, aut facultate expultrice agitatus, extra capillares venas in cute efflorescit. Illæ potissimum solent contingere iis, qui sanguinis fluxum patiuntur, ex eo quòd ille factus fuerit tenuior & aquosior: tum etiam in lienosis, ictericis, & diuturnas viscerum obstructions patientibus, iisque omnibus (ut summatim dicam) qui propter viscerum debilitatem, sanguinem generant aquosum, & in cachexiam proclives sunt. His enim sanguis tenuior factus, modo per nares, modò per aliam partem defluit, modò etiam à capillaribus exiens venis, in partes cutaneas transmittitur, ubi retentus, propriam amittit colorem, & vel lividus, vel niger, vel puniceus efficitur, variasque macularum differentias profert, quæ tamen à maculis febrium pestilentium diversissimæ sunt, & nihil aliud quàm sanguinis tenuitatem aquosam, atque imbecillitatem jecoris præ se ferunt. Hæ autem maculæ, febribus pestilentibus supervenientes, ab humoribus putrescentibus, & pravâ qualitate infectis oriuntur. Præterea hujusmodi maculæ aliquando criticè, aliquando symptomaticè erumpunt. Criticè quidem; cum vel ex parte, vel totaliter superatâ putredine, pravaque correctâ qualitate, natura corruptum humorem ab internis ad externa transmittit, tumque semper sequitur imminutio morbi. Symptomaticè verò, cum natura, materiæ morbificæ quantitate, vel qualitate pravâ stimulatâ, ante illius concoctionem, & pravæ qualitatis correctionem, ad partes cutaneas materiæ portionem transmittit. Et hinc nullum subsequitur ægrotanti levamen, sed potius factò inutili naturæ cum morbo certamine, devictæ magis, quàm vincentis naturæ indicium est.

Colores harum macularum diversi sunt & diversitatem humorum ostendunt, ex quibus generantur. Rubræ siquidem à sanguine puriori, virides, puniceæ, lividæ, & nigrae, à sanguine bilioso, & magis vel minus adusto. Quòd ad quantitatem spectat, aliàs plures, aliàs pauciores hujusmodi maculæ apparent, quandoque majores, quandoque verò minores. Apparere incipiunt aliquando quartâ quintâ, septimâ, vel nonâ, vel aliâ indicatoriâ die, si ad bonum fuerit excretio, aliquando etiam aliis diebus, cum minus fida & utilis fuerit. In omnibus interdum corporis partibus, frequentissimè tamen in lumbis, pectore, & cervice apparere solent.

Affectus verò, febribus pestilentibus supervenientes præcipui sunt, exanthemata, pustulæ oris, & ulcera, carbunculi, bubones & parotides.

Exanthemata à maculis purpureis differunt; quod maculæ ad qualitates mutatas ipsius cutis, cum nullo modo emineant, exanthemata verò, ad tumorum genera referantur. Sunt enim variolarum instar aliquando, alias verò minora, granis milii simillima. Aliquando rubra sunt, à sanguine genita, aliquando alba, à pituita, vel serosa, flava



## Sect. III. Cap. I. De febre pestilenti. 451

flava; à bile, punicea, à bile exusta, livida vel nigra, à maxima exustione, vel mortificatione. Quædam symptomatice, quædam criticè, quædam medio modo erumpunt. Alia exsiccantur simpliciter, alia suppurantur, alia ulcerantur.

Ad hæc referri possunt pustulæ, in ore apparentes, quæ omnes prædictas exanthematum differentias nanciscuntur, & aliquando adeò malignæ sunt, ut cibum & potum agrotantes vix tolerant. In tenera ætate sæpè mortem afferunt, cum sibi ipsis vim ad ingerendum cibum non inferant. Hæc pustulæ plerumque in ulcera degenerant, quæ maximam agrotantibus pariunt molestiam, motum linguæ, & præcipuè deglutitionem impediunt.

Aliquando tamen immediate, & nullis pustulis præcedentibus, generantur ulcera in ore, aphthæ Græcis appellata quorum plures sunt differentię. Alia enim sunt superficialia, alia profunda: alia munda, alia sordida, alia benigna, alia maligna, alia cum crusta, alia sine ea. Et crusta aliquando est alba, aliquando flava, livida, aut nigra. Quæ sunt profunda, sordida & maligna, & cum crusta nigra, deteriora.

Carbunculi & bubones, in variis corporis partibus, sed præcipuè circa corpora glandulosa solent accidere; quia expultrix facultas, à maligna qualitate irritata, à partibus interioribus, præcipuè nobilibus, ad exteriores perniciosam materiam expellit: unde à cerebro ad glandulas post aures, à corde ad axillas, à jecore ad inguina, materia hæc transmittitur unde parotides & bubones generantur. Quæ tumorum genera in febre verè pestilente potissimum apparent, præsertim bubones, qui apud vulgus pestis nomine donantur. At carbunculi & parotides etiam in febribus malignis erumpunt, sed quæ summum malignitatis gradum adeptæ sunt, & ad verè pestilentium naturam proximè accedunt.

Signa commemorativa potissimum usu veniunt, quando vocatur Medici ad visitanda defunctorum cadavera illis temporibus, in quibus vagantur morbi pestilentes, aut quædam eorum est suspicio, ut judicetur, an ex iis morbis interitus acciderit.

Et primum in dictis cadaveribus apparent aliquando maculæ, de quibus supra mentio facta est; interdum verò vibices, ac si flagellis percussa fuissent, hæc enim sunt venenati morbi indicia, quandoquidem in iis, qui ex assumpto veneno perempti sunt, eadem signa apparere solent. Illæ autem maculæ pestilentem morbum magis significant, si livido, aut nigro colore infectæ sunt. Idem etiam restantur exanthemata supra enumerata, præsertim si pravo colore infecta sint, tum etiam multò magis bubones, parotides, & carbunculi. Quibus addi possunt signa, quæ in decursu morbi apparuerunt: Eorum enim commemoratio certam demonstrationem efficit.

Prognosis febrium pestilentium adeo incerta est, ut nihil de earum eventu possit certo constitui, donec manifesta victoriæ alterutrius partis, naturæ scilicet vel morbi, indicia appareant; quod non solet contingere, nisi circa finem status, aut principium declinationis. Ideo prudens Medicus differre ac suspendere iudicium suum debet de morbi eventu, in principio & augmento.

Proponenda tamen sunt indicia præcipua, ex quibus magnam elicere poterimus conjecturam, an morbus lethaliter, an salutariter finiturus sit, quorum adminiculo quid sperandum, aut metuendum si poterimus prævidere, sine certâ tamen fiduciâ, nam experientia nos docuit plurimos cum perniciosissimis signis evasisse; alios verò cum salutaribus è medio sublatis. Omnia autem signa prognostica prætermittimus, quæ omnibus morbis acutis communia sunt, de quibus fusè egit Hippoc. in Prognosticis, Coacis, Prorheticis, & Epidemiis, tum in Aphorismis, quæ hîc etiam suum locum habere possunt. Sed illa tantum proponemus, quæ febribus pestilentibus magis peculiariora sunt, ab iisque certior prognosis elici potest.

Illæ autem ex iisdem fontibus desumentur, ex quibus diagnostica desumpta sunt.

Primo igitur in hisce febribus pulsus æqualitatem ac tenorem servans, licet febris maxima appareat, spei sem-

*Lazar. Riverii Opera.*

per aliquid præstat. Contra verò inordinatus, inæqualis, & contractus periculosus, præsertim si à principio debilis appareat, Iste autem pulsuum differentia non tam perniciosæ sunt in febribus malignis, quemadmodum in febribus vulgaribus. Quamvis enim pulsus intermittens in juvene tam sit lethalis, ut testetur Galenus, se plurimos senes & pueros cum pulsu intermittente liberatos vidisse, juvenem verò neminem: In febribus tamen malignis nos juvenes non paucos, pulsuum intermittentem per multos dies habentes, evasisse vidimus. Pulsus sanorum pulsibus similes, admodum periculosi, significant enim naturam præ imbecillitate à coctione abstinere. Ubi enim prava & perniciosâ qualitate vires admodum debilitantur, natura debilis facta concoctionem materiæ non aggreditur, humoremque qui morbum excitavit, non attingit: unde non tentatâ coctione, nec labor sequitur, febrisque vel nulla, vel minima est. Hujus rei exemplum habemus in tumoribus externis, in quibus quamdiu pars ferè obruta à copia vel pravâ qualitate materiæ nec dolores, nec febres fiunt: cum verò natura materiam illam oppugnare aggreditur, eamque in pus convertere tentat, febris plurimum intenditur. Sic in febribus malignis ægri interdum à febre immunes videntur, cum tamen in pejus, & ad interitum ruant, ut videre est apud Hippoc. 3. *Epid. sect. 1. agr. 2.* ubi Hermocrates à 20. die ad 24. febris expers visus est, cum tamen 26. obierit.

Delirium in hac febre frequentissimum est, neque metuendum, cum à somno compescitur, tum præcipuè, si cum copioso sudore evanescat. Signum enim, est materiam à cerebro ad corporis habitum revocari. At perseverans delirium perniciosum est, in veram enim phrenitidem degenerare significat.

Contractiones, & subsultus membrorum, in hac febre frequenter contingere soliti, convulsivi motus sunt, & admodum periculosi, idque magis, si delirio conjungantur: maximam enim cerebri læsionem significant.

Motus tremuli manuum & linguæ, funesii esse solent, & plurimum damnantur ab Hipp. 1. *progn.* Maximam enim arguunt virium imbecillitatem, & naturam ostendunt à morbo devictam.

Surditas, licet in principiis morborum acutorum periculosissima sit, juxta doctrinam Hippocratis; tamen in statu morbi apparens, salutem portendit, præsertim in febribus malignis. Et nos millies observavimus hisce febribus laborantes, quibus surditas in statu supervenerat, aliis symptomatis, quantumvis periculosis existentibus, omnes evasisse, indicium enim est, cerebrum satis validum noxios humores ab internis partibus ad exteriores detrudere.

Sternutamenta, ex Hipp. in *prognosticis*, in morbis etiam exitalibus, (modò non sine affectu pulmones) spem solutionis adferunt. At in febribus malignis, quantumvis sæva symptomata periculum portendant, securitatem pollicentur.

Cardialgiæ frequentes, aut singultus, periculum minantur, & ventriculum graviter à venenatâ qualitate affici significant.

Maxima ciborum aversio periculosissima est. Significat enim ventriculum à maligna qualitate superatum, ejusque temperiem omninò everfam, ut laudabile alimentum, sibi in statu naturali familiarissimum, respuat & aversetur.

Suppressio omnium evacuationum, in principio, & augmento morbi, in bonis habetur. Significat enim, materiæ morbificæ tantam non esse malitiam: ut naturam irriter ante debitum tempus; sed naturam adhuc vincere, & suo tempore excreturam, modò non adsit nota aliqua decubitus humorum ad caput, ventrem, aut aliquam ex præcipuis partibus. At in statu morbi nihil excerui, sed signa in aliquo principalium membrorum deteriora apparere, malum est. Indicio enim est aut morbum diutius duraturum: aut dubiam admodum præstiturum salutis spem. Materia siquidem, quæ pluribus diebus evinci non potuit, aliquod gravius damnum in eodem membro adfert, ut phrenitidem, lethargum, aliâque post undecimum, vel 14. diem orientia, quæ difficillimè quibusvis adhibitis auxiliis expugnari valent.



Sanguis per venæ sectionem eductus si nullum præ se ferat vitium sed purus, & secundum naturam se habere videatur, periculosus. Evidens enim signum est, plus adesse venenosæ qualitatis, quàm putredinis; aut putredinem in venis cordis proximis latitare, quæ venæ sectione educi non possit.

Ex urinis in febre pestilenti nulla ferè prognosis elicitur; aut admodum incerta. Non solum enim confusa, perturbata; tenuior, aut crassior urina, ut in aliis febribus mala est; sed etiam illa, quæ urinis sanorum consimilis est. Imò verò multi coctionis signis manifestè in urinis apparentibus, isque denudò recrudescentibus, è medio sublati sunt. Attamen urinæ concoctæ, & laudabile enazorema habentes, idque multis diebus perseverans & de die in diem magis sese uniens, ac in matulæ fundum sensim descendens, certam salutem perpetuò pollicetur, etiam in febribus malignis ac pestilentibus. Fieri enim non potest, ut facultas naturalis valida & robusta, quæ in huius urinis elucescit, adversus malignam qualitatem non insurgat, eamque tandem superet. Ideò sæpe febre maligna laborantibus, gravissimisque symptomatibus afflictis, & in maxima adstantium trepidatione, felicem eventum ex coctionis signis, in urinis perseverantibus, summâ fiduciâ prædiximus.

Urina pinguis & oleaginea, nigra, aut livescens, cum hypostasi nigra aut livescente, certum exitum prænuociat.

Copiosa admodum urina, quam febris imminutio non sequitur, periculosa est, quia colliquationem significat.

Sudores in hac febre, etiam si cum requisitis accidant conditionibus, nedum die decretorio, rarò solent eam ex toto judicare: Imò interdum primo die ex sudore febris remittit; deinceps verò symptomata ingravescent alia, & post multos sudores succumbit æger. Sudores enim copiosi, morbum non imminuentes, ex colliquatione totius corporis oriuntur. Neque ob id credendum est, in hac febre nusquam prodesse criticos sudores. Nam quò minus venenositatis febris obtinuerit, eo magis prodesse poterunt, ut in aliis febribus vulgaribus. Observatione etiam compertum est, longè utilius esse, si frequentibus sudoribus æger à principio morbi corripiatur, (dummodò ex sudore non se deterius habeat): Signum enim est, naturam paulatim materiam attenuare; & per sudorem excernere.

Alvi fluxus incertum omninò est præsagium. Nam in principio morbi sæpe salubriter fluit, quod etiam aliquando esse lethale signum experientia docuit. Rursum præmissa aliqua coctione visus est ab alvi fluxu laborans interim: nonnunquam verò liberari. Ita tamen distinguendum est. Cum venenosa qualitas præpollet, quo magis à principio per alvi fluxum prolabitur materia, eò securior est. At cum ex humorum putredine majori parte morbus oritur; deterius se habent hi, quibus alvus à principio solvitur.

Maculæ purpureæ, cum plures sunt, majores, & caloris benignioris, & criticè erumpunt, naturæ victoriam prænuociant. Si verò pauciores, minores, & pravi coloris, & symptomaticè excernantur, naturam succumbere significant. Præterea si retrocedant, postquam apparuerint, pessimum signum est; indicant enim materiam morificam ad interiora refluere.

Exanthemata in variis partibus apparentia, majoris malignitatis soboles sunt, quàm maculæ purpureæ: atque ad id majus periculum portendunt.

Carbunculi & bubones maximam testantur malignitatem, & maximum periculum minantur, cum eas febres comitari soleant, quarum peculiaris character in eo constitutus est, ut ex is plures intereant, quàm servantur. Anthraces & bubones, quo longius à corde consistunt, citius crescent, & ad maturitatem perveniunt; eò minus periculosi sunt. Attamen si derepentè, & cum prævisis symptomatibus tumores augeantur, malum est. Carbunculi valde magni, foedi coloris, cum ulcere depascente, aut qui in gangrænâ mutantur lethales sunt. Quemadmodum etiam, qui cordi vicini sunt, aut guttur occupant. Experientiâ observatum est, carbunculos plures paucis

esse periculosiores, & contrà bubones plures paucioribus esse securiores. Paronides in febribus malignis & purpuratis in augmento & statu lethales. Si verò vel tantillum inclinante morbo apparere incipiant, & ad suppurationem veniant, salutare.

Curatio febris pestilentis in duas partes dividitur: Quarum una continet præservationem illorum qui eâ nondum correpti sunt; altera curationem actu ægrotantium.

Præservatio præcipuè consistit in ablatione causarum, quæ corpora febre pestilenti recipiendæ idonea efficiunt, eamque in iis generare possunt. Illæ autem sunt internæ, vel externæ. Internæ sunt corporis dispositio; plethora, cacochymia, & obstructions. Externæ præcipuè sunt aer vitiosus, & contagium vagans. Corpora huic morbo disposita sunt quæ à natura, vel accidenti, sunt præter modum humida, debilia, laxa & rara, densa & compacta. Humidiora corpora exsiccanda: quæ autem sicciora sunt, in eodem statu conservanda. Humidiora igitur vitare debent victum pleniorum, largiorumque potum, & omnia alimenta humidiora; qualia sunt in primis fructus horarum, olera, pisces, lacticia: aerem austinum, & lustrem, & præcipuè nocturnum, otium, somnum longiorem, præsertim meridianum, balnea, & alia omnia, quæ corpus humectare possunt.

Corpora debilia victu analeptico, & roborantibus medicamentis instaurantur. Rara & laxa eadem quæ humida; præcautione indigent. Densa verò & compacta, quia febre pestilenti recipiendæ omnium maximè disposita sunt, à plethora, cacochymia, & obstructionibus magis sedulò liberanda sunt. Quæ causæ cum in omnibus corporibus hanc febrem producere valeant, tanquam causæ internæ, ut antea dictum est, earum remotioni perpetuò incumbendum.

Plethoræ debetur venæ sectio, modò nihil contra indicet, ut tempus anni calidius aut frigidius, & pestilens aeris status, in quo non est mittendus sanguis, nisi plethora ad vasa manifestè urgeat; vel consueta aliqua sanguinis evacuatio per menses, hæmorrhoidas, aut hæmorrhagiam natium suppressa fuerit. Exhausto enim sanguine, facilius inspiratus aer pestilentem imprimet actionem, difficiliusque, si morbus superveniat ab eodem, patiens, ob vires aliquantulum imminutas, evadet. Quemadmodum his, qui post sectam venam venenum hauserunt, facilius hoc penetrat, & illi difficilius liberantur. Tum etiam in metu veneni assumpti à venæ sectione abstinemus. Sic etiam Galenus *lib. 1. de diff. febr. c. 4.* ubi præservationem à febre pestilenti proponit, purgationem quidem & obstructionum apertionem præscribit; nullam verò phlebotomiâ facit mentionem.

Cacochymia debetur purgatio, eaque humoribus peccantibus appropriata præmissa præparatione idoneâ, si ea necessaria videatur; hac cautione, adhibita, ut benigna tantum usurpentur medicamenta, ab iis abstinendo, quæ malignam & deleteriam habent qualiteratem. Quibus etiam utile erit admiscere nonnulla bezoardica, & vim alexipharmacam habentia.

Obstructions fiunt ab humorum multitudine, crassitie, & lentore. Multitudo evacuantibus, crassities attenuantibus, lentor abstergentibus medicamentis aufertur.

Ratione causarum externarum præcautio instituenda est; primum aeris excessus corrigendo, calidiorem scilicet refrigerando, ut in febribus continuis docuimus, humidiorum exsiccando accensis ignibus, tum in viis publicis tum in privatis domiciliis, idque ex lignis odoratis, tantum fieri poterit, junipero, lauro, roremarino, & similibus. Secundò omnes causas removendo, quæ aerem inquinare possunt & suprâ recensita fuere. Tertiò, inquinamenta in ipso aere suscepta consumendo ac dissipando. Quod fiet accensis ignibus, ut in humiditate corrigenda dictum est, & sufficiis, ex odoratis atque alexipharmacis, Tum etiam agitatione aeris vehementis, ad quam tormenta bellica, frequenter explosa, erunt efficacissima.

Quòd si aer valde perniciosam qualitatem induerit, ut



inde febris verè pestilens exurgat, omnium præservatio-  
num præstantissima est cœli mutatio. Illi tan en, qui ma-  
nere coguntur, vel inter ipsa inquinamenta, & cum ægro-  
tantibus versari, multis aliis cautionibus indigent, &  
antidotis frequenter uti debent. Quæ omnes ab Authori-  
bus, qui de peste ex professo scripserunt, fusè explican-  
tur, inde repetenda, cum nostrum insitutum sit, ea leviori  
pede percurrere, quæ veræ pestis curationi maximè pro-  
pria sunt: quandoquidem pauci melioris notæ Medici  
tam periculoso exercitio sese exponere audent. Contra  
verò cum per totos viginti annos & in Gallia, & in Eu-  
ropa universa plerique omnes Medici in febribus mali-  
gnis, & purpuratis curandis occupati fuerint; operæ præ-  
tium duximus, hanc nostram curationem ad eam febris  
pestilentis speciem, quæ maligna simpliciter, & purpurata  
vulgò dicitur, dirigere. Ita tamen, ut veræ pestilentis cu-  
rationi etiam inservire valeat, cum ut ab initio diximus,  
eâdem materiâ medicâ iisdemque indicationibus, utraque  
oppugnari valeat.

Curatio igitur actu ægotantium dirigenda est ad fe-  
brem, putredinem, & malignam qualitatem. Febris oppu-  
gnanda est refrigerantibus & humedantibus. Putredo eva-  
cuantibus & alterantibus. Maligna qualitas alexipharma-  
cis. Quæ omnes intentiones triplici instrumento medico  
adimplendæ sunt, in sequentem modum.

Victus ratio in hac febre eadem instituenda est, quæ in  
febribus continuis fuit proposita. Hoc saltem observando,  
ut acida in potu & jusculis præscripta frequentius usur-  
pentur, utpotè putredini & malignæ qualitati oppugnan-  
dæ maximè idonea. Deinde circa potum hoc etiam an-  
notandum, vini usum in hac febre aliquando esse profi-  
cium, utpotè insigne cardiacum, & malignæ qualitati ma-  
ximè adversum. Sæpè tamen valdè nocere, febrilemque  
calorem plurimum intendere. Ideò Medici prudentia hîc  
apprimè necessaria est, ut morbi naturam, & ægotantis  
temperiem contempletur: ex his enim vini exhibendi in-  
dicatio desumenda est. Si namque febris sit admodum  
exigua, venenata verò qualitas plurimum intensa, & cor-  
pus ægotantis pituitosum: tutò & feliciter vinum in po-  
tu exhibetur, sed valdè lymphatum. Contra verò in fe-  
bre intensa, & bilioso corpore, vinum exhibere, pernicio-  
sum est. Hæc à nobis observata sunt infinitis experimentis,  
ac præsertim in febre purpurata, quæ Monspelii grassata  
est anno 1623. post urbis obsidionem; quæ tantæ maligni-  
tatis particeps fuit, ut tertia ad minus ægotantium pars  
de medio sublata fuerit, & à vera peste solo bubone  
distincta fuerit: cum non solum ectymata & exanthe-  
mata rubra, livida & nigra, sed etiam carbunculi & pa-  
rotides frequenter apparent. Iis enim ægotantibus, qui-  
bus pulsus erat parum frequens, & pulsui sanorum ferè  
similis lingua humida, & nulla sitis, vinum exhibuimus  
felici successu, illiusque continuationem indicabit leva-  
men inde emergens, & ex illius usu febris nullatenus in-  
tensior evadebat, neque sitis, aut linguæ siccitas excitaba-  
tur. Iis verò quibus febris erat intensior cum siti, lin-  
guæ siccitate, scabritie, aut nigredine, vinum prorsus in-  
terdicebamus, eosque in refrigerantium, acidulorumque  
potuum usu perpetuo detinebamus. Advertendum tamen  
est primis morbi diebus vinum nunquam esse exhiben-  
dum, ne materiæ crudæ nimium exagitentur; sed tantum  
circa statum, cum malignitatis signa sese magis exerere  
incipiunt. Attamen Zacutus Lusitanus *observ. 93. lib. I. praxis admiranda* refert, se in febre maligna, præsentē siti  
intensa, cum linguæ siccitate & nigredine, ægro jam des-  
perato vinum exhibuisse felicissimo successu, ut hoc solo  
remedio restitutus fuerit. Verum hîc Celsi sententiam ad-  
ducere non alienum est; *Sæpe quoque ratio non restituit, te-  
meritas adjuvat.*

Institutâ victus ratione, à phlebotomia inchoanda cu-  
ratio est, præmissis clystere: ea enim maximè convenit  
ratione magnitudinis morbi, calidæ intemperiei, & pu-  
tredinis. Verum in quantitate sanguinis metienda, summa  
prudentia necessaria est, cum ratione malignæ & venena-  
tæ qualitatis non conferat, imò potius noceat, ab ea  
enim facultas vitalis maximè labefactatur: & qui veneno

assumpto sanguinis missionem patiuntur, in exitum præ-  
cipitari solent. Ideò si maligna & venenata qualitas pu-  
tredini prævaleat, quod ex propriis signis supra proposi-  
tis facillè internosci poterit, minori copiâ sanguis mitten-  
dus est. Si verò putredo magis infecta sit, quàm venenata  
qualitas, majori copia detrahendus. Atque ita, si ex mor-  
boso apparatu potissimum, & putridis humoribus intra  
venas coërcitis, febris maligna oriatur, iterari tutò po-  
test phlebotomia, semel, bis, aut ter, donec sarcina humo-  
ris vitiosi in venis contenti exonerata sit. Idque in primis,  
si visceris cujusdam inflammatio adesse, aut imminere vi-  
deatur, quod non rarò in febribus malignis solet contin-  
gere. Maturè autem, & à morbi initio instituenda est  
phlebotomia. Si enim progressum malum fuerit, & in to-  
tam massam sanguineam malignitas diffusa, non solum  
non confert; sed etiam naturam maximè debilitat, ita ut  
Authores quamplurimi, transactâ die quâriâ sanguinem  
mittendum non esse censeant. In ò verò, cum febris ma-  
lignæ variis temporibus diversam admodum habeant na-  
turam, ex diverso malignitatis gradu oriundam, quando  
illæ grassari incipiunt, sedulò observandum est, quod-  
nam ægri ex venæ sectione emolumentum capiant. Non-  
nullæ enim de synochorum genere, & in quibus inten-  
sior est putredo, malignitas verò remissior, venæ sectione  
valdè imminuuntur. Aliæ verò, quarum natura in una  
propemodum malignitate consistit sectâ venâ, magis per-  
niciosa fiunt. Hoc apparet in vera peste, in quo multo-  
rum & probatissimorum Autorum experienciâ omnes  
ægri, quibus secta vena fuit, è medio sublati sunt: Ita ut  
etiam, in pleuritide pestilenti, sanguinis missionem in-  
signem noxam attulisse; & morbi favitiam intendisse  
affirmant. Imò verò in aliis morbis epidemicis, minori  
malignitate præditis, in quibus tamen sola ferè maligni-  
tas erat in vitio, idem eventus animadversus est. Sic refert  
Wierus in catarrho epidemico, qui anno 1580. per to-  
tam Europam vagatus est, & ex quo omnes ferè evade-  
bant, ita ut vix millesimus quilibet moreretur; tamen ferè  
omnes, quibus secta vena fuerat, interiisse. Observandum  
autem est diligenter, quod docuit Galen. 44. *meth. c. 10.*  
in carbuncolorum curatione venæ sectionem ad lipothy-  
miam convenire: ut sanguis ebulliens, à quo fit carbuncu-  
lus, magnâ copiâ educatur. Cum tamen idem Gal. *lib. de cu-  
rat. per venæ sect. c. 14.* in phlegmonosis tumoribus sangui-  
nem detrahendum esse præcipiat usque ad coloris muta-  
tionem, nisi vires sint debiles, aut phlegmone maligna  
fuerit. Quibus innuitur, Galenum copiosam sanguinis  
missionem admittere in carbunculo simplici & malignita-  
tis experte, in maligno verò & pestilenti, minimè, quod su-  
periori præcepto à nobis proposito ad amissum convenit.

Circa tempus & intervalla in venæ sectionis iteratio-  
ne adhibendâ, hoc advertendum; ut si morbus lentè pro-  
cedat, sanguinis detractiones accelerandæ non sint: fran-  
guntur enim vires ante tempus: ita ut toti morbo exant-  
lando sufficere nequeant. Prout igitur morbus movetur;  
sic Medicus celerius aut tardius venæ sectionem celebra-  
re debet.

An verò exanthematis seu maculis purpureis apparen-  
tibus, sit secanda vena, maximè controversatur. Nonnulli  
enim existimant, piaculum esse, exanthematis apparen-  
tibus, sanguinem sectâ venâ detrachere, quod tunc tempo-  
ris humores ferantur à centro ad circumferentiam, qui  
motus omninò adjuvandus est; & per venæ sectionem  
contrarius omninò motus humoribus concilietur, san-  
guisque trahatur à circumferentia ad centrum, cum facta  
partium interiorum inanitione, necessarium sit sangui-  
nem in exterioribus partibus contentum, ad interiores  
recurrere; quod disertè docuit Galen. 9. *de sanit. tuenda,*  
*cap. 10.* sanguinem nimirum, sectâ venâ, à corporis mole  
universa ad internas partes remigrare. Et idem Gal. *comp.*  
*in 6. Epid.* Simoni illi, de quo Hipp. sermonem habuit,  
latas pustulas habenti, vomitum eâ de causâ non profuisse  
conjectans, quod succi ad cutem vergentes per eam sint  
evacuati.

Attamen sanioribus Doctorum sententiis sancitum est,  
maculis purpureis apparentibus in morbi principio, &



iis diebus quibus venæ sectio celebrari consuevit, si antea sanguis sufficienter detractus non fuerit; etiam quantitate moderata esse detrahendum, neque ullum inde imminere periculum, cum illa exanthematum eruptio, quæ fit in principio morbi, critica non sit, sed tantum symptomatrica, ex insigni sanguinis bullitione, & humorum malignorum ac putrescentium fervore oriunda; atque adeo non possit impediri naturæ motus, qui nullus est tunc temporis. Si enim corpore carente plethorico cum lotio crasso ac rubro, exanthematum apparentium ratione habita sanguinem non detraxeris; vix natura tantum humorum copiam superare poterit, & periculum erit, ne illi in partem aliquam internam irruant, in eaque perniciosa inflammationem generent. Sanguis tamen eo tempore cautius, & minori copia detrahendus est, non ut venæ admodum inaniantur, unde retractio humorum ab exterioribus ad interiora possit succedere; sed tantum, ut nimia earum plenitudo tollatur, quâ demptâ venæ novum sanguinem non attrahunt, sed in se concidunt, ac non nihil laxantur & coarctantur: ut melius sanguinem in iis relictum continere ac regere valeant. Si que juvatur motus & expulsio naturæ ad superficiem corporis. Levata enim parte oneris, quo premebatur, illud quod reliquum est, facilius excutit & expellit. Quod notis in Medicina facienda passim innotescit, dum sæpe eadem die, qua secatur vena in acutis febribus, imò paucis interdum post venæ sectionem horis copiosos sudores, eosque criticos ac salutares erumpentes conspicimus. Imo verò, quamvis satis valida esset natura, ut totum illum sanguinem redundantem regere sufficienter valeret; cum in corporibus plethoricis sanguis plerumque crassior esse soleat, & per huiusmodi eclymata, tenuissima tantum sanguinis portio exhalet, crassior in venis remanens magis ac magis corruptesceret & longe periculosiorem morbum efficeret. Consultissimum tamen existimo, paulò post venæ sectionem plures cucurbitulas admove, ut motus humorum ad exteriora magis adjuvetur: de quarum cucurbitularum administratione paulò inferius agetur. Notandum tamen diligenter, quod supra à nobis dictum est, tempus esse observandum, quo exanthemata apparere incipiunt. Si nempe in principio morbi, & ante quartum diem id fiat, quo tempore eorum eruptio critica esse non potest, & nullum ægroti levamen ex ea emergit, sed potius symptomata ingravescent, unde venæ sectio nullo modo pertimescenda est. At si post quartum diem erumpunt, idque magnâ copiam, ut inde æger melius habeat, ac symptomata remittantur; satius multò est à venæ sectione abstinere, & plures cucurbitulas cum scarificatione affigere, ut motus ille humorum ad exteriora multum promoveatur.

Quæ de venæ sectione hæcenus à nobis dicta sunt, intelligenda veniunt de ea, quæ fit in brachio, quæ confestim multitudinem sanguinis imminuit. Aliquando tamen sectio venarum inferiorum utilissima est, si nempe vires debiliores fuerint, & prædictam venæ sectionem antea usurpatam ulterius ferre nequeant. Tum præcipue confert hæc phlebotomia in mulieribus: est enim, ut inquit Oribasius *lib. 7. cap. 10.* mulieribus propria, multumque efficax, quippe quæ naturalis excretionis modum imitetur. Imo verò circa mensium evacuationem mulieribus utilis est ista vacuatio; quia ex lege naturæ in venis utero vicinis plurimo sanguine abundant. Confert etiam iis, in quibus metuenda est translatio humorum ad cerebrum, quæ frequenter in hisce febribus solet contingere, & phrenitidem generare. Quod faciliè indicabunt (ut supra in prognostico dictum est) urinae tenues, albæ, & decolores: iisque ita se habentibus, sectio venarum inferiorum erit utilissima. Refert etiam Oribasius *loco citato*, se febre pestilenti correptum, detractis per venas inferiores sanguinis *lib. ii.* convalescere: & omnes, qui eodem remedio uti essent, fuisse liberatos.

Easdem vires obtinent apertio hæmorrhoidum, quæ hirudinum applicatione perficitur. Cum enim hoc modo sanguis paulatim educatur, minima consequitur virium exolutio. Ab intimis tamen visceribus, in quibus solet incendiū adesse, & mali fomes, sanguis revellitur. Me-

lancholicis præcipue plurimum convenit, quia iis natura plerumque per has vias limosum sanguinem educere consuevit.

Post sufficientem venæ sectionem, revulsiones celebrandæ sunt per cucurbitulas tum siccas tum scarificatas. Siccas quidem, quando simplex revulsio molienda est, scarificatas verò, quando sanguinis redundantis copia penitus ablata non est per venæ sectionem, quam vires ulterius ferre nequiverunt. Siquidem multò minori virium jacturâ sanguis per cucurbitulas educitur: & præterea venenati spiritus intus latitantes ad exteriora retrahuntur.

Sed de locis quibus applicandæ sunt cucurbitulae, inter Authores non convenit. Alii enim, & imprimis Itali ferè omnes, censent partibus inferioribus, cruribus scilicet & natibus tantum esse applicandas, ut materia venenata à corde ad distantissimas partes revellantur. In scapulis verò ac dorso non convenire, quia humores noxios attrahunt ab aliis partibus versùs cor. Alii contrà scapulis & dorso adnotas cucurbitulas maximè convenire existimant, ut humores & vapores venenati trahantur è centro ad circumferentiam, qui motus naturæ motui in hoc morbo maximè consentaneus est. Nos autem in omnibus locis prædictis cucurbitulas admovendas esse censemus: opportunumque esse, à partibus inferioribus incipere, ut portio quædam malignitatis ad remotiores partes retrahatur. Sed quia partibus illis inferioribus adnotas cucurbitulae venenatos humores, ac vapores à corde & partibus illi vicinis sufficienter retrahere nequeunt, conducibile est, partibus vicinis, scapulis scilicet ac dorso admove. Hoc enim modo naturæ motus maximè juvatur: cum experientia doceat macularum eruptionem ad illas præcipue partes fieri, quæ frequenter cucurbitularum admodone plurimum adjuvatur. Quod præ cæteris Mercatus eleganter tradidit his verbis: *Interim tamen dum corpus aliis remediis tractatur, cucurbitulas parvas, seu plures aut pluries adhibere oportet. Quod si maxima fuerit imbecillitas, & venenositus, citra scarificationem, aut cum levissima. Sin autem & sanguinis vitiosus. Aliquid superesse cognoverimus, cum scarificatione. In quo sanè usu & indicatione confutissimum est eas scarificare, quæ in dorso è regione cordis affiguntur. Quod sanè inventum tanti sæpe esse momenti usus demonstravit, ut anxietates, & pulsus inæqualitatem, ac alia gravissima accidentia ab eis protinus visum sit. Quamobrem donec veneni accidentia quodam modo miscescere, ac supersedere visum sit, ab eis desistendum non est.*

Ratio verò, cui prioris sententiæ assertores innituntur, parvi est momenti, quia metuunt, ne humores noxii ab aliis partibus ad cor retrahantur. Hoc enim forsitan aliquem posset habere locum, si in principio morbi, præsentis totius corporis plenitudine, adhiberentur. At post universalem evacuationem, phlebotomia sufficienter celebrata adnotas, nullum tale possunt inferre periculum. Quod luculentissimo pleuritidis exemplo fit manifestissimum, in cuius principio, si cucurbitula lateri dolenti admoveatur, attrahet sine dubio fluxionem magis ac magis ad partem affectam. Sed cum post multas sanguinis missiones admovei soleat, non solum nihil ab aliis partibus ad affectam attrahit, sed illud, quod parti infixum & incuneatum est, ad exteriora potentissimè trahit, ut inde integra sæpe morbi solutio subsequatur. Quamvis in hoc affectu tractio ad partem affectam magis metuenda sit, quia externa ferè & cucurbitula vicinæ est.

Zacutus Lusitanus *obs. 3. lib. 5. praxis admiranda*, plurimum commendat cucurbitulas scarificatas, prope inguina, & axillas adnotas: his enim vitiosus succus ad partes ignobiles & communia emunctoria attrahitur, ad quæ natura solet eum utiliter deponere.

Inter revulsiva remedia merito etiam referuntur frictions partium extremarum, cum linteo asperiori, frequenter repetitæ. Sed præsertim commendatur illa, quæ fit in toto corpore, cum linimento Aëtii, quod in hunc modum componitur.

℞. Ol. amygdal. dulc. & aquæ fontis, ana ℥. iii. salis nitrî ʒ. ii. Bulliant ad aquæ consumptionem, & manibus hoc



hoc oleo inunctis perfricetur calidè totum corpus manè & sero, Aërius oleum subinum præscribit: sed quia calidius est, meridè à Bapista Montano oleum amygdalarum dulcium subliuitur. Hoc linimentum cutis poros aperit, ut natura commodius vapores venenatos ad eam transmittere valeat.

Potenter etiam pravy ac venenatos ichores attrahunt & revellunt vesicatoria, variis partibus adnota. Vulgò adhibentur posteriori parti cervicis: hinc enim & materiem veneficam eliciunt, & à capite derivant, comatosisque affectibus, qui non rarò hisce febribus solent contingere, percurandis inserviunt. Item & utrique suræ. Attamen, ubi maxima est malignitas, totum corpus occupans, & sævissima symptomata urgent, unicum vesicatorium non sufficit; sed plura admovenda sunt. Soleo ea in magna morbi sævitia quinque locis admovere, cervici nimirum, utrique brachio, parte interiori inter cubitum & humerum, & utrique femori, parte etiam interiori inter inguina, & genua, cum felici successu.

Summum huius remedii usum ex Galeno elicere possumus, qui lib. 5. meth. cap. 12. refert, ex febre pestilenti omnes evasisse, quibus exulcerationes in variis corporis partibus contigerant, evacuata nimirum per ea ulcera materia morbosica. Cum tamen ex huiusmodi vesicatoriis stranguria sæpissimè contingat (cantharides enim virtute specificâ impetunt vesicam) opportunum erit, eo tempore emulsionem exhibere, quibus urinæ acrimonia temperabitur. Hoc etiam symptoma præcaveri potest, si emplastro vesicatorio semina ammeos pulverata permisceantur, quæ hac facultate donata sunt, ut prohibeant, ne cantharides nocumentum vesicæ inferant.

Inter revulsoria remedia referri etiam potest cataplasma ex raphanis à Cratone laudatum: Raphanus, inquit, quia magnam vim habet attrahendi malignitatem materiæ, utile est scobem ejus pedibus, sale & aceto prius mundatis alligare. Sequens verò cataplasma ad eundem usum utilius esse poterit.

R. Rasuræ raphani, & bryoniæ utriusque, ana ℥. ii. β. nasturtii hortensis ℥. i. granorum paradisi ℥. β. salis marini ℥. iii. Mixta irrorentur aceto fortissimo, & excipiantur f. q. saponis liquidi. Fiat veluti cataplasma applicandum plantis pedum, è stupis pexis, calidè horâ somni.

Huic cataplasmati utiliter addi poterunt folia rutæ, urticæ, salviæ, scordii, sterqus columbinum, succus rutæ, acetum.

Cataplasma ex cochleis confusis similem habet efficaciam, potenter attrahit ad inferiora humores, & vapores noxios; quemadmodum Galenus illud maximè commendat ad aquas hydropicorum potenter attrahendas & discutendas.

Hæc revulsoria remedia locum habere solent toto morbi decursu, post universales evacuationes, phlebotomiam scilicet & purgationem, de cujus usu nunc agendum est, ut à remediis chirurgicis ad pharmaceutica progrediamur.

Plurimum autem inter practicos controversitur, utrum sub febrium malignarum initio purgatio debeat institui; Multi hanc omnino rejiciunt, non solum propter vulgatum Hippocratis præceptum, *concocta esse medicanda, non cruda*: sed etiam, quia in hoc morbo humores maligni à purgantibus medicamentis nimium exagitantur, & malignam qualitatem latius diffundunt, naturamque acriter stimulantia perniciosos alvi fluxus inducunt. Cum alioqui in hisce febribus fluxus colliquantes sæpissimè contingere, ægrosque de medio tollere soliti sint. Alii verò contendunt, tantum esse interdum pravorum ac venenatorum humorum copiam, in primis viis stabulantem, ut nisi purgante medicamento in principio tollatur, aut valdè imminuatur, reliquam humorum massam inficiat, ut à naturâ, quantumvis alexipharmacis, roborantibusque medicamentis adjuta, superari nequeant.

Nos hoc dissidium ita componendum esse existimamus: nimirum, in huius morbi principio, quantum fieri potest, à purgantibus medicamentis abstinendum esse ob ra-

tiones in priori sententia allatas; & putridorum humorum illuvem, in primis viis stagnantem, (quæ maxime equidem curationi impedimento esse consuevit,) clysteribus frequentibus potius, quàm purgante medicamento esse educendam. Si tamen tanta sit in prima regione cacochymia, ut clysteribus sufficienter educi non posse videatur, quod præcipue contingit, quando humores ravi in ventriculo redundant, tunc que adest summa inappetentia, oris amaritudo, nausea & vomitus, vel quando adest luxuriantium copia: ut illud est, purgante medicamento eam educere, ut materia morbosica, in venis contenta, postmodum commodius edomari valeat. Quæ quidem materia ante concoctionem educi non potest, & in illa tantum locum habet sententia Hippocratis, *concocta esse medicanda*. Sed materia in prima regione contenta, & excrementorum illuvies, nullâ præmissâ præparatione, ut concoctione educi potest, & solis clysteribus, ut antea dictum est, plerumque expurgatur. Illa autem medicamenta, primam tantum regionem evacuantia, ex benignioribus eligenda sunt, vitando vehementia, imò etiam mediocritas. Atque adeo usurpari tuto poterunt cassia, manna, tamarindi, syrupus rosaceus, & de cichorio compositus. Vixque licet ad sennam & rhabbarum transcendere, aut saltem non nisi in exigua quantitate, magna urgente cacochymia, cæteris permiscere. Horum medicamentorum formulæ in febrium putridarum continuarum curatione & purgatione, in principio earum instituenda, propositæ sunt.

Enemata verò non solum in morbi principio, ad primam regionem ab excrementis liberandam; sed etiam toto morbi decursu usurpanda sunt, si alvus sponte non fluat, idque singulis, vel alternis diebus. His enim quotidiana excrementa educuntur, & quædam materiæ morbosicæ portio sensim detrahitur. Tum etiam humores, ad superiores partes vergentes, ad contraria loca eaque naturæ consentanea, retrahuntur. Hæc autem enemata ex decocto emolliente ac refrigerante componenda sunt, additis laxantibus benignioribus: acria enim & diacrydiata nimium irritant naturam ad excretionem, & sæpe alvi fluxus perniciosos inducunt.

Imo verò satius est nulla purgantia in vigore morbi enematis admiscere, ne alvi fluxus excitetur, qui huic affectui frequentissimus est. Ita ut potius fomenti interioris rationem obtineant, quàm remedii laxantis.

Quod si alvus in morbi decursu liquida appareat, non idcirco ab enematis abstinendum; sed modicè detergentibus & refrigerantibus utendum. Et in julepis dissolvendus est syrupus granatorum, cum pulvere coralli præparati.

Dum prædicta remedia in usum vocantur; febrilis caloris, putredinis, & malignæ qualitatis correctioni incumbendum remediis sequentibus.

Ac primum julepi alterantes, in febrium putridarum continuarum curatione propositi, erunt convenientissimi, ex decoctis præcipue rad. acetosæ, cichorii, graminis, buglossi, lapathi acuti, fol. endiviæ, cichorii, acetosæ, pimpinellæ, capil. ven. tamarindorum. Quibus addenda erunt quæ proprietate specificâ venenatam qualitatem oppugnant, alexipharmaca vulgò dicta: ut radices pentaphylli, tormentillæ, carlinæ, fol. scordii, card. benedict. scabiosæ, scorzonæræ, ulmaræ, flores calendulæ, veronicæ rubiæ, frusta limonis, aut citrii, & semina eorundem; cortices pomorum redolentium; rasura cornu cervi, &c. cum syrupis de limonibus, granatorum, acetoso simplici, de succo acetosæ, & oxyfaccharo. In hisque frequentius acida medicamenta, ut succus mali citrii, vel limonii, spiritus sulphuris, aut vitrioli admiscenda sunt: putredini enim & venenatæ qualitati maximè resistunt.

De malo citrio refert Athenæus, in Ægypto quondam homines morte damnatos, feris expositos, ab aspidibus quidam demorsos fuisse, & nihil inde damni perpeffos, eo quod cum ad supplicium ducerentur, quædam muliercula commiseratione ducta, citria poma, ad refectiorem, & sitim compescendam, illis edenda obtulisset quibus assumptis nihil à lethali virulentarum bestiarum



ictu noxæ perferant. Omnes autem mali citrii parte vim quandam alexipharmacam obtinent; ideo utiliter in taleolas dissectum, cum rad. & herbis prædictis ad julepos conficiendos decoquitur, & præterea utiliter aquæ potus ordinarii infunditur, eique fragrantiam à cortice, & aciditatem à succo conciliat: quamvis solus succus refrigerandi facultate præditus sit.

Spiritus acidi sulphuris & vitrioli à Chymiatris præcipuè summis efferuntur laudibus. Et præstantes eorum doctes diutinâ experientiâ comprobata effecerunt, ut apud Galenicis jam diu recepti sint, ac communiter usurpati. Ut verò pateat, quanto in pretio apud priores habeantur, sufficit nobis unius Mundereri verba hic in medium afferre, quæ habentur *cap. 15. lib. de pestilentia*, ubi de spiritu vitrioli, & sulphuris, aliisque ex sulphure paratis medicamentis agens: *Nulla*, inquit, *est pueredo, cujus vires non frangant: nulla infectio, quam non superent: nulla humorum depravatio, quam ista non superent: Sane (ut liberrimè loquar) si mihi vitriolatorum medicamentorum usus vel interdiceretur, vel inhiberetur, ego ad pestis curationem nunquam vel saltem inermis accederem.*

Iisdem julepis interdum addi potest sal prunellæ, quod potenter refrigerat, & febrilem ardorem extinguit, habetque præterea vim quandam diaphoreticam, cujus ratione febribus malignis utilissimè accommodatur.

Juleporum loco pro delicatioribus interdum substitui poterunt juscula medicata, ex foliis borraginis, acetosæ, pimpinellæ, aliisque herbis gustui gratioribus, corticibus pomorum redolentium; pulpâ & acido citri, cum pullo gallinaceo, iisque sal prunellæ ad magis refrigerandum interdum addi potest.

Emulsiones etiam parari poterunt ex amygdalis dulcibus, semin. frig. maj. cum decocto juleporum. Et ad majorem qualitatis venenosæ oppugnationem, seminibus prædictis addi poterunt semina citri, napi, aquilegiæ, & cardui benedicti. Ad saporis verò gratiam, syrupi prædicti admisceri poterunt.

Toto autem morbi decursu alexipharmaca usurpanda sunt, non solum julepis, jusculis & emulsionibus permixta, ut antea dictum est, & jam ulterius dicetur, sed etiam in alias formas concinnata. Quia verò non omnia indiscriminatum usurpanda sunt, nec quolibet morbi tempore, ut eorum usus legitimus probè distinguatur; in quatuor classes distinguenda sunt. Prima continebit ea, quæ præter specificam qualitatem qua venenis resistunt, frigida & sicca sunt ac modicè adstringunt, sicque putredinem cohibent, confirmant & roborant, venenum coercunt, ne tam facile in totum corpus diffundantur, partiumque dissolutioni compressione quadam obstant, ut bolus armena, terra sigillata, corallus, radix pentaphylli, tormentillæ. Secunda complectetur ea, quæ frigiditate sua, & substantiæ tenuitate putredini resistunt, & malignitatem coercunt, ut succus limon. spiritus sulphuris & vitrioli, tum acida omnia, ipsum & acetum. Tertia comprehendet calida & diaphoretica, quæ venenosos humores & vapores à corde expellunt, eosque à centro ad circumferentiam educunt ut angelica, zedoaria, dictamnium, ulmaria, scordium, carduus benedictus, scabiosa, theriaca, mithridatum, aqua theriacalis. Quarta deniq; continebit ea, quæ specificâ vi, sine ullo primarum qualitatum excessu, venenatam qualitatem oppugnant, ut lapis bezoardicus, cornu cervi & monocerotis, trochisci viperini, & similia.

Primæ, 2. & 4. classis remedia in principio & augmento magis conveniunt. Tertiæ verò, in statu & declinatione. Maximè autem varianda sunt hæc medicamenta, & miscenda, pro vario malignitatis aut putredinis gradu; pro varia febris intensione, vel remissione, & vario ægrotantium temperamento, sexu, ætate, aliisque circumstantiis, quarum decisio ex Medici judicio atque prudentia tota dependet, neque certis regulis determinari potest. Hos tantum admonemus, quod est notissimum, quando scilicet vehemens febris exardet, & refrigerantibus & acidis præcipuè inhærendum, calida & diaphoretica calida non esse exhibenda, quæ tamen maxime convenient, ubi febris remissior est, & maligna qualitas præcipuum facit

negotium. Ex his igitur varia componi possunt medicamenta, pro arburio Medici curantis. Ne tamen tyrones eorum formulis omnino destituantur, nonnullæ hic subnectendæ sunt, ad quarum imitationem infinitas alias in rem præsentem concinnare poterunt.

Recipe radices acetosæ, buglossi, tormentillæ, ana Unciam j. fol. endiviæ, cichorii, acetosæ, pimpinellæ, an. M. i. tamarindor. Unc. i. Coquantur an. lb. i. In colat. dissolve syrup. de limon. & granat. an. Unc. i. sem. Fiat julepus pro tribus dosibus, bis in die sumendis: addendo unicuique dosi confect. de hyacinth. dra. hm. i. lapid. bezoard. gr. vi.

Hæc julepi forma in febris initio convenire poterit. Eâ tamen intensâ admodum existente, & temperaturâ corporis biliosâ, addi poterit unicuique dosi salis prunellæ 3. i. vel spiritus sulphuris, aut vitrioli q. s. ad moderatam aciditatem, vel utrumque simul. In febre verò non admodum intensa addi poterunt decocto radices carlinæ, & pentaphylli, folia scordii, & scabiosæ.

Recipe amygdalarum dulcium excorticatarum Unc. i. sem. melonum, cucurbitæ, napi, aquilegiæ, citri, & cardui benedicti, an. drachm. ii. Contundantur in mortario marmoreo, sensim affundendo decocti julepi prædicti lb. i. semis, syrupi de limonibus Unc. iii. salis prunellæ drachm. iii. Fiat emulsio pro tribus dosibus, bis aut ter in die sumendis.

Toto morbi decursu utatur æger, in jusculis, confectioe de hyacintho: vel pulvere sequenti gustui non ingrato.

4. Coralli præparati, margaritarum præparatarum, rasuræ eboris, cornu cervi, & lapid. bezoard. ana ʒ. i. Misce, Fiat pulvis, de quo detur scrup. sem. cum singulis jusculis.

Novatores hodierni, gemmas, margaritas, corallium & omnia cardiaca in universum, ab usu medico proscribere conantes, & febres omnes, etiamnum malignas, sola venæ sectione, & apozematis simpliciter refrigerantibus curantes; hoc saltem experimento, circa corallium & margaritas, convincantur, quod illa in pulverem redacta, si aceto, limonum, aut spiritui vitrioli aut aquæ forti infundantur, omnem horum liquorum acrimoniam tollant. Unde videre est, eadem medicamenta intus assumpta, humorum acrimoniam & malignam qualitatem denudare, & ad moderatam reducere. Qui solutiones perlarum aut corallorum, in succo limonum, aut aceto destillato factas degustarunt; hoc probè norunt.

Ubi maligna & venenata qualitas plurimum agit, alexipharmaca in julepis, jusculis, aquâ potus ordinarii, & omnibus, quæ assumuntur, exhibenda sunt, ut assiduo & indefinente conspectu insensus hostis oppugnetur.

Lapis bezoardicus solus ad gr. v. vel vi. exhibitus cum aqua ulmarie, scorzonæ, cardui benedicti, aut alia consimili, non solum ad malignam qualitatem oppugnandam, sed etiam ad diaphoresin adjuvandam prodest, virtute siquidem sudorifica pollere hic lapis vulgo creditur. Quam tamen probati Authores non pauci in dubium revocant, quod nullum sensibilem effectum ex lapidis illius exhibitione videre potuerint. Et certè (ut ingenuè fatear) non potest magna fiducia huic lapidi adhiberi: quandoquidem, etsi vero ac genuino lapidi bezoardicoe facultates concedantur, quæ illi adscribuntur; quia tamen magnum illius pretium efficit, ut quamplurimi propolæ in eo adulterando strenuam operam navaverint, vix alios quam adulterinos hodie habere possumus. Cujus rei testimonium luculentum inde elici potest, quod rerum Indicarum scriptores testentur, lapidem bezoardicum apud ipsos Indos rarum, magnique pretii esse, cum apud nos tamen magnâ copiâ, & satis vili pretio reperitur.

Major fides haberi debet radici illi quæ nostro sæculo ab Hispanis ex India allata est, quam *contrayer-vam* nominant: quod vocabulum herbam alexipharmacam significat; quoniam illius pulvis adversus venena præsentissimum est remedium, eaque per sudores, aut



## Sectio III. Cap. I. De Febre pestilenti. 457

aut insensibilem transpirationem evacuat. Illamque plantam existimant commune esse alimentum, quo animalia lapidem bezoardicum generantia vesci consueverunt, ex eaque præcipuè vim alexipharmacam tribui lapidi bezoardico. Radicis hujus pulveratæ ʒ. i. vel ʒ. ʒ. exhiberi potest, cum aqua cardui bened. aut aliis medicamentis permisceri.

Mindererus pulverem sequentem prædicat.

℞. Sacchari canti ʒ. iii. zinzib. albi ʒ. ii. camphoræ ʒ. i. Fiat pulvis, cujus dosi ʒ. i. cum liquore idoneo. Monet verò idem Author, in magnis capitis & ventriculi doloribus cautè esse utendum camphorâ, quam tamen maximè commendat in morbis pestilentibus; & tempestivè datam plus prodesse asserit; quam vel pretiosa quævis medicamenta bezoardica. Hunc pulverem calidiorem censèo ratione zinziberis, & ad illius imitationem sequentem composui, quo usus sum foelici successu.

℞. Bezoardici miner. ʒ. iii. salis prunellæ ʒ. ii. camphoræ ʒ. i. Misce. Dosis ʒ. i. cum aqua card. bened. aut alio liquore idoneo.

Ex fragmentis pretiosis etiam pulveres concinnari possunt, quorum tamen vires multi irrident, alii eas suscipiunt: unde ab Arabum temporibus, usque ad nostram ætatem, variae compositiones officinales ex iis paratæ inveniuntur, ut electuarium de geminis; & confectio de hyacintho. Verùm in morbis venenatis smaragdum insignem vim habere prædicarunt nonnulli, inter quos numerandi sunt Avenzoar, Mindererus, & Zacutus Lusitanus Avenzoar, 1. *teisir. tract. i. cap. 5.* refert, seipsum ex veneno laborantem, hoc solo remedio fuisse curatum. Mindererus *lib. de pestilentia cap. 15.* narrat se mulieri, febre pestilenti correptæ, quæ omnia remedia averfabatur, pulverem sequentem exhibuisse, quem sine odore, vel sapore transglutire poterat; eoque assumpto, abactis sævorum symptomatum seditionibus, & in salutem protinus converso morbo, evasisse.

℞. Smaragdi præpar. lapid. bezoard. orient. an. g. vi. hyacinthi præp. g. iii. Misce. Fiat pulvis pro una dosi.

Zacutus verò Lusitan *observ. 87. lib. 3. praxis admirandæ*; refert nobilem quendam Lusitanum, diuturno alvi fluxu ex veneno assumpto laborantem, & in tabem deductum, a quo affectu nullo abstergentium & alexipharmacorum usu liberari potuerat; solo smaragdi usu curatum fuisse, cujus pulverem fumebat in conserva cydoniorum alternis diebus ad gr. xii. cum quinquies sumpsisset, à fluxu immunem evasisse.

Medici Mompelienses utuntur in hac febre, tanquam alexipharmaco utilissimo, nulla calefaciendi vi prædito, trochiscis viperinis, qui ad confectionem theriacæ vulgò concinnari solent, eosque exhibent à ʒ. i. ad ʒ. sem. cum aquis cordialibus, vel julepis.

Melior tamen foret caro viperina exsiccata, nulla venenosa qualitate prædita (ut vulgò creditur) sed potiùs virtute alexipharmacâ potenti, quæ in decoctione multum immittitur; ad trochiscos enim parandos in aqua decoquitur. Ideò præstantiores effectus observamus ex corde & hepate viperarum; solâ exsiccatione præparatis.

Tertiæ classis alexipharmaca, quæ nimirum diaphoretica & sudorifica sunt, non nisi in statu morbi, aut declinatione, (ut antea dictum est) exhiberi debent. Quod quidem intelligendum est, dum in febre maligna simpliciter, & purpuratâ usurpantur: nam in vera peste ab ipso morbi initio usurpanda sunt, ut venenata qualitas, brevi hominem jugulatura, citò & potenter oppugnetur, malignique vapores discutiantur. Imò verò, in maligna simpliciter, si venenata qualitas putredini prævalere videatur, etiam à principio exhibenda sunt in minori dosi; ea eligendo, quæ minori calefaciendi vi prædita sunt, & permiscendo julepis, aliisque medicamentis refrigerantibus, suprâ propositis.

Horum autem medicamentorum diaphoreticorum varii sunt gradus. Alia enim calidiora, ut angelica, zedoaria, dictamnium, theriaca, mithridatum, aqua theriacalis. Quæ

Laz. Riverii Opera.

quidem nunquam exhiberi debent, quando febrilis ardor maximè viget, sed tantum, eo plurimum remisso & malignitatis signis valdè prævalentibus. Alia verò minori caliditate prædita sunt, ut scabiosa, carduus benedictus, ulmaria, scordium; quæ tutius etiam vigente febre administrari possunt. Et hæc in usu practico maximè distinguenda sunt. Quod ad formulas spectat, unusquisque eas variare potest, pro vario caloris febrilis & malignitatis gradu. Nos tamen eas, quas majoris efficaciæ esse existimamus, describemus.

℞. Aquar. ulmarie, & card. bened. an. Unc. ii. succi limon. Unc. i. theriac. veter. ʒ. sem. ʒ. ii. vel ʒ. i. prout major, vel minor calefaciendi metus est. Misce. Fiat potio, sumenda tepidè, corpus tegendo paulò plus solito. Si magna sit vehementia symptomatum, recens theriaca magis conveniet, propter vires opii adhuc in ea vigentes, quarum ratione vehementia symptomatum temperabitur, & humorum effervescencia coercetur: in ò verò interdum, quando usus theriacæ non videbitur idoneus, præcipuè morbi principio, vel augmento, laudanum opiatum ad g. ii. exhibitum, & alexipharmacis permixtum, multum prodest. Illius enim virtute narcoticâ & congelante, ferventes spiritus, cordi infestissimi; figuntur quasi, & materia morbifica, (quæ dum est in fluxu, perniciosissima est,) sistitur ac penè immota manet. Unde contingit, ut natura à malignis humoribus & spiritibus non laceßita, recollectis viribus, alexipharmacorum virtutem facilius sibi applicet.

Aqua theriacalis ipsi theriacæ præferenda videtur. Cum enim tenuissima & valdè spirituosissima sit; facilius citiusque penetrat, totumque corpus pervadit, ac sudores prolicit. Quia verò plures habentur illius descriptiones, varia earum dosi esse debet, prout ex magis vel minus calidis medicamentis composita est. Nos præcipuas hæc proponemus.

Ac primò, aqua theriacalis Bauderoni præstantissima est, utpotè valdè temperata. Non enim alium recipit liquorem, quam acetum & succum limonum, à quibus calida ingredientia valdè temperantur. Ideòque ab Unc. sem. ad Unc. i. exhiberi potest, in aquis vel decoctis sudorificis. Quamvis tamen præ cæteris quæ à variis Authoribus proponuntur, hæc minus calefaciens existat, nos tamen aliam excogitavimus, paratu facillimam, quæ majori refrigerandi vi prædita, non minus febrem, quam malignam qualitatem oppugnare, sicque toto morbi decursu, & quocumque illius tempore usurpari valeat. Ejusque compositio talis est.

℞. Limones recentes & succulentos num. xii. Cortices & semina eximantur, succus exprimatur, eique adde cortices prædictos & semina succi scordii lb. iii. succi acetosæ, rutæ caprarie, scabiosæ, & card. bened. an. lb. i. rasuræ cornu cervi Unc. iv. theriacæ veteris Unc. vi. Cortices limonum in tenues laminas dividantur, semina contendantur, & herbæ, quæ minus habent succi, inter contundendum succo limonum irrorentur omniaque destillent in B. M. Hujus aquæ detur ʒ. i. per se, vel cum aliis liquoribus permixta.

Aquæ theriacales calidiores fiunt cum vino albo, aut spiritu vini, eaque cautius & in minori dosi exhibendæ, magis tamen penetrant, & sudores movent, ac præcipuè in vera peste locum habent. In certis tamen casibus à Medico prudenti in usum vocari poterunt. Ex variis earum descriptionibus nos duas insigniores hæc proponemus.

℞. Rad. angelicæ carlinæ, gentianæ, tormentillæ, zedoariæ, cornu cervi, an. ʒ. i. triam fantalor. ʒ. ʒ. theriacæ ʒ. iii. camphoræ ʒ. i. Contendantur omnia, & insundantur in vini albi generosi lb. ii. in loco calido, per triiduum. Deinde destillentur in B. M. & aqua fervetur ad usum. Dosis erit à ʒ. ii. ad ʒ. ʒ. in julepis refrigerantibus; addendo spirit. virioli, ad inflammabilitatem illius corrigendam.

℞. Spiritus vini opt. rectificati lb. i. ʒ. theriacæ vet. ʒ. viii. myrrhæ electæ ʒ. iv. croci Orientalis ʒ. i. camphoræ ʒ. sem. Insundantur per 24. horas in B. M. Postea

M m m

destillen-



defilientur in eodem balneo, & eliciatur aqua summè efficax.

Chymici bezoardica sua mineralia valdè prædicant, quòd sudorifica, aut saltem diaphoretica sint, nullam tamen calefaciendi vim habeant: idque probare contendunt ex insipido eorum sapore, ratione cujus etiam delicatioribus quibuscvis ægrotantibus, & ingrata medicamenta respicientibus facillè possunt exhiberi. Laudant prætereà illam, quam vocant mixturam simplicem, vel mixturam spiritualem, ex aqua theriacali camphoratâ, spiritu tartari & vitrioli compositam; ejusque 3. i. julepis, aut potionibus alexipharmacis admiscant.

Medicus febrium malignarum curationi incumbens, varia in promptu habere debet alexipharmaca, eaque per vices immutare, ne natura uni & eidem assiduè usurpato, nimium affuecat, illiusque vires contemnat. Adde, quòd non una & eadem semper sit veneni natura, sed pro varietate corporum admodum diversa: ita ut, quod uni profuerit, alteri non conferat. Ideò, postquam per aliquod tempus uno usu fuerit alexipharmaco, ad aliud & aliud transire erit utilissimum.

Dum prædicta diaphoretica usurpantur, si quando eorum operationem augere est animus; ut potentius venenum ad superficiem corporis educant, externa quædam remedia possunt admoveri: nempe cucurbitulæ, tum scarificatæ & pluries admotæ; & vesicatoria, de quibus antè dictum est, quæ in statu morbi præsertim maximè conveniunt, & quo tempore sudorifica medicamenta exhibentur, ac etiam ol. scorpion. Matthioli, quod ab omnibus prædictis multum commendatur; virus enim, in profundo corporis residens, ad exteriora evocat. Ideò corporis emunctoria, ut inguina, & axillæ; tum etiam pulsus temporum, manuum & pedum hoc oleo calente frequenter inungi debent; nempe ter, aut quater in die, vel etiam tertiâ quaque horâ. In hujus olei penuriâ parari potest linimentum ex theriaca succo limonum dissolutâ, addendo croci & camphoræ tantillum.

Si quando natura, veneni malignitate oppressa, & quasi devictâ, nihil prorsus agere, sed victis quodam modo manibus collum submittere videatur; fortissima quæque diaphoretica, etiam majori dosi, exhibenda sunt, ut consternati cordis vires; quasi stimulis quibusdam concitentur. Tumque aquæ theriacales, aut bezoardica potentiora, & majori penetrandi vi prædita (quæ etiam additâ camphorâ plurimum intendi poterunt) usurpanda sunt. Exteriùs verò tunc temporis fons sequens assumptorum vim mirificè juvabit, malignorumque vaporum diaphoretin promovebit. Hac enim methodo non pauci ab Orci confinio liberati sunt.

℞. Rad. angelicæ & gentianæ, an. 3. ii. fol. melissæ, origani, scordii, an. M. sem. Card. bened. 3. i. flor. chamom. verbasci, meliloti, hyperici, centaurii minor. stœchad. anthos. & calendulæ, an. P. ii. Fiat decoctio in r̄b. iv. aq. comm. addendo sub finem parum vini albi, quæ foveantur pedes, inguina, axillæ, & latera, calidè, cum spongiis.

Si linguæ siccitas, sitis, & alia febrem æque prævalere, ac malignam qualitatem ostendant; hoc foku abstinendum est, & illius loco gallina, per spinam divisa, vel pulmo & omentum vervecis recenter mactati, ventri admoveantur.

In toto curationis decursu virium ratio maximè habenda est, quæ venenata qualitate valdè deiciuntur. Eæque fulciantur primò jusculis convenientibus, ex decocto caponum paratis, quibus, urgente necessitate, jura carniū stillatitia addi poterunt, ac præcipue aqua caponis, per descensum in B. M. parata, ut hodie vulgò fit. Confectio de hyacintho in jusculis vires recreat, & malignam qualitatem oppugnat. In iisdem jusculis gelatina cornu cervi utramque etiam indicationem implet. Labentibus omnibus, ad confectionem alkermes licet confugere, modò febrilis calor non vehemens urgeat. Ac denique vinum omnium cardiacorum potentissimum est, de cujus usu in hoc morbo, supra in victus ratione actum est. Solus vini odor vires admodum recreat, & multò magis frustum

panis assatum, in vino odoro, & aqua rosarum maceratum ac naribus oblatum.

Tum etiam confectio alkermes & de hyacintho potionibus alexipharmacis admisceri solent. Vel in maxima virium imbecillitate potiones merè cardiacæ concinnari possunt, in hunc modum.

℞. Aquæ naphæ & rosar. an. 3. i. sem. Confect. alker. 3. i. syrapi de pomis 3. i. succi limon. 3. iii. Fiat potio. Si febris non sit intensa; aqua cinnam. ad 3. i. vel iii. addi poterit, & interdum anbra grisea ad g. v. vel viii.

Neque tamen, in maxima virium ruinâ, calida illa roborantia tantoperè metuenda sunt, ut febris augmentum formidantem ægrum ab imminente mortis discrimine liberare nolimus, quandoquidem urgentiori perpetuò major ratio habenda est; & relictis aliquantulum viribus, quod roborantia calida plùs æquo inflammant, refrigerantibus validis, ut sale prunellæ, & spiritu vitrioli; julepis & potu ordinario permixtis, postmodum contemperari potest. Hæc methodus à prudenti Medico observata, non solum in roborantium, sed etiam alexipharmacorum & sudorificorum calidorum exhibitione feliciter succedit.

His accedent epithematum, & animalium applicatio regioni cordis; fons genitalium, ex confectione alkermes in vino dissolutâ; sacculi ventriculo admovendi; aliaque tum interna, tum externa remedia in affectibus cordis, *cap. de virium imbecillitate*, paulò fusiùs à nobis descripta.

Quod ad epithemata spectat, in iis cautio adhibenda est. Siquidem Authores quamplurimi usum eorum rejiciunt, quod ex refrigerantibus & repellentibus componi soleant: aquis nimirum herbarum frigidarum, & aceto, à quibus venenata qualitas ad cor repercutitur, illiusque diaphoresis, quæ perpetuò adjuvanda est, impeditur. Verùm ratio hæc usum epithematum nequit impedire, cum ea ex aquis cordialibus & diaphoreticis, nullaue adstringendi, aut repellendi vi præditis, & sine aceto (quod tamen multi admittunt,) componere possimus, additis cardiacis, iisque simul junctis fient epithemata, non solum cordis robur sustinentia, sed etiam poros cutis aperientia, ut per eos maligni vapores faciliùs transpirent. Hujusmodi epithematum exemplum tale esse poterit.

℞. Aquar. scabios. & card. ben. an. 3. iv. aquæ naphæ 3. ii. confect. alker. 3. ii. pulv. elect. diamarg. frig. 3. i. croci, & camphoræ, an. g. vi. Fiat epithema. applic. regioni cordis, tepidè, frequenter.

℞. Confect. alkermes 3. sem. Pulv. elect. triasant. & diamarg. frig. an. 3. i. sem. Aquæ naphæ parum. Fiat linimentum applicandum eidem parti, post usum epithematis prædicti.

Epithemata etiam, hypochondriis admovenda, hic etiam omittenda non sunt, propter rationes, in febrium putridarum curatione, circa eorum usum propositas, quorum etiam materia inde desumi poterit.

Devictâ tandem remediis prædictis malignâ & venenatâ qualitate, remissaque febre, ac morbo ad declinationem vergente, coctionisque signis manifestè apparentibus, purgatio instituenda est, quæ ægrotantis viribus & constitutioni, à Medico exercitato aptari poterit. Nos in tyronum gratiam unicum exemplum hic proponemus.

℞. Sennæ mundat. 3. 6. Sem. anisi 3. i. fol. scabios. & scordii, an. M. sem. liquirit. 3. iii. Coquantur ad Unc. iv. In colat. dissolve rhab. in aqua buglossi cum fantalo citrino infusi 3. iv. mannæ & syrapi rosac. an. 3. i. Misce. Fiat potio.

Neque verò ut plurimum in morbi declinatione & statu convalescentiæ, unica purgatio sufficit; sed ea non raro bis, terve per intervalla repetenda, ut pravi humores funditus eradicentur. Alioqui periculum est recidivæ, aut saltem ægroti longè tardius convalescunt. Qui natura, etsi satis potens sit illas materiæ morbificæ reliquias contemere, id tamen non nisi multo tempore præstare potest, & interim corpus pristinum robur tardius recuperat.

Ad



## Sectio III. Cap. I. De Febre pestilenti. 459

Ad integrum hujus curationis complementum, superest tantum ut de correctione symptomatum, quæ huic morbo supervenire solent, aliquid dicamus. Eorum autem curatio eadem propemodum est, quæ *sect. 2. hujus tract. capitul. 2.* fuit proposita, ubi symptomatum, febres putridas comitantium curationes tradidimus. Et illa symptomata cum iis, quæ febribus malignis accidunt, eadem ferè sunt secundum magis tantum & minus differentia; ideo eadem remedia in utroque morbo iis aptari poterunt. Nos tamen hoc loco, quæ frequentius à nobis in febrium malignarum symptomatis edomandis usurpata sunt, quæve magis profuere, paucis adnotabimus. Simulque morborum hinc febribus supervenientium curationes proponemus.

Ac primum in dolore capitis, vigiliis, & delirio, conveniunt in principio reveillentia omnis generis: ut aperio venarum inferiorum & hæmorrhoidum, clysteres emollientes, frictiones partium inferiorum, cucurbitulæ primò suris, postea dorso & scapulis adnotæ, tum siccæ, cum scarificatæ; & vesicatoria, quæ in delirio simplici, à materia biliosa excitato, brachiis & femoribus erunt admovenda. Si verò cum delirio stupor & somnolentia adfuerint, etiam cervici, deinde repellentia fronti admovenda, & oxyrrhodina: de quibus hoc notandum, ea minus convenire in febribus malignis, quàm in putridis simpliciter; quia venenatorum vaporum diffusio omni arte procuranda est, non autem intus retinenda. Idèò leviora prius repellentia admovenda sunt, & si vehementia dictorum symptomatum ad fortiora confugere nos cogat; diu non sunt usurpanda.

Inter repellentia leviora recensetur frontale commune, ex flor. nymphææ, violar. & rosar. sem. frig. maj. & granis Kermes, vapore aceti irroratum. Quod si non sufficiat; sequens admovebitur.

℞. Unguenti populei ʒ. i. conservæ rosar. & violar. an. ʒ. sem. ol. rosacei ʒ. vi. aceti rosar. ʒ. ii. Misceantur omnia, & excipiantur stupis pexis, & duobus linteis inclusa fronti applicentur.

Interea emulsiones quatuor sem. frigid. maj. usurpari poterunt; quibus vapores frigidi & benigni ad cerebrum transferri, & dicta symptomata demulceri solent. Quæ si non sufficiant; narcotica addentur, acrium & malignorum vaporum ascensum ad cerebrum mirum in modum prohibentia & somnum conciliantia. Ea tamen parva dosi usurpanda, ut syrup. de papav. ʒ. β. Vel urgente necessitate, laudani opiat gran. ii. cum conserva rosarum utiliter exhibebuntur; vel in julepo aliquo dissolventur, vel illius loco theriaca recens ad Drach. β. Hæc tamen narcotica rarò & in parva dosi usurpanda, quia venenum concentrant, quamvis sudorifica à nonnullis habeantur.

Post repellentia, per unum aut alterum diem usurpata, ad derivantia veniendum est, inter quæ recensetur vesicatorium cervici admotum, de quo supra, cui addenda est sectio venæ frontis: ex eaque detrahendus est sanguis ad ʒ. v. vel vi. & feliciter succedit, dummodò sufficienter antea per venas brachii sanguis detractus fuerit. Affigantur etiam hirudines penè aures. Quod remedium utile quidem est, sed priori minùs efficax, quia per hirudines tenuissima tantum sanguinis pars educitur, cum per venam frontis aliquando in phrenitide sanguis impurior, & magis corruptus educatur quàm ex vena brachii. Tandem in flatu phrenitidis, aut declinationis principio, resolutentia admovenda sunt, præcipuè verò animalia, aut eorum partes, ut pulmo vervecinus, qui pullis columbinis, & catellis commodior est, eo quod totum ferè caput moliter amplectatur. Hæc autem animalia humores noxios in cerebro contentos parim resolvunt, concoquant, atque maturant, ut natura postmodum eos faciliùs expellat. Malè à nonnullis in principio phrenitidis admoventur, quia calorem augendo, fluxionem ad cerebrum magis promovent, & delirium intendunt.

In linguæ inflammatione, siccitate & nigredine con-

veniunt remedia, dicto loco proposita, præsertim, quæ ex aqua, vel succo sempervivi, & sale prunellæ composita sunt. Quibus sequens ex Minderero addi poterit, quippe quod maxime conferre, experientia docuit.

℞. Butyri recentis in aqua rosar. loti ʒ. ii. salis prunellæ ʒ. β. Misce, & servetur in aqua frigida, detur pisi, vel fabæ magnitudine sæpiùs in die, & diu in ore detineatur. Curationis probè succedentis signum est, si fuligo aëra decedat, ac lingua rimis dehiscens humescere incipiat, sicque cutis ramenta, tanquam excoitationes decidant, ita ut faucium exuvias ægri screatu rejiciant. At tum palatum doliat, & tenuissima cuticula quæ convellit, ob ténacitatem vix quicquam ferre potest, sed leviori acore, & vix perceptibili acrimonia offenditur, quod cum prægressæ inflammationis stigmata adhuc ferat, nova pelle vestiendum, ac sic penitus & refrigerandum, & persanandum occurrit. Huic usui convenientissima erit sequens gelatina.

℞. Sem. psyllii, & cydon. an. ʒ. i. β. gummi tragacant. ʒ. i. Cum aquæ rosar. f. q. extrahatur mucilago satis liquida, cui adde syrupi violacei parem quantitatem. Fiat instar gelatinæ, utatur frequenter ex cochleari, diuque ore contineat.

Lac calens gargarizatum dolorem lenit, inflammationem temperat, linguam & fauces humectat, & venenum attrahit.

Pilulæ sequentes commodè usurpari poterunt.

℞. Sem. cucumer. mundat. & contus. ʒ. i. gummi tragacant. subtilissimè pulverat. ʒ. sem. albutinis ovi. q. f. Fermentur pilulæ, quas teneat in ore frequenter. Vel

℞. Sem. cucurbitæ, melon. mundat. & papav. albi, an. ʒ. i. liquirit. & tragacanth. an. ʒ. i. sem. Contundantur & pulverentur, cum mucilag. sem. cydonior. extractâ cum aqua rosar. fiant pilulæ in ore detinendæ.

Quia verò hæc linguæ inflammatio, siccitas, & nigredo, ex interno incendio procedit, ad illius extinctionem convenient julepi valdè refrigerantes, quibus addentur sal prunellæ, & spiritus virioli. Tum etiam aquæ potus ordinarii eadem permisceri poterunt.

Sitis intensissimæ curatio dicto loco sufficienter fuit proposita. Sed in febre maligna feliciter extinguetur duobus remediis proximè laudatis, nempe sale prunellæ, & spiritu virioli, in julepis, aquâ potus ordinarii.

Inappetentiæ, nausea, vomitus, & singultus curationes ex dicto loco desumendæ sunt. De vomitu tamen hoc addimus, eum interdum febre maligna correptos ita divexare ut omnia injecta statim rejiciant; & quamvis sitis, & linguæ siccitas, & nigredo adsint, nullum tamen potentia materiæ genus ferre possint, sed omnes julepos; emulsiones, pilulas, quam etiam simplicem statim post assumptionem evomant. Huic symptomati gravissimo statim medetur, quasi miraculo, sal absinthii ad ʒ. i. in succi limonum recentis cochleari exhibitum, ut experientiâ didici.

Alvi fluxus in hoc morbo frequentissimus est, in eoque Medici prudentia valdè necessaria est. Si enim cohibeatur præposterè, materia venenata intus retinetur. Si verò non cohibeatur, vires deiciat, ægrumque non rarò ad interitum ducit. In illius curatione ita procedendum. Si ita moderatus sit, ut vires non deiciat; cohibendus non est, sed clysteribus roborantibus tantum moderandus. Si verò immodicus sit, & vires admodum deiciat; colligativus esse consuevit, & auster cohibendus, quod summa efficacia præstabit theriaca recens, ad ʒ. sem. vel laudanum opiatum ad g. ii. vel iii. Sæpè tamen observavi, alvi fluxum perniciosum, ex quo æger ad interitum ruere videbatur, potionibus diaphoreticis magna dosi exhibitis, quasi momento cohibitum fuisse, fugato scilicet veneno, quo intestina, aliaque viscera vellicando, fluxum illum syntecticum efficiebat.

Lumbrici hoc morbo laborantes sæpissimè infestant, & ex summa humorum putredine copiosi generantur. His è corpore educendis conveniunt clysteres dulces, & portiones contra vermes, præcipuè quæ ex decocto scordii parantur. Siquidem scordium adversus malignitatem &



lumbricos æqualiter confert. Ut autem illius caliditas temperetur, cum portulaca, acetosâ, & cornu cervi decoqui poterit. Tum etiam cornu cervi usum utiliter decoquetur. Siquidem Forëstus *obs. 4. lib. 6.* testatur, nullum remedium æquè profuisse febre maligna roborantibus, quibus lumbricorum copia & alvi fluxus aderant, ac cornu cervi usum, cum julepis idoneis ad 3. i. exhibitum.

Quando maligna & venenata qualitas in hisce febribus valdè prædominatur, ut ad pestilentiam propriè dictarum naturam accedant, plerumque fiunt parotides & carbunculi. Eorum curatio hîc subnectenda est.

In parotidis principio, quamprimum illa apparere incipit, pars recipiens laxanda, & si tumor segmèter increcat attrahentibus admotis, & alexipharmacis, ac diaphoreticis exhibitis, naturæ ad eas partes materiam morbosicam expellentis motus adjuvandus est. Ad partem laxandam fiet inunctio ex unguento de althæa, admotâ postmodum lanâ succidâ. Attractio fiet admotis catulis, aut pullis columbinis, quibus etiam dolor temperabitur. Validiùs attrahunt emplastra ex fermento, caricis, cepis, columbino stercore, addendo butyrum, pinguedinem gallinæ, axungiam suillam recentem, & ol. lilior. vel amygdal. dulcium. Si attrahentibus hisce pars nimium incalcescat, & dolor nimis intendatur, fiat eorum intermissio per intervalla, admovendo interim cataplasma de mica panis, aut oleo prædicto, lanâ succidâ excepta, vel unguentum de althæa, ut supra. Et quia pars non est capax materiam morbosicam sufficienter recipiendi, ad portionem illius derivandam, admovendum est vesicatorium posteriori parti cervicis, simulque diaphoretica supra enumerata frequenter usurpanda. Evocatâ materiâ ad partes exteriores, tentetur suppuratio, admoto cataplasmate ex rad. althææ, lilior. caricis, farina lini, axungis, & oleis prædictis composito. Suppuratione factâ tumor aperiatur, reliquum materiæ concoquatur, continuato cataplasmate, vel admoto emplastro diachylone. Ulcus mundificetur digestivo communi ex terebinthinâ, vitellis ovorum, & oleo rosaceo. Tum etiam ulcus teneatur diu apertum, admotâ turundâ, ut totum virus per illud sufficienter expurgetur, & tandem ad cicatricem perducatur. Hoc tamen observandum, tumorem ita crescentem, ut periculum suffocationis immineat, ante perfectam maturationem esse aperiendum: sic enim aliquâ materiæ portioneeducta, tumor aliquantulum subsidebit, & suffocationis periculum evitabitur. Pari modo, si intensissima sit malignitas, ut ager morbo succumbere videatur, antequam tumor ad maturitatem perductus sit; aperiendus etiam est ante tempus, ut veneni vis expiret, unde salus ægri subsequi non rarò consuevit. Hacque ratione in vera peste bubones ante suppurationem aperire solent.

Denique silentio præterire nefas est insigne experimentum quod mihi contigit in febre illa epidemica, quæ Monspelii sævissimè grassata est anno 1623. ita ut media ferè pars ægrotantium interierit: peculiariter verò, quibuscumque parotides superveniebant (quod solebat contingere circa nonum, vel undecimum morbi diem) omnes intra biduum interibant; præcedente, aut eodem tempore accedente delirio, stupore, motibus convulsivis; & pulsu inæquali, frequenti, minutulo, quasi fornicante. Cum autem plures hujusmodi vidissem, qui neque alexipharmacis frequenter adhibitis, neque attrahentibus parotidi admotis juvari poterant; animo revolve, quâ via liberari possent à tam certo exitio: Tandem cogitare cæpi, idèò parotides febribus hisce supervenientes sinistri esse indicii, quòd locus, in quo fiunt, non sit capax totam materiam morbosicam excipiendi, quæ intus retenta opprimit ægrotantem, ac proinde opus naturæ inchoatum solummodo evacuationibus suppleri posse; venæ sectione scilicet & purgatione; cum etiam Galenus 3. *de compos. medic. secundum loca, cap. de parot.* in earum curatione phlebotomiam præscribat. Verùm huic indicationi maximè obstabat summa virium imbecillitas, quæ tanta erat, ut jam versari ægrotantes viderentur in agone mortis, quæ etiam brevi succedebat. Galenus verò loco citato, dum

præscribit venæ sectionem in parotidum curatione, duas proponit conditiones: nempe si adsit sanguinis redundantia, & vires ferant. Quæ conditiones hîc omnino deerant: prius enim sufficienter sanguis detractus fuerat, tum per phlebotomias iteratas, tum per cucurbitulas scarificatas: tum etiam maxima aderat virium ruina. Hisce omnibus perpenfis, auream hanc Corn. Celsi sententiam, si aliàs unquam hic maximè locum habere censui; multa scilicet in præcipui periculo rectè fieri, quæ aliàs essent omittenda: & satius esse anceps remedium in uno aut altero experiri, quam tot ægros certo exitio relinquere. Hoc etiam animus addebat, quòd summa illa virium dejectio ab oppressione magis, quam ab exsolutione proficisci videbatur. Idèò enim subito vires corruiebant, quòd natura non posset grave onus excutere, ejusque immutatione sublevatum iri sperandum fuerat. Adde, quòd phlebotomia ita poterat institui, ut nullum inde periculum esset metuendum, si nimirum Unc. ii. vel tres sanguinis primâ vice tantum educerentur, tentandi gratiâ, & si ritè succederet, major deinceps quantitas detraheretur. Hac igitur viâ rem exequi placuit. Et cum mercator Monspelienfis nomine *Bernadier*, primus occurreret, eique parotis pone aurem sinistram die morbi undecima erumperet, cum pulsu, aliisque symptomatis supra enumeratis; phlebotomiam præscribo ad Uncias iii. quam tamen Chirurgus senex & peritus celebrare renuebat, metuens ne æger ad extrema redactus, in ipsa operatione expiraret, meâ postmodum præsentia & autoritate confirmatus, sanguinem misit ad Uncias iii. tribus, aut quatuor horis elapsis, ægrum iterum in vivo, & pulsum paulò validiorem invenio, minusque inæqualem: iteratur phlebotomia ad Unc. iv. Pulsus inde multò melior & robustior. Sanguis detractus admodum corruptus apparuit. Sequenti die propinatur medicamentum ex fenna, rhab. & syrupo rosaceo. Sicque æger à mortis confinio liberatus est. Omnibus deinceps ægrotantibus, quibus succrescebant parotides, venæ sectio plurimum, idque partitis vicibus, sequenti die purgatio à me præscripta est: sicque omnes (Deo sit laus & honos) quotquot hoc modo tractati sunt, feliciter evaserunt, neque ullus amplius toto illo anno ex parotidibus interiiit.

Advertendum tamen est (quod in prognosi notavimus) parotides sæpe criticè & utiliter apparere, & ex iis ægros à morbo liberari; quando scilicet in declinatione contingunt. Idque facillè apparet ex remissione symptomatum quæ illarum eruptionem solet præcedere; & tales accidere solent in febribus, minori malignitate præditis. At verò in prædicta temporis constitutione tanta erat febris epidemicæ malignitas, ut parotides sæpè in statu morbi, & symptomaticè, ac lethaliter erumperent, donec prædictis remediis earum pernicies sublata est.

In carbunculo, febris ardenti superveniente, si ante illius apparitionem sanguis sufficienter missus non fuerit; aut si æger ulteriorem venæ sectionem ferre non possit, aperiatur vena carbunculo vicinior, ut major fiat attractio materiæ virulentæ ad partem affectam. Postmodum tumor undique in circuitu scarificetur, idque satis profundis vulneribus; & aquâ falsâ calidâ foveatur aliquantisper, ut sanguinis concretio impediatur, ejusque effluxus adjuvetur. Mox caustici granum in pustulæ medio applicetur. Toti autem tumori sequens cataplasma admoveatur.

℞. Fol. rutæ, & scabiosæ, contus. an. M. i. ficuum siccar. contusar. par. iii. fermenti acris Unc. i. piperis pulverati 3. i. vitell. ovor. num. ii. Misce. Fiat cataplasma, quod per biduum applicetur.

Deinde verò sequens admoveatur.

℞. Succorum symphyti maj. scabiosæ, calendulæ, an. 3. i. theriacæ vet. ̄. iv. salis 3. i. vitell. ovor. num. ii. Misce. Applicetur tumori.

Potest etiam ab initio tumori applicari cataplasma de arnoglossò in Pharmacopœa Bauderon. descriptum.

Ipsi verò escharæ post caustici applicationem admoveatur unguentum basilicum, cui addatur theriaca, ol. scorpionum, & vitellum ovi.

Postquam



## Se&ct. III. Cap. II. De variolis & morbillis. 461

Postquam tumor incrementum suscepit, ne materia maligna refluat ad interiora; illius ambitus illinatur unguento de bolo, bis aut ter in die. Supra escharam verò, ut illius casus procuretur, applicetur unguentum basilicum, cum butyro, aut axungia suilla permixtum. Post escharæ casum ulcus detergetur unguento sequenti.

℞. Succorum calendulæ, absinthii, scabiosæ, & apii, ana Unc. i. myrrhæ electæ, rad. ireos Florent. aloës, sarcocollæ ana Drach. i. mellis rosati Unc. ii. Fiat unguentum continuandum usque ad integram curationem.

### C A P U T II.

#### De Variolis & Morbillis.

**A**D febres malignas & pestilentes meritò referenda est, quæ variolas & morbillos comitari solet; cum epidemica & contagiosa sit, plurimosque pueros, quibus præcipuè solet accidere, de medio tollat.

Quænam sit inter variolas & morbillos differentia, apud Autores omninò convenit. Usus verò obtinuit, ut variolæ nominentur pustulæ majores, varis persimiles, unde nomen sortitæ sunt; quæ ad suppurationem pervenire solent: morbilli verò sint pustulæ perexiguæ; & veluti cutis asperitates, cum intensa rubedine, instar erysipelatum: quæ intra quinque vel septem dies sine suppuratione discutiuntur, & ratione rubedinis intensæ, apud Gallos *la rougeole* vocari consueverunt, variolæ verò *la petite verole*, & in Occitania *la picote*. Est & tertium pustularum genus, pueris familiare, variolis simile, quoad magnitudinem & figuram: sed in eo ab iis distinguitur, quòd variolæ cum rubore & inflammatione appareant: hæ verò albæ sint, & veluti vesiculæ, seroso humore repletæ, quæ intra triduum disrumpuntur & exsiccantur, nullumque asferre solent periculum, & plerumque sine febre erumpunt. Id pustularum genus à nostratibus scæminis, *la verolette*, nominari solet; ab Italis, *ravaglione*. Ejusque descriptio reperitur apud Vidum Vidium, his verbis: *Sunt qui præter duas species crystallos adjiciant. Sic enim appellant quasdam veluti vesiculas, plenas aqua, instar crystalli splendentes, quibus cutis variis locis distinguitur: has nunc vulgò nominant ravaglione. In quas non ita incurrunt omnes homines, sicut in variolas & morbillos: neque sub ipsis ita affliguntur. Quamobrem non videntur, tanquam tertia species, morbillis & variolis hæ pustulæ adjiciendæ.*

De variolis & morbillis Autores multum disputant, ac præsertim, utrum hi affectus sint morbi novi, an veteribus incogniti, & à qua causa proximè atque immediatè producantur. Cum autem nos summam brevitem in prælectionibus nostris obnixè affectemus; omnes controversias prætermittere consuevimus, nudas & simplices earum decisiones proponentes, ideòque sic, quid de prædictis quæstionibus censendum sit, paucis explicabimus.

Ac primùm variolas & morbillos minimè novos affectus esse censemus: cum ab antiquissima causa, nempe sanguinis materni impuritatibus oriantur; Quam cum Arabes agnoverint, minin è novum morbum esse censuerunt. Si autem eorum temporibus primùm grassari cœpissent; illud speciatim ab iis fuisset annotatum. At quanquam ab iis primùm exacta eorum descriptio tradita sit, Hippocr. verò & Galenus, alique antiquiores vix de iis mentionem fecerint: arbitrari oportet, ideò peculiarem de iis tractationem à veteribus hisce non esse institutam, quòd sint tantum accidentia, febribus synochis & malignis supervenientia, & eruptiones criticæ, proprium & peculiare morbi genus minimè constituentes. Vel quòd in Græcia, propter aëris clementiam, tam levis fuerit affectus, ut Medicorum curam non meruerit. Quemadmodum apud Indos Occidentales, propter summam aëris clementiam tam levis esse consueverat, ut vix animadversus fuerit ante accessum Hispanorum in eas regiones. Postquam verò Æthiops quidam, eò delatus, variolis pestilentibus correptus est, communicata per contagium maligna & venenata qualitate, tam immaniter grassari cœpit affectus, ut magna Indorum pars de medio sublata fuerit. Cum enim

antea impuritates illæ, ex materno sanguine relictæ ob clementiam aëris à natura facile discuti consuevissent, accedente postmodum venenatâ qualitate, graves morbos effecere.

Sanguinem verò maternum esse veram causam variolarum & morbillorum, inde præcipuè colligitur; quòd ex hominum millibus vix unum reperire liceat, qui semel saltem in vita hos affectus non patiat. At morbus omnibus communis à causa aliqua communi necessariò dependet: qualia sunt generationis principia, semen nimirum & sanguis maternus. At semen non potest esse causa variolarum & morbillorum, cum ab eo morbi hæreditarii & totâ vita perdurantes oriantur. Superest igitur à sanguine materno, quo nutritur fœtus in utero, hos affectus provenire. In illo enim, quantumvis purissimo, quædam impuritates continentur, quæ partibus fœtus labem suam communicant; & illa labes partibus impressa massam sanguinis inficit, eique à causa procatactica excitata, ebullitionem conciliat, cujus beneficio fit fermentatio & depuratio tum sanguinis, tum ipsarum partium. Hoc docent Arabes luculento vini exemplo, quod dum adhuc recens & musti naturam retinens in dolium mucidum, aut prava alia qualitate infectum infunditur, à dolio quidem malam illam qualitatem recipit. Dum verò per ebullitionem depuratur, non modo seipsum, sed etiam dolium purificat. Ista autem ebullitio, seu fermentatio, ut plurimum puerulis contingit, aliquando tamen grandioribus, & virilem ætatem adeptis; quia semper à causa aliquâ externâ commoveri solet, qualis est in primis certa aëris dispositio, huic morbo analogâ. Unde fit, ut nunc variolæ, nunc morbilli grassari soleant; quòd illa aëris dispositio nunc his, nunc illis sit magis analogâ.

Neque impuritates illæ sanguinis materni ipsam matrem inficere possunt, in eaque similes affectus generare; quamvis dictum fuerit ab Hipp. *lib. de natura pueri*, tres esse partes in sanguine, unam purissimam, qua nutritur fœtus: alteram impuriorem, quâ nutritur mater: & tertiam, impurissimam, quæ in venis uteri asservatur toto gestationis tempore, & post partum per lochia expurgatur. Primò enim cum mater habeat partes duriores & solidiores, eæ non tam facile recipiunt impressionem, quemadmodum fœtus corpus tenellum atque molliissimum. Deinde, portio illa sanguinis impurissima quæ asservatur in venis uteri & secundarum, toto gestationis tempore, inficit in transitu sanguinem, qui deferitur per ea loca ad fœtus nutritionem, unde fœtus contrahit malam qualitatem, quæ suo tempore causa est ebullitionis in sanguine fœtus. At verò portio illa impurissima, in dictis locis remanens, non inficit corpus matris.

Præterea mirandum non est, tamdiu differri aliquando eruptionem variolarum & morbillorum, ut in virili ætate nonnullos corripiant. Non enim substantialiter in corpore remanent impuritates illæ, ut multi existimant: corrumpuntur enim mora longissimâ & putredinem deterrinâ acquirere. Sed ab iis tantum prava quædâ qualitas partibus fœtus imprimitur, quæ tandem humorem partem aliquam inficiens, naturæ molestior redditur, quæ tunc temporis insurgens, infectas illas humorum portiones ad cutem propellit.

Cum autem in sanguinis massa duplex excrementum reperitur: unum crassum, alterum verò tenue, ex crasso variolæ generantur, ex tenui verò, morbilli. Et licet una eademque sit prava & maligna qualitas, utrumque excrementum inficiens; attamen, quia diversa est utriusque excrementi natura, diversa etiam est causæ externæ ad utrumque analogia. Unde fit, ut aliquando variolæ, aliquando morbilli populariter grassentur.

Quamvis autem variolæ in toto corpore erumpere soleant; majori tamen copiâ in facie, pedibus & manibus apparere consueverunt, cum aliter evenire soleat in maculis purpureis, quæ in febre purpurata contingunt: illæ enim in pectore & dorso præcipuè apparent. Cujus differentiae ratio inde desumenda est, quòd cum variolæ oriantur ab ebullitione sanguinis, cujus beneficio fit excretio ad cutem excrementi, in eo latitantis: & prava qualitate affecti: hepar autem sit sanguinis fons & origo, ab eo



præsertim talis expulsio dependet, ac hepatis emunctoria sunt facies, manus & pedes: unde fit ut calidiori hepate præditi, faciei rubedine & pustulis laborare, caloremque intensum in volis manuum ac pedum percipere soleant; eaque ratione major fit expulsio ad eas partes. Contrà maculæ purpureæ in febre maligna apparentes, à corde præcipuè affecto oriuntur, ideoque circa partes cordi vicinas erumpunt, & præcipuè circa lumbos, quia in iis vena cava ascendens, & arteria aorta, cordi annexæ decurrunt.

Alia præterea differentia inter variolas & maculas purpureas adnotanda est: quod nimirum variolæ & morbilli, apparentes tertio vel quarto die, à febris invasione, criticæ esse soleant, & ut plurimum saluæ; maculæ verò purpureæ, etiam septimo die apparentes, plerumque symptomatice sint, & morbum reddant deteriorem, cum aliter debere fieri videretur; morbus enim crudior est quarto die, quam septimo. Hujus tamen eventus ratio inde depromenda est, quod in variolis & morbillis plerumque febris incipiat à summo vigore; ideo non solum tertio, aut quarto, sed etiam primò & secundo die excretiones in ea verè criticæ possunt contingere. At febres malignæ segniùs progrediuntur, & principium earum ad septimum plerumque extenditur: unde eo tempore excretiones contingentes, non possunt esse verè criticæ. Quod v. rò variolæ & morbilli tam citò ad statum perveniant, non autem febres malignæ: inde fit, quia febris variolarum & morbillorum à putredine levissimâ, & sanguinis ebullitione potius, quam ab intensâ materiæ putredine proficiscitur, eam ideo cessare fecit natura mediante coctione, ante diem septimum, eò quod levissima sit, & à facillimis causis orta. At in malignis febribus adeo est ingens ac sordida putredo, ut nec decimâ quartâ die, & interdum vigesimâ corrigi possit. Et ob id, maculis erumpentibus, ante id tempus exacerbatur quia citra coctionem & symptomatice coacta fuit natura eas expellere.

Fit igitur expulsio variolarum & morbillorum, per sanguinis ebullitionem. Quæ quidem ebullitio, juxta doctrinam Avicennæ, duplex est, una perfectiva, altera verò corruptiva. Perfectiva, seu depurativa est in qua partes tantum impuriore & excrementitiæ sanguinis putrescunt, & à natura expurgantur, ut tota massa pura postmodum relinquatur: & tunc variolæ fiunt saluæ, quæ sine ullo medico auxilio curantur. Corruptiva verò est, in qua non solum partes sanguinis excrementitiæ, sed etiam sanguis ipse sincerus computrescit, unde periculosa & lethales variolæ oriuntur, & pro majori vel minori putredine, majoris vel minoris malignitatis particeps, plures vel pauciores sanguinis partes occupantis, majus vel minus periculum emergit. Talis ebullitio corruptiva præcipuè contingit, dum epidemice grassantur isti morbi, & à maligna aëris constitutione excitantur, à qua humorum effervescencia, & maligna putredo ducitur, unde variolæ multæ & periculosa generari solent, quæ aliquando pestis prodromi & nuntii, juxta Rhasis sententiam, esse consueverunt.

Inter morbos acutos recenseri solent variolæ & morbilli, ut plurimum enim intra quatuordecim dies terminantur. Duplex autem temporum series à nonnullis ingeniosè statuitur: tempus nimirum ebullitionis & tempus eruptionis variolarum. Tempus ebullitionis quatuor ut plurimum diebus perficitur: ita ut primus dies principium statuitur: secundus, augmentum: tertius, status: & quartus, declinatio: tunc enim febris & alia symptomata remittere solent. At principium exitus variolarum est ipsemet quartus dies: augmentum ad septimum protrahitur, status ad undecimum, declinatio verò ad decimum quartum, quo tempore variolæ exsiccantur. Non raro tamen ad vigesimum usque protrahitur variolarum exsiccatio.

Differentiæ variolarum & morbillorum desumuntur, vel à substantia, ratione cujus aliæ sunt magis vel minus pituitosæ, sanguineæ, biliosæ, aut melancholicæ; vel à quantitate, ratione cujus dicuntur majores aut minores, plures aut pauciores, profundæ aut superficialiæ; vel à qualitate, ratione cujus aliæ rubicundæ, aliæ albæ, subflavæ, violaceæ, lividæ, nigræ pro diversitate humo-

rum ex quibus componuntur, vel à tempore, ratione cujus aliæ citò, aliæ tardè erumpunt, aliæ citius, aliæ tardius suppurantur, aut dissolvuntur; vel à loco, ratione cujus aliæ cutem tantum occupant, aliæ etiam partes internas invadunt, ut fauces, pulmones, intestina, jecur, lienem, reliquaque viscera.

Diagnosin dirigenda est vel ad effectum jam præsentem, vel ad eundem imminens. Variolæ & morbilli jam præsentem, cum sensibus pateant, non aliis signis indigent. Imminentes verò sequentia indicant.

Dolor capitis, cum pulsationis sensu in fronte & temporibus: Somnolentia gravis: Terrores in somno: Deliria: interdum tremores & convulsiones: Sternutatio: Pandiculatio frequens, Raucedo, Tussis, Spirandi difficultas: Calor, rubor & punctio sensus in toto corpore, Dolor dorsi, qui aliquando solus, aut cum paucis aliis symptomatis in febre synocha apparens; variolas imminentes significat. Cum enim per dorsum ferantur vena & arteria magna, in quibus sanguis ebulliens malignus acres vapores ad nervos & membranas vicinas emittit; necesse est dolores in iis partibus præcipuè percipi. Magna anxietas, & inquietudo. Lacrymæ involuntariæ; Oculorum splendor & pruritus: Tumor faciei cum aliquo rubore. Vehementia symptomatum ab initio, ut morbus statim vigorem attigisse videatur.

Quæ omnia fiunt vel à vaporibus multis & crassis, per sanguinis ebullitionem in caput, diaphragma, aliasque partes transmissis; vel ab ipsa variolarum materia, jam ipsas partes invadere incipiente; vel à fluxione, caloris vi excitata, humores in cerebro colliquantis.

Maximi est momenti, imminentes variolas prævidere: sed multò majoris, earum eventum prædicere: quem sequentia signa prognostica indicabunt.

Ac primùm saluæ esse solent variolæ, quæ citò & facile exeunt, ac brevi ad maturitatem perducuntur.

In quibus febris levis est, sine magnis symptomatis, quæ post exitum variolarum cessat; aut admodum imminuitur. In quibus vox libera est, & respiratio facilis. Variolæ primùm rubræ, & albæ, molles, distinctæ, paucæ, rotundæ, fastigiatae, solum cutem, non autem partes internas afficientes, saluæ esse consueverunt.

Omnia prædicta signa materiæ morbificæ paucitatem, obsequium, benignitatem & naturæ robur, validè eam expellentis, significant.

Contra verò periculosas aut lethales variolas ostendunt, febris ingens, & non imminuta post eruptionem variolarum. Significat enim humores malignos & venenatos non fuisse sufficienter ad cutem expulsos, sed maximam eorum partem adhuc in venis restitisse. Anxietas & inquietudo magna: ab iisdem humoribus, in venis ebullientibus. Difficultas spirandi, quæ significat pustulas, aut zosterem in pulmonibus, anginam, aut virium lapsum. Sitis ingens, quæ internum incendium indicat: & si cum ea angustia respirationis augeatur: mors in propinquo est. Alvi fluxus, aut dysenteria, quæ significat humores malignos ad interiora recurrere, motu omnino contrario naturæ motui, atque adeo lethalis. Ideò ex iis qui hujusmodi alvi fluxus post eruptionem variolarum corripiuntur, paucissimi evadunt.

Urina sanguinea lethalissimum est signum: tum etiam si per alvum sanguis purus & sincerus rejiciatur. Interdum etiam per nares, gingivas, aliasque corporis partes fiunt excretiones sanguineæ, quæ lethales sæpe esse consueverint. Significant enim summam sanguinis acrimoniam atque malignitatem, quæ naturam vehementer irritat, & ad præposteram illius excretionem compellit.

Pessimæ etiam sunt variolæ tardè apparentes, quæ materiæ contumaciam, aut naturæ imbecillitatem significant. Multæ, magnæ, duplices & continuæ, ejusdem materiæ quantitatem nimiam ostendentes. Duræ, ejusdem materiæ crassitiem & incoctibilitatem indicantes. Depressæ, expultricis imbecillitatem significantes: æquè deteriores sunt si in earum medio macula nigra appareat, quæ malignitatem insignem attestatur. Virides, lividæ, nigræ, & quæ ex bile porraceâ, vel atrâ generantur.

Omnium



## Sect. III. Cap. II. De variolis & morbillis. 463

Omnium pessimæ, quæ ubi egressæ sunt, confestim evanescunt, & tumor partium remittitur. Significant enim humorum retrocessum ad interiora, & eorum, quibus ista retrocessio contingit, nullus evadit; sed ut plurimum intra viginti quatuor horas pereunt.

Periculosa etiam sunt, quando maculae febris purpuratæ familiares, illis permiscuntur: præcipue, si maculae illæ livida vel nigra fuerint. Significant enim non solum levem illam putredinem, quæ ex ebullitione sanguinis in variolis solet contingere: sed etiam intensam illam & profundam (ut vocant) putredinem adesse, ex qua magis multò ægrotanti impendet periculum.

Fæces, aut urinæ in variolis lividæ, aut nigrae magnam in hoc morbo portendunt periculum: significant enim humorem atrabilarium in venis redundare, & totam massam humorum inficere.

Curatio variolarum & morbillorum quatuor indicationibus perficitur. Quorum prima versatur in humorum quantitate, peccantium evacuatione. Secunda in motu naturæ, seu variolarum expulsiōe adjuvanda. Tertia, in malignæ & venenatæ qualitatē oppugnatione. Quarta denique, in symptomatum correctione. Quæ omnia ut commodè perficiantur, primum idonea victus ratio instituentur; quæ eadem esse debet, quæ in febrium putridarum curatione fuit proposita: nonnulla tamen peculiariter advertenda sunt.

Primum, ut ager in loco calidiusculo detineatur, quo cutis pori aperiantur, & variolarum eruptio adjuvetur. Ideo commendus est in cubiculo bene clauso, quod aer frigidus nullo modo ingrediatur. Multi enim pueri benignis aliis variolis laborantes, frigidioris aeris appulsu de medio sublatis sunt reperculsa nimirum materiâ morbifica ad interiores partes. Eademque ratione vestibus moderatè contentendi sunt; ita tamen, ut aeris caliditas, aut integumentorum pondus febrili ardorem non intendat. Dicta tegumenta ex pannis rubris plerumque concinnari solent, quia analogiâ quadam sanguinem ebullientem ad exteriora movere creduntur. Solent etiam multi overni, aut vervecem in cubiculo, vel etiam cubili detinere; quod illa animalia venenatam labem faciliè recipiant, & in se attrahant; unde ægris levamen aliquod emergere potest.

In potu decoctum hordei, vel radices acetosæ, vel decoctum rasuræ eboris, aut cornu cervi utiliter usurpari solet, præcipue in principio, & dum febris est vehemens. Si verò non ita incandescat: decoctum hordei & caricarum erit utilissimum, utpote humores ad cutem efficaciter expellens: eoque utebantur passim Amatus & Forestus cum felici successu.

Præterea somnus toto morbi decursu moderatus esse debet: in augmento tamen est, cum pustulæ erumpunt, diuturnior noxius est, & satius plus solito vigilare.

Ut igitur indicationes prædictæ impleantur: à venæ sectione inchoanda curatio est, (si sanguis aliquatenus redundet, ætasque ægrotantis ferre posse videatur) eaque quamprimum celebranda. Si tamen Medicus primo morbi die non fuerit vocatus; utiliter nihilominus sanguinem detrahatur ante eruptionem variolarum, vel dum adhuc paucæ apparent; quod tempus vulgo usque ad quartum diem extendi consuevit, à febris invasione. In quo tamen cautio diligens necessaria est. Si enim, pustulis erumpere incipientibus, febris imminutio, & symptomatum remissio subsequantur, satis est totum negotium naturæ bene operanti relinquere, quo totam materiam morbificam ad cutem sufficienter expulsa est. Tum venæ sectio necessaria non est, cum experientia doceat, infinitos pueros, benignioribus variolis laborantes, neque plethorâ oneratos, sine sanguinis detractiōe feliciter curari. Quin potius aliquando in dicto casu phlebotomia noxam inferre poterit, cum variolarum expulsio fieri soleat per ebullitionem sanguinis, quæ si levis sit, à sanguinis detractiōe multum imminuetur, sicque insufficiens evadet ad sanguinis massam ab impuritatibus perfectè depurandam. Contrà verò, si erumpentibus variolis febris in-

tenfior, anxietas, difficultas spirandi, lorium crassum & rubrum, aliaque symptomata majora appareant; signum est, naturam nimio humorum onere premi, eosque non posse convenienter regere; ideo phlebotomiam esse necessariam, ut detractâ portione oneris, reliquum à natura facilius expellatur. Uno verbo, in ebullitione merè perfectiva, seu depurativa, sanguis detrahendus non est; in corruptiva verò, venæ sectio maximè necessaria est, etiam in ea, quæ minoris malignitatis est particeps: cuius gradus suprâ fuerunt expositi. Tam autem necessaria est phlebotomia in periculosis variolis, in quibus ebullitio corruptiva fieri consuevit, ut tenellula puerorum ætas illam non impediatur. Usus enim invaluit, ut quarto, & non rarò tertio ætatis anno missio sanguinis usurpetur. Parisienses Medici in teneriori ætate, & lac sugentibus pueris, à venæ sectione non abstinere.

Quod tamen ægerrimè admittit tenellula natura, levissimum lactis alimentum; & copiosus per cutem effluxus. Neque ullis è sapientibus scriptoribus patrocinio defendi potest nova hæc mittendi sanguinis licentia.

In paulò grandioribus pueris unica phlebotomia interdum non sufficit; sed illa erit iteranda, si febris intensa perseveret; vel delirium, aliudve grave symptoma urgeat, sanguis denuò mittendus est, & ægri tractandi, ut febre continua putrida laborantes.

Si suspecta sit venæ sectio, propter ætatem tenellam, vel quod tempus idoneum jam transactum fuerit; sanguinis redundantia auferri poterit cucurbitulis scarificatis, dorso, scapulis, & femoribus admotis, quæ etiam in statu morbi conferre poterunt, cum motus naturæ à centro ad circumferentiam per eas adjuvetur. Cavendum autem in puerulis ne profundiores fiant scarificationes: Contingit enim aliquando, ut penitus adactò scalpello ab imprudenti chirurgo, sanguis fervidus & ebulliens, venulis divisis, eo impetu per vulnuscula effluat, ut difficili negotio prohiberi possit.

Purgatio in hoc affectu suspecta est. Fit enim motus motui naturæ contrarius, nempe à circumferentia ad centrum. Et quibuscumque variolis laborantibus alvi fluxus contingit introcessio variolarum repentina, & mors ut plurimum consequitur, ut in prognosi notavi. Adverte tamen utilissimè non rarò purgationem institui ante eruptionem variolarum, & antequam febris incandescat, quando scilicet pueri sunt veluti in neutro decidentia. Tunc enim, si abundet cacoehymia, utiliter ea purgatione imminuitur, ut natura postmodum alacrius expulsionem molietur. At variolis apparere incipientibus, purgatio futura est perniciofa. Tum etiam, si maxima vigeat malignitas, ut in constitutione epidemica, quando plurimi pueri ex morbo intereunt, satius est omnino à purgatione abstinere, quia in morbis valde malignis & pestilentibus purgatio in principio morbi instituta, valde noxia est. Ex blandis autem medicamentis componenda sunt purgantia, rhabarb. scilicet, cassia, manna, tamarindis, & syrupo rosaceo.

In morbi decursu si alvus adstricta sit; sollicitari blandissimè, non autem irritari poterit; idque suppositorio, ex solo melle, sine sale confecto; vel enemate ex jusculo, aut lacte, aut decocto hordei, passularum, & liquiritiæ, cum saccharo & vitellis ovorum.

Post venæ sectionem, aliasque evacuationes (si necessariae fuerint) variolarum expulsio adjuvanda est, non solum remediis specificis, humores ad cutem propellentibus; sed etiam diaphoreticis & alexipharmacis, præsertim si variolæ epidemicae, & summæ malignitatis periculum portendant.

Vulgarissimum est, & à Rhafi, Avicenna, totaque Arabum familia commendatum ad cutem propellens medicamentum; quod etiam à potissima recentiorum parte usurpatur; juxta Avicennæ descriptionem, quod sic habet.

℞. Ficum pinguium ℥. vii. lentium excortic. drach. ii. lacca ℥. ii. β. gummi tragacanthi & seminis scenicul.

ana



ana Drach. ii. Coquantur in lb. i. ß. aquæ fontis, donec redeant ad tertiam partem. Detur in potu de ea. Rhais addit prædictis simplicibus croci gr. xv. passular. 3. v. quia crocus aperit & corroborat, passulæ hepar firmant. Tragacanthum verò, licet incrasset & adstringat, ideò reliquis miscetur, ut nimiam sanguinis ebullitionem prohibeat.

Lentes à quibusdam neotericis rejiciuntur, quòd adstringendi facultate præditæ sint, atque adeo variolarum eruptionem impedian. Sed non temerè rejicienda est tor, tantorumque Medicinæ procerum autoritas, quin potius statuendum est summa cum ratione, lentes excorticatas, vel levem ebullitionem passas, huic compositioni addi; ut nimirum suâ adstringendi & incrassandi vi servorem nimium humorum coërceant, eorumque impetum in aliquam partem nobilem prohibeant. In quem finem etiam tragacanthum additum est, ut antea monui. Hoc desumitur è Galeno, qui 1. de aliment. facult. cap. 18. lentes bis coctas partes naturales roborare, & adstrictione qua pollent, ventris fluxum cohibere docuit. Illæ igitur præscribi, vel omitti à Medico curante poterunt prout major, vel minor attenuandi, & humores ad cutem propellendi necessitas urgere videbitur. Si enim materia subtilis fuerit, & magna ebullitio fiat; utiliter lentes præscribi poterunt, ad intentiones prædictas. Si verò materia crassa videatur, quam natura segniter ad cutem propellat; tunc illæ erunt omittendæ, imò & tragacanthum, & reliquo attenuantia ac diaphoretica solum permiscenda. Unde patet, remedium formulis, ab Auctoribus propositis, non esse arctè insistendum; sed in variis casibus variè esse immutandas. Pro exemplo sit formula sequens, partim ex simplicibus prædictis, partim ex aliis diaphoreticis & malignitatem oppugnantibus composita; quæ agrotantibus plerumque, variolas patientibus, in expulsionis conatu multum conferre poterit.

℞. Rad. foenic. & acetos. an. ʒ. i. rasuræ cornu cervi ʒ. ß. sol. scabiosæ, scordii & hyperici, an. M. i. ficum pinguium par. iii. gummi laccæ ʒ. iii. sem. napi & card. bened. an. ʒ. ii. lentium excort. ʒ. ʒ. gummi tragacanthi ʒ. i. ß. Coquantur ad lb. i. ß. De colatura cape ʒ. iii. syrupi de limon. ʒ. i. Misce. Fiat julep. Detur bis, aut ter in die.

Si malignitas maxime urgeat, ut vulgò in variolis epidemicis fieri solet; alexipharmacis præcipuè insistendum est. Sicque ea omnia, quæ in febribus malignis à nobis proposita sunt, hîc convenire poterunt, habitâ virium, ætatisque ratione. Et inter alia frequenter usurpari poterunt, confectio de hyacinth. lapis bezoardicus: pulvis ex corallis, margaritis, rasurâ cornu cervi, lapide bezoardico: oleum scorpionum Matthioli, aliaque, quorum utendi modus è capite præcedenti desumi poterit.

Neque omittenda sunt vires instaurantia, tam interna, quam externa, à præcedenti etiam capite repetenda, & à prudenti Medico opportunis temporibus usurpanda.

Advertendum autem est diligenter, ea medicamenta, quæ variolarum expulsionem adjuvant, in omnibus agrotantibus non esse usurpanda. Interdum enim tanto impetu erumpunt, ut earum motus aliquantisper cohibendus sit, maxima enim ebullitio & fervor sanguinis immodicus nisi temperentur, ad exitum agrotantes perducere consueverunt: ideò frænantibus, & modicè refrigerantibus tunc temporibus convenit. Pro exemplo julepus in hunc modum componi poterit.

℞. Hordei integri P. i. rad. pentaphylli & tormentillæ, an. ʒ. i. sol. acetos. endiv. & oxytriphylly, an. M. i. lentium excort. ʒ. ʒ. gummi tragacanthi ʒ. i. Coquantur ad lb. ii. In colatura dissolve syrupi limon. aut granator. ʒ. iv. Fiant julepi pro iv. dosibus, bis in die sumendi.

Amatus Lusitanus curat. 18. cent. 3. exemplum proponit hujusmodi variolarum, à fervidioribus humoribus productarum, & solis refrigerantibus atque incrassantibus curatarum. Quod hic ad verbum subnectere libuit, ut tyronibus appareat, quibus in casibus curatio maxime varianda sit. Puer, inquit, Alarasi, variolis corripicæ-

pit; ex quibus nonnullæ ita percurrerant, ut miserum corpusculum intra duos dies fere totum excoriatum reliquerint; quæ aliis quoque evenisse puerulis observavi. Contra quæ sic orsus sum. Primo cum materia hæc plus justo acrior, cam obtundere conati sumus: nec tantum eam, verum etiam jecinoris & membrorum internorum malam qualitatem infringendo, ne de novo altera gigneretur. Sed id refrigerantibus complebamur medicamentis, ut syrupo rosato, de cichoreo simplici, de endivia, de violis, adjectis similibus aquis. Exterius verò jecur ex santalino unguento illinebatur. Sed vitius ad id multum faciebat, qui ad frigidum cum humiditate declinabat. Quibus omnibus materia crassior est reddita & variolæ crassæ & amplæ apparere ceperunt.

Pro potu verò ordinario præscribatur decoctum hordei & radicum acetosæ. Eaque remedia continuanda erunt, donec fervor sese aliquantulum remiserit: postea verò ea, quæ expulsionem promovent, erunt usurpanda, si natura eorum auxilio indigere videatur.

Hæc ad directam variolarum curationem possent sufficere. Sed quia illæ plurimis partibus tam internis, quam externis, gravem noxam inferre possunt; earum præcautioni & curationi incumbendum est.

Internæ partes præservari maxime possunt decocto lentium, laccæ, & tragacanthi supra descripto. Siquidem lacca jecur & lienem tuetur, lentes intestina, tragacanthum pectus.

Peculiariter verò pulmonem defendunt conservæ rosar. violar. syrupus jujubinus, violaceus, myrtinus, de rosis siccis; de papavere, tum etiam eclegmata sequentia.

℞. Confer. rosar. ʒ. i. ß. succi expressi ex lentibus tertio elixir ʒ. vi. semin. papav. alb. drach. ʒ. gummi tragac. ʒ. i. Cum syrupo de rosis siccis fiat looch.

Vel istud Avicennæ; quod à Guainerio & Foresto laudatur.

℞. Lentium excorticatar. & subtilissime tritarum. ʒ. iii. semin. papav. alb. ʒ. i. confer. rosar. ʒ. ii. julepi rosar. q. f. Fiat looch.

Vel ex solis syrupis tale lambitivum componi poterit.

℞. Syrupi violac. jujubin. & de ros. sic. an. ʒ. i. syrupi de papav. ʒ. ʒ. Misce. Utatur frequenter ex cochleari, sensim lambendo.

Si verò jam præsens fluxio in pulmonem irruat, & raudinem ac suffocationem inducat; non solum remediis prædictis cohibenda erit, sed etiam revellenda per cucurbitulas, tum siccas, tum scarificatas; & venæ sectionem, si cætera consentiant. Prætereà in potu exhibebitur decoctum hordei, jujubarum, & liquiritiæ, & looch sequens in usum vocabitur.

℞. Sem. alth. melon. cucumer. & papav. alb. an. drach. ii. passular. mund. & jujubar. an. par. iii. Coquantur ad lb. i. In qua dissolve confer. rosar. & violar. an. drach. ʒ. pulver. elect. diatragac. frigidi drach. iii. sacchari canti & rosar. an. q. f. Fiat looch.

Fauces & guttur defendi poterunt, antequam variolæ erumpant, sequenti gargarismate.

℞. Hordei mundi P. i. folior. plantag. M. ii. rosar. rub. P. i. balauft. sem. sumac. an. drach. ii. bulliant in aquæ lb. ii. ad tertiæ partis consumptionem. In colatura dissolve syrupi de moris & granat. an. ʒ. i. Misce. Fiat gargarisma.

Si tenella puerorum ætas gargarismatis usum non permittat, fiet lambitivum ex syrupo mororum, granat. de ros. sic. vel solis, vel cum aqua plantaginis & rosarum permixtis. Quibus si fluxio cohiberi nequeat, ob nimiam illius copiam, unde suffocationis periculum imminet: ea, quæ vias laxant & excretionem juvant, usurpanda erunt in hunc modum.

℞. Mucilag. sem. psyllii & olei amygd. dulc. recentis an. Unc. i. sem. sacchari albi. Unc. ii. Misce. Fiat lambitivum, singulis horis exhibendum.

Si ex fluxionis acrimoniâ, aut copiâ variolarum, ulcus in



## Seçtio III. Cap. II. De variolis & morbillis. 465

in faucibus genitum fuerit; aquâ hordei cum melle rosaceo, vel aquâ aluminosâ detergendum est, & si in corruptionem vergat, Ægyptiaci tantillum prædictis erit admiscendum.

Intestina præservabuntur iisdem remediis, quæ ad pulmones præservandos fuere proposita. At si jam præsens alvi fluxus, vel dysenteria urgeat; primum detergentia & lenientia remedia, postmodum verò adstringentia usurpanda sunt. Sicque parabuntur clysteres ex lacte chalybeato, saccharo; & vitellis ovorum: mox ex decocto hordei & rosar. rubr. cum ovi vitello, ac tandem ex decocto plantag. centinodiar. & prunellæ, aliisque, ex curatione dysenteriar. desumendis. Advertendum autem alvi fluxum non rarò in pueris variolis laborantibus, à lumbricis excitari, eumque toto ferè morbi decursu, perdurare, unde vitæ periculum imminet, quia expulsio variarum impeditur aut imminuitur. Idque facile dignoscitur ex dejectionum crassitie ac viscositate, & colore griseo vel albicante: tunc enim lumbricos enecantia exhibenda sunt, & clysteres dulces injiciendi.

Renes etiam interdum afficiuntur, & exulcerationem patiuntur, unde sanguinis mictus exoritur. His confert emulsio sem. frig. maj. cum trochiscis alkekengi, de carabe; aliaque in mictus sanguinis curatione proposita.

Inter partes externas oculi maximè à variolis præservandi sunt. Cum enim molli & humidâ substantia præditi sint; variarum materia facilè ad eos propellitur, unde gravissima malâ incurrunt, & interdum visus prorsus destruitur.

Antequàm igitur variolæ erumpant aut dum erumpere incipiunt, illinendi sunt oculi omni horâ, aquâ plantag. rosar. in qua tantillum croci dissolutum sit; vel collyrio sequenti, quod efficacius præservat.

℞. Aquæ rosar. & plantag. an. Unc. i. sem. Pulver. sem. sumach. Drach. ii. infundantur parum, & calidè: Colentur cum multa expressione. Colaturæ adde camphoræ ʒ. sem. croci gr. i. Fiat collyrium.

Adhuc efficacius erit, si loco aquarum, succi centinodiar. & bursæ pastoris depurati cum reliquis permisceantur.

Si verò intra oculum ipsum pustulæ suboriri videantur; sanguis columbinus frequenter instillandus est, ut earum resolutio citò promoveatur. Tum etiam collyrium sequens usurpandum.

℞. Aquæ rosar. Unc. ii. aquæ euphras. Unc. sem. trochisc. alb. Rhaf. Drach. i. tuthiæ præparatæ ʒ. i. camphoræ gr. v. croci gr. ii. Fiat collyrium, quo cum tenui linteo oculi sæpè illinantur.

Oculi verò ita intumescētes, ut aperiri nullo modo possint, frequenter abluendi sunt decocto sem. lini, fenugr. cydonior. malvæ; sicque tumor subsidebit, & oculi aperientur. At si oculis apertis nebulae in iis appareant saccharo canto in tenuissimum polinem redacto, abstergendi sunt.

Ac tandem, si oculi exulcerentur, collyrio sequenti curabuntur.

℞. Cerussæ lotæ ʒ. iii. sarcocollæ ʒ. i. gummi tragacanth. ʒ. i. opii gr. ii. Cum mucilagine tragacanth. extracta cum aqua plantag. fiant trochisci: qui dissolvantur in lacte muliebri, vel aqua rosac. ad usum, & in cæteris procedendum, ut in curatione ulcerum oculorum fufius à prædictis docetur.

Ad nares præservandas acetum sæpè olfaciendum est, Ac efficacius operabitur collyrium ex succo polygoni & bursæ pastoris, semin. sumach, & camphorâ supra laudatum, quointincta turunda sæpè in nares erit immittenda. Si nihilominus variolæ intra nares adnascantur, illæ citò in crustas abeunt, quæ oleo amygd. dulc. frequenter erunt illinendæ, ut brevi decidant. Ac denique si exulceratio contingat, linimento ex oleo in vi. iis ovorum, & succo plantag. in mortario plumbeo subactis, tractanda erit.

Lazar. Riverii Opera.

Ad faciei custodiam, nonnulli eam aquâ rosacâ aliisque adstringentibus abluunt. Quod mihi probari non potest: siquidem maxima impuritatum portio ad faciem propellitur. Illius enim cutis laxa & mollis, ex renientis recipiendis maxime idonea est. Quamobrem si impuritates illæ, quæ à natura ad faciem amandantur, ad ea repellantur, intus retentæ gravem noxam inferre poterunt; itaque naturæ morus neutiquam impediendus est. Sed huic tantum muneri incumbere debet Medicus, ut impediât, ne in facie germinantes variolæ foveas & cicatrices relinquant, à quibus facies deturpari non ratò consuevit. Id verò utiliter præstabit, si cum variolæ jam maturuerunt & in medio albicantes eminent, (quod circa nonum morbi diem solet contingere) oleo amygd. dulc. recenter sine igne expresso, cum penna illinantur bis in die, usque ad crustarum casum. Hoc enim remedio temperatur bilis acrimonia, maturatio acceleratur, & crustularum casus promoveretur, quæ alioqui adhærentes, cutem profundius exulcerant ob pus subtilius delitescens. Oleum nucum recenter & sine igne extractum, cum aquæ rosac. pari quantitate subactum ad formam linimenti, ad eundem usum præstantissimum est.

Si ob neglecta prædicta remedia, vel insignem variarum malitiam, vestigia & cicatrices remanent, illarum reparationi sedulo incumbendum est. Quod tamen integrè obtinere difficilissimum est: quamvis plurimi in eo multum desudarunt in gratiam virginum & mulierum; quæ pulchritudinis conservandæ studiosissimæ sunt. Ex infinitis autem remediis, quæ ad hanc rem ab Auctoribus descripta reperiuntur, nos selectiora tantum proponemus.

Ac primum, oleum ex vitellis ovorum cutem nutrit atque generat, idè cicatricibus implendis maximè idoneum est.

Sevum vervecinum, recens liquatum, & pennâ inunctum, ad idem est efficax.

Maximè verò reparantur fœda variarum vestigia, si aqua mille florum, seu è stercore vaccino, mense Majo destillatâ abluantur, & postea axungia humana inungantur.

Forestus unguentum sequens valde prædicat.

℞. Olei amygd. dulc. liliorum albor. an. Unc. i. pinguedinis capi Drach. iii. pulver. radic. pæoniæ, ireos Floren. & lithargyri auri, ana Scrup. sem. sacchari canti Scrup. i. His omnibus in calido mortario bene mistis, & per linteum expressis, inunge dicta loca manè & serò. Postea verò aquâ è pedibus vitulinis destillatâ bene abluantur, in cujus defectu aqua mille flor. usurpari poterit.

Neque prætermittendum est, quod à multis prædictis docetur, ut nimirum variolæ; ad maturitatem perductæ, ac perforantur aurea vel argentea ne pus diutius moram trahens, in parte cicatrices relinquat. Quod tamen fere jam obsoletum est, cum experientia docuerit, variolas perforatas tardius curari, & crustas diutius retinere, ob caloris nativi imbecillitatem quæ à perforatione parti inducta est: unde cicatrices fœdiores relinquuntur. Itaque satius est ab hac perforatione abstinere, & puris evacuationem soli naturæ relinquere.

Pro hujus curationis coronide, affectuum variolis supervenientium pruritus nempe, & exulcerationis therapia subnectenda est.

Ac Primum, in eruptione variarum, aut dum maturescere incipiunt, ingens dolor, vel pruritus interdum ægotantes affligit, præferim verò in plantis manuum & pedum, eò quod densior in iis partibus cutis eruptionem prohibeat.

Cui symptomati medeberis: si partes illas in aqua calida detineas, vel decocto emolliente diutius foveas. In facie verò cum ingens adest pruritus, quo ægri eam scalpere coguntur, unde fœda illius deturpatio, & insignes cicatrices emergunt; sequenti remedio utere.

℞. Fol. parietar. M. i. flor. chamamel. & melilo. N n n ana



ana P. sem. Decoquantur in aquæ scabiosæ lb. i. Colaturæ adde aquæ caprifol. unc. iii. Colaturâ calidâ madescant sæpè variolæ prurientes cum bombace, aut linteo tenui.


Ulcera verò, quæ ex malignis & exedentibus variolis oriuntur, curanda sunt unguento albo Rhasis cam-

phorato, vel unguento de plumbo, in hunc modum composito.

℥. Plumbi usti ℥. ii. lithargyri ℥. i. cerussæ lotæ, aceti, ana ℥. s. olei rosat. ℥. iii. mellis rosac. ℥. i. vitellos ovor. num. iii. myrrhæ unc. sem. ceræ q. s. Fiat unguentum.







L A Z A R I  
R I V E R I I  
O B S E R V A T I O N U M  
M E D I C A R U M E T C U R A T I O N U M  
I N S I G N I U M.  
C E N T U R I A P R I M A.

O B S E R V A T I O P R I M A.

*Urinæ suppressio.*

**N**OBILIS vir D. Antonius Mestre sexagenarius, sanguineo temperamento, & habitu athletico præditus, cum diebus æstivis calidissimis Lutetiâ Monspelium venisset magnis itineribus, multo potu sese ingurgitaverat, ad sitim extinguendam, ab æstu contractam. Tribus verò aut quatuor diebus, à reditu suo, incidit in omnimodam urinæ suppressionem, ad cujus curationem vocavit Medicum seniore, qui variis remediis per triduum contumacem affectum oppugnavit, clysteribus, fotibus, semicupiiis, linimentis, & diureticis assumptis. Ac tandem tertio die, reliquis non conferentibus, catheter in vesicam immixtus est & nihil urinæ profluxit, unde perterritus Medicus, & de ægri salute desperans, alium sibi adjungi voluit. Vocatus ego in fine tertii à suppressione diei, & prædictorum relationem audiens; Quæro num dolorem aliquem in lumbis aut pube æger persentiret, aut aliàs nephriticis affectibus obnoxius fuisset; Ille se nullo dictarum partium dolore affici, neque unquam dolores nephriticos passum esse, aut calculos arenulasve excrevisse, constanter affirmavit. Quibus omnibus diligenter perpensis, censui hanc urinæ suppressionem à nullo renum aut vesicæ vitio dependere; sed potius ab obstructione venarum emulgentium, quam humorum multitudo pepererat, siquidem Galenus lib. 10. meth. cap. 2. duplicem obstructionis causam statuit, humorum scilicet multitudinem, eorumque crassitiem. Ratione multitudinis, vasa nimium repleta & distenta, non possunt sese contrahere ad expulsionem: Quod manifestè apparet in vesica, quæ à diuturniori urinæ retentione præter modum distenta, difficillimè interdum urinam excernit, propter contractionis defectum. Huic sententiæ inherens phlebotomiam proposui larga manu celebrandam, ad solvendam venarum plenitudinem: cui cum acquievisset Medicus ordinarius, extracta fuit sanguinis lb. i. At vix horâ elapsa à venæ sectione, sensit æger profluentem urinam à renibus ad vesicam per ureteres, & se brevi eam redditurum professus est, ac paulò post matulam petiit, quæ cum unica mictione reple-

*Lazar. Riverii Opera.*

retur, alia vasa fuerunt afferenda, ita ut intra horæ spatium plures urinæ libras excreverit. Sicque omnino liberatus est, neque sumere voluit purgans medicamentum, quod in crassinum ipsi fuerat præscriptum.

O B S E R V A T I O I I.

*Mensum suppressio.*

**M**ULIER quædam extera, sanguineo temperamento donata, varios affectus patiebatur, à mensum præcipue suppressione oriundos, quibus cum præsentis Medici multa adhibuissent remedia, & illi contumaces apparerent, petitum est consilium à Medicis Monspelienfibus per literas. In relatione autem hoc in primis notaverant Medici ordinarii, de qua impensè mirabantur, & sibi rationem reddi postulabant, quòd nimirum quoties secabatur vena malleoli, menstrua cohiberentur, dum verò ex vena brachii sanguis mittebatur, ea largius profluerent: Qui eventus rationi & vulgaribus Medicorum placitis adversari videbantur, quibus sancitum est, venarum inferiorum apertione mensum fluxum provocari, è venis autem superioribus apertis, eundem cohiberi. Huic dubitationi responsum fuit à Medicis Monspelienfibus, hos eventus cum ratione & Galeni doctrina maxime congruere. Cum enim illa mulier plethorica esset, ac suppressionem mensum pateretur à nimia sanguinis copiâ, uterî vasa ita distendente, ut comprimî sufficienter non valerent; attracto sanguine ad ea vasa per venarum inferiorum apertionem, augebatur obstructio. Quando verò missa sanguine à venis superioribus retractio fiebat à vasis uteri, eorumque plenitudo & distensio minuebatur, tunc illa facilius sese contrahebant ad expulsionem naturalem & ordinariam, quæ per uterum solet fieri. Quæ ratio fulciebatur Galeni sententiâ, superiori observatione citatâ ex lib. 10. meth. cap. 2. ubi docet obstructionem fieri non solum à crassitie humorum; sed etiam à multitudine. Ideò monebantur Medici præsentis, ut largâ phlebotomiâ, in brachio celebratâ, plethoram imminuerent: Postea verò apertis venis inferioribus sanguinem ad inferiora retraherent, præcipue circa illud tempus; quo prius laborans purgari consueverat. Quibus addebantur alia remedia menses cohibitos provocantia.



## OBSERVATIO III.

*Colica biliosa.*

**U**Xor Joannis Daumont Latomi Monspeliensis 30. annos nata colica biliosa afflicta fuit per octo menses quorum spatio multis remediis usa est, à duobus Medicis seriatim præscriptis, quæ nihil profuerunt. Tandem à me consilium capiens, tribus remediis sequentibus intra quinque dies curata est.

℞. Decocti commun. clyster. ℞. i. cassiæ recent. extract. ℞. i. hieræ picræ ℞. β. mellis violacei ℞. i. β. butyri recent. ℞. ii. salis ℞. β. misce, fiat clyster injiciendus hora commoda.

℞. Polypod. querc. recent. & sem. carthami ana ℞. i. β. Epithymi. summitat. thymi siccat. ana. p. j. sem. anisi, fœniculi carvi, & cardui bened. ana ℞. ii. fennæ mundatæ ℞. i. & turbit. gummofi ℞. β. cinnamomi ℞. i. β. crystallor. tartari ℞. ii. salis gemmæ ℞. β. contundantur omnia, iisque impleatur venter galli veteris eviscerati, deinde coquantur in tribus aquæ partibus, & una vini albi, quousque galli caro ab ossibus separetur, de hoc jusculo capiat ℞. vi. vel vii. quotidie mane, continuando per septem vel octo dies, si opus fuerit.

℞. Conservæ fol. absynt. & capill. veneris ana ℞. β. corticis citri saccharo conditi ℞. vi. myrobolan. condit. numero I. confect. alkerim. ℞. iii. croci martis aperitivi ℞. ii. pul. diarrhodon abbat. drach. i. β. spicæ nardi ℞. i. cum syrupo condituræ corticis citri, fiat opiata, de qua capiat ℞. i. β. singulis diebus horis duabus ante cœnam, superbibendo parum vini, aquâ cichorii multum dilut.

℞. Radicis Aronis præparatæ, ut docetur in pharmacopœa Quercetani ℞. β. radicis Acori vulgaris, & pimpinellæ ana ℞. ii. cinnamomi ℞. ii. salis absint. ℞. β. sacchari rosacei ad pondus omnium, fiat pulvis, de quo capiat ℞. ii. singulis diebus, tribus horis post cœnam, superbibendo parum vini, aqua cichorii, ut supra, diluti.

Cum per quatrimum hisce remediis usa esset, & colico dolore eodem modo affligeretur, qui singulis diebus semel aut bis recurrere solebat, cum acerbis cruciatibus, per duas aut tres horas perseverantibus; quinta diè circa meridiem, dum jusculum purgans operationem suam exereret, tanto ventris cruciatu correpta est, ut intolerabilis prorsus videretur, & illa se nunquam similem passam esse referret, qui tamen intra horæ unius spatium omninò cessavit, & nunquam amplius rediit. Atque ita ægra à sævo isto morbo prorsus liberata est. Credibile est materiam acrem & biliosam, tunicis intestinorum aut peritonæi impactam; diutina mora incrassatam, à medicamentis attenuatam, & vias referatas fuisse; per quas materia illa evacuata est.

## OBSERVATIO IV.

*Dolor ischiadicus.*

**J**oannes Ranquier, bajulus Monspeliensis, magno vigente frigore, tibia in aquam per multas horas demerserat, unde ingens dolor obortus est in Ischio, ad femora & tibiâ sese exporrigens: ita ut nullo modo incedere valeret.

Injecto clystere, missus fuit sanguis ex brachio ejusdem lateris. Sequenti die purgatus fuit vehementi cathartico: triduo sequenti accepit manè singulis diebus spiritus theriacalis guttas octo cum aqua cardui bened. Et copiosissimè sudavit, atque ita omnis dolor sublatus est. Spiritus theriacalis sudorifici præparatio in sequentibus centuriis docebitur.

## OBSERVATIO V.

*Chlorosis cum colico dolore.*

**A**ncilla D. Petri Desfours, patroni Monspeliensis, maxime laborabat hepatis & lienis obstructionibus, ob quas non poterat scalas ascendere gravi oppressa lassitudine & anhelitus difficultate, Aderat præterea suis in-

gens, mensium suppressio, tensio hypochondriorum & color sœdus totius corporis. Imprimis verò immaniter cruciatur doloribus colicis, bis aut ter in die recurrentibus. Ad quorum afflictuum sublationem sequentia usurpata sunt remedia.

Primum quia conditio illius longum remediorum usum ferre non poterat, unicam tantum potionem phlegmagogam præscribo, præmissa pridie venæ sectione: eamque post triduum iterari jubeo.

Postea sumpsit quotidie manè spiritus tartari ℞. β. cum decocto absint. vulgaris. A secunda exhibitione, colici dolores prorsus evanuerunt, & continuando per decem dies hujus remedii usum, integræ sanitati restituta est.

Pro potu utebatur vino albo, ex infusione chalybis parato, quod per aliquod tempus continuandum jussi.

## OBSERVATIO VI.

*Icterus.*

**F**ilius D. Trouffellerii, juris utriusque Doctoris, in opido Aymargues dicto degentis, annos natus quatuordecim ictero tenebatur sœdissimo, quo universa cutis aureo colore tincta apparebat. Huic sequentia remedia cum D. Pathequo, Medico Lunelleni celeberrimo, præscripsimus.

℞. Fol. fennæ mundat. ℞. β. sem. anisi ℞. i. summitat. absint. pontici & fol. agrimonii ana m. β. liquiritiæ rasæ drach. ii. flor. genistæ & cichorii ana p. β. coquantur ad ℞. iii. in colat. dissolve rhab. in aqua absinthii cum cinnamomo infusi, & expressi ℞. iv. Electuarii de succo rosarum drach. ii. syrupi rosati solut. ℞. i. fiat potio, capiat cum regimine.

℞. Rad. rubi. tinctorum ℞. β. fol. chelidoniæ maris m. i. summitat. centaurii minor. p. i. cin. drach. β. croci ℞. β. infundantur per noctem cum vini albi ℞. viii. colaturæ adde sacchari albi ℞. β. capiat manè per quinque dies; Post prædictâ potionem, & post usum hujus remedii, reiteretur potio laxans præscripta. His solis remediis perfectè convaluit.

## OBSERVATIO VII.

*Oculorum rubor pertinax.*

**E**legans & venusta puella; Antoneta De Louïs octodecim annos nata, à tribus aut quatuor annis fluxionem patiebatur in oculum sinistram procumbentem, quas totus oculus, palpebræ, & partes etiam circumjacentes, tumore ac rubore afficiebantur. Unde pulchra illius facies defœdabatur. Autumno præcipuè ingravescebat affectus, & tota hyeme perseverabat, neque venæ sectione aut purgatione ex potionibus & apozematis, aut vesicatoriis, aliisque remediis quàmplurimis, quæ frequenter, & frustra usurpata fuerant, sedari poterat.

Tandem ineunte autumno, quo morbus pari cum ferocia rediit, potentioribus remediis uti visum est ad fluxionis contumacis radicem extirpandam. Itaque loco apozematis, quo antea usa erat, præscribo pilulas aperientes & diaphoreticas ex salibus tamarisci, absinth. magisterio tartari, & pulvere diaphoretico, de quibus capiebat duas manè, tribus horis ante prandium, & totidem ante cœnam, per quatuor dies. Quinto die sumpsit pilularum catholicarum ℞. β. quibus optimè purgata est, unde rubor & inflammatio valde imminui cœperunt. Sumpsit iterum pilulas aperientes per quatuor dies, & quinto pilulis catholicis purgata est feliciter. Ac paucis postea diebus oculi rubor omninò evanuit, neque amplius reversus est. Pilularum catholicarum basis proposita est in praxi medica nostra c. 7. lib. I. de Epilepsia.

In hac curatione missus non fuit sanguis quamvis ægra prædita esset sanguineo temperamento, quia paucis antea diebus detractus fuerat, tum ex brachio, tum ex malleolo. Sed peracta curatione decoctum menses promovens præscriptum fuit, quia illos imminutè patiebatur. Illud autem decoctum tale fuit.

℞. Rad. althææ & valer. ana ℞. i. rad. fœniculi, asparagi, &



& apii an. 3. vi. folior. betonicae, pimpinellae, ceterach. artemisiae sabinae an. m. i. bulliant omnia in decocto cicerum rubrorum ad quartaria v. In colatura dissolve sacchari albi 3. iii. fiat apozema clarificatum & aromatizatum 3. ii. cinnamomi & 3. i. croci, quatuor dosibus matutinis, quas capiat quatuor diebus antequam menses prodeant.

## OBSERVATIO VIII.

*Dolores venerci.*

**C**larissimus Juvenis D. N. 25. annos natus togatae & armatae militiae peritus, dolores venereos patiebatur, eosque continuos diu noctuque affligentes à quatuor annis praecipue in tibia sinistra, secundum longitudinem illius. Per annum integrum emplastrum de vigo cum mercurio gestavit in ea parte ex consilio Chirurgorum, quibus solis se committebat. Tandem plurimum Medicorum consilio quorum ego unus eram diætam sudorificam usurpavit per 20. dies; topica multa tibiae admovit. fomenta nimirum, fustumigia, unctiones, & emplastra: Quae omnia nihil profuerunt. Me solum passim interpellat, ut aliquid ulterius praestem, quod illum ab hoc malo inveteratissimo liberare valeat. Ipsi ut obtemperem, antivenericum exhibeo, per mensem integrum, in pilulas reductum; de quibus capiebat duas, horis matutinis, & totidem pomeridianis, horis tribus ante pastum. Quinto quoque cum pilulis catholicis purgabatur, & ita sensim dolor evanuit.

## OBSERVATIO IX.

*Lues venerea.*

**C**larissimus vir D. N. 50. annos natus, venerea lue ab anno integro infectus, quae ordinariis remediis non cesserat, duobus praedictis, nempe antivenerico & pilulis catholicis usurpatis, per 20. dies probe convaleuit.

## OBSERVATIO X.

*Catarrhus cum aliis symptomatis.*

**N**obilis vir Guillelmus Hebrardus D. de Miravault, 31. annos natus pituitoso, & melancholico temperamento praeditus, contumaci affectu laborabat, multis symptomatis stipato: gravitate totius corporis, interdum tam immani, ut se commovere non posset, cum tanta virium imbecillitate, ut ferè animo deficeret. Horis verò pomeridianis, tum etiam vespertinis fluxio tenuis & acris in pulmonem decumbebat, quae ipsi tussiculam inanem & molestissimam excitabat, unde phthisim imminuentem admodum verebatur quod eum mœrore conficiebat, quandoquidem duae illius sorores ex eo affectu perierant, & ipse alias sanguinem ore excreverat. Quod omnium pessimum erat, nolebat Medicos consulere, quia omnia medicamentorum genera ita horrebat, ut statim ea vomitu rejiceret. Malo tamen in dies ingravescente, clarissima illius uxor me accersendum curat: Audiat morbi historia, multa propono remedia, vulgari usu recepta quibus ipse nolens acquiescere, polliceor ipsi remedia gustui gratissima, quae pristinam ei valetudinem restituere valerent. Impetrato sub hac conditione obsequio, primum sequentia jussula praescribo.

℞. Rad. buglossi & asparagi an. 3. i. fol. agrimon. pimpinellae, scabiosae, & capilli ven. an. M. i. cremoris tartari 3. i. coquantur cum quarta parte galli veteris, fiat jussulum, quo utatur per sex dierum spatium. His alvus bis aut ter in die subducebatur, & aeger aliquod inde levamen se percipere asserebat. Deinde sequentem pulverem praescribo.

℞. Salis tamarisci, magisterii tartari, & lactis sulphuris an. 3. i. Misce, fiat pulvis, de quo capiat 3. β. manè singulis diebus, cum jussulo praedicto. Hoc remedio per sex dies usurpato, septimo purgatus fuit pulvere sequenti.

℞. Sennae mundatae, & cremoris tartari an. 3. diagyridii gr. viii. cinnamomi g. iv. pulveris cephalici specifici g. v. misce, fiat pulvis, quem capiat cum jussulo. Hoc remedium incredibilem humorum pituitosorum copiam excrevit; sine molestia, ut quasi sponte ferrentur è ventriculo, instar albuminum ovorum. E cerebro etiam ad os tanta copia ferebantur, ut vix aeger eorum excretioni screando sufficeret. Urinas etiam multò copiosiores emisit. Eadem die ita sublevatus atque exhilaratus est; ut se curatum profiteretur. Quia tamen totum corpus ingenti humorum copia refertum erat; jussi ut per sex dies iterum praedictum pulverem assumeret, & septimo iterum purgaretur quod ille sedulo praestitit; & eodem modo quo antea successit: multò tamen minorem humorum copiam excrevit, quia praecedente purgatione imminuta fuerat. Post secundam purgationem balneum ingreditur ex hordeo, amygdalis, & feminibus frigidis confectum, idque tepidè, per biduum, manè & ferò, ad humectanda viscera calidiora. Post balneum utitur per triduum pulvere praedicto, & ultimò purgatus est, ut supra, sicque pristinae sanitati omninò restitutus est.

## OBSERVATIO XI.

*Cephalaea cum aliis affectibus.*

**L**ectissima virgo, Margareta de Varanda, doctissimi olim viri, D. Davidis Varandae Jureconsulti celeberrimi, & in Monspeliensi Universitate juris utriusque Professoris, filia, 20. annos nata capitis dolore acerrimo laboravit, cum dextri hypochondrii tensione, ventris doloribus, & aliis symptomatis. Multa quotannis usurpabat remedia, potiones, apozemata, pilulas, balnea, vesicatoria, & alia quamplurima, quae parum proficiebant, Usu chalybis etiam parum adjuncta est, quamvis haec omnia ab obstructionibus dependerent, & pravis humoribus in hypochondriis stabulantibus, iisque adustis, vapores acerrimos ad caput demittentibus. Tandem vere ineunte anni 1625. sequentia remedia illi praescripsi.

℞. Conservae fol. absinth. & capill. ven. an. 3. i. conservae rad. enulae camp. 3. β. salis tamarisci, magisterii tartari, & pulveris aperientis specifici an. 3. β. cum syrupo capill. ven. fiat opiata de qua capiat 3. ii. singulis diebus, mane, duabus horis ante pastum.

Quinto quoque die purgabatur pilulis catholicis ad 3. ii. & intra quindecim dies perfecte curata est.

## OBSERVATIO XII.

*Colicus dolor.*

**S**upra dictae puellae frater, Stephanus Varandaeus 18. annos natus, colico dolore acerbissimo torquebatur ab aliquot diebus. Ipsum invisens, statim praescribo ad immanem dolorem coercendum, quem vix sustinere poterat, laudani opiatum gr. vi. quibus intra duas horas dolor omninò sedatus est, lautè coenavit & tota nocte dormivit, qui plures antea insomnes transegerat.

Postridie manè surrexit, & ad consueta munia se contulit, neque ulla purgatione uti voluit, quam ipsi ad sublationem causae praescriberam, dolor tamen non rediit.

## OBSERVATIO XIII.

*Colicus dolor.*

**C**larissimus vir D. Stephanus Dumoy in Curia praesidiali Monspeliensi Consiliarius regius colico dolore cruciatus, aliis remediis per biduum frustra tentatis, assumpta 3. β. pilularum catholicarum, optimè purgatus est, & eadem die à colico dolore integre liberatus.



## OBSERVATIO XIV.

*Cephalæa.*

**U**Xor clarissima D. Guillelmi Dortomanni, Patroni celeberrimi, quam primis nuptiis duxerat, temperamento melancholico donata, cephalæâ gravissimâ multis annis tenebatur, quæ illam continuò ferè affligebat. Ad illius curationem infinita penè remedia à variis Medicis præscripta fuerant; quibus cum morbus pertinaciter obfisteret, à me etiam remedia postulat, quæ ipsi in hunc modum præscripsi.

℞. Conservæ fol. absinth. capill. ven. & rad. enulæ camp. an. ℥. i. falis absinth. & tamarisci an. ℥. i. cum syrupo capill. ven. fiat opiata, de qua capiat ℥. ii. singulis diebus mane, duabus horis ante passum.

Quinto quoque die capiat pilulas catholicas ad ℥. ii. His remediis, per decem dies usurpatis, dolor ille acerbus & chronicus evanuit.

## OBSERVATIO XV.

*Vomitus in febre maligna.*

**E**Gregius vir Laurentius Boschius, Pharmacopœus Monspelienfis celeberrimus, febre illa epidemica, quam purpuratam vocant, graviter laborabat, mense Decembri anni 1622. post Monspelii obsidionem; & inter alia symptomata hoc in primis molestissimè urgebatur, vomitu nimirum omnem materiam potulentam, simul atque ebibita fuerat, aquam, vinum, julepos, emulsiones, omnia rejiciebat; sola juscula retinebat. Per quatrimum febris sævierat, cum ardore & siti ingenti, quæ potu non poterat sedari. Interiora adeò exsiccabantur & adurebantur; ut lingua summam nigredinem & ariditatem præ se ferret. Tam grave symptoma hoc levissimo remedio, meo consilio sublatum est.

℞. Salis absinth. ℥. i. succi limonum recentis cochl. i. mixta fuerunt in ipso cochleari, & exhibita. Statim vomitus sedatus est, & ab eo tempore bibit quantum voluit, neque aliquid deinceps vomitu rejecit.

## OBSERVATIO XVI.

*Febris verminosa.*

**F**ilia Joannis Nivelles, in bipartitorum judicum exhedra procuratoris, annos nata 12. febre continuâ laborabat, cum alvi fluxu molestissimo, quo materias excernebat colore cinericio infectas, quales apparere solent pleurumque in verminosis affectibus.

Præscripti initio fuerunt clysteres detergentes, ex rebus dulcibus parati: tum potus vulgares contra lumbricos, & rhabarbarum pulveratum etiam bis iteratum, ex quibus omnibus nullum levamen obtinuit: imò febris & alvi fluxus in deterius urgebant; ut jam de salute puellæ dubitaretur: quandoquidem delicatula, & à longo tempore malè affecta erat, ac pallidis coloribus defœdata. Tandem sequentem julepum ipsi præscripsi.

℞. Rad. acetosæ, graminis, & cichorii an. ℥. i. fol. endiviæ, cichorii, acetosæ, portulacæ, & hyperici an. M. i. scordii & absinth. pontici an. M. s. flor. cordialium an. p. i. coquantur in aqua hordei, ad quartaria V. in colatura dissolve syrupi limonum ℥. iv. spiritus vitrioli guttas aliquot, ad levem aciditatem; fiat julep. pro quatuor dosibus manè & serò sumendis.

Intra illud biduum quo Julepo usa est, febris & alvi fluxus omninò quieverunt: & perfectè curata est. Si quis miretur tam levi remedio sublatum esse hunc affectum, sciat hypericum & scordium mirabili efficacia putredini resistere, & lumbricorum generationem prohibere, nedum jam genitos enecare. Ut etiam istæ herbæ vestibis complicatæ, vermiculorum generationem impendant, vestes laneas præsertim erodentium, qui tineæ & blattæ no-

minantur. Et verè testari possum, me hujusmodi julepis in infinitis pene puerulis, lumbricis laborantibus, cum felicissimo successu usum esse.

## OBSERVATIO XVII.

*Icterus.*

**C**hirurgiæ studiosus, Larosè nominatus, apud D. Thierry Haguenot, Chirurgum celeberrimum tunc temporis habitans, qui jam à longo tempore chirurgiæ magisterium exercet, Ictero laborabat. Et præscripti potionem cholagogam, mox infusum ictericum, observatione sexta descriptum, per quinque dies, & in fine iterum potionem cholagogam, unde cito convaleuit.

## OBSERVATIO XVIII.

*In infantulo icterus.*

**F**ilius primogenitus D. Demansè, Galliæ Quæstoris generalis, natus erat ex matre, febre tertiana laborante, & ipse in lucem editus quatuor accessiones ejusdem febris passus erat. Deinde factus est ictericus, ita ut totum corpus flavissimo colore infectum esset, quod magnū parentibus terrorem incutiebat: erat autem tantum bimestris. Cum ad illum curandum vocatus sum, dubitavi admodum quid fieri posset in tam tenero corpusculo. Tandem hunc syrupum præscripsi.

℞. Rad. rubiæ tinctorum & chelidoniæ majoris ana ℥. ii. fol. chelidoniæ majoris, centaurii minoris & absint. Pontici an. m. ii. cinnamomi ℥. ii. croci ℥. s. coquantur in aqua fontis ad ℔. i. in colatura dissolve sacchari albi ℔. i. fiat syrupus, de quo capiebat exiguum cochlear mane per 20. dies & perfectè restitutus est, & nunc etiam bene valet, defuncti parentis sedem honorificè occupans.

## OBSERVATIO XIX.

*Pleuritis, & synochus febris cum putredine.*

**D**ie decima mensis Junii anni 1630. Gratianopoli D. de Boissuzel, ex nobili stirpe oriundus, adolescens xx. annos natus, temperamento sanguineo præditus, circa vesperam cœpit tentari dolore lateris sinistri, sine febre. Eadem die injectus fuit clyster carminans, & admotus sacculus discutiens parti dolenti. Postridiè manè cœpit febricitare, perseverante dolore, qui magis urgebat, cum decumberet in latus oppositum. Iteratus fuit clyster, & sanguis missus ex brachio sinistro. Julepus exhibitus ex aqua papav. rhæad. syrupo violac. & sale prunellæ. Fotus emolliens, & carminans lateri admotus; & postea unguentum de althæa cum oleis chalcidicis. Sanguis apparuit valdè impurus, pomeridianis horis febris intensior. Repetita sanguinis missio; julepus & topica remedia etiam iterata. Die tertiâ manè iterata sanguinis missio in duabus patinis; quarum una satis erat corrupta, altera verò purior. Julepus & topica continuata. Pro potu ab initio pitamam sumebat ex hordeo & liquiritia, solisque jusculis vescabatur, iisque interdum alteratis herbis refrigerantibus. Eadem die post meridiem febris exacerbata est, sanguis detractus ex eodem vulnere ad ℥. vi. qui satis laudabilis apparuit. Matutinâ phlebotomia dolor lateris omninò desuit, qui nunquam admodum vehemens fuerat, neque tussim, difficultatem spirandi, aut sputum cruentum sibi junctum habebat; quod indicabat eum vel ex fluxione leviori, vel ex vaporibus acrioribus traxisse originem; cum etiam ante febrem apparuisset. Ideò febris primaria fuit ex synochorum genere, à pleuritide minimè dependens. Post ultimam venæ sectionem; cum vehementi siti & æstu vexaretur, ipsi propino aquæ frigidæ circiter ℔. i. cum spiritus sulphuris guttis xx. Statim frigus percepit in toto abdomine: Aliquibus stragulis correctus est, & parum sudavit post horæ spatium. Deinde hausit jusculum, & post horam alteram injectus fuit clyster eoque



eoque rejecto novus sudor exortus est tam copiosus, ut undique diffunderet. Detergo sudore, iterum sudavit, sed minus copiose, & tota nocte satis placide quievit. Die quarta mane iterum sudavit, & febris magna ex parte sublata est. Ita ut die septima febris expers omnino fuerit, & octava purgatus, nullis aliis remediis opus habuerit. In hac curatione hoc observandum: à spiritu sulphuris cum aqua exhibitio sudores copiosos fuisse provocatos, quod multis experimentis nobis innotescit, qui plures tertianas febres curatas vidimus eodem remedio, in summo accessione aëstu, & urgente siti exhibitio, unde copiosi sudores provocabantur à quibus non solum paroxysmus sed etiam totus morbus integrè solvebatur. In minori aquæ quantitate spiritus quantitas minuenda est, ne nimium acescat.

## OBSERVATIO XX.

*Febris tertiana.*

**M**agister Berardus, Pharmacopœus Gratianopolitanus celeberrimus, quinquagenarius, mense Julio anni 1630. laborabat febre tertiana intermittente, ac postquam bis purgatus esset, bisque phlebotomia celebrata fuisset, neque melius haberet, sumpsit pilulas catholicas nostras, die intermissionis, & sequenti die accessio rediit multò remissior. Postea ante sequentem paroxysmum, sequens potiuncula ei exhibitæ est.

℞. Aquæ cichorii ℥. iii. salis absinthii ℥. ℥. spiritus sulphuris guttas xii. misce.

Ab hac potione accessio non rediit; sed per urinas plurimum fuit evacuatus.

Eodem tempore D. de Maniffieu, in Senatu Gratianopolitano Consiliarius regius, annos natus 24. post duas accessiones, unica venæ sectione curatus est absque ullo remedio; erat autem sanguis valde calidus ac biliosus.

## OBSERVATIO XXI.

*Febris purpurata.*

**D**ie 18. mensis Junii anni 1630 Gratianopoli vocatus sum ad D. de Chapoullay apud Quæstores generales advocatum regium, febre continuâ laborantem ab octo diebus, quorum spatio ter ipsi vena secta fuerat, & purgans medicamentum semel exhibitum ex præscripto Medici ordinarii. Quam primum illum invisi, invenio pulsum valdè frequentem & inæqualem, unde suspicor febre esse malignam, simulque eum detegi jubeo, & totum corpus invenio exanthematis purpureis refertum. Urinæ erant satis laudabiles, & concoctionis rudimenta quædam ostentantes.

Præscripsimus cucurbitulas multas, secundum spinæ longitudinem applicandas, tum siccas, tum humidas, epithemata, inunctiones ex oleo scorpionum Matthioli, confectionem de hyacintho in iusculis, & julepos refrigerantes cum cardiacis. Pro potu utebatur pisana vulgari, cui nodulus cornu cervi immergebatur.

Hæc remedia continuavit usque ad undecimum morbi diem, cum tamen, omnia in dies ruerent in pejus, agerque delirio & convulsionibus corriperebatur. Dicta die undecima leviter sudavit sine fructu. Delirium cum stupore quodam conjunctum erat, idcirco vesicatorium cervici admotum est, & cucurbitulæ continuæ partibus inferioribus loco priorum Juleporum, qui ex radicibus & herbis refrigerantibus & aperientibus erant compositi, sequentes præscripti sunt.

℞. Hordei integri p. i. rad. buglossi ℥. i. fol. borrag. pimpinellæ, scordii. an. m. i. sem. citri & acetosæ an. ℥. ℥. tamarindorum ℥. ii. flor. borrag. buglossi & rosar. rubr. an. p. i. dictamni cretici p. ℥. fiat decoctio in aquæ lb. vii. ad tertiam partis consumptionem, in colatura dissolve sacchari albi lb. ℥. fiat Julep. de quo capiat ℥. viii. manè & serò. addendo unicuique dosi salis prunellæ ℥. i. spiritus vitrioli ℥. ℥.

Pro potu præscripta fuit tinctura rosarum. In iusculis, pulvis ex margaritis, coralli, rasura eboris, cornu cervi, &

lapide bezoardico. At postremis diebus, instante decimo quarto die, cum omnia in pejus ruerent, loco illius pulveris, substitui bezoardicum minerale purum, cujus & i. fumebat in singulis iusculis.

Cum verò circa vespèram, febris, delirium & convulsio plurimum intendi consuevissent, duabus horis ante exacerbationem, hunc pulverem exhibuimus.

℞. Salis prunellæ ℥. ℥. bezoardici mineralis ℥. i. camphoræ, g. vi. misce, capiat cum aquâ cardui benedicti. Decimo tertio die exhibitus est hic pulvis. eademque die bezoardicum prædictum sumere inceperat in iusculis, & non rediit ea die exacerbatio; sed melius habuit tota nocte, post mediam noctem idem pulvis iteratus est. Decima quarta die paulò melius habuit, attamen sine ulla excretionem. Decima quintâ eodem modo. Decima sextâ, cum appareret concoctio in urinis, & toto morbi decursu apparuisset, ac sensim progressa esset, medicamentum catharticum exhibitum est ex sennæ ℥. ii. hab. ℥. i. ℥. decocto refrigeranti infusus, addendo colaturæ mannæ & syrupi rosacei an. ℥. i. quo blandè purgatus est. Eadem die pustulæ quàmplurimæ animadversæ sunt, instar variolarum ad suppurationem tendentes, magno quidem numero circa vesicatorium, tum sparsæ per dorsum, lumbos & nates. Decima septimâ prædictæ pustulæ majori ex parte ruptæ apparuerunt, & ad exsiccationem tendentes.

Verum in parte anteriori, circa hypochondria & pectus, pustulæ perexiguæ, pellucidæ, & diaphanæ, humore seroso r. furtæ, infinito propemodum numero prodire: febris valde remissa, & delirium valdè imminutum. Decima octava somnus multus fuit, & ferè continuus, diu nocturnusque, usque ad diem vigesimum. Purgatus est iterum die vigesimâ secundâ, & postea febris omnino desiit, ac paucis postmodum diebus perfectè convaleuit. Ante duos annos Dominus de Rastendieres curatus est à febre purpuratâ periculosissimâ, hoc præcipuè remedio, quod scilicet unicuique hauserit potus ordinarii, ex pisana vulgari confecti, misceretur salis prunellæ ℥. i. spiritus vitrioli guttas x. sic enim summa lingue nigrities & siccitas, cum ingenti siti conjuncta, paucis diebus discussa est.

## OBSERVATIO XXII.

*Febris tertiana.*

**D**e Chaune sexagenarius, Quæstor Gallia generallis die 18. Junii anni 1630. Gratianopoli laborare cepit tertianâ febre, & intra 12. dies semel purgatus est, terque ipsi secta fuit vena, nec non julepi exhibitum multoties, intrâque illud tempus à febre liberatus est. Hoc verò animadversione dignum fuit in hoc agrotante, quòd nullum unquam contentum apparuerit in urinis; liquor tamen ipsarum, in declinatione, colore, & substantia laudabilis apparebat. Cujus eventus ratio inde fuit desumpta, quòd ager nephriticis affectibus diu obnoxius fuerit, quorum ratione urinæ transcolari consueverant.

## OBSERVATIO XXIII.

*Hæmorrhagia.*

**I**dem D. de Chaune, cum per multos dies à prædicta febre immans permanisset, hæmorrhagia correptus est, adeò in modicâ, ut vires degeret. Ad eam autem cohibendam cum multa usurparentur remedia; hoc unicum profuit nempe oxycratum per nares frequenter attractum, quo statim cohibitus est sanguinis fluxus. Eumque post biduum denuò prorumpentem, oxycratum denuò simili modo usurpatum confestim cohibuit.

## OBSERVATIO XXIV.

*Febris maligna.*

**D**ie 19. mensis Julii anni 1630. Gratianopoli vocatus sum ad filium Stephani Mercier, scribendi artem docentem.



docentis, sedecim annos natum, febre maligna laborantem. Erat autem in quinta die morbi maculis violaceis conspersus, cum delirio, alvi fluxu, aliisque gravibus symptomatibus. Semel ipsi secta fuerat vena, & nulla alia remedia administrata. Exhibeo ipsi pulveris sudorifici ℥.ii. cum camphoræ g. xii. in aquæ cardui benedicti ℥.iv. probe testus copiose sudavit, & optimè habuit, delirium cessavit, alvi fluxus imminutus est. Postera die febris satis magna vigeat, sine ullo gravi symptomate. Sanguis detractus est, & eadem die febris expers omnino fuit.

## OBSERVATIO XXV.

*Gonorrhœa antiqua.*

**D**. Chevalier, civis Gratianopolitanus 30. annos natus, & temperamento sanguineo præditus, Gonorrhœa laborans admodum inveterata, à me consilium petit, die undecima mensis Julii, anni 1630. Ipsi præscribo primum purgationem ex mercurii dulcis ℥.i. cum pilularum cochlearum minorum eadem quantitate, postera die venæ sectionem; Ac deinde bolum ex rhab. pulverat. ℥.i. cum terebinthinæ ℥.iii. quem continuavit per quinque dies, eoque purgabatur ter aut quater in die. Iterum sumpsit pilulas mercuriales, & bolum prædictum per alios quinque dies. Ac tandem aquam sequentem per octo dies.

℥. Menthæ siccae ℥.iii. sem. lactucæ, rutæ, agni casti an. ℥.ii. β. dictamni cretici ℥.x. sacchari albi lb.ii. omnia pulverentur, addendo terebinthinæ venetæ ℥.v. Vini albi generosi ℥.xxx. fiat defillatio in balneo mar. capiat æger cochlearia duo, mane, duabus horis ante cibum.

Et his remediis à contumaci illo affectu liberatus est.

## OBSERVATIO XXVI.

*Febris tertiana.*

**D**ie 25. Junii anni 1630. Gratianopoli vocatus sum ad D. de Poulemies, 30. annos natum, ordinis Divi Joannis equitem, febre tertiana laborantem. Erat autem tunc temporis in tertia accessione. Prius tamen quam tres illæ accessiones ordinem cepissent, per aliquot dies sine typo febricitaverat. Præscripti ad diem sequentem qui erat intermissionis dies, calomelanos Turqueti ℥.i. diagridii g. v. in forma pilularum, quibus valdè purgatus est, & circa vesperam appetentiam ciborum percipere cœpit, qua prius destitutus fuerat. Die verò accessionis sumpsit ante paroxysmum julepum sequentem.

℥. Aquæ cichorii ℥.iii. salis absinth. ℥.β. spiritus sulphuris ℥.i. fiat julep. quem hausit duabus horis ante paroxysmum, & corpore probè conlecto sudavit copiosissimè, sicque à febre liber evasit.

## OBSERVATIO XXVII.

*Febris tertiana.*

**D**ie 30. mensis Junii anni 1630. vocatus sum Gratianopoli ad Domini de Semiane, Quæstoris generalis uxorem, febre tertiana laborantem. Passa erat antea novem paroxysmos, & à quodam Medico regio quinquies ei secta fuerat vena, nec non medicamentum exhibitum, ex fennæ & cassiæ infusione paratum. Paroxysmi tamen ingravescebant, in iisque unum præcipuè symptoma eam graviter urgebat, nempe capitis dolor acerbissimus, pungens & lancinans, dimidiam tantum capitis partem hemispheriæ instar occupans. Statim judicavi hunc dolorem procedere à vaporibus acerbis, ex materia quadam biliosa, in ventriculo aut partibus vicinis stagnante, elevatis. Ideoque præscripsi purgans medicamentum ex aquæ benedictæ ℥.i. cum infusione ℥.β. foliorum fennæ paratum; quo per inferiora quater purgata est, & bis per superiora vomitumque rejecit prima vice circiter lb. i. bilis porraceæ; secunda verò parem quantitatem bilis æruginosæ, & sequenti accessione à dolore capitis omnino fuit libera,

tum post julepos aperientes temperatos, & purgationem iteratam ex fenna, rhab. & catholicone, omnino convaleuit.

## OBSERVATIO XXVIII.

*Lumbrici.*

**F**iliolus Magistri Imberti, mercatoris Gratianopolitani, tres circiter annos natus, per multos dies vexatus est alvi fluxu, & nausæ ferè perpetuâ, cum febre acutissima, quæ à lumbricis, in ventriculo & intestinis contentis, exoriri videbantur. Varia remedia frustra tentata fuerant: & cum jam omnia essent desperata, ægerque in summo vitæ periculo versaretur, ipsi exhibui calomelanos Turqueti g. xii. statim cessavit nausæa, & totâ ferè die dormivit: at noctu vomitus & alvi fluxus multo graviores excitati sunt. In excrementis inveniebantur frustula vermium putrefacta, in maxima copia. Mane dormivit, & tota die sequenti, neque amplius vomuit, & intra 24. horas febris expers apparuit, atque ita curatus, ut aliis remediis non indiguerit.

## OBSERVATIO XXIX.

*Febris maligna.*

**D**. De Beaubois, Juvenis Aulicus, principio mensis Julii anni 1630. laborabat Gratianopoli febre maligna cum exanthematis. Vocatus sum ad eum die morbi nona: octies ei sanguis missus fuerat, & reliqua remedia abnuebat, gravis urgebat diarrhœa, & interdum delirabat. Die decima, febris & alvi fluxus intensior, pulsus intermittens, in lecto excrementa deponebat. Undecimâ, omnia eadem. Duodecima, in pejus ruit. Decima-tertiâ, moribundus videbatur & in agone versari. Admoveri jubeo vesicatorium cervici: & propino manè pulveris diaphoretici ℥.ii. camphoræ g. xii. cum aqua cardui bened. & testus mansit per duas horas; non sudavit. Vesperi eadem potio iterata est, & probè testus copiose sudavit, multò meliùs habuit, per totum illius diei decursum sumpsit in singulis jusculis bezoardici mineralis ℥.i. Paucis postea diebus omnino convaleuit. Cessante febre parotis oborta est valdè dolorifica, quæ per resolutionem discussa est.

## OBSERVATIO XXX.

*Dolor nephriticus.*

**D**ie 3. mensis Julii anni 1630. Petrus Bernardus, Pharmacopœus Gratianopolitanus celeberrimus, quinquagenarius, correptus est dolore nephritico vehementissimo, statimque sibi injici curavit duos clysteres consequenter valdè laxantes, ex confectioe hamech & diaprurno solutivo cum terebinthina, iisque nihil conferentibus me vocari jussit; tertium clysterem præscribo, emollientem, & carminantem cum diaphanici & diaprurni solutivi, singulorum ℥.β. & aquæ benedictæ ℥.iv. hoc enemate multum evacuatus est, dolorque omnino sublatus. Sentiebat enim æger materias ex lumbis totòque abdomine sibi avelli, sine ulla tamen molestia. Eodem tempore fomenta ex priori decocto admovebantur.

## OBSERVATIO XXXI.

*Dolores arthritici.*

**D**ie octava mensis Julii anni 1630. vocatus sum à Magistro Perdreau, eminentissimi Cardinalis Richelii Pharmacopœo. Gratianopoli decumbente ex doloribus articulo-um, qui pedes & brachia, aliisque partes affligebant, cum tumore, inflammatione & febriculâ. A viginti diebus hoc affectu laborabat, eique novies proprio nutu secta fuerat vena, sanguisque multo sero abundans detractus; aliquoties etiam purgatus fuerat. Meo autem jussu illi exhibetur pulvis in juscule ex calomelanos ℥.i. diagridii g. viii. caryo-



caryophyll. num. i. blandè & copiosè purgatus est; ac multò melius habuit. Deinde sumpsit manè & serò julepum refrigerantem, in cuius dosi matutina infundebantur fennæ ʒ. iii. cum seminis coriandri ʒ. ʒ. frigidè per biduum; postea sumpsit eundem pulverem pari succellu, & integrè curatus est.

## OBSERVATIO XXXII.

*Hystericus affectus.*

**M**ense Octobri anni 1631. uxor D. Dalmeras, in suprema subsidiorum Curia Consilarii regii hystericco affectu laborabat, cum vomitu & alvi fluxu, summàque virium dejectione, ut moribunda videretur. Post multa remedia usurpata, nempe fomenta roborantia ventriculo admota, pulsos cordi applicitos, & Epithemata eidem parti apposita, cucurbitulas femoribus & pubi affixas, clysterem ex jusculo & theriaca injectum; tum aquam cinnamomi exhibitam, sumpsit tandem sequentem potionem, quæ mirum in modum ipsi profuit.

℞. Aquarum artemisæ, rosar. & florum aurantiorum ana ʒ. i. aquæ cinnamomi ʒ. iii. confectionis de hyacintho ʒ. i. pulveris electuarij diamargariti frigidi ʒ. ʒ. croci g. iv. fiat potio.

Assumpta hac potione non ampliùs vomuit; & optimè habuit per duos dies, postea iterum affectus rediit, & per intervalla repetiit. At quoties dicta potio usurpatur, omnia symptomata cessabant.

## OBSERVATIO XXXIII.

*Diarrhœa.*

**V**ir quidam robustus, & bilioso temperamento præditus, æstate media, correptus est diarrhœa biliola, valdè urgente, cum siti intensissima. Vocatus ad eum, præscripsi sal prunellæ in potu ordinario, tum etiam in julepis, ex aquæ lactucæ & portulacæ paratis, ter in die sumendis, & intra 24. horas convaleuit.

## OBSERVATIO XXXIV.

*Obstructio hepatis & lienis.*

**Q**uidam studiosus Polonus, ex intempestivis lucubrationibus incidit in gravissimas obstructions Hepatis & Lienis, quæ eum ad extremam maciem perduxerunt, cum antea esset viris & bono habitu præditus: postquam autem potionibus purgantibus, apozematis aperientibus, aliisque remediis usus esset, quæ parùm contulerant; pilulæ sequentes à me præscriptæ sunt, quarum usu intra mentem restitutus est.

℞. Aloës optimæ, & gummi ammoniaci in aceto soluti & per setaceum trajecti, atque iterum inspissati ana ʒ. iii. fennæ mundatæ & myrrhæ electæ ana ʒ. i. ʒ. croci ʒ. ʒ. cum oxymelite scillitico; fiat massa pilularum, de qua capiat ʒ. ii. alternis diebus duabus horis ante prandium.

## OBSERVATIO XXXV.

*Phthisis incipiens.*

**C**larissima & pulcherrima mulier, vidua D. de Ribera Sommeriensis, 25. annos nata, fluxione tenui & acri in pectus delabente graviter afficiebatur, cum tussi sicca ferè perpetua, macie, febre lenta, & genarum rubore, quæ vitia per contagium contraxerat ex marito suo, qui ante duos menses phthisicus perierat, ita ut illa ad eundem morbum ruere videretur.

Die decimâ quinta mensis Maij anni 1629. ei præscripsi potionem purgantem ex fenna, rhab. mannâ & syrupo rosaceo, cum decocto pectorali. Postera die venæ sectionem deinde juscula pectoralia & refrigerantia per duodecim dies, & in quarto quolibet jusculo fenna coquebatur

*Lucar. Riverii Opera.*

ad ʒ. ʒ. Post juscula, balneum ex decocto hordei & amygdalarum dulcium. Interim noctu sumebat cochlear unum syrupi fluxionem & tussim cohibentis, ex syrupo violaceo, jujubino, de rosis siccis, & de papavere, partibus aequalibus, compositi.

Hiscæ remediis perfectè convaleuit, neque opus fuit caustico & lacte asinino, quæ præscripta fuerant. Nihilominus suasi, ut bis in anno purgationem renovaret.

## OBSERVATIO XXXVI.

*Gonorrhœa antiqua.*

**D**Q. Juris utriusque Doctor, ab octo mensibus gonorrhœa laborans, à me consilium petiit. Illi primum sequentem bolum præscripsi.

℞. Terebinthinæ venet. drach. iii. rhab. pulv. drach. i. fiat bolus, quem capiat per quinque dies, ab hoc remedio bene habuit, sed post aliquot dies fluxus reversus est. Postea usus est aquâ ad gonorrhœam Quercetani, in illius pharmacopœa descriptâ. Primâ exhibitione omninò sedatus fluxus, & adeò per tres aut quatuor dies tantum illius usum continuavit, neque amplius rediit.

## OBSERVATIO XXXVII.

*Dolor capitis lethalis.*

**D**ie sextâ mensis Aprilis anni 1629. cum essem Ledovæ, in vili filiam Francisci Fezon mercatoris, septem annos natam, quæ à duobus mensibus affligebatur gravissimo capitis dolore, circa frontem & supercilia, qui singulis propemodum horis recurrerebat, tam acutus, ut illa sibi cultro caput aperiri frequenter postularet. Jam verò à duobus diebus inciderat ter aut quater in paroxysmos epilepticos, cum spuma in ore. A Medico ordinario præscripta fuerant multa remedia, præsertim purgationes per apozemata; cucurbitulæ & vesicatorium cervici, sed omnia frustra. Cum essemus de hoc casu consilium inituri; relatum nobis fuit, eam novo paroxysmo fuisse è vivis ereptam, & post mortem puris aliquod per nares effluxisse. Inde conjiciendum fuit, in cerebro abscessum latitare, sed eo aperto nihil inventum fuit præter serosum humorem, in cerebri substantiam & ventriculos effusum.

Hic casus mihi in memoriam revocavit historiam cujusdam virginis, quæ cum simili dolore per multos menses cruciata fuisset, & multa remedia frustra tentasset; à quodam Chirurgo totum caput, derafo capillitio, vesicatorio contactum est, instar cucuphæ, & vesiculis excitatis: magna serosi humoris copia effluxit, & ita liberata est, quod remedium huic etiam prodesse potuisset.

## OBSERVATIO XXXVIII.

*Uteri scirrhus.*

**D**ie 29. mensis Decembris anni 1630. uxor D. Dugast Biterrensis, 20. annos nata, Montpelium venit, ut affectus, quo premebatur, curationi incumberet. Erat autem tumor scirrhusus, corpus uteri occupans, & à quinque mensibus exortus, cum filium primogenitum peperisset, & aëri frigido incautè sese exposuisset; unde lochiorum reliquiæ suppressæ sunt, & in uteri corpore retentæ, ubi tumorem effecerunt, qui tractu temporis scirrhusam duritiem contraxit. Dolores interdum pungitivos in parte sentiebat, unde suspicio erat, ne tumor ille ad canceri naturam quodam modo accederet, Sequentia remedia illi à me præscripta sunt.

℞. Catholic. duplic. ʒ. ʒ. hieræ picræ & diaphœnici ana ʒ. i. ʒ. rhab. pulverat. ʒ. i. cum saccharo fiat bolus quem capiat manè cum regimine, sequenti die aperiatur vena basilica cubiti dextri mittantur sanguinis ʒ. viii.

℞. Radic. asparagi, brusci, petroselinæ & bryoniæ ana ʒ. i. cortic. rad. capparum & mediani tamarisci ana ʒ. ʒ. fol. agrimen. ceterach. capill. ven. artemisæ, matricariæ

O o o

ana



ana m. i. iennæ mundatæ & polypod. querc. ana ʒ. i. epithym. ʒ. ʒ. agarici recenter trochiscati ʒ. ii. zinzib. & caryophyllor. ana ʒ. ii. coquantur ad lb. i. ʒ. in colatura dissolve syrupi de cichorio compositi cum rheo ʒ. iii. fiat apozema pro tribus dosibus matutinis.

24. Rad. alth. & liliorum ana ʒ. ii. rad. bryoniæ & cucumeris agrellis ana ʒ. i. fol. malv. & violar. ana m. ii. fol. artemisiæ, nepethæ ana m. i. ficuum pinguium par. xii. sem. lini & fœnugr. ana ʒ. i. flor. chamomel. & meliloti ana p. ii. fiat omnium decoctio in tribus partibus aquæ, & una vini alb. sub finem additi, qua foveatur pars affecta mane & sero.

24. Butyri recentis & axungie porci, ana ʒ. i. ʒ. pinguedinis gallinæ, anseris, & anatis ana ʒ. i. olei amygdalarum dulc. & liliorum ana ʒ. ii. mucilaginis sem. fœnugr. extractæ cum vino alco ʒ. vi. gummi ammoniaci in aceto soluti ʒ. iii. croci ʒ. ʒ. ceræ q. s. fiat unguentum applicandum post forum.

24. Massæ emplastri de meliloto & de mucilaginibus ana ʒ. i. gummi ammoniaci in aceto soluti & trajecti, & iterum inspissati ʒ. ʒ. cum oleo liliorum fiat emplastrum super alutam debitæ magnitudinis & figuræ, applicandum eidem parti post inunctionem, & quinto quoque die renovandum.

24. Aloës optimæ ʒ. ʒ. gummi ammoniaci in aceto soluti, & iterum inspissati ʒ. ii. bdellij & myrrhæ ana ʒ. i. fennæ mundatæ & agarici recenter trochiscati ana ʒ. ii. fæculæ bryoniæ ʒ. i. cum oxymelite scillitico fiat massa pilularum, de qua capiat ʒ. ʒ. singulis diebus manè, duabus horis ante passum continuando per xv. dies.

Dum horum remediorum usum aggressa esset, frigus intensissimum adveniens eorum continuationem impedivit, & illa in patriam rediit; eique discedenti præscripsimus, ut verno tempore prædictorum remediorum usum repeteret, eaque diu continuaret, quibus addidimus semicupium frequens, cataplasma emolliens, & bocherum rad. chinæ pro potu ordinario. Quibus per tres menses continuatis præcipue sopientis, unguentis & emplastris cum bochetto prædicto, perfecte convaleuit. Et mensura purgatio, quæ per octo menses suppressa fuerat, iterum apparuit, naturalem ordinem servavit, ab eoque tempore alios liberos peperit.

## OBSERVATIO XXXIX.

*Febris quartana.*

**E**Legans puella filia D. Desplans, in suprema subsidiorum curia Consilarii regii, quatuordecim annos nata, mense Novembri, anni 1630. laborabat quartana duplici, à duobus mensibus. Ipsi præscribo infusionem ʒ. i. fennæ, factam in aqua mea febrifuga, singulis diebus sumendam, & quarta exhibitione, febris omnino sublata est, & deinceps optime habuit.

## OBSERVATIO XL.

*Alia quartana.*

**D**Uarandæus Canonicus, annos natus 30. febre quartana laborans, mense Decembr. anni 1610. prædicto remedio usus est quotidie; & septima exhibitione curatus est.

## OBSERVATIO XLI.

*Mammarum inflammatio.*

**C**Irca initium mensis Januarij anni 1631. amplissimi viri D. de Rochemore, in curia computorum & subsidiorum Protopræsidis uxor puerpera, laborare cœpit inflammatione mammæ dextræ ob ictum, in illam partem infictum. In ea autem continebatur lac quod non poterat exfugiri. Facta fuit embrocatio prima die ex duabus partibus olei rosati completi & una omphacini. Secunda die & sequentibus continuata illa embrocatio parti

tantum dolenti, & toti mammæ admotum est his in die unguentum de althæa, & sine alio remedio intra paucos dies curata est, affixæ fuerunt cucurbitulæ scapulis, neque secta fuit vena, cum statim viderem, affectum resolutione discuti.

## OBSERVATIO XLII.

*Febris maligna.*

**M**ense Aprili anni 1631. juvenis mulier, vidua Montaudi, civis Monspelienfis, febre maligna laborabat cum exanthematis, eique vulgaria remedia administrata fuerant usque ad octavam morbi diem, qua vocatus fui, & ægrotantem inveni in summa virium imbecillitate versantem, cum siti ingenti, linguæ siccitate ac nigritie, tum lentoribus nigris, dentibus adhærentibus. Præter cardiaca varia, præscripsi julepos valde refrigerantes cum sale prunellæ & spiritu vitrioli. Et in pituita sumebat pro potu ordinario sal prunellæ & spiritum vitrioli. Admovebantur foci refrigerantes & humectantes pectori & hypochondriis; & intra biduum sitis & ardor evanuit. Ac post modum purgatione aliisque levioribus remediis intra paucos dies convaleuit.

## OBSERVATIO XLIII.

*Febris maligna cum parotidibus.*

**A**Nno 1623. post Monspelii obsidionem, grassata est per plures menses febris admodum maligna, ex qua media ferè pars ægrotantium interibat. Peculiariter verò, quibuscunque parotides superveniebant (quod circa nonum, vel undecimum morbi diem solebat contingere) omnes interibant. Cum autem plures hujusmodi vidissem, neque ullis alexipharmacis liberare potuissem: cogitare capi, ideò censei lethales parotides, quod pars illa non sit capax recipere totam materiam morbificam, quæ intus manens interimit, & supplendum esse naturæ opus. Ac quanquam ægrotantes pulsum haberent parvum & frequentissimum, ac pene formicantem, ut in agone mortis versari viderentur, quæ etiam brevissimè succedere solebat: attamen hanc Cornelij Celsi sententiam animo revolvens, multa scilicet in præcipiti periculo rectè fieri, quæ alias essent omittenda, & satius esse anceps remedium in uno aut altero experiri, quam tot ægros certo exitio relinquere; sanguinis missionem præscripsi partitis vicibus, propter virium imbecillitatem, bis aut ter eadem die, & sequenti die purgationem. Qua via omnes quibus hæc remedia administrata sunt, feliciter evaserunt, neque ullus deinceps interiit. Primi ægroti hac methodo curati historia fusè descripta reperitur capite primo sect. 3. methodi nostræ curandarum febrium.

## OBSERVATIO XLIV.

*Colica ventriculi.*

**M**ense Aprili anni 1631. uxor D. Guillelmi Dortomanni, Patroni Monspelienfis celeberrimi, subito correpta est doloribus vehementissimis, ventriculi & lienis regionem occupantibus, qui neque fomentis, neque purgatione sedari potuerunt, sed phlebotomiâ celebratâ, satis largâ manu, è brachio sinistro, statim evanuerunt.

## OBSERVATIO XLV.

*Vomitus sanguinis.*

**P**Aulus Hilarius mercator Nemausensis vomitu sanguinis, eoque copioso afflictus fuerat, quatuor aut quinque, intra sex septimanas, ad cujus cohibitionem multa præstita fuerant à Medicis ordinariis. Tandem symptomate redeunte & diutius perseverante, ut ager in maximo vitæ discrimine versari videretur, ad eum vocatus sum



die 2. mensis Maii anni 1631. Homo erat quinquagenarius, temperamento biliosus, & in actionibus promptissimus, quique anno præterito Consulatum exercens, maximis laboribus, tum animi, tum corporis sese exagitarat, unde bilis proventus major, quæ exustione ad atræ bilis naturam accedebat, & magnam sanguini commotionem præbens ejusdem foras educationem produxerat, cui rei maxime conferre videbatur ejusdem humoris acrimonia venis referendis aptissima; tum maxima sanguinis tenuitas à feri multa copia eidem permixta. Censui hunc sanguinem per anastomosin effluere, quandoquidem eum maxima copia evomuerat in thrombos concretum. Attamen per dilucida intervalla nihil emittebat, ita ut per mensem integrum à primo insultu nihil sanguinis excreverit. Adde, quod non solum per vomitum, sed etiam per secessum sanguinem fundebat: imo verò primus paroxysmus ab excretionem sanguinis per alvum inchoaverat, quod ostendit venas melaëricas, ad intestina desinentes, per anastomosin fuisse apertas.

Die prædicta, quâ eum invisi, sanguinis eruptio à 24. horis cohibita fuerat, ea tamen denuò imminere videbatur, ut facile apparebat ex inquietudine, siti, cardialgia, æstus præcordiorum, capitis pulsatione & febre. Ideò cum jam advesperasceret, julepus tantum exhibitus est, ex aquis plantaginis & portulacæ cum sale prunellæ, tota nocte non dormivit valde anxius & inquietus.

Die 29. mensis Maii horis matutinis missus fuit sanguis ex brachio sinistro ad 3. iv. tantum, quia æger cardialgiâ ita afficiebatur, cum tantâ virium dejectione, ut se brevi expiraturum putaret. Sanguis fuit valde rubicundus, & totus pene in serum conversus, à phlebotomia robustior factus est, & melius habuit. Tum urinæ, quæ antea profusæ aqueæ fuerant, coloratiores evaserunt. Injecto post meridiem clystere detergente, sanguis denuò missus est ad 3. vii. priori persimilis, unde æger melius habuit. Julepi prædicti fuerunt iterati. Pro potu utebatur aqua ferrata cum syrupo cydoniorum & spiritu vitrioli. Jusculis, hordeatis & panatellis pulvis adstringens immiscebatur, tum etiam præscripta est opiata roborans & adstringens, sumenda semel in die, circa vesperam. Hypochondriis fatus admovebatur, ex decocto portulacæ & plantaginis, aliorumque in oxycrato coctorum. Unguentum etiam refrigerans & adstringens iisdem partibus. Juscula cum aqua ferrata parabantur. Nocte insequente satis dormivit, sed cum insomniis turbulentis.

Die 30. ejusdem mensis, urinæ coloratiores, habentes eneorema tenue: pulsus meliores. Supererant tantum sitis & pulsatio in capite. Mane exhibitum est medicamentum ex rhab. pulv. 3. i. & tryphæ persicæ 3. ii. quo quater aut quinquies deiecit biliosa serosa multa, unde melius habuit, & urinæ meliores, tota nocte dormivit.

Die ultimâ ejusdem mensis manè bene habebat; sed urinæ eneorematibus expertes, sitis permanebat, & pulsatio in capite, propinatus est julepus refrigerans & adstringens ex decocto paratus. Urinæ sensim pallidiores evadebant, eneorematibus expertes, sitis augebatur, non obstante potu acido. Circa vesperam, febris aucta est, æger valde inquietus, & sitibundus, tum se æstum maximum in ventriculo percipere querebatur. Inde metus ingens mihi incussus est redeuntis denuò sanguinæ vomitionis, cujus causa videbatur esse translatio bilis ad illas partes, unde urinæ pallidiores. Causam procataëticam hujus recursus esse censui, vel jusculorum nimis coctorum crebriorem exhibitionem, vel fotuum ab imperito Pharmacopæi famulo nimis calidè admotionem, cum frigidè admoveri debuissent. Hujus rei indicio fuit, quod æger retulerit se à prima fotuum admotione caliditatem in hypochondriis percepisse. Ut igitur symptomata imminens præcaverem, missionem sanguinis præscripti è cubito sinistro ad 3. viii. qui cum impetu effluit. Eodem tempore epithemata ex oxycrato hypochondriis subfrigidè admota, frictiones & ligaturæ celebratæ, clyster injectus & julepus exhibitus, ex aqua portulacæ & papaveris rhœados, cum syrupo ejusdem papaveris rhœados, & sale prunellæ. Qui-

bus remediis intra duas horas liberatus est ab illo æstu & siti. Noctis reliquum cum somno permodico peregit, manente perpetua capitis pulsatione.

Die primâ Junii, urinæ benè coloratæ, cum eneoremate apparuerunt. Exhibita est potio ex decocto foliorum cichorii, acetosæ & portulacæ, cum tamarindorum 3. β. addendo syrupo granatorum 3. i. rhabbari pulverati 3. i. bis purgatus est horis matutinis, & serosi humoris copiam excrevit. Post secundam sedem vomitu correptus est cum valido conatu, ac jusculum paulò ante assumptum reiecit cum pituita, nihil verò sanguinis. Pomeridianis horis bis aut ter deiecit biliosa & spumosa, noctu mediocriter dormivit.

Die secunda Junii manè parùm turbatus apparebat in discursu, ut verba recte pronunciare non posset, nec sensu commodè expromere, quod tamen ipse percipiebat dicebatque se non habere mentem liberam. Pulsatio in capite continuo perseverabat, sumpsit prædictum medicamentum ex tamarindorum 3. β. & rhabbari 3. i. Cum autem dicta mentis conturbatio perseveraret, cucurbitulæ duæ admotæ sunt scapulis, cum scarificatione; quibus sanguis valde serosus eductus est, & frontale commune admotum. Intra unam horam leve illud delirium omnino cessavit, diei decursu quater aut quinquies alvus soluta est cum euphoria, nocte placidè dormivit, & inde multò melius habuit.

Die 3. Junii se optimè habere professus est, & capitis pulsationem esse valde imminutam. Sumpsit iterum prædictum medicamentum, quo purgatus est, ut supra. Admovebantur quotidie epithemata cordi, fomenta hypochondriis ex oxycrato, tum sumebat vesperi opiata prædictam.

Die 4. Junii æger in eodem statu consistebat, sumpsit manè opiata prædictam, atque iterum vesperi, & post meridiem syrupum corallorum. Sed quia in liene insignis durities apparebat; admotus est fatus emolliens & aperiens, tum etiam unguentum iisdem viribus prædictum.

Die 5. sumpsit mane decoctum galli veteris cum herbis temperatis aperientibus, radice chinæ, & cremore tartari. Admotum est causticum tibie sinistrae, fatus & inunctio lienis continuata. Jam remedia sanguinem cohibentia sensim omittebantur, & ad ea transibamus quæ lienis obstructioni, & humori melancholico magis erant idonea. Tum cœpit uti solidis alimentis, cum tantillo vini crassioris, cum à febre imminutus esset, alvi excrementa, & urinæ melius concoctæ, somnus ferè assiduus, tumor in liene satis insignis apparebat, ideò præscriptum est decoctum galli prædictum ad 12. dies, addendo tertio quoque die fennæ 3. ii. & continuatio fatus & linimenti emollientis & aperientis per idem spatium, & post 12. illos dies balneum, deinde aquas Meynenses cum iteratione balnei semel in septimana. Ac demum syrupum magistrale ex succis, cum opiata deobstruente.

Die 6. Junii, sumpsit jusculum cum fennæ 3. ii. eoque ritè purgatus est.

Die 7. discessi & usu prædictorum remediorum, præcipue syrupo magistralis, longo tempore continuati, probè convaluit.

## OBSERVATIO XLVI.

## Fluor Uterinus.

Illustris quædam religiosa, propter hepatis & renum calidam intemperiem, initio mensis Augusti, anni 1630. correpta est fluore admodum copioso & molesto, à quo præposterè curata à Chirurgo qui vehementia purgantia ei exhibuerat, affectus ad sequentem hyemem productus est, nec tunc temporis cessavit; sed tantum imminutus est, & ægra pallida & decolor permansit. Vere autem sequente, affectus paulatim in deterius vergebat; usque ad æstatis initium quo tempore inappetentia & febricula laborabat, quibus interdum tussis accedebat, ut metus esset, ne in tabem incideret.



Et primum præscripsi leve catharticum ex senna & rhab. postea phlebotomiam. Ac consequenter pitisanam laxantem per quatuor dies. Postea balneum tepidum ad hepatis & renum ardorem temperandum, per biduum sequens.

A balneo correpta est alvi fluxu, à quo bene habere videbatur primis diebus: postea tamen ab eo vires infirmiores evadebant, febris interdum aderat, & ventriculus inappetentia laborabat. Jussi ut per quinque vel sex dies fumeret mane rhab. pulv. ʒ. i. cum syrupo de absint. pontico, ad boli formam redactum, hora una ante prandium. Prima die alvus multum & frequenter deiecit; Secunda, alvi fluxus omnino cohibitus, & ventriculus valde confirmatus, febricula disparuit, melius colorata in dies apparebat; sed inappetentia perseverabat. Jussi ut rhabarbari usum continuaret adhuc per 12. dies, sed non amplius cum syrupo, sed cum terebinthinæ ʒ. i. in bolum redactum, ad fluorem uteri melius compescendum. Et sic ab omnibus prædictis affectibus liberata est.

## OBSERVATIO XLVII.

*Febris continua & maligna.*

**D**ie ultimâ mensis Januarii anni 1629. Reverendissimus Episcopus Nemausensis, annum agens quinquagesimum, laborare cepit febre maligna, quæ singulis diebus exacerbationes habebat, ab hora undecima matutina, ad sextam pomeridianam, nauseam & singultum per intervalla patiebatur, urinæ rubræ & turbidæ, excrementa alvi liquida, biliosa, & pauca, vigiliæ perpetuæ usque ad septimam diem. Cum in villula quadam prope castra regia ægrotare cœpisset; statim sese contulit Bellicolam, ubi secunda die morbi à duobus Medicis sanguinis missio fuit celebrata, eductusque sanguis valde corruptus, idque præmissio clystere.

Tertia die fuit iterata venæ sectio, & sanguis priori similis eductus. Interim julepi refrigerantes & venenatam qualitatem oppugnantes fuerunt usurpati. Eadem die sudor apparuit levis, sine præcedente rigore aut horrore, sed nausea ante sudorem vehementius urgebat. Quartâ, quintâ, & sextâ similis sudor rediit, sine ulla febris remissione.

Circa finem quintæ, stillæ sanguinis ex naribus prodierunt. Ego verò ad illum vocatus sum die sextâ, qua febris vehemens apparuit, cum pulsu magno & frequenti, siti, jactatione, & aliis symptomatibus. Eadem die sanguinis missio iterata est ad ʒ. viii.

Circa initium septimi, rigore correptus est per horam integram. Hunc sequuta est nausea satis gravis per horam alteram, tandem sudor copiosè erupit, tota ferè die perseverans, ut septies lintea mutanda fuerint. A sudore febris omnino sedata, & urinæ, quæ antea rubræ & crassæ fuerant, luteæ & laudabiles evaserunt.

Die octavâ & nona, alvi fluxu moderato excreta fuit materia biliosa & pituitosa, quo pristinæ sanitati restitutus esse videbatur.

Die decimâ, translatus fuit Nemausum, propter Bellicolæ infalubritatem, & pestem incipientem.

Duodecimâ, purgatus est medicamento ex senna, rheo, manna, & syrupo rosaceo.

Decimâ tertiâ, solidioribus alimentis uti cœpit parva quantitate; & decima quintâ, vino valde diluto. Eadem die lecto egressus est: & in mensa prandium assumpsit ut perfectæ valetudini restitutus videretur.

Nihilominus recidivam passus eadem 15. die, circa mediam noctem, cum nausea frequenti, qua pituitosa & pauca rejiciebat.

Circa initium decimæ sextæ diei, injecto clystere, secta fuit vena, & sanguis eductus valde corruptus. Julepi ex refrigerantibus, aperientibus, & alexipharmacis parati, epithemata; inunctiones ex oleo scorpionum Matthioli, & confectio de hyacintho in jusculis præscripta.

Decimâ septimâ iteratus clyster, & iterata phlebotomia. Sanguis priori similis. Lapis bezoardicus in julepis, & bezoardicum minerale interdum in jusculis usurpatum. Ad nauseam compescendam sal absinthii bis fuit exhibitum, non sine fructu. Fomenta roborantia ventriculo adnota. Inunctio ex oleo nucis moschatæ, & cydoniorum eidem parti. Julepo semel atque iterum aqua theriacalis fuit commixta, cum magna suspicio esset luis pestiferæ, huic morbo admixtæ, propter nauseas, & lipothymias frequentes; spiritus vitrioli in potu ordinario.

Decimâ octavâ, rigore correptus est, quem excepit sudor per quatuor aut quinque horas perseverans, sed exigua quantitate effluens cum dysphoria & inquietudine, tum etiam nausea, & vomitu frequenti.

Postea ad nauseam perseverantem exhibita ex salis absynthii ʒ. i. in vino dissoluta, quæ feliciter operata est, & rarissimo postea vomitu afflicta est. Paucis post horis rigore iterum correptus, deinde bis alvum deposuit satis copiosè, ac tandem sudor emanavit, quem diu ferre non poterat, propter inquietudines, isque lentè ferebatur; sed per multas horas perseveravit. Ad motum illum adjuvandum semel exhibitus fuit lapis bezoardicus, cum jusculo, & cum altero jusculo post aliquot horas bezoar solare, quo sudor copiosissimus effusus est cum facili tolerantia, & inde febris maximè imminuta est.

Decimâ nonâ, febris multò remissior, injecto clystere laxante, cum aquæ benedictæ ʒ. iii. alvum quinquies deposuit, totius diei curriculo, & multam bilem excrevit cum pituita mixtam. Nocte placidè dormivit, urinæ bene coloratæ cum hypostasi tenui. Medicamentis roborantibus vires reficiebantur.

Vigessimâ & vigessimâ prima, omnia eadem: semel aut bis in die alvo deiciebat materiam satis crassam.

Vigesima secunda purgatus est medicamento superiori simili; & pluries deiecit biliosa atque pituitosa, nec non per vomitum excrevit pituitam crassam cum exigua bile; postea placidè dormivit tota nocte, tum etiam die sequenti, quæ erat 23. tumque febris omnino expers fuit; & urinæ melius coctæ apparuerunt.

Ad reliquias humorum deturbandas 24. die sumpsit jusculum aperiens, eoque die 26. incoximus sennæ ʒ. β. cum correctivis, quo quater purgatus est, indèque auctus ciborum appetitus cum siti nulla, ac continuatis jusculis aperientibus per aliquot dies, pristinæ sanitati restitutus est.

## OBSERVATIO XLVIII.

*Inflammatio & abscessus renum, Hæmorrhagia, febris maligna, cum gravibus symptomatibus.*

**D**ie 27. mensis Martii, anni 1629. vocatus sum ad Reverendissimum Episcopum Lodevensi. quinquagenarium, qui antea febre maligna laboraverat, ejusque duas passus erat recidivas, ab iisque liberatus multis crisi-bus, præcipuè per hæmorrhagias copiosissimas, & remediis quàmplurimis, à duobus Medicis Lodevensibus mecum præscriptis. Cum multis diebus omnino convalescere videretur; die 17. Martii circa horam duodecimam ægrotare cœpit, ac sequenti, subito correptus est dolore acuto & fixo circa renem dextrum, quem sequuta sunt hæc symptomata, vomitus frequens, singultus, urinæ turbidæ, rubræ aliquando & aquosæ, interdum cum arenulis partim rubris, partim verò albis, interdum etiam conquestus est de cruris dextri stupore. Die 22. febris supervenit, quam exceperunt diebus sequentibus horrores, bis aut ter in die invadentes; eosque sequebatur febris exacerbatio per duas vel tres horas.

Cum igitur accessissem die 27. morbi, unâ cum prædictis Medicis suspicati fuimus in communi consilio, calculum latitare in rene dextro, & à dolore excitatam esse inflammationem in eadem parte. Quia verò dolor tunc ferè nullus apparebat; existimavimus inflammationem jam



jam ad suppurationem fuisse progressam. Decretum fuit, mittendum esse sanguinem primum ex brachio dextro, postea ex malleolo ejusdem regionis, clysteres mollientes & refrigerantes frequenter injiciendos, julepos, & emulsionem lenientes imperandas. Epithemata, fomenta, linimenta, & cataplasmata præscribenda. Incœpinus à venæ sectione, quæ celebrata fuit die prædicta 27. hora secunda vespertina ad 3. viii. Circa vesperam oborta est hæmorrhagia, quæ per quatuor horas perseverans, sanguinis ferè 12. ii. æquavit, adhuc affatim fluebat & vires concidebant. Igitur cogitandum fuit de cohibenda hæmorrhagia, & præscripta fuit venæ sectio revelans in brachio dextro, sal prunellæ in aqua frigida dissolutum frontale adstringens, acetum in aurem instillandum, succus urticæ sumendus, cucurbitula regioni hepatis admovenda, linteam aceto madefactum, quo cervix eratvolvenda, & ligaturæ extremorum quibus nihil proficientibus æger se alvum deponere velle dixit, nec potuit cogi, ut in lecto deiceret. Præmonuimus, si lecto exurgeret cum tanta exsolatione virum, fore ut in syncopem rueret: attamen eam syncopem cohibendo sanguini fore perutilem. Ita ferè successit, nam postquam surrexisset, animi deliquium passus est, à quo statim excitatus est vino exhibitio, & aqua frigida in faciem projecta, postea copiosè dejecit, & postquam in lectum delatus fuisset; sanguis multò minore impetu fluebat. Postquam verò paululùm quievisset; exhibitum est sal prunellæ ad 3. i. 8. in aqua frigida dissolutum; quo assumpto, statim sanguinis fluxus omnino fuit cohibitus, nec aliis remediis opus fuit.

Die sequenti, quæ erat 18. Martii, siti ingenti premebatur, & pustulæ quædam dolentes, ex sanguine adusto genitæ, circa frontem, genas, labia, linguam, & in volis manuum obortæ sunt, dolor verò renum nullus apparebat: sed ingens alimentorum averfio, ut jusculum omninò renueret, multò magis julepos & emulsionem. Attamen tota fere die dormivit per intervalla, & per alvum bis dejecit biliosa & valde foetida. Urina erat decolor, tenuis, & sine sedimento, cum arenulis in fundo matulæ. In potu mane exhibuimus salis perlarum 3. 8. cum aqua cocta, & sitis plurimùm contempera-  
rata est. Post meridiem, atque iterum vesperi, spiritus vitrioli gutt. 12. cum 3. i. syrapi capillorum ven. & aqua cocta propinata sunt, à quibus etiam sitis & febris plurimùm sedata. Inunctio frequenter fuit celebrata regioni lumborum, ex unguento populeo & refrigerante Galeni, cum oleo rosaceo. Lac amygdalarum dulcium jusculis miscebatur ad cochlearia tria vel quatuor. Nocte sequenti satis quietè etiam dormivit, sese per vices expergefaciens cum planctu luctuoso, ut solebat diebus præcedentibus.

Die 29. conquestus est mane de dolore renis dextri, sed parum vehemente, non poterat tamen supra latus dextrum decumbere. Urinæ tenues & pallidæ, cum arenulis partim rubris, partim albis: pustulæ oris inunctæ sunt pomata recenti, tantillo salis prunellæ admixto. Præscriptum fuit fomentum & cataplasma emolliens & anodynum, renibus admovendum; tum etiam julepus ex decocto herbarum refrigerantium, cum semine lactucæ & papaveris albi, summit. malv. flor. violar. & buglossi.

Circa horam quartam pomeridianam, levi horrore correptus est: quem excepit febris intensior, ad aliquot horas perseverans. Hora decima propinatus est julepus ad 3. viii. totâ nocte parùm dormivit.

Die 30. horâ tertiâ matutinâ, rigore vehemente affictus est per horam dimidiam, postea febris adaucta, oris & faucium ulcera graviora & magis dolentia, quibus demulcendis diamorum usurpatum est. Siris ingens, alvi excrementa liquida, & valdè foetida. Post duas horas, sumpto jusculo, sudor erupit copiosus in capite & cervice, cum madore tantùm in reliquis partibus, in cujus medio alvus iterum soluta est, & usque ad horam octavam quinquies dejecit, urinæ magis coctæ colorationes

apparuerunt, exiguam hypostasim habentes: febris etiam imminuta; sed vires admodum fractæ ex alvi fluxu. Circa horam quartam sumpsit julepum cum spiritus sulphuris guttis viginti. Quantitas autem julepi perpetuò fuit 3. viii. iterum dormivit usque ad horam sextam, & expectatus dixit se à julepo plurimùm fuisse adjutum, & refrigerationem percepisse in toto corpore, febris equidem remissior apparebat. Assumpto jusculo refrigerante, conquestus est de dolore in palato; quod inspicientes, ulceratum invenimus ex ardore febris prægressæ. Ad hoc malum demulcendum usus est decocto mororum conditorum: postea sequens gargarisma præscripsimus.

℞. Aquar. plantag. & matrisc. ana 3. iv. aquæ rosar. 3. ii. aluminis crudi 3. ii. post levem ebullitionem dissolve diamor. & mellis rosac. ana 3. i. fiat gargarisma. Præcepimus etiam ut palatum melle rosaceo frequenter inungeretur ex penicillo: colluebat etiam os frequenter pitana potus ordinarii; quæ ex hordeo & liquiritia confecta erat.

Ab eo etiam tempore satis placidè quievit usque ad mediam noctem, quâ rigore iterum correptus est, ad duas horas perducto: postea febris aucta, quæ sequenti die, quæ erat ultima mensis Martii, circa horam octavam multò remissior apparuit; urinæ semper tenues & valdè crudæ. Pomeridianis horis febris multò remissior, & in universum melius habere visus est, quàm diebus præteritis. Alvus totâ die ter dejecit liquida & biliosa, julepi bis in die iterabantur, epithemata frequenter admovebantur.

In sequenti verò nocte, circa illud tempus, quo rigor accidere consueverat, anxietate gravi, & inquietudine molestissima vexatus est, cum alvi fluxu partim bilioso, partim pituitoso, frequenti, sed paucò. Totâ nocte vigilavit, neque in lecto subsistere poterat. Ut igitur motum illum naturæ, qui difficile ac laboriosè fiebat, juvaremus, ipsi exhibuimus medicamentum purgans primo die Aprilis, hora tertia matutina. Interim ulcera palati & oris erant molestissima, & foetorem cadaverosum referebant: urinæ continuò tenues & decolores nos valdè terrebant: inquietudines circa horam nonam remissæ sunt, & purgatus fuit quinquies totâ die. Circa vesperam multò melius habuit, sed urinæ perpetuò albæ & crudæ; ulcera oris perpetuò molesta, pustulæ labia & mentum occupantes, imò & partem genæ dextræ in foetidam crustam degeneraverant ut sit in variolis multis, simul junctis. In media etiam crurum parte interiori obortæ sunt pustulæ, variolis consimiles, inter se distinctæ & in unaquaque tibia manus magnitudinem æquantes maximæ malignitatis & adustionis testes.

Die 2. Aprilis, hora prima post mediam noctem, accessio iterum rediit, cum horrore levissimo, quem sequutus est calor auctus cum inquietudine, præcedenti multò minore. Circa finem accessionis iterum exhibitum fuit medicamentum purgans, deiecitque bilem subviridem, cum pituita copiosa. Post meridiem cessavit purgatio, & febris omninò expers fuit, seque appetentiam ad solidiores cibos percipere aiebat. Crustæ ulcerosæ menti & genarum foetorem quendam exhalabant.

Die 3. Aprilis; post mediam noctem paroxysmus febris tertianæ duplicis iterum reversus est eadem hora, priori consimilis. Urinæ colorationes apparuerunt, foetor satis insignis in ulceribus menti & genarum. Decretum fuit reliquias materiæ morbificæ præparare ad ulteriorem purgationem, remediis internis & externis. Interna fuerunt julepi aperientes & refrigerantes, externa verò, fomentum emolliens, aperiens & humectans, super hypochondria, præcipuè regionem hepatis, in qua tensio quædam apparebat, tum etiam linimentum iisdem viribus præditum. Ante meridiem febris imminuta est; sed non prorsus intermisit. Urinæ laudabiles cum hypostasi parva apparuerunt. A meridie ad sextam horam vespertinam bis dejecit liquida & subflava, ulceribus menti & genarum admotum est unguentum ex



terebinthinâ, vitellis ovorum, & melle rosaceo. Hora septima vespertina rediit accessio cum rigore, qui ad dimidiam horam extensus est, postea calor auctus ad mediam noctem perseveravit. & duplici sudore, eoque copioso solutus est. Postea ἀπύρετος evasit, foetor maxillarum usu unguenti prædicti intra duodecim horas sublatus est, & ulcera pus album & crassum emittere cœperunt. In accessione exhibitus fuit, pro potu syrupus violaceus, cum pitana & spiritu sulphuris.

Die 4. Apr. cum esset febris expers, matutinis horis prædicta remedia iterata sunt; & toto die febris expers apparuit. Hora sexta vespertina iterum rediit accessio cum rigore, & præcedente longior fuit.

Die 5. Apr. præmissis clystere, sanguis detractus est, ad humorum fervorem & putredinem inhibendam, quæ duo paroxyfmi incrementum peperisse videbantur. Circa horam quintam vespertinam exhibitum est febrile Crollii ex sale absinthii spiritu sulphuris, & aqua cichorii. Cum jam æger frigus extremorum perciperet, postea plus solito contactus est, lintheis calidis membra munita, sicque dilatatum est principium accessionis ad horam septimam, rigorque per horam perseveravit. Postea vi medicamenti prædicti evomuit pituitam & bilem satis magna copia, deinde calor erat mitis, & sine inquietudine, saltem insigni.

Die 6. Apr. ab exitu paroxyfmi, conquerebatur æger de calore igneo in ventriculo, qui per intervalla sæviebat. Conquerebatur æger etiâ de dolore in sinistro hypochondrio: quem cum explorare voluissim non potuit ferre manus contactum, & tensio manifesta apparebat. Urinæ a triduo integro nullæ colligebantur, sed quia æger dejicere solebat ter aut quater de die, censuimus cum dejectionibus urinas etiam profundas. Quia tamen præter dejectiones prædictas continua ferè aderat desidendi cupiditas, magna nobis suspicio aderat, ne gravis quædam affectio in renibus latitaret, præsertim cum singultus frequenter ægro tantum urgeret. Tandem, circa horam secundam, emisit in matulam verum pus, album, læve & æquale, minimè foetidum, ad ʒ. iii. cum urina paucissima. Hinc certissimè apparuit, factum esse abscessum in renibus, qui intus retentus symptomata graviora afferebat. Imò verò æger totâ die dormivit, & usque ad mediam noctem febris remississima fuit. Ignea caliditas per intervalla ventriculum affligebat, & singultus per vices urgebat. Nocte concubia dolor & tumor hypochondrii sinistri valdè imminuti sunt, ut se contrectari pateretur: aliquid puris iterum per urinam excrevit, sed tantum ad ʒ. β. bis aut ter per alvum excrevit materiam biliosam, cui existimavimus materiam purulentam esse permixtam, quamvis illud certò non appareret. Post mediam noctem rediit accessio, quæ non verè accessio dicenda est, sed potius exacerbatio: non contigit enim cum horrore aut rigore, neque cum febre intensissima, sed potius cum inquietudine, & languore.

Die septimâ Aprilis, mane ante lucem urinam reddidit, quæ vix Unciæ unius quantitatem exæquabat, in cuius fundo tantillum puris subsidebat. Circa horam septimam alvus soluta est parvâ quantitate, & dejectionis medietas purulenta erat: Hinc conjicere licuit abscessum in capacitatem abdominis fuisse apertum, & per intestina expurgari, sed propter admixtionem aliorum excrementorum, quando copiosa est dejectio, non apparere. Conjecimus etiam, urinam cum pure & sæcibus effundi in intestina, aut non attrahi à renibus, quia nihil aut per exiguum mingebat, nullumque in vesica, ejusque meatibus vitium apparebat. Adde quod dejectiones essent copiosissimæ, quæ nisi clystere frequenti prolicerentur, æger multo deterius habebat, & hac die, cum inquietus ad desperationem propemodum fuisset, usque ad meridiem; post ejectum clysterem, quo bis purgatus est, placide habuit. Calor intensus in regione ventriculi perseverat, & quod mirum est, nulla urgetur siti, julepi usurpantur refrigerantes & lenientes, tum etiam emulsiones. Interdum jusculis lac amygdalarum dulcium permiscetur. Pro potu utitur decocto hordei & liquiritiæ cum syrupo violaceo: interea vires in dies languent, & pulsus evadit infirmior. Circa

horam quintam vespertinam, satis copiosam urinam reddidit sine molestia, in cuius fundo tantillum puris subsidebat. Optimè quievit, & horâ octavâ iterum minxit, cum minori puris quantitate, & pulsus multo melior apparuit. Totâ nocte placide quievit, ter copiosè minxit cum pure perpetuò in fundo matulæ residente: & febris exacerbatio perexigua ac brevissima fuit.

Die octavâ Aprilis, summo manè julepus fuit exhibitus, post horam clyster injectus, quo bis copiosè deiecit. In jusculo dissolvebatur pulvis ex seminibus frigidis cum saccharo; nunc lac amygdalarum dulcium, nunc decoquebantur herbæ refrigerantes, & parum detergentes lumborum regio unguento refrigerante inungebatur. Pro potu decocto hordei, graminis, & liquiritiæ utebatur, quæ omnia detergendo ulceri, in renibus jam contracto, & reliquiis inflammationis earundem partium temperandis destinata fuerant. Totâ die multo melius habuit, ac febris propemodum expers fuit. Hora sextâ vespertina accessio rediit, cum horrore levi tota fere nocte perseverans; sed non admodum vehemens. Urinæ purulentæ, dolor hæmorrhoidum.

Die 9. purgatus est blando medicamento ex fennâ, rheo, mannâ. Satis bene habuit; sed magna jusculorum aversio, & difficultas deglutendi: febris perexigua, sed vires infirmæ. Pondus veluti quoddam circa vesperam sentiebat in fundo stomachi, singultus frequens, qualis toto morbi decursu. Nocte nullam habuit accessionem aut exacerbationem; sed tantum ardorem in ore, qui eum vigilare, & os frequenter abluere cœgit. In labiis siccitas & adustio apparebat, tamen nulla sitis.

Die 10. aderant oris siccitas, alvi fluxus, febris exigua, pulsus languidus, excrementa alvi male olentia, & quoties deiciebat, quendam tetrum odorem in ore percipiebat. Urinæ crudæ cum paucissimo pure, nocte melius habuit, non rediit accessio, sed levis tantum exacerbatio, quater deiecit biliosa, urinæ copiosæ, crudæ cum exiguo pure.

Die 11. manè melius habebat, nihil molestum erat: præter ingentem lassitudinem: alvi fluxus perseverat, urinæ eadem. Post meridiem adhuc melius, & sine lassitudine, ciborum appetentia, & omnino convaluisse videbatur, si urinæ meliores extitissent; nocte inquietudo levis, vigiliæ, & febris paulo intensior, alvum semel tantum deposuit.

Die 12. Febricula perseverat cum exigua lassitudine, circa vesperam febris expers, usque ad decimam horam, in qua febris exacerbatio redit, sed levior, & minus molesta. Alvum non deposuit, urinæ ut suprâ.

Die decima tertia, exigua febris perseverat, melius tamen habuit.

Die 14. purgatus est prædicto medicamento, sed molestia oris siccitate afflictus, frequenter os colluere coactus est: febris lenta perseverat.

Die 15. cibos solidos comedere cœpit cum appetentia, urinæ coloratiores, sed purulentam continuò subsidentiam habentes, febris lenta perseverat.

Die 16. manè bene habuit, hæmorrhagia rediit, venæ sectione parca sedata est, ter deiecit tota die, injecto clystere, urinæ eadem, febris eadem.

Die 17. cibos sumpsit cum appetentia, febris minor, semel tantum deiecit excrementa solidiora, urinæ eadem, noctu quievit parum, sine exacerbatione febrili.

Die 18. melius habuit, cibos sumpsit cum majori appetentia, hirudo admota est hæmorrhoidi adhuc tumenti, ad revellendam hæmorrhagiam narium, quæ instare videbatur. Multum sanguinis effluxit cum humore seroso, & nocte sequenti melius dormivit.

Die 19. ciborum appetentia, febris exigua pomeridianis horis, urinæ pallidæ & tenues, nullam subsidentiam habentes, & puris expertes.

Die 20. Omnia similia diei præcedenti.

Die 21. discessi, postea sensim convaluit, & intra paucos dies integræ sanitati restitutus est, usu potissimum feri lactis.



## OBSERVATIO XLIX.

*Rheumatica affectio.*

**V**ir nobilis quinquagenarius, bilioso temperamento præditus, cum per longum tempus multos in victu errores commisisset: præsertim in comestationibus, & exercitiis immodicis, ac intempestivis, jam à duobus annis cruciari cepit variis doloribus, nunc brachia & manus, nunc pedes & tibias, aliasque partes affligentibus, hisque errantibus, nec diu in una & eadem parte consistentibus, ita ut hodie manus dextra, cras sinistra afficeretur, postea verò dolor manus deferit, & ad pedes devolvitur. Cessante autem dolore in partibus summa in iis imbecillitas relinquitur, ut æger per plures dies decumbere cogatur. Nec articulos tantum hujusmodi dolores affligunt; sed etiam alias partes: interdum enim caput dolore afficitur, alias dentes & maxillæ dolitant, alias etiam hypochondria; ita ut nulla ferè corporis pars doloribus immunis videatur. In principio morbi longiora erant dolorum intervalla, ita ut postquam per 15. aut 20. dies afflictus fuisset; per mensem unum aut alterum à doloribus immunis esset. Nunc verò breviora multò sunt dolorum intervalla; & vix per octiduum integra fruitur valetudine. Febricula interdum laborat, præcipuè doloribus accedentibus, & ad summam maciem, totiusque corporis debilitatem perductus est. Multa remedia à præsentibus Medicis usurpata sunt; ad contumacem istum affectum oppugnandum, præcipue vacuantia per intervalla usurpata, phlebotomia scilicet, & purgatio, sed omnia incassum; ideo Medicos Monspelientes consulere voluit, à quibus sequentia præscripta sunt.

Ex historia symptomatum, quibus Nobilissimus ægro-  
tans jamdiu confectus est, conicere licet eum illo morbo laborare, qui Rheumatica affectio nominatur, quod equidem nomen non juxta vulgarem & communem significationem usurpatum volumus, qua omnes ii affectus enunciantur solent, in quibus à capite in aliquam partem aliquid transmittitur, ut de catarrhis vulgariter fertur; Sed propriè & peculiariter juxta doctrinam Hippocratis lib. de locis in homine, & Galeni 1. de febrium diff. & 2. de compos. med. secundum genera, rheumaticum affectum nominamus illum, qui ex totius corporis habituali intemperie ducit originem. Ille autem graphicè depingitur à Gal. 1. febrium cap. 7. his verbis: hujusmodi quæpiam ratione provenire scito rheumaticos nominatos affectus toto videlicet corpore infirmo, principibus verò illius partibus, paululum licet insit sanguinis, gravari tamen solitis eundemque ad carneas cutis partes protrudentibus. Hæc Galenus. Unde legitimam rheumaticæ affectio-  
nis rationem in eo sitam esse constat, quòd corpus universum ea impotentia ad id habitualiter sit affectum, ut ubi principem ejus partem aliquo sanguine gravari contigerit, licet non sit in copia plurimum excedens, ad carnosas partes sub cute, & in ipsam protinus transmittat, & hinc in articulos facillè delabatur. Illam verò principem partem quæ in hoc affectu maximè læditur, jecur esse statuimus; quod alimentum, non satis nutritioni conveniens, propter adscititiam quandam imbecillitatem generans, totum corpus pari imbecillitate, & maximà molestiâ solet afficere. Hujusmodi autem imbecillitas ex intemperie quadam facta ducit originem: quæ ut accuratius investigari queat, in memoriam revocandum alterari posse. Primò defectu innati caloris, & humidi primigenii. Secundò, per intensionem alicujus qualitatæ ex quatuor, in quibus consistere fertur temperamentum. Tertio, ex vitiosa maligna aut venenata qualitate in partem introductâ. Quarto, cum spiritus vitalis obtunditur, dissipatur, distrahitur, aut præve corrumpitur. In nostro autem laborante, secunda in primis causa accusanda est, aucta nimirum caliditas hepatis, & præternaturalis facta, unde concoctio ipsius partis depravatur, sanguisque serosus, servidus, & nu-

tritioni ineptus redditur, eaque ratione ad varias partes distrahitur, easque partim acrimonia sua vellicat, variosque dolores afficit, partim in flatus convertitur, aliasque symptomata producit, donec tandem portio illius serosa & flutuosa per insensibilem transpirationem, aut urinam excludatur.

Hujus affectus curationem nondum assequi potuerunt præstantissimi Medici, duplici de causa. Primò, quia (ut antea dictum est) intemperies, rheumaticam illam affectionem propriè dictam & legitimam generans, habitualis est. & fixa; atque adeo difficillimè mutabilis. Secundò, quia non videntur præceptum illud observasse; à Galeno propositum in hujus morbi curatione 1. febrium c. 6. quod sic habet. Merito ergo his curandis scopus est, non evacuatio, sed totius corporis roboratio. Quæ quidem ita intelligenda sunt: non, quòd nulla omnino competat evacuatio (idem enim Galenus ante hujus affectus curationem orditur à missione sanguinis, ac si excrementa pravam etiam qualitatem habuerint, unam adhibet purgationem) sed quòd magis & frequentius roborantibus, minus verò & parcius evacuantibus agendum sit.

Cum igitur intemperies calidior, ex insignibus maximisque vitæ erroribus, in hepate potissimum contracta, sui ipsius, totiusque corporis imbecillitatem pariat; adversus eam omni arte colluctandum est, iis remediis, quæ dictam intemperiem oppugnent, simulque specifica proprietate hepar roborent ac reficiant. Et quia temperies illa habitualis est, longissimo indiget remediorum usu.

Primò igitur inter omnia remedia, quæ hæctenus ars invenire potuit, ad hepar præcalidum refrigerandum atque roborandum, primas obtinet tinctura corallorum; cujus cochlearis duo æger sumere poterit singulis diebus manè, duabus horis ante pastum, illius preparatio talis est.

℞. Coralli rubri crassiusculè triti ℥. vi. reponantur in vase vitreo rotundo; (quod matrarium vulgo nominant,) iisque affundatur succus limonum, ut supra materiam quatuor digitis emineat in penuria succi limonum substitui poterit succus berberis,) vase bene clauso, ponantur in balneo Mariæ per quatuor aut quinque dies continuos, & tincturam separa à facie, & in alio vase serva ad usum dictum.

Gustui gratior fiet tinctura, si cum sacchari candi pari quantitate reducatur in syrupum; sed multo inefficacior evadet; at melius addetur saccharum cuilibet dosi, exhibitionis tempore.

Ad hunc eundem usum valde commendatur conserva ex fructu cynorrhodi seu rosæ caninæ confecta: scilicet fructus illos maturos mundando à seminibus, deinde coquendo in aqua, ac trajiciendo per setaceum, tandemque recoquendo cum saccharo ad opiata consistentiam. Modus autem faciendi consimilis est ei, quo cydoniatum parari consuevit.

Hujus autem conservæ sumere poterit singulis diebus ad nucis magnitudinem, manè aut vespere, & sub introitu lecti uti poterit electuario sequenti.

℞. Electuarii triasantali quadruplicato rheo in tabellas redacti Uncias 4. Capiat tabellam unam ponderis Unciarum duarum, superbibendo parum aquæ potus ordinarii.

Tinctura etiam rosarum ad usum prædictum erit utilissima, quæ in sequentem modum componitur.

Recipe rosarum rubrarum siccarum Unciam j. aquæ tepidæ libras iii. spiritus sulphuris aut virioli Drachmam semis, infundantur per horas sex; colaturæ adde sacchari albi libram semis: capiat cyathum unum horâ commodâ.

Hæc quatuor remedia in usu continuo ita habenda sunt, ut mane alterutrum sumatur, horis duabus ante pastum, vespere verò alterum, sub introitu lecti: postmodum verò alia duo iisdem horis, ita frequenter remedia immutando, ne natura nimium iisdem assuescat. Quando verò omnia simul habere non poterit



terit. duobus aut tribus ordine prædicto utetur, inò verò circa initium ter in die: si lubet, dicta remedia usurpare poterit: scilicet manè, vespèri, & horis duabus ante coenam.

Tinctura rosarum omni etiam horâ usurpari poterit tempore sitis, extra passum, tum etiam statim post aliorum remediorum usum.

Inter reborantia remedia convenientissima est ambra cineritia, quæ spiritus & calorem nativum mihi reficit. Neque tantopere calefacit ut vulgò creditur: estque veluti balsamum humidi radicalis, ejus igitur g. viii. vel x. fumere poterit, per vices, cum tinctura corallorum vel jusculo communi aut in ovo sorbili.

Quia verò partium præcipuarum intemperies & imbecillitas excrementorum proventum solet efficere, ideo blandis purgationibus, ut antea dictum est, per vices expurganda sunt, quod fit syrupo magistrali ex succis composito, qui magis alterando & roborando hepar, quam purgando præstabit.

R. Succorum recenter expressorum, & per residentiam depuratorum, ex foliis endiviæ, cichorii, acetosæ, fumaris, lupulorum, agrim. & buglossi lb. iii. succipomorum redolentium recenter expressi lb. ss. fennæ mundatæ ʒ. vi. epithymi ʒ. ii. agatidis recenter trochiscatis ʒ. i. macis, & caryophyllor. an. ʒ. i. infundantur & decoquantur, ut artis est, donec colaturæ supersint quart. v. in quibus dissolve rhab. electi. prædictis succis seorsim infusi, cum santalo citrino ʒ. i. ss. sacchari albi quart. v. fiat syrupus perfectè coctus & clarificatus qui servetur in vase vitreo, de quo capiat ʒ. i. ss. vel ʒ. ii. bis aut ter in mense, cum jusculo puli, feli endiviæ, cichorii, & acetosæ alterato.

Intermediis verò temporibus, quando alvus non erit libera, quæ perpetuò mollis servanda est, fumere poterit ejusdem syrupi ʒ. i. cum jusculo communi, hora una ante prandium.

Vel dissolvere poterit eundem syrupum in decocto prunorum.

Vel in eodem decocto, loco syrupi dissolvi poterit manna ab ʒ. ss. ad ʒ. i. sumenda itidem hora una ante prandium.

Vel in dicto decocto prunorum decoqui interdum poterunt fennæ mundatæ ʒ. ii.

Prædicta remedia frequentari poterunt bis in septimana, si alvus non sit libera.

Præterea ad hepatis fervorem demulcendum, nihil præstantius est balneo aquæ tepidæ, quod per totam ætatem usurpandum erit frequentissimè, singulis ferè diebus, per horam, ante coenam, in formam semicupij.

His addere licet optimam victus rationem ex cibis concoctis facilibus, & optimi succi, v. g. perdicibus, caponibus, pullis gallinaceis, & pipionibus, præcipuè verò jusculis & consummatis juribus carniū expressis, aliisque, quæ omnia sumenda sunt in mediocri quantitate, ut facilius concoqui possint.

Pro potu utatur diluto rhabbari, per longum tempus in hunc modum composito.

R. Rhab. pulverat. crassiusculè ʒ. ss. aquæ fontis ss. iii. bulliant parùm & colentur, ac colatura utatur pro potu ordinario, cum tantillo vini rubelli.

Interdum etiam, loco illius diluti, uti poterit decocto radicum cichorii cum vino, ut dictum est.

Vitabit maximè motus vehementes, tam animi quam corporis; venerem, & alia, quæ sibi maximè obfuisse non dubitat.

Si quando dolor firmetur in articulis; sequentibus remediis mulceri, & dissolvi poterit.

R. Pulpæ radicis althææ ʒ. iv. lactis recentis ʒ. ii. fiat instar linimenti, quod inducatur parti dolenti, vel

R. Massæ emplastri diapalmæ q. s. extendatur super alutam, fiat emplastrum debitæ magnitudinis, applicandum parti dolenti.

## OBSERVATIO L.

## Tumor lienis.

S Oror Dn. Nicolai, Canonicus Monspeliensis, 20. annos nata, post febrem tertianam malè curatam, incidit in tumorem lienis insignem, qui totum ferè abdomen continebat, cum febre lenta, inappetentia, vigiliis, aliisque symptomatis.

Præscribo primum venæ sectionem brachij sinistri, præmissio clystere. Deinde apozema aperiens cum cremore tartari, ad duodecim dies. Tertio quoque die infundebantur fennæ ʒ. ii. addebaturque syrupi de cichorio compositi ʒ. i. Eodem tempore admovebatur leni fottus emolliens & aperiens manè & serò, & linimentum post fottum. Sumebat etiam vespertinis horis scilicet hora una ante coenam, opiatam sequentem.

R. Conservæ florum tamarisci & radicis enulæ campanæ an. ʒ. i. conservæ capillorum ven. ʒ. ii. conservæ absinthij vulgaris, & corticis citri condit. ʒ. ss. confectio-nis Alkerm. ʒ. iii. salis absinthii & tamarisc. an. ʒ. ii. pulveris electuarij diarrhodon. Abbat. ʒ. i. cum syrupo capill. ven. fiat opiatæ, de qua capiat magnitudinem castaneæ, singulis diebus, manè, duabus horis ante passum, superhauslo vini diluti momento.

Hisce remediis convaleuit intra 15. dies.

## OBSERVATIO LI.

## Sanguis coagulatus in ventriculo.

F Rater Dn. Dumoy in curia prædiali Monspeliensi Consilij Regij, quinquagenarius, post exercitia vehementia, in venatione assidua, parum sanguinis evomit & nonnihil etiam ejusdem per alvum excrevit. Sequentibus diebus ventriculi gravitate premebatur cum cardialgia, ut alimentum frequenter expeteret, illiusque abstinentia per intervallum aliquod se deficere diceret. Vinum etiam frequenter forbillabat. Quando tractabatur regio ventriculi, dolorem sentiebat, manus subfrigidæ habebat; parum sitiebat. Medicus ordinarius eum febre lipiria ex inflammatione ventriculi laborare dicebat. At cum mihi febris nulla pulsus tangenti appareret; ille virium imbecillitatem ob stare inquiebat, quominus febricitare videretur. Illam autem inflammationem colligebat ex sanguine antea excreto, qui ejusdem effusionem in substantia ventriculi argueret, ex dolore ipsius partis, manuum frigiditate, & cardialgia, indeque audacter pronunciabat, eum certò brevi moriturum. Ego verò omnia illa symptomata ex sanguine in ventriculo concreto & corrupto provenire censebam; qui quidem sanguis corruptus, ut docet Galenus, veneni naturam induit, & inde lipothymia aut cardialgia, extremorum perfrigerationes, aliæque symptomata emergunt. Neque enim fieri posse putabam, ut ventriculi inflammatio febrem intensam ac suum non accerferet. Deinde admotione tegulæ calefactæ, & pannorum calidorum, supra ventriculum, æger delectabatur, nec non meri assumptione frequenti, & Jusculis valde calidis; quæ omnia non tulisset ventriculus inflammatus. Injecto clystere thrombulos quosdam sanguinis cum eo excrevit, sanguis detractus fuit valde pituitosus. Ab emulsione, vespere exhibita, ex præscripto Medici ordinarij, graviter affectus est tota nocte. Remediis autem sanguinem coagulatum dissolventibus & expurgantibus, noluit acquiescere dictus Medicus; ideo ego, qui per occasionem ægrum semel tantum videram, integram illi curam reliqui. Sed postera die, nullo alio remedio usurpato, per alvum deposuit materiam foetidissimam & nigricantem, sicque liberatus est ab omnibus prædictis symptomatibus: quod manifestè indicavit, affectus hujus causam non aliam extitisse, quam sanguinem concretum in ventriculo, ut nos existimavimus.

OBSER-



## OBSERVATIO LII.

*Partis atrophia & sensus imminutio.*

**O**Rnatissimi viri D. Paschalii Consilarii Regii, & in computorum camera Grationopolitana Magistri uxor dilectissima, annos nata 22. temperamento prædita calido & sicco, (prout ex actionum promptitudine, ingenii acrimoniâ, iracundiâ, venarum latitudine, habitu inacilento, aliisque signis facile videre est, à septem annis laborare cœpit imminutione sensus tactus, in manu sinistra, cum partis ejusdem macie & extenuatione, quæ primùm in pollice apparuit, cujus musculi, veneris montem constituentes, primùm assumpti sunt, moxque ejusdem particulæ sensus imminutus, & consequenter alii digiti eodem affectu tentati; donec tandem integra ferè sensus abolitio subsequuta fuerit, nunc etenim acum in pollicem immisam vix dolorificè percipit. Ad hæc vesiculæ interdum in extremitatibus digitorum exoriuntur, unctionibus simillimæ, aliaque nonnulla in illius habitu apparent, quæ suo loco proponuntur.

Casus iste difficillimus est, rarissimus & intricatissimus, licet de eo præstantissimi Medici qui illius curam susceperunt, parùm dubitaverunt: illam sensus tactus læsionem, ad incipientem paralyfin referentes. Quæ quidem sententia, licet rationibus non levibus confirmari valeat; Aliud tamen de hujus morbi natura judicium proferre, & validissimis rationum momentis sustinere facile est. Esse nimirum nudam partis atrophiam, quam ratione siccitatis sensus tactus læsio consequuta sit, citra ullam nervorum obstructionem. Nos utriusque partis rationes proferemus, ut saniores eligere ejusvis arbitrio sit. Ac tandem demonstrabimus, (quod erit egregium & singulare) eadem curandi methodo, iisdem remediis hunc affectum, sive ab hac, sive ab illa causa dependeat, esse profligandum.

Primò igitur, hanc sensus tactus læsionem, speciem esse paralyfin, inde constare videtur: quod ab alia causa non possit in aliqua parte sensus ille imminui vel aboleri, quàm ab obstructione nervorum, spiritus animales, simulque facultatem sensificam & motricem ad partes deferentium. Deinde, quod nobilis hæc mulier tumorem alias passa sit in parte dextra cervicis, & interdum auris dextræ tinnitum, nec non dolorem quandam circa cervicem percepit, quæ indicia sunt fluxionis à capite irruentis.

Contra verò hunc affectum non ad paralyfin, sed ad quandam potius atrophie speciem referendum esse, sequentes rationes possunt evincere.

Primò, in paralyfi non solum sensus; sed etiam motus læditur: præsertim, quando antiqua est & confirmata, quemadmodum ista, quæ per septennium affligit, licet enim interdum lædi possit motus illæso sensu; & contra interdum sensus lædatur illæso motu; hæc tamen adhibenda est differentia, quæ discretè docetur à Gal. I. *de loc. affect.* cap. 9. quod nimirum in parte motus capaci non possit lædi sensus illæso motu; cum tamen motus lædi possit, illæso sensu. Sensus enim in patiando magis, motus verò in agendo consistit. Et cum idem spiritus malis per eundem nervum deferat sensum & motum; si minori copia affluat, quàm quæ motui possit sufficere, & illa tamen sensui sufficiet, at si tanta nervi fuerit obstructio, ut sensus lædatur; multo major læsio motui continget. Quomodo igitur fieri poterit, ut interdum sensus lædatur, illæso motu; hæc tantum ratione (docente Galeno loco citato,) quod nimirum, si soli nervi qui ad cutem feruntur, afficiantur, illæsis iis, qui ad musculos destinunt, sensus tantum peribit, illæso motu, quemadmodum contigit Paulaniæ Syrio sophistæ, cujus historiam refert Gal. 3. *de loco cap.* 12. tum etiam loco supra citato, qui Romam proficiscens, & vehiculo decidit, & ictu accepto circa septimam vertebra, unde nervulus ad cutem duorum minimorum digitorum deferretur, in iis duobus digitis sensus perit, illæso motu, quia

*Laz. Riverii Opera.*

nervi qui ad musculos earum partium ferebantur, non erant affecti. Jam verò in casu proposito res non potest ita se habere; quandoquidem si affectus oritur ab obstructione nervorum, concedendum est, nervos qui feruntur ad musculos, esse graviter affectos, siquidem nunquam contingit macies & consumptio in parte paralytica, quin prius illa spiritus animalis influxu prorsus destituta sit, siquidem facultas naturalis, feriente facultate animali, in consensum trahitur, & malè nutriens partem, atrophiam inducit. Sed cum ex integritate motus nervorum integritas pateat; conjiciendum est, illam atrophiam non sequi paralyfin; sed potius sensus illam læsionem ab atrophia, & exticcatione partium dependere. Neque enim verum est, ut nuper assereretur; omnem sensus imminutionem & abolitionem esse speciem paralyfis, siquidem in elephantiasi sensus imminuitur & aboletur à siccitate, in partes introducta ab humore atrabilario.

Secundò, ex dictis etiam aliud argumentum colligere fas est: siquidem macies & atrophia non contingunt partibus paralyticis, nisi paralyfis confirmata sit. At ista à suis authoribus dicitur tantum incipiens, cum sensus tantum lædatur illæso motu. Unde sequitur necessario, atrophiam istam à paralyfi minimè dependere.

Tertiò, cum dicatur paralyfis incipiens; mirum est, principium morbi per septennium durasse, neque ulterius progressum, & fluxionem, quæ nervorum tantum unum aut alterum, ad digitorum cutem excurrentem obfessit, nervos tandem majores, prædictis contiguos, & motum efficientes, non invasisse. Ita ut inde motus & sensus læsio contigerit, & integra absolutaque paralyfis prodierit.

Quartò, ante sensus imminutionem, primùm apparere cœpit macies & consumptio musculorum pollicis, quam deinde subsequuta est sensus imminutio. Ergo atrophia partis ab alia causa dependet, quàm à paralyfi, & sensus imminuti causa esse videtur.

Quintò, vesiculæ unctionibus simillimæ, digitorum extrema non raro affligentes, humorem arguunt in partes affectas delabi longè diversum ab eo, qui solet efficere paralyfin. Qui quidem humor non solum digitis ab hepate suggeritur; sed etiam universæ medietati corporis sibi viciniore. Nam & digiti pedis dextri iisdem vesiculis afficiuntur, & tibia dextra herpetibus, & brachium dextrum rivulis quibusdam insignitur, à venis ordinariis distinctis, sub cute recto tramite decurrentibus, & colorem rubrum, saturatum, ac ferè livescentem referentibus ut facile appareat sanguinem atrabilarium ad partes affectas defluere, qui nutritionem vitians maciem & siccitatem induxerit; à qua siccitate sensus tactus imminutus est, siquidem à sapientibus artis medicæ proceribus litteris proditum est; motum juvari à siccitate, sensum verò ab humiditate. Atque adeo dum pars redditur humidior, ineptam fieri ad motum: dum verò siccior evadit ineptam fieri ad sensum. Similes etiam rivuli in tibia dextra ægrotantis apparent, varicum instar, qui hepatis vitium evidentius comprobant.

Denique hujusce affectus naturam magis ac magis indicant juvenia & lædencia. Sicut enim nunquam hæcenus remediis convenientibus usæ est; sic usu thermarum aliarumque rerum calidarum, tunc medicamentorum potenter resolventium, parti admotorum, multo pejus habuit.

Quamvis autem hæc posterior sententia veritati propior esse videatur, si quis tamen priori favere voluerit, ultimâ ratione persuasus, in illius gratiam adductæ: quæ certe minime contemnenda est, saltem hoc æstimare possit, quendam forte humoris defluxum spinalis medullæ particulam aliquam afficere, unde sensus imminutio oriatur. At verò maciem & atrophiam partis huic causæ acceptam referre, impossibile est: quemadmodum id rationes allatæ evidenter convincunt. Et saltem juxta illam sententiam asserendum esset, maciem & sensus imminutionem esse complicatos affectus, à diversis causis oriundos. Quibus ita suppositis, in quamcumque partem animum convertere lubeat, eadem per-

Ppp

petuo



petuò erit curandi ratio, quemadmodum ab initio fuimus polliciti.

Illam igitur curationem ex legitimis indicationibus deducentes, omni opera elaborandum est, ut calidior & ficcior hepatis intemperies, omnium malorum soboles, emendetur; partis consumptio & atrophia reparetur & renutriatur: à qua si læsio sensus prodeat; simul illa curabitur; sublata causa, nimirum siccitate. Si verò hæc sensus læsio à nervorum læsione oriri existimetur; & à fluxione à cerebro in spinam ruente: non tamen idcirco calefacientia remedia exhibenda sunt, quæ causam fluxionis primariam, scilicet hepatis intemperiem auferent. Neque refrigerantibus calida permiscenda, mixtis indicationibus, siquidem illis intemperies hepatis nunquam corrigetur, præsertim cum in formulis remediorum, juxta hanc indicationem antea præscriptis, calida medicamenta frigidis longè prævaleant. Neque externa remedia resolventia parti affectæ admovenda sunt, quia illam magis ac magis absument & exsiccabunt; & affectus curationi nullo modo inservient. Obstructio enim nervorum, si quæ est, non in manibus est; sed juxta vertebrae in nervorum origine. Sic Galenus imitandus veniet, qui in Pausania Syro, antea nominato, remedia ab aliis Medicis adnota duobus digitis sensu carentibus, ibique nihil conferentibus, vertebrae colli applicuit, felici successu.

Imò verò paralyseos, quæ in corporibus calidioribus ficcioribusque contingunt, solis refrigerantibus & humectantibus remediis curari possunt, quemadmodum docet Trallianus *lib. 1. cap. 16.* his verbis. Causam resolutionis effectricem magna ex parte internoscere licet ex crasso, viscoso, & frigido humore constiitui; Sciendum etiam est, vitium hoc ex qualitate calida aut sicca proficisci, ubi calida intemperies sanguinem & humores nimium torrefecerit. Et paulò post, si namque qualitas sola fuerit calida & sicca; tunc extenuantia, calefacientiaque (omnia enim hujusmodi nativum humorem consumunt) magis adhuc assant materiam, crassiorumque reddunt. Ac tandem curationem subnectit ex victu & remediis purè refrigerantibus & humectantibus; quam quidem ab experientia desumptam esse asseverat, inquit: Novi sanè ego quendam, resolutionem ex morore, multâ sollicitudine, & inedia expertum: deinde sumptâ hierâ, adeo læsum, ut totus ipse immobilis fieret, & propemodum interiret, nisi in contrarium mutatus fuisset, & humectantibus omnibus, tum potionibus, tum cibis, & aliis quæ temperatum ipsum reddidissent, usus fuisset; maxime verò balneis compluribus, unctionibus ex hydrelæo, mutatione aeris temperati, & omni hilaritate. Huic non valdè abfimilem historiam videre est apud Forestum *observat. 97. lib. 10.* cujusdam adolescentis, qui à cruribus ad pedes sensu & motu destitutus erat, cum earundem partium extenuatione & atrophia. Cumque calefacientium & exsiccantium medicamentorum usu, ab aliis Medicis præscriptorum, in pejus continuò rueret; tandem solis humectantibus assumptis & admotis, à Forestio restitutus est.

Primò igitur victus ratio instituenda est refrigerans & humectans. Cibi sint boni succi & concoctu faciles, & ex junioribus præsertim animalibus. In jusculis utatur herbis refrigerantibus, borragine, acetosâ, endivia, lactuca, portulaca. Vitentur omnia frixa, salsa, & piperata; legumina, caseus antiquus, aliæque, cibi crassiores & calidiores: vinum bibat valdè dilutum & oligophorum.

Vitentur in primis animi pathemata, præsertim tristitia & iracundia: somnus sit longissimus, quia nihil magis humectat, quàm somnus. Alves sit semper libera, naturâ, vel arte.

Quàm primum erit à graviditate libera, transacto uno à partu mense; sequentium remediorum usum aggrediatur.

2. Rad. buglossi, graminis, & asparagi ana ʒ. 6. fol. endiviæ, cichorii, acetos. buglos. ana M. ʒ. coquantur cum

pulso gallinaceo, & fiat jusculum, quod capiat manè per duodecim dies.

In tertio quoque jusculo infunde per noctem sennæ mundat. ʒ. ʒ. sem. anisi ʒ. 1.

Post primum jusculum purgans, aperiatur vena basilica cubiti dextri: mittantur sanguinis ʒ. vii.

Finitis jusculis, ingrediatur balneum sequens.

3. Amygdal. dul. contusar. & farinæ hordei ana lb. 1. ʒ. decoquantur pro balneo, in sacculo inclusa; quod ingreditur tepide manè; & longè à pastu, singulis diebus decoctum renovando.

4. Unguenti rosacei & cerati santalini ana ʒ. 1. succi cichorii & olei rosac. ana ʒ. ʒ. trochiscor. de caphura ʒ. 1. ceræ albæ parum. Fiat unguentum, quo inungatur regio hepatis ab exitu balnei, post desertum madorem, hoc continuando, singulis diebus, in introitu lecti, per longum tempus.

5. Seri lactis caprilli per lactis ebullitionem extracti, & probè clarificati ʒ. v. succi cichorii & pomorum redolentium ana ʒ. i. capiat manè duabus horis antè prandium per 15. dies.

Si tempus fuerit frigidius, quò minus sero lactis uti possit; illius loco decoctum chinæ substitui poterit in sequentem modum.

6. Rad. chinæ in taleolas incisæ ʒ. i. aquæ fontis lb. vi. succi limonum ʒ. iii. macerentur per 24. horas, deinde coquantur in vasè terreo vitreato bene clauso, ad tertiæ partis consumptionem, colentur per manicam Hippocr. capiat ʒ. vi. vel viii. singulis diebus manè.

7. Succorum recentè expressorum, & per residentiam depuratorum ex foliis borrag. bugloss. fumariz, cichor. & acetos. lb. iii. succi pomorum redolent. recentè expressi & depurati lb. ʒ. quibus infunde sennæ mundat. ʒ. viii. polypod. querc. recentis, & epithymi ana ʒ. ii. agarici recentè trochiscati ʒ. i. macis & caryophyll. ana ʒ. i. Postea coquantur ad lb. i. ʒ. in colatura dissolve rhab. electi in prædictorum succorum portione seorsim infusi ʒ. i. sacchari albi lb. i. ʒ. coquantur in syrupum, de quo capiat ʒ. iii. cum jusculo pulii, foliis borrag. buglos. fumariz. & acetos. alterato.

Diebus intermediis capiat singulis diebus mane, duabus horis ante pastum ʒ. i. opiatæ, confectæ ex fructu cynorrhodi, seu rosæ caninæ, probè maturo & convenienter cocto, & per setaceum trajecto, ac deinde recocto cum sacchari f. q. quemadmodum cydoniatum parari consuevit.

Utatur etiam interdum tabellis triasantali duplicato rheo; cujus capiat ʒ. ii. mane, loco opiatæ prædictæ, superbibendo aquæ cichorii parum.

Si propter temporis injurias hoc autumnò omnia prædicta remedia ad amissum exequi non valeat. Vere proximo illa erunt de integro repetenda, tum etiam balneum frequenter iterandum, & serum lactis diu usurpandum: in hisce enim remediis præcipua curandi ratio versatur.

Denique ad hunc affectum expugnandum utilissimæ ac longè præstantissimæ sunt aquæ Meynenses, quas adire poterit circa initium mensis Julii, isque utetur per mensem integrum.

Interea ab ipso curationis initio topica remedia usurpanda sunt, brachio & manui affectæ frequenter admovenda.

8. Olei amygdal. dulc. recentè extracti sine igne ʒ. ii. olei chamæm. ʒ. i. misce, inungatur pars calidè, mane & serò, mox linteis calidiusculis eandem obvolvendo.

Postquam admotum fuerit oleum prædictum per 15. dies, usurpetur sequens per idem tempus.

9. Olei catellorum, & lumbricorum ana ʒ. ii. olei amygdal. dulc. ʒ. iii. misc. utatur ut dictum est: Postea per totidem dies utatur sequenti linimento.

10. Olei violar. & olivar. an. ʒ. i. ʒ. picis navalis ʒ. ii. ol. amygdal. dulc. ʒ. i. fiat linimentum.

Tandem, si affectus prædictis remediis pertinaciter obstet; ad sequentis decocti usum erit transeundum.

11. Rad.



℞. Rad. bryoniæ, liliorum & althææ ana ℥.iii. coquantur in jusculo capitis, pedum, & intestinorum vituli aut vervecis, & in hoc decoctum demergatur manus, & portio brachii, calidè, manè, & serò per duas horas, idque post usum balnei per 15. dies.

Ut etiam suspicioni provideatur materiæ nervorum principio impactæ; usurpari poterunt unguenta & linimenta potenter resolventia, à præstantissimis Medicis præscripta, iis inungendo calidè spinam dorsi per aliquot dierum spatium. Actum Monspelii die 14. mensis Augusti anni 1631.

## OBSERVATIO LIII.

*Aborsus præcautio.*

**Q**Uædam mulier, uxor Joannis Vieules, civis Monspelienfis, tres aborsus consequentes passa erat, variis gestationis temporibus. Jam verò à duobus mensibus gravida patiebatur dolores circa umbilicum & lumbos, qui aborsum minabantur. Alius Medicus duo emplastra præscripserat, lumbis & umbilico admovenda, ex massa empl. pro fracturis & disloc. unde melius habuit ad aliquot dies, postea verò iidem dolores reversi. Vocatus ego, advertens mulierem juvenem & sanguineam, venam secari jubeo, unde intra paucas horas à doloribus & metu aborsus omninò liberata est. Sanguis erat valdè serosus. Tamen ad præcautionem præscribo rhab. pulv. 3. i. cum jusculo, iterandam semel in septimana per mensem; unguentum adstringens lumbis & ventri admovendum pridie purgationis, & opiatam adstringentem postdie rhabbari, quibus tamen non usà est. Symptomata illa accesserant eo tempore, quo menstruas purgationes pati consueverat extra graviditatem. Tertio deinde graviditatis mense eadem symptomata redierunt, & venæ sectione statim liberata est. Quarto iidem, quinto, sexto, septimo, & octavo, iidem symptomatibus periodicè recurrentibus, iterata est venæ sectio; statim liberabatur, ultima venæ sectio celebrata fuit octo diebus ante principium noni mensis, cum eodem fructu, die scilicet 15. Januarii anni 1632. & in fine noni mensis peperit filium bene habitum, atque vitalem, sed pallidiusculum.

## OBSERVATIO LIV.

*Febris hemitritæa, capitis dolor.*

**I**n 12. mensis Octobris anni 1631. vocatus sum ad Dominam de Lesignan, Picenis decumbentem ex febre continua, cum intermittente copulatâ; cui junctus erat occipitis dolor gravans, cum tendinum cervicis dolore & flexione, in dextrum oculum decumbente. Statim inde conjeci, dolorem capitis esse Idiopathicum; eumque acceperat ob æris nocturni injuria, cui se exposuerat. Febris erat satis lenta & pituitosa, sine siti. Inveni eam decimo quarto morbi die: antea verò ipsi semel vena fuerat aperta, & bis purgans medicamentum exhibitum. Sudor copiosus apparuerat dicto die decimo quarto, omnia sine fructu: febris eadem, quæ circa vesperam exacerbatur, cum extremorum perfrigeratione, unde paroxysmi notabantur. Decimo quinto & decimo sexto, iterata est phlebotomia: postea medicamentum fuit exhibitum; & post aliquot dies iteratum, ex infusione fennæ cum sale tartari: juscula aperientia exhibita, quoniam julepos & alia remedia interna renuebat. Fetus & inunctiones factæ in hypochondriis, quæ tensa apparebant. Ratione doloris capitis admotum est vesicatorium & emplastrum commissuræ. Hæc continuata sunt usque ad vigesimum sextum morbi diem, perseverante febre, urinæ aliquando coctæ, cum enæoremate laudabili; sæpius crudæ, cum enæoremate valdè divulso, & non rarò ex tribus urinis, quæ noctu servabantur, prima & tertia crudæ erant, media laudabilis, quæ morbi longitudinem minabantur. Post tempus prædictum, cum alia re-

*Laz. Riverii Opera.*

media respueret, exhibeo per triduum salis tartari 3. ℔. spiritus vitrioli guttas xv. in decocto absinthii, unde optinè habuit, febrisque superata est, urinæ tamen tenues permanebant, cum enæoremate divulso. Iterum purgata est, & omninò convaluit.

## OBSERVATIO LV.

*Tussis & Catarrhus Infantis.*

**F**ilius Dn. de Boirarques, in camera computorum Monspelienfi correctoris; undecimæstris, tentabatur catarrho, cum tussi assidua & febre, pituitam frequenter evomebat; multum lac fugebat, & parùm mingebat. Post multa remedia, cum perexiguo fructu usurpata, jussi ut inungeretur regio renum, oleo scorpionum Matthioli, ter in die, unde urinæ copiosiores redditæ, & catarrhus imminutus. Dicit enim Mercatus lib. de morbis puerorum cap. 8. in pueris contingere catarrhum aliquando ex vitio & imbecillitate renum non trahentium serosum humorem: ut ille sursum translatus, fiat materia catarrhi. Si symptoma illud perseverasset, usurpata fuissent remedia, ab eodem Mercato proposita cap. 15. de suppressa urina in pueris, ut clysteres, juscula aperientia, &c.

## OBSERVATIO LVI.

*Pleuritis.*

**Q**uidam futor juvenis & biliosus, pleuritide laborans, post multas phlebotomias, aliæque remedia ordinaria. Die quinta perseverante febre intensâ, & lateris dolore, sumpsit pomum coctum cum thuris Drachi. i. superbibendo aquæ cardui bened. Unc. iv. & postea rectus est. Sudavit parùm sine febris imminutione, sequenti die multum sudavit, bis aut ter, & inde convaluit.

## OBSERVATIO LVII.

*Febris continua in puellula.*

**A**Nno 1632. mense Januario, filia Dn. Darneës Causidici annos septem nata, laborabat febre continuâ non admodum vehementi; sed quæ per intervalla, scilicet circa vesperam exacerbabatur. Incepit febris cum vomitu pituitoso, quem deinde sequutus est alvi fluxus etiam pituitosus, per unum tantum diem perseverans, scilicet secundo die morbi. Urina erat pallida & turbata, anhelitus acidus & graveolens. Præscribo potionem ex infuso 3. i. rhei, syrupi rosacei 3. i. Antequam exhiberetur medicamentum, alius Medicus superveniens, volebat illud omittere, & phlebotomiam potiore esse contendebat; tamen exhibitum est medicamentum, quod paulò post evomuit cum pituita crassâ & valdè putrida. Deinde præscribo clysterem ex catholic. dupl. 3. ℔. circa vesperam injiciendum, quo & reliquis medicamentis simul operantibus quinquies deiecit totâ nocte materiam pituitosam, biliosam, & valde foetentem. Manè febris perexigua, & meridie febris experts ac sanitati restituta est.

Ex hac observatione colligere est, quantum aberrant illi Medici, qui in omni febre continuâ indiscriminatim à venæ sectione inchoandam esse curationem existimant. Cum sæpè in pueris dictæ febres à putridis humoribus, in prima regione stagnantibus, oriantur; qui purgatione facile educuntur. In hac autem puellula vomitus pituitosus & alvi fluxus talem humorum redundantiam indicabant:



## OBSERVATIO LVIII.

*Colicus dolor.*

**U**Xor Dn. Audifreti, civis Monspeliensis, laborabat colico dolore gravissimo die 22. Januarii anni 1632. Injectus fuerat clyster carminans & purgans frustra, vocatus ego præscribo alium clysterem, ex decocto emollientium & carminantium, facto in æquis partibus aquæ & vini albi, dissolvendo cathol. dupli. mellis rosacei ʒ. ii. aquæ benedictæ turbidæ ʒ. iv. statim injecto clystere dolor quievit, per tres horas dormivit, postea mediocriter purgata est, & dolor non rediit.

## OBSERVATIO LIX.

*Colicus dolor.*

**D**ie octavâ mensis Martii anni 1631. Domina de Varranda sexagenaria gravissimis doloribus vexabatur circa regionem lumborum, hepatis, ventriculi, & intestinorum: duo injecti fuerant clysteres, quibus valdè purgata fuerat & cucurbitula magna adnota, ante & retrò. Dolores perpetuò intensi. Vocatus ego, exhibeo pulveris intestini lupi ʒ. i. cum vini ʒ. i. statim cessavit dolor. Et postea exhibitum est purgans medicamentum ad reliquias materiæ morbificæ expellendas.

## OBSERVATIO LX.

*Asthma, peripneumonia, cordis palpitatio.*

**D**ie 8. Aprilis anni 1632. vidua Dn. de Scielory, civis Monspeliensis, cum paucis induta vestibus à lecto in fenestram transiisset circa mediam noctem, illicò correpta est magna respirandi difficultate, asthmatis paroxysmum æmulante, cum tussi, sputo cruento, febre, & faciei rubedine. Vocatus ego venam cubiti dextri aperiri jubeo, & detractis sanguinis ʒ. viii. statim spirandi difficultas quievit. Postea clyster laxans injectus est, & julepus exhibitus ex aqua papav. rhoead. syrup. viol. sale prunell. & confect. de hyacintho.

Die 9. horâ decimâ ante meridiem, eam iterum inviso, & invenio febrientem, tussi laborantem, & sanguinea sputa excernentem; tum pondus grave sentiebat in medio pectoris, cum ardore interno & puncturis, in variis thoracis locis. Impero phlebotomiam ex brachio sinistro, clysteris ac julepi iterationem, inunctionem pectoris ex oleo violaceo, syrupi violacei usum frequentem. A venæ sectione statim levata, & sensus ille ponderis & ardoris in thorace valdè imminutus. Horâ quinta vespertina ejusdem diei, cum existimarem à partibus inferioribus vapores & humores in thoracem transferri, quod Orthopnoea illa satis indicabat, præscribo missionem sanguinis ex sapphena; ex qua etiam melius habuit. Nocte sequenti iteratus est julepus prædictus, parum dormivit.

Die 10. mane melius habuit, febris, & reliqua symptomata valdè remissa. Circa horam tertiam vespertinam, levem refrigerationem extremorum passa est, cum sudore levissimo in pedibus & volis manuum: inde febris aucta, pulsus valdè oppressus, & gravitatis sensus in thorace plurimum auctus. Vocatus est in consilium Dn. Ranchinus Cancellarius, qui censuit hunc affectum esse pleuritidem anteriorem, ex inflammatione mediaſtini. Et ex communi consensu missus est sanguis ad ʒ. vii. ex brachio dextro, unde etiam melius habuit. Reliqua remedia continuata, tum etiam frictiones, ligaturæ, & cucurbitulæ in partibus inferioribus frequenter celebrabantur.

Die 11. quæ erat tertia morbi, commotus iis quæ observaveram in alio morbo ejusdem ægrotantis, qui fluxu alvi tenesmode, & catarrho in pectus vicissim affligebatur, ita, ut quoties alvus resistebat, catarrhus graviter affligeret; & fluxu alvi redeunte, statim catarrhus cessaret facta palindrome ad intestina, humoris in pectus defluentis, censui purgationem ipsi fore utilissimam, quam in hunc modum compono.

ʒ. Fol. buglossi & lactucæ ana M. i. tamarind. ʒ. β. liquiritiæ ʒ. iii. flor. violar. p. i. coquantur ad ʒ. iv. in colaturâ dissolve rhab. in aqua buglossi cum fantalo citrin. infusi ʒ. i. mannæ & syrupi rosacei an. ʒ. i. fiat potio, quam sumpsit manè, & multa pituitosa, serosa, acria, foetidaque excrevit. Nihilominus exacerbatio circa vesperam rediit, ut die præcedenti: attamen pulsus non erat oppressus ut antea, & gravitas pectoris minor. Sed dolorem percipiebat circa claviculam dextram, qui etiam tactu exasperabatur, nox ferè infomnis, emulsionibus frequenter utebatur.

Die 4. morbi, & mensis 12. cum manè febris, & dolor ad claviculam perseverarent, iterum vocatus est in consilium Dn. Ranchinus, præter dicta symptomata autem maximam palpitationem cordis patiebatur, quæ etiam palpitatio apparuerat in hypochondrio dextro, tum etiam in latere dextro; sed exiguo tempore. At in regione cordis permanebat, & instar mallei violenter percutiebat. Iterum aperta est vena brachii dextri, præscripta inunctio partis dolentis, & remedia ad inferiora revellentia. Circa vesperam rediit exacerbatio, cum palpitatione perseverante. Post aliquot horas parum sudavit toto corpore, unde aliquantulum levata est, At palpitatio & febris eadem. Cum suspicio esset, vapores ferri ab utero; præscripta sunt clyster hystericus, frictiones, ligaturæ, & cucurbitulæ partibus inferioribus; Emplastrum hystericum umbilico, & Julepus ad sudorem juvandum, ex aquis scabiosæ, & cardui bened. cam. lapid. bezoard. & aquæ naphthæ ʒ. β. ratione uteri. Nocte alvuster copiosè dejecit foetida & corrupta. Post mediam noctem placidè dormivit usque ad matutinum.

Die 5. morbi mane eam invenio cum exigua febre, sine ulla pectoris oppresseione aut dolore, & cum exigua cordis palpitazione. Circa vesperam parum sudavit, & paulò melius habuit. Post rejectum clysterem, cordis palpitatio aucta est, febrisque intensior evasit. Nocte mediocriter habuit.

Die 6. omnia eadem, vesperi adnotæ cucurbitulæ scarificatæ cum fructu.

Die 7. menstrua copiosè fluere cœperunt, unde omnia symptomata fuere valde remissa.

Die 8. melius habuit.

Die 9. levis alvi fluxus tenesmodos, quo pituitosa pauca ejiciebat: & ante illum fluxum, per vomitum rejecit multa.

Præparabantur humores aperientibus temperatis.

Die 10. quæ erat 18. mensis, alvi fluxus minor, vespere omnino substitit, febris nulla. Inde omnino convaleuit.

Die 29. ejusdem mensis Aprilis, cum optime se habere videretur, & negotia domestica ageret, sedens in sella, subito in terram concidit exanimis, & verè mortua.

Aperto cadavere inventum est mediaſtinum plenum sero sanguineo, quod forte rupta membrana versus partem superiorem pulmonis, eumque atque asperam arteriam comprimens, subito eam suffocaverat. Præterea inventa est pulmonis universa substantia repleta materia purulenta, & gravitate insigni prædita, tum etiam testiculus sinister exigui ovi magnitudinem æquabat, colore nigricante eoque aperto, substantia illius spongiosa, nigra & veluti gangræna affecta, visa est. Imò verò, statim ab apertione, excidit è testiculi medio materia quædam nuclei instar, & grumo sanguinis putrefacto simillima. Inde oriri conjecimus affectus hystericos, quibus erat valde obnoxia; Imò verò, forsitan cordis palpitatio inde oriebatur, à tetris nempe vaporibus ab ea parte elevatis.



## OBSERVATIO LXI.

*Ex abortu symptomata.*

**C**larissima uxor Dn. Desgardies die 28. mensis Mart. anni 1632. abortum passa est, quo secundinas primum cum multo sanguine excrevit, unde summa virium imbecillitas ad extremum periculum eam deduxit. Sedato sanguinis profluvio, die sequenti foetum exclusit. Erat autem quatuor mensium, postea convalescere visa est, & mediocriter purgabatur. Attamen foetor insignis & cadaverosus apparebat in iis, quæ purgabantur. Die septimâ, febre intensâ correpta est, & placentam illam carneam, quæ jecur uterinum nominatur, excrevit admodum foetentem, sanguine atro plenam; unde postea sensim convaleuit.

Idem contigit Dominæ de Laroche quæ die 15. Aprilis ejusdem anni, cum gravida esset à quatuor mensibus, abortum passa est, & foetum cum membrana exclusit, unde omnino liberata credebatur. Attamen febre intensâ postmodum laborabat, cum horrore frequenti, & animi defectibus. Tum purgamenta foetidissima cum thrombis & carunculis exercebat. Die septima placentam illam integram excrevit, eamque foetidissimam: unde melius habere coepit, ac sensim convaleuit.

Hæ duæ historiæ docent, purgamenta uteri, foetorem cadaverosum referentia, ut plurimum significare aliquam secundinarum portionem in utero restitisse.

## OBSERVATIO LXII.

*Scabies.*

**Q**uidam adolescens famulus Dn. Grasseti Judicis regii, foeda scabie torquebatur, cum furunculis frequenter emergentibus: à quibus affectibus liberari nequiverat venæ sectionibus & purgationibus multis, intra sex menses per intervalla usurpatis. Tandem ei exhibetur Mercurii dulcis ℥. i. cum diagrid. ℥. β. quibus optimè purgatus est, & à foeda illa scabie intra paucos dies liberatus.

## OBSERVATIO LXIII.

*Ventris dolor.*

**U**xor Dn. de la Faverie, postquam icterum aliquandiu passa esset, à quo imperfectè curata fuerat, incidit in febrem tertianam diurnam, eaque soluta, febris lenta permanebat cum exacerbationibus tertianis, & hepatis duritie. His successit dolor atrocissimus, primo insultu regionem hepatis infestans, postea verò totum ventrem occupans, præcipuè verò uteri regionem, cum purgationes menstruas valde imminutas pateretur. Injecti fuerunt clysteres, fomenta, & linimenta admota, quibus dolor valde imminuebatur, ac præcipuè exhibitio pulveris, ex sulphuris 3. β. cum nucis moschatæ 5. i. confecto, ab alio Medico seniori, me absente, præscripto, quem fecreti instar celabat. At neque sublati omnino dolor, & brevi iterum rediit, non minori vehementia, ut jam in vitæ periculo constituta ægrotans videretur. Prædictis remediis frustra iteratis, sequentes pilulæ à me præscriptæ fuerunt die 19. Julii anni 1632.

℥. Aloës foccot. ℥. ii. Laudani opiat. gran. iii. diagryd. gran. vi. formentur pilul. vi. quas postquam deglutivit agra noctis initio; per horam dormivit, & expectata, se à dolore omnino liberam professâ est. Nocte mediocriter dormivit, multum sudavit, manè optimè habuit, doloris & febris expers. Nullo modo purgata est; sed matutinis horis clyster injectus, à quo multa dejecit excrementa, eoque singulis diebus per triduum iterato, dolor non amplius rediit.

## OBSERVATIO LXIV.

*Fluxus hepaticus, Dysenteria.*

**Q**uidam pistor dysenteriam passus per duos menses, incidit tandem in fluxum hepaticum, quò multum

sanguinis diluti emittebat, sine aliis humoribus, cum febre, & virium dejectione summa, unde brevi moriturum æstimantes proximi, Theologum & Tabellionem vocant. Vocatus etiam ego Laudani gr. i. exhibeo circa vesperam, & intra horam fluxus cohibitus est, nec nocte dejecit usque ad meridiem sequentem, in quo fluxus rediit, sed minimè sanguineus, erat enim tantum biliosus; vesperi tamen aliquid sanguinis permiscebatur. Eadem die manè detractus fuit sanguis ad 3. vi. in duobus vasculis quorum posterius habebat sanguinem fervidum & spumantem. Præscripti sunt julepi refrigerantes & adstringentes, epithemata, unguentum hepatis refriger. tinctura rosarum, pro potu ordinario. Hæc agebantur die 14. Augusti, anni 1623. Nox sequens fuit satis molesta & insonnis, cum pluribus dejectionibus biliosis, & interdum sanguineis. Die verò 15. sumpsit potionem ex rhab. tamarind. & myrobolan. in decocto refrigerante & adstringente, quâ multum purgatus est tota die, & admodum debilitatus. Vesperi reiteratum laudanum, & statim alvi fluxus cohibitus est; nocte tamen nihil dormivit. Manè præscript. est fons adstringens ex rad. & herbis, aliisque, sacculis inclusis, & vino rubro & aceto decoctis, toti ventri admoveendus: Item julepus ex succo portulacæ, plantag. & forborum; tum pulvis roborans & adstringens, in jusculis & panatellis usurpandus, & 24. horarum spatio omnino sanatus est.

## OBSERVATIO LXV.

*Hysterica Passio.*

**U**xor Dn. Moureti, in curia præsidiali procuratoris, correpta est die 15. Augusti anni 1623. nausea frequenti, qua parum pituitæ magno conatu rejiciebat, cordis dolore, & febre quadam, quæ pluries in die redibat & occultabatur. Tum menstrua apparuerunt ante tempus consuetum. Censeo eam laborare ab utero, & præscribo clysterem hystericum, emplastrum de galbano, & potiunculam ex aquæ naphthæ 3. ii. cum gr. iv. castorei. His nihilo melius habuit; imò verò fluxus mensium cohibitus est. Die secunda, cum nausea urgeret, exhibeo potionem ex sale vitrioli, qua ingentem pituitæ viscidæ copiam evomit cum maximo labore. Tertiâ, jubeo aperiri venam malleoli, inde multum levata est. Sed quarta die animi defectibus & languoribus afficiebatur, ut se vapores ad cor ascendentes percipere affereret. Aperta est vena alterius malleoli sine fructu. Quintâ die exhibita est potio sequens, hystericis convenientissima.

℞. Moschi & sang. draconis ana gr. xiii. aquæ naphthæ 3. iv. fiat potio.

Hoc remedio maximè levata est, & tota die melius habuit. At sexta die redeunt symptomata, quibus etiam septima die plurimum vexata est. Octava sumpsit pilularum foetidarum 3. i. quibus optimè purgata est, & tam bene se habuit, ut nullis aliis remediis opus fuerit.

## OBSERVATIO LXVI.

*Dysenteria.*

**F**lliulus Dn. Dorthes bimulus dysenteria contumaci laborabat, post multa alia remedia frustra usurpata, exhibui extracti corallorum ℥. β. cum aqua plantag. & eadem die fluxus cohibitus est.

## OBSERVATIO LXVII.

*Colicus dolor.*

**Q**uidam Aulicus, dum Rex Monspelii esset, die 2. Octobris anni 1632. incidit in colicum dolorem gravissimum, ad cujus sublationem primo injectus est clyster emolliens & purgans, postea carminans & evacuans, cum therebinthina quo levatus est; sed brevi dolor rediit. Tandem in decocto carminante dissolvi jubeo aquæ benedictæ 3. iv. diaphenici 3. i. à quo quater dejecit pituitosa multa, & omnino liberatus est.

Ppp 3

Eodem



Eodem clystere Dn. Verchand, civis Monspeliensis, prope divum Firminum, ante duos menses, à simili dolore liberatus fuerat.

## OBSERVATIO LXVIII.

*Hepatis durities cum cachexia.*

**D** Omina de la Faverie post morbum supra descriptum, observ. 33. laborabat cachexia cum duritie hepatis palpabili, sequentibus pilulis usa per 20. dies perfecte restituta est.

℞. Chalybis præp. cum sulph. ʒ. ʒ. aloës optimæ, senæ mundat. agaric. troch. & rhab. elect. ana ʒ. j. pulv. diarrhod. abbat. ʒ. ʒ. croci ʒ. ʒ. cum syrupo rosar. solut. fiat massa pilular. de qua capiat ʒ. i. singulis diebus manè, leviter deambulando, & post tres horas capiat jusculum, in quo folia & rad. petrosel. bullierint.

Quia hæ pilulæ non purgabant; bis aut ter addita sunt uni dosi diagrid. gr. iv.

## OBSERVATIO LXIX.

*Affectio hysterica æmula.*

**U** Xor Dn. Salgues mercatoris Monspeliensis, per multos dies conflictata est dolore, circa regionem hepatis graviter infestante, cum levi lipothymia & faucium constrictione quadam, atque vomitibus pituitosis, per intervalla recurrebat dolor & interdum ad alias abdominis partes exporrigebatur. Tanta interdum animi defectio eam corripiebat; ut brevi moritura videretur. Cum affectio hysterica putaretur; remedia ipsi congrua usurpabantur, à quibus aliquando levabatur, sed omnia symptomata postmodum recurrebant. Tandem balneis, fotibus, & clysteribus usa, per alvum excrevit materiam quandam pilulosam, compactam, & latam, fasciæ instar, palmi magnitudine; postea verò, per aliquot sedes, materiam mucosam, ac postmodum omnino sanata est.

## OBSERVATIO LXX.

*Hydrops.*

**J** Uvenis quidam 25. annos natus coquus Dn. Marchionis de Varennes, post febrem continuam, & intermittentem, incidit in hydropem tympanitem, cum non exigua aquarum copia conjunctum. Post multa remedia & purgationes frequentes, quarum beneficio multum feri & flatuum copiam emittebat, & venter imminuebatur, atque iterum spatio 24. horarum in pristinam amplitudinem redibat, tandem sequentibus duobus remediis, per 15. dies usurpatis, convaleuit.

℞. Rad. eryngii, rubiæ tinctorum, apii, petrosel. cortic. rad. capparum, mediani fraxini, & tamarisci ana ʒ. i. rad. asari. ʒ. i. fol. agrim. ceterac. capil. ven. chamædr. hyperic. absinth. & centaur. min. ana m. i. sem. dauci & petrosel. maced. ana ʒ. ʒ. coquantur ad quart. v. in duabus partibus aquæ, & una vini albi, sub finem additi. In colatura dissolve syrapi de cichorio compos. ʒ. iiii. fiat apozema pro iiii. dosibus iratusinis, addendo unicuique dosi spiritus diurectici ʒ. ʒ. spiritus virioli ʒ. i.

Post tertiam vel quartam dosim apozematis, purgabatur cum mercurii vitæ g. vi. scammonii gr. x. quibus vomitus non provocabatur.

Alterum remedium erat cataplasma ex rad. cucum. agrest. cum pulvere cumini paratum, cujus descriptio habetur in praxi medica nostra cap. de hydrope.

## OBSERVATIO LXXI.

*Variolæ cum dysenteria.*

**P** Uer quinque annorum, filius Magistri Limonfini pictoris, variolis prehensus tertio die alvi fluxu cruento

corripitur, cum frequenti egerendi conatu; pituitosa, & mucosa excernebat, cum magna sanguinis copia. Exanthemata erant parva, alba, & depressa. Ad eum vocatus, sequentia præscribo.

℞. Rosar. rubr. p. i. fantali rubr. ʒ. ʒ. liquiritiæ rasæ & passularum integr. ana ʒ. i. coquantur in jusculo capitis vervecis, in colaturæ quartar. tribus dissolve confect. de hyacinth. ʒ. iij. conservæ rosar. per setaceum trajectæ ʒ. ʒ. vitell. ovi num. i. fiat clyster frequenter injiciendus.

℞. Aquar. scabios. & card. bened. ana ʒ. i. ʒ. syrapi de rosis siccis ʒ. i. corall. præp. & margaritar. præp. ana ʒ. ʒ. lapid. bezoard. gr. iij. confect. de hyacinth. ʒ. ʒ. fiat julep. qui detur bis in die.

℞. Olei scorpionum Matthioli ʒ. ʒ. illinantur inguina & axillæ calidè, frequenter.

Bis injecto clystere, & bis sumpto julepo, cessavit prorsus alvi fluxus, & exanthemata validius erumpere cœperunt, ac postmodum morbo placidè defunctus est ad perfectam sanationem, ut nostro amplius auxilio non indiguerit.

Quamvis vulgaria sint remedia proposita; hic tamen casus observationem meruit, propter eventum non vulgarem. Ex omnibus enim pueris; variolis laborantibus, quos mihi tota vita videre contigit, hic unicuique fuit, qui ex alvi fluxu sanguineo evaserit; Nam in cæteris certum mortis præsagium fuit, magnâ præsertim sanguinis copia effluente.

## OBSERVATIO LXXII.

*Pleuritis maligna.*

**U** Xor D. Argelies Frontinianensis, circa finem mensis Martii anni 1633. laborabat pleuritide dextrâ, eaque gravissimâ. Die septimâ circa finem & initium octavæ, subito correpta est palpitatione cordis adeo gravi, ut Medicus illius ordinarius extremos esse naturæ conatus arbitraretur, eamque brevi morituram palam pronunciarit. Nos verò à putrida aliqua materia evaporante, in ventre inferiori contenta, hujusmodi palpitationem procedere censuimus. Eventus rem indicavit; nam post duas horas ægra bis alvo ejecit valdè foetida, & ab hujusmodi palpitatione liberata est. Periculi suspensionem afferebat, quod affectus intra septem dies nullis remediis, nedum frequenti venæ sectione imminutus fuerat. Licet autem symptomata imminuta apparerent; die undecimâ parotis apparuit, quæ postero die delituit, & 13. mortua est. Unde apparuit pleuritidem fuisse malignam, vel potius febrem malignam, pleuritide comitam.

## OBSERVATIO LXXIII.

*Pleuritis spuria.*

**C** Irca idem tempus ancilla Domini Germain, civis Monspeliensis laboravit dolore lateris pungitivo, cum tussi & sputis albis, quæ tamen bis aut ter cruenta apparuerunt, melius decumbebat in latus dolens, quod erat dextrum. Erat autem febris experts, quod significabat non esse veram pleuritidem, cum inflammatio talis non posset esse sine febre acuta. Septimo die morbi, cum dolor nunquam intermisset, sanguinis sputum apparuit copiosum per aliquot horas, cui successit fluxus mensium; cui integra morbi solutio successit. Causam hujus affectus censui serosum quendam humorem acrem, in latus per venas translatus, qui dolorem efficiebat sine inflammatione. Qui serosus humor exagitatus die septimo aperuit quasdam venulas, unde contigit sanguinis sputum. At vincente natura, & serosam illam materiam amandante ad venas uteri, facta fuit morbi solutio.



## OBSERVATIO LXXIV.

*Paralysis, convulsio, & affectio hypochondriaca.*

**D**N. Fouquetus, Medicus Frontinianensis, passus est autumnno prægresso febrem tertianam duplicem valde diuturnam, quæ ad hyemis initium perduravit anni 1633. Is erat temperamento melancholico donatus, annum agens quadagesimum, usus est tempore Quadragesimæ pravis eduliis, præterea animi pathematis admodum gravibus affectus est. Post festum Paschatis laborare cœpit catarrho, in omoplatam sinistram decumbente, ubi dolor excitabatur. Post aliquot dies incidit in motus & sensus imminutionem dolorificam ferè omnium partium, præcipuè verò tibiæ atque femorum; præterea tensiones dolorificæ per intervalla contingebant iisdem partibus ut digiti pedum contraherentur, & muscoli juxta inguina chordarum instar tensa apparerent. In partibus superioribus, brachiis præsertim, motus erat liberior. At in omnibus partibus sensus obtusus; ut in naso & facie se parum sentire affirmaret. Per os excernebat humorem tenuem, quem ipse ager dicebat saporem acrem & acerbum præ se ferre, instar vitrioli; singulis diebus febris exacerbabatur, & in exacerbatione tensiones musculorum fluxio, & alia symptomata intendebantur, nec non pectus admodum coarctabatur, ut suffocari videretur. In morbi principio bis phlebotomia usurpata, & toties purgato corpore ad thermas Balerucanas se contulit; ubi quater merfus est in balneum per quadriduum, & caput lavit sine ullo fructu. Regressus è thermis, usus est nostro consilio. Judicavimus autem hunc affectum procedere ab humore seroso, à cerebro in spinam medullarem & totum genus nervosum confluentem: illius autem ferosi humoris collectionem fieri prius in hypochondriis, præsertim venis mesaraicis, in quibus continetur humoris melancholici copia, ex causis prægressis. Ita ut hunc affectum ad hypochondriacam affectum nem referendum esse censuerimus, cujus symptomata essent illa paralysis, & convulsio imperfecta, à seroso humore in dictas partes effuso progenita. Quod indicabat tum agrotantis constitutio melancholica, tum copiosus ejusdem humoris effluxus per os, tum febris, qua propemodum assidue tenebatur, & ingravescente febre, omnia symptomata intendebantur; cum tamen paralysis à pituita oriundæ febris soleat esse remedium. Talia autem symptomata ex humore melancholico contingere, refert Sennertus, agens de affectu hypochondriaco, & de scorbuto. Non est hæc paralysis propriè dicta, quæ sit affecto nervorum principio: sed abusive sic appellata, quæ non totalis est sensus motusque privatio, ob denegatum animalis spiritus per nervos influxum; sed potius functionis sensitivæ & motivæ depravatio, quia dolorificus sensus adest.

Præscripsimus ipsi apozema ad plures dies, ex aperientibus temperatis, alternis diebus purgans, & alternis tantum alterans. Fotum hypochondriis emollientem, & aperientem, linimentum ejusdem facultatis, tum venæ sectionem post primam dosim apozematis, præmisso clystere, & purgante medicamento. Pro potu utebatur infuso corticis tamarisci, agrimonie, & pimpinellæ. At cum sanguis detractus valde cacochymus videretur, iterum detractus est. Ex reliquis remediis nullum percepit solatium; sed morbus in pejus ibat.

Die 24. mensis Aprilis, eum iterum invisi, eumque inveni infractis admodum viribus, cum febre assiduâ lenta, quæ tamen tertianæ paroxysmos habebat. In quibus hypochondria per intervalla ex flatibus intumescabant; præcipuè verò lien. Aliquando etiam ab iisdem flatibus ita comprimebatur diaphragma, ut se suffocari clamitaret: epoto aquæ cyatho, ructus duos, aut tres edebat, ac confestim ab illa suffocatione liberabatur. Urinis innatabat aliquid pingue, instar telæ araneæ, & sedimenta earum erant farinacea, quæ quidem urinæ lethales sunt ex Hippoc. progn. Die intermissionis laborabat pyralismo frequenti, & humorem intra cranium & cutem, aut musculos faciei deferri sentiebat.

Die 29. Aprilis, eum iterum invisi ad extrema redactum pulsus erat minutulus, pyralismus cohibitus, respiratio oppressa. At mente constabat. Die sequenti manè obiit.

## OBSERVATIO LXXV.

*Dolor pleuriticus ex lumbricis.*

**C**irca finem mensis Aprilis, anni 1633. filia Raymundi Michaelis Frontinianensis, annos octo nata, laborare cœpit tussi & febre, quibus successit lateris dolor, ita ut pleuritica censeretur. Attamen quinta die morbi, tres aut quatuor lumbricos excrevit per clysterem, ac diebus sequentibus quamplures, tum exhibitis medicamentis lumbricos expellentibus, tum purgante medicamento, & ita curata est. Unde patet vapores ex materia putrida (à qua lumbrici generantur) elevatos, dolores lateris & tussim, aliaque symptomata producere, quæ pleuritidem mentiuntur.

## OBSERVATIO LXXVI.

*Tumor strumofus.*

**D**ie 6. Junii anni 1633. D. de Gaian ad nos adduxit filiam suam 13. annos natam temperamento sanguineo præditam, quod ex colore subrubro faciei apparebat, & ab undecimo ætatis anno menstruas purgationes patiebatur. Cum ab octo mensibus fluxio quædam in partem faciei dextram decubisset, paucis postea diebus decedit in cervicem, ita ut glandula illius loci paululum tumefacta apparuerit. Ab eo tempore tumor sensum increvit, ita ut jam ovi asinerini magnitudinem superaret. A præsentibus Medico & Chirurgo, per duos menses multa præstita fuerunt remedia, purgationes, decocta sudorifica, causticum inustum; tum parti admota remedia, primum resolventia & emollientia, postea suppurantia & attrahentia validissima quibus nihil profectum est, imò contra tumor antea exiguus incrementum suscepit. Nos verò consilio inito cum Dn. Delort Universitatis Decano, & Magistro Thierry Haguenot, Chirurgo seniori, primum eam misimus ad thermas Balerucanas, ut iis uteretur in potu, balneo, & capitis embrocatione. Postea verò sequentia præscripta sunt.

Pulvis Arthriticus addito zinzibere sumendus singulis hebdomadis. Venæ sectio post primam dosim pulveris.

Fotus ex spongia in aqua calcis expressa, & arctè alligata per decem dies: Suffumigium ex lapide pyrite extincto in aceto fortissimo, bis in die acceptum per infundibulum, cujus tubulum totum tumorem contineat.

Post suffumigium, emplastrum de vigo, quadruplicato mercurio, cujus singulis uncis addatur vitriol. romani 5.i.

Bochetum falsæ parillæ per longum tempus, sine vino.

Infusio ad bronchocele, in pharmacopœa Quercetani descripta, tempore plenilunii usurpanda.

Aquæ Meynenses per mensem, pro potu & fotu partis, bis in die; postea emplastrum prædictum, ex eadem aqua paratur bochetum.

Victus continuò exsiccans.

Post reditum ab aquis Meynensibus, si tumor non fuerit discussus, aperiendus erit caustico.

Omnibus remediis usæ est, exceptis aquis Meynensibus, quia cum reliqua nihil profecissent, imò tumor incrementum suscepisset, non fuit speranda salus ab hujusmodi aquis, sed ad apertionem statim veniendum censuimus, quæ fuit celebrata die 29. Septembr. 1633. cumque admoto caustico, supra escharam facta fuisset incisio scalpelli ministerio, illicò erupit aqua tenuis & limpidissima, instar aquæ fontanæ, ac tumor statim subsedit, ad planitiem parti suppositæ propemodum æqualem, quod nobis admirationem peperit, & observatione dignum censuimus. Similes enim tumores ab aqua productos, præter hydroceles, & hydrocephalos à nemine Authorum descriptos existimo.



stimo. Decem aut duodecim horis ab apertione, correpta est febre acuta, & magna fluxio facta in partem cum inflammatione. Tertia die cessavit febris, post venæ sectionem bis factam, & purgationem: cataplasma de mica panis tumori admotum, paululum subsedit, & pus quoddam pituitosum effluebat. Decimâ tertiâ die ab apertione, decisâ antea escharâ, exivit per ulcus cystis integra, instar sacci verè membranosa, & paucis postea diebus curata est.

## OBSERVATIO LXXVII.

*Lues venerea.*

**J**Uvenis quidam biliosus ac melancholico temperamento præditus, luë venerea infectus, mense Junio anni 1633. aggressus est diætâ sudorificam, eaque peracta frictiones ex unguento mercuriali celebratæ fuerunt. Post secundam frictionem, cum pyralismus ritè procederet, subito correptus est contractione brachiorum & tibiarum, cum tensione ingenti abdominis, & suffocatione, subitoque pyralismus cessavit. Frictiones vehementes celebratæ sunt in partibus contractis; aqua imperialis & cinnamoni exhibitæ, quæ nihil præstiterunt. Postea aquam nostram theriacalem, ex spiritu vini conflatam, exhibuimus, à qua plurimum levatus est, & injecto clistere acri paroxysmus desinit. Post biduum, cum parum spueret, admotæ fuerunt emplâstra mercurialia tibiis, femoribus, & brachiis quæ intra 24. horas sputum satis copiosè promoverunt. At æger in prædictum paroxysmum incidit. Cum verò frictiones celebratæ fuissent, & prædicta aqua exhibitæ, tum clyster injectus qui non poterat ejici; suppositoriis nullo modo levabatur, sed omninò suffocari videbatur. Nos alium clysterem acriorem ex diaphœnici & hieræ ana ʒ. ii. injici curavimus, quem secuta copiosa est evacuatio, & æger à paroxysmo liberatus est. Sequenti die, præcedenti pyralismo, iterum in eundem paroxysmum incidit, cæteris multò graviolem, nam nec aqua theriacali, nec clysteribus iteratis, quibus etiam multum dejecerat, potuit sedari. Tandem cum ab initio censuissem hæc symptomata ex eo provenire, quòd excrementorum colluvies, superiora petens, in ventriculo colligeretur, & non posset per os expurgari ob sui crassitiem, vel facultatis expultricis imbecillitatem, & magnâ copiâ cumulatâ, ac malignitate prædita, ventriculi orificium vellicaret, unde ortæ convulsiones per consensum generis nervosi; Tum etiam prædictâ materiâ à calore exagitâ multi vapores elevarentur, qui ventriculum distendentes, diaphragma comprimerent, unde suffocatio, & tensio abdominis sequebatur: Ventriculum esse vacuandum judicavimus, prompto & potenti remedio. Atque in hunc finem exhibuimus salis vitrioli ʒ. i. in aqua dissolutam, qua intra horæ quadrantem humoris pituitosi, viscidî, & crassî, cum melancholico permixti circiter lb. ii. rejecit, & statim à paroxysmo liberatus est; Postea continuavit pyralismus per multos dies; sine alio symptomate, sicque integre liberatus est.

## OBSERVATIO LXXVIII.

*Lues venerea.*

**A**Me curata est in pluribus decocto, ex sudorificis & purgantibus, per xx. dies usurpato. Si hæc non sufficerent; ad frictiones ex unguento mercuriali veniebam. Multi in media hyeme, hoc solo decocto curati sunt, quibus diætâ sudorifica administrari non poterat, propter aeris inclementiam.

## OBSERVATIO LXXIX.

*Pleuritis in empyema degenerans.*

**F**ilius Dn. de Calvies, apud Nemaufenses litium capitalium Judicis, 20. annos natus, incidit Monspelii

circa medium mensis Maji, anni 1633. in pleuritidem sinistram, quâ ita detinebatur, ut in neutrum latus posset decumbere, sed tantum supinus jaceret. Hic multa remedia fuere præscripta ex consilio trium Medicorum, & decies aut ultra phlebotomia celebrata; attamen affectus diù perseveravit, quamvis dolor lateris aliquando cessare videretur, & æger in utrumque latus sese converteret. At febris permanebat, & dolor lateris redibat. Producta fuit febris usque ad diem trigessimam quintam, quâ latus aliquantulum intumescere visum est, & ad tactum dolebat, nonnullo rubore suffusum. Judicatum fuit, pleuritidem in empyema converti, & admotæ fuere cataplasmata suppurantia, quibus latus paulò magis intumuit. Sexto aut septimo ab hinc die, cum apertio lateris nimium procrastinata fuisset, quæ apparente lateris tumore statim fieri debuerat, ruptus fuit abscessus ad interiora. Attamen æger pus facilè excrevit tussiendo, quod laudabile apparuit, & minimè foetidum, magnâ copia, singulis diebus excernebatur prinò purum, postea multa pituita permixtum. Post ruptum abscessum, in utrumque latus facilè convertebatur, febre perseverante, cum antea non posset converti in latus sanum, quia pondus insigne sentiebat in latere dolente, quod signum notatur ab Hippoc. in prognosticis. Octiduo elapsò à ruptionis die, purulenta excretio desinit, & solam pituitam rejiciebat. Tum pondus in eodem latere iterum sentire cœpit, ut ad latus sanum converti non posset, nec non elevatio in parte lateris externa iterum apparuit. Novam collectionem in latere factam esse censui, & prompta apertione indigere, ne iterum profusa materia in thoracem, pulmōni laborem novum efficeret, unde phthiseos periculum immineret. Cum tamen alii Medici duo, cum duobus Chirurgis, sententiæ meæ assentiri noluisent, & mater illius discessum urgeret: Nemaufum translatus est, ubi tandem empyema apertum est, canthico lateri admoto, & pus diutissime ab ulcere manavit, ac tandem æger integre curatus est.

## OBSERVATIO LXXX.

*Lochia suppressa.*

**M**ulier quædam plebeia, gravida octimestris, correpta est febre continua, die 5. Julii, anni 1633. Tertia die febris abortum passa est, & à partu lochia omnino suppressa sunt, maculæ purpuræ in toto corpore apparebant, præcipuè circa cervicem; febris erat intensâ. Præscribo sectionem venæ malleoli, & julepos, ex aperientibus frigidis compositos, frictiones partium inferiorum, fots & linimentum relaxans pubi & perinæo: Ex his nullus fructus apparuit, imò sub finem secundi ab abortu diei, febris admodum exacerbata est, ut delirium pateretur, & facies valdè immutata esset, unde in summo vitæ discriminare ægram versari, nemo non videbat. Tunc venam brachii aperiri jubeo, & sanguinem mitti ad Unc. x. qui fuit valdè corruptus. Erat circiter hora quinta vespertina, jubeoque, ut venæ sectio iteraretur post horas quatuor, scilicet circa horam nonam. Præscribo julepos valdè refrigerantes ex decocto lactucæ, portulacæ, acetosæ, cum sale prunellæ, clysterem pariter refrigerantem mollientem: quibus remediis ita adjuta fuit, ut sequenti die febris valde exigua apparuerit, lochia fluere inceperint, & paucis diebus sine aliis remediis omninò convalesceret.

## OBSERVATIO LXXXI.

*Urinæ suppressio à caruncula virgæ.*

**L**ictor quidam Senatus Divionensis, cum esset Monspelii negotiorum causâ, die 7. Julii, anni 1633. incidit in urinæ suppressionem, ex caruncula virgæ, tumefactâ à coitu immodico. Chirurgus, quem primum vocavit, catheterem immittens, magnam sanguinis profusionem excitavit; vulneratâ parte, & nihil urinæ excrevit; sed æger gravissimis doloribus & mingendi contractibus preme-



premebatur. Vocatus ego, præscribo phlebotomiam ad  $\mathfrak{z}$ . xii. quia erat sanguineo temperamento præditus; clysterem emollientem & refrigerantem & semicupium subtepidum, injectionem refrigerantem, & inunctionem renum pubis, & perinaei, etiam refrigerantem, erat hora nona vespertina, tum jubeo, ut circa mediam noctem iteretur venæ sectio, quæ omnia præstita fuerunt. Manè erat in eodem statu; summos meiendi conatus patiebatur, & nihil emittebat, nisi guttulas iii. vel iv. urinæ, singulis conatibus. Iterum vocatus præscribo vomitorium ex salis vitrioli  $\mathfrak{z}$ . i. cujus ope bis evomit pituitosa multa; At in secundo vomitu urinæ  $\mathfrak{z}$ . i. vel ii. emisit, & sublevatum se dixit; quod hæcenus non contigerat. Inde per intervalla urinam paulò copiosiore excernebat, ita ut intra quatuor vel quinque horas vesica omnino depleta fuerit. Supererat partis affectæ inflammatio quædam, quæ emulsionibus cum sale prunellæ, injectionibus, clysteribus, semicupio & inunctionibus curata est.

## OBSERVATIO LXXXII.

*Difficultas spirandi.*

**F**ilius D. Hugonis; Mercatoris Monspelienfis, quinque annos natus, cum malè educatus fuisset à nutricibus, inter varia symptomata hoc præcipuè pati solebat, ut cum curreret; aut vehementius moveretur, spirandi difficultate laboraret. Tandem die tertia Julii, cum ab exercitio multum incaluisse, incidit in tussim cum difficultate spirandi, febricula, & alvi fluxu mediocri in quo flava, pituitosa, & aliquando subviridia apparebant. Hæc tamen symptomata adeo levia erant, ut de vocando Medico parentes non cogitaverint; sed à pharmacopœo admotum fuerat vesicans posteriori cervici. Die quintâ morbi vocatus ego, eadem invenio symptomata, ex quibus fluxionem conjiciens in pulmonem, cum metu peripneumoniæ, phlebotomiam præscribo, quæ non fuit celebrata, ex eo quod Chirurgus venam attingere nequiverit; sed cucurbitulæ scarificatæ statim fuerunt admotæ, & julepus pectoralis refrigerans fuit exhibitus. Hæc circa meridiem fiebant. At hora vespertina subito æger correptus est lipothymia, à qua brevi excitatus est. Postmodum verò pulsus apparuit parvus, languidus, frequens & pulsibus morientium similis, venter admodumensus & dolens, respirandi aderat summa difficultas, & suis inexplabilis. Multa in hoc præcipui casu usurpata fuere remedia, vocato consilio, quæ nihil profuerunt; sed æger continuò in pejus ruens media nocte interiit. Aperto cadavere, partes naturales benè constitutæ apparuerunt, nisi quod cystis fellea grandior, & humore nigricante referta erat. Sed pulmonis pars sinistra diaphragmati hærebat tam firmiter, ut separari non potuerit, unde difficultatem spirandi ex parte provenire censuimus. Sinistra verò cordis auricula, solito amplior, referta erat materia crassa & compacta, omnino alba, lardum coctum referente, quam subitanæ mortis causam fuisse censuimus, cordis ventriculum sinistrum suffocando, & illius ventilationem impediendo.

## OBSERVATIO LXXXIII.

*Hæmoptoe.*

**D**ie 13. Augusti anni 1633. Dn. Duprat in curia Præfidiæ Monspelienfi Consiliarius, circa noctem incidit in sputum sanguinis spumosi cum tussi, & magnam illius quantitatem excrevit tota nocte.

Die 14. mane vocatus, venæ sectionem præscribo ad  $\mathfrak{z}$ . viii. deinde julepum ex aqua plantag. syrup. de ros. siccis & sale prunellæ. Postea injectus fuit clyster, cucurbitula admodum regioni hepatis, looch incrassans, & adstringens usurpatum. Hora decimâ iterata fuit venæ sectio ad  $\mathfrak{z}$ . vi. syrupus ex succo portulacæ etiam præscriptus. Post meridiem sanguinis sputum magnâ copâ, scilicet ad  $\mathfrak{lb}$ . i. iteratus fuit julepus, oxycratum admotum testibus,

*Lazar. Riverii Opera.*

epithema refrigerans hepatis, linimentum refrigerans eadem parti, & lumborum regioni, cucurbitula hypochondriis frequenter iterata; & circa vespertam sanguis denuo missus ex altero brachio ad  $\mathfrak{z}$ . vii. præscripti julepi ex infusione millefolii, rad. tormentillæ, & conservæ rosar. in praxi medica nostra descripti cap. de hæmoptoe, qui magnæ sunt efficaciar. Pro potu utebatur conserva rosarum, cum decocto hordei & liquiritiæ: ad noctem præscriptus est syrupus sequens.

$\mathfrak{z}$ . Syrupi de ros. siccis, de succo portulacæ, & papaveris albi ana  $\mathfrak{z}$ . i. misce, capiat cochlear unum singulis duabus horis, ita ut intra noctem tres illæ uncia absumentur. Mirum in modum profuit hic syrupus, & sequenti die, quæ erat 15. fuit iteratus, ut per longiora intervalla sumeret cochlear unum. Eadem die manè aperta fuit vena poplitis, & satis bona quantitas sanguiniseducta est, tum reliqua remedia fuere continuata, aliæque addita; ut opiata adstringens & conglutinans, & clyster denuo injectus. Toto illo tempore sanguinem non excrevit assatum, & sputa quæ per longissima intervalla extulsiēbat, erant sanguinea. Attamen difficultate spirandi laborabat, cum vocis raucedine. Sequentibus verò diebus nihil amplius sanguinis excrevit, & omnino convaleuit.

## OBSERVATIO LXXXIV.

*Gangræna.*

**V**ir quidam è plebe; febre continuâ laborans, ab imperito Chirurgo venâ apertâ, incidit in tumorem illius brachii, cum inflammatione, quæ tandem in gangrænam desiit, ita ut totum brachium livescens appareret. At in duobus locis color magis immutatus erat, in iisque scarificationes non sentiebat. Igitur post multas scarificationes admovebantur remedia ordinaria, quæ parum proficiebant, imò brachium in deterius vergebat. Ego tandem vocatus, locos scarificatos humectari jubeo spiritu sulphuris, quo caro mortificata exusta est, ac veluti cauterisata. Postea foveri jubeo totum brachium calidè spiritu vini, in quo pulveres aloë & myrrhæ infundebantur, postea inspergebantur toti brachio pulveres prædicti ex aloë & myrrha, magna quantitate, ac deinde supra pulveres admovebantur lintea, spiritu vini madefacta, quo remedio, per aliquot horas usurpato, brachium miraculi instar nativum colorem recepit, tumore imminuto; & gangræna fuit cohibita, ita ut sequenti die loca mortificata & exusta, à viva carne separari cœperint, quibus admotum fuit digestivum ex vitellis ovorum, terebinthinâ, & melle, ac post integram separationem, epuloticis curatio absoluta est.

## OBSERVATIO LXXXV.

*Dolor Nephriticus.*

**D**ie decimâ mensis Octobris anni 1633. Coquus Dn. de Miron, Regii Præfidi in Occitanica provincia, laborans à multis diebus dolore nephritico, qui vulgaribus remediis non cesserat, sumpsit bolum ex diaprun. solut.  $\mathfrak{z}$ . β. panacæ  $\mathfrak{z}$ . i. quo quater blande dejecit, eodèque tempore crassas urinas minxit, & à dolore liberatus est. Cum medicamentum operabatur, sentiebat materias sibi à renibus avelli, & sine dolore.

## OBSERVATIO LXXXVI.

*Colicus dolor.*

**P**incipio mensis Novembris anni 1633. Domina de Varanda doloribus colicis acerbissimis confictabatur, & post duos clysteres, frustra injectos, sumpsit intestini lupi pulverati  $\mathfrak{z}$ . i. cum vino, quod ipsi mense prægresso exhibitum fuerat pro eodem dolore, ut ex

Q. 99

obl.



obl. 59. hujus centuriæ constat, & statim dolor evanuit. Post decem aut duodecim dies, licet per apozemata purgata fuisset, dolor rediit acerbior quam antea; ac licet in clystere philonii 3. ii. dissolutæ fuissent, dolor non quievit. Prædictus pulvis iterum fuit exhibitus, & dolor imminutus est, ac post trium horarum spatium omnino ferè sublatus. Sed postridie rediit acerbior, quam antea. Exhibita fuerunt laudani grana v. & dolor omnino sublatus est, nec amplius rediit.

## OBSERVATIO LXXXVII.

*Ulcus in corde.*

**D**ie 23. Januarii, anni 1624. vocatus sum ad filiam Dn. N. annos 14. natam, quæ antea per multos dies laboraverat vomitu pituitoso semel aut bis in die invadente, horis præcipuè matutinis, cum cardialgia per intervalla affligente. Item patiebatur dolorem in summa scapula sinistra, & summitate brachii, qua humero committitur. Nocte insequente, quæ erat quinta à prima invasione, correpta est alvi fluxu & febre, quæ tota die eam detinuerunt. Sexta sumpsit rhab. pulverat. 3. i. cum jusculo & pluries deiecit, febris perseverat, nocte bis tantum deiecit per duas horas dormivit. Septima, alvi fluxus perseverat, sed minùs frequens, ut locum dederit venæ sectioni, quâ missus fuit sanguis ad 3. iv. Hæc duo peculiariter à febris invasione notavimus, quòd pulsus ferè semper erat intermittens; & cum dolor prædictus in eadem parte fixus permaneret, neque ad thoracem ullo modo pertingeret, ægra tamen non poterat in illud latius, quod erat sinistrum decumbere; quin statim cardialgia & tussis corriperebatur, ita ut perpetuò super latus dextrum decumbere cogeretur. Tussis sicca eam infestabat per intervalla, status emittebat interdum supernè & infernè. Octava, eadem symptomata perseverant, præcipuè cardialgia per intervalla recurrens, & pulsus intermittens inæqualiter, somnus paucus. Continuabantur remedia cardiaca, sumpta & admota; tum vermes enecantia ac ventriculum roborantia. Urgente admodum cardialgiâ, exhibitus est salis absinthii 3. i. cum succi limonum cochleari uno, unde optimè habuit per horas aliquot: sed symptomata redierunt. Noctu urinæ erant crassæ & satis pallidæ. Nonâ admotum fuit vesicans cervici, quo tussis cessavit. Antea dolor humeri imminutus fuerat, & supra latus sinistrum melius decumbebat. Eadem die sumpsit medicamentum ex infusione 3. i. rhei cum hieræ pieræ 3. i. & syrup. de cichor. compof. 3. i. quo valde purgata est cum fructu, & alvi fluxus perseveravit per aliquot dies, unde prorsus convalescere visa est, cum tamen pulsus continuò intermitteret in 3. 4. vel 5. pulsatione. Postquam è lecto surrexit, intermissio pulsus desinit, manente tamen frequentia, & ægra tussis premebatur, noctu præcipuè, cum difficultate spirandi. Quæ symptomata per longum tempus perseveraverunt, ac præter difficultatem spirandi aderat per intervalla dolor lateris pungens, qui magis urgebat, cum ægra in latus sanum decumberet, & contra gravior erat difficultas spirandi, quando supra latus dolens decumbebat. Febris perpetuò erat intensa quæ omnia magnam suspicionem faciebant abscessus in sinistra pulmonis parte latitantis. Tandem die trigesima quarta morbi, subito correpta est sanguinis sputo, quem per tussim excrevit ad Uncias viii. circa meridiem, is autem sanguis erat satis crassus, & non spumofus, quem ægra ipsa dicebat à capite descendisse, seque ante illius exclusionem in faucibus percepisse titillationem, tum aliquid sanguinis emungendo per nares eductum fuerat. Attamen vespertinis horis, sanguinis sputo redeunte, satis apparuit eum è pulmone ferri. Erat enim totus spumofus, ejusque quantitas fuit ad libram unam, tum missus fuit sanguis de basilica sinistra, exhibitus julepus ex aqua plantag. & papav. rhœad. cum sale prunellæ, & syrupo de rosis siccis. Utebatur tota nocte syrupis violaceo, de rosis siccis, & de papavere, simul mixtis, quibus tussis sedabatur, excretio-

nis redivit impediabatur, & per intervalla dormiebat. Postridie manè iterata fuit phlebotomia ex brachio dextro: iteratus julepus, & multa alia remedia, in hæmoptysi usitata, præscripta fuere. In communi consilio, habito cum Domino Ranchino Cancellario, & Delort Decano, sputum sanguinis rediit ad uncias viii. circa horam undecimam ante meridiem. Continuabantur remedia, & venæ sectio malleoli usurpata. Hora quarta vespertina, redeunte sanguinis sputo copioso, subito extincta est. Dissecto cadavere, inventus est pulmo colore albicante, costis utrinque, & diaphragmati undique adhærens; tum etiam pericardio undique adhærebat, ut unum corpus continuum efficeret. Cor verò albicans visum est, & media fere sui parte, quâ diaphragma respicit, exesum atque exulceratum; ut fibræ carnosæ semiputridæ summis digitis evellerentur. Et animadversum fuerat, frustula quædam carnea, hujusmodi fibris simillima, cum sanguine per sputum rejecta fuisse. Ita ut verissimum sit, istam ægrotantem, cordis substantiam per sputum rejecisse, quod est valde mirum. Cum autem in capsula cordis nullus humor repertus fuerit; existimandum est materiam, hujusmodi abscessum seu ulcus efficientem, sanguini permixtam fuisse, & per tussim excretam. Similes quædam historiæ reperiuntur apud Schenkium in observationibus libri secundi, titulo de tumoribus & apostematibus cordis.

## OBSERVATIO LXXXVIII.

*Hydrops pectoris.*

**U**Xor clarissima Nobilissimi viri, Domini de Thomas in suprema Computorum, Subsidiorum, & Fisci curia Monspelienfi Consilarii Regii, à quinque mensibus laborabat fluxione humoris tenuis, in pulmonem decumbente cum tussis sicca, difficultate spirandi, febre assidua & lenta, quæ singulis noctibus exacerbabatur, cum levi horrore, eamque consequebantur sudores nocturni copiosissimi, ut singulis noctibus ter, quaterve indusia mutare cogeretur. Ab aliquot diebus exacerbationes bis in die redeunt, post meridiem & vespere, in diurna non sudat; sed semper sub somno. Tum ab ipso morbi initio dolor adfuit lateris sinistri in ipsa pectoris regione, cum difficili decubitu in eandem partem, ita ut cum primum in dictum latus decumberet, tussis molestissima cum difficultate majori corriperebatur. Imo verò interdum, comprimendo latus summis digitis, maxima pulmonis oppressio & spirandi difficultas orta fuit. His accedebat lienis inflatio, cum aliqua tensione conjuncta, quæ reliquis affectibus originem dedisse censetur.

Habito consilio cum Domino Ranchino Cancellario, statutum fuit præcipuum affectum in sinistro illo latere residere, eumque esse collectionem quandam, pectoris partem sinistram opprimentem. Cujus autem materiæ sit illa collectio, non omnino certò posse pronunciari. Hoc nihilominus asseritur, materiam illam esse aquosam, vel purulentam; utriusque enim signa concurrunt, & consimilia ab Hippocrate recensentur, dum secundo de morbis dicit, hydrope pulmones affectos, velut suppuratos affici, verum remissius ac diutius. Ad collectionem aquosam magis inclinant sententiæ, quod neque pleuritis, aut peripneumonia, aut hæmoptoë præcesserint, neque quicquam sputi purulenti unquam rejecerit. Phthisica interiit, & apertionem cadaveris ante obitum prohibuit.

## OBSERVATIO LXXXIX.

*Urinæ suppressio.*

**D**N. Raymundus Ratte sexagenarius, vir plethoricus & calculosus, qui multos calculos innoxie per intervalla



valla cum urinis excernere solebat; circa finem Jan. 1635. post plures calculos excretos, ab immediato exercitio, incidit in omnimodam urinæ suppressionem, quæ quidem suppressio (ut ex signis luculenter apparebat) erat in renibus, non in vesica. Jam per triduum integrum, nihil lotii emittebat, cum vocatus sum in consilium, cum duobus Medicis senioribus, quorum unus erat ordinarius; qui per illud triduum varia præscripserat diuretica, tum externa, tum interna, clysteres, semicupia, potiones, & similia. Et antequam ipse vocaretur, purgatus fuerat æger blando cathartico. Ego prior sententiam ferens, dixi hujus affectus causam præcipuam, aut saltem jam hoc symptoma foventem esse venarum supra renes insignem plenitudinem quæ propter distensionem à copia feri per triduum retenti, non possent sese contrahere ad expulsionem, quemadmodum videmus vesicam urinâ nimiam distentam, non posse sese facile contrahere, unde non rarò meiendi difficultas solet exoriri. Maximam autem feri copiam adesse ostendit, tum corporis plenitudo, tum quod æger multum potare soleat, & urinæ libras tres aut quatuor singulis noctibus in statu sano reddere solitus sit. Ideo censui diuretica esse omittenda, quæ humores ad vias urinæ deducendo, distensionem in iis augment. Sed potius insignes revulsionem, & quam primum sanguinem esse mittendum magnâ copiâ, tum post quinque vel sex horas potens medicamentum phlegmagogum & hydragogum esse exhibendum. Eiusdem fuere sententiæ reliqui Collegæ, & missus fuit sanguis ad lb. i. ante meridiem, vesperi exhibita fuit 3. i. pulveris diacarthami, detractis feminibus, pluries fuit purgatus, & post quatuor aut quinque sedes coepit mingere urinamque reddidit subnigram prima vice ad 3. iv. paulò post valde rufam, majori copia, postmodum limpidam. Intra unum diem magnam excrevit urinæ copiam & liberatus fuit. Similis fere casus propositus est observat. i. hujus centuriæ.

## OBSERVATIO XC.

*Ventriculi dolor.*

**D**ie 24. Januar. anni 1635. vocatus fui ad aurifabrum Monspeliensem, qui à tribus mensibus laborabat dolore circa ventriculum acerbissimo, & indefinente, ita ut præ dolore & vigiliis ad summam maciem perductus fuerit. Per dictum tempus à Medico ordinario præscripta fuerant duodecim aut quindecim medicamenta purgantia, eaque blanda, aliâque non pauca remedia, tam interna, quam externa, non omisissis fomentis, liniimentis, & similibus. Tandem advocatis in consilium tribus Medicis, præscribitur vomitorium ex decocto sem. raphani, atriplicis, &c. quæ vulgo ad vomitoria præscribi solent. Post vomitorium assumptum nihil vomuit, eoque iterato, ventriculus exoneratus est, & satis copiosè vomuit, sine ullo doloris levamine. Postea iteratur purgans medicamentum & diætâ sudorifica præscribitur. Biduo post purgationem ante usum decocti sudorifici, à quodam monitus æger me accersit circa vesperam, & morbi sui historiam exponit. Ego verò, ut ostenderem, saltem ad tempus dolorem sedari posse; præscribo pro ea nocte laudani gr. v. quibus dolor protinus cessavit, & totâ nocte dormivit, cum tribus illis mensibus longior somnus non fuisset unius horæ. Manè se curatum prædicabat. Rediit tamen dolor, qui nullis remediis sedari potuit, nisi laudano aliquoties exhibito, idque ad breve tempus, donec æger marasmo confectus interiit. Aperto cadavere inventus est ingens scirrhus, totum pancreas, & mesenterii partem occupans; tum etiam pylorum, ac Jejunii intestini principium ambiens, ita ut ductum illum, qui est à ventriculo ad intestina; adeo angustaverit, ut fere occlusus esset, & ventriculus materiâ esculentâ ac potulentâ plenus inventus fuerit. Cum igitur alimentum non posset distribui, marcore consumptus est. Scirrhus ille non apparebat tactui, quia sub ventriculo & intestinis latitabat. Dolorem intensum efficiebat, quia pylorum & extremam ventriculi partem, pyloro continuam attingebat.

*Lazarii Riverii Opera.*

## OBSERVATIO XCI.

*Lumbrici.*

**F**ilius D. Gerardi, Quæstoris Franciæ generalis, annos quatuor natus, laborare coepit 25. Jan. anni 1635. febre verminosa cum vomitu bilis porraceæ, & nausea continua. Præscripsi potionem contra vermes vulgarem, cui addita fuit propter malignitatem (quæ ex humore excreto, & tumefactione quadam totius corporis apparebat,) lapidis bezoardici gr. iv. & clysterem dulcem. Potione assumpta, evomuit duos lumbricos, unum cum clystere per alvum egressit. Noctu iterata est potio, & sequenti die bene habuit, ut adstantes nulla alia remedia expetiverint. Post biduum incidit in eundem affectum, & multo gravius torquebatur cum inquietudine, planctu continuo, etiam per somnum. Statim præscripsi potionem purgantem ex infuso rhei, & syrupo rosaceo, in aqua portulacæ, ex qua ter deiecit materiam nigerrimam, sed post purgationem omnia symptomata permanebant, tum etiam vomitus auctus; ita ut omnia juscula & potulenta rejiceret; unde factum est, ut potio contra vermes prædictas, quæ tantopere profuerat ab initio, jam nullius effectus fuerit, cum perpetuò evomeretur. Advertens itaque, eum non evomuisse confectionem de hyacintho, cum jusculo exhibitam, eam bis iterandam jussi, additis lapidis bezoardici gr. iv. Non amplius vomuit, & nocte dormivit ac multo melius habuit. Unde colligo, & observatione dignum censeo, lapidem bezoardicum, in affectibus verminosis, summæ esse efficaciam. Potionem purgantem prædictam iterum assumpsit, & alvi fluxus criticus eam sequutus est, quo morbus admodum imminutus est, ac tandem julepis specificis, ex decocto Scordii & Hypericonis, cum refrigerantibus paratis, omninò sublatus, iterata post julepos purgatione, ex fenna, rhab. & syrupo rosaceo.

## OBSERVATIO XCII.

*Abscessus Abdominis.*

**D**ie decimâ sextâ Februarii, anni millesimi sexcentissimi trigessimi quinti, vocatus sum ad filiam viduæ Joannis Peire, Mercatoris Monspeliensis, annos 14. natam, quam ante duos annos curaveram ab hydrope incipiente, à quo tempore valetudinariam vitam agebat. Nunc verò è tribus septimanis decumbebat, nullo vocato Medico. Invenio eam laborantem febre assidua, cum alvi fluxu moderato, quo pituitosa & cruda rejiciebat. Refert præterea sibi ventrem iterum intumuisse, in eoque per vices dolorem quandam puncturium percipere, tum etiam tibias per vices œdematosas apparere. De redeunte hydrope statim cogitabam, quod ut exactius explorarem, manum ventri admoveo, quem dum aliquantulum comprimere intenderem, illa statim obstitit, de dolore conquerens, qui comprimendo ipsi inferebatur. Ego verò ratus in hydrope dolores hujusmodi non apparere, ventrem denudari jubeo, admota lucerna, ut rem attentius indagarem. Ventrem igitur inspicio colore naturali præditum, sed elevatum & tumentem, dum utraque manu blande contrecto, invenio tumoris circumferentiam in ambitu umbilici, quinque digitorum latitudine, extra quam circumferentiam ægra contactum indolenter ferebat; in tumore verò, etiam leviter compressa, plurimum dolebat; præcipuè in sinistro latere, quobus digitis ab umbilico, ubi à principio morbi dolorem puncturium per vices percipiebat. Præterea in ipso tumore fluxionem quandam animadvertēbam; ex quibus pronuncio, abscessum latere inter peritonæum & musculos abdominis, jam factam esse suppurationem; ac statim Chirurgum advocari jubeo, qui ejusdem protinus fuit sententiæ. Itaque quamprimum aperiendum esse abscessum statuimus, ne si in cavitatem abdominis rumperetur, mortem præcipitem afferret: Admovetur ergo causticum ei parti, in qua dolorem pungitivum

Q q q 2

ab



ab initio percipiebat, & tribus horis elapsis, facta escharâ immittitur ferrum ad latitudinem duorum digitorum, nulum tamen pus effluxit. At non ausus est Chirurgus ulterius phlebotomum immittere, ne fortè peritonæum confoderetur, sicque materia ad cavitatem abdominis efflueret; immisit ergo turundam in foramen & post quinque horas extracta turunda tantillum puris effluxit, postmodum manè extracta iterum turunda, magna puris copia emissa est; pus autem erat pravi coloris & odoris. Nihilominus ægra in pejus ruebat, ita ut quinto ab apertionis die interierit. Aperto cadavere inventi sunt muscoli abdominis in loco tumoris, putredine affecti circa partem sinistram umbilicalem, in parte verò dextra hypogastrica intestina peritonæo adhærebant, & partes hujus loci etiam putrefactæ erant; hepar colore flavissimo præditum adhærebatur peritonæo undique, & diaphragmati, & mole sua mediam thoracis partem replebat, ut ipsi cordi esset omnino vicinum, pure & putrilagine omnia erant referta, ac terribilimum odorem spirabant; summa præterea macies aderat in toto corpore, quod marasmo confectum videbatur, idque ob defectum hepatis sanguinem non generantis.

Non solum autem abscessus abdominis ex chronico morbo in corpore malè affecto lethales sunt, sed etiam ut plurimum ii, qui febribus sive continuis, sive intermittentibus succedunt; quos damnavit Hippocr. in Coacis. Et vidit D. Pachecus Medicus Lunellensis, amicus meus, juvenem tertianâ laborantem, cui cessarunt paroxysmi post septimam accessionem; factus tamen abscessus circa inguen, & apertus emisit pus laudabile in principio; sequentibus verò diebus prava successerunt symptomata, pus deterius apparuit, & æger interit vigesimo die. Quem tamen abscessum ab initio lethalem judicare potuit, quod eo apparente, sæva symptomata etiam apparuerunt. At salutares abscessus allevationem symptomatum afferre debent. Si contrarium fiat, decubitus materiæ in illam partem significat, non criticam expulsionem.

## OBSERVATIO XCIII.

*Partus difficilis.*

**U**Xor D. Baronis Daumales, Quæstoris Franciæ generalis, in partu per triduum laboravit, ita ut tandem vires essent admodum dejectæ. Vocatus præscribo sequentem potionem.

℞. Dictamni cretici, aristolochiæ utriusque & trochisc. de myrrha, ana Scrup. sem. croci & cinnamomi, ana gr. xii. confect. alchermes Drach. sem. aquæ naphthæ & artemisiæ ana Unc. i. sem. misce, fiat potio, qua assumpta statim conatus parturitionis excitati sunt, & paulo post gemellos peperit. Idem contigit uxori D. Sartrei primiparæ, quæ est filia D. Boschii Pharmacopæi Monspelienensis.

## OBSERVATIO XCIV.

*Fluxus mensium immodicus cum hysterica suffocatione.*

**A**Ncilla D. Baronis de Castries, mensium fluxum tam copiosum patiebatur, ut intra duas horas sanguinis lb. iv. aut v. excreverit, unde secuta est affectio hysterica tam gravis, ut illa aphona, & quasi mortua jaceret, cum tamen apertos haberet oculos, & manu se strangulari indicaret. Vocatus ad eam potionem sequentem præscribo, tum cohibendo fluxui, tum hystericiæ affectioni coërendæ idoneam.

℞. Aquæ naphthæ, rosar. & plantag. ana Unciam i. sanguinis draconis grana xii. salis prunellæ Drachm. i. misce, fiat potio, quæ post tres horas interjecto jusculo reiterabatur. Post primam exhibitionem omnia symptomata remissa sunt, in secunda verò omnino cessarunt.

## OBSERVATIO XCV.

*Lues venerea in puero.*

**F**ilius Dn. N. duos annos natus, à nutrice infectus fuerat lue venerea, quæ sese prodidit primùm pustulis latis & rubris, in perinæo acervatis, iisque successerunt ulcera in natibus, juxta podicem, mox pustulæ in facie, & tandem ultra in faucibus & labiis. Quibus accedebat corporis consumptio in dies progrediens. Vocatus ad eum, sequentia præscripsi.

℞. Sennæ mundat. ʒ. i. rhab. elect. & agarici recenter trochiscati ana ʒ. ii. cinnam. ʒ. ʒ. infundantur in aqua cardui bened. in expressione dissolve syrupi rosar. ʒ. i. fiat potio, detur manè, & reiteretur semel in septimana.

Diebus intermediis utebatur sequenti decocto.

℞. Ligni guajaci ʒ. i. corticis ejusdem ʒ. ʒ. aquæ fontis lb. iii. infundantur, & decoquantur, ut artis est, ad tertias, colaturæ capiat ʒ. iv. manè sine sudore, propter aeris inclementiam, hyems enim vigeat, tum etiam metuebam nimiam exsiccationem; propter corpus tenellum, eaque ratione victum etiam analepticum concedebam. Eodem decocto pro potu utebatur, sed diluto æquali aquæ potione.

Cum hæc remedia continuasset per 20. dies, omnia symptomata disparuerunt, ægerque in ipso remediorum usu refectus, & denuo impinguatus fuit. Eramus autem media hyeme, curatus omnino videbatur.

Attamen intra unum mensem dicta symptomata redierunt, ægerque extenuatus est.

Nos iterari jussimus eadem remedia, decoctum tamen paulò efficacius efficiendo; coctione facta ad medias, eumque stragulis operiebamus, ut saltem leviter sudaret. Hac curâ iterum restitutus fuit intra quindecim dies, quam tamen diutius continuassemus, metu recidivæ, nisi rigidissima hyems, quæ tunc etiam vigeat, obstitisset. Intermissio itaque remediorum usu per viginti dies, aut circiter, ulcera renovata sunt. Et cum tunc cælum esset satis temperatum, mense Februario ob Austrinam constitutionem, curam iterum instauramus, sed efficaciorum.

Exhibemus itaque primum mercurii dulcis gr. viii. cum diagryd. gr. iiii. in jusculo, quo valde purgatus est per vomitum & secessum, & quarto quoque die hoc medicamentum exhibebatur: intermediis verò diebus sumebatur decoctum hoc modo paratum. Supradict. guajaci & corticis ejusdem quantitas ponebatur per diem naturalem, ac postea destillabatur ad medias, juncturis alembici & recipientis probè munitis. Liquor superstes in alembico colatus miscebatur cum aqua destillata, quæ erat acidula, hujus mixtionis dabantur ʒ. iii. manè calidè, corpus tegendo, & sudores copiosiores effluebant. Per viginti dies continuata fuit hæc postrema curatio, ex qua morbus fuit omnino sublatus.

Ulceribus narium admovebatur unguentum ex melle rosaceo, vitellis ovorum, terebinthina. Faucium verò ulcera brevi curabantur melle rosaceo, cum spiritu vitrioli acido reddito.

## OBSERVATIO XCVI.

*Lochiorum fluxus immodicus.*

**Q**Uædam mulier post abortum à sanguinis fluxu immodico summam virium dejectionem patiebatur. Illi præscribo frictions & ligaturas partium superiorum, cucurbitulas sub mammis, epithemata, & pullos columbinos, fotu manuum cum vino calente, in quo confectio alkermes dissoluta sit, & sequentem potionem.

℞. Aquarum plantag. naphthæ & rosar. ana ʒ. i. syrupi corallor. ʒ. i. salis prunellæ ʒ. ʒ. sanguinis draconis ʒ. ʒ. misce, fiat potio. Quæ statim fuit exhibita, antequam reliqua remedia fierent, & intra horæ quadrantem dolores ventris & lumborum quieverunt, & fluxus immixtus est.

OBSER.



## OBSERVATIO XCVII.

*Cancer.*

**D**N. Chapuis Tolosa, à nobilis stirpe oriundus. Monspeliensis degens, anno 1635. circa finem hyemis correptus fuit exiguo tuberculo, labrum superius obsidente; quod in dies incrementum capiens in tumorem degeneravit, totum ferè labrum occupantem, eumque durum ac lividum, cum dolore pungitivo & caloris sensu. Statim ab initio, alterius Medici præscripto usus est phlebotomia frequenti, cum levibus purgationibus, ex fenna & cassia paratis, præmissis julepis refrigerantibus. Cum autem hæc remedia per aliquod tempus continuasset, & affectus nihilominus in deterius vergeret, priorem Medicum deferens, curæ meæ sese commisit, die secunda Aprilis, anni supradicti. Ego verò prædicta signa considerans, num etiam, quòd omnia topica remedia, quæcunque admovebantur; malum exasperarent, & dolorem pungentem, ac exurentem, intensiorem efficerent, tumorem cancriformem esse existimavi. Licet autem iste morbus incurabilis censeatur; illius tamen curationem suscepi, edoctus à Galeno, cancrum in principio & dum adhuc recens est, sanari posse, ut habetur 2. ad Glauconem cap. 10. ubi de cancro agens sic loquitur. Hunc morbum per sui initia sæpè sanavimus, sed ubi in molem insignem satis evectus est, nemo sine manus opera potuit curare, & paulò post: Hunc igitur morbum, ut diximus, in principio sanavimus, & tunc præsertim; cum melancholicus humor non admodum crassius videbatur existere: nam hinc purgantibus medicamentis, ex quibus sanitas sequitur, promptè succumbit: neque obscurum est, hujusmodi medicamenta debere esse atræ bili accommodata. Quod tamdiu faciendum est, donec sanitas pristina parti subsequatur, quemadmodum, ratio victus optimos generans humores, interim adhibeatur. Et ex ejusdem Galeni præcepto, quod habetur lib. de atra bile, cap. 9. & comment. aph. 47. lect. 6. hoc morbo affectos, fortioribus medicamentis esse expurgandos. Ad potentiora remedia confugiendum esse censui; ex quibus principem locum obtinet radix hellebori nigri, quæ ad humorem melancholicum expurgandum, efficacissima est. Sic igitur curationem aggressus sum.

℞. Rad. buglossi & cichor. an. ʒ. i. fol. agrim. borrag. ceterach. & veronicæ ana m. β. coquantur cum pullo gallinaceo, in colatura dissolve cremoris tartari ʒ. i. fiat jusculum, quod capiat manè per 12. dies.

In quarto quoque jusculo dissolve ʒ. ii. syrupi sequentis.

℞. Succorum recenter expressorum & per residentiam depuratorum, borraginis, buglossi, fumariæ, cichorii lb. iii. succi veronicæ & pomor. redolent. an. lb. i. fennæ mundat. ʒ. vi. epithymi ʒ. ii. rhab. electi & agarici recenter trochiscati an. ʒ. i. zinzib. & cariophyll. an. ʒ. i. infundantur & decoquantur, ut artis est, donec colaturæ supersint quart. v. in quibus dissolve sacchari albi quart. v. fiat syrupus perfectè coctus ad usum dictum.

Postremæ dosi jusculorum adde extracti hellebori nigri gr. iv. capiat cum regimine.

Hoc medicamentum summa cum vehementia ægro tantem expurgavit, non solum per alvum, sed etiam per vomitum, verum eadem die tumor valde imminutus apparuit, ac doloris expers.

Post usum jusculorum, usus est balneo tepido per triiduum, hirudines hæmorrhoidibus admotæ, causticum utrique tibie inustum, serum lactis cum epithymo per mensem usurpatum, & balneum iteratum singulis septimanis.

Post quindecim dies ab assumpto extracto hellebori, idem remedium iteratum est, eadem dosi, cum diapruni solutivi ʒ. iii. cujus operatio fuit priori similis, & eadem die tumor imminutus apparebat.

Topica omnia tumorem exasperabant, & dolorem intensiorem efficiebant, excepto unguento ex ranis viridibus, quod maximè laudatur ab Aquapendente, Chalmetæo, & aliis, & in hoc affectu plurimum præstitit; ita ut illius curationem duobus præsertim remediis tribuendam esse existimem, extracto scilicet hellebori nigri, & unguento

de ranis viridibus. Non parùm tamen contulit syrupus magistralis, quo bis in septimana utebatur.

Intra mensem, à curationis principio, tumoris portio suppurata, & sponte aperta, cum pure satis laudabili. Ulceri & tumori universo admovebatur continuo unguentum prædictum, & sensim tumor imminutus ac tandem sensim resolutus est, & ulcus ad cicatricem perductum.

Unguenti de ranis viridibus compositio talis est.

℞. Ranas virides in arboribus, vel aquis puris degentes, in vas fictile vitro illitum, multisque exiguis in fundo foraminibus pertusum conjicito: earumque ora butyro impleto: vas ne quid exhalet, luto diligenter oblinito & operito, cui aliud effossa terra conclusum supposito, ignem in ambitu ad distillandum accendito, oleum seu liquorem illum stillatitium colligito, & cum pulvere ranarum misceto, ut fiat linimentum.

## OBSERVATIO XCVIII.

*Peripneumonia pituitosa.*

**D**N. Gaultier fisci regii quæstor generalis, ætatis 60. annorum, laborabat peripneumonia pituitosa, quæ innotescebat ex tussi: difficultate spirandi, febre, dolore sub humero sinistro, & maxillarum rubedine. Cum autem multa pituita refertus videretur, ejusque satis bonam quantitatem evomisset, tum clystere injecto ter aut quater alvus soluta esset, postridie venæ sectionis, semel tantum celebratæ, purgans medicamentum fuit exhibitum ex infuso rhei, cum manna & syrupo rosaceo, quo optimè purgatus est quarta die morbi, quæ erat 29. Maii, anni 1635. & postridie à febre aliisque symptomatis liberatus apparuit. Unde patet purgationem in peripneumonia interdum convenire, quamvis ut plurimum, ante septimum diem usurpata, perniciofa sit.

## OBSERVATIO XCIX.

*Phthisis incipiens.*

**M**ense Maio anni 1635. uxor D. Thomas curiæ computorum, subsidiorum & fisci Consiliiarii, phthisica interiit, & post unum aut alterum mensem illius ancilla, quæ diu noctuque illi ministrabat, in similem affectum incidere videbatur. Laborabat enim febre lenta, cum tussi sicca, diu noctuque perseverante, macie totius corporis, inappetentia, & vigiliis. Vocatus ad eam præscribo venæ sectionem & purgationem universalem ex apozemate, & balnea tepida, cum victus ratione incrassante & refrigerante; quæ nihil contulerunt. Tandem mecum reputans affectum procedere ex maligna qualitate impressâ pulmonibus & cordi per contagium, præscribo decoctum guaiaci ad 15. dies cum victu analeptico, sine sudore quo remedio perfectè curata est. Et febris, tussis, aliæque symptomata omnino desierunt.

## OBSERVATIO C.

*Variolæ.*

**F**ilius Dn. Boudon receptoris stipendiorum curialium præsidialium Occitanie, annos natus novem febre laborans, quæ videbatur variolas portendere, meæ curæ committitur mense Junio anni 1635.

Prima die venam secari jussi, & sanguinem extrahi ad Unc. v. & vesperi eadem quantitate iterari, julepi præscribuntur, inunctio ex oleo scorpionum, & reliqua ordinariâ; secundâ & tertiâ die parum delirabat. Variolæ apparent, minutæ, densæ, & depressæ paulatim incrassescabant, sed admodum segniter, ita ut sexta die facies nullo modo inflata videretur. Variolæ in facie & toto corpore depressæ, & in medio concavæ, imò verò nonnullæ in medio erant nigræ. Magis timebant parentes ex eo, quòd tres alios liberos amiserant ex eodem morbo, & variolis omnino consimilibus. Ego igitur ad efficaciora remedia confugiendum ratus, sequentem julepum præscripsi.

Q q q 3

℞. Aquæ



℥. Aquæ card. bened. ℥.iii. aquæ theriac.℥.iii. trochisc. viperin. ʒ.i. lapid.bezoard. gr. vi. capiat heris vespertinis.

Cordi applicabantur pulli columbini, ac deinde linimentum ex theriaca, confect. Alkerm. & ol. scorpion. Matthioli.

In omnibus iusculis dissolvebatur bezoard. mineral. ʒ. ʒ. sequenti die quæ erat septima morbi, ter excrevit per alvum materiam satis crassam, sed omnino lividam. Eo-

dem tempore copiosissimè excrevit urinas, & variolarum eruptio ita promota est, ut intra unum diem facies multum inflata fuerit, & variolæ ab eo tempore sufficienter increverint. Continuum fuit bezoard. mineral. per alterum diem, & postea confectio de hyacintho, quæ ab initio usurpata fuerat. Donec tandem æger à sævo illo morbo protinus liberatus fuerit.

\*\*\*\*\*

# LAZARI RIVERII

## OBSERVATIONUM MEDICARUM

### ET CURATIONUM INSIGNIUM.

#### CENTURIA SECUNDA.

##### OBSERVATIO PRIMA.

###### *Colicus dolor.*

**D**IE primâ Julii, anni 1635. Sarretus, Salinarum visitator generalis, quadragenarius, correptus est gravissimo dolore colico, qui neque clysteribus laxantibus, & carminantibus; etiam cum aqua benedicta, neque fomentis ac semicupis intra 24. horas usurpatis, sedari potuit. Eoque continuo sciviente, sequentes pilulas præscripsi.

℥. Aloës optimæ ʒ. i. diagrid. gr. viii. laudani opiat. gr. v. fiant pilulæ sex deauratæ.

Has pilulas sumpsit media nocte, manè hora quarta dolor protinus quievit, & per dici decursum purgatus est quinquies, sicque omnino liberatus.

##### OBSERVATIO II.

###### *Variolæ cum alvi fluxu.*

**F**ilius D. Grasseti in curia Computorum Consilarii, annos quinque natus, variolis laborabat cum alvi fluxu per totum morbi decursum perseverante. Septima die morbi, quæ erat 15. Augusti, anni 1635. multo gravior fuit alvi fluxus, febris intensa, sitis ingens, variolæ depressæ, quarum elevatio ab alvi fluxu impediabatur. Reliquis remediis usque ad id tempus parum conferentibus, sequentem præscribo julepum, alvi fluxum & malignitatem respicientem.

℥. Rad. pentaphylli & tormentillæ ana ʒ. i. fol. scabiosæ, pimpinellæ an. M. i. scordii p. i. fantali citrini ʒ. ii. coquantur ad 4. iii. pro tribus dosibus bis in die sumendis. Addendo unicuique dosi confect. de hyacintho ʒ. ʒ. trochiscor. viperin. ʒ. sem. lapid. bezoard. gr. iv.

Post primam exhibitionem alvi fluxus imminutus fuit variolæ tumefactæ, & sitis imminuta.

In aliis pueris quamplurimis eadem potio mirè profuit ad sedandum alvi fluxum, & variolas depressas tumefaciendas. Cui addebam aquam rosarum, & naphthæ an. ʒ. ʒ. Etiam circa alvi fluxum; in depressis variolis mirum in modum contulit; & plerumque sic componebam.

℥. Rad. pentaphylli, & tormentillæ an. ʒ. i. fol. pimpinellæ & scordii an. M. i. fantali citrini & rasuræ eboris an. ʒ. ii. coquantur ad 4. iii. in colaturæ ʒ. iii. dissolve aquæ naphthæ & rosar. an. ʒ. ʒ. trochisc. viper. in ʒ. i. lapid. bezoard. g. iv. fiat potio, quæ grandioribus detur uno haustu bis in die, lac verò sugentibus, ex cochleari frequenter.

##### OBSERVATIO III.

###### *Secundina retenta.*

**C**larissima uxor Domini de Grasset in curia Computorum, subsidiorum, & filci Consilarii, principio mensis Octobris anni 1635. cum abortum passa esset ex gestatione trimestri, foetum optimè efformatum exclusit, retenta secundinâ. Hinc fluxu albo diu laboravit, & quandam oris foetorem percipiebat, qui post aliquot dies desinit. Frustrula quædam membrana exclusit, sed pauca &

exigua. Ita, ut afferentibus mulieribus, illam secundinas frustulatim ejecisse, ego contrarium perpetuò censuerim. Paulatim ad pristinam valetudinem rediit, fluxu tamen albo perseverante. Attamen post duos menses cum dimidio, immodico mensium fluxu correpta est, cum quo secundina exsiccata per frustula excreta est. Quod notatu dignissimum secundinam tamdiu in utero, sine gravi noxa, retineri posse.

##### OBSERVATIO IV.

###### *Hernia in infante.*

**F**ilius Dn. D. Aumelas Franciæ Quæstoris generalis 11. menses natus, laborabat hernia aquosa, dextrum testem occupante, cum materia contentâ, in membrana testis propriâ, dartos appellatâ, ut testis ovi exigui magnitudinem æquare videretur; & hic tumor à nativitate ferè cum occupabat, quem diu cotone, suffitu thuris imbuto, discutere tentaverant. Tandem vocatus sequens præscribo cataplasma, principio mensis Novembris anno 1635.

℥. Farinæ fabarum lb. ʒ. decoquatur cum vino generoso ad pulvis consistentiam, deinde adde oxymel. simpl. ʒ. iii. fiat cataplasma admovendum manè & serò.

Intra octo dies, hoc solo remedio tumor omnino diffusus est.

##### OBSERVATIO V.

###### *Lumbrici.*

**D**ie 25. Novemb. anni 1635. puer quatuor annos natus, ex lumbricis ita laborabat, ut gravi dolore ventris torqueretur, cum summa virium dejectione, ita ut pulsus in carpo non perciperetur, & oculi concavi essent, ut spiritibus orbat, quales in moribundis apparere solent. Atribus diebus laborabat, quatuor lumbricos mortuos per os excreverat cum vomitu humoris nigri. Pharmacopœus potiones contra vermes exhibuerat, & potionem purgantem ex electuario diacarthami, & rhabbarbaro, sed nullo modo ex ea purgatus fuerat. Præscribo ipsi potentia ad lumbricos remedia ordinaria, tum interna, tum externa, quæ nihil profuerunt. Postera die in eodem statu persistebat. Jubeo ut exhibeatur calomelanos Turqueti gr. viii. cum gr. vi. scammonii, quò medicamento alvus soluta est, excrevitque materiam viscidam, glutinosam, putridam, cum duobus lumbricis, ter alvum deposuit, & maximè levatus est, ac postea intra paucos dies omnino convaleuit.

##### OBSERVATIO VI.

###### *Hæmorrhoidum dolor.*

**D**ie 21. Decembris anni 1635. D. Joannes Charanton, civis Monspelionensis, cum ad villam duobus miliaribus ab urbe distantem pedes ivisset, multis vestimentis indutus, vehementer incaluit, unde facta est magna humorum commotio, eorumque decubitus ad anum, unde hæmorrhoides valdè intumuerant, cum inflammatione, & dolore acerbissimo. Tota die sequenti valde excruciatu est, noctemque infornem transegit. Postridie ad urbem rediit.



diit super equum, sed pedibus subnixus supra stapedes, cum magno labore, ita ut tumor inde irritatus fuerit. Vocatus ego post meridiem, sanguinem detrahi jubeo ad ℥. vii. manè alvum dejecerat bis. Circa vesperam iteratur phlebotomia propter doloris urgentiam, vesperi accepit julepum cum syrupo de papavere, & usus est quater sub noctis decursu suffumigio, ex sempervivo majori cocto in vino albo; dormivit per intervalla, dolor & tumor immixtus hæmorrhoidesque relaxatæ, & suffumigii, ac linimentorum anodynorum continuatione brevi sanatus est.

## OBSERVATIO VII.

*Fœtus in partu morientes.*

**U**Xor tinctoris Nemaufensis à conjugii initio ter peperit maturum partum, nono gestationis mense; labores patiebatur consuetos ante partum, quemadmodum aliæ fœminæ, sine majori molestia, ita ut neque partus admodum difficilis, aut laboriosus esset; neque mulier malè habita, ut aliquo affectu præternaturali laboraret, in ipsis partus doloribus, fœtus in utero movebatur sufficienter, attamen statim post excussione mortuus inveniebatur, idque ter hæcenus contigit. Medici post secundum partum purgationes præscripserunt, & diætam sudorificam, mutata etiam fuit obstetrix. Tertius tamen eodem modo interiit, Quæritur causa & medela. Cum nulla causa in historia referatur, difficillimum est eam conjecturam assequi. Ut tamen sententiam nostram proferamus, dicimus, hos casus accidere, vel ob fœtus debilitatem, vel ob constrictionem uteri, aut cervicis ejusdem tempore partus. Debilitas fœtus ex latente quodam seminis, aut sanguinis materni vitio contracta, potest efficere, ut cum fœtus in partu, & maximo conatu exitum quærat, in eo exsolvatur, & moriatur, quemadmodum partus octimestris necessario interire solet, propterea quod conatum ediderit septimo mense quem si repetat octavo, exsolvitur & interit. Si igitur quilibet fœtus ex duplici conatu necessario interit, qui debilis est, unico conatu potest interire. Alia etiam ratione debilitas illa mortis causa esse potest, quod ille fœtus exclusus, ob dictam debilitatem, aërem & lucem ferre nequeat, ab iisque perimatur. Ac denique à constrictione uteri, vel cervicis id pendere potest: uterus in partu sese colligit & constringit, ad exclusionem fœtus, & si nimia fuerit illa constructio, ac fœtus corpus tenellum vehementer comprimatur, eum suffocare potest. Idem potest contingere ab uteri cervice, si dum fœtus ad eam pervenit, sese constringat, eam enim constrictione potest fœtum opprimere. His ita propositis, remedia ad duo erunt dirigenda, imbecillitatem scilicet fœtus corrigendam, & uteri constrictionem nimiam impediendam.

Ratione prioris, conjuges ante conceptionem debent uti victu euchymo & laudabili, ut semen purum, & omni labe vacuum generetur. Tum mater toto graviditatis tempore, eodem victu uti debet, ut sanguinem laudabilem fœtui suppeditet. Et præterea, bis in septimana, pulvere sequenti utetur.

℥. Granorum kermes, rasuræ eboris, corall. præparat. & margaritar. ana ℥. i. mastiches ℥. ℞. manus christi perlat. ℥. ii. fiat pulvis, dosis ℥. i. in ovo sorbili, aut juscule.

Alternis vicibus, loco pulveris, utatur opiata sequenti.

℥. Conservæ rosar. ℥. ii. cortic. citri condit. ℥. i. myrobal. condit. & nucis moschat. condit. ana ℥. f. coralli præparati & margaritar. præpar. an. ℥. i. rasuræ eboris ℥. f. fiat opiata eum syrupo condit. citri, de qua capiat magnitudinem castaneæ, semel aut bis in septimana loco pulveris prædicti.

Si utrumque tandem fastidiat, utatur tabellis sequentibus gustui gratissimis.

℥. Confect. Alkerm. ℥. iii. ambræ grise. ℥. i. sacchari in aqua naphthæ & ros. dissoluti ℥. iv. fiant tabellæ, quibus etiam omni horâ uti poterit, per supra dictorum usum.

Dum ingreditur nonum mensem sequentia applicentur ventri, manè, per dimidiæ horæ spatium.

℥. Vini generosi lb. iii. calefiat, & in eo dissolve olei nucis moschatæ. Unc. sem. pulv. caryophyl. & grano-

rum Kermes ana Drachmas iii. misce, & spongia hoc liquore imbuta umbilico applicetur calidè bis in septimana.

℥. Nucis mosch. macis, caryophyll. & cinnam. ana partes æquales, excipiantur melle calido, ad formam linimenti, & extendantur super crustam panis assatam, & umbilico applicentur manè, singulis diebus vacuis, ab usu fomenti.

℥. Aquæ naphthæ & ros. ana ℥. iii. aquæ cinnam. ℥. i. misce, capiat cochlear. i. singulis diebus manè per totum noni mensis decursum.

Tempore partus exhibeatur cum singulis jusculis drachma r. confect. Alkermes, secundum descriptionem Mesuæi paratæ, ratione dosis ambari, & horâ unâ post jusculum quodvis, exhibeatur aquæ cinnam. cochlear. unum.

Umbilico applicentur frequenter frustum semissæ carnis calidum, pulv. cinnam. nucis mosch. & caryophyll. conspersum.

Ratione constrictionis uteri, aut cervicis illius, si mulier non sit gravida extra hyemem, utatur frequenter semicupio, ex decocto emollientium parato. In graviditate, à principio noni mensis, ad diem partus, illinatur cervix uteri & perinæum oleo seminis lini, sine igne extracto. Actum Montpelii, die 24. Decembris anni 1635.

## OBSERVATIO VIII.

*Dolores vagi circa thoracem.*

**D**. Raymundus Arnaldus Melgoriensis, quinquagenarius, sanguineo temperamento præditus, è bello Italico rediens, conqueritur de sævissimis doloribus singulis noctibus affligentibus, post primum somnum; incipiuntque isti dolores in latere sinistro, simulque ad anteriorem thoracis partem, & posteriorem; tum ad latus sinistrum & scapulas extenduntur, tanta vehementiâ, ut subito expergiscatur, & in nulla decubitus formâ consistere possit; sed assurgere cogatur. Perseverant isti dolores usque ad matutinum, & tunc temporis quiescunt. Nec tota die ullatenus apparent. Jam à duobus mensibus iis vexari cœpit, neque ulla adhuc remedia adhibuit. Medicus, qui pro eo antea scripsit, existimat hosce dolores provenire à catarrho tenui, in eas partes decumbente, horis nocturnis, quo tempore pituitosus humor commoveri solet. Ego verò cenfeo hujusmodi dolores provenire à flatibus, qui illis horis tantum excitantur à calore intensiori, facto ex concentratione ipsius, per somnum. Materia ex qua elevantur flatūs hujusmodi, est illuvies pravorum humorum atque crudorum, in ventriculo, mesenterio, & præsertim regione hepatis congestorum. Hæc autem congestio facta est in castris ob pravam victus rationem. Hinc etiam ventriculi coctio debilitata est, unde fit ut ciborum portio crudior; à pravis humoribus etiam infecta, verratur in flatūs, qui quoque versum transmittuntur. Peracta verò concoctione, non amplius flatūs hujusmodi transmittuntur, & ita dolores cessant circa matutinum.

Ad curationem hujus affectus præscripsi primum evacuationem universalem per apozemata, & phlebotomiam, quibus absolutis præscripsi decoctum chinæ, ad 15. dies quorum usu affectus sensim imminutus est, & sine ullo alio remedio, intra mensem omnino sublatus.

## OBSERVATIO IX.

*Icterus in gravida.*

**C**Lariff. uxor Dn. Daumelas, Franciæ Quæstoris generalis, circa finem septimi graviditatis mensis, occasione quadam concitata est à qua vomitum manè patiebatur cum dolore stomachi, & ictérica facta est. Hic autem icterus duo habebat peculiaria, unum, quod in lecto color faciei & totius corporis remississimam flavitiem referebat: cum verò surgeret, & sese aliquantulum commoveret; intensus multò, & quasi derepente flavescebat. Alterum est quod alvus non erat adstricta, ut vulgò fit in ictericis; sed potius liquida & biliosa deiciebat. Urina erat rubra, sed lintea non tingeat. Ego Medicus ordinarius



MATRIS D. Ranchinum in consilium advoco, ut de phlebotomia decerneretur, ex una enim parte causâ procatarctica suadere videbatur, omnibus enim morbis ab irâ, venæ sectio eximie convenit, propter maximam sanguinis commotionem, quæ ab eâ excitatur. Præterea evaporationes illæ biliosæ subito ex levi mora invadentes sanguinem valde exagitatum testabantur. Neque ab obstructione meatus choledochi oriebatur hic affectus (in quo Galenus venæ sectionem vetat. lib. de sang. miss.) quia alvus fuisset obstructa, & alba dejecisset, sed potius ab hepate accenso & præcalesfacto: ex altera verò parte graviditas jam proventa phlebotomiam dehortari videbatur, & cum ægra ex morbo in abortus periculo versaretur; si post venæ sectionem ille contingeret, culpa in eam rejici potuisset. His postremis de causis noluit Ranchinus phlebotomiæ assentiri: sed decretum fuit rhab. in substantia exhibere ad 3. i. ut bilis per alvum sensim educeretur, quod factum fuit. Parum præstitit rhabarbarum; ægræque post quinque vel sex dies abortum passa est. Fortè venæ sectione liberari potuisset. Sed nostratum mulierum nequitia, omnes infaustos eventus remediis adscribentium, efficit, ut etiam prudentiores Medici, metu calumniæ ab utilissimis interdum abstineant.

## OBSERVATIO X.

*Angina.*

**D**ie decimâ octavâ Februarii 1636. Juvenis quidam fossor anginâ laborabat tam vehementi, ut nec loqui, nec deglutire possêt, respiratio tamen integrâ manebat. Cum ad eum vocatus sum, injectus fuerat clyster, statim verò sanguinem mitti jubeo ad Uncias decem, postea admoventur vesicatorium posteriori cervici, cucurbitulæ scapulis admoventur cum scarificatione, & quatuor horis à venæ sectione exhibentur aquæ benedictæ Unciæ duæ, quibus purgatus est per vomitum, & per alvum, & inde loqui ac deglutire cœpit, ac paulò post integrè curatus est.

## OBSERVATIO XI.

*Symptomata hysterica & hypochondriaca.*

**D**ie decimâ quintâ Martii 1636. Clarissima uxor Domini de Clause, Consilii Regii in Curia Computorum, Subsidiorum, & Fisci Regii, annos nata 54. temperamento pituitoso & melancholico prædita, adversa multis annis fruens valetudine, incidit ex mœrore diuturno in varia symptomata, quæ eam frequenter, & præsertim nocte infestabant. Ea autem erant, dolores totius lateris sinistri, à costis ad ilia pertingentes, ut non posset supra illud latus decumbere, vomitus pituitosi & acidi, capitis dolores, cardialgiæ, & lipothymia ita urgentes, ut sese moribundam putaret, horrores, & tremores totius corporis, quos sudores excipiebant: pulsi valdè parvi, languidi & debiles, eructationes frequentes à copia flatuum per os erumpentium. Cum primum ad eam vocatus sum, præscribo clysterem carminantem & laxantem, potionem ex aquis naphthæ, rosarum, & cinnam. sacculos stomachicos, & oleum nucis moschatae regioni stomachi admoventum, quibus valde sublevata est, & à prædictis symptomatibus liberata. Sed cum ea frequenter redirent, purgatio usurpata est bis intra quatuor dies. Redeuntibus autem symptomatibus exhibui laudani opiatigr. ii. cum conferva rosarum, in forma boli, hora somni, quo intra horam omnia symptomata omnino sublata sunt, & placidè dormivit, neque postea eadem symptomata redierunt adeo vehementia, sed multo leviora. Post purgata est bis in hebdomadâ pilulis specificis, quibus ad melius in dies vergebat. Et sic tandem integræ sanitati restituta est.

## OBSERVATIO XII.

*Colicus dolor.*

**V**igesimali secundâ Martii, anno millesimo sexcentesimo trigesimo sexto, Vidua Domini Dortes summa duritie, & tensione totius abdominis à multis annis laborans unde per intervalla dolores atrocissimos, colicorum instar patiebatur, eodem dolore corripitur multo atrociori, quàm antea circa noctem. Vocatus Pharmacopœus duos clysteres injicit sine ullo fructu, quamvis eorum vi multum purgata fuisset. Vocatus ego manè præscribo pilulam ex laudani granis quinque conflata, & intra horam dolor penitus quievit, nec amplius rediit.

Eodem tempore Domina de Varanda, prædictæ mater, dolore colico vero, cui obnoxia est, corripitur, injicitur clyster à Pharmacopœo, eoque nihil operante, advocor, invenio eam ex doloris gravitate clamanter, & vociferantem; præscribo clysterem ex decocti emollientis lb. i. diaphœnici ʒ. i. aquæ benedictæ ʒ. iii. quo dolor omnino quievit: & ægra multa pituitosa, cum multis flatibus excrevit.

Ego ipse ante unum mensem simili dolore vexatus, neque clystere emolliente carminante & laxante admodum levatus, simili clystere curatus sum, ita ut statim eo injecto dolor omnino quieverit; quamvis clyster non nisi post duas horas rejectus fuerit.

## OBSERVATIO XIII.

*Sanguinis mictio.*

**C**larissimus Dominus de Serres Consiliarius Regius, in Curia Computorum, Subsidiorum, & Fisci Corrector, quinquagenarius, temperamento bilioso & melancholico præditus, cum per multos dies gravia quædam animi pathemata & mœrores passus esset, indeque noctem aliquam insomnem tranlegisset, urinas sanguinolentas reddidit quæ post equitationem immediatè apparuerunt, eodemque tempore urinae acrimoniam seu ardorem passus est. Hinc quoties equitando itineri se commisit, urinas pariter sanguinolentas reddidit, & ardorem prædictum inducentes. In ò verò prædictus ardor urinae sæpe solet recurrere, etiam si urinae sanguine infectæ non appareant. Præterea, cum urina, arenulas quasdam matulæ parietibus adherentes excernit, quas ipse à multis annis excernere solitus est. Quæritur jam, à qua causa proxima & immediata hæc sanguinis mictio dependeat. Cum autem sanguinis mictus in genere à pluribus causis soleat exoriri, in præsentem tamen casu duæ tantum in controversiam revocari possunt. Calculus nimirum in renibus contentus, & asperitate sua venulas collidens, ex iisque sanguinem eliciens, vel humores acres; falsi aut biliosi, prædictarum venarum oscula aperientes. Priorem causam duo potissimum videntur indicare: nempe arenulæ illæ quas æger à multis annis cum urina solet profundere: quasi latentis calculi sobolem esse posse, conjicere quis valeat. Et periodica illa excretio sanguinis, eo solum tempore contingens, quo æger immodico exercitio utitur, equitandoque renes vehementer concutit, unde allisio lapidis ad renis substantiam illiusque venulas, colligenda videtur. Verum hæc duo signa minimè sufficiunt, ut calculum in renibus latentem demonstrare valeant. Præcipua enim signa, & perpetuo vel assidentia, vel præcedentia, omnino deficiunt. Quorum præcipuum est dolor lumborum, qui præsentem calculo abesse minimè potest, sed necessario affligit, & per intervalla recurrit, isque vel gravans, si calculus renem substantia hæreat vel pungens ac lancinans, si in renis cavitate membranea contineatur. Adde quod clarissimus æger nunquam tota vita nephriticis doloribus conflictatus fuerit, neque ullum unquam calculum excreverit; cum tamen fieri vix possit, ut calculosa dispositio, quæ ut plurimum nativa & hæreditaria est, ad quinquagesimum annum otari possit, & ea primum ætate in actum produci, quin prægressis temporibus quædam sui



fui indicia prodiderit, cum præcipua conjectura miſtus ſanguinis, à calculo prodeuntis, ab Authoribus vulgò deſumi ſoleat ex eo, quòd antea laborantes, calculos excreverint. Adde etiam, nullam in ægrotantis parentibus huiusmodi diſpoſitionem calculoſam fuiſſe obſervatam, quod non parvi eſt hac in re momenti. Omnia denique alia ſigna, calculum in rene contentum indicantia, hic protius deſiderantur, ut ſtupor cruris è directo poſiti, teſticuli retractio, nauſea & vomitus, alimenta craſſa diù antea uſurpata, & ſimilia.

Duo verò ſigna pro calculo ſtabiliendo propoſita, ita conſutantur. Arenulæ calculum intus latentem verè indicantes, in fundo matulæ ſubſident, & ſi digitis comprimentur, non facilè comminuuntur. Si verò matulæ parietibus hæreant, & digitis compreſſæ facile comminuuntur (quales ſunt illæ, quæ à noſtro ægrotante excernuntur) calculi indicia nunquam eſſe poſſunt. Neque enim illæ in renibus aut veſica generantur, ſed in venis ac hepate, ex humorum aduſſione, quorum particulæ craſſiores & tartareæ, arenularum formam æmulantur, & cum ſero in venis contento ſeparantur, ac in renes & veſicam detruduntur. Quod cum à paucis fuerit animadverſum; fit, ut multi calculoſi pronuncientur, qui ab eo malo prorsus immunes ſunt. Et quotidiana docet experientia, multos à pueritia huiusmodi arenulas excernere tota vita, qui tamen nunquā calculo laborarunt, quibuſve calculus non facile timèdus.

Periodica verò ſanguinis excretio, eo ſolùm tempore contingens, quo æger equitando ſeſe vehementius exercet, licet ex aliſione lapidis aſperioris in ſubſtantiam renis poſſit contingere; minimè tamen dubium eſt, quin ille etiam ex calore, à motu immodico, in renibus, & tota ſanguinis maſſa excitato citra calculi præſentiam generari poſſit. Humores enim bilioſi & acres, vel pituitæ falſæ naturam redolentes, à motu & calore exagitati, ad renes amandantur unà cum ſero, ſanguini permixto, & renum venulas aperientes, ſanguinis effluviū excitant. Et ita rem ſe habere in præſenti ægrotante prorsus aſſevero, cum ille bilioſo temperamento præditus ſit, & ab animi pathematis vigiliſque ſuprà recensitis, ſanguinis maſſa majorem aduſſionem adepta fuerit. Tum eorum humorum, qui per renes efferuntur acrimonia, ex urinæ ardore, quæ illum ſæpiſſimè afficit, etiam citra ſanguinis effluviū, facilè innotefcit.

Hanc noſtram ſententiam doctiſſimorum virorum placitis eſſe conſentaneam, infinitis exemplis facile eſſet oſtendere. Nonnulla tantum annotare ſufficiet. Hollerius vir in artis operibus, ſi quis alius, exercitatiſſimus, cap. 25. lib. de morbis internis. Quibuſdam (inquit) naturis eodem modo ſanguis per vias urinarias excernitur, quo aliis per nares, venas ſedis, aut vomitum. At experientiâ conſtat, huiusmodi ſanguinis excretiones in diſpoſitis ſæpè recurrere, quando vehementiori exercitio eorum corpora incaleſcunt. Poſſet igitur ſanguinis miſtio, illiusque reſuſcitatio, à ſanguinis & humorum calefactione ſuſcitari. Mulò apertius rem explicat idem Author comment. aph. 78. ſect. 4. Sunt (inquit) nonnulli, qui ſi durius equitent, aut ſeſe exerceant immoderatiùs, excalefactis renibus, ſanguinem meiant. Doctiſſimus Montanus conſ. 283. caſum proponit cujuſdam Episcopi Hungari, huic noſtro tam ſimilem, ut ad verbum hic deſcribendus videatur. Ejus igitur verba hæc ſunt: Arbitramur (inquit) ſanguinolentiam urinam, & turbidam reddi ab hoc Reverendiſſ. Episcopo, propter dilatationem, factam tum in cavitatibus renum, tum in vaſis urinariis, propter intenſam caliditatem à motu violento primò generatam, dum curru, ſalebroſo itinere conſuenter; præcipuè circa dorſi regionem, deinde ſuccedente ingenti calore, dum cum veſte pellicea ſub ſole ardente montem aſcenderet. Ex his igitur omnibus tantus calor circa partes renum fuit excitatus, ut ob nimiam dilatationem urina ſanguinolenta excreta fuerit. Et inde eſt, quòd nunc quoque quotieſcumque deſatigatur, & corpus exercet, in idem ſymptoma incidat, turbidæ ſcilicet & ſanguinolentæ urinæ. Excitatur enim dilatatio ob motum, quæ in quiete deliteſcit. Ardor autem excretionem urinæ, ſimulque dolor circa anum, ab

Lazar. Riverii Opera.

eadem cauſa provenit; videlicet ab illa urina fœculenta, habente in ſe partes acres & rodentes, vel bilis, vel humoris aduſſi, vel pituitæ falſæ, vel omnium ſimul. Dolor verò, qui circa ani regionem percipitur, eſt in ipſis muſculis colli veſicæ, quod quidem collum illis partibus adjacet, & in ea poſſimum parte non ſine ratione dolor percipitur. Hæc Montanus. Ex quibus etiam apparet, unam eſſe calculi veſicæ ſuſpicionem, quam æger noſter ſibi affigere voluit, ex ardore urinæ, & ani irritatione deſumptam; cum ea ſymptomata ab iſdem cauſis proveniant, quas miſtum ſanguinis provocare oſtendimus, Horſius cbs. 37. lib. 4. Puer (inquit) annorum octo magnifici Cancellarii Joannis Struppil filius, macilentæ conſtitutionis, dejectum patitur appetitum, ſiti premitur, & urinam omninò ſanguineam amittit, abſque omni dolore lumborum, nec etiam in ipſa excretionem quicquam ſentit, eſt cruenta miſtio frequenter accidat, quod in calculo renum, in eorum, vicinarumque partium exulceratione, ſimilibuſque morbis maniſeſtum eſt. Rarus tamen hic affectus eſt, reſpectu præſentis caſus, ubi talis miſtio ſanguinis omninò ſine dolore accidit, quo colligitur, nec à calculo, continuum ſolvente, nec etiam ab exulceratione quadam, cruentam hanc excretionem fieri. Reſtat igitur, in acrimoniâ bilioſi ſanguinis, & imbecillitate renum huius affectus cauſam eſſe quærendam. Hæc Horſius. Quæ exempla hic paulò exactius adſcribere volui, ut clariſſimi laborantis animus à calculi in renibus aut veſica geniti metu, quo diutiùs, ex alterius Medici ſententia, inquietatus eſt, prorsus liberetur.

Quòd ad curationem attinet; ea ad duas intentiones revocanda eſt: humorum ſcilicet acrimoniam temperandam, & renes corroborandos, ne humores acres, aliunde conſuentes, tam facile recipiant. Ad hanc rem faciet primū victus refrigerans & increaſſans, quo ſere æger ab aliquo tempore uti cœpit, & in quo diu perſeverare debet utendo præſertim lactuca, plantagine, & portulaca in juſculis, tum etiam hordeatis, avenatis, oryzatis, & ſimilibus, tum etiam in potu aqua ferrata, cum vino rubro, aliquantulum aſtremo. Abſtinendo ſemper à vehementibus corporis & animi motibus.

Licet autem clariſſimus æger haud multo abundet ſanguine, utile tamen cenſuerim, ſanguinem brachio detrahere ad 3. vi. vel vii. ut totius maſſæ humorum calidior intemperies melius corrigi valeat. Imò verò, ſi affectus diutiùs conſiſteret, derivatio quædam per inferiora, aperta venâ malleoli, aut provocatis hæmorrhoidibus, videretur conſentanea.

Post modum verò purgatio blanda maxime conveniet, eaque per intervalla erit repetenda, ut humores ad renes conſuentes, per alvum educantur, cujuſ compoſitio talis eſſe poterit.

℞. Fol. lactucæ, portul. plantag. & ſummit. malvæ, ana m. ſ. tamarind. 3. β. myrobal. citrin. 3. i. coquantur ad 3. vi. colaturæ infunde caſſiæ recenter extractæ 3. i. colentur iterum, & poſteà diſſolve rhab. in aqua lactucæ cum ſantalo citrino infuſi drach. i. β. mannæ, & ſyrupi roſac. ana. 3. i. miſce fiat potio.

Post primam purgationem, julepi, apozemata, juſcula, vel emulſiones, prædictas indicationes reſpicientes, ad ægrotantis tolerantiam accommodari poterunt, iſſque ad aliquod tempus uſurpatis, lac ovillum, vel caprillum erit convenientiſſimum. Et maxime commendatur ab Hippoc. Avicennâ, & recentioribus, inter quos Gattinaria & Forreſtus ſe hoc ſolo remedio ſanguinis miſtum ſæpè curaffe gloriantur. Unicuique autem doſi boli armeni veri drach. i. permiſcent, quod quidem ut graviore ſanguinis miſtui convenit, ita in hoc leviori raro faciendum cenſuerim.

Quia verò æger ſicco atque macilento habitu præditus eſt, eoque calido & ſicco; ante & poſt lactis uſum, balneum aquæ tepidæ illi convenientiſſimum eſſe cenſuerim, & toto æſtatis tempore frequenter uſurpatum, in formam ſemicupii.

Post uſum lactis, utatur Meynenſibus.

Intermediis temporibus, ſi ardor urinæ aliquando urgeat; aqua ſorum althææ cum aqua roſarum, vel conſer-

Rrr

va



va florum malvæ, vel althææ, aut denique emulsiões, aliæque prædicta usurpari poterunt.

Ac denique pro curationis sigillo, opiata roborans, mediocriter adstringens & refrigerans, in usum revocari poterit. Neque inutile futurum esset, perseverante affectu, causticum tibiæ inurere, ad humores acres, in renes & urinas defluentes, sensim derivandos.

Toto curationis decursu, topica renibus admota, erunt maximè proficua, cæque refrigerantia & adstringentia.

℞. Unguenti Comitissæ, & refriger. Galen. ana ℥. ii. abluantur oxycrato, diligenter, & inungantur lumbi frequenter.

Lamina etiam plumbea, multis foraminibus perforata, supra renes diu gestari poterit.

#### OBSERVATIO XIV.

##### *Caruncula virgæ.*

**S**equentia remedia transcripta sunt in camera Computorum Monspelienſi, quibus Geofroy Giannatus curavit Carolum IX. Galliarum Regem, anno 1584. Et donatus fuit duobus millibus aureorum.

Primo ℞. cassiæ recentè extractæ ℥. β. succi liquirit. ℥. i. elect. de succo rosar. ℥. ii. aquæ lupuli ℥. iii. fiat potio exhibenda manè, postea per decem dies bibat sequentis decocti ℥. viii. tepidas.

℞. Rad. liquirit. raf. althææ, sebesten, passular. ana m. i. sem. althææ, malvæ, apii, petrosel. ana drach. f. aquæ fontis ℥. ii. bulliant ad medias, de qua sumat ℥. viii. per decem dies, præcedente potione, vel bolo ex cassia.

##### *Modus primum unguentum conficiendi.*

℞. Olei rosac. ℥. i. cerusæ venetæ Unc. iii. caphuræ ℥. β. tuthiæ aquæ rosar. præp. ℥. f. lithargyri auri præp. Unc. iii. antimonii optimè pulverati ℥. i. f. opii, thuris masticuli, seu olibani, mastiche, aloës hepatic. an. ʒ. ii. misceantur omnia, & in pyxide plumbea servantur.

##### *Modus secundum unguentum parandi ad consolidandum.*

℞. Unguenti rosati Gal. recentè parati, & loti aqua rosar. unguenti albi Rasis camphorati ana Unc. i. pomatæ sine speciebus paratæ ℥. f. misceantur simul, & in pyxide plumbeam reponantur ad usum.

##### *In applicatione unguenti sic te gere.*

℞. Candelam tenuiss. ex cera alba, tela vetustissima & tenuissima involutam. Ut autem appareat locus carnositatis. ℞. candelam prædicta crassiorē, oleo amygdal. dulc. illitam, & in virgæ canalem intromittatur. Quod si obstaculum appareat impediens, ne candela possit ulterius progredi; nota locum in candela, & mensura longitudinem candelæ intrantis, deinde involve candelam linteolo, eamque illine in extremitate unguento, & tunc immitte candelam in virgam, quousque carnositatem attingit. Quod si duplex carnositas appareat; tunc ita primum unguentum aptandum, ut utramque attingat, continuando per 15. 18. aut 20. dies juxta mali magnitudinem, & prout carnositas videbitur aperiri ac in pus dissolvi. Cum autem videbis urinam liberè & facilè reddi, pauco pure turbatam, tunc oportebit primum unguentum griseum à candela tollere, sed illines candelam totam secundo unguento, continuando octo, aut decem dies, quousque pus non ampliùs effluat cum candela, nec ullus dolor inter meiendum percipiatur, quo tempore abstinendum erit à remediis.

#### OBSERVATIO XV.

##### *Dolor Nephriticus.*

**D**Ecimâ octavâ April. 1636. Vidua D. Dortes dolore Nephritico vehementissimo vexabatur, qui à rene sinistro ad pubem usque secundum longitudinem ureteris exporrigebatur, cum urinæ acrimoniâ, & frequenti micturitione: huic neque clysteres cum aqua benedicta; neque cum terebinthina; neque cum laudano: neque vomitus

ingens, qui sponte veniebat; neque semicupium; neque laudanum assumptum quicquam profuere, dolore clamoso per biduum perseverante. Tandem aperta fuit vena malleoli, & statim sanguine missò, dolor ingens quievit, superstite tamen dolore obtusiori.

#### OBSERVATIO XVI.

##### *Lumbrici.*

**D**ie Junii 1636. Puella trium annorum, filia pastoris, nomine Roberti, laborabat febre acutissima, cum anxietate magnâ, & virium prostratione. Vocatus ad eam circa vespèram, judico eam ex lumbricis laborare, & præscribo potiunculam ex hieræ ʒ. β. syrupi rosacei ℥. β. cum aqua portulacæ, quæ nocte eam purgavit, & inde plurimum levata est: postridie præscribo julepos sequentes.

℞. Fol. acetosæ, portulacæ, & endiviæ ana man. i. summit. hyperici & scordii ana p. i. coquantur ad ℔. i. in colatura dissolve syrupi limon. ℥. iii. fiat julep. capiat ℥. iii. manè, meridie, & vesperi. Intra biduum omninò curata est.

Triduo post filia D. Beuf, Mercatoris, annos sex nata, simili morbo laborabat, idque gravissimè. Præscribo eadem remedia cum eodem successu, sed hiera erat ad ʒ. i. syrup. rosac. ℥. i. in potione.

#### OBSERVATIO XVII.

##### *Dolor tensivus abdominis.*

**D**ie 15. Junii 1636. Petrus Blanc, civis Monspelienſis diuturno alvi fluxu laboraverat, undè valdè debilis & macilentus evaserat. Tandem 15. Junii 1636. murmur ingens percepit in abdomine, ex quo vomitus consequutus est, ac deinde tensio dolorifica cum febre eum maxime afflixit; nihil per vomitum aut secessum omnino rejiciebat & clysteres puros sine ullo excremento reddebat. Jussu imperiti chirurgi lumpsit medicamentum purgans, ex quo nihil dejecit; sed tensio & dolor indè maxima sumpserè incrementa. Vocatus ego, quinto die morbi, invenio hominem valdè debilem, facie hippocraticâ, & extremorum frigiditate, mortem imminuentem indicantibus. Valdè anxius fui in hujus morbi diagnosi, & nihil aliud potui excogitare, quàm ingentem inflammationem, quæ tumore insigni intestina comprimeret, & excrementorum transitum impediret. Aperto cadavere, inventa sunt intestina crassa livida, & semicorrupta, unumque ex iis perforatum, in abdomine verò multi humores foetidissimi, ex quibus apparuit, humores excrementitios, qui ad intestina confluere jamdiù solebant, & alvi fluxum efficere, tandem diutius moratos, ob facultatem expultricem debilitatam intestina corrupisse, ac tandem pondere suo eam partem, in qua humores dicti morabantur, magis putrefactam aperuisse, & impetu in abdomen irrupisse. Ac consequenter alimenta & clysterum partem, illud foramen, ad capacitatem abdominis fuisse translata.

#### OBSERVATIO XVIII.

##### *Febris maligna.*

**D**ie 4. Junii 1636. Petrus Stelle Consul oppidi, Perolæ nominati, quadragenarius incidit in cholera morbum, qui intra 24. horas ope remediorum cohibitus est. Hinc sequuta est tertio die morbi hæmorrhagia copiosissima, ex qua valdè debilitatus est; siti tamen ingenti à morbi principio tenebatur, & inquietudinibus, cum æstu præcordiorum. Vocatus ad eum, invenio pulsum parvum & frequentissimum, cum facie hippocratica, mox habitum corporis perlustrans, eum invenio maculis latis & lividis conspersum: undè summa morbi malignitas colligitur, quæ tantorum symptomatum causa fuerat. Præter remedia ordinaria, & julepos cardiacos, cum sale prunellæ, ter in die exhibendos, hunc pulverem præscribo.

℞. Salis prunellæ ʒ. β. camphoræ ʒ. β. misce fiat pulvis qui,



qui dividatur in quatuor partes, quarum unam capiat tertia quaque hora, Noctu hunc pulverem sumpsit, & manè multò melius habuit. Jubeo iterari pulverem cum aliis remediis, & eadem die à præsentaneo vitæ periculo liberatus est, ac paucis postmodum diebus omninò convaluit.

## OBSERVATIO XIX.

*Cholera morbus ex superpurgatione.*

**G**ladiatorum faber, qui pro insigni habet florem lilii; purgatus à tonsore, pulvere quodam valido, vigente æstu, & ipse admodum biliosus, nocte insequenti passus est superpurgationem violentam, quâ identidem biliosa & aquosa per alvum & vomitum rejiciebat, cum dolore ventriculi, sui intensa, & virium dejectione maxima. Postridie manè vocatus exhibeo statim laudani gr. vi. intra horæ quadrantem omnia symptomata quieverunt. Nihilominus admoti fuerunt sacculi roborantes ventriculo, vino rubro macerati, & eadem die omninò sanus fuit.

## OBSERVATIO XX.

*Alvi fluxus contumax.*

**D**ie 8. Septembr. 1636. C. Petrus Hucherus, Joannis Hucheri, olim Universitatis nostræ Cancellarii celeberrimi filius, post febrem tertianam diuturnam, alvi fluxu corripitur tam vehemente, ut intra triduum vires omninò prostratæ fuerint, & ille de vita periclitaretur. Vocatus ego, præscribo primùm rhab. pulv. 3. i. quâ multò pejus habuit; sequenti die hora somni bolum ex mastiches & terræ sigill. an. 3. 6. laudani gr. iii. alvus cohibita est, tamen non dormivit; sequentibus diebus alvum deponebat tantum bis aut ter; intra paucos dies omninò convaluit. Eodem tempore Dn. Grassëtus in curia Computorum Præses, post longam febrem continuam, cum accessionibus junctam, correptus est alvi fluxu molestissimo; quo vires admodum resolvebantur. Invisëbam eum cum altero Medico seniori, & una tentavimus primùm roborantia varia, postmodum adstringentia, omnia incassum. Senior Medicus exhibitione laudani noluit unquam acquiescere, & fluxus ad viginti dies perduraverat, semper eodem impetu procedens, proposueram etiam sæpè tincturam corallorum, quæ roborando hepar, fluxus cohibet, tum potenter refrigerat, quod maxime optandum erat in hoc ægrotante, bilioso temperamento prædito. Ea verò per multos dies neglecta fuerat. Tandem me quotidie urgente illius præparationem & exhibitionem, in usum revocata est, ægerque de ea sumpsit 3. ii. bis in die per triduum, quo remedio alvi fluxus manifestè imminuebatur in dies, & excrementa concocta apparebant, ita ut paucis diebus integra sanitas inde revocata fuerit.

Nota illi antea fuisse exhibitum cum juscule rhab. bis infusum in aqua cichorii, ac deinde exsiccatum, ex quo pejus habuerat.

## OBSERVATIO XXI.

*Dolor capitis ab insolatu.*

**D**ie 8. Octobr. 1636. Dn. Guillelmus Dortomannus, Patronus celeberrimus, cum esset in villa, circa meridiem sese soli exposuit, eundo pedibus in aliam villam, satis à sua distantem, hinc correptus est paroxysmus febris tertianæ duplicis satis levibus, & circa vesperam recurrentibus: hoc tamen symptoma in paroxysmo urgebat, nempe capitis dolor intensus, qui tribus primis diebus cum febre cessabat, matutinis horis. Interim facta fuit vena bis, & purgans medicamentum semel exhibitum. Quibus non obstantibus dolor capitis & æstus plurimum increvit, & continuus factus est post quartam accessionem,

*Lazar. Riverii Opera.*

horis enim matutinis, non minùs quàm reliquis, saevissimè eum inflabat, neque febris omninò aberat. Cum igitur ab insolatu dolorem istum concitatum fuisse appareret, metuendum erat, ne inflammatio fieret in cerebro, frontalia enim repellentia frustra adnota fuerant. Ut autem grave hoc symptoma tolleretur, venam frontis aperiendam consului ex eaque sanguinis 3. viii.eductæ sunt, à qua venæ sectione dolor capitis statim valdè remissus est, & sequens paroxysmus nullo levior rediit, cum exiguò capitis dolore. At postera die mane doloris omninò expers fuit.

## OBSERVATIO XXII.

*Febris hectica cum putrida complicata.*

**D**ecimâ tertiâ Octobr. 1636. Filia Dn. de Serres, in Curia Computorum Correctoris, annos nata 14. circa finem Æstatis, correpta est febre tertiana intermittente, quæ post quatuor paroxysmos sponte desit, & post aliquod tempus iterum rediit, ac cessantibus iterum paroxysmis febricula quædam eam occupavit, cum obstructionibus ventris inferioris, quibus menstrua suppressa sunt. In hoc statu permansit per tres menses, sine ullis remediis, cum ruri esset. In principio Octobris ad eam vocatus, invenio febre lenta affectam, cum summa macie, & calore ad tactum valdè acri, qui nocte ingravescibat, illa tamen se febrile non percipiebat, ac licet calor igneus noctu appareret; siti tamen non afficiebatur, unde febrem illam in hecticam verti conjicimus, cum & incallescencia post singulos passus appareret, & circa longitudinem arteriæ brachii, calor intensior multò perciperetur, quod ipsi adstantes advertebant; & in urinis oleosum quippiam innataret. Cum igitur appareret complicatio febris putridæ cum hectica incipiente, ad putridæ sublationem primò animum convertimus; ac statim sanguinem detraxi jussimus à basilica dextra ad 3. vii. Postera die purgata est blando medicamento. Tertia julepum hausit refrigerantem & aperientem. Quarta iterum vena secta: sanguis enim valdè adustus & corruptus apparebat. Continuati julepi, fatus emolliens & aperiens regioni lienis admotus, emolliens & purgans injectus est, quo multum purgata est, ac febris valdè exacerbata est; pulsus erat parvus & frequens calor acer & mordax; quæ omnia tota nocte & media parte diei sequentis perseverarunt. Duobus diebus subsequenter multò melius habuit, febris erat remissa, exacerbationes nocturnæ etiam valdè remissæ sunt; tumor lienis, & renitentia minor; tum dolor, qui tangendo, & aliquantulum comprimendo lienem percipiebatur ab ægra, ferè sublatus est. Interim fatus, linimenta & juscule aperientia continuabantur. Post illud biduum purgata est blando medicamento, quo multa pituitosa vomitu rejecit; & bis tantum dejecit. Eadem die febris adhuc remissior apparuit. Postea continuata sunt juscule aperientia, fatus & linimenta; tum in tertio quoque juscule fenic. sem. infusa fuit. Sic paulatim ad pristinam valetudinem revocata est.

## OBSERVATIO XXIII.

*Pinguis corpuscula per alvum excreta.*

**F**ilia Domini de Rochemore, in Curia Computorum & Subsidiorum Principis, nomine Lucretia, ætatis annorum trium, laborabat febre continua verminosa. Excrementa dejiciebat valdè cruda; & veluti gypsea, in quibus inveniebantur interdum globuli virides instar pisorum majorum, qui suprâ orbem positi, dum orbis igni admovebatur, & tantillum incallescere, statim butyri instar liquabantur. Cum nunquam antea talem materiam vidissem, neque ullum Authorem de ea scribentem legissem, valdè dubius fui, unde ista materia suam duceret originem. Pharmacopœus ferex & expertus retulit, se in propria filia similes excretionem observasse. Tandem cum à pinguedine, aut humido oleoso ipsius corporis

Rrr 2

non



non videretur hæc materia procedere: (hæclicâ enim febre, aut colliquante ægra non laborabat.) Et excrementa admodum indigesta apparerent; conjeci hanc materiam procedere ex pinguedine assumpta cum carnibus, quæ nimia copia offerebantur; vel cum jusculis, à pinguedine malè repurgatis, quæ pinguedo relaxando ventriculorum coctionem læderet, malè in ipso concoqueretur: præsertim cum alia etiam alimenta, nimia copia ingesta, malè cocta remanerent. Illa igitur pinguedo diu in ventriculo, aut intestinis retenta, à calore crassitiem & colorem illum viridem obtinebat.

Duodecimâ Octobr. 1636. hanc meam conjecturam confirmavit alius casus viri cujusdam hypochondriacâ melancholia laborantis, qui sibi frequenter venenum porrigi putabat, quod ut oppugnaret, magnam olei copiam frequenter ingerebat. Reiciebat autem similes globulos, quos ipse liquabat; & in phialis reservabat. Hæc autem materia in phialis contenta amurcam referebat, nullius prorsus odoris. Unde conjeci, oleum magnâ copiâ ingestum, non posse totum à naturâ superari, sed crassiores partes calore diuturno magis incrassari, & in hujusmodi globulos effingi, qui liquati amurcam referebant.

## OBSERVATIO XXIV.

*Angina.*

**D**ecimâ quartâ Octobris 1636. quidam sartor quadragenarius, vocatus Vendemiam, Angina laborabat, qua deglutitio impediatur, eique secta fuerat vena, clysteres injecti, & admotum vesicatorium à Pharmacopœo. His non proficientibus me vocant: & advertens, cum vix tantillum jusculi, ex cochleari, magno conatu deglutire, ac per consequens medicamentum purgans haurire non posse: præscribo aquæ benedictæ ℥. ii. quibus purgatus est pluries per vomitum & secessum, eademque die ab Angina liberatus.

## OBSERVATIO XXV.

*Dolor Ischiadicus.*

**O**ctavâ Januar. 1637. Dn. Greffucille, in suprema Computorum Curia Consiliarius, coxendico dolore vexabatur, rigida hyeme: injectis clysteribus, sumpto medicamento purgante, & admoto emplastro parti affectæ, dolor nihilo secius perseverabat: tandem aperta est vena malleoli è directo partis affectæ, & intra paucas horas dolor remissus est, ac postmodum omnino desit, ut secundo à venæ sectione die ad consueta munia transire, & per urbem pedibus ire potuerit.

## OBSERVATIO XXVI.

*Affectus soporofus, hypnotico curatus.*

**D**ie vigesimâ secundâ Octobr. 1639. Virgo quædam Melgoriensis 20. annos nata, nomine Liquiere, tentata fuerat febre tertiana duplici, circa initium Autumni per 12. dies, ab eaque post quorundam remediorum usum liberata. Iterum recidit in similes paroxysmos, qui ab initio more consueto invadebant, sed postmodum nova quædam symptomata cum paroxysmo accesserunt, nempe dolor insignis, faciei rubor, oculorum prominentia, dolor lateris sinistri pungitivus, & deglutendi summa difficultas, perveniens tamen cibus & potus usque ad extremum œsophagi; & juxta orificium ventriculi, subito rejiciebatur, si quid verò intromittebatur, id magno cum labore fiebat. Suspensus sum hystericam affectionem cum paroxysmo febrili complicari, & hystericæ remedia præscripsi, quibus non obstantibus malum perseveravit. Post aliquot dies hujusmodi symptomata sine febre redibant, quod meam opinionem maximè confirmavit tum quod dolor lateris sinistri ad dextrum interdum transliebat, interdum verò dolores pungitivi in variis abdominis parti-

bus apparebant, ventriculorum dolor & nausea infestabantur ægra suffocatione interdum premebatur. Tria in hoc affectu peculiaria observavi. Primum erat deglutendi difficultas, quæ non est frequens in hystericæ affectu, ea tamen non erat perpetua; sed interpolata: impediēbat enim cibi potusque assumptionem per multas horas, deinde prorsus evanescebat, ut etiam pilulas sine ulla molestia, me præsentē, deglutierit. Secundum erat, quod isti paroxysmi hystericæ periodicè recurrebant singulis diebus, nempe vespertinis horis, quemadmodum accessiones febriles. Tertium, quod urgente dolore stomachi cum aliis symptomatibus, sacculi roborantes & calefacientes, aliæque remedia calida augerent affectum, & suffocationem inducerent. Quod cum mihi relatum esset, & principio unius paroxysmi adesset, conquerente ægra de maximo ventriculi dolore; jussi, ut crusta panis assata, & in vino calente madefacta, ac pulvere caryophyllorum, & nucis moschatae conspersa, ventriculo apponeretur; quo remedio aucta plurimum fuit suffocatio; ita ut illud abjicere necessarium fuerit. Tum tentandi gratia jussi, ut linteam quadruplicatum in oxycrato maceratum ventriculo frigide admooveretur, eoque admoto, cessavit illico suffocatio, ac dolor ventriculi. Huic rei fuit aqua frigida eodem tempore assumpta, cujus guttulas aliquot magna vi deglutivit, earumque frigiditatem in ventriculo percepit, & statim levata est. Postea jussi ut iterum crusta panis calida admooveretur, quam tunc temporis patienter tulit; cujus rei rationem esse puto; quod vapores commoti, & ventriculorum afficientes, à calorificis magis commovebantur. At postquam frigidis remediis compressi fuerant, ventriculus ab iis vaporibus immunis, calida remedia facile tolerare poterat. Puto à febre præcedente corruptum fuisse semen retentum, quod talia symptomata producebat. Fortè etiam reliquæ sanguinis mensuræ putrefactæ ad eosdem affectus producendos concurrere poterant. At materia illa putrefacta motus habebat periodicos, quemadmodum videmus sæpè materiam abscessuum interiorum moveri etiam periodicè, & paroxysmos tertianæ febris æmulari.

Antequam autem paroxysmo corripere, cum tunc temporis optimè deglutiret, sumpsit meo jussu quatuor exiguas pilulas, compositas ex laudani gr. iiii. & paulò post accessit paroxysmus suprà enarratus; sed post duas horas, laudano operari incipiente, omnia remissa fuerunt, & totâ nocte bene habuit, cum prægressis noctibus maximè torqueretur. Postridie mane sumpsit apozema hystericum & purgans, idque triduo continuavit, quibus absoluta est curatio. Multum dubitavi in exhibitione laudani, quod in paroxysmo ægra sopore gravi afficeretur, qui usu laudani gravior effici poterat. At tandem hoc apud me constitui, soporem illum à vaporibus ex utero ad cerebrum affatim translatis exoriri, quorum ascensum prohibendo, sopor impediri poterat. Et eventus huius rationis respondit. Unde vera elicitur conclusio, quæ prima fronte videtur valde paradoxa, nempe soporofum affectum usu laudani prohiberi posse.

## OBSERVATIO XXVII.

*Tormina puerorum.*

**D**uodecimâ Decembris 1636. Filiolus meus Carolus, ætatis quatuor mensium, correptus fuit colico dolore sævissimo, qui clamores, & ejulatus continuos ab eo extorquebat. Exhibui pulveris elect. diamoschi dulcis ℥. s. cum lacte, quo dolor quievit per horæ quadrantem, & iterum rediit cum pari sævitia. Injectus fuit clyster ex decocto anisi & chamomillæ, cum vitello ovi & saccharo, eoque dolor omnino sublatus est. Post octiduum eodem dolore affectus est, tam acerbo, ut prior deterior appareret, prout ejulatus indicare videbatur; sumpsit pulverem prædictum, sed frustra; injectus fuit clyster prædictus, etiam frustra. Tandem admoveo fotum toti ventri ex decocto anisi & chamomillæ in aqua vitæ: prima applicatione dolor omnino desit. Sequenti iterum rediit dolor; eoque aliquantulum mitigato remediis



remediis prædictis, postera die manè exhibita fuit syrupi rosac. ʒ. i. quem assumendo vomuit pituitam instar albuminis ovi, sed nihil fere deiecit, torinina recurrebant. Iteratus syrupus cum ʒ. i. infusionis fennæ, etiam hoc medicamentum parum præstitit. Tandem exhibui pulverem comitis ad ʒ. ʒ. cum lacte, eoque blande & copiose purgatus est, & ab hoc affectu omnino liberatus.

## OBSERVATIO XXVIII.

*Fluxio in pulmonem in Infante.*

**D**ecimâ nonâ Januarij 1637. idem filiolus meus Carolus incidit post mensem à priori morbo, in catarhum sævissimum, in pectus delabentem, quo frequenter tussiebat, & inter respirandum stertebat. Purgationem exhibui ex syrupo rosaceo cum infus. fennæ, qua pituitam evomuit, sed parum deiecit. Syrupi pectorales exhibebantur, inunctiones pectori admovebantur. Perseverante affectu, eadem purgatio iterata est cum exiguo fructu. Tandem exhibeo pulveris comitis ʒ. ʒ. cum lacte, quo blandè & copiose purgatus est, eademque die convaluit.

## OBSERVATIO XXIX.

*Urinæ suppressio.*

**V**igesimâ septimâ Januarij 1637. Dn. de Labaie, in Curia Computorum Auditor, urinæ suppressione omnimodâ, laborabat biduo, cum dolore renis sinistri, & ureteris ejusdem lateris. Injecti fuerant clysteres ex præscripto alterius Medici, & fatus admoti pubis regioni. Vocatus sum in consilium cum dicto Medico, præscripta fuit apertio hæmorrhoidum (quæ intumuerant:) admotis hirudinibus, iteratus clyster emolliens; cum dimidia oleorum portione, fatus admotus reni & ureteri, mox inunctio ex oleo scorpion. & amygdal. dulc. tum etiam catapl. ex fæce decocti emollientis, cum cepis coctis sub cineribus, eodemque tempore exhibitus julepus sequens.

ʒ. Succor. parietariæ, & fœniculi marini. ana ʒ. i. ʒ. fucci limon. & ol. amygdal. dul. recent. ana ʒ. i. misce fiat julep. Intra horam ab assumpto julepo copiosè minxit & liberatus est, horis septem ab initio consilio, in quibus prædicta remedia administrata sunt. Ad sigillum curationis, sumpsit postridie manè bolum ex cassia, rhab. & cremore tartari.

## OBSERVATIO XXX.

*Gonorrhœa contumax.*

**S**extâ Februar. 1637. Dn. N. triginta annos natus, bilioso & sanguineo temperamento præditus, cum gonorrhœam pateretur à duobus mensibus: & à Chirurgis multa incassum tentata fuissent remedia, meæ curæ sese commisit. Huic primùm præscribo phlebotomiam malleoli, postridie mercurii dulcis ʒ. i. cum diagrid. ʒ. ʒ. in juscule, postmodum bolum ex terebinth. ʒ. iii. & rhab. ʒ. i. per sex dies integros, quæ nihil profuerunt. Iteratur pulvis purgans, & postea sequenti aqua usus est per 12. dies, quæ statim profuit, isque omnino curatus est, detergebat ulcus internum tam potenter, ut urina in pavementum effusa, illud inficeret colore albo, instar calcis dissolutæ.

ʒ. Menthæ siccæ ʒ. iii. fem. lactucæ, ruthæ, agni casti an. ʒ. ii. ʒ. ireos florent. ʒ. ii. dictamni cretici ʒ. x. sacchari ʒ. ii. omnia pulveriscentur, addendo terebinth. claræ ʒ. v. vini albi generosi ʒ. xxx. misce, destillantur in B. M. capiat æger cochlearia duo mane duabus horis ante cibum, & vespri quatuor, à cœna.

## OBSERVATIO XXXI.

*Hysterica Epilepsia.*

**D**ecimâ septimâ Februar. 1637. Uxor Dn. Palemar-chi de Sumenes, per multos annos variis affectibus

hystericis vexata est, qui epilepticos insultus referebant. Multa tentavit remedia, à multis Medicis præscripta, sed omnino incassum. Tandem cujusdam mulieris consilio sumpsit carnem lupi in pulverem redactam, & frustulum ejusdem carnis salitæ semper gestavit, à quo tempore immunis omnino fuit à prædictis affectibus.

## OBSERVATIO XXXII.

*Mensium fluxus immodicus.*

**D**ie 6. Martij 1637. inter alia remedia, uxori Dn. de Vitrac præscripta, quæ ad extrema redacta fuerat, ex immodico fluxu mensium, post abortum concitato, sequens julepus mirum in modum profuit.

ʒ. Flor. chamæleontis, spicæ nardi, & sang. draconis subtilissimè pulverat. ana ʒ. i. aquæ plantag. & rosar. ana ʒ. i. ʒ. fiat julep. hujus cochlearia duo dabantur bis in hora.

Extractum coralli cum aqua plantag. profuit etiam non parum.

## OBSERVATIO XXXIII.

*Colica biliosa.*

**D**ie decimâ octavâ Maii 1637. mulier quædam patiebatur dolores colicos atroces & pungitivos, totum ferè abdomen afficientes. Ab alio Medico seniore curata fuit remediis ordinariis calefacientibus, carminantibus, & phlegmagogis, à quibus nullum levamen percepit. Tandem vocatus ego, ex specie doloris, situ ejusdem, temperamento mulieris præcalido, & urinis valdè rubris conjicio colicam esse biliosam; & præscribo statim venæ sectionem, clysterem refrigerantem ac lenientem, & julepum refrigerantem, quibus dolor valdè imminutus est, cum verò sanguis valdè biliosus ac corruptus appareret: iterata est postridie phlebotomia, qua dolor prorsus evanuit. Ac tandem potione cholagoga, curatio absoluta est. Præscriperam ab initio semicupium, quo non usa est propter maximam doloris imminutionem.

## OBSERVATIO XXXIV.

*Febbris maligna.*

**D**ie septimâ mensis Junij, anni 1637. Dn. Patris in Curia Præsidiali Consiliarius, annos natus 55. correptus est levi frigore, & tota nocte febricitavit, eodemque modo perseveravit. Postridie manè febris expers, & vespri iterum febricitavit, eodemque modo perseveravit febris intermittens, usque ad septimam diem, quâ facta est continua. Attamen frequentes patiebatur pedum & genuum ac interdum manuum perfrigerationes, urinæ, sanorum urinis similes; tamen omnia in dies in deterius vergebant, ut faciliè appareret, febrem esse malignam, quam tandem indicarunt exanthemata, nono die apparentia, tum deliria, & motus manuum convulsivi, cum sopore quodam, & alvi fluxu. Cura ordinaria fuit administrata. Sed hoc peculiariter notandum, quod sanguis fuerit missus tertîâ die, & laudabilis apparuerit. Quinta, fuit medicamentum purgans exhibitum, cum adhuc febris esset intermittens. Septimâ, alvi fluxus copiosus & perseverans, usque ad undecimam, ulteriorem phlebotomiam impedivit. Cum autem duodecimâ alvi fluxus sedatus videretur; dubitavi num venæ sectio esset celebranda, cum alia evacuatio nihil contulisset, vires admodum fractæ, & summum periculum, in quo æger constitutus videbatur, ut tanquam brevi moriturum affines lugerent, dehortari viderentur. Adde, quod per duos dies præcedentes, plures cucurbitulæ fuerant admotæ cum scarificatione ut supplerent defectum phlebotomiæ. Tandem visum est veluti tentativam phlebotomiam usurpare, scilicet ad ʒ. iv. vel v. eo animo, ut si æger commodè ferret, iterari posset. Missus est sanguis niger & corruptus, cum euphoria ægrotantis; post quinque horas eadem quantitas



detracta est, constantibus perpetuò viribus in eodem statu. Julepis refrigerantibus miscebatur scordium, & hypericum. In dissolutione sal prunellæ, & spiritus vitrioli, in singulis jusculis bezoard. mineral. ad 3. i. Nocte ejusdem diei duodecimæ, alvus copiosè fluxit, æger tamen melius habere visus est. Vinum exhibitum pro potu valdè lymphatum. Multa in morbi decursu edidit sternutamenta, undè salutem sperabam, etiamsi multa alia signa periculum portenderent. Decimâ tertiâ, & decimâ quartâ, alvi fluxus perseverabat, cum virium debilitate summa. Injecti fuere clysteres ex lacte quibus alvi fluxus temperatus est. Exhibitus julepus ex aqua naphthæ & rosarum, cum confect. alkerimes, & guttis aliquot aquæ cinnamomi, cujus cochlear unum fumebat interdum, ad vires reficiendas. Imminuto alvi fluxu, sopor imminutus est die decimâ quintâ, & delirium cessavit. Urinæ tamen nihil aut exiguum admodum deponebant. Decimâ sextâ, paulò melius: lingua antea sicca, humida apparebat, postea verò sensim convaleuit.

## OBSERVATIO XXXV.

*Alvi fluxus.*

**D**ie decimâ quintâ Julii 1637. Domina de Grasset octogenaria, sed robustissimo corpore prædita; correpta est alvi fluxu tenesimode, quo pluries singulis horis deiciebat cum gravissimis torminibus. Variæ erant dejectiones, nunc flavæ, nunc porraceæ, & aliquando nigrae. Morbi minera ablata est quatuor purgationibus, per intervalla repetitis ex rhab. partim infuso, partim in substantia, cum syrupo rosaceo: Intervallis clysteres detergentes, anodynæ, & roborantes injiciebantur; julepi refrigerantes, & incrassantes, nec non emulsiones exhibebantur.

## OBSERVATIO XXXVI.

*Dysenteria Prognosis.*

**M**ense Julio 1637. Filia Dn. Guilliminet Occitanæ Comitiorum Scribæ, quinque annos nata, dysenteria laborans varia excrementa rejiciebat, flava, viridia, & nigra aliquando. Circa finem morbi quædam exanthemata, pulicum morsibus similia, in facie, aliisque partibus apparuerunt, & manus altera tumore oedematoso affecta est: quæ certa fuere mortis præsignia.

Eodem tempore R. Pater Guardianus, Cœnobii Franciscanorum, qui Minores vocantur, præfectus: alvi fluxu dysenterico afflictus, crebris singultibus tentabatur, qui fuere mortis prænuncii.

## OBSERVATIO XXXVII.

*Dysenteria.*

**M**ense Augusto 1637. Filius Dn. de Maussac in Curia Computorum, Subsidiorum, & fisci Præsidis, octo annos natus, dysenteria tenebatur, multo sanguine, dejectionibus viridibus & porraceis admixto, & febre continuâ. Tertiâ morbi die sumpsit infusum rhei ad 3. i. in aqua plantag. paratum cum fantalo citrino, dissolvendo rhab. pulv. 3. i. syrup. rosac. 3. i. optimè purgatus est, multa excrementa rejecit sine sanguine, & febris ferè expers fuit tota illa die. Postridie sanguinem purum rejiciebat, cui permixtæ erant veluti guttæ materiæ porraceæ, frequens erat dejectio cum dolore ventris, & febre, quæ perseveravit usque ad diem octavam, licet omnia remedia ordinaria, interna & externa adhiberentur, tum etiam clysteres varii. Septima die extractum corallorum ter exhibitum fuerat ad 3. i. cum aqua plantag. ros. & syrupo cydonior. sed frustra. Principio octavi diei, cum & febris & fluxus ingravescerent, ac merus sanguis excerneretur; secta fuit vena, & sanguis detractus ad 3. v. circa meridiem. Nocte omnia eadem. Postridie mane exhibui laudani g. ii.

cum extracto corallor. aquâ plantag. rosar. & syrupo cydonior. alvus omninò suppressa est, per horas quatuor placidè dormivit; ac per intervalla expurgiscebatur. Post quatuor horas iterum alvum deposuit ter, duabus horis, merum sanguinem ut supra excernebat, & jusculum evomit; hinc major metus impendentis periculi, cum reliqua remedia nihil profuissent, neque ipsum laudanum, quod perpetuò confert in hoc affectu. Semel sternutavit. Quarta dejectio ab assumpto laudano fæces habuit satis multas, sine ullo sanguine. Non amplius vomuit. Circa vespere dejectiones frequentiores, minus tamen, quam ante assumptionem laudani, neque erant adeò cruentæ, sed ex parte stercorosæ. Nocte insequente dormivit per intervalla satis insignia, & dejectiones rariores fuere. Mane sumpsit medicamentum ex rhab. 3. i. myrobal. citrin. 3. i. santal. rubr. 3. i. infus. in decocto plantag. portul. & tamarindor. dissolvendo in colaturæ rhab. pulv. 3. i. syrupi rosac. 3. i. à quo materiam dejecit stercorosam, & humoralem copiosam, cum paucissimo sanguine, exiguisque torminibus. Febris immutata est, & nocte insequente rarius dejecit, meliusque dormivit. Sequentibus diebus alvi fluxus perseveravit per dilucida intervalla, sine ullo sanguine, sine torminibus, sine febre. Postea tamen alvi fluxu diuturno cum febre lenta vexatus est, per mensem integrum, cum appetitu ingenti, nocte in lecto deiciebat, & frequenter in die, ut ad febrem hecticam vergere videretur. Tandem exhibitâ bolo armena orientali ad 3. ii. cum jusculo, per biduum, alvi fluxu omninò curatus est.

## OBSERVATIO XXXVIII.

*Colicus dolor.*

**D**ie vigesimâ quintâ Septembris 1637. Uxor Dn. de Sarret, Consilarii Regii, in suprema Computorum, & Subsidiorum Curia; gravida novimestris, corripitur colico dolore gravissimo, quo omnia revomebat in principio, & nihil inferius deponebat. Multis fructibus sese ingurgitaverat, dolor erat fixus circa hypochondrium dextrum, ut de inflammatione hepatis metueretur, quia febris & sitis aderat satis intensâ. Post multos clysteres, fatus, & femicupia, excrementa alvi dejecit liquida & cruda. Dolor tamen perseverabat. Tandem exhibitum est purgans medicamentum ex catholic. 3. i. infus. in decocto cichoraceorum, & capillarium cum rhab. 3. i. etiam infuso, mannæ & syrupi rosac. ana 3. i. septies dejecit copiosè, cum magna doloris imminutione. Postridie perseverabat dolor, sed remissior, injectus fuit clyster, quo quinquies dejecit, & postea multas excrevit urinas, unde integra curatio subsequuta est.

## OBSERVATIO XXXIX.

*Testium inflammatio.*

**D**ie vigesima Septembris 1637. D. Texier, Nemaufensis, I. V. Doct. ex equitatione violenta incidit in testiculi dextri inflammationem cum tumore insigni. Secta fuit vena brachii bis, semel in malleolo, purgans medicamentum exhibitum. Pars fovebatur aqua rosarum, & imponebatur cataplasma ex farina fabarum cocta in oxycrato, ita ut quarta pars aceti cum tribus aquæ partibus misceretur, quod cataplasma nunquam me fefellit in hoc affectu. In hoc tamen ægro adeò tenera erat cutis scroti, ut excoriata fuerit ab aceto acriori, & cataplasma ferè amplius nequiverit. Ego iterandum curavi cataplasma, sed ad tollendam acrimoniam aceti, illud decoquendum curavi, cum lithargyro; & sic cataplasma optime operatum est, ægerque intra triduum à tumore liberatus.

## OBSERVATIO XL.

*Fluxus Hepaticus.*

**D**ie undecima Octobr. 1637. Uxor Petri Banete Artocopi; post aliquot accessiones febris tertianæ influxum



fluxum hepaticum incidit, quo dejectiones erant omnino sanguineae. Vocatus ego, praescribo statim laudani g. ii. cum conservae rosar. ʒ. β. & intra horam fluxus desit, postea verò rediens, humores tantum, non sanguinem rejiciebat, aliisque remediis vulgaribus curata est.

## OBSERVATIO XLI.

*Erysipelas.*

**D**N. De Gout nobilis Monspelienſis 25. annum agens, saepe afficiebatur erysipelate in tibiis, coepit vinum bibere multò meracius solito, & paucissimæ aquæ permixtum, ab eo tempore numquam erysipelate affectus est, & bene valet, licet quatuor aut quinque anni effluxerint. Causam esse existimo, quod à vino roborata facultate expultrice, materia erysipelatis expellitur per alvum, urinas, vel insensibilem transpirationem.

## OBSERVATIO XLII.

*Febris tertiana cum vomitu, & alvi fluxu in paroxysmo.*

**D**ie decima octavâ Augusti 1638. D. Durant quinquagenarius, Procurator in Curia Præsidiâli Monspelienſi, quinque paroxysmos febris tertianæ passus erat, ab iisque liberatus sola venæ sectione. Per quindecim dies bene habuit, & fructus horæos comedebat. Recidit in eandem febrem, & in secundo paroxysmo, gravissimo vomitu, & alvi fluxu vexatus est, in quo multa biliosa, supra infrâque rejiciebat, cum inquietudine summa, & virium exsolutione, ita ut jam de vita periclitaretur. Sequentem praescribo julepum, quo statim omnia symptomata cohibita sunt, per duas horas dormivit, copioso sudore paroxysmus solutus est & intra paucos dies à morbo prorsus liber evasit.

℞. Aquar. lactucæ, rosar. & plantag. an. ʒ. i. fyrupi cydonior. ʒ. i. confect. de hyacinth. ʒ. i. laudani opiatum g. ii. misce, fiat julep. qui detur statim.

## OBSERVATIO XLIII.

*Aphthæ puerorum gravissimæ.*

**D**ie quartâ Septembris 1636. Filius meus Stephanus, annos quatuor natus, passus est fluxionem acerrimam in linguam & fauces, ut infinitis ulceribus scaterent, iisque albicantibus, & admodum dolorificis, cum magna inflammatione. Non poterat cibum capere, neque lac sugere. Et diebus ac noctibus ejulabat insomnis, macilentus, ac ferè consumptus. Ex remediis non profuit mel rosaceum cum spiritu vitrioli, quod aliàs misericè conduxerat. Aderat alvi fluxus copiosus, quo bilem porraceam ejiciebat. Vescicatorium valdè profuit. Sed dolores & clamores perseverabant, & continuò æger per os humorem ferofum & acrem emittebat, dolore & inflammatione magis ac magis attrahente.

Tandem exhibui laudani g. i. cum jusculo, eoque dolor sopitus est, somnus levissimus conciliatus, qui postmodum perseveravit moderatus, & suis horis adveniens. Hinc coepit convalescere & fluxio illa humoris, per os emanantis, omnino cohibita. Sequenti tamen die purgans medicamentum exhibitum est, quod multum etiam profuit.

## OBSERVATIO XLIV.

*Dysenteria.*

**J**anna de Paravisol, octodecim annos nata, laboravit gravissimâ dysenteria cum febre acutâ. Per septem dies fuit in manibus alterius Medici senioris, qui nihil aliud praescripserat, quàm clysteres detergentes & rhabbarum, quo febris aucta, & dysenteria deterior evaserat. Eo absente, vocatus ego, exhibeo primum laudanum ad g. iii. quo fluxus valdè imminutus est eâ nocte, & per tres aut

quatuor horas dormivit. Manè secatur vena, & sanguis educitur fervidissimus. Dein exhibetur extractum corall. ad ʒ. i. cum aqua plantag. bis eadem die, sed sine fructu, noctem enim habuit acerbissimam tum ratione febris, tum ratione fluxus, ejusque sanguinei, qui ad aliquod tempus fuerat cohibitus usu laudani. Sequenti die manè exhibeo iterum laudanum, & fluxus cohibitus est; Vespere vena iterum tunditur. Minor erat sanguinis excretio, sed bilem porraceam ejiciebat valdè erodentem, febre & siti plurimum urgentibus. Ad sitim praescribo julepos ex decocto portulacæ, & plantag. cum sale prunellæ, qui multum profuere, affectu tamen perseverante. Tandem exhibita est mane aqua rosar. cum ol. communi, meridie decoctum intestinorum vervicis valde consumptum, cum pulvere granorum actes. Magnum levamen inde consequuta est ægra. Et postera die, repetitis semel illis tribus remediis, ad statum convalescentiæ perducta est.

## OBSERVATIO XLV.

*Morbilli.*

**D**ie vigesimâ octavâ Septemb. 1638. Nutrix filii mei Stephani, nomine Claudia, correpta est morbillis, quibus totum corpus contextum erat, cum febre intensa. His accessit symptoma gravissimum, nimirum fluxio tenuis, in pulmonem descendens, quæ tussim frequenter excitabat, & suffocationis metum incutiebat, cum raucedine ingenti. Admotum est vescicatorium cervici, & exhibita sunt laudani g. ii. cum conserva rosarum. Fluxio cohibita est tota nocte. Postridie rediit, & iterum exhibitum est laudanum cum simili effectu, unde ad convalescentiam paucis diebus perducta est, manente raucedine ad longum tempus.

## OBSERVATIO XLVI.

*Febris Tertiana.*

**A**Nno 1638. Febres tertianæ longissimæ vigeant Autumno, à quibus multi liberati sunt, sumendo in declinatione, post phlebotomias, & purgationes frequenter iteratas, theriacæ ʒ. i. cum aqua plantaginis, mane, per triduum. In quibus caliditas magis timebatur, à cœna exhibebam. Unus autem sumpsit theriacam, sine consilio Medici, morbo adhuc crudo existente, cum urinis rubris, & febris aucta est. His confirmatur Galeni experimentum, quod habetur lib. de præcogn. ad Posthum. cap. 2. & 3. de Eudemo Peripatetico, cui morbo adhuc crudo existente, theriaca exhibita est à Romanis Medicis, quartana simplex in triplicem versa est. Eadem verò theriaca à Galeno exhibita, apparentibus coctionis signis feliciter curatus est.

## OBSERVATIO XLVII.

*Diarrhœa inveterata.*

**D**ie decimâ quintâ Octobris 1638. Quidam nobilis vir triginta annos natus Monspelium venit, consilium petiturus pro alvi fluxu, ab octo annis infestante, quo quinquies aut sexies die ac nocte dejiciebat, partim biliosa, partim pituitosa. In hoc malum inciderat ex prava victus ratione, cui insistere coactus fuerat per multos annos, dum castra sequeretur, non erat valde ex eo debilitatus, quinimò faciem habebat rubram, saltem circâ genas. Missus est à nobis ad thermas Balerucas, quarum aquam potavit per sex dies, & alvi fluxus omnino fuit cohibitus, ita ut per octiduum, à quo aquas sumere desierat, nunquam noctu surrexerit, cum antea bis aut ter surgere consuevisset. Multa alia remedia usualia illi praescripta sunt ad partes naturales roborandas, quibus usurum in patria asseruit.

OBSER-



## OBSERVATIO XLVIII.

*Vomitum contumacissimum.*

**D**ie decimâ quintâ Octobris 1638. Dn. Enguarran, Ecclesiæ Monspeliensis Cathedralis Canonicus temperamento melancholico & adusto præditus, incidit in vomitum contumacissimum, sine causa manifesta, quo multa pituitosa, viscida, & mucilaginosâ excernebat, cum maximo conatu. Flatus enim multos eructabat ab assumpto jussulo. Ab aliis Medicis multa in cassum usurpata fuere remedia, per duos menses. Principio sumpsit pilulas de hiera per multos dies; postea purgatus est decocto senne; & infusione rhei, deinde per apozemata, in quorum usu perseverare non potuit. Postmodum lac fuit exhibitum, quia suspicio erat ulceris ventriculi. Theriaca etiam frequenter; propter veneni assumpti metum; fomenta & unguenta plurima admota. Ego vocatus invenio hypochondria valde tensa, præcipuè sinistrum, pulsus satis firmum, licet æger admodum esset debilis, quoad vires animales. Conjeci humores fluere ab hypochondriis, & vomitum illum esse speciem affectionis hypochondriacæ. Vesperis exhibentur ipsi laudani gr. ii. & totâ nocte non vomuit; sed placide quievit. Sequenti die phlebotomia celebrata, quæ ab aliis Medicis omiſsa fuerat, & mittuntur sanguinis ʒ. vi. qui valde fuit adustus, vomuit bis aut ter eâ die, clyster injectus fuit circa vespem. Præscriptus etiam forus emolliens & aperiens, hypochondriis adinovendus, & linimentum iisdem viribus præditum. Tertia die sumpsit hunc pulverem.

R. Rhab. pulv. ʒ. i. myrobal. citrin. ʒ. i. spodii, & mastiches ana gr. vi. fiat pulvis. detur mane cum jussulo. Revomuit medicamentum, & nullis aliis voluit uti remediis. Post mensem interiit, & aperto cadavere inventum est epiploon crassum, rubrum, scirrhum, & contractum, ut hepar prin. à fronte referret, ejusque crassitiem æquaret, ventriculus lividus in fundo, tenuis; parte verò superiori, scirrhotus; in testina livida. Lien bene habebat. Humores melancholici in omento asservabantur, & inde in ventriculum refluebant.

## OBSERVATIO XLIX.

*Alvi fluxus diuturnus cum ulcere recti intestini.*

**D**ie secunda Novembris 1638. D. Ludovicus Massanes febre tertianâ duplici afflictus est, per duos menses, cum alvi fluxu partim stercoroso, partim humoralis, partim hæmorrhoidali, quo octies, aut decies singulis diebus deiciebat. Tandem ab accessionibus liberatus est, manente alvi fluxu, quo dolor in recto intestino excitatus est, paulò supra anum, perpetuò affligens, etiam dum non deiciebat. Interdum faeces laudabiles excernebat, interdum verò materiam subrubram, colorem hepatis referentem, & interdum quasi purulentam; conjecimus ex diuturno fluxu factum fuisse ulcus circa hæmorrhoidas internas. Remedia ferè omnia averſabatur. Ideò consului usum aquarum thermalium ad triduum. Prima die statim appetentia, jam diu dejecta, restituta est, consequenter dolor ani prorsus evanuit, manente alvi fluxu mediocri, eoque bis noctu, & totidem interdum procedente, quo excrementa molliora, sed bene concocta excernebat. Hinc singulis diebus in melius procedebat, ut iterato post 15. dies aquarum usu, omninò convaluerit. Recepit tamen suffumigium ex decocto tapſi barbati, in cathedra perforata. quo fluxus maxime cohibitus est, licet bis tantum eo usus fuerit. Sensibilis fuit effectus suffumigii.

## OBSERVATIO L.

*Dolores Arthritici.*

**D**ie duodecimâ Novembris 1638. Dn. Mouretus Monspeliensis, tentabatur doloribus arthriticis, varias partes assilgentibus, & per universos articulos va-

gantibus. Per mensem unum & integrum, hunc affectum passus erat, & pluries purgatus fuerat, non omiſsa venæ sectione. Tum usus est bochetto sequenti.

R. Rad. Salsæ parill. ʒ. i. rasuræ ligni guajaci ʒ. ii. aquæ q. s. Bulliant ad quartæ partis consumpt. colentur ad lentu cinnam. parum, fiat bochetum.

Postquam per octiduum usus esset hoc bochetto, cœpit excernere cum urinis materiam pituitosâ, quæ fundo matulæ adherbat. Eodemque tempore magnum à doloribus levamen sensit, donec prorsus curatus fuerit, excretâ per multos dies materiâ illâ pituitosâ.

## OBSERVATIO LI.

*Dolores vagi.*

**D**ie decimâ tertiâ Novembris 1638. D. Gaillard cognomine Balbus, subito correptus est doloribus vagis atrocissimis, nunc crura, nunc genua, tibias, vel pedes, nunc lumbos dissecantibus. Vocatus alius Medicus, sanguinem mittit ad quinque vascula, intra horam, & dolore non remittente, postea exhibet pilulam ex laudano, qua dolores consopiti fuere, tum noctu, tum sequenti die usque ad meridiem. Pomeridianis horis dolores recurrunt pari acerbitate. Vocatus ego absente altero Medico, præscribo bolum ex diapr. solut. ʒ. ʒ. jalappæ ʒ. i. etiam noctu sumendum, quam insomnem alioqui, & cum atrocibus doloribus traducturus erat. Purgatus est decies utiliter, nam dolores illi admodum imminuti sunt, consequenter brevi temporis spatio omninò discussi. Erat vir quinquagenarius, atrabilario temperamento præditus, multis antea animi pathematis agitatus, ex consulatu, quem gerebat eo anno. Ideò conjeci, hosce dolores provenire à serosa materia tenuissima & acerrima, quæ huc & illuc velut orgasmo ferebatur. Eamque cito purganti medicamento esse educendam.

## OBSERVATIO LII.

*Hæmoptoë.*

**D**ie decimâ Decembris 1638. Uxor Dn. Cagoni in Curia Computorum Auditoris, quinquagenaria, post mediam noctem, correpta est sanguinis sputo copioso, quod per tussim ejiciebat, & præfalsum perſentebat. Usque ad matutinum perseveravit, per intervalla recurrens; quo tempore vocatus ego, statim venæ sectionem impero, ex brachio dextro, ad ʒ. vii. post duas horas iterandam. Post singulas phlebotomias sumpsit julepum ex aquis plantag. & lactucæ, cum syrup. violac. ʒ. vi. & de papavere ʒ. iii. frictions & ligaturæ in tibiis, cucurbitulæ hypochondriis frequenter iterandæ fuerunt adhibitæ, looch incrassans & adstringens. Noctu sumpsit syrupum compositum ex æquis partibus syrupi violacei, de ros. ficcis, & de papavere, scilicet cochlear unum hora somni, alterum post mediam noctem. Et sanguinis sputum non amplius rediit.

## OBSERVATIO LIII.

*Tumor Cancroſus in hepate cum dolore Ischiadico.*

**D**ie decimâ septimâ Decembris 1638. Vidua Petri Auberti, Mercatoris Monspeliensis, per multos menses decubuit, assidua febre affecta, patiebatur dolores atrocissimos in ischio sinistro, qui se ad extremum pedem exporrigebant. Præterea percipiebatur tumor inclinans, isque durus, ita ut scirrhusus putaretur, & in musculis epigastrii situs, quia sub cute statim tangebatur; non erat dolorificus; nisi cum premeretur. Aliquando dolores acres humerum dextrum occupabant, & latus ipsum, ut pleuritidem mentirentur. Existimabamus dolores istos provenire à materia serosa acerrima, quæ in hepate fervidissimo generaretur. Sanguis qui detrahebatur, erat ferventissimus, & lividus; Nullum levamen percipit



cœpit unquam, nisi à laudano, cujus ope dolores leniebantur. Cum dolor in coxa gravior evasisset, & tumor in parte apparet, concolor tamen; tum etiam pars compressa multum doleat; nec non ægra dolores lancinantes in eadem perciperet per vices; vocati fuere Chirurghi, qui abscessum profundum latitare firmiter asseruerunt: sicque consilio habito pars aperta est caustico, & scalpello; nullum pus effluxit. Post 15. dies ab apertione, venter antea tumidus, magis intumuit, & hydropica facta est, ac tandem suffocata interiit. Aperto cadavere inventum est hepar tumoribus scirrhis, & magna ex parte suppuratis refertum, in cuius extremo adnati erant duo tumores cancrofi, usque ad umbilicum prominentes, & pugni magnitudinem æquantes, qui cum essent ferè contigui, tumorem illum abdominis jam dictum repræsentabant; neque in hepate esse putabantur, quia non erant in loco hepatis naturali, imò hepar seorsim ab illis tumoribus tangebatur, sed durum, & dolorificum: quia dicti tumores erant magis prominentes, quàm reliqua hepatis substantia. Totum illud hepar pendebat viginti libras, & amplius. Secta fuit coxa usque ad os in loco apertionis, & inventæ sunt parvæ quædam glandulæ suppuratæ, quæ pus concretum continebant, ita ut non potuerit effluere.

## OBSERVATIO LIV.

*Tumores Strumosi.*

**D**ie octavâ Januarii 1639. Puella quædam Nemausensis, 18. annos nata, patiebatur tumores strumosos in collo, qui multis remediis per longum tempus adhibitis suppurati fuerant, & postea consolidati. Attamen portio tumorum remanebat durissima, quæ nec emplastro de Vigo, quadruplicato mercurio, ulla ex parte dissolvi potuit. Tandem præscripsi emplastrum ex æquis partibus dicti emplastri de Vigo, vitrioli romani, & gummi ammoniaci in aceto soluti & inspissati cum terebinthinæ s. q. quo emplastro intra mensem tumores illi integre soluti. Adhibito interim idoneo victus regimine, & convenientibus evacuationibus interdum usurpatis.

## OBSERVATIO LV.

*Fluxus mensium inordinatus cum fluore albo.*

**D**ie decimâ quintâ Januarii 1639. Uxor Dn. de Rignac, in Curia Computorum, Subsidiorum & Fisci Regii Procuratoris generalis, pingui, obeso, & pituitoso corpore prædita, post abortum patiebatur fluxum mensium inordinatum, cum fluore albo. Feliciter curata est phlebotomia, purgatione, bocheto ex salsaparilla, & suffumigio ex thure, mastiche, sandaraca, succino, styrace, benjoïno, caryophyllis, nuce moschata, & rosæ rubris, per infundibulū excepto, mane & sero, per longum tempus.

## OBSERVATIO LVI.

*Dolor capitis immanis & diuturnus.*

**D**ie 29. Martii 1639. Mulier Frontinianensis, quæ dragenaria, atrabilario temperamento donata, post abortum non amplius passa est purgationes mensuales, inde gravissimus capitis dolor per quatuor menses eam afflixit, nihil conferentibus venæ sectionibus, hirudinibus, fronti & temporibus admotis, aliisque remediis. Vocatus ego præscribo apertionem arteriæ temporalis, quæ optime celebrata fuit, neque sanguis salu egrediebatur ob exilitatem arteriæ, & sanguinis crassitiem, sed guttatim extractus fuit ad 3. v. ruber & floridus, tum internâ, tum externâ superficie. Vulnus occlusum fuit emplastro ex sola mastiche, cum ligatura simplici, postquam alia ligatura, quæ in vulneribus capitis solet fieri, per quinque horas adhæsisset liberata est à dolore capitis sine recidiva.

*Laz. Riverii Opera.*

## OBSERVATIO LVII.

*Febris Tertiana.*

**D**ie decimâ quartâ Julii 1639. Dn. Devandiere, Medicinæ studiosus, post quinque accessiones febris tertianæ, secta vena bis, & semel purgato corpore, sumpsit initio paroxysmi aquæ benedictæ 3. viii. accessio fuit cohibita, tum etiam operatio medicamenti per duas horas, postea vomuit quinquies, aut sexies, sine molestia, quia in singulis vomitibus sumebat iusculi communis cum pissis parati 3. iv. aut v. Accessio brevior solito fuit, & in fine illius purgatus per alvū, pluribus vicibus, & omnino curatus est.

## OBSERVATIO LVIII.

*Dolor Nephriticus.*

**D**ie vigesimâ secundâ mensis Julii, anni 1639. passus sum colicum dolorem, qui in imo ventre acriter urgebat, & renem dextrum obsidebat. Duobus enematis injectis, dolor ventris cessavit. Supererat dolor renis, qui per ureteris continuitatem exportigebatur, cum sinistri testis retractione: ita ut verè nephriticus esset: Balneo calente dissolutus est, cum tepidum augeret dolorem. Iterum rediit dolor, cucurbitulis parti admotis discussus est. Postridie redit, & denuò cucurbitulis cessit; mox sumpsi bolum ex cassia, catholicone, rhabarbaro, & crysallo tartari, non amplius dolor rediit. Conjeci hunc dolorem nephriticum factum fuisse à flatibus, cum discutientibus remediis, puta balneo calido, & cucurbitulis solveretur, & nulla materia obstruens scilicet calculus, arenulæ, aut pituita per urinas à me rejecta sit post solutionem morbi, neque in ipso morbo, neque unquam antea. Neque impossibile est, eosdem flatus qui sese intra tunicas intestinorum insinuant, in renes & ureteres posse transferri, ibidemque graves distensiones efficere: cum in omnes corporis partes flatus interdū deferri soleant, in iisque dolores, aut palpitationes efficere. Imò verò, non pauci existimant, dolores dentium acerbissimos à flatibus exoriri, in vasculis, ad radices dentium, perreptantibus inclusis. Conjecturam meam auxit, quod operante medicamento cathartico, flatus à lumbis ad alvum sensibilibiter ferebantur, cum sonitu blando, qui ab adstantibus faciliè audiebatur.

## OBSERVATIO LIX.

*Diarrhœa.*

**P**aucis diebus ab effectu prædicto correptus sum diarrhœa biliosa, tanta acrimonia prædita, ut anum eroderet, ardorēque urinae conciret, translata materiæ portione ad urinas. Dysenteria erat in prociuctu. Ingressus semicupium tepidum, illico liberatus sum.

## OBSERVATIO LX.

*Epilepsia puerilis.*

**Q**uidam puer trimulus patiebatur insultum epilepticum à quo liberatus fuit fumo tabaci, quem minister tubulo attrahebat, & insufflabat in os pueri apertum, vomitus puero concitatus est, & paroxysmus solutus.

## OBSERVATIO LXI.

*Phthisis incipiens.*

**D**ie decimâ quinquâ Octobris 1639. Filius Dn. Le Sage, Monspelienfis, 10. annos natus, duobus mensibus laborabat fluxione, in pulmonem decumbente, cum tussis frequenti spiratione, & febre lenta, ita ut in phthisim jam prolapsus videretur. Præscribo phlebotomiam, purgationem ex manna, iuscula medicata, & alia remedia

*Sss ordinaria,*



ordinaria, sed præcipuum fuit causticum utrique axillæ, quod fluxiones ad pectus delabentes, & humores in eo contentos potentissimè derivat, hocque intra mensem restitutus est.

## OBSERVATIO LXII.

*Febris Maligna.*

**D**ie decimâ octavâ Octobris 1639. Joannes Vezian. Aromatarius Monspelienfis annos natus 24. laborabat febre maligna, ex qua tandem circa undecimam morbi diem incidit in delirium, & paucis postmodum diebus in motus tremulos, & convulsivos nervorum, qui phrenitidi lethali supervenire solent; per mensem ferè integrum delirium perseveravit, convulsiones verò per dies duodecim, tandem evasit post multorum remediorum usum. Ea quæ magis profuere, sunt sectio venæ frontis & julepi compositi ex aquæ card. bened. ℥. iv. aquæ theriacalis ℥. iii. bezoardici mineral. ℥. ii. camphoræ g. xii. qui quinquies fuere exhibiti.

**D**ie 8. Decembris 1639. Petrus Randon Lapidista 30. annos natus, simili morbo correptus est, qui mitis admodum videbatur usque ad septimum diem, in quo delirus factus est. Die undecima aperta est vena frontis; postmodum sumpsit julepos prædictos bis, & sequenti die semel, iisque omnis malignitas discussa est.

## OBSERVATIO LXIII.

*Pleuritis.*

**D**ie decimâ quintâ Decembris 1639. Uxor Dn. Clauselii, in Curia Computorum subsidiarum, & Fisci Regii, Contiliarii, annos 20. nata, incidit in pleuritidem sinistram, eadem die, qua menstruæ purgationes apparere inceperant, quæ tamen suppressæ propemodum fuere; Quandoquidem perexigua humoris lubrici quantitas excernebatur, nihil verò, colorem sanguinis referens, apparebat. Vocatus ego ma. antè lucem, hæsitavi aliquantulum, an vena malleoli esset aperienda ad juvandum naturæ motum. Attamen quia dolor lateris admodum urgebat, & nihil effatu dignum per uterum excernebatur, censui satius esse venam brachii aperire ejusdem lateris, quod bene successit; dolor enim lateris admodum imminutus est. Statim à phlebotomia celebratæ sunt frictions crurum, admotæ ligaturæ tibiis, & cucurbitulæ femoribus, ad juvandam purgationem menstruam. Post meridiem secta fuit vena malleoli, admota lateri fomenta & linimenta, injectus clyster inter duas venæ sectiones. Præscripti Julepi cum sale prunellæ, secundo & tertio die menses aliquantulum perseverabant, sed perexigua quantitate. Quia tamen malum non urgebat, naturæ negotium reliquimus, cum præcipuè anacatharsis esset libera & liberalis, per quam excernebatur multa pituita, levi rubore suffusa. Quarto die, cum menstrua profus desissent, & affectus non imminueretur, missus iterum sanguis fuit mane ad ℥. ix. & post meridiem iterum ad ℥. vi. Quinto iterum missus sanguis mane ad ℥. viii. qui similis præcedentibus fuit, nempe valde pituitosus, cum mulier tamen macilenta, & bilioso temperamento prædita esset, in fundo vasculi adustus apparebat. Eadem die, post meridiem, iterata phlebotomia ad ℥. vi. & sanguis rubicundus apparuit in superficie, qui antea albus apparuerat. Hinc coniecimus, sufficienter fuisse venam sectam, cum sanguis detractus fuisset usque ad coloris mutationem, juxta præceptum Hippocratis; & ægra meliusculè habuit, nocte dormivit per tres aut quatuor horas, cum omnes antea insomnes traduxisset. In emulsione tamen syrupi papaverini ℥. ii. admixtæ fuerant; continuatæ emulsiones cum sale prunellæ, & admotum lateri cataplasma ex materia fots cum farina sem. lini, oleo lilior. amygdal. dulc. butyro recenti, & croco. Sexto die sumpsit pomum coctum in quod immixta fuerat thuris pulver. drach. i. super-

haultis aquæ cardui bened. ℥. iv. & corpus tegendo plus solito, ad sudores eliciendos. Mane hora nona fuit administratum hoc medicamentum, non sudavit, sed sputa per tres aut quatuor horas majori sanguinis copiâ tincta apparebant, & facilius expectorabantur. Circa secundam horam pomeridianam, non amplius rubra sputa apparuerunt, sed omninò alba. Febris remissior erat, & dolor lateris omnino sedatus, ut ægra in utroque latus indolenter decumberet. Continuatæ emulsiones ad fervorem sanguinis temperandum. Septimo purgationes menstruæ eruperunt copiosè, & per quatuor dies perseverarunt, unde febris admodum imminuta est, & dolor lateris omninò sublatus. Duodecimo, purgata est medicamento ex sennæ ℥. ℥. rhab. ℥. i. mannae & syrupi rosac. ana ℥. i. benè successit purgatio, & ægra omninò curata est.

Eodem tempore villica quædam eodem morbo laboravit: post septimam phlebotomiam imminutus fuit morbus; die duodecimâ purgata est simili medicamento, unde maximè levata est, & morbus ad declinationem paucis postea diebus pervenit.

## OBSERVATIO LXIV.

*Febris Maligna.*

**D**ie 11. Januarii 1640. Mulier quinquagenaria, nomine Martina, olei proxeneta, febre malignâ tenebatur, cum maculis latis & violaceis circa humeros & cervicem, sed parva copia. Vocatus fui sexta morbi die, pulsus erat humilis & languidus, magna ad somnum propensio, & affectus comatosus. Bis illi secta fuerat vena; Præscribo enema molliens & laxans, vesicatorium cervici, Julepos refrigerantes, cum alexipharmacis. Septima die, omnia exacerbata. Octava iterum vocatus, præscribo potionem diaphoreticam, ex bezoardici min. ℥. ii. camphoræ Gr. vii. cum aqua card. bened. quæ per tres vices fuit iterata, post primam exhibitionem additus est fots diaphoreticus, toti ventri & pectori cum spongiis admovendus, post assumptam potionem, & pulsus validior factus est, ac magis ordinatus. Post biduum iterum vocatus; invenio signa malignitatis adhuc vigentis; unde ægra in summo versabatur periculo. Præscribo Julepos ex decocto rad. pentaphylli, carlinæ, buglossi, foliis scordii, acetosæ, &c. manè & serò sumendos, & quatuor vesicatoria, brachiis & cruribus admovenda. Die undecima, parotis apparuit, quæ topicis medicamentis in suppurationem venit, & tandem ægra pristinae sanitati restituta.

## OBSERVATIO LXV.

*Hydrops.*

**D**ie 8. Novembris 1640. Ancilla Uxoris Dn. Ducros, Patroni celeberrimi, post febrem tertianam incidit in hydropem, quia sese in accessionibus aqua ingurgitaverat. Præscribo infusum sennæ cum sale tartari per 12. dies, unde meliusculè habuit. Postea apozema sequens illi exhibitum est.

℥. Rad. enulæ camp. gentianæ, valerianæ, Iridis nostratis & aristoloch. longæ ana ℥. i. corticum radicum caprarum, median. fraxini & tamarisc. ana ℥. ℥. fol. agrimon. absinth. utriusque, chamædr. & centaur. min. ana M. i. liquirit. raf. & passul. mundat. an. ℥. i. sennæ mundat. ℥. i. turbith. & agarici ana ℥. ℥. sem. ebuli ℥. iii. zinzib. & caryoph. an. ℥. i. coquantur ad lb. i. ℥. in colatura dissolve syrupi de cichor. compos. cum rheo ℥. iv. fiat apozema pro iii. dosibus matutinis.

Hoc apozemate universam humorum illuviem per alvum & urinas deposuit, & omninò sanata est.

Non parum consultit ad curationem, quod illa, dum uteretur aliquo suffumigio, ad tibiæ tumorem discutendum, unctionem in utraque tibia passa est, unde exulcerationes subsequutæ sunt à quibus aqua multa fluxit per usum apozematum.



## OBSERVATIO LXVI.

*Febris quartana.*

**D**ie 15. Octobris 1640. Filius Magistri Roche annos 12. natus, febre quartana liberatus est usu infusionis fennæ cum sale tartari, per septem dies.

Decima quarta Novembris Dn. Pellisserius 30. annos natus febre quartana detinebatur per tres menses, principio Novembris, post usum apozematis aperientis, quod paulò ante sumperat per quatuor dies admixtis etiam purgantibus: tandem præscribo infusum fennæ cum sale tartari per 15. dies. At duodecima exhibitione cessavit febrilis accessio, neque amplius rediit. Est autem præditus temperamento melancholico, & difficillimè purgatur, vir robustus, & proceræ staturæ. Principio infundebatur ʒ. i. fennæ cum ʒ. i. salis tartari in ʒ. x. quæ, semel tantum in die purgabatur: post aliquot dies salis tartari ʒ. iv. admiscebantur, & bis in die purgatus est.

Post usum hujus remedii, quamvis ab accessionibus liber esset, præscripsi opiatam roborantem & aperientem ad 12. dies, à qua pristinum faciei nitorem recuperavit.

## OBSERVATIO LXVII.

*Hydrops.*

**D**ie vigesimâ Febr. 1641. Vidua Pauli Ducros, civis Monipeliensis, sexagenaria, hydrope cum asthma correpta est, ita ut totus venter, femora, & tibie valdè intumuerint. Habitus fuerat totâ vitâ pinguis admodum, & pituitosus. Præscripsi post quædam alia remedia decoctum guajaci, cum fenna, agarico, turpeto, & hermodactylis, per 16. dies continuos usurpandum.

Postea sequentibus duobus remediis, per mensem continuatis, integrè restituta est.

ʒ. Rad. enulæ camp. apii, sœniculi, & Iridis siccarum ana ʒ. i. ʒ. rad. valerianæ, gentianæ, asari, scyllæ ana ʒ. i. corticis mediani sambuci, & ligni sassafras ana ʒ. vi. fol. absint. agrim. chamædr. capill. Ven. siccorum an. ʒ. ii. summit. centaur. min. & flor. genistæ an. ʒ. i. sem. petrosel. ameos, anethi, an. ʒ. i. ʒ. cinnam. ʒ. ii. conquassentur omnia & infundantur in vini albi lb. iv. per aliquot dies; deinde hujus vini capiat ʒ. ii. vel iii. singulis diebus, manè, duabus horis ante pastum.

Quarto vel quinto quoque die capiat dosin pulveris sequentis. R. fennæ mundat. turbit. gummosi, hermodactylor. sem. buli, rad. Jalapæ, & mechoacan. an. ʒ. i. cremoris tartari ʒ. ii. guttæ gummi ʒ. ʒ. pulver. diambra, diarrhodon. abbatis, & sem. sœniculi an. ʒ. i. sacchari canti ʒ. iii. fiat omnium pulvis, cujus ʒ. ii. infundantur per noctem in vini prædicti ʒ. iv. capiat manè vinum & pulverem.

## OBSERVATIO LXVIII.

*Ulcus gingivarum.*

**D**ie vigesimâ tertiâ Februarii 1641. Filia Dn. de Rastenclieries annos 18. nata, cum à duobus annis gingivarum erosiones contumaces passa esset in maxilla inferiori, ad radices trium dentium anteriorum, qui incisorii nominantur, ita ut dentes vacillarent, & usque ad alveolum carne denudati essent; ab eo affectu nonnisi multo labore, & multis remediis liberata est: propterea quod à lienis intemperie calida & sicca, atque adeò atrabilaria constitutione dependebat. Cum per annum integrum curata remansisset, oborta est pustula in eodem loco, sed paulò inferius, scilicet juxta ipsam maxillam, & in ea parte, in qua labrum inferius à maxilla separari incipit. Post quatuor, aut quinque menses, cum nulla remedia adhibuisset; pustula disrupta est, remansit ulcus cum denudatione ossis mandibulæ, quod intuentibus patebat omninò nudum, ad magnitudinem dimidiæ partis unguis.

*Laz. Riverii Opera.*

Post phlebotomiam & purgationem sequenti balsamo intra 15. dies ulcus omninò consolidatum est.

ʒ. Myrrhæ electæ, & sacchari canti ana partes æquales, pulverentur, iisque impleatur album ovi coctum, & per medium sectum, filo probe alligetur, & suspendatur in cella Vinaria, supponendo vas vitreum, instillabit liquor, seu balsamus, quo pars sæpius in die illinatur.

## OBSERVATIO LXIX.

*Inflatio totius corporis in puero.*

**D**ie tertiâ Junii 1641. Filius Roche civis Monspeliensis ætatis 18. mensium, toto corpore inflatus est, subito, cum febre; & alter filius ejusdem familiæ, ex eodem affectu interierat. Varia per 10. aut 12. dies à me præscripta sunt remedia, purgatio nempe, clysteres, Julepi aperientes, vesicatorium, inunctiones. Tandem præscribo syrupum ex decocto agrimonii, absinthii utriusque, & centaurii minoris, sumendū sex cochlearibus in die; Et intra triduum convaluit, succedente alvi fluxu, & urinæ profluvio.

## OBSERVATIO LXX.

*Hydrops.*

**D**ie decimâ quintâ Junii 1641. Nobilis quidam extraneus, 30. annos natus, ante biennium passus erat luum venereum, ex qua malè curata relictus est dolor in brachio sinistro, tutum serè radius & cubitum continens, qui noctu exacerbabatur, & circa periosium sentiebatur. Præscribo purgationem universalem, & phlebotomiam iteratam. Postea dietam sudorificam per 12. dies, mane sumebat decoctum, & vesperi suffiebatur brachium decocto guajaci & herbarum cephalicarum, cum aqua & vino albo parato, quo irrorabantur filites candentes, sicque multus sudor in brachio excitabatur. Post sudorem, admovebatur emplastrum de vigo quadruplicato mercurio. Finita dieta, continuatum suffumigium per quinque dies, & serò & postea imponebatur emplastrum, in lichia de præscriptum, ex auripigmento, viridi æris, &c. compositum, quod pustulas excitavit, & ulcuscula in iis locis, in quibus dolor maxime urgere solebat, sicque omninò curatus est.

## OBSERVATIO LXXI.

*Colica Biliosa.*

**R**eligiosus quidam obnoxius erat colicæ biliosæ diurnæ & contumaci, quæ sæpe recurrerebat. Cujusdam consilio sumpsit mane frustum butyri recentis, superbibendo parum vini. Hoc remedio per longum tempus continuato, ab affectu liber & immunis evasit.

## OBSERVATIO LXXII.

*Dolor Ischiadicus.*

**F**ilius Dn. Pacheq. Medici Lunellensis, arctissimo amicitie vinculo mihi conjunctissimi, correptus est dolore Ischiadico, cui successit stupor quidam brachiorum, & actio digitorum quodam modo læsa, cum aliqua respirandi difficultate. Hæc omnia symptomata ab eodem affectu proveniebant, ratione quarti muscoli thoracis, qui oritur ab osse sacro, & ab interno osse ilium, & scandens per lumborum vertebra, decem primis costis adhæret, ac inseritur septimæ cervicis vertebræ, ut non sit mirum, si dum in exordio afficitur hic musculus, tumore, vel dolore, vel lassitudine aliqua, quæ sit tensiva, vel ulcerosa, vel phlegmonodes; lædantur partes quibus annectitur. Cum igitur inserviat respirationi; ea læditur; hoc musculo affecto in sua origine: Et cum inseratur vertebra cervicis, à quibus nervi, brachii inservientes,



oriuntur, par est brachiorum & digitorum actiones lædi. Hæc fusiùs explicantur à Sanctorio *lib. 2. cap. 20. de vitandis erroribus.*

## OBSERVATIO LXXIII.

*Febris maligna.*

**D**ie vigesimâ sextâ Octobris 1641. Filia D. Conte, Mercatoris Monspeliensis, 20. annos nata, correpta est febre maligna, quæ eo usque processit, non obstantibus remediis ordinariis, ut circa undecimum morbi diem, in delirium, per intervalla recurrens, & nervorum contractiones, in carpis præcipue apparentes, inciderit; quibus accedebant interdum lipopsychiæ, & lentores nigerimi dentibus adhærebant. Lingua erat scabra, nigra, & exusta. In gravi illo periculo præter epithemata, & pullos columbinos; aliaque roborantia, tum interna, tum externa, sequentia remedia præscripsi, quæ in hisce affectibus maximæ solent esse efficacæ. Nempe vesicatoria quinque, cervici, brachiis, femoribus admovenda. Julepos ex aquæ cardui bened. ʒ. iii. aquæ theriacalis Bauderonii ʒ. iii. bezoard. mineral. ʒ. ii. & camphoræ g. vi. qui Julepi per biduum usurpati fuere, mane & sero. Tum etiam dictum bezoard. mineral. exhibebatur in singulis jusculis ad ʒ. i. Hisce remediis intra paucos dies à gravi illo morbo liberata est.

## OBSERVATIO LXXIV.

*Gonorrhœa.*

**V**ir quadragenarius ex impuro concubitu gonorrhœæ contraxit, cui ab initio præscripti bolum ex cassiæ ʒ. i. rhab. pulver. & crystalli tartari, singulorum ʒ. i. sequenti die volebam sanguinem mittere ex pede, quod ipse æger renuit. Emulsiones præscriptæ sunt ad tres, aut quatuor dies, quibus urinæ acrimonia temperata est, fluxu eodem modo perseverante. Postmodum ptisanâ laxante usus est per septem dies continuos, in hunc modum præscripta.

℞. Tamarindor. ʒ. ii. aquæ fontis ℔. iv. coquantur ad ℔. iii. colaturæ infunde frigidè per noctem fennæ mund. sem. coriandri, liquirit. & rosar. rubr. an. ʒ. ii. capiat cyathum unum mane, una hora ante pastum. Hoc remedio fluxus valde imminutus est, ad quem omninò delendum sequentem bolum præscripsi.

℞. Terebinthinæ venetæ ʒ. iii. rhab. pulver. ʒ. i. fiat bolus, quem capiat manè per quinque dies.

Deinde aqua sequenti usus est per septem dies.

℞. Mentæ siccæ ʒ. iii. sem. lactucæ, ruthæ, agni casti an. ʒ. ii. ʒ. ireos florent. ʒ. ii. fol. dictamni, ʒ. x. sacchari optimi ℔. ii. omnia pulverisentur addendo terebinth. Venet. ʒ. v. vini albi generosi ʒ. xxx. Misce, fiat destillatio in balneo, capiat æger cochlearia duo, mane, duabus horis ante cibum. Hoc modo gonorrhœa curata est. Quia tamen exigua quædam humiditas in extremitate glandis frequenter apparebat, ut in fine gonorrhœæ plerumque fieri consuevit; Ad eam prorsus cohibendam & exsiccandam, sequentes pilulæ præscriptæ sunt.

℞. Gummi arabici, tragacant. carabe, mumix, boli armen. an. ʒ. i. pulverisentur, & cum syrupo de ros. sic. fiat massa pilularum, de qua capiat ʒ. i. singulis diebus manè, duabus horis ante pastum, per 8. vel 9. dies. Et ita fluxus omninò cohibitus est.

## OBSERVATIO LXXV.

*Empyema.*

**F**ilius Dn. de Plantade in Curia Computorum, Subfidiorum & Fisci Regii, Consiliarii, quintum ætatis annum agens, febre continuâ laborabat, per duos ferè menses perseverante, cum tussi frequenti ac molesta, ita ut ad tabem vergere crederetur. Tandem vocatis in consilium Medicis relatum fuit, illum conqueri de dolore la-

teris sinistri, præcipuè, cum circa illam regionem manu contrectaretur. Tum etiam relatum fuit, in febris principio illum perferensisse aliquem dolorem in illo latere, qui tamen intra paucos dies delituerat; Idcirco pleuriticus non fuit judicatus à Medico ordinario. Suspicio fuit Empyema aliquod ibi latere, atque ut res clarior evaderet, decretum fuit, admovendum esse per aliquot dies cataplasma emolliens & attrahens, quo per triduum admoto, apparuit elevatio quædam in parte, & in ea fluctuatio subobscura percipiebatur. Convocato iterum consilio de empyemate nemo amplius dubitavit: Et apertione facta pus copiosum effluxit, ejusque vacuatio per duos menses continuata est, donec tota materia evacuata, æger tandem pristinæ sanitati restitutus fuerit.

## OBSERVATIO LXXVI.

*Ulcus cum ossis carie.*

**P**uer 15. annorum ulcus habebat vetustum in metapedio, quod à perito Chirurgo per annum integrum curari non potuit. Alter Chirurgus Junior, cui postmodum æger commissus fuit, dilatato ulcere cariem percipit, pulverem catagmaticum imponit ad tollendam cariem, & frustra; Postea oleum sulphuris admovet & frustra: Postmodum me consuluit. Jubeo imponi pulverem euphorbii, prima applicatione cum plumaceolo, ex linteo detricto facta, multæ educuntur exiguæ ossium squillæ. Secunda die plumaceolum nudum admovet, tertia die eundem pulverem denuò applicat, & plures iterum squillæ egressæ sunt, ut deinde os mundum, & à carie repurgatum apparuerit, atque ulcus postmodum intra breve tempus curatum fuerit.

## OBSERVATIO LXXVII.

*Difficultas spirandi cum pulsu valdè inæquali.*

**C**larissima Domina de la Roquette, sexagenaria, pinguis admodum & obesa, vitam agens sedentariam, admodum religiosa, & diuturnis orationibus dedita, à quindecim annis difficultate spirandi laborare cœpit, quæ paulatim incrementum susceperat, ita ut jam scalas ascendens, in tertio vel quarto quoque gradu conquiescere cogeretur. Circa principium mensis Januarii anni 1642. cum iter faceret in aëre Austriano & pluvioso, subito correpta est catarrho, partim in pulmonem, partim in mandibulas delabente. Inde aucta est difficultas spirandi, & tumor apparuit in genâ dextrâ, tum mandibulæ ita erant coarctatæ, ut nullum cibum capere posset, sed jusculum tantum sorbillaret. Corripi solebat per intervalla, jam à multis annis Erysipelate tibiæ sinistræ, quod sæpè exulcerari consueverat; & ante hujus catarrhi invasionem etiam apparuerat, cum ulceratione insigni. Vocatus ego ad eam, octava die morbi, invenio pulsum admodum inæqualem, tertia vel quarta quavis pulsatione intermittentem, cum difficillima respiratione: Unde conjeci, grave esse malum; non solum in pulmone, sed etiam in corde, aut vasis cordi proximis, & agram morituram prædixi: Quod prognosticum certius reddebatur ex eo, quod ulcus Erysipelatis subito ac derepente exsiccatum fuerat juxta sententiam Hippocrat. *aphor. 25. sect. 6.* Erysipelas foris intrò converti, malum. Præterea, resoluta paucis diebus genæ tumore, mandibulæ nihilominus clausæ permanserunt, tumque apparuit, illam constrictionem mandibularum, à muscutorum, eas moventium, convulsione dependere. Decimo quinto morbi die, matutinis horis dexter oculus clausus apparuit, altero aperto existente, quod contigit ex palpebræ paralyti sycquæ graviorem affectum minabantur, qui eodem die post meridiem contigit, scilicet apoplexia levis, à qua intrâ duas horas aliquantulum surrexit, sed media corporis pars, sinistra nimirum, reddita est paralytica. Et triduo post, sensim satisfecit viribus, extincta est.

Toto



Toto morbi decursu nulla tussis difficultatem spirandi comitata est, neque stertor, per unum diem, ante interitum. Aperto cadavere lien repertus est putredine affectus ita ut levi compressione in frusta discederet. Pulmonis substantia livida, & humore aqueo perfusa, unusque illius lobus, ad sinistram partem situs, pituita putrida, & purulenta refertus. Cordis ventriculus dexter, parte interiori, membrana denudatus, putridus, & exulceratus apparuit; Ut illius fibræ carnosæ, summis digitis contrectando, in frustula secederent. Auricula dextra solito major apparuit, & omnino referta substantia quadam carnosa, partim rubra, partim nigricante, sanguini concreto simili, quæ tamen manibus dividi non poterat. Hos duos affectus, auriculæ nimirum, & ventriculi dextri puto causam fuisse tantæ pulsus inæqualitatis; & intermissionis; dum cor, rem sibi molestem excutere tentans, variis motibus quateretur; Unde pulsus naturalis interruptio atque interceptio oriebatur, spirandi verò difficultatem à pulmonis infractu ortam esse satis manifestum est.

Similem pulsus inæqualitatem mihi videre contigit in duobus aliis agrotantibus, quorum unus erat filius D. Hugonis, Mercatoris Monspelienfis, quinque annos natus, qui tali pulsus inæqualitate diu vexatus, tandem interiit. In aperto cadavere nihil præter naturam apparuit, præter auriculam cordis dexteram, quæ multo major solito apparebat, & omnino referta erat substantiâ quadam pituitosa, & durâ, & concreta ipsarum nucis majusculæ, quæ quidem liberum cordis motum impediabat, & dictam pulsus inæqualitatem pariebat. Similes pulsus apparuerunt in filia Dn. G. 20. annos nata, in cujus cadavere aperto inventum est ulcus in ipso corde, quo media fere illius substantia absumpta fuerat. Horum casuum historiæ superioribus observationibus descriptæ sunt.

## OBSERVATIO LXXVIII.

*Phthisis.*

**F**ilia Dn. Salmonis civis Monspelienfis, annos circiter 25. nata, bilioso admodum temperamento prædita, gravi fluxione, in pulmonem decumbente, ab aliquot mensibus detinebatur, cum tussi molesta dies noctesque affligente, vigiliis perpetuis, dolore pectoris; febre lenta, alvi constrictione, & macie totius corporis; ita ut phthisica omnino videretur, & è multis diebus lecto affixa, ad interitum rueret. Vocatus ego, calidissimam viscerum intemperiem advertens, & perpetuam alvi constrictionem, maximè importunam præmissio clystere molliente, jubeo sanguinem detrahi ad ℥. vi. mox duo caustica adhiberi inter scapulas, juxta spinam dorsii. Pituitam laxantem præscribo per quinque dies continuos usurpandam, cujus descriptio talis est.

R. Tamerindor. ℥. i. β. aquæ fontis ℔. iii. coquantur ad lib. ij. in colatura infunde frigidè per noctem sennæ mundat. coriandri, & liquirit. contusor. an. ℥. ii. rosar. ʒ. i. colaturæ capiat cyathum unum, manè, hora una ante passum.

Paucis hisce remediis ita restituta est, ut post quindecim dies è lecto surrexerit, & ad consueta munia sese conferre cœperit. Manebat tamen alvi constrictione & somni vacuitas, quibus affectibus eliminandis præscribo primum bolum ex conservæ rosar. ʒ. i. & laudani Gr. i. compositum, quo per quatuor aut quinque horas dormivit, ac deinceps singulis noctibus ferè integris sine ullius remedii auxilio. Deinde jubeo, ut pituitam laxantem reiteret per aliquot dies. Vere insequente, lacte asinino per mensem usurpato, omnino restituta est.

## OBSERVATIO LXXIX.

*Pleuritis.*

**D**ie 4. April. 1642. Filius D. Roche civis Monspelienfis, annos duodecim natus, laborabat pleuritide lateris dextri. Quinquies lecta fuit vena, & alia remedia

ordinaria administrata, usque ad septimam diem. Febris erat intensa, cum inquietudine magna, dolor valdè urgebat. Exhibita fuit die septima, fuliginis camini pulver. ʒ. β. cum aqua cardui benedicti, intra duas horas ab assumptione, omnia symptomata valde remiserunt, ægerque multò melius habuit, & postmodum sensim convaleuit.

## OBSERVATIO LXXX.

*Raucedo.*

**F**ilia Dn. Viventii Lunellenfis, nata annos 20. cum sese aëri frigido exposuisset, incidit in raucedinem tam gravem, ut nullam ferè vocem edere posset, sine tussi, sine difficultate spirandi, & sine catarrho apparente. Perseveravit affectus per sex menses, multa remedia fuere usurpata, sed frustra. Tandem inter dormiendum aquosæ materiæ quantitas mediocris per aurem effluxit, liberè loqui cœpit, ac vocem claram edere. Inde conjicere licet, dicti humoris collectionem, in cerebro factam, eum occupasse nervi ramum, qui à quintâ conjugatione fertur ad musculos laryngis, à quibus vox efformatur, unde illi musculi veluti paralytici evaserant.

Post quatuor menses altera virgo Lunellenfis Rudau-de nominata, eodem affectu laborans ab octo mensibus, meum consilium exposcit; Exemplo superioriedoctus censui omnem intensionem curativam ad materiam serosam, aut pituitosam, in cerebro collectam, evacuandam vel discutendam, dirigi debere. Et præmissa venæ sectione, ac purgatione, præscripsi decoctum guajaci & salsæ parillæ, cum senna, agarico, turbit. & hermodact. per 20. dies sumendum, cum bochetto ex salsâ parilla, & victu exsiccante, postea misi eam ad thermas Balerucanas; ubi sudavit per triduum, & affectus integrè curatus est.

## OBSERVATIO LXXXI.

*Lues venerea inveterata, cum calido & sicco temperamento, ac ferè atrabilario.*

**N**obilis quidam annos natus 35. dicto temperamento præditus, à duobus annis lue venereæ laborans, ulcera foeda in palato, labro superiori, & circa nasi radicem patiebatur. Primò tractatus fuerat per sudores & hydragryrosin, quibus curatus videbatur; sed paucis postea diebus ulcera recrudescunt, & æger ad priorem statum redit. Iterum curatio instituitur per sudorifica, & frictiones mercuriales, à quibus pejus habuit. Tertio instituitur curatio priori contraria, per refrigerantia & humectantia; omnis prorsus lue oppugnantibus, sed nullo profectu. Tandem Monspelium se conferens, & consilium trium Medicorum implorans, tale præscriptum retulit. Ut scilicet tum à calida & sicca viscerum intemperie, tum à lue ipsa indicationes sumerentur, quod sequentibus remediis præstitum fuit.

Primò, clyster emolliens injectus.

Secundò, potio refrigerans & purgans præscripta.

Tertiò, venæ sectio ad ʒ. viii.

Quartò, apozema refrigerans & purgans.

Quintò, balneum tepidum per biduum.

Ab exitu ultimi balnei provocatio hæmorrhoidum.

Posteà diætâ liberalis & temperata præscripta, ex salsaparilla & ligno guajaco, addendo sub finem decocti cichorium, endiviam, acetosam, & tamarindes, utatur per quinque dies, sudores lenissimè provocando.

Interim utatur bochetto ex salsaparilla, cum victu liberali, & non exsiccante.

Post usum decocti sudorifici, per quinque dies reiteretur potio laxans prædicta.

Per biduum sequens reiteretur balneum.

Posteà utatur iterum decocto sudorifico per quinque dies, ex solis sudorificis prædictis parato sine additione herbarum & tamarindorum. Et provocabuntur sudores cum vapore spiritus vini, tinctura guajaci imprægnari.

Sss 3

Post



Post sudores iteratos per quinque dies iterum purgetur potione prædicta, quam sequatur balneum per biduum.

Et iterum repetantur sudores per quinque dies, cum decocto guajaci solius; elapsisque quinque diebus, capiat iterum potionem purgantem, & postea utatur balneo tepido per biduum.

Hanc methodum continuabit, donec ulcera consolidata fuerint. Atque ut eorum curatio magis promoveatur; topicis utetur sequentibus.

Primò fiet gargarisma ex decocto rasuræ guajaci, additis radicibus symphyti majoris, & aristolochiæ rotundæ, foliis agrimonii, vincæ pervincæ, prunell. pilosellæ, betonic. ana M. j. summit. hyperici, rosæ rubris, dissolvendo postea mel rosaceum.

Ulcera externa curentur primò infusione, lithargyri ex aceto parata. Et si crustis ablatis valde sordida appareant sequens unguentum usurpabitur.

℞. Olei rosac. omphacini ℥. i. β. succi plantag. & solani an. ℥. i. bulliant ad succorum consumpt. postea adde plumbi usti & loti ℥. vi. ceræ albæ q. s. fiat unguentum.

Si gargarisma nimis ingratum videatur; poterit fieri sine aristolochia, & augeri quantitas mellis, aut loco illius poni saccharum rosaceum.

Curatis ulceribus, utatur adhuc per mensem unum aut alterum bochetto prædicto.

In fine diætæ reiteretur purgatio & balneum; & capiat juscula refrigerantia per decem dies, in quibus dissolvitur salis prunellæ ℥. i. crystalli tartari ℥. β. sacchari albi ℥. iii. Cum incipiet uti jusculis, applicetur cauterium utrique tibie.

Denique ad firmandam curationem utatur per aliquod tempus opiata, ex sudorificis & purgantibus composita, cujus descriptionem in Renodæi pharmacopœa videre est.

## OBSERVATIO LXXXII.

*Urinæ suppressio.*

**Q**uidam septuagenarius, cum succussorem equum conscendisset per aliquot milliaria, incidit in urinæ suppressionem, quâ ægrè, & guttatim urinam excernebat. Ab alio Medico primùm injectus fuit clyster, sanguis detractus, & semicupium administratum; tum potiones quædam diuretinæ exhibitæ. Cum non melius inde haberet; vocatus ego, adverto tensionem & duritiem in regione vesicæ, cum dolore, qui comprimendo tantum percipiebatur. Præterea æger patiebatur dolores in dorso, scapulis, & pectore, ut ægrè sese commovere posset. Tempestas erat Austrina & pluviosa. Conjicio hæc omnia fieri à catarrho è capite delabente, & influxum humorum vesicæ corpus invasisse, ibique tumorem quendam excitasse, à quo sphincter vesicæ comprimebatur, ejusdemque vesicæ meatus angustior evaserat. Ideò ad fluentis humoris diversionem & evacuationem præscripsi apozema purgans & temperatum, per triduum vesicatorium posteriori parti cervicis, & fotum emollientem ac parum resolventem, regioni vesicæ admovendum, ac linimentum, iisdem viribus præditum. Per apozematis usum urinæ in dies melius procedebant, ita ut triduo elapso, multò commodius & liberalius eas reddiderit. Postmodum præscripsi bolum ex terebinthina & pulvere liquiritiæ per triduum, fotum & clysterem, ex decocto emolliente & magis resolvente paratum, & cataplasma ex residentia decocti, cum farina fabarum & sænugr. oleo anethino & chamæmelino. His ad pristinam sanitatem restitutus est.

## OBSERVATIO LXXXIII.

*Febres puerorum.*

**F**ilius Dn. Paul. civis Monspelienfis, tres annos natus, laborare cœpit febre acutissima, quæ statim ab initio ad vigorem pervenit; aderat sitis perpetua & inextingui-

bilis, quæ ab initio ad finem perseveravit, & intra quinque dies extinctus est. Extremorum frigiditas sæpe apparuit, & postremis diebus perseveravit, ita ut febrem lipyriam referret. Aperto cadavere nulla inflammatio apparuit in ventriculo, intestinis, aliave parte, cujus magna erat suspicio, ex symptomatis propositis. Et cum nulla causa appareret tantorum symptomatum, omniâque viscera benè constituta essent; existimavi, gravia illa symptomata à malignâ & venenata qualitate proditisse, ex variolis nimirum, quæ tunc temporis grassabantur, quas puer ille non potuit excludere, propter nativam quandam imbecillitatem, qua præditus erat, & veneni vehementiam. Hæc contigerunt circa medium mensis Julii anni 1642.

Eodem tempore duæ puellulæ, octo menses natæ, ægrotare cœperunt ex alvi fluxu frequenti, quo bilis porracea & æruginosa excernebatur, cum febre intensissima. Utrique præscripsi clysteres ex jusculo, vitello ovi, & confect. de hyacintho; linimentum ventri ex unguento rosaceo comitissæ & oleo cydoniorum; Epithemata cordi refrigerantia & roborantia, & julepos ex aqua plantaginis, portulacæ, syrupo cydoniorum, confectio de hyacintho, & sale prunellæ quibus utebatur ex cochleari frequenter, & intra biduum febris valde remissa est, ac propemodum extincta, alvi fluxus admodum imminutus. Nutrici victus refrigerans imperatus fuit.

## OBSERVATIO LXXXIV.

*Dysenteria.*

**D**ie tertiâ Augusti 1642. Uxor mea incidit in gravem dysenteriam, pomeridianis horis, ab assumpto pridie pharmaco leviori, qui morbus tunc temporis populariter grassabatur. Circa horam somni exhibeo laudani gr. ii. cum conserva rosarum; postridie, hora secunda pomeridiana, cum perseveraret affectus, exhibeo ejusdem laudani gr. ii. continuavit alvi fluxus, sine sanguinea ejec-tione, qui per quinque vel sex dies perseveravit non admodum molestus. Ac tandem medicamento ex infusione rhab. & myrob. cum rhab. pulver. & syrupo rosac. omnino sublatus est.

## OBSERVATIO LXXXV.

*Hydrops.*

**J**oannes Haguenotus Chirurgus, annos natus circiter 27. laboravit rheumatico affectu, cum doloribus universalibus, ex calida hepatis intemperie oriundis, qui affectus, per quatuor aut quinque menses perseverans, eum ad extremam maciem perduxit, cum febre lenta perpetua. Tandem, non obstantibus variis remediis, quæ ad tanta mala expugnanda fuere adhibita, incidit in hydro-pem, partim ascitem, partim tympanitem, ex quo venter in magnam molem intumuit. Post multa præsidia frustra tentata, & varias consultationes irritas, cum desperatus omnino videretur, mihi soli committitur. Aderat extrema macies, ut muscoli omnino consumpti essent, sicut in febre hectica tertii gradus: Existimabam ipsam hepatis substantiam esse valdè labefactatam, ut eam restituere esset impossibile. Ideò præmissis tali prognostico, tentandi gratiâ, curationem aggredior, die 4. mensis Augusti, anni 1642. Ac primùm exhibeo pilulas panchymagogas cum calomelanos Turqueti ℥. i. Purgatus fuit sexies cum euphoria, dejecit serosa multa & pituitosa.

Sequenti die aggressus est usum apozematû sequentium.

℞. Rad. asparagi, brusci, & enulæ campanæ ana ℥. i. cortic. mediani fraxini & tamarisci ana ℥. β. rad. valerianæ, aristolochiæ rot. & asari ana ℥. ii. fol. cichor. agrim. ceterach. & capill. ven. ana M. i. absinthii uriusque; chamædr. & centaur. min. ana M. β. coquantur ad lb. i. in colatura dissolve syrupo capil. ven. ℥. iii. fiat apozema pro iii. dosibus matutinis, addendo cuilibet dosi salis diuretici ℥. i. spiritus diuretici gutt. xxx. Continuavit per sex dies; deiciebat



deiciebat bis aut ter singulis diebus pituitosa & serosa. Septimo die sumpsit iterum pilulas prædictas cum eodem effectu. Postea continuavit apozemata per quindecim dies & totus venter detumuit, quotidie enim deiciebat quater, aut quinquies, serosa, & pituitosa, & copiosas urinas profundeabat. Manebat extrema macies cum inappetentia: Præscribo pulverem ex vitrioli martis 3. i. & rasur. eboris 3. ii. sumebat primum 3. i. manè, cum panatella, eodemque tempore exhibebantur manè & sero, tincturæ rosarum cochl. ii. Hæc per biduum tantum continuata fuere. Sed quia venter adhuc subhumidus erat, & materia pituitosa ac valde cruda per alvum ejiciebatur, rediit ad Julepos aperientes, qui ex decocto rad. & herbar. aperient. temperat. compositi erant, adjecto sale & spiritu prædictis, quia ex longo prioris decocti usu nimia siccitas timebatur. Sumebat eundem julepum vesperi, sine sale & spiritu, sed cum syrupo limonum, ad sitim temperandam. Deiciebat, ut supra, pituitosa, & aquosa. Vespertino Julepo addebatur interdum 3. i. tincturæ corallorum, ad hepatis robur & refrigerium. His per 12. dies continuatis, venter omnino detumuit, & interim cutis totius corporis mollior ad tactum apparebat, muscoli impleri, & totus habitus refici incipiebant, appetitus vigeat, & coctio in ventriculo rite conficiebatur. Tandem ad viscera roboranda, & facultatem expultricem, quæ segnis remanebat, leviter irritandam singulis diebus exhibebatur rhab. 3. β. cum syrupo de absinthio pontico in boli formam redacto. Hic bolus per quinque dies continuatus fuit. Postea ab omni remedio abstinuit per totidem dies. Postmodum ad maciem reparandam balneo usus est, ex hordeo & an. ygdalis confecto, quod semel in septimana iterabatur. Cum autem per mensem integrum à purgatione abstinuisset, doloribus quibusdam in artubus cruciari coepit, non tamen admodum vehementibus, qui cum per plures dies continuassent, me iterum vocavit: Ego autem purgatione tollendam esse fluxionem asserui. Ille contra dicebat dolores prægressos, qui in principio morbi apparuerunt, à purgatione non parum fuisse irritatos. Hoc causæ fuit, quod purgantia vulgaria adhibere noluerim, sed exhibitis pilulis prædictis blandè purgatus est, & dolores prorsus sublati sunt. Curatus ab hydropo omnino fuit; sed cum incauta admodum victus ratione uteretur, & cibos absurdos identidem ingereret, in febrem tertianam incidit, à qua liberatus quibusdam remediis, post 15. dies iterum in eam recidebat; & sic per quatuor aut quinque menses vixit, tertianæ paroxysmis identidem redeuntibus, ex novis in victu erroribus, donec tandem è vivis discessit, cum tamen, per sex menses ante obitum, ab hydropo liber continuo degerit.

## OBSERVATIO LXXXVI.

*Gangrena ex Vesicatorio.*

**M**ense Augusto 1642. Filia Dn. Bonin Computorum, vespigalium, & Fisci Regii, tunc Consiliarii, tunc verò Protoprædis, annos duos cum dimidio nata, laborans febre maligna, variis remediis curata est, & cum inter cætera vesicatorium præscriptum esset. Pharmacopœus ex emplastro vesicatorio officinarum composuit, & ad vim illius augendam, multo pulvere cantharidum sinapifavit, unde cutis exusta est sequenti die tota illa pars, quæ à vesicatorio continebatur, gangrænâ affecta apparuit. Ad cujus curationem celebratis scarificationibus, fœtus admotus est ex aqua vitæ dissoluto. Intra triduum eschara separata est, & ulcus residuum curatum sequenti unguento.

℞. Pinguedinis renum bovis 3. i. lithargyri præpar. & minii ana 3. i. olei rosac. q. s. fiat unguentum.

## OBSERVATIO LXXXVII.

*Febris maligna.*

**J**oannes Richardus, civis Monspelienfis, cum laborasset febre maligna, per sex septimanas, tanta virium dejectione detinebatur, ut brevi moriturus videretur. Ego

tunc temporis eum videre incipiens & audiens, parum expurgatum fuisse toto morbi decursu, ab humorum sarcina vires opprimi censui, eas tamen adeò dejectas, vix purgationem sustinere posse. Ideo per epicrasin purgationem institui, & potionem præscripsi ex infusione 3. i. fennæ in aqua cichorii, cum salis tartari 3. β. addendo syrupi ros. 3. i. continuata fuit potio per triduum. Ex ea bis deiciebat singulis diebus, vires paulum recreatæ, quarto die sumpsit syrupi de absinthio pontico 3. i. quinto exhibita infusio 3. i. fennæ, & per biduum continuata, blande purgatus est cum fructu. Unde melius habere coepit, sensim convaluit, repetitis per intervalla purgationibus. Per aliquod tempus recidivam passus est, & Medicum non vocavit, donec ad extrema redactus fuerit, atque ita ultimum diem clausit, hoc tantum in hac observatione notatu dignum est, medicamentum purgans exhiberi posse in summa virium dejectione; inodo perexigua dosis præscribatur.

## OBSERVATIO LXXXVIII.

*Alvi fluxus in puero.*

**F**ilius Dn. Audeffan in Curia Computorum, &c. Consiliarii, annos quatuor natus, diuturno alvi fluxu laborabat, cum inappetentia & dejectione virium. Origo illius alvi fluxus erat ex prava victus ratione, eum enim pluribus cibis ingurgitabat, & metum aliquando ei exhibebat; inde calor nativus ita attritus est, ut alimenta in cruda & pituitosa excrementa converterentur; nihil enim ferè, nisi meram pituitam deiciebat, quo tempore eum videre cæpi; cum tamen antea flava, viridia, æruginosa & sanguinolenta rejecisset, ut mihi relatum est. Instituta victus ratione præscribo medicamentum, ex syrupi de cichorio compositi 3. i. cum rhab. 3. β. per triduum exhibendum, deinde tincturam corallorum manè & sero sumendam, ad cochlearia duo; intra quinque dies melius habuit, & continuatis remediis, paucis diebus restitutus est.

## OBSERVATIO LXXXIX.

*Alvi fluxus diuturnus, & dolor capitis contumax.*

**D**ie septimâ mensis Octobris, anni 1642. Vocatus sum Lodovam ad Dominum Fleury, Fisci Regii Quæstorem, octogenarium, laborantem alvi fluxu diuturno, à duobus mensibus eum infestante, quo multa serosa & cruda excernebat; præcipue verò nocturnis horis alvi fluxus exacerbabatur; ex quo & aliis signis conicere licuit à cerebro potissimum influxum dependere. Præterea laborabat dolore capitis atroci, partem sinistram à summo vertice ad aurem & tempus ejusdem lateris occupante, qui dolor, cum supra partem affectam decumberet, pulsans manifestè apparebat. Illius curationem aggrediens, primum ratione alvi fluxus sequentem potionem præscribo.

℞. Rhab. electi 3. i. myrobalan. citrin. 3. β. santali citrini 3. β. infundantur in aqua plantag. expressione facta dissolve rhab. pulver. 3. β. syrupi rosar. 3. β. fiat potio, à cujus assumptione ter alvum deposuit interdiu, & nocte consequente bis tantum dejecit, cum prægressis noctibus quinquies, aut sexies deiceret.

Sequenti die eadem potio laxans exhibita est, addita in infusione fol. fennæ 3. i. Quinquies aut sexies dejecit per diei decursum, nocte verò nihil, & ita alvi fluxus omnino curatus est.

Tertia die, ad dolorem capitis pulsantem & diuturnum auferendum, cum multa alia remedia frustra tentata fuissent, ad arteriæ temporis apertionem venio, qua sanguinis 3. iii. detractæ sunt, & desuper admotum est emplastrum ex thure, mastiche, bolo armena, pilis leporinis & albumine ovi, cum bona ligatura: Et eadem die dolor omnino sublatus est.

OBSER-



## OBSERVATIO XC.

*Catarrhus in pulmonem defluens.*

**C**irca finem mensis Octobris anni 1642. incidi in gravem catarrhum ab insolatu, qui in pulmonem defluens, difficultatem spirandi efficiebat cum stertore. Venæ sectio celebrata est, deinde purgatio per biduum, ex pituita laxante, cum vini abstinentia, & magna cibi parcimonia: His stertor desit, & difficultas spirandi valde imminuta est. Sed eorum loco tussis successit valde molesta, quæ cum per biduum perseverasset, manè tabaci frustulum ori admovi, leviter prius dentibus contritum, quod cum per mediam horam supra linguam detinuissem, quædam capitis conturbatio oborta est, mox nausea levis, quam sequutus est vomitus satis exiguus serosæ materiæ, quæ in fine amarorem referebat. Conturbatio capitis per duas horas perseveravit, & tussis sedata est, usque ad vesperam, in qua leviter denuò infestare cœpit, per intervalla repetens. Circa horam cœnæ, capitis dolor obortus est, cum calore quodam, præsertim in parte sinistra. Post cœnam (quæ fuit satis liberalis) dolor capitis multò gravior efficitur, eumque comitabatur nausea molesta, quæ cum per horam perseverassent, & dolor capitis magis ac magis ingravesceret, immisso penitissimè in os digito, vomitum excitavi, quo omnia alimenta in cœna assumpta ejecta sunt, cum pituita multa, inde dolor capitis imminutus, mox in lectum me compono, ubi somno correptus noctem placidè transegi, & sequenti die à tussi & catarrho prorsus immunis fui.

## OBSERVATIO XCI.

*Cephalæa ex Lue venerea malè curata.*

**V**ir quidam lue venerea infectus, curatus fuit per diætam sudorificam, & litum ex hydrargyro, unde per aliquod tempus à morbo immunis visus est. Postea verò idem affectus recurrit, & iterum curatus est decocto sudorifico, per aliquot dies assumpto, ac deinde suffitu cinabaribus, iterum perfectè curatus visus est. Postea tamen tentari cœpit gravi cephalæa, sinistram capitis partem obsidente, quæ in mutationibus tempestatum, ac præcipuè ineunte autumno, graviter eum excruciat, & in eodem loco clavi instar semper infixè permanebat. Et cum multa remedia evacuantiâ, revellentia, derivantia, & anodyna frustra tentasset, ad nos venit. Nos verò statuimus gravem illam cephalæam ex reliquiis luis venereæ, non perfectè curatæ, procedere. Causam tamen illius proximam, & immediatam, aut saltem fœventem & augmentem illum dolorem, propter virulentiam veneream, esse vel humorem acrem ac mordentem, ad eam capitis partem confluentem, vel mercurium ipsum in parte congestum, vel cariem in osse capitis contractam. Quæ duæ causæ posteriores, licet infrequentes sint, aliquando tamen contingunt, ut multis historiis, ab authoribus relatis, constat.

Ut igitur harum omnium causarum habetur ratio, primò præscripsimus evacuationem universalem per sanguinis missionem, & purgationem, per apozemata ad quatuor dies.

Deinde diætam sudorificam ex decocto ligni guajaci & fassaparillæ ad 30. vel 40. dies, habita ratione temperamenti, quod si calidius fuerit, (neque enim hominem coram videre licebat, sed ex scripta relatione consilium petebatur, non exposito ægri temperamento) balneis & iussulis refrigerantibus corrigatur. Sæpe enim lue venerea, quæ hydrargyro curari non potuit, longo usu decocti sanatur. Et si cephalæa ab humoribus tantum virulentis, membranas vellicantibus oriatur; sola diætâ longiori curari poterit.

Si verò dolor ille capitis, decocto diu usurpato, non cessesit, videndum erit, num mercurius in parte collectus sit, quod internosci poterit, si globulus, ex foliis auri confectus, in narem sinistram profundè immittatur, & post aliquam moram ex nare albicans extrahatur, signum enim

erit adesse mercurium. Idem tentari poterit contegendo emplastrum cephalicum foliis auri, & parti dolenti imponendo, si enim albescat aurum signum erit, adesse mercurium, qui paulatim extrahetur, si lamina aurea tenuis supra partem dolentem continuò gestetur, & globulus aureus solidior frequenter in narem immittatur.

Si neque hoc præsidio cesset dolor; aperienda erit pars, & terebello perforanda. Sæpe enim ab acris humoribus & virulentis corroditur cranium, eique caries inducitur, cute integra remanente. Et licet caries non appareat; trepanum tamen sæpe confert, educendo materiam virulentam, supra meninges cerebri collectam.

## OBSERVATIO XCII.

*Pleuritis.*

**F**ilia D. Divoul, civis Monspeliensis, sanguineo temperamento prædita, 20. annos nata, sæva pleuritide affecta est lateris sinistri, principio mensis Martii, anni 1643. Secunda die morbi secta fuit vena ejusdem lateris, & sanguis detractus ad 3. viii. sequenti die, cum Chirurgus vellet iterare phlebotomiam, non potuit venam attingere, quia virgo illa erat admodum obesa, & vena in profundo brachii sepulta, ita ut cum in brachio dextro vena magis pateret, eam aperire coactus fuerit, ex eaque detraxit sanguinis 3. viii. quæ tamen phlebotomia nihil profuit. Cum igitur pleuritis admodum urgeret, me in auxilium vocarunt, & cum maximam iterandæ phlebotomiæ necessitatem viderem, ex eo quod ægra ferè suffocabatur, ac febre intensissima laborabat, iussi alios vocari Chirurgos, ut aliquis eorum venam aperiret, cum igitur unum ex peritioribus vocavissent, eum monui, ut si venam aperire posset, amplo foramine id efficeret, & magnam sanguinis copiam una vice detraheret, cum venæ sectionem iterare esset tam difficile. Ille rem præstitit, ut monueram & sanguinis circiter 3. xiv. detraxit, qua evacuatione ægra maxime sublevata fuit, sine ulla virium jactura. Post quatuor, aut quinque horas missus fuit iterum sanguis ad 3. x. quam etiam vacationem ægra facile tulit, & sequenti die à pleuritide & febre omnino liberata est.

## OBSERVATIO XCIII.

*Epilepsia.*

**F**ilius D. Roche, civis Monspeliensis, annos natus 12. ab aliquot mensibus, epilepticis accessionibus affligebatur, quæ primum semel in septimana, postmodum verò singulis diebus invadebant. Purgatus fuerat semel aut bis, sanguisque detractus, & à multis annis cauterium habebat in brachio. Vocatus ad eum præscribo apozema ex cephalicis, & Epilepsiæ specificis, cum purgantibus, ad quatuor doses. Deinde inuritur causticum futuræ coronali, & his duobus remediis à morbo liberatus est.

Erat puer iste calido & bilioso temperamento præditus, & in actionibus promptissimus, quod conjecturam faciebat, hunc affectum à vaporibus tetris exoriri, qui per istud emissarium diffari poterant.

## OBSERVATIO XCIV.

*Hydrops.*

**F**ilia Dn. Patris in Curia Præsidiali Consilarii, annos sex nata, & hydrope detenta, sequentibus remediis curata est mense Martio, anni 1643.

Primò injectus fuit clyster sic paratus.

℞. Pulpæ colocynthid. 3.i. surfaris macri M i.coquantur in vino albo ad quart. iii. fiat clyster, qui pituitosa & serosa eduxit, sine molestia, & fuit continuatus per triduum. Eodem tempore admotum fuit toto ventri cataplasma ex rad. cucum.agressis,cumino, & melle paratum, cujus descriptio habetur in praxi nostra cap.de hydrope, cum autem venter detu-



detumescere inciperet, & agra remedia interna sumere nolle; iteratus est clyster alternis diebus, ter aut quater, & continuatum cataplasma. Ex quibus major ventris immutatio sequuta est. Tandem præscriptus fuit pulvis purgans ex senna, turbith, aliisque paratus, cujus descriptio habetur in praxi fol. 286. cujus dosis erat 3. i. ex eoque parum purgata est, cum medicamentum vomitu rejiceret, & venter adhuc tumidus apparebat. Postmodum præscribo Julepos ex rad. & herbis valde aperientibus cum sale, & spiritu diuretico, ad quatuor doses, quorum usu majorem urinæ copiam reddidit, sed venter adhuc tumidus permanebat. Postmodum præscripsi pulverem ex rad. jatap. gr. xv. scammon. gr. viii. calomelanos Turqueti gr. xii. quem sumpsit cum jusculo, & septies purgata est, multumque feri ac pituitæ rejecit per alvum, & semel vomuit pituitosa multa, unde tumor ventris, dimidia sui parte imminutus est, intra horas 24. Iteratus est julepus prædictus per triduum; quarto vero die iterum sumpsit pulverem prædictum cum eodem succellu, & cum venter admodum imminutus esset, ac agra de lecto surgere inciperet, cibosque lautè appeteret, à remediorum usu ulteriori abstinuit, sicque sensim convaleuit.

## OBSERVATIO XCV.

*Lucis venerea in puerulo.*

**P**uer 30. menses natus, Lucis venerea laborans, & scabie, totum corpus occupante, quam à nutrice acceperat, sequentibus remediis curatus est.

℞. Rasuræ ligni guajaci ʒ. ii. aquæ fontis ℥. ii. infundantur per 24. horas, deinde bulliant, ad tertie partis consumptionem. Colaturæ capiat ʒ. iii. singulis diebus manè, duabus horis ante pastum corpus tegendo paulo plus solito, & continuando per 20. dies.

℞. Scammon. pulver. gr. vi. calomelanos gr. v. fiat pulvis tenuissimus, qui detur cum cochleari uno vel altero panatellæ saccharatæ, & superbibendo parum jusculi, continuetur hoc remedium quinto quoque die, augendo dosim utriusque medicamenti, juxta operationem.

℞. Residentiam prædicti decocti, aquæ fontis ℥. iii. fiat bocherum pro potu ordinario addendo sacchari, & liquiritiæ q. s. ad saporis gratiam. His remediis per mentem continuatis probè convaleuit.

## OBSERVATIO XCVI.

*Abcessus juxta spinam dors.*

**I**ntra illud tempus quo medicinam facio, quinque abcessus, mihi videre contigit, dorsum occupantes, juxta ejus spinam, qui materia frigida sensim collecta geniti fuerant sine dolore, aut inflammatione, & partis colore nullo modo mutato. Molles erant tumores, oedemati similes, pugni magnitudinem ferè adæquantes. Ex iis tamen apertis pus laudabile effluebat. Tres priores de medio ægros sustulere, intra trium aut quatuor mensium decursum, cum ulcus ex abcessu aperto relictum, sinuosum admodum evaserit, ex eoque continuo magna puris copia effluerit; unde corpus universum exhaustum, & in atrophiam conversum est, licet multis remediis ulcerum curatio tentata fuerit. Quartus curatus fuit incisionibus magnis in dorso factis, quibus omnes sinus detecti sunt; mox fotibus ex aqua catapularum, aliisque topicis ulcera sanata sunt, interim tamen causæ antecedenti providebatur frequenti evacuatione & usu decocti sudorifici. Quintus denique curatus est sine incisione, sed magna apertione factâ per cauterium potentiale, mox deterfione ulceris per injectiones ex decocto catapularum, & fotu ex eodem ac denique valida compressione partis, cum fasciis & splenis, & valde adstringentium emplastrorum continua admotione in ambitu ulceris. Interim verò causæ antecedenti providebatur remediis prædictis.

*Lazar. Riverii Opera.*

## OBSERVATIO XCVII.

*Hydrops in puerulo septem annorum.*

**F**ilius D. Saget civis Monspelliensis, graves obstructions patiebatur, unde venter intumuit magnam in modum, ut jam hydropicus factus esset. Vocatus ad eum die 28. mensis Aprilis anni 1643. sequentia præscripsi.

℞. Sennæ mundat. ʒ. ii. sem. anisi & cremoris tartari ana. ʒ. i. absinthii pontic. p. i. coquantur ad ʒ. iii. in colaturâ dissolve electuarii diachartami ʒ. i. t. syrupi rosac. ʒ. ʒ. fiat potio, detur mane cum regimine.

℞. Rad. apii, petrosel. & asparagi ana ʒ. ʒ. fol. agrim. capill. Ven. ceterach. & hyssopi ana M. polypod. querc. & sem. carthami ana ʒ. ii. sem. apii, & petrosel. ana ʒ. i. cremoris tartari ʒ. ii. coquantur cum quarta parte galli veteris, in colatura dissolve salis absinthii & tamarisci ana. ʒ. i. fiat jusculum, quod capiat manè per 12. dies.

In tertio quoque jusculo infunde per noctem sennæ mund. ʒ. ii. capiat cum regimine.

℞. Olei de capparibus & tamarisci ana ʒ. ii. succi ebulli, & cucumeris agrellis ana ʒ. i. ʒ. bulliant ad succorum consumpt. in colatura dissolve sem. agni casti, & petrosel. macedonici subtilissime pulverat. ana ʒ. ʒ. olei nucis moschat. ʒ. ʒ. ceræ q. s. fiat linimentum quo illinatur totus venter calidè in introitu lecti.

Utatur pro potu ordinario infusione chalybis, & rhab. in forma bocheti.

Hisce remediis ventris tumor minutus est, sed non omninò sublatus, ita ut ad sequentia remedia transeundum fuerit, quæ intra tres septimanas morbum integrè discusserunt.

℞. Conservæ flor. tamarisci & capill. ven. ana ʒ. i. ʒ. conservæ rhad. enulæ campanæ ʒ. ʒ. confect. alchem. ʒ. iii. salis absinthii. tamarisci ana ʒ. i. rasuræ eboris, & pulv. electuar. diarrhod. abbat. ana ʒ. ii. cum syrupo capillor. ven. fiat opiata, de qua capiat magnitudinem castaneæ, singulis diebus, manè, duabus horis ante pastum, superhausto vini diluti momento.

℞. Calomelanos gr. viii. diacryd. gr. vii. fol. auri num. i. fiat pulvis, qui detur semel in septimana, cum duobus cochlearibus panatellæ saccharatæ, superbibendo parum jusculi.

## OBSERVATIO XCVIII.

*Paralysis spuria.*

**H**onesta mulier Aquisextiana, quinquaginta circiter annos nata, cum abortum passa esset, & adhuc ex eo decumberet, affecta est primum sensu obtuso, in regione abdominis, quem (manu ventrem contrectando) facile percipiebat. Hunc abortum post aliquot menses sequuta est graviditas, per cujus decursum illa sensus obtusio crura etiam & tibias invasit; cuique longe deterius symptomata accessit; nempe motus impotentia. Post partum multa remedia purgantia, sudorifica, & alia quamplurima calefacientia & exsiccantia fuere usurpata sine ullo fructu, ita ut jam à duobus annis gravi hoc affectu detineatur. Non est in dictis partibus omnimoda sensus privatio; sed tantum imminutio: motus verò omninò abolitus est. Hoc tamen peculiare, & animadversione dignissimum occurrit; quod dum tibiæ à ministris extenduntur, aut alio quovis modo commoventur; statim rigidæ evadant, & convellantur, ita ut tetanus efficiatur. Huic accedit motus quidam convulsivus, epilepticorum motui consimilis, qui etiam sponte non rarò accidere consuevit, per quædam intervalla. Dum autem iis symptomatis agra corripitur, quendam motum percipit in hypochondriis, præterea doloribus vagis frequenter affligitur, varias partes, præcipuè verò thoracem occupantibus, ita ut nunc anterior, nunc posterior, nunc dextra, nunc sinistra thoracis pars illis doloribus fugacibus afficiatur. Hæc est morbi historia ab ipsa agrotante relata, quæ à thermis rediens, frustra usurpatis, à nobis consilium petiit die 4. Julii anni 1643.

T t t

Optarem



Optarem equidem ut illius enarratio à peritis Medicis, qui illius curationi præfuerunt, exactius fuisset exarata, quo affectus intricatissimi atque difficillimi natura & curatio, ex omnium circumstantiarum attenta meditatione solidius stabiliri posset. Non desinam tamen; ægrotantis voto satisfactus, sententiam meam proferre, & peritissimorum Medicorum (qui omnia morbi momenta captare potuerunt, remque penitus inspicere,) iudicio subicere.

Censeo itaque, hunc affectum non esse veram paralyfin, ab humore pituitoso nervos laxante ac resolvente oriundam, sed potius mixtum quemdam affectum, spurie paralyseos, & convulsionis participem. Spuriæ autem huiusmodi paralyseos, distensionibus nervorum ac convulsionibus complicatæ, in partibus illis inferioribus sæpe produci solent ab humoribus biliosis, melancholicis, aut ferosis, in hypochondriis, aliisque partibus in ventre inferiori contentis & in spinam dorsum transfusis; à qua cum nervi oriuntur, motum & sensum partibus inferioribus, tum etiam musculis & cuti abdominis tribuentes; non est mirum earum partium actiones animales plurimum oblædi. Hæc longiori discursu authorum placitis, & rerum usu confirmari possent, sed peritis viris sufficiet paucula quædam indicare; quæ huius rei conjecturam satis probabilem efficere poterunt.

Primò itaque hoc; tanquam fixum ratumque statuentum est: non omnem sensus motusque privationem ab humore pituitoso originem ducere; sed eam aliquando à calida siccaque intemperie, humoribusque talem temperiem consequentibus proficisci. Hoc vel unius Tralliani sententia confirmari potest, qui c. 16. lib. 1. talem causam adstruit, eamque luculento exemplo confirmat his verbis. Novi ego sane quendam, resolutionem ex mœrore, multa sollicitatione, & inedia expertum, deinde sumpta hiera adeò læsum, ut totus ipse immobilis fieret, & propemodum interiret, nisi in contrarium mutatus fuisset, & humectantibus omnibus, tum potionibus, tum cibis, & aliis, quæ temperatum ipsum reddidissent, usus fuisset. Maximè verò balneis compluribus, unctionibus, ex hydrelæo, mutatione aëris temperati, & omni hilaritate. Huic non valde absimilem historiam videre est apud Forestum obs. 97. lib. 10. cujusdam adolescentis qui à cruribus ad pedes sensu & motu destitutus, cum earundem partium extenuatione & atrophia; cumque calefacientium & exsiccantium medicamentorum usu, ab aliis Medicis præscriptorum, in pejus continuò rueret; tandem solis humectantibus assumptis admotis, ab eo restitutus est.

Præterea jamdiu apud practicos pervulgata est colica biliosa, quæ in paralyfin frequenter degenerat, & hanc paralyfin à bile produci nemini dubium est.

Ac denique, ab humore melancholico & feroso symptomata produci paralyseos, & convulsionis æmula, ab iis Auctoribus, qui de scorbuto & affectione hypochondriaca scripserunt; passim relatum est, ut apud Sennertum videre est, dictorum morborum symptomata explicantem in lib. de scorbuto & de affectione hypochondriaca.

Jam verò sensus & motus læsiones, quæ honestam hanc mulierem affligunt à calidis & exustis humoribus produci, conjicere primò licet à juvantibus & lædentibus. Cum enim à calefacientibus atque exsiccantibus remediis minimè adjuta sit, sed ab iis perpetuò pejus habuerit, consequens est, illa morbo minimè contraria fuisse. Et hæc fuit unica via, quæ Trallianum & Forestum deduxit, in historiis suprâ memoratis, ad dignotionem paralyseos, à calidâ & siccâ intemperie oriundæ.

Secundò, siccam intemperiem in hac ægrotante inde colligere licet, quòd cauteria, variis partibus admota, exiguum humorem reddiderint, & brevi exsiccata fuerint.

Tertiò, paralyseos à pituita originem, ex cerebro, tanquam humoris illius fonte ducunt originem, & partes capiti viciniores primam ut plurimum atque majorem læsionem sentiunt, At hîc nulla humoris à capite fluentis indicia apparent, neque nulla partibus superioribus læsio contingit: ita ut brachia, manus, & aliæ partes superiores integrè functiones exercent.

Quartò prima morbi invasio, in ventre, & musculis abdominis sensum obtusum præbuit, quod ostendit nervos, à spinâ dorsum per vertebrae lumborum oriundos, primùm fuisse læsos, ac postmodum affectum fuisse propagatum ad nervos, qui ab osse sacro oriuntur, & ad crura tibiaeque perreptant. Quo innuitur à partibus in ventre inferiori contentis, humorem noxium ad eos nervos fuisse translatum, non secus ac in paralyfi, colico dolori succedenti, huiusmodi translatio fieri consuevit.

Quintò, dolores varias partes, præcipuè circa pectus infestantes, iique fugaces, vapores arguunt acres atque mordaces, ab hypochondriis ad illas partes translatos, quemadmodum dolores consimiles melancholiâ hypochondriaca detentis sæpissimè contingunt.

Sextò, quoties pedes & tibiæ huic ægrotanti commoventur, tensio, & motus tremulus statim oboritur: quod innuit materiam nervis impactam, tenuem esse & mobilem, atque vel levi motu agitatam commoveri, sicque tensiones & vibrationes nervorum efficere.

Septimò dum convulsionem mulierem aggrediuntur, præcedit motus quidam in visceribus, qui ab ea manifestè percipitur & ille motus fit à dicta materia, sese commoveri incipiente; vel à vaporibus, ab eadem materia per commotionem illam elevatis, quemadmodum in epilepsia sympathica, à partibus inferioribus oriundâ, tales in ventre commotiones apparent, invadente paroxysmo.

Denique hîc affectus post abortum apparere cœpit, & consecutariæ graviditatis tempore incrementum habuit, quod significat humores pravos, in uteri venis collectos, & per menstruas purgationes non satis commodè evacuat, ad partes illas nervosas decubuisse, & huiusmodi sensus & motus oblæsiones tandem produxisse.

His positis, ad curationem veniendum est, quæ ad istas indicationes erit dirigenda, ut calida, & sicca viscerum intemperies corrigatur, humores melancholici & exusti (quos præcipuam horum symptomatum causam esse existimo,) præparentur & evacuentur, viæ obstructæ referantur, & viscera præcipua, tales humores producentia, roborentur. Materiam, hisce indicationibus adimplendis idoneam, eamque selectiorem, summam proponemus, hoc præmissis prognostico, affectus, ab humore melancholico oriundos esse curatu difficillimos: quòd si nervorum genus invadant, multo difficiliore. Affectus verò nervorum confirmatos, & qui jam in vetustatem abierunt, esse deploratos. Unde sequitur, propositum casum vix remediis esse superabilem, exiguamque spem curationis superesse. Tentandam tamen hanc curationem suaserim, quandoquidem multa præter spem quotidie eveniunt, & multi affectus curationem recipiunt, qui pro deploratis habitii fuerant.

Primò igitur victus ratio instituenda est ex cibis boni succi, & facili coctionis, aliquantulum refrigerantibus & valde humectantibus. In horum censu carnes juniorum animalium & ova forbilis recentia principem locum obtinent. Cæteræ victus minutiae Medicis ordinariis præscribendæ relinquuntur.

Reliqua curatio à clystere laxante inchoanda est, quem sequetur postera die missio sanguinis, ex brachio sinistro ad 3. viii. & si sanguis corruptus, aut prava aliqua qualitate infectus videatur; repetenda erit phlebotomia postriedie, ex altero brachio, pari quantitate. Post venæ sectionem sequentium jusculeorum aggrediatur.

℞. Rad. buglossi & asparagi ana 3. i. fol. agrim. ceterach. capillor. ven. & cichor. ana M. i. coquantur cum pullo gallinaceo, & fiat jusculum, in quo dissolve crystalli tartari 3. i. capiat per 12. dies.

In quarto quoque jusculo infunde per noctem fennæ mund. 3. iii. anisi 3. i. in colaturâ dissolve mannæ electæ 3. i. β. capiat cum regimine.

Finitis jusculis, utatur semicupio tepido, ex decocto hordei, & amygdal. dulc. per triduum, bis in die longè à pastu.

Postriedie ultimi semicupii, aperiatur vena malleoli sinistri, emittantur sanguinis 3. vi.

Utatur deinde sero lactis caprilli per xv. aut xx. dies sumen-



sumendo primis diebus cyathum unum, deinde duos, vel tres; prout ventriculus ferre poterit, quo enim major quantitas assumetur; eo utilius usurpabitur. Debet autem serum lactis parari immediatè, antequàm assumatur, & ex lacte educi recenter ab ubere extracto, coquendo dictum lac unâ ebullitione, & quam primùm bullire incipit, irrorando pauca quantitate succi limonum vel aceti, & subinde ab igne removendo. Fiet enim statim feri separatio à caseosa substantia, quod colatura, & clarificatione cum albumine ovi, limpidissimum evadit, & magna copia sumi potest, sine ventriculi offensa, ita ut non rarò instar aquarum mineralium à nonnullis cum maximo fructu assumatur.

Quarto vel quinto quoque die, in primo feri cyatho mannæ ʒ. ii. dissolvuntur.

Per reliquum æstatis decursum, semicupium iterandum est, semel aut bis in septimana, ut hypochondria humectentur, & noxii humoris acrimonia temperetur.

Si alvus sponte non fluat; clysteribus alternis diebus sollicitabitur.

℞. Conservæ fructus cynorrhodi ʒ. iv. conservæ flor. borrag. Violar. & tamarisci ana ʒ. ii. conservæ rad. enulæ campan. & cortic. citri condit. ana ʒ. ʒ. rasuræ eboris ʒ. ii. salis absinthii & tamarisci ana ʒ. i. ʒ. myrobolan. condit. num. ii. confect. alkerm. ʒ. ʒ. cum syrupo capill. ven. fiat opiata, de qua capiat magnitudinem castaneæ, singulis diebus, manè, duabus horis ante pastum, superhausto vini diluti momento.

Quia verò morbus est valde contumax, & non nisi remediis diutissimè continuatis expurgari potest: Ineunte Autumno curatio de integro instituenda est, incipiendo à clystere injecto, quem sequetur venæ sectio in brachio, ac postmodum apozema sequens ad xii. dies usurpabitur.

℞. Rad. asparagi, bruci, & buglossi ana ʒ. i. rad. enulæ campan. cortic. rad. capparum, mediani fraxini, & tamarisci ana ʒ. ʒ. fol. agrim. borrag. pimpinellæ, cichor. ceterach. & capil. ven. ana, M. i. poma redolentia bene, & in talleolâ secta num. ii. flor. borrag. viol. & tamarisci ana. P. i. coquantur ad ʒ. i. pro iii. dosib. addendo unicuique dosi crystalli tartari ʒ. i. salis absinthii, & tamarisci ana ʒ. i. syrapi capill. ven. ʒ. i. capiat per dictum tempus manè, tribus horis ante pastum, tercio quoque die decoctum renovando.

In quarta quaque dosi infunde per noctem sennæ mund. ʒ. iii. sem. anisi ʒ. i. in colatura dissolve mannæ electæ ʒ. ii. capiat cum regimine.

Post usum apozematum reiteretur semicupium per triduum, ut supra præscriptum est.

Post die ultimæ semicupii, anus confricetur panno asperiori, & affigantur duæ hirudines partibus eminentioribus, extrahanturque sanguinis ʒ. v. vel vi.

Sequenti die affigatur causticum utrique tibie parti interiori, & ulcera, decisâ echarâ, teneantur deu aperta.

℞. Succorum recenter expressorum, & levigine depuratorum borrag. buglossi, fumariæ, cichor. endiviæ ʒ. iii. succi pomorum redolent. recenter expressi & depurati ʒ. ii. sennæ mundat. ʒ. vi. epithymi ʒ. iii. agarici recenter trochiscati & rhab. electi ana ʒ. i. ʒ. macis & caryophyllorum ana ʒ. i. infundantur, & decoquantur, ut artis est, donec colaturæ supersint quart. v. in quibus dissolve sacchari albi quart. v. fiat syrupus perfectè coctus, de quo capiat ʒ. ii. bis aut ter in mensè, cum juscule pulli, foliis borrag. buglossi, & agrim. & pimpinell. alterato.

Continuet usum opiatæ prædictæ, singulis diebus, vacuis ab aliorum remediorum usu.

## OBSERVATIO XCIX.

*Vomitus in febre maligna.*

**F**Amula Dn. de Rozel, nomine Laprunæ, febre malignâ laborans, die decimâ morbi, vomitu detinebatur tam importuno, ut omnia juscula & potum rejiceret, cumque per triduum perseverasset affectus; Medicus qui ejus curationi præerat, meo consilio exhibuit salis absinthii ʒ. i. *Lazar. Riverii Opera.*

cum succi limonum cochleari uno, & vomitus subito cohibitus est ac postmodum omnia assumpta retinuit. Triduo post idem vomitus rediit & eodem remedio statim sedatus est.

Post aliquot dies, idem remedium ab eodem Medico exhibitum est duobus pueris, decem, aut duodecim annos natis, eodem symptomate laborantibus, cum eodem successu.

## OBSERVATIO C.

*Falsa graviditas.*

**M**ulier Giniacensis annos nata circiter 45. Monspelium venit, de affectu suo consilium petitura, retulit nobis se, cum nunquam viro nupsisset, & rem habuisset cum adolescente, in utero concepisse, unde sequuta est inappetentia, macies, & pallor totius corporis, quorundam eduliorum desiderium, cum aliis graviditatis signis.

Post quadagesimum à conceptione diem percepit palpitationem quandam versus hypochondrium dextrum, ab eoque tempore melius habuit, & appetitus restitutus est. Venter in dies augebatur, mammae intumescabant, in quibus tandem lac colligi cepit, nempe quarto mense in mamma sinistra, idque subrufum, postea album in dextra.

Quarto mense, fluxus menstruorum apparuit copiosus, triduo perseverans, inde ventris tumor imminutus est. Postea tamen sensum denuò augebatur. Menstruæ purgationes singulis mensibus prodibant, quemadmodum ante graviditatem; Motus in ventre sentiebatur illi consimilis, quem foetus in utero conclusus solet exercere.

Nono mense, dolores parturientium passa est, ut ita vocata obsterice, omnes adstantes partum expectarent. Illi tamen dolores post 24. horas quieverunt, & nihil exclusum est.

Ab eo tempore menstruorum fluxus adhuc ordinatus fuit, usque ad decimum tertium mensem, in quo iterum parturientium dolores passa est, sine effectu. Postea verò nunquam amplius menstrua prodierunt, ventris tumor permanens, cum motu interpolato, instar foetus inclusi. Jamque elapsi sunt triginta duo menses à principio graviditatis, neque tumor ventris est admodum insignis, vix enim æmulatur semestrem gestationem. Duo tumores apparent sensibilibus distincti, ut quoddam interstitium medium appareat: Illi tumores ad hypochondria vergunt, decumbente muliere. At eadem erecta, veram graviditatem referunt, medium ventrem occupantes: compressi recedunt, & iterum accedunt, Moventur sæpè motu proprio, instar foetus, utero inclusi.

Mammarum tumor jamdiu evanuit, & illæ admodum molles ac flaccidæ evaserunt, è quibus exprimuntur lactis viridis guttule perexiguæ.

Toto graviditatis tempore, mœrore & jejuniis sese confecit; domi inclusa remanens, quod graviditas illa sine conjugio legitimo contracta fuisset.

Casus iste rarissimus est, & intricatissimis difficultatum labyrinthis involutus, è quibus tamen rationis & conjecturæ filo nos expedire conabimur.

Primò quidem esse veram imprægnationem, argue-re possent appetitus depravati, lacin mammis collectum, & motus ipsius foetus, cui nihil deesse videtur, quam tempus partus consuetum, quod quidem tempus ex eo retardatum fuisse quis dicere possit quod longa jejunia, & fluxus mensium foetum debito alimento fraudaverint, unde illius perfectio ad longius intervallum producta, hincque mora in utero diuturnior consequuta fuerit. Attamen convenit inter Medicos, Philosophos, & Jurisperitos, à quibus sæpè hæc controversia disputata est, ultimum humani partus terminum ultra undecimum mensem extendi non posse. Neque est, quòd dicere quis valeat, præter naturalem & ordinarium pariendi terminum, raros quosdam, extraordinarios casus posse contingere, quemadmodum apud nos recens adhuc est historia



Dominae de Cardet, quæ se primum ad decimum quintum mensem, postea verò ad annum, duos, & tres, foetum in utero gestasse asserbat; quâ de re duo exstant consilia invicem pugnantia doctissimorum virorum Hucheri cum Varandeo ex una parte; & Saportæ cum Pradillæo ex altera. Tum etiam apud Schenckium quardam historiae proponuntur infantium, per biennium in utero gestorum, qui statim, ac in lucem editi essent, & loqui & incedere cœperunt. Hasce enim historias, non historias, sed fabulas esse asserimus, idque ex earum lectione confirmari facile est, nam quod ad Dn. de Cardet spectat, rationibus in consilio Saportæ & Pradillæi propositis abunde convincitur, illam fuisse melancholicam, & imaginationis errore laborasse; quod non solum ructus frequentes, cordis palpitaciones, anathymiales ad caput & faciem delatæ, aliæque testabantur; sed in primis quòd ipsa se puerum in utero clamantem audivisse testaretur; quod esse impossibile, vel tantillum initiatis in Arte medica notum est. Et ea quæ ab eo tenore subsequuta sunt, errorem illum mentis sufficienter ostendunt. Illa enim Domina, cum adhuc in vivis sit, se etiamnum hodie à viginti duobus annis gravidam pronunciat, quæ assertio reliquarum omnium ab ea prolatarum fidem faciliè abrogat. Historiæ verò, à Schenckio collectæ, ex eo falsitatis arguuntur, quòd asserant, in lucem editos statim loqui cœpisse. At nemo nescit, loquelam esse ex disciplina. Eiusdem farinae est, quòd Avicenna refert se à fideli quodam accepisse, mulierem post decimum quartum mensem peperisse. Auritum enim testem se, non oculatum proficitur. Cum igitur nullâ verâ historiâ tales casus aliquando accidisse constet, ac demùm in nostro casu conceptus circa diem quadragesimum moveri cœperit, cum verus foetus tertio vel quarto tantum mense moveatur, fatius est asserere, nostram hanc mulierem verum foetum non habere in utero. Tantum enim abest, ut inedia & purgationes menstruæ foetum retardare potuerint, quæ potius eundem accelerare potuissent, quemadmodum docet Hippocr. gravidam mulierem ex sanguinis missione in abortum incidere. Dicendum ergo est: in hujus foeminæ utero esse præternaturale quippiam, quod ad unum ex quatuor generibus referendum sit aquam, flatum, molam, vel monstrum. Aquam esse nemo ausit asserere. De huius major esset conjectura: si quidem non ratio contingit, ut flatu, utero conclusus, motus elat foetuum motibus simillimos, qui veram graviditatem diu mentiantur. Attamen flatum non esse, duo convincere videntur: unum quidem, quòd ille utero tandiu contineri nequivisset, sed tandem exclusus, aut dissipatus fuisset: Alterum, quod lac in mammis apparens, aliquid flatu majus contestari videatur. Molam autem esse, tutius est asserere: tum quod illius generatio satis frequens rei novitatem imminuit; tum quòd proposita indicia illi satis videntur respondere, nimirum motus palpitans ad quadragesimum diem, lac in mammis crudum, mensium fluxus graviditatis tempore, idem lac post nonum mensem evanescens, & mammarum detumescencia, quibus addere est tumoris ventris durtiem, qui premendo locum mutat, & iterum regreditur. Quamvis autem Hippocr. 1. de morbis mulierum asserat; ex mola lac in mammis non colligi, id de vero & perfecto lacte audiendum est, non autem de lehoroso, quod in huiusmodi casibus reperiri solet. Cum autem duo tumores distincti tactui subjiciantur; verisimile est duas adesse molas.

His equidem acquiescere posset animus, nisi quædam obsisterent, ex quibus summa difficultas, ab initio proposita, exoritur. Primò enim ex doctrina Hippocr. mola nullum habet proprium motum: sed tantum movetur ad motum uteri, & si quis motus tangentibus appareat; ille palpitans tantum est. In hac verò muliere major motus percipitur, & veri foetus motibus consimilis, qui ab adstantibus faciliè conspicitur. Secundò, mola convertitur in utrumque laus, lapidis instar, cum ponderis & gravitatis sensu; In hac muliere nihil tale apparet. Tertiò, in mola venter dilatatur in omnem dimensionem æqualiter, cum in vero foetu acuminetur versus umbilicum,

coarctatis utrinque lateribus, cuiusmodi se habet venter hujus mulierculæ. Quartò, mola ad pubem & inguina propendit; In hac muliere tumor est ad hypochondria. Denique, mola continuò augetur, & spatio trium fere annorum ad ingeniem molem pervenisset; At in hoc casu tumoris ventris perexiguus est graviditatem quinque tantum vel sex mensem referens, neque à longo tempore ulterius augetur. In harum difficultatum concursu, licet fatius duxerimus molæ generationi, tanquam frequentiori insistere; Attamen omnibus phænomenis melius satisficeret, si liceret asserere, monstrum quoddam in hujus foeminæ utero latitare, quod ad præfinitam quandam magnitudinem auctum, nullum ampliùs incrementum suscipiat; sed tantummodò viventis humani foetus instar nutriatur, indèque fiat, ut neque uterus ampliùs extendatur, neque foetus alimento privatus intereat. Ita enim nonnullas mulieres, serpentes, talpas, ranas, mures, aves, aliæque animalia enixas fuisse, inter historias relatum est. Inò verò in Apulia & Lombardia frequentem esse talium animalium generationem, multi Authores referunt, idque genus animalium ideò vocari fratrem Lombardorum; à Gordanio, Tornamira, aliisque barbaris Medicis Arpa seu Arpia nominatur, quod huiusmodi Monstrum multos plerumque habeat pedes, quo etiam sermone illo barbarico arpas nominant. Hoc, inquam, supposito, omnibus phænomenis potest satisfieri. Nam in talis graviditatis initio, omnia veræ graviditatis signa apparere potuerunt, scilicet lac in mammis, motus veri foetus motui consimilis qui quadragesimo die potuit apparere ex eo, quod tale animal citius conformatum fuerit, quàm verus foetus: Deinde, absoluto animali venter non ampliùs crescit, illud tamen non irritat naturam ad sui exclusionem, quia solâ transpiratione vivit, & uteri tepore fovetur. Duplex autem esse animal conjiciendum est, quando duo corpora distincta utero percipiuntur. Per huiusmodi conjecturas incertus divagari potest animus, donec rei latentis exclusio rem totam oculis subjiciat. Quam equidem exclusionem (ut hoc tantum de curatione dicam,) nollem arte promovere, ne mulier in aliquod vitæ discrimen conjiciatur; sed tantisper expectare, donec vel natura spontè onus excutiat, vel ad tumorem ampliorem venter aliquando perveniat, quod tamen non eventurum ex propositis fundamentis asserere teneor. Post aliquot annos relatum mihi fuit, hanc mulierculam fuisse liberatam: sed quo eventu, expiscari non potui, quia illa rem studiosè celavit.

Ad hujus historiae illustrationem non parùm conducit alius casus, à vetula obsetrice mihi relatus, de quadam muliere Monspelienfi, cui primum menstruæ purgationes defecerunt, mox inappetentia, & quorundam peculiarium alimentorum appetitus eam invasit; præcipuè verò piscium ostraceorum appetentia eximia premebatur, ut iis continuò vesci cogeretur. Post secundum graviditatis mensem, motum foetus in utero persequitur, qui deinde sequentibus diebus, & mensibus perseveravit: quod tamen ipsi, aliisque mulieribus mirum videbatur, cum ante tertium mensem foetus in utero moveri non consueverit. Post septimum mensem, lac in mammis apparuit, sed pravo colore, ad viridem vergente, infectum. Partus ad finem usque decimi mensis protractus est. Quo tempore mulier, doloribus parturitionis afflicta, obsetricem vocavit, & in iis doloribus per triduum integrum perseveravit. In eo autem prædicti dolores à vulgaribus parturientium doloribus erant dissimiles, quod agra se in ventre pungi ac lancinari sentiebat, & uterum sibi laniari dicebat. Tanta autem erat doloris illius pungitivi atrocitas, ut magnis ejulatibus vociferari cogeretur. Tandem post plures enixus, animal quoddam, seu monstrum peperit, bufoni non absimile, sed plus quàm viginti pedibus in toto corporis sui ambitu munitum. A mulieris utero in obsetricis sinum exceptum, inde in terram profiliit, & supra pavimentum satis celeriter cursavit, ac tandem infrà lectum se recepit; unde extractum subito enecatam est, & in cella vinaria sepultum, ut mulieris opprobrium celaretur. In pedum extremitatibus ungui-



unguiculi erant satis acuti, à quibus sine dubio dolores pungitivi & lancinantes oriebantur, quas mulier parturiens percipiebat, Disruptis enim membranis, quæ tempore gestationis animal continebant, illud exitum quaeritans, uteri membranam anteriorem unguiculis discerpebat, & dolores illos atroces concitabat. Quamvis hujus-

modi monstra varias formas & figuras obtineant, quia casu, & fortuito; ac naturæ errore generantur; Attamen ea, quæ frequenter in Apulia generantur, & fratres Lombardorum nominantur, ad jam descriptam figuram frequentius accedunt, ut ex Authorum, qui hac de re scripserunt, relationibus videre est.

LAZARI RIVERII  
OBSERVATIONUM MEDICARUM  
ET CURATIONUM INSIGNIUM  
CENTURIA TERTIA.

OBSERVATIO PRIMÆ.

*Testis sinistri inflammatio.*

**D**OMINUS B. Mercator Monspelienſis, cum gonorrhœam ex impuro concubitu contraxiſſet, Chirurgum conſultuit, qui venam pedis aperuit, botum ex caſſia exhibuit, & ſequenti die bolû ex terebinthina, aliâque remedia conſequenter, quibus gonorrhœa ſuppreſſa eſt, unde facta meſtaſi materiæ fluentis, teſticuli tumor cum inflammatione obortus eſt, ita, ut intra duos dies ad pugni magnitudinem excreverit. Tandem ad me venit, die octavâ menſis Julii anni 1643. jubeo iterari venæ ſectionem ex pede; emulſiones præſcribo, & cataplaſma ex farina fabarum cocta in oxycrato. Per biduum uſurpata hæc remedia nihil proſuere, tumore & dolore teſticuli perſeſcente, non ſine febre. Peto mihi oſtendi cataplaſma, quod à Chirurgo conſectum fuerat nimis durum, & cum oxycrato valde diluto, ideò inflammationem non ſedabat defectu aceti, & partem caleſciebat nimia ſoliditas. Præſcribo venæ ſectionem ex brachio, ſotum teſticuli cum aqua roſaceâ, & idem cataplaſma iterandum cum æquis partibus aquæ & aceti, atque iterum emulſiones cum decocto refrigerante paratas, quæ omnia apud Pharmacopœum ex arte præparata fuere. Sequenti die melius habuit, febris & inflammatio imminuta, tumore in eodem ſtatu perſeſcente. Purgationem præſcribo ex ſenna, rhab. marna, & ſyrupo roſaceo: bene purgatus eſt, febris omnino ſublata, inflammatio valdè imminuta eſt, ſed teſtis adhuc tumidus permanebat. Iteratur venæ ſectio in brachio, cataplaſma componitur ex farina fabarum cocta in aceto puro; tumor valdè imminuebatur, ſed aceti acrimonia ſcrotum vellicabat, ad cujus ſublationem jubeo, ut acetum cum lithargyro potiùs decoquatur; ſic enim proruſus aceti acrimonia tollitur, ex quo paratum eſt denuò cataplaſma cum farina fabarum. Optime ſucceſſit, & intra quatuor aut quinque dies tumor ita imminutus eſt, ut teſtis affectus vix magnitudine ſanum ſuperaret.

OBSERVATIO II.

*Dysenteria.*

**D**Omnia Luquiſſa. Soror Baronis de la Roquette, correpta eſt dysenteria gravi, decima quarta die menſis Julii anni 1643. æſtu maximè ſaviente. Ad eam vocatus ſum tertia die morbi, præſcribo clyſterem detergentem & venæ ſectionem. Quartâ, purgata eſt medicamento ex rhab. ʒ. i. ʒ. ʒ. myrobal. ʒ. ʒ. inſuſ. in aqua plantag. diſſolven- do rhab. pulv. ʒ. i. ſyrupi roſac. ʒ. i. his deſecit humores excrementitios, ſed in reliquis deſectionibus, quæ erant frequentes, mucoſum quid, ſanguine perſuſum. Veſperi exhibeo laudani grana duo, quibus tormina parùm remiſerunt, & deſectiones paulò rarioreſ fuerunt, tum per brevia

intervalla aliquantulum dormivit, cum prægreſſis noctibus pervigil omnino fuiſſet. Quinta, tormina eadem, deſectio frequens, eaque ſanguinea, clyſteres ex lacte & vitellis ovorum frequenter injiciebantur. Veſperi ſumpſit iterum laudanum ad g. ii. cum conſerva roſarum, & illico dolores ſedati ſunt, ac ſemel tantum in hora deſiciebat, dormivit per intervalla. Sextâ die, manè, deſectiones iterum frequentiores cum doloribus intenſis: iterum ſecatur vena; & poſt tres horas ſumpſit decoctum inteſtinorum vervecis, cum pulveris granorum actes ʒ. i. dolores omnino ſublati ſunt, & deſectionum intervalla multò longiora reddita, ſed ſtatim à venæ ſectione totus venter inungebatur oxyrhodino ex oleo roſ. aceto & aqua roſ. parato, quod ſingulis horis admovebatur, ad ſedandam inteſtinorum inflammationem, quæ ex febre dignoſcebat- tur, & ex eo, quòd levis ventris contactus dolorem inferret, & hoc remedio multum levabatur. Veſperi injectus fuit clyſter ex lacte cum ʒ. iii. ſucci plantaginis, ad eandem inflammationem inteſtinorum demulcendam; nam mihi maximi momenti viſum eſt, in tempeſtate calidiſſima & æſtuoſiſſima, ad inflammationem illarum partium præcipuam curationem dirigere, quia ex ea præcipuum ſolet impendere periculum: ut plurimum enim, qui ex dyſenteria intereunt: præcipuam moris cauſam, inteſtinorum gangranam agnoſcunt, quæ ex aſſidua pravorum humorum illuvie, in partes inflammatas & ulceratas confluen- te, facile inducitur. Noctu etiam exhibitus fuit julepus ex aqua plantaginis, cum ʒ. i. pulv. granorum actes compoſitus. Totâ nocte non dormivit, & frequenter admodum deſecit, ſed ſine dolore. Septima die deſectionum frequen- tia continuavit, ſed ſine dolore: clyſteres continuati. Octavâ ſumpſit rhab. pulv. ʒ. i. cum juſculo, unde majora deſectionum intervalla. Poſtmodum verò per triduum, ſumpſit manè decoctum myrobalanorum, quo integrè curata eſt, illud autem decoctum ita compoſitum fuit.

ʒ. Cortic. myrobal. chebulor. ʒ. i. citrinor. ʒ. ʒ. paſſu- lar. corinthiac. ʒ. ii. coquantur in aqua ʒ. ii. ad tertie partis conſumpt. colat. diſſolve ſacchari ʒ. i. clarificentur & aromatizentur cinnam. ʒ. ii. capiat in quatuor doſes, mane & ſero.

OBSERVATIO III.

*Lumbrici.*

**D**ominus de Saint André, vir nobilis, ſexagenarius laboravit dyſetia per multos dies poſtmodum febre tertianâ. At tandem cum convaleſcere videretur, pulſus apparuit intermittens, per tres aut quatuor dies, cum animi angore, & viriû proſtratione. Cauſa hujus pulſus inter- mittentis neque à Medico ordinario, neque à me in conſilium vocato internoſci potuit. Sed illa ſe ipſam prodidit, quæ erat lumbricus craſſitie digitum æquans, & longitudine brachii dimidium. Eo excreto pulſus ad priſtinum ſtatu rediit, & æger, qui peregrinus erat, ad ſuos reverſus eſt.



## OBSERVATIO IV.

*Dysenteria.*

**D**ie 2. Augusti 1643. Filius meus Carolus, septennis, correptus fuit dysenteria, à frigore repentino producta, quod illis diebus contigit. Excernebat frequenter pituitosa multa, sanguine permixta, sed sine dolore & febre. Secunda die, eadem. Tertia die febris eum corripuit, dejectiones pauciores, sed frequentiores porraceæ, & cum torminibus: clysteres ex lacte injecti, & sanguis missus ad 3. vi. vesperti, cum fluxus urgeret, exhibeo laudani granum semis, fluxus aliquantulum retardatus est, ut rariores essent dejectiones, & minus dolorificæ. Quartâ exhibeo potionem ex rhab. 3. i. infusa in aqua plantag. cum ejusdem pulv. 3. i. & syrupi ros. 3. i. cum febris admodum remissa esset multam pituitam & bilem excrevit per plures vices, cum levamine, sed nocte insequente gravissimis torminibus vexabatur, iisque ferè assiduis, cum perpetuâ & inani desidendi cupiditate. Exhibeo circa mediam noctem laudani granum unum, quo dolores illi sedati sunt, & fluxus imminutus, ut non nisi semel in hora deiceret.

Pro potu sumpsit perpetuò decoctum rasuræ eboris, cum conserva rosarum agitata, cui interdum miscebam salis prunellæ 3. i. Hæc erant juleporum loco, quos pertinaciter renuebat. Quintâ die dejectionem intervalla rariores, ita ut aliquando per duas aut tres horas non deiceret, & humores pituitosi ac biliosi excernebantur, sine sanguine & febre. Sextâ & septimâ, eadem. Octavâ sumpsit rhab. 3. i. cum jusculo; multa deiecit, per dilucida intervalla. Nonâ, rariores dejectiones & crassiores, appetentiâ cibi premebatur, & sequentibus diebus sine aliis remediis, Deo sit laus & gloria, ad integram sanitatem perductus.

## OBSERVATIO V.

*Purgatio in Canicula.*

**A**nno 1643. ardente Sirio, circa initium Augusti, tres pueruli, duorum aut trium annorum, à Medicis, quorum curæ commissi fuerant, purgati blandis medicamentis, eadem die convulsi perierunt. Horum duo laborabant catarrho in pectus delabente, tertius verò dysenteria. Alij etiam pueruli ex catarrho in convulsiones inciderunt, eodem tempore, & eadem die è vivis sublati sunt. Fiunt autem hujusmodi convulsiones Epilepticae, colliquatis humoribus ab aere calidiori. Hinc patet, summa cautione utendum esse in ægrorum purgatione, diebus canicularibus, juxta præceptum Hippocratis.

## OBSERVATIO VI.

*Alvus adstricta.*

**Q**uidam Religiosus Ordinis sancti Dominici, temperamento melancholicus, alvum habebat valdè adstrictam, ita interdum per sex aut septem dies non deiceret. Cui incommodo inmedebatur sumendo duabus horis ante coenam pruna cocta cum eorum decocto, quibus addebat vini valdè lymphati cyathum semis, cujus mediam partem sumebat ante pruna, alteram verò medietatem iisdem assumptis; & sic alvus commodè laxabatur, ac multò efficacius, quàm ex folis prunis fieri consuevit. Idem præstabat interdum sumendo butyrum recens ad nucis majusculæ magnitudinem, & desuper hauriendo vinum lymphatum.

## OBSERVATIO VII.

*Hæmorrhoidum dolor.*

**I**dem Religiosus quintâ die Augusti 1643. correptus est dolore hæmorrhoidum acerbissimo, cum tumore insigni atque inflammatione. Vocatus ad eum, venæsectionem præscribo ex brachio sinistro, præmissis clysteribus,

postea fotum anodynum cum cataplasmate de mica panis quod ferre non poterat propter exquisitissimum partis sensum. Secundâ die iteratur phlebotomia ex brachio dextro, sumpsit julepos emollientes, & aliquantulum laxantes, ut alvus liquida fervaretur, siquidem sæces induratae dolorem admodum exacerbare solent. Julepi autem erant hujusmodi.

℥. Fol. lactucæ, buglossi, & summitat. malvæ ana M. i. liquirit. rasæ & passular. mundat. ana. 3. ss. flor. buglossi, borrag. & violar. ana P. i. coquantur ad 3. vii. in colatura infunde cassiæ, recenter extractæ 3. i. colentur iterum & clarificentur addendo syrupi violacei 3. i. capiat bis in die.

Parti verò sequens unguentum admotum est.

℥. Olei ros. & violac. ana 3. i. unguenti popul. 3. ss. fiat linimentum.

Cum autem tumor & dolor perseverarent, admotæ sunt duæ hirudines hæmorrhoidibus, extractisque sanguis ad 3. iv. & tensio atque inflammatio aliquantulum remissa est. Postea verò suffumigium sequens præscriptum est.

℥. Sempervivi major M. i. vini albi ʒ. ii. bulliant, & hujus decocti fumum recipiat in cathedra perforatâ. Deinde sequens unguentum parti admoveatur.

℥. Unguenti ros. 3. i. mercurii crud. 3. ii. misce, fiat unguentum.

Quamvis autem mercurius eximiam vim habeat emolliendi, & tumorem discutiendi, durities tamen in parte permanebat. Ideò, ad emolliendum ac discutiendum tumorem, duo remedia præscripta sunt. Primum fuit suffumigium aceti in quo silices igniti exstinguebantur, quo scirrhosos tumores emolliri Galenus docuit; Alterum fuit sequens linimentum, post suffitum, admovendum.

℥. Ol. amygdal. amar. 3. ii. bdellij & styracis liquidæ an. 3. ii. fiat linimentum.

His dolor & tumor singulis diebus multum imminuebatur. Cui rei etiam multum contulit decoctum millefolii, quod per biduum sumpsit pro potu ordinario, cum paucio vino.

Quia verò alvus continuò adstricta erat; ad eam laxandam & simul causam antecedentem per epicrasim auferendam, pilulæ sequentes præscriptæ sunt.

℥. Massæ pilul. de bdellio 3. ii. sennæ mundat. rhab. electi, & agarici recenter trochiscati an. 3. i. cum syrupo ros. solut. fiat massa pilular. de qua capiat 3. i. singulis diebus manè, donec massa assumpta fuerit. Et hisce per aliquot dies continuatis omninò convaluit. Suffitus ex aceto ad tumorem discutiendum mitè profuit.

## OBSERVATIO VIII.

*Asthma & Hydrops.*

**V**ir pauperculus & senex, asthmate à multis annis laborans, hydropicus factus est. Cumque non posset multis remediis tractari; clyster ei præscribitur ex fursis M. i. & colocynthid. 3. i. coctis in vino albo, quo multa serosa & pituitosa excrevit. Idem remedium tertio quoque die iteravit, & semel in septimana electuar. diacarth. 3. ss. sumpsit cum jusculo, & intra mensem hydrops sublatus est. Asthma verò cum curari non posset ob vetustatem, & æger tantum aliquod remedium peteret, quo in paroxysmo uteretur, eoque ab imminente suffocatione liberaretur; aut aliquod gravissimæ spirandi difficultati solatium afferret, sequens ei præscriptum est.

℥. Aquæ cinnam. 3. ii. oxymel. scillit. 3. i. misce, utatur ex cochleari in paroxysmo.

Hoc remedio multam pituitam crassam & viscidam expectorabat, & brevi à paroxysmo liberabatur, qui suffocationem integram minabatur.

## OBSERVATIO IX.

*Dysenteria.*

**A**dolescens 20. annos natus, circa finem Augusti 1643. laboravit dysenteria, per duodecim dies quam nullo remedio, oppugnare conatus est, donec ad xenodo-



xenodochium deductus sumpsit ex præscripto Medici xenodochij salis vitrioli 3. i. in aqua dissolutam, multa evomuit biliosa & pituitosa, sicque facta est revulsio humoris ad intestina defluentis, & hoc solo remedio curatus est.

## OBSERVATIO X.

*Tertiana duplex.*

**Q**uidam adolescens, Jacobus Durand. nominatus, ætatis 17. annorum, mense Septembri anni 1643. laborabat duplici tertiana, ejusque octo accessiones passus erat, antequam nullo remedio uteretur. Secta fuit vena, injecto prius clystere; postridie verò sumpsit guttæ gummi cum spiritu vini & sulphuris præparati grana decem, non purgatus fuit; sed tantum levissima quadam nausea; eaque inani affectus est: Accessio ea die anticipavit, brevior tamen fuit, & nullam aliam deinceps passus est, atque à morbo immunis fuit.

## OBSERVATIO XI.

*Alia Tertiana duplex.*

**P**etrus Alegre 10. annos natus, patiebatur duplicem tertianam, à sex septimanis, in quarum decursu aliquoties vena secta fuerat, & purgantia medicamenta exhibita. Tandem sumpsit bolum ex mercurii præcipitati rubri, sine corrosivis parati, granis decem, scammonii pari quantitate, & conserva rosarum compositum. Laborabat alvi fluxu satis moderato, ab octo vel decem diebus, ante assumptionem medicamenti, quod tamen Medico curanti non retulerat. Attamen operatio medicamenti ita successit, ut ab eo æger non purgatus fuerit, & alvi fluxus cohibitus sit, febrilesque accessiones desierint.

Eodem tempore alius, eadem febre laborans, idem medicamentum sumpsit, & ab eo decies purgatus, nausæque interdum affectus est, & ab accessionibus liber evasit.

## OBSERVATIO XII.

*Hæmorrh.*

**V**ir militaris, nomine Beaulaguet Anianensis, triginta annos natus, temperamento sanguineo & bilioso præditus, ab octo mensibus incidit in sanguinis excretionem per os, quem vomitu rejecit prima vice ad libras octo, à quo affectu frequenti phlebotomia liberatus est. Idem tamen vomitus sanguinis post aliquod tempus semel atque iterum recurrit; sed minori copia, & jam per intervalla sputa cruenta, sincerum sanguinem per sputum rejicit. Huic sequentia præscripta fuere remedia, principio Augusti anno 1643.

Injecto clystere laxante aperiatur vena basilica cubiti dextri, mittantur sanguinis 3. vi. vel vii.

Postridie venæ sectionis brachii, aperiatur vena malleoli sinistri, mittantur sanguinis uncie totidem.

℞. Fol. plantag. m. i. tamarindor. 3. β. coquantur ad 3. vi. in colatura infunde rhab. electi 3. i. myrobalanor. citrin. 3. β. santali citr. 3. β. in expressione dissolve mannæ & syrupi rosac. an. 3. i. rhab. pulv. 3. i. fiat potio, quæ detur postridie ultimæ sectionis, cum regimine.

Postridie purgationis applicentur duo caustica posteriori parti cervicis, inter tertiam & quartam vertebam.

℞. Radic. bistortæ, tormentillæ, & symphyti majoris an. 3. i. fol. plantag. pimpinellæ, pilosellæ & vincæ pervincæ an. m. i. santali rubr. 3. ii. coquantur ad 1/2 i. β. in colat. dissolve syrup. de ros. siccis 3. iv. fiat julep. quatuor dosibus matutinis, addendo unicuique dosi salis prunellæ 3. i.

Finitis julepis, reiteretur potio purgans prædicta, addendo pulv. jalapæ 3. i. & totidem rhab. infundendo.

℞. Radic. consolidæ major. 3. i. fol. plantag. pimpinellæ bugulæ, prunellæ & pilosellæ an. m. β. coquantur cum jusculo colli vervecini, & colaturam capiat, manè tribus

horis ante prandium, continuando per xii. dies.

Post quartum quodlibet jusculum capiat potionem purgantem prædictam.

Finitis jusculis utatur opiata sequenti.

℞. Conservæ rosar. & radic. symphyti ana 3. i. trochisc. de carabe & de terra sigillata ana 3. β. corallii præparati, margaritar. & lapid. hæmatit. ana 3. i. gummi arabici & tragacanth. ana 3. i. cum syrupo de ros. siccis, fiat opiata; de qua capiat magnitudinem avellanæ, duabus horis ante pastum, superbibendo parum aquæ potus ordinarij, quæ erit ptisana, confecta ex decocto hordei & liquiritiæ, vel aqua ferrata, cui pimpinella vel pilosella infundatur.

In principio autumnus utatur per xv. dies lacte caprillo, vel ovillo leviter chalybeato.

Quam primum agressus est homo remediorum usum, sanguinis sputum cessavit, neque unquam amplius in toto eorum decursu comparuit, neque deinceps.

## OBSERVATIO XIII.

*Ex tumore in genu aperto, loco puris, ventus egreditur.*

**M**ulier 30. annos nata, ab octo mensibus tumorem patiebatur, partem femoris inferiorem occupantem; & ipsum genu. Nullus rubor aderat, sed dolor eam infestabat, ut claudicare cogeretur. Multis remediis resolventibus adhibitis, tumor in eodem statu permanebat. Tandem in duobus locis, parte scilicet interna & externa, elevatio satis insignis apparuit, eaque circumscripta, cum mollitie & fluctuatione; ita ut purulentam materiam adesse omnes existimarent. Admotum est causticum potentiale parti magis tumentis, quæ erat exterior, postmodum scalpello incisa eschara, & aperto tumore flatus quidem emanavit, & nihil aliud. Simile exemplum habetur apud Zacut. Lusit. l. 2. prax. admir. obser. 163. ubi ex Gal. & Avic. docet hujusmodi tumores in genu sæpe à Medicis aperiri, pus intus latere existimantibus; & nihil aliud tamen, quam flatuosum spiritum egredi.

## OBSERVATIO XIV.

*Punctura apum.*

**M**ercator Monspeliensis, nomine Claparede, quinqua-genarius, cum summo mane ex urbe egressus esset, peregrinè discessurus, & mille passuum iter ab urbe perfecisset, examen apum in aere volitans eum subito invasit, & totam faciem ac cervicem infinitis aculeis compunxit. Unde gravissimi dolores statim exorti sunt, qui eum domum repetere confestim coegerunt. Ad illum statim vocatus, hominem invenio maxima doloris impatientia oppressum, ut vix in lecto se continere posset, facies intumescebat, & rubore undique infecta erat. Jubeo statim partes compunctas illiniri theriaca, quæ cum doloris atrocitatem non compesceret, solum præscribo ex eadem theriaca, in aqua vitæ dissoluta, qua dolores aliquantulum mitigati sunt, & tumor faciei imminutus. Postmodum locis magis dolentibus admotæ fuerunt cepæ contusæ, in modum cataplasmatum. Lac ficulneum etiam quibusdam particulis admotum, ac deinde inunctiones factæ ex oleo scorpionum Matthioli. Doloris acerbitas remedia sæpe mutare cogebat, quæ per duas horas continuata, & exhibita potione cardiaca & alexipharmaca, dolores in omnibus ferè partibus cessarunt. Adhuc tamen infestabat dolor acutissimus in auris sinistræ cartilagine, qui prædictis remediis sedari non potuerat. Animo revolvens non solum apes parti admotas venenum attrahere, & dolorem sedare; sed etiam alia muscarum genera, existimavi cantharides duplici nomine conferre posse: tum quod inter muscarum species numerentur; tum etiam quod attrahendi vi potentissima præditæ sint. Et cum emplastrum velicatorium quod in officinis habetur, magnam cantharidum copiam in sua compositione recipiat; ex eis paratum emplastrum auri admoveo, quod intra horæ quadran-



quadrantem, dolorem omninò submovit, vesicis non excitatis, propter moram exiguam.

## OBSERVATIO XV.

*Catarrhus cum raucedine.*

**C**irca finem mensis Octobris anni 1643. cum primum Austri flare inciperent; catarrho affectus sum, in pectus delabente; summam vocis raucedinem, ac pene aphonium efficiente; cui statim medelam faciens, purgationem instituo ex ptisana laxante, quam fumo bis quotidie per biduum. Hoc remedio cessavit raucedo, & interdum à catarrho immunis videbar; sed noctu fluxio ingravescerebat circa mediam noctem, tussimque continuam efficiebat, neque è lecto egredi cogebat. Huic mederi cupiens sanguinem detraxi ad  $\mathfrak{z}$ . x. sequenti tamen nocte eadem tussis rediit, quæ non aliâ viâ quam surrectione è lecto sedari poterat. Postridie venæ sectionis, liberatus à catarrho videbar, sed nocte mediâ iterum tussis rediit; ad quam potentius cohibendam, fumo eadem hora laudani grana tria, & lectum repetens; post mediam horam, noctis reliquum, sine tussi & fluxione, cum somno suavissimo transegi, ac noctibus insequentibus nec tussis, nec catarrhus amplius comparuit. Urgente affectu à vino abstinebam, utens pro potu ptisana, ex coriandro & liquiritia confecta.

## OBSERVATIO XVI.

*Febris tertiana duplex cum hydropse.*

**A**ntonius Sany Monspeliensis, annos circiter 40. natus, homo humilis fortis, & pauperculus mense Septembri anni 1643. correptus est febre tertianâ duplici, eaque vehementissimâ, quam per mensem integrum sustinuit sine remediis, & pravis vescens eduliis, undè primum lien intumuit, & scirrhosam duritiem contraxit, ac tandem hydrops consequutus est. Dum esset in eo statu Medicum xenodochii vocavit, qui primum potionem purgantem præscripsit, postea venæ sectionem, deinde apozema pro tribus dosibus refrigerans, aperiens, & purgans, simulque solum emollientem & aperientem regioni lienis per biduum, & iteratam venæ sectionem post usum apozematum. Cum hæc nihil profuissent, exhibuit meo consilio bolum ex mercurii vitæ correcti, & per inferiora tantum purgantis g. xii. cum conserva rosarum: bis deiecit, sine nausea & vomitu & postera die paroxysmus mitior ac brevior fuit, qui antea vehementissimus esse consueverat. Duobus interjectis diebus, iterum exhibitum est idem medicamentum, quo per alvum rejecit atra, porracea, & foetida quamplurima, ac bis tantum purgatus est, & paroxysmus adhuc magis imminutus. Duobus iterum interjectis diebus, tertia medicamenti dosi exhibita est, & nulla evacuatio subsequuta, sed paroxysmi non amplius redierunt, ab eoque tempore æger à febre illa tertiana prorsus liberatus est. Manebat tamen hydrops cum tumore lienis, & dolore intenso ejusdem partis; ad quorum effectuum curationem exhibitus fuit bolus ex calomelano Turqueti g. xx. & diacrydii g. x. cum conserva rosarum, idque remedium per sex dies continuo usurpatum fuit, ab eoque movebatur alvus bis aut ter singulis diebus, sine molestia. Et post quartam exhibitionem, ventris tumor resolutus apparuit, durities & tensio lienis discussa, ut æger omnino curatus videretur. Ad majorem tamen cautelam, per biduum adhuc continuatum fuit remedium, ac post modum relictus fuit æger, alimentis tantummodò restituendus, cum nullus affectus præter naturam in eo appareret. Tam subita verò resolutio tumoris abdominis, tensionis & doloris lienis, conjecturam facit flatuum copiam in ægri abdomine contentam fuisse, quæ brevi discussa fuerit, reſeratis viis & meatibus partium naturalium.

## OBSERVATIO XVII.

*Hydrops in Puero.*

**F**ilius D. Chaugerii, in Computorum Curia Procuratoris, sex annos natus, principio æstatis, anni 1643. affligi cœpit dolore satis molesto in regione lienis, qui ad umbilicum sese exporrigebat. Hunc sequutus est tumor abdominis; sensum increſcens, cum macie totius corporis. Quæ tamen cum non valdè urgerent; neglecta fuit curatio à parentibus, usque ad finem mensis Octobris; quo tempore me consulunt. Præscribo primum potionem purgantem, postmodum juscula aperientia per duodecim dies, addendo tertio cuique juscule fennæ  $\mathfrak{z}$ . ii. & syrupi cichor. compos.  $\mathfrak{z}$ . i. Eodem tempore illinebatur totus venter unguento deobstruente, saniebat pro potu ordinario bochetum rhabbari, cum aqua infusionis chalybis paratum. Hæc diligenter usurpata nihil contulerunt. Ideò ad potentiora confugiens, præscribo opiatam aperientem & roborantem, singulis diebus usurpandum, tum purgationem ex jalapæ & scammonii ana granis decem, calomelanos Turqueti g. xii. quæ in formam boli reducebantur cum conserva rosarum. In prima exhibitione fuerunt tantum grana sex scammonii & jalapæ; sed cum medicamentum duas tantum sedes movisset grana decem utriusque in secundâ dosi usurpata sunt, à quibus æger quater deiecit sine molestia, & postera die manè semel alvum disposuit, & in dejectionibus inventa est vesicula hydatides, nucis juglandis magnitudinem æquans, cui adharebat satis magna copia pituitæ crassæ & viscidæ. Tertio quoque die purgationes istæ usurpatæ sunt, & quinquies iteratæ, unde ventris tumor valdè imminutus est, ægerque multò alacrior factus, sed cum glacialis æris frigiditas urgeret purgationes istæ ad aliquod tempus intermissæ sunt. Post duos menses umbilicus sponte apertus est; & magna puris copia excreta, unde æger interiit. Dolores in principio morbi apparentes abscessum indicare potuissent, si à Medico attente animadversis fuissent. Sed cum tunc temporis vocatus non esset, & mater doloris illius in primâ morbi relatione mentionem non fecisset, ac tumor universum abdomen occuparet; vulgaris hydropsis conjectura facta est.

## OBSERVATIO XVIII.

*Ulcus Cancrosum.*

**M**ater Petri Renaldi, Chyrurgi Monspeliensis, sexagenaria, ulcus patiebatur in tibiâ sinistra, magnitudinis volæ manus, lividum & cacoethæa, carnem habens præduram, & sensu prorsus orbatam, ita ut sine dolore secaretur, quod ab humore atrabilario partis substantiam adurente procedebat. Erat autem mense Octobri anni 1643. vigente frigore, ita ut semicupia, quæ alioqui viscerum intemperiei corrigendæ admodum necessaria fuissent, usurpari non potuerint. Ideò jussi tantum, ut institutâ victus ratione refrigerante & humectante; uteretur per multos dies jusculis refrigerantibus & humectantibus, & semel in septimanâ purgaretur ptisanâ laxante. Parti verò admovit mercurium præcipitatum rubrum, ad carnem illam emortuam absumendam, & factâ escharâ satis profundâ, admotum est ulceri emplastrum sipticum Crollii, cujus beneficio intra unum mensem ulcus carne repletum, & ad cicatricem perductum est.

## OBSERVATIO XIX.

*Vulnus contusum.*

**S**acerdos septuagenarius, constanti virium robore præditus, vulnus contusum accepit in superiore humeri parte, à fuste inflatum, unde dolor acerbus eum cruciabat, & pars livida admodum apparebat. Illi statim secta fuit vena, & admotum emplastrum de cumino postridie exhibitum blandum catharticum. Perseverabat dolor, quade



de causa oleo ceræ pars affecta inuncta est calidè frequenter, desuper admoto prædicto emplastro, sicque intra 24. horas dolor omnino sublatus est, & pristinus color parti restitutus.

## OBSERVATIO XX.

*Febris tertiana simplex.*

**J**uvenis 25. annos natus tertianâ simplici laborans, circa finem mensis Sept. anni 1643. sequentibus remediis curatus est. Primum catharticum medicamentum exhibitum est. Secunda die celebrata phlebotomia. Tertia die exhibitus mercurius præcipitatus ruber, sine corrosivis paratus, cum scammonio, ad grana decem utriusque. Excrevit biliosa multa & porracea, bis per vomitum, & bis per secessum. Perseverante morbo, eadem dosi utriusque exhibita est, eodem modo purgatus est, & febris non amplius rediit.

## OBSERVATIO XXI.

*Asthma.*

**S**enex septuagenarius, à multis annis asthmaticus, ad eam redactus erat angustiam, ut vix spiritum ducere posset, etiam erecta cervice; & hianti ore continuo stertaret, neque ullo modo quiescere posset, quin statim suffocari videretur. Sequentium remediorum usu stertor desinit, facilior respiratio fuit, & æger multum levatus est.

℥. Aquæ cinnam. ʒ. ii. oxymel. scillit. ʒ. i. misce, utatur ex cochleari frequenter.

℥. Radic. enulæ campanæ. saccharo conditæ ʒ. iii. sacchari candi ʒ. ʒ. syrapi de hyssopo ʒ. ii. gummi ammoniaci aqua vitæ dissoluti ʒ. ʒ. misce, fiat looch. de quo capiat cochlear unum, manè & sero, sensim lambendo.

## OBSERVATIO XXII.

*Hysterica Passio.*

**D**ie 19. mensis Decembris, anni 1643. clarissima Matrona uxor Dn. de la Roche in Suprema Computorum, Subsidiarum, & Fisci Regii Curia Monspel. Consiliar. correpta est dolore colico acerbissimo, quo tota lumborum & hypogastrii regio vehementissimè premebatur. Laboraverat autem per duos menses rheumatismo, qui omnes ferè corporis partes feriatim, & vicissim pervaserat, in iisque partibus dolores excitaverat, neque adhuc à dictis doloribus liberata erat. Ad quorum expugnationem sanguis fuerat detractus frequenter, ex venis tum superioribus, tum inferioribus; enemata frequenter injecta; sed purgationes paucae & leves usurpatæ, quia ægra mollis & delicatula eas ferre non poterat. Ad dolorem hunc immanem auferendum, præscribo clysterem, ex decocto emollientium & carminantium confectum, in quo dissolvuntur catholic. dupl. ʒ. i. diaphœnic. ʒ. ʒ. aquæ benedictæ. ʒ. iv. intra dimidiam horam ab assumpto clystere, vomitu rejecit pituitæ crassæ & viscosæ patinam dimidiam, & post alteram dimidiam horam, eandem pituitæ quantitatem vomitu rejecit, & iterum post horam, eandem pituitam evomuit, sed paulò minori copia & bile flava suffusam, Per alvum bis purgata est, intra trium horarum spatium ab injecto clystere, à dolore omnino liberata fuit. Nocte insequenti optimè dormivit, & dolores prægressi, à rheumatismo oriundi, prorsus quieverunt.

## OBSERVATIO XXIII.

*Hydrops.*

**J**acobus Mignot, pistor Monspelienfis annum agens 36. cum mense Augusto anni 1643. febre tertianâ duplici intermittente per aliquod tempus afflictus esset, ex incauta victus ratione incidit in febrem continuam, quæ ad 20. dies extensa, in tertianam duplicem iterum commigravit, Lazar. Riverii Opera.

eaque per mensem integrum perseveravit, & cum æger nullis aut paucis remediis uteretur, ac multo potu se ingurgitaret, tandem in hydropem Atcitem incidit, quo à duobus mensibus detinebatur, cum ad eum vocatus sum. Tunc temporis tumore insigni abdominis conflabatur, crura etiam, tibiæ, & scrotum valde intumuerant, ac totum corpus ita debilitatum erat, ut in lecto perpetuò decumbere cogeretur, Illius curationem ita aggressus sum.

Prima die, quæ erat 27. mensis Novembris, purgans medicamentum ei exhibitum est, ex senna, agarico, manna, & syrupo ros. quo mediocriter purgatus est. 28. sanguis detractus est è brachio dextro ad ʒ. viii. multo sero refertus. Vigesima nonâ sumpsit bolum ex calomelanos g. 24. jalappæ ʒ. i. cum conserva rosarum, quo quinquies deiecit excrementa crassa & nigricantia. Trigesima die ejusdem mensis sumpsit calomelanos g. 24. jalappæ ʒ. ʒ. septies purgatus, primum crassa & nigra excrementa; postmodum serosi humoris copiam excrevit, crura & tibiæ valdè detumuerunt, scrotum media parte imminutum. Prima die Decembris idem remedium iteratum est, cum eadem operatione. Secundâ Decembris, idem remedium iteratum & eadem fuit operatio, sed paulò minor: crura, tibiæ & scrotum omnino detumuerunt; sed venter in eodem statu permanebat, die tertiâ ejusdem mensis clyster injectus est, ex pulpæ colocynthid. ʒ. i. ʒ. ʒ. surfuris m. i. in vino albo decocti. Non diu retinuit, bis tamen deiecit fatis copiosè, Quarta die ejusdem mensis idem clyster iteratus ex ʒ. i. colocynthid. cui addita est olei communis ʒ. i. ut minus irritaret facultatem expultricem, diutius retinuit, sed bis tantum deiecit. Die 5. Decembris sumpsit pulverem hydropicum, & copiosè purgatus est, nigra multa deiecit qualia etiam per clysteres evacuata fuerant, pulvis autem talis est.

℥. Sennæ mundæ, turbith. gummosi, hermodactylor. Sem. ebuli, jalappæ, mechoac. an. ʒ. i. cremor. tartari ʒ. ii. guttæ gummi. ʒ. ʒ. pulv. diambæ, diarrhod. abbat. & sem. feniculi ana ʒ. i. sacchari candi ʒ. iii. fiat omnium pulvis, cujus ʒ. ii. infundantur per noctem, in vini albi ʒ. iv. capiat manè vinum & pulverem.

Die sextâ ejusdem mensis sumpsit julepum sequentem.

℥. Radic. apii, petrosel. enulæ camp. an. ʒ. i. cortic. median. fraxini & tamaris. an. ʒ. ʒ. radic. azari ʒ. ii. sol. agrim. ceterach. capillor. ven. cichor. chamædr. centaurii min. & absint. utriusque an. m. i. sem. anisi & petros. ana ʒ. iii. flor. genistæ & sambuci ana P. i. coquantur ad quartaria quinque: in colatura dissolve syrapi de limonibus ʒ. iv. fiat julep. pro iv. dosibus matutinis, addendo unicuique dosi salis diurectici ʒ. i. spiritus diurectici ʒ. ʒ. in prima exhibitione julepi nullus effectus sensibilis apparuit; sed in secunda urinæ copiosiores.

Post secundam dosin julepi, scilicet octava die Decembris, pulvis hydropicus iterum exhibitus est, quo multum purgatus est. Die nonâ & decimâ ejusdem mensis, julepus iteratus est, venter mollior & imminutus apparuit. Die undecima, pulvis hydropicus iteratus, multas aquas ejecit, venter magis imminutus: tota fere die levibus deambulationibus in cubiculo exercebatur. Die 12. 13. 14. & 15. julepus aperiens iteratus & urinæ copiosiores apparuere, & venter in dies magis imminuebatur, ita ut jam convalescere omnino videretur, & potentioribus remediis non indigere. Idcò præcepi, ut tantum exactam victus rationem servaret; & pro potu ordinario uteretur vino albo, ex infusione chalybis parato, cum ptisana consueta, qua à principio curationis continuò utebatur; ex decocto agrim. ceterach, capillor. ven. corticibus medianis tamarisci composita. Hoc præscripto per quinque vel sex dies non eum invisi, quibus elapsus retulit mihi, se adhuc sitî importuna detineri qua etiam toto morbi decursu vexatus fuerat. Consulo ad sitim extinguendam, ut in ptisana ordinariæ lb. iii. dissolveret salis petrae optimè purificati ʒ. ʒ. eaque uteretur pro potu ordinario, cum vino chalybeato prædicto. Quibus per quinque vel sex dies continuatis, suis omnino disparuit, & urinæ hujus remediî usu multò copiosiores exercebantur: ita ut, eo continuato, per decem aut duodecim dies, tumoris ventris reliquæ

V u u

liquæ



liquiæ omnino discussæ fuerint, & æger, Deo sit laus & honor, pristinam valetudinem recuperaverit. Consului tamen ut vino chalybeato adhuc per longum tempus uteretur in potu, ejusque 3. ii. sumeret singulis matutinis. Ante duos annos hæc contingere, & ab eo tempore ille pancreaticè vixit, & nunc inculpata fruitur valetudine.

## OBSERVATIO XXIV.

*Sanguinis fluxus immodicus in gravida, cum fœtu mortuo.*

**U**Xor Joannis Chauvet, Curia Computorum, subditorum, & Fisci Regii Licitoris primarii 30. annos nata, principio noni mensis graviditatis suæ, quod erat circa medium mensis Decembris anni 1644. istum accepit in ventre satis levem, sed die sequenti, valida brachiorum contensione lectum adornaverat, unde exortus est exiguus sanguinis fluxus ab utero, qui per duos aut tres dies perseveravit. Postea cohibitus est per totidem dies atque iterum rediit, & cessavit per intervalla usque ad 28. diem ejusdem mensis, in quo tanta copia sanguinis effluxit, ut intra tres aut quatuor horas vires admodum dejectæ fuerint; eoque perseverante, Medicos in auxilium vocare coacta fuerit qui primum phlebotomiam ex brachio præscribunt, & julepos adstringentes, quæ remedia cum nihil conferrent, & fluxus immodicus perseveraret, sine ullo parturitionis indicio, relatum esset ab agrâ, se à multis diebus nullum fœtus motum percepisse, qui etiam manum ventri admovendo, glomeratus & immobilis sentiebatur, eum interiisse censuimus, & uterum, onus inutile excutere conantem, sese assiduò contrahere, sanguinemque per proprias venas expellere, neque posse sufficienter edere motum illum; qui ad partum necessarius est, ideo opus esse omni arte partum provocare, ut immodica illa sanguinis profusio cohibeatur, quæ alioqui ægram ad interitum perductura erat. Ad hunc finem primum clyster injectus est ex catholico. & diaphænic. an. 3. vi. olei lilior. 3. iii. salis 3. i. cum decocto emolliente, quo bellè purgata est, & statim, post illius rejectionem, sanguinis fluxus valde imminutus, quod mirum videri potest; cum hujusmodi clysteres sanguinis profluvium augere potius videantur. Sed illud ea ratione factum existimo, quòd uterus ab excrementis, recto intestino contentis, premebatur. Ab illa oppressione liberatus, sese colligere coepit, & motum illum præposteriorum cohibere, ut ad magis genuinum ac naturalem sese accingeret. Cum autem post ejectum clysterem uterus nihil moliretur; sed aliquis sanguinis effluxus semper continuaretur, & de fœtu mortuo constaret; ad illius exclusionem exhibita est salis vitrioli 3. i. in aquæ buglossi 3. iv. dissoluta. Quod sane duplici nomine conferre videbatur; primò quod vomitum ciendo, uterum etiam irritaturus esset ad exclusionem; quandoquidem in vomitu omnes partes in imo ventre contentæ sese vehementer contrahunt: secundò, quod sal vitrioli maxima adstringendi vi præditum est, qua sanguinis fluxui cohibendo conferre potest. Exhibito medicamento, bis vomuit, satis vehementer, ac multa pituitosa, serosa, ac biliosa excrevit, & paulo post dolores parturitionis apparere coeperunt: qui cum per quatuor, aut quinque horas perseverassent, neque frequentiores aut intensiores evaderent; ad partum ulterius adjuvandum sequens potio exhibita est.

2℥. Dictamni cretici, aristolochiæ utriusque & trochisc. de myrrha an. 3. 6. croci & cinnam. an. g. xii. conf. alkerm. 3. 6. aquæ cinnam. 3. 6. aquæ naphthæ & artemisiæ an. 3. i. 6. fiat potio, quâ assumptâ intra horæ quadrantem, validis conatibus, iisque geminatis ter aut quater, fœtus exclusit, cujus cutis putrescere incipiens, variis in locis lacerata viscebatur. Paulò post etiam secundinas semiputres exclusit, & ab eo tempore lochia valde mediocria effluxere.

## OBSERVATIO XXV.

*Ophthalmia.*

**Q**uidam Rusticus quinquagenarius, ophthalmia inveterata laborans, ex Medici præscripto; victu refri-

gerante & aquæ potu, longo tempore usus fuerat, sine ullo levamine. Tandem ab alio rustico persuasus fuit, ut victum illum refrigerantem defereret, & meri potui indulgeret. Post assumptum primum meri cyathum, se oculis melius habere sensit, & intra paucos dies, eodem potu continuato, ab ophthalmia prorsus liberatus est. Idem aliis duobus contigisse mihi relatum est, quod confirmat aphorismum Hippocratis, dolores oculorum interdum meri potione curari; quando scilicet ophthalmia fit à sanguine crasso & pituitoso, oculorum tunicis impacto, qui meri usu liquatur, attenuatur, atque resolvitur.

## OBSERVATIO XXVI.

*Iliaca Passio.*

**D**ie 29. mensis Januarii 1644. Dn. Guillelmus Patris in Curia Præfidiâli Montpelienâ Consiliarius, laborare coepit colico dolore vehementi, ex intenso frigore concepto, quod tunc temporis vigeat. Vocatus Pharmacopœus, injectit statim clysterem emollientem, carminantem & laxantem, quo fæces multas excrevit. Dolore perseverante iteratus fuit idem clyster, adjectis oleis carminantibus, quem non rejecit. Dolore adhuc sæviente, tertius post modum injectus est, quem etiam retinuit, pluribus immixtis suppositoriis, clysterum portionem excrevit, sine ulla materia fæculenta. Die secunda morbi vocatus ego, præscribo fotum emollientem & anodynum, toti ventri admovendum, & clysterem ex fotus decocto paratum, quem etiam diu retinuit, & exiguum illius portionem rejecit, sine ulla materia, nullus dolor aderat, neque ulla febris, vomitus autem per intervalla infestabat. Hinc conicere licuit, ægrum iliaca affectione laborare, sed à qua causâ fieret, valde dubitatum est in consultationibus pro tanto affectu convocatis. Inflammationem enim testari videbatur febris, quæ tertio die supervenit, sitis & linguæ ariditas. Sed quomodo inflammatio intestinorum adesse posset citra dolorem, concipere non poteram: videbatur potius fieri à facibus induratis, vel contorsione alicujus intestini. Multa remedia usurpata fuere, venæ sectio ter repetita, bis in brachio, & semel in pede; julepi refrigerantes exhibiti, clysteres ex decocto intestinorum vervecis injecti, omni hora; fotus emolliens continuò admotus toti ventri. Usque ad septimam diem vomitus perseveravit; quo juscula & potulenta exercebat, cum materia biliosa, pituitosa, & stercorea. Nihil verò per alvum effluebat. Circa finem septimi diei alvus fluere coepit, fæces multas excrevit per intervalla, cessante prorsus vomitu. Alvi fluxus continuavit per quinque dies, manente tamen febre & virium imbecillitate; liquida in fine deiciebat, qualia ante vomere consueverat. Die decima tertia morbi, gravibus inquietudinibus affectus est, cum virium languore, quibus sensim deficientibus, è medio sublatus est. Aperto cadavere, inventum est intestinum ileon tribus complicationibus convolutum, & quasi compactum in unam massam, circa finem illius, tota autem illa intestini portio complicata, gangræna affecta erat, cum portione mesenterii sibi adjuncta. Intestina reliqua amplissima apparebant, ut brachii magnitudinem æquarent. Præterea intestinum, gangræna affectum, perforatum erat supra complicationem. Existimo, à pondere materiæ contentæ in superioribus intestinis fuisse disruptum, postquam sphacelo affectum est. Per illud foramen tota excrementorum illuvies in abdomen effluerat, & mora sua partem ani interiorem corruerat, in qua etiam foramen aliud apparuit, per quod excrementa effluebant per alvum, & obstructionis intestinorum apertionem mentiebantur. Unde patet, alvi fluxum, ileo supervenientem, posse interdum Medicis imponere.

## OBSERVATIO XXVII.

*Sitis inextinguibilis.*

**D**ie 17. mensis Februarii anni 1644. Vocatus sum Lodovam, pro illustrissimo Episcopo Lodovenâ annos



annos sexaginta quatuor nato, sanguineo temperamento prædito. Is cum per aliquot dies arthriticis doloribus confectus esset, subito dolores valde imminuti sunt, eodemque tempore febris eum corripuit, cum siti inextinguibili, ita ut, postquam duos cyathos aquæ bibisset, sitis nullo modo imminuta appareret. Existimaui hos affectus provenire ex retentione humorum, qui ad articulos antea ferebantur; illi enim intus coerciti febrem ac sitim efficiebant; unde maximum impendebat vitæ periculum, Arthritici enim plerumque interire solent in senectute, quando facultas expultrix debilitata, non potest sufficienter humores superfluos deponere ad articulos, sed in visceribus retenti, gravia damna inferunt, & plerumque lethalia. Ad horum affectuum curationem præscripsi clysterem laxantem & refrigerantem, bis in die iterandum; tum etiam phlebotomiam, bis in die, per biduum, & in singulis haustibus potus ordinarii, qui erat ex decocto hordei & graminis, dissolvebam salis prunellæ 3. i. spiritus vitrioli guttas xii. Hisce remediis intra biduum sitis illa ingens extincta est, & febris admodum remissa. Ac paucis postea diebus blandis purgationibus, cum jusculis refrigerantibus, per intervalla usurpatis, integrè restitutus est.

## OBSERVATIO XXVIII.

*Catarrhus in pulmone defluens.*

Sub fine mensis Februarii anni 1644. afflictus sum catarrho gravissimo, in pulmonem decumbente, unde tussis vehemens, diu noctuque perseverans, cum difficultate spirandi, ita ut in lecto non possem decumbere. Adeo præterea febris exigua, quæ peripneumoniam minabatur. Adversus istum affectum pugnavi quatuor venæ sectionibus, & totidem purgationibus intra quindecim dies usurpatis. His accedebant cucurbitulæ, vesicatorium, incassantia bechica permulta. Licet bis aut ter in anno hujusmodi catarrhis affligi solem; nunquam tamen antea tam diuturnus & contumax fuerat, ita ut valde metuerem, ne in phthisin tandem degeneraret: cum irrita essent omnia remedia, quæ aliàs statim prodesse consueverant. Itaque ad efficacius quoddam remedium confugiendum esse ratus, quo fluxionis radices evellerentur sumpsit calomelanos gr. xx. cum jalappæ gr. x. quo remedio per alvum excreta sunt pituitosa ac biliosa multa, qualia in aliis purgationibus non apparuerunt: per os autem multam pituitam excrevi & scretu, quæ evacuatione, per biduum perseverante cessavit, postea catarrhus, & tussis omnino disparuit, sicque à gravi illo morbo Dei beneficio liberatus sum.

## OBSERVATIO XXIX.

*Contusiones.*

Quidam adolescens ex alto ceciderat & omnia membra admodum contusa fuerant, ut brevi moriturus videretur; Pater ipsius accepit favos cum melle, & coxit in vino ad consistentiam unguenti, quod extendit super corium vervecis recenter mactati, eoque ægrum involvit. Reiteratâ per triduum operatione, æger omnino curatus est.

## OBSERVATIO XXX.

*Febris lenta, cum doloribus lumborum & crurum.*

Filius Jacobi de Ladevese, civis Monspelienensis, septem annos natus: ab aliquot mensibus febre lenta detinebatur, qua corpus valde emaciatus fuerat, eamque comitabantur dolores, lumborum regionem & crura affligentes. Multa remedia in usum revocaverat, sed frustra. Vocatus ad eum die 16. mensis Aprilis anni 1644. præscripsi bolum ex calomelanos g. x. diagryd. g. v. cum conserva rosarum, quem sumpsit die vigesima, bis purgatus est abundè, & inde melius habuit. Die vigesimâ prima ejusdem mensis assumpsit calomelanos g. xii. diagryd. g. vi. bis etiam blandè purgatus est, & multò melius habuit.

*Lazari Riverii Opera.*

Die vigesima secundâ, eandem dosin sumpsit cum eadem operatione, & integrè sanitati restitutus est.

## OBSERVATIO XXXI.

*Tussis & difficultas spirandi, cum doloribus humerorum & brachiorum.*

Uxor Petri Florens agricolæ. Vivatessè nominata, ab octo mensibus laborabat humorum & brachiorum doloribus, cum pectoris angustia, tussi, & difficultate spirandi, multam extulsiendo materiæ pituitosæ aquosæ copiam excernebat. Pluribus potionibus & apozematis, aliisque remediis usa fuerat, ab alio Medico præscriptis malo in eodem statu perseverante. Tandem meam opem implorat die decima octavâ mensis Aprilis anni 1644. eique exhibeo bolum ex calomelanos g. xxi. diagryd. g. x. cum conserva rosarum. Horis duabus ab assumptione remediis, bis copiosè sudavit, postea per tres vices alvum copiosissimè deposuit; & postera die dixit se perfectè curatum esse. Tamen triduo post jubeo ut idem remedium repeteret, à quo quater purgata est, & ab eo tempore à prædictis affectibus omnino liberata est.

## OBSERVATIO XXXII.

*Febris chronica intermittens, sine typo, cum affectione hypochondriacâ.*

Die 10. mensis Junii 1644. dum essem Gratianopoli, Nobilis vir Dn. de S. Martino de Vercors, 30. annos natus, ad me venit contumacissimi affectus curationem postulans. Laborabat à triennio paroxysmis febrilibus, bis aut ter in mense invadentibus, sine typo, ita ut nunc post decem, nunc post duodecim, aut quindecim dies accessio invaderet. Incipiebat cum levi horrore, quem ingens calor sequebatur cum atrocibus crurum doloribus. Ad quindecim, viginti, & viginti quatuor horas extendebatur, & nonnisi copiosâ sudoris & urinæ profusione sedabatur. Diebus intermediis omnes corporis functiones ritè exercebat, nisi quod alvum adsistitiam habebat, & excrementa rejiciebat cum magno labore, viscida, & ceram æmulantia. Ortum duxerat hic affectus ex febre continuâ, quam ante triennium in castris Italicis passus erat, neque in fine illius ritè purgatus fuerat. Ita ut morbi reliquæ in mesenterio præsertim latitantes crassitiam adeptæ fuerint, & contumaces obstructions pepererint. A quibus impeditus humorum comineatus affectionem hypochondriacæ similem efficiebat, & in calido ægri temperamento febres hujusmodi concitabat. Quæ quidem febres à serosa illuvie ebulliente & putrescente oriebantur, eaque per sudores & urinas excreta, cessabant. Dolores verò crurum à crassis vaporibus concitabantur, ab hypochondriis ad eas partes translatis. Multis remediis usus fuerat, per illud triennium à peritis Medicis præscriptis. Ego in hunc modum curationem aggredior.

℞. Sennæ mund. 3. ii. aquæ fontis 3. viii. salis tartari 3. i. spiritus sulphuris gutt. xxx. infundantur frigidè per noctem, colaturam capiat mane cum regimine.

Sequenti die aperiatur vena basilica cubiti sinistri, mittantur sanguinis 3. iv.

Post venæ sectionem, reiteretur infusum sennæ per triduum.

Per usum horum remediorum foveatur venter decocto emolliente & aperiente, manè, per horam ante sumptionem infusi, & vesperi, per horam ante cœnam.

Post fotum, illinantur eadem partes unguento emolliente & aperiente.

Deinde utatur pilulis ex chalybe, per quindecim dies.

Eodem tempore statim ab assumptis pilulis capiat infusionem 3. i. sennæ, cum sale tartari, & spiritu sulphuris paratam.

Per usum pilularum continuetur fotus & litus manè & serò.

In medio & fine pilularum utatur balneo tepido, per biduum.



His perfectè curatus visus est, neque enim redibant accessiones febriles, neque alvi excrementa ceream illam consistentiam amplius obtinebant. Ad perfectiorem tamen curationem, ad aquas acidulas eum dimisi, per quindecim dies sumendas. Præscripti per æstatis decursum syrupum magistrale, bis in mense sumendum, & opiatam roborantem, & aperientem, frequenter usurpandam. Autumno verò, ut præmissa purgatione & venæ sectione pilulas ex chalybe repeteret, per duodecim dies, cum fotu & linimento. Deinde pilulas usuales aperientes & purgantes bis aut ter in mense per totam hyemem sumendas, ac denique opiata continuationem, diebus intermediis. Posteriora remedia, nempe syrupum, pilulas, & opiatam, non usurpavit, quia priorum effectu à contumaci morbo liberatus est.

## OBSERVATIO XXXIII.

*Mensium fluxus immodicus, cum principio hydropis.*

**A**mplissimi viri Dn. de Burcin, in Senatu Gratiano-politano Præsidis, uxor clarissima à septem mensibus fluxum menstruum patiebatur serè continuum, à quo in cachexiam & principium hydropis inciderat, cum maxima virium imbecillitate, Vocatus sum ad eam, die 12. mensis Maii anni 1644. dicebat se à remediis magis lædi, quia purgationes mensium fluxum augebant, tum etiam ea omnia, quæ ad obstructions referandas præscribebantur. Ego verò præscripsi purgationem ex decocto plantaginis & myrob. in quo rhab. pulv. 3. β. dissolvebatur. Blande purgata est hoc remedio, per triduum, usurpato, & simul mensium fluxus serè cohibitus, tum sitis, qua perpetuo premebatur, valde imminuta. Ad obstructions autem referandas & universam humorum illuviem educendam, pilulæ sequentes præscriptæ sunt.

℞. Chalybis præparat. cum sulphure 3. i. fennæ mundat. rhab. elect. & agarici recenter trochisc. an. 3. i. pulv. elect. diarrhod. abbat. 3. β. cum oxymel. simpl. fiat massa pilular. de qua capiat 3. i. tribus horis ante pastum, postea deambulando.

Hiscæ pilulis, per quindecim dies continuatis, à fluxu mensium immodico, & à cachexia liberata est. Ad robur autem hepatis conciliandum, conserva absinthii pontici per multos dies usa est. Et per quatuor aut quinque dies ante adventum purgationis menstruæ, ne immodicè proflueret, unde maxima virium dejectio sequebatur, sumebat, manè spicæ nardi grana octo, cum croci martis adstringentis granis quindecim, in pilulas redacta, cum conserva absinthii pontici, sicque fluxus mensium immodicus cohibitus est.

## OBSERVATIO XXXIV.

*Dolor dentium cum tumore supra mandibulam superiorem.*

**D**ie decima quinta Augusti anni 1644. correptus sum dolore dentium, quem secutus est tumor supra mandibulam superiorem sinistram, cum inflammatione, & dolore insigni. Post venæ sectionem, ex eodem latere, parti admoveo. per totam diem, cataplasma de mica panis quod renovabam tertiam quaque hora, & ante applicationem, partem fovebam per dimidiam horam aqua rosacea, in qua sul saturni dissolvebatur. Nocte insequente cum dolor perseveraret, sumo laudani grana tria, inde somnus placidus, cujus vacuitas nocte prægressa adfuerat, dolor sedatus est, ac fluxio cohibita, tumor verò multum imminutus postridie mane apparuit, & in diei decursu majori ex parte discussus est.

## OBSERVATIO XXXV.

*Aphthæ contumacissimæ.*

**Q**uædam mulier laborabat aphthis contumacissimis, quæ neque venæ sectionibus, neque purgationibus

multis, neque julepis refrigerantibus, neque illitu ex spiritu sulphuris curari potuerant. Noctes insomnes trahebat, & vix cibum devorare poterat, quia omnes oris partes hujusmodi ulcusculis scatebant. Sumpsit noctu laudani grana tria, idque remedium continuavit per triduum, & sic fluxio acris, in oris partes defluens, cohibita est, ac consequenter oris ulcera paucis diebus percurata sunt.

## OBSERVATIO XXXVI.

*Febris maligna.*

**D**ie decimaquarta mensis Augusti, ancilla uxoris meæ fibre maligna laborare cœpit, quæ eam ad deliria & convulsiones deduxit. Et quia paupercula erat, & parcebat sumptibus, paucis remediis curata est, in frequentem modum.

Quater secta fuit vena, cucurbitulæ plures admotæ, humidæ & siccæ, pro potu uti batur decocto radicis acetosæ, in quo dissolvebam dis in die salis prunellæ 5. i. spiritus sulphuris guttas xv. in jussulis sumebat frequenter bezoard. min. 3. i. Die undecima morbi exhibui spiritus fuliginis 3. ii. in aqua cardui benedicti, & parum sudavit; die duodecima exhibui ejusdem spiritus 3. iii. cum eadem aqua, copiosè sudavit, eademque die febris remissa est, deliria & motus convulsivi desierunt, & intra paucos dies postmodum convaleuit.

## OBSERVATIO XXXVII.

*Hemicrania.*

**F**ilia nobilis Viri Dn. de Larcare Picenensis, annos nata duodecim, laborabat hemicrania, ab aliquot annis infestante, quæ nullis remediis cesserat, sed corpus emaciatum permanebat, nullum lumen incrementum. Missa est meo consilio ad thermas Balerucanas, & aquis earum usa est in potu, & lotionem capitis, sicque perfectè curata est.

## OBSERVATIO XXXVIII.

*Vulnus in brachio curatu difficile.*

**D**N. de Rochemore annos natus circiter 25. vulnus acceperat in brachio, paulo supra carpum & versus cubitum ascendens. In curatione fluxiones novæ frequenter obortæ sunt, quibus totum brachium & manus intumescabant, illique suppurationes succedebant, quæ aliis in locis tum brachii, tum manus apertæ sunt, licet debita curatio adhiberetur, brachium, & manus tumore œdematoso afficiebantur, & ex ulceribus pus ferofum effluebat. Post multa remedia causam antecedentem & conjunctam respicientia, curatio peracta fuit per splenia, locis tumentibus admotæ, cum bona ligatura, quibus humorum in partem affluxus impediabatur, & sinuosorum ulcerum unio procurabatur. Sicque æger intra quindecim dies curatus est, qui antea per duos menses laboraverat.

## OBSERVATIO XXXIX.

*Pleuritis.*

**I**N principio mensis Septembris anni 1644. Filius Dn. Audifret, civis Monspeliensis quinque annos natus correptus est pleuritide lateris sinistri, cum febre acutissima. Post remedia ordinaria per quinque dies usurpata, & quatuor phlebotomias, jussi ut cucurbitulæ duæ lateri dolenti applicarentur, cum profundis scarificationibus. Contigit autem, ut ex scarificationibus illius cucurbitulæ, quæ dolentem locum propius attingebat, sanies multa effluerit, per totum diem, simulque dolor ac febris desierint. Jussi, ut admovebantur folia betæ supra loca scarificata, & per duos dies saniei fluxus continuatus est, ac denique in fine verum pus è vulneribus emanavit. Atque ita æger omnino curatus est. Credo scarificationes ad locum



cum pleuritidis pervenisse, & materiam morbificam per a vulnera emanasse.

## OBSERVATIO XL.

*Dolor capitis in hemitritæo.*

**I**llustrissimus Princeps, Janethinus Doria, classis Hispanicæ Præfectus, cum in arce Monspelienfi bello captus detineretur, afflictus est principio mensis Septembris febre hemitritæa, quæ inter cætera symptomata, capitis dolorem gravissimum inferebat, eumque continuum, & extra accessionem æque molestum, qui tamen post quatuor phlebotomias, in brachiis celebratas, eodem vigore perseverans, intra horam sublatus est sanguinis missione ex malleolo dextro in fine diei sextæ usurpata. Tam promptus effectus observatione dignus fuit, ut tyrones videant quam bona fiat revulsio à capite per saphenarum apertionem.

## OBSERVATIO XLI.

*Rheumatismus.*

**D**ominus de Barri, filius natus major Domini de Rochemore, in Suprema Computorum Subsidiarum Curia apud Monspelienfem Protopræsidis, principio mensis Augusti, anni 1644. laborare coepit rheumatismo universali, omnes propemodum corporis articulos infestante, cum febre assidua, & summa urinarum cruditate. Contigerat præcipue hic affectus ex natatione intempestiva. Cum enim ad flumen, longe ab urbe distitum, aestu vigente proficisceretur, corpus calefactum in aquam demergebat, unde catarrhus iste universalis prodit. Per sex septimanas frustra usurpata fuisse remedia videbantur, cum nihil proficerent, & dolores in varias partes vagarentur, ac sæpè recurrerent. Præcipua autem remedia fuere venæ sectio decies usurpata, & julepi refrigerantes & incrascentes quibus bis aut ter accesserunt leves purgationes. Tandem malo perseverante, exhibitus est bolus ex conserva rosarum cum calom. gr. xx. extracti jalappæ gr. vi. tertio quoque die multa serosa & porracea deiciebat, quo remedio quater usurpato, dolores omnino sublatis sunt, postmodum tumores oedematosi qui in nonnullis articulationibus, præsertim pedum remanebant, emplastris resolventibus & roborantibus discussi sunt.

## OBSERVATIO XLII.

*Singultus.*

**P**uella tredecim annos nata, ab anno integro laborabat singultu admodum molesto, quater aut quinquies in die infestante, nunc per horæ quadrantem, nunc per dimidiam horam, nunc per horam integram. Per totam hyemem prægressam symptoma hoc eam infestaverat: æstate verò, ab eo ferè immunis fuerat, ut per dilucida admodum intervalla rediret. Adventante Autumno, rediit cum pristina sævitie. Parens illius à me consilium petiit die secunda mensis Octobris, anni 1644. Sequenti die exhiberi jubeo calomelanos gr. xvi. diagryd. gr. viii. quo solo remedio affectus in totum sublatus est eadem die.

## OBSERVATIO XLIII.

*Aneurisma.*

**F**ilius Petri Vesian, mercatoris Monspelienfis, quinque annos natus, febre laborans, mense Julio anni 1644. ex venæ sectione incidit in aneurisma, propter apertam arteriam, quod integrè curatum est, admotis cataplasmatibus adstringentibus ex bolo, terra sigillata, aliisque compositis, aceto & albumine ovi subactis, & tertio quoque die immutatis, quibus fascia arctissima superinducebatur, & triginta mensium spatio, curatio perfecta est.

## OBSERVATIO XLIV.

*Catarrhus in pulmonem decumbens.*

**D**ie decimaquarta mensis Octobris, anni 1644. cum Austri per mensem integrum viguissent, subito tempestas calida & humida in frigidam & siccam, nempe Aquiloniam mutata est, ex qua, licet per biduum immediate præcedens, pituita laxante, & manna purgatus fuisset, fluxio in pulmonem mihi concitata est, tussim, & spirandi difficultatem patiens cum levi stertore. Levis fuit affectus per biduum, ut nihilominus per urbem ambulare non desinerem. Tertio die, ingravescente affectu, sumpsi mannæ ʒ. i. cum resinæ jalappæ gr. iv. quibus parum purgatus sum, ideo sumpsi eadem nocte circa horam undecimam, pituitam laxantem cum manna, & copiosè purgatus sum per noctis decursum. Quartâ die leviter pransus sum, & quinque horis à prandio sumpsi eandem pituitam laxantem, qua mediocriter purgatus sum per noctis decursum. Quinâ die, horâ somni, cum catarrhus perseveraret, licet à modum imminutus, sumpsi laudani gr. iii. cessavit illico catarrhus, & tota nocte placidè dormivi. Cum tamen sexta die mane stertor levis in pectore audiretur, cum levi spirandi difficultate, decrevi jejunio reliquias illas absumere. Ideò manens in lecto tota illa die, sumpsi tantum jusculum unum hora prandii, & hordeatum hora cœnæ. Placidè dormivi tota nocte insequente & catarrhus omninò discussus est. Dolor tamen in mandibula dextra satis levis exortus est, qui fluxu sanguinis ex gingiva, ubi dens corrosus est, protinus sublatus fuit. Fluxit autem sanguis ferè guttatim cum pituita permixtus ad ʒ. iii.

## OBSERVATIO XLV.

*Oculi macula.*

**F**iliæ Dn. de Merviol octo annos natæ, ex diuturna ophthalmia, relicta est macula densissima in oculo, mediam iridis partem occupans. Quæ absumpta fuit aqua rosarum, in qua dissolvebatur sal armoniacum, eâ quantitate, ut linguam leviter feriret, eaque detinebatur per biduum, aut triduum in vase, ex aurichalco confecto, donec cæruleum colorem acquireret.

## OBSERVATIO XLVI.

*Catarrhus cum raucedine.*

**D**ie decima septima mensis Novembris anni 1644. flante Austro, correptus sum catarrho cum raucedine. Secundâ morbi die mansi in lecto, & nihil sumpsi tota die, præter hordeata duo, horis prandii & cœnæ. Tertia sumpsi pituitam laxantem; cum mannæ ʒ. i. Quarta die quievi, & raucedo valdè immixta. Quinta tussis sicca aderat, cujus ratione venam aperui. Sexta tussis perseverabat. Ideo sumpsi calomelanos gr. xx. cum resinæ jalappæ gr. viii. Medicamentum tota die nihil præstitit; sed tantum circa vesperam duas sedes movit perexiguas. Tussis tamen omnino discussa est.

## OBSERVATIO XLVII.

*Difficultas spirandi cum tussi & raucedine.*

**U**Xor D. Dortomanni Patroni celeberrimi laborabat tussi, raucedine, & difficultate spirandi à viginti diebus in quorum decursu ter purgata fuerat, cum infuso sennæ & mannæ ʒ. i. Vocatus ad eam in principio mensis Decembris anni 1644. præscripsi venæ sectionem ad ʒ. ix. sanguis fuit valde corruptus, deinde usa est per septem dies jusculis pectoralibus, in quorum primo & ultimo senna infundebatur, & manna dissolvebatur. Nihilominus tussis & difficultas spirandi, quamvis remissiores, perseverabant, quia illa pulmonem habet debilem, & cerebrum



valdè humidum. Qua ratione proponitur ab adflantibus usus decocti sudorifici; quem me non improbare dixi, sed prius tentandum esse unicum remedium, ad contumaces fluxiones eradicandas efficacissimum. Quare præscribo calomelanos gr. xx. cum resinæ jalappæ g. x. à quo remedio septies purgata est, & à fluxione omninò liberata, ita ut aliis remediis opus non fuerit.

## OBSERVATIO XLVIII.

*Dolor colicus antiquus cum alvi fluxu.*

**H**oneſta virgo Antonia de Paraviſol. 25. annos nata laborabat ab octo menſibus dolore ventris, colico non abſimili, quem comitabatur alvi fluxus, quo pituitofam atque bilioſam materiam, nec non purulentam exercebat. Pauciſſima remedia uſurpaverat, donec ad extrema redacta, & ſe morti proximam exiſtimans, auxilium meum implorat. Præſcribo primum, ad demulcendum dolorem, qui atrox & continuus erat, Laudani gr. iii. cum conſervæ roſar. drach. i. quo dolor ſaltem ad tempus ſedatus eſt, & alvi fluxus imminutus. Deinde ad eum dolorem leniendum, obſtructiones referandas, & tenſionem, quæ in ventre tactui ſubjiciebatur, tum etiam alvi fluxum cohibendum, ſequentia à me præſcripta ſunt.

℞. Rad. altheæ Unci. ii. folior. malvæ, pariet. violar. an. m. ii. ſem. lini & fœnugr. ana Unc. i. flor. chamom. & meliloti ana ꝑ. ii. fiat omnium decoctio, qua foveatur pars dolens, manè & ſerò.

℞. Unguenti de althea Unc. ii. olei chamom. & lilior. ana unc. i. fiat linimentum, quo illinatur eadem pars, poſt fotum.

℞. Rad. gram. aſparag. bruſci ana Unc. ii. ſol. agrim. pimpinellæ, pilofellæ & plantag. ana m. i. tamarindor. Unc. i. tartari crudi Unc. ſ. myrobal. citrin. drach. ii. coquantur ad ꝑ. i. fiat apozema pro tribus doſibus matutinis, addendo unicuique doſi rhab. pulv. drach. ſ. ſyrupi de roſis ſiccis, Unc. i.

His remediis ita imminutus eſt dolor, & alvi fluxus, ut ægra ipſa ſe integræ ſanitati proximam putaret. Sed elapſis quindecim diebus, ſymptomata rediere, cum eadem vehementia. Vocatus iterum, ſequentia præſcribo.

℞. Rhab. pulv. drach. i. conſervæ roſar. drach. iii. fiat bolus, qui detur manè cum regimine.

℞. Terebinthinæ aquæ plantag. lotæ drach. iii. rhab. pulv. drach. ſ. miſce, fiat bolus, qui detur per triduum, poſt uſum prioris.

Hiſce duobus remediis, quanquam levioribus, omnino liberata eſt.

## OBSERVATIO XLIX.

*Febris tertiana diuturna.*

**P**uella, decem annos nata, febre tertiana laborans, tribus menſibus, in Noſocomio, poſt multa remedia fruſtrâ tentata, ſumpſit die octava Januarii anni 1645. febrifugi mei gr. xii. quæ erat dies intermiſſionis. Quinques purgata eſt per alvum, acceſſio venit eadem die præter morem, ſequenti die non apparuit, neque deinceps. De hoc febrifugo plura dicemus in fine hujus centuriæ.

## OBSERVATIO L.

*Febris quartana.*

**M**ulier quadragenaria, in Noſocomio decumbens, laborabat febre quartana à quatuor menſibus. Die decima Januarii anni 1645. ſumpſit febrifugi mei gr. xx. pridie acceſſionis. Sexies purgata eſt per alvum. Sequenti die, loco acceſſionis, paſſa eſt quorſdam labores & inquietudines, ſine rigore aut frigore præcedente, & ſine calore ſenſibili. Die ſequentis acceſſionis eadem inquietudines rediere, ſine acceſſione. Poſtridie purgata eſt medicamento ex ſennæ ꝑ. ſ. diaphœnic. drach. iii. ſyrupi roſ. ꝑ. i. ſepties deiecit, & inde nullam amplius aut acceſſionem, aut inquietudinem paſſa eſt.

## OBSERVATIO LI.

*Febris quartana.*

**U**xor Ludovici Lauterii, ſutoris, annos 23. nata propè portam Latenſem habitans, & duplici quartana laborans, à quinque menſibus, ad me venit die 27. Januarii anni 1645. cui exhibeo die 28. febrifugi mei gr. xx. horis matutinis, cum circa velperam prima acceſſio expectaretur. Purgata eſt ſexies, & ſemel vomuit, circa meridiem, tribus horis ab aſſumpto juſculo, & cum prandere inciperet. Veſperi acceſſio rediit ſine frigore, ſed calor ſolitò longior fuit. Secunda acceſſio poſtridie non rediit, neque ullà alia deinceps.

## OBSERVATIO LII.

*Hydrops.*

**M**endicus quidam, nomine Rafeau, hydropem patiebatur à tribus menſibus ex quo venter in ampliſſimum tumorem increverat, & cum, propter inopiam, Medici auxiliis uti non poſſet, ex ruſticæ mulieris conſilio uſus eſt per menſem integrum decocto radicis bruſci. Purgatus eſt bis aut ter, ſimplici ſennæ infuſo, & hiſ ſolis præſidiis perfectè curatus eſt.

## OBSERVATIO LIII.

*Febris hectica cum ſuſpicionè phthiſeos.*

**F**ilius Domini Paſchalii, quatuor annos natus, per ſex menſes integros febre hecticam patiebatur cum tuſſi & ſputis ſubputridis, unde phthiſicus putabatur, & tandem pro deplorato relictus eſt à Medico ordinario, hecticam eſſe in tercio gradu, palam profitente. Mater in hac deſperatione victum tenuem inſtituit, cum antea ſolidioribus alimentis veſceretur, juſcula enim tantum hauriebat per diei decurſum, veſperi verò hordeatum ſumebat. Bis verò in ſeptimana infuſum drach. ii. ſennæ capiebat, in decocto cichorii & bugloſſæ paratum, cum aniſo, in quod decoctum calens ſenna injiciebatur, & in eo pernoctabat ſine alio calore. Hac ſimplici cura intra menſem reſtitutus eſt.

## OBSERVATIO LIV.

*Febris quartana.*

**D**omini Athanaſii Salinarum Conductoris Socrus, annos nata 52. Febre quartana laborans, ſex menſium ſpatio die quinta menſis Februarii, anni 1645. ſumpſit febrifugi mei gr. xx. Bis purgata eſt per alvum, & ſemel vomuit amara, poſt aſſumptum juſculum. Erat pridie acceſſionis, quæ poſtridiè rediit horâ conſuetâ, eadem formâ & duratione. Die verò ſequenti acceſſionis nihil apparuit, neque deinceps.

## OBSERVATIO LV.

*Febris quartana.*

**L**udovica Bevonſe annos 45. nata, propè ſanum ſanctæ Crucis habitans, & febre quartanâ laborans à quatuor menſibus, ſumpſit die octavâ Februarii anni 1645. Febrifugi mei gr. xx. pridie acceſſionis, à quo primum purgata eſt per vomitum, rejecitque bilem multam, eamque amariffimam, tribus horis ab aſſumpto medicamento, & poſt vomitum ſumpſit juſculum, quod paulò poſt vomitu rejecit, cum bile minus amara. Poſt mediam horam deiecit per alvum copioſos humores, & ſemel tantum per hanc viam purgata eſt. Sequenti die rediit acceſſio prioribus conſimilis, & ab eo tempore nullam amplius acceſſionem paſſa eſt.

OBSER-



## OBSERVATIO LVI.

*Febris quartana.*

**F**ilia Dn. de Boitargues, in Curia Computorum, Subsidiorum, & Fisci Regii Correctoris, quindecim annos nata, à tribus mensibus quartanâ laborans, post multa remedia, frustra usurpata, sumpsit die nona Februarii anni 1645. febrifugi mei gr. xx. pridie accessionis. Sexies purgata est per alvum. Sequenti die accessio rediit, sed tribus horis retardata est; & multò brevior fuit. Secunda accessio non rediit; sed loco illius quasdam passa est inquietudines. Tertia accessio iterum rediit; sed perexigua. Quarta major fuit. Sumpsit iterum remedium pridie quintæ accessionis, quæ rediit paulò minor, & ab eo tempore nulla amplius apparuit.

## OBSERVATIO LVII.

*Febris quartana.*

**M**ulier quadragenaria nomine Jeanne Guillarde, à sex mensibus quartanâ laborans, die decimaquintâ Februarii sumpsit febrifugi mei gr. xx. pridie accessionis. Sexies purgata est per alvum, & nihil per vomitum rejecit. Postridie accessio rediit dimidio brevior, & non amplius deinceps comparuit.

## OBSERVATIO LVIII.

*Febris quartana.*

**M**ulier quinquagenaria, nomine Motana, propè puteum templi habitans, febre quartanâ laborabat à septem mensibus, eaque vehementissimâ. Sumpsit die decima septima Februarii anni 1645. febrifugi mei gr. xxv. Ter purgata est per alvum, & semel vomuit bilem amarissimam; accessiones perseverabant, sed multò remissiores. Post tertiam accessionem ab assumpto medicamento, sumpsit ejusdem febrifugi gr. xxx. & purgata est per alvum duodecies; bis verò per vomitum excrevit bilem porraceam pituitæ mixtam, & ab accessionibus omnino liberata est.

## OBSERVATIO LIX.

*Febris quartana.*

**P**uella tredecim annos nata, nomine Andrea Delona, Filia Jacobi Delon fratrum minorum hortulani; à quatuor mensibus quartanâ laborans, sumpsit die decima septima Februarii, anni 1645. febrifugi gr. xx. per vomitum bis purgata est, & nihil per feces excrevit. Accessiones eadem perseverabant. Post tertiam accessionem, die scilicet vigesima tertiam ejusdem mensis, sumpsit febrifugi gr. xxiv. purgata est quinquies per alvum, & nullo modo per vomitum, sicque morbus omnino sublatus est, nulla accessione deinceps redeunte.

## OBSERVATIO LX.

*Febris quartana.*

**M**aria Delona, prædictæ soror, annos undecim nata, eandem febrem patiebatur ab eodem tempore. Sumpsit die decima septima Februarii anni 1645. febrifugi gr. xvi. ter dejecit per alvum ea die, postridie bis, & à morbo protinus curata est.

## OBSERVATIO LXI.

*Febris quartana.*

**D**ie secunda mensis Martii, anni 1645. Antonius Bayle, quinquagenarius, propè fanum divæ Annæ habitans, quartana laborans à quinque mensibus, sum-

pfit febrifugi mei gr. xx. ter purgatus est per alvum, sine nausea vel vomitu, & sine ulla molestia. Postridie rediit accessio, sed dimidio minor, & ab eo tempore non amplius apparuit.

## OBSERVATIO LXII.

*Febris quartana.*

**C**larissimus vir Dn. de Lespine in suprema Computorum, Subsidiorum & Fisci Curia Consiliarius, à septem mensibus febre quartanâ laborans, post multa remedia frustra tentata, & cachecticum habitum adeptus, unde hydrops metuebatur, quod ille in accessionibus multo potu sese ingurgitaret, & aquæ lb. vi. aut vii. hauriret; sumpsit die octava Martii, anni 1645. febrifugi mei gr. xx. purgatus est per 24. horas, ad minimum duodecies, vomuit verò ter aut quater, quæ omnia sine molestia passus est. Die nonâ ejusdem mensis, accessio, quæ hora meridiana recurrere solebat, rediit tantum horâ septimâ vespertina, sine frigore, & cum calore, minori quidem intensivè, sed majori extensivè. Die decimâ quæ accessionem sequuta est, bene habuit. Die undecimâ mane dolore insigni correptus est colico persimili, sinistrum hypochondrium occupante, cum hæmorrhagia narium, qua sanguinis circiter 3. iv. excrevit. Dolor nunc intensior, nunc remissior, totâ die perseveravit, cum assidua desidendi cupiditate: Per dilucida tamen intervalla pravos quosdam humores excernebat. Circa vespem, molestam mictionem passus est, cum ardoris sensu in fine mictionis. Die duodecimâ bene habuit tota die, & accessio, quæ tunc temporis expectabatur, non rediit. Die decimatertiâ multoties urinas reddidit nigerrimas, atramenti instar, cum sedimento crasso & nigerrimo. Die decimaquartâ, dolor sinistri hypochondrii iterum apparuit, per intervalla rediens, & intensior factus est die decimaquintâ, tumque dolorem esse in liene certò constitit ex tensione illius partis, & inflammatione, quæ antea non apparuerat. Admota fuere fomenta parti affectæ, clysters injecti, unde levis alvi fluxus sequutus est, laxatis viis, & attenuatâ materia, quæ intus retenta dolorem efficiebat. Die decimasexta sumpsit infusionem 3. ii. fennæ cum salis tartari 3. i. ter purgatus est, sequenti verò die, iterato medicamento quinquies dejecit, unde melius habuit. Attamen diebus subsequenter quosdam horrores passus est, illis scilicet, quibus accessiones redire consueverant, donec tertia invasione accessio integra apparuit, sed prioribus levior. Sumpsit iterum fennæ infusum per biduum, quo purgatus est mediocriter, accessio tamen rediit priori similis. Die prima mensis Aprilis, sumpsit iterum febrifugum eadem dosi. Ter purgatus est copiosè per alvum, nullus vomitus concitatus est. Die secunda rediit accessio prioribus similis. Die quinta ejusdem mensis accessio quæ expectabatur, non rediit. Die undecimâ accessio rediit priori intensior, ita ut febris ad priorem statum recurrere videretur. Ideò die decimatertiâ idem remedium iteratum est duplicata dosi, unde copiosè purgatus est per biduum, & ab eo tempore accessio non amplius rediit.

## OBSERVATIO LXIII.

*Pleuritis spuria.*

**D**ie octava mensis Martii, anni 1645. cum tempestas Austrina in Aquiloniam & frigidissimam subito conversa esset, laborare cæpi horis matutinis dolore gravissimo latus sinistrum & sternum occupante, à quo summa respirandi difficultas oriebatur. Quem statim discutere tentavi fomentis calidis, quamvis febris apparere inciperet, quæ tamen erat satis exigua. A fomentis dolor factus est intensior, unde, vocato chirurgus sanguinem misit è brachio ejusdem lateris ad 3. x. qui fervidus admodum apparuit. Duabus horis à venæ sectione, assumpto antehoram jussulo, clyster injectus est. Post secundum jussulum iterata est venæ sectio ad 3. xii. Licet enim à flatus



bus præcipuè dolor ille exoriri videretur. Verebar tamen, ne doloris atrocitas fluxionem ad partem attraheret, quæ duobus annis præteritis pleuritide vera bis affecta fuerat. Hic dolor aliquantulum fuit imminutus. Ego tamen sequenti die perseverante, alium clysterem injiciendum præcipio, ex decocto emolliente paratum in quo diaphænici  $\mathfrak{z}$ . i. dissoluta est cum aquæ benedictæ,  $\mathfrak{z}$ . iv. à quo alvus copiosè soluta est, & vomitus semel concitatus; tum inter vomendum flatus in partibus thoracicis contentus subito explosus est, ita ut post vomitum à dolore lateris & sterni me prorsus liberatum senserim, nullisque aliis remediis opus habuerim.

## OBSERVATIO LXIV.

*Febris quartana.*

**D**ie duodecimâ mensis Martii anni 1645. Joannes Rey laternarum faber, quadragenarius, in via Lapeyre dicta habitans, & febre quartanâ laborans à sex mensium spatio, sumpsit febrifugi mei gr. xx. ter purgatus est per alvum, pluries vomuit serosa & biliosa. Sequenti die, quæ erat decima tertia ejusdem mensis, accessio rediit hora solita, sed minor. Die decima sexta loco accessionis levem calorem passus est sine frigore. Die decima nona, quæ accessio expectabatur, nihil apparuit, & ab eo tempore liber omninò fuit.

## OBSERVATIO LXV.

*Febris quartana.*

**D**ie decimâ septimâ mensis Martii, anni 1645. mulier quadragenaria, nomine Marie Courbiague, ante ædes Domini d'Argencour habitans, paupercula, & pessimâ victus ratione utens, ac vino frequenter sese ingurgitans, à duobus annis quartanâ laborabat, sumpsit febrifugi mei gr. xx. (nullâ præmissâ præparatione, una exceptâ venæ sectione, quæ paucis antea diebus celebrata fuerat) quod omnino rejecit. Purgata est vigesies, quia corpus erat impurissimum; bis aut ter vomuit. Postridie levem accessionem passâ est, & nullam deinceps.

## OBSERVATIO LXVI.

*Febris quartana.*

**E**adem die, scilicet decima septimâ mensis Martii, mulier quadragenaria nomine Toinette Boyssiere, vidua Joannis Alquier sartoris, juxta domum prædictæ Mariæ habitans, & septem mensibus quartana laborans sumpsit febrifugi mei gr. xx. septies purgata est per alvum, quater vomuit & postridiè manè iterum ter dejecit per alvum copiosè. Eadem die accessio quæ reditura erat hora tertia vespertina, post mediam noctem apparuit, sed cum levi frigore, & levi calore, per tres aut quatuor horas, cum ante accessio vehementissima per quatuordecim horas durare consuevisset. Et inde nullam amplius accessionem passâ est.

## OBSERVATIO LXVII.

*Febris tertiana duplex.*

**P**etrus Palat, quindecim annos natus, in hospitio habitans, cui signum est Aquila argentea, febre tertiana duplici laborans quadraginta diebus, post venæ sectionem & purgationem aliquoties repetitam, & julepos pluries exhibitos, ex alterius Medici præscripto, sumpsit die decima octavâ mensis Martii anni 1645. febrifugi mei gran. xiv. Sexies purgatus est per alvum. Sumpserat medicamentum hora quarta matutina, quamvis accessio hora octava redire solita esset, quæ etiam hora dicta apparuit: & modo confecto, sed nullam amplius ab eo tempore accessionem passus est.

## OBSERVATIO LXVIII.

*Febris quartana.*

**S**erenissimus Princeps Janethinus Doria, Genuensis, Classium Hispanicarum Præfectus, cum illius triremis à procellosis ventorum tempestatibus ad oras Catalauniæ propulsa fuisset, à nostris militibus captus, & in arcem Monspelensem deductus est, ubi per biennium moratus, æstate prægressâ incidit in febrem tertianam, quæ per quatuor menses perseveravit, nunc simplicis, nunc duplicis typum referentem, non obstantibus omnibus remediis, quæ à Medico ordinario præscripta fuerant, aliisque in consilium vocatis, è quorum numero unus interdum fueram. Tandem ineunte hyeme febris tertiana in quartanam migravit, quæ trium mensium spatio multis etiam remediis oppugnata fuit à duobus Medicis, serenissimo Principi serianum opem ferentibus. Tandem perseverante affectu, meam opem implorat, eique morem gerens, exhibui die vigesimâ septimâ mensis Martii 1645. febrifugi mei gr. xx. Tribus horis ab assumpto medicamento bis vomuit serosos humores, & nihil dejecit tota die. Circa mediam noctem semel dejecit copiosè. Postridiè manè bis. Eadem die expectabatur accessio hora sextâ vespertina, quæ non apparuit, neque deinceps, & inde ad perfectam valetudinem perductus est.

## OBSERVATIO LXIX.

*Catarrhus cum tussi.*

**D**ie quartâ mensis Aprilis anni 1645. cum ex catarrho satis diuturno, molesta tussi laborarem quæ noctu potissimum ingravescebat, & aliquot purgationibus non cesserat, sumpsit laudani opiatum gr. iii. quibus tussis sedata est. Illa tamen rediit post biduum, ex injuria aëris, qui una die valde calidus fuit postero verò valde frigidus, flante Aquilone. Die Octavâ ejusdem mensis, sumpsit ejusdem laudani grana duo, & tussis omninò sedata est.

## OBSERVATIO LXX.

*Febris quartana.*

**D**ominus Pithory in Curia Computorum, subsidiorum, & Fisci Regii Consiliarius, à febre quartana liberatus est casu rarissimo. Cum secta illi fuisset vena, paulò post occlusum vulnus, & ligatum brachium, fluere coeperunt ex vulnere guttulæ quædam aquæ limpidissimæ, quæ fasciam penetrabant, & indusia sæpè mutare cogebant. Perseveravit ille fluxus per multos dies, donec febris quartana cessaverit. Notandum est, illum post multos annos ex hydrope interiisse.

## OBSERVATIO LXXI.

*Oesophagi obstructio.*

**Q**uidam rusticus famelicus, pedem suillum elixum comedendo, ejus frustulum satis magnum devoravit, in cujus medio ossiculum carne contactum latitabat. Illud autem propter magnitudinem & glutinositatem oesophago adhæsit, eique agglutinatum est, ut neque vomitu, neque sorbitione ulla excuti potuerit. Per biduum in eo statum fuit, cum tanta angustia, ut brevi moriturus videretur. Post multa tentata, Chirurgus filum ferreum oblongum in apice duplicavit ad formam hami, quo pisces capiuntur, & filum illud penitissimè demisit in oesophagum, cujus unco frustum illud pedis porcini arreptum est, & magna vi ab oesophago avulsum, forasque extractum.

## OBSERVATIO LXXII.

*Angina.*

**Q**uidam Anginâ verâ correptus, tam arctè occlusum habebat ab inflammatione superius oesophagi ossiculum



lum, ut nihil omnino deglutire posset. Dum verò remedia usurpabantur, ad vires reficiendās, ut copiosas sanguinis missiones aliaque remedia ferre posset, immisus fuit catheter in oesophagum, & syringa catheteri aptata; per quam iuscula in ventriculum demittebantur, tum etiam alia remedia, quorum ope à morbo liberatus est.

OBSERVATIO LXXIII.

*Icterus.*

**P**ater Jesuita laborabat ictero, ventriculi imbecillitate ex bile in eum refluyente, unde vomitus frequens oriebatur. Pharmacopœus Collegii exhibuit ei succum fumariæ ad §. iii. Prima exhibitione cohibitus est vomitus, & per aliquot dies, continuato remedio, icterus omnino sublatus est. Factus fuerat ille icterus ex calida hepatis intemperie, cum obstructione pori colidochi conjuncta. Ad utramque autem affectum fumaria plurimum valet, cujus vires in succo longe potentiores sunt, quam in decocto.

OBSERVATIO LXXIV.

*Catarrhus ferinus, cum variis febrium complicationibus.*

**D**ie primâ mensis Maii, anni 1645. vocatus sum ad Dominam de Beaufort, apud matrem Dominam du Pelous decumbentem, in Castello Bayart nominato, apud Vivarienses non longe à Rhodano, erat autem nata annos 35. sanguineo temperamento prædita. Per mensem integrum ægrotaverat ex catarrho ferino, cum febre continua, cui jungebantur accessiones febris intermittens, bis in die recurrentes, nempe hora 10. matutina & hora 6. vespertina. Cum his tussis molestissima dies noctesque eam infestabat, ex qua pituitam crudam ingenti copia rejiciebat, ut nullus somno relinqueretur locus. Per mensem decursum quinquies celebrata fuerat venæ sectio à D. Chaumel Medico ordinario peritissimo, & ter purgatio administrata, aliaque multa remedia usurpata, ex quibus unum maxime profuerat, nempe bolus ex laudani gr. iii. cum conserva rosarum: à quo per 12. horas tussis & catarrhus omnino sedabantur, & ægra se curatam prædicabat, ob summum levamen quod ex eo remedio percipiebat. Quamprimum eam invisi, in consilio, habito cum duobus aliis Medicis, censui, quoad typum febrium prædictarum spectat, esse febre continuam, & duas tertianas duplices simul complicatas. Quoad remedia verò, esse mittendum sanguinem ex brachio sinistro, cum dolor pungitivus adesset in latere sinistro cum febre intensissima, & linguæ nigredine; quam tussis ferè indefinens comitabatur. Die igitur primâ mensis Maii circa vespertam, missus est sanguis ad Unc. ix. & exhibitus est julepus refrigerans & incrassans. Noctem transegit cum paulo minori molestia. Postridie manè, quæ erat secunda mensis Maii, cum febris intensa adhuc vigeret, iterata est phlebotomia ad Unc. viii. ex qua febris remissior facta est, & dolor lateris evanuit. Circa vespertam ejusdem diei, ægra conquesta est de dolore lateris dextri, qui sensim increfcens, gravis admodum factus est horâ nonâ vespertinâ, ut venam ejusdem lateris aperire coacti fuerimus eadem horâ, unde lateris dolor imminutus est, & intra noctis decursum prorsus evanuit: nox tamen insomnis fuit & molesta, cum tussis ferè assidua. Accessiones febriles omnino desierant. Una ex medicamento purgante, pridie mei adventus. Altera, ex priori venæ sectione, sed febris continua perseverabat cum eodem tenore. Die tertiâ ejusdem mensis, cum tussis & febris vehementer urgerent, exhibita est ante meridiem boli prædicti, ex laudani gr. iii. compositi, qui paratus habebatur, media tantum pars, quæ intra horam tussim omnino sedavit, & ægra bene habuit usque ad mediam noctem; tussis tamen per intervalla recurrebat, quâ pituitam crassam, viscidam, & valde putridam excernebat; ita ut multa sputa essent flava & viridia, febre intentâ continuo perseverante. Cum autem vesperi tussis admodum urgeret, & ægra inquietudinibus plurimum affligeretur

*Lazar. Riverii Opera.*

exhibita est boli prædicti altera pars dimidia, ex qua noctem placide transegit, cum paucissimo tamen somno. Die quartâ manè tussis rediit, sed cum libera admodum & liberali anacatharsi, qua sputa valde putrida excernebantur, & nonnulla eorum sanguine tantillum conspersa erant. Post duas horas cessavit tussis usque ad meridiem, quo tempore iterum rediit satis molesta, & cum diutius perseveraret, ægramque graviter affligeret, ac sputa crudiora apparerent, ita ut ex fluxionis renovatione procedere videretur; exhibita est alterius boli ex gr. iii. laudani compositi dimidia pars, quâ tussis iterum sedata est. Alvus mane soluta fuerat, & ægra dejecerat biliosa multa, & subviridia, cum antea perpetuò alvus adstricta fuisset, & clysteribus parum solveretur. Circa vespertam injectus est clyster ex decocto §. 6. fennæ cum Catholic. & diaphœnic. an. §. i. quo quater purgata est, & in ultima excretionem multam pituitam rejecit, viridi colore persusam, eique similem, quæ per anacatharsim excernebatur. Post ejectum clysterem dormivit placide per horas tres, & se adeo suavem somnum toto morbi decursu non percepisse asseruit. Horâ decimâ noctis, cum tussis aliquantulum rediisset, sumpsit alter. part. dimid. boli prædicti partem quartam, quæ laudani granum dimidium non continebat, eâ tamen tussis sedata est, & noctu ægra placide quievit. Die quintâ matutinâ sumpsit manè purgans medicamentum ex fennæ §. 6. in juscule pectorali, quo bis in die utebatur, insula, in quo post colaturam mannæ §. ij. dissolutæ sunt. Eademque die discessi, ordine agendorum in posterum cum Medico ordinario sedulo deliberato, & scriptis mandato. Quibus intra viginti dies, à meo discessu, pristinae sanitati restituta est. Horum præcipua fuere juscula pectoralia continuata, venæ sectio, & purgatio iterata. Sed præ cæteris palman retulit bolus ex laudano, per plures dies consequentes parva dosi usurpatus, quo omnia symptomata tandem sedata sunt.

OBSERVATIO LXXV.

*Tumor pedis dextri diuturnus.*

**N**obilis Matrona, uxor Nobilissimi viri D. de Langon, quinquagenaria, tumoræ oedematofum cum dolore insigni in dextro pede patiebatur, cujus origo talis fuerat. Cum aliquando iter faceret, equus cui infidebat, in terram cecidit, & super dextrum dictæ matronæ pedem, quo ictu gravissimo calcaneum depressum est, & à parte pedis interiori ad exteriorem detrusum, unde dolores acerbissimi cum movendi impotentia exorti sunt. A multis, tum Chirurgis, tum Empyricis pluries vexata est, nec os luxatum in pristinam sedem protinus reponi potuit, unde dolores, & ambulandi impotentia, cum pedis tumore oedematoso, eam continuo affligebant. Jam à quatuor mensibus in his angustiis erat, cum eam invisi, quod contigit die 20. mensis Maii, anni 1645. Explorans autem diligenter partem affectam, video luxationem satis levem remanere; eamque callum contraxisse, atque adeo esse protinus immedicabilem. Dolorem autem præcipuum esse in vola pedis; non in parte luxata, quod nervi, partem illam occupantes, humore multo imbuti essent. Ideo ad curationem oportere humoris ad partem debilem affluxum impedire, & eum, qui parti impactus erat, discutere, partemque ipsam roborare. Quæ omnia octo dierum spatio sequentibus remediis præstata sunt.

℞. Radic. falsæ parill. §. iv. aquæ fontis ℞. iv. infundantur per viginti quatuor horas, deinde bulliant ad mediæ partis consumptionem, addendo sub finem fennæ mundat. §. i. turbith. hermodactylor. ana §. ii. colaturæ capiat ℞. ʒ. manè per octo dies.

℞. Olei ceræ §. i. illinatur pars affecta manè & serò; deinde sequens emplastrum admoveatur.

℞. Massæ emplastri diapalma, vino rubro austero soluti, & ad vini consumptionem cocti ℞. ʒ. rosar. rubr. myrtillor. massich. & tartari vini rubri pulveratorum an. ʒ. i. chamæpit. & chamæm. pulveratorum an. ʒ. ii. fiat massa de qua formentur emplastra, quibus pes universus post inun-

xxx

ctionem



tionem contegatur. His tumor & dolor ablati est, manente tamen claudicatione, propter ossis luxationem.

## OBSERVATIO LXXVI.

*Morbilli.*

**E**Adem Matrona Domina de Langon febre continua correpta est, cum tussi & raucedine, die vigesima sexta Junii 1645. Per triduum symptomata non valide urgebant; ideo tempus illud sine remediis transegit. Quartâ die cum febris intensior evasisset sanguis detrahitur, & julepus refrigerans exhibetur. Eadem die totum corpus morbillis conspersum apparuit. Vocatus ego die quinta, præscribo circa vesperam julepum, ex æquis partibus aquæ ulnariæ & cardui benedicti, cum bezoardici mineralis gr. xx. Duabus horis assumptis ab assumpto julepo, copiose sudavit, febris valde imminuta, & portio morbillorum discussa est: post sudores, alvus soluta est. Postridie manè idem julepus iteratus est, ac copiosius sudavit post duas horas, ac febris omnino ablata est, omniaque prope modum exanthemata discussa sunt.

## OBSERVATIO LXXVII.

*Nephritis.*

**Q**uidam vir quinquagenarius, nephriticis doloribus valde obnoxius, sumpsit per duodecim dies decoctum radicis cardui asinini & liquiritiæ, quo multos lapillos & arenulas excrevit, & postmodum per plures annos ab affectu liber permansit. Erat autem radicis 3. β. cum liquiritiæ 3. ii. in singulis dosibus.

## OBSERVATIO LXXVIII.

*Cholera morbus in febre tertiana maligna.*

**J**uvenis quidam bilioso temperamento præditus, incidit æstate mediâ in febrem tertianam, quæ duabus primis accessionibus satis mitis apparuit, sed in tertia accessione, tanta fuit humoris biliosi malignitas & ferocia; ut concitato vomitu, atque alvi fluxu frequenti, cum maxima virium jactura, summum ægro periculum impenderet. Vocatus ad eum, præscribo clysterem, ex juleo cum confect. Alkermes 3. in. theriacæ recentis 3. i. quo statim vomitus & alvi fluxus sedatus est. Quia verò in hujusmodi febribus malignis sæva illa symptomata in singulis paroxysmis redire solent, & ægrum secunda, vel tertia invasione de medio tollere; ad præcautionem præscripsi victum incrassantem, & laudani gr. iv. duabus horis ante paroxysmum sumenda, sicque symptomata prædicta non redire, levis accessio fuit, & julepis refrigerantibus, incrassantibus, atque alexipharmacis curatio absoluta est.

## OBSERVATIO LXXIX.

*Lochiorum suppressio.*

**E**legans quædam mulier, triduo à partu, nimiam parvum genitalium dilatationem emendare cupiens, vulvæ adstringentia applicuit, quibus lochia suppressa fuere, & tantâ copiâ sanguis cumulatus est in utero, ut rectum intestinum, & vesicæ cervicem comprimendo, omnes evacuationes cohibuerit, & venter in utris modum intumuerit. Vocatus ad eam, primum immitti jubeo catheterem in vesicam, & magna urinæ copia excreta est. Postea pessarium acre præscribo, in uteri cervicem immittendum, quo lochia affatim fluere, ac tandem clyster laxans injectus est, quo fæces plurimas dejecit, & ita omnes viæ apertæ sunt.

## OBSERVATIO LXXX.

*Sudores nocturni.*

**V**ir quadragenarius, melancholico temperamento præditus, sudores nocturnos patiebatur à longo tempore, qui per quatuor, aut quinque dies perseverabant, & postea cessabant. Recurrebant verò bis aut ter in mense. Satis apparebat, hos sudores procedere à colluvie serosa,

quæ per intervalla colligebatur, & à natura postmodum per sudores expellebantur. Ideo cum satis pauper esset, & multorum remediorum sumptus ferre non posset, consului, ut bis in mense sumeret pulveris jalapæ drach. β. cum cremoris tartari pari quantitate. Quibus, per trium mensium spatium continuatis à tædio affectu liberatus est.

## OBSERVATIO LXXXI.

*Fluor muliebris.*

**M**ulier quadragenaria, diuturno fluore albo laborans, post multa remedia frustra tentata, pitisanâ laxante, per mensem integrum, singulis diebus usurpata, protinus liberata est. Hujus autem pitisanæ compositio talis fuit.

℥. Sennæ mundat. drach. i. sem. coriandri præpar. liquirit. rasæ ana drach. i. β. aquæ fontis, in aqua tamarindor. drach. iii. & ligni lentiscini drach. i. bullierint, cyathum unum, infundantur frigidè per noctem, & colaturam capiat manè, duabus horis ante passum.

## OBSERVATIO LXXXII.

*Enterocoele.*

**V**ir quinquagenarius enterocoelem gravissimam passus erat per quatuor dies continuos à qua nullis auxiliis revocari potuerat. Vocatus ad eum, pulsus valde languidus invenio, cum extremarum partium frigiditate. Tum pars affecta valde frigida ad tactum sentiebatur, ut de illius narcosi metueretur. Inter alia remedia præscribo fœtum ex aqua vitæ calente, inguini admovendum, quo per duas horas continuato, intestinum repositum est blanda impulsione, & æger ab imminente exitio liberatus.

## OBSERVATIO LXXXIII.

*Hysterica passio.*

**M**ulier 20. annos nata, bilioso temperamento prædita, cum hysterica suffocatione premeretur, & faciem haberet rubicundam, injecto clystere, ex oxycrato parato, confestim liberata est, ita ut aliis remediis, quæ ipsi præscripta fuerant, non indiguerit.

## OBSERVATIO LXXXIV.

*Dysenteria.*

**Q**uidam dysentericus omnia remedia respuens, solus usus est pimpinellæ decocto, cum aqua & butyro confecto, cujus scutellam sumebat manè & serò, & intra triduum curatus est. Plurimum valet pimpinella ad depurandum sanguinem, & levem habet adstringendi vim, ideo non est mirum, si dysentericis conferat.

## OBSERVATIO LXXXV.

*Tumor Pancreatis scirrhusus, cum affectione hypochondriaca.*

**I**llustrissimus vir Dominus Audoyer in Senatu Gratianopolitano Præses Amplissimus, annos natus 57. gravissimis & contumacissimis torquebatur affectibus, quorum idea ut exactius introspecti valeat series affectuum, quibus à viginti annis conflictatus est, paucis exponenda.

Ac primum sciendum est, eum temperamento bilioso ac melancholico esse præditum, gracili habitu & macilento. Prima autem malorum origo in doloribus arthriticis constituenda est, qui ab anno 1622. eum per intervalla infestare coeperunt. Et illis postmodum succedere leves quidam insultus epileptici, qui circa annum 1626. primum invadentes, & per dilucida intervalla redeunt, post exactum biennium prorsus desiere, eodemque tempore dolores arthritici iterum reversi sunt, qui per totum illud tempus, quo insultus epileptici sævierant, omnino delituerant.

Illi autem arthritici dolores bis aut ter singulis annis eum exercuere, ut interdum per duos aut tres menses lecto affixus fuerit, cum per exiguum ex variis remediis usurpatis auxilio: hoc imprimis observans, se ex frequenti phlebo-



phlebotomia parum adjutum fuisse : imò verò ex ea dolores arthricos intensiores semper redditos fuisse.

Postquam verò per octo annorum spatium, nempe ab anno 1631. usque ad annum 1639. doloribus hisce per intervalla prædicta confectus est ; in graviora mala postmodum delapsus est, à mœnore acerbissimo, ex mulieris aulicæ, & magnatis affinitate, & amicitia sibi conjunctissimæ, suisque rebus maximè necessariæ, interitu. Unde primum correptus est motu quodam palpebrarum involuntario, ad hunc usque diem perseverante, quo oculi per intervalla clauduntur & aperiuntur ; ut sit veluti tremor quidam illarum partium, quo etiamnum manus & pedes frequenter (levissimè tamen) corripiantur.

Eodem tempore doloribus arthriticis vexatus est, trium mensium spatio, quos ambulandi impotentia subsequuta est, per sex menses perseverans. Cum autem Parisiis tunc temporis degeret, aquis Villecomitensibus, ex D. Delorme Medici clarissimi præscripto usus est, à quibus magnam stomachi refrigerationem passus est, ac deinceps scabies pruriginosa, admodum molesta totum corpus invasit, quæ confestim curata est unguento quodam (ni fallor mercuriali) carpis manuum, & plantis pedum admoto, ex consilio D. de Labrosse Medici Parisiensis ; Quæ inunctionem sequuta est ingens diarrhoea, per 20 dies perseverans, cum gravissimis ventris torminibus : Interdum alvi fluxus dysentericus apparuerit. Interim pedum & tibiarum incommoda perseverantia ambulandi facultatem per annum integrum sustulere. Eo verò tempore, tum maximis animi contentionibus in libris, aliisque chartis evolvendis ; tum gravissimis animi pathematis, & mœnore ingenti, ob infelicem negotiorum successum agitatus est. Quæ reliquis affectibus infra describendis originem dedisse merito existimantur.

Anno 1640. in gravem incidit spirandi difficultatem, & pectoris angustiam, cum dolore quodam ventriculi regionem obidente, quæ quidem symptomata per 15. dies acerbis afflixere, ac deinde non levem remissionem passa sunt ; sed post aliquod temporis intervallum iterum atque iterum vires novas resumere visa sunt, ita ut ad hunc usque diem nunc remissius, nunc intensius, ab iis obsessus fuerit æger illustrissimus.

Pro contumaci affectu expugnando varia à variis Medicis remedia per quatuor annorum decursum præscripta sunt : purgationes variæ per apozemata, potiones, syropos magistrales, pituitas laxantes, & similia. His accesserunt phlebotomiæ frequentes, cauteria, vesicatoria, apertiones hæmorrhoidum, feniopia, juscula medicata, serum lactis chalybeatum, lac integrum, aquæ minerales sulphuræ, ut Borbonienses & Dinienses, tum etiam vitriolata, ut Aureliana, opiata roborantes & aperientes, syrapi pectorales, & alia quamplurima, quæ variis temporibus per quadriennium usurpata, maximum aliquando, aliàs verò minimum ægrotanti solatium attulere. Verum habitualis affectus semper in orbem rediit, & perillustis æger iisdem hætenus affectibus vexatus est.

Cum autem nos ad eum invensum accersiti fuerimus, circa principium mensis Maii, anni 1644. curationem universam ad insignia duo symptomata superius recensita dirigendam esse censuimus, pectoris nimirum angustiam & spirandi difficultatem, quorum causæ primò introspectendæ sunt, in quo maxima difficultas & summa obscuritas residere videtur. Illa enim spirandi difficultas nullam veri asthmatis, aut fluxionis, à capite in pulmonem irruentis speciem præ se ferre videtur, licet pro asthmatico à præstantissimis quibusdam Medicis tractatus fuerit. Nulla enim tussis, nullus stertor, & nulla humoris pituitosi per anacatharsum excretio apparet. Secundò illa difficultas spirandi à causis procatacticis in momento ferè concitatur & definit ; ut, si paulò vehementius corpus commoveat, aut in levissimam iracundiam feratur ; statim anhelitu difficili corripitur, & paulò post spirandi libertatem iterum recuperet. Tertiò, quamquam vespertinis horis hoc symptomate magis premitur, ita ut erectâ cervice, & sedens in lecto usque ad mediam noctem manere cogatur ; attamen simul atque somno corripitur incipit, protinus evanescit spi-

Lazar. Riverii Opera,

randi difficultas, & capite in pulvinar demisso æger decumbit ; sicque noctis reliquum tam placidè pervadit, & cum tanta spirandi facilitate, ut nullum in pulmone affectum latitare, facile appareat.

Illius igitur anhelitus difficilis causa immediata alibi quaerenda est : nempe in infimo ventre, cujus partes molestissimis affectibus oblectæ, omnium malorum mineram in se continent.

Hoc primum demonstrat doloris & angustiae sensus, de quo nobilis æger perpetuò conqueritur, ejusque sedem sub diaphragmate, & circa ventriculi regionem ostendit, & quoties difficultate spirandi premitur ; dolor ille & angustia, atque oppressio (ut ipse nominat) toties augetur, & vice versa : ita ut unum ab alio dependere manifestum sit. Nos autem doloris illius & angustiae seu oppressionis causam diligenter inquirentes, & ventriculi regionem contrectantes, eam quidem satis tractabilem invenimus, quoties manum suspensam aliquantulum adhiberemus ; sed postquam eam penitus adëgimus satis vehementi compressione facta, duritiem quandam & renitentiam profundius, & sub ventriculo sitam percepimus, eamque in pancreate residere censuimus, quod tumore duro & scirrholo affectum arbitramur. Et cum pancreas sub diaphragmate sedeat ; non est mirum, illud tumore affectum, partem eam respirationi maximè inservientem comprimere, ejusque motum liberum impedire. Verum enim verò, illa causa per contactum explorata, non planè satisfacit. Si enim anhelitus difficultas ab ea solummodò dependeret ; esset perpetua, non interpolata, neque à causis externis corporis nimirum, aut animi commotione tam facilè induceretur. Equidem ita convincit hæc ratio, ut alia causa huic adjungenda sit, nempe materia quædam tenuis, quæ levi momento commoveatur, ac deinde facile ejusdem agitatio sedetur. Quænam autem sit illa materia, & quam præcisè sedem occupet ; ad amissum definire, facillimum non est. Licebit tamen, cum præstantissimis Medicis qui nobilis agri curationem susceperunt, ad communem, & magis probabilem rationem confugere, vapores & flatus à liene, ventriculo aliisque partibus translatos, accusantem. Hæc autem flatuum & vaporum in ventriculo commotio inde facilè dignoscitur, quod nobilis æger post singulos pastus à prædictis symptomatibus gravius torqueatur. Siquidem ex coctione difficili & laboriosa, in ventriculo debili, multi flatus generantur, qui ventriculum distendentes pancreas & diaphragma comprimunt, unde major angustia & difficultas spirandi, per aliquot horas à passu, exoriri consuevit. Præterea in maximis aeris mutationibus, quando Aquilonia tempestas in Austrinam convertitur, maximè ingravescunt symptomata prædicta, ex eo, quod ab illa aeris mutatione excitantur rheumatismi, qui aliàs dolores arthricos parere consueverant, & jam in partes interiores, diuturnis intemperiebus & obstructionibus deliberatas, confluent, pravosque humores in iis contentos exagitant : vel quod ab humidiori aëre insentur humores, ac veluti fermententur, unde anathymiasis elevatur, quæ diaphragma, & pulmonem impetens, pectoris angustiam, & spirandi difficultatem parit.

Si hæc symptomata ad aliquod morbi genus referenda sint ; nos ea protinus ad melancholiciæ speciem, quæ hypochondriaca nominatur, reducenda censemus : cum ex mœnore gravi & diuturno primam duxerit originem, in corpore calido & sicco, unde magna humoris melancholici congeries, quæ obstructiones contumaces, in hypochondriis peperit. Imò verò, quamvis scorbutus, in Septentrionalibus plagis frequentissimus, hisce regionibus nostris infrequens omnino sit ; Hic tamen affectus ad scorbutum naturam accedere videtur, cum prædicta duo symptomata, nimirum pectoris angustia, & difficultas spirandi, frequentissima sint hujus morbi symptomata, ut quàm plurimis observationibus annotavit Severinus Eugalenus, in cujus patria morbus iste frequentissimus est, & ad illius imitationem Daniel Sennerthus lib. de scorbuto cap. 4. ubi illius morbi signa proponit, & art. 9. illius capitis hæc duo symptomata ita describit, ut illustrissimi ægrotantis nostri statum graphicè depingere vi leatur.

Quamvis autem (ut jam dictum est) morbus ille, scor-



butus appellatus, hisce nostris regionibus insolens, ac pene invifus fit; Nos tamen, ne in tanti affectus curatione aliquid neglexiffè videremur, specifica hujus morbi remedia statim ufurpavimus, cum aliis permixta, quæ obftructiones referare, humorem melancholicum obtundere, & foras excludere valerent. Atque ita primùm nafurtii aquatici, beccabungæ & fumariæ succos per multos dies exhibuimus, iis admifcendo falem tartari, & fpiritum vitrioli, in quibus etiam fennæ tantillum paffim infundebamus; ficque humores craffi, glutinofi, tartarei, fenfim educebantur. Interdum verò succos prædictos cum decoctis rad. enulæ camp. cortic. tamarifc. fol. agrimon. abfin. pimpinellæ, permifcebamus. A quibus remediis à 7. menfis Maii, ad 28. continuatis, plurimùm adjutus æger noster videbatur. Cum verò ea die tempus ficcum & ferenum in Austrinum & pluviofum fuerit converfum, prædicta fymptomata de integro renovata funt, quæ ad diem tertium menfis Junii perfeverantia, duplici phlebotomia parca manu celebrata, plurimùm immutata funt. Ab eo tempore, fale feu vitriolo martis, per mensem integrum ufus eft, quod quidem ad obftructiones referandas, vifcera roboranda, eorumque calidam intemperiem corrigendam, vires habet eximias. Interdum tamen, tertio videlicet aut quarto die, purgatiunculas ex fenna, prædictis decoctis infufa, interjiciebamus, interdum etiam pilulas ex chalybe exhibebamus, & aquam ex infufione chalybis paratam in potu ordinario cum vino tenui & oligophoro propinabamus. Quibus per mensem (ut dictum eft) continuatis nobilis æger ad multò meliorem flatum perductus eft ita ut, qui antea neque in equo, neque in carruca, fine magna moleftia iter facere non poterat, jam & carrucæ motum velociorem, & equi celerem ambulationem facile toleraret. Præterea totius corporis vigor, & ipfius faciei color plurimum reftitutus eft. Hoc in primis annotatione digniffimum eft, quòd nobilis æger à femicupiis & fotibus, regioni ventriculi admotis, maximè lædebatur, & in infignem anhelitus difficultatem conjiciebatur; ita ut eorum ufum, quamvis huic curationi maximè neceffarium, prorfus abjicere coacti fuerimus.

Hæc ufque ad diem quartam Julii à nobis acta funt, quo tempore impetrata ab illuftriffimo Præfide difcedendi veniâ, Mompelium rediimus, relicto ipfi præfcripto eorum, quæ in pofterum agenda videbantur.

A difceffu meo, per totum autumnus & hyemis fequentis decurfum, prædicta remedia alternatim & per debita intervalla, ex clariffimi viri D. Joannis Matthæi, Medici illius ordinarii præfcripto ufurpavit, nempe falem Martis, pilulas ex chalybe, & infufionem fennæ in prædicto decocto; cum fale tartari, & fpiritu vitrioli paratam, quibus addebatur opiata roborans & aperiens, à nobis ante difceffum præfcripta. Cum verò poft aliquot menses maxima fymptomatum imminutio appareret, confului per litteras, ut fotum & femicupium tentaret, fiquidem fperandum foret, ut caufis morbificis valdè imminutis, minor fiat humorum commotio, quæ dictorum remediorum ufum impediabat. Res ex voto fuffecit, & fotus fine moleftia æger ferre potuit, à quibus maximum fructum percepit. Vere autem fequenti non folùm fotus, fed etiam femicupia ufurpavit, & prædicta remedia fedulò continuavit, aliis nonnullis additis, à quibus tandem, Deo fit laus & gloria, ad optimam valetudinem perductus eft.

[Conf. lib. xii. c. vi.]

#### OBSERVATIO LXXXVI.

##### *Hydrops tympanites.*

Clariffima Matrona, uxor D. de Gevre, Coftenfis Juris utriufque Doctores 30. annos nata, biliofo temperamento prædita, laboravit per 10. menses tumore ventris fatis infigni, cui tensio maxima adjuncta erat, ut hydropis tympanitis naturam omnino referret. Prima affectus origo huic præfertim caufæ adfcribatur, quòd ægra, fluorem album è longo tempore patiens, in balneum actum frigidum fele demerferit, à quo fluor ille fuppreffus eft.

etiam caufæ varii errores in victu accefferunt. Multis remediis ufa eft per dictum tempus, à peritiffimis Medicis præfcriptis Potionibus, nempe apozematis, & julepis aperientibus ac diureticis, opiatas hepatis roborantibus, aliisque quamplurimis fine ullo fructu; tandem circa finem menfis Maii anni 1645. curæ meæ fe commifit, quam fequentibus remediis aggreffus fum.

Rad. asparagi, brulci, & cichorii an. 3. fl. rad. enulæ camp. & petrolei. an. 3. ii. fol. agrimon. ceterach. capil. ven. ana M. fl. abfinthii utriufque ana P. fl. coquantur ad 3. vi. in colatura infunde frigidè per noctem fennæ mund. 3. i. falis diuretici 3. i. fpiritus diuretici gutt. xxx. cap. manè cum regimine, per fex dies continuos. Purgabatur quater aut quinquies fingulis diebus, & materiam vifcidam cineritii coloris excernebat. Poft fecundam dofim fanguis detractus fuit ad 3. viii. in fine apozematum fumpfit pilulas ex calomelanos gr. xx. diacr. gr. x. quibus fepties purgata eft, & fequenti die ventris tumor refolutus apparuit; qui tamen circa vefperam iterum inflari cœpit. Tumore fubfidente, dum hypochondria contrectarem, percepi tensionem infignem & dolorificam, circa ventriculi regionem: cujus ratione præfcripti (cum juleporum continuatione) fotum emollientem & aperientem, univerfæ regi. ni hypochondriacæ fingulis diebus admoventum, fiquis tensio etiam non levis in dextro hypochondrio apparebat. Quibus per 4. dies ufurpatis menftruarum purgationes prodire, quæ per aliquot menses latuerant. Cum tamen illæ feigniter admodum procederent, triduo elapfo iterum ufurpati funt tum fotus, tum apozemata, sine fenna parata. A quibus moderata menfium copia provocata eft, & ab eo tempore tumor ventris omnino difcuffus apparuit. Ad firmandam tamen curationem præfcripti pilulas ufuales aperientes & laxantes, bis aut ter in mense deglutendas; tum etiam opiata roborantem & aperientem, fingulis diebus per mensem integrum ufurpandam.

#### OBSERVATIO LXXXVII.

##### *Felris quartana.*

Joannes Goffel Lotharingus, bonarum literarum candidatus, in Delphinatu, prope oppidum Revel nominatum, apud nobilem virum, cujus filios erudiebat, tunc temporis habitans, ad me venit die 16. menfis Junii anni 1645. ut ei febre quartana ab anno integro laboranti opem ferrem. Ejus autem hypochondria explorans, maximam tensionem & duritiem in regione hepatis & lienis invenio, quam tantæ morbi contumaciæ atque longitudinis caufam eiffe exiftimans, eam prius demoliendam cenfui apozemate aperiente & laxante, [ præmiſſa venæ fectione,] tum etiam fotibus mollientibus & aperientibus, ac pilulis ex chalybe paratis. Quæ omnia ipfi præfcripti ad xx. dies ufurpanda. Tum febrifugi mei dofim ei tradidi poft dicta remedia fumendam. Cum autem ille non poſſet commodè Pharmacopœis uti, qui à loco ubi degebat, fatis longè diftabant, & fumptus remediorum vix ferre poſſet, omiffis iis omnibus, quæ præfcripta fuerant, febrifugum ftatim fumpfit, à quo multum purgatus eft. Prima acceſſio affumpto remedio dinidio minor fuit; fecunda priori adhuc minor. Et ita minuentibus fenſibiliter acceſſionibus, poſt quintum paroxyſmum, à febre quartana omnino liber fuit, de quo me per litteras monuit, addens, ſe tuſſicula inſeſtari à febre ſibi relicta. Cui reſcripſi, ut remedia à me antea præſcripta uſurparet, pro hypochondrii utriufque obſtructionibus referendis, quas adhuc perſiſtere, & tuſſim illam ſiccā perducere non dubitabam.

#### OBSERVATIO LXXXVIII.

##### *Vomitus antiquus.*

Uxor D. Antonii de Maniffy, Medici Romanenſis & Universitatis Valentianæ Doctores aggregati meritiſſimi, annos nata 24. laboravit per triennium vomitu moleſto, cum dolore lumborum ad regionem lienis ſeſe exporrigente,



porrigente, vomebat autem post singulos passus, omnem propemodum cibum & potum cum pituita viscida permixtum: unde ad summam maciem perducta est. Præterea quasdam velut accessiones febriles patiebatur, bis aut ter in mense per 12. aut 15. horas perseverantes. Multi Medici ex eis, qui pro ea consilium inierant, hæc symptomata à calculo, renum parenchymati infixio, provenire existimabant. Alii verò obstructions, & hystericos affectus accusabant. Quorum omnium ratione varia remedia usurpata fuerant sine ullo fructu. Donec tandem agra ad tantam maciem perducta fuerit, cum febre lenta conjunctam, ut febre hectica confecta putaretur. Ego autem rogatus à marito, ut quasdam remedia ipsi præscriberem, censei præcipuam mali originem in liene residere, eumque tum obstructionibus, tum intemperie calida siccâ laborare. Quorum ratione, præmissâ parvâ venæ sectione, sequentia præscripsi remedia.

℞. Rad. cichor. asparagi, brusci, & buglossi an. ʒ. ʒ. ʒ. fol. agrimon. ceterach. capill. ven. & pimpinellæ an. M. ʒ. coquantur cum pullo gallinaceo, in colat. dissolve cremor. tart. ʒ. j. fiat jusculum, quod capiat manè per 16. dies.

In quarto quoque jusculo infunde per noctem sennæ mund. ʒ. iii. sem. anisi ʒ. i. capiat cum regimine.

℞. Hord. integri & amygd. dulc. an. lb. i. contundantur & decoquantur pro semicupio, quod ingrediatum tepidè bis in die per triduum, post usum jusculorum.

℞. Chalyb. præp. cum sulph. ʒ. i. aloës opt. sennæ mund. rhab. elect. & agarici recenter trochisc. an. ʒ. ii. pulv. diarrh. abb. ʒ. ʒ. croci ʒ. ʒ. cum oxymel. simpl. fiat massa pilular. de qua capiat ʒ. i. singulis dieb. manè tribus horis ante passum, postea deambulando, & continuando per xv. dies.

Finito usu pilularum, reiteretur semicupium per quadriduum.

Hisce remediis ordine usurpatis, à prædictis affectibus liberata est, & in integrum sanitatem restituta.

## OBSERVATIO LXXXIX.

*Febris tertiana.*

**A**Ncilla Domini de Sautereau in Senatu Gratianopolitano Consiliarii Regii, triginta annos nata, febre tertianâ intermittente detinebatur, ejusque accessiones 15. passâ erat, in quarum decursu bis ei sanguis detractus fuerat, & medicamentum catharticum bis etiam exhibitum: pluresque julepi refrigerantes & aperientes præscripti à Medico ordinatio; qui post decimum quintum paroxysmum febrifugi mei gr. xx. illi exhibuit die intermissionis, quæ erat 25. Julii 1645. Quinques purgata est per alvum, blandè, & sine molestia. Postridie accessio rediit multò intensior. Et ab eo tempore nullam amplius accessionem passâ est.

## OBSERVATIO XC.

*Febris tertiana.*

**D**ominus de Pourroy, in Senatu Gratianopolitano Præses amplissimus, quinquagenarius, febris tertianæ intermittens accessiones viginti passus erat, quando ad eum vocatus sum. Bis ei sanguis detractus fuerat: julepi refrigerantes multi exhibit, & aqua benedicta Rulandi bis propinata, unde magnam bilis & pituitæ copiam excreverat, per vomitum, & secessum. Vocatus ego in accessione vigesima prima, eam valde intensam invenio, quatuordecim horarum spatio, ægrum valde assidentem, cum siti ingenti, & gravi inquietudine, quæ tandem sudoribus in fine paroxysmi prodeuntibus, discussa est. Urinæ erant rubræ, & quasi flammæ, nullum concoctionis indicium exhibentes. Ideo sanguinem detrahi jubeo satis magnâ copiâ: julepos valdè refrigerantes præscribo; succum limonum in ptisana potus ordinarii, & spiritum vitrioli in eadem ptisana, tempore accessionis. Quibus intra biduum color urinæ ruber valdè remissus est, & leve enæorema in ea apparuit. Nihilominus accessio vigesima secun-

da ejusdem fuit durationis, sed cum minori inquietudine, quæ epithematis liquidis regioni cordis admotis, valdè temperata est. Sequenti die exhibui febrifugi mei gr. xxv. cujus nulla fuit operatio per totam diem, nisi quod circa horam tertiam vespertinam semel alvum deposuit, & submediocrem materiæ biliosæ copiam excrevit. Postridiè vero, horâ octavâ matutinâ, iterum dejecit, sed multò copiosius, excrementa autem biliosa & serosa erant. Horâ nonâ rediit accessio, quæ multò remissior & brevior fuit, ad horas octo tantum perseverans. Post accessionem ter alvus soluta est. Contigit ista accessio die ult. mensis Julii 1645. Die 1. Augusti nulla accessio fuit, quia erat dies intermissionis. Die verò secundâ, in qua accessio expectabatur, nulla etiam apparuit, ita ut ager curatus videretur. Attamen die tertiâ, quæ erat dies intermissionis, nova accessio prodit. Sequenti die, quæ erat quarta ejusdem mensis, secta fuit vena, cum urinæ adhuc rubræ apparerent, post meridiem verò alia accessio contigit, ita ut febris tertiana simplex in duplicem versa videretur. Die quinta ejusdem mensis rediit accessio priori similis. Hic amplum critici insultandi campum invenere, quod febrifugo meo tertianam simplicem in duplicem convertissem. At die sexta iterum exhibui febrifugum ad gr. xxxvi. quo sexies purgatus est, multaque dejecit biliosa, ac pituitosa. Accessio rediit eadem hora, sed priori aliquantulum remissior. Post accessionem ter aut quater iterum alvum deposuit. Postridiè manè iterum ter aut quater. Et accessio non rediit, neque diebus consequentibus, & intra paucos dies ad consuetam munia rediit. In eoque statu permansit per 24. dies, in quorum decursu varios errores commisit in victu, qui eum in recidivam conjecere. Itaque die trigesimâ, ejusdem mensis, novâ accessione correptus est, horâ secunda post meridiem, quæ decem horarum spatium peragravit. Die ultima mensis, alia accessio rediit hora quarta vespertina, sed multò levior. Die primâ Septembris rediit accessio hora decimâ matutinâ, priori consimilis, censei illas accessiones ex nova cacochymia ab incauta victus ratione cumulata exoriri, quæ levem quandam putredinem nacta sit, & nondum esse partibus firmiter infixam, neque tenaciter fermentatam, atque adeo eam levioribus remediis evacuari posse, neque ad febrifugum esse confugiendum. Præscripsi itaque purgans medicamentum ex infus. ʒ. iii. sennæ in decocto tamarindor. cichorii, & agrim. cum sem. anisi & crystal. mineral. an. ʒ. i. addendo colaturæ mannæ & syrup. ros. an. ʒ. i. pulv. jalapæ ʒ. i. Optimè purgatus est, & accessio sequens minor fuit. Tum per biduum sequens sumpsit juscula aperientia & laxantia, sicque ab accessionibus omnino liberatus est, & debito victus regimine cautius observato, ad perfectam valetudinem perductus est; quæ ad hanc diem usque feliciter fruitur.

## OBSERVATIO XCI.

*Febris quartana.*

**F**Rater Theotimus, juvenis Religiosus, Ordinis Recllectorum Cœnobii Gratianopolitani, incidit in febrem quartanam versus finem mensis Julii anni 1645. Quinque accessiones passus erat, cum ad eum vocatus sum. Sanguis ei detractus fuerat sine ullo alio remedio. Sumpsit die septimâ Augusti febrifugi mei gr. xxx. pridie accessionis. Multum purgatus est per inferiora, & aliquoties per superiora. Accessio postridiè rediit multò minor, quam nulla alia subsecuta est.

## OBSERVATIO XCII.

*Febris quartana.*

**F**Rater Paschalius, ejusdem Cœnobii Religiosus, 10. accessiones febris quartanæ passus erat cum eum invisi. Ei exhibui febrifugi mei gr. xxii. die 25. mensis Octobris anni prædicti, octies purgatus est per alvum, & bis per vomitum, eaque evacuatione morbus omnino sublatus est.

Xxx 3

OBSER-



## OBSERVATIO XCIII.

*Febris quartana.*

**U**Xor clarissimi viri D. de Chappoulay, apud Quæstores Franciæ Gratianopolitanos Advocati regii, quinquagenaria, à quinque septimanis febre quartanâ laborabat, adeò graviter, ut in lecto perpetuò decumberet, & solis iusculis vesceretur, nunquam enim aderat integra *ἀσπесьια*. Die primâ mensis Septembris sumpsit febrifugi mei gr. xv. sexies purgata est per alvum, idque blandissimè, sequenti die bis iterum purgata est, & accessio, quæ reditura erat post meridiem, utque ad horam septimam retardata est, multòque remissior fuit. Sequentibus verò diebus non ampliùs comparuit. Cum autem sese reficere inciperet, & solidis alimentis uteretur, uvas immaturas in singulis passibus comedebat, unde in febrem quartanam recidit; quæ consequenter duplex & triplex facta est, cum ego tunc temporis Gratianopoli discessissem, & Monspelium rediissem. Contigit autem, ut mensè Decembri ejusdem anni Gratianopolim iterum vocatus fuërim, eam verò tunc temporis invisens, triplici quartana graviter oppressam inveni. Quamobrem ei exhibui febrifugi mei gr. xx. die decima nona dicti mensis quibus septies purgata est per alvum, & bis per vomitum. Febris ea die non rediit, neque per biduum sequens. At verò die 23. cum lautè prandisset, longa accessione correpta est. Qua de causa sumpsit sequenti die febrifugi parem quantitatem, & quinquies deiecit per alvum, nihil verò per vomitum, consequenter à febre immunis fuit.

## OBSERVATIO XCIV.

*Febris quartana.*

**M**ulier quinquagenaria, in Nosocomio Gratianopolitano, per annum integrum febre quartanâ conflictata fuerat. Die 5. mensis Septembris anni 1645. sumpsit febrifugi mei gr. xx. & copiosè purgata est per alvum, semel vero per vomitum; idque septem horis ab assumpto medicamento. Die sexta accessio rediit paulò minor, & retardata est per horas quatuor. Ab eoque tempore nullam ampliùs accessionem passa est.

## OBSERVATIO XCV.

*Febris quartana.*

**A**ncilla Uxoris Domini de Servien, in Camera Computorum Gratianopolitana Præsidis, febre quartanâ laborabat à quinque septimanis. Sumpsit die 6. Septembris anni 1645. febrifugi mei gr. xvi. pridie accessionis, quo multum purgata est, per inferiora tantum. Secunda die rediit accessio sine frigore, sed prioribus longior, & retardata est per horas sex, sequentibus verò diebus non ampliùs rediit, & in eo statu permanfit per mensem integrum. Incautam verò victus rationem servans, ancillarum more, in febrem quartanam recidit, quæ primum in duplicem, mox in triplicem migravit, idque post meum discessum. Cum autem Gratianopolim rediissem mensè Decembri, ipsi exhibui febrifugi mei gr. xx. die 23. ejusdem mensis, rigidâ hyeme, atque glaciali existente. Matutinis horis materiam viscosam & glutinosam, eamque copiosam vomitu rejecit, vespertinis verò plurimum per alvum expurgata est, & sic omnino liberata fuit à triplici quartana.

## OBSERVATIO XCVI.

*Febris tertiana.*

**P**etrus Faiole, in Senatu Gratianopolitano Procurator, unus ex Consulibus illius anni, annos natus 40. febre tertiana duplici laborabat 25. diebus, per quos vulgaribus remediis ex alterius Medici præscripto abundè usus fuerat. Vocatus ego die 24. Augusti anni 1645. eum lecto affixum inveni, & solis iusculis utentem, gravibusque paroxysmis quotidie afflictum. Illi autem exhibui febrifugi

mei gr. xv. quibus septies purgatus est per alvum, idque blandissimè, & à paroxysmis febrilibus omnino liberatus.

## OBSERVATIO XCVII.

*Febris quartana.*

**G**abriel Pyot famulus D. Marcha civis Monspelienfis, annos natus 24. febre quartanâ duplici laborans à tribus mensibus, & nullis usus remediis, per illud tempus sumpsit febrifugi gr. xxiv. die 10. Novembris anni 1645. quæ erat dies intermissionis; purgatus est septies ea die per alvum, sine ullo vomitu, aut nausea, & sine ulla molestia: sequenti die bis alvum deposuit. Accessio, quæ quintâ vespertina expectabatur, retardata est usque ad 3. matutinam sequentis diei. Secunda accessio quæ vespertinis horis redire consueverat, nullo modo comparuit, & ab eo tempore æger nullam ampliùs accessionem passus est.

## OBSERVATIO XCVIII.

*Febris quartana.*

**U**Xor Joannis Alles Chirurgi Montfrinenfis, triginta annos nata, febre quartana laborabat à quatuor mensibus, & cum per illud oppidum transirem circa finem mensis Octobris anni 1645. rogatus sum à marito, ut quædam remedia illius curationi idonea præferberem. Video mulierem admodum pallidam & macilentam, cui mentes non fluxerant à principio morbi, & contrectans hypochondria, lienem inveni durissimum, ac ferè scirrholum. Ideo censui febrem quartanam curari non posse, quin obstructions illæ graves prius auferrentur. Præscripsi itaque primum potionem purgantem, & postridie venæ sectionem. Postmodum pilulas ex chalybe, aloë, ammoniaco, aliisque per 15. dies usurpandas, solum emollientem atque aperientem, per usum pilularum singulis diebus hypochondria admoveendum. Quibus diligenter usurpatis, tensio hypochondrii sinistri admodum remissa est, sed accessiones febriles in eodem tenore consistebant: sumpsit itaque febrifugi mei gr. xx. à quo sexies purgata est per alvum, & ab eo tempore nullam ampliùs accessionem passa est.

## OBSERVATIO XCIX.

*Febris quartana.*

**I**ngenuus adolescens Michaël Pineau Romarantinianus, Medicinæ studiosus, cum febre tertiana per quatuor menses afflictus fuisset, tandem in quartanam incidit, eaque laborabat à sex septimanis, cum ad me venit remedium exposcens. Dedi itaque febrifugi mei gr. xx. die 29. mensis Novembris, anni 1645. ea die bis tantum purgatus est per inferiora, idque circa vesperam. Sequenti die quæ erat dies accessionis, decies purgatus est per alvum, & bis per vomitum, nempe horis prandii & cœnæ, & cum assumptis alimentis biliosos humores excrevit, & accessio non apparuit ea die neque deinceps.

## OBSERVATIO C.

*Febris quartana.*

**P**uella sancti Ægidii, nomine Joanna Brunetta decem annos nata, febre quartana laborans à quatuor mensibus, sumpsit febrifugi mei gr. xxi. die 29. mensis Novembris anni 1645. Quinquies purgata est per alvum sine molestia: sequenti die rediit accessio more consueto, & ab eo tempore non ampliùs comparuit, atque ita ægra à morbo libera omnino evasit.

## APPENDIX.

**Q**uia omnes febris quartanæ curationes, sub diversis titulis propositæ, centuriæ limites excederent, ideo sequentes sub eodem titulo comprehendimus, ut ad hanc usque diem, qua hæc prælo subsiciuntur, curationum nostrarum series extendatur. Tum ut ea quæ de febrifugo nostro i. serius dicturi sumus, illustriora evadant.

Cum



Cum Gratianopoli Monspelium peterem mense Octobri anni 1645. Valentiam transeunti occurrit mihi caupo quidam, qui Claudius Boudon nominatur, febre quartana laborans à tribus mensibus; ad cujus oppugnationem nullum remedium usurpaverat, præter unicam venæ sectionem. Præscribo primum potionem purgantem, ad cacochymiam, in primis viis restagnantem evacuandum; quæ febrifugi operationi obsistere potuisset, ex sennæ ʒ. ʒ. diaphæn. ʒ. iii. syrapi rosac. ʒ. i. sumendam postridie accessiois, qua copiosè purgatus est. Sequenti die sumpsit febrifugi mei gr. xx. ter purgatus est per alvum sine molestia, idque tantum circa vesperam. Postridie rediit accessio solito multò longior, & postmodum nulla alia subsequuta est.

In eodem itinere transiens per oppidum, quod *le Bourg Saint Andiol* nominatur apud Vivarienses, rogavit me D. Henricus Chays Chirurgus peritissimus, ut febrifugi mei dosin ipsi concederem pro muliercula quadam, à longo tempore febre quartanâ laborante: cujus voto statim satisfeci; ille post aliquod tempus mihi retulit, illam mulierem à febre quartana, hujus remedii vi statim fuisse liberatam.

Joannes Rideletus in Senatu Gratianopolitano Procurator annos natus 54. febre quartanâ laborabat à tribus mensibus, eaque duplici & sævissimâ; ita ut lecto affixus decumberet, & folis jusculis vesceretur. Summa macie confectus erat, tum faciem, pedes, ac tibias tumore œdematoso affectas habebat, ut in hydropem ruere videretur. Post multa remedia frustra tentata, meam opem implorat die 13. Decembris anni 1645. rigida hyeme existente. Ego verò in pessimo illo statu eum constitutum videns, negabam me specificum meum exhibiturum, ne infamaretur remedium. Attamen uxoris & fratris precibus tandem cedere coactus, remedium exhibeo ad grana xx. die 24. ejusdem mensis. Septies purgatus est per alvum sine molestia, primò biliosa, mox pituitosa multa excrevit. Die 25. ter iterum dejecit eandem materiam. Accessiones perseverabant. Die 27. sumpsit febrifugi gr. xxiv. sexies purgatus est per alvum sine molestia. Sequenti die levem accessiois passus est. Et ab eo tempore febris quartanæ accessiones non redire; saltem per septem dies quibus ego post ultimam accessiois Gratianopoli moratus sum; neque, quid post meum discessum acciderit, rescire hactenus potui; imminens enim hydrops maximum periculum minabatur.

Claudius Mouffseau, artocopus Gratianopolitanus, cui signum est ensis regius, annos natus 40. febre quartanâ duplici laborans, à quatuor mensibus, sumpsit febrifugi mei gr. xx. die 25. Decembris anni 1645. hyeme rigidâ & glaciali existente. Quater purgatus est per alvum blandissimè. Die 24. & 25. accessiones iterum passus est. Die 26. sumpsit febrifugi gr. xxx. Bis tantum purgatus est, sed copiosè, & ab eo tempore nullam amplius accessiois passus est.

Michaël Gounfelin faber ferrarius Gratianopolitanus, à quatuor mensibus quartanâ laborans, sumpsit febrifugi mei gr. xxxii. die 26. Decemb. anni 1645. frigore intensissimo sæviente. Septies purgatus est per alvum, bis verò per vomitum. Sequenti die rediit accessio, prioribus intensior. Die 29. ejusdem mensis sumpsit idem remedium, & sexies purgatus est per alvum sine vomitu ullo, accessio nulla postmodum apparuit.

Martinus Lebreton Parisiensis, Ecclesiæ divi Ludovici Patrum Jesuitarum Musicus, 20. annos natus, febre quartanâ laborans à quatuor mensibus, per quos nulla remedia ex arte usurpaverat, sumpsit die tertiâ Februarii anni 1646. febrifugi mei gr. xx. pluries purgatus est per inferiora tantum. Postridie accessio rediit levissima, & nulla alia deinceps.

Ancilla uxoris nobilissimi viri Domini Mareschalli de L'Hospital, nomine Barba Lepeze, febre quartana duplici laborans ab octo mensibus, sumpsit febrifugi mei gr. xx. die 25. Febr. anni 1646. quæ erat dies intermissiois: sexies purgata est per alvum. Die sequenti eodem modo purgata est, & pari quantitate. Accessio, quæ expectabatur

hora quinta vespertina, rediit hora nonâ matutinâ prioribus similis: Et ab eo tempore nulla amplius accessio comparuit; Sicque ægra à duplici illa quartana contumaci prorsus liberata est.

Pedissequus D. Comitis de Larocheguion, octodecim annos natus, febre quartana laborans à quatuor mensibus, petiit à me auxilium die 27. Februarii anni 1646. Quia verò jamdiu nulla remedia usurpaverat, & cibus quadragesimalibus tunc temporis utebatur; censui præparandum esse corpus venæ sectione moderata, & purgatione ex infusione ʒ. iii. sennæ cum ʒ. ʒ. salis tartari, quâ blandè purgatus est. Die 2. Martii sumpsit febrifugi gr. xx. quæ erat dies accessiois, sed tantum hora sexta vespertina reditura. Octies purgatus est per inferiora tantum. Accessio anticipavit, & rediit hora secunda, prioribus intensior. Die quinta ejusdem mensis rediit accessio, itidem horâ secundâ, prædictæ similis. Die septimâ sumpsit febrifugi eandem dosin, cujus operatio priori fuit similis: rediit tamen accessio more consueto, & consequenter tres alias accessiones passus est, nullo utens remedio. Attamen corpus resiciebat, & faciei color vividior in dies evadebat, nec non ciborum appetentia melior. Post tres illas accessiones & pridie quartæ, sumpsit febrifugi gr. xxii. quibus sexies purgatus est per alvum: accessio rediit postridie paulò remissior, & ab eo tempore æger nullam amplius accessiois passus est, prorsusque à febre quartana liberatus fuit.

#### DE FEBRIFUGO NOSTRO.

**H**Actenus febris quartana pro incurabili habita est in principio, augmento, & statu, quòd materia morbifica illis temporibus nondum sufficienter concocta & præparata sit, ut medicamentis purgantibus educi valeat; & quicunque vehementioribus remediis eam educere nituntur, ex quartana simplici, non rarò duplicem ac triplicem faciant, atque interdum continuam, qua ægrotantes in maximum vitæ periculum conjiciuntur. Hinc factum est, ut prudentiores Medici quartanariis longam patientiam consulant, eosque ad verum tempus demittant, cujus temperies humoris peccantis concoctioni & evacuationi maximè idonea est: hyemis verò frigus tantopere adversum, ut eo vigente febris quartana prorsus incurabilis censeatur, propterea quòd humores tartarei & melancholici magis condensentur, ac veluti congelentur, nec non meatus corporis tum sensiles, tum insensiles constringantur, ut evacuationis, aut diaphoresis spes omnis oblata videatur. Quinimo tanta est non rarò materiæ morbificæ contumacia, ut multæ quartanæ à doctissimis etiam Medicis recta methodo, & maximo vulgari remedium apparatu, tempore idoneo (id est vere, & æstate) oppugnata, eorum vim eludant, & ad annum integrum, imò interdum ad biennium & triennium protrahantur.

Verum enim verò, longus usus & exercitatio diuturna, magna artibus incrementa asferre consuevit, & nova recentiorum inventa antiquorum medicinam ad longè sublimius dignitatis fastigium extulere. Quorum ego vestigiis insistens, cum in penitioribus naturæ arcanis perscrutandis per triginta septem annos, à quibus medicinam facio, sedulam operam navaverim, licet publicis, ac ferè continuis (præter ægrorum visitationes) sectionum, disputationum, aliarumque Academicarum exercitationum occupationibus distractus; attenta cogitatione diu multumque meditatsum; si qua via contumax, & diuturnus iste morbus exiguo tempore vinci edomarique valeret. Ac licet conatus ille perarduus videretur, & propemodum impossibilis, successum tamen optatum (divino numine aspirante, cui sit laus & gloria) obtinere licuit. Tandemque diu meditando, elaborando, experiendo, conjungendo, separando, addendo, detrahendo, augendo, minuendo, varièque varia præparando, verum atque specificum febris quartanæ *παραγομον* inveni. Nolo infallibile remedium pronuntiare, ne agyrtarum vocibus uti videar. Sed quod res est, bonâ fide pronuntiare possum, me ad hanc usque diem nunquam remedium exhibuisse, quin accessiones febriles tertiâ saltem



tem exhibitione cessaverint. In nonnullis tamen vel ob errores in victu, vel ob quasdam materiae morbificae reliquias, intus resistentes, recidiva contigit, quae levi aliqua purgatione, ex vulgaribus medicamentis parata, ut plurimum discussa est.

A quatuordecim tantum mensibus, hoc remedio uti coepi, quod per multos annos in mente agitaveram. Plurimum verò, à quibus haecenus usurpatum est, nomina & historias, scriptis mandavi. In quibus febres quartanae in principio, augmento, statu, tum etiam in media hyeme, eaque gelu rigida, curatae inveniuntur.

Hujus remedii vires ejusmodi sunt, ut humorem melancholicum virtute specificâ oppugnet, illius fermentationem, quae paroxysmi causa est, inhibeat, pravas ejusdem qualitates extinguat, totamque ejus naturam immutet. Sicque omnes turbæ, quas ferus iste humor in corpore humano excitare solet, illico sedantur, eo scilicet imbelli, atque invalido, aquae communis instar, effecto. Quemadmodum enim acetum, sale tartari aut saturni admixto, omnem aciditatem, omnesque vires subito amittit, & aquae simillimum fit; ita humor melancholicus ad specifi sui occursum extinguitur quodammodo, omnemque agendi ac resistendi potentiam amittit: Ita, ut plerumque una illius exhibitione febris quartana profligetur, & raro ad secundam, rarissime ad tertiam confugiendum sit. Cum aliouin materia rebellis, & non prius edomita, centum medicamentis ne minimum quidem commoveri valeat. Unde Medici non raro illius contumaciâ pertæsi, curationem dimittere coguntur. Licet autem hoc remedium febris quartanae oppugnandæ peculiariter destinatum sit; febres etiamnum tertianas, propter analogiam, quae illis cum quartanis intercedit (siquidem febres tertianæ longiores in quartanas plerumque degenerant) unâ die profligat: ut in multis febris tertianæ curationibus supra videre est, unde generico febrifugi nomine à nobis donatum est.

Exactam ac dilucidam hujus remedii descriptionem nondum proponendam censui, donec pluribus aliquot annorum observationibus ejus virtus perspecta fuerit. Ut tamen interim curiosis naturæ indagatoribus inquirendi occasio præbeatur, subobscuram, & tenui velo obvolutam, fidelem tamen, & omni fraude vacuum descriptionem propono: quam filii artis, sedulo adhibito labore, non admodum difficile evolvere poterunt. Componitur ergo

pretiosum hoc medicamentum ex triplici Hercule, id est Sole, Antimonio, & Mercurio, duodecim (destillationibus) laboribus ad summam nobilitatem evecto, quibus tandem quartus athleta Spiritus vini additur, operis complementum efficiens. Dari potest pueris ad gr. x. xii. & xv. Adultioribus vero à gr. xx. ad xxx. & xxxx. Blandè operatur, justâ dosi exhibitum, nec magis conturbat, quàm medicamenta vulgaria, & senna & rhabarbaro composita. Aliquando tamen per vomitum evacuat, si materiae morbificæ portio circa ventriculum hæreat. Hoc enim habet peculiare, ut materiam morbificam ubicumque latentem rectâ viâ adeat, efficaciter aggrediatur, & fortiter oppugnet, donec tandem devicerit. Historiæ supra descriptæ id ipsum apertè indicant. In quibusdam enim vias apertas, & materiam non admodum copiosam inveniens, sine ulla molestia, & cum exigua evacuatione opus suum absolvit, ut in Principe Doria, aliisque contigit. In aliis verò qui nullis, totius morbi decursu remediis usi fuerant, & pravis eduliis corpus suum impleverant; noxiorum humorum multitudinem, & contumaces viarum obstructions, summamque cruditatem inveniens, non sine conturbatione, & labore ægotantis, morbum vincere potuit, ut in pauperibus, & plebeis quibusdam contigit, in quibus prima hujus remedii experimenta facta sunt. Hæc igitur de febrifugo nostro dicta sufficiant.

Specificum hoc Febrifugum Germanorum Chymicorū Decano Hartmanno debetur, qui id ita describit. *z.* Auri puri & optimè purgati *℥.* 8. redige in crustulas tenues, & more solito in aqua Regia ex sale communi, (non verò armoniaco, quia illud Mercurium volatilem reddit,) solve Vitri antum. *℥.* 6. & Mercurii probe mund. *℥.* iii. in aqua forti solve, singula nempe seorsim, ac in separatis vitris, ita tamen, ut solutiones omnes probe sint claræ, & transparentes. Omnes istas aquas confunde, & aquam abstrahere per alembicum, & novam aquam Regiam affunde, sæpius & identidem evoca, idque factantisper, donec præcipitatum in ignita ferreâ laminâ penitus nullum fumum de se emittat. Quo signo præsentî, totum præcipitatum diligenter sub tegula calcina, sic nimirum spiritus aquæ Regis omnes exploduntur & dissipantur. Tandem ab eodem spiritum vini sexies destilla, donec quodammodo figatur Mercurius Denuo sub tegula igniendus, & lentè calcinandus. Ita Hartm. Rolsink. aliique Rivericū Febrifugū explicat.

# LAZARI RIVERII

## OBSERVATIONUM MEDICARUM

### ET CURATIONUM INSIGNIUM.

#### CENTURIA QUARTA.

##### OBSERVATIO PRIMA.

###### Febris hectica.

**F**ilia Domini d'Aumelas, Franciæ Quæstoris generalis, annos tredecim nata, laborabat ab octo mensibus febre lenta, quæ hectica censebatur, propterea, quòd omnibus remediis, quæ ad chlorosin & viscerum obstructions referandas vulgò præscribi solent, à duobus peritissimis Medicis illius curæ successivè incumbentibus, per dictum tempus auferri non potuerat, quin potius morbus ad extremam maciem & summam totius corporis debilitatem ægotantem perduxerat, ut ab omnibus pro deplorata haberetur. Cui judicio maximè favebat vomitus assiduus, qui eam statim à somno matutinis horis infestabat, & usque ad horam prandii perseverabat, ita ut omnia Medicamenta tum alterantia tum vacuantia quæ ipsi matutinis horis exhibebantur, vomitu rejiceret.

Et sic nullus videbatur esse remedio locus. Cum tandem curæ meæ commissa fuisset, præmissis Prognostico, quòd exigua salutis spes superesse videretur, ad duo animum converti; primo, ut remedia antea usurpatis efficaciora adhiberentur: secundò, ut semel assumpta vomitu non rejicerentur. Remedia efficaciora è Spagyricorum officinis erant depromenda. Ut verò facilius retinerentur, gustui non ingrata esse debebant, & illis horis exhiberi, quibus vomitus non urgebat. Ideo cum mihi relatum esset, illam è meridie usque ad horam somni vomitu non tentari, censui remedia vespertinis horis esse exhibenda. Primum itaque præscribo tabellas compositas ex Stomachici Poterii *℥.* ii. & sacchari in aqua rosarum dissol. *℥.* vi. quarum sumebat *℥.* ii. singulis diebus, horis duabus ante cœnam. Continuat hisce tabellis per 8. dies, sumpsit auri diaphoretici gr. iv. ac deinde, per alios 8. dies tabellas Stomachicas continuavit; quibus elapsis aurum diaphoreticum iteratum est, post cujus exhibitionem, febris illa lenta, quæ hectica putaba.



putabatur, omnino disparuit: tum etiam vomitus cessavit. Quamobrem eo tempore etiam matutinis horis remedia exhibita sunt. Sumpsit igitur singulis diebus mane, per mensē integrum, Balsami Peruviani guttas iij. cum saccharo subactas, ad Pilulæ formam, cui superbibebat tantillum vini generosi. Hoc remedium ad ventriculum roborandum, & obstructions referandas eximias vires obtinet. Et per dictum mensē sumpsit etiam quotidie vespertinis horis tabellas stomachicas, & semel in septimana aurum diaphoreticum, sicque ad integram valetudinem restituta est.

## OBSERVATIO II.

*Tertiana duplex.*

**D**ominus Gerardus, in Curia Computorum, Subsidiorum, & Fisci regii Consiliarius, annum agens 63. febre tertianā duplici laborabat à quinque septimanis, in quarum decursu multa remedia administrata fuerant ab alio Medico. Quater secta fuerat vena, pluries purgatus fuerat, & multi julepi, aliaque remedia exhibita. Morbus tamen in pejus ruebat, accessiones graviores evadebant, ut ea die, quā ego vocatus sum, ipsum attonitum, & comatoso quodam stupore affectum invenerim, & adstantes de ipsius salute maxime dubitarent. Tanta autem erat virium prostratio, ut nulli evacuationi locum esse censuerim. Prima igitur die, qua ipsius curationi incumbere cœpi, julepum sequentem exhibui hora una ante accessionem.

℞. Aquæ cichor. ℥. iij. salis absinth. 3. β. spiritus sulphur. ʒ. j. misce, F. julepus.

Secunda die idem remedium iteratum est, etiam hora una ante accessionem, qua transacta, urinæ meliores fuerunt, concoctionis non levia rudimenta ostendentes, quæ antea crudissimæ apparuerant. Tertia die idem julepus iteratus est eadem hora, & accessio perexigua fuit. Quarta die mane sumpsit portionem sequentem.

℞. Senn. mund. ʒ. ij. salis tartari 3. β. spirit. vitriol. ʒ. β. aquæ cichor. ℥. iv. infundantur frigide per noctem, & colaturam capiat manè cum regimine.

Pluries purgatus est cum euphoria, & ea die accessio non apparuit, neque deinceps, & ita perfecte curatus est.

## OBSERVATIO III.

*Hydrops Thoracis.*

**D**ie vigesima mensis Junii, anni 1646. vocatus sum à D. Daniele Verchando, Cive Monspeliensi quinquagenario, maxima spirandi difficultate à tribus mensibus laborante, ad quam amoliendam multis remediis tum à medico ordinario, tum in variis consultationibus præscriptis usus fuerat, sed frustra: eum enim inveni anhelantem, & extremos penè spiritus exhalantem præ suffocatione, qua urgebatur. Censui eum pectoris hydropē laborare, cum neque tussis, neque stertor adesset, neque ulla sputa viscida & crassa excernerentur, ut in vero asthma te solet fieri. Præterea tibiæ œdematosæ tumore affectæ erant, & venter intumescere incipiebat, ut jam asciticus fieri videretur. Insuper in lecto à duobus mensibus non decubuerat, sed diu nocteque in Cathedra corpore erecto sedere cogebatur. Ego verò de illius salute desperans, volebam ipsi remedia præscribere, verum ipse instanter urgebat, ut summam illam respirandi difficultatem minuerem. Quamobrem illius precibus victus aliquod saltem solatium ipsi afferre contendens, exhibui die sequenti bolum ex Calomelanos ʒ. j. cum diacryd. ʒ. β. in conserva rosarum. Septies purgatus est per alvum, & magnam sericopiam excrevit, unde maximum levamen eadem die recepit, ita ut liberius modo quàm antea respiraret. Post biduum iteratum est remedium, pari successu, & sequente nocte in lecto decubuit, sine ulla pectoris oppressione, ventris tumore imminuto, hypochondria contrectare licuit, & lienem magnum atque scirrhum inveni: ideo

*Lazar. Riverii Opera.*

præcipi apozemata aperientia cum sale Tartari & spiritu sulphuris, tum etiam fots & linimenta, hypochondriis admovenda, cum iterata tertio quoque die purgatione prædicta. Quibus per 15. dies continuatis, ad longè meliorem statum revocatus est, ut se curatum omnino putaret. Attamen elapso uno mense omnia symptomata rediere, venter magis intumuit, & post duos alios menses è vivis excessit. In hac Observatione notanda est summa Calomelanos efficacia, quod in morbo lethali tantum adjuvanti afferre potuit.

## OBSERVATIO IV.

*Paralysis.*

**J**oannes Alberger quinquagenarius, à quatuor mensibus hemiplegia laborabat, partem corporis dextram occupante, ita ut vix loqui, & verba pronunciare valeret. Ab anno integro hoc morbo affligebatur, & per illius decursum multa usurpaverat remedia cum exiguo fructu. Ego verò, illius curationem aggressus, die 26. mensis Junii anno 1646. bolum præscripti ex Bezoardici mineralis granis xij. cum conserva rosarum, bis in die sumendum, & quinto quoque die pilularum coctiarum minorum ʒ. j. cum Mercurii calcinati per se, sine corrosivis, gr. viij. Quibus per 20. dies continuatis, pristina sanitati restitutus est.

## OBSERVATIO V.

*Hæmorrhagia.*

**V**ir robustus 30. annos natus, bilioso temperamento præditus, contumaci hæmorrhagia ad extrema redactus fuerat. Post multa remedia, frustra tentata, tandem cujusdam Medici consilio è lecto in pavementum delatus est supra mattam laneam, & totum corpus contextum linteis, oxycrato madidis, per longum tempus, donec rigore correptus est, tunc enim ad lectum deportatus, & rigorem febris subsequuta est, quam sudor excepit, à quo curatus est. Collum etiam iisdem linteis obducebatur.

## OBSERVATIO VI.

*Hysterica passio.*

**D**ie 17. Junii anni 1646. ancilla uxoris meæ, nomine Ludovica Costa, subito correpta est dolore atrocissimo latus dextrum & lumbos tam immaniter infestante, ut illa continuo ejulare cogeretur. Cum nulla febris adesset, existimavi affectum esse hystericum. Ideo statim oxycrati cyathum exhibui, quem post horæ quadrantem vomitu rejecit, cum multa pituita. Sedato vomitu, alterum oxycrati cyathum hausit, & statim dolor protinus evanuit, eaque prorsus liberata est.

## OBSERVATIO VII.

*Dolor Nephriticus.*

**D**ie 20. mensis Julii anni 1646. C. Jacobus Lemadre Medicinæ studiosus, filii mei præceptor, correptus est dolore nephritico valde urgente. Urinæ erant rubræ & sanguinolentæ. Primum injectus est clyster ex decocto emolliente: cum diaphoen. ʒ. j. aquæ benedict. ʒ. iij. qui parum præstitit. Sequenti die missus est sanguis ad ʒ. x. quia erat plethoricus. Dolor tamen perseverabat. Tertia die iteratus est clyster prædictus, qui eum tota die purgavit blandè, & per dilucida intervalla; eademque die à dolore prorsus liberatus est, excretis duobus calculis perexiguis. Clyster prædictus ad dolores Colicos & Nephriticos præstantissimus est, ut in aliis Centuriis videre est. In hac autem curatione hoc peculiariter annotandum, quod si prima vice injectus clyster votis non respondeat, semel atque iterum repetendus sit.

Y y y

OBSER-



## OBSERVATIO VIII.

*Cholera morbus.*

**U**Xor Petri Portalon, civis Monspeliensis, correpta est Cholera morbo die 23. Julii anni 1646. circa meridiem, & ad vesperam usque vigesies alvum deposuit, cum gravissimis doloribus, non solum intestina, sed etiam ventriculum infestantibus, ita ut sequenti etiam vomitu premeretur, multosque humores acres, & biliosos excerneret. Maritus à me consilium petiit vespertinis horis; dum alia remedia pararentur, consulo, ut ægra oxycrati cyathum assumeret, cujus adeo efficax fuit operatio, ut vomitus & alvi fluxus statim cohibitus fuerit, & alia remedia usurpata non fuerint; dictitante ægrâ, se à morbo liberatam, & pristina valetudini restitutam.

## OBSERVATIO IX.

*Carbunculus.*

**F**ilius Petri Boujac, Mercatoris Monspeliensis, quartum ætatis annum agens, Carbunculo afflictus à triduo integro, per quod nullum remedium usurpatum fuerat, à me invisus est die 22. mensis Junii, anni 1646. Erat autem Carbunculus in media fronte, cum tumore rubicundo, in medio nigerrimo, & tota facies valde inflata erat. Jubeo primum ad fixandum Carbunculum, causticum inuri parti nigranti, & imponi escharæ unguentum Basilicum cum Theriaca, ol. Scorpion. Matthiol. & vitello ovi: toti verò tumori cataplasma de Arnoglossio. Eodem tempore clyster injectus est, eoque rejecto, venæ sectio iterata: quæ horis matutinis, tum etiam pridie celebrata fuerat. Vescitorium cervici admotum, & potio Cardiaca præscripta; tum etiam confectio de hyacintho, in singulis jusculis exhibenda. Sequenti die febrem valde imminutam, tumoris inflammationem remissam, & omnia mitigata invenio; unde proximam salutem sperandam censui. In hoc casu notandus est præcipue vescicatorii usus, quod magnam humoris virulenti portionem derivans, præcipuam curationis partem fecisse credibile est. Ideo in omni carbunculo usurpandum censeo, & parti viciniore admovendum. Defensivum ex unguento de Bolo quod vulgo in his affectibus usurpatur, adhibendum non existimavi, quia repellentia, faciei admota, in illius inflammationibus admodum noxia sunt.

## OBSERVATIO X.

*Epilepsia.*

**A**ncilla Epileptica usu oxycrati liberata est, cujus cyathum sumebat manè, singulis diebus; & ante tempus invasionis acetum purum. Curato morbo doloribus artuum correpta est, qui usu Thermarum curati sunt.

## OBSERVATIO XI.

*Hæmoptœ.*

**J**ohannes Figuiere Civis Monspeliensis hæmoptœ laboraverat per triennium, quâ sanguinem rejiciebat per intervalla, satis magna copia. Tandem post multa remedia, per mensem integrum, manè sumpsit amyllum, aquâ decoctum (& sine calce paratum) instar Panatellæ, & ab eo tempore sanguinis sputo nunquam correptus est.

## OBSERVATIO XII.

*Febris tertiana.*

**M**ense Augusto anni 1646. Guilelmus Dortomanus, Patronus celeberrimus sexagenarius, bilioso temperamento præditus, laboravit febre tertianâ vehe-

menti, eique quater secta fuit vena, & semel purgans medicamentum exhibitum intra dies 14. Præterea julepi refrigerantes & aperientes fuere usurpati, tum ante sextam & septimam accessionem specificum exhibitum est ex salis absint. 3. β. spiritus sulphuris 3. j. cum aquæ cichor. 3. iij. quibus accessiones imminutæ sunt, eodem tempore, in primo potu sumebat, vigente febre, spiritus sulphuris guttulas 15. in aqua fontis. Tandem horâ unâ ante octavam accessionem secta fuit vena, præmisso decocto chammom. & cremoris tartari, & Emplastrum Strobilbergeri carpis admotum est, quibus remediis imminens accessio fugata est, ut nulla ejus vestigia apparuerint.

## OBSERVATIO XIII.

*Febris quartana.*

**F**ilia Domini Ducabè Poussanensis, 15. annos nata, febrem quartanam patiebatur à 14. mensibus. Monspelim adducta est, ut mihi curanda traderetur: Illi exhibui febrifugi mei grana 16. die 22. mensis Augusti & decies purgata est per alvum, bis etiam per vomitum, quo humores primum acidos, mox amaros excrevit. Unicam accessionem passa est ab assumpto medicamento, & nullam aliam deinceps.

## OBSERVATIO XIV.

*Calculus vesicæ.*

**I**llustrissimus vir, Dom. de Burcin, Senatus Gratianopolitani Præses, mense Augusto anni 1645. correptus est dolore Nephritico, à quo post aliquot dies liberatus est derepentè, etiamsi nullum Calculum excreverit, cum tamen aliàs, simili dolore tentatus, per lapillorum excretionem liberari consuevisset; unde conjeci, Calculum à renibus per ureteres excessum, fuisse retentum in vesica. Nec falsa fuit conjectura; siquidem ab eo tempore titillationes frequenter patiebatur circa vesicæ sphincterem, urinæ acrimoniam, & dolores, ad balani extremitatem sese porrigentes. Multa usurpavit remedia toto anno, per intervalla, ac tandem mense Augusto anni 1646. calculum excrevit nucis avellanæ magnitudinem æquantem, sed figuræ oblongæ, olivam referentis: At verò tanta difficultate ferebatur per virgæ canalem, ut intra 25. tantum horas à vesicæ orificio ad balani radicem pervenerit; ubi meatum angustiores inveniens nullo modo eum pervadere potuit, atque adeo necessum fuerit balani incisione illum extrahere, quæ in parte inferiori propè frenum celebrata est. Remedia quæ ultimò usurpata sunt, & quibus præcipue calculi exclusio adscribitur, talia fuere.

Post evacuationes universales usus est per mensem integrum pilulis, ex salibus baccarum hederæ & nasturtii aquatici, crytallo tartari, & minerali part. æqualibus, cum terebinthina, in massam pilularum redactis, de qua sumebat drach. j. mane singulis diebus, postea verò per novem dies sumpsit aquæ ceparum albarum in vino albo destillatarum 3. iij. cui aquæ addebatur sal ex capite mortuo elicatum, & nona die prædicti calculi excretio contigit.

## OBSERVATIO XV.

*Febris tertiana.*

**D**om. de Craucet, in curia Præsidiali Præses & judex major, correptus est febre tertianâ duplici, mense Augusto anni 1646. Febrem esse malignitatis participem, ostendebat pulsus non admodum frequens in paroxysmo, & summa perfrigeratio extremorum, quæ toto accessionis decursu non recalescebant. Bis illi secta fuit vena, & bis ptisana laxans ac refrigerans exhibita, tum etiam spiritus Sulphuris, in quibusdam accessionibus, ad guttas 15. cum aquæ cyatho permixtus propinatus est. Julepus ex aqua Cich. spiritus sulph. & sale absinth. bis usurpatus est paulò ante paroxysmum, & emplastrum Siro-



Strobelbergeri carpis admotum. Ac denique aqua theriacalis refrigerans, & nobis descripta capere de febre pestilenti, ad 3. iij. exhibita est, ante duos postremos paroxysmos. Quibus remediis intra 15. dies à morbo illo periculoso liberatus est.

## OBSERVATIO XVI.

*Febris tertiana.*

**D**Om. Massauve, Quæstor Franciæ Generalis mense Augusto anni 1646. duplicem tertianam patiebatur, in qua duo paroxysmi apparebant in una die, altera existente vacua. In alterius Medici manibus fuit per 12. dies, morbo quotidie in pejus abeunte. Meam postmodum opem imploravit, eodemque die febrem passus est ex duplici paroxysmo constantem, per 30. horas. Initio sequentis accessionis sumpsit ex meo præscripto decoctum Chamæmeli & crystalli tartari, eodemque tempore facta fuit vena, & emplastrum Strobelbergeri admotum. Unicam tantum accessionem passus est, eamque levio-rem, ac triduo post omnino liberatus est, sumens in duobus paroxysmis spiritus sulphuris guttas 15. & julepos refrigerantes, cum eodem spiritu bis in die. Ante penultimam accessionem sumpsit. Pisanam laxantem & refrigerantem; & ante ultimam hausit aquæ Theriacalis refrigerantis nostræ 3. iij. Tum etiam admotum ventriculo cataplasma ex Tanaceto, pulveribus aromaticis, & Terebinthina, in placenta rosacea, quæ ultima accessio ferè nulla fuit.

## OBSERVATIO XVII.

*Variole.*

**F**iliolus N. Benoist, Mercatoris Monspeliensis, natus menses 23. variolis correptus, secunda morbi die in coma & convulsiones incidit, cum tanta virium prostratione, ut intra paucas horas moriturus videretur. Vocatus ad eum die 12. mensis Novembris, anni 1645. quæ erat secunda morbi dies, venæ sectionem statim præscribo, & sanguis detractus est ad 3. iv. deinde exhibetur ex cochleari frequenter julepus, compositus ex aquæ Cardui benedicti & Scabiosæ an. 3. iij. Trochisc. viperinorum, & Bezoardici mineralis an. 3. j. Eodem tempore exhibebatur tertia quaque hora Bezoardic. mineralis 3. 6. cum pauco jusclo; quibus per biduum continuatis, totum corpus variolis conspersum fuit, quæ postmodum ad decentem magnitudinem increverunt, & æger reliquis morbi temporibus feliciter defunctus est.

## OBSERVATIO XVIII.

*Pleuritis spuria.*

**U**Xor Dom. du Cros, in Curia Computorum Auditoris, Erysipelas passa est in tibia, per septem vel octo dies, cum febre continua. Ab utroque affectu liberata, curâ & diligentia Medici ordinarii, aëri frigido sese præmaturè exposuit, unde in lateris dolorem incidit, cum febre, tussi & difficultate spirandi; tum etiam sputa nonnulla sanguine infecta apparuerant. Secta fuit vena bis, ter, & reliqua remedia Pleuritidi conferentia administrata. Vocatus ego in consilium, die 19. mensis Novembris, quæ erat quinta dies morbi, censui purgans medicamentum esse exhibendum die sequenti, quod tamen contra leges artis, & vulgarem methodum esse videbatur, quibus sancitum est, ante septimum morbi diem purgans medicamentum Pleuriticis non esse exhibendum. Verum sequentes rationes purgationem illam suadere videbantur: primò quòd Pleuritis illa vera & exquisita non apparebat à systrophica inflammatione genita, sed potius spuria, à fluxione quadam tenui & serosa, vel etiam vaporibus acris, ex cacochyminia in ventre inferiori contenta elevatis, & membranam costas succingentem velli- cantibus. Id ex eo colligebatur, quòd sanguis in uno vel

*Lazari Riverii Opera.*

altero tantum sputo apparuerit, isque paucissimus. in stat filamentum, qui à Pleurâ inflatus tantæ exiguâ copia prodire non potuerat, sed potius à venulâ quadam apertâ tussis vehementiâ, vel à cerebro defecare potuit, cum ægra circa idem tempus levem hæmorrhagiam passa fuerit. Secundo, quòd dolor ille continuus non fuerit, sed per intervalla deimens ac rediens; qui ipso consultationis tempore nullus ferè apparebat, tum etiam febris erat admodum remissa. Tertiò, quod per totum posterioris invasionis tempus assiduæ vigiliæ adessent licet lateris dolor, etiam nocturnis horis, valde interdum remitteretur, unde colligere licuit, intensas illas vigilias ab humorum putredine potius, & à febre essentiali, quàm à Pleuritide dependere. Quarto, quod a gra toto illo tempore, quo erysipelate laboravit, purgans medicamentum, à Medico ordinario præscriptum, sumere noluerit, atque adeò tota pravorum humorum congeries intus conclusa remanserit. Sumpsit igitur purgans medicamentum die sexta posterioris hujus morbi, ex Sennâ, Rhabarbaro, Maniâ & syrupo rosaceo compositum, à quo blandè purgata est, cum felici successu: Nunquam enim amplius lateris dolorem sensit, neque vigiliis afflicta est, sed tantum febricula quadam, vespertinis horis apparente. Postmodum lenibus aliquot remediis usurpatis, integram valetudinem adeptæ est.

## OBSERVATIO XIX.

*Panaritium.*

**U**Xor Domini Sarrai in Curia Computorum & Subsidiorum Consiliarii, panaritio laborans à quatuor diebus, immisit digitum in aurem felis, & intra horæ quadrantem curata est. Sentiebat per intervalla calorem humeros & brachium invadentem, ac sensim descendentem, cum gravissimo extremi digiti dolore, qui calor postmodum evanescebat, & paulò post denuò invadebat, cum simili dolore. Felis verò ex dolore auris sese violenter commovebat, ut à duobus hominibus agrè contineretur. Hinc colligere licet in capite felis esse vim quandam magneticam, panaritii qualitatibus familiarem, cujus beneficio venenum, in tumore illo latens, ad se trahat.

## OBSERVATIO XX.

*Febris duplex tertiana.*

**D**ie 27. Octobris anni 1646. vocatus ad oppidum Aimargues dictum, ut inviserem uxorem Dom. Columbi, Computorum Auditoris, annos 22. nata, quæ laborabat duplici tertiana, à septem diebus. Secta fuerat vena semel, & nihil aliud præstitum. Octavâ die iterata venæ sectio ex brachio sinistro, quia lien tensus & tumidus apparebat. Nonâ sumpsit infusum Sennæ cum 3. 6. salis Tartari; eâdem die, febrile Crollii ante accessionem. Decimâ febrile iteratum, & accessio non rediit.

## OBSERVATIO XXI.

*Cordis palpitatio & pulsus inæqualitas.*

**D**ominus de Becheran in Curia Computorum, Subsidiorum & Fisci Regii Consiliarius, principio mensis Novembris anni 1646. ad me venit, & de palpitatio- ne cordis aliquot diebus ipsum infestante conquestus est. Pulsus illius contrectans, illum inæqualem invenio omni genere inæqualitatis, ita ut statim mihi in memoriam revocaverit historiam illam Antipatri Medici apud Galenum, quem ipse censuit habere obstructions in levibus arteriis, vel crudum tuberculum. Nulla erat tunc temporis respirandi difficultas, & æger munia consueta obibat, quotidie ad Curiam se conferens neque ulla remedia nisi diebus festis usurpare volebat. Præscripsi statim venæ sectionem iteratam, ac postmodum purgationem, à quibus

Y y y 2 meliuscu-



inclinulè habuit. Post 10. vel 12. dies iterum conqueſtus eſt de eodem affectu, varia præſcripti remedia attenuantia & incidentia, citra calefactionem, quibus tamen non uſus eſt, variis diſtriſtus negotiis. Tandem principio menſis Decembris decubnit, cum difficultate ſpirandi laborare inciperet, & tibiæ inflatæ apparent; tum temporis remedia prædicta uſurpavit, cum iterata phlebotomia, quæ cum per 12. dies continuata nihil operis attuliſſent ſed malum perpetuò in pejus rueret, convocatum eſt conſilium aliorum Medicorum, quorum ſententia fuit, eſſe affectum ſimilem illi, qui recensetur à Galen. quarto de loc. affect. cap. 8. de Antiſpatro Medico; & ita incidentibus atque attenuantibus remediis eſſe oppugnandum. Variæ remediorum formulæ in hunc finem præſcriptæ, quas recensere foret ſuperfluum, quia nihil proſuere, ſed æger perpetuò in pejus ruebat, ſumma ſpirandi difficultate laborabat, & pulſus nullus apparebat in carpo, adnota tamen manu ſupra regionem cordis, palpitatio ſentiebat frequentiſſima, debiliſſima, & inæqualiſſima: aucta etiam erat tibiæ inflatio, ut jam etiam crura invaderet. Remedia præſcripta fuere prioribus ſimilia, quibus addita ſunt cardiaca interna & externa. Biduo poſt, æger ad extrema redactus videbatur: ſuffocatio ingens aderat, & pulſus in brachio nullo modo, in corde vix percipiebatur. Eadem die moriturus putabatur: cucurbitulam apponi jubeo regioni cordis cum ſcarificatione, cujus beneficio Zacutus Luſitanus obſerv. 133. lib. 1. praxis admirandæ ſiquidam ægrotum à deſperata cordis palpitatione liberaviſſe teſtatur. Meliusculè habuit, & nocte inſequente cœpit excernere per ſputum ſanguinem nigerrimum, craſſum & glomeratum, cum tuſſi moleſtâ, unde levior reſpiratio fieri cœpit. Ad exſpectorationem juvandam utebatur frequenter ſyrupo de tuſſilagine, cum quarta parte oxymelitis ſimplicis, & juſculum galli veteris cum pectoralibus ſemel aut bis quotidie exhibebatur. Hiſce remediis, per quatrduum continuatis, æger in eodem ſtatu perſtanebat, ſanguinem continuò nigrum & craſſum excernens. Quintâ die à ſanguinis ſputo, quæ erat quarta Januarii, anni 1647. exhibui Elixir proprietatis ad guttas xij. cum tantillo vini generoſi, à quo levamen percepit æger, & tota nocte facilius fuit anacathariſis. Die ſexta iteratum eſt Elixir, tum etiam juſculum galli veteris: verum inde non melius habuit; ſed actu in dies ſpirandi difficultate, & ſanguinis ſputo etiam plurimum aucto, die octavâ vespertinis horis interiit. Aperto cadavere inventus fuit cordis ventriculus uterque ſanguine concreto repletus, ac diſtensus, cum etiam totus pulmo ſanguine multo reſertus viſus eſt; unde caloris nativi ſuffocatio in utraque parte contigit. Paucis ante obitum diebus cauſa hujus morbi procataſtica relata eſt, quam æger nunquam retulerat; terror ſcilicet inſignis, quo ille graviter affectus fuerat, dum Arelate Monſpelium petens, ſupra Rhodanum cum familia ſua in naufragii periculo verſatus eſt. Hinc conjicere licuit, à terrore ſanguinem retractum fuiſſe magnâ copiâ ad cor, ut ab eo regi non potuerit; ſed in ejus ventriculis concreverit: ac deinde cor, onus grave excutere continuò tentans, motus illos palpitantes, tremulos, & inæquales ediderit, tum ſanguis per venam cavam jugiter aſcendens, liberum aditum ad cor non inveniens, ad pulmonem reſluxit, eumque implevit. Prætereà in ſiniſtro cordis ventriculo inventæ ſunt carunculæ rotundæ; ſubſtantiam pulmonis æmulantes, quorum major ad avellanæ molem accedebat, & arteriæ aortæ oſtium præcludebat, unde pulſationis defectum in arteriis contigiſſe exiſtimo. Illas autem carunculas genitas fuiſſe puto à ſanguine redundante, quem calor inſignis ventriculi ſiniſtri excoxerat, & in huiusmodi ſubſtantiam commutaverat. Caruncula ſimilis, & multo major ante oſtiduum inventa fuit in dextro cordis ventriculo cujuſdam militis, qui in Theatro Anatomico diſſectus fuit, poſtquam ab alio milite occiſus fuiſſet. Ille tamen antea bona fruebatur valetudine, quia caro illa parietibus ventriculi ex parte adhærebat. Ideo venarum oriſicia non occludebat. Ex prædictis patet ſanguinem aliquando in cavitatem aliquam effuſum, in huius-

modi carunculas converti, à calore concoquente: quod multis aliis exemplis confirmare poſſumus: Hoc ſaltem erit inſtar omnium, tanquam notiſſimum, quod plurimæ mulieres, præcipuè ſteriles, dum patiuntur purgationes menſtruas carunculas exiguas cum ſanguine menſtruo frequenter excernere conſueverunt. Quod quidem in calidiori temperamento præditis magis contingit, quia à calore uteri excedente exiguæ ſanguinis portiunculæ excoquuntur, & in ejuſmodi carunculas commutantur.

## OBSERVATIO XXII.

*Lues venerea inveterata.*

**Q**uidam aulicus Monſpelium venit, pro curatione luis venereæ, quæ à xvj. annis laborabat, cum exoſtoſibus in utraque tibia, à quibus dolores inſignes patiebatur, ut noctes inſomnes tranſigeret. A me curatus eſt perfectè intra menſem, inſtituta venæ ſectione utriuſque brachii, purgatione per apozemata, & diata ſudorifica ex decocto Guajaci & Antimonii per 20. dies continua, bis in die. Sudores autem eliciebantur cum vapore ſpiritus vini. Quinto quoque die exhibebam antivenerei doſin: exoſtoſes verò ſublatae ſunt veſicatoriis, iſſque bis aut ter iteratis, cum fluere deſinebant, & exſiccatae erant.

## OBSERVATIO XXIII.

*Rara Hemitritæi ſpecies.*

**J**oannes Gerardus, Civis Sommedriënſis, febre continua pituitosa laborabat, menſe Februario anni 1647. Cui hoc notatu dignum contigit. Die 28. morbi febris continuæ acceſſerunt paroxyſmi febris tertianæ, à rigore inſigni incipientes, qui bis in die recurrebant, & febre intensâ ad multas horas perſeuerante, qui ſudore terminabantur manente perpetuò febre continua: ita ut hæc febris dicenda videatur ſpecies hemitritæi, ex Quotidiana continuâ & Tertianâ intermittente quadruplici. Si enim duplex Tertiana dicitur, quæ ſemel recurrit ſingulis diebus, rationi conſentaneum eſt, eam quæ bis in die invadit, quadruplicem nominari. Triplicem aliàs notavi Tertianam, quæ intra duos dies ter recurrit, nempe poſt ſingulas ſedecim horas.

## OBSERVATIO XXIV.

*Tonſillarum, faucium, & linguæ inflammatio.*

**I**n fine menſis Februarii anni 1647. uxor Domini d'Aumelas, Quæſtoris Franciæ Generalis, correpta eſt prædicto affectu, quo deglutiendi & loquendi facultas adempta eſt. Poſt quatuor phlebotomias, perſeuerante malo, & linguâ multis ulcuſculis infectâ cum judicarem hunc morbum à fluxione ſeroſæ materiæ acerrimæ exoriri, & purgationem eſſe neceſſariam, ægra autem medicamentum ſumere non poſſet; cum vix juſcula paulatim forbilaret, exhibui Reſinæ jalapæ gr. vj. in ovo ſorbili, cujus remedii opera blandè & copioſè purgata eſt, & poſtridie liberè loqui & comedere cœpit.

## OBSERVATIO XXV.

*Febris tertiana duplex.*

**M**enſe Julio anni 1647. Dominus de Roüanel in Eccleſia Cathedrali Archidiaconus major, 30. annos natus, laboravit febre tertianâ duplici, cujus acceſſiones erant graviſſimæ & longiſſimæ, magnis inquietudinibus comitatæ, cum inſigni capitis dolore, etiam extra acceſſiones perſeuerante. Urinæ erant rubicundiſſimæ. Poſt celebratam bis phlebotomiam, & leve medicamentum purgans exhibitum, ſumpſit horâ unâ ante acceſſionem potionem, ex ſalis abſynth. 3. ſ. ſpiritus ſulph. 3. aquæ ci hor. 3. iij. eodem tempore admotum eſt carpiſ emplaſtrum

Stro-



Strobelbergeri, & accessio non apparuit, neque deinceps, quamvis urinæ rubræ, & alia symptomata ostenderent, morbum adhuc esse in vigore. Diebus consequentibus per levem alvi fluxum materia morbifica expurgata est: ad capitis dolorem maxime profuit cucurbita recens, contusa, plantis pedum admota, instar cataplasmatum, & frequenter iterata.

## OBSERVATIO XXVI.

*Vomitum sanguinis ab hausta in potu hirudine.*

**Q**uidam rusticus vomitu sanguinis laborabat, qui nullis remediis per multos dies usurpatis sedari poterat. Medicus cupiens sanguinem in ventriculo collectum educere per vomitum, qui graviter ægotantem infestabat, & oppressionem insignem in ea parte efficiebat, præscripsit olei amygd. dulc. ℥. ij. quibus vomitus excitatus est, vomuitque sanguinem concretum, simulque hirudinem unam, sese in terra commoventem. Hæc erat causa ignota & rara sanguinis vomitus: Retulit postea æger, se in rivulo aquam bibisse, cum qua simul hirudinem hauserat.

## OBSERVATIO XXVII.

*Alvi fluxus diuturnus, cum febre lenta.*

**F**ilia Domini de la Coste Piscenenfis, octavum ætatis annum agens, laborabat à tribus mensibus alvi fluxu bilioso, cum febre continua & lenta, ita ut in magno vitæ periculo versari videretur, propterea, quod illius frater in eadem ætate à simili morbo extinctus fuerat. Ad eam vocatus, sequentia præscripsi remedia.

℥. Fol. plantag. m. β. tamarind. ʒ. iij. coquantur ad ʒ. iv. in colatura infunde rhabarb. elect. ʒ. i. fantali citrin. ʒ. j. colentur iterum, & adde syrupi de absinth. Pontico ʒ. β. rhab. pulverati ʒ. j. fiat potio, quam capiat manè cum regimine.

℥. Tincturæ corallor. cum succo limonum recenter paratæ ℥. j. capiat ʒ. j. manè, cum paucis saccharo rosaceo, per octo dies.

Post usum tincturæ corallor. reiteretur potio laxans prædicta.

℥. Rad. gramin. asparag. brusc. & cortic. mediani tamarisci an. ʒ. β. fol. agrimon. pimpinel. ceterach. capillor. ven. an. m. β. rasuræ eboris, & fantali citrin. an. ʒ. j. coquantur ad ℥. j. colaturæ adde syrupi capillor. ven. ʒ. j. β. fiat julep. pro tribus dosibus matutinis, addendo unicuique dosi salis absinthii & tamarisci an. ʒ. β. hisque finitis reiterentur pro totidem dosibus. Utatur pro potu ordinario aqua infusionis chalybis, & rhabarb. in nodulo.

℥. Olei de capparib. & tamarisci an. ʒ. ij. illinatur totus venter calidè, manè & serò.

℥. Olei nucis moschatæ ʒ. β. balsami peruviani ʒ. ij. misce, illinatur regio stomachi, calidè dictis temporibus.

℥. Rasuræ eboris & margarit. præparat. an. ʒ. ij. salis absinth. & tamarisc. an. ʒ. j. fiat pulvis; de quo capiat ʒ. β. cum singulis jusculis & panatellis.

Hisce remediis intra mensem convaleuit. Et quum post annum in eundem affectum incidisset, iteratis iisdem remediis, liberata est, & ab eo tempore optima fruitur valetudine.

## OBSERVATIO XXVIII.

*Coma, seu subeth puerorum.*

**D**ie 28. mensis Septembris anni 1647. filius Domini Ducros, in curia Computorum Auditoris, quinque annos natus, crassus & obesus, incidit subito in comatosum affectum, cui convulsiones interdum superveniebant. Vocatus, statim præscribo clysterem ex hiera, diaphœnicone, aquâ benedictâ, quo multum purgatus est. Rejecto clystere, exhibeo salis vitrioli ʒ. ℥. & provocato cum penna vomitu, multam pituitam excrevit, ac paucis post horis liberatus est.

## OBSERVATIO XXIX.

*Lues venerea antiqua.*

**V**ir quadragenarius, ex superiori Occitania ad nos venit, pro curatione luis venereæ, quæ à 12. annis, laborabat. Tres insignes exostoses habebat in capite à multis annis, & tumorem scirrhum in testis sinistro, pugni magnitudinem æquantem. Pluries tractatus fuerat per dietas sudorificas & hydrargyrosim, sine successu. Principio mensis Octobris anni 1647. usus est per 20. dies decocto chinæ & falsæ parillæ cum primario, tum secundo, sine sudore, & quinto quoque die pilulas anti-venereas sumebat. Postmodum per 15. dies sumpsit decoctum ad luem inveteratam, ex china, falsâ parilla, putaminibus nucum, & antimonio compositum: intra illud spatium exostoses discissæ sunt emplastro vesicante: tumor verò testiculi sufficit aceti, & emplastro de sulphure.

## OBSERVATIO XXX.

*Febris quartana.*

**U**xor Domini le Thaneur artis scribendi Magistri, 30. annos nata, febre quartana duplici laborans à tribus mensibus, sumpsit die intermissionis, quæ erat 15. Decembris anni 1647. febrifugi grana xx. ter blandè purgata est, & accessiones consequentes prioribus similes rediere. Altera die intermissionis sumpsit febrifugi. gr. xxv. & nullus effectus sensibilis apparuit, nullaque evacuatio subsequuta est, & accessiones subsequentes perexiguæ, ac ferè nullæ apparuerunt, & brevi postmodum omnino convaleuit.

## OBSERVATIO XXXI.

*Dolor dentium.*

**D**ie 30. Decembris anni 1647. gravissimo dentium dolore afflictus sum, qui cum circa mediam noctem intolerabilis evasisset; frustulum tabaci ore assumpsit, & diu leviter malicavi, donec vomitus excitatus est, quo omnia alimenta in cœna assumpta rejecta sunt, & cum in multa pituita, dolor verò intra duas horas evanuit.

## OBSERVATIO XXXII.

*Hydrops.*

**I**llustrissimus Archiepiscopus Abredunensis, annos natus 56. hydropicè laborans, me vocavit circa medium mensem Aprilis anni 1648. Præter tumorem ventris insignem, & tibias valdè inflatas, duobus gravibus symptomatibus affligebatur: nempe siti inextinguibili, & difficultate spirandi, quam inquietudines nocturnæ comitabantur. Purgatus fuit pluries mercurio vitæ, correcto cum spiritu salis, quo serosi humores evacuati sunt, & ablata spirandi difficultas; Sitis spiritu salis sublata est, cujus guttas xx. sumebat manè cum jusculo, & vesperi cum aqua potabili. Omnia symptomata cessarunt, & venter detumuit, quia verò propter ætatem, & viscerum imbecillitatem novus aquarum proventus sensim cumulabatur, ad impediendam recidivam purgatus fuit bis in mense, prædicto remedio, & sumpsit quotidie tabellas ex confectioe alkermes cum bezoardico minerali. Hoc modo vixit per triennium cum minori incommodo, & sine hydropis recursum; donec tandem, viribus deficientibus, ferè sine morbo conspicuo extinctus est.

## OBSERVATIO XXXIII.

*Febris tertiana duplex.*

**D**ie 15. Septembris anni 1648. vocatus sum ad Illustrissimum Episcopum Agathensem, febre tertianâ laborantem: Illa autem primò simplex fuerat per octo

Y y y 3

accessio



accessiones, mox in duplicem conversa est, illiusque accessiones quatuor passus erat ante meum adventum. Bis ei vena secta fuerat, & medicamentum purgans bis exhibitum: sudoribus multis diffuebat, etiam extra accessiones, ita ut vix per horam dimidiam dormire posset, quin mutanda essent indusia. Urinæ rubræ & crudæ apparebant, ita ut metus esset longitudinis morbi. Die 16. per horam ante accessionem, exhibeo decoctum camomillæ & crystalli tartari, simulque sanguinem detrahi jubeo ad ℥. viij. ea die accessio non rediit. Die 18. exhibeo Mercurii vitæ correcti g. iij. blandè purgatus est: nihilominus accessio tertianæ simplicis, quæ decimâ septimâ etiam prodierat, 19. rediit. Die 20. iterata est phlebotomia, cum adhuc urinæ rubræ apparerent. Die 2. ante accessionem exhibitum est febrile Crollii, quæ tamen accessio præcedentibus similis fuit. Die 22. quæ erat vacua ab accessione exhibitus est bolus ex cassiæ 3. ℔. Pulveris jalapæ 3. ℔. & febrifugi granis x. copiosè purgatus est per alvum, & semel per vomitum. Accessio sequenti die non rediit. Die 24. exhibitum est infusum Sennæ cum sale tartari, ac spiritu sulphuris: quo multa biliosa & pituita purgata sunt. Sequenti die etiam accessio non rediit, ita ut postmodum discesserim: monui tamen periculum esse recidivæ: quia urinæ parùm videbantur coctæ, ideò præcepi, ut infusum sennæ iteraretur per triduum vel consequens, vel alternum, ut omnes morbi reliquiæ exturbarentur. Eadem die, quâ ego discessi, accessio rediit, & triduo perseveravit. Postmodum verò jusculis aperientibus usurpatis, quæ ego ante discessum præscripseram, omninò convaluit.

## OBSERVATIO XXXIV.

*Aneurisma.*

**D**om. Pelet, Civis Monspeliensis quinquagenarius, atrabilario temperamento præditus, cum gravissimis curis afflictus esset, post multa symptomata, melancholiam hypochondriacam attestantia, passus est tumorem, sub clavicula dextra eminentem, & ovi dimidii magnitudinem æquantem, mollem, & reliquæ cuti concolorem, in quo pulsatio insignis apparebat. Judicatum fuit, esse aneurisma insanabile: eo defuncto inventa est arteria magna ascendens à corde ad claviculam ita dilatata, ut brachii fere magnitudinem æquaret, & ovum gallinaeum in cavitatem suam faciliè admittere posset. Præterea tunica illius admodum densa & cartilaginea evaserat, quod admirabilem naturæ providentiam notat, quæ tunicæ maxime dilatatæ ruptionem evitare contendens, eam densiorem ac duriorem effecerat. Sic vidi aliquando renem viginti duobus calculis refertum, in magnitudinem altero rene quadruplo majorem excrevisse, quasi naturam amplificare voluisset, ut calculos illos cum minori incommodo continere posset.

## OBSERVATIO XXXV.

*Febris quartana.*

**J**oannes Verchandus Aromatarius, febre quartanâ satis diuturnâ laborans, quæ multis adhibitis remediis non cesserat, miscuit cum ptisanæ potus ordinarii cyathis tribus mixtionem ex ambra & moscho, quam pro conficiendis muscardinis paraverat, saccharo addito, in qua erant utriusque grana viij. & in calore accessionis ptisanam sumpsit in tres doses, singulis vicibus agitando, ne pulvis in fundo remaneret, unde copiosissimi sudores oborti sunt, qui moschum redolebant, & ille perfectè curatus est.

## OBSERVATIO XXXVI.

*Febris tertiana maligna.*

**N**obilis matrona, uxor Domini de Sumenes, febre tertianâ duplici laborans in paroxysmis graves lipothymias patiebatur, ut vererentur adstantes, ne ipsa om-

ninò deficeret, quæ intensam morbi malignitatem testabantur. Vocatus ad eam exhibui bis in die in julepo cardiaco Bezoardici jovialis g. viij. & Bezoardici mineralis ʒ. j. in singulis jusculis. Intra biduum cessarunt omninò lipothymia, & paroxysmi sine gravi aliquo symptomate transacti sunt, paucisque diebus, remediis ordinariis, ægra à morbo liberata est.

## OBSERVATIO XXXVII.

*Hydrops in puero.*

**F**ilius Guillelmi Delbosc, Civis Monspeliensis, biennis, hydrope ascite laborabat à quatuor mensibus; cui sequentia remedia præscripsi.

℥. Rhabarb. pulverat. 3. j. capiat manè cum jusculo, semel in septimana.

℥. Rad. asparag. brus. & enulæ campan. an. 3. j. fol. agrimon. cichor. ceterach. capillor. ven. chamædr. centa. min. & absinth. utriusque an. m. j. coquantur ad ℔. j. in colatura dissolve sacchar. albi ℔. j. ʒ. ʒ. Fiat syrupus perfectè coctus, de quo capiat 3. j. alternis diebus, manè; per horam ante & post lactationem.

℥. Tabellar. tria fantal. quadruplicato Reo 3. ij. Capiat 3. j. manè alternis diebus, vacuis ab usu syrupi.

℥. Rhabarb. pulverat. in nodulo inclusi ʒ. j. aquæ font. ℥. j. ʒ. infundantur frigidè simul, & aquâ utatur pro potu ordinario.

℥. Passular. mundatar. ℥. iij. bulliant in vino albo ad putrilaginem, deinde per tetaceum trajiciantur, ac postmodum recoquantur ad opiatae consistentiam, utatur omni hora per se, vel cum pane, ad libitum.

Hisce remediis per duos menses continuatis, ad integram valetudinem perductus est.

## OBSERVATIO XXXVIII.

*Epilepsia.*

**P**uella 12. annorum epilepsia frequenter corripiebatur, ad cujus curationem multa remedia frustra tentata fuerant. Cum autem pleuritide correpta fuisset, pluries ei secta fuit vena, & ab eo tempore epilepsia nunquam correpta est. Inde colligere licet venæ sectionem ad epilepsia curationem plurimum conferre.

## OBSERVATIO XXXIX.

*Febris maligna.*

**I**llustrissimus Episcopus Uzetiensis, febre malignissimâ laborans, quæ ex continuâ & intermittente complicata erat, ad hemitritæ naturam accedens. Die undecimâ morbi adeo gravem paroxysmum passus est, ut de vita ipsius maximè dubitarem. Symptomatibus ingravescentibus, duabus aut tribus horis à principio invasionis, ipsi exhibui aquæ theriacalis nostræ, ex succis limonum, aliisque paratæ, in tractatu nostro de febribus descriptæ, capite de febribus malignis. 3. j. ʒ. cum aquæ cardui benedicti 3. iij. & intra horæ quadrantem omnia symptomata cessarunt, æger somno correptus, ab eoque post tres horas expergefactus, febris immunis fuit, quæ non amplius deinceps rediit.

## OBSERVATIO XL.

*Febris tertiana.*

**F**ilius Domini de Boitarges natu major, duplici tertianâ laborans à 20. diebus, sumpsit per horam ante tempus accessionis aquæ nostræ theriacalis 3. j. cum aquæ cardui benedicti 3. ij. & accessio non apparuit amplius.



aquæ cyatho, spiritus vitrioli satis insignem aciditatem adeptus.

## OBSERVATIO XLI.

*Febris quartana, scabies, & marasmus.*

**R**aymundus Michaël Civis Frontinianensis, annos natus 66. febre quartanâ laborans, post multa remedia tamen curatus est, media hyeme, sumpto per 16. dies Mercurio diaphoretico ad g. vj. à quo nullam sentiebat operationem sensibilem, sed accessiones in dies minuebantur, ut, ferè omninò evanuerint. Integra tamen solutio febrifugo semel exhibito in parva dosi comparata est. Superfuit verò summa macies, quæ illum ad marasimum ferè perduxerat, cum scabie sicca valdè pruriginosa, totum corpus occupante. Præscripsi usum lactis asinini per 40. dies, & balneum integrum per triduum, & semicupium per 20. dies, & inunctionem ab usu semicupii, cum unguento scabiei appropriato, & sic integrè curatus est.

## OBSERVATIO XLII.

*Rheumatismus.*

**L**udovicus Michaël Frontinianensis, annos natus 25. mense Septembris anni 1649. incidit in Rheumatismum, à quo omnes totius ferè corporis articuli gravibus doloribus afficiebantur, iisque vagis, ita ut nunc unam, nunc aliam partem invaderent. Licet autem Chronicus ut plurimum esse soleat hic affectus, & ad plures menses perseverans; attamen intra 15. dies sublatus fuit, septem venæ sectionibus, in principio celebratis, & aquâ papaveris Rhœados, manè & serò exhibita. Remittente verò dolore, purgatus fuit ter pulvere arthritico, alternis diebus.

## OBSERVATIO XLIII.

*Phthisis.*

**P**uella Phthisica, & ad extremam maciem perducta ex consilio Medici, solis passulis victavit, cum pane comestis, & pro potu utebatur decocto hordei & liquiritiæ, sicque intra octo menses restituta est, & optimè ac propè impinguata.

## OBSERVATIO XLIV.

*Hydrops.*

**P**uella octo annos nata, hydrope laborans, usa est conserva ex passulis, in omni pastu. Intra duos menses liberata est. Illa autem conserva fiebat ex passulis in vino albo decoctis ad putrilaginem, & per setaceum trajectis, iterumque recoctis ad opiata consistentiam.

## OBSERVATIO XLV.

*Urinæ suppressio.*

**V**ir quidam urinæ suppressionem passus per 11. dies, hac methodo curatus est. Sumebat quotidie ptisanam laxantem, factam in decocto parietariæ, qua humores ferosi attrahebantur, ut in vesicam confluerent. Semicupium etiam frequenter usurpabatur. Post quatuor purgationes sumebat circa vespertam olei Scorpionum Matthioli 3. j. vel ij. cum eodem decocto. Hoc etiam observatione dignum, quòd post absolutam curationem tota facies crassa obducta sit, quæ intra dies 15. exsiccata decidit. Unde conijcere licuit, virulentam quamdam materiam in corpore latentem, olei Scorpionum vi fuisse ad faciem propulsam. Et fortè illud oleum Elephantiacis plurimum conferret.

## OBSERVATIO XLVI.

*Vomitus ad choleram morbum accedens.*

**M**ulier quædam vomitu ingenti, choleram morbum referente laborans, curata fuit in momento hausto

## OBSERVATIO XLVII.

*Lypothymia, & alia symptomata ex utero.*

**A**lia mulier gravia symptomata ex utero patiens, eodem spiritu aquæ mixto sanata est.

## OBSERVATIO XLVIII.

*Hydrops spurius.*

**V**ir quidam abdomen impensè tumidum habebat, ut hydropicus ab omnibus putaretur. Tandem post exhibitum medicamentum excrevit vesicas numero septem, oblongas instar farciminum (quæ vulgò *Boudins* nominantur) ejusdemque crassitie, & unius palmi longitudinem æquantes, quæ humore foetido repletæ erant, iisque excretis, omninò liberatus est.

## OBSERVATIO XLIX.

*Colica biliosa.*

**P**harmacopœus Claromontanus, qui Michaël nominatur, annos circiter 40. natus, retulit mihi, se per multos annos colico dolore vexatum, nullum aliud remedium invenisse, præter hydroposiam, & quandiu in ea perseveraret, prorsus incolumem permanere, quoties verò ad vini usum redire voluerit, intra biduum eodem affectu correptum esse. Cum autem à me hujus eventus causam postularet, respondi non à bile simpliciter colicum dolorem in eo excitari, sed majori parte ab humore melancholico, humori bilioso permixto, cum ille temperamento melancholico à prædominio præditus sit. Cum autem melancholia jugiter à liene in ventriculum effundatur; aciditate sua vinum assumptum inficit, & ita vinum confestim in ventriculo acescit, ac morbi causam auget. Si verò biliosus humor morbi causa existeret, ab aquæ potu quidem corrigeretur, sed vini usus tam citò affectum non suscitaret, quia vinum bilis qualitates tam promptè non induit, sicut melancholiæ, quatenus facilè acescit; non autem amarescit. Conjecturam meam auget, quod dictus Pharmacopœus, cum paroxysmo colicæ corripitur, acida per vomitum rejicit, non autem amara.

## OBSERVATIO L.

*Gangræna.*

**M**ulier quædam pauperrima, ex fractura tibiæ insigni, cum gravi ulcere, incidit in gangrænam, quæ totum vulnus ampiebat, & in horas crescebat, partemque vicinas invadebat. Chirurgus meo consilio partem fovit continuò per biduum aceto, in quo scoria ferri (vulgò *Machefer*) bullerat, & cohibita est gangræna; tum è vulnere exire cœpit pus satis laudabile, illudque postea ordinariâ methodo curatum est.

## OBSERVATIO LI.

*Dolor in genu ex contusione.*

**J**oannes Cavalier, famulus meus, circa meridiem accepit ictum in genu, ex globo ligneo, quo luditur malleo. Ambulavit citra dolorem usque ad horam quartam vespertinam, quo tempore dolor, totum genu occupans, adeò gravis invasit, ut nullo modo ambulare potuerit. Statim partem obliniri jubeo olei ceræ & spiritus vini partibus æqualibus, admotis linteis calidis: horâ somni repetitur inunctio, & iterum postridie manè, intraque 24. horas liberatur.

OBSER:



## OBSERVATIO LII.

*Tumor in genu contumax, & diuturnus.*

**D**ominus Monts Tabellio Regius, per trium mensium spatium passus est tumorem in genu tam contumacem, ut omnium remediorum vim deluserit; Mollis erat; saepe, ut ad suppurationem venisse crederetur, & Chirurghi aperuissent, nisi ego obstitissem. Post multa remedia sequens Emplastrum profuit plurimum.

℞. Massæ emplastr. diapalma 3. j. Mercur. crudi cum sulphure extincti, & vitrioli Romani an. 3. ij. terebinthinæ parum, f. emplastrum.

Manebat tamen adhuc tumor, quamvis valdè imminutus: denique sequens emplastrum curationem absolvit.

℞. Gummi Ammoniac. & Sagapen. in aceto dissolut. & denuò inspissat. ana 3. ij. emplastr. diachylon cum gummi 3. j. ℞. liquefiant omnia simul, deinde adde cinnabaris & æris usti an. 3. j. auripigmenti & viridis æris aa 3. ij. fiat massa.

## OBSERVATIO LIII.

*Cholera morbus.*

**P**etrus Manuel, Mercator Monspeliensis, septuagenarius gravi cholera morbo correptus, quatuor præcipuè remediis intra septem dies liberatus est, clystere ex lacte, confectioe de hyacintho, conservâ rosarum, & vitellis ovorum, fotu ventriculi astringente & roborante cum sacculis, in vino rubro maceratis; julepo ex decocto plantaginis & portulacæ, cum syrupo cydoniorum & confectioe de hyacintho, manè & serò exhibito; & laudano, cujus g. j. singulis noctibus in julepo dissolvebatur. Pro miraculo habita est hæc curatio, in tam provecta ætate.

## OBSERVATIO LIV.

*Febris maligna.*

**D**ie 6. mensis Augusti anni 1650. vocatus sum Balneolas pro Dn. Guerino mercatore Lugdunensi, qui ibi morbo correptus fuerat. Dies erat morbi 15. delirio continuo tenebatur, & convulsionibus perpetuis, seu nervorum contractionibus, & membrorum subsultibus, præterea omnia respuebat tum juscula, tum reliqua potulenta, & in os ex cochleari rejecta expuebat omnia. Ego primum juscula deglutire cogo, nares obturando, & cochlear diu in ore continendo: Postmodum exhibeo Bezoardicum joviale ad g. xx. bis quotidie, & in singulis jusculis Bezoardici mineralis 9. j. per biduum, cum julepis alexipharmacis, epithematis, & aliis remediis vulgaribus. Præterea admota sunt vesicatoria cervici & utrique brachio, & intra triduum à febre, omnibusque symptomatis liberatus est.

## OBSERVATIO LV.

*Febris maligna.*

**D**ie 14. Augusti, anni 1650. Dn. Dalmeras navis bellicæ Præfectus, à septem diebus laborabat febre continuâ malignâ, cum tanta virium dejectione, ut sese in lecto nullo modo commovere posset, neque in alterutrum latus convertere. Omnia remedia ordinaria in usum revocabantur, sine ullo profectu, imò neque lapis Bezoardicus, quem se à nobili Hispano habuisse dicebat ex India delatum. Tandem die 12. morbi, cum omnia in pejus ruerent, & agrum mihi commendatissimum in summo vitæ discrimine constitutum viderem? Exhibeo ipsi hora 9. vespertina, aquæ theriacalis nostræ cum succo limonium paratæ 3. iv. horâ undecimâ cum jusculo exhibui Bezoardici jovialis g. xij. & manè horâ 4. idem Bezoardicum fuit iteratum. Horum remediorum fructus talis fuit, ut lipothymia, quæ pridie eum afflixerant, non amplius apparuerint: imò cum antea, alvi fluxu laborans, quoties deijceret, maximum virium languorem perciperet,

ea tamen nocte alvum copiosissimè deposuit, & inde vires firmiores evaserunt. Præterea post tres horas ab assumptâ aqua & pulvere se se spontè in latus convertit, & in eo decubuit, cum antea per multos dies supinus & immobilis jacuisset, manè urinæ melius concoctæ apparuerunt, & ab eo tempore æger quotidie melius habuit, ac brevi à febre integrè liberatus est.

## OBSERVATIO LVI.

*Febris maligna.*

**D**ie tertiâ Septembris, anni 1650. vocatus sum ad oppidum, quod Aigue-mortes nominatur, ut inviserem clarissimam matronam, Dominam de Guy, sexagenariam, quæ febre maligna laborabat, ad Hemitritæi naturam accedente; erant enim accessiones singulis diebus recurrentes; quæ ad ἀνυγξία non desinebant, & cum iis accedebat totius corporis refrigeratio per 12. aut 15. horas perseverans, cum maximo virium languore. Præterea aderat summa virium dejectio ex continuo & copioso alvi fluxu; quo humores crudissimi griseo colore infecti exercebantur; & accedebat iste fluxus ad lienteriam, quoties enim jusculum aut potum sumebat, statim per alvum exercebat, sed copiâ quadruplo majori illis quæ assumebantur. Accessi nona morbi die & remedia ordinaria sedulo ac continuo per biduum usurpavi, quæ pro febre maligna, alvi fluxu, & corroboracione virium vulgò præscribi solent. Cumque illa nihil profuissent, & ægra in pejus rueret, ut die undecimâ morbi proxima, ac veluti in agone constituta videretur, ad Bezoardicum joviale, tanquam alexipharmacum eximium, & potens diaphoreticum confugiendum esse censui, illiusque g. 12. exhibui. Ab eo tempore non amplius deiecit, perfrigerationes non redierunt, & intra biduum febris expers fuit, ac postmodum brevi convaleuit.

## OBSERVATIO LVII.

*Fovea in mamma.*

**R**arus est iste casus. Nobilis matrona annum agens 51. temperamento bilioso & melancholico prædita, ante decennium subito terrore correpta est, ex repentina infantis sui morte, à nutrice incauta interfecti. Hinc mensium fluxus omnino suppressus est, nec unquam amplius ab extempore apparuit. Post duos annos exortus est in parte superiori mammæ sinistræ tumor subdurus & oblongus, digiti crassitiem æquans. Paulò post apparuit in parte inferiori ejusdem mammæ tumor alius exiguus & rotundus, qui intra paucos dies foveam effecit in eadem parte exiguam, & sine dolore, quæ fovea sensim incrementum sumpsit, ut intra biennium dimidium fere mammæ totius partem ad interiora retraxerit, & in fundo illius cutis costis adhærere videretur. In ambitu verò illius fundi quædam percipitur durities, quæ compressa digitis, doloris sensum inducit. Aliquando ægra in tota illa parte dolorem pungitivum percipit, sed exiguum & rarò evenientem. Præterea calore intenso afficitur in regione hepatis, & dextra thoracis parte.

Habito consilio sancitum fuit, hunc affectum ad canceri occulti naturam accedere. Cum enim maxima sit in humoris melancholici & atrabilarii natura varietas, fit, ut ab illis humoribus variæ formæ ejusdem speciei morbi contingant. Vulgò humor melancholicus adultus, cancerum efficiens, crassus est, & tumorem durum producit, qui tandem putredinem & acrimoniam acquirens, partem exulcerat, & ulcus insanabile producit. In hoc autem casu humor ille tenuis est, ideò tumorem perexiguum efficit, sed præterea humor ille malignam quandam ac dissolventem qualitatem habet, quæ partis substantiam colliquat & absumit, quemadmodum videmus quædam salia erodendi & exulcerandi vi prædita, qualia sunt ea, ex quibus cauteria potentialia componuntur, quædam verò dissolvendi durissima corpora, ex quibus fiunt aquæ fortes, lapides & metalla



metalla dissolventes, imò acetum lapides dissolvit, cutem tamen non erodit. Sic in microcosmo generantur salia, similibus facultatibus prædita, quæ humoribus permixta, admirandos effectus producunt. Ita in hoc casu humor, qui à natura in mammam, ceu partem mollem & spongiosam expellitur, substantiam illius sensim dissolvit & absumit, ita ut fovea illa majus in dies recipiat incrementum. Judicatus fuit iste affectus incurabilis, eique tantum curam palliativam esse adhibendam, metuendumque, ne tandem pars ulceretur, introductâ majori acrimoniâ, Remedia præscripta fuerunt alterantia, & phlebotomiæ periodicæ, juscula alterantia, serum lactis, aquæ minerales, Cauteria, opiata specifica & similia. Topica verò lenientia humoris ferociam & humectantia, ut linimentum ex oleo ros. succo plantag. & solani, cum mercurio crudo, unguentum de ranis viridibus descriptum, capite de cancro: linimentum è butyro, & oleo violac. cum sale saturni, fots ex aqua rosarum cum sale Saturni.

## OBSERVATIO LVIII.

*Hæmorrhoidum dolor.*

**V**ir sexagenarius, melancholico & atrabilario temperamento præditus, dolore hæmorrhoidum molesto conflictabatur, cum tumore & inflammatione partis qui multis remediis non cesserat. Præscripti fots ex aqua rosarum, in cujus ʒ. vi. salis Saturni ʒ. i. dissolvebatur, qui fots pluries de die iterabatur. Postmodum verò cataplasma admotum est, ex cepa alba, sub cineribus cocta. & cum butyro subactâ, partibus æqualibus. Intra biduum inflammatio sedata est, tumor magna ex parte resolutus.

## OBSERVATIO LIX.

*Convulsiones pueri.*

**D**ie 27. Octobris anni 1650. dum essem Nemausi, pro alio ægro, filius Domini de Marguerite in Curia Præsidiali Nemausensi Consilarii, 10. annos natus, correptus est convulsionibus Epilepticis sævissimis, ut omnes corporis partes atrociter convellerentur, & paroxysmi identidem recurrerent, nullaque propemodum adesset intermissio. In tanto periculo, & tam præcipiti affectu, exhibeo salis vitrioli ʒ. β. in aqua betonicæ dissolutam, qua vomitus illicò concitatus est, ægerque multam rejecit pituitam, statimque convulsiones cohibitæ sunt. Attamen post aliquot horas redierunt, sed longe breviores ac leviores, ideò purgatio instituta est ex diacarthami ʒ. β. syrup. rosac. ʒ. i. cum aqua betonicæ, eaque exhibita est sub vesperam, cum manè affectus eum corripuisset; per noctem bene purgatus est. Postea ei exhibitæ sunt olei succini & spiritus vitrioli an. guttæ v. in aqua betonicæ. Remissiores fuere paroxysmi, sed nocte insequente aliquantulum frequentiores rediere. Postridie manè exhibetur potio ex aqua cardui benedict. & scord. an. ʒ. i. aquæ theriacalis Bauderonii ʒ. i. salis Card. bened. ʒ. i. confectiois alkermes ʒ. i. cujus beneficio convulsiones omnino sublatae sunt. Ne tamen iterum succrescerent, bezoardicum joviale bis exhibitum est, octo horarum spatio, ad g. 12. & sic omnino liberatus est. Potio alexipharmaca & bezoardicum joviale exhibita sunt, quia magna erat malignitatis suspicio in hoc morbo, propterea, puer iste ante 15. dies anginâ laboraverat, quæ tunc temporis Nemausi erat epidemica, pueros præsertim affligens, qua etiam nonnulli moriebantur. Unde conjicere licuit, malignitatem, ex eo morbo relictam, quæ in pueri corpusculo per tempus prædictum latuerat, subito suscitata fuisse, & convulsiones illas excitasse.

## OBSERVATIO LX.

*Angina.*

**D**ie 27. Octobris anni 1650. D. Cheison, Patronus Nemausensis 30. annos natus, gravi anginâ laborabat

*Laz. Riverii Opera.*

à quinque diebus, quæ illi deglutionis libertatem omnino abstulerat, ita ut ne guttulam jusculi haurire posset, & à 24. horis nihil assumpserat, præter aquam, quæ facilius permeabat. Statim ipsi exhibere jubeo aquæ benedictæ ʒ. ii. cujus operatione abscessus in faucibus latens, qui totum oesophagi orificium obturabat, disruptus est, & æger multum puris rejecit cum pituita, ac tantillo sanguinis. Postmodum verò jusculum assumpsit sine magna molestia, & paucis aliis adhibitis remediis, omnino convaluit.

## OBSERVATIO LXI.

*Tertiana duplex.*

**D**ie 29. mensis Novembris anni 1650. dum essem Nemausi, vocatus sum ad Nobilem virum D. de Mirabel, apud Dominum Barnier Consiliarium Regium habitantem, qui febre tertiana duplici laborabat à 15. diebus. Hujus temporis decursu bis sanguis detractus fuerat, & totidem purgationes celebratae, multique julepi exhibiti refrigerantes & aperientes. Nihilominus febris perseverabat, accessiones anticipabant, urinæ erant crudæ & subrubræ, tum æger sudores nocturnos patiebatur: quæ omnia morbi longitudinem minabantur, ut metus esset, ne in quartanam degeneraret. Ego igitur curationem aggrediens, ad Phlogosim internam auferendam, quæ ex urinarum rubedine, & magno accessionis aestu innotescebat, iterum sanguinem detraho, qui cum valde exustus & corruptus appareret, postridie iterandum censui. Postmodum ad sanguinem depurandum & temperandum, præscripti julepos ex radic. aperientibus temperatis, cum cichoraceis & capillaribus ad triduum continuandos, quos sequebatur potio, ex sennâ, tamarindis, mannâ, & syrupo rosaceo, qua sufficienter purgatus est. Attamen accessiones æquè validæ perseverabant. Exhibeo igitur febrifugi grana 20. quibus septies purgatus est tantum per inferiora, & adeò blandè, ut passim profiteretur se nunquam benignius sumpsisse medicamentum: Sumpsit autem hora tertia matutina, cum accessio horâ primâ pomeridianâ expectaretur, quæ ad quartam vespertinam retardata est, & multo levior fuit. Sequenti die rediit accessio eadem hora, & priori consimilis. Exhibeo iterum febrifugum eadem dosi, & eodem modo purgatus est, neque accessio amplius reversa est. Postridie medicamenti hæmorrhagiam narium passus est, qua sanguinis ʒ. i. excrevit, sine ulla virium jactura. Et hoc interdum observavi in febrifugo nostro, ut cum omnia, quæ naturam gravant, expellere conetur, sanguinem etiam superfluum per hæmorrhagiam foras propellat: quod in hoc nobili viro contigit, qui juvenis erat & sanguineus, ut adhuc, non obstantibus quatuor venæ sectionibus, sanguis superfluus in ipso redundaret. Sic perfectè curatus est, & ad pristinam valetudinem perductus.

## OBSERVATIO LXII.

*Febris quartana.*

**R**everendus Pater Dominicanus, nomine Augustinus, ab anno integro ferè quartanâ laborabat, cui successit icterus niger. Multis remediis hunc morbum oppugnare tentaverat, ex variorum Medicorum præscripto, sed frustra. Erat enim temperamento valde melancholico & adusto præditus: Præterea hypochondrium sinistrum ac renitens habebat. Præscribo ipsi venæ sectionem, apoze-mata aperientia & melanagoga ad quatuor dies, cum fots hypochondriorum aperientibus & emollientibus, postmodum exhibui febrifugi grana xx. Febris inconcussa permanet. Post duas accessiones exhibui ejusdem remediij grana xxv. & accessiones imminutæ sunt. Post alias duas accessiones exhibui grana xxx. & febris illa contumax omnino fugata est.

Z z z

OBSER-



## OBSERVATIO LXIII.

*Paronychia.*

**P** Rincipio mensis Martii, anni 1651. filia natu major Domini Baronis d'Amelaz, Quæstoris Franciæ Generalis, Paronychiam patiebatur in indice manus sinistræ, quæ ipsam vehementer afflixerat per 4. dies, ita ut noctes insomnes transigeret, cum dolore insigni. Jussi, ut digitum immitteret in aurem felis, & intra duas horas doloris expers fuit. Sentiebat per intervalla attractionem digiti in cavitatem auris, ac subinde dolor totum brachium invadebat, usque ad humerum, eo denique tempore felis vociferabatur, ut credibile sit, eum dolore affici à veneno attracto. (Paronychia enim est tumor venenosus:) tota manus intumuit, ac postmodum detumuit, excepto digito, qui tumefactus remansit, & doloris expers. Sublato dolore digitus extractus est, & suppuratus apparuit, ac deinceps solo emplastro diapalma curatus.

## OBSERVATIO LXIV.

*Hæmorrhoidum fluxus immodicus.*

**M** Ense Aprili anni 1651. nobilis Matrona, uxor Domini de Riniac, in Curia Computorum, Subsidiorum, & fisci regii procuratoris generalis, quadragenaria, patiebatur hæmorrhoidum fluxum immodicum, à quo nullis remediis, à duobus Medicis consequenter per octo menses præscriptis, liberari potuerat, & ad summam cachexiam, hydropem minitantem, perducta erat, cum maxima virium imbecillitate, ut vix progredi posset, & icterico faciei, ac totius corporis colore. Remedia ferre amplius non poterat, & à purgantibus medicamentis, quantumvis levibus, ex dictorum Medicorum præscripto usurpatis, fluxus irritabatur. In hac desperatione ad me confugit, meam opem implorans. Ego verò statim illi præscribo sequentem potionem per quatuor dies continuos usurpandam.

℞. Tamarindor. ꝯ. ℥. fol. plantag. m. i. myrobalan. citrin. ʒ. i. coquantur ad ʒ. vi. in colat. infunde rhab. electi ʒ. i. spicæ nardi ʒ. ℥. expressione facta dissolve syrupi rosac. ʒ. i. rhab. pulv. ʒ. i. fiat potio.

In prima exhibitione sanguinis fluxus cohibitus est licet quinques dejecerit; & in cæteris dosibus idem eventus.

Dein præscripsi julepos ex decocto radic. pentaphylli & tormentil. fol. plantag. pimpinel. & mille fol. paratos, cum sale prunellæ & syrupo granator. per xii. dies, iterando purgationem quinto quoque die; & toto illo tempore fluxus hæmorrhoidum nunquam comparuit.

Quia verò affectus erat contumax, & valde diuturnus, qui semel cohibitus, post aliquod tempus iterum revertebatur, post dicta remedia præscripti salem martis, ad multos dies exhibendum à g. vi. ad g. viii. & potionis prædictæ exhibitionem quinto quoque die.

Per horum remediorum usum, fluxus hæmorrhoidum non comparuit per quinque septimanas, quibus elapsis, rediit fluxus satis molestus: copiam enim sanguinis purissimi excernebat, quoties alvum deponeret. Sequenti die vocatus præscripsi iterum potionem purgantem, à qua ter aut quater dejecit, sine ulla excretionem sanguinis.

Postridie potionis præscribo balneum ex hordeo, plantag. polygono, summitat. rubi & rosæ rubris paratum, per biduum usurpandum.

Postmodum iterata sunt eadem remedia per mensem integrum, & in dies vires reficiebantur, & color faciei vividus reddebatur: donec tandem integram valetudinem acquisierit. Attamen circa finem prædicti mensis calorem sentiebat in hypochondriis, & inquietudines horâ somni. Facile erat conjicere, hæc à sanguine retento provenire, qui antea per hæmorrhoides effluebat, & quem natura probè regere non poterat, prædictis evacuationibus assue-ta: præsertim cum purgationes menstruæ ab aliquot annis defecissent: idèò sanguinis missionem ex brachio præscribo, cujus beneficio symptomata illa sublata sunt.

## OBSERVATIO LXV.

*Contusio, inflammatio, & excoriatio clunium ex decubitu diuturno supra partem.*

**U** Xor Domini de Briffac, febre continua laborans, cum catarrho molestissimo, in pulmonem decumbente, unde tussis ferè perpetua, quæ vehementius affligebat, quoties decumbere tentaret: ita ut diu noctuque in lecto sedere cogeretur. Cum autem valde macilenta esset, clunium extrema, quæ ad podicem accedunt, ex compressione diuturna, contusionem & excoriationem passa sunt, quæ sequuta est inflammatio, rubedine obscura prædita, ad lividitatem declinante. Post quædam unguenta & emplastra per aliquot dies à Chirurgo frustra tentata, & malo ingravescente, res mihi exponitur; jubeo foveri partem aqua rosar. in qua sal saturni dissolutum fuerit, & intra 24. horas malum curatum est.

## OBSERVATIO LXVI.

*Febris maligna.*

**M** Ense Julio anni 1651. D. Deletre, salinarum procurator, incidit in febrem malignam, quæ ipsum ad convulsionem & delirium perduxit, cum summa pulsus inæqualitate, unde brevi moriturus videbatur. Ex variis, quæ illi exhibita fuerunt, maximè profuit aqua theriacalis nostra, in febris pestilentis curatione descripta ad ʒ. iv. exhibita, cum bezoardici jovialis g. xii. à quibus sudor copiosus excitatus est, & æger veluti miraculo liberatus.

## OBSERVATIO LXVII.

*Situs ventriculi monstruosus.*

**F**ilius D. Rat, Civis Monspelienfis 24. annos natus temperamento melancholicus, febre tertiana diuturna, nunc simplici, nunc duplici; per totam ferè æstatem laboraverat. Mense verò Septembri, licet à paroxysmis febrilibus liberatus esset, non satis tamen prosperâ valetudine frueretur; ab Empyrico quodam antimonium sumpsit, fortè malè præparatum, à quo vehementissimi vomendi conatus excitati sunt, absque ullo effectu; ita ut conatus ille irritus, continuo affligens, eum intra septem vel octo horas ad extrema redegerit, & circa vesperam de medio sustulerit. Aperto cadavere, inventus est ventriculus in parte thoracis dextra, variis humoribus repletus, qui quidem situs præternaturalis effecit proculdubio, ut sese sufficienter dilatare ac subvertere nequiverit ad vomitum efficiendum, costarum ambitu oppressus. Hunc autem situm ab ortu contractum fuisse testatur pulmonis carentia in illa thoracis parte, cum unius illius lobus in sinistra appareret. Mirum est, hunc juvenem toto vitæ decursu spirandi difficultate non fuisse valde oppressum, & omnes corporis functiones, ante morbum prædictum, commodè exercuisse; militiam enim exercuerat, & febres prædictas in bello contraxerat.

## OBSERVATIO LXVIII.

*Hydrops.*

**P**uer bimulus, hydrope laborans, sequentibus remediis intra duos menses perfectè curatus est.

℞. Rhab. pulv. ʒ. i. capiat manè cum jusculo.

℞. Radic. asparag. brufci, & enulæ cam. an. ʒ. i. fol. agrim. cichor. ceterac. capillor. ven. chamædr. centaur. min. & absinth. utriusque an. m. i. coquantur ad ʒ. i. fiat syrupus perfectè coctus, de quo capiat ʒ. i. alternis diebus, per horam, longè à lactatione.

℞. Tabellarum triafantali quadruplicato rheo ʒ. iv. capiat ʒ. i. alternis diebus, vacuis ab usu syrupi.

℞. Rhab. electi, nodulo inclusi ʒ. aquæ font. ʒ. i. ʒ. i. ʒ. i. infundantur frigide simul, & hac aqua utatur pro potu ordinario.



## OBSERVATIO LXIX.

*Alvi fluxus cruentus.*

**D**. Roussier Medicinæ Doctor & Medicus Uticensis, quadragenarius, à quatuor mensibus patiebatur alvi fluxum biliosum, pituitosum, & sanguineum, quo plus sanguinis, quàm reliquorum humorum exercebat, ita ut ad summam maciem ac veluti marcorem perductus esset. Cum multa remedia per totum illud tempus frustra tentasset; me tandem in consilium vocat, cui exhibui auri horizontalis g. xii. quibus blandè purgatus est, & copiam bilis porraceæ ac æruginosæ excrevit sine ullo sanguine. Idem remedium bis iterandum præcipio tertio quoque die, & eadem sequuta est operatio. Postmodum verò, ab alvi fluxu prorsus immunis fuit, & enchymis utens alimentis ad pristinam valetudinem perductus est.

## OBSERVATIO LXX.

*Veneris impotentia.*

**N**obilis vir, triginta annos natus, cùm à prima adolescentia veneri admodum indulgisset, & diuturnam gonorrhœam passus esset, quâ vigente, frequenti nihilominus utebatur concubitu, etiam cum impuris scortis, debilitatis admodum, à causis prædictis, partibus genitalibus, incidit tandem in veneris impotentiam, quæ non in defectu erectionis consistit, quam asserit esse sufficientem, sed ejaculationis, quæ rarissimè contingit. Illam autem dependere censeo ex seminis defectu, quod perexiguâ copiâ generatur, propter testium imbecillitatem, quorum calor natus exhaustus atque exsolutus est, frequentiori coitu. Fortè etiam parastatè in vitio sunt, & exiguam feminis copiam recipiunt à testibus, propter cicatrices in iis relictas, ab ulceribus, quæ diurnas illas gonorrhœas comitari solent. Tum etiam propter frigidam intemperiem, illis partibus introductam, per insiti spiritus exsolutionem. Præ curatione hujus affectus, sequentia præscripsi primæ die mensis Aprilis 1652.

℥. Decoct. emollient. lb. i. β. cathol. duplic. & diaphœn. an. 3. vj. mellis ros. & olei lilior. an. 3. ii. fiat clyster, injiciendus hora quarta post meridiem.

Sequenti die aperiatur vena basilica cubiti dextri, mittantur sanguinis 3. viii.

℥. Sennæ mundat. 3. β. Sem. anisi 3. i. absint. pontici P. β. coquantur ad 3. vi. in colatura dissolve diaphœn. 3. iii. syrupi ros. 3. i. F. potio, quæ detur postmodum venæ sectionis cum regimine.

℥. Rasuræ ligni guajaci 3. iv. aquæ font. ℥. iv. infundantur per 14. horas, deinde bulliant ad quartæ partis consumpt. addendo sub finem sennæ mundat. 3. i. turbit. hermodactyl. an. 3. iii. colaturæ capiat lb. β. manè, tribus horis ante pastum, per 20. dies.

℥. Radic. falsæ parill. 3. i. aquæ fontis lb. viii. infundantur per horas 12. deinde bulliant ad quartæ partis consumpt. colaturâ utatur pro potu ordinario, cum vino generoso, per usum prædicti decocti, utendo interea pane biscocto & anisato, carnibus assis, & non elixis, nucleis pineis, amygdalis torrefactis, aliisque cibis siccioribus.

Finito usu prædicti decocti, capiat per triduum manè terebinthinæ, aquâ agrimonii diligenter lotæ 3. i.

Post horum remediorum usum adeat thermas Balerucanas, quarum aquam sumat per triduum, more solito.

Postmodum verò utatur semicupio ejusdem aquæ per quatuor dies, manè & vespèri, sudando matutinis horis, vespèri verò testes tantum & perinæum cùm regione pubis balneando.

Ab exitu cujuslibet balnei, post deterfum sudorem vel madorem, inungatur scrotum, perinæum, & regio lumborum unguento sequenti.

℥. Olei lilior. 3. ii. olei nucis moschat. 3. β. oleo caryophyl. 3. i. piperis albi, nigri, & longi an. drach. β. sem. erucæ, urticæ, nigellæ an. 3. β. pyrethri 3. i. ceræ q. s. fiat unguentum.

*Laz. Riverii Opera.*

℥. Olei nucis moschat. 3. ii. olei caryoph. 3. i. ambraæ gryseæ, moschi & zibetæ an. 3. i. fiat linimentum.

Post usum thermarum, foveantur partes prædictæ per 15. aut 20. dies per horam, ante introitum lecti, decocto sequenti.

℥. Radic. galangæ, calami aromat. & ireos florent. an. 3. i. fol. salviæ, majoranæ, & rorism. an. m. i. Sem. erucæ, nasturtii, urticæ, cardamomi, & cubebæ. an. 3. iii. nucis moschat. caryophyll. & cinam. an. 3. 6. ros. rubr. p. i. coquantur in vino rubro ad quartæ partis consumpt. colatura utatur pro potu prædicto.

Post solum illinantur eadem partes calidè linimento prædicto.

Per usum prædictorum remediorum sumat quotidie manè conservæ satyrionis vel eryngii 3. β. vel nucem juglandem saccharo conditam, vel myrobalanum conditam, vel tabellarum sequentium 3. ii.

℥. Confect. alcherm. 3. ii. ambraæ gryseæ 3. i. moschi optimi. g. vi. sacchari in aqua flor. aurantior. & rosar. dissoluti 3. v. fiant tabellæ.

Prædictis uti poterit alternatim, ne unius tædio afficiatur.

Interim victu utatur analeptico; & in primis comedat frequenter perdices & pullos columbinos, lepuleculos, & oryzam cum lacte.

In bellariis verò utatur pistaciis, tuberibus, scolymis, amygdalis, avellanis, dactylis, & nucleis pineis; tum etiam confectio ex iis parata, quam vulgo pineolatum vocant.

Abstineat à fructibus & oleribus crudis, piscibus, aliisque frigidioribus & humidioribus alimentis, nec non à coitu, per usum remediorum.

## OBSERVATIO LXXI.

*Hydrops pectoris.*

**J**oannes Manenty, civis Monspeliensis, annos natus 65. corpore crasso & obæso præditus, à tribus mensibus patiebatur magnam spirandi difficultatem, ita ut vix posset in lecto decumbere, nocturno tempore in primis, quo magis vexabatur. Nulla erat tussis, aut saltem rarissima, neque quicquam effatu dignum per anacatharsim exercebat. Facies erat subtumida, & venter intumescere incipiebat, ita ut in ascitem inclinare videretur; cùm tibiæ etiam & pedes intumescerent. Ad illius curationem præscripta fuit principio mensis Maii 1652. purgatio universalis, quæ ad quatuor dies, per apozema phlegmagogum & hydragogum fuit instituta; mox diætâ sudorifica ex decocto guajaci & falsæparill. ad xx. dies, copiosè sudando in laconico, cum vapore spiritus vini parato. Et post quartam quamlibet dosin fumebat pulverem hydropicum ex senna, turbit. hermodactyl. jalappa, scammonio, & cremore tartari paratum, quibus remediis omninò liberatus est.

## OBSERVATIO LXXII.

*Febris tertiana duplex.*

**U**Xor D. Bruieys in graviditate septimestri correpta est febre tertianâ duplici in mense Majo anni 1652. quæ per mensem eam afflixit, nullâ apparente remissione, quod periculum non exiguum portendebat. Docet enim experientia quotidiana, mulieres gravidas, hujusmodi febribus laborantes, difficillimè curari, & non paucas, abortu interveniente, de medio tolli. Ter ipsi secta fuerat vena, purgans medicamentum bis exhibitum, & multi julepi aperientes ac refrigerantes propinati; tandem venæ sectione per horam ante paroxysmum celebrata, & exhibito immediatè ante venæ sectionem julepo, ex decocto chamæm. & cremor. tartari parato, febris omninò sublata est. Accessio enim quæ post venæ sectionem expectabatur, non comparuit, neque deinceps.

Zzz 2

OBSER-



## OBSERVATIO LXXIII.

*Hydrops.*

**U**Xor factoris vicini, triginta annos nata, cum cachectica fuisset toto tempore partus, & malè se gessisset in puerperio, febre acuta correpta est, in cujus fine incidit in hydropem, in quo venter, crura & tibiæ insignem tumorem subierant. Cum autem inops esset, hunc tantum pulverem ei præscripsi.

7. Sennæ mundat. crystall. tart. & radic. Jalappæ ana  
3. ʒ. fiat pulvis, de quo capiat 3. i. cum iusculo, singulis  
diebus. Hoc remedio per 20. dies usurpato integre libe-  
rata est.

## OBSERVATIO LXXIV.

*Mammæ inflammatio.*

**J**Uvenis mulier circa nonum graviditatis mensem correpta est tumore mammæ sinistræ, cum tensione, rubore, & pulsatione. Vocatus Chirurgus, cataplasma de mica panis statim admoveat, unde tumor admodum increvit. Vocatus ego, cataplasma præscribo ex farina fabarum cocta in oxycrato, sæpè immutandum, qui intra paucas horas exsiccat. Intra 12. horas inflammatio ablata est, tumorque admodum imminutus, & intra paucos dies omnino evanuit.

## OBSERVATIO LXXV.

*Colica biliosa.*

**D**N. de Chalanges, Salinarum coctor, correptus fuit colicâ biliosâ circa finem mensis Januarii anni 1653. Dolor erat vehementer excrucians, cum vigiliis assiduïs, febre continuâ, & singultu frequenti, ut Medicus ordinarius inflammationem alicujus partis imi ventris suspicaretur. Ego verò, in consilium vocatus, existimavi hæc omnia dependere ex cacochymia biliosâ, hac præcipuè ratione ductus, quod dolor esset vagus, & interdum partem ventris inferiorem & hypogastricam occuparet, interdum superiorem & epigastricam. Hanc sententiam eventus comprobavit. Nam post quatuor phlebotomias, enemata multa emollientia, purgantia, & anodyna, fots & semicupia, quatuor purgationibus curatus est, diebus consequentibus usurpatis, ex decocto cichoraceorum & capillarium cum summit. malv. ʒ. ii. fennæ, cui infundebatur cassiæ ʒ. i. & in colatura dissolvebatur syrupi rosac. ʒ. i. quotidie excernebat multam bilem porraceam, quæ dicta symptomata pariebat.

OBSERVATIO LXXVI.

*Tonsillarum inflammatio.*

**D**ie 21. mensis Maii anni 1653. uxor Dn. Engarran in Curia Computorum Consiliarii, afflicta est tonsillarum inflammatione gravissimâ, quam brevi sequuta est exulceratio, cum dolore intenso. Celebrata venæ sectione & gargarismatis ex oxycrato per biduum frustra usurpatis, sequenti curata est intra unum diem.

74. Sem. sinapis ʒ.i. aceti rofac. & sacchari albi an. ʒ.i.  
aquæ ʒ.iii. fiat gargarisma.

OBSERVATIO LXXVII.

*Hydrops in puero.*

**F**ilius D. Joannis Guy mercatoris, quinque annos natus, à quatuor mensibus hydropicus, cùm alia remedia non profuissent, syrupo sequenti per 15. dies usurpato perfectè curatus est.

74. Radic. enulæ camp. ʒ. i. fol. agrimon. chamædr. centaur. minor. & absinthii utriusque an. M. i. coquantur ad lb. in colatura dissolve sacchari albi lb. i. fiat syrupus, de quo capiat ʒ. i. singulis diebus manè aliquot horis ante pastum.

OBSERVATIO LXXVIII.

*Singultus.*

**D**N. Sequin febre maligna laborans, gravissimo singultu, & ferè assiduo torquebatur, post multa remedia, febrim & malignitatem oppugnantia, quatuor sectiones, & unam purgationem, multòque clysteres, & multa remedia, singuluis præsertim appropriata. Die 12. morbi iterum purgatus est: singultus erat frequentior circa vesperam, licet satis copiosè purgatus fuisset. Vocatus in consilium laudani g. ii. præscribo, cum emulsione 4. sem. frig. major. in qua salis prunellæ 3. i. dissoluta fuit, intra horam cessavit singultus, nec ampliùs rediit.

## OBSERVATIO LXXIX.

*Ad veneris impotentiam.*

**R** Ecipe olei de liquid. ambar.  $\mathfrak{z}$ . i. sem. eruc.  $\mathfrak{z}$ . i. reli-  
qua vide apud Zacut. in praxi admiranda fol. 233.

Si pilulæ istæ non possint tam citò præparari, sequentes usurpari poterunt, cum magno fructu.

22. Ambrae griseæ, moschi optini & agalloch. electissi-  
mi an. ʒ. i. β. rasuræ ebor. diamoschi dulc. galliæ mosch.  
an. ʒ. β. rad. angelic. pœon. & carpobals. an. ʒ. i. Zebetæ  
q. s. fiat massa pilular. de qua capiat ʒ. i. vel ʒ. β. singulis  
noctibus.

Ad varianda remedia aqua sequens interdum usurpari poterit.

24. Cinam. Caryophyll. nuc. mosch. macis ana  $\bar{z}$ . i. cubeb. piperis longi, galang. zedoar. amni, feseleos, ana  $\bar{z}$ .  
 6. granor. juniper. 3. i. vini albi generosi, aquæ rorism. majoran. ana  $\frac{1}{16}$  i. stent in digestionē per dies vi. & postea distillantur in B. M. capiat cochl. ii. manè & ferò.

Denique cæteris non proficientibus, opiata sequens usurpari poterit.

2. Radic. satyrii recent. ꝯ.iii. rad. pastinac. recent. 3.  
iii. reliqua vide apud Zacut. in praxi admiranda fol. 232.  
Exterius fots & linimenta usurpari poterunt, supra ob-  
servat. 69. præscripta, quibus etiam emplastrum sequens  
addi poterit.

℞. Massæ empl. de baccis lauri, & massiche an. ʒ. i.  
gummi tacamahac. & caragn. ana ʒ. β. rad. bistort. & tor-  
mentill. nucis mosch. caryophyll. zinziber. & pulv. aromat.  
rosar. an. ʒ. i. ol. nuc. mosch. ʒ. β. balsam. peruvian. q. s. fiat  
emplastrum quadratum, applicandum regioni lumborū &  
perpetuo gestandum, ac singulis septimanis renovandum.

## OBSERVATIO LXXX.

*Febris tertiana diuturna.*

UXOR Dn. de Brissac. 20. annos nata, per mensem Julium & Augustum tentata est febre tertiana duplici, eaque valde consumaci, quia corpus erat valde debilitatum à graviditate semestri, & abortu subsequente. Multa remedia in cassum per illud tempus usurpata fuerant à Medico ordinario, venæ sectiones & purgationes plurimæ, julepi, juscula medicata, &c. Vocatus ego, exhibeo per horam ante accessionem bezoard. jovialis g. xii. cum aquâ cardui bened. ʒ. iv. Accessio retardata est per horas duas, & multò minor fuit, tum in fine illius alvum bis aut ter deposuit, quæ antea non nisi clysteribus solvebatur, & fœtidissima rejecit excrementa. Sequenti die idem remedium fuit usurpatum, & accessio similiter retardata & imminuta fuit, tum etiam in fine illius fœtidissima excrevit, & postmodum accessiones quasdam passa est vix perceptibiles, deinde sensim integrè liberata est.

OBSERVATIO LXXXI.

*Fluxus Hæmorrhoidum.*

**D**N. Engarran, in suprema Computorum, subsidiorum, & Fisci regii curia Consiliarius, immodico hæmorrhoidum fluxu laborabat à quinque vel sex diebus, quo sanguinis



sanguinis 3. viii. vel x. singulis diebus profundeabat. Post venæ sectionem, julepos refrigerantes, aliâque remedia interna & externa frustra exhibita, cum res urgeret, & æger admodum debilitaretur, præscripsi succum urticæ, levi ebullitione depuratum ad 3. ii. cum paucis saccharo, & hoc solo remedio fluxus omnino cohibitus est.

Candide Lector. Quia numerus observationum deficiebat in scriptis Riverianis, ad implendam hanc centuriam, sequentes subjunximus, plures ejusdem speciei morbos sub eodem titulo, clarioris doctrinæ gratia, aliquando comprehendentes, 82. igitur erit prima nostrorum, huic centuriæ perficiendæ additarum.

## OBSERVATIO LXXXII.

*Hydrops.*

**A**Nno 1645. quidam nomine Felizat Costensis, hydropicus factus, sine remediorum ope curatus est, umbilico sponte & confertim aperto, dum per urbem incederet, ita ut reversus domum, multa stragula & lectum continuè irroraverit per aliquot dies, unde sanus & hilaris per totum annum vixit. Eotamen elapso iterum venter super eum magnificatus est (ut Arabum verbis utar) & ita intumuit, ut cum insigni respirandi difficultate per urbem incederet: cumque tumor adeo increvisset, ut suffocationis periculum immineret, & adesset satis insignis exomphalos seu umbilici prominentia, constantibus etiam viribus, de ejus apertione nos iterum a quæ iterum rogavit, alioqui sibi violentas manus illaturus. Quod cum tandem Chirurgus ritè & sine dolore præstissset; aquam statim fluere permisimus fere ad 3. i. & sub noctem eadem quantitate: verum eadem nocte sensim subsidentibus partibus, vires etiam subsidebant. Ita ut sequentem diem ultimum obierit. Unde patet, naturæ opera non semper esse imitanda, ut videre est in hoc agrotante annorum circiter 25. Attamen licet constare viderentur vires, quod per urbem incederet, & ritè comederet, morbum tamen fuisse confirmatum, & viscera jam labem, præsertim ex priore morbo contraxisse, coniciendum est.

Multis aliis hanc operationem, & cum præmeditatione fuisse administratam, sed neminem servatum, à multis Prædicis audiui.

Hydrops universalis à me pluries curatus est brevi & facili per diuretica & hydragoga; qui scilicet hydrops seu tumoris universalis genus, non erat tertia hydropis species, leucophlegmatia passim dicta, quæ non nisi ægrè curatur. Sanguinis enim pituitosi crassique & male compacti, nec poris partium bene agglutinati & assimilati, idèoque in toto redundanti & superflui soboles existit, ex defectu tertiæ coctionis, quæ in singulis partibus fieri debet. Adde, quod in hac color cutis subalbidus atque lacteus, aut livore suffusus, cum anorexia & siti importuna aliudque conspiciatur: ea verò symptomata non apparebant in prædicto tumore universali, qui ideo continentem habebat causam diversam, scilicet serosum humorem, cutem inter & cæteras membranas universales stagnantem, unde aqua intercus Celso dicitur, cui color idem fere atque ante; quod etiam confirmat tactus. Nam curis digito compressa resilit, ex se statim refluit aqua sponte illuc, unde à premente manu dejecta; in leucophlegmatia autem impressum relinquitur digni vestigium, sanguine crasso non faciliè refluit illuc, unde expressus fuit: præterea cita curatio, quæ consequuta est, illud satis evidenter arguit, quod ulterius patet in sequentibus observationibus, quas ideo annectere placuit.

Deinde modus solutionis differentiam etiam statuit inter leucophlegmatiam & prædictum tumorem universalem, quandoquidem longè facilius pleonexia serosa seu illuvies in toto redundans corrigitur, quàm intemperies frigida siccaque viscerum, crudioris sanguinis parens emendatur: Prædicta autem curatio per hydragoga à me celebrata, sententiæ Hippoc. in coacis respondere mihi videbatur, cum ait, *Incipienti hydropi alvi profluvium aquosum sine cruditate, morbum solvit, & purgatio per*

*renes.* Idem etiam dixi. *Si aqua ad vesicam aut ventrem fluat, solutio.* Cum tamen experientia doceat, evacuationem quæ fit per urinas, melius succedere eâ, quæ fit per alvum.

Rusticus quinquagenarius ex perpeffa per aliquot menses febre tertianâ nothâ, incidit in hydropem universalem, a quo eum liberavimus succo ireos nostratis, ad 3. iii. cum mannæ 3. i. f. eoque intra septem dies ter exhibitio, venter omnino decumuit, maxima serosæ illuviei copia per alvum & urinas excreta.

Alter annorum circiter 26. ex febre quartanâ diuturnâ incidit in tumorem universalem totius corporis, in quo cutis digito compressa resiliebat, cum duritie, è regione lienis. Huic Chirurgus quidam sine ullo præscripto, ut ferè semper apud rusticos præstare solent, multa remedia per longum tempus, sed sine fructu exhibuerat, donec ad extrema ferè redactus, meam open imploraverit, quippe quem ab acuto morbo aliquando liberaveram. Hic ergo cum quædam remedia ex arte præscripsissem, præcipuè vinum juniperinum, hoc solo uti voluit, jamdudum omnium fermè remediorum pertæsus, fuit enatque illius 3. vi. singulis matutinis, unde urina copiosius & frequentiùs fluere, venterque parum decumescere cœpit. Quod cum rescivissem, & eum reliqua remedia præscripta amandasse, suasi ut saltem 5. j. pulveris ex lenna, cremore tartari, & radice jalappæ cum jusculo fumeret per 12. dies alternos, & interim diebus vacuis perseveraret in usu vini juniperini, quo peracto, integram sanitatem recuperavit, & brevi ad solitos labores reversus est.

## OBSERVATIO LXXXIII.

*Febres tertianæ.*

**F**Rater Eloysius, juvenis Religiosus Ordinis Fratrum Minorum apud Costam, febre tertiana duplici laborans à 4. mensibus, frustra usurpatis multis remediis, ab alio Medico præscriptis, à me curatus est, rigida existente hyeme, exhibitis febrifugi Riveriani gr. 12. quibus blandè purgatus per inferiora tantum. Graviorem ead die (ut sæpe fieri solet in hujus remedii usu) passus est accessionem, sed nullam deinceps; attamen post 15. dies ob incautam victus rationem & fructuum usum nimium, leves rediere accessiones; quæ levi cathartico exhibitio iterum disparuerunt. Quod in hujusmodi febribus, & quartanis, ita sæpe usurpavimus, quoties recidiva contigit.

Febre tertianam duplicem in sartore Costensi 30. annorum, melancholici & pituitosi temperamenti curavimus, præmissis duabus purgationibus cum præparantibus idoneis, & duplici venæ sectione, usu febrilis Crollii ex 3. iii. aquæ cicchor. salis absinth. 5. f. & spiritus sulphur. gur. xv. ex cujus prima dosi febriles accessiones immantæ sunt, ac tertia penitus sublatæ quæ prædictis remediis per 20. dies non cesserant. Hòcque remedium à 12. annis centies usurpavi in variis febribus, & præcipuè tertianis, semper profuisse animadvertimus. In defectu autem salis absinthii, sal tartari sæpe substituiimus, exemplo præceptoris nostri Dom. Riverii, & aliquando etiam cum decoct. absinthii, ut videre est in ipsius observationibus.

Dn. de la Rivoire, laborans principio Augusti 1648. febre tertiana duplici, cujus alterni accessus cum gravissimè affligebant inquietudinibus, siti, dolore capitis, & respirandi difficultate, à me curatus est præmissis clystere & venæ sectione, exhibendo in vigore paroxysmi, ad extinguendos spiritus febriles sitibundos, aqua fontis magnum haustum, cum spiritu sulphuris per campanam elicti q. f. ad sensibilem aciditatem & syrupo de limonibus; quo potu febricitantibus siticulosus gratissimo, ter aut quater exhibitio per biduum, omnia febris prædictæ symptomata longè mitiora evaserunt, & paroxysmi multo breviores, ita ut hac prævia præparatione materiæ morbificæ, & imminutione symptomatum, curatio absoluta fuerit usu pulveris Comitæ & febrilis Crolliani per biduum sequens exhibitio. Notandum autem est prædictum agrotantem



tantem 35. annos natum, obstructionis utriusque hypochondrii præcipuè verò lienis esse affectum, & singulis ferè annis, gravibus morbis diuturnis esse obnoxium, ob incautam & igneam vivendi rationem.

Prædictus Dn. febre tertianâ laborans, mense Julio anni sequentis, curatus est unica dosi febrilis Crolliani, cujus quia duæ doses missæ fuerant, alteram exhibuit puellæ 10. aut 12. annorum, eodem morbo laboranti, & sic febris in utroque disparuit.

Pater Christophorus, ex Ordine fratrum Minorum hujus urbis, ætatis 40. annorum, macilento, & melancholico corporis habitu præditus in principio Septembris anni 1649. incidit in febrem tertianam, quam curavi, præmissis clystere & venæ sectione, unicâ dosi pulveris Cornachini.

Eodem tempore frater Norbertus annorum circiter 35. firmiori corporis habitu & eufarco donatus, laborabat eadem febre, quam ex caloris ingentis gradu, inappetentiâ, dolore capitis, inquietudinibus, cacochymiâ, & paroxysmorum longitudine, diuturnam fore immerito suspicabar, adde, quod anno elapso eodem morbo graviter laboraverat, per mensem integrum, cum insigni virium dispendio. Post injectum clysterem, & phlebotomiam celebratam, sumpsit calomelanos Turqueti gr. 10. Scammonii gr. 10. in forma pilulari, unde copiosè & blande purgatus est eadem die. Sequentibus verò duabus ter aut quater, sicque prædicta omnia symptomata brevi disparuerunt, unamque tantum & levem accessionem, post assumptum remedium passus est. Calomelas Turqueti, est mercurius dulcis sexies aut septies sublimatus, ut videbis infra.

Domina de Dossin Monialis mense Martio anni 1651. à febre tertiana liberata est post 4. accessiones, sumendo in vigore paroxysmi spiritus sulphuris per campanam elicitum, guttas 20. cum ptisana vulgari & syrupo de cerasis acidis, vel aqua sola saccharata bis aut ter, urgente siti, instar julepi, sequenti die sumpsit mercurii prædicti dulcis gr. 20. & resinæ scammonii gr. 10. in pilulam redacta, & pellicula cerafi saccharo conditi inclusam, quâ optimè & blandè evacuata est.

Illustrissimam Comitissam Dominam de Ferrieres, eodem modo eademque ratione à simili affectu liberavimus principio mensis Februarii, ejusdem anni, rigidissima existente hyemali tempestate.

Innumeros, quibus multa remedia frustra exhibita fuerant, per longum tempus à tertiana simplici & duplici curatos vidimus, assumpta semel aut bis aqua benedicta Rulandi. Alios sale vitrioli ad 3. i. Plurimos, quibus hæc & reliqua non profuerant, usu syrupi de asaro Lozzelli ad cochlear unum sumpti: & certè vomitorium virtutem atque utilitatem præ cæteris remediis, & iis, frustra tentatis, multoties expertus sum in variis casibus, cum cætera consentirent.

Præterea phlebotomiam in plenilunio celebratam pro febribus intermittentibus plurimum prodesse vidimus, quia tunc, ob lunæ vim, humores ebulliunt, & fluxibilior sit sanguis, ac promptius venâ sectâ educitur. Quo remedio eo tempore celebrato plures curatos, alios levatos esse testatur Zacutus Lusitanus, & ipse novissimè in viro religioso, ac instante paroxysmo duplicis tertianæ, curationem subsequutam vidi.

Mulier Costensis sexagenaria, nomine Ludovica Soyson, à quinque septimanis febre tertiana duplici laborabat, cujus alterni paroxysmi ad 15. & 20. horas extendebantur, & matutinis horis cum levi horrore, sed diu durante invadebant, alii verò circa meridiem & aliquando tardius cum rigore satis insigni nec ultra 12. vel 14. horas protraherantur, unde diversorum humorum in diversis locis putrescentium, non levis conjectura fuit, ideòque morbum etiam fore diuturnum, aut in quartanam abiturum prædixeram, propterea, quòd etiam ægra de hypochondrii sinistri dolore semper conquesta esset. Huic primò purgans medicamentum bis aut ter exhibitum, phlebotomia semel celebrata, cum clysteribus identidem injectis per 12. dies à seniori Pharmacopœo. Tandem vocatus præscripsi quatuor doses apozematis ex radic. & her-

bis aperient. refrigerant. & specificis, addendo cuilibet dosi sennæ mundat. 3. iii. syrupi rosæ 3. i. & salis tartari 3. ʒ. unde laudabilis evacuatio sequebatur, attamen febris parum imminuta. Sed propter ætatem & virium imbecillitatem intermissa remedia, pro induciis naturæ concedendis, & restauratione virium, ut deinde feliciter per epicrasin natura obstericaret; sicque post aliquot dies iterum duæ doses prædicti apozematis alternatim præscriptæ & exhibitæ sunt, unde febris post tres vel quatuor dies disparuit per unum aut alterum diem, quo elapso, cum pari vigore iterum invasit, ita ut etiam aliquando ab ea omnino expers non videretur; sicque lecto affixa languebat circa dies caniculares anni 1655. Huic igitur tandem exhibui febrifugi Riveriani gr. 20. cum confectioe de hyacinth. in formam boli, in majori febris intervallo, unde quinque alvum deposuit cum tolerantia, in paroxysmo verò bis per vomitum rejecit magnam copiam materiæ porraceæ, æruginosæ, & viscosæ, cum aliquot ventris torminibus, quæ duas vel tres sedes per inferiora præcesserunt. Paroxysmus brevior fuit, neque deinceps apparuit. Hoc autem notatu dignum erat, quod in operatione ægrotans sibi aliquid ex hypochondrio sinistro, ubi dolor antea fuerat, evelli sentiebat, quod causam febris & doloris ibi latitantem à remedii virtute specifica in suo foco oppugnari, evidenter demonstrabat.

Juvenis annorum 20. febre tertiana duplici laborans, in exercitu Pedemontano sumpsit cyathum unum vini albi calidè in quo dissolvit sulphur pulveratum ad magnitudinem unius ovi. Post dimidiam horam copiosissimè sudavit, nec amplius febris apparuit, quod remedium in duobus aliis hac in urbe usurpavit, cum eodem successu.

#### OBSERVATIO LXXXIV.

##### Febris quartana.

Juvenis Sabaudus annorum 22. habitu eufarco & pituitoso, à duobus mensibus laborabat febre quartana duplici. Huic cum remedia universalia per apozemata & venæ sectionem respueret, febrifugi dicti gr. 20. exhibuimus, unde febris ex quartana duplici simplex facta est, iterumque bis exhibitæ eadem dosi, omnino curatus est.

Sacerdos quinquagenarius multum melancholicus, febrem quartanam passus erat per quatuor menses. Hanc ego curavi media hyeme, exhibendo febrifugi Riveriani prædicti gr. 24. verum post 25. dies reversa est, & iterum curata eodem remedio.

Prædicta Domina de Dossin, annorum 30. laudabilis temperamenti, & elegantis formæ, ac ingenii singularis, post varios affectus ex mœrore oriundos, incidit in febrem quartanam, à qua post quatuor menses curata est mense Decembri anni 1650. post multa remedia frustrata, unica dosi prædicti febrifugi.

Nepos meus Franciscus Jacoz annorum duodecim, febre quartanâ post tertianam diuturnam laboravit per sex menses, quorum spatio multa sumpsit remedia, etiam febrifugum prædictum, at frustra, partim propter ingluviem, partim etiam ob pravam viscerum dispositionem. Tandem uno cochleari syrupi prædicti de azaro, in ptisana communi, curatus est excitato scilicet ter aut quater copioso vomitu variorum humorum, parietibus ventriculi, & vicinis partibus ita adhærentium ut cathartici pluries exhibitis deturbari non potuissent, qui appetitum valde dejiciebant, jamque colorem atque habitum corporis valde immutaverant, quæ tamen recepit post breve tempus, cujus decursu ita febris imminuebatur, ut vix eam persentiret, donec omnino disparuit, redeunte appetitu laudabili, & vivo faciei colore.

Nepos meus Bernardus annorum 30. febre quartana laboravit, mense Octobri 1650. per tres septimanas, cum anorexia, languore, & pallido ac macilento totius corporis habitu. Sumpsit paulò ante paroxysmum cochlear unum syrupi de azaro dicti in juscule, multoties & copiosè vomuit amarissima, cum labore, per duas circiter horas, ita ut sequentibus quatuor diebus os ipsi foetidum & amarum instar fuliginis esse videretur, ac febris perseveraret, sed levior facta, post septem dies omnino sublata est



est assumptis mercurii dulcis ut *suprà* sublimati gr. 32. & resinæ scammonii, gr. 20. (difficile enim purgatur) statimque vividum faciei colorem & appetitum simul recuperavit, cum viribus, in horas redeuntibus.

Frater Otho Recollectus hujus urbis, squalidi & sicci temperamenti, febre quartanâ laborans à tribus mensibus cum tensione & dolore lienis, ac sudoribus nocturnis, curatus est mense Novembri, anni 1651. sumendo primum infusionem 3. β. salis tartari cum guttis aliquot spiritus salis & 3. i. fol. sennæ factam in 3. vi. aquæ fontis per noctem, manè quatuor dierum spatium, unde bis aut ter singulis diebus purgatur, appetitum & robur sensim redire afferens; febris levior, quæ tandem disparuit post 7. dies, iterumque reversa curata est per gr. 5. resinæ scammonii & 3. β. mercurii sublimati dulcis prædicti, quibus optimè & blandè purgatus, iterum sumpsit per triduum prædictam ptisanam tartarizatam laxantem. Verum quia sudoribus diffuebat singulis noctibus, & dolor circa lienem non omnino sublatus erat, ac lassitudinem in tibiis gravem persentiebat, iterum sumpsit calomelanos similem dosin, ut *suprà*, in forma pilulari, ad recidivæ occasionem evitandam.

Febris duplex quartana, gravissimè affligens à duobus mensibus honestum virum, Dominum Regoudin, temperamento valdè melancholicum, meo consilio curata est principio Novembris anni 1651. tribus dosibus infusionis sennæ in aqua febrifugâ Riverii factæ, & phlebotomia semel celebratâ, quia ejus indicationes aderant. Est autem aqua hæc febrifuga sola aqua fontis cum sale tartari, cujus certè miros effectus quotidie experimur in omnibus diuturnis febribus, & morbis, ab obstructionibus productis, ut clariùs patebit infra. Eodem tempore frater meus quinquagenarius, postquam bis recidivam ex tertiana duplici passus esset, quia multis negotiis & domesticis rebus implicatus, nec satis purgatus, incidit in quartanam triplicem molestissimam, sed post quatuor vel quinque ejus paroxysmos, sumptâ bis infusione prædicta, purgatus evasit à longiori febris molestia.

Dn. Gruifard mercator Costensis 30. annorum, laborans quartana duplici, à duobus mensibus, sumpsit febrifugi gr. 24. in pilularem formam redacta. & in quartanam simplicem, eamque levissimam, versa est febris, quæ tamen post aliquot dies, ob errores in cibo & potu commissos, gravior facta est & aliquando duplex, aliàs verò triplex; iterum sumpto febrifugo levior facta, sensim evanuit, imperato vitæ regimine parciori: sed quia arti suæ, equitationi intempestivæ, & genio nimium deditus, iterum passus est recidivam, iterum sumpsit febrifugi gr. xxxii. sicque sensim convaleuit.

Pater Andreas à Costa, frater meus natu major, è Franciscanorum familia, post febrem acutam multorum dierum, multosque labores perpeffos, incidit anno 1654. in febrem quartanam, quam multis remediis oppugnare conatus est, sed frustra. Tandem missis ad eum duabus dosibus febrifugi Riveriani, sub finem hyemis anni 1655. à prædicta febre liber omninò evasit.

Eodem tempore rusticus quadragenarius, Villicus Magistri Dumas, Chirurgi Costensis, eodem morbo laborans à duobus mensibus, unica dosi prædicti remedii feliciter & integrè curatus est.

Mulier Tullinensis, 24. annorum, à quindecim mensibus laborans febre quartanâ, quæ aliquando duplex, imò semel continua facta, eam ad extrema coëgerat, cum icterico faciei colore, appetitu dejecto, macie corporis, & tumore insigni utriusque hypo. hondrii, maximè verò lienis, de valetudine recuperanda parum sperans, ad me venit, auxilium si quod superesset, tot malis enixè postulans. Huic igitur primò præscripti ptisanam tartarizatam laxantem prædictam, in decocto hepatico & splenetico, per octo dierum spatium, cum fotu & linimento, iisdem viribus prædito, & utrique hypochondrio admovendo; Tum deinde pilulas tartareas Botii ex aloë. gummi ammoniaci, & tartaro vitriolato, per duodecim dies: quibus elapsis, iterum sumpsit per triduum prædictam ptisanam, tumor & dolor è regione lienis multum imminutus apparuit,

faciei color citrinus evanuit, appetitus redire coepit, febris tamen eadem, quæ tandem omnino disparuit, ter exhibito pridie accessionis febrifugo Riveriano: sicque post aliquot dies sine ullo recidivæ metu sana & hilaris in patriam reversa est.

Tædiofum foret omnes recensere, quibus prædictum febrifugum exhibitum vel febrem subtulit, vel multum imminuit, nec unquam nocumento fuit.

Sutor Costensis nomine Gelas, febre quartana laboravit per sex menses, & ab ea liberatus est, sumendo dimidium cyathum vini atbi in quo decoquebat mala aurantia, in partes dissecta, idque singulis matutinis, per aliquot dies.

Multi rustici in his oris curant febrem quartanam pulvere chamædr. exsiccat. tum jusculo per aliquot dies sumpto, quod certe sine ratione fieri non existimò, præcipue si quædam purgantia præcesserint, cum splenetica ac hepatica sit, & insigni virtute polleat, viscera ab infarctu liberandi.

## OBSERVATIO LXXXV.

*Colicus dolor in purgatione menstrua, & hysterici affectus.*

**L**ectissima virgo Monialis Dominica de S. Paul, annorum 37. laudabilis temperamenti. (sicut & ingenii) ad pituitosum tamen nonnihil vergentis, circa tempus menstruæ purgationis, imò in ipso fluxu, solita est pati dolorem colicum spurium, eumque atrocissimum, per duos vel tres dies, unde aliquando menstrua purgatio supprimitur. Utrique affectui subvenimus aliquando clystere carminante & laxante; aliàs verò, olei anisi guttis aliquot in vino vel jusculo sumptis; ita ut colicus ille dolor, qui multum durare solebat, in momento sæpè sublatus fuerit.

Eadem Domina sapissimè corripitur suffocationibus hystericiis, cum dolore capitis & ventriculi, à quibus affectibus eam multoties liberavimus exhibito sale vitrioli ad 3. β. & 3. i. in aqua fontis dissoluti. Blandè siquidem provocat vomitum, & hystericiis affectibus specificum prædicant omnes chymici: aliquando etiam granis aliquot laudani ex descriptione Crollii, cujus certè miros effectus se percepisse semper fatebatur, etiam ex solo ipsius laudani olfactu, cujus sæpè majorem pilulam manibus volutabat, identidem odorando.

Mulier vidua Costensis, quadragenaria, hystericiis affectibus diu nocturneque ita vexata, cum febre & vigiliis, ut moritura videretur, post unum aut alterum clysterem injectum, sumpsit laudani gr. 4. brevique post tempore quævit, & symptomata omnia cum febre evanuerunt.

## OBSERVATIO LXXXVI.

*Mensium fluxus immodicus.*

**N**obilissima Domina de la Jassodièrè, annorum 40. optimi habitus & temperamenti, à duobus ferè annis laborabat fluore muliebri seroso, qui per intervalla adeo copiosus erat, ut ægotantem in vitæ periculum conjiceret. Ad eam aliquando vocatus, cum longè ab urbe dislaret, & remedia in promptu non haberentur, ea verò propter fluxum immodicum deficeret, exhiberi jubeo 3. i. pulveris ex putaminibus ovorum combustis in jusculo, unde tanta serosi sanguinis jactura multum imminuta est intra paucas horas, ac sequenti die iterato remedio, omnia suppressa, agræque victu reficiente & analeptico sensim restituta, ac post aliquod tempus causæ morbificæ per debita præsidia provisum est.

Uxor pulcherrima Claudii Vivier Costensis annorum circiter 27. per excretionem molæ bimestris, incidit in fluxum sanguinis immodicum, qui per tres septimanas perseverans, eam in vitæ discrimen adduxit, & tantam spirituum cum sanguine jacturam, ut vires & animus continuo deficerent. Vocatus suasi ut succi urticæ depurati 3. iv. mane & sero sumeret per biduum: sed bis assumpto remedio



medio, sanguinis fluxus valde imminutus est & ante 24. horas omnino cohibitus. Eodem tempore admovebat regioni uteri fotum, ex spongia in aceto & vino rubro auflero madefacta: hoc remedium alias in simili casu cum pari successu à me usurpatum est, illudque valde prædicat Amatus Lusitanus in centuriis.

## OBSERVATIO LXXXVII.

*Dysenteria.*

**R**usticus 60. annorum, principio Augusti anni 1648. laborabat à multis diebus gravissima dysenteria, cui cum remedia ex arte præscripta non tam citò ab urbe asportari potuissent, cataplasma ex absinthio & rosis rubris in lacte decoctis toti abdomini applicari jubeo, exhibitis interim laudani gr. 4. Inde post aliquot horas rariora fuerunt dejectionum intervalla, dolor imminutus, nec non tranquillior, ita ut præscriptis remediis opus non habuerit.

Illud idem serè contigit in alio Rustico 20. annorum qui per multos dies & noctes dysenterico fluxu ad extrema ferè redactus propter dolores immanes & vigilias perpetuas; sumptis laudani gr. 3. sub noctem, quam ferè integram placidè transegit, cum levamine & fluxu tantum bilioso, cui post modum per debita remedia provisum est.

Vir militaris fide & laude dignissimus multos curavit in exercitu à dysenteria & alvi fluxu per 3. i. suberis pulverati in vino vel jusculo, quod remedium vide in observationibus Riverii.

## OBSERVATIO LXXXVIII.

*Pleuritis.*

**M**ultos & præcipuè, quibus appropriata remedia defuerant, ex pleuritide ad extrema fere redactos & reitutatos vidimus usum pomi Quercetani semel aut bis sumpti, intra 24. horas, unde præter spem vel copiosus sudor, vel anacatharsis libera sequebatur. Plurimos certè nominare possem, quibus ferè desperatis hoc remedii genus præscriptum, nec unquam alium, quàm felicem eventum ex eo animadverti; multisque, qui hoc apud ægros observaverunt, ita successisse multoties audiui.

## OBSERVATIO LXXXIX.

*Tumor mammarum.*

**M**ulier nobilis hujus urbis puerpera, laborans tumore mammæ sinistræ præduro ex concretione lactis, irritis omnibus remediis ex arte per mensem integrum usurpatis, curata est, sumendo 3. i. pulveris mille pedum præparat. in jusculo per triduum, hujus autem pulveris eximias dotes sæpe vidimus & audivimus ab expertis in hujusmodi tumoribus ex lacte concreto, nec non etiam in cancro mammarum ac reliquarum partium, ut contigit cuidam viro religioso, qui patiebatur ulcera multa etiam profunda in multis partibus corporis, præcipuè verò in tibiis, à quibus brevi tempore curatus est sumendo 3. i. prædicti pulveris per 7. vel 8. dies alternos, præmissis tamen præmittendis. Præterea pulvis hic cum sit tenuium partium, insigne præbet aperitivum & diureticum.

## OBSERVATIO XC.

*Dolor dentium.*

**U**xor D. Dumas Chirurgi Costensis, gravida septemtritis, & biliosi temperamenti, ab acuto morbo resurgens, tanto dolore dentium correpta est, ut frustra tentatis omnibus remediis, per multos dies insomnis & clamitans, cum lachrymis & vigiliis continuis, quælibet remedia, imò ferrum & ignem experta, ad desperationem ferè adducta fuerit. Ita ut coactus fuero ipsi exhibere nocturnis horis (quia tunc præcipuè intolerabilis ipsi

dolor erat) Laudani opiatum ritè præparatum gr. 4. quibus cum pauca quantitate confectiois de hyacinto assumptis, post horæ quadrantem placidè per aliquot horas dormivit, ac sine dolore expergescens, reliquum graviditatis tempus jucundè transegit, quæ propter cariem & nigredinem dentium, eorum dolore ferè continuo laborare solebat.

## OBSERVATIO XCI.

*Lues venerea.*

**D**. Gr. mercator Costensis, lue venereâ laborans ab aliquot mensibus, à me curatus est sine ullo alio remedium apparatu, per opiatam Neapolitanam Renodæi, cui addebat singulis diebus mercurii præcipitati albi, cum spiritu sulphuris præpar. 3. 6. & per intervalla exhibebam dosim calomelanos Turqueti seu mercurii dulcis sexies sublimati gr. 20. cum resinæ scammonii gr. 12. in forma pilulari, cum usu bocheti, ex decocto guajaci & falsæ parillæ per 20. dies.

Alter juvenis, ejusdem amicus, eodem morbo laborans, eodem etiam tempore & modo curatus est circa vernum tempus anni 1648. & ab eo tempore multos etiam curavimus usu folius opiatæ prædictæ, cum mercurio prædicto & decocto falsæ parillæ, per longum tempus. Quibus autem alvus multum movebatur, illi tantum alternis diebus sumebant prædictæ opiatæ 3. 6.

Puellam 15. mensium Domini B. consobrini mei à lue venereâ per contagium à nutrice acceptâ curavimus, exhibito mercurio præcipitato albo, ut supra præparato ad gr. 3. & 4. per aliquot dies cum panatella saccharata vel lacte.

## OBSERVATIO XCII.

*Phthisis.*

**P**hthisim per contagium communicatam curavimus. præter omnium spem, principio Julii 1649. sequentibus remediis: ac primo potione ex manna & syrupo rosac. in decocto pectorali; sequenti die applicita sunt duo caustica posteriori parti cervicis; postmodum juscula per 15. dies cum radic. chinæ, foliis buglossi, tussilag. pulmonariæ passulis corinthiacis, quæ per intervalla, purgantia reddita sunt. Utebatur etiam continuo conserva ros. rubr. & sæpe sub noctem syrupo fluxionem cohibente ac tussim sedante ex æquis partibus syrapi violac. de ros. siccis, & de papavere. Erat autem puella 15. annorum, nondum menstruata, quæ febre lenta laborabat à tribus septimanis, cum tussi continuâ laboriosâ, anorexiâ, difficultate spirandi, & macie totius corporis, ac vigiliis ferè continuis, quem affectum contraxerat à sorore sua, quæ lac præbuerat per aliquot dies illustrissimo Domino Abbati de S. Paul qui phthisicus perierat ante duos menses. Prædicta autem mulier 22. annorum, bene habita, brevi deinde tempore, eodem affectu etiam periit.

Illustrissimus Baro N. à morbo Castrensi & dysenteria diuturnâ incidit in febrem hecticam, ferè marasmodem, ita ut Lugdunum deportatus, à Medicis tandem deploratus, & suo prognostico derelictus, sed à Rustico qui eodem morbo laborasse & evasisse ferebatur, sequenti remedio restitutus est, scilicet jusculo per aliquot dies exhibito in quo decoquebat limaces rubros agrestes exenteratos & lotos in aqua ros. vel alio liquore; jusculum colatum sic propinabat, quod certè non mirum, neque respuendum; siquidem testudines præscribere solemus ad reparandos hecticos, & alia hujusmodi alimenta, quæ solidam, glutinosam, & minùs dissipabilem substantiam obtinent.

## OBSERVATIO XCIII.

*Pica & Chlorosis.*

**T**Acere non possum mirabiles effectus ex pulvere cachectico Quercetani, cujus beneficio innumeras tum virgines



virgines, tum mulieres & viduas, chlorosi & picâ, tum etiam sæpe cachexia laborantès curavimus, præmissis tamen universalibus remediis.

Certè miratus sum quod etiam feles picâ laborent, ut vidi in fele mea domestica carbonēs & cineres comedente, cum jam à multis diebus vix quicquam comedere veller; ea autem, ideo ut existimo nunquam catulos peperit.

## OBSERVATIO XCIV.

*Febris putrida continua.*

**C**irca medium Maii anni 1652. cum tempus calidum fuisset per aliquot dies, mox boreale & ita frigidum, ut teneriora fructuum & arborum germina adureret, atque iterum calidius factum, corpore tali inæqualitate & subita mutatione malè disposuit. Quod ego certè meo incommodo expertus sum; tunc temporis enim ferè semper ad ægros rure profectus, die vigesima ejusdem mensis incidi in gravissimum capitis dolorem: cum febre continua, inquietudinibus, siti, ac vigiliis importunis, calore acri & mordaci ad tactum: Quæ cum jam 24. horas afflissent, statim injecto clystere, sanguinis adusti & parum corrupti 3. x. è brachio dextro exire jussi, unde cum parum levaminis perciperem, iterum post novem horas ejusdem diei 3. ix. detraxi, qui magis corruptus apparuit, & post horam unam vel alteram capitis dolor & febris remittere cœperunt, ac sequentem noctem quietior transigi, cum placido somno aliquot horarum. Tertia die febris omninò disparuit, quæ certè duratura videbatur ulteriùs. Usque adeo verum est illud Hippocratis. In principiis morborum, si quid movendum videtur, move, & quoad iterationem phlebotomiæ, quando ea necessaria videtur ad evacuationem, eodem die fieri debet; si revulsionis gratia, diversis diebus. Nam ubi vacuandum est, præcipuè in acutis, subito corpus in alium statum transferendum est; quia sæpe accidit, ut morbus mox principium percurrat, ita ut postea venæ sectione non ita commodè uti liceat.

## OBSERVATIO XCV.

*Tumor hepatis scirrhus & decipiens.*

**A**liquando tumor scirrhus occupat musculos epigastricos, quod certè decipere potest juniores incautos, aut umbratiles Medicos, ut vidimus contigisse seniori & celeberrimo Medico, cujus laudi nihil propterea detrahendum qui talem tumorem sumpsit pro scirrhus hepatis in nobili viro, & remedia ad talem effectum oppugnandum ordinaria, sed frustra præscripsit, cum solis externis opus esset, iisque curatio absoluta fuerit: Nobilis autem ille vir licet sexagenarius optimâ valetudine fruebatur à duobus annis, ac vivido faciei colore quod tamdiu non tulisset, si verus hepatis scirrhus adfuisset: adde quod tumor ille locum mutaret, quoties nobilis ille ad latus sinistrum vertebatur, est hujus rei testis Dominus Riverius.

## OBSERVATIO XCVI.

*Idus serpentum.*

**R**usticus à serpente ictus in ingentem totius corporis tumorem incidit, attamen evasit, multas hirudines singulis diebus morsui applicando, per aliquot dies.

Qui in his oris viperas capiunt, prope sylvam sancti Hilarii, quando ab eis punguntur, nihil applicant morsui præter allium contusum, cujus usus etiam utilissimus.

Venator quidam amicus meus, morsum in canibus suis fricat cum saliva sua, & post reditum, aquam frigidam propinat, sicque omnes liberat; Idem retulit mihi, cor viperæ statim exhibitum, præsentissimum esse remedium: illud etiam præstat pulvis ejusdem cordis, vel totius animalis, in iusculo, aut alio liquore appropriato.

Cum aliquando canis mea venatica ictum viperæ accepisset, subito in terram concidit, nec erecta progredi poterat, quin statim recideret. Huic vulnus cultello scarificavi, & in proximam domum deportatæ ossâ exhibui cum theriaca & alio, sicque liberata est, collo ta-

*Lazar. Riverii Opera.*

men ubi demorsa fuerat, per aliquot dies tumido remanente.

## OBSERVATIO XCVII.

*Morbi Chronici, & diuturni.*

**I**n morbis omnibus Chronicis & contumacibus curandis experientia & lectione ubique didici, vel hydrotica & sudorifica, vel præcipuè aperientia valida præstantissima esse; qualia sunt sal tartari, spiritus sulphuris per campanam elicitus, & mercurius dulcis sexies sublimatus, & his similia, ad longos dies usurpata, ut centies observavi, & præscripsi exemplo Præceptoris mei, qui sæpe ita sal tartari, & spiritum sulphuris infundebat cum 3. j. vel 3. ij. sennæ (aliquando radic. jalapæ 3. ʒ.) in aqua fontis sola, aut decocto appropriato, ut videre est in ejus observationibus; sicque febres intermittentes diuturnas; & ipsam quartanam, chlorosin, cachexiam, melancholicos affectus & contumaces viscerum obstructions, irritis aliis, sæpissimè curavimus.

Aquam autem sale tartari imprægnatam, febrifugam jure meritoque vocavit D. Riverius in observationibus, ubi calomelanos nomine donavit Mercurium dulcem, ut supra sublimatum, qui certè laudabile, nec unquam noxium efficit catharticum ad ʒ. j. cum ʒ. ʒ. resinæ jalapæ vel scammonii, quorum dosis minui vel augeri potest: Et sane nunquam alium nisi optatum ex remedio assumpto vidimus effectum in casibus innumeris, & in omni ætate. Illius autem doses apud Authores chymicos nunquam satis laudari poterunt.

## OBSERVATIO XCVIII.

*Animadversiones practicæ circa febres malignas.*

**A**nnis 1649. & 1650. hoc observatione dignum existimavi in omnibus febribus malignis, quæ adeo grassabantur, ut omnis generis remedia eluderent. Scilicet quod quicumque ab initio de corde, ut vulgò dici solet, conquerebantur, seu levi syncope aut cardialgia corripiebantur, omnes ferè interierunt: causam hujus rei in malignam qualitatem jam in majora vasa & intimas corporis partes irrepentem referendam censeo, & ventriculum graviter à venenata illa qualitate citius affici, quàm remedia illam oppugnantia exhiberi possent.

Quibus etiam dolor capitis longè ante febrem oriebatur, & quicumque vermes in statu morbi per superiora rejecerunt, etiam interierunt, præcipuè vere & æstate, non ita vero autumnali tempestate: Omnes autem quotquot evasisse vidi, multum sudavere quinto, & sexto die, quod mihi mirum visum est, eò quod infrequens & præter rationem ac leges dierum criticorum, atque ideo ni fallor, omnibus ferè recidiva contigit, idque ter & quater, & iterum per sudores judicati sunt præter eos quibus levia cathartica exhibita sunt; & quicumque ab initio correpti sunt febre continua cum vigore symptomatum, vel alio modo purgati sunt: quibus missus fuit sanguis, omnes ferè perierunt. Quibus autem circa autumnum pauca remedia administrata sunt, ii citius evaserunt.

Hoc unum afferam de remediis, scilicet me vidisse miranda experimenta aquæ theriacalis Bauderonii, & alterius etiam minus compositæ, etiam in deploratis, & quibus maculæ purpureæ, aut variolæ tunc etiam grassantes retrocesserunt.

Alvi fluxus in principio ferè semper funestus fuit, cum urina, suspensum aliquando sedimentum perseverans, ac colorem laudabilem habente: ii etiam citius evaserunt, quibus parçè missus fuit sanguis, & nulla purgatio exhibita, quæ alioqui periculosa fuit, & multis perniciofa.

Toto anno sequenti 1651. & præcipuè autumnali tempestate, hoc ego verissimum esse expertus sum, si unquam alias, quod dicit Fernelius de corporibus cacoehymis, quibus purgatio necessaria est, eamque respuendo, alimentis potius quam remediis sese reficere conantur, non se (inquit) sed suam ipsi intemperiem alunt. Sic enim natura cum sit paucis contenta, ita suas functiones melius perficit, nec putres aut crudi humores in ventriculo collecti, aut aliunde

A a a a

illapfi



illapſi actiones illius deſtruunt, ſicque vita in longiores & leviores annos prorogatur ſolius temperantiæ beneficio, quæ una eſt vitæ ſalubris moderatrix, ut ait Hippocrates, & ante illum Eccleſiaſticus verbis proſus divinis. Propter crapulam (inquit) multi obierunt, qui abſtinens eſt ad-jiciet ad vitam. Omnes autem, quotquot à popularibus hiſce febribus evaſerunt, temperantes erant, & quicum-que recidivam paſſi ſunt (omnes autem fere patiebantur) hoc contingebat propter cibum largius, quam par erat ſumptum, licet etiam in minori copia, & alimenta faciliſ coctionis laudabilis ſucci ſumere viderentur, quod certè omnes ægri fere fatebantur invito appetitu.

## OBSERVATIO XCIX.

Pestis.

**Q**uidam, cui demandata fuerat cura tertiæ partis al-cujus urbis peſte afflicta, omnes ferè curavit vomitorio composito ex 3. ij. cujuſlibet vitrioli, mellis 3. ij. & aquæ communis 3. vj. ſimul mixtis, quod exhibebat ſta-tim atque apparebant aliqua ſigna morbi imminentiſ vel præſentiſ, ita ut vix decem aut duodecim obie-rint in ſuis partibus, cum in reliquis pauci evade-rent. Quod ſemper & ulteriuſ denotat vires & neceſſitatem vomitus in tali caſu, ſicut etiam probant tot Authorum obſervationes, & illæ quas annotavimus ex peſtilentia Coſtentiſ in priori editione obſervationum Ri-verianarum.

## OBSERVATIO C.

Suffuſio &amp; Cataracta.

**M**ulier 30. annorum, ex confirmata ſuffuſione, quæ ca-taracta vulgo nominatur, per annum integrum ob-ca-ca a, videndi facultatem recuperavit, præmiſſis univerſa-libus, beneficio aquæ ophthalmicæ. Quercetani per lon-gum tempuſ uſurpata, & purgationibus interpoſitiſ: huic autem loco aquæ chelidoniæ majoris ab authore præſcri-ptæ ſubſtituimus vinum album, imitatione prædicti Præ-ceptoris noſtri, à quo prædictam aquam cum ſelici ſucceſſu multoties præſcriptam vidimus & audivimus.

Puella 20. annorum, dolore intenſo, & ardore inſigni oculorum, cum lachrymis ferè continuiſ laborans per mul-tos meſes, tandem eo redacta, ut per annum integrum vix oculos attollere, & ſine alteriuſ ope progredi poſſet. Huic varia remedia omniſ generiſ adminiſtrata ſunt, ſed fruſtra ſoloque ſeraceo auriculari, à me tandem præſcripto, cura-ta eſt, ſcilicet in extrema parte utriuſque auriculæ facto, cum ſtylo triangulari ferro candenti, foramine immiſſiſ-que radici thymelææ fruſtuliſ, poſtea emplaſtro diachylo-ne gummato obvolutiſ, & ad inſtar ſetacei vulgariſ biſ aut quotidie, ſi opuſ ſit renovatiſ, per longum tempuſ.

Certè mirum eſt & incredibile dictuſ quantum ſeroſæ il-luviei copiam per huiuſmodi foramina depluere ſæpe vidi-muſ, ita ut vix decem dierum ſpatio ea copia per ſetaceum, quæ aliquando intra viginti quatuor horas per hæc emiſſa-ria fluere poſſit: Nec tantuſ in ejuſmodi fluxionibus ad oculos, ſed etiam partes omneſ inferioreſ (præcipuè verò externeſ) ut pectuſ, dentēſ, articuloſ; &c. hoc remedii genus multuſ valere ſæpe vidimuſ, multoſque ab immi-nente phthiſi ex tenui acrique deſtillatione, alioſ ab inve-teratiſ capitiſ doloribus curatoſ experti ſumuſ, dignuſ-que remedium, quod omneſ Præctici in fluxionibus tum vacuandiſ, tum avertendiſ pro variis affectibus in uſum revocare non dedignantur.

## OBSERVATIONES

ab aliis communicatæ.

## PRÆFATIO AD LECTOREM.

**O**mnibuſ ſedulo & accuratè artem Medicam exer-centibuſ, multa frequenter occurrunt obſervatione digniſſima, quæ tamen ut plurimuſ neglecta, inſeliciter percuſ, & oblivioni devoventur. Ea verò, quæ à qui-buſdam in commentariis privatoſ reſeruntur, illorum qui-dem uſui reſervantur, ſed utilitati publicæ nequicquam conferunt. Ideo ſeduloſ quoque artiſ Profeſſoreſ rogatoſ

velim, ut ſi publicè prodeſſe cupiant, & præclaras obſer-vationeſ hætenuſ collegerint, quæ juſtum volumen im-plere valeant, publici juris faciant. Si vero impar volumi-ni conſtruendo numeruſ earum fuerit, mihi liberaliter com-municare dignentur, eaſ cum quarta centuria (quam, ſi Deus vitam conceſſerit, brevi edituruſ ſum) ſub eorum no-minibuſ in lucem prolaturuſ. Quemadmodum in ſequentibuſ obſervationibuſ ab aliis communicatiſ, à me factuſ vide-re eſt: quaſ hinc inde ad amicuſ collegi, & ſub propriiſ ſin-gulorum nominibuſ edidi. In quibuſ multa meiſ præſtantio-ra legentur, ut inde patcat, unicuique licere artiſ Medicæ dignitatem hoc ſcribendi genere ulteriuſ promovere, & ali-quod inde nomen ſibi comparare.

Præterea benevoluſ Leſtorem etiam monenduſ duxi, me hæſce obſervationeſ ſecunduſ ordinem quo mihi communi-catæ ſunt deſcribendaſ curaffe. Ne quiſ de dignitatiſ ordine parum obſervato conqueri valeat.

\*\*\*\*\*

## OBSERVATIONES COMMUNICATÆ

à D. Petro Paſcheco.

Medico Lunellenſi Celeberrimo, amico meo Antiquiſſimo.

## OBSERVATIO I.

Inappetentia.

**M**illeſ chronica febre male mulctatuſ, incipienſ jam aliquantiſper respirare ab acceſſionibuſ, quæ multuſ priſtinæ ſavitiæ depoſuerant ſupplex à me petiit, ut appe-tentiam in ſe plane deſectam revocarem, alioquin intra quatríduum indubiè perituro. Ego præſcripſi potionem ex 3. ſ. diaphoenici, cum abſinthii vulgariſ, & agrimonii decocto, poſtea ſequentibuſ, veluti cote, appetentiam acui.

24. Folior. agrim. abſinth. vulgariſ, centa. min. ana m. ſ. fiat omnium decoctio, de colatura cape lb. ſ. cum pauco ſaccharo. Juſſeram ut novem dieſ huic decocto indulgeret febricitanſ noſter: ſed poſt dieſ quinque exactoſ rediit ad me, enixè rogans, ut caninam appetentiam uſu medica-menti noſtri excitatam obtunderem, quod præſtitimuſ ab-ſtinendo à potione noſtra amara, illique conſulendo, ut butyro, pinguedine, & vino generoſo uteretur. Plureſ in-talem affectuſ incidiſſe eodem remedio teſtiſ ſum.

## OBSERVATIO II.

Colicus dolor.

**D**N. Præſeſ de Rupemora ſenior graviſſimo colico do-lore excarnificatuſ triduum integrum, cum nulliſ a-nodynſ levaretur, ſumpta 3. j. pulveriſ inteſtini lupi, cum pauco vino generoſo, incantamenti inſtar in priſtinam va-letudinē erectuſ fuit. Item præſbyter huic malo valde ob-noxiuſ. Item vidua, quæ Monſpeli degenſ 27. dieſ crude-leſ craciatuſ toleraverat. Denique mille alii, quos brevita-tiſ gratia prætereo, nullo inſecto clyſtere, aut medicamen-to purgante ſumpto, quod admirationem fovet.

## OBSERVATIO III.

Colica Nephritica.

**V**idua quædam colico dolore, eoque nephritico dive-xata, petiit à me, agente in Bellilucaniſ thermiſ, ut ma-liſ ſuiſ obviam irem, quod in momento feci. Juſſi enim ut in thermiſ nullâ interpoſitâ morâ deſcenderet, & ſtatim dolor perfectè quievit, & mirati ſumuſ, quòd nullo prægreſſo clyſtere, aut pharmaco, tam ſubito levamen acceſſerit.

## OBSERVATIO IV.

Alvi fluxuſ cholericuſ febribuſ intermittētibuſ ſupervenienſ.

**Q**ui febribuſ intermittētibuſ biliſiſ & maligniſ la-borant, præcipuè duplici tertianâ, propter multitudi-nem materiæ biliſiæ ſurentiſ, in choleraſ morbuſ inci-dunt, recurrente paroxyſmo, cujuſ impetuſ ſi non ſcena-veriſ medicamentiſ infra ſtatim à me ſcribendiſ, morietur æger intra duos, aut treſ paroxyſmoſ. D. Labrunæſ vir literiſ apprimè tinctuſ, ejuſmodi febre laboranſ, vix poſuit à paroxyſmo ſervari, cui ſupervenerat choleraſ morbuſ, tri-guſ marinorum, pulſuſ minutuluſ & ſermè deſicientiſ, oculi concavi



concavi, aliaque horrenda symptomata. Tandem post innumera adhibita remedia, quibus multi agri noluerant uti qui valedixerant mundo, è faucibus Orci rediit. Ego ut crassiam potestatem averterem, iussi ægrotum panatellis crassiusculis & gelatinis recreari, ut frænum injiceretur humoribus sequenti die sævituris: Epithemata, & opiatas præscripsi ex conserva rosarum, bugloss. borrag. myrobal. saccharo conditis, margaritis: tribus vero horis ante paroxysmum, clysterem hunc mirabilem injiciendum curavi, sine quo actum erat, ni fallor, de meo amico.

℞. Rosar. rubr. M. j. coquatur in jusculo capitis & pedum vervecis, in colaturæ ℞. j. dissolve theriacæ recentis ℞. ij. vitellum n. i. fiat clyster, quem retinuit ad reditum usque paroxysmi, qui alvi fluxum reduxit, sed minorem multò. Huic methodo inhærens multo deploratos servavi.

## OBSERVATIO V.

*Hæmorrhoidum dolor.*

MULTI in hoc cœli tractu æstuoso, cæcis internisque hæmorrhoidibus laborant, quibus summus dolor creatur. Ab excrementis etiam induratis & suppressis, propter tumorem illarum, intestinum claudentem, sævissimus excitatur cruciatus. Vulgus Medicorum cassia ventrem emollit, ut liberiùs alvus deponat sua excrementa, sed malè profectò. Cum enim venæ inflentur in sede potissimum, propter insitam molliem, qua paratæ sunt sanguinem recipere, accidit, ut usu cassiæ ita molliantur, ut in posterum luxuriantem sanguinem faciliè recipiant, affectumque hoc modo magis augeant. Ego verò à muliercula stipem emendicante didici infundere millefolium in aqua fervente, & bibere infusionem illam per mensem integrum, aut diutius, & omnes tali affectu laborantes sanati sunt. Domina Dumasia, malè habita à tumentibus venis sedis, & Uxor Creancerii Chirurghi, fuerunt hac arte curatæ. Tandem hoc ipsum remedium reperimus apud Arnaldum de Villanova, cap. de hæmorrhoidum doloribus. Id ipsum remedium ad fluxum illarum immoderatum valde confert, si prædicto Arnaldo credere fas est, ratio etiam suadet.

## OBSERVATIO VI.

*Ictus vespa.*

CUM vespa manui aculeum meæ fixisset, dolor adeo sævus exortus est, ut impar essem ad ferendum malum. Admotâ theriacâ in momento cruciatus cessavit. Sed cum post tres horas theriacam illam admotam abjecissem, rediit dolor crudelissimus, ut antea, qui sopitus est eodem remedio, parti per diem integrum admoto.

## OBSERVATIO VII.

*Epinyctides.*

CUM nullis remediis epinyctides potuissem curare in atrabilario venatore mulierculæ consilio, illitæ fuerunt oleo juniperino, & vir iste placide dormivit, cum antea insomnes noctes duceret, & sanatus fuit.

## OBSERVATIO VIII.

*Convulsio.*

JUVENIS toto corpore convulsus erat, ita ut spina dorsif non posset inflecti. Sequenti remedio statim expeditè ambulavit.

℞. Butyri rancidi, & laridi veteris, ana quar. j. bdellii, ammoniaci, ana ℞. j. myrrhæ, castorei, ana ℞. iij. flor. stœchad. anthos, ana p. j. nucis moscat. & caryophyll. ana ℞. j. catum parvum exenteratum, excoctum, & in frusta concisum. His inferciatur anser, & consuatur, & torreatur in vero, primus qui defluet succus, abjiciatur, secundus qui defluet, colligatur in vase aceto semipleno, pro litu spinæ convulsæ. Remedium est divinum.

*Lazari Riverii Opera.*

## OBSERVATIO IX.

*Faciei tubercula retrocedentia.*

CARMELITA quidam, comis certè, optimis moribus præditus, sed tuberculis eminentioribus rubris, ac crassis per totam faciem sparsis dehonestatus, me invisit, quem prima fronte non cognoscebam, quod prædictæ pustulæ nullo artis præsidio, sed sponte delituerant, complanatæque fuerant. Huic prædixi in gravissimum morbum brevi casurum, nec fefellit conjectura; nam intra 15. dies, in continuam febrem incidit, à qua de medio sublatus est.

## OBSERVATIO X.

*Passio hysterica.*

PUELLA quædam viro matura, motibus quibusdam convulsivis, vagis tamen, affligebatur, ex quibus conjecti, (ut etiam ex doloribus uteri) illam suffocatione laborare missis ex antro pudoris vaporibus. Sequenti remedio in momento liberavi.

℞. Assæ foetidæ ℞. ij. castorei, sæculæ brioniæ an. ℞. j. Sem. rutæ ℞. j. croci ℞. ℞. laudani Paracelsi gr. viij. (quæ certè addidi, tum consilio Hippocratis, qui succum paveris somniferi præscribit in suffocatione uterina, lib. 2. de morbis mulierum, sect. 5. pag. 237. circa finem in Hippocrate Foëssii) tum ut cætera remedia admixta laudano contemperarem, cum syrupo de arthem. fiat massa pilul. de qua capiat ℞. j.

## OBSERVATIO XI.

*Dolores à partu.*

MULIER temulenta, sævissimis à partu exercebatur doloribus, qui post alia remedia huic præsidio cessaverunt.

℞. Galbani, assæ foetidæ, ana ℞. j. paretur emplastrum rotundum, cum quatuor granis moschi in medio, admoveatur paulo infra umbilicum. Uterus conglobatus in inguine lares suos reperiit, & dolor evanuit.

## OBSERVATIO XII.

*Ad dolores à vesicatorio.*

DN. Amalricus comate laborans, & ab eo emerfus conquirebatur mirum in modum de dolore à vesicatorio excitato, sed cum nullo anodyno potuissem illum sedare, Domina Ranchina uxoris meæ soror solo hydrelæo leniit. Ego mulierculam vesicatorio excarnificatam beavi sic, & omnes alias, quæ in tale tædium inciderunt.

℞. Corticis secundi, & viridis rami sambuci cultello derafi M. j. coquatur in oleo dulci cum pauca aqua ad consumptionem aquæ, colaturæ adde ceræ parum, fiat unguentum, quo dolores omnes à vesicatorio excitati demulcebantur. Divinum meherculè est.

## OBSERVATIO XIII.

*Vulnere prognosis.*

UXORI Dn. Justamundi crus intumuerat, quod gangrænam minabatur, calore nativo ab humorum pondere suffocato jam & obruto. Secta venâ, syrups de rhamno ℞. j. exhibui, cum pauco decocto cinerum ruborum, & crassina die detumuit bene membrum affectum. Hoc etiam observavi in pluribus aliis mulierculis, quas notavi crurum tumoribus magis obnoxias, quam viros, quod sit uterus corporis

A a a a 2

senæ



sentina, in quam confluit cumulatque humorum colluvies: & in coxas vicinas excrementa sua deponit.

## OBSERVATIO XIV.

*Mammillarum fissura.*

**U**Xor mea malè mulcēbatur mammillarum fissuris, quas nullo remedio potueram sanare. Mulier pannosa & annosa brevi curavit, illito oleo de nucleis recens expresso, sinapifato saccharo desuper, tenuissimè pulverato. Balsamum sacchari idem præstat, quod centies observavi.

## OBSERVATIO XV.

*Hydrops.*

**S**Abardatus Presbyter, post vomitum sanguinis librarum octodecim, in hydropem ascitem incidit, à quo cum liberaveram infuso rhabarbaro in aqua communi pro potu ordinario: sed cum genio indulgeret, nec memor esset præteritorum malorum, rediit hydrops, quo de medio sublatus est.

## OBSERVATIO XVI.

*Hæmorrhagia.*

**R**ufficus ex hæmorrhagia liberari, jam vicinus morti, me accersivit: sed cum nulla remedia contulissent, instillavi in aurem è directo naris sanguinem fundentis guttas aliquot aceti rosati, & sanguinis fluxus statim sublitit. Didiceram à Dn. Pontando, qui viderat hoc remedium à Belga Medico factitatum, idque apud Scribonium Largum legi cap. de hæmorrhagia.

## OBSERVATIO XVII.

*Singultus.*

**D**umasius Centurio febre tertianâ laborans, sumpto syrupo de papavere in medio paroxysmi, tam importuno singultu premebatur, ut penè moreretur, sed cum nec aloë sæpius sumpta, nec alia medicamenta potuissent affectum illum sanare, tandem consilio ægri nostri misimus ad thermas Balerucanas quæsitum aquam, qua copiosè epota, ut in thermis fieri solet; brevi curatus est suis & deterfis humoribus à syrupo tunicis ventriculi infixis.

## OBSERVATIO XVIII.

*Fluxus sanguinis ex auribus.*

**V**idi Brusolum Giniacensem, qui cecidit ex equo in lapides, & supra aurem dextram, à qua lb. iij. sanguinis effluerunt. Vidi etiam plurimos, qui sanguinem copiosum casu ex auribus reddiderunt, nec obierunt. Quotquot autem vidi ex casu aures saniosam materiam reddere, omnes de medio sublatis fuerunt.

## OBSERVATIO XIX.

*Venus languida.*

**M**ulier prolis cupidissima, sed appetentiâ veneris nullo modo laceffita à me petiit, ut stimulos veneris in se mortuos (ut dicebat) accenderem: quod feci sequenti opiata.

℞. Conservæ rad. eringii, & satyrionis maris an. ℥. j. corticis aurantiorum melle conditorum ℥. vj. nucem juglandem conditam num. i. confect. alkerin. ℥. ss. ambræ griseæ, formicarum volantium an. ℥. j. moschi gr. vj. cum syrupo conservationis corticis citrii: fiat opiata: de qua capiat ante levem coenam, ad molem parvæ castaneæ, superbibendo parum vini Hippocratici. Illa confessa est, se miram percepisse voluptatem post usum opiatæ nostræ.

Nihil autem efficacius invenitur, quàm litus regionis ueri, ex oleo de formicis volantibus, quod sic fit.

℞. Formicarum volantium ℥. iij. infundantur diebus canicularibus in oleo ad solem fervidum per 40. dies.

## OBSERVATIO XX.

*Dolor pleuriticus.*

**P**Uella atrabiliaria sævissimo pleuritidis dolore excarnificata, jam undam lethæam bibebat, è qua eam retraximus sic.

℞. Olei amygdal. dulc. ℥. ij. laudani Paracelsi gr. iij. paulò post quievit dolor, & melius habuit.

## OBSERVATIO XXI.

*Hyperfarcosis.*

**L**aborabam ulcere sub ungue pollicis pedis delitescente. Huic ut obviam irem, iussi Chirurgum è directo ulceris unguem superpositum incidere, & foramen efficere, ut remedia ulceri admoveri possent; sed caro fungosa supercrevit: quam cum sæpius delevissem, iterum crescebat. Quare post longum usum aluminis usti, decrevi remedium novum experiri. Præcipitato igitur rubro, bene loto, & nullo modo dolorifico usus sum, ad carnem superfluam abolendam, quod brevi factum, nec amplius pullulavit.

## OBSERVATIO XXII.

*Vulnecum prognosis.*

**I**N obsidione Moespeliensi, multi milites in manibus præcipuè fauciati, convulsione musculorum temporalium intra aliquot dies corripiebantur, & omnes moriebantur, ut vidimus nos. Dux quidam in pugna illa cruenta facta Calvissioni à Marefcallo Dutrec, & Duce Rohannæo, fauciatus fuit in femore vulnusque ad periostium usque penetravit. Convulsio successit partibus femori vicinis, sensim ad crotaphitas musculos usque ascendit, mortemque invexit. Qui tali convulsione corripuntur, non possunt aperire os, loquuntur initio convulsione expedite, nec sentitur res suas malo esse loco.

## OBSERVATIO XXIII.

*Hypercatharsis.*

**B**aro Calvissionis post sumptum pulverem diacharthami, me repugnante, centies evacuatus est. Hunc salvum fecimus.

Primo ex iusculo in quo rosæ coxerant, & flores chamomillæ, cum pauco saccharo, & vitello olvi, clysterem paravimus, postea sequentem injecimus.

℞. Jusculi capi lb. j. sacchari ℥. j. laudani Paracelsi gr. v. vitellum ovi num. i. superpurgationem statim compefcuit. Loco laudani addatur theriacæ recentis ℥. j. β.

## OBSERVATIO XXIV.

*Sitis intensa.*

**D**N. Viventius, febre continuâ laborans, tam intensâ siti vexabatur, ut crederet se esse unum ex bajulis illis Parisiensibus, qui aquam per urbem circumferunt, clamabatque diu, ac noctu sic, (de l'eau) sed cum sitis ejus nullis potuisset extingui remediis, cessavit sumpta ℥. j. β. salis prunellæ cum aqua communi. Item Simeon meus, sumpto syrupo de rhamno, tam immensa siti premebatur, ut fermè moreretur: sumpsit ℥. j. salis prunellæ, & sitis statim desit.

OBSER-



## OBSERVATIO XXV.

*Variolæ.*

**V**idi filium Dn. Martineri variolis laborantem cum signis laudabilibus, febris enim post exortum pustularum remiserat, respiratio liberatior erat, nullus alvi fluxus, tubercula eminentia satis, somnus mediocris, bene se habebat ad ea quæ offerebantur, subito tamen, & sine manifestâ causâ pustulæ sese occultaverunt, morsque sequuta est illarum occasum. Idipsum vidi in pluribus aliis eodem morbo afflictis, quibus omnibus mortem certissimam portendi.

## OBSERVATIO XXVI.

*Prognosis lethalis.*

**D**N. Engarramus filius febre afflictus, non poterat deglutire; sed potum naribus rejiciebat, musculus cesophagi (ni fallor,) resolutis, & obiit. Item cum non esset vultu matri similis, illius tamen vultus materno erat similis, ita ante obitum, ut astantes omnes mirarentur. Item neptis mea nullo modo matri similis, paulò ante mortem matris imaginem præ se ferebat. Omnes autem ægroti, potum naribus rejicientes, aut repræsentantes atavos, aut parentes, perierunt, quod mirabile est.

## OBSERVATIO XXVII.

*Sudores nocturni.*

**U**Xor Dn. de Cadevese singulis noctibus post expurgatam febrem sudabat. Huic præscripti julepum refrigerantem ex aquis cichorii, & buglossi, cum syrupo de pomis; nec impotenter sudavit, unde conjicio, sudores in somno erumpentes, non esse semper signum humorum luxuriantium, sed aliquando caliditatis. Nam sani, calido temperamento donati, noctu sæpe sudant. Adde quod prædicta domina sine ulla evacuatione naturali, aut artificiosa curata est.

## OBSERVATIO XXVIII.

*Hæmorrhagia ex dente avulso.*

**D**omina Viventia cum sibi dentem avulisset, tam copiosa hæmorrhagia successit, ut fermè moreretur, irritis omnibus remediis. Vocatus jussi ut emplastrum contra rupturam satis magnum tempori denti avulso respondentem, admoveretur. Item alveolo, è quo dense extractus erat, parum colcotharis pulverisati adhiberetur cum cotone, & digito contineretur. His factis intra horulam substitit sanguis.

## OBSERVATIO XXIX.

*Pleuritis.*

**O**Mnes pleuritici, qui vomunt statim in principio morbi, evadunt, ut in infinitis observavi, levata pleura ab humorum sarcina, vomitus beneficio.

## OBSERVATIO XXX.

*Sanguis menstruus.*

**S**anguis menstruus muliercularum, præcipuè benè valentium, odorem florum calendulæ spirat. Hinc conjicio similitudine quadam substantiæ calendulam movere menses.

## OBSERVATIO XXXI.

*Arthritis.*

**D**omina de Cottereau arthritide universali laborans, nulla enim corporis pars vacabat à dolore, liberata

fuit beneficio croci metallorum, quidquid dicat Hippocrates de 40. diebus.

## OBSERVATIO XXXII.

*Uteri dolores.*

**M**ultas mulierculas vidimus uteri doloribus excarnificatas, quæ parum levaminis à laudano nostro sentiunt. Exhibita verò 3. j. antidoti asyncriti, statim dolore vacant. Quod ego valdè miratus sum, nec contempnas.

## OBSERVATIO XXXIII.

*Balneum Calidius.*

**H**onestissima mulier in exitu balnei calidioris, in tantam totius corporis phlogosin inciderat, ut nullo temporis puncto à doloribus & anxietatibus quiesceret. Cumque omnia refrigerantia, tam interna, quam externa, in usum revocata fuissent in cassum, balneum ex folla aqua tepida, eam ab omnibus doloribus liberavit; quod animum meum valdè anxium levavit.

## OBSERVATIO XXXIV.

*Ventriculi dolor.*

**B**iliofi, macri, rufi, raræ texturæ, innuente æstate dolore ventriculi exercentur, quia cum orificium illorum prædium sit acerrimo sensu, à biliosis humoribus (antea à veris & hyemis temperie aliquo modo frænatis) vellitur. Medela est purgatio ex rhabarbaro, tum datis bis, aut ter mane laudani Paracelsi gr. iij. aut iv. certè obtuso ventriculi sensu multo melius degunt.

## OBSERVATIO XXXV.

*Scabies tibiarum.*

**A**d magnam illam scabiem, quæ in tibias excutitur post morbos longos, & præcipuè febrem quartanam, doloribus sævissimis junctam, nihil inveni in tota Medicina efficacius, sequenti unguento.

℞. Unguenti Basilic. 3. iv. terebinth. 3. ij. olei rosati 3. iv. vitellos ovor. n. iij. ceræ tantillum: fiat unguentum quo inungantur partes scabie laborantes.

## OBSERVATIO XXXVI.

*Oris inflammatio ex hydrargyrosi.*

**U**nguento mercuriali inunctis, inflammatio, & ulceratio oris ex salivatione accidit, quibus aliquando difficillimè succurritur. Ego cum quemdam inungi curassem, tanta in ore excitata est inflammatio, ut perè in desperationem venerit, quæ irritis aliis omnibus remediis solo jusculo ex pullo comparato sine ullis herbis, omnimodum levamen accepit, retusa virulentia, ut puto, mercurii à benigniori pulli substantia.

## OBSERVATIO XXXVII.

*Hemicrania.*

**P**ost hemicraniam quindecim annorum accidit mihi apertio venæ in superiori labio, è qua singulis mensibus lb. iv. aut v. sanguinis ferventissimi & falsi profundeabantur. Tædium hoc amolitus sum secta vena brachii à directo labii affecti, bis singulis mensibus; & educto liberaliter sanguine, hemicrania cessavit.

## OBSERVATIO XXXVIII.

*Capitis contusiones.*

**P**uella annos nata 20. lapide percutitur paulo supra frontem, non deserit consueta munia. Illa tamen post



tres dies de dolore capitis obtuso conqueritur, somnolenta fit, febris exigua admodum est, decimo septimo die, motus quidam convulsivi apparent; vigesimo rupto abscessu, & excreto è naribus virescente pure moritur. Dn. Viventius in posteriora cecidit, mansit dies aliquot negotiis suis intentus, postea verò coepit delirare, ignem petere, dicens se frigere, somnolentus erat, nox erat laboriosa, manum subinde capiti admovebat, undecima die, rupto abscessu ore excrevit materiam purulentam, & statim mortuus est. Nepos meus cum contusionem capitis accepisset, tristis factus est, de dolore capitis leviter conquerebatur. Tandem post mensem incidit in febrem continuam, cum somnolentia, capitis dolore, surgebat subinde, & clamabat, septimo die morbi, excreto pure per nares, vitam statim cum morte commutavit.

## OBSERVATIO XXXIX.

*Impetigo & pruritus totius corporis.*

**M**ulier quædam piscatrix, ferinâ totius corporis impetigine laborabat, cum tanto pruritu, ut perpetuo sese scalperet, nec posset punctum temporis quiescere. Mane ex perpetuo scalptu squamarum M. ij. aut iv. in lecto colligebantur, piscium squammis similium. Ego imperato victu ex pullis gallinaceis, carne hœdina, & hordeatis primò præscripti bolum ex cassia, postea venam brachii utriusque basilicam aperiendam curavi; tum frontis, & utriusque malleoli, ut vitiosum ex toto corpore sanguinem exhaurirem. His peractis sequentem syrupum Magistrallem per 30. dies imperavi.

℞. Folior. fennæ mundator. polypod. q̄erc. recentis, an. ʒ. iv. epithymi ʒ. j. β. rhab. elect. ʒ. j. Sem. anisi ʒ. iij. santal. citr. ʒ. j. β. infundantur per noctem in succo pomorum, per residentiam depurato; postea coquantur, ut artis est, addendo sacchari q. s. recoquantur, in syrupum perfectè coctum, cujus capiat prima & secundâ vice, ʒ. ij. aut ʒ. ij. β. cum sero lactis. Aliis diebus hujus syrupi capiebat cochlearia duo manè, sic enim alvus libera servabatur, & materia illa sensim & pedetentim vacuabatur. Tabella diarrhœdon. Abbat. aliquando sumebat mane, post assumptum syrupum. Jusculis pullorum indulsi per plures dies, quibus maximè infracta est vis atrabilarii humoris. Tandem ad aquas Meynenses ægram nostram relegavimus, quarum frigiditate, temperato hepatis incendio in perfectissimam valetudinem restituta fuit, nec ab annis quindecim postea opem meam imploravit. Illius maritus leprâ periebat.

## OBSERVATIO XL.

*Lumbrici per urinas excreti.*

**J**uvenis quidam, renum dolore excarnificatus, excrevit cum urinis vermes plurimos nigros, & magnitudine & longitudine acus communis, cornutos, friabiles, quorum duos misimus ad te, si bene memineris.

## OBSERVATIO XLI.

*Stultitia.*

**D**N. N. post usum longum aquæ papaveris rhæados infatuatus est, & tandem obiit. Aperto cranio, cerebri ventriculi inventi sunt à me pleni humore nigro, atramenti æmulo, summè foetido.

## OBSERVATIO XLII.

*Ferina destillatio.*

**P**lurimos vidi ferinâ destillatione laborantes, tanto sudore diffuentes, ut in summam virium dejectionem venirent, quem cohibuimus hoc modo.

℞. Thuris, mastich. fantali rubri, granor. chermes, rolar. rubr. ana ʒ. j. fiat pulvis, quo suffiantur capitis opera.

## OBSERVATIO XLIII.

*Oculorum macula.*

**A**qua mellis oculorum maculas certissimè delet, si penicillo illas tangamus, sed oculorum dolor, si quis sit primò mulcendus, est enim dolorifica, quod notandum.

## OBSERVATIO XLIV.

*Testium magnitudo præternaturalis.*

**D**N. N. testiculos magnos admodum habebat à natura, ut multo intervallo superarent magnitudinem testiculorum equi, ille nunquam prolem suscepit, illius, ut credo, instrumentis parum aptis ad veneris sacra. Intumuit scrotum post casum ab equo, instar sphaeræ, qua trunculis luditur: tumor ad suppurationem versus est ex quo puris insignis copia effluxit. Ulcere detergo perfectè, deciderunt testiculorum frustula omninò lapidea, silicea enim duritiem æmulabant, & malleolo in multas partes dissiliebant ut cæteri lapides. Corporis, & animi functiones parum erant immutatae. Tandem post aliquot dies supervenit febricula, cum anxietate & siti, quæ paulo post accipit incrementum: pulsus è directo testiculi affecti valde imminutus erat, priusquam in alio latere mutaretur: successit saturatus rubor in facie, nec non exanthemata rubra in corpore universo, quæ brevi mortem adduxerunt; hæc historia notatu dignissima est.

## OBSERVATIO XLV.

*Gemelli in utero.*

**U**xorem meam & multas alias mulierculas geminam prolem parituras prædixi, quarum matres gemellos ediderant: graviditas illis molesta præter morem, ut uterus maximè turgeret, & brevi tibiæ, & pedes inflarentur, parumque moveretur foetus ultimis mensibus conclusus, in angusto loco propter socium dimidium loci occupantem; ratò in prædictione aberravimus.

## OBSERVATIO XLVI.

*Sanguis eductus actu frigidus.*

**V**idi mulierem, naturâ admodum iracundam, febre continuâ laborantem, cui secta est vena me præsentē, sed cum sanguis infuso scalpelli vulnere ad me pervenisset, percepi illum actu frigidissimum, nivis enim, vel glaciei frigiditatem æmulabatur: intra dies quinque à secta vena obiit.

## OBSERVATIO XLVII.

*Salvatellæ apertio in quartana.*

**S**alvatellæ sectio maxime prodest in febre quartana. Domina Trosella quartanaria, sectâ horâ unâ ante paroxysmum salvatellâ, confessâ est paroxysmum multum imminutum fuisse: secunda vice, fermè extinctum esse; post tertiam salvatellæ apertionem, omninò desisse accessiones.

## OBSERVATIO XLVIII.

*Impetigines.*

**D**omina de Castellan laborabat scdâ, feraque impetigine utriusque manus, proter quam radio maximo afficiebatur. Venæ sectionem, cathartica, & omnia alia remedia respuebat. Hanc paucis diebus sic curavi.

℞. Unguenti rosati ʒ. iij. præcipitati albi ʒ. iij. misce pro litu partium.

Hoc remedio prædicta domina, matronam quandam magni nominis in Provincia, ut retulit mihi eodem morbo afflictam curavit.

OBSER-



## OBSERVATIO XLIX.

*Scirrhus lienis.*

**V**etula scirrhus lienis laborans, supra modum anxiosa petiit à me, ut mala sua lenirem, cognoscebat enim nullis posse præsidiiis libitinam evitare. Dedi pilulam ex g. iv. laudani confectam, qua gravia omnia symptomata quieverunt, præcipue summa spirandi difficultas, qua premebatur; quod miratus sum.

## OBSERVATIO L.

*Epilepsia puerilis.*

**P**ueri ferme omnes, qui alvum adstrictam habent, obnoxii sunt convulsionibus, ut ex Hippocrate didici, & experientia. Filius Caroli mei adstrictione alvi perpetuo laborans, convulsus periit.

## OBSERVATIO LI.

*Animi deliquium ex venæ sectione.*

**M**ulti venæ sectionem, & sanguinis effusionem bene tolerant, sed dum solvitur ligatura, & vulnus occluditur, in animi deliquium incidunt. His subvenies iusculo optimo ante venæ divisionem exhibito, quod non semel observavi.

## OBSERVATIO LII.

*Dolor Ischiadicus.*

**M**ulti sunt, qui acutissimis doloribus excernentur ischiadicis, biliosi, & æstatis tempore, quos non ex crucio medicamentis calidioribus, sed secta vena post clysterem purgantem, injicio secundum clysterem cum iusculo, & laudano. Sic Lunelli sanavi tuum Jacobum salibus & diæteriis ditissimum.

## OBSERVATIO LIII.

*Impetigines.*

**P**uer annos decem natus, impetigine affligebatur, quæ ichorosa materiam sudabat. Succedente Boreali constitutione, suppressa est foeda illa materia, & in pulmonem conversa, quæ horrendum excitavit asthma: quod desit, recurrente statim constitutione Australi.

## OBSERVATIO LIV.

*Ad puris extractionem ex abscessu pectoris, & aliis.*

**M**iles fauciatus in pectore nullum sanguinem reddidit per dies septem. Consilio Chirurgi emplastrum vulneri apposuimus, quod magnam puris quantitatem eduxit. Sigillorius etiam tumore ad suppurationem verso exercebatur: sed cum non fuisset apertus ut decebat, & in tempore, æger videbatur in alea vitæ, concentrato & occultato pure, quod attraximus beneficio sequentis emplastri.

℞. Resinæ pini recentis, claræ, odoratæ lb. j. olei laurini, & terebinthinæ, an. ℥. ij. gummi elemi ℥. iv. Primo oportet resinam, & gummi in pelvi manere, donec misceantur, postea addes terebinthinam & oleum, omniaque simul bulliant iterum, tum demum per linteum crassius transcolentur. Extendatur pars hujus materiæ supra alutam, fiat emplastrum, quod vulneri apponatur. Mutetur autem hyemis tempore semel in die tantum, æstate verò bis in die. & mirabilia videbis, neque puto in omnibus nostris observationibus aliquid certius reperiri, ut discere poteris ex Pareo lib. 30. de vulneribus pectoris, & thoracis, cap. 30. Prædictum autem emplastrum debet in medio perforari incisuris duabus, aut tribus longis, ut pus attrahatur faciliè effluat.

## OBSERVATIO LV.

*Anodynum ad dolores impetiginum.*

**M**ulier, annosa fera impetigine laborans, cum summo dolore, irritis omnibus remediis, sequenti cataplasmate mirum in modum fuit levata.

℞. Putrida poma n. vj. per setaceum transmittantur, quibus adde olei rosacei ℥. ij. lactis muliebris parum, fiat cataplasma, quod admoveatur parti dolenti. Longa autem experientia didici, putrida poma dolorem magis lenire, quam cocta, quod sæpe aliquod empyreuma præ se ferant.

## OBSERVATIO LVI.

*Febres æstivæ puerorum.*

**M**ense Julio, Augusto, & Septembri, magnus infantum numerus moritur lactentium, quos nosstrates mulierculæ vermibus laborare asserunt. Ego verò assevero mortem provenire ab acriusculo nutricum lacte, quo inflammatur ventriculus. Nam frigus extremorum adest, sitis inexplebilis, anxietas ingens, nausea, vomitus, diarrhoea ut testis sum. Quare vena secanda est. Postea verò regioni ventriculi admovendum sequens cataplasma.

℞. Farinæ hordei lb. j. micæ panis ℥. iv. coquantur leviter in lacte caprillo, addendo postea succi solani ℥. j. olei rosati q. s. misce, fiat cataplasma ad dolorem inflammatorium leniendum. Debemus etiam nutricem mutare, & mucilaginem sem. psylli cum saccharo pauco rosato exhibere ægro ex cochleari. Iuscula pullorum, portulacæ, & acetosæ aut lactucæ alteranda. Item animalium per dorsum divisorum admotione calor furens foras alliciendus.

## OBSERVATIO LVII.

*Lumbrici.*

**N**osstrates mulierculæ putant omnes pueros vermibus laborare; sed cum nullus rejicitur vermis, eos dicunt in humores putridos fuisse conversos, nec malè; nam ut vermes in phiala conclusi, & fimo calente obruti, brevi convertuntur in passam; cur in corpore nostro, cujus calor fumi calori respondet, non idem fiet, vermibus enecatis ab amaris medicamentis. Certè hoc videtur mihi rationi consentaneum.

## OBSERVATIO LVIII.

*Hysterica symptomata.*

**M**elancholica mulier, suffocationi uterinæ obnoxia, maximam urinæ quantitatem profundeabat, crudam nulloque colore tinctam semel in die: quæ excreta, symptomatum ilias statim emergebat, veluti ex equo Trojano, quorum causam difficillimam esse puto. Nam modò capitis dolor eam excercebat, modò cordis palpitatio, modò lipothymia, modò nausea, modò sudatiuncula in collo & fronte apparebat, modò horrore totum illius corpus quatiebatur. Sed undenam ejusmodi symptomata? Puto certè debere referri ad uterum, corporis muliebris sentinam. Cum enim prædicta symptomata, non nisi excretâ urinâ se proderent, in ea sum sententia, vesicam urinâ distentam, utero suppositam, mole sua uterum cohibere. Hinc fit, ut impuritates & vapores, in antro uteri coerciti, non possint liberè sævire in alias corporis partes. Evacuata verò urinâ, putridi illi humores sui juris fiunt, & varia illa accidentia pariunt.

## OBSERVATIO LIX.

*Vomitùs horrendus.*

**P**uella annos nata 25. conquerebatur de lienis dolore altè sepulto, cui successit scirrhus. Vomebat singulis diebus, sed tamen per intervalla 20. aut 22. hb. materiæ virescentis. In diuinam hydropem incidit mense Novembri, & 16. die Januarii obiit. Vidi rusticum, qui materiæ illius virescentis lb. 20. 25. aut 30. vomebat ferme singulis diebus, sed tamen per intervalla, ut prædicta nostra puella, quam



quam usus chalybis fervavit. Sanatus enim fuit, & hodie perfecta sanitate fruitur, quod certe notandum est.

## OBSERVATIO LX.

*Catarrhus.*

**N**ihil magis sistit catarrhum immoderatissimum, quam sequens Rulandi cataplasma.

℥. Fermenti acrioris ℥. ij. carabes pulveratæ ℥. ij. fiat cataplasma, quod vertici, rasō capillitio, admoveatur.

## OBSERVATIO LXI.

*Febris ex pluvia.*

**P**lurimi madidi pluviam, in morbum incidunt, & in febrem continuam sæpissimè, prohibita cutis transpiratione, quæ febribus excitandis valde est idonea. Post venæ sectionem nihil inveni utilius, quam decocto sudorifico corpus relaxare.

℥. Rad. falsæ parillæ ℥. j. Sem. carduibened. ℥. ss. fol. scabiosæ, calendulæ ana m. ss. fiat omnium decoctio, quæ calide hauriatur, addito pauco vino albo, aut aquæ theriacalis guttis aliquot. Vidi multos Medicos, quod nullo modo de sudorificis cogitaverant, videntes autem potionis nostræ effectum, laudarunt illam.

## OBSERVATIO LXII.

*Variolarum prognos.*

**Q**uotquot variolis aut morbillis laborantes vidi, qui tensione, meteorismo ventris, cum anxietate huc atque illuc agitabantur, intra paucos dies obire vidi, præcipuè si dolor junctus fuerit.

## OBSERVATIO LXIII.

*Prognosis ex anni constitutione.*

**A**nno 1640. undecimo mensis Octobris. die 12. 13. 14. 15. tam asperum frigus sævit, ut amnes, & rivuli nostri omnes glacie frænarentur. Februario mense sequenti lateris dolores supervenerunt, qui plurimos de medio sustulerunt.

## OBSERVATIO LXIV.

*Prognosis in febre continua.*

**I**nfinitos vidimus, in febre continua nullo modo dormientes, manentes tamen quietos, sine ulla querela, nullo modo loquentes, nisi interrogarentur. Quibus si pulsus contractaretur, retraherant manus tremulas, quasi vitæ suæ timerent. Eos omnes vale dixisse vidimus.

## OBSERVATIO LXV.

*Dentium caries.*

**I**nfinitos in hoc cœli tractu videmus dentium doloribus excarnificatos, propter dentes cariosos & cavos. Ego cavitatem dentium terebinthina impleo, & cauterio actuali dentem inuro felicissimo cum successu.

## OBSERVATIO COMMUNICATA

à D. Dabadie, Medico Tholosate celeberrimo.

*Scabies pruriginosa in senè octuagenario.*

**I**llustrissimus Senator & Decanus D. de Mauffac, octuagesimum quartum annum attingens à primordiis mixta crasi præditus præpollente sanguine bilioso, unde emerfit habitus inter carnosum & ex-

carnem n edius, cum liberali proceritate, & decora structura t tuis compaginis. Præter ea versatili ingenio, & eximiâ in disceptandis litibus solertiâ, in tam provecta ætate insignis. Olim eleganti valetudine fruebatur, absque ullo discrimine tempestatis frigidæ, vel æstuantis, de cujus tamen integritate ter fuit dejectus intra quinquennium ex *ἀνέψια* sive organi, ventriculi scilicet, ætatis decursu fœscentis damno, sine vitio objecti: quamvis enim numquam expleatur epulis, nec genio indulgeat, edax tamen est acetariorum, fructuumque horæorum, qui et si, familiares naturæ nostræ, concoctique faciles videntur, vix tamen in probum sanguinem mutationem suscipere possunt, unde pravi succi generantur & succiunt, qui aliundè ad putrescendum exiguum occasionem nacti, non rarò febres mali moris accendunt, hoc notante Gal. 2. de alim. facul. Quod venerando senî contigisse observavimus, influente Majo in primis sequenti anno post *ἐπύλας*, postremò circa occalum pleiadum, & gravius, ita ut in febrem acutam inciderit, cum exacerbatione, alternis diebus graviore post cujus insultum perturbata fuit alvus, ductaque *αἷμα καὶ κατα* pituitoso humore excrementitio, bile tandem concitata persuso, cum *δυσφορία* & cardialgia gravi, quæ sunt morbi cholæræ saltē spuris argumenta, è quo discrimine emerfit septimo, natura ad commune emissarium morbigicæ causæ reliquias propulsante. Unde totius habitus fœda prurigo partim in tibias, potissimum sinistram, in qua erysipelas excitum est, cujus materia ferè discussa, superstes fuit erysipelatosa quædam *σπάσις* sive effusio instar herpetis miliaris, cum molesto pruritu, crebrò stimulante ad scalpendum, ab ichore multiplici, falso, acri, putrique, per utramque tibiam effuso, qui cacochymis dissimularis est soboles & cachexiæ, quæ sexibus familiaris, eò gravior erat, quo pedes & tibis subumescerent, cujusmodi affectus non exiguum viscerum labem denunciabat, maximè jecoris, cujus vitiatam diathesim à prægresso ardore febrili, cum ætatis multum provectæ beneficio, vix pristinae sanitati restitutum iri suspicandum erat.

Curatio primis insultibus inaugurata fuit à coëssione humoris excrementitii, in ventriculo fluitantis; concitato magis vomitu, cum jam vomituriret: quo sedato, alvinæ regionis subsidens impuritas clementiori cathartico fuit expurgata. At cum huic curationis ornamento non cederet nimis cruda seraque affectio, de venæ sectione deliberatur, circa quam celebrandam dissident sententiæ, illam reclamante ætate provectiore, & inchoatâ cachexiâ, quæ abunde elucebat ex pruritu stimulante, & pedum, tibiarumque inflatione. Verum tamen febre ingravescente, sanguis mittitur, nec immeritò; cum periclitari melius sit, quàm omninò perire: conspurcatus effluxit cum *εὐσπεία* septimoque judicatus est, depositis materiæ morbigicæ reliquiis ad corporis habitum & tibias. Post aliquot dies repullulantem cacochymiam iterum repurgandam censuimus, ut ad usum balnei suavis liceret tutius confugere, tum ad procurandam *ἐνδιαφύσιν*, contemperandum fervorem, & acrimoniam humorum vaporumque, tum ad illos, laxatâ cute, evocandos, Balneo per plusculos dies administrato, prurigo molestior evasit, evocatâ à centro ad peripheriam cacochymiâ, nondum satis exhaustâ, quare cum illustris Senator iteratam purgationem respueret; *ἐπιπύλας* moliri apud me decrevi, explorando usum l. clis asini, quod interdum loco lenientis & purgantis medicamenti eligitur, ab Hippocrate potissimum, quarto de diætâ acutorum, nec defuit optatus eventus. Propinquo enim per mensem integrum lacte, soluta est alvus siccissima, ichorum, humorumque redundantium vacuatio, proborumque humorum repositio accessisset; & diluta crassiorum humorum sæce evasit hæmorrhœicus, cujus vacationis beneficio pristinae sanitati, firmiorique fuit restitutus. Nihil de roborantibus recenseo, nec de topicis, pruriginem sedantibus, & remisso fervore erysipelatis, materiam illius superstitem discutientibus, quæ bonis ægri rebus in usum revocata fuerunt. Deo Optimo Maximo, sanitatis, & bonorum omnium largitore nostris votis favente.

OBSER:



## OBSERVATIO COMMUNICATA

à D. Antonio Jodon Medico Antissiodorensi  
celeberrimo.*Hydrops ventriculi.*

**A**Nno Domini 1620. mulier statura grandiori, quæ dragesimum octavum agens annum, Joanna Delier, civis Antissiodorensis uxor, in utero se habere credidit, crescente sensim abdominis tumore. At cum tempus gestationis cognosceret elapsum, Medicum ordinarium consuluit, qui eam illico hydropisim contraxisse pronuntiavit. Remediis frustra tentatis, tumor triennio perseverans, in tantam molem excrevit, licet interim ægra consueta munia obiret, ut tanto ferendo oneri vix sufficeret. Tandem in febrem continuam incidit cum majori difficultate spirandi siti implacabili, inquietudinum turba. Intra septimum diem animam efflavit. Cujus cadaver cum feretro includi non posset, propter insignem totius ventris undequaque distensionem, à parentibus defunctæ rogati, ventrem secuimus, & tam ingens serosæ humiditatis factum est effluvium, ut nonaginta librarum pondus excederet. Ultimo manante sero obscuro, & parum turbido, utpotè sua hypostasi vel fæce non destituto. His peractis, & penicillis intra vulnere per quæ aquaeducta fuerat, relictis, ad apertionem totius abdominis debita methodo devenimus, & cum peritonæum quæreremus diffecandum, mirum dictu, sed magis visu mirandum hæc membrana, partes naturales investiens, ventriculo antica parte tam firmiter adhærebat, ut nisi vi discerpta atque dissecta, avelli nequiverit; imò verò invenimus nostrum penicillum in vulnere relictum, in cavitatem ventriculi fuisse demersum, ante cujus anatomem ejusdem insolitam magnitudinem paulisper sumus contemplati, duoque ejusdem orificia, stomachum scilicet & pylorum, eundem situm prope obtinentia, seque invicem tangentia, epiploæ regionem superiorem occupante, hepate satis sano, quod tamen ventriculus tumidus efferebat desuper; cor mediante diaphragmate eidem graviter incumbens, turbinatam suam figuram parti gibbæ ejusdem, instar ceræ impresserat nec mirum si ægotans tam valida spirandi difficultate per biennium saltem premeretur, reliquis visceribus, liene, renibus, intestinis, mesenterio, cystide fellea, vesica & utero integris, & parum calore febrili alteratis. His notatis prægrandem illum ventriculum cum œsophago, duodenoque extraximus, qui per medium dissectus, ulnam Parisiensem superabat, in cujus decliviori parte illuvies serosa notabatur, hypostaseos prædicti feri residuum fibræ omnibus, quæ interiorem membranam contexebant, à se invicem latè dissitis, orificio utroque nulla vitii notâ impedito, nisi quod in medio pylori ipsiusque limine cystis pendebat, longitudinis medii digiti, pollice paulò crassior, aquâ pellucida plena, cavitatemque duodeni subintrans. Cæterum membranam illam interiorem ventriculi, multis hydatidibus, partim integris, partim exesis conspersam vidimus. Et hæc post homines natos (ni mea me fallat opinio) nondum fuere notata, saltem à nobis perlecta vel audita. Causam verò tam rari affectus ventriculi, scilicet hydropisicos, cum apud nos solidiori minervâ investigaremus, ventriculi totius intemperiem frigidam, humidam, hæcticamque arguimus, qui cum sanguinem à trunco venæ portæ per gastricum ramum, alioque pro alimento attraheret, propter illam dyscrasiam in serosum excrementum ad instar hydropis hepatis convertebat. Illa autem frigida humidaque intemperies, ex largo frigida potu, fructuum crudorum esu, aliisque causis originem duxerat. Cum verò ex maxima fibrarum ventriculi laxitate, & perversa partis figura, orificium inferius, eundem cum superiori situm obtineret, facilis alimentorum ab uno ad aliud transitus fiebat, ut in vastum illum serosum gurgitem non mergerentur, sed in duodeno intestino qualemcumque chylicationem obtinerent, siquidem intestina chylicandi vi non esse destituta, apud omnes in confesso est, quam quidem vim natura necessitate coacta potentior reddidit. Aquas autem illas ventriculus per ductus illos patentes non rejiciebat, ex eo quod fibræ illius resolutæ erant à copiosa humiditate.

*Lazar. Riverii Opera.*

## OBSERVATIONES COMMUNICATÆ

à D. Franc. Chomel, Medico  
Annonænsi celeberrimo.

## OBSERVATIO I.

*Ileos seu miserere mei.*

**V**Ir quidam Ileo laborans à quinque diebus, ut fæces per os rejiceret, multis remediis frustra tentatis, sumpsit mercurii cum sulphure extincti, & in formam pulveris redacti ℥. i. globulo ceræ inclusam. Statim post exhibitionem fœtus continuo adhibiti, & clysteres frequenter injecti. Post aliquot horas frustula quædam ceræ in rejecto clystere apparuere, quod indicio fuit apertam fuisse viam, & medicamento purgante exhibito, æger à morbo prorsus liberatus est.

## OBSERVATIO II.

*Cauterii efficacia.*

**Q**uidam æger dolore lumborum diutissime afflictus, nullis remediis conferentibus, tandem diem suum obiit. Inter alia remedia paulò ante interitum, cauterium femori, quatuor digitis suprâ genu affixum fuerat, à quo, decisa eschara, fluxit sanies quædam circiter ad ℥. β. postmodum verò singulis diebus fluebat ex cauterio pus verum & laudabile ad ℥. i. vel amplius. Mirabatur Chirurgus, neque unquam potuit conjicere, undenam pus illud emanaret. Defuncto ægotante, apertoque illius cadavere, inventus est pulmo purulentus, quæ præcipua mortis causa fuit. In lumbis verò magnus abscessus inventus est, à quo dolor ille diuturnus & contumax oriebatur. Ab abscessu autem ad cauterium usque inventus est canaliculus per quem puris portio quædam effluebat. Unde colligere est, quanta solertia natura uti soleat ad causas morbosas foras eliminandas, quæ canaliculum illum efformaverit ad abscessum lumborum per cauterium expurgandum, quod tamen perficere non potuit, à morbi magnitudine superata.

## OBSERVATIO III.

*Febris tertiana.*

**R**etulit mihi dictus D. Chomel, se omnes propemodum tertianas curare solitum, exhibendo per horam ante accessionem bonum haustum decocti chamom. & cremor. tartari, & statim ab assumpto remedio sanguinem detrahendo. Si non sit ad manus decoctum, aquæ frigida cyathum exhibet, & idem ferè succedit effectus. Putat aquam illam assumptam, per phlebotomiam ad venas rapi, & materiam ebullitioni proximam abluere, unde accessio impeditur.

## OBSERVATIO IV.

*Colicus dolor.*

**P**Uella quædam annos nata quatuordecim, laborabat colico dolore atrocissimo, cum ventris inflatione, quæ neque clysteribus neque potionibus purgantibus, vel lumbricos enecantibus sedari poterat; sed tantum balneo tepido sopiebatur. Sed egressæ à balneo recurrebat, donec intra viginti dies ægram de medio sustulerit. Per biddum ante mortem magnam sanguinis nigerrimi copiam per alvum excrevit. Dissecto cadavere, inventa est multa pituita vitrea, externæ intestinorum tunice adhærens, & per totam eorum longitudinem frustillatim dispersa, magnitudine varia, ut quædam frustula fabæ, alia avelanæ magnitudinem æquarent. In venis autem, & cordis ventriculis nullus sanguis inventus est, quia natura extremo conatu totum ad intestina detruserat, qui in iis nigrescens, ut omni sanguini extravasato contingit, ante obitum exclusus fuerat. Ubi notanda est sedes materiæ, colicum dolorem efficientis, & authoribus non expressa, nempe externa intestinorum superficies.

Bbbb

OBSER-



OBSERVATIONES COMMUNICATÆ  
à D. Joanne Marfino, Medico Apamienſi peritiſſimo.

## OBSERVATIO I.

*Aſcites.*

**A**Nno 1642. menſe Octobri, vocatus fui ad puerum quatuordecim annos natum, aſcite poſt variolas à mente laborantem: nulla aderat febris, licet æger proſtratis omnino viribus cogeretur decumbere. Præſcripſi quamprimum apozema aperiens & hydragogum, quod habetur in praxi D. Riverii c. de hydropē, & poſt uſum apozematis juſſi, ut ſiſſunigio inſtar ſtuphæ ex aperientibus & diſcutientibus compoſito uteretur per triduum, ſemel in die, quibus uſurpatis planè convaluit.

## OBSERVATIO II.

*Inflammatio teſtium, cum urinaſuppreſſione.*

**E**Odem anno, menſe Decembri, inviſi hominem quendam quinquagenarium, inflammatione teſtis dextri, & urinaſuppreſſione laborantem. Præſcribo clyſterem partim emollientem & laxantem, partim carminantem, eoque reſecto, baſilicam dextram aperiri jubeo ad 3. viij. Reſus oleo ſcorpionum Matthioli inungi, & poſt inunctionem placentam ex cepis minutim inciſis, ovis quibuſdam agitatis, & axungia porci conſectam, eidem parti applicari, & in craſſinum, bolum ex caſſia, diaph. & reo pulv. exhiberi. His fluxit urina copioſè. Ad inflammatum verò teſtem, conſectum eſt cataplaſma ex farina fabarum, cocta in oxycrato ad puliculæ conſiſtentiam, quo remedio per triduum applicato parti affectæ, priſtinæ ſanitati reſtitutus eſt.

## OBSERVATIO III.

*Iſchuria.*

**E**Odem anno & menſe incidi in mulierem quadragenariam, euſarcam & obeſam, iſchuriâ laborantem, febris aderat, ſed non intenſa; urina autem quæ in exigua admodum quantitate excernebatur, erat valdè rubra, dolor circa renes aderant, iſque inſignis. Demùm vomitus frequenter recurrebat. Varii injecti fuerant clyſteres emollientes, laxantes, & carminantes, ſed fruſtra: celebrata venæ ſectio bis, in brachio ſcilicet & pede; ſotus inſuper & linimenta, ut in ſimili caſu fieri ſolet, uſurpata fuerant; bolus ex caſſia, diaphœnic. rheo compoſitus, exhibitus, ſed omnia in caſſum. Tandem adhibui placentam ſuperiori obſervatione laudatam, circa renes. Poſtremo hoc remedio placidè quievit, copioſè minxit, & bene omnino habuit. Simile quid mihi contigit in alio ægrotante, qui cum febre acuta laboraret, abſque tamen dolore ullo nephritico, & non poſſet mingere, applicata eadem placentâ, minxit in poſterum, fugatâ febre, ſanus factus eſt.

## OBSERVATIO IV.

*Ulcus fiſtuloſum.*

**M**enſe Januario anno 1643. Dominus Ferries Vatiſenſis, annos natus 55. temperamento bilioſo admodum, quique ſeſe variis curis laboribuſque fatigaverat, ſe mihi ſanandum obtulit. Laborabat à quatuor jam annis variis in pectore doloribus, productis ab humoribus à capite verſus partes thoracis exteriores delabentibus: Aderat circa claviculam tumor, ovi gallinacei magnitudinis: ſed quod pejus erat, ſupra os pubis dextrum, videbatur tumor, unius & alterius ovi anſerini magnitudinem æquans, ex quo à quibuſdam menſibus aperto, effluebat pus laudabile: Ulcus erat profundum, ſerè ad ſemipedis altitudinem; ad quod ſanandum varia, ſed fruſtra tentata fuerant remedia, ita ut de futura fiſtula omnes tinnerent. Curationem hoc pacto aggreſſus ſum.

Præſcripſi primum potionem purgantem, partim phlegmagogam, partim cholagogam, deinde phlebotomiam. Poſt hæc apozemata ex aperientibus temperatis, vulnerariis, & purgantibus. Finito apozemate decoctum ſequens ſumpſit bis in die, per 12. dies.

℥. Hordei integri P. i. folior. ſcabiola, ſaniculæ, pilofellæ, vinæ pervinc. agrim. & pimpinel. ana M. i. Sem. hyperici & cardui bened. ana 3. ii. flor. trium cordial. ana P. i. coquantur in hydromel. tenui ad lb. i. b. colaturæ capiat 3. vi. manè, & ſerò.

Interim ex eodem decocto fiebant injectiones ſingulis diebus in ulcus. Verum cum hæc non ſufficerent, ſed omnes prædicti affectus perfeverarent, ad diætâ ſudorificam devenimus per viginti quinque dies continuandam, ex decocto radic. ſaſſaparil. & raſuræ ligni guaiaci ad partes æquales. Ex reſidentia parabatur bochetum pro potu ordinario. Sexto autem quolibet diætæ die ſumebat medicamentum purgans. Verſus finem diætæ, cum ulcus in eodem ſerè ſtatu permanere videretur, juſſi ut Chirurgus inducto in ulcus baculo, ſuperpoſitam cutem & carnem, quæ unius digiti latitudinem ſerè adæquabat, novacula ſcinderet, ut cavo illo detecto, faciliiori negotio debita remedia adhiberentur. Succellit votis eventus, conſumpta ſiquidem fungoſa illa, & minimè laudabili carne, ulcus ad cicatricem brevi deductum eſt, ægerque non tantum à doloribus, ſed etiam à metu fiſtulæ liber evaſit. Ad ſigillum curationis præſcripſi cauſticum brachio ſiniſtro inurendum, diuque geſtandum.

## OBSERVATIO V.

*Secundinarum retentione.*

**E**Odem tempore Domina de Ruſſia, annos nata 35. temperamento ſanguineo, poſt editum multo dolore & labore foetum, incidit in ſecundinarum retentionem. Pulſus nullus apparebat, facies mortuo ſimillima, ita ut conclamata omnia viderentur. Cum acceſſi, præſcripſerat quidam Chirurgus, ut ex capillis ipſius nonnihil abſcinderetur, combureretur, & vino diſſolutum propinaretur. Quod cum præſtituiſſet ægra, ſecundinas feliciter expulit. Verum emiſſis ſecundinis lochia ſuppreſſa ſunt, unde febris exorta eſt. Poſtridie præſcripſi ſanguinis miſſionem ex malleolo dextro ad 3. viij. (pulſus enim erat validus & plenus) & in craſſinum, quia alvus erat adſtrieta, clyſterem in hunc modum.

℥. Fol. malvæ, violar. pariet. mercurial. ana m. i. flor. chamom. & meliloti ana P. i. Sem. aniſi & ſœniculi, an. 3. β. coquantur in juſculo capitis vituli, ad lb. i. in qua diſſolve ſyrupi violacei & ſacchari rub. an. 3. fiat clyſter.

Reſecto clyſtere, aperta eſt vena malleoli ſiniſtri ad 3. vij. His febris remiſit, ſomnus, quo antea planè caruerat, rediit: paulatim abſque aliis remediis convaluit.

## OBSERVATIO VI.

*Catarrhus ſalfus cum propenſione ad phthiſin.*

**M**enſe Octobri an. 1643. vocatus fui ad ægrum quadraginta annos natum, temperamento bilioſo, habitu gracili & macilento. Laborabat catarrho ſalſo & acri, à capite in pulmonem delabente à quatuor annis tuſſis aderat ſicca, obſtruſtio utrumque occupabat hypochondrium, cum febre continua & lenta. His adde phlogoſin quandam, dolore circa ſternum & dorſi vertebraſ manifestam. Præſcripſi primum potionem purgantem ex rheo, tamarindis, ſenna, manna, & ſyrupo roſaceo conſectam, ſed in exigua quantitate. Deinde venæ ſectionem ex brachio dextro ad 3. vij. His præſtitis, juſculis medicatis ex aperientibus temperatis uſus per duodecim dies, inſundendo per noctem in tertio quoque juſculo, ſennæ 3. β. & diſſolvendo mannæ 3. i. Finitis juſculis ingreſſus eſt ſemicupium tepidum ex decocto hordei, & amygdal. dulc. paratum, per triduum, bis in die. Ab initio curationis applicui duo cauſtica inter duas ſcapulas, ſpinâ dorſi intermediâ latitudine duorum digito-



digitorum : jussique , ut semel in hebdomada cucurbitula superponeretur , quod remedium tantum in hoc laborante præstitit , ob serositates , quæ in magna copia singulis vicibus educebantur , ut integram curationem illi ferè adscripserim.

## OBSERVATIO VII.

*Ophthalmia.*

**Q**uidam annos natus 30. temperamento sanguineo , sed cerebro admodum catarrhoso donatus , laborabat à longo tempore inflammatione , quæ tum adnatam , tum utramque palpebram occupabat. Affectus non erat continuus , sed recurrens : varia usurpata fuerant antea remedia , sed frustra. Tandem præscripti duo cauteria inter duas scapulas gestanda , necnon cucurbitulam utrumque amplectentem applicandam , urgente nimirum fluxione : Quod cum præstitisset , sani omninò illius oculi evasere. Non parum ad illius curationem contulit unguentum sequens , quo in ipso curationis initio usus fuit , purgato prius corpore , sectaque vena.

℞. Viridis æris g. xij. camphoræ , & lapidis calamin. ana ʒ. ʒ. tuthiæ præparat. ʒ. ʒ. butyri recentis , aqua rosac. loti , ʒ. ij. misce , fiat unguentum.

## OBSERVATIO VIII.

*Febris maligna.*


**M**ense Maio anno 1644. mulier 30. annos nata , sese mihi curandam obtulit. Laborabat febre maligna à duobus diebus , cum dolore capitis & inquietudinibus ferè continuis , sitique intensa , maculis quibusdam lividis circa pectus & dorsum apparentibus. Ter intra biduum sanguinem eduxi ʒ. viij. singulis vicibus , cumque interna omnia remedia averfaretur , ad externa animum contuli. Quartò itaque morbi die cataplasma ex cochleis cum suis testis contusis , stupisque superpositis , utrique pedi circa plantas applicandum curavi. Admotum est hocce remedium circa horam tertiam pomeridianam. Inclinate autem die cœpit ægra sentire dolorem quendam molestum & gravem in utroque femore & tibia , qui ad mediam usque noctem duravit eâ sævitia , ut ægra de removendo cataplasmate perpetuò quereretur. Media autem nocte sudor totum corpus invasit , tanto foetore & graveolentia , ut illum ægra sustinere vix posset. Mutato indusio , amota sunt à pedibus cataplasmata , tetrum adeò odorem exhalantia , ut adstantes ferè inficerent. Manè ægram alacrem invenio febre aliisque symptomatis valde imminutis. Cumque omnia in tuto posita mihi viderentur , nihil ampliùs agendum duxi , sola contentus purgatione , quam tamen laborans , ob summam inobedientiam , sumere noluit : nihilominus brevi post benè omninò habuit.

## OBSERVATIO IX.

*Arthritis.*

**N**obilis quidam mense Februario anno 1645. temperamento sanguineo , habitu eufarcho & obeso , gona-gra à tribus diebus laborabat. Quamprimùm eum invisi , sanguinem ad lb. j. mitti jubeo , qui cum valde impurus apparuisset , postridie iterum sanguinis missionem ad parem quantitatem præscribo , quâ se multum recreari sensit laborans , sanguine educto , priori simili. Tertio demùm sanguinem detraho ad ʒ. x. postridie verò medicamentum ex senna & rhab. in decocto convenienti , cum diaphoen. & syrupo rosac. propino , quo benè omninò habuit , simile quid mihi contigit in aliis duobus ægrotantibus , eodem temperamento & habitu donatis , in quibus venæ sectio ter aut quater repetita in ipso initio affectum penitus sustulit oxycrato fovendo partem affectam , & postea illinendo oleo rosaceo.

Lazar. Riverii Opera.



## OBSERVATIONES

Communicatæ à D. Des Grands Prez , Medico Gratianopolitano peritissimo.

## OBSERVATIO I.

*Linguae tumor.*

**Q**uidam lue venereâ infectus , per frictiones mercuriales curabatur , quæ cum supra Medici præscriptum , Pharmacopœi jussu frequentius & diutius celebratæ fuissent , maximus fluxionis impetus tantum linguae tumorem excitavit , ut quatuor digitorum transversorum mensura extra os prominere. Cui Medicus nihil præscribere voluit , ægrè ferens , quòd ordo à se præscriptus , contemptus , & superatus esset. Unde ægrotans in misero hoc statu quatuor mensium spatio permansit , & lingua ab aère continuò alterata trium digitorum transversorum crassitudinem acquisierat. Vocatus ego , post phlebotomiam , purgationem , pulverem ex pipere , zinzibere , sinapi & sale decrepitato , linguae admovendum præscribo. Cujus usu , primo statim die , lingua mollescere , & per se moveri cœpit. Tertiâ die eam ablui jubeo pluries in die aquâ vitæ probè rectificatâ , ut quartâ longè mollior apparuerit , & in os protrudi potuerit , cum tamen illico rursus egrederetur. Postmodum verò in parte inferiori linguae juxta ranulas , ulcera animadvertens , quæ ex collisione dentium , quibus illa innitebatur , oriunda erant ; aquâ albâ , ex præcipitato albo paratâ , ea ulcera ablunda curavi , & profundas scarificationes circa ranulas fieri jussi. Quibus intra paucos dies tumor discussus est , & lingua in propriis oris cancellis coërcita.

## OBSERVATIO II.

*Mutus casu curatus.*

**Q**uidam Mendicus Ponsenacium propè Muram noctu appellens , à magnæ illius domus conductore hospitaliter exceptus est. Ubi per aliquot dies commoratur propter puerum mutum & surdum , secum adductum , qui febre continua eadem nocte correptus fuerat. Tandem impatientia percitus , & de illius salute desperans , clam discessit , ægrumque ibi deferuit , quem ad pristinam valetudinem revocatum , conductor primùm agnorum postmodum ovium , & vervecum custodiæ præfecit , quo munere fungebatur egregiè. Contigit autem post aliquot annos ut aleâ ludens , crassiori baculo percussus fuerit , quo ictu gravissimo os occipitale in multas particulas contractum est. A quo tamen vulnere , valde periculoso , periti Chirurgi industria curatus est. Dum autem convalesceret sensus auditus illi succrescebat , & verbum quædam balbutie incipiebat , donec tandem integram audiendi & loquendi facultatem adeptus est , & in eo statu vixit ad annum ætatis suæ 45. D. Pajano Procuratori Gratianopolitano pro vinitore inserviens , vixque duo anni ab illius interitu elapsi sunt.

## OBSERVATIO III.

*Cranii depressio.*

**I**n multis cranii depressio curata est , admotâ post unam vel alteram phlebotomiam , supra depressionem cucurbitulâ , cum multa flamma , addita interdum incisione , & multis interdum scarificationibus , & interdum sine illis. Sed inter cæteros unum notatu dignissimum referam : qui Artaudus nominatur Procurator Gratianopolitanus , is in profundo itinere , inimico obviam factus , lapide percussus est supra os parietale sinistrum , quo ictu ex equo in terram dejectus est , & pro mortuo derelictus. Inde in villam vicinam delatus , à duobus Chirurgis curari cœpit , qui tantum venæ sectione & cucurbitulis usi sunt , sine ulla vulneris providentia , quòd nullam solutionem continui manifestam perciperent. Vocatus ego , hominem in-

Bbbb 2 venio



venio sanguine perfusum, qui ex ore & naribus excernebatur cum nausea & vomitu fere continuo, vix adstantes agnoscentem, ægerrimeque loquentem, & ne quidem oculos aperientem. Perlustrato capite universo, dum locum cranii depressum summis digitis tantillum comprimebam, nausea excitabatur. Quo animadverso, Chirurgus præscripsi, ut partem illam raderet & cucurbitulam satis magnam illi applicaret, cum multa flamma: quæ licet partibus sanis & solidis inniteretur, tantum dolorem ægro inferebat, ut loquendi facultate carens, in lectum sese mustitando demitteret. Postquam verò cucurbitula avulsa est, & incisio facta supra partem affectam, atque iterum adnota cucurbitula, tantum abest, ut dolorem perciperet, quin potius maximum inde solatium consequutus est: unde nobiscum loqui cœpit, omnesque adstantes agnovit. Ac quanquam per cucurbitulam sanguinis 3. viij. vel vij. extractæ fuissent, præcepi tamen, ut sequenti die phlebotomia iterum celebraretur, sicque æger paucis postmodum diebus omnino convaluit.

## OBSERVATIO IV.

*Phthisis.*

**F**ilius natus tertius Amplissimi viri Domini de Perissol in Senatu Gratianopolitano Præsidis, annos natus 14. Genævâ Gratianopolim advectus est 8. morbi sui mense, macie & phthisi consumptus cum alvi fluxu insigni, ita ut eum brevi moriturum patri prædixim, propter ulcus pulmonis, quem frustulatum extulsi: & frustula illa supra carbones injecta gravissimum foetorem exhalabant: Tum foetor anhelitus cadaverosus, non solum ægrotantis cubiculum, sed etiam vicina usque ad scalas inficiebat. Quibus animadversis nullum aliud remedium præscribere posse pronuntiavi, quàm lac muliebre ab optimæ nutricis uberibus sugendum. Quod postera die in usum revocatum, post quatuor dies ægrum in paulo meliorem statum reduxit, & intra duos menses integræ sanitati restituit. Ortus erat hic affectus ex pleuritide male curata, quæ in empyema migraverat, & empyema in phthisin. Hoc idem remedium in pluribus aliis expertus sum, tum etiam in me ipso & filio meo, & duobus nobilibus viris, qui sanguinem per os magnâ copiâ rejiciebant.

## OBSERVATIO V.

*Punctura nervi.*

**Q**uidam mercator Gratianopolitanus, manu inversâ mensam percuriens, acum in eam defixit, quæ globulo filii inserta erat. Per biduum nihil inde mali percepit, sed tertio die tantus in parte dolor obortus est, in dies sequentes perseverans, ut neque venæ sectionibus, neque foribus, neque cataplasmatibus anodynus sedari potuerit. Hujus doloris contumaciam advertens, peto à Chirurgo, num eum alias morbo aliquo venereo affectum viderit? Respondit eum quidem ante triennium gonorrhœa & carie pudendi affectum fuisse, sed perfectè curatum. Præscripsi statim suffumigium ex cinnabari, storace, benzoino, thurè, & semine hyoscyami, terebinthinâ exceptis, quo manus tantum suffiebatur, statim melius habuit, paucisque diebus continuato remedio, perfectè curatus est.

## OBSERVATIO VI.

*Febris quartana.*

**M**ultos curavi quartanarios quorum felix successus, post universalia remedia, oleo magnetico præsertim à me tribuitur, quod nullum effectum sensibilem producit. Eius autem guttas duas vel tres in vini cochleari exhibeo in principio accessionis. Ex eoque pilulas febrifugas compono.

## OBSERVATIO VII.

*Epilepsia.*

**N**on rarò expertus sum, & plures habeo hujus rei testes, poëziam sub propria constellatione collectam,

nempe inclinante luna in Ariete existente, epilepsiam solvere sola applicatione. Radicem autem mediam & præcipuam atque majorem per longitudinem divisam, collo & brachiis circumdedit in quadam nosocomii virgine 18. annos nata, quæ à pueritia hoc morbo affligebatur, & singulis diebus paroxysmos patiebatur. Attamen ab eo tempore protinus curata visa est. Hic patet, quantopere utilis sit in medicina facienda syderum observatio.

## OBSERVATIONES COMMUNICATÆ

AB HENRICO RUFO,

APUD SAMMARCELLINENSES MEDICO,  
& inter Gratianopolitanos conscripto.D. D. LAZARO RIVERIO,  
Consiliario, & Medico Regio, & in Universitate  
Monspelienfi Medicinæ Professore dignissimo.HENRICUS RUFUS  
S. P. D.

**C**UM novum sydus huic Provinciæ affulseris (Profesor Meritissime) non mirum si omnium in te convertuntur oculi: cumque tuo lumine magna lætitiâ nos afficias, par est, ut magnâ laude afficiaris quia per te beatiores sumus. Quicumque enim virtutes tuas & vitæ summum decus non novit, audit saltem, & propius novisse desiderat. Mitto animi dotes & colloquiorum cum doctrina suavitatem, Tot ægrotantes, quos & Gratianopoli & ubique locorum Delpinatus ab Orci faucibus redemisti, laudes tuas reticere non possunt nec debent, in uno afflictis & infelices, quod Gallia Narbonensis totumque Monspelium te nobis invidet: nusquam tamen totus aberis (Doctor & Professor Clarissime,) præter commemorata, opus practicum, quod omni puncto absolutissimum publici juris fecisti, mihi desiderium nobiscum sublevabit, atque Reipublicæ Medicæ hoc conferet emolumentum, ut & absentem te consulere liceat, neque huic labori finem dedisti: nam inter tot gravia exercitia, quibus in scholâ Monspelienfi incumbis, & tot ægrotantium pro sua salute interpellationes: alterum præterea observationum tuarum librum moliris, nec sanitati parcis, aut à lucubrationibus cessas, ut Medicinæ splendorem adaugeas: quod cum solus exequi potuisses, apprimè tamen quorundam amicorum & discipulorum subtexere voluisti: neque à me (cui quondam discipulus artis Jatrice rudimenta de tuo distamine hausisse gloriatur,) observationum expetere dedignatus es. Concessi, te jubente, non inscius, me aquas in mare deportare: has si legeris, & in iis quadam minùs aptè exarata videantur (D. C.) à te castigari non ægrè feram, qui obsequium perpetuum tibi devovi, teque in æternum colendum suscepi. Vale, & mihi torique Apollineæ familiæ vive diu: è nostro Musæolo, idibus Julii anni 1645.

## OBSERVATIO I.

*De portentoso & insolenti singultu.*

**A**Nno 1634. mense Decembri Sammarcellini, futor quinquagenarius, ab inedia, frigore, & itinere incidit in ephemeram, quæ intra 24. horas per copiosum sudorem discussa est: ita ut postera die omni febre & dolore capitis vacuus remanserit usque ad octavam, ciborum tamen inappetentiâ superflite, cum quâ & somnolentiâ & torpente lassitudine tenebatur. Verum octavâ die manè iterum febriculâ absq; rigore obsessus est, mox sub vespere gravissimo singultu angebatur, cujus sonus sive strepitus ultra quartam domum vicinam suæ, è subjecta autem via facile audiebatur, nulla remissione, nullis datis induciis. Inter quæ haud multum siticulosus, mente constans: sed tam ferocis symptomatis maximè impatiens; undecima aliquid cruentum carni semiputri non absimile per vomitum, concurrente tussicula ejecit: quod quidem



ab adstantibus caro cydoniorum saccharo condita, quam non pridem comederat aeger, putabatur. At die sequenti, frustum ejusdem magnitudinis & coloris, rubrum scilicet, & avellanæ molem æquans per nauseam excrevit: quod primum in aqua lavari, deinde prunis apponi iussimus, atque exempto colore sanguinis, quo aqua perfusa est, & nidore foetido, qui ab ustione exhalavit quod ante ex narratione fueramus suspicati dilucidè apparuit, illud nempe explosum fuisse molem carneam cum membranis ab ulcere in œsophago vel prope superius ventriculi os latitante abrasam. An verò ulcus istud derepente ortum sit, & à prima illa die, qua Ephemera correptus est homo, inustum; an potius à longo tempore fuerit contractum, non bene constat. Est tamen verisimile, tam brevem non habuisse originem: primò, quia Phlegmone vel alius tumor non præcesserat, quem plerumque subsequi solet ulcus; deinde quòd à pluribus annis levi tussicula & inani itidem premeretur: sine ulla è pulmonibus manifesta excretionem, idcirco malum, quod sub prima œsophagi vel stomachi tunica jam pridem radices egerat, à causis externis suprà allatis concitatum, sese confestim exeruit, symptoma verò fuit continuum ab ulcere, à quo mors 14. cum delirio fuit inducta: cum singultus neque phlebotomia iterata, neque cucurbitulis, neque medicamentis detergentibus, digestibus, & purgantibus (inter quæ hiera valdè commendatur) quicquam de crudelitate, usque ad exitum remiserit.

## OBSERVATIO II.

*De phlegmone cerebri partem posticam obsidente, & symptomatibus inde consequentibus.*

**N**obilissimus & illustris juvenis D. de Larrhaudiere, annos natus 37. sub cane in gravissimum & acutissimum dolorem capitis incidit, qui ad posteriora & latus sinistrum magis porrigebatur. Aderat obscura & levissima febris, sensuum vigor, gustus præcipuè, cum his nihilominus sitis ingens & vigilie perpetuæ: frons nihil incaluit, caput parum, ex tactu licet duro, non dolebat, appositis ad frontem manuum unâ, ad sinciput alterâ, cerebrum intus concuti ac convelli sentiebatur, ac caput universum involuntariè subsilliebat, urinæ in principio crassæ & albæ: quibus animadversis, phlegmonem in cerebro vel erysipelas metuentes, ex cephalica primum, deinde ex mediana mitti statim sanguinem ad lb. ij. iussimus. Diebus sequentibus, quod dolor instaret crudeliter, iterum partitis vicibus phlebotomiam celebravimus ad lb. ij. adverso brachio. Quintâ ventrem subduximus: sextâ per cucurbitulas humeris affixas sanguinis lb. ss. detraximus, intra hæc caput derafum oxyrrhodino illitum fuit, nec quicquam eorum omisimus, quæ à cerebro cujusvis generis humores revelere, derivare, vel repellere valent. Quartâ morbi die, in linguæ latere dextro erupit tuberculum, quod durum & cavum & sine sensu ulcerosum deprehensum est, carcinoma scilicet. Septima sub vespere paululum deliravit, mox sudor in facie primum, deinde per totum corpus copiosus obortus est, ita ut veram & perfectam crisin adfore speraremus. Mador detergitur, permutantur lintea, sudor itidem abundè prorumpit. At aeger jam de operimentis conqueri cœpit, ac suffocari exclamat, quæ dum amoveantur, & sudor, ut antea abstergitur, illum fermè resolutum invenimus, & continuo delirantem: vires quæ ante sudorem fuerant prævalidæ, omnino fractæ percipiuntur, atque in eo statu nocte tota usque ad horam octavæ diei noniam matutinam perstitit, garrulus supra modum, & insipiens, & immemor omnium quæ sibi in morbo contigerant, vel facta fuerant. Circa decimam resipiscere visus est, quorundam reminisci, & sic spes animis addita fuisset, nisi pulsus convulsivus, artuumque tremor cerebrum pessimè affici indicassent. In prociectu urinæ excretio copiosissima quæ rubra & igneo splendore corruscabat: simili hora qua pridie, sub vespere, rursus ægrotantem invasit delirium, in eo pejus, quod cum vires rursus constarent, factus phreneticus, adstantes summo terrore profligabat. Nonâ matutina

iterum resipuit, usque ad vespere, sub quam tumor exortus est in cervice, pomi mediocris magnitudine, non dolorosus, neque à cute diversi coloris, nec minus delirium juvenem occupavit cum manuum motu convulsivo. Die decima omnia similiter se habuerunt. Sub finem undecimæ convulsus moritur. Porro cum morte ante septimam nec spectata, nec pronunciata sublatus fuisset vir, ut illustrissimæ familiæ, sic & magni momenti apud omnes sui generis, consultum fuit cadaver diffecare, ut causa latens apud populares detegeretur. Ceteræ corporis partes & parenchymata laudata conditione seu diathesi inventa sunt præter cerebrum. Aperta quippe calvaria, magna copia sanguinis nigerrimi, etsi diluti, illico effluxit, intactis adhuc menyngibus, imò ossibus vix deductis ad ferræ capedinem, qui quidem sanguis inter calvariâ & membranas effusus ponderis lb. ij. vel pluris æstimabatur. Ubi detectæ sunt cerebri tunice, mox universum venulis nigro torridoque sanguine turgentibus conspersæ apparuerunt. Pars autem posterior duorum digitorum latitudine, longitudine quatuor, ubi torcularis sedes definitur, non solum nigricans sed præterea membranæ puniceo colore, & gangræna corruptæ visæ sunt, in qua parte dum scalpellum adigi iussimus, protinus inde materia purulenta ad 3. v. vel 3. vj. cum foetore emanavit. Exinde novaculâ aliis penetrantes Chirurgi, tota ferè basis cerebri, in primis cerebellum, & ea pars spinalis medullæ, quæ primis vertebri excipitur, & super qua tumor apparuerat, sphacelo similiter corruptæ sunt inventæ; meninges vero partis sinistræ, ulcusculis exesæ, per quæ sanguinem sub calvariam effluxisse, verisimile est. Ex quorum narratione facile inferre licet, causam doloris illius acutissimi, vigiliarum, delirii & convulsionis, fuisse solutionem continui in cerebri parte postica, cerebello vulgo nominata. Solvere verò unitatem causæ duæ, ulcus & phlegmon, erysipelatodes: ulcus quidem, ut causa primaria, ab aliquot mensibus contractum ex causis mihi relatis, sed reticendis, ut sobolem habuit ulcusculum illud in lingua enatum, sic & partem debilem reddidit & inflammationi locum dedit. Phlegmonem autem erysipelatodem promoverunt atas juvenilis, temperamentum sanguineo biliosum, temporis constitutio. Sed præ cæteris causæ externæ, natatio scilicet in frigida sub dio post insolationem præcedentem & exandescentiam. Causæ verò cur febris tam obscura cum tot terrificis symptomatibus deprehenderetur, hæc sunt prima, quòd cæteris partibus bene valentibus unum cerebrum laborabat, secunda, quòd cerebrum obscuro sensu sit præditum ex se, & præterea frigidum & humidum: tertia & magis notatu digna, quod cerebrum longè sit distitum à corde, ideoque spiritus caput perreptantes, semel in plexus binos illos labyrinthicos illapsi, difficilè ad cor recurrunt, & contagium partis affectæ cordi minimè communicant.

## OBSERVATIO III.

*De morbo lento, à syderatis pulmonibus orto, quo virgo nihil mali sentiens, interiit mense Febr. 1643.*

**I**ngenua virgo, annum agens supra 14. brevi morbo (ut multis videbatur) sublata est: ante biennium tamen altum ducebat spiritum, solitudinem affectabat, & facies totusque habitus pallore albescebat. Ante duos menses, dum ejusdem fratrem lento quoque morbo confectum inviseremus, à matre fuimus rogati, ut illius pulsum exploraremus, num febricitaret: pulsum observavimus languidum, & inæqualem, sed sine calore febrili; ideoque ubi vultum pallefcentem paululum sumus contemplati; & de ætate sciscitanti, venit in mentem menstrua forsitan instare, quæ dum ob venarum & viarum angustias naturæ inæquæ impedita, referre laboraret, sanguis ab iis insufficiebatur, & levia illa symptomata suscitabat, uti solet contingere non rarò in virginibus hujus ætatis, quodque mater & sanguineæ opinabantur: quare his obiter dictis & factis discessimus, altius rem indagaturi, si malum protraheretur, aut symptomata ingravescerent. Sed iis utrinque



vel neglectis, vel oblivioni datis, post duos menses seriò vocati, morbum multo graviores reperimus, ut quem *ἀποσιτία* & febris continua comitarentur, quique sub *ἐπαισμηγία*, vires præterea deiciebantur, narium pinnæ inter expirandum expandebantur, nec tamen insignis dyspnœa aderat nulla sitis, non rubor in genis, non vigiliæ, decumbens nonnihil tussiebat sine spūto. Cor verò crebro & valido motu, continuò sub noctem recrudescente, tangenti palpitabat, ægrâ non sentiente; urinæ crassæ, albæ, adiposæ cum enæoremate vel hypostasi ejusdem conditionis divulsa: nunquam deliravit, nullam noctem duxit insomnem, ne quidem ultimam, in qua placide & sine agone hanc vitam cum meliore commutavit. Ergo propter istius mortem inopinatam, apud parentes, & quod etiam tredecim alii ejusdem genituræ, ante vel circa pubertatem, defuncti essent, consilium fuit apud amicos, corpus mortuum aperire, & primum nudato cadavere, latus utrumque ab alis ad costarum notharum ultimam, maculis latis è rubro liventibus, & sugillationem referentibus erat conspersum, viscera in abdomine contenta visa sunt; solo jecore, nonnihil plus solo nigricante, & ventriculo perexiguo, bile porracea intincta. Ubi in thoracem deventum est, ab utraque ejus cavitate incisa confertim aquæ virosæ magna effluxit copia, ad lb. iv. mirum quod orthopnœam vel saltem dyspnœam viventi non invexerit aut fluctuationem non prodiderit: pulmones syderati inventi sunt, præterea in eorum ambitu puncta passim albescentia cernebantur, quæ levissimo tactu disrupta, & pus & tabunt cructabant, imo labe vasa omnia, & cavitates puniceo colore affecerat; pleura musculique intercostales virore erant perfusi, non diaphragma, sed pericardium lege vicinitatis erat exsuccum, putrefactum, & humore suo privatum: cor & cerebrum sana. Ex his deliberatum & decretum fuit, hanc labem à primo ortu duxisse originem, sive à semine, sive à sanguine. Exempli Fratrum rem maximè comprobant, & si ab externis causis affectus iste in virgine derivasset, portio duntaxat pulmonum, non universi fuissent labefactati: nam non peccaverat illa in victu, neque in aliis rebus non naturalibus: deinde mors placida corruptionem in substantia & temperamento sensim, & per progressus factam fuisse, non à causa violenta, atque etiam cum nunquam tussierit. Ex eo patet neque fluxionem, neque congeriem humorum vitiasse pulmones. Secundo tales affectus ut à parentibus deduci nemo dubitat: ita & facile posse communicari est concedendum, & vulgo comperimus in familiis ejusmodi labe infectis, plures simul vel successivè pari morbo corripì, imo & aliquando ad quintam sextamve generationem protrahi, & in extraneos, qui istorum consuetudine utuntur prorepere.

## OBSERVATIO IV.

*De calculis per anum perpetuò excretis.*

**V**irum nobilem, cujus castellum non longè è Sanmarcellino distat, novimus, qui quoties alvum exonerat, calculos inæquales, fastigiatos, cineritios, cum excrementis dejicit jam à pluribus annis, non dissimiles in colore & substantia illis qui per ureterem à renibus decidunt; isti & mole & scabritie podicem transeuntes infestant, ita ut de re, neque de generatione perpetua non sit dubitandum.

## OBSERVATIO V.

*De calculis in omnibus corporis partibus procreatis.*

**V**irum alium probum novimus degentem in domo D. de Leyssins in Suprema curia Delphinatus Consiliarii Regii, & ejusdem Scribam, & rerum forensium Præfectum, qui calculos & lapides majusculos in quavis sui corporis parte ostendit. Vidimus sæpe, & tales tetigimus super carnes, musculos, membranas, nervos, ossa indifferenter: ita ut aures, nasus, mammae, cilia illis non careant; protuberant quippe manifestè, & tangentibus mobiles apparent, & si quando resolvuntur in parte aliqua, in alia pullulant, & in dies numero & magnitudine multiplican-

tur. Est & idem nephriticus quem dū aliquando invisimus, nobis super rotulâ genu dextri tumorem insignem ostendit, ejusmodi lapidibus variis & distinctis refertum; ac si in pera fuissent conclusi, strepitum edebant, si cornoveretur. Post aliquot menses in eundem rursus incidimus, qui tumorem illum mollè & æqualem evasisse nobis declarat. Genu utrumque deteximus, tumores palpavimus, & revera humorè subesse comperimus, infigitur scalpellum, & subinde tres vel quatuor unciae materiæ coctæ & crassioris erumpunt, qualis à steatomate prodire sæpe visum est in genu sinistro, quoniâ calculi partim adhuc solidi tangebantur cum spatii, licet mollioribus, apertionem non sumus aggressi, resolutionem perfectiorem expectantes.

## OBSERVATIO VI.

*De calculis in liene genitis, & inde per vomitum rejectis.*

**S**ævisissima nephritide per quadriennium laboravi, sine sensibili renum vel hepatis intemperie calida, à qua sensim (Deo favente) sum liberatus, usu aquarum vitriolarum Aurelii apud Dienes. At vix calculos arenasque emingere cessaveram, cum in cruciatus crudelissimos incidi lateris sinistri: sub costis circa lienem dolor brevi spatio circumscriptus, ad ventrem & umbilicum non porrigebatur, ren tantum sinister alternatim compatiebatur, ventriculus maximè sinisterosum, præcipuè cum vomitus instaret. Solvitur primò non ante decimam diem affectus iste: his observatis, quod neque alvus erat suppressa, ut in colico dolore, neque urina repressa, ut in nephritide: contra urinæ copiosæ mingebantur, crassæ, turbidæ, in quibus laterculos pulverisatos dissolutos fuisse, dixisses, qui breviter matulæ fundum petebant: at nihilominus crassa ista hypostasis non erat aspera, neque ullo modo calculosa, sed calcis instar in urinam levi agitatione rursus diffundebatur. Tali paroxysmo prima hieme ter quaterve fui cruciatus, celebrando ad tanti doloris expulsionem remedia, quæ in colico vulgo usurpari solent uno omisso balneo, à quo pessimè habueram in principio. Verum cum vomitus frequens & laboriosus inter cætera symptomata maximè infestaret, quem angor & gravis cardialgia præcedebat, venit in animū explorare accuratius, cujus conditionis esset materia illa, quæ tã abundè etiam jejuno ventriculo rejectabatur. Erat certè quoad colorem, rubro nigricans, pultis consistentia, crassa, tenaxque, in qua dum bacillo agitatur, multi calculi cineritii & subflavi, quales per urinas primò excreveram, inventi sunt, non semel tantum, sed quoties vomerem, magno conatu & labore, vel quoties talis dolor repeteret. Anno hoc postremo 1645. dolores mitiores sensim facti fuere, ren parum doluit, sed magis lien & ventriculus, seu pars sinistra de more solito, ac longiori intervallo. Ex quibus agnovi mineram calculorum, primo & ultimo in liene & ejus vasis delituisse, & per vas breve (quod ex usu aquarum acidularum, deinde & per vomitum patentius factum est,) in ventriculum cum humoris atrabiliarii magna copia sui portionem amandasse, quæ primo ad renes tantummodo propellebatur.

## OBSERVATIONES COMMUNICATÆ

A. D. SIMEONE JACOBZ,  
Medico Costensi peritissimo,

CLARISS. VIRO D. D. LAZARO RIVERIO  
Regis Consiliario & Medico.

NEC NON IN CELEBERRIMA  
Monspelienſium Medicorum Academia Professori  
Regio dignissimo.

**Q**uod à me nuper desiderasti, seu potius quod imperasti (PROFESSOR REGIE CLARISSIME) id nunc haud invitatus exsequor, & offero nascentes Medicinæ meæ practicæ primitias, seu potius eruditionis tuæ fructum, quem nemo justius sibi vindicet quàm is qui tantâ cum curâ excoluit.  
Redeunt



Redeunt igitur ad te tanquam ad originem suam, observantia nuncule nostræ, quas tuis aliorum præstantissimorum artis nostræ Heroum observationibus & experimentis conjunctas esse voluisti. Tuæ sunt quia tuus sum: tibi debentur, quia primus es eorum auctor, quo duce Pæonium conscendi navibus æquor, quo monstrante viam stadium Apollinare feliciter emensus sum, & felicius tandem quievi per biennium in portu tuo domestico, in quo ut prima Medicinæ practica, tum publicè, tum privatim in me sparsisti semina & fovisti, ita ea jam in lucem edenda, ab eo in quo versantur calumnie periculo defendere, gloriæ est tuæ; cum primos ut plurimum conatus tot comitentur difficultates, tantaque subsequantur pericula, ut vix ac ne vix quidem hosce nascentis Hygeæ meæ fructus unquam proferre ausus fuisset, nisi sub felicibus tui nominis auspiciis in publicum prodissent, tuque ipse mihi fuisses publicæ, duxque comesque viæ. Quem quia morborum cura celebrem, usus peritum, & experientia felicem in arte fecit, & fortunatum; quem morbi timent ut hostem, homines amant ut salutis vindicem, & mors odii ut victorem. Ideo non pigebit in medio prodire sub tanto duce, qui mihi præterea in rebus tum publicis, tum privatis, semper propitius fuisti, & inter innumeros difficultatum, adversorumque fortunæ fluctuum impetus animum meum domestica consuetudine erexisti, meaque eruditionis maxime sollicitus, ingenium meum omni tempore fecundo tuæ doctrinæ flumine irrigasti, & aperuisti viam ad majora, quæ forsitan maturior ætas & occasio amplior aliquando suppeditabunt.

Si modò fata sinant, Phœbique in vota vocati Numina, sint studiis non inimica meis.

Vale iterum, & quam diutissime inclytæ Universitati, sicut & toti Galliæ, novi Apollinis instar affulgeas, vitamque prorahas in longos & Alcyonæos dies, quos tibi votis omnibus deprecatur, tibi omnibus, etiam vitæ titulis addictissimus SIMEON JACOBZ Medicinæ Mospeliensis Doctor. Datum Costæ sancti Andree, 6. Idus Octobr. anni 1645.

## OBSERVATIO I.

## Linguae frigiditas.

**A**dolescens Mospeliensis 20. annos natus, nomine Ludovic. Decamp, diuturno alvi profluvio laboravit mense Junio anni 1643. & tandem adductus est in xenodochium Mospeliense, cujus cura mihi à Consulibus delata fuerat. Post aliquot remedia pro sua sorte per 15. dies frustra tentata, morbus in eodem statu perseveravit, cum insigni virium dejectione, perseverante tamen appetitu satis laudabili, & siti non multum intensa, in eoque statu vixit adhuc per sex aut septem dies: quibus elapsis, lingua satis humida, colore naturali prædita mihi insipienti apparuit, sed tangenti actu frigida sentiebatur sine extremorum perfrigeratione; ita ut mihi ipsum affligere videretur, præter alvi fluxum, à quo multum dejectæ fuerant vires: brevi tamen morituro existimabam, sed vixit adhuc per quatuor dies, cum actuali linguae frigiditate.

Alter ejusdem ætatis in eodem nosocomio patiebatur ulcera multa in utraque tibia, ac fistulosum in inguine sinistro, brevique emaciatus ad interitum ruebat. Postquam tamen in eo statu per duos menses aut amplius, cum ulteriori extenuatione permanisset, lingua ei apparuit actu frigida, sicut prædicto, cujus exemplo edoctus, brevi morituro prædixi, sicut accidit post 24. horas. Alius nomine Joannes Aventurier 15. annos natus in eodem nosocomio laboravit dysenteria; & intra sex dierum sparium macie consumptus apparuit, lingua actu frigida existens, sine perfrigeratione extremorum, ac die sequenti obiit. Ex quibus colligere licet linguae frigiditatem inter signa lethalia esse referendam.

## OBSERVATIO II.

## Epilepsia cum paralyti.

**P**uella quædam nomine Catharina Bognole, decem annos nata, pituitoso temperamento, & quadrato corpo-

re prædita, à quinque aut sex mensibus laborabat epilepsia, cujus insultus singulis ferè diebus, imò aliquando bis & ter in die solebant invadere, iisque supervenerat motus & sensus privatio in brachio dextro. Huic in nosocomium nostrum adductæ mense Decembri 1643. primò præscripsimus potionem phlegmagogam, cum decocto cephalico, quæ iterata fuit post aliquot dies, quorum spatio præparantibus & specificis usa est, sed sine fructu. Tandem opiata Montagnanæ circiter 3. ij. sumpsit per 4. aut 5. dies, quibus elapsis coepit movere digitos, mox totum brachium, & rariùs tentari paroxysmis epilepticis, ita ut intra 20. dies (continuato scilicet singulis matutinis usu prædictæ opiata) ab utroque affectu omnino liberata fuerit. Descriptio autem talis est.

℞. Radic. pœoniæ maris, stœchad. casti an. 3. x. agarici 3. v. pyrethri, carvi, sem. anethi, assæ foetidæ, aristolochiæ, ana 3. ij. 6. succi scyllæ & mellis electi aa libr. 1. & 3. ii. coquantur simul scylla & mel lento igne usque ad bonam consistentiam, deinde superadditis speciebus fiat electuarium, de quo capiat 3. ii. singulis diebus mane, tribus horis ante pastum.

## OBSERVATIO III.

## Hysterica Passio.

**M**ulier Mospeliensis sexagenaria, patiebatur hystericam suffocationem à 24. horis, cum dolore capitis & ventris inferioris, præcipuè è regione lienis. Aderant ingens inquietudo, vigiliæ, ac sitis; cum neque cucurbitulas neque clysteres admittere vellet, solo emplastro ex galbano, umbilico admoto contenta: suasi ut quoties sitiret, cyathum oxycrati sumeret, quod fecit ter aut quater, & intra paucas horas immunis evasit. Aliam fœminam liberavi ab hysterica suffocatione, solo clystere ex oxycrato, quem per duas horas retinuit.

## OBSERVATIO IV.

## Dolores Arthritici &amp; veneriei.

**A**dolescens 25. annos natus, nomine Matthæus Farlet, à duobus mensibus laborabat doloribus articulorum atrocissimis, præcipuè in genu; cum tumore, qui tamen concolor erat parti, nec ad tactum dolebat, sed profundus doloris sensum efficiebat, tum etiam in scapulis, cubito, metacarpio, & digitis, qui noctu solebant exacerbari, & ægrotantem lecto affixum maxime cruciari: Post totius providentiam per apozemata, & phlebotomiam sæpius iteratam, sensit aliquod levamen, & præcipuè ex pulvere radices jalappæ, ita ut jam incedere posset. Remansit tamen dolor, licet minus atrox in genu, cubito, & scapulis, noctu semper recurrens: unde ego venereum esse conjeci: tum etiam ex eo, quod ante duos annos gonorrhœam passus fuerat, à qua citius quàm par fuisset, liberatus, se nullum incommodum ab eo tempore persensisse affirmavit. Huic igitur in xenodochium tandem deducto, quia extraneus erat, exhibui per septem dies continuos mercurii dulcis sexies sublimati per se cum sola conserva rosarum, primo scilicet die 3. i. secundo, tertio, & quarto 3. β. reliquis usque ad septimum 3. ii. levem salivationem excitabat hora una aut altera post assumptionem, quæ perseverabat usque ad horam prandii, alvum bis movebat singulis diebus sine ulla molestia, vel nausea. Octavo die sumpsit pulverem ex senna, cremore tartari, & radice jalappæ, à quo optimè purgatus, nullum deinceps dolorem persensit.

## OBSERVATIO V.

## Tumor, &amp; dolor ingens.

**A**lter adolescens 22. annorum in eodem nosocomio Mospeliensi patiebatur tumorem in genu sinistro, cum dolore identidem recurrente, qui rheumatismo successerat, ægrumque affligerat per 4. aut 5. menses. Post universales evacuationes sumpsit eodem tempore mercurium dulcè methodo supradicta, per septē dies, cum levi salivatione,



tione, singulis matutinis ab assumpto pulvere. At septimo die ingens pyralismus exortus est, cum exulceratione faucium & palati, dentibus tremulis, & quasi prolabantibus pituitæ continuo fluxu, ac tanto oris foetore ut eum æger ferre non posset, noctu diuque infomnis. Post quatuor dierum spatium de cohibendo pyralismo cogitandum fuit. Ideò præscripsi ptisanam laxantem bis in die sumendam per biduum, sicque humores ἀνάρρητοι facti sunt κατάρρητοι: tumor disparuit, dolor cessavit, ægerque sine adminiculis incedere cœpit, nullisque adhibitis remediis prophylacticis, post quindecim dies sanus & incolumis in suam patriam reversus est.

## OBSERVATIO VI.

*Hydrops.*

**R**uficus 30. annorum, à tribus mensibus hydropelaborans, in xenodochium adductus est circa finem mensis Januarii anni 1644. At post aliquot dies vitam cum morte commutavit. Dissecto cadavere ingens aquarum copia fluxit; jecur optimè constitutum, & naturali temperie præditum invenimus, lienem verò corruptum, & totam ferè ipsius substantiam pici liquatæ similem. Unde patet, non omnem hydropis speciem ex summa hepatis imbecillitate aut intemperie perpetuò generari.

## OBSERVATIO VII.

*Mensium fluxus immodicus.*

**M**ulier quædam rustica, trigessimum ætatis annum agens, laborabat à mense Junio anni 1644. mensi fluxu immodico, & maximam virium cum sanguine jacturam patiebatur singulis horis ab aliquot diebus, ita ut de ipsius salute jam actum esse videretur. Ego fortè fortuna rura perambulans, venationis gratia, cum remedia non suppetere, nec ægrotantis fortuna eorum sumptus ferre posset, exhibui statim, idque circa horam sextam vespertinam, succi urticæ ʒ. v. aut vj. & jussi admoveri parti hypogastricæ prædictum succum cum farina tritici subactum instar cataplasmati; circa mediam noctem utrumque reiterari jubeo. Quod cum factum fuisset, ægra matutinis horis meliùs habuit & sanguinis fluxus immodicus omninò cohibitus est, ac sensim convaleuit absque alterius remedii ope.

## OBSERVATIO VIII.

*Fluxus muliebri.*

**M**ulier Costensis quadragenaria, laborabat à septem mensibus fluxu muliebri seroso, quem curavimus intra quinque septimanas, exhibendo singulis octo diebus g. viij. resinæ jalappæ; eductâ scilicet serosâ illuvie, à qua pendebat affectus. Deinde recidivæ occasio sublata est usu sequentis opiatae.

ʒ. Conservæ rosar. antiquæ ʒ. ij. conservæ absynthii pontici ʒ. j. pulveris electuar. triafrantali & aromatici rosati ana ʒ. coralli rubri præparati ʒ. ʒ. theriacæ veteris ʒ. ij. cum syrupo de rosis siccis fiat opiata, de qua sumebat ad magnitudinem avellanæ singulis diebus, hora somni, per longum tempus.

## OBSERVATIO IX.

*Lupia.*

**P**uella Costensis ætatis 20. annorum, laborabat tumore scirrroso nucis juglandis magnitudine, superiorem partem metacarpii occupante, qui discussus est meo consilio, admotâ super partem affectam laminâ plumbeâ hydrargyro illitâ, eaque per octo dies gestatâ tumor disparuit, nec ampliùs reversus est.

## OBSERVATIO X.

*Hydrops incipiens.*

**M**ulier 25. annorum nomine Damiana Gulon, neptis mea, laborabat à duobus annis mensium suppressio-

ne, ob incautam vivendi rationem, & errores à partu commissos, ( citius enim externo aëri sese exposuerat ) cum vigiliis, inappetentia, pigritie ad motum, difficultate spirandi, tumore & duritie lienis, ac extenuatione totius corporis ita ut ad phthisin, aut hydropem brevi ruitura videretur. Varia per annum integrum usurpavit remedia, à peritissimis Medicis ex arte præscripta. Verùm procedente morbo, & irritis omnibus auxiliis exortus est tibiæ tumor oedematofus, & totius abdominis inflatio; quæ tamen multorum flatuum particeps erat. Ingravescabant in dies omnia symptomata, ac tandem regio ventriculi in tumorem pellucidum elata est. His afflicta, & prostrata ad me accessit, ac sequentium remediorum usu convaleuit mense Septembri anni 1644.

Primò sumpsit per quatuor dies ptisanam laxantem ex infusione ʒ. ij. fennæ cum ʒ. ʒ. salis prunellæ, guttis xv. spiritus sulphuris per campanam elicti. Deinde sequentium jusculorum usum aggressa est.

ʒ. Radic. asparagi, graminis, & cichorii, ana ʒ. ʒ. radic. chinæ in taleolas sectæ ʒ. i. folior. agrim. ceterach. buglossi & cichor. an. m. ʒ. crystalli tartari ʒ. ij. coquantur, cum quarta parte galli veteris, in colatura dissolve salis absynthii & tamarisci, an. ʒ. i. sacchari rosacei ʒ. ii. fiat jusculum, quod capiat manè per 12. dies, tribus horis ante prandium.

Finitis jusculis, iterum sumpsit ptisanam laxantem prædictam, per triduum. Ac deinde opiatam sequentem cujus miros effectus sæpe vidimus.

ʒ. Conservæ flor. tamarisci & capillor. ven. an. ʒ. j. ʒ. conservæ radic. enulæ campanæ ʒ. vj. chalybis præparati cum sulphure ʒ. i. salis tamarisci ʒ. i. spiritus sulphuris per campanam elicti ʒ. i. cum syrupo condituræ citri fiat opiata, de qua capiat ʒ. ij. aut iij. singulis diebus manè, postea deambulando, & continuando per 15. aut 20. dies.

Utebatur aqua ex infusione chalybis paratâ, cum mediocri vini rubelli quantitate.

Affixum fuerat ab initio utrique tibiæ causticum, ac continuò gestatum, usque ad integram curationem, quæ sensim sequuta est prædictorum remediorum usum. Paulatim enim venter detumuit appetitum recuperavit, ac vividum faciei colorem, cum naturali somno, & hypochondrii sinistri mollitie, ac recuperato menstruæ purificationis beneficio.

## OBSERVATIO XI.

*Lumbrici.*

**P**uellus quatuor annorum, lumbricis valdè obnoxius, mense Septembri anni 1644. laborabat inappetentia, nausea-pruritu narium, siti, inflatione ventris cum ejusdem torminibus & febre, quam cum verminofam ex prædictis & præcedentibus signis esse manifestum esset, exhibui mercurii dulcis sexies sublimati g. xij. cum diagrid. gr. v. Post duas horas ab assumpto remedio viginti circiter lumbricos simul glomeratos per alvum rejecit, & prædicta omnia symptomata simul evanuerunt, ægerque convaleuit.

## OBSERVATIO XII.

*Dolor capitis intolerabilis.*

**V**ir quidam quinquagenarius, gracilis & raræ texturæ, ad iram maximè proclivis, laborabat à duobus circiter annis dolore capitis acutissimo, partem dextram à summo vertice ad tempus ejusdem lateris occupante, qui quoties recurrebat ( recurrebat autem ter aut quater in anno ) ægrum lecto affixum adeò cruciabat, ut in desperationem ferre adduceret, sine febre tamen ac sine siti aut phlogosi ulla, sed cum pulsatione insigni arteriæ ejusdem temporis. Ad eum vocatus mense Septembri anni 1644. phlebotomiam imperavi, præmissis clystere, ad eluendas primæ regionis impuritates, deinde medicamentum cholagogum exhibitum & iteratum & post aliquot dies, usurpatis iterum julepis refrigerantibus & humorem biliosum præparantibus. Postea admotâ capiti repellentia & oxyrrhodyna, aut revulsiones per cucurbitulas tam siccas, quam scarificatas, frictions extremorum celebratæ. Iterata phle-



phlebotomia, quibus tamen non cessit dolor, qui cum reversus esset, adventante vere anni 1645. clystere emolliente & refrigerante præmissis, cum medicamento bilem alterante & evacuantem, ad arteriæ temporis apertionem venio, eaque celebrata fuit urgente dolore, & sanguis cum impetu ac saltu profiliens extractus est ad 3. v. deinde admoto vulnere splenio ex linteo complicato, & aqua frigidâ madefacto; ac fasciâ superinductâ, ut in vulgari phlebotomia fieri solet, dolor intra dimidiam horam sublatus est, qui antea per multos dies affligere solebat, nec ab eo tempore reversus est.

Admoveri poterat ad majorem cautionem emplastrum Galeni ex thure, mastiche, bolo armena, & pilis leporinis, cum albumine ovi & bona ligatura, sicut paratum habetur, hoc tamen opus non fuit.

## OBSERVATIO XIII.

*Dolor capitis continuus.*

**M**ulier Costensis quinquagenaria, nimis nota, & nimis famosa, laborabat mense Octobri anni 1644. difficultate respirandi, cum dolore capitis atrocissimo, qui tamen vagus erat, & noctu præcipue ingravescerebat, cumque remediis ordinariis tum vacuantibus, tum roborantibus per mensem integrum usurpatis non cederet, venenum esse suspicatus sum. Augebant autem hanc suspicionem spontaneæ corporis lassitudines, desidia, torporque ad motum, interdum gravis auditus, cum tinnitu aurium, immixta ventriculi & jecoris concoctio, & dolor & cruciatus insignis in priori parte utriusque tibiæ, noctu potissimum recurrens, tum quod præter antea vitæ rationem, anno superiori, diætâ sudorificam, & frictiones ex unguentis mercurialibus ac pilulas mercuriales multoties usurpaverat. Itaque cum anni tempestas frigidissima, & ægrotantis status antivenereorum usum non pateretur, de dolore capitis sublevando cogitandum fuit, qui cum vagus esset, à mercurii cerebrum impetentis & obsidentis maligna qualitate produci existimavimus, nec sefellit opinio. Inditus enim utrique nari nummus aureus circumvolutus, & per aliquot horas ibi detentus, ac tandem extractus, albicans utraque ex parte, ac Mercurio tinctus apparuit, qui deinde carbonibus appositus pristinum colorem recepit. Alter etiam nummus in ore detentus per quatuor aut quinque horas, eodem modo albicans extractus est, eoque carbonibus imposito mercurius evanuit, hocque remedio aliquoties iterato dolor capitis acutissimus omnino sublatus est, cum tamen gravitas quædam superesset; & ægra melius habere visa est per multos dies; ita ut è lecto surgeret, cibum ritè appeteret, seque curam profiteretur, remanente tamen difficultate spirandi, & tibiæ dolore noctu semper recurrente. Verum post quindecim dies, obortâ febre continuâ, è vivis decessit.

## OBSERVATIO XIV.

*Febris tertiana notha.*

**V**ir quidam Costensis, annorum 27. optimi habitus & temperaturæ, circa initium mensis Septembris 1644. febre tertianâ nothâ correptus est, quæ cum per mensem integrum perseverasset, frustra tentatis ex arte remediis, ab alio Medico præscriptis, sumpsit meo consilio vomitorium ex 5. j. salis vitrioli in aqua dissoluti, à quo ter aut quater excitatus fuit vomitus, nec febris amplius apparuit.

## OBSERVATIO XV.

*Dolor dentium.*

**P**incipio mensis Februarii anni 1645. correptus sum frequenti & molesta salivatione, cum dolore dentium acerbissimo, qui tandem febrem accersivit, eaque post injectum clysterem & celebratam phlebotomiam evanuit, remanente tamen dolore dentium, & continuo pyralismo

*Lazar. Riverii Opera.*

materia tenuis & serosa, cujus excretionem perseverante, oborti sunt in diversis corporis partibus dolores vagi, modò unam, modò alteram partem occupantes, quos cum à fero melancholico provenire judicarem, sumpsit resinæ jallappæ g. vj. quibus optimè & blandè purgatus, serosam illuviem in corpore redundantem, septem dejectionibus excrevi in maxima copia, sequenti die à prædictis doloribus & molestissimo pyralismo immunem me sensi. Attamen mense Aprili reversi sunt dolor dentium & pyralismus, qui sumpto eodem medicamento, intra 24. horas prorsus evanuerunt.

## OBSERVATIO XVI.

*Lues venerea.*

**M**ense Majo anni 1645. Puellæ duæ, quarum major vix atigerat quintum, minor verò tertium ætatis annum laborabant lue venereâ, quam per contagium susceperant à quinque mensum spatio, cum ulceribus multis in ore & pudendis, necnon pustulis, & foeda scabie, per totum corpus erumpentibus. Frustra exhibitum fuerat decoctum guaiacini per mensem integrum à perito chirurgo. Vocatus ego intra quindecim dierum spatium curavi prædictas puellas mercurio præcipitato albo exhibendo scilicet singulis diebus majori puellæ g. vj. minori verò g. iv. augendo tamen aliquando utriusque dosin, juxta operationem, quæ talis fuit, ut utraque singulis diebus bis aut ter alvum deponeret; nec vomitus ullus, aut pyralismus unquam subsequutus est. Perseverabant tamen per dictum tempus in usu bocheti ex rasura ligni guaiacini.

## OBSERVATIO XVII.

*Verrucæ manuum.*

**Q**uidam patiebatur verrucas multas in digitis manuum, quas curavit meo consilio, lactis illitus ficulnei quater aut quinquies adhibiti. Idem præstitit, idque multò efficacius, spiritus sulphuris per campanam elicitus: & per aliquot dies admotus, instar fomenti, in quodam rustico.

## OBSERVATIO XVIII.

*Vulnus contusum.*

**D**ux quidam, milites conducens in hac urbe pro D. de Ville, principio mensis Maii 1645. è summis scalis cecidit in subjectum dolium, vulnusque contusum accepit in dextro latere, ad costas, ita ut multo sanguine circa illas partes affuso perpetuus dolor, isque sævissimus cruciaret ægrotantem, qui vix ac ne vix quidem sese movere, nec loqui, nec spirare nec tussire posset quin statim ingentes clamores ederet. Vocatus ego venam subito aperiri jubeo ex eodem latere, & emplastrum de cumino apponi partibus dolentibus; quo per duodecim horas gestato, & semel renovato, dolor valdè imminutus est, lividus partis color disparuit, melius spiravit ac sequenti die è lecto surgere coepit, sicque post alterum diem discessit.

## OBSERVATIO XIX.

*Pestis.*

**T**empore pestilentiae quæ per totam ferè Galliam grassata est annis 1628. & 1629. Homo quidam Costensis, cum se peste correptum existimaret, propter subitam capitis gravitatem & dolorem, necnon vomitum variegatum, statim cantharides, cum fermento & aceto applicuit pone aures & aliis emunctoriis ac in lecto decubuit. Post 24. horas erupit parotis, ex qua continuo fluxit humor quidam acer & serosus, sicut & per alia emunctoria;

Cccc

unde



unde morbus minus gravis & salutaris extitit. Indeque post aliquot dies ager evasit, nec amplius laboravit, licet assidue cum pestiferis ageret, eisque inserviret. Eiusdem uxor post aliquod tempus, cum se male habere perseniret, eodem modo libera evasit quod remedium ab aliis didicerant, qui ita bene & bonis suis rebus egerant.

Eodem anno uxor N. Micha, Costensis, cum filiam suam primogenitam, annorum circiter 12. peste correptam existimaret, ut conjecit mulier ingeniosa, ex aspectu horrido, febre, calore, dolore capitis, & nausea: statim acceptâ puellâ pennam oleo illitam in ejus fauces immisit, excitato vomitu, serosam primò materiam, deinde flavam, ac randem porraceam & viridem veluti herbam semicoctam in magna copia eduxit: postea filiam suam in lectum reposuit, jusculum propinavit, ac quieti commisit. Post aliquot horas puella surrexit hilaris, nec amplius ullo symptomate pestifero correpta fuit, licet cum pestiferis sæpe versaretur. Interjectis octo diebus, fratres ejusdem duo natu minores, & sororuncula iisdem, imò gravioribus symptomatibus correpti sunt, quos mater eadem ratione, excitato vomitu & simili humorum sarcinâ deposita, à mortis confinio liberavit.

## OBSERVATIO XX.

*Strumæ.*

**P**Uella vicini nostri Jacobi Gorrez, quatuor annos nata laborabat scrophulosis tumoribus circa collum & aures valde eminentibus. Consuluit aliquis parentibus ipsius, ut eam pediculis corripere sinerent, qui tandem ulcera toti capiti inferre possent, per quæ materia morbifica, humor scilicet pituitosus, in magna copia ritè evacuatus est per aliquot menses, & ægra tandem liberata fuit absque alio remedio.

## OBSERVATIO XXI.

*Hydrops.*

**M**ULIER 30. annorum, hydropse anasarchâ laborans, consilio alterius mulieris, & Pharmacopœi senioris abstinuit ab omni potulenta materia per annum fere integrum, & sic tandem convaleuit absque alio remedio. Cujus exemplo rusticus ipsius vicinus, eodem morbo laborans, eodem etiam modo curatus est, intra quatuor menses. Alter hydropicus multis vesicatoriis admotis in multis partibus, à Pharmacopœo curatus est.

## OBSERVATIO XXII.

*Hysterica passio.*

**I**LLUSTRISSIMA Domina de Popiam in Occitania, affectibus hystericis multum obnoxia, variis remediis usâ est per multos annos, sed frustra, quia continuo recurrebant prædicti affectus. Tandem usu sequentis pulveris libera evasit per quindecim annos: sumebat autem illius circiter 3. j. cum vino vel pane hostiario bis aut ter in septimana, & sæpius etiam, si affectus urgeret. Utitur præterea hoc pulvere adversus omnia venena, pestem, febres intermittentes, & inappetentiam, cum felicissimo successu, ut nos sæpe vidimus. Descriptio autem pulveris talis est.

℞. Radic. gentianæ, dictam. albi, tormentillæ pyrethri, rhapontici, bistortæ, aristolochiæ rotund. carlinæ, baccarum lauri, angelicæ, imperatoricæ, sem. coriandr. præparat. sem. anisi, granorum juniperi, mastich. boli armen. orientalis, terræ sigillatæ, an. 3. iij. β. croci orientalis 3. ij. β. misce, fiat pulvis tenuissimus ad usum referendus.

## OBSERVATIONES

## COMMUNICATÆ

## A. D. SAMUELE FORMIO,

Chirurgiæ Magistro Monspelienfi exercitissimo, & à 50. annis artem exercente.

## OBSERVATIO I.

*Hæmorrhagia ex vulnere in brachio.*

**A**NNO 1593. cum miles quidam vulnus accepisset in brachio, quo radius & cubitus transversim secabantur, tanta sequuta est hæmorrhagia, ut post varia adstringentia admota, tum etiam caustica & escharotica, fluxus tamen sanguinis per intervalla recurreret, ita ut Medici & Chirurghi de brachio penitus amputando cogitarent. Ego verò cui æger commissus fuerat, linteum complicavi in formam cylindri, longitudinis trium digitorum transversorum, crassitie pollicis, quod perpendiculariter in vulnus densi: Deinde plumaceolis reliquum vulneris spatium implevi, & quia cylindri extremum extra brachii superficiem, pollicis crassitie eminebat, splenia quatuor admovi, quæ cylindrum æquabant firmabantque: ipsi verò cylindro quintum splenium, idque quadratum apposui, ac denique fascia arcuè ligavi: Et ab eo tempore sanguis amplius non effluxit, vulnus autem non detexi per quatuor aut quinque dies, donec caro intus enata venæ orificium impleverit.

## OBSERVATIO II.

*Hæmorrhagia ex arteriâ vulneratâ, ligatura cohibita.*

**A**DOLESCENS Monspelienfis, nomine N. Peyre, in singulari certamine vulnus acceperat in parte anteriore brachii prope axillam, quo vena & arteria axillaris præcisæ fuerant, unde tanta hæmorrhagia sequuta est, ut cum eam nullis adstringentibus cohiberi posse judicaret, statim ad ligaturam venerim, quam hoc modo feliciter perfeci, Acum incurvam in partem sanam supra vulnus adagi, ita ut ad os usque penetraret, & dictam venam, atque arteriam ambiret, à parte inferiori incipiendo, ubi musculus extensor longus transfigebatur, & acu in exitu musculum bicipitem perforavi, in extremo acus filum erat quadruplex, quo vena & arteria intus cingebantur, deinde admoto cylindro ex linteis confecto, supra cutem inter duo fili extrema, filum arcuè supra cylindrum alligavi, ne scilicet cutis & vasa à filo rumperentur, & hoc modo ligata fuere vasa, ut nulla amplius hæmorrhagia apparuerit. Post decem aut undecim dies, cum vulnus conglutinatum videretur, filum absidi, & æger curatus est. Interim post dictam ligaturam, ad compescendum dolorem, qui ex ea oriebatur, & arcendam inflammationem, quæ dolorem sequebatur, phlebotomiæ frequentes celebratæ sunt, & exyrrhodina parti admota, aliaque remedia dolorem sedantia, & inflammationem cohibentia.

## OBSERVATIO III.

*Dolor ossis sacri intolerandus.*

**H**OMUNCIO quidam, veterum calceorum instaurator, annos natus circiter 40. dolorem atrocissimum passus erat per duos menses in parte inferiori ossis sacri, qui adeo vehemens fuerat, ut ex eo æger in maniam inciderit. Frustra usurpata fuerant varia remedia, universalis & particularia. Tandem vocatus ad eum, cucurbitulas duas applicui, unam parti dolenti alteram vero paulò inferius, nempe supra natem, cum profundis scarificationibus ex quibus



quibus multus sanguis emanavit, eoque deterſo iterum cucurbitulas admovi ſupra loca ſcarificata, & ſanguis iterum profluxit, ſatis bona quantitate. Æger à dolore liberatus videbatur; nihilominus ſequenti die magnum cauſticum inuſſi loco dolenti, ſupra ipſas ſcarificationes, idque ibi detinui per 24. horas, ita ut eſchara capitis latitudinem æquaret, & ad os uſque penetraret. Decisâ eſcharâ ulcus ad cicatricem perductum eſt, & æger a tanto malo liberatus.

## OBSERVATIO IV.

*Hydrops.*

**I**dem calceorum inſtaurator, poſt biennium à prædictâ curatione incidit in hydropem aſcitem, quo cum à ſex menſibus detineretur, & umbilicus promineret ad magnitudinem ovi gallinæ, paracenteſis facta in medio exomphalos, & aquâ per partes educâ, admota cannula ex aurichalco confecta, in cujus extremo lamina erat lata, ne in ventrem mergeretur, foraminibus utrinque pervia ut alligari poſſet. Deinde dicta lamina veſte ſeu ſtriato clavo claudabatur, & ita curatus fuit.

In hac operatione advertendum, ne hydropici aperiantur, niſi exomphalos appareat, quaſi naturâ viam illam ad excluſionem aquarum affectante. Alioqui omnes qui aperiantur, non prominente umbilico, intereunt. Hæc autem umbilici prominentia arte procurari poſteſt admotis frequenter umbilico cucurbitulis ficcis, cum multa flamma, tum etiam fomentis emollientibus & attrahentibus, quæ intra octiduum plus minus uſurpata, prominentiam faciunt, in qua apertio adminiſtrari poſteſt.

## OBSERVATIO V.

*Alius hydrops.*

**M**ulier quædam 25. annos nata, paupercula, hydrope laborabat. Vetula quædam ei conſuluit, ut offa cujuſlibet animalis ſub dio exſiccata ſumeret, & in pulverem reduceret, ejuſque 3. j. ſumeret per menſem integrum cum vino albo, ſucco petroſellini permixto. Ille autem ſuccus ita extrahebatur: ſumebat fol. petroſellini m. j. quem linteo involutum decoquebat ſub cineribus calidis, & deinde contundebat in mortario marmoreo, ſenſim affundendo vini albi q. ſ. exprimebat ſuccum, & vinum ad cyathi quantitatem, & in eo offa pulverata diſſolvebat, & quotidie manè ſumebat per dictum tempus, quo elapſo integrè curata remanſit.

## OBSERVATIO VI.

*Hydrocephalos.*

**I**nſans recenter in lucem editus, hydrocephalo laborabat, & totum caput occupante, cum magna ſuturarum dilatatione. Ego ſine ullo medicamento, aut alio remedio hunc affectum curavi ſola ſcizia Guidonis, in formam cucuphæ concinnata, qua totum caput obvolvebatur duabus extremitatibus in globulo obvolutis, quæ Gallicè (capeline de Guidon) nominatur, quotidie dicta ſcizia renovabatur, & intra quindecim aut viginti dies tumor prorsus evanuit.

## OBSERVATIO VII.

*Hydrops.*

**A**ccepi à teſtibus fide dignis duas mulieres hydropicas ſanatas fuiſſe, unguibus pedum ita arctè præciſis, ut carnis vel cutis portiuncula raderetur, & aliquid ſanguinis emanaret, quem ſequabatur ſeroſi humoris inſtillatio per multos dies, & ſic paulatim totus humor abdomine contentus educebatur.

## OBSERVATIO VIII.

*Vulnus capitis cum contuſione.*

**Q**uædam mulier ex lapſu trabis in verticem, grave vulnus accepit cum contuſione; unde paucis diebus  
*Lazarii Riverii Opera.*

ſaccus apparuit in parte inferiore ſupra os parietale, magnitudinis quatuor digitorum tranſverſorum. Volui ipſe ſaccum ſeu abſceſſum aperire in parte declivi, quod ægra pertinaciter renuit. Prædicta igitur ſcizia (capellinaire dicta) & ſplenio denſo emplaſtrato, ut firmius hæreret, ſupra abſceſſum admoto, facta fuit expreſſio materiæ ad vulnus, quod ſuperiorem partem occupabat, ac deinde glutinatio; unde curatio integra feliciter ſubſequuta eſt.

## OBSERVATIO IX.

*Abſceſſus in ſterno.*

**Q**uidam Medicinæ Studioſus phlegmonem paſſus eſt in ſterno inſignis magnitudinis, quæ volæ manus magnitudinem æquabat, ea ſuppurata, abſceſſus apertus fuit imperitiâ alterius Chirurgi in parte ſuperiori. Vocatus ego abſceſſum iterum aperire volui in parte declivi; quod æger ferre noluit: admoto igitur ſplenio denſo emplaſtrato, eoque ſcizia firmiter alligato, totum pus ad locum apertum expulſum eſt, & vulnus hoc modo consolidatum.

## OBSERVATIO X.

*Ulcus ſinuofum.*

**A**doleſcens 18. annos natus, à quatuor menſibus ulcus ſinuofum habebat in crure dextro, inter inguen & iſchium; oriſcium erat ſuperius, ſinus verò dorſum ferrebat uſque ad medium femur. Noluit etiam dictus æger apertionem ſuſtinere in parte inferiori, quæ neceſſaria videbatur. Ergo neceſſitate coactus, poſt injectiones detergentes ſæpe repetitas, ſplenium admovi valdè ſpiſſum, & emplaſtratum, ut firmiter hæreret; & inducâ ſcizia ſpirali, quæ à parte inferiori ad ſuperiorem tendebat, uſque ad oriſcium ulceris, quod apertum ſervabatur, ulcus illud ſinuofum intra menſem conglutinatum eſt.

## OBSERVATIO XI.

*Subeth puerorum.*

**F**ilia D. Ludovici civis Monſpelienſis, octo annos nata, comate, ſeu Subeth Avicennæ, detinebatur, cum convuſionibus frequentibus, cui Medici multa remedia adhibuerant: clyſteres nempe, frictions, cucurbitulas, veſicatoria, ſternutatoria, & ſimilia. Ego vitrioli albi 3. j. cum juſculo exhibui, & vomitu excitato illico liberata eſt.

Filius cujuſdam hortulani quinque vel ſex annos natus, eodem affectu cum convuſionibus detinebatur, cui exhibui aquæ benedictæ Rulandi ʒ. ſ. unde ſupra & infra purgatus eſt, & ab affectu liberatus.

Filia magiſtri de la Croix mercatoris, annicula, eodem affectu laborans, ſine convuſionibus, ſumpſit ſucci ceparum, olei communis ana cochlear unum, ſimul mixta, quibus vomitus fuit excitatus, & ægra ab affectu liberata.

Filia Magiſtri Morandi aurifabri, quatuor annos nata, eodem remedio ab eodem affectu liberata eſt.

## OBSERVATIO XII.

*Febris tertiana & lumbrici.*

**Q**uidam civis Monſpelienſis, 30. annos natus febre tertianâ laborans, ſumpſit aquæ benedictæ, ʒ. j. & à febre curatus eſt, & operatione hujus medicamenti latum lumbricum excrevit ſeptem pedum longitudinem æquantem.

## OBSERVATIO XIII.

*Globulus plumbeus vulnere ſclopæti calcaneo infixus.*

**Q**uidam miles vulnus acceperat in tibia, quod inferius deſcendebat uſque ad calcaneum, cujus ſubſtantiam  
Cccc 2 tiam



etiam globulus infixus fuerat, ibique hærebat. Non curatum fuit ulcus, sed fistulosum evasit, & in eo statu per septennium permansit. Tandem se mihi curandum commisit. Ego verò specillum in ulcus dimittens, in ipsius offis cavitate, contactu globulum inveni. Tum locum metiens cum specillo, quod sex digitorum transversorum latitudine ulcus ingrediebatur à directo loci, in quo erat globulus, magnum causticum admovi, quod cum ad os usque non pervenisset, escharâ ablatâ, aliud causticum denudò apposui, cujus operatio ad calcaneum usque pervenit, eoque denudato, trepano calcaneum aperui, & in eo latentem globulum inveni, & extraxi, ac brevi postmodum tempore ulcus sanatum est.

## OBSERVATIO XIV.

*Cranii depressio ex vulnere.*

**M** Agistri Strinc, civis Monspeliensis filia 18. menses nata, per scalas cecidit, & capite illiso in lapidem, facta fuit cranii depressio in futuram sagittalem & coronalem, magnitudinis dimidiæ nucis. Ad quam vocatus, raso capillitio parti cucurbitulam admovi sine scarificatione, & consequenter iterum admovi cum scarificatione: Postea applicui cataplasma ex fursure, & pane cum rosis & vino compositum, idque iteravi bis in die per quinque vel sex dies, iterando cucurbitulæ applicationem sine scarificatione ante singulas admotiones cataplasmatum: deinde per quatuor aut quinque dies, solum cataplasma adinovendo. Tumor à cucurbitula excitatus discussus est, & depressio sublata apparuit, atque os ad suum naturalem locum, & consuetam convexitatem restitutum.

## OBSERVATIO XV.

*Enterocoele.*

**M**ultos curavi tum viros, tum foeminas enterocoele laborantes, quorum nonnullis à tribus aut quatuor diebus intestinum extra peritonæum exierat: ita ut etiam ad iliacam passionem, quam miserere mei vulgò vocant, pervenerint, idque sequenti methodo: Mensam vel asserem satis latum juxta lectum ita dispono, ut una illius extremitas pavimentum attingat, altera verò lecto innitatur, Deinde ægrum supra asserem subjectis pulvinaribus tali situ colloco, ut caput ad pavimentum, crura verò ad lectum vergant. Mox linteis quadruplicatis in aqua frigida maceratis, diu partem foveo, eam interim digitis leniter contrectando, & fotu per mediam horam continuato, linteam multiplex ad triangularem figuram efformatum, & aqua frigida imbutum applico, superinducta ligatura contentiva, & sic intra paucas horas, ut plurimum, intestinum sponte reponitur: Quod si post primum fotum & sequentem lintei applicationem, intestinum non reponatur, eandem operationem repeto bis in die, & secunda aut tertia iteratione affectus curatur.

In quibusdam autem seriùs vocatus, cum intestinum esset inflammatum, ut præ tumore angustum ruptionis peritonæi foramen denudò ingredi non posset, dilatato illo foramine per incisionem, tres ægrotos à propinqua morte liberavi. Hanc autem operationem hac methodo perfeci. Primò ægrum colloco, ut pro repositione dictum est, & præterea artus probè alligantur, ne in operatione sese commovere possit. Postmodum lineam transversalem duco cum atramento, supra lineam strangulationis intestini, ubi est ruptura peritonæi. Deinde alteram lineam duco perpendiculariter supra dictam secantem juxta ipsum locum strangulationis, & in medio ipsius: Postmodum autem duobus digitis utrinque adduco secundam lineam transversalem, eamque novacula incido secundum perpendicularem, ita ut incisio sua longitudine duorum digitorum transversorum latitudinem æquet. Postmodum muscoli rupturam regentes hamulis sensim eleventur, & scalpello separantur, donec productio peritonæi detegatur. Eaque detecta hamulo elevatur, eodemque scalpello inciditur, & hoc modo intestinum reponitur. Quod si intestinum ab inflammatione, aut flatibus ita intumuerit, ut in abdomen pro-

trudi nequeat, apertio jam facta amplificari poterit, immisso in vulnus cathetere cannulato, supra quod linthotomia solet fieri, & supra ipsum, abdomine forcipibus inciso in parte superiori, aut inferiori, prout à Chirurgo melius visum fuerit.

In hac operatione hoc notatu dignissimum in muliere quadam observavi, quam prædicta operatione curavi, quod nimirum aperto abdomine intestinum quod tredecim annis extra peritonæum exierat, & in inguine perpetuum tumorem efficiebat, carnea veluti fascia contectum apparuit, quæ dictum intestinum ambiebat, & à parte inferiori juxta rupturam continuò accrescens, tandem intestinum in ea parte adeo coarctaverat, ut excrementa præterlabi non possent, unde mulier in iliacam passionem inciderat, quæ operationi locum dedit.

## OBSERVATIO XVI.

*Ganglion in facie supra zygoma.*

**J**uvenis quædam mulier ganglion habebat in facie, cerasi magnitudinem æquans, infra oculum, supra zygoma, quod intra mensem discussum est, admotâ lamina plumbea hydrargyro illitâ, & emplastro infixa, ut melius hæreret; eaque supra ganglion admota, unâ cum emplastro splenium satis solidum superimponebam, deinde fasciâ alligabam, quæ semiphalera à Galeno nominatur.

## OBSERVATIO XVII.

*Anchylops.*

**M**ulier quadragenaria tumorem habebat in majori oculi cantho, qui Anchylops nominatur: hunc sustuli admoto caustici granulo, & decisâ escharâ ulcus curavi tantillo mercurii præcipitati rubri, cum alumine usto ea proportionem, ut dupla sit quantitas mercurii, & simplex aluminis: pulvis iste exceptus unguento aureo, ulceri admovebatur, donec novâ inducta escharâ ad lentis magnitudinem, eaque decisâ os detectum fuerit, quod cum illæsum appareret, ulcus confestim carne implendum procuravi admotis linteis detritis, & bis in die immutatis, sicque affectus integrè curatus est.

## OBSERVATIO XVIII.

*Alvi constrictio lethalis.*

**Q**uidam sutor per mensem aut ultra fæces alvi non excreverat, & multis clysteribus, ac potionibus purgantibus frustra usurpatis, tandem interiit. Aperto cadavere, omnia intestina inventa sunt fæcibus, aut alimentis vel potulentis omnino repleta, instar sanguiculorum, vulgo (Boudins) quod judicatum fuit à facultate intestinorum expultrice abolita provenisse.

## OBSERVATIO XIX.

*Fractura cranii in tempore sinistro.*

**M**ulier quadam vulnus accepit in tempore sinistro ex ictu lapidis, quæ cum statim ab accepto vulnere in juvenis Chirurgi manus venisset, ille gravitate vulneris perterritus me vocavit: Ego verò cognita fractura & admotionem trepani necessariam esse judicans, non dubitavi incisionem crucialem efficere supra crotaphitam, qua os fractum detectum est, & effractio reperta, in qua frustulum cranii, nuclei amygdalini magnitudinem æquans, omnino separatum, ad duram matrem depressum, & sub cranio latitans visibatur. At trepano ritè administrato, portio illa cranii extracta est, & vulnus feliciter curatum, neque ullum grave symptoma ex incisione crotaphitæ exortum est.

OBSER-



## OBSERVATIO XX.

*Cancer.*

**Q**Uædam mulier quinquagenaria laborabat cancro in mamma sinistra, ulcerari incipiente, juvenis Chirurgus extraneus sequens remedium admovit.

℥. Aquæ fortis ʒ. j. sublimati crudi ꝛ. iv. salis ammoniaci ʒ. ij. arsenici ʒ. j. ponantur omnia in alembico & distillantur ad siccitatem, addendo acetum distillatum par pulveri pondus, distilletur iterum acetum, donec materia ad pastam consistentiam redeat.

Primo cancerum diligenter abluebat vino calente, cum linteis eo imbutis, & fortiter fricabat, ut pars irritaretur, deinde extendebat pastam supra plumaceolum sextuplo minorem ipso tumore, quod remedium supra partem relinquebat per 24. horas, & fiebat eschara plumaceolo sextuplo major; ita ut cancerum omnino absumeret, & decisa eschara ulcus carne implebatur, & ad cicatricem perducebatur. Quod si dicta eschara tumorem universum non abstulisset, sed quædam illius radices subsisterent; illas absumebat pulvere præcipitati rubri, cum alumine usto permixti.

Ad ulcus verò carne implendum, linteis tantum detritis utebatur.

Hoc autem notatu dignissimum est, quod admoto parti medicamento febris accendebatur, vomitus & alvi fluxus excitabatur, & urinæ fluxus provocabatur, quæ symptomata per biduum, aut triduum perseverabant, natura irritata à venenati medicamenti deleteria qualitate.

Eodem remedio cancer in nasi extremitate obortus, qui nasi apicem exederat, in quodam milite curatus fuit.

## OBSERVATIO XXI.

*Alia cancri curatio.*

**V**etula quædam mulier cancrum habebat in mamma sinistra, quem per tredecim annos gestaverat, in quo exigui tumores carnosus adnascabantur, qui multò acerbiores dolores excitabant, propterea quod exulcerati fuerant, quam tota cancri ipsius moles, qui tamen exigui tumores sublatis sunt frequenti applicatione aquarum papaver. rhoead. plantag. & rosar. cum melle ros. permixtarum, ab initio deinde solis aquis admotis. In altera etiam muliere ulcus cancrosum patiente in mamma, idem remedium ulcus protinus sustulit, & ad cicatricem perduxit.

## OBSERVATIO XXII.

*Gangræna in vulva.*

**M**ulier 30. annos nata, ex partu laborioso, & laceratione labiorum vulvæ, ingentem tumorem contraxerat in labio dextro, ex affluxu sanguinis in eam partem, quod malum cum neglexisset per tres aut quatuor dies tandem gangræna in parte introducta est. Vocatus tunc temporis, profundas & magnas incisiones feci in parte interiori vulvæ deinde in ipsas incisiones manum immittebam, eaque thrombos sanguinis quamplurimos extrahebam ad ℥. j. β. quantitatem. Postmodum vino, sale, melle, & aceto simul mixtis partem abluebam calidissime, & linteis fovebam, deinde novas incisiones efficiebam, & denuò abluebam, atque fovebam. Post modum portiones tunicæ interioris corruptas refecabam, atque iterum resionibus & fotibus, donec nullus foetor in parte apparuerit & omnes particule corruptæ ablatae fuerint. Ac deinceps foci prædicti diu noctuque continuati sunt per duos aut tres dies, quibus elapsis ægyptiacum cum aureo mixtum parti admotum fuit, & tandem aqua vulneraria ulcus ad cicatricem perductum est.

Eadem methodo civis quidam Monspeliensis à testiculi gangræna liberatus est.

## OBSERVATIO XXIII.

*Alia gangræna in pede.*

**N**obilis mulier ex morbo diuturno gangrænam contraxit in pede, quæ cum esset adhuc incipiens protinus sublata est fotu diuturno cum decocto vulnerario ex aristoloch. rotund. rhapontico, zedoaria, myrihâ, aloë & vino albo parato, cui addebatur post decoctionem & colaturam aqua vitæ, in qua camphora dissoluta fuerat.

## OBSERVATIO XXIV.

*Alia gangræna in tibia.*

**V**ir quidam nobilis gangrænam patiebatur in tibia quæ eo processerat, ut medici & Chirurgi partem amputare decreverint, quod ad sequentem diem distulissent. Post eorum discessum, adductus fuit empiricus, qui gangrænae curationem pollicitus est, & cum æger se illi commississet, per totam noctem partem affectam fovit aqua in qua calx & creta alba decoctæ fuerant, & maturinis horis gangræna apparuit protinus ablata.

## OBSERVATIO XXV.

*Lupia.*

**F**ilius Magistri Malafosse Mercatoris Monspeliensis lupiam magnam habebat pugni majoris magnitudinem æquantem juxta spinam dorsum sub omoplata, quæ hac methodo curata fuit. Instrumentum comparavi ex fraxino vel quercu, aut alio ligno densiori ad exiguæ molæ figuram efformato, quali pictores colores in marmore conterere soliti sunt, eoque lupiam confricabam & conterebam bis in die per dimidiæ horæ spatium: deinde cataplasma emolliens suppurans valdè calidum admovebam idque continuando per quatuor aut quinque dies, lupia in suppuratum abiit, eaque aperta pus effluxit liquidum, ac deinceps tota materia in lupia contenta, in pus conversa, evacuata est, & ulcus ad cicatricem perductum: attritione prædicta instrumento ligneo facta, cystis lupiæ rumpitur & materia contenta attenuatur, atque in particulas dividitur, ut facilius concoqui valeat. Loco cataplasmati panis calens è furno per medium sectus utiliter adhiberi potest.

Hoc idem remedium in pluribus aliis eundem effectum protulit.

## OBSERVATIO XXVI.

*Lues venerea in puello nuper in lucem edito.*

**M**ulier lue venerea infecta, puellum peperit, pustulis, & ulceribus in variis partibus affectum, qui curatus fuit præcipitato albo ad grana duo vel tria exhibitum, cum saccharo & lacte, singulis vel alternis diebus continuando per mensem integrum, & incepta est remedii exhibitio, decimo quinto nativitatis die.

## OBSERVATIO XXVII.

*Renes purulenti.*

**P**uella 18. annos nata purulentas urinas reddiderat per longum tempus, & febre diuturna, lentâ, hecticaque detinebatur, ac tandem interiit. Aperto cadavere, renes inventi sunt in pus omnino conversi, ita ut eorum tunica pure omnino referta fuerit, nullis apparentibus parenchymatis reliquiis.

## OBSERVATIO XXVIII.

*Macula in cornea.*

**Q**Uædam mulier infimæ sortis maculam habebat in oculo, cui consilium dedi, ut bis in die succi rutæ

Cccc 3

guttam



guttam unicam in oculum instillaret, quod cum satis diu continuasset, macula protinus absumpta est.

## OBSERVATIO XXIX.

*Gutta Serena.*

**J**uvenis mulier in guttam serenam inciderat, quâ ita afflicta fuit, ut cibi abstinentia sibi mortem inferre decreverit, cum tamen maritus, & adstantes aliquod jusculi aut vini sorbere per vim cogerent, & illa perexiguum fumeret omnia quantum poterat, respuendo. In eo statu per annum integrum perseveravit, & ad extremam maciem perducta est, calore nativo, defectu pabuli, humidum substantificum depopulante: cum eo verò omnis simul corporis humiditas, tum ipsa materia, guttam serenam efficiens absumpta est; & sic ægra visum recuperavit, ac postmodum sensim victu analeptico refecta est.

## OBSERVATIO XXX.

*Crura vara.*

**S**æpe pueri in ætate duorum annorum, cum progredi incipiunt, vari esse consueverunt, de quo matres sollicitæ auxilium quærent à chirurgis, qui plerumque variis machinis tibias & crura erigere conantur, sed frustra, quia, sponte naturæ ut plurimum circa ætatem trium aut quatuor annorum, tibie & musculi firmanentur, & partes ad naturalem statum redeunt.

## OBSERVATIO XXXI.

*Cephalæa & hemisrania.*

**I**n dolore hemisranico à causa calida oriundo, & in dolore illo qui à Gordonio clavus nominatur, est dolor fixus in temporibus, arteriotomia mirifice prodest, quam tuò celebravi in plurimis, vulnus alligando simplici splenio ex linteo complicato confecto, & aqua frigida madefacto, ut in vulgari phlebotomia, fascia superinducta, quæ à Galeno lepus sine auribus nominatur, neque ulla unquam sequuta est hæmorrhagiâ. Item vidi cephalæam diurnam curatam fuisse in Nosocomio admoto caustico potentiali, super arteriam temporalem; Decisâ enim escharâ cauterii potentialis super venas & arterias admoti, nullus sanguinis fluxus emergit, quia provida natura, dum escharæ separationem molitur, simul novam carnem generat, quâ venarum oscula teguntur. Ad id verò, quod objiciebatur, magnas hæmorrhagias, quæ in vulneribus cauterio actuali vel cathæreticis medicamentis cohibentur, sæpe iterum renovari, cum eschara decidit: Respondeo, escharas illas tenuiores esse, & citius excidere, idè non intercedere sufficiens temporis spatium ad novam carnem regnendam, escharas verò à potentiali cauterio inductas, crassiores, ac solidiores esse, non nisi longiori tempore excidere, sicque in eo spatio carnem sufficientem generari ad occlusionem venarum.

## OBSERVATIO XXXII.

*Mania.*

**Q**uidam adolescens maniacus, ad cujus curationem potentissima remedia usurpata fuerant, ita ut ventum fuerit ad usum Antimonii, trepanum, & arteriotomiam temporum. Cum hæc omnia nihil conferrent, castrationem consului, qua usurpata, remissa fuere omnia symptomata & feror omnino cessavit, manente tamen delirio melancholico, ita ut mania in melancholiam versa fuerit.

## OBSERVATIO XXXIII.

*Ischuria.*

**E**fficax remedium ad ischuriam expertus sum in tribus ægrotantibus, ex cerebro picæ exsiccato, & cum vino albo propinato, intra horam fluxus urinæ promovetur.

## OBSERVATIO XXXIV.

*Verrucæ.*

**I**ntra septem vel octo dies curantur portulaca confusa, eaque pars confricatur, deinde instar cataplasmatibus admovetur, iterando bis in die.

## OBSERVATIO XXXV.

*Clavi pedum.*

**A**bscindantur clavi decrescente luna, pedibus aliquandiu primum aquâ calida lotis, deinde admoveantur folia hederæ confusa, & singulis diebus iteretur remedium manè & serò, intra quindecim dies clavus extrahitur. Unde colligere est attractivam vim hederæ inesse potentissimam.

## OBSERVATIO XXXVI.

*Ambusta.*

**E**adem hedera ambustis medetur, si folia illius in aqua decocta applicentur.

## OBSERVATIO XXXVII.

*Pestis.*

**C**um pestis sævissima grassaretur Monspelii anno 1630. duos ægrotantes, cum peste correpti essent, ad me miserunt, ut quid acturi essent, præciperem. Ego in memoriam revocans, me legisse apud Pareum, muriam encraticolorum piscium, qui vulgo (Anchoës) nominantur, nonnullos peste infectos liberasse: Consilium dedi ut eadem fumerent, unus muriam scutellam sumpsit solam, alter cum urina permixtam & uterque liberatus est oborta vaccinatione vehementi per vomitum & secessum.

## OBSERVATIO XXXVIII.

*Alia pestis curatio.*

**I**n eadem peste tres ejusdem familiæ, Maritus nempe, uxor & soror illius peste correpti sunt, stercus proprium cum propria urina dissolutum, & linteo colatum hauserunt, unde gravissimus vomitus, & alvi fluxus abortus est, & omnes à peste immunes evaserunt: similis quodammodo historia habetur apud Zacutum Lusit. obs. 89. lib. 3. ubi narrat in provincia Occidentali animal quoddam esse parvum instar lacertæ, in agris frequentissimum, Garit nominatum, cujus morsus omnino lethalis est, nisi ægri stercus humanum assumant, quod unicum est illius alexipharmacum. Aliis tamen vomitoriis multos à peste liberari constat.

## OBSERVATIO XXXIX.

*Dolor arthriticus.*

**C**itissime sedatur, fovendo partem aqua foliorum fraxini destillata in alembico plumbeo, quo vulgus rosas instillare solet.

## OBSERVATIO XL.

*Dentium dolor.*

**I**n finitos à dolore dentium liberavi, denti corroso admovendo tantillum gossipii, oleo buxi imbuti. Illud autem oleum extrahitur per retortam igne reverberii, scobem illius prius infundendo per 24. horas in vino albo, & omnia simul destillando, primum egreditur aqua acida, quæ etiam



etiam ad eundem affectum confert, simplici ablutione dentis, mox egreditur oleum usui diligenter observandum.

Hoc etiam remedio feliciter usus sum.

℞. Sem. plantag. ℥. ij. tormentillæ. ℥. iij. rad. hyosciami albi ℥. iv. omnia exsiccata redigantur in pulverem subtilissimum, addendo opii granum unum, includantur nodulis, qui macerentur in decocto sequenti.

℞. Flor. sambuci m. i. rosar. rub. P. ij. bulliant in aceto ad usum dictum.

Hi noduli in dicto decocto macerati, intra dentes leviter comprimuntur & detinentur, & intra exiguum temporis spatium multus humor effluit & dolor aufertur.

## OBSERVATIO XLI.

*Lues venerea.*

**H**enricus tertius Gallorum Rex lue venerea laborans, à Medicis ordinariis curari non potuerat. Monitus fuit Penam tunc temporis Lutetiæ Medicinam facientem, multos ab hoc morbo liberare remedio peculiari, quod à quodam Turca didicerat: illum vocari iussit, ab eoque curatus est. Hoc autem remedium tale erat.

℞. Radic. bardanæ in taleolas sectæ ℥. viij. vini albi & aquæ font. ana. ℔. ij. bulliant ad mediæ partis consumptionem, addendo sub finem sennæ mundat. ℥. j. vel ℥. j. ℔. pro dispositione ægrotantis, colaturæ capiat mane ℔. ℔. sudores provocando cum filicibus majoribus calidis linteis obvolutis, quorum unus admoveatur plantis pedum, duo tibiis juxta peronem, duo cruribus juxta medium parti exteriori, & duo juxta humeros, probè tegendo ægrum, sudores copiosi excitantur per horam unam cum dimidia, & circa vesperam alvus solvitur bis aut ter.

Hoc remedium usurpabatur præmissis universalibus per spatium 15. aut 20. dierum, & interim pro potu ordinario utebatur decocto chinæ, vel falsæ parillæ, cum victu in diætis consueto.

Post horum remediorum usum, capiebat mane singulis diebus decoctum bardanæ sine sennæ, & sine ullo alio regimine, per mensem integrum, aut etiam per quadraginta dies.

## OBSERVATIO XLII.

*Ischuria.*

**P**armacopæus Parisiensis, nomine Lafoxilliere, ischuria laborans, post multa remedia per quatuor dies frustra usurpata sequens sibi ipsi composuit, à quo urina provocata est, & liberatus fuit.

℞. Vini albi canarini ℥. iv. succi limonum ℥. j. spiritus terebinthinæ ℥. ij. pro uno haustu.

## OBSERVATIO XLIII.

*Hæmorrhoides internæ.*

**D**ictus Lafoxilliere hæmorrhoides internas felicissimo cum successu curabat; injiciendo primùm cum syringa decoctum sequens.

℞. Cortic. mediani ulmi ℥. ij. rad. tapfi barbati ℥. ℔. aquæ fluminis ℔. iv. coquantur ad medias, & colentur ad usum.

Post injectionem, immittatur in anum pilula ex antimonio crudo lythargiro auri, subtilissimè pulveratis, & unguento rosaceo exceptis.

Immisa pilula in anum, illius ambitus unguento sequenti illinatur.

℞. Succorum sempervivi majoris, plantag. tapfi barbati, solani ana ℥. iv. axungia porci ℔. j. coquantur ad succorum consumpt. in linteo exprimantur, & refrigeratis adde pulveris cancrorum fluviatilium in furno exsiccatum ℥. ℔. tapfi barbati, pulverati, & pulv. concharum mytulorum ana ℥. ij. fiat unguentum: continentur hæc remedia manè & serò per octiduum.

## OBSERVATIO XLIV.

*Dolores universales.*

**Q**uidam vir quadragenarius doloribus universalibus torquebatur, qui multis remediis à Medicis præscriptis non cesserant; tandem mulierculæ consilio foliis alni in duobus saccis majoribus conclusis, & in furno calefactis, post extractionem panis, totum corpus in lecto contextum est, & undique obvolutum, unde sudores copiosi excitati, & remedio ter iterato, à doloribus omnino liberatus fuit.

## OBSERVATIO XLV.

*Parulis cancrofa.*

**A**ncilla quædam 25. annos nata, tumorem durum in gingiva superiori, supra caninum dentem patiebatur magnitudinis dimidiæ nucis, quæ bis amputata fuerat novacula, deinde candente ferro cauterizata. Semper rediit affectus, & post secundam operationem, manente ulcere & tumore, integrè à me curata fuit admotione mercurii præcipitati rubri cum alumine usso permixti, quo plumaceolum saliva madefactum inspergebam, vel unguento apostolorum perni iscebam, & iteratâ singulis diebus applicatione, intra sex septimanas probè curata est absumptoque penitus tumore, per catharticum remedium carnis regeneratio procurata est linteis detritis, admovendo ossi denudato pulverem catagmaticum Guidonis; & sic ulcus ad cicatricem perductum est.

## OBSERVATIO XLVI.

*Excrecentia carnea in faucibus.*

**Q**uidam sartor Monspelienfis, cum pisces comedendo, spina satis insignis faucibus infixæ esset, eam extrahendo, sibi fauces laniavit, unde temporis progressu exorta est paulatim excrecentia carnea in faucibus juxta uvulam, nucis magnitudinem superans, ad cujus curationem Empyricum vocavit: qui cauterio actuali frequenter admoto, tumorem absumpsit: sed cum ulcus ad cicatricem non perduxisset, tumor iterùm rediit, alterum Empyricum vocavit, qui oleo vitrioli frequenter admoto, tumorem iterùm absumpsit & ad perfectam cicatricem perduxit.

## OBSERVATIO XLVII.

*Gonorrhœa.*

**C**onservâ fructus brusci à ℥. ij. ad ℥. ℔. per aliquot dies exhibita gonorrhœas multas curavi. Idem præstat aqua ejusdem fructus destillata.

## OBSERVATIO XLVIII.

*Ensis portio insignis, in vulnere diu latens, extracta.*

**D**N. de Suellies in singulari certamine vulnus acceperat in humero supra omoplatam, quod à parte superiori ad inferiorem descendebat, & ensis portio in eo remanserat, ad pedis longitudinem; quod cum ignoraret Chirurgus, vulnus ad cicatricem duxit, manente ensis cuspe, quæ inter omoplatam & musculos eam contegentes latitabat: in eo statu permansit per septennium integrum dolores in ea parte frequenter patiens. Tandem natura ferrum propellente versus partem superiorem, juxta cicatricem vulneris, elevatio quædam apparuit cum dolore, cui admotum fuit causticum, & incisa eschara, ferri extremitas apparuit, quæ rostro grui apprehensa, faciliè extracta est, rubigine contexta.

OBSER-



## OBSERVATIO XLIX.

*Tumores strumosi in digitis.*

**F**ilia magistri Duseigneur Aurifabri, decem annos nata, patiebatur tumores duros & strumosos in tribus digitis qui curati fuerunt suffitu aceti supra filices candentes coniecti, manè & serò, per mentem integrum continuato, quod remedium à Galeno miris laudibus effertur ad tumores scirrhusos discutiendos.

## OBSERVATIO L.

*Visus imminutio in sen.*

**S**enex quidam à fluxione in oculos decumbente, incidit in tantam visus imminutionem, ut solus in via incedere non posset, à quo affectu liberatus est, visumque recuperavit, immittendo in oculos singulis noctibus in introitu lecti seminis hormini majoris grana quinque vel sex, à quibus humores pituitosi ab oculis extrahebantur, & cornea tunica abstergebatur.

## OBSERVATIO LI.

*Lues venerea in puero quinque annorum.*

**C**urata à me fuit præcipitato albo ad grana quatuor exhibito singulis diebus per viginti dies cum panatella. Per inferiora tantum purgabat, neque ullus unquam sequutus est pyralismus.

\*\*\*\*\*

## OBSERVATIONES

Communicata à D. Petro Estavove, Chirurgo Monspeliensi peritissimo.

## OBSERVATIO I.

*Vulnus in pectore.*

**Q**UIDAM miles hastâ confossus est in parte thoracis anteriori, vulnere ad illius capacitatem penetrante. Intra duas horas ab accepto vulnere, universus corporis truncus una cum scroto utris instar inflatus est, quæ tamen inflatio fursure torrefacto, & calente variis sacculis incluso, facile discussa est.

## OBSERVATIO II.

*Abscessus in Abdomine.*

**P**uer quidam tumore ventris laborans, hydropicus censebatur, & cum umbilicus valde prominere, apertio tandem facta est, ex qua puris laudabilis octo vel decem libræ profluxere, sicque omnino æger curatus est: advertant tyrones in pueris frequenter tales abdominis abscessus generari, qui hydropem mentiuntur; & si maturè à perito artifice aperiantur, ægros à certo interitu plerumque liberari.

## OBSERVATIO III.

*Alter abscessus in abdomine.*

**P**uella quædam ventris tumorem patiebatur ab octo mensium spatio, cum doloribus assiduis, quibus ad extremam maciem perducta fuerat: hydropica ab omnibus censebatur. Ego verò ad eam vocatus, & ventrem diligenter explorans, abscessum latentem invenio intra musculos hypogastrii, eumque caustico potenciali aperio, unde quindecim, aut viginti libræ puris laudabilis effluxere intra plures dies, sicque ægra perfectè curata est.

## OBSERVATIO IV.

*Tumor Scroti.*

**F**Amulus Domini Richardi in Suprema Computorum curia consiliarii, cum ab equi calcitracione percussus esset in regione ventris inferioris, quatuor horarum spatio tumor in scroto obortus, capitis infantis magnitudinem æquans, & lividitate infectus, qui præmissa venæ sectione discussus est intra decem dies, cataplasmate ex farinis hordei & fabarum, semine cumini, floribus chamomil. melilot. & rosar. pulveratis, & cum oxymelite decoctis.

Vir quidam enitè confossus in regione lumborum, similem tumorem passus est, qui eodem cataplasmate, intra idem tempus discussus est.

## OBSERVATIO V.

*Lapis sub lingua.*

**V**ir quidam quadragenarius, graves & frequentes, in fauces, & tonsillas fluxiones patiebatur. Tandem animadversum est, lapillum sub lingua concretum fuisse, qui facile extractus est ægerque ab eo tempore fluxionibus prædictis vexatus non fuit.

## OBSERVATIO VI.

*Cornu in facie enatum.*

**C**uidam vetulæ supra zygoma corpus durum & callosum enatum est, duorum digitorum transversorum longitudinem æquans, materiâ & figurâ cornu omnino referens, latum in basi, & acutum in cuspide, quod successu temporis sponte cecidit, & illius loco cancer obortus est.

\*\*\*\*\*

## OBSERVATIONES

Communicata à D. Dionysio Pomaret Chirurgo Monspeliensi peritissimo.

## OBSERVATIO I.

*Tumor suppuratus resolutione curatus.*

**M**ARIA Pomareta filia mea octo annos nata, tumorem phlegmonosum, & œdematosum satis exiguum passa est in parte externa mandibulæ inferioris dextræ quæ ad suppurationem venit. Ego verò metuens ne cicatrice facies scedaretur, antequam ad abscessus apertionem venirem, resolutionem prius tentare decrevi, Guidonis authoritati innixus, qui in sermone generali de apostematis dicit aliquando apostemata suppurata, resolutione finiri: quod etiam solempni Paræi experimento confirmatur, qui se apostema suppuratum mercurio crudo, cum emplastro diapalma subacto, per viam resolutionis curasse testatur. Ad cuius imitationem dicti mercurii 3. cum emplastri diapalma 5. j. admiscui, & tumori suppurato admovi, qui intra quatuor dies omnino resolutus est.

Ad materiam suppuratam resolutione discutiendam, sequentes conditiones necessariae sunt, 1. ut materia sit quantitate exigua, 2. ut sit tenuis & serosa, 3. ut cutem & corporis superficiem occupet, non autem partes profundas, 4. ut sit in corpore robusto, juvenili, & molles carnes habente, 5. ut tempus sit æstivum.

## OBSERVATIO II.

*Tumor œdematosus.*

**E**Adem filia mea passa est tumorem œdematosum crudum, & minimè suppuratum supra regionem lumborum magnitudinis volæ manus, qui eodem remedio intra paucos dies discussus est.

OBSER-



## OBSERVATIO III.

*Lupia.*

**F**Rater quidam Capucinus, coenobii Monspeliensis, annos natus 25. lupiam habebat in genu, quam longo tempore gestaverat, ita ut summam mollitiem tandem perducta fuerit, cuius ratione apertionem suadebam, cum materia contenta ritè concocta videretur. Ille verò renuit, inquiens se lupias huic consimiles resolutione curatas vidisse, foliis acetosæ charta madida involutis, & sub cineribus coctis, quæ postmodum cum cineribus per cribrum trajectis incorporabantur in formam cataplasmat, quod ille per plures dies calidè applicuit, & tumor prorsus evanuit, quod ego valde miratus sum, & ab eo tempore duas alias lupias in eadem parte eodem remedio curavi, quarum una detinebatur Joannes Guerinus sexagenarius, altera verò uxor Timothei Coula, fabri lignarii Monspeliensis.

## OBSERVATIO IV.

*Ecchymosis.*

**U**Xor Petri Lajardi mercatoris Monspeliensis, quinquagenaria, cum è scalis cecidisset, vulnus contusum accepit in capite, ita ut tumor ex sanguine extravasato, ecchymosis dictus, ovi gallinacei magnitudinem æquans, obortus fuerit. Post primam applicationem ex albumine ovi & oleo rosaceo compositam, & venæ sectionem celebratam, de tumoris apertione per novaculam, aut suppurationem cogitavi, juxta aph. Hippoc. 20. sect. 5. si sanguis in ventrem præter naturam effunditur, necesse est suppurari. Ad hoc concurrebant materiæ copia, ægroantis ætas, cutis capitis durities, & tempus hyemale. Cum autem ægra incisionem renuisset, ego verò suppurationis dolores, aliasque molestias evitare cuperem, resolutionem tentare per aliquot dies decrevi, licet perexigua istius spes affulgeret. Hac autem methodo usus sum. Primò partem affectam aquâ calente per mediam horam bis in die fovebam. Post forum partem novacula radebam adversis pilis, ut pori magis aperirentur, & omnes sordes parti hærentes probè abstergerentur, ac tandem oleum lilaceum cum chamomælino partibus æqualibus applicabam, superposito cotone, suffusa aromatum imbuto, & calente, sicque tumor omninò resolutus est.

## OBSERVATIO V.

*Carbunculus.*

**C**irca carbunculos, duo observavi notatu digna: unum, quod licet carbunculi febrem perpetuò soleant habere comitem, propter inflammationem ingentem, quæ in iis reperitur, ut docuit Galen. 2. ad Glauconem, his verbis: *Cum verò sanguis admodum calidus, & calidissimus in quamcunque partem confestim fluxerit, hinc exurit, ulcusque cum crusta efficit: quidquid verò circumstat, inflammationem attrahit ferventem, ac gravi dolore conflantem:* Attamen ab eo tempore, quo Chirurgiæ incumbo, tres mihi videre contigit, qui sine ulla febre, sua percurrere tempera, & sine ullo alio gravi symptomate, ita ut ægri à consuetis muneribus nunquam desisterent, unus erat in gena sinistra, alter in cervice, tertius sub palpebra inferiori oculi sinistri. Qui omnes curati fuere iidem remediis, quibus cauteria potentialia curari consueverunt, videlicet escharæ casum procurantibus.

Altera circa carbunculos observatio mea est. Quod in sævis illa peste, quæ Monspeli grassata est anno 1629. & 1630. carbunculi apparebant, signis stipati ab iis omninò diversis, quæ à Galeno, Guidone, & Neotericiis describuntur. Quod causæ fuit, ut complures Medici & Chirurgi etiam peritissimi, in illorum diagnosi in principi

*Lazari Riverii Opera.*

pio erraverint, signa autem diversa, in illis carbunculis apparentia, hæc erant. Virium dejectio, pulsus parvus, pars carbunculo affecta tumoris expers, exigua inflammatio pustulam ambiens, escharæ mollities ingens, quæ putredinis potius, quam usionis soboles erat, motus libertas in parte affecta, & gravitatis sensus carentia, qui in vulgariis carbunculis tantus est, ut pars vinculis constringi videatur.

## OBSERVATIO VI.

*Sarcoma.*

**I**Uvenis quidem, nomine Claparede, excrescentiam carneam patiebatur, sarcoma Græcis dictam; in parte interna inferiori tibie dextræ, quatuor digitis supra malleolum figuræ cylindricæ, longitudinis trium digitorum transversorum, & crassitudinis brachii infantis nuper nati. Hic tumor ab arteria nutrebat ad basin suam protensa, quæ cum admodum lata esset, ligari non poterat. Si quando æger altero pede tumorem percuteret, tanta fiebat sanguinis effusio, ut in vitæ periculum incideret. Vocato mecum in consilium D. Samuele Formio, Chirurgus seniore peritissimo, decretum fuit inter nos, extirpandum esse tumorem, & ad sanguinis effusionem impediendam, quæsita fuit arteria poplitea, eaque tactu inventa parte superiori & inferiori tibie; compositum fuit splenium durum & compactum ex linteis artè complicatis in formam cylindri, & succo urticæ imbutum, quod superinducto adstringente communi, arteriæ admotum est, secundum illius longitudinem, superinductâ fasciâ, multis circumvolutionibus illud artè constringente. Tum alia splenia toti tibie, & cruris extremitati, adstringente dicto illita, admotæ sunt cum fasciis artissimis. Nec non cauteria actualia parata habebantur ad cohibendum sanguinis profluvium, siquidem illud non obstantibus prædictis ligaturis affatim erumperet. Tali præmissis apparatu, tumorem manu sinistra apprehendi, & extrorsum attraxi, eumque manu dextrâ novaculâ munitâ, radicitus præcidi sine ulla sanguinis arterialis profusione. Mox adstringens cataplasma vulnere admovi, quod per 24. horas in parte relictum est, post cujus extractionem nulla hæmorrhagia apparuit neque deinceps. Et quia caro quædam superflua, & parum laudabilis relicta fuerat, ea blandis cathæreticis absumpta est: ulcus pus laudabile reddidit, ac tandem detergentibus, epuloticis, & cicatricem inducentibus, ad integram curationem perductum est.

## OBSERVATIO VII.

*Calculus in gutture.*

**S**acerdos sexagenarius, sanguineo temperamento præditus, gutturi inflammatione frequenter corripiebatur, præcipuè quoties canendo acrius contenderet, quæ quidem inflammatio venæsectione sedabatur, & gargarismate ex oxycrato. In postrema invasione, cum partem affectam attentius introspecerem, corpus quoddam extraneum, gutturi infixum conspicio, juxta finem mandibulæ dextræ inferioris, globulum sclopeti referens, quod à me facili negotio extractum est, & diligenter ablutum: nihil aliud fuit quàm lapis durus & compactus, ad pyri sylvestris forsitan compositus, qui cauda sua musculis masseteribus infixus erat. Ulcus rotundum & purulentum superfuit, quod œnomelite deterfum & consolidatum fuit.

## OBSERVATIO VIII.

*Vulnus sclopeti.*

**D**ominus de Roques junior, Eques cognominatus, in Salsæ obsidione vulnus ex sclopeto accepit in parte superiori & media sterni, quod obliquè ad dorsum ferebatur, & sex digitis transversis à spina dorsi exitum habebat. Statim ab inflictio vulnere dolores punctorios acutissimos in œsophago percepit, ac si spinas illi parti infi-

D d d d

xas



has haberet, & quia à sanguine suffocabatur, maximis conatibus illum nitebatur excernere; ac tandem post longos frequentesque conatus, & multam sanguinis excretionem, qua plurimas pulves impleverat, dolor œsophagi punctorius omninò desit. Post multos dies æger alvum deponendo eosdem in ano dolores punctorios percepit quos in œsophago passus erat, & digito explorans quid rei esset, corpus solidum & pungens invenit, quod sensim ex ano extraxit, altero statim excreto, priori consimili. Hæc autem corpora erant duo ossis fragmenta tenuia, lata, & depressa instar foliorum arboris, ex una parte lævia, ex altera verò aspera; in extremitatibus verò acuta & incidentia, instar aciei gladiatorum. Judicatum fuit glandem sclopeti hæc ossis fragmenta è sterno abrafisse, & in œsophagum violenter impulisse, unde dolor punctorius in œsophago sentiebatur, quamdiu ea infixæ parti adhærebant. His verò tandem post multos conatus avulsis, & in ventriculum protrusis, doloris punctorii cessatio fuit, sed post aliquot dies, fragmentis illis ad intestina devolutis, idem dolor in ano excitatus est. Fragmenta illa unguis digiti articularis latitudinem æquabant, longitudinem verò superabant.

## OBSERVATIO IX.

*Tumores strumosi.*

**R**ustica quædam mulier tumoribus strumosis quamplurimis scatens in collo, & ipso capite, ad me veniens, ostendit duo ulcera supra os petrosum, & duos tumores molles etiam in capite, unum scilicet supra os syn-cipitis dextrum, alterum verò supra os occipitis, tribus digitis transversis invicem distantes. Ulcus incisione à me apertum est, inventumque os petrosum carie affectum. Cum autem suspicaret, sub dictis tumoribus simile quippiam latitare, eos aperiendos censui caustico potentiali admoto, & decisis escharis (dictu mirum) sub utroque tumore cranii utraque tabula perforata apparuit, ac si trepano operata fuisset, foramina autem assis magnitudinem æquabant, quorum beneficio, motus cerebri facilè conspiciebatur in meningibus ipsius, supra quas aliquid puris innatabat; neque ullam, quantumvis exiguam ossis particulam invenire licuit. Post aliquot dies misella ægrotans tot mala pertæsa, sese in puteum præcipitavit.

Notanda hic est mira humoris strumas efficientis malignitas & acrimonia, quæ ossa liquare ac dissolvere valeat.

## OBSERVATIO X.

*Phrenitis.*

**Q**uidam Agricola nomine Poulet, ex febre ardente factus est Phreneticus, & in delirio ac vigiliis perpetuis, se damnatum esse, & mori velle clamabat. Hoc autem artificio à me curatus est. Votis illius annuens, dixi me eum occidere velle & cum hirudines plures fronti admotæ essent, ex quarum vulneribus cruor emanabat; novaculam ei ostendo, qua ipsi jugulum me incisurum esse dicebam, ac subinde manubrio ejusdem novaculæ jugulum violenter corrado, idque pluribus vicibus repeto. Interim novacula sanguine inficitur, qui à frontis vulnusculis emanabat; eique postmodum eam cruentam ostendens, jam occisum esse prædico; ac subinde faciem linteis contego, & fenestras occludo, ut nullus splendor in cubiculo appareret. Ille se mortuum esse putans, in motus permanet, & paulò post somno profundo corripitur, sicque à phrenitide liberatur.

## OBSERVATIO XI.

*Uteri prolapsus.*

**Q**uædam scæmina uteri prolapsum patiens, globum cereum, magnitudinis pilæ palmariæ, in uterum magna vi introduxit, eumque per decennium gestavit, à morbo prorsus libera. Quod mihi compertum fuit post

illius obitum ex dissectione cadaveris, cum ex febre continua interiisset; inventoque in utero globulo prædicto, foror ipsius asseruit eum ante decennium fuisse in uterum introductum, & continuò gestatum.

## OBSERVATIO XII.

*Anevrisma.*

**H**onestæ virgo, nomine Margareta Varfeline Villanovensis, cum sanguis ei mitteretur ab ingenio Chirurgo, Anevrisma passa est ob arteriam simul cum vena apertam, quod ab initio resolventibus medicamentis applicitis, in magnam molem excrevit. Habito consilio, decretum fuit aperiendum esse tumorem, ligata prius arteria in parte superiori, cui sententiæ ægra subscribere noluit. Sed relicto priori Chirurgo ad me venit, rogans ut topicis remediis curationem tentarem. Ego ipsi morem gerens, splenia parti admoveo, adstringente imbuta, superinducta fascia comprimente. Quibus per 10. aut 12. dies continuatis, tumor admodum imminutus est, postmodum ægra Villanovam rediit, ubi nullis remediis utens, & brachium in variis operibus exagitans, tumorem iterum suscitavit in molem ingentem, cum dolore insigni, vigiliis, inquietudinibus, febre, dolore capitis, siti, aliisque symptomatis. Qua de causa me vocavit cum V. Formio Chirurgo seniori. Censuimus tumorem esse aperiendum, contracta prius arteria spleniis fortioribus, ut supra in Claparedi operatione factum fuerat, sed ægra prorsus renuit. Post 12. dies tumor sponte apertus est in eo loco, qui venæ sectione apertus fuerat, & per foramen satis exiguum sanguis niger, liquidus, ac minime foetidus egressus est, sequentibus diebus pus laudabile, sed pauca quantitate egressum est, ac tandem ulcus ad cicatricem perductum, sicque ægra omninò curata, hoc tantum in commodo relicto, quod brachium omninò extendere non valeat, semiflexum perpetuò remanens.

## OBSERVATIO XIII.

*Colicus dolor.*

**U**xor Domini Sartrei, in Curia Computorum, Subsidiorum & Fisci Regii Consiliarii, gravissimum ventris dolorem passâ erat per mensem integrum, quamplurimis remediis frustra adhibitis. Ego tandem cucurbitulam magnam umbilico admovi, qua humoris ferrosi 5. vj. vel septem elicite sunt, & ægra à doloribus liberata est.

## OBSERVATIO XIV.

*Pleuritidis.*

**P**edissequus D. Demanse, Quæstoris Franciæ generalis, ex cursu exæstuans, ac sudore persusus, aquam frigidam copiosam hausit, & paulò post dolore lateris atroci correptus fuit, cum tanta difficultate respirandi, ut suffocari videretur. Ego confestim vocatus, magnam sanguinis quantitatem detraho, & dum sanguis detrahatur, respirandi difficultas, & lateris dolor sensim remittebatur, absolutaque evacuatione, utrumque symptoma prorsus desit, ægerque omninò curatus est.

## OBSERVATIO XV.

*Dens avulsus in alveolum intrusus.*

**C**um virgo quædam oppidi vicini dolore dentium torqueretur, quem à dente incisorio carie affecto provenire



hire putabat, Chirurgum vocat, ut dentem avelleret. Ille proximum dentem benè sanum avulsit: subinde, cognito errore cariosum abstulit; mox alveolum prioris vino abluens, dentem sanum in eum intromisit, & gargarisma adstringens præscripsit ex rosis rubris, balaustis, cortice granatorum, ligno lentiscino, & alumine in aqua, & vino austero decoctis, quo ægra frequenter utebatur. Tum eam per aliquot dies alimentis liquidis uti iussit, à masticatione prorsus abstinendo. Et ita dens avulsus in alveolo conglutinator est.

## OBSERVATIO XVI.

*Lues venerea.*

**C**hirurgos interdum errare contingit in luis venereæ curatione, quando post ordinaria remedia convenientes usurpata, ægros perfectè curatos non esse existimant, quòd adhuc quædam symptomata, luem veneream comitantia, apparere non desinant, unde ægros interdum in nova tormenta conjiciunt, & in atrophiam, aut tabem præcipitant. Cum tamen illa symptomata ut plurimum post aliquod tempus sponte dispareant, aut lenibus quibusdam topicis remediis discutiantur.

Dum essem Luteriæ apud Dominum Helotum Chirurgum peritissimum, nobilis quidam Parisiensis, temperamento melancholicus, se illi curandum tradidit, qui præter dolores nocturnos, aliaque luis venereæ symptomata, tumorem in cervice patiebatur, ex pituita & melancholia genitum. Post inunctionem ex unguento mercuriali, copiosus fuit pyralismus, & omnia luis venereæ symptomata prorsus abolita sunt uno excepto tumore, cujus duæ teritiæ partes discussæ fuerant. Existimabat æger se non esse curatum, propter tumorem superstitem. Ab alio tamen Chirurgo seniori ad hanc rem vocato confirmatus fuit, & admoto emplastro de vigo, quadruplicato mercurio, tumor discussus est mensis unius spatio.

Alter vir nobilis, curæ meæ commissus, absoluto pyralismo, se non curatum esse putabat, quòd ulcus in cervice, & regione œsophagi remaneret. Hoc tamen ulcus remediis vulgaribus intra mensem curatum est, sine ullo remedio luem veneream respiciente.

Tertium habui præ manibus, qui inter alia symptomata dolorem insignem patiebatur supra os tibiæ. Temperamento bilioso præditus erat, & frictiones mercuriales quater passus erat, quibus ad summam maciem perductus fuerat. Dietâ humectante per mensem usus est. Postea frictio ex hydrargyro universaliter usurpata, & hac unica frictione dolor sedatus & pyralismus provocatus, per quem humores flavos, tenues, & foetidissimos mensis unius spatio rejecit, mox per 15. dies pituitam crassam excrevit; qua evacuatione nimium perseverante, coactus sum aëri illum exponere, ut citius cohiberetur. Tandem supra locum antea dolentem incisio facta est, & caries in osse reperta, quæ cauterio actuali, & pulvere catagmatico ablata est, & æger omninò curatus.

Ultimum exemplum erit Equitis cujusdam, qui à lue venerea methodo ordinaria curatus fuerat. Supererant tamen dolores insignes, omnes articulos occupantes, ut membra sine clamore commovere non posset. Dominus Joannes Delort, Professor Regius Monspelienfis, & in praxi Medica exercitatissimus, horum dolorum causam diligenter inquirens, censuit eos non à lue venerea procedere, sed potius ab intemperie sicca, ligamenta articulos connectentia, & partes nervosas annexas occupante. Ab eaque intemperie indicationem sumens, victum humectantem, & balneum præscripsit, quibus diu continuatis, omninò curatus est.

\*\*\*\*\*

## OBSERVATIONES

Communicatæ à D. Ozia Aimar, Chirurgo Gratianopolitano celeberrimo.

## OBSERVATIO I.

*Vulnus contusum in oculo.*

**I**LLUSTRISSIMUS vir Dominus de Servieh, qui Munsteri pacis ineundæ gratiâ Plenipotentiarum legationem exercuit, ante multos annos in spheristerio quodam Parisiensi vulnus accepit in oculo sinistro ex ictu pilæ palmariæ, ex quo gravissimi dolores exorti sunt. Chirurgi Parisienses docti & experti omnia remedia, quæ ad hujus affectus curationem necessaria videbantur, ex arte adhibuerunt; & inter cætera, cum echymosin conjunctivam occupantem advertissent, levibus scarificationibus sanguinem extravasatum educere conati sunt. Nihilominus dolores in eodem statu consisterunt. Ille igitur, cum malum in pejus rueret, Gratianopolim venire decrevit, ut sese curæ meæ committeret. Ego verò pluribus venæ sectionibus, cucurbitulis, variisque topicis parti admotis, malum delinire conatus sum. Verùm iis omnibus nihil conferentibus ei tandem persuasi, ut oculum introspecti pateretur, quod antea nunquam obtinere potueram, propter acerbissimos dolores, quos ille ad luminis occursum patiebatur. Aperto igitur oculo, vidi album quidpiam totam pupillam contegens quod hypopyon esse judicavi idque aperiendum censui, ad evacuandam materiam eo contentam, quæ dolores continuos efficiebat. Factâ itaque levi incisione, exiguus sanguinis thrombus egressus est, qui exteriori superficie albicans erat, interiori verò ruber. Educto illo thrombulo, statim dolores omnes quieverunt, & intra paucos dies æger lucem sustinere cœpit, ac brevi integram sanitatem adeptus est.

## OBSERVATIO II.

*Ulcus cariosum in sterno.*

**D**ominus Speaute Quæstor Franciæ generalis, tumorem scirrhum patiebatur in sterno, qui post annum elapsus sponte apertus est. Ego verò ulcus explorans, subiecta ossa carie affecta inveni, quibus multa cauteria actualia admovi, ac deinde detergentibus & epuloticis ulcus ad cicatricem perduxì, non omittis remediis universalibus, causam antecedentem respicientibus.

## OBSERVATIO III.

*Costæ carie corruptæ.*

**Q**uædam Matrona quadragenaria, vehementi lateris sinistri dolore vexata cum febre lenta & extenuatione totius corporis. Postquam per annum integrum multis remediis usa esset sine fructu in pago, ubi degit Gratianopoli undecim miliaribus distante, tandem Gratianopolim se contulit, & sese curæ meæ commisit. Ego statim latus dolens explorans, tumorem suppuratum in eo inveni, & magnâ incisione cruciatim factâ, puris valde inæqualis & foetidissimi vascula duo extraxi. Evacuato pure tres costas reperi in extremitatibus suis carie valde infectas, quartam videlicet, quintam & sextam, ab inferioribus ad superiores computando. Necessum fuit costas illas amputare trium digitorum transversorum longitudine, admoto postmodum earum extremitatibus cauterio actuali. Hic naturæ providentiam admirari licuit, quæ pleuram sub costis carie infectis multa carne munierat, ad eam roborandam, & costarum defectum supplendum. Hæc matrona post modum victu analeptico & usu lactis ad integram valetudinem perducta est.

Dominus de Bessin Centurio, tumorem scirrhum patiebatur à longo tempore in latere sinistro, supra costas veras,

D d d d 2

quing



quintam nimirum, sextam, & septimam. Quidam Chirurgus cauterio actuali tumorem aperuit ex quo pus perexiguum emanavit, & dolores in parte gravissimi permanserunt, quod eum coëgit, ruri degentem, Gratianopolim venire, & meam operam implorare. Ulcus animadverti volæ manus magnitudinem æquans, & costas subjectas carie infectas, plusquam dimidium earum penetrante. Præmissis igitur remediis universalibus costarum extremitates amputavi quatuor digitorum transversorum longitudine, admodum post modum cauterio actuali earum extremitatibus. Tandem pulveribus catagmaticis partium exustarum exfoliationem procuravi, remediisque detergentibus & incarnantibus ulcus ad cicatricem perduxit.

## OBSERVATIO IV.

*Fractura ossis temporalis.*

**V**ir quadragenarius vulnus accepit in tempore dextro, quo os subjectum insigni fractura affectum est. Vocatus ad eum, & trepani necessitatem advertens, supra musculos crotaphitas crucialem incisionem feci, sine ullo superveniente symptomate, quamvis Auctores eorum musculorum vulnera, tanquam maximè periculosa, plurimum reformident. Trepanum admovi, ossa depressa reposui, & omnibus convenienter administratis, æger ad pristinam valetudinem feliciter perductus est.

## OBSERVATIO V.

*Vulnus asperæ arteriæ ex sclopeto.*

**A**ncilla Domini de Viviers in Senatu Gratianopolitano Secretarii Regii, ictu parvi sclopeti, quod vulgo *puclet* nominatur, vulnerata est in gutture sub larynge, tribus globulis, in dicto sclopeto inclusis, quos ægra per os rejecit. Ex tribus asperæ arteriæ foraminibus, ventus cum murmure & sibilo egrediebatur. Licet autem pars illa cartilaginosa difficillimè coalescat, attamen diligenti curâ adhibitâ, vulnera illa perfectè consolidata sunt.

## OBSERVATIO VI.

*Empyema ex vulnere epigastrii.*

**N**obilis quidam Occitanus Gratianopoli, pugionis ictu vulnus accepit in epigastrio, ad capacitatem illius penetrans, sine intestinorum aut ventriculi læsione. Brevi vulnus hoc ad cicatricem perductum est. Attamen post duos menses ad me venit, magna spiranni difficultate oppressus, cui jungebatur sensus ponderis in pectore, & fœtor os continuo inficiens. Hæc symptomata, puris in thorace collecti maximam suspicionem fecerunt, sed vulneris cicatricem explorans, eamque in parte epigastrica inveniens, miratus sum, quomodo vulnus ventri inferiori inflictum, puris collectionem in thorace producere potuerit. Tandem inquirens, & quo situ esset æger, cum vulnus accepisset, respondit se in domus cujusdam scalis tunc temporis fuisse: & vulnerantem in gradu inferiore situm, pugionem sibi in ventrem adegisse. Ex quibus conjeci vulnus à parte inferiori ad superiorem vergens, diaphragma penetrasse, & ad thoracis capacitatem pervenisse, unde puris collectio, ex sanguine diaphragmatis vulnerati extravasato, facile fieri potuit. Latus aperui in veris costis inter quartam & quintam, ab inferioribus ad superiores computando, quatuor digitis transversis à vertebra dorsi. Apertione facta pus effluxit album & fœtidissimum: ejus prima vice tria vascula eduxi, postmodum verò eandem quantitatem; & consequenter paulatim educto pure, æger intra duos menses optimè convaluit.

## OBSERVATIO VII.

*Gangræna perinæ, ani & scroti.*

**D**ominus Pourroy, in camera Computorum Gratianopolitana Magister sexagenarius, tumorem patiebatur in perinæo, qui à solo Pharmacopœo curabatur;

gangræna partes illas invasit, ad cujus curationem vocatus, invenio eam perinæum, scrotum, & anum occupasse. Statim multis scarificationibus, iisque profundis celebratis, partes aceto, sale, aquâ vitæ, unguento Ægyptiaco, & mercurio sublimato simul nixtis frequenter abluo. Quæ tamen gangrænae progressum non impediabant, ita ut ad cauteria actualia confugere coactus sim, quorum beneficio gangræna cohibita est, tamen fœtor ex partibus illis exhalabat, ut adstantes inficeret. Magna excidit carnis putridæ copia. Uretra prorsus detecta erat, & duobus foraminibus pertusa, per quæ urina egrediebatur. Nihilominus omnes illæ partes unitæ, incarnatæ, & cicatrices feliciter obductæ sunt.

## OBSERVATIO VIII.

*Enterocœle desperata, sectione curata.*

**Q**uidam Procurator Gratianopolitanus nomine Baro ex prolapsu intestini in scrotum, in iliacam passionem incidit, quia intestinum facibus repletum fuit, quæ admodum induratæ, intestini repositionem impediabant. Post multa remedia, per novem dies frustra tentata, in consilium vocor, cum Dominis de Villeneuve & Davins Medicis celeberrimis. Sententiam ferens dixi, aperiendam esse partem, usque ad productionem peritonæi, quæ intestinum strangulabat, quamvis metuendum esset, ne intestinum, propter morbi diuturnitatem, gangræna affectum esset, nihilominus sequendam esse Celsi sententiam, dicentis: satius esse anceps remedium experiri, quam certo exitui ægrum exponere. Clarissimi Medici ejusdem fuere sententiæ. Itaque ægro in situ convenienti collocato, in inguine incisionem feci usque ad peritonæum, diligenter cavendo, ne intestinum læderetur. Postmodum cannulam argenteam, ex una parte rotundam, ex altera verò cavam, in processum peritonæi immisi, & super cannulæ cavitatem dictum processum aperui, ea longitudine, quæ ad reponendum intestinum necessaria videbatur: deinde intestinum blandè in ventrem immisi, futura processum univi, & reliquarum partium vulnus gastroraphiâ, remediisque conglutinantibus, ad perfectam sanitatem perduxit.

## OBSERVATIO IX.

*Abscessus lumborum ad renes penetrans.*

**V**ir nobilis Gratianopolitanus tumorem in regione renis dextri passus est, qui in suppuratum abiit, eoque aperto, magna serosæ materiæ quantitas effluxit. Post aliquot dies ex ulcere egressi sunt duo calculi, amygdalæ magnitudinem æquantes, quod mihi admirationem peperit: sed ulceris profunditatem advertens, quæ quatuor digitorum transversorum latitudinem æquabat: cum etiam consequenter alii calculi fabæ magnitudinem æquantes, ex ulcere prodierint; credere coactus sum, eos calculos à rene etiam ulcerato procedere. Hujus rei fidem etiam faciebat, quod ex ulcere magna serosæ materiæ copia continuo effluebat, & lintea subjecta intra paucas horas madore inficiebat, quasi in aquam demersa fuissent. Præterea pus interdum cum urina per penem effluebat. Jam à decennio casus iste contigit, & ulcus in fistulam abiit, quæ sæpe occluditur per tres aut quatuor menses; & cum denuò aperitur, sanguineam quandam materiam emittit, postea iterum sponte occluditur. Æger in eo statu satis commode vivit, & omnes actiones ordinarias liberè exercet.


## OBSERVATIO X.

*Rara convulsionis species.*

**D**ominus de Bollon vir militaris, ex ictu tormenti bellici vulnus accepit in brachio dextro, quo totum brachium abscissum est, superstiti tantum parte, quæ humero



mero vicina est, ad quatuor digitorum transversorum longitudinem. Curato brachio, vulnere omnino consolidato, quadam convulsionis specie correptus est, qua retrahebatur caput versus partem dextram, & mandibulas frequenter agitabat, ita ut lintea continuo intra dentes habere cogeretur, quæ identidem mordebat, ac dentibus conterebat. Multas Medicorum & Chirurgorum consultationes convocavit, qui omnes uno ore censuerunt, in extremitate ossis, à tormento bellico præcisi, aliquam eminentiam acutam adesse, quæ nervum aliquem feriendo, talem convulsionem produceret, & ideo rescindendam iterum esse ossis extremitatem, ac diligenter adæquandam. Hæc operatio sedulo celebrata, nihil tamen profuit, & æger eodem incommodo continuo affligebatur, quod ei omnem sanationis spem ademit. Fortè fortuna, cum ei occurrissimè, & ille incommoda sua mihi enarraret, in mentem venit aliquod virus venereum, intus latens, hunc affectum forsan posse producere. Et illico ab eo quæsi, num dum vulnus accepisset, morbum aliquem venereum pateretur, vel antea passus esset: respondit se per aliquod tempus antequam vulneratus esset, gravem passum esse gonorrhœam, quæ tamen curata prorsus fuerat. Hoc meam conjecturam auxit, ita ut ægro consuluerim remedia luis venereæ experiri, quibus ille hujus morbi curandi cupidissimus, se libenter submisit. Præmissis igitur purgatione universali & diætâ sudorifica, frictiones ex unguento mercuriali celebravi, à quibus pytalismus provocatus est, & post tertiam diem pytalismi contractiones illæ & convulsiones desierunt, neque ab eo malo amplius ullo modo æger conflictatus est.



### OBSERVATIONES

hinc inde decerptæ.

#### OBSERVATIO I.

*Ulcus renum.*

**R**elatum mihi fuit, quendam Empiricum curasse ulcus renum inveteratum sola inunctione unguenti mercurialis.

#### OBSERVATIO II.

*Gibbositas.*

**D**ominus Franciscus Ranchinus, Cancellarius facultatis Medicinæ Monspeliensis, narravit mihi modum, quo curavit luxationem spinæ dorsii illustrissimæ Dominæ de Mormoranci, quæ contigit ex catharro è cerebro in spinam decumbente: quo duæ vertebræ in medio spinæ luxatæ fuerant. Ille igitur post remedia universalia, ad reductionem vertebrarum usus est primum torculari Chirurgorum, quo comprimunt lintea complicata, capillorum tonsuræ destinata, quod satis proficiebat, dum unum tabulatum dorso, alterum pectori apponebatur, & ita sensim comprimebatur, interjectis inter ligna & corpus pulvinaribus lineis: sed incommodum fuit hoc remedium, siquidem pectus comprimendo, respirationem offendeat. Tandem usus est alio instrumento, quod habetur in carrucis ad eas attollendas, dum viæ concavæ insiguntur, & Gallicè vocatur (cric) cujus extremo circulari admovebat lignum aptandum vertebræ luxatæ, intermedio pulvinari lineo. Alterum extremum hujus instrumenti parieti admovebatur, mox ægra firmiter circa scapulas continebatur, postea instrumentum blandè impellebatur, donec ægra amplius dolorem ferre non posset, quo tempore ab opere desistebatur, idque bis in die iterabatur, atque ita sensim luxatio illa perfectè curata est.

#### OBSERVATIO III.

*Oculorum inflammatio cum sordibus.*

**I**nfans recens natus, oculorum rubore afficiebatur, cum multis sordibus, puris instar inde influentibus. Per tres menses affectus continuavit, & multa collyria admota nihil contulerunt. Tandem ex præscripto cujusdam Medici gossypium singulis noctibus admotum est utrique oculo, quod prius ad prunas diligenter exsiccatum, digitis prius disceptum, & bene carminatum; postmodum uterque oculus contegebatur pauca cottonis quantitate inter plumaceolos, fascia superinductâ. Manè gossypium auferebatur, dictis sordibus valdè imbutum. Continuando remedium per plures noctes, infans optimè curatus est.

#### OBSERVATIO IV.

*Hysterica epilepsia.*

**U**Xor Domini Polemarchi de Sumenes per multos annos variis affectibus hysterice vexata est, qui epilepticos insultus referebant. Multa tentavit remedia à multis Medicis præscripta, sed omnino in cassum. Tandem cujusdam mulieris consilio sumpsit carnem lupi in pulverem redactam, frustulum ejusdem carnis semper gestavit, à quo tempore immunis omnino fuit à prædictis affectibus.

#### OBSERVATIO V.

*Febris tertiana.*

**Q**uidam empyricus multos curavit tertianarios purgando semel levi medicamento, postea venam aperiendo in ipso accessionis initio. Cohibebatur accessio, & valde exigua apparebat, postea verò non redibat.

#### OBSERVATIO VI.

*Vulnus Thoracis curatu difficile.*

**D**o Henricus Bachamans, Medicus Avenionensis exercitatus, retulit mihi Filium D. Dorfan 20. annos natum vulnus accepisse in thorace, ad capacitatem illius penetrans, quod multis variisque remediis adhibitis curari non potuit, & ad tres aut quatuor menses perseveravit, unde æger valde emaciatus, & ad tabem perductus est. Tandem illius consilio, lacte muliebri usus est, quod ex mammilla fugebat; ex eoque injectiones fiebant in vulnus; atque hoc solo remedio intra mensem curatus est à vulnere, & ad bonum habitum perductus.

#### OBSERVATIO VII.

*Colicus dolor.*

**Q**uidam civis Narbonensis retulit mihi, se colico dolori obnoxium fuisse per multos annos, quo frequenter affligi solebat, ab eoque affectu liberatum sequenti remedio, una tantum vice assumpto, ita ut nunquam deinceps in eum reciderit, & plurimos alios, quibus idem remedium communicavit, fuisse etiam liberatos. Hoc remedium est dolii obturamentum ex subere confectum, quod per plures annos huic usui inservierit, atque adeo vino probe imbutum sit, illud autem super igne comburendum est, ejusque cinis exhibendus cum vino albo 3. j. pondere, urgente dolore.

#### OBSERVATIO VIII.

*Hydrops.*

**V**ir quidam fide dignus retulit mihi, se multos afflicte laborantes curatos vidisse sequenti remedio.

D d d d 3 Sili-



Silices colligebantur albissimi, qui circa flumina reperiuntur, & fracti aliquantulum pellucet, cryfalli instar: illi autem super prunas incalescebant & candentes in vino albo exstinguebantur, hujus vini cyathum unum ægri sumebant mane, usque ad perfectam curationem, quæ intra mensem perficiebatur.

Hujusmodi silicum calcinatorum sal, in vino albo exhibitus, felicius (ni fallor) operatur.

Sal millepedum à celebri Medico feliciter usurpatur in hac curatione, quem julepis aliisque aperientibus admiscet præmissa purgatione, cum succo ireos nostratis: quem si æger vomitu rejiciat, pro deplorato habendum esse existimat.

## OBSERVATIO IX.

*Alius hydrops.*

**Q**uidam hydropicus curatus est solo usu salis prunellæ, in potu ordinario, per mensem integrum, cujus spatio aqua universa in abdomine contenta evacuata est.

Hanc curationem contigisse existimo non solum propter virtutem diureticam, quæ sal prunellæ præditum est, sed etiam ex eo quod hydrops ille forsitan à servida hepatis intemperie productus fuerat, quæ à sale prunellæ, potentissima refrigerandi vi prædita, extincta est.

Alius hydropicus curatus fuit decocto suminitatum quercus, cujus cyathum unum sumpsit manè per 15. dies.

## OBSERVATIO X.

*Strumæ.*

**A**rmoricus quidam, Danielis nomine, 30. annum agens, vir ruficanus, habitu eusarco & robusto, à pluribus annis strumis laborabat, tum circa collum, tum etiam sub utraque axilla, qui cum amicis, & notis omnibus invisus esset propter contagiosum istum affectum, ad Nosocomium Charitatis Lutetianum, velut ad verum Æsculapii templum sese contulit, ratus se illic certam mali medelam reperturum. Nec cassa spes frustratum reliquit ægrotantem, primo enim decubitus die ab Illustrissimo D. Gabriele Harduino de saint Jacques Nosocomii Medico ordinario invisus est, qui præmissis universalibus, cataplasma ex foliis cucumeris asinini leviusculè contusis, partibus tumentibus admovit, præscriptaque diætâ tenui, nec non modicè exsiccante, altera die opiatâ sequens præscripta est.

24. Turbith. hermodact. ana. 3. ij. radic. utriusque scrophulariæ 3. j. rad. angelicæ major. 3. ij. fol. oriental. 3. β. scamon. crudi 3. iv. fiat omnium pulvis, & excipiat cum syrupo rosar. pallid. dosis ad 3. ij. addendo cuilibet, mercurii sublimati dulcis g. xx. qua alternis diebus per 15. dies repetita, necnon renovato cataplasmate, disparuerunt tumores omnes scrophulosi absque sectione, aut eradicatione ulla, ipsumque Armoricum sanum & incolumem dimisit anno salutis 1641. Communicata à D. Lesq. Medicinæ Doctore Monspelienfi, & dicti D. de saint Jacques olim discipulo.

## OBSERVATIO XI.

*Dolor dentium.*

**D.** Lesq. Medicinæ Doctore supra nominatus, se curatum vidisse retulit dolorem dentium sale fraxini, quo impletur digitale mulierum, aut quid simile, & applicatur arteriæ temporum, ubi sentitur pulsatio, intra breve tempus nodum facit in arteria, quo fluxus intercipitur.

## OBSERVATIO XII.

*Arthritis nodosa.*

**D.** Chomel Medicus Annonæensis scripsit ad me, se nuper Arthriticum vidisse variis articularum ulceribus scatentem, è quibus calculi tophacei plusquam du-

centi exierunt, pisorum magnitudinem superantes, & ita duri, ut malleo resisterent. Et quod mirum dictu est, pus, sanies, & serosa materia ad ulcera confluens, exigua in parte morâ, concresecbat illico, & tophaceam duritiem acquirebat. Hoc etiam rarum, in illo ægrotante observavit, quod tупica uni parti conducentia, alteram lædebant & vice versa.

## OBSERVATIO XIII.

*Hemicrania.*

**D.** Genton Romanensis, natu minor, retulit mihi, se hemicraniâ laborasse per multos annos, & post multa remedia frustra tentata, curatum fuisse suffitu ex carabe, per mediam horam tempore paroxysmi, ore & naribus excepto.

## OBSERVATIO XIV.

*Hernia.*

**I**dem retulit, se Hernia intestinali per multos annos laborasse, & curatum fuisse tribus emplastris, à quodam empyrico sibi traditis, quorum singula gestare jussit per novem dies cum subligaculo; erant autem ex eadem materia confecta, & valda fœtida: tum quando auferebantur, materia eorum tota consumpta apparebat, nisi quod in aluto pulvis quidam remanebat vitro pulverato similis. Per usum primi emplastri nullus effectus apparuit, post admotionem secundi urinæ copiosæ prodierunt, & varii coloris, nunc virides, nunc nigrae, & aliquando cum dysuria post diem 27. absumptis tribus emplastris, pars strigosa & macilenta apparuit, ut omnis caro & pinguedo subjecta protinus absumpta videretur. Conjecimus ex fœtore hoc emplastrum ex galbano fuisse compositum, quod summa attentandi vi præditum, humores ad partem affectam affluentes, & fortè circa eam concretos, fundere, & liquare potuit, ut natura deinde eos partim per urinas excusserit, partim insensibiliter discusserit.

## OBSERVATIO XV.

*Hydrops.*

**R**uficus quidam hydropicus factus, abscessum passus est in dextra parte abdominis, eoque aperto, infinitus propemodum vesicularum aqua repletarum numerus egressus est, ut ducentarum numerum excederet, idque per plurium dierum spatium, & sic omnino curatus est. Hac observatione confirmatur historia à Schenkio proposita, cujusdam hydropici, cujus abdomen post obitum, apertum, vesiculis, aqua repletis, peritonæo, aliisque partibus adhærentibus repletum apparuit.

## OBSERVATIONES

Quædam infrequentium, curatûve difficilium morborum, cum curationibus eorundem, in veteri quadam Bibliotheca, sine Authoris nomine repertæ.

## P R Æ F A T I O.

**O**CCASIO quamobrem de raris curationibus morborum quorundam scribere, qui mea ætate ingruerunt, susceperim, hujusmodi est: nam cum quodotidie, morbi quidam novi, aut saltem cum inauditis nonnullis symptomatibus suboriantur, de quibus paucos admodum, aut fortè nullos mentionem fecisse constat, præterea multos quotidie veluti postliminio reversos repullulare, atque redire percipimus, ad quorum veram & genuinam curationem invemendam multa horæ bonæ frustra consumuntur, quando quidem sexcenti codices ante revolvendi sunt, quàm morbus, de quo agitur, aut innotescat aut expulsiōis ratio teneatur.



veneatur, proinde tum ex optimis quibusque Autoribus, tum ex iis quæ ipso longo usu atque experientia comprobavimus, quosdam veluti exoticos flores excerpimus, quibus quisque pro arbitrio utatur. Insuper habeat, unde curationes morborum symptomatumque rarò contingentium depromere queat.

## OBSERVATIO I.

## Singultus.

**Q**uidam Germanus, annum agens circiter quadragesimum, correptus fuit singultu, quem mira postea subiequuta sunt symptomata & creditu difficilia. Ille igitur è Germania Nemausum usque profectus, radicum buxi emendarum gratiâ, quarum maximum est commercium in Gallia Narbonensi, ardoreque Solis intenso exæstuans (tum enim Syrius ardebat) ut erat sitis impatientissimus, simul atque in hospitium divertit, correpta puteali situla, frigida recenti oppleta, adeo sese ingurgitavit, ut ob aquæ tum copiam, tum frigus immodicum, in spasmodum ventriculi inciderit, usque adeo ingentem, ut nullis auxiliorum formulis, aut victus ratione per bimestre spatium cesserit, imò verò quando magis eum superare nitebamur, tantò magis conatus nostros eludere videbatur.

Sed & hoc in primis admirandum, ut cum primum quis vel vestis, vel pallii fimbriam digitulo attingeret, singultu antea sedato, ille tanta cum totius corporis concussione suscitabatur, ut vel cubiculi tabulata tremescerent, & cum forte fortuna D. Rondeletius visendorum ægrorum gratia, Nemausum accederet, eo in consilium adhibito, cum D. Ferrando & aliis, qui tum ibi aderant Medicis atque Chirurgis ac tandem peroratis singulorum sententiis, quid rei an causæ subesset, cur in sanitatem pristinam tam difficulter rediret, præterea qua industria remediis uti liceret, omnes uno ore maximam ventriculi intemperiem causam esse asseriebant, cur hæc symptomata perseveraverint tamdiu: quantum verò attinebat ad remedia, in fotibus, cataplasmatibus embrochis, cucurbitulis, non neglecta & purgatione, & syruporum, & opiatum, pulverumque assumptione persistendum, appositè ad hanc rem citato aphorismo Hippocratis: Omnia secundum rationem facienti, non esse transeundum, &c. Ego verò tentatis frustra omnibus remediis, de quibus inter nos conveneramus cœpi mecum cogitare balneum calidum posse tantam intemperiem mutare, & in temperamentum naturale reducere partim quia longa in balneo mora promptius corporis habitui vis balnei sese insinuaret, unde fieret cum affecto membro communicatio, partim quoniam existimarem majorem vim penetrandi accedere medicamentis, si balneo commiscerentur, ob cuius quam calida balnea efficiunt laxiorem raritatem majorem. Nec mea me fefellit opinio, quandoquidem parato balneo ex lauro, origano, mentha, absynchio in aqua coctis tantam ex mora in eo utilitatem percepit, ut intra quatuor aut quinque dies sanus evaserit, præterea interim sacculum contextum, in quem insertæ herbæ prædictæ erant, regioni ventriculi quamdiu in balneo permanfit, accommodavimus. Neque verò omittendum bimestri spatio singultum adeò Germanum illum exercuisse, ut jam cruditate in ventriculo, & intestinis radices agente, deplorata ejus videretur salus; sed Dei beneficio, qui mentem hominum quando vult illustrat, & ad inveniendâ remedia nos quasi manu ducit, pristinae sanitati fuit restitutus non sine Doctorum Monspelienfium, Nemausensiumque, qui ægrotantem inviserant, admiratione.

## OBSERVATIO II.

## Phthisis.

**Q**uidam Catalaunus, natus annos circiter 44. humoribus, sanguine & atrabile, in eo dominantibus. Cum autem annis duobus antea quadam (ut referebat) levi pleuritide laborasset, & incuriâ suâ vel Medici, præsidia quæ ad morbi curationem requirebantur, neglecta fuisset,

phthisicus factus est: nam per triennium excreato sanguine simul cum pure, tantus eum marcor obsessit, ut ossa (ut vulgò dicitur) cutem transmiserint. Interim tussis ipsum adeò inquietabat, ut vel modicum somnum capere haud potis esset, præ copia purulentæ materiæ, per tracheam arteriam à natura expulsæ, alioqui in gutture fermentis, & liberam respirationem impediens, itaque cum mecum vocaret insigniores Medicos Avenionenses, nihilquæ ommissum fuisset, quod ad ejus salutem recuperandam videretur, præscriptis abunde iis quæ artis erant, nec quicquam proficientibus, consului, ut è D. Schironio, & Rondeletio docentibus Monspelluli, tanquam ex tripode Apollinis oracula peteret, eos remedia nonnulla educturos (ut erant ingenio non tantum perspicaci, sed etiam experientia longa in morbis fugandis exercitati) quo tandem si non in totum sanaretur, saltem meliusculè haberet, ne tam miseram vitam, non quiescendo, non quidquam cibi appetendo, degeret: malle enim se vitam cum morte commutare, quàm diutius vitam, quæ potius mors erat, prorogare dictitabat. Medici ergo illi Monspelienfes visis omnibus quæ à nobis præscripta fuerant, nil amplius addiderunt, quàm ut frequenter cancris fluviatilibus vesceretur in aqua hordei præcoctis, similiter & testudinibus nemoralibus, annexisque nonnullis formulis remediorum, quas Pandaliones vocant ægrum ad Tabias miserunt, id est ad oppida temperamenti similitudine Tabias referentia, nempe aperto cœlo, loco alto, siccoque exposita. Cum verò jam suæ vitæ tæderet, utpote qui plus quatuor annis talem affectum non sine summa molestia angustiaque toleraverit, arrepta dextra manu mea, per deos inquit te oro, ut à fœtido morbo isto me liberes, vel tentatis extremis remediis me de medio tollas; omnem præstabo culpam, & te ab ea exsolvam. Quando ita vis (inquam) experiar inte unum quod superest remedium, à Galeno summo Medico proditum. Scribit enim fustitum quendam ad veteres tussis, nempe trochiscos ex auripigmento, quorum vaporem necesse est per os recipere: hoc unum relictum est remedium, ex quo deplorati ferè restituti sunt multi, proinde te hortor, ut illud experiaris, postquam alia remedia tibi fuere frustra adhibita: fateor quidem id genus remedii esse tuis viribus impar, sed tam parva dosi in principio uti convenit, ut possis illam conjectura nostra quodammodo æquare. Tandem igitur illorum trochiscorum fumum, prunis suppositis, cœpit per infundibulum vesperi per os haurire. Ille verò se nolle in posterum iis uti, mane cum eum reviserem, protestatus mihi est, quia videlicet se respiratione privatum iri sibi persuaderet, si iterum id auxilii genus tentaret. Ego autem instare non destiti, donec iterum trochiscos ut paulo ante experiretur: quid multa? nocte sequenti intempesta, post haustum vaporem trochiscorum, tantus eum rigor invasit, ut non solum lectus, in quo decumbebat, sed etiam tabulatum cubiculi quodam veluti terræ motu concuti viderentur? ipse verò cum morti proximum se arbitraretur, misit puerum, qui me accerseret. Nolui ei in re tam urgente deesse, cumque me introeuntem intueretur, quia nolui (inquit) non tibi vale dicto, fato meo fungi, propterea te, non vocaturus in posterum, volui vocare simul ut videres miserum meum statum. Ego verò tentata carpi quatuor digitis arteria, deprehenso undoso pulsu cum vitalium virium robore, prædixi brevi futurum, ut copioso sudore difflueret, qui tantus quidem paulo post emanavit, ut culcitra, & lintea tota permaduerint, proinde ac si (ut vulgò dicitur) in fluvium demersa fuissent: exinde somnus & quies optata, nulla tussis, nullus excreatus, in summa sanitate integra frui illi licuit plus quindecim ab hinc annis. Cæterum hic mirari licet unde à corpore tam exsanguis & exsucco tantus sudor exire potuerit. Hoc certè contigit Insulæ, quo tempore tyrocinia Medicinæ faciebam. Narravi per litteras D. Rondeletio, rem prout gesta fuerat; miratus est talem morbi curationem, exitum, & subitam solutionem, atque in commentaria se relaturum hunc morbi decursum mihi pollicitus est.



## OBSERVATIO III.

*Febris maligna.*

**N**ulla unquam symptomata læviora cuiquam acciderunt, quam quæ adolescenti Nemaulino nomine Grasset supervenere, dægenti Belliquadri an. 1574. is natus annos circiter 20. aut 22. incidit in febrem *καυσον*, in qua siti inexhausta cruciabat, lingua nigrescens, vigilæ perpetuæ à 4. usque ad nonum diem hominem exercebant, parum & inæqualiter sudabat, tum deliria inceperunt cum urina tenui pulsuque raro. Undecimo stridores dentium, convulsionum rigores die & nocte, cum clamoribus & ejulationibus terrorem incutientibus, pulsus inordinatus, & perturbatus apparuit. Decimo quarto, urinæ copiosæ & egestionem, non sine delirio, animi deliquio, convulsionibus. Decimo septimo, exanthemata & papulæ multæ per universum corpus sparsæ, singulæ magnitudinis fabæ, colore lividæ: quæ cum cutem extirpam exederent, carnem subiectam depascendo, ulcera cava reddebant, perinde ac si ferrum candens illa inuissilet, erant autem profunda ad pollicis latitudinem. Vigesimo, parotides sub utraque aure magnæ duæ eruperunt, hinc febris sensim remitti deprehensa est, quibus omnibus, longo temporis intervallo curatis, viribusque refocillatis, æger incolumis Avenionem profectus est, totumque morbi decursum D. Philippo Guilielmo narravit. Quod ad curationem attinet, non desivi à communi Medicorum usu, (vel ut dici solet) ad latum unguem, quandoque item inspecto loto, injectoque clystere, cum alvus dura esset idonea sanguinis missio facta fuit, sanguis valde corruptus apparuit. Deinde julepis, ardorem febrilem extinguentibus, putredinemque arcentibus. Octavo die sumpsit dilutum Rhabarb. cum diaprun. solut. vigilis occurri syrupo papaverino, tibiæ lotionibus, unguento popul. temporibus, volis manuum & pedum plantis accommodato. Sed vix credibile est, quàm lac mulieris, puellam lactantis, mixtum succo lactucæ rosato delirium sedaverit. Deliquis animi succurrimus epithematis regioni cordis admotis, & mixturis ad cor recreandum dicatis; dentium stridoribus, oleis chamæmelino atque amygdalino dulci, cervici & temporibus calidè applicatis, lana succida superdata: ulceribus & papulis relictis, unguento albo camphorato: parotidibus, oleo chamæmelino & de lilio, deinde cum ad suppurationem eas tendere cognovimus (nam materiæ crassities discussionem detrectabat), ad cataplasmata atque emplastra ex mucilaginis, herbis emollientibus, diachylo magno, & aliis ejusdem farinæ, transire coacti fuimus, cum autem Avenionem profectus esset, apertione facta, reliqua industria D. Philippi Guilielmi commissimus.

## OBSERVATIO IV.

*Febris maligna cum sopore.*

**I**gna est, quæ scriptis mandetur ægritudo uxoris D. Formerii Nemausensis Causidici, quæ post curatum maritum, febris ardente maligna, omnia læva symptomata secum vehente, nimirum paraphrenitidem, dentium stridorem, jactationem inquietantem, sitim inextinctam, in continuam febrem propter vigilas tot noctes, conjugis causâ, inediato, curam liberorum, rei que domesticæ, incidit: quæ sexaginta dies uno eodemque fervore citra aliquam intermissionem veluti stupida, conniventibus oculis permansit, nec interim per totum morbi cursum ulla crisis se prodidit usque ad diem sexagesimum, in quo tantum sputum album & spumofum, sine ulla tussi rejecit (ut pulvim duodecim libras capacem liquoris impleverit) quo abundè per os emissis, à febre libera, ad sese rediit, asserens se nihil doloris, nihilque propter morbum incommodi percepisse, quin se graviter & cum summo suæ vitæ discrimine agrotasse, vix in ejus animum inducere potuimus. Interim scire licet, nihil omissum fuisse, quod ad veram morbi profligationem pertinere potuimus conjicere, ut pote à sanguinis missione auspiciati (nam hæc mulier adhuc adolescens

erat plethorica) deinde ad purgationem devenimus, clysmata, cucurbitulam, somnumque prohibentia præscripsimus.

## OBSERVATIO V.

*Vulnus vesicæ ex sclopeto.*

**R**em inauditam, & omnem fidem superantem, attamen veram; vereor ne si narrare coner, vanitatis insimuler: cate. um viri fide digni, tum in arte medica apprime versati, tum in Chirurgia admodum exercitati, ut interim si leam nobiles insigis & que viros, qui curationi interfuerunt, me ab omni calumnia vindicabunt. Quo die igitur Nemausenses subuculatos, id est subuculis altis in lumbos, trajecto Rhodano Tarascone clam venientes, insidisque quibusdam Belliadrum oppidum ingressos fugaverunt atque fuderunt; quidam eorum, qui terga vertebant, glande sclopeti per penis meatum seu fistulam intrusa, vesicam & dextrum latus ossis sacri penetrante, ita, ut per vulnus possicium. lotium redderetur, laeso tantum meatu urinario, ceu excoriatione, integræ sanitati fuit restitutus à Chirurgis Tarasconensibus, me assistente, Antonio Fortunato, & Joanne Bonneto, & quod mirum est nullis aliis medicamentis, quàm trivialibus, & quæ ad manum erant. Tria igitur hic sunt quæ omnes Medicinæ peritos in admirationem trahere debent. Primum quo modo in meatum urinarium glans illa, pene illaesa, nisi modica excoriatione meatus, ingressa fuerit. Secundum, quæ ratione aut naturæ proprietate, vesicâ vulneratâ aliqui remedia omnia resurgente, sanatus sit. Tertium, qui non conquistis secretis remediis, sed iis tantum quæ ad manum erant præscriptis (cum sæpe numero in aliis vulneribus non usque adeo lethaliibus & exoticis & pretiosis uti cogamur, cum ægri tamen perniciæ) nam initio defensivo vocato vulnere circumdato usi sunt Chirurghi, tum Basilico cum vitello ovi turunda oblita, postea unguento de resina, denique carnem regenerantibus, & cicatricem inducentibus, unde adeo prosperè ad pristinam sanitatem rediit, ut adhuc sit superstitis Arelate, dictus cognomine Boriau: hoc tam admirandum vulnus viderunt ferè omnes præcipui Tarasconensium, simul cum Doctoribus D. Philippo Guilielmo, Bertrando Vanio, qui mecum explorato vulnere, radiolo Chirurgico ad id destinato, rem ita habere, curiosa investigatione conspexerunt.

## OBSERVATIO VI.

*Tumor in crure.*

**R**arum morbi genus silentio non est prætermittendum: id est tumor in interiori parte cruris dextri nobilissimæ & bonis moribus ornatissimæ, quæ tum vidua erat D. Deledignam. Hæc igitur in ea parte, tumore oborto, phlegmones speciem præbente, tantis cruciatibus noctu & interdiu inquietata fuit, tamque variis anodynorum formulis D. Rondeletius qui unâ mecum ad ei opem ferendam vocatus fuerat, urebatur, ut nihil spei de ejus salute relictum videretur: nam quando magis tumoris illius duritiem mollientibus vincere nitebamur, tanto magis nostris conatibus reluctari percipiebatur, nec tamen interea dolor ullas dabat inducias. Itaque coacti fuimus, tumorem caustico medicamento aperire, quo humor contentus, licet crudus (ut nobis videbatur) dolorcm committens, apertione facta exitum haberet. Postquam igitur suspicati sumus, causticum suas vires exeruisse, dissolutis fasciis, quibus illud suppositum fuerat, nullum humorem intus delitescerentem, nullum serum inde exisse vidimus. Imò verò (quod caput est) hiante vulnere subiectam carnem nihil imminutam aut alteratam conspeximus; nec aliam extitisse tanti tumoris dolorisque occasionem, quam flatum judicavimus: sed nec similem tumorem Medicos, quos convenire nobis contingit, se vidisse, aut alicubi legisse: tum quia flatu tantos dolores excitabat, ut animi deliquia & vigilas perpetuas induceret: tum quia nihil intra



intra vulnus delituisse alienum à naturali constitutione repertum fuerit, nobis asseruerint. Ab apertione tumoris statu dissipato, omnia evanuerunt symptomata, in posterumque adeo bene valuit, ac si nunquam ægrotasset.

## OBSERVATIO VII.

*Paralysis Lingua.*

**S**Ubit admirari sapenumero opera naturæ: dissectis enim corporibus admiranda inveniuntur quæ citra ætatem ita esse, ut sunt, vix persuaderemur, cujusmodi dum Nemausi agerem, Roberto Berriero contigerunt, nam ferè quamdiu vixit, destillatio perpetua ad nervos, motui linguæ destinatos, adeo ei loquelam impedierat, ut balbutiem molestam invexerit, quæ nullis auxiliis potuit unquam emendari; unde tandem fluxione aucta suffocatione repentina est extinctus. Parentes igitur, qui tum ultimæ ejus diei intererant, me rogarunt ut defuncti recens cadaver juberem diffecari, quo causa & origo tanti hujusce mali cognita, posthac simili destillationi tutius occurreretur. Quare justæ eorum petitioni morè gessi, apertoque primum cranio, ac utrobique separata sensim portione extima cerebri, in conspectum nostrum se dedit cystis, id est sacculus robustâ membranâ compactâque contextus, undique serosum humorem continens, qui in fundo exiguum foramen habens semper novam materiam nervis linguæ suggerebat. Quamobrem cum nullis remediorum formulis hic serosus humor, nec ulla industria absumi discursive posset, cum propter ejus copiam, tum propter membranæ densitatem, quæ nimirum obstabat, quo minus vis medicamentorum eò perveniret, uno ore diximus, talem affectionem curationem nunquam admissuram fuisse. Sed quis obsecro unquam judicasset vesiculam quandam intra cerebri substantiam generatam, seroso humore tumorem tam perniciosæ destillationis causam fuisse.

## OBSERVATIO VIII.

*Syncope à Liene.*

**V**IR Nobiliss. & strenuus D. Egminius Tarasconensis, quodam morbi genere laborabat, quod (ut arbitror) tanquam inauditum, & infrequens à paucis visum erat. Vir igitur ille mihi retulit, tunc se in syncope statim incidere, simulatque in latus sinistrum decumberet, ita ut difficulter ab ea revocaretur, adeo omnes vires collapsæ erant: secus se nihil doloris aut incommodi percipere, nec propterea minus cibi assumere, imò omnia se munia obire, quæ integra sanitate præditus, mihi asseveravit. Mecum itaque mediâ perquirens, ac animo revolvens, quid causæ esset, quamobrem tam sævum symptoma sine manifesta causa apprehenderet, & veluti exanimem relinqueret hominem, coepi cogitare humorem melancholicum, malæ alicujus qualitatis participem, ex liene vaporem quendam venenosum ad cor mittere, eumque occasionem præstare tam maligni symptomatis. Nec mea me fefellit opinio: siquidem ratione victus commodè instituta, purgatoque universaliter corpore ab humore melancholico, & privatim, exhibito medicamine, lienem ab obstructionibus liberante atque demum roborato corde, tam epithematis, quàm mixturis cardiacis, liber omnino à tam lethali symptomate evasit.

## OBSERVATIO IX.

*Morbus Epidemicus Coqueluche vulgò dictus.*

**A**NNO 1557. Mense Julio paulo ante catadysmum, Nemausinos agros vastantem, totam ferè civitatem occupantem, sævit epidemicus morbus, nemini parcens (Coqueluche) vocitatus, adeo immanis & truculentus, ut quamplurimos de medio tolleret, quosdam quarto die, alios septimo, ad summum 14. eos tussis cum faucium asperitate, inflammatione ferventi & febre continua corripiebat, dolor capitis vehemens ægros affligebat, nec

*Lazar. Riverii Opera.*

præ tussi usque ad ravim inquietante, cuiquam somnum capere fas erat: adhuc accedebat renum & lumborum dolor assiduus & eximius, qui paucos admodum progredi sinebat, ad hæc coryza perpetuo vix aërem inspirare per nares permittebat. Cæterum, qui tamen (ut ita loquar) pestem evadebant, facta sanguinis missione & medicamentis expectorantibus exhibitis, sudore foetido superveniente, constantibusque viribus è toto corpore manante, liberabantur. Qui verò febre & inedia consumpti, (cum vix durare possent,) invalidi reddebantur, omnes ad interitum pergebant. Quare in eo cardo curationis versabatur, ut adhibitis sine mora universalibus remediis, (quantum leni tantum purgatione egerent) appetentia revocaretur, & fauces cibi fierent perviæ: ad purgationem sufficiebant manna, cassia fistula, rhabar. cum decocto bechii & aliorum pectoralium. Vehementiora tanquam acuti scopuli vitanda erant.

## OBSERVATIO X.

*Febris Epidemica.*

**E**PIDEMICUS morbus, prædicto non absimilis, grassatus est anno 1580. per æstatis maximam partem, post insectorum innumerabilium congeriem, mensibus Aprili à Maio è terra exortam, quæ quidem tam ingens erumpebat, ut itinera quæque occuparet, nec effugere quisque potis erat, quin infinitos vellet nollet, pedibus conculcasset; unde multo post Arelate, Avenione, Bellicadri & aliis in locis, non procul ab his distitis, tanta pestilentia grassata est, ut perpauca eam evadere potuerint. Sed ut ad rem redeam, prædictus morbus multos quidem jugulabat; sed si primis diebus, & quam citissimè fieri poterat, auxilia administrabantur, ferè omnes erant superstites. Is igitur simul cum febre & tussi invadebat, quam dolor capitis & lumborum subsequabatur, interim febris aliquot diebus intermittebat, postea veluti vires recolligens gravius ægros affligebat. Interim quosdam nulla quiete frui sinebat; sed magis ac magis urgente fervore ad interitum eos præcipitabat. Phrenitide quidam furentes, quidam phthyssi languescentes interibant. Cæterum si maturè, ut dictum est curabantur, omnes ferè intra paucos dies convalescebant. Nec curatio alia à præscripta paulo ante adhibebatur, siquidem pectoralibus medicamentis & lenibus purgationibus (non neglecta imprimis sanguinis missione) clysteribus refrigerantibus injectis, admotis cucurbitulis, & cardiacis opiat, ac epithematibus frequentibus, maximum levamen percipiebant; denique ratione victus optimè institutâ, tandem ad integram sanitatem perducebantur.

## OBSERVATIO XI.

*Deglutitio Impedita.*

**D**OMINUS Bonius, Causidicus Nemausensis clarissimus gravissimo ventriculi dolore, simul cum deglutiendi difficultate summa laborabat, cum febre continua comitante: & cum ante meum adventum præscripta essent medicamenta purgantia, nec quidquam profuissent, ut potè quæ ad fundum ventriculi descendere haud potuerant, ubi primum ad eum accessi, tractatisque à me diligenter cum ventriculi regione hypochondriis, reprehendi renitentem tensionem, undiquaque has partes occupantem, simulque rugitum internum, frequentibus ructibus per os emissis, exitum habentem, quæ causa erat, quamobrem nec jusculum, nec cibus ullus ad ventriculi fundum delabi posset, nimirum sublato & suspensio à flatuum copia cibo. Proinde cum periculum immineret, ne corpus edendi penuriâ absumeretur, cum jam quatuor aut quinque dies à cibo abstinuisset, in id totum curationis scopum dirigere volui, ut tantam flatuum abundantiam discuterem. Quocirca admoveri jussi ventriculi, & hypochondriorum regioni (injecto prius clystere

E e e e

partim



partim discutiente, partim vacuante) fatus calidos, ex decocto absinthii, menthae, floribus chamomeli, meliloti, feminibus cumini, fœniculi, & similibus quibusdam peractus, oleo uardino & chamomelino his partibus calidè irrigatis, meliusculè habuit, coepitque deglutire, spemque bonam recuperandæ sanitatis habere; cum antea, ac si res deplorata esset, de hac vita migrare cogitaret. Tum demum præcepi admovendam ventriculo, cum multa flamma cucurbitulam, à qua flatus adeò potenter digesti fuere, ut postea, & juscula & quævis edulia transglutire valeret ac exinde febris cum dolore quievit, febrem tamen potissimum extinxit multa urinæ excretio. Cæterum, ne affectus recrudesceret, evacuationem iterandam suasi.

## OBSERVATIO XII.

*Febris Maligna cum Exanthematis.*

**J**Udex Ordinarius Nemaufensis, Blanus nomine, febre tertiana duplici accessiones acerbissimas secum vehente conflictabatur: Eum curabat D. Vegratius ætate provectior. Ille igitur, cum in quodam paroxysmo symptomatibus tam vehementibus atque malignis urgeretur, ut in lipothymiam laberetur, ob nimirum exorta repente per totum corpus exanthemata sublivida, nolens quidquam, quod saluti conferret prætermittere, me ut sibi cum D. Vegratio adessem, vocari jussit, qui simul atque in ejus conspectu veni, conqueesus est de intolerabili ardore ab exanthematis excitato, simul cum virium prostratione, obsecravique, ut sibi in maximo discrimine vitæ conslituto, opem subitam ferrem. Ego verò benè inspectis & meditatè consideratis exanthematis, quæ adhuc pullulare videbantur, pulsuque carpi cognito, jussi bonam spem de sua salute conciperet, arreptaque dextra D. Vegratii fecessimus in cubiculum remotum, ut quid factò opus esset, inter nos deliberaremus. Ipse enarratis omnibus quæ præscripserat, petiit à me, quid agendum censerem. Ego sermonem ejus excipiens fui in ea sententia, ut quoad ejus fieri posset, citissimè fieret venæ sectio, secus futurum ut in grave suæ vitæ periculum incideret: Ille verò repugnare, nam (inquit) verendum est, ne humor malignus per cutem (commune totius corporis expurgaculum) dispersus, intro remeet, & partem aliquam principem adoriatur. Ego iterum instare factum, nam Authòribus Montano, Avicenna, Aëtio, Rondeletio, aliisque multis nixus, posse fieri contendebam, in eruptionis eorum principio, dum natura materiam exitiosam expellebat, alioqui si per aliquot dies in cute firma esset, non revocandam intra corpus. Quare tandem is in meam descendit sententiam, & hilari animo nuntiavi ægro, ante discessum nostrum sanitati restitutum iri, si sanguinis missionem tolerare vellet; ipse autem, se quidvis subiturum, dummodo à tantis malis eximeretur. Cum igitur saphena non esset conspicua, venam dextri brachii communem secari jussimus quâ festâ, id evenit, quod futurum prædixeram; siquidem antequâ discederemus, ardor sedatus fuit, pacatum etiam fuit sævum quod timorem incutiebat symptoma. Unde pro tantis beneficiis dici non potest, quàm artem Medicam & nos extulerit. Hinc nos ad febris reliquias profligandas properavimus, quas brevi Deo adjutore expulimus.

## OBSERVATIO XIII.

*Lumbrici.*

**D**Uas Virgines filias Notarii Fezanderii Nemaufensis vidimus, quarum altera annum septimum, altera nonum non excedebat, quæ intra semestrem spatium dolore acerbissimo ventris totius obiere, qui nullis remediorum generibus mitescere poterat, nempe injectis clysteribus, potionibus pituitam vacuantibus, flatus discutientibus, denique vermes necantibus. Itaque provectiore defuncta, cum cadaveris fieret dissecio, ut nobis abdita causa mortem accersens innotesceret, sunt inventi in inferiore ventre lumbrici, qui intestina & præsertim colon perforaverant.

Exactis ab hoc sex mensibus, cum similibus doloribus altera interfecta fuisset, dissecione factâ non solum intestina exesa, & vermibus transfixa vidimus; sed etiam cor & hepar ab iis corrosum & aliè excavatum, quæ res non parvum stuporem adstantibus omnibus incussit, quærentibus, qui ab intestinis, quaque via ad hepar, & cor venerint, cum in illis locis vix alimentum sibi familiare, neque materiam vermium generationi idoneam, quamquam ex putredine quadam ibi nata, quispiam eos genitos existimaverit; adde nec viam paratam, sed tot anfractibus aut circumvolutionibus impeditam habuerint. Quare nihil aliud quàm naturæ opera mirari, causam scire non valentes, potuimus; sed hinc discedentes, præscriptis tum pulveribus ex scordio & dictamno albo, & unguentis vermes fugantibus necantibusque, reliquis quæ adhuc superflues erant puellis, horum generationem in posterum prohibuimus.

## OBSERVATIO XIV.

*Tumor Oesophagi.*

**N**ONNUMQUAM tumor in oesophago succrescit, qui cibos deglutiri non permittit, ægerque inedia debilitatus, vires amittere solet; ejus curatio ut interim cognitionem fileam, non parum etiam oculatissimis faceffit negotii: quam sic felici successu præscribere consuevi, primum victus ratione præfinitâ, adhibitisque universalibus remediis, id est sanguinis missione, (præsertim quando febris aut inflammationis suspicio subest) item purgatione, revulsione per cucurbitulas. Linctus sequens ex usu est.

℞. Conservæ rosar. symphyti majoris, ana ℥. ss. confer. viol. 3. ij. boli armeni orientalis 3. j. ss. mucilag. sem. cydon. extractæ ex aqua rosar. 3. ss. cum syr. cydonior. fiat linctus quo sæpe utatur æger: exterius verò supra collum hujusmodi unguentum admovendum est.

℞. Oesopi, medullæ cruris bovis, axungia gallinæ, anferis & anatis, ana 3. ss. mucilag. althææ & lini, ana 3. vj. olei nymphaeæ 3. ij. croci 3. ss. ceræ albæ q. s. fiat unguentum lotum ex aqua hordei & nymphaeæ, hoc ter aut quater die ac nocte collum liniatur, lanâ succidâ superadditâ.

## OBSERVATIO XV.

*Scabies Fæda.*

**N**UNC me convertam ad labiorum scedam quandam scabiem, cum oris ulceribus conjunctam, quæ multum mihi, ut eam discuterem, exhibuit negotii, sed tantum his remediis cessit scabies, ulceraque sanata nunquam repullularunt. Nam adeo cacoëthea erant, ut conatum omnem respuere viderentur. Itaque post universalia remedia his topicis usus sum.

℞. Clavicularum vitium, fol. plantaque caprifol. tribuli terrestris, an. m. i. rosar. rubr. hordei, lentium, an. p. j. fiat decoctum ad ℥b. j. In colatur. dissolve succi granator. & diamori an. 3. ij. hoc decocto frequenter os colluere oportere dixi, labiis verò jussi sequens medicamentum adlini.

℞. Pul. coralli utriusque usi & loti, cornu cervi itidem usi & loti, an. 3. ij. corticis burgiæ 3. j. ss. cum pomata & syr. de rosis ficcis, fiat linimentum: soleo etiam penuria pomatæ pulveres dissolvere in cerâ alba liquefactâ, & axungia hirci recenti.

## OBSERVATIO XVI.

*Hernia.*

**P**RÆTER multorum expectationem, ramicem intestini & omenti auxiliis infra dicendis curavi, sine Chirurgi manu, maxime verò eum, qui quendam germanum ludimagistrum Avenione anno 1543. torquebat, qui herniam intestinale decem annis passus fuerat, non sine doloribus gravissimis, australi constitutione ingruere solitis. Huic igitur imperavi, ut in lecto se contineret mensem unum



unum simul, quantum fieri posset, adductis cruribus, non divaricatis, victu exsiccante uteretur, nisi fortè prunis elixis ex saccharo & aqua ad alvum subducendam, nullis crudis, flatuosis, & coctu difficilibus, præter suum, hædorum, aut arietum pedes, vesceretur, his autem medicamentis usus est.

℥. Terræ sigillatæ, rad. consolidæ major. boli arm. veri, ana ℥. ij. cornu cervi usli ℥. j. capiat per 14. aut 15. dies 3. j. β. aut 3. ij. manè ex juscule capi. Deinde

℥. Sanguinis draconis, mumie, massiches, thuris, rad. conf. major. boli arm. limacum rubrarum, erinacii terrestres pulverisati, ana ℥. j. incorporentur omnia terebinthina, & fiat emplastrum, quod admoveatur inguinibus. Verum scire licet, universalis auxilia pro ratione morbi præcedere debere.

## OBSERVATIO XVII.

*Fœtus mortuus.*

**V**Ocatus fui à nobili quadam muliere, quæ febre continuâ graviter laborabat, cui semestri graviditate per febris vehementiam, fœtus in utero suffocatus fuit, qui cum multis & variis remediis foras extrudi non posset, tandem myrrha cum chrysololla & vino Hippocratico propinatis, admotoq; ventri cataplasmate ex colocynthide, utroque pulegio, sabina, arthemisia, matricaria, herba cati, magno puerperæ conatu prodiit, non sine summa medicinæ laude, cum illa in summo vitæ periculo constituta, tandem excluso fœtu, à febre ardentissima immunis fuerit, quanquam ab hinc sex aut 7. menses morbo acutissimo decumbens extincta fuit.

## OBSERVATIO XVIII.

*Strumæ.*

**M**Orbus est frequens & curatu difficilis, strumæ à Medicis dictus: eo si à D. Præsidis Nemausini Claveri affecta fuerat dum in vivis esset. Itaque à multis Medicis vario usu Medicamentorum vexata, nihilo melius se haberet, sed magis atque magis saviente morbo, collum ipsius putris, vitiosusque humor depasceretur; tandem ego vocatus, post præscripta ut decet medicamenta purgantia ei emplastrum choetadicum ab Aëtio descriptum, diligenter sanie expressæ exterisq; superponi jussi, deinde tertio quoque die eodem medicamine renovato prius ut (dictum est) ulceribus exieris, eoque quater aut quinquies repetito, sana in totum effecta est. Quod si choetades non sint ulceratæ, sole earum duriciem pulvere pyritis lapidis simul cum diachylo ireato malaxato remollire atque tandem aperta cum ferro candente, aut caustico medicamento fordem intus contentam digitis exprimere; postremò emplastrum choetadicum superligare, nec ante triduum solvere, quod semper est observandum, idque tamdiu iterare, donec completa videatur curatio.

## OBSERVATIO XIX.

*Tertiana duplex.*

**P**ræfectus Præsidii Bellicadrensis, D. de Râcoine quotannis solebat in Gallia apud suos tertiana duplici affligi, biestri aut trimestri spatio: is cum in Narbonensem provinciam profectus fuisset, simul cum Protomacho nostro non multo post eodem morbi genere correptus, me ad se visendum vocavit, qui tristis admodum cum putaret, (ut solebat) se diu hac febre vexatum iri, rogavit me, ut si quod remediū haberem, quoturò tertianam duplicem expellerem, sui causâ explicarem. Respondi me, (Deo duce) votis suis satisfacturum, si modò mihi morem gereret. Itaque injecto eodem die clystere, postridie verò, cum urinæ in principio subcrudæ apparerent, consilium Avicennæ sequutus, non ante secundam aut ter-

*Lazar. Riverii Opera.*

tiam accessionem, in quibus urinæ coloratiores conspiciuntur, basilicam dextri brachii secare jussi, & sanguinis uncias sex aut 7. evacuari: interim præparantibus juraliis manè utebatur, quibus vix dum finis, miratus fuit decumbens, febris accessionem sequentem ferè nullam fuisse peractaque purgatione, posthac ne vestigium quidem ullum febris subrepisse, quamobrem supra quàm dici potest lætus, quòd tam brevi temporis curriculo curatus esset, aliis suis commilitonibus (æstas tū ardebat) simili febre agrotantibus suasit, ut sese curandos mihi committerent, qui omnes simili ratione sanitati fuere restituti.

## OBSERVATIO XX.

*Dolor Ischiadicus.*

**I**ngenue & bonis moribus imbutus Antonius Clemens Bellicadrensis, Ischiadico dolore tam vehementi vexatus fuit, ut opem à Medicis Monspelienfibus quærere coactus fuerit, præcipuè verò à D. de Fegnes, Doctore Medico, qui tunc temporis maximam sibi famam, ob raram in curandis morbis dexteritatem, comparaverat. Is nec ischiadicæ venæ apertione, nec purgantibus catapotis, diætâ vulgò dictâ, nec denique fotibus, cataplasmatibus, hypocaustis, emplastris, cucurbitulis, dolorem tam acerbum pacare poterat, quinimo eo in dies magis ac magis urgente, æger se ulterius vitam prorogare posse diffidebat. Fortè verò, cum Nemauso Bellicadram confugerem, quo tempore per cancellos ferreos aquam fontanam excipientes, viri religiosæ factionis, antea circumlimatos, sunt subingressi: & me ad se invisendum vocare, auditis iis, quæ D. de Fegnes præscripserat, admoveri cantharides ex fermento veteri, loco dolenti jubeo, unde post vesicas excitatas atque acu perforatas, tanta humoris serosi copia vacuata fuit, ut optata quies subsequuta fuerit, nec in posterum dolor hominem affligeret, verumtamen ulceribus quæ à cantharidibus inflicta erant sanatis, jussi ut per aliquod temporis spatium locus dolens emplastro ex diachylo & diameliloto compacto tegeretur, adjecto sulphuris ignem non experti momento, & seminis iberidis atque nasturtii pari pondere.

## OBSERVATIO XXI.

*Ulcus fordidum.*

**N**on diu est quando D. Comes de Tantem, vir & generis nobilitate & animi corporisque præstantia clarissimus, novissimè pulmonis ulceribus extinctus, ulcere cacoëthe, in tibia sinistra omnem consolidationem respuente affectus erat. Is cum esset rerum antiquarum studiosissimus, & me jussisset accersiri ut quandam in veteri numismate inscriptionem interpretarer: postquam de variis hinc inde rebus verba fecimus, me rogat, ut si quid haberem, quod ulcus tibie ad cicatricem perduceret, id sibi impertirem; nam alia atque alia nihil conferentia expertus nunquam sanari posse sibi persuaserat. Ego verò non potui tanto viro operam studiumque meum denegare proinde si velis (dixi) meis dictis auscultare, brevi futurum est, ut sanitati pristina restituaris. Atque adeo coepi post remedia universalis, præfinitamque rationem victus idoneam, hoc linimentum sequens præscribere, quo intra 12. aut 15. dies planè curatum fuit ulcus. Interim tamen volui, ut hoc syrupo, ne ulcus recrudesceret 14. diebus uteretur per intervalla.

℥. Ramentor. ligni guaiaci ℔. 6. infundatur in ℔. 12. aquæ Rhodani, postea fiat decoctio ad medias, in fine ejus adde polypodii quercini ℥. 4. carthami ℥. ij. turbith. ℥. j. agarici ℥. β. Rad. pentaphilli ℥. iv. colaturæ adde mellis rosati & sacchari rub. ana ℔. j. clarificetur & aromatizetur ℥. 6. fantali rub. fiat syr. semicoctus, de quo sumebat ℥. v. vel vj. tertio vel iv. quoque die, addebam sennam quando alvus non bene respondebat, ulcus abluebatur frequenter aqua alum. forma linimenti erat hujusmodi.

Eeee 2

℥. Axum-



℥. Axungiae porci ℥iij. axungiae hirci 3. ij. fol. hyoscyami coctorum sub cineribus & diligenter contutorum cum axungis m. i. litharg. cerussae diligenter lotae, an. 3. j. plumbi usti & loti antim. min. an. 3. ij. agitentur in mortario plumbeo, fiat linim. addito tantillo opii cum dolor intendebatur; postea num a grè adhuc cicatrix ducuntur jussi laminulam plumbeam in aceto macerari triduo, deinde siccare, & pulverem subtilissimè ulteri aspergi, alteramque integram superimponi, & sic voti sui compos, unde laudem eximiam (ut præmium sileam) reportavi.

## OBSERVATIO XXII.

*Virgæ Caruncula.*

**Q**uidam Monachus familiae D. Augustini, Ambrosius nomine, caruncula in collo vesicae oborta, inter meendum vehementer torquebatur, & ad eam abstinentiam multorum operum imploraverat. Nam jam a quinquennio morbus suas radices egerat. Cum verò in dies acerbiores dolores experiretur, licet pulvere fabinae per ceream candelam intruso, aliisque hinc inde uteretur, fortè occurrit mihi obviam præ dolore veluti mentis impositus. Non possum (inquit) diu loco consistere, nec mihi temperare, quin è sublimi me præcipitem dem, tam acri dolore crucior. Ego miseratione commotus, verbis lenibus animum effrænè quàm potui placidè mulcere volui, meque de sua salute bene speraturum nuntiavi, dummodò recta vivendi normâ servatâ meis jussis obtemperaret, quod certè aliquandiu sedato dolore se præstiturum mihi pollicitus est. Consului igitur ut perpetuò virgulam plumbeam in urinario meatu teneret, sic agendo, ut quàm fieri posset, sensim & placidè per collum vesicae, licet angustum, in vesicam intromitteretur, periculo primum factò à gracili & tenui virgula, deinde gradatim ad crassiores veniendo, donec liber esset ejus in vesicam ingressus, atque hoc in auxilio diu persisteret. Is itaque cum nocte dieque plumbeum radiolum, ut jusseram in urinaria fistula teneret, mihi tantam utilitatem, intra 15. dies se percepisse retulit, ut liberè jam & indolenter lotiù redderet; iterque urinæ adeò fuisse pervium, ut nullis amplius ad meendum medicamentis egeret.

## OBSERVATIO XXIII.

*Hemitritæus.*

**C**onvocati fuimus ad curationem hemitritæi D. Quæstoris Nemaufensis, de Rage vocati, D. Ferrandus, Castellanus, & ego. Cumque in consultationem venissemus, D. Castellanus, ecquid sentirem de morbo Quæstoris à me primò (cum primus eum inviserim) sciscitatus est; Respondi ingenuè, illum vero hemitritæo laborare, atque ea de causâ egere optimis & promptis remediis, nam tertio quoque die tertiana cum rigore hominem affligebat, nec post sudorem, declinationi tertianæ supervenientem, erat unquam *ampt.* Meæ opinioni acriter repugnabat D. Ferrandus, ut erat ingenio ad contradicendū proclivi, dicens in febricitationem inter duos paroxysmos percipi, propterea tantum esse tertianam notham majori famæ asserebat. Contrà ego audacter affirmabam, delitescere quotidianam continuam, addebam febrem, si fuisset notha, non tantas vigilias, non lipothymias excitaturam; præterea hemitritæum, autumno sæpius quam alio tempore accidere, in quo æger noster correptus erat, denique gulosos homines & catillones (qualis ipse erat) potissimum infestare. Vocatis in testes non solum optimis quibusque Medicis, sed etiam Martiale.

*Uri Tongilius malè dicitur hemitritæo.*

*Novi hominis vires, esurit atque sinit.*

Deinde in fine Epigrammatis:

*Omnes Tongilium Medici jussu lavari.*

*O stulti febrem creditis esse! gula est.*

D. tamen Castellanus perrogatis auditisque sententiis, subscripsit D. Ferrando, atque os in me convertens

subjecit hæc verba, non mirum videri debet (inquit) si quædam febricula subsequi tertianam videretur, nam cum febris hæc notha sit, plurimam habet crassam pituitam permixtam, qua de causa sumi elevati ab ea diutius perdurant, appositè citato exemplo Gal. lib. de diff. febr. de lignis viridibus; quæ quidem difficulter flammam concipiunt, cā verò extinctā, longo temporis intervallo sumus crassus ex eis attollitur, quod non contingit lignis aridis: itaque, inquit, cum ratio curationis non valdè diversa sit inter hemitritæum & tertianam notham, hoc inter nos sit statutum, sanguinem promptissimè mittendum. Porro licet omnia hæc & episthemata ad cordis roborationem, multaque alia ex arte administrarentur, æger ab hinc tribus aut 4. diebus vitam cum morte commutavit, cumque fama de ejus obitu ad aures Castellani pervenisset, mutavit sententiam, dixitque hemitritæum verum ægrotum jugulasse; tamen D. Ferrandus noluit ad latum unguem de persuasionem discedere.

## OBSERVATIO XXIV.

*Polypus.*

**U**Xor Antigraphi Urgensis polypo deformis erat, dolebat autem quòd Chirurghi citra excisionem vix posse sanari contendebant cum Medicis; accedens igitur ad me, post congruentem traditam vietus rationem, præscriptamque purgationem, jussi ut capitellum Vigonis origini nervorum adinoveretur, deinde hoc unguento polypus ungeretur, quod est.

℞. Corticis malor. granat. gallarum viridum, ana 3. j. β. summitatum fabinae exsiccatarum, & pulv. 3. i. chalcitidis uste 3. i. β. usti aluminis & hermodact. an. 3. iv. cum unguento ægyptiaco polypo applicabatur, interim dum hoc utebatur, circumlinebantur loca propinqua refrænantibus, unguento de bolo, vel de lithargyro cum succis deinde.

℥. Plumbi usti & loti 3. i. β. corticis cucurbitæ longæ uste 3. i. antimonii, lapidis calaminaris diligenter lotor. an. 3. iv. testarum cancrorum fluviatiliū vel marinor. 3. i. β. tuthiæ præp. 3. ii. succi plantaginis & solani depurati, an. 3. i. β. olei ros. omph. 3. iv. dilucantur diu in mortario & pistillo plumbeis, addendo succi gran. 3. j. β. per vices abluebatur locus aqua aluminosa, & citra Chirurghi manum brevi extirpatus fuit polypus.

## OBSERVATIO XXV.

*Pustula Faciei.*

**Q**uidam occurrunt affectus, qui licet ut parvi momenti negligantur, rariò Medici eorum curationi præstant, tamen quòd molesti sint, & pertinaciter hæreant, non sunt contemnendi. Ita rem habere sæpe usu venit, vel non ita diu in quadam muliere, quæ nullis remediis faciei intensum ruborem cum multis variis pustulisque illam indecore dehonestantem, quales bibaces homines, popinas sectantes habere solent, abolere poterat; quamvis famosos Medicos ad id agendum adhibuisset. Illi consului, regimine vitæ humectante & refrigerante præscripto, & tusa jecoraria vena, itemque sumpta per triduum opiata, sensim dosim ejus augendo, humores adustos evacuante, hac aqua destillata faciem ablueret.

℥. Summit. myrti, & mali gran. oleastri, ceterach. plantag. morel. quæ species solani est, claviculæ viris, an. m. iv. uvarum acerbarum cum pediculis, vel lan brascarum ℥. ii. incidantur & irrorentur aceto, & aqua destillata reservetur usui.

℥. Aquæ præscriptæ 3. iv. aluminis usti 3. vi. albutinis ovorum fortiter agitatorum 3. i. admoveantur facie eundo cubitum, & abluatur frequenter facies prædicta aqua Postea.

℥. Tuthiæ



℞. Tuthiæ præpar. cerussæ ustæ, an. ℥ij. lithargyri. ℥i. succi plantag. æquæ superioris destillatæ, an. q. s. olei myrt. ℥. ij. olei de vitellis ovorum ℥. j. incorporentur simul & reducantur ad formam nutriti & adde chalcitidis ℥. iij. aluminis ℥. ij. sulph. ℥. i. succi citri ℥. i. β. applicentur noctu mane verò abluatur facies aqua destillatâ: si istis medicamentis non cessisset, addissem argenti vivi ℥. i. aut eo plus. Sed cum rubor & vari evanuiscent; nihil opus fuit quippiam adjicere.

## OBSERVATIO XXVI.

*Cholera Morbus.*

**A**Nno, si bene memini (1564.) antequam pestis Nemausum adoriretur, grassatus est morbus, cholera vocitatus, multos intra 4. dies interficiens. Attamen illi qui in primis morbi insulibus auxilium petebant, ferè omnes hac curandi methodo evadebant. In primis, cum satis evomuisse ægrotantes conjiciebam, ne vires collaberentur, mivam cidoniorum aromaticam, febre non admodum intensa, quod si intensa erat, mivam simplicem mane & vesperi duabus horis ante cibum propinabam ex cochleari argenteo, omni circumscripta potione aut saltem parcissima concessâ, licet ægri inextinguibili siti cruciarentur, quandoquidem potio & vomitum & alvi fluxum adaugere, unde mors inevitabilis sequitur. Torpori & convulsionibus tibiarum oleo chamæm. calente succurrebam, vomitui verò & alvi fluxui embrochis ex oleo nardino, mastichino, cydoniorum, totius ventris regionem irrigabam, superasperfis pulveribus coriandri præpar. ros. mastiches, menthæ siccæ corticis citri sicci, ligni aloës, laudani, nucis moschatæ, coralli utriusque, & similibus. Opiatam etiam sumebant ex conserva rosar. mirbal. conditis pulv. margar. & corall. rubri, & eboris, cum syr. cydon. & de ribes formatam: interdum, si vires validæ erant in morbi principio rhabarb. cum substantia exhibebam, non posthabitis epithematis, cardiacis, iisdem remedium formulis in pueris tali fluxu, aut colliquativo nominato emaciatis, æstare præsertim, pro ratione ætatis, injectis interdum clysteribus etiam, partim roborantibus partim reficientibus, uti suadebam, & ferè omnes salutem (Dei benignitate) adipiscebantur.

## OBSERVATIO XXVII.

*Hæmorrhoidum dolor, & ani procidentia.*

**Q**UIDAM insulanus, comitatus Venayssini, vehementi hæmorrhoidum dolore torquebatur: qui nullis anodynis præscribi solitis cedebat, nimirum fortibus ex malva, herba hæmorrhoidali; floribus tapfi barbati chamæmeli, neque unguentis ex butyro. adipe recenti anseris gallinæ, oleo de semine lini, atque hujusce farinæ, aliis sexcentis, quapropter dejecta appetentia, vigiliæ, vires prostratæ subsequutæ fuerant, sed neque mucro fistulæ, per quam clysteres injiciuntur, in anum intromitti poterat, adeo venæ illæ hæmorrhoidales propinqua loca tumefecerant, quæ causâ fuit, cur alvus nullas fæces spatio octo dierum excreverit, quamvis cassiam recentem æger bis devorasset: tandem verò à quodam dicto Germano, illac transeunte monitus, multis fortibus ex emollientibus repetitis, unguentum de succo nummulariæ cum butyro recenti non rancido parari jussit, quo turunda illita & sensim intromissa dolorem compescuit; unde somnus optatus sensim surrepsit, appetentia revocata fuit. Eidem ægro paulò post intestinum rectum prociduum fuit, quod hoc remedio curatum nunquam postea foras exiit.

℞. Olei mastich. q. s. in eo bulliant scarabæi N. S. deinde oleo ungatur intestinum supra asperfo pulvere putaminum ovorum, ex quibus pulli fuere exclusi: idem Germanus mihi afferebat succum blattariæ itidem mirè dolores omnes hæmorrhoidum mitigare.

## OBSERVATIO XXVIII.

*Febres Elodes.*

**D**ominus Richerius, Consiliarius Regius Nemausinus, subito dolore & gravissimo in inferiori parte metaphreni, cum in horto qui prope ædes suas erat, quippiam moliretur, correptus est. Cum autem præ dolore stare non valeret, sed coactus fuisset in lecto decumbere, coepit febricitare, nulla tamen siti premebatur, quod febris non admodum acris eum urgeret. Præterea nihil illi caput dolebat, satis ex sententia dormiebat. Postero die sudore totum corpus maduit, nullis medicamentis provocato, at sponte foras prodeunte, ex quo dolor metaphreni sedatus fuit. Cæterum ab eo multo copiosior sudoris facta fuit emissio, scilicet tanquam ex rivulis undequaque disfluentibus emanasse quivis potuisset conjicere. Et hoc quidem usque ad nonum diem: nullis etenim diaplasmatis, ad sudores immodicos cohibendos comparatis potuit supprimi, inò nec frequenti ventilatione, nec stragularum refectione, nec fenestrarum aperture, quo pervius ventis in cubiculum introitus fieret; sed viribus sensim deficientibus loquendo & ut dicitur domi suæ disponendo repentina morte præventus fuit nullis aliis symptomatibus, cum sudore coeuntibus. Jam verò licet & clysmatis & medicamentis per alvum evacuantibus uteremur, ut naturæ impetum à centro ad superficiem, tandem à superficie ad centrum revocaremus. Verumtamen auxilia omnia nostra irrita fuerunt, nec unquam à tanto sudoris effluvio ægrotantem vindicare potuimus. Omitto rationem victus ex solidis & viscidis alimentis præscriptam fuisse, ne ex subtilibus, humidis, velociterque nutrientibus, eorum quoque velox, ut ait Hipp. per cutem fieret excretio. Itaque omnes Medici uno ore extitisse febrem eam quæ Elodes aut Typhodes à Galen. nuncupatur, affirmarunt. Nam (inquit) in ea febre parum aut nihil ex sudore juvantur ægrotantes, qua de causa plerumque lethalis censetur. Interim notandum, sudorem usque ad extremum diem manasse calidum, quo quidem die frigidissimus extitit.

## OBSERVATIO XXIX.

*Paralysis.*

**N**on possum oblivioni tradere paralyfin complexam, ita à practicis dictam, matris clarissimi Jurisconsulti & benevolentiae vinculo mihi conjunctissimi. D. Favarii, Nemausensis, quæ tum nata erat annos circiter 64. Ea igitur paulo ante vergiliarum occasum, sub vespere repente in paralyfin dextri lateris incidit, ita ut nec valeret distinctè loqui, nec corpore notæ sufficiebant vires (ut inquit ille) id est artus dextræ partis motu & sensu destituti fuerant. Huc accedebat summa capitis gravitas, non sine magna ad sonnum propensione, & tum ei alvus non liberè fluere, statim injecto clystere, partim ex emollientibus, partim ex herbis capitalibus, in colatura dissolvitur hiera Nicolai, cum diaphanico, oleo chamæmel. & melle anthos. eoque hinc ad horam è lecto, cum sacibus plurima excrementa pituitosa educta fuerunt, sub noctis autem gallicinio jussi deglutiret 7. catapota ex foetidis cochiis cum ij. gran. trochisc. alhandal. composita, excepta verò syr. stœchade, quæ circa auroram tantam pituitæ crassæ & viscidæ, cum portione quadam biliosi humoris tenuis eduxere; ut jam capitis gravitas & sopor magna ex parte diminutus videretur. Tertio die sumpsit apozema confectum ex rad. galan. crassæ calami aromatici, herbis beton. melis. yva arthritica, salvia, hyssopo & cæteris hujusce ordinis, cum oxymel. scillitico, de quo quatuor doses diebus sequentibus mane hausit, post quas, iteratis catapotis paulò ante dictis, meliusculè coepit habere. Nihilum tamen vel minimum dimovere digitum ex affecta manu potis erat. His peractis, errhinis & apo-



phlegmatifinis extrema quædam cerebri mucosa per nares & os ejecta fuere, abhinc verò tres dies, mane & vespere, diæta de guaiaco, cujus colatura aromatizata erat pulv. nucis moschatæ (cujus alioqui porciunculam linguâ assidue in ore continebat: interdum etiam diamofcho dulci usa est, hacque epota cum secundo decocto, spatio 25. dierum membra paralisi affecta sensum quandam recuperasse, motumque obscurum obuisse deprehensa sunt. Sed postquam hypocaustis ubi abundè lapides candentes decocto fol. lauri, lavend. pseudospicæ, flor. utriusque stœchados, chamæm. callitrici, fuerunt extincti, sudor provocatus fuit, & unctionibus calidis ex martiato, opopanace, oleo de castoreo, de piperibus, vulpino, & cæteris hujusmodi per totam dorfi spinam & membra affecta calidè uncta fuit, in totum sanitatem adepta est. Præterea victus ratio per totum morbi curriculum siccans injuncta fuit. Hac methodo à me non pauci sanati sunt, quæ artuum & linguæ motus erat denegatus.

## OBSERVATIO XXX.

*Melancholia hypochondriaca.*

**A**ffectus existit non admodum frequens, attamen curatu difficilis, cujus malitia vix in facie detegitur, unde à vulgo serè deridentur eo detenti, male se ægrotare dicentibus, cum bene se habeant ad ea, quæ offeruntur, & negotia sua interdum sanorum more plerumque obire valeant; nihilominus tamen variè exagitantur; tum quia insomnes noctes traducunt; tum quia vaporibus, à ventriculo atque hypochondriis sursum elatis, aurium tinnitibus obtunduntur; multi timorem sibi incutiunt, alii tremores cordis patiuntur, quidam tanquam mente alienati absurda secum murmurant, & vitæ tædio multa de morte oppetenda animo versant, quosdam rugitus & murmurilla ex hypochondriis exeuntia cum multo & frequenti sputo exercent, nonnulli incendium quoddam in illis partibus, perinde ac si phlegmone obsiderentur, sentiunt. In summa, tantis malorum symptomatum concursibus devexantur, ut vel exercitatissimis in operibus artis medicis multum negotii præbeant, antequam illorum ingentem pertinaciam funditus expugnare queant, Hic autem affectus melancholia hypochondriaca à clarissimis Medicis vocatur, qua diu quidam Franciscanorum, vir Doctus Pibris nomine, alioqui boni habitus corporis, & ætatis virginti, inquietatus fuit. Atque adeo hujus occasione suggestum, in quo concionabatur, subito cordis tremore, cum scotomia correptus, vacuum relinquere sæpe coactus fuit. Jam verò is ab omnibus serè prædictis symptomatibus à tribus aut quatuor annis (ut assererat) afflictus fuit, nec quicquam levaminis ex tota Tholosatiensium Monspelienfiumque Medicorum præscriptis se percepisse referebat. Itaque me summè obsecravit, ut calculum meum reliquis adjicerem, etiam si ab aliorum sententia desciscere vellem. Respondi me totis viribus (visis atque discussis quibusque schedis) quas præ manibus habebat, in eorum consensum descendere, attamen non gravatè me traditurum ea quæ longò usu non tantum in aliis, sed in me ipso, dum adolescentiæ fines non præteribam, felici successu periculum fecerim; fortè enim futurum (inquam) ut inter tot & tanta remedia novissimè tentata, sint profutura, spemque aliquam sibi relictam debere, cum præsertim egomet tali affectione laborans, Dei beneficio salvus jamdudum evaserim. Quare verbis meis aures adhibens, animum bonum habuit, ut tantis malis mea ope liberatum iri sibi tandem persuaderet. Nec certè sui ipsius persuasio vana fuit; nam remedium usu, à me præscriptorum, intra bimestre spatium optatâ sanitate potitus est. Illi igitur post traditam victus rationem, parum ad frigidum & humidum temperamentum declinantem, qualia sunt juscula ex carnis caponum, vervecis, hædi bene habiti, cum borragine, & modica lactuca parata, item perdices, turdi pingues, coturnices, atque hujusce generis aliæ aves assæ modicè, pro potu vino concessio oligophoro, aquâ largâ limpidâ, & qualitatis experte diluto, atque rubello. At

prohibitis caseosis omnibus & sanguinem crassum atque melancholiam generantibus, proculque remotis animi affectibus, tristitiam timoremque inducentibus, jussi ut hac clysinatum formula bis in hebdomada uteretur, etiam haud alvo difficulter se exonerante.

21. Juris intestinorum vervecis q. s. in eo decoquantur mal. acanth. borrag. ana m. i. flor. trium cordial. chamæm. ana p. i. passul. à vinaceis purgat. p. 20. in colatura 16. i. β. dissolve cassiæ cum sacch. & cathol. ana 3. vj. olei viol. 3. iij. sacch. rubri 3. j. misceat clysinâ. Præterea portionem sequentis opiatæ laxantis octavo quoque die sumeret.

22. Pulpæ passular. & sebesten, ana 3. j. cassiæ recent. è theca sua exemptæ, & cathol. ana 3. i. β. cum syr. violata fiat compositio ad instar opiatæ, de qua sume 3. x. vel ad summum 3. i. β. mane horâ 5. ex colatura decocti buglossæ, cicerum rub. passul. glycyrr. & flor. cordial. interdum etiam simplicem cassiam saccharo involutâ ad 3. i. devoraret, nec permisi usum vehementiorum catharticonum, ne exagitata morbum committente materia tanquam crabro (ut ex proverbio) irritatus magis atque magis sæviret, quandoquidem æquo medicamentis acrioribus laceffita, violentius fuerit, ac sursum vapore ejus irruente & vigiliæ & aurium tinnitus cum cordis palpitatione majores molestioresque redderentur, ut hinc non facillè symptomatum ferocitas mulceri queat. Tribus aut quatuor diebus post sumptam opiatam præcepi apozema ex endivia utraq; borrag. capillaribus, uvis passis mundatis, gly. cyrr. seriatim ebiberet, postridie verò iterum opiatâ purgarem, qua iterata magnam percipit utilitatem, nimirum sensum vacuatâ bona parte humoris adusæ, atque melancholici. Jam verò paucis post diebus, jussi ingrederetur balneum dulcis aquæ tepidum, manè jejuno ventriculo, alvoque exonerata ibique moraretur selsui horam, nullo sudore elicto. In illo incoctæ erant mal. violæ, aliquot folia lact. (instabat enim æstatis principium,) borrag. fuit autem continuatum balneum 5. aut 6. dies. Alvo suo officio non fungente, injiciebatur præscriptus clyster, atque his peractis, longè se habuit melius, nempe somno revocato; sedatoque cordis tremore; postremò alienis imaginationibus mentem perturbantibus extinctis, & quum adhuc aurium quidam tinnitus relictus esset, in aures oleo cucumeris asinini cum tantilla castorei portione instillato, discussi status fuerunt. Ad reliquias autem symptomatum, hac opiatâ sequenti cardiacâ, quam alternis diebus ad 3. β. usurpabat, in totum à tantis periculis perfunctus fuit.

23. Conservæ violarum & bugl. utriusque, ceterach, ana 3. i. β. passul. dulcium recent. à vinaceis purgat 3. i. cort. citri saccharo conditi 3. iij. confect. alchermes 3. ij. pulv. margarit. electarum 3. i. cum syrupo de pomis redolentibus simplici. Fiat cardiacâ opiatâ. Denique ut jucundas hominum conversationes frequentaret, suasi. Omitto, hypochondrium sinistrum post purgationem solum fuisse ex decocto mal. flor. tamarisci, chamæmel. chamæd. rap. cappar. ceterach, agnicassi, linguæ cervinæ, adjectâ aquâ fabrorum: nam lien tumere videbatur.

## OBSERVATIO XXXI.

*Hysterica passio.*

**M**ulieres ex utero suffocatio frequenter infestat, in vitæque discrimen trahit, maximè quibus vel menstrua aliqua occasione fuerunt suppressa, vel à viri societate pudicitæ aut honoris ergo alienatis, viduitas solitariae vita cordi est. A qua tamen difficulter suscitantur quædam, quædam nullâ ope quamvis præptâ arte præstita in priorem statum referuntur. Quapropter non gravabo aliqua omnium quæ novimus præstantissima adversus præposteram istam atque periculosam affectionem scribere, quibus illas veluti exanimas in naturalem constitutionem reddimus. Primum itaque post injectos clysteres eccoproticos, statusque discutientes, cum iis quæ (ut loquuntur practici) uterum respiciunt, qualia sunt Origanum, Arthemisia, Matricaria, herba Cati, stœchas; chamæmelum, sem.



sem. anisi, cumini, fœniculi, baccæ lauri, dissoluta autem Hierâ Nicolai, Catholico, oleo rutaceo, & aliis hujusmodi: non neglectis postea cucurbitulis, imo ventri admovendis, frictionibus inferiores partes calefacientibus, fœtidis naribus objiciendis, beneolentibus autem, ut gallia moschatâ, benzoino, styrace, suffitu aut illitu subjiciendis, postero die catapotia ex hiera Nicolai, vel Ruffi (si vires suadeant) devoranda præcipio. Cæterum si tam urgens sit symptoma, ut actionem catapotiorum expectare non patiatur, emplastrum ex Asphalto umbilico accommodandum crit, aut oleum ex lapide gagate parva copia liniendum; deinde propinanda potio ex decocto artem. in quo camphora selecta, identidem igne accensa, extincta sit. Quod si neque ob hæc excitentur, os aperire togendæ sunt, si maxillæ (ut sæpe fit) adeo cohæreant, ut potui non pateat aditus; compage quadam lignea, vel ferro ad id destinatum; tum demum pulvere fol. anagris 3. i. ex aqua destillatâ artem. ingurgitandæ, (ut ita loquar) veniunt; multas siquidem semimortuas hoc remedio restitimus. Denique semel liberatæ, si menses suppressi suffocationis occasionem præstiterint, missione sanguinis ex saphena, & pharacis menstrua cientibus, quo tempore consueverint, sunt provocandi. Non desunt quæ amuleti vice hydragryum intra nucis ponticæ corticem inclusum collo gerent, ut se à tanto malo tutas reddant.

## OBSERVATIO XXXII.

*Ulcus Verminosum.*

**Q**uidam Urgens, claris Parentibus ortus, ulcere caecoete, in tibia sinistra infestatus, nescio an incuria detentus, an præpostero regimine usus, eo putredinis illud finit deduci, ut vermiculorum innumerabili proventu refertum fuerit, adeo excussu difficili, ut nullis medicamentis ad eos interimendos aut fugandos comparatis, mirum (quæ comminisci potuimus) cesserint; sed in dies magis ac magis multiplicati, subjecta carne exesa, dolores inferebant intolerabiles. Omitto succum minoris centaurii, absynthii, persicariæ, fol. persici, quinimò calcem & æruginem, & alia sexcenta, ulceri verminoso fuisse admota, at nulla prorsus utilitate, proinde Chironis manu potius quam nostra egere videretur, tum ad vermiculos carni mordicus adherentes evellendos, tum ad tam prodigiosum ulcus extirpandum & ad cicatricem ducendum. Quare meditati mihi aliquandiu, quid tandem adversus odiosa illa animalia parva agendum esset, subito venit in mentem opilionis cujusdam canis, qui à lupo in crure demorsus similibus vermiculis torquebatur, sola autem Eupatorii herbæ ex collo gestatione innumeri quibus ulcus scatebat gregatim decidere. Unde cum ejus herbæ periculum properè factum viderem, idem hoc præstare posse in hoc viro, quemadmodum in cane, analogismo utens, mihi persuasi, licet hominis temperiem ab animalis hujus natura diversam esse, non fuerim nescius. Itaque ad priscorum medicorum imitationem volui remedium ad hominem transferre; nec me experimentum meum frustratum est, siquidem partim succo illius herbæ ulceri infuso, partim ejusdem ex collo gestatione totam vermium involutam congeriem aufugere vidimus, non sine summa Chirurgorum quibus adstabant, & amicorum quorundam admiratione, ut pote cum non qualitatibus manifestis, sed arcana nescio qua proprietate (nullis antea amaris aut acris aut acidis proficientibus) prædita, tantam luem abegerit. Itaque diligenter mundato (ut decebat) ulcere, carne sarcoticis medicamentis restitutâ, & cute cicatricem ducentibus obdurata, vir ille brevi convaleuit, qui in aliis postea, & potissimum in veterinis animalibus, simili morbo affectis, hoc experimentum ex sententiâ successisse mihi affirmavit.

## OBSERVATIO XXXIII.

*Hydrops à Calida Intemperie.*

**I**llustri loco nata mulier Nemausina, ascite graviter laborans, quamvis laudata victus ratione uteretur, à potu-

que nisi parçissimè abstineret, attamen ejus venter, crurâ quoque in tantam molem excreverunt, ut respirandi progrediendique usum ademerit. Cum verò paucis ante diebus, apozemata, opiatas, & decccta quædam à D. Schiornio præscripta sumpisset, detumuerant quidem aliquantisper crura & venter. Cæterum errore bibendi repetito, major & tumoris moles, & respirationis facta fuit læsio, quapropter, postquam narrata omnia mihi fuerunt ordine, quæcumque fuerant illi administrata, inspecto primum lotio; eoque admodum rubro, judicavi non tantum hepar intemperie calida laborare, sed etiam rudimenta nonnulla inflammationis significari, quæ tam duri humoris in hypochondrio dextro occasionem præstaret. Quare sumptis & admotis iis, quæ intemperiem calidam jecoris corrigerent, cataplasma regioni hepatis admoveri curavimus; sed in primis potu cujuscunque liquoris interdicto, qui ad sitim sedandam paratus esset, quandoquidem stultum est ei potum propinare, à quo major irritatur sitis, ut adeo non temerè ab Ovidio dictum sit, *Quo plus sunt pota, plus sitiuntur aquæ*. Cataplasma fuit hujusmodi.

℥. Micæ panis syncomisti ℥. i. daetyl. à pelliculis & ossibus mundator. p. xij. ficuum, passularum cum suis gargaris. ana p. x. coquantur in aqua & aceto, donec mollescant. Deinde per setaceum colentur, colaturæ adde ischœnanti, myrrhæ, spicæ celticæ, santali albi & rubri, rosarum rubrarum ana 3. ij. olei amygdalarum amararum, nardini, & de absinthio, ana 3. iij. fiat cataplasma, quod tepidum applicetur regioni hepatis, manè, tribus horis ante prandium. Hoc de cataplasmate, seu majori emplastro, spatio 6. aut 7. dierum adnoto, & tumor sensim decrescere, & omnia symptomata sedari cœpere, quibus peractis, ad serosum humorem discutiendum me converti; in quem finem usus sum cataplasmate facto ex ramentis coriorum recenter ex calce paratorum, aqua sola coctis, ad putrilaginem usque; hæc enim præstantissimam vim tum flatus dirigendi, tum humorem aquosum evocandi sortita sunt, quemadmodum in hac muliere experti sumus, siquidem post tertiam aut quartam inunctionem, (hepate tamen defenso ex unguento rosato & cerato santalino,) in totum venter subsedit, atque adeo frequenti usu opiatæ, quæ recipit conservæ flor. tamarisci, cichorii, ceterach. capilli veneris ana 3. i. corticis citri saccharo conditi, conservæ rad. apii, ana 3. β. pulveris elect. triasantal. 3. ij. trochisc. diarrhod. & de Eupatorio, ana 3. i. optatam recuperavit sanitatem.

## OBSERVATIO XXXIV.

*Erysipelas, Herpes, & Lichenes.*

**D**omina de Colias, uxor D. Albenasii Judicis Legati rerum privatarum curiæ Nemausensis sæpenu-mero dum ætatem consistentiæ ageret, vero erysipelate faciem occupante detinebatur; ingravescente autè ætate, tandè herpete miliari, quo tempore erysipelas suas sedes figebat, tota fuit facies notata. Porro hic herpes plurimum Medicis exhibuit negotii. Nam nec purgatione, neque remediis extrinsecus admotis, ulcerationem prohibere potuimus curatu pertinacem. Cæterum post alia atque alia usurpata unguenta, hoc demum inculpatam sanitatem restituit.

℥. Unguenti de lithargyro, 3. i. argenti vivi, succo limonum extincti 3. β. tuthiæ præpar. 3. iij. cerusæ & lapidis calaminaris, ana 3. ij. aquæ rosarum & aceti rosati, ana 3. i. β. agitentur omnia in mortario & pistillo plumbeis. Post exactam herpetis curationem, conquesta est inecum de quibusdam lichenibus, per circuitum quo annis redeuntibus, adeo suas radices late agentibus, ut sedes suas nisi post semestrem spatium non relinquerent. Hocigitur linimentum intra 3. aut 4. dies exterebat lichenes.

℥. Styrcis liquidæ, olei rosati completi, ana 3. β. agitentur simul in mortario, donec optime mixta fuerint, iisque mane ac vespere fricabantur lichenes. Contra eos etiam efficax est aqua heliotropii.

OBSER.



## OBSERVATIO XXXV.

*Mammillarum fissura & hircus alarum.*

**N**obilis quædam matrona Nemaufina, semper partu edito, dolore acerbissimo in papillis propter ulcusculam quædam excitato solebat tentari, quæ nec unguentis, nec lotionibus sicari poterant, multo verò minùs dolor mitigari, Me igitur consulens, qui agendum judicarem adversus tam importuna mala, injunxi ut post hac, dum gereret uterum, mense uno ante partum aqua destillatitia Rhœis papillas sæpè ablueret, quod cum fecisset, proximo puello gravida nullis in posterum ulcusculis fuit inquietata, hoc remedio deinceps usæ sunt mulieres non paucæ, quæ similibus ulceribus obnoxie erant, foetu edito, maximo adjumento. Jam verò, cum forte offensis mammis ex alis ipsius, (quia hircum olebant,) gravis & odiosus odor expirabat, me obnoxie rogavit, ut quid esset, quod hunc tetrum odorem (cum is invisus hominibus reddat mulieres) aboleret, id ipsi impertirein. Unguento ex pulvere lithargyri auri composito cum aceto rosato, quo mane & vesperi axillas illineret, foedus ille odor in totum evanuit.

## OBSERVATIO XXXVI.

*Catarrhus ferinus & aphthæ, cum Phthiæos periculo.*

**M**ulier quædam Urgenensis per totam hyemem tenui & acri ad pectus defluente destillatione, ita nocte & interdiu vexabatur, ut inquieta tussiendo & exscreando usque sedere coacta esset, nec interim evacuationibus, revulsionibus, diversionibusque per cucurbitulas & frictiones, destillatio cedebat: hinc dejecta appetentia, insomnia, cruditas ventriculi, mulierem tam macilentam reddiderunt, ut Phthiæos grave periculum immineret. Proinde sequenti opiata, somno captato, emplastroque ex ammoniaco, thure, mastiche, nuce moschata, nigellâ torrefacta futuræ coronali capitis accommodato, tussis sedata, appetentiaque sensim restituta in pristinam habitudinem rediit; erat autem opiata hujusmodi.

℞. Conservæ rosar. antiquæ ʒ. ss. diacodii cum sapa ʒ. ii. pulver. diatrag. ʒ. i. misce, fiat opiata sub lingua vel inter crassiores dentes & musculos internos masseteres tenenda, hora qua somnus noctu captandus venit: & quia acris illa destillatio aphthas excitaverat, ad eas exterendas hoc remedio à me præscripto usa est.

℞. Tribuli terrestris & caprifolii, ana. m. i. hordei integri p. j. fiat decoctio ad ʒ. viij. In colatura dissolve succi malorum punicorum dulcacidorum ʒ. ii. misce. Hoc decocto colluebat sæpè os & brevi temporis spatio ulcera, quibus illud scatebat, curata fuerunt; sed paucis post diebus, recrudescente morbo, coactus fuit crustas ulcerum oleo ex Mercurio leviter illinere, quò citò deciderunt, nec in posterum ullum vestigium eorum relictum fuit.

*Sequentem Tractatum Itali cujusdam Monachi, quanquam à Riverii doctrina alienum, ut pote farragine chumica turgidum; qui tamen Arcanorum Riverianorum titulo superbit, edere sub finem volumus, ne quid morosis deesset, videretur, quod ad nostrum pertineret Author. m.*

## OBSERVATIO XXXVII.

*Ruclius Acidus.*

**D** Consiliarius Regius, cognomine Chef de bien, filius adoptatus D. Chef de bien, Quæstoris Regii, longo temporis intervallo Monspeffuli laboraverat oxyregmia, & cum ibi variis medicamentis tum assumptis tum admotis usus nihil aut parum proficeret; imò in dies se emaciari perciperet, nimirum subtracto (nihil appetendo) corpori alimento, tandem cogitavit aëris mutandi gratia solum vertere, atque adeò Urgenum properare, quò cum venisset, atque fortè fortunâ mihi obviam occurrisset, occasione mihi sui adventus explicata, suasi bonam spem de sanitate pristina recuperanda haberet (ille etenim vix se in integrum posse restitui sibi persuaserat) quin affectum non adeo esse curatu difficilem, ut non vel unius assis pretio evinci possit. Cumque primum meis monitis parum fidei adhiberet, attamen evici tandem, ut grana ʒ. aut 6. piperis integra manè, quinque horis ante prandium, jejunos deglutiret: quod cum peregisset, spatio trium aut quatuor dierum, nullum in posterum percepit oxyregmiæ vestigium, cumque antea maxime illi fuisset dejecta appetentia, inde adeo vires ventriculi fuere collectæ, ut postea avidè cibum caperet atque concoqueret, ex quo & totum corpus refocillari, & ejus substantia absumpta reparari visa est.

## MEDICAMENTA QUÆDAM RIVERIANA.

**A**rcanum Nephreticum. ℞. ocul. ʒ. cum spiri. salis imprægnat. ʒ. ij. spec. litonript. offic. ʒ. i. ss. sem. faxifrag. milii solis, ana ʒ. i. Cinam. ʒ. ii. salis apii, petrosel. onon. ana. ʒ. i. Sacchari cant. ad pondus omnium M. f. pulvis, qui sumatur in sequenti aq. ʒ. aq. heder. terrestr. ʒ. iij. petrosel. onon. parietar. ceras. nunc. ana ʒ. i. ss. Spir. juniperi ʒ. i. ss. salis ʒ. ss. m.

*Pulvis diaphoreticus.* ℞. Antim. diaphor. ʒ. ss. bezoardici miner. ʒ. bezoar. or. ʒ. ss. Lap. prunel. g. xv. Camphoræ. g. v. m. dosis ʒ. i.

*Pulvis cephalicus specificus* est pulvis Riverii de Gutta mixtus cum seq. ℞. Cinn. antim. Magist. Corall. perlat. cranii humani, unguil. alcis ana.

*Pulvis aperiens.* ℞. Antimon. diaphoret. sal. tamarisci, absinth. crem. Tart. quæ al. part. addito pauxillo spir. sulphuris & santal. rubr.

*Pilule Catholicæ*, componuntur ex Panch. Crollii ʒ. i. & Mercur. dulc. ʒ. i.

*Antivenereum in pilulas redactum*, fit ex mercurio dulci cum extr. hellebori nigri, aloës & diagryd.

*Pilule ad morbos deploratos.* ℞. mass. pilul. Ruffi. ʒ. i. Antimon. diaphoretici, gummi Guaiaci, ana ʒ. j. Cum bals. Peruv. f. pilul. dosis ʒ. i. per 30. dies, si alvus solvenda, add. Scammon. sulph. g. iij.

*Spiritus diureticus*, est Spir. Tartari ter rectific. vid. lib. xj. c. 2.

*Sal diureticum.* est Sal Tartari.

*Calomelas Turqueti*, est Mercurius dulcis, sexies aut septies sublimatus, utitur eo author passim.



A R C A N A  
**LAZARI RIVERII,**  
 CONSILIARII, ET MEDICI  
 REGIS CHRISTIANISSIMI,  
 ET IN MONSPELLIENSI UNIVERSITATE PROFESSORIS,  
 Nusquam in lucem edita.

*Tinctura Nostra Solis.*



UM multæ, & multæ potabilis auri receptæ non deliteant, quæ auri denominantur à quibusdam essentia, modum hunc mihi pariter describere lubet, ut unum ex his, cui adhærere non dubitavi, non solum doctissimi mei Præceptoris exemplo, verum & Petri Joan. Febri, sub cujus anni disciplina manipulationes primùm apprehendi, multaque ex ejus pretiosis Arcanis.

Cæteri solvunt aurum minimè dispositum, nostra autem methodus hoc modo colitur.

℞. Aurum in lamina ex purissimo, & cum Antimonio ter calcina, semper addendo crudum Antimonium; hinc à cineribus, qui optimè apparebunt, segrega, mundificatumque dissolve in aqua regia juxta dissolutiones. Dissolutum asperge guttatim oleo tartari facto per deliquium, aurum enim in profundo præcipitabitur, tuncque remota aqua per decantationem, crebris aquarum dulcium communium ablutionibus fac acrimoniam removeas: exsicca inde ad Solem, vel suprà tepidum cinerem, sed cave ab igne, nam tenans aurum est. Mox pulverem dissolve in spiritu salis facti ad usum nostrum, aut in nostro vitrioli spiritu, reponendo in calore lento per mensem, & tunc omnem dictis spiritibus tincturam communicabit. Alterum duorum separa addendo novum spiritum, donec tingatur, tinctique spiritus cuilibet uncia adde dragmam salis tartari volatilis dissoluti, digerendo in loco calido per dies quindecim. Hinc omnia iterum junge pulveri, qui jam in fundo vasis remansit, & vitriorum in fornace colloca per dies sexaginta lento primùm igne, paulatim augendo calorem; post quindecim enim dies petrificent omnia; duobus inde elapsis mensibus, ut dictum, ponantur in loco humido in ovo, ut mos est, donec dissolvantur, & aurum est nostrum potabile.

Tanti robur Arcani cæteris longè antecellit, roborat quippe cor, cerebrum, jecur, omnesque nostri corporis partes, sed eas præcipuè, quarum est attrahere, transmutare, alere, segregare, expellere, & similia. Hoc verum vitæ balsamum sustinetur, hoc ut juvenile servatur, spiritus adaugentur, senectus retardatur, humoremque ne alter alterum corrumpat efficitur. Omnibus morborum speciebus confert, tum auri vi, cum fixorum salium, qui corporum impuritates per transpirationem dissolvunt, in quibusvis datur liquoribus à guttis quinque ad octo, pro vice.

*Tinctura nostra Lunæ.*

Quoniam de auro scriptum pretii sibi primum locum vindicante argenti quoque Tincturam hinc subdo, utpotè quod non solum pretio, sed & virtutibus secundum alteri accedi.

*Laz. Riverii Opera.*

℞. Purissimè cupellatum argentum, aqua forti dissolve, & oleo tartari fac præcipitetur. Postquam cum aqua communi laveris, exsicca & tincturam extrahe cum supra dictis liquoribus eodem modo ac in auro, & tandem ut supra dissolve. Innumeratæ sunt hujus virtutes, præsertim in morbis capitalibus; confert autem epilepsia, quamvis antiquæ, vertigini, hemiplegia, paralyti; aliisque à cerebri infectione devenientibus; nam sicuti in Macrocosmo argentum cerebrum Mundi appellatur, ita & hæc Tinctura verum, & validius est remedium ad capitales affectus. Mirum hæcticos juvat, & Phthysicos si cum aliis datur specificis, præcipuè cum auro potabili supradicto cum aquis adhibetur, ut si pro epilepsia cum aqua hiruadinum, &c.

*Tinctura nostra Jovis.*

DE Jove five stanno multi saltem scribunt, pauci vero sunt ejusdem Manipulatores, immò pro sale Jovis, Saturni extrahunt, ut in plerisque patet ex hodiernis Professoribus, qui nullam de stanno substantiam promovere valent. Hujusmodi Tinctura fit ut sequitur.

℞. Purum stannum sine plumbo, & igne, calcina in vase ferreo semper agitando cum spatula donec pulverizetur, inde verò igne cimentorum albescat, tuncque per mensem in fornace vitriorum pone vehementissimo igne, vel in igne reverberio per septem dies. Mox digerens calore lento, aceto stillato, tincturam separa viridem, quæ tinget, & hac ablata acetum junge Jovi calcinato, in retorta lutata septies stillando novumque semper addendo acetum stillatum. Partem digere stillatam eadem calce in loco calido per multos dies, inde filtra, & stilla usque ad siccitatem. Fixo spiritum vini benè rectificatum, & alcalizatum addens, dissolves tincturam, tantum verò spiritum pones, quo fixum resolvatur. Mox per octo dies digere, tunc enim separato spiritu tinctura remanebit in fundo, quæ quidem est mirabilis.

His similes Receptas, sinceras, & claras profectò non invenies, nil quippe est, quod pluries manipulationibus non perlustrarim.

Tinctura hæc omnibus morborum speciebus mirificè confert: nam sicuti Jovis nomen à juvando trahitur, ita hæc exterius & interius juvat. Interius primum obtinet locum in uterinos affectus, quamvis indomitos, uterum enim confortat, roborat, & mundificat ab impuris, & corruptis seminibus tot varia procreantibus; succurrit etiam cerebro, visceribus, hypochondriis, & cum specificis multum phthysicis, atque hæcticis. Exterius omnem plagarum acrimoniam, aut mordacitatem cohibet, atque dulcificat, ipsasque ad perfectam redigit integritatem. Datur cum liquoribus à ʒ. j. ad ʒ. ʒ. pro vice.



*Tinctura seu essentia nostra Martis.*

**P**urissima de ferro remedia sciant, quamquam huiusmodi Tinctura apud paucos in usu sit, & tamen ex pretiosioribus est, cæterarum verò laboriosissima, scilicet:

Recipe limaturam ferream, & in crucibulo optimè ignitam extingue aceto stillato, id autem plusquam tricies, inde fac bulliat in dicto aceto, & calidam filtra per chartam emporeticam. Limaturam exsicca, ignitamque iterum novo aceto stillato extingue ut supra; mox fac bulliat, & percola; quam regulam postquam ter iteraveris, aceta filtrata stillabis ad siccitatem, & adde spiritum vini; cæterum eundem servabis ordinem ac in Jove.

Cordialis hæc est, adstringens, disspilativa, præ cæteris enim confert fluxibus dysentericis, diarrhœis, lienteris, fluxibus immodicis menstrualibus, albescensibus menstruis, gonorrhœis, spuris cruentis, hæmorrhagiis sanguinis nasi, fluxionibus repentinis cujuslibet corporis partis. In omnibus vulneribus corruptelam non permittit, brevissimè sanat; ulcera & plagas mundificat, abstergit, & desiccatur. Propinatur à scrup. j. ad ʒ. ʒ. cum specificis cordialibus.

Eodem modo Tincturæ sunt lapidis hæmatitis, sanguinis draconis, & similium, quæ remedia sunt pro sanguine operantia.

*Essentia nostra Mercurii.*

**M**ercurium more solito ter sublima vitriolo, & nitro, purissimum inde crystallinum separa, quem postquam septies iterum sale communi albo benè decrepitate sublimaveris optimè contritum pone in fagiolo vitreo cum spiritu salis benè rectificato, qui supernatet sex digitis. Sigillatum digere per quadraginta dies in balneo, inde spiritum per decantationem separa, & novo iterum spiritu superinfuso per alios 40. dies digere. Hinc ut supra separa, & sublimatus omnis dissolutus, ad novam infusionem, & digestionem recurre donec ferè nihil in fundo remaneat. Digestos omnes spiritus pone in retorta benè lutata, & cum recipiente stilla usquequò albæ guttæ ascendant, tunc enim remove, & quater cohæba spiritum semper super caput mortuum, vehementiorem tandem addendo ignem usque ad siccitatem. Quod fixi remanet in fundo, calcina donec albescat, & more solito sal fiat. Spiritum stilla, & separa donec in fundo tinctura supersit, quam suo salijunges calore lento ut in unum coeant, spiritum inde vini dulcifica, in eodem digere, & spiritum separa, id verò quinquies, ut dulcis evadat.

Hæc ardua est, sed morbos evellit ex incurabilibus, dari quippè potest in corporibus, sexu, & ætate qualibet omnibus morborum generibus; omnes corruptorum morborum species mundificat in corporis partibus maligna gignentium; sine molestia, irritatione, nocumento, aut incommodo operatur; balsamum vitæ servat, & fovet, impuritates per transpirationem expellit, catharos à quovis provenientes exsiccat, & consumit; opilatis, aut cachecticis ex hypochondriorum, uteri vel corrupti sanguinis pravis humoribus medetur; hystericos juvat tam frigidos, quam calidos, roborando jecur, & viscera; infectiones ex lue Venerea antiquas, aut nova extrahit, schirrhos, strumas, tumoresve pertinaces exulcerat, & sanat. Datur in iuribus, vitellis ovorum, aut vino à guttis octo ad decem, manè jejuno.

*Essentia seu Tinctura nostra Coralliorum.*

**D**E corallis infinitæ receptæ tincturam docent extrahi, & quomodo fiat sal, verum ut plurimum saliant, & pro tinctura coralliorum, tinctura emergit vi balnei, & ingredientium quæ immisceri docent. Nostra hæc est, & sincera, quoties à Manipulatore optimè agitur.

Recipe coralliorum minutim contritorum, & in vase vitreo infunde acetum ex illo, quod extraxit Antimonii tincturam, indeque per distillationem separatum est, enim verò nihil aptius hoc pro corallis, unionibus, oculis cancerorum corticibus ovorum, lapide onice, bolo arme-

no, lapide hæmatitis, & similibus. Acetum supernatet sex digitis, in balneo fervente per aliquot dies corallia dissolventur; tunc autem stilla acetum ad siccitatem. Pulverem aquis cordialibus decies, vel duodecies ablue, donec omnis acrimonia, grossiores partes, & terreæ tollantur beneque dulcis fiat, & clarus crystalli ad instar. Tunc benè exsicca, & reponere ad bibendum, ut dicitur: aliud recipe corallium, immixtoque pari sale ammoniaco, pone in sale sublimatorio sublimandum; sal enim attrahet omnem coralliorum rubedinem. Salem sublimatum rubeum pone in spiritu vini rectificati alcalizati, & serventi balneo paucis diebus spiritus omnem ad se trahet tincturam; spiritum per distillationem separa, & remanebit essentia, cui addes pulverem fixum supradictum, & hæc erit coralliorum essentia.

Cordialis est, mundificat sanguinem, ut apparet in leprosis; omni corpori, aut morborum speciei conceditur; fluxibus quibuslibet convenit, ut dictum de Mercurii essentia; cor, & stomachum confortat, naturalem calorem restaurat, humidumque radicale fortificat; concretum sanguinem dissolvit, vulnera venenata juvat, ulcera maligna, & sordida. Datur à ʒ. ʒ. ad unam in jure vitello ovi, aqua plantaginis, &c.

*Essentia nostra Margaritarum.*

**E**ssentia margaritarum nostra differt aliquantulum ab aliorum descriptis, & hæc est.

Digere margaritas in aceto dicto antimonii, & dissolvitur celerrimè; fit inde ut supra de coralliis, donec sal albus evadat, postquam scilicet per ablutiones acrimoniam reliquit, tunc dissolve spiritu vini alcalizati, & septies distilla semper super caput mortuum; hinc separa spiritum, & remanet essentia, ut de aliis.

Perfectissimum cordiale est auro potabili minimè inferius, datur enim ad corpora debilia, & languentia restauranda, malignis febribus confert, & pesti præ cordialitate; syncopes, cerebri passionis, apoplexias, epilepsias, paralyses, vertigines, & passionis hystericas hypochondriacas repellit. Datur in iuribus vitelli ovorum, vel aquis à ʒ. ʒ. ad unam.

*Essentia nostra Smaragdorum.*

**S**maragdorum fragmenti minutim pulverizati partem unam, nitrii, sulphuris partes tres positas in vase fictili calori resistenti calcinabis; mox dulcificatas aquis tepidis, modo iterum ac supra bis calcina novo semper nitrio, & sulphure. Post tertiam calcinationem, & dulcificationem pulverem pone in crucibulo lutato in fornace vasariorum, seu in igne reverberio per sex dies, postea in vase vitreo supra infunde spiritum salis rectificati qui supernatet quatuor digitis, & per dies viginti digere in balneo serventi; hinc per decantationem fiat in alio vase separatio, & supra feces infundens novum salis spiritum iterum digeres, ut supra, donec omnis pulvis solvatur. Spiritum omnem pone in vase optimè obturato, & digere per mensem, quo elapso leviter ipsum distilla, tinctura quippe in fundo remanebit; augetur inde virtus addendo spiritum vini alcalizati, & digerendo, non spiritum separando. Eodem modo fit pyroporum essentia, hyacinthorum, aliorumque lapidum pretiosorum.

De hac non est cur dicam; potentissimum enim cordiale est contra venenum, malignas febres pestilenciales, omnibusque cerebri morbis, maniiis, apoplexiis, & similibus succurrit.

*Essentia nostra Auripigmenti.*

**D**iffertum est perfectum Spagyricum ex rebus usualibus, & pretiosis venenum mortiferum extrahere posse, ipsumque venenum in perfectissima Alexipharmaca convertere, & vera cordialia. Id in auripigmento accidit quod cum venenum sit ex mortiferis, mirabilem de illo præ cordialitate essentiam depromimus.

Recipe auripigmenti partem unam, nitrii rectificati partes tres, de quibus positis in fictili vase non vitrato, sed igni resistenti, fac ut mos est de croco antimonii



monii. Calcinatas ablutionibus aquarum tepidarum exue nitro; exsicca inde, & iterum novo nitro fac ut supra: exsiccationem hinc repete post novam ablutionem, & additis nitri partibus duabus, duabusve sulphuris, incende noviter, & dulcifica, sed cave à flamma, & à fumo. Post tertiam calcinationem, & dulcificationem pone pulverem in crucibulo benè lutato in fornace, aut igne reverberare per Mensem. Mox cum spiritu salis proceditur, ut dictum de cæteris, digerendo, & cohobando pluries, solutis omnibus, spiritum separa ad siccitatem, inde cum spiritu vini, &c. ut in aliis.

Essentia hæc omne venenum validissimè expugnat, auroque potabili virtutibus æmulator, margaritis, coralliis, lapidibus pretiosis; impura corpora ab omni prava humore in venis corruptione mundificat. Hujus inter cætera remedia primus locus est contra ulcera maligna, gangrænas, aut quaslibet corrosiones, morphæas, tineas evellit unctione. Propinatur in juribus, vel aquis à ʒ.j. ad ʒ.j.

*Essentia nostra Salis communis.*

**S**alem decrepitatum filtra pluries per chartam emporicam in aqua pluviali septies stillata; humidum exhala, & ex fixato spiritum extrahe cum bolo armeno diligenter secundum artem. Hinc super caput mortuum quater cohoba, & ab impuris rectificatum serva, ut inferius, mox frange retortam, & salem fac ex capite mortuo secundum artem benè filtrando, rubescet enim; tunc spiritu supradicto junctis in vase benè lutato massiche, & ovi albumine, in balneo digere; mense elapso bis, vel ter iterum rectifica, inde addito vini spiritu alcalizato, & facta nova digestionem, separa spiritum vini, & remanebit salis essentia.

Hæc tam cadavera, quam viva corpora à corruptione præservat, balsamis pro vulneribus est efficacior, mirum juvat ulcera Vesicæ calculos, & arenam solvit, venas à prava crassitie qualitate, vel arenula mundificat, & à sanguine morbis provenientius medetur; conglutinat, consolidat, & sanat renum, vel vesicæ ulcera; liene, jecore, & visceribus obstructos, juvat; contra putridas febres maximè valet; cutis infectiones removet, inter quas scabies, lentigines, impetigines, ignem sacrum, herpes: cujusvis generis tumores calidos suppurat, frigidos resolvit, quamquam scyrrhosos; dolores articulares lenit, humidum radicale tuctur, senectutem retardat, intellectum acuit. Propinatur in liquoribus à dragma una ad duas.

*Essentia nostra Salis prunelle.*

**S**alem prunellæ clarissimum sale communi decrepitato immisce, & eadem sit regula, quæ in sale communi. Hic à communi virtutibus non differt, præcipuè in febribus.

*Essentia nostra Sulphuris.*

**P**rimò vitriolum rubifica, addita inde pari sulphuris parte, pone in novis ollis secundum usum, & quater sulphuri sublimetur, misce inde salem communem decrepitatum, dissolutum, & coagulatum, terque iterum cum dicto flore sublima; flos enim ille albesct, & erit volatilis, hunc verò serva, ut dicitur. Hinc recipe spiritum sulphuris extractum per campanam rectificatum, ipsumque noviter per chalybis limaturam traducens, acrimoniam tolle, ita ut aquæ ad instar dulcescat. In hoc dulcificato spiritu flores supra repositos immerge, ut spiritus quatuor digitis supernatet, & in vase vitreo benè obturato digere in balneo, spiritus enim rubeum colorem assumet; spiritum per decantationem separa, novum addendo, donec amplius non tingat: tunc spiritum separa per distillationem, & tinctura in fundo remaneat, cui addens spiritum vini alcalizatum digere per plures dies usquequò simul coeant; mox per distillationem separa, & in fundo remanebit essentia.

Cordialissima est, nihilque hac aptius contra spasmodum in vulneribus, etiam cum nervorum recisione puncturas, vel cujuslibet animalis morsus curat veneficos, venenum extinguit, vulnera sanat. Verum balsamum est

*Lazari Riverii Opera.*

pulmonum affectibus, vel ulceribus; hæcticis, phthisicis, & asthmaticis succurrit; humidum radicale conservat, dolores evellit arthriticos, nervos confortat; antiquas, vel novas catarrhorum impuritates confert; furdus auditum revocat; fordibus ulceribus confert. Propinatur à ʒ. ʒ. ad unam in juribus, vel aquis, & exterius ex se adhibetur; vel unguentis affociata.

*Essentia nostra vitrioli.*

**V**itriolum afferunt, Philosophi sanguinem esse Macrocosmi Mundialis machinæ, & Philosophorum lapidem ab ipso fieri volunt, quem tot quaritantes in vanum laborant. In hoc veram arcani universalis vim, quæ mineralium sit anima, consistere affirmant. Verum quidem est, quod si rectis manipulationibus Spagyricis ab omnibus mineralium partibus, & feminalium mirificæ emergunt virtutes, mirabilia ex vitriolo extrahuntur, ut apparet ipsum ad Solem tantum calcinatum fluxiones sanguinis sistere; utuntur etiam multi in distantia imponendo ipsum sanguini, ad præservandam partem à corruptela. Hinc patet, quod eo magis polleat sapientiæ gradibus manipulator ab impuris mundificatus & ad perfectionem decoctus.

Recipe vitriolum calcinatum, & extracto secundum artem spiritu rectifica, facies in vase remanentes aqua ferventi solve; hinc filtra, & exsicca, de quibus manipulationibus plures age, ut spiritum aliquantum, & salem congerere possis, ut dictum est. Mox spiritum ter rectificatum junge sali, & stilla cohobando super illum septies, semper verò caput mortuum solve, & fixa, ut dictum est. Salem pone in vase calori resistente, igne reverberare per septem dies donec rubescat; tunc autem iterum spiritu suo benè rectificato adde in vase benè obturato, & in Balneo Mariæ fervido digere. Post dies quadraginta stilla, & rectifica septies spiritum, salemque aqua vitæ rectificata alcalizata dissolve, & fixa; hinc iterum junge spiritum, & digere donec rubescat, postea spiritum separa per distillationem, sed in fundo tinctura remaneat, quam novo spiritu vini alcalizato addito digere, extracto in spiritu remanet essentia.

Nullus hoc clarius dedit contra morbos omnes medicamentum; omne expellit veneni genus vegetabilis, animalis, aut mineralis; spiritus vitales recreat, naturales animales. Arcanum hoc est à tot celatum, tam mirabile, tam universale, omnibus morbis, omnibus ætatibus, ambobus sexibus confert; auro potabili præstat, Panacæis, vel quolibet alio. Propinatur à scrup. j. ad dragm. j. in juribus, vitellis ovorum, vel aliis liquoribus.

*Trochisci Antepileptici.*

**P**erique sunt cynabarem mineralem affirmantes, cujus matrem telluris viscera arbitrantur. A veritate autem longè aberrant, cinabaris enim mineralis vocatus, hujusce nostri umbra tegitur, ne antimonium nominetur. Cynabaris contra epilepsiam multis ab Authoribus traditus, mineralis, & artificiosus dictus, hoc modo fit.

Recipe caput mortuum, quod de composito antimonii butyro superest, & Mercurium tantundem sublimatum adjuuge; vase inde vitreo benè lutato, & alembico distilla ad usum. Ad ultimum ignem subijce ardentissimum, quo vitri collum ascendet antimonium cynabaris pulcherrimi ad instar, qui mineralis erit. Lavatur hic donec dulcescitur, indeque in crucibulo pone igne rotæ aperto tribus horis, acter, vel quater spiritum vini incende. Ex eo recipe ʒ. j. magist. margaritar. & corallior. an. dragm. j. ʒ. ambræ griseæ, croc. an. scrup. j. unguis Alcis dragm. j. cran. hum. præparat. absque igne dragm. iij. sæcul. peoniæ unc. ʒ. ol. succini distill. mucilag. corn. cerv. & cranii q. f. ad trochiscos componendos, de quibus da à scrup. ij. ad drag. ʒ. epilepticis, & mira videbis; sæpius enim multis ab experientiis Arcanum hoc est confirmatum.



*Caput mortuum nostrum magisteriale.*

**R** Ecipe caput mortuum aquæ fortis, quæ facta sit de nitro rectificato, & vitriolo berè calcinato, cumque aqua pluviae stillata tepida fac lixiviam, & saltem extrahe secundum artem. Bis inde iterum cum aqua dicta stillata resoluta sale eodem, usque quò crysalla appareant, sume nitri rectificati partem unam, & duas dicti salis fusoque nitro in cruciolo igne secunda gradus, sale adjice paulatim, igneque facilius facta sint omnia per horas tres. Massam hanc pone in aqua forti extracta à supradictis, & pro quacumque libra adijunge florum antimonii ex regulo Martis 3. iij. auri in fol. 3. iij. corall. margarit. cort. ovi, an. 3. ij. in loco tepido digere quatuor diebus. His peractis, destilla ad siccitatem & massam, quæ restat pinfa, iterumque aqua vitæ imbebe; octo inde diebus digere, & destilla denuò ad siccitatem. Caput mortuum, quod remanet, ferva in ampulis optimè obturatis, de illo enim si à gut. 12. ad 18. dederis, effectus consumes hypochondr. & ex validissimis remediis est contra talem morbum. Omnes expellit obstructionum species, febresque vitiosas; corporibus prodest cachecticis, hydrojicos liberat, & similia.

*Aureatum Catharticum nostrum.*

**R** Ecipe aureati nostri unc. sem. spiritus sulphuris optimè rectificati unc. iij. digere in loco tepido. Diebus quindecim elapsis per vitream distilla igne arenæ, indeque novies dictum spiritum cum dicto aureato cooba, atque optimè pulverem lava aquis cordialibus, & exsicca. Dosis erit à gr. 4. ad 10. semper unà cum magisteriis mechocanis, jalappæ, vel scammonæ, vel extractis, quæ juxta necessitatem convenient.

*Pilule Antivenereæ.*

**R** Ecipe calomelanos, magister. lapidis hazuli, extract. rhabarb. fennæ, turbitis, spinæ Ponticæ, ana dragm. ij. gum. ligni sancti ad pondus omnium, magister. tartari solut. ol. cinamonum, ana dragm. j. sem. syrup. de fumaria quant. suff. ad pilulas componendas. Feliciter evellunt hæc omnem humoris Venerei radicem, etiam ex ossibus infectis. Dosis à drag. sem. ad drag. j. viginti, triginta, vel quadraginta diebus.

*Calomelanos nostrum.*

**R** Ecipe Mercurium bonum, & in retorta pone cum dupla arena optimè permixtum, gradatimque ignem subijce, & in vas transimite, absque eo quòd ejus os claudas, ut impura Mercurii partes in arena permanent. Sublima inde sale communi decrepitato, secundum artem, rejectisque fecibus, sublimato purius illi Mercurio sale iterum adijunge, iterumque sublima. Projectis inde partibus quæ restant, novo sale sublima puriorem; hoc autem fac septies, & fecibus denuò sejunctis retortam colloca in fornace reverberæ cum sublimato septimæ vicis, ibique per horas duas relinque igne ardentissimo. Hinc multoties aquis dilue cordialibus, & aqua vitæ juniperina imbebe, quæ supernatet ad digiti mensuram, ipsamque combure; ter autem id facias.

*Catharticum Antimonii cum vitriolo, dictum Catholicum nostrum.*

**R** Ecipe antimonii de terræ sinu fulgentis, auroque colore similis partem unam, vitrioli rubificati partes duas, pulverizata, & mixta in crucibulo posita fac simul unà liquefiant. Massam inde contere, & in retorta repone optimè lutata cum aceto stillato, quod supernatet quatuor digitis, caloreque moderato digere 24. horis cum suo recipiente. Ignem inde gradatim augeas, & ultimò ardentissimum, ut omnis spiritus exeat, moderato igne evaporabitur, donec pinguis tinctura superfit. Tunc recipe extract. rhab. fennæ, jalapp. turbit. hellebor. nigr. ana drag. j. extract. aloës unc. j. essent. junip. & cort. citr. ana drag. ij. additaque unc. sem. tincturæ suprad. simul omnia digere moderato calore, indeque reduc ad consistentiam in formam extractis, optimum enim habebis cartharticum contra omnes febrium species mirabile, tam acutarum, quàm intermittentium, omnibusque antecellit cæterorum Panchinagogis. Dosis erit à gr. 8. ad 15. juxta vires.

*Trochisci nostri contra Carbones.*

**R** Ecipe feces reguli communis vulgaris, & in loco humido colloca supra marmor, subterque vase, locum cum autem illum pluvia diluere nequeat, sed solus aer penetret, & in ol. dissolvatur. Hoc igne lento exhala, & sal fiet pungentissimus, de quo recipe unc. j. sublimati de Mercurio unc. j. farinæ hordei, & lentis ana unc. ij. gumma tragachant. dragm. ij. liquefacta in aqua ros. trochiscosque compone, qui omnes curant carbones, & peccantem corrodunt carnem mirificè.

*Pulvis noster Anthellicus.*

**R** Ecipe reguli stellati Martis, & Jovis Angeli an. partem unam, pulveriza, & misce cum tribus partibus nitri rectificati, & secundum artem calcina. Aqua inde fervida omnium remove falsedinem secundum usum, & pulverem illum album pone iterum in fornace reverberæ tribus diebus, vel in fornace vitriariorum, aut figulina-rum, atque inde iterum aqua imbebe vitæ rectificata, quam accendas ad comburendum, hoc autem ter facias. Hinc recipe de illo unc. j. pulv. viperarum ad usum unc. sem. salviæ sicca pulverizata unc. j. sem. ranas inde vivas conjice in olla clausas usque moriantur, & tunc in clibano fac areant donec in pulverem converti possint, & de his unc. iij. immisce supra dictis. De composito hoc de quadraginta diebus à dragm. ij.

*Aqua vitæ nostra contra Dolores Arthriticos.*

**R** Ecipe ivæ arthriticæ manip. 4. fol. cupressi, salviæ, rosmarin. spicæ, urticæ an. manip. i. cort. ulmi, fol. ejusdem, cort. hederæ an. unc. ij. ebuli manip. ij. hæc omnia contrita infunde in lib. 20. vini generosi, indeque distilla, & extrahe quartam partem. Extracta illi aquæ vitæ dimidium dictæ ejusdem dosis herbarum supra dictarum viridium adijunge, cum lib. ij. lumbricorum, quos antea vino benè ablueris, & lib. 3. adipis canini, atque tunc iterum distilla, extrahendo dimidium. Tertiā inde partem iterum adjice supradictorum, herbarum nempe, vermium, & adipis, iterumque distillans extrahe tertiā partem. Hæc autem perfecta erit aqua vitæ, quæ ad confortandum & resolvendum optimā est in omnibus morbis articularibus, & podagris.

*Anodinum sive Narcoticum nostrum vitrioli.*

**R** Ecipe vitrioli Romani, & tartari ana lib. i. limaturæ chalybis lib. sem. pulverizatum vitriolum, & intrit. pone in vitrea cucurbita, simul prius mixta, atque inde imbebe aceto stillato duobus digitis supernatante, & digere tribus diebus. His elapsis igne moderato congela, & aceto imbebe ut supra, supradictumque ordinem sequare. Postquam congelaveris, adde acetum stillatum, quòd supernatet sex digitis, & calore lento celerrimè rubeum accipiet colorem. Hinc novum pone acetum usque quòd extrahatur tinctura, indeque aceto oleum adijunge tartari factum per deliquium, omne enim sulphur in infimam vitri partem eo modo descendet. Tunc benè exsiccabis, ipsumque immerges in tres lib. aquæ vitæ rectificatæ; vas inde benè obturatum mastiche, & ovi albumine colloca in fimo equino calido, quem mutabis quibuslibet quatuor diebus. Post quadraginta dies stilla, tinctura verò relicta in parte infimi vitri juxta usum tincturarum. Hoc autem verum erit Narcoticum ad omnes febres acutas, ardentes, & malignas propulsandas potentissimum, præcipuè in deliriis. Contra etiam passionem hystericas, dolores colicos, nephriticos, omnesque morbos in quibus datur laudan. nepent. hoc tutius est Dosis à gut. 5. ad 12.

*Aureatum nostrum.*

**R** Ecipe auri sol. unc. j. antim. crud. unc. iij. misce & in crucibulo funde simul, sed æquali calore non fluctuanti, ne igne nimio regulus separetur. Postquam liquefeceris fac frigescat, & minutatim contere, indeque lento igne paulatim calcina eo modo, quo fit pro vitro calcinato, semper miscens virgâ ferreâ. Tunc autem calcina-



calcinatum erit, dum antimon. cum auro valde album evaserit, neque ullo modo agglomeratur, nec impositis carbonibus accensis fumum attollat. Vitrum inde fit posita calce in cruciolo igne fusionis vehemente per horam, tuncque perfectum est, cum vitrificatum apparet colore pyropi perlucidum.

Manipulatio quidem aliquantum difficilis, fallitque artifices aliquando. Clarius via ad compositionem huiusce Arcani patebit in alio Opere, quod luci tradam, illud enim Tyronum proprium explicabo. Præparatio hæc opulentior est auro illo, quam scribit Crolius, Sennerius, Schroderus, & alii, ita etiam cordialis. Aureatum tandem est evomitivum, & solutivum, inter verò cætera evomitiva primum sibi locum vindicat, aurum quippè illud cor tuetur, & viscera. Calcem Chymicum virtutibus non solum æquat, sed antecellit, ipsiusque dosis à ʒ. ij. ad v.

*Aqua Catholica nostra.*

**R** Ecipe succ. brionæ, spinæ Ponticæ, chelidonæ, rosar. sylvestrium, cortic. sambuci, ebuli, chamædryos, ana ʒ. ij. spiritus vini rectificati lb. ij. digere duobus diebus, inde stilla, & aquæ illi stillatæ adde extract. rhabarb. agarici, fennæ, gratiolæ, ana ʒ. b. magister. mechoacanis ʒ. iij. magister. tartar. solutivi. ʒ. ij. cinnamom. masticar. zinziber. anisi, ana ʒ. b. spiritus vitrioli stybiati ʒ. vj. & digere in fimo equino. Post dies 24. percola, & in vase optimè obturato serva. Catholica hæc vocatur, quia verè agit absque nausea, & in omnibus morbis; in quibus purgatio requiritur, ipsa maxime prodest, sumitur autem vel cum jure, vel cum vino, vel etiam aqua. Dosis à ʒ. j. ad iij. aut iv. ad summum.

*Trochisci primi nostri Alexipharmaci.*

**R** Ecipe bezoard. lapid. Orient. cornu cervi præpar. bezoard. Jovial. ejusdem mineral. unicorn. veri, rhinocerotis, ana ʒ. ij. terræ melitenis, bolarmeni lutei, terræ bohemiæ, mundavii colorati, sigilli lemnii, ana ʒ. b. contrayervæ ʒ. v. spodii, fragmentorum omnium lapidum pretiosior. præparat. ana ʒ. b. magister. margaritar. corall. omnium, & dentium aprorum, ana ʒ. j. auri fol. 20. pulverizentur omnia, & cum mucilag. cornu cervi fiant trochisci. Ab omnibus venenis liberant, febribusque malignis, & erraticis, contra fluxus menstruorum, sputum, & vomitum sanguinis, plenritidem, cardialgiam mirifica sunt, maximeque mulieribus gravidis profunt de abortu dubitantibus. Dosis à ʒ. b. ad g. xx. cum specificis.

*Trochisci secundi viperini Alexipharmaci.*

**R** Ecipe anthoræ, vincetoxici, scorzonæ, contrayervæ, cortic. citrin. ana ʒ. j. pulver. viperini ʒ. lb. unicornu veri, lapid. bezoard. Rhinocerotis, ossis cornu cervi, ana ʒ. b. Bezoard. Jovial. crystalli rub. præparat. ana ʒ. j. pulverizentur, & cum glutine cornu cervi fiant trochisci, qui periculas, venena, febres malignas, pustulas, morbillos, & similia consumunt. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. b.

*Trochisci nostri tertii Alexipharmaci.*

**R** Ecipe radic. tormentillæ, angelicæ, carlinæ, vince-toxici, gentianæ, contrayervæ, anthoræ, scorzonæ, imperatoricæ, ana ʒ. j. bacchar. lauri, juniperi, ana ʒ. j. hederæ ʒ. b. cinnamom. santalorum citrinorum triturbis, & in vase vitreo irrorabis, essent. theriacæ ʒ. iij. addantur crystalli rub. præparat. maragdorū præparat. lapid. bezoardic. Orient. magister. margarit. unicornu veri, ana ʒ. j. magister. carabum, sal. Jovis, foliorum auri, ana g. xxv. glutinis cornu cervi, & mucilag. tragacant. fact. in aqua florum mali medici q. s. F. pastill. sec. artem. Hæc pestem morbos pestilentiales, febresque malignas expellit, omnibus cordis ptodeft syncopationibus, contraque arsenicalia, & similia venena potentissima est: cujus dosis à ʒ. j. ad ʒ. b.

*Balsamum vitæ, sive cordiale nostrum.*

**R** Ecipe Panacææ universalis, essent. auri, & argenti, ana ʒ. ij. essent. ambra griseæ ʒ. xxv. essent. margarit. ʒ. iij. tincturæ viperarum ʒ. b. essent. sang. cerv. ʒ. j. misce. & adde opobals. veri Orient. ʒ. iv. & maximum est cordiale ad naturam confortandam: dosis à ʒ. b. ad unum.

*Balsamum salutis nostrum.*

**R** Ecipe essent. ambra griseæ factæ cum spiritu rosarum, quint. essent. rosarum, essent. bacc. juniper. & cortic. citrin. ana ʒ. j. oleor. mali medici ʒ. b. m. & detur cum saccharo rosato simplici à gutt. 2. ad 6.

*Bezoardicum Minerale Nostrum.*

**B**ezoardicum minerale nostrum parum à communi differt, quod Chymici componunt, correctius autem est, & tutius, quia correctio antimon. & Mercurii est dum ab omni mala qualitate viutorum expurgetur igne.

Reguli vulgaris antimonii, sed ex illo, quod in ardentissimo igne fuerit, postquam purificatum, per horas 16. & Mercur. sublimati, ex illo facto de Calomelano, & per alembicum distilla sec. usum, extrahens butyrum sicuti in Bezoard. mineral. scriptis ab aliis Authoribus: Dulcifica inde abluens multoties aqua tepida, & calore temperato exsicca. Exsiccatum imbebe spiritu nitri, qui supernatet quatuor digitis, & distilla indeque ter cohoba, iterumque dulcifica ut antea. Dulcificatum pone in vase fictili, igne verè resistenti, ignemque circum tribus diebus accende; hæc enim vera est decoctio. Spiritum inde vini imbebe, qui supra quinquies accenditur, tuncque certus eris optimum, & perfectum habere Bezoardicum.

Hoc illud est mei Præceptoris, & si animadverteris cæterorum compositionem, tanta non adhibetur assiduitas. Utebatur ipse in singulis juribus ʒ. j. pro vice, ut ex ejus, & meis patet Observationibus, quia verò correctum est, & concoctum ita ut nunquam noceat, omnibus dabat laborantibus non solum febre maligna, acuta, & pestilentiali, sed & cachectica, variolis, & morbillis, & aliis morbis doctis à ʒ. b. ad ʒ. j.

*Bezoardicum Joviale Nostrum.*

**E**odem modo ac supradictum componitur hoc nulla re exclusa, sed solum differt in compositione; primo enim fit regulus Martis stellatus, & per ignem cum pari Jove de perfectiore conjungitur, & cum supradicto Mercurio sublimato de Calomelano. Cæterum nihil penitus ordinem prætermittas, quo suprad. Minerale factum est. Ita enim illud est, quod usu mei dicti Præceptoris celebratur, quodque dabat ipse, & do in omnibus morbis desperatis à ʒ. b. ad ʒ. b.

Alia sunt Bezoardica Solaria auro addito, lunaria Lunâ, ita etiam de cæteris, ut ab aliis scribuntur Authoribus. Satius autem arbitror ab igne non discedere, & modo illo quem proposui in minerali Bezoardico; si enim secus fiat, integra non pollebunt perfectione. Florum croci, & aurati correcti, correctio hoc modo fit; recipe florem croceum, aut vitrum, & in retorta pone cum spiritu vitrioli rectificati ad digerendum quinque diebus in loco calido moderato. Stillâ inde ad siccitatem, & sex aliis vicibus cooba semperstillans ad siccitatem. Hoc Aquis cordialibus dulcifica & exsiccatum imbebe aqua vitæ generosa, quæ quinquies supra incenditur; modus enim hic multum corrigit Antimonium, correctique hi tali pacto componuntur.

*Appendix.*

**N**on exiguum Bezoardicorum portentum minimè prætermittendum arbitratus, appendicem hanc statui, in qua pulcherrimum quidem Venetiarum eventum percurrere, Lector, ne dedigneris. Joan. Baptistam Tola inviserem jussit ægrotantem Illustrissimus, atque excellentissimus D. Andreas Donatus Serenissimæ hujus Reipub. Senator præstantissimus, cujus humanitate maxime devincior. Accessi, ipsumque inveni



annorum circa sexaginta quinque, temperamentum aduſſi, melancholici, vinis generosis jam antea plurimum deditum, tunc verò à septem diebus ſebre continua maligna laborantem, à ſumis capite occupatum, & obſcuro delirio: pulſus tremulus erat, & parvus, urina turbida, & groſſa, oculi tenebroſi ſerè vitrei, vires abjeſtiſſimæ, tandem, ut multa in unum contraham, ex ſignis omnibus quæ apparebant mortalia, vitæ ut potè deſperato conclamavi una cum Excellentiff. Medico, qui multa juxta canonicum uſum opportunè remedia exhibuerat. Non niſi cordialibus ſuccurrendum eſſe ambo cenſuimus, breviffimamque ad mortem periodum ſuperſeſſe domeſticis prænuſtiavimus. Attamen Excellentiff. Medico poſtulavi an optimum duceret hoc ultimum quoque tentare, Bezoardica ſcilicet, Solaria, & Jovialia ægro exhibere, multoties enim in hujusmodi caſibus benefici ſcætant eventus, cogunt quippe Bezoardica naturam ad ea expellenda per ſudorem, urinam, aut ſecceſſum, quæ miſerum prope ad mortem impellunt. Opinionem hanc meam confirmavit ille, juſſitque continuo grana ſex Solarium, & ſex Jovialium cum aliis cordialibus; miſit autem ad Reverendiſſ. P. Præſectum Servitarum, Spagyricum optimum perfectumque Manipulatore, ut ſupra dicta concederet. Sumpſit æger, & multam per ſecceſſum ejecit atram bilem, verum ex ea convulſione vires exhauſtæ omni penitus deſtitutæ ſunt vi, majoriſque debilitatis edidere ſigna, ex quo, perterritis domeſticis, filius Presbyter ad me ſe contulit iracundia non ſolum ſuccenſum, ſed & Medicis verbis ex Bezoardicorum pulvere illo mortem provenientem ſignificantibus, qui quamvis ex eo minimè fieri poſſe ſciet, nihilominus à repentino motus periculo culpam in me conſerre curabat. Filius, inquam, mihi tale ſcelus exprobrans minis de genitoris cæde accuſabat. Demum talis evacuatio, Omnipotentis permiſſione, atram bilem tranſmiſit, quam natura ex ſe non valebat, ideòque mortuum, ut ita dicam, novam in ſalutis lucem revocavit. Hinc dum aliqua in conſultatione adſum, nunquam cæterorum diverſam expono propoſitionem, certus minimum eventum malum mihi crimini fore tribuendum.

*Extractum noſtrum Antiſpleuriticum.*

**R** Ecipe extracti flor. papaver. errat. ʒ. ij. malvæ arboreæ rubræ, gummiæ extractæ de ligno quercino, ana ʒ. j. ʒ. pleuræ humanæ, vel apri ʒ. ij. limaturæ dentis apri ʒ. iij. maxillarum aſelli piſcis ʒ. j. ʒ. unicornu veri, magiſter. corral. corticum interior. avellanar. flor. buxi, ſalis prunellæ, ana ʒ. j. fiat maſſa cum extract. ſupradictis, & compoſitum eſt portentofum pro pleuritide. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ʒ.

*Extractum Hyſtericum noſtrum.*

**R** Ecipe extract. artemiſ. matricar. ana ʒ. iij. extract. ſabinæ, & bacc. junip. ana ʒ. j. ſæcul. aronis ʒ. ʒ. ſæcul. brioniæ ʒ. ij. extract. nepetæ, & azari, ana ʒ. j. ʒ. magiſter. carabum ʒ. iv. ſal. Jovis ʒ. iv. ſem. ſeſeleos, nepentes, ana ʒ. ij. ſem. ameos, rutæ, carvi, aniſi, cardamomi, ana ʒ. ij. caſtorei ʒ. iv. m. & da à ʒ. ʒ. ad ʒ. ij. in paſſionibus enim hyſtericis magnopere prodeſt.

*Extractum Nephriticum noſtrum.*

**R** Ecipe herbæ Turcicæ ſiccæ manip. ʒ. eryng. reſta-bovis, bardanæ, ana manip. j. baccar. junip. & lauri. ana ʒ. ij. ſem. de milio Solis, urticæ, cepæ, ſaxifrag. aniſi, ſoenicul. ana ʒ. ij. De his omnibus fac extractum ſec. artem, indeque adde magiſter. lapid. Judaici, cryſtallin. de monte, oculorum cancrorum, cortic. ovorum, ſal. cortic. fabæ. ſal. flor. ammoniaci. ana ʒ. j. Hæc fermenta ſimul, & magnum remedium eſt contra nephriticos dolores. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ʒ.

*Extractum Aureatum noſtrum.*

**R** Ecipe bacc. junip. bacc. lauri, amygdalorum perſici, ana ʒ. iv. flor. nucum, ſambuci, uvæ ſylveſtris, herb. calamenti, origani, pulegii, ana manip. j. ſem. dauci, aniſi, feniculi, cumini, ana ʒ. ij. cinamomi, caryophyllorum, ana ʒ. ʒ. lign. aloës ʒ. i. ſac extract. ſec. artem, inde adde baſſami Peruviani impetriti. ol. nucis

nucis moſchatae, ol. ætherci terebinthini, ana ʒ. ʒ. m. & ſimul fermenta. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij.

*Diaphoreticum Aureatum noſtrum.*

**M** Ultis ab Authoribus hoc ſcribitur eſſe ſulphur illud, quod eſt in Reguli ſecibus vulgaris, quo contrito, & ebullito cum aceto præcipitatur ſulphur in inferiori parte, inde verò multoties abluto, & exſiccato utuntur ad ſanguinem mundificandum, ſudorem provocandum. Correſtius autem noſtrum eſt quia ſupradictis omnibus peractis, calcinatur iterum in fornace horis 24. vel igne rotæ, donec dealbeſcat una cum quarta parte auri tonantis. Digeritur inde aqua vitæ ardenti, quæ ter ſuperincenditur; tuncque optimum Diaphoreticum eſt in pleuritide, & febris peſtilentialibus; datur autem à ʒ. xvj. ad xx.

*Diaphoreticum commune noſtrum.*

**R** Egulus hoc eſt vulgaris ter calcinatus, ſemper cum duplo nitro rectificato, indeque dulcificatus, & aqua vitæ ſuperincenſa. Datur hoc à ʒ. j. ad ʒ. ʒ. vel etiam ʒ. j. contra omnes morbos chronicos, in quibus per ſudorem operatur, vel inſenſibilem tranſpirationem.

*Diaphoreticum fixum noſtrum.*

**P**ulvis eſt fixus P. Baſilii Valentini, quem ipſe univerſalem proponit, nomine etiam interdum Panacæ fixæ Baſilii, ſcriptæ in Curru Triumphali Antimonii ejusdem Authoris.

*Panacæa liquida noſtra univerſalis cum auro.*

**R** Ecipe auri ſoliati ʒ. j. & calcina cum ſulphure in igne circulatorio per horas 8. quater ſulphur addens, Aqua inde calida dilue, exſiccaturque conjunge cum oleo antimon. facti tali modo: ʒ. reguli de antimon. Mercurii ſublimate. ana ʒ. iv. miſce bene in mortario, ſtillaque per retortam, ſicuti fit ol. graciæ ſive butyrum antimon. ignem adde gradatim, donec in butyr. convertatur, appoſitis etiam carbonibus ad collum retortæ. Butyrum illud pone in Cella vinaria ſupra lapidem cum vaſe in quo guttatim cadat, & ol. fiet, cujus ʒ. adde ʒ. i. auri calcinati per cimentum, ut ſupra. Vas inde reponere in loco calido, digerens per menſem, tingetur enim in aureum colorem. Hinc adde ſpiritum vini rectificati, & iterum in calore colloca, ubi aqua vitæ ſibi omne aurum attrahet. Percola, & aqua vitæ iterum addita donec tingatur, ol. exhala; nam pulvis remanebit. Hunc una cum ʒ. viij. antim. crudi, & ʒ. xx. olei de nitro facti per deliquium pones in vaſe quod bene obturabis, ad digerendum. Poſt menſem adde lb. ij. ſpiritus vini rectificati, & iterum digere; brevi enim tinctura menſtruo ſpoliabitur, ſicuti antea. Spiritum hunc cum illo auri conjunge, & alium iterum ſpiritum adde, ſupra ol. nitrii, donec color detergatur; remanere enim debet ſicuti erat cum poſitum primum fuit. Tunc ſpiritus hoſte tinctos per papyrus emporiticum, & per cinerem ſtilla paulatim uſquequo tibi ʒ. iv. tincturæ reſtent in inferiori parte retortæ. Atque hæc eſt noſtra liquida Panacæa univerſalis, quæ per tranſpirationem operatur, facultateſque vitales facile impellit ad ea faciendæ, quibus indiget natura, abſque eo quod noceat. Heſtici multi, phthiſici, & hydropici per hanc à me curati ſalutem adepti ſunt; dari autem de ipſa poteſt à gut. 8. ad 20. cum ſpecificis, & juxta vires citò vel ſerò operatur.

*Tinctura noſtra, ſive oleum verum Antimonii dulcis.*

**R** Ecipe vitri antimon. hyacinthini clari ʒ. iv. olei nitrii facti per deliquium ʒ. viij. contritumque hyacinthinum oleo immiſce ſupradicto in vaſe vitreo bene obturato, temperatoque, & æquali igne digere per menſem; oleo enim illud fiet rubicundum. Tunc adde ſpiritum vini rectificati, ut in Panacæa liq. ſuprad. factum eſt, donec tinctura oleum ſpolietur. Spiritum inde, & tincturam extrahe, quæ in inferiori parte reſtat. Pretioſum eſt contra omnes morborum ſpecies, pauloque inferies ſupra dictæ Panacææ. In vulneribus, & ulceribus corroſivis, aliſque pernicioſis morbis maximè prodeſt. Ipſius doſis à gut. 8. ad 10. in vino, vel aliis ſpecificis. Hoc corpore



corpora renovari & reviviscere scribit Basilios, & alii; mundificat enim omnem humoris impuritatem, quæ sanguinem polluit & cordialissimum est. Hydropicis, cachecticis, hecticis, phthisicis, omnibusque infirmitatibus mirum in modum confert.

Alii multi de hac scripserunt, non verò facile adeo ad agendum; si enim manipulationem observabis menstruum hoc non est cur stilles, imposita quippe aqua vitæ removetur, & aliis inservit solutionibus.

Tincturæ aliæ modo eodem fiunt, omnesque optimæ hæ autem duæ cæteris præstant. Illa pariter, quæ ex antimon. crudo extrahitur, mirifica est, nitrum quippe simplex attrahit tincturam, & ignis nihil de ipso consumpsit; dicitur autem Panacæa. A regulo vulgari extrahitur tertii gradus, ab electris, à regulo Martis, à regulo Jovis, à croc. metall. à flor. antimon. à calcinationibus ejusdem, & si cum dicto menstruo extrahatur, multò melior evadet, quàm ex acetis stillatis, aliisque liquoribus. Ejus dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. ʒ.

Olea nostra corrosiva sunt, oleum nempe glaciale, hoc est butyrum illud, quod dixi ad aurum solvendum, atque hoc malam omnem carnem corrodit. Alterum liquor est, qui per deliquium fit ex facibus reguli vulgaris.

Essentiæ à plerisque habentur illæ, quas nomine tincturatum, vel extractionum appello; essent. verò dico eas, quæ hoc fiunt modo: ʒ. de simplici illo, ex quo essentiam vis extrahere, flores, cortices sem. & radic. si omnes habere potes, atque hæc macera in spiritu vini rectific. duobus diebus: inde stilla ad siccitatem. Hinc spiritum illum imbebe iterum herbis, vel floribus ejusdem, iterumque digere in vase bene obturato; stillaque denuò, bis autem iterum eundem sequare modum. Illam tunc circula, & essentia erit vegetabilis, quod adhibueris. Quibus plerumque utor, sunt de absynthio, menta, rosmar. salvia, spica, calendula, liliis convallis, flor. tiliæ, flor. pæoniæ, lign. quercin. angelica, carlina, vincetoxico, chelidonia, euphrasia, bistorta, tormentilla, contrahierva, bacc. lauri, bacc. junip. anisi, fœnicul. cumino, sem. pastinacæ, dauco, cardamomo, galanga, cort. citr. & aliis.

#### Quinta essentia.

Secus ac supra dictæ fiunt hæ, fermentantur enim primores, ut tot alii scribunt, indeque per distillationes oleum separatur, quod separatum vera est quinta essentia. Tincturæ liquidæ sunt extractæ de spiritu vini, exhalando ipsius partem. Extractæ nonnullæ stillatis aquis liquorum acidorum auxilio. Illæ de Mineralibus, & Semineralibus extractæ sunt cum suis menstruis appropriatis. In Manipulario nostro de his apertè patebit.

#### Elixir.

Cum nominentur hæc in observationibus nostris, necesse est idèd ipsorum aliqua explicare. Elixir proprietas ad usum Crollii semper feci, optimosque testari possum effectus. Addo ego cum illo essent. absynthii, & menthæ, elixir verbi gratia, ʒ. ij. essent. absynthii, & menthæ, ana ʒ. j. digere simul, ipsoque utere, magnum enim est stomachale. Ita etiam eidem addo essent. Chelidoniæ, cymbalariae, ramoracciæ, nasturtii, synapis, limacum, an. partes æquales, & digero per mensem, de quo datur ʒ. j. ad ʒ. ʒ. contra affectus omnes atrabiles, scorbuticos, hypochondriacos exitu felicissimo.

#### Elixir Antiscorbuticum, & contra Hypochondriacos affectus.

Recipe elixir proprietatis ʒ. ij. essent. carab. ʒ. ij. essent. corr. cappar. essent. cortic. tamarisci, essent. cortic. mediani fraxini, ana ʒ. j. radic. dictam. alb. rhapontici, polypodii, scorzonerae, filicis, acori, ana ʒ. ij. nasturtii aquat. sedimaralis, camædryos, chelidoniæ, ceterac. linguæ cervinæ, acrimoniæ, acerati, corymbiferi cum floribus, hepaticæ, fumariæ, flor. genistæ, centaureæ, hyperici, ana manip. 2. sem. genistæ, fœnic. amar. ana ʒ. ʒ. ligni sancti raspati, cortic. ejusdem, ana ʒ. iv. salis parillæ ʒ. j. ʒ. lign. sassafras ʒ. iv. salis tart. ʒ. ʒ. triturrata infunde orania in spiritu vini bene rectificati, & flammati q. f.

usque quo bene imbibantur, & duobus digitis supernatet, digerens per dies 8. Stilla inde, & novam in stillato repetere compositionem ut supra. Pro hypochondriacis mirabile est, & pro his, qui frigidis affliguntur tumoribus. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ʒ. in rebus appropriatis.

#### Elixir Nephriticum.

Recipe ligni nephritici veri ʒ. ij. ʒ. camomillæ, meliloti, hederæ terrestres, virgæ aureæ, veronicæ, hypericonis, cum sem. & flor. herniariæ, sive herb. Turcic. ana manip. ʒ. radic. ononidis, pimpinellæ, saxifragiæ hermoracchiæ, sem. cynosbati, milii folis, ana ʒ. ij. alchechengi ʒ. iij. bacc. junip. & hederæ, ana ʒ. j. ʒ. contrita omnia in vase infunde bene obturato, cum spiritu vini terebinthinato, qui digitis quatuor supernatet, & octo diebus digere, inde stilla; supradicta iterum viridia infundens fac ut supra cujus dosis à ʒ. j. ad ʒ. ʒ. & pro arenulæ morbo, & calculorum, proque ipso calculo optimum est.

#### Elixir Uterinum.

Recipe artemis. herb. Turcic. matricar. pulegii, calamenti, ana manip. j. cortic. fraxini, & fabinæ. ʒ. iij. cortic. citrin. & mali medici, ana ʒ. ʒ. radic. vincetoxici, aristolochiæ, pæoniæ, rub. tinctorum, bryoniæ, ireos, dictam. alb. zedoariæ, sem. anisi, cardamomi, ana ʒ. ʒ. ocyymi ʒ. ij. bacc. lauri ʒ. ij. zinziber, cinnamomi, nucis moschatae, croci, ana ʒ. i. omnia triturrata digere cum spiritu vini alcalizati ʒ. iij. in vase vitreo bene obturato, & loco calido, nempe fimo equino; sive balneo Mariæ. Post dies 14. stilla per balneum Mariæ, addeque inde ʒ. j. novi vini spiritus fecibus, quæ in stillatorio remanserunt, iterumque digere in loco calido. Post octo dies separa per inclinationem spiritum tinctum, lentissimoque igne tincturam exhala, donec mellaginosam convertatur in formam. Primò hanc adde distillato; feces in cinere incende, & aqua artemisiæ saltem extrahe, qui supradicto Elixir adjungitur unà cum ʒ. j. tincturæ Jovis. Divinitus operatur in uterinis affectibus, omnibusque morbis, qui ab utero trahunt originem. Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. in liquore appropriato, & multis potest adhiberi diebus juxta ægroti necessitatem.

#### Extractum nostrum Antepilepticum.

Recipe extracti cranii humani facti sec. usum ʒ. ʒ. extract. buxi, radic. & sem. pæoniæ, ligni quercini, flor. lil. conval. & flor. tiliæ, ana ʒ. ij. mucilag. cornu cervi, de primo anno ʒ. iij. lapid. veri bezoar. Orient. unicornu veri, unguis veri Alcis, ana ʒ. j. extracti hirundinum, & picarum priusquam è nidis discedant, stercoris pavonis, ana ʒ. j. ʒ. narcotici de vitriolo; salis Lunæ, succini, ana ʒ. j. magister. margarit. corall. & saphyrorum, flor. affium odorifer. balsam. Peruviani in petra, ana ʒ. ʒ. diaphoretici fixi de antimonio nostro ʒ. ʒ. tincturæ nostræ universalis de antimonio cum auro ʒ. iij. misce, & fac compositum, de quo vel in pilulis, vel in liquore appropriato dabis à ʒ. ʒ. ad ʒ. ʒ. pro vice quindecim diebus, matutino tempore Luna deficiente.

Hoc multi liberati omnino sunt epileptici, quamvis etiam nonnullis dederim per menses integros, cui plus, cui minus. Si verò laboriosum, & magni sumptus est, inter potentiora locum sibi vindicat. Usu eodem optimum est contra omnes hemicranias. Paralyfes, Apoplexias & morbos capitales ex intemperie frigida productos.

#### Tinctura nostra Polycresla.

Recipe radic. angelicæ, carlinæ, dictamni albi, bistortæ, tormentillæ, ana ʒ. iij. vincetoxici, gentianæ, rhapontici, scorzonerae, acori veri, ana ʒ. ʒ. fol. absynthii, abrotani, ivæ attreticæ, ana manip. ʒ. fol. scordii, calamentis ana manip. i. flor. rosmar. centaureæ minoris, horminis, betonicæ, & malorum medicorum, ana pug. i. cinnamomi, nucis moschatae, caryophyl. ana ʒ. i. myrrhæ, mastich. aloë succotrini, ana ʒ. ij. castorei,



castorei, mumiae transmarinae, an. scrup. 2. corall. rub. preparati, cornu cervi, matr. perl. preparatae, an. drach. 1. s. croci scrup. 1. aff. 1. dulc. spicae nardi an. drach. 1. cort. citr. & malorum mediocrium, an. unc. 1. s. sautal. rub. citr. & alb. an. unc. s. omnia contere, & infunde in vase vitreo bene obturato una cum spiritu vini electi alcalizati lib. 9. ad digerendum per dies 15. Per detonationem inde tincturam sejunge, ipsique salem adde facum sec. artem de incensis sacibus. Tinctura haec maximis pollet virtutibus, perinde ac Elixir vitae spiritus recreat vitales, omnemque expellit ab ipsis veneni vaporem. Datur in omnibus malignis morbis, tempore pestis, & contra omnia venena à 3. j. ad 5. j.

*Elixir vitae majus nostrum.*

**R** Ecipe succ. melissae lib. 9. vini generosi lib. 4. cornu cervi in fragmenta crudi lib. 3. unicornu fossilis, bo-larum. pretiosi an. lib. 6. vipersas decorticatas, absque capite, cauda, & interioribus num. 3. & distilla per tamburlanum bene stannatum, quod magnum habeat refrigeratorium, fragmenta autem cornu cervi, & unicornu stent in collo tamburlani, ut omnem recipiant fumum. Postquam stillaveris, novum iterum succum & vinum distillato adde, semperque recens cornu cervi, & vipersas tres ut dictum est, quam manipulationem fac novies; qualibet nempe vice adjungens recentem succum, recentemque vinum distillato, & vas permutans juxta capacitatem. Ultima vice addunt omnia supradictae tincturae policrostae & in fimo equino, sive balneo Mariae calido digeruntur per mensem in vasibus vitreis capacibus bene obturatis. Distilla inde ad siccitatem extrahens non solum ex omnibus fecibus, sed & fragmentis ossium, & terris, salem secundum artem, quo immixto cum stillato circulas per duos menses.

Elixir hoc, quamvis difficile, attamen non magnae impensae, illo autem nunquam inveni pretiosius inter tot, quibus usus sum, cordialibus enim operatur quam illud Serenissimi Magni Etruriae Ducis. In omnibus morbi affectibus, in quibus cor, & viscera auxilio indigent, dari potest, ad venenorum, putredinum, &c. resistantiam. Dosis à 5. s. ad 5. ij. neque odorem habet aquae vitae, sed gratissimum, & suavem.

*Tinctura Viperarum nostra.*

**R** Ecipe vipersas decorticatas, num. 20. & imbebe spiritum salis; indeque adde dictam. Cretic. albi, tormentillae, bistortae, vincetoxici, scorzonerae an. un. 1. vini albi generosique q. s. ad imbibendum, quod supernatet duobus digitis, & digere in baln. Mariae, seu fimo equino. Post dies octo in eodem vase vitreo decoque per duas horas in balneo Mariae, indeque sit fortis expressio. Feces exsiccatae incenduntur, & sal extrahitur. Quod remanet his purificatur ovi albumine, iterumque ponitur in balneo Mariae tepido per triginta dies, calore moderato, hoc enim tempore rubescit ad instar sanguinis.

Cordialis haec est, & Alexipharmaca; prodest hecicis, phibicis, hydropicis, cachecticis, febre laborantibus putrida, & maligna, & tempore pestis; multi eum utuntur pro praeservativo, sanguinem enim mundificare affirmant. Dosis à 3. j. ad 5. s.

*Extractum nostrum Antinephreticum.*

**R** Ecipe lign. abietini cort. & ligni raspati lib. 1. ligni nephretici lib. 6. cortic. interioris coryli unc. 7. herb. faxafragiae, pimpinel. cymbalariae, parietariae, gerc. Turcic. an. manip. 1. radic. liquiritiae, anodinae, bardanae, levistici an. unc. 1. 6. bacc. maturarum junip. amygd. perfici, amygd. cerasi an. unc. 3. sem. dauci, petroselinii, pimpinellae, cepae, urticae, genistae an. unc. 6. comprime, & contere omnia; recipe inde succi de herniaria, de haedera terrestri, de parietaria, de cepa, de malo massilico, de raphano an. lib. 1. vini generosi lib. 3. & una cum suprad. omnibus pone in vase vitreo capac. bene obturato in balneo tepido per dies octo. Fortem inde fac expressionem, & ovi albumine clarifica, & percola, & exhala per alembicum in balneo Mariae, donec in formam extracti liquidi evadant.

Tunc addes hoc magister. Oculorum cancrorum, cortic.

ovi, matr. perl. crysalli de monte an. 3 j. s. salis fabarum, parietariae, succi lini, urinae volatilis an. drach. 1. misce, & serva.

Maximum est remedium contra omnes calculorum species, arenulas & similia, dolores extinguendi nephreticos ceteris virtute antecellit. Dosis à 3. s. ad 3. j. vel in pilulis, vel in liquoribus appropriatis.

*Antifebrile nostrum.*

**R** Ecipe cortic. chinae lib. 6. cortic. tamarisci, cort. fraxini, an. unc. 1. fol. camedryos, chelidoniae, pimpinellae, heliotropii minoris an. manip. 6. aquae stillatae de succo camedryos, & de succo cymarum tenerarum fraxini an. lb. iij. spiritus vitrioli stybiati 3. ij. contrita omnia infunde in aqua praedicta, in vase vitreo bene obturato, in balneo Mariae. Post dies 12. per fortem expressionem omne humidum extrahe, deque exsiccatis, & incensis fecibus fac salem. De liquore fac extractum cum calore baln. secundum usum. Hinc recipe de dicto extracto unc. 2. extract. de rhabarb. de fenna, de gratiola, an. unc. magister. de mechoacana, de frialappa an. drag. 1. salis de fecibus superd. salis de centaurea minore, de gentiana, de absynth. vitriolato de vitriolo Martis ana 3. j. magister. de cortic. limacum parvarum de lacu oblongarum unc. 6. magister. tart. soluti drag. 2. haec omnia fermentabis per dies duodecim. Datur antifebrile hoc in omnibus febrium speciebus, tam intermittentium quam continuas. Sistit vapores febris, placideque purgat, est autem ex perfectissimis, quae adhiberi possint, absque eo quod unquam nocuerit. Dosis a 3. j. 6.

*Spiritus noster Vitrioli stybiatus, qui ingreditur in aqua Catholica, & in Antifebrili extracto.*

**R** Ecipe spiritus vitrioli rectific. unc. 1. vitri hyacinthini de antimonio unc. 6. digere in loco calido per mensem; spiritus enim tingetur in aureum colorem; inde percola, & serva.

Hic spiritus erit stybiatus supradictus, qui una cum medicamentis purgantibus à guttis 12. ad 20. placide, & sine vomitu operatur, corrigitque earundem medicinarum calorem.

*Magisterium Tartari purgans nostrum.*

**A** Plerisque hoc describitur, non verò ei fidem illam habent, quam habere deberent; Medici enim compositum minime animadvertunt.

Fit hoc modo: recipe salis de tartaro facti de oleo dicti tartari partem unam, aceti distillati fortissimi partes duas, & misce simul. Postquam interno exastuaverint murmure, distilla ad siccitatem, indeque novum acetum adde. Subbullitione praedicta iterum facta dulcificantur; acetum enim falsedine salem exuit, & sale acetum acrimoniam. Hinc iterum distilla, & hanc facies manipulationem decies, donec acetum suam sibi resumat acrimoniam; semper autem stillabis ad fixationem tartari. Fixo decimae vicis adjunge aquam vitae stillatam, & rectificatam, factamque de vini fecibus, subito enim tingetur in rub. colorem. Tincturam inde percolas & aquam vitae iterum infunde, donec amplius non tingat, atque tunc filtra, iterumque stilla ad siccitatem. Quod restat fixum ad aërem resolvitur in oleosum liquorem, qui magisterium est tartari solutivum.

Solvit crassos, & tenaces humores, qui in venis sunt; certum autem, & necessarium remedium est in omnibus febribus longis, & vitiosis. Immo Praceptor meus Riverius in fine febrium acutarum, vel contumacium ad humorum reliquias, & fermentum resolvendum, agrotos purgabat per epicrasin hoc modo: Recipe aq. capil. Ven. vel similis humoribus appropriatae, unc. 6. fennae scrup. 2. cynamom. rhabarb. an. scrup. 1. spiritus vitrioli stybiati, sive communis gut. 3. infundebatque per noctem. Manè aquam percolabat, additisque gut. 15. vel 20. de dicto magisterio, propinabat quater, vel quinquies, cui plùs, cui minùs, juxta necessitatem, cui quotidie, cui alternatim; nonnullis dosim minorem, nonnullisque majorem; aliquibus pro rhabard. mechoacanam vel frialapam ponebat; aliquibus unc. 1. dabat syr. rosarum solutivarum, atque hoc modo corpora obstructionibus infecta non remanebant, neque febres in erraticas convertebantur. Hac eadem



eadem serie utor, usque sum ego, sicut & Medici multi mihi familiares multam sibi laudem comparavere, maximas enim vidi utilitates.

*Febrifugum nostrum.*

**R** Ecipe flor. antimonii ter sublimati cum sale ammoniaco, & dulcificato, vitri de antim. hyacinthino pellucidi, an. unc. β. aq. fortis factæ de nitro, & de alumine unc. 4. in qua aqua præcipita dictum antimonium, iterumque recipe Mercurii revivificati à cinnabare unc. 6. & cum aqua forti facta de nitro, vitriolo, & alumine præcipita, donec omnia præcipitentur: recipe inde aurum de Cechinis Venetis; aut Ungaris limatum ad unç. i. & solve in aqua regia, omniaque tria menstrua cum materia pone in retorta bene lutata, & igne gradatim distilla ad siccitatem; spiritum collige in vase recipiente bene obturato, ipsumque distillatum infunde in retorta. Distilla iterum, eodemque modo semper super caput mortuum duodecies. Ultima vice fracta retorta lavatur pulvis aquis cordialibus quinquies, quem inde exsiccatum in lb. ii. aquæ vitæ rectificatæ immerges, ipsumque in retorta nova benè lutata iterum distillabis coobans sexcies super massam. Hinc aquam vitæ separa, massamque calcis reponne in crucibulo forti benè lutato, igne rotæ, per tres horas. Remove inde, & spiritum aquæ vitæ superincende, quem antea stillaveras.

Febrifugum est hoc compositum tribus ab Herculis, cum nostro Præceptore quarto Athleta, quartanarum destructor, ut ex ejus, & meis Observationibus innumera patuerunt experimenta. Dosis à gr. vi. usque ad x. cum resina scammonæ, vel scammonæ præparata cum sulphure, à gr. xii. usque ad xxv. juxta vires. Multi hoc indagaverunt, non autem veris manipulationibus, & legitimis: hoc unum sincerum est.

*Sales, quos adhibeo in febribus pertinacibus perinde ac Autumnalibus, & ad humores heterogeneos dissolvendos optimi.*

**R** Ecipe sal. de gentiana, de centaury minore, de chelidonia, de absinthio, de carduo sancto, prunellæ, de vitriolo Martis, flor. sal. ammoniaci, an. unc. i. aquæ de agrimonia, vel similis q. f. prædictosque sales resolve, & fac lixivium. Decoque inde lento igne, donec supra fiat pellicula, & reponne in loco humido, & frigido, nam crystallizantur. Consumunt hi opilationes, febresque intermittentes vitiosas, ut quartanas, & ex impuritate productas. Dosis à ʒ. i. ad ʒ. β. & ʒ. i. in jure, vel similibus appropriatis. Nonnullis datur duabus horis ante accessiones, & tegitur æger, ut sudare possit.

Salem quoque ex alumine, & tartaro factum præceptor meus dabat, quem valde laudibus extollebat: ego verò nunquam usus sum, scilicet.

Recipe crem. tart. & aluminis, an. partem æqualem, aquæ stillatæ de carduo sancto q. f. in qua resolvuntur supradicta, igneque lento reducuntur in formam, qua crystallizari possint in loco humido, & frigido. De hoc datur à ʒ. i. ad ʒ. β. in liquoribus appropriatis.

Sapè etiam do salem absynthii vitriolati vel alios; recipe nempe salem, & cum spiritu vitrioli conjunge donec subbullitio fiat, qua facta evapora, & minus pungens erit, aptiorque ad apertionem, & refrigerantior. De tartaro vitriolato à multis scribitur, & à Medicis adhibetur.

Conjunguntur pariter sales hi quilibet cum chalybe, si recipias partes duas salis, quem chalybeare vis, partem unam vitrioli Martis, & cum aqua stillata appropriata liquefacies, igne inde lento condensabis in sale, qui veri sunt chalybeati. Eodem modo fiunt cum vitriolo Veneris, cum sale Lunæ, cum sale Jovis, & similibus.

*Sal noster celebris Antiscorbuticus.*

**R** Ecipe de cineribus dealbatis, & incretis fraxini, juniperi, buxi, ligni sancti, mentæ crispæ, camedryos, agerati, acrimoniæ, centaureæ, hepaticæ, cetracæ, linguæ ceru. fumaricæ, cymbalaricæ, nausturtii aquatici, cappar. tamarisci, genistæ, hypericonis, portulacæ marinæ, samentorum viris, an. partes æquales, cum aqua nasturt. aquaticæ. fac saltem sec. artem. Inde recipe de sale ipso unc.

*Laz. Riverii Opera.*

2. & adde vitrioli Martis ʒ. ii. salis tart. aluminati ʒ. β. flor. salis ammoniaci ter sublimati ʒ. ii. auri sol. num. 20. spiritus salis communis q. f. ad imbibendum, ita ut dimidio digito supernatet. Calore lento exsicceetur spiritus cum suprad. & fiat massa, & vocatur Antiscorbutic. Riverii, qui in hypochondriacis, cachecticis, & aliis perfectissimus est; humorum enim atrabiliariorum omnes expellit impuritates, & venas mundificat. Dosis à ʒ. β. ad ʒ. i. in liquore appropriato.

*Extractum ligni sancti nostrum pro lue venerea.*

**D** Insert hoc nostrum ab aliis: extracto quippe utor, & menstruo, quod sudoriferum est hoc modo.

Recipe lign. sancti. raspat. cortic. ejusdem, falsæ parillæ, cynamom. an. unc. 4. falsasfras unc. 2. vini generosi lb. xii. digere in vase benè obturato. Post dies duos stilla, & extrahere lb. ii. spiritus, quem ex se reponne. Aliud vinum exhala per baln. Mariæ, donec deficiat plusquam dimidium, & tunc percola, & filtra benè, & per baln. iterum exhala donec evadat in formam melluginis, & aliquantò durius. Hujus extracti pro qualibet uncia adde ʒ. ii. diaphoretici communis antim. ʒ. β. & belzoaris Orientalis. & fac pilulas, de quibus una pro manè datur ad pondus ʒ. i. ʒ. β. quam sequitur unc. β. de illa aqua vitæ, de qua dictum est, beneque tegitur infirmus, num. 30. diebus, citius vel serius ab omni mala qualitate prædicti morbi liber extabit, ut toties de hac compositione expertus sum.

*Terebinthum potabile nostrum pro Gonorrhæis.*

**R** Ecipe terebinthinæ claræ unc. 4. & pone in marmoreo mortario unâ cum duobus vitellis ovi, & ligneo pilillo misce; nam in liquidam convertetur, addensque lb. i. aquæ acrimoniæ miscebis donec soluta omninò sit. Hinc ampulla vitrea pones in baln. Mariæ per noctem, & manè optimè percolabis per chartam emporeticam, vel linteolum. Adjunge inde sacchari fini lb. i. vel plus, cum succo limonis q. f. per gratitudinem, & de hoc dabis unc. i. ad unc. i. β. pro mane illis, qui remedia in pilulas sumere non possunt; hæc enim ex odore optimum faciet effectum.

*Aqua nostra contra Gonorrhæas antiquas.*

**R** Ecipe ligni sancti, lentisci, corticis abietini, an. unc. 4. triura, & infunde in lb. viii. vini albi generosi, add. radic. dictamni, ireos Florentinæ, an. unc. 3. menthæ siccæ manip. 4. verbenæ manip. i. β. sem. agni casti, rutæ, lactucæ, an. unc. 3. benè contusæ, terebinthinæ claræ lb. i. misce, & pone in vitrea cucurbita per horas 24. in loco tepido; inde per baln. Mariæ distilla, & de illa dabis coclearia duo, vel tria in mane per aliquot dies.

*Potio nostra contra Gonorrhæas, & Ulcera renum, & vesicæ.*

**R** Ecipe herb. vermicularis manip. i. radic. consolidæ majoris, tormentil. alchimil. sigilli Salomonis, polygoni, plantag. an. unc. i. β. sem. cydoniorum, agni casti, rutæ, plantag. rosarum, an. unc. i. succi limonum lb. i. sang. draconis, croc. Martis adstring. an. unc. i. aq. flor. malvæ lb. 3. macera per dies duos, postea igne lento decoque, & da cochlearia duo pro mane horis quatuor ante cibum.

*De Extractis.*

**I**N Pharmacopœa Præceptoris mei manipulationes multæ ab his differre videntur, sed in formam ab eodem descriptam redactæ, majoris evadebant pretii, quàm illæ ad usum Quercetani, & aliorum; non verò quòd Quercetanus, totque alii optima non egerint, sed facile est inventis addere, ipse diversam utilius servabat formam, ut ex his patet Arcanis à me descriptis quæ manipulationum augmento, & virtutibus amplificantur.

Extractionum purgantium ex vegetabilibus, juxta supradicti disciplinam, usus meus est, quòd succum ex plantis illis extraho, quas jam antea propriis collegi temporibus, ipsumque digero per balneum, & optimè clarifico; hinc distillo separando spiritum, remanensque in extracti formam coagulo. Mox plantam expressam, novamque simul non expressam minutatim contero, & in vase pono capaci apto

G g g g

ad



ad distillandum per descensum, ex eis nempe, quæ ad lignorum olea conficienda adhibentur. Apposito vase ad oleum recipiendum, igne circulatorio, qui semper vehementior augetur, omnis exit humiditas, cæteraque in albissimum cinerem incensâ converto, ni verò cinis q. f. calcinatus sit, iterum ipsum calcino. Ex hoc cum aqua vel spiritu primo separato lixiviam facio, & cum filtratione salem, secundum usum. Oleum per descensum extractum, quod empireumaticum exhalat odorem, supradictò sali immisceo, & pauco salis tartari clari; & puri pariter eidem addito, digero in loco calido. Distillo inde semper super feces coobando spiritum donec oleum salis vi ab empireumate destituatur, & in formam mellaginosam reduco. Tunc extracto primo factò mellaginosum quoque hoc addo, quia propter omnes spiritus extracti, & salis facultates in unum hoc modo congeruntur. Hæc perfectior est forma, quæ pro extractionibus possit reperiri. In usu datur juxta compositi vim, vel Pharmacopœarum regulas, immò potius cum majori levitate, quia efficacior.

In herbis, drogis, aut radicibus siccis, vel pauci succi omnis extrahitur vis cum proprio menstruo, indeque accommodatur materies, ut suprâ, per descensum, & oleum exprimitur; hinc sal fit, qui oleo additus, & pluries, ut dictum est, rectificatus extracto jungitur, verum quidem est, quod hujusmodi extracta in vasibus vitreis servantur obturatis.

Alia generum omnium extracta simili pacto fieri possunt, tam alexipharmaca, quam specifica, quamvis ex rebus variis forent composita: sed de horum descriptione non me extendo, qui enim artis exercitatione prædatus est, instructione non indiget.

Notandum est, quòd extracta vulnerariarum herbarum, verbi gratia aristolochiæ, symphyti, hypericonis, stellariæ, veronicæ, faniculæ, hederæ terrestres, & similibus dari possunt internè non solum, verum etiam externè in linimentorum formam vulneribus admota absolute, vel cum similibus; mirificos operantur effectus, confortant quippe, in unum contrahunt, & tuentur partem à corruptelis, ipsamque citius ad cicatricem reducant. Ita pariter plantæ illæ, quæ abstersivæ sunt, & exulcerativæ, meliores efficiunt operationes.

De oleis vegetabilium ad usum Spagyricum tot de Spagyrica tractantia volumina differunt, at modum hunc optimum cæterorum existimo. Plantæ, de quibus vis oleum, fac areant, & oleum per descensum extrahe, ut supra dictum, hinc de cineribus fac salem, quem oleo junge, indeque una cum pauca calce viva oleum rectifica, calx enim empireumaticum odorem resolvit, si pluries, ut mos est, trajeceris. Mox in vase vitreo positum soli expone, flores vel folia proprii vegetabilis ad infusionem immiscens, vel alterius, si compositum decreveris; odorem enim gratum resumit, juxtaque plantarum virtutem, gradus recipit illos augmenti quot sunt centum pro qualibet; adhibetur autem non secus ad adnotata à primo meo Præceptore Petro Joan. Febristam interius, quàm exterius.

*Basilicum Chymicum nostrum.*

**R** Ecipe ol. myrrhæ, mastiches, thuris distillati, an. unc. ol. terebinthinæ, de lateribus, ceræ distillati, an. unc. 1. vitell. ovorum num. 3. misce benè, utere, nam mira experieris.

*Balsamum Sulphuris nostrum.*

**R** Ecipe flor. sulph. unc. 1. ol. terebinthinæ unc. 3. ol. violati unc. 3. misce, & in pila vitreata bulliant, agnabique spatula lignea donec fiant rubicundissima. Remove inde ab igne, & adde ol. ceræ, vitelli ovi, an. 3. 3. misce, & utere omnibus vulneribus, ad spasmos, nervos contusos, & transfixos.

*Balsamum Mumiatum nostrum.*

**R** Ecipe extract. aristolochiæ rotundæ, centaureæ minoris, an. unc. 3. extract. hypericonis, symphyti majoris, an. unc. 1. terebinthinæ Venetæ, & mellis, alb. ana. unc. 4. myrrhæ unc. 3. mumiae veræ unc. 3. croci Martis unc. 4. hæc omnia misce, & infunde in vase vitreo cum lib. 6. aqu. vitæ rectificatæ, & digere per mensem, agitan-

do quotidie materiam, ut facilius spiritus vini rerum tincturam extrahat. Postea per inclinationem separa diligenter tincturam, & per baln. distilla usquequo sit in fundo alembici quasi nelligo, quæ ad balsamum, quo uti poteris ad vulnera quæcunque agglutinanda. Spiritus distillatus mirabiles etiam possidet virtutes.

*Balsamum Apoplecticum nostrum.*

**R** Ecipe essent. sive ol. distillati spicæ, salviæ, rosmar. junip. an. dragm. 1. rutæ, majoranæ, an. drag. 3. cinnamom. caryophyll. an. scrup. 1. succini dram. 1. 3. extract. belzovini, storacis calamitæ balf. albi sodi Orient. an. drag. 2. balf. Peruviani, & Orient. liquidi an. unc. 3. ol. nucis moscatæ expressæ unc. 3. ambræ griseæ; nigræ, an. drag. 1. 3. musci odorati drag. 2. misce, & ad calorem lentissimum agita, usquequo simul uniantur. Perfectissimum est pro epilepticis, & apoplecticis, vertigines expellit, ab aëris contagiosa corruptione defendit, cor recreat, omnes vitales facultates, & animales. Adhibetur ungendis commissuris coronalibus, temporibus & odorando.

*Spiritus noster Sulphuris ad consolidanda pulmonum ulcera, ipsorumque sanandas corrosiones.*

**R** Ecipe spiritus sulph. acidi rectificati, & paulatim superimibe limaturam chalybis ad lib. duas, vel tres; nam ex se subbulliet, indeque quasi in salivam evadet. Hinc omnia pone in retorta bene lutata, & stilla sec. artem, & extrahe spiritum. Hunc imbe iterum capite mortuo, & cooba quinquies, nova autem retorta qualibet vice. Dulcificatum spiritum adde magisteriis margaritarum, balf. imperiti Orientalis, & belzovini, an. unc. 3. misce, & in supra dictis affectibus mirabile est, in omnibus phthificis, quorum multi hoc salutem habuere à me curati.

Magisterium margaritarum fit solutis primò unionibus in ol. sulph. & inde bene dulcificatis cum aquis cordialibus, postea exaltatis cum spiritu vini magisteria belzovini, & balf. Orient. dissolvuntur in spiritu vini, & præcipitantur aquis cordialibus, indeque sublimantur eodem modo, quo sulphur. Quod sublimatur purius est, & pulmonibus optimum.

*Balsamum Canis rubei nostrum.*

**O**ccides canem rubeum, rejectisque interioribus, non verò adipe, cæde ejus carnem, ossa, & pellem in frusta, quæ omnia in vitro capaci fac bulliant cum ol. & vini q. f. addens hæc: adipis ursi, anseris, gallinæ, taxi, vulpis, felis, equi, asini, an. unc. 1. lumbricorum terræ vino ablutorum lib. 4. radic. hebull. ivæ arteticæ, an. manip. 3. salviæ, spicæ, rosmar. absynth. abrotani, fol. cupressi, cortic. hederæ, cortic. ulmi, sabinæ, an. manip. 1. hæc omnia decoque, donec caro consumpta sit ossaque omnia disjuncta. Tunc ad torcular exprimuntur, & reponuntur in retorta forti lutata, unà cum unc. 1. gummi de hederæ, & lib. 2. lumbricorum supradictorum, ivæ artericæ manip. 6. ranis vivis num. 20. & digere in loco tepido per dies tres. Inde distilla, extrahe omne oleum, quod servabis, nam balf. anodinans est, & consolidans nervos, præcipue in morbis articularibus.

*Emplastrum Sulphuris Rulandi.*

**R** Ecipe olei sulphuris nostri unc. 3. colophonie drag. 3. ceræ unc. 3. myrrhæ ad pondus omnium; cera, colophonia, oleoque liquefactis simul, & bene commixtis insperge myrrha subtilissimè trita paulatim, igneque lento coquantur, spatula semper agitando, donec optimè permixta fuerint: post quadrantem hora ab igne dependantur, & paulatim frigescent. Habebis emplastrum præstantissimum, certum, & infallibile in curandis cujuslibet generis ulceribus, & vulneribus quibuscumque, sicut experimenta in Centuriis ejusdem Rulandi descripta, quibus tutò, & perpetuò fidendum, & in curatione 94. dicit, quod in hoc emplastro est divina, miranda, & celer vis emolliendi, suppurandi, rumpendi, abstergendi, & conglutinandi, quemadmodum longa experientia expertus est.

*Oleum nostrum Bufonis.*

**R** Ecipe bufones sylvestres ex illis, qui longè ab aqua morantur, numero quatuor vivos, & pone in olla bene



nè obturata ut purgentur; recipere indè ol. commun. l. 2. in quo ebullierint manip. 1. pro quolibet hac re, scilicet salvia, sonci, radie. iridis, & gentianæ, immerloque uno ex illis bufonibus pones ad ignem in loco aperto, in olla vitreata cooperta; sed cave à fumo. Dùm primus aridus est, pone alterum pariter vivum, cui arido insequatur tertius, & sic quartus; dùm coctum ol. est, percolatur; atque hoc validissimum est contra omnes dolores frigidos, optimum, contra tinea, morphœam, & hydropem, & tepidum adhibetur.

*Balsamum Antipoplecticum nostrum.*

**R** Ecipe ol. succini rectificati, petroli, Philosophorum rosmarini, salvia, spica, (omnia verò sint distillata an. 3. 6. ol. nucis moschatæ per expressionem unc. 1. extracti castorei, ol. buxi, caphuræ, an. drag. 1. balsami Peruviani, opobalsami Occidentalis, ziberti, extracti benzoini, an. unc. 3. musci, ambræ griseæ, an. scrup. 1. m. omnia, & calore moderato conficiatur balsamum, quod valet contra morbos capitis ungendo occiput, nares, & pulsus, contra apoplexiam, epilepsiam, & similia. Ungendo umbilicum colici dolores tolluntur, & hystericae passionēs.

*Pilulae nostræ contra morbos pestilenciales.*

**R** Ecipe aloë loti, croci, myrrhæ, an. unc. 3. balsami Orientalis, Occidentalis, an. drag. 3. ossa de corde cervi num. 6. unicornum, smaragd. bezoard. Orientalis, margarit. præparat. coralli præparat. ligni aloë, an. g. x. ambræ griseæ g. v. tincturæ nostræ electri & magisterii tartari, an. q. s. ad formandam massam pilularum, de quibus capiatur una ad pondus 3. 3. fero in hora somni, bis in hebdomada. Sanguinem mundificant, caput & ventriculum corroborant, succurrunt cardialgiæ, spiritus omnes confortant, juventutem renovant, senectutemque retardant.

*Aqua nostra lapidem frangens.*

**R** Ecipe nuces juglandes virides in mense Maii, contusæque distilla ter coobando, semper distillato super alias nuces virides contusas, postea extrahe salem residui ex capite mortuo, & est validissima; dosis erit unc. 1. ad unc. 1. 6.

*Balsamum nostrum contra Asthma.*

**R** Ecipe bals. de sulphure facti cum ol. therebinthi, & ol. sulphuris nostri dulcificati, an. unc. 1. flor. affæ dulcis unc. 1. 6. ol. de saccharo facti cum spiritu vini lb. ij. m. fiat balsamum. Hoc prodest valde in omnibus morbis pectoris, & pulmonum; dosis erit cochlear dimidium, ad unum.

*Pilulae nostræ contra omnes impuritates sanguinis & humorum.*

**R** Ecipe extracti de helleboro nigro suo sale fixato unc. 3. calomelani nostri 3. ii. auri foliati mixti 3. 6. magister. margarit. 3. 1. misce, & fiat massa pilularum, dosis à scrup. 1. ad unc. 3. Si sine calomel. detur ad quatuor, aut quinque mentes bis in hebdomada; sanguinis autem contumaciam mundificabis in lue Venerea cum dicto calomelano.

*Balsamum nostrum contra dolores Colicos.*

**R** Ecipe amygdalorum amarorum ex persicis lb. iv. therebinthi Cypri lb. ij. conterantur omnia, & misce; recipe indè ol. express. ex nuce moscata unc. 3. bals. Peruviani unc. 1. 6. ex caryophyllis unc. 3. misce, & destilla sec. artem, & super caput mortuum ter cooba, indè adde spiritus vitrioli rosati 3. ij. essent. ambræ griseæ, ligni aloë an. 3. 6. misce, circula per dies 15. nam prodest mirifice contra dolores colicos; dosis 3. 6. ad 3. i. cum liquoribus appropriatis.

*Aqua Ophthalmica nostra.*

**R** Ecipe succi chelidonie, eufrazie, verbenæ, an. lb. 3. succi cancerorum fluvialium, unc. 8. aloë succotrinii unc. 3. turbiæ crudæ unc. 1. croci metall. unc. 1. 6. digere in levi calore per horas 24. indè destilla, & aquæ distillatæ adde vitri antimonii 3. ij. & fac bulliat lento igne per horam, indè cola, & ferva; nam excellens est contra suffusionem oculorum, caligines, &c.

*Lazari Riverii Opera.*

*Arcanum nostrum contra morsum canis rabidi.*

**R** Ecipe hepatis canis rabidi redacti in formam magisterii, & magisterii cancerorum fluvialium. an. unc. 1. tincturæ croci Orientalis, gentianæ, castorei, n. yrrhæ, an. 3. ij. quintæ essentia vitrioli, salis communis antimonii, Lunæ, an. 3. 6. foliorum hyperici, betonicæ, millefolii, centaureæ min. attemisiæ, menthæ, absinthii, plantagin. s. pelypodii quercini, salvia minoris, verbenæ, rutæ hortensis an. pug. 1. alii pug. 3. sicca, & pulveriza, & cum gummi tragacanthi q. s. dissoluti in aqua scorzonæ, & liquoribus supra dictis, fac pastillos, & da 3. i. pro vice per 40. dies cum æq. cordiali, & videbis mirabilia.

*Tinctura nostra contra Dysenteriam.*

**R** Ecipe sanguinis leporis sicci lb. 3. spiritus vini rectificati lb. 1. digerantur in balneo Mariæ per triduum, postea extrahe tincturam, ut artis est, & coagula ad formam mellagineam. Dosis est 3. 6. ad scrup. 1. cum lacte seminum acetosæ.

*Balsamum nostrum Mastiches.*

**R** Ecipe mastich. capat. q. vis, solve in spiritu therebinthi igne tepido ex balneo Mariæ, dein separa menturam corpore soluto, & habebis balsamum ad omnes corporis affectiones; nam externè appositum sistit vomitum oris ventriculi, si internè ad gutt. 4. in jure, vel vino generoso.

*Arcanum nostrum contra Volvulum & Vomitus.*

**R** Ecipe olei ætherei, seu quintæ essentia therebinthi unc. 6. balsami Peruviani 3. i. 6. mastiches capari 3. vi. misce, & distilla, postea cooba tribus vicibus, & utere in vino malvatico, vel jure cicerum rubrorum, aut alio specifico liquore. Dosis à g. 6. ad 12.

Idem prodest oleum æthereum in eodem morbo, &c.

*Spiritus noster Nitri fixi Tartarizati.*

**R** Ecipe spiritus nitri rectificati lb. i. pone in cucurbita vitrea oris ampli aperti, & paulatim, & guttatim oleum tartari facti per deliquium tantundem super affunde, spumam excitabit, tandiù super affundas, quandiù spumam inexcitaram observabis. Tartarum nitratum fundum petet, tunc decanta, & dulcifica, cum aqua rosacea. Datur in morbis longis cum decoctis appropriatis à g. vi. ad viii. in aqua cancerorum, vel formicarum, & antifebricum est.

*Emplastrum Antipleuriticum nostrum.*

**R** Ecipe farinæ sem. lini unc. 3. cepæ, & saponis novi, an. unc. 1. 3. contere, & misce simul, indè cum melle pone in sartagine ad ignem, permiscens omnia donec incorporentur. Hæc supra fluppam extende, & parti appone pleuritica, & opposita dolori, mirificos enim contra hunc morbum videbis effectus.

*Emplastrum nostrum pro fractis ossibus, & luxatis.*

**R** Epósito ossi in locum suum, recipe fulig. camini unc. 3. thuris unc. 1. farinæ tritici unc. 4. ovi albuminis q. s. ad supradicta subigenda: appone inde læsæ parti assulis accommodatis, & fasciis, neque removeas, donec pars ex se ipsa dimittat. Aliquo videtur incommodo esse, verum nullum aliud hoc æquare, necdum antecellere unquam vidi in hujusmodi affectibus; adhibentur inde cerata oxycrocei, & alia juxta necessitatem.

*Oleum nostrum Antipleuriticum.*

**R** Ecipe ol. communis lb. 4. mense Maii, in quo pone pleuræ human. lb. ii. lb. iii. flor. camomil. & liorum alborum duobus mensibus ad Solem. Ad torcular inde exprime, & libra oleum, cui adde cucurbitam de æstate longam ad pondus ipsius olei, projecto verò cortice, & medulla, contritaque in frustula, fac bulliat donec ol. absorberit humiditatem è cucurbita, cujus nempe minutæ partes aridæ evaserint. Tunc in promptu habueris duodecim ignita ferrea fragmenta nova ad pondus lb. 3. pro quolibet, ipsaque in ol. singulatim demerge; hoc autem modo bis iterum inflammata bis extinguēs in oleo; tunc enim perfectum erit. Mirabile est si illo tepido ungantur partes doloris in pleuritide bis, vel ter die.



*Pulvis Uterinus noster.*

**R** Ecipe herb. Turciæ. manip. 1. baccar. lauri cortice exutarum sem. pastinacæ an. 3. i. ʒ. rutæ, agnicasti, & præoniæ, granor. Paradisi, an. 3. ʒ. ʒ. calami aromatici, cassiæ lineæ, macis, cinnamom. caryophyl. an. 3. iij. sæcul. brioniæ, salis Jovis, an. 3. ii. misce, & in minutissimum pulv. contere, de quo dabis à 3. ʒ. ad unam in juribus, gelatino, confervis, vel similibus, contra omnes morbos uterinos.

**A** Arcana nostra omnia per tempus non licet in hoc Opusculo publicè explicare, verùm si duo alii anni vitæ & valetudinis favente Deo concedentur, Observationes multas paratas habeo adnotatu dignas. Manipularium quoque, in quo aperitè explicabuntur pleraque Artis Mytheria, errorumque cautiones, in quo offendunt Artifices. Quamvis verò multa hodie volumina novitia pateant Italico, Latinoque idiomate de Spagyrica, quæ tamen ab Antiquis collegere, ego quoque de iisdem scribam, sed multa correctoria.

Calyx Chymicus toties in Observationibus nostris nominatus, communiterque adeò omnibus concessus, non est ut nonnulli arbitrabantur, & arbitrantur, ex Regulo Antimonii vulgaris; ex Regulo quidem est, sed tertii gradus, qui longè differt à vulgari, quamvis etiam multi hoc utantur non sine periculo bibentium. Romæ fui, Neapoli, Venetiis, & tot in aliis Italiæ Urbibus, aliarumque Provinciarum, multosque inveni Calicis Chymici arcanum callentes, omnes verò ex Regulo communi, vel aliquos etiam ex composito cum Marte. Multoties cum multis ex his sermonem habui, penetraturus an quis partes arsenicales, quas Regulus in se continet, ab eodem segregare sciret, verum judicant cum Antimonium cum Tartaro incenditur, & nitrio, feces illas sulphureas, quæ separantur, omnem continere impuritatem Antimonii, illumque esse Calicem Antiquorum. Verùm longè equidem à veritate aberrant, nullum enim invenient Authorem ex Classicis, & rationalibus uti Regulo simplici ad Calicem formandum, sed ad alias quidem præparationes. Vulgaris Regulus nondum suam reliquit cruditatem; supra dicto autem modo factus vocatur Regulus primi gradus, de quo multæ compositiones fieri possunt, ut stellatus limatura ferrea, ut electrum nobile, quod Regulus est, & auro, argento, stanno, ferro. Alter Regulus fit in electrum cum ferro, ære, plumbo, stanno, Mercurio, & Regulo. Ut verò tertii gradus apex attingatur, hoc opus, hic labor est, & tunc pro perfectio concedi potest, ut Clossius inter Sanctos habitus, & Basilii Valentini inter Beatos illum celebrant Regem medicamentorum purgantium, tantum enim quæ naturæ nocent de corpore extrahit, sanguinem mundificat, & humores corroborat non corruptos, ut observatur in his, qui de illo sumunt, quamvis in vomitum erumpant, non tamen ullis viribus destituuntur, atque in hoc differt ab aliis Medicinis. Has laudes celebros, quia Latino patent idiomate, ideoque ignarorum aures non penetrabunt, arma enim puerorum manibus concessurus minimè sum. Dico equidem viginti duobus ab hinc annis nullum aliud purgans corpus meum penetrasse, quam vinum Calicis Chymici, de quo bibo ter, vel quater in anno, neque ulla unquam hoc tempore Dei gratia vexatus sum ab infirmi-

tate, & si in Observationibus crebro apparet, hoc fit ex eo quod mihi honores maximos attulit.

Nonnullorum quidem quin fraudes detegam hic minime negligendum est, quas circa Regulum patrare non verentur, quorum multi in hac Urbe, qui Calices conficientes ipsos communiter distribuunt. Hi tamen primum prætervolare gradum nequeunt, sed ut pulcherrimum, & fulgens opus appareat, marchesitam addunt argenti crudam, quæ non solum pulchritudinem auget, & verum Regulum per dimidium multiplicat, quapropter auri fame ducti Regulum defraudant, Calicesque ut tertii gradus nundinantur. Diligentissimè de hoc cavendum est, marchesita enim pro sanguine mundificando, ipsum corrodit, & corpora quamvis ad vomitum celeberrimè excitet, attamen ipsa damnis afficit non exiguis. Apertius in nostra Chirurgia tanti detegendi doli modus patebit.

Calicis nostri Chymici compositio, Balsami adstringentis, & Pilularum adstringentium non patent in hoc opere, sed pro alio servo, ut in illo quoque recondita, & nobilia explicantur; in hoc enim Arcana amantissimi Præceptoris mei celebriora sunt, in altero tria supra dicta duces erunt. Spero sanè in illo pulcherrima tradere naturalia nempe apud virtute præditos, & curiosos accuratè investigavi naturales virtutes mineralium, feminerum, faxorum, animalium, & vegetabilium, quæ virtute occulta operantur, nam illa sunt vera specifica, ex quibus mira valdè vidi, neque tamen aliquid scire licuit.

In secundo de hoc Opere Observationes luci publicæ tradam, ad Chirurgiam spectantes, quæ acciderint usque ad tempus quo proficiet Opus, & præcipuè illas de Regno Neapolis, & Venetiarum, ubi nunc moror, quamquam in hac Civitate curando absolutè non me extendam. Crebro adsum Consultibus Excellentissimorum Medicorum, ut Excellentissimorum Bernardi Florii, Bracchi, Bravi, Cornelli, & aliorum, quorum optima gratia multoties meam propositionem acceptaverunt.

Experientias in hac Urbe feci de meo bals. astringenti in domo Illustriss. atque Excellentiss. Comitum de Avaus Seigneur de Longeval, Christianissimi Regis Legati apud Serenissimam hanc Rempubliam; nempe à Chirurgo ipsius recisæ sunt porculo jugulares, cani arteria major coxendicis, & à me arteria prope jugularem alteri cani, & omnes nostro tantummodò Balsamo adstringenti sanati sunt omnium admiratione novem diebus. Hoc nostro Balsamo sanatus est tonsor nomine Surdus apud Sanctum Vitum in hac pariter Urbe de arteria fracta. Navicularius quoque, cui cum à Chirurgo recideretur ulcus in membro virili, rescissa est arteria; quæ cum igne claudi non posset, bals. nostro sanguinis profluvium interclusum est, & convaluit.

Alter experimentia facta est in domo Illustriss. atque Excellentiss. Marchionis de Fuentes Legati Hispanici, in cane, cui octo jam à diebus recisa fuerat arteria, & sanatus est. Cani eidem Excellentissimus Pica alteram omnino recidit venam, & cum circumstantes advocaret visuros canem, hoc temporis spatio sanguis ferè totus exiit antequam Balsamum applicaretur, balsamo inde admoto paucus ille sanguis, qui superfuit non amplius exivit, sed canis ex inanitione, cum nullum sumere posset alimentum mortuus est terribili convulsione die infrequenti.





INDEX  
RERUM ET VERBORUM,  
QUÆ IN HOC OPERE  
PASSIM CONTINENTUR,  
IN PRIORIBUS EDITIONIBUS TRIPARTITUS,  
*sed in hac postrema, ob faciliorem Lectoris indaginem  
& inventionem, in unum congestus.*

A

|                                                                           |         |                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>A</b> BSCESSUS legitimi qui.                                           | pag. 34 | Acida in pituita quid.                                                          | pag. 11 |
| Abcessus futuri signa.                                                    | 94      | Acida in biliosis febribus cur usurpanda.                                       | 431     |
| Abcessus qui mali.                                                        | ibid.   | Acida humorem melancholicum fermentare creduntur.                               | 441     |
| Abcessus abdominis.                                                       | 491     | Acida & acuta appetere, quàm res absurdas, in pica me-<br>lius.                 | 278     |
| Abcessus juxta spinam dorsi.                                              | 513     | Acidus ructus cur dysenteriae longae superveniens salu-<br>taris.               | 279     |
| Abcessus in sterno.                                                       | 571     | Acida quibus morbis non convenient.                                             | 429     |
| Abcessus in abdomine.                                                     | 576     | Acida amara dulcificantur.                                                      | 432     |
| Alter abcessus in abdomine.                                               | ibid.   | Acida cur febribus pestilentibus convenient.                                    | 453     |
| Abcessus lumborum ad renes penetrans.                                     | 380     | Actio laesa praecipuum symptoma morbi.                                          | 42      |
| Abdominis musculorum inflammatorum signa.                                 | 318     | Differentia actionum laesarum.                                                  | ibid.   |
| Abortus quid.                                                             | 400     | Actionum laesarum causae.                                                       | 43      |
| Abortus causae internae & externae.                                       | ibid.   | Actiones naturales quae malae.                                                  | 69      |
| Abortus praecautio.                                                       | 483     | Acutus morbus.                                                                  | 31      |
| Ab abortu symptoma.                                                       | 485     | Acuti morbi quando judicentur.                                                  | 91      |
| Abortus saepe per phlebotomiam in gravidis praecavetur.                   | 399     | Acuti morbi signa.                                                              | 56      |
| Abortus gemellorum cur frequentior.                                       | 400     | Adeps an sit pars corporis.                                                     | 16      |
| Abortum cur indicet mammaram extenuatio.                                  | 401     | Adnatæ tunicae affectus.                                                        | 205     |
| Abortum cur efficiat tenesmus.                                            | ibid.   | Ulcera.                                                                         | 211     |
| Abortus futuri signa.                                                     | ibid.   | Adolescens victus.                                                              | 102     |
| Abortus imminens signa.                                                   | ibid.   | Adstrictio quid.                                                                | 29      |
| Abortus periculosior, quàm verus partus.                                  | ibid.   | Adstrictio unde producat.                                                       | 42      |
| Abortum quae symptomata & morbi sequantur.                                | ibid.   | Adstringentia medicamenta.                                                      | 146     |
| Abortus curatio in praeservatione consistit.                              | ibid.   | Ægylops & anchylops in quo differant.                                           | 212     |
| Abortum quae impediant vi specifica.                                      | ibid.   | Ægylops cum inflammatione, & sine inflammatione.                                | ibid.   |
| Abortum coitus saepe procurat.                                            | 402     | Aëris qualitates.                                                               | 116     |
| Abortus imminens curatio.                                                 | ibid.   | Aër qualis esse debeat ad curationem frigidae & humidæ<br>cerebri intemperiei.  | 160     |
| Abortus cur magis contingat primis & ultimis gestatio-<br>nis mensibus.   | 400     | Aëris Aquilonaris incommoda.                                                    | 162     |
| Abinthii sale cum succo limonum vomitus in febre<br>maligna curatur.      | 449     | Aër nocturnus cerebro frigido & humido inimicus.                                | ibid.   |
| Abinthii usus in tertiana intermittente longiori.                         | 437     | Aër in febribus quomodo refrigerandus.                                          | 430     |
| Abinthii decoctum cum fenna, in quartana utilissimum.                     | 442     | Aër ambiens pestilentium febrium praecipua causa.                               | 272     |
| Abinthii Pontici conserva nonnulli hydropici curati.                      | 327     | Aër à quibus causis vitiosus evadat.                                            | 447     |
| Abinthii succus vel decoctum in melancholia hypo-<br>chondriaca laudatur. | 338     | Aëris in primis qualitatibus excessus, quomodo sit causa<br>febris pestilentis. | ibid.   |
| Accessiones longiores quid arguant.                                       | 60      | Aër quomodo alteretur ab influxu syderum.                                       | ibid.   |
| Accidentium essentia unde pendeat.                                        | 28      | Aër in constitutione pestilenti quomodo corrigendus.                            | 453     |
| Accretio quid.                                                            | 20      | Aëris in aure implantati motus causæ.                                           | 218     |
| A nutritione realiter distinguitur.                                       | ibid.   | Aëris peculiari vitio dysenteriae epidemicae excitantur.                        | 301     |
| Accretionis terminus quis.                                                | ibid.   | Aër frigidus an hecticæ feberi conveniat.                                       | 423     |
| Acetosa.                                                                  | 105     | Æquivoca generatio.                                                             | 21      |
| Acetum non permiscendum medicamentis somnium con-<br>ciliantibus.         | 184     | Æruginosa bilis quid.                                                           | 10      |
| Acetum commendatur in affectibus lienis.                                  | 332     | Æruginosa bilis an præternaturalis, & unde procreetur.                          | 57      |
|                                                                           |         | Ætatis temperamentum.                                                           | 7       |
|                                                                           |         | Æstatis victus.                                                                 | 103     |



# Index Rerum

|                                                                                                    |          |                                                                                             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Æstatis qualitates.</i>                                                                         | pag. 111 | nientis curatio.                                                                            | pag. 424 |
| <i>Æstus in toto corpore morbi acuti index.</i>                                                    | 56       | Aluminosa aqua quomodo calefaciat.                                                          | 41       |
| <i>Ætatum temperamenta.</i>                                                                        | 6        | Amara dulcificantur per acida.                                                              | 431      |
| <i>Affectio hysterica æmula.</i>                                                                   | 473      | Amarities in lingua quid significet.                                                        | ibid.    |
| <i>Affectus soporofus hypnotico curatus.</i>                                                       | 500      | Amaurosis, seu gutta serena quid?                                                           | 195      |
| <i>Agaricus specificus ad abscessum in angina rumpendum.</i>                                       | 419      | ejus causæ.                                                                                 | ibid.    |
| <i>Agnina caro.</i>                                                                                | 108      | Amaurosis ab adstrictione facta facilius curatur quàm ea,                                   | 196      |
| <i>Albugo seu leucoma, quid?</i>                                                                   | 208      | quæ fit ab obstructione.                                                                    | ibid.    |
| Ejus causæ.                                                                                        | ibid.    | Amauroseos curatio.                                                                         | 197      |
| curatio.                                                                                           | 209      | Amaurosi venæ sectio aliquando convenit.                                                    | 336      |
| <i>Albuginis à cicatrice productæ remedia melli periniscenda.</i>                                  | 208      | Ambra grisea usus in melancholia hypochondriaca.                                            | 276      |
| <i>Alces ungula specificum in hysterica passione.</i>                                              | 383      | Ambra grisea ventriculum roborat.                                                           | 99       |
| <i>Alchekengi fructus &amp; vinum ad calculum.</i>                                                 | 349      | Ambusta.                                                                                    | 24       |
| ad Ischuriam.                                                                                      | 364      | Amnios quid?                                                                                | 397      |
| <i>Alexipharmaca in febribus malignis, diaphoretica &amp; sudorifica quando exhibenda.</i>         | 456      | Amni semen ad curandam sterilitatem maximè prædicatur.                                      | 455      |
| <i>Alexipharmacorum variæ classes.</i>                                                             | ibid.    | Amuleta ad suffocationem hystericam.                                                        | 384      |
| <i>Alexipharmaca diaphoretica in vena peste statim initio usurpanda.</i>                           | ibid.    | Amuleta proprietate quadam adversantia pharmacis occulta vi sterilitatem inducentibus.      | 397      |
| <i>Alexipharmacorum diaphoreticum varii gradus.</i>                                                | 457      | Amygdala.                                                                                   | 106      |
| <i>Alexipharmaca ad variolas.</i>                                                                  | 464      | Amygdalarum dulcium oleum in calculo renum commendatur.                                     | 349      |
| <i>Alibilis humor quid?</i>                                                                        | 8        | Amygdalæ amaræ calculos renum imminuunt.                                                    | 351      |
| <i>Alimenta calida quomodo calefaciant.</i>                                                        | 40       | Anacatharsis libera & liberalis, fieri incipiens, venæ sectionem dehortatur.                | 249      |
| <i>Alimentorum excessus refrigerat.</i>                                                            | ibid.    | Anacatharsi expurgata materia ex pectore per pulmones transfluitur.                         | 248      |
| <i>Alimentorum qualitas, &amp; ordo ea sumendi.</i>                                                | 98       | Anacatharsim promoventia in pleuritide.                                                     | 249      |
| <i>Alimentorum præparatio.</i>                                                                     | 99       | Anacollemata in hæmorrhagia.                                                                | 44       |
| <i>Alimentorum quantitas quæ necessaria.</i>                                                       | 97       | <i>Anacollemata</i> signa.                                                                  | 329      |
| <i>Alimentorum vitia.</i>                                                                          | 270      | Anasarca quid? Ejus causæ.                                                                  | ibid.    |
| <i>Alimenta concoctu faciliora vel difficiliora redduntur ex coquendi &amp; condiendi ratione.</i> | ibid.    | Anasarca inter species hydropi minùs habet periculi.                                        | ibid.    |
| <i>Alimenta, calculi materiam suppeditantia.</i>                                                   | 346      | Anasarca sudorifica semper profunt.                                                         | 226      |
| <i>Alimentorum pravitatis causæ.</i>                                                               | 448      | <i>Anasarca</i> quid, causæ?                                                                | 29       |
| <i>Allium.</i>                                                                                     | 106      | Anastomosis quando fiat?                                                                    | 572      |
| <i>Allium &amp; cepæ auditui nocent.</i>                                                           | 217      | Anchylops.                                                                                  | 525. 542 |
| <i>Allii hortensis vis ad menses movendos, &amp; conceptionem juvandam.</i>                        | 398      | Aneurisma.                                                                                  | 330      |
| <i>Ad præcavendam arthritidem.</i>                                                                 | 416      | Aneurismatis varia exempla.                                                                 | ibid.    |
| <i>Aloës in singultu maximè commendatur.</i>                                                       | 120      | sæpe in melancholia hypochondriaca incurabilis.                                             | 545      |
| <i>Aloë tusa, cum lacte exhibita, ad ulcera renum, &amp; vesicæ.</i>                               | 360      | Angina.                                                                                     | 240      |
| <i>Aloë pulverisata, &amp; in pilam redacta, commendatur ad epiphoram.</i>                         | 214      | Angina quid?                                                                                | ibid.    |
| <i>Alteratio exsiccet.</i>                                                                         | 40       | Ejus differentia.                                                                           | 241      |
| Interdum humectat.                                                                                 | ibid.    | causæ.                                                                                      | ibid.    |
| <i>Alteratrix facultas quid sit.</i>                                                               | 21       | curatio.                                                                                    | verò     |
| <i>Alvi fluxus.</i>                                                                                | 502      | Angina laborantes cur liquida difficilius, solida facilius deglutiant.                      | 241      |
| <i>Alvi fluxus quando malus.</i>                                                                   | 78       | Anginæ cur viri magis obnoxii, quam foeminae.                                               | ibid.    |
| <i>Alvi fluxus diuturnus cum ulcere recti intestini.</i>                                           | 504      | Angina faciliè in peripneumoniam mutatur.                                                   | ibid.    |
| <i>Alvi fluxus in puero.</i>                                                                       | 511      | Angina laborantibus cur spuma circa os apparens lethalis.                                   | 242      |
| <i>Alvi fluxus diuturnus &amp; dolor capitis contumax.</i>                                         | ibid.    | Anginæ copiosa venæ sectio utilis.                                                          | 243      |
| <i>Alvus adstricta.</i>                                                                            | 528      | Anginæ quando conveniat purgatio.                                                           | ibid.    |
| <i>Alvi fluxus diuturnus cum febre lenta.</i>                                                      | 541      | Anginæ conferunt cucurbitulæ, sub mento scarificatæ.                                        | ibid.    |
| <i>Alvi fluxus cruentus.</i>                                                                       | 547      | Anginosus profundis scarificationibus sub maxillis & supra collum curatus.                  | 243      |
| <i>Alvi fluxus cholericus febribus intermittentibus superveniens.</i>                              | 554      | Anginosus abscessus quomodo rumpendus.                                                      | ibid.    |
| <i>Alvi constrictione lethalis.</i>                                                                | 99       | Anginæ abscessus ruptus quomodo curandus.                                                   | 29       |
| <i>Alvi adstrictæ incommoda &amp; causæ.</i>                                                       | 295      | Angina quomodo oriatur.                                                                     | 309      |
| curatio.                                                                                           | 296      | Anhelitus acidus lumbricorum in pueris indicium.                                            | 454      |
| <i>Alvi fluxus inveterati per venerem exsiccantur.</i>                                             | 305      | Animadversiones practicæ circa febres malignas.                                             | 181      |
| <i>Alvi fluxus, hæctica superveniens, quomodo curandus.</i>                                        | 280      | Anima quid sit?                                                                             | 559      |
| <i>Alvi fluxus authoris longior ovis induratis aceto intinctus curatus.</i>                        | 281      | Animi deliquium ex venæ sectione.                                                           | 19       |
| <i>Alvi fluxus differentia.</i>                                                                    | 299      | Animalis spiritus quis, & ubi generetur.                                                    | ibid.    |
| unde desumantur.                                                                                   | ibid.    | Probatur dari.                                                                              | 107      |
| <i>Alvi fluxus criticus quibus contingat.</i>                                                      | ibid.    | cibi ex Animalibus.                                                                         | 12       |
| <i>Alvi fluxus gravidis abortum minatur.</i>                                                       | ibid.    | Animata quomodo calefaciant.                                                                | 458      |
| <i>Alvi fluxus symptomati curatio.</i>                                                             | ibid.    | Animalia aut eorum partes capiti admovenda in febre maligna, ad dolorem capitis & vigilias. | ibid.    |
| <i>Et vomitus &amp; venæ sectio conveniunt, quales clysteres.</i>                                  | ibid.    | male in principio phrenitidis admoventur.                                                   | 184      |
| <i>Alvi fluxus quando salutaris in hydrope.</i>                                                    | 327      | Animalia recenter mactata, per medium secta, & applicata in phrenitide.                     | 447      |
| <i>Alvi fluxus incertum præsagium in febre pestilenti.</i>                                         | 369      | Annorum diversitas à qua causa dependeat.                                                   | 314      |
| <i>Alvi fluxu tertiana intermittens terminatur.</i>                                                | 424      | Ani affectus.                                                                               | 148      |
| <i>Alvi fluxus symptomati in febribus putridis supervenientis curatio.</i>                         | 424      | Anodyna medicamenta.                                                                        | Anodynum |



## & Verborum.

|                                                          |          |                                                            |          |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|
| Anodynum ad dolores impetiginum.                         | pag. 558 | Apparitionis mensis.                                       | pag. 49  |
| Anodyna medicamenta ad dolores arthriticos.              | 412      | Appetentia quæ mala.                                       | 73       |
| Anodyna in convulsione.                                  | 175      | Appetitus naturalis causæ.                                 | 27       |
| in ophthalmia.                                           | 207      | Appetitus depravatus ventriculi utrum feratur ad similia,  |          |
| in aurium dolore.                                        | 221      | vel contraria.                                             | 275      |
| in pleuritide.                                           | 249      | Appetentiam excitant acida.                                | 188      |
| in cancro depascente.                                    | 210      | Appetentiæ depravatæ causæ.                                | 274. 275 |
| Anodynæ glandes ad dolores vesicæ leniendos.             | 356      | Aquæ.                                                      | 112. 113 |
| <i>Ανορεξία.</i>                                         | 271      | Aquæ apoplecticæ.                                          | 167      |
| Anorexia magnum morbum arguit.                           | 55       | Aqua frigida per accidens calefacit.                       | 39       |
| Anseres.                                                 | 110      | Aqua singularis in paralyfi.                               | 172      |
| Antecedentia signa criseos.                              | 34       | Aquæ hirundinum laus in convulsione.                       | 175      |
| Anthraces in febre pestilenti qui boni, qui pravi.       | 452      | in Epilepsia.                                              | 179      |
| Anticipatio accessionis quid notet?                      | 60       | Aquæ acidulæ in epilepsia sympatica.                       | ibid.    |
| Antimonii usus in lethargo & soporosis affectibus.       | 166      | Aqua nucum in recenti catarrho.                            | 192      |
| in paralyfi.                                             | 181      | Aquæ singulares in suffusione.                             | 201      |
| in mania.                                                | 182      | ophthalmia.                                                | 207. 210 |
| Antimonium diaphoreticum ad curationem hydropis.         | 328      | corneæ cancro.                                             | 211      |
| Antimonium à prudenti & perito medico exhiberi de-       |          | surditate.                                                 | 216      |
| bet.                                                     | 442      | Aqua fraxini ad surditatem.                                | 217      |
| Antimonium diaphoreticum ad phthisim.                    | 264      | auris dolorem.                                             | 221      |
| ad hydropem.                                             | 329      | Aqua sublimata ad ulcera narium, ejus compositio.          | 223      |
| Antiperistasis calefacit.                                | 40       | Aqua benedicta ad curationem anginæ,                       | 244      |
| Antipodagrica varia.                                     | 416      | Aquæ ad hæmoptoën.                                         | 257      |
| Antiscorbutorum vis à sale quodam volatili dependet.     | 341      | Aquæ stillatiæ restaurantes.                               | 271      |
| <i>Απεψία.</i>                                           | 278      | Aquæ claretæ compositio.                                   | 274      |
| Apepsia magnum morbum denotat.                           | 55       | Aqua imperialis ad vomitum.                                | 284      |
| Aphthæ quid?                                             | 238      | Aqua copia luxurians in pericardio, palpitationem ex-      |          |
| Earum curatio.                                           | ibid.    | cit.                                                       | 183      |
| Aphthæ contumacissimæ.                                   | 524      | Aqua ex hydrargyri crudi infusione adversus lumbrici-      |          |
| Aphtharum pestilentium differentia.                      | 450      | cos.                                                       | 311      |
| Aphthas in ventriculo facit incautus limonum succi usus. | 359      | Aquæ minerales vitriolatæ hepar refrigerant.               | 317      |
| Apnoea quid.                                             | 245      | earum in hydropo à causa calida usus.                      | 331      |
| Apophlegmatismi tali obnoxiiis infensi, cum formula.     | 257      | in melancholia hypochondriaca.                             | 337      |
| Apophlegmatismi in Asthmate non conveniunt.              | 164      | ad præcavendam arthritidem biliosam.                       | 416      |
| Apoplexia lethalis quæ.                                  | 63       | Aquarum mineralium acidularum doses.                       | 431      |
| In Apoplexia cur sensus & motus in toto corpore          |          | utiles in mictu sanguinis à renum calculo.                 | 358      |
| pereant.                                                 | 31       | Aqua ferrata vel chalybeata lienem imminuit.               | 332      |
| Apoplexia in quo differat ab aliis affectibus soporosis. | 364      | Aquarum thermalium potus an conveniat in melanco-          |          |
| Apoplexia fortis quid sit.                               | 164      | lia hypochondriaca.                                        | 337      |
| Apoplexiæ quando febris salutaris.                       | 161      | in Ischuria & stranguria à pituita.                        | 364      |
| Apoplecticis <i>επιδησις</i> superveniens mala.          | ibid.    | ad chlorosim.                                              | 368      |
| Apoplexiæ venæ sectio interdum necessaria.               | 167      | Aqua extinctionis auri, pro potu ordinario, in melan-      |          |
| Apoplecticis jugularium sectio convenit.                 | 166      | cholia hypochondriaca.                                     | 338      |
| Apoplecticis fortius catharticum exhibendum.             | ibid.    | Aquæ calculum imminentes.                                  | 349      |
| Apoplecticis cucurbitulæ capiti admotæ profunt, postero- |          | Aquæ minerales aluminosæ ferratæ utiliter usurpantur       |          |
| ri verò thoracis parti aut hypochondriis nocent.         | ibid.    | in ulcere renum & vesicæ.                                  | 351      |
| Apoplecticis ab humore melancholico hæmorrhoidum         |          | in dysuria.                                                | 366      |
| fluxus utilis.                                           | 168      | fluxu mensium immodico.                                    | 373      |
| Apoplexia quomodo distinguatur ab hysterica passione.    | 271      | Aquæ menses provocantes in suppressione mensium.           | 198      |
| Apoplecticæ aquæ variæ.                                  | 167      | fluxum mensium immodicum cohibentes.                       | 373      |
| <i>Αποσιτία.</i>                                         | 271      | Aqua refrigerans, & semen extinguens in furore ute-        |          |
| Apositia magnum morbum arguit.                           | 55       | rino.                                                      | 377      |
| Apozema alterans.                                        | 149      | Aquæ hysterica.                                            | 383      |
| purgans.                                                 | 150      | Aqua, seu serosa materia, in cavitate uteri quomodo        |          |
| Apozema alterans & purgans in frigida humida cerebri     |          | contineatur.                                               | 390      |
| intemperie.                                              | 162      | Aqua à liene ad omentum per quem ductum feratur.           | 344      |
| purgans in gutta serena.                                 | 197      | Aqua conceptionem adjuvans.                                | 402      |
| purgans inappetentiam à frigida causa.                   | 272      | Aquæ resolventes ad arthritidem.                           | 414      |
| Apozema abstergens & purgans ad ventriculi inappe-       |          | Aquæ frigidæ exhibendæ in synocho simplici cautiones.      | 423      |
| tentiam.                                                 | ibid.    | cur illius usus obsolevit.                                 | ibid.    |
| simpliciter abstergens in ulcere ventriculi.             | 291      | quando conveniat in febre hectica.                         | 424      |
| bilem evacuans.                                          | 326      | Aqua in febribus continuis putridis an possit tutò ex-     |          |
| aperiens & laxans.                                       | 320. 321 | hiberi.                                                    | 432      |
| Phlegmagogum & hydragogum.                               | 330      | Aqua benedicta ex croco metallorum fit.                    | 438      |
| aperiens & purgans in melancholia hypochondriaca.        | 337      | febres tertianas ut plurimum eradicat.                     | ibid.    |
| Apozema sanguinis fervorem temperans in mictu san-       |          | Aquæ theriacalis laus in febre pestilenti, ejus variæ def- |          |
| guinis.                                                  | 337      | criptiones.                                                | 458      |
| incidens & purgans in febre quartana contumaci.          | 442      | Aqua destillata è pedibus vitulinis ad variolarum cic-     |          |
|                                                          |          | trices implendas.                                          | ibid.    |
|                                                          |          | Aqua calcis ad scirrhum lienis.                            | 333      |
|                                                          |          | Aquæ ex utero profusæ varia exempla.                       | 393      |
|                                                          |          |                                                            | Aquæ     |



# Index Rerum

|                                                                                          |            |                                                                                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aquæ thermales sulphureæ, nitrosæ ac bituminosæ cerebrum roborant & exsiccant.           | pag. 164   | ad sedandos dolores aurium.                                                                   | pag. 220 |
| Aquâ frigidâ facies aspersa quomodo hæmorrhagiam sistat.                                 | 229        | Afininum lac. Vide lac afininum.                                                              | ibid.    |
| Aquei humoris affectus.                                                                  | 197        | Aspectus lunæ cum Zodiaci signo, & loco, in quo erat initio morbi, ad crisin est observandus. | 38       |
| Arantiorum corticum decoctum sanguinis profluvium immodicum curat.                       | 374        | Asperitas quid sit.                                                                           | 33       |
| Ardentis febris essentia, differentiæ, & causæ.                                          | 426        | Asperitas unde oriatur.                                                                       | 41       |
| signa pathognomonica.                                                                    | 428        | Asphyxia in quo differat à syncope.                                                           | 265      |
| Arenulæ excretæ quid notent.                                                             | 51         | Atta elixis facilius inflammantur.                                                            | 424      |
| Arenulæ frequenter in urina excretæ an calculum semper indicent.                         | 347        | assatio.                                                                                      | 16       |
| Hipp. Aphor. 79. sect. 4. explicatur.                                                    | 353        | Affidentia signa.                                                                             | 44       |
| Argentum vivum seu crudum an exhiberi possit in curatione vermium.                       | 311        | Affodis febris essentia & causæ.                                                              | 426      |
| Aristolochiæ decoctum commendatur in ulceribus curandis.                                 | 360        | Asthma.                                                                                       | 245      |
| Aromata bilem generant.                                                                  | 47         | Ejus causæ.                                                                                   | ibid.    |
| Aromata quomodo calefaciant.                                                             | 40         | Asthma flatulentum.                                                                           | ibid.    |
| Aromata in cibis usurpata frigidis affectibus profunt.                                   | 167        | Asthmatis causa interdum ab hepate & venis proficiscitur.                                     | 248      |
| Arteriæ vulnus quomodo noscatur.                                                         | 51         | Asthmati pleuritis aut peripneumonia superveniens lethalis.                                   | ibid.    |
| Arteriæ quomodo impleantur.                                                              | 21         | Asthmati vomitoria maximè conveniunt.                                                         | ibid.    |
| Arterialis sanguis quis.                                                                 | 8          | Asthmatis curatio in paroxismo.                                                               | 81       |
| Artemisiæ sal & conserva ob chlorosim.                                                   | 368        | extra paroxysmum.                                                                             | ibid.    |
| Arthritis.                                                                               | 557. & 563 | Asthma, peripneumonia, cordis palpitatio.                                                     | 484      |
| Arthritica medicamenta.                                                                  | 145        | Asthma & hydrops.                                                                             | 518      |
| Arthritis scorbutica quid differat à vera arthritide.                                    | 340        | Asthma quando periculosum.                                                                    | 63       |
| Arthritis quid.                                                                          | 409        | Asthma.                                                                                       | 521      |
| differentiæ.                                                                             | ibid.      | Astringentium moderatus debet esse usus.                                                      | 374      |
| Arthritidis humor rarè in cavitatem articularum influit.                                 | 409        | advertenda in astringentium usu ad mensium suppressionem.                                     | 374      |
| Arthritidis humor, in partes nervosas & membranosas fluens, cur non faciat convulsionem. | ibid.      | Astringentibus quando locus in dolore dentium.                                                | 235      |
| Arthritidis causæ internæ.                                                               | 410        | in dysenteria.                                                                                | 306      |
| externæ.                                                                                 | ibid.      | Astrorum in hæc inferiora actiones.                                                           | 447      |
| Arthritidem committens humor, à quibus partibus effluat.                                 | 410        | Astrorum influxus an morbos pestilentes excitet.                                              | ibid.    |
| Arthritis cur veneris & bacchi filia dicatur.                                            | ibid.      | Atrabilis quid sit, & ejus differentiæ.                                                       | 11       |
| Arthritidis imminentis signa.                                                            | 410        | Atrabiliarii olores, proditores.                                                              | 49       |
| præsentis.                                                                               | 411        | Atrophia quomodo noceat.                                                                      | 30       |
| causarum signa.                                                                          | ibid.      | Attractio per quid fiat.                                                                      | 19       |
| Arthritis cum duratione contumacissima.                                                  | ibid.      | Attractrix facultas quid sit?                                                                 | ibid.    |
| Arthritici qui sanari possint.                                                           | ibid.      | Auctrix facultas.                                                                             | 20       |
| Arthritis quando periculosa.                                                             | ibid.      | Auctio, sive accretio quomodo fiat.                                                           | ibi.     |
| Arthritidi statim ab initio convenientissima est sanguinis detractio.                    | ibid.      | Auditus quid.                                                                                 | 23       |
| itidem & purgatio.                                                                       | ibid.      | Auditus in biliosis acutus.                                                                   | ibid.    |
| cautiones in ea observandæ.                                                              | ibid.      | Auditus signa lethalia.                                                                       | 46       |
| Arthritidi an conferant vomitoria, itidem & sudorifica.                                  | 411        | Auditus gravis causæ.                                                                         | 51       |
| topica statim usurpanda.                                                                 | ibid.      | curatio.                                                                                      | 215      |
| Arthriticis pinguedines & olea exterius admota an convenerint.                           | 413        | Auditio melius fit obturatis auribus & aperto ore.                                            | ibid.    |
| Arthritidi incipienti an repellentia conveniant.                                         | 414        | Auditus exquisitior tinnitum aurium quomodo efficiat?                                         | ibid.    |
| Arthritidis prophylaxis.                                                                 | 415        | Auditus gravis facilè in surditatem degenerat.                                                | 216      |
| Arthriticis vinum maximè noxium.                                                         | ibid.      | Auditus instrumentorum cum loquelæ instrumentis consensu.                                     | ibid.    |
| Arthritis cur longævitiæ interdum afferat.                                               | 416        | Avellanæ nuces calculos expellunt.                                                            | 351      |
| Arthritis in quo differat à rheumatismo.                                                 | 418        | Avena.                                                                                        | 104      |
| Articoca.                                                                                | 108        | Aves cur durissima plantarum semina dissolvant.                                               | 279      |
| Articulorum abscessu tentandorum signa.                                                  | 94         | Augmentum morbi.                                                                              | 32       |
| Articulorum affectus.                                                                    | 409        | Aurium dolores quando periculosi.                                                             | 6        |
| Articulos occupantes dolores an omnes sint arthritici.                                   | ibid.      | Aurifabri tremoribus obnoxii, à vaporibus hydrargyri.                                         | 181      |
| Articulorum dispositio ad recipiendam arthritidem qualis sit.                            | 410        | Aurem interiorem vellicando cur tussis excitetur.                                             | 215      |
| Articulos causæ debilitantes.                                                            | ibid.      | Aurium cavitati inserta quomodo auferenda?                                                    | 216      |
| Articulos roborantia.                                                                    | 416        | Aurium sonitus.                                                                               | 217      |
| Afarum, mediocre vomitorium in febre tertiana intermittente.                             | 438        | causæ.                                                                                        | ibid.    |
| febris quartanæ maximè proficuum.                                                        | 444        | differentiæ.                                                                                  | 218      |
| Ascites quid.                                                                            | 326        | signa.                                                                                        | ibid.    |
| causæ.                                                                                   | 156        | curatio.                                                                                      | ibid.    |
| Aselli seu millepedes ad asthma.                                                         | 248        | Aurium tinnitus, à lue venerea certus, difficillimè curatur.                                  | ibid.    |
| ad Vesicæ calculum.                                                                      | 356        | Aurium dolor.                                                                                 | ibid.    |
| ad renum calculum dissolvendum.                                                          | 349        | causæ.                                                                                        | 219      |
| ad urinæ suppressionem.                                                                  | 364        | Aurium dolorem cucurbitula scarificata, pone aures apposta, multum juvat.                     | 220      |
|                                                                                          |            | Aurium inflammatio topicis sedanda.                                                           | ibid.    |
|                                                                                          |            | In ea vitentur potenter repellentia.                                                          | ibid.    |
|                                                                                          |            | Auris suppuratæ curatio.                                                                      | ibid.    |
|                                                                                          |            | Auris ulcera quomodo curanda.                                                                 | ibid.    |
|                                                                                          |            | Aurium excreta præter naturam.                                                                | 222      |
|                                                                                          |            | Aurum                                                                                         |          |



## & Verborum.

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Autumni temperamentum.                      | pag. 7 |
| Autumni victus.                             | 102    |
| Autumni qualitates.                         | 117    |
| Autumnalis aer acrium destillationum causa. | 260    |
| Autumno incipiente, catarrhi maxime fiunt.  | 193    |
| Axungia anatis laudatur in convulsione.     | 175    |

### B.

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>B</b> Albi qui sint.                                                           | 177   |
| Balbos inter & traulos differentia.                                               | ibid. |
| Balbutiei causa.                                                                  | ibid. |
| Balerucanarum aquarum doses ad calculi prophylaxin.                               | 366   |
| ad urinæ suppressionem à pituita mucilaginosa.                                    | 342   |
| ad chlorosim.                                                                     | 368   |
| ad suffocationis hystericae prophylaxin.                                          | 377   |
| Balneum.                                                                          | 158   |
| Balneum calidius.                                                                 | 557   |
| Balnea ex oleo puro convulsioni conferunt.                                        | 171   |
| Balnea sulphurea & ex decocto herbarum cephalicarum etiam conveniunt.             | ibid. |
| Balnei usus in ictero, ad coloris flavi discussionem.                             | 324   |
| in melancholia hypochondriaca.                                                    | 336   |
| aquæ tepidæ in mania.                                                             | 187   |
| in ophthalmia.                                                                    | 207   |
| sulphurei in furditate.                                                           | 216   |
| Balneum aquæ tepidæ corpus refrigerat & humectat.                                 | 319   |
| valet ad prophylaxin rheumatismi.                                                 | 421   |
| ad curationem febris hecticae.                                                    | 425   |
| ut moderandum in hecticis.                                                        | ibid. |
| ex hydrelæo laudatur.                                                             | ibid. |
| in febribus quando conveniat.                                                     | 433   |
| in febre quartana interdum usurpari debet.                                        | 443   |
| sulphureum ac bituminosum in mensium suppressione.                                | 377   |
| aperiens & relaxans in chlorosi.                                                  | 368   |
| refrigerans in furore uterino utile.                                              | 376   |
| Balsamum cerebrum corroborans.                                                    | 164   |
| ad gingivarum erosionem.                                                          | 239   |
| Balsamum Guidonis in paralyfi.                                                    | 172   |
| Galbani.                                                                          | ibid. |
| Peruvianum ad inappetentiam à frigida causa.                                      | 274   |
| Peruvianum ad vomitum.                                                            | 287   |
| Peruvianum ad calculos expellendos.                                               | 350   |
| Balsamum sulphuris in hæmorrhoidum dolore & ulcere.                               | 316   |
| Apoplecticum in epilepsia puerorum.                                               | 179   |
| Peruvianum in ulcere pulmonum.                                                    | 264   |
| Bardanae radices decoctum laudatur ad arthritidem.                                | 413   |
| <i>Βερύκοια</i> quid.                                                             | 215   |
| Beccabunga seu anagallis aquatica, antiscorbutica.                                | 341   |
| Bedegaris spongia exsiccata, lapillos expurgat.                                   | 351   |
| Benignus morbus.                                                                  | 319   |
| Betæ.                                                                             | 105   |
| Bezoardicus lapis cur apud nos rarissimus esse debeat.                            | 456   |
| Bezoardici lapidis usus commendatur adversus morbos melancholicos.                | 336   |
| Bezoardicum minerale in obstructionibus plurimum commendatur.                     | 332   |
| Bezoardica chymica in febre pestilenti usurpanda.                                 | 457   |
| Bilis alimentaria quid? quæ ætas, quod alimentum, quod temperamentum eam generet. | 9     |
| eiusdem effectus.                                                                 | ibid. |
| Bilis excrementitia quid.                                                         | 10    |
| Illius usus & differentia.                                                        | ibid. |
| Bilis atra quomodo cognoscatur, unde procreetur.                                  | 57    |
| Bilis præternaturalis signa.                                                      | ibid. |
| Cibi calidi & sicci bilem generant.                                               | 47    |
| Biliosi humoris prædominantis signa.                                              | ibid. |
| Excrementa eorumdem & habitus corporis.                                           | 47    |
| Biliosis unde oriantur insomnia.                                                  | 22    |
| Bilis redundantis signa.                                                          | 179   |
| Bilis porracea generatur in ventriculo ex corruptis alimentis.                    | 274   |

*Lazari Riverii Opera.*

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bilis æruginosa ex diuturnis doloribus & vigiliis generatur.              | pag. 347   |
| Biliofarum febrium continuarum essentia & causa.                          | 426        |
| signa diagnostica.                                                        | 429        |
| prognosis.                                                                | 430        |
| diæta conveniens.                                                         | 429        |
| Bilis an possit esse causa paralyseos.                                    | 165        |
| Bilem temperantia.                                                        | 183        |
| an dulcia semper procreant.                                               | 309        |
| Bilem depravantes causa.                                                  | 323        |
| Bilem purgantia in ictero.                                                | 324        |
| in hepatis intemperie calida.                                             | 316        |
| Biliosis in febribus cur mittendus sanguis.                               | 431        |
| Bilis an magis effervescat à sanguinis missione.                          | ibid.      |
| Bochetum arthriticis proficuum.                                           | 415        |
| Bochetum rhabarbari ad obstructiones puerorum.                            | 433        |
| Boli expurgantes primam corporis regionem in febribus continuis.          | 430        |
| Bolus purgans in rheumatismo.                                             | 420        |
| discutiens in hydrope uteri.                                              | 389        |
| calculus imminuens.                                                       | 350        |
| semen expurgans in furore uterino.                                        | 378        |
| purgans in ictero.                                                        | 324        |
| in calculo renum.                                                         | 347        |
| in mictu sanguinis.                                                       | 357        |
| ad inappetentiam.                                                         | 273        |
| ad diarrhoeam.                                                            | 302        |
| ad dysenteriam.                                                           | 305        |
| Bolus.                                                                    | 155        |
| Bombus quando malus.                                                      | 64         |
| Borborygmus quid arguat.                                                  | 52         |
| Borrage.                                                                  | 105        |
| Bothor Arabum.                                                            | 210        |
| <i>Βότρυς</i> quid.                                                       | ibid.      |
| Boulimia in quo differat à fame canina.                                   | 274        |
| <i>Βραδυμηνία</i> .                                                       | 278        |
| Brassica.                                                                 | 103        |
| Brevioris morbi signa.                                                    | 61. & seq. |
| Bronchia pulmonum quo signo notentur.                                     | 51         |
| Bronchocele familiaris Alpinorum montium incolis.                         | 32         |
| Bryoniae radix prædicatur in hysterica passione.                          | 383        |
| Bryoniae sæcula ad chlorosim.                                             | 368        |
| Bubo pestilens, signum febris pestilentis præcipuum.                      | 446        |
| sed non verè pathognomonicum.                                             | 449        |
| Bubones plures, paucioribus periculosiores.                               | 452        |
| Bubones in febribus maligni.                                              | 56         |
| Bubula caro.                                                              | 109        |
| Bufo sylvestris, renibus alligatus, hydropicorum aquas per urinas educit. | 330        |
| ex eodem paratur pulvis & ceratum ad hydropem.                            | ibid.      |
| Buglossi succus humorem atrabiliarem contemperat.                         | 338        |
| Bugulæ decoctum phthisi, & internis ulceribus mirè prodest.               | 263        |
| Butyrum.                                                                  | 109        |
| Buxi oleum quomodo præparandum.                                           | 236        |
| Buxi flores sanguinem purgant.                                            | 252        |
| Buxi oleum ad hæmorrhoidum dolorem leniendum efficacissimum.              | 315        |
| dentium dolores sedat.                                                    | ibid.      |
| ad epilepsiam.                                                            | 178        |

### C.

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| <b>C</b> Achexia causa.                                    | 329   |
| Cachecticorum febris qualis.                               | 428   |
| Cacoehymia.                                                | 128   |
| Cæcitatis causa.                                           | 280   |
| Cæsarea sectio an celebranda.                              | 405   |
| Calcis aqua pro fotu in scirrho lienis.                    | 333   |
| Calculi medicamenta.                                       | 144   |
| Calculus quomodo noceat.                                   | 29    |
| Calculus vesicæ.                                           | 566   |
| de calculis in liene genitis, & inde per vomitum rejectis. | ibid. |

H h h h

De



# Index Rerum

|                                                        |             |                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| De calculis per anum excretis.                         | pag 566     | sed non verè pathognomonicum.                          | pag. 449    |
| Calculus in gutture.                                   |             | plures paucis periculosiores in febre pestilenti.      | 452         |
| Calculus sub quo affectuum genere collocandus.         | 344         | curatio in febre maligna.                              | 480         |
| causæ ex Gal. & ejus affectis imp. gnatæ, ibid. &      | 345         | In eo venæ sectio ad lipothymiam quando convenit.      | 453         |
| causa efficiens & spiritus lapidificus.                | 346         | Carbunculi in febribus malignis.                       | 56          |
| causæ antecedentes.                                    | ibid.       | Carbunculus.                                           | 554         |
| signa diagnostica.                                     | 347         | Cardiaca medicamenta.                                  | 143         |
| Calculus renum cur valde periculosus.                  | ibid.       | Cardialgiæ causa.                                      | 288         |
| ejus curatio.                                          | ibid.       | pro varietate causarum exacerbatur.                    | ibid.       |
| Calculus imminuentia & expellentia.                    | 348         | reliquis ventriculi doloribus periculosior.            | ibid.       |
| Calculosi quomodo præservandi.                         | 350         | Caricarum & hordei decoctum humores efficaciter ad     |             |
| Eis quantum utiles aquæ Balerucanæ.                    | 351         | cutem expellit.                                        | 463         |
| minerales acidulæ vitriolatæ.                          | ibid.       | Caries quid.                                           | 13          |
| Calculus vesicæ eandem habet causam materialem & ef-   |             | Carnes quæ utiles.                                     | 108         |
| ficientem, ac calculus renum.                          | 352         | Carnosæ partes.                                        | 16          |
| Calculo vesicæ cur pueri magis obnoxii, & calculo re-  |             | Carnosæ partes in naribus quando perficiantur, &       |             |
| num senes.                                             | ibid.       | quando in foeminis.                                    | 24          |
| An semper rudimentum accipiat à renibus.               | ibid.       | Carnes exhibitæ pueris lactentibus in lumbricos facer- |             |
| Ejus signa.                                            | ibid.       | sunt.                                                  | 309         |
| Prognosis.                                             | 354         | Carnis hœdinæ, vitulinæ, aut vervecinæ usus in oph-    |             |
| Curatio.                                               | ibid.       | thalmia.                                               | 208         |
| Vix nisi per lithotomiam curari potest.                | ibid.       | pullorum in cancro corneæ.                             | 211         |
| Calculorum aliter curatorum exempla.                   | ibid.       | Cares five Carus in quo differat ab apoplexia, comate, |             |
| usu aquæ destillatæ ex cepis.                          | 356         | & lethargo.                                            | 164         |
| Calculus in meatu penis quomodo excludendus.           | 364         | Comate & lethargo periculosior.                        | ibid.       |
| Calculus vesicæ cur extractu facilius in mulieribus,   |             | Carpis applicanda in tertiana intermittente longiore.  | 439         |
| quàm in viris.                                         | 354         | in quartana intermittente.                             | 443         |
| Calendulæ florum conserva in mensium suppressione.     | 370         | Carunculam in penis meatu extirpandi modus.            | 364         |
| vertiginis specificum.                                 | 181         | Caryocostini laus in arthritide.                       | 416         |
| Caliditas, qualitas ignis & æris.                      | 3           | in ischiade.                                           | 417         |
| causæ caliditatis in corpore.                          | 40          | Caryophylli.                                           | 111         |
| Calidum innatum quid.                                  | 14          | Cateus.                                                | 110         |
| Calor activus qualis, illius origo & quomodo confer-   |             | Cassia infusum in dolore hæmorrhoidum.                 | 314         |
| verur.                                                 | 15          | Castanea.                                              | 108         |
| illum coelestem putat Fernelius.                       | ibid.       | Castorei laus in apoplexia.                            | 167         |
| refutatur tamen.                                       |             | in convulsione.                                        | 174         |
| Calor in febribus, qui malus.                          | 86          | Cataplasma cerebri exsicicans.                         | 161         |
| Calor præcipua fluxionis causa.                        | 190         | suppurans in empiemate.                                | 254         |
| Calvi fiunt biliosi.                                   | 47          | plantis pedum admodum in dolore capitis.               | 144         |
| Cambium humor secundarius.                             | 10          | in suffusione.                                         | 201         |
| Camphora in hysterica passione commendatur.            | 383         | in ophthalmia.                                         | 208         |
| fecunditati nocet plurimum.                            | 397         | aurium dolore.                                         | 220         |
| in vomitu commendatur.                                 | 284         | de mica panis.                                         | ibid. & 384 |
| in vomitu sanguinis.                                   | 285         | admovendum regioni ventriculi in singultu.             | 280         |
| Cancer morbus, perpetuò malignus.                      | 493         | applicandum regioni ventriculi in tertiana febre in-   |             |
| Cancro depascenti caro pulli columbini in tenues lami- |             | termittente contumaci.                                 | 439         |
| nas concisa, optimum anodynum.                         | 211         | Regioni hepatis.                                       |             |
| Cancro uteri causæ, signa.                             | 388         | attrahens malignitatem in febre pestilenti.            | 455         |
| curatio palliativa.                                    | ibid.       | suppurans.                                             | 479         |
| per linimenta, per fatus partis affectæ, per narcoti-  |             | attrahens.                                             | 480         |
| ca in vehementissimo dolore.                           | ibid. & 389 | suppurans in phlegmone ventriculi.                     | 291         |
| Cancer.                                                | 493         | ad fluxum immodicum hæmorrhoidum cohibendum.           | 375         |
| alia Cancro curatio.                                   | 573         | refrigerantia & resolventia in hepatis inflammatione.  | 310         |
| Canina fames.                                          | 274         | in hydrope.                                            | 330         |
| causæ.                                                 | ibid.       | scirrhus lienis.                                       | 332         |
| curatio.                                               | ibid.       | in calculo renum.                                      | 348         |
| eam obtundunt pinguis & oleaginosa.                    | ibid.       | regioni renum, pubis, & lumborum in ischuria &         |             |
| narcotica.                                             | 276         | stranguria.                                            | 369         |
| Cantharides non solum vesicæ, sed etiam utero infensæ. | 367         | in fluxu mensium immodico.                             | 373         |
| Cantharidum noxa quibus inhibeat.                      | 455         | Epispasticum plantis pedum admovendum in passione      |             |
| Cantharides vesicæ noxiæ.                              | 456         | hysterica.                                             | 382         |
| Capones.                                               | 110         | discutiens.                                            | 385         |
| Capitis dolores quando periculosi.                     | 160         | aliud suppurans.                                       | ibid.       |
| Capitis dolorum differentia.                           | 161         | emolliens & resolvens.                                 | ibid.       |
| signa diagnostica, prognostica.                        | ibid.       | ad uteri gangrænam.                                    | 392         |
| internus dolor quomodo disti. gnatur ab externo.       | ibid.       | de tribus farinis dictum.                              | ibid.       |
| specificæ.                                             | 194         | imminentem abortum præcavens.                          | ibid.       |
| Capitis dolor ex utero.                                | 379         | in torminibus à partu.                                 | 407         |
| doloris à vapore vel humore distinctio.                | ibid.       | ad dolores arthriticos.                                | 414         |
| in febribus quomodo curandus.                          | 433         | Cataplasma.                                            | 159         |
| in febre maligna.                                      | 458         | Cataplasmata anodina & parum repellentia.              | 415         |
| Caput facile tentantia.                                | 162         | resolventia.                                           | ibid.       |
| Caput quot affectuum origo.                            | 233         | ex iberide ad dolorem ischiadicum.                     | 417         |
| an ex eo fluxiones arthriticæ.                         | 410         |                                                        | Morbi       |
| Carbunculus signum præcipuum febris pestilentis.       | 446         |                                                        |             |



# & Verborum.

|                                                           |            |                                                          |         |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Morbi in cavitate, quotuplices.                           | pag. 29    | Cerebrum pituitæ metropolis.                             | pag. 18 |
| Cataracta suffusio, aqua & ὑπόχυμα idem.                  | 199        | Cerebrum pars organica.                                  | 17      |
| inunctione mercuriali curata.                             | 202        | Cerebri frigida & humida intemperies, morborum serax.    | 160     |
| Catarrhus quid.                                           | 188        | Cerebrum refrigerantes præcipuæ causæ.                   | 161     |
| Ejus causæ.                                               | 189        | frigida intemperiei signa.                               | ibid.   |
| signa.                                                    | 190        | Cerebri frigida intemperies hæreditaria incurabilis.     | ibid.   |
| differentiæ.                                              | ibid.      | Cerebro maximè infensi lunares radii.                    | 161     |
| triplex est: ferinus, suffocans, & epidemicus.            | ibid.      | Cerebro frigido & humido conveniens victus ratio.        | ibid.   |
| in senibus difficillimè coquitur.                         | 191        | Cerebrum frigidum & humidum alterantia & roboran-        |         |
| curatio.                                                  | ibid.      | tia.                                                     | 162     |
| Catarrhi calidi curatio.                                  | 192        | Cerebri abscessus & sphacelus quid.                      | 184     |
| Catarrhis obnoxii non rarò cerebrum frigidum & hepar      |            | causæ.                                                   | ibid.   |
| calidum habent.                                           | 191        | signa.                                                   | ibid.   |
| Catarrho tenui fortius resolventia infensa.               | ibid.      | curatio.                                                 | 185     |
| Catarrhalis febris causa.                                 | 190        | Cerebri excrementa per quas vias expurgentur.            | 188     |
| Catarrhum contumax, in pulmones defluens, sæpe ve-        |            | Cerebrum quasi cucurbitula corpori imposita.             | ibid.   |
| ram phthisim mentitur.                                    | 261        | velut spongia à frigore aëris ambientis comprimitur.     | 189     |
| Catarrhi à rheumatismo differentia.                       | 418        | Cerebri cur cesset actio, cessante actione cordis.       | 265     |
| Catarrhus cum aliis symptomatis.                          | 469        | Cerebri nimium calefacti effectus.                       | 189     |
| Catarrhus in pulmones defluens.                           | 511        | Chalybis usus in omnibus febribus chronicis utilissimus. | 444     |
| Catarrhus cum raucedine.                                  | 518        | Chalybs, ex eoque parata medicamenta, ad obstructio-     |         |
| Catarrhus in pulmonem decumbens.                          | 525        | nes hepatis potentissima.                                | 323     |
| Catarrhus cum tuili.                                      | 528        | Cautiones observandæ post sumptionem medicamentorum      | ibid.   |
| Catarrhus ferinus cum variis febrium complicationibus.    | 519        | chalybeatorum.                                           | ibid.   |
| Catarrhus.                                                | 560        | Ea in obstructionibus lienis usurpanda.                  | 333     |
| Catarrhus falsus cum propensione ad phthisim.             | 260        | in melancholia hypochondriaca.                           | 383     |
| Catellus vivus admotus, dolorem demulcet in arthride.     | 419        | scirrho hepatis.                                         | 326     |
| Caulium rubrorum decoctum asthmaticos juvat.              | 248        | Chamædrios extractum præstantissimum in febre quar-      |         |
| Causæ minus principales dierum criticorum.                | 39         | tana.                                                    | 443     |
| Causi, seu febris ardentis essentia, differentiæ & causæ. | 427        | Chamædryos usus in febribus lentis & diuturnis.          | 432     |
| signa.                                                    | 428        | Chamæmeli decoctum in pituitosis febribus commenda-      |         |
| cur in sene at hyeme tempore adveniens lethale.           | ibid.      | tur.                                                     | 432     |
| Cauticum posteriori cervicis parti inustum, cerebrum      |            | aqua stillatoria & decoctum specificum in doloribus      |         |
| expurgat.                                                 | 164        | ventriculi.                                              | 290     |
| paralyticis inurendum.                                    | 171        | florum decoctum ad uteri dolorem commendatur in          |         |
| sincipiti epilepticis.                                    | 177        | torminibus à partu.                                      | 407     |
| Cautica medicamenta.                                      | 150        | Chemosis species ophthalmiæ.                             | 205     |
| Cauterium actuale inter primam & secundam vertebra        |            | Cherefollii succus hydropicis urinas movet.              | 340     |
| applicatum soporosis affectibus convenit item pueris      |            | Chinæ decoctum in hepate calido & obstructo.             | 318     |
| epilepticis.                                              | 167        | in melancholia hypochondriaca.                           | 358     |
| Cauterium sincipiti admovendum in vertigine.              | 180        | ad interna ulcera.                                       | 291     |
| futura coronali applicandum in mania.                     | 185        | Chlorosin congressus sanat.                              | 368     |
| Cauterium usus unde.                                      | 190        | Ei an conveniat venæ sectio.                             | ibid.   |
| retro aures destillationibus remedium opportunum.         | 191        | Chlorosis seu pallidi virginum colores.                  | 367     |
| posteriori parti cervicis & inter scapulas admotum.       | ibid.      | Ejus causæ.                                              | ibid.   |
| Cauterium seu fonticulus inter pollicem & indicem ad-     |            | signa.                                                   | 368     |
| motus in dolore capitis.                                  | 194        | curatio.                                                 | ibid.   |
| futura coronali & tumoribus.                              | ibid.      | Chlorosis antiqua quibus præsidii curata.                | ibid.   |
| occipiti in gutta serena.                                 | 197        | Chlorosis cum colico dolore.                             | ibid.   |
| cruribus in furore uterino.                               | 378        | Cholagoga medicamenta.                                   | 139     |
| ad præcavendum abortum.                                   | 401        | Cholera morbus, unde dicatur.                            | 286     |
| Cauteria in hydropicis cur non applicanda.                | 330        | pars affecta, differentiæ & causæ.                       | ibid.   |
| tibiis admotæ conferunt in mensium suppressione.          | 372        | quomodo conveniat venæ sectio.                           | 287     |
| tibiæ dextræ vel sinistræ in chlorosi contumacissima.     | 368        | an sint quædam critica.                                  | 286     |
| Cauterii efficacia.                                       | 561        | Cholera morbus ex superpurgatione.                       | 499     |
| Centaurium minus cur febrifugum vocatum.                  | 438        | Cholera morbus.                                          | 538     |
| Cepæ quomodo calefaciant.                                 | 40         | Cholera morbus cum febre tertiana maligna.               | 508     |
| Cepæ.                                                     | 106        | Choledochi pori prava conformatio acris facit picrocolos |         |
| Cepæ sub cineribus coctæ usus in hæmorrhoidum dolo-       |            | as.                                                      | 282     |
| re.                                                       | ibid.      | Chordapsus cur ileos vocetur.                            | 294     |
| Cephalæa.                                                 | 201. & 469 | Chorion quid.                                            | 24      |
| Cephalæa cum aliis affectibus.                            | 469        | Chronicus morbus.                                        | 31      |
| Cephalæa ex lue venerea malè curatâ.                      | 512        | Chronicus morbus quis.                                   | 56      |
| Cephalæa & hemicrania.                                    | 574        | Chylosis ubi fiat.                                       | 19      |
| Cephalalgia quid.                                         | 201        | Cibi ex volatilibus.                                     | 110     |
| Cephalica medicamenta.                                    | 140        | Cibi fastidii in febribus causa.                         | 436     |
| Cetæ oleum ad pleuritidem.                                | 247        | Ciborum maxima aversio in febre pestilenti cur pericu-   |         |
| ad dysenteriam.                                           | 603        | losissima.                                               | 450     |
| Cerata.                                                   | 107        | Cibi consueti, an aliis utiles.                          | 102     |
| Cerata varia contra ægylopos.                             | 212        | Cicadarum pulvis, cum vino albo exhibitus, ad diar-      |         |
| Laz. Riverii Opera.                                       |            | rhœam.                                                   | 300     |
|                                                           |            | Cicatricem inducit vinum rubrum, in quo alumen disso-    |         |
|                                                           |            | lutum est.                                               | 233     |
|                                                           |            | H h h h 2                                                | Cica-   |



# Index Rerum

|                                                                                            |               |                                                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cicatrices à variolis relictas, quæ repleant.                                              | pag. 465      | Colicus dolor unde nomen habeat.                                          | pag. 291     |
| Cicatricem inducentia medicamenta.                                                         | 149           | Ejus causæ.                                                               | ibid. & seq. |
| Cicera.                                                                                    | 104           | signa.                                                                    | 291. & seq.  |
| Cichorium.                                                                                 | 105           | Colicus dolor quibus signis distinguatur à nephritico.                    | ibid.        |
| Cichorii sanguis quomodo parandus.                                                         | 317           | flatuosa & pituitosa & biliosa curatio.                                   | 293          |
| sanguinem depurat.                                                                         | ibid.         | Colliquantis febris essentia & causa.                                     | 427          |
| Cicuta tumores emollit & discutit.                                                         | 246           | signa diagnostica.                                                        | 428          |
| Cinnabaris nativæ laus in epilepsia, cinnabaris item antimonii.                            | 175           | Collutiones variæ ad dolores dentium.                                     | 236          |
| Cinnamomum.                                                                                | 111           | Collyria in suffusione.                                                   | 201. 202     |
| Cinnamomi aqua in hydropse.                                                                | 330           | ophthalmia.                                                               | 207. 208     |
| aqua, pulvis, & oleum ad accelerandum partum.                                              | 403           | in pupillæ dilatatione.                                                   | 203          |
| Citri mali laus in febre pestilenti.                                                       | 455           | albugine.                                                                 | 191          |
| Citri cortex conditus ventriculum roborat.                                                 | 274           | hypopyo.                                                                  | 210          |
| Clavi pedum.                                                                               | 574           | in principio ophthalmiæ repellentia non conveniunt.                       | 208          |
| Clyster.                                                                                   | 156           | Collyrii compositio.                                                      | 157          |
| Clysteres ex oxycrato in cholera morbo.                                                    | 110           | Collyrium valdè detergens & exsiccans.                                    | 213          |
| in furore uterino.                                                                         | 376           | adstringens & exsiccans.                                                  | ibid.        |
| hysterica passione.                                                                        | 382           | ad oculorum affectus à variolis excitatos.                                | 465          |
| lenientes in phlegmone ventriculi.                                                         | 205           | in pterygio seu ungue oculorum.                                           | 214          |
| emollientes in adstrictione alvi.                                                          | 298           | Collyrium Lanfranci ad oris ac faucium ulcera.                            | 239          |
| detergentes in diarrhœa.                                                                   | 300           | Colocynthidis correctio & dosi.                                           | 191          |
| in dysenteria quales esse debeant.                                                         | 303           | Color niger in lingua sine siti morbum malignum indicat.                  | 56           |
| adstringentes in dysenteria.                                                               | ibid.         | Coma quid.                                                                | 164          |
| quare pulveres non debeant dissolvi.                                                       | ibid.         | Comatosus affectus acutissimo morbo superveniens.                         | 165          |
| adversus lumbricos.                                                                        | 311. 312      | Coma vigil quid, ejus causæ.                                              | 168          |
| carminativi & hydragogi in hydropse.                                                       | 330. 331      | idiopathici & sympathici curatio.                                         | ibid.        |
| Clysterum frequens usus in melancholia hypochondriaca maxime prodest.                      | 337           | Cometæ quomodo sint causæ pestilentium morborum.                          | 448          |
| emollientes in calculo renum.                                                              | 348           | Cometæ qui anno 1618. apparuit, descriptio.                               | ibid.        |
| calculum imminuentes.                                                                      | 349           | Compositio medicamentorum.                                                | 151          |
| in renum inflammatione.                                                                    | 356           | Conceptio quando fieri dicatur, & quænam sint potissima ipsius signa.     | 24           |
| molliens & evacuans.                                                                       | 361           | Conceptio interdum fit in mulieribus, quibus nunquam menstrua effluerunt. | 395          |
| in mensium suppressione.                                                                   | 371           | Conceptionem impediunt.                                                   | ibid.        |
| summæ efficaciam in ischuria & stranguria.                                                 | 365           | quot operationes requirat conceptio.                                      | ibid.        |
| alius in dysuria.                                                                          | 366           | in quibus separabilis, in quibus non.                                     | ibid.        |
| in hysterica passione.                                                                     | 382           | Concoctio quomodo & unde perficiatur.                                     | 19           |
| in uteri inflammatione.                                                                    | 385           | fit incrassando, & triplex est.                                           | ibid.        |
| discutientes & laxantes in dolore aurium.                                                  | 386           | Concoctio humorum.                                                        | 132          |
| emolliens.                                                                                 | 420           | Concoctrix facultas quid sit.                                             | 19           |
| in partu difficili discutiens & dolores leniens.                                           | 404           | Concoctionis primæ vitium non corrigitur in secunda.                      | 235          |
| emolliens laxans, & aperiens.                                                              | 406           | Concoctio naturalis viscerum fit per elixationem.                         | 334          |
| leniens in torminibus à partu.                                                             | 407           | Concomitantia signa criseos.                                              | 30           |
| resolvens discutiens in dolore ischiadico.                                                 | 418           | Concrescientia à calido liquantur ab humido.                              | 345          |
| nutriens.                                                                                  | 415           | Condimenta.                                                               | 111          |
| Clysterum materia in febribus continuis.                                                   | 431           | Conditum.                                                                 | 155          |
| cautiones observandæ in eorum usu.                                                         | ibid.         | Condita ad vires reficiendas in febribus continuis.                       | 433          |
| emolliens, & purgans in febre quartana.                                                    | 450           | in hæmoptoe.                                                              | 257. 258     |
| in variolarum curatione ex quibus componendi.                                              | 464           | Condyloma in quo differat in hæmorrhoidibus.                              | 312          |
| Coagulum hædi vel leporis sanguinem fluentem sistit & concretum in utero dissolvit.        | 373           | Confectionis hyacinthinæ & chermesinæ usus in febribus malignis.          | 458          |
| Cœli mutatio in febre pestilenti omnium præservativum præstantissima.                      | 452           | Conformatrix facultas quid.                                               | 21           |
| Cœliaca passio in quo differat à lienteria.                                                | 297           | Conjunctio quid comprehendat.                                             | 17           |
| fit tum ventriculi, tum intestinorum vitio.                                                | ibid.         | Connexio partium quomodo pervertatur.                                     | 42           |
| Cœliacæ passioni peculiaris causa.                                                         | 298           | signa partis laborantis per consensum.                                    | 52           |
| curatio.                                                                                   | ibid.         | Constantis ætatis temperamentum.                                          | 7            |
| Cœna an largior prandio esse debeat.                                                       | 100           | Constipatio interdum refrigerat.                                          | 40           |
| Coindicantia.                                                                              | 122           | Constipatio calefacit.                                                    | ibid.        |
| Coitus quomodo abortus causa.                                                              | 402           | Contagiosus morbus.                                                       | 31           |
| dysenteriae medetur.                                                                       | 308           | Contemplabiles dies ad crism qui.                                         | ibid.        |
| Coli inflammatio quomodo à renum inflammatione distinguatur.                               | 355           | Continentia, contenta, & vim facientia quid sint.                         | 13           |
| Colica Pictonum in paralyfin degenerat.                                                    | 292           | Continuæ febres periculosæ.                                               | 63           |
| Colica Biliosa.                                                                            | 483. 485. 490 | Continuus morbus.                                                         | 31           |
| Colica pestilens.                                                                          | 291           | Contra indicantia.                                                        | 122          |
| Colica sedata exhibitione mannæ granatæ, cum oleo amygdalarum dulcium, in jusculo gallinæ. | 293           | Contrayervæ radix alexipharmaca.                                          | 457          |
| Colica biliosa aquæ frigidæ exhibitione sedata.                                            | ibid.         | animalia bezoardicum lapidem generantia, ea vesci consueverunt.           | ibid.        |
| Colici doloris exacerbationum & remissionum causa.                                         | 291           | Conturbatio quid sit.                                                     | 33           |
| materia non semper in sola intestinorum cavitate continetur.                               | ibid.         | unde fiat.                                                                | ibid.        |
| Colicus dolor & rheumatismus.                                                              | 502. 554      | Contusio quomodo solvat continuum.                                        | 31           |
| Colicus dolor in purgatione mensrua, & hysterici affectus.                                 | 551           | Contusiones.                                                              | 523          |
|                                                                                            |               | Contusiones capitis.                                                      | 557          |
|                                                                                            |               | Con-                                                                      |              |



& Verborum.

|                                                           |                                                          |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Contusio, inflammatio, & excoꝛiatio clunium, ex decu-     | Crocus.                                                  | pag. 112  |
| bitu diuturno supra partem.                               | Croci metallorum aqua ad suffusionem.                    | 201       |
| Convulsio quæ periculosa.                                 | Crocus in condimentis pectōri utilis.                    | 248       |
| Convulsionis futuræ signa.                                | accelerat partum.                                        | 404       |
| Convulsio.                                                | Cryſtalli puſtularum malignarum species.                 | 461       |
| fit à repletionē vel inanitionē.                          | Cryſtallum minerale ſuppreſſam urinam movet.             | 364       |
| eſt univerſalis vel particularis, & ejus differentiæ.     | adn iſcendum julepis in fluxionibus.                     | 201       |
| Convulſionis & motus convulſivi diſcrimen.                | Cryſtallini humoris affectus.                            | 198       |
| Convulſionis & paralyſeos cauſa materialis non eſt ea-    | ſitus mutatus.                                           | ibid.     |
| dem.                                                      | Cryſtallini ſitus vitiatus myopiæ cauſa.                 | 195       |
| Convulſio ab inanitionē cur in hectica & maraſmo non      | Criſtæ ficis finitimæ ſunt.                              | 315       |
| contingat.                                                | Cubitōrum dolores quid portendant.                       | 94. & 574 |
| quæ thoracis muſculos obſidet, periculoſiſſima.           | Cucumeres.                                               | 117       |
| à phrenitide lethalis.                                    | Cucupha ad cerebrum roborandum.                          | 94        |
| Convulſioni febrem ſupervenire melius eſt, quàm febrī     | Cucurbitæ.                                               | 117       |
| convulſionem.                                             | Cucurbitularum uſus in paralyſi.                         | 172       |
| Convulſionis ab inanitionē & repletionē curatio.          | in convulſione.                                          | 174       |
| Convulſis partibus animalia per medium ſecta adhuc ca-    | ſummo capiti affigendæ in phrenitide.                    | 183       |
| lentia admoveantur.                                       | occipitio cum ſcarificatione admota in gutta ſerena.     | 197       |
| Convulſiones in febrībus quomodo curandæ.                 | Cucurbitæ hypochondriis admotæ in hæmorrhagia ali-       | 229       |
| Convulſivi motus in febre peſtilenti ſæpè contingunt.     | quando periculosa.                                       | 233       |
| Convulſio.                                                | ſub mento ſcarificatæ ad linguæ inflammationem.          | ibid.     |
| Convulſiones in puero.                                    | linguæ paralyſim.                                        | 251       |
| Convulſionis rara ſpecies.                                | cum ſcarificatione lateri dolenti admota in pleuritide.  | 269       |
| Cor pars organica.                                        | thoraci & cordi in palpitatione cordis.                  | 281       |
| Cor quando impleatur.                                     | Cucurbitula regioni ventriculi admota in ſingultu à fla- | 430       |
| Corallorum ſyrupus & tinctura ad hæmoptoēn.               | tibus.                                                   | 454       |
| diarrhœam.                                                | Cucurbitularum uſus in febrībus continuis.               | 457       |
| in fluxu menſium immodico convenit.                       | in febrībus malignis.                                    | 463       |
| rheumatismo.                                              | quibus partibus applicandæ.                              | 288       |
| Cordis affectus.                                          | quo morbi tempore.                                       | 293       |
| morbi inſignes.                                           | in variolis præſertim puerorum.                          | 350       |
| morbi proprii.                                            | ventriculo admota ad illius dolores ſedandos.            | 383       |
| Cordis palpitatio & pulſus æqualitas.                     | umbilico in dolore colico.                               | 324       |
| Cornari abſtinentia mirabilis.                            | quomodo admovendæ in renum calculo.                      | 418       |
| Corneæ ruptura.                                           | mammis admotæ in fluxu menſium immodico.                 | 109       |
| ſigna.                                                    | pectini admota hyſtericis affectibus multum prodeſt.     | 120       |
| curatio.                                                  | sine ſcarificatione in ſumma parte doloris admotæ ad     | 123       |
| Cornu cervi uſtum confert in febre maligna.               | dolorem iſchiadicum.                                     | 6         |
| Cornu in facie exortum.                                   | Cuniculorum caro.                                        | 106       |
| Corporis humani triplex ſtatuſ.                           | Curatio.                                                 | 273       |
| Corpore in vivente omnia tranſfluxilia & permeabilia.     | Curationis primum & generaliſſimum principium.           | 107       |
| Corruptio ſæpè putredinem præcedit.                       | Cutiſ eſt inſtrumentum, quo dignoſcitur temperamen-      | 420       |
| Coryza quando periculosa.                                 | tum.                                                     | 351       |
| Coryza.                                                   | Cydonia.                                                 | 323       |
| ejus cauſæ.                                               | Cydonium, cydoniorum miva, ſyrupus cydoniorum ad         | 338       |
| curatio.                                                  | ventriculum roborandum.                                  | 324       |
| Coſtæ carie corruptæ.                                     | Cynara.                                                  | 36        |
| Cotone moſchato ſurditas curata.                          | Cynorrhodi fructus conſerva ad roborandum in rheu-       | 36        |
| Coturnices.                                               | matismo.                                                 | 154       |
| Cranii humani uſus in dyſenteria.                         | refrigerat, & urinæ vias expurgat.                       | ibid.     |
| Cranii depreſſio.                                         | Cynosbari radicis decoctum potenter aperit.              | 37        |
| Cranii depreſſio ex vulnere.                              | in melancholia hypochondriaca.                           | 68        |
| Cremor lactis.                                            | Cyſtidis felleæ obſtructio una ex cauſis icteri flavi.   | 240       |
| Cremor tartari utiliter medicamentis addi poteſt in febre |                                                          | 585       |
| tertiana intermittente.                                   |                                                          | 79        |
| Criſi inſtante cur narcotica non uſurpanda.               |                                                          | 52        |
| Criſis quid, variæ illius nominis acceptiones.            |                                                          | 272       |
| ſimilitudo illius cum judicio forenſi.                    |                                                          | 298       |
| Criſis per urinas futuræ ſigna.                           |                                                          | 64        |
| Criſis per hæmorrhagiam futuræ ſigna.                     |                                                          |           |
| Criſis per menſes futuræ ſigna.                           |                                                          |           |
| Criſis perfectæ quæ.                                      |                                                          |           |
| Criſis imperfectæ.                                        |                                                          |           |
| Criſium ſigna.                                            |                                                          |           |
| Criſium differentiæ perfectæ & imperfectæ.                |                                                          |           |
| Criſium cauſæ & dierum criticorum.                        |                                                          |           |
| in criſibus luna plurimum pollet.                         |                                                          |           |
| ſigna futuræ criſeos per vomitum, per alvi fluxum, &      |                                                          |           |
| ſudores.                                                  |                                                          |           |
| Criticus dies habet indicem.                              |                                                          |           |
| Dies critici qui.                                         |                                                          |           |
| Criticorum dierum computatio à qua hora debéat fieri.     |                                                          |           |



# Index Rerum

|                                                         |         |                                                           |               |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Deliquium subitum malignum.                             | pag. 55 | confertus cum cerebro.                                    | pag. 182      |
| Deliquium aperi quam hæmorrhagiam cohibeat.             | 226     | Diarrhœa unde oriatur aliquando.                          | 27            |
| Deliquium aperi in quo differat a syncope.              | 265     | Diarrhœa quid.                                            | 298           |
| Delirii faturi signa.                                   | 65      | in quo differat ab aliis alvi fluxus speciebus.           | ibid.         |
| Delirium pravam signum in universum.                    | 64      | differentia.                                              | 299           |
| quando lethale.                                         | 65      | signa causarum.                                           | ibid.         |
| Delirii variæ significationes.                          | 52      | & partis mandantis.                                       | ibid.         |
| Delirium morbi maligni index.                           | 55      | curatio.                                                  | 300           |
| Delirii causa in mania.                                 | 185     | critica quibus præcipue contingit.                        | 299           |
| Deliriorum melancholicorum varietas.                    | 188     | biliosa largo frigida haustu in æstate curata.            | 300           |
| Delirium sedantia.                                      | 185     | in hydropo quando bona.                                   | 329           |
| in febribus.                                            | 434     | inveteratæ curatio.                                       | 300           |
| in febre maligna.                                       | 457     | Diarrhœa.                                                 | 473           |
| Densitas qualitas Elementorum.                          | 4       | Diarrhœa inveterata.                                      | 504           |
| Dentes prodeunt anno septimo.                           | 35      | Diafarum Fernelii in fluore muliebri.                     | 376           |
| Dentium stridor quid arguat in febribus.                | 431     | Diafoles effectus.                                        | 21            |
| Dentes sensu præditi.                                   | 235     | Dies critici.                                             | 35. & 36      |
| dolent secundum ipsorum substantiam.                    | ibid.   | Dies critici puerperæ febricitantis.                      | 36            |
| doloris causa.                                          | ibi l.  | Dierum criticorum computatio in morbis puerperarum        |               |
| à seroso humore ut plurimum fit.                        | ibid.   | an à principio morbi fieri debeat, an die paritæ.         | 495           |
| medicamentis in aurem immixtis levatur.                 | 236     | Digestivum ad ulcus mundificandum.                        | 480           |
| quibus topicis curandus.                                | ibid.   | Digestivus pulvis, vide Pulvis digestivus.                |               |
| Dentis dolentis erosi nervus canterio adurendus.        | ibid.   | Digitorum extremitas apta ad dignoscendum tempera-        |               |
| extractio in contumaci dolore non uno ictu fieri de-    | ibid.   | mentum.                                                   | 6             |
| bet.                                                    | ibid.   | Dilatio unde oriatur.                                     | 29            |
| Dentium casum removens.                                 | 237     | Dilatio quid.                                             | ibid.         |
| nigredo & erosio.                                       | ibid.   | Διψασις quid.                                             | 361           |
| causæ & curatio.                                        | ibid.   | Discurtus facilis sanguinis.                              | 48            |
| Dente avulso hæmorrhagia incurabilis contingit.         | 238     | Dispersi morbi.                                           | 32            |
| dealbat, & detergit oleum vitrioli seu spiritus.        | 237     | Dissimilares partes.                                      | 17            |
| Dentium caries.                                         | 560     | Dissentio trium facultatum, vitalis, naturalis & animalis |               |
| Dens avulsus in alveolum intrusus.                      | 578     | quomodo probetur.                                         | 18            |
| Derivatio.                                              | 126     | Divinum in morbis.                                        | 447           |
| Destillatum restaurans in fluxu hepatico.               | 308     | Diuretica medicamenta.                                    | 148           |
| Destillata per descensum facta magis restaurant quam ea |         | Diuretica non sunt frequenter usurpanda in curatione      |               |
| quæ fiunt per ascensum.                                 | 424     | calculi renum.                                            | 351           |
| serina destillatio.                                     | 558     | in febre tertiana longiori usurpanda.                     | 435           |
| Detergentia medicamenta.                                | 149     | an fluori muliebri convenient.                            | 376           |
| Detergentia & exsiccantia moderata.                     | 211     | ad uteri hydropem.                                        | 391           |
| Diabete quid significetur.                              | 54      | an convenient gravidis,                                   | 397           |
| Diabetes Græcis διψασις, aliàs hydrops ad matulam.      | 360     | in febrium continuarum declinatione commoda.              | 431           |
| rarissimus affectus.                                    | ibid.   | Divulsio quid sit.                                        | 31            |
| causæ ex Galeno & aliis.                                | ibid.   | Dolores quando periculosi.                                | 68            |
| signa, & curatio.                                       | ibid.   | Dolor pungitivus quid significet.                         | 51            |
| affectus incurabilis.                                   | ibid.   | Dolorum dentium promptissimum remedium sanguinis          |               |
| an sudorifica convenient.                               | ibid.   | missio.                                                   | 236           |
| Diabrosis.                                              | 226     | Dolor ὀξυπνοῦ quis dicatur.                               | 440           |
| causæ.                                                  | 257     | quartanæ proprius.                                        | ibid.         |
| Diacodium album.                                        | 184     | Dolores capitis in febribus sedantia.                     | 435           |
| Diæta.                                                  | 132     | lumborum.                                                 | ibid.         |
| quænam sint ejus species, & quibus morbis conve-        |         | Dolores à partu.                                          | 555           |
| niant.                                                  | 133     | Dolores arthritici.                                       | 471           |
| Diæta sudorifica ad calefaciendum & exsiccandum cere-   |         | Dolores arthritici & venerei.                             | 667           |
| brum.                                                   | 162     | Dolor dentium.                                            | 541. 552. 490 |
| septimo quoque die interponatur medicamentum pur-       |         | Dolor dentium cum tumore supra mandibulam supe-           |               |
| gans.                                                   | ibid.   | riorem.                                                   | 524           |
| utilis in paralyfi.                                     | 89      | Dolor capitis lethalis.                                   | 559           |
| gutta ferena.                                           | 196     | Dolor capitis ab insolatu.                                | 498           |
| ulcere renum & vesicæ.                                  | 359     | Dolor capitis immanis & diuturnus.                        | 505           |
| hysterica passione.                                     | 382     | Dolor capitis in hæmitritæo.                              | 524           |
| in urinæ incontinentia à frigida causa.                 | 362     | Dolor intolerabilis.                                      | 26. 53        |
| ad chlorosin.                                           | 368     | Dolor capitis contumax.                                   | 569           |
| ad uteri procidentiam.                                  | 394     | Dolor colicus antiquus cum alvi fluxu.                    | 216           |
| ad prophylaxin in arthriticis.                          | 416     | Dolor in genu ex contusione.                              | 544           |
| Diagnostica signa.                                      | 45      | Dolor ischiadicus.                                        | 559. 507      |
| Diagrydiata in febribus continuis exhibenda.            | 432     | Dolor nephriticus.                                        | 472. 498      |
| Diapalma articulos in arthritide roborat.               | 416     | Dolor ossis sacri intolerandus.                           | 570           |
| Diapedesis quando fit.                                  | 29      | Dolor pleuriticus ex lumbricis.                           | 487           |
| Διαπυλνσις.                                             | 226     | Dolor pleuriticus.                                        | 556           |
| causæ.                                                  | 257     | Dolor tensivus abdominis.                                 | 498           |
| Diaphœnicum cum philonio Romano in singultu.            | 282     | Dolores vagi circa thoracem.                              | 495           |
| in dolore ventriculi.                                   | 289     | Dolores vagi.                                             | 504           |
| in colico dolore.                                       | 293     | Dolores venerei.                                          | 469           |
| Diaphoretica chymica in febre pestilenti.               | 457     | Dolor venereus in uno brachio.                            | 507           |
| Diaphragmatis inflammati signa.                         | 182     | ad dolores vesicatorios.                                  | 555           |
|                                                         |         | Dolores                                                   |               |



## & Verborum.

|                                                        |                         |                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Dolores universales.                                   | pag. 574                | cerebrum roborans.                                     | pag. 199     |
| Dorsalis tabes quid.                                   | 260                     | de vigo cum mercurio capiti admotum in dolore          |              |
| Dosis.                                                 | 123                     | capitis.                                               | 202          |
| Dulcis pituita quæ.                                    | 13                      | in dolore dentium.                                     | 236          |
| Dulcia bilem generant.                                 | 47                      | supra partem affectam applicanda in convulsione.       | 175          |
| Dulcia an semper bilefcent.                            | 310                     | Emplastrum Galeni hæmorrhagiam sistens.                | 225          |
| hystericos affectus excitant.                          | 379                     | pus attrahens & foras educens.                         | 306          |
| Dulcibus hepar inflammatum in majorem molem attol-     |                         | ventriculum calefaciens.                               | 112          |
| litur.                                                 | 319                     | ventriculo admovendum in singultu.                     | 281          |
| Durities quid sit.                                     | 3                       | ad vomitum compescendum.                               | 284          |
| Durities cutis quando mala.                            | 87                      | ad duritiem alicujus partis.                           | 321          |
| Δυσουρῆς.                                              | 271                     | emolliens scirrhum hepatis.                            | 325          |
| Δυσπνῆξ.                                               | 277                     | Emplastrum abdomini applicanda in hydrope.             | 331          |
| Dysenteria.                                            | 300. 485. 502. 503. 510 | in scirrhu lienis.                                     | 333          |
| Dysenterizæ prognosis.                                 | 301                     | astringens & roborans in urinæ incontinentia.          | 362          |
| species.                                               | 300                     | in hystERICA passione qua forma fieri debeant.         | 381          |
| propriè dicta.                                         | ibid.                   | vulgare pro matrice propter astrictionem in affectibus |              |
| causa.                                                 | 300                     | hystericis non ita convenit.                           | 381          |
| signa.                                                 | 301                     | adversus sterilitatem à frigida causa.                 | 398          |
| quartanam solvit.                                      | 440                     | ad præcavendum abortum.                                | 402          |
| Dysenterica exulceratio à qua causa fiat.              | 300                     | per intervalla removeantur.                            | ibid.        |
| Dysentericum contagium quomodo operetur.               | 301                     | resolventia ad dolores arthriticos.                    | 415          |
| Dysenteria epidemica peculiari aëris vitio excitatur.  | ibid.                   | diacalciteos seu diapalma impositum articulos robo-    |              |
| ab atra bile cur lethalis.                             | ibid.                   | rat.                                                   | 416          |
| vomitus & venæ sectio an convenient.                   | ibid.                   | resolventia ad dolorem ischiadicum.                    | 418          |
| specificæ.                                             | 302                     | regioni ventriculi admovendum in febre tertiana in-    |              |
| adstringentia quando convenient.                       | ibid.                   | termittente.                                           | 439          |
| epidemicæ curatio.                                     | ibid.                   | validè attrahentia ex quibus componantur.              | 480          |
| potus qualis exhibendus.                               | 305                     | supra futuram coronalem in catarrho applicanda.        | 184          |
| Dyspnœa quid.                                          | 245                     | Emprosthotonos convulsionis species.                   | 172. & seq.  |
| Dysuria quid.                                          | 365                     | Empyema.                                               | 254          |
| causæ.                                                 | ibid. & seq.            | causæ.                                                 | ibid. & seq. |
| in decrepitis senibus sæpe incurabilis.                | 366                     | signa.                                                 | ibid.        |
| phlebotomia ex venis inferioribus ad derivationem      |                         | latus affectum quomodo dignoscatur.                    | ibid.        |
| convenit.                                              | ibid.                   | pus aliquando per alvum & urinas expurgatur.           | 255          |
| quæ purgantia convenient.                              | ibid.                   | per chirurgiam lateris apertione curatur.              | ibid.        |
| quæ vomitoria.                                         | ibid.                   | Empyema.                                               | 575          |
| topica.                                                | ibid.                   | Empyema ex vulnere epigastrii.                         | 580          |
| Dysuriæ ab acri & bilioso humore apertio hæmorrhoidum, |                         | Emulsio.                                               | 135. 154     |
| & causticum tibiæ dextræ admodum conveniunt.           | ibid.                   | Emulsionem in phrenitide.                              | 183          |
|                                                        |                         | in renum inflammatione.                                | 154          |
|                                                        |                         | in dysuria.                                            | 366          |
|                                                        |                         | furor uterino.                                         | 377          |
|                                                        |                         | in syncho simplici.                                    | 422          |
|                                                        |                         | in febre hectica.                                      | 425          |
|                                                        |                         | in febribus maximè conveniunt.                         | 431          |
|                                                        |                         | ad febrem malignam.                                    | 456          |
|                                                        |                         | inflammationem ventriculi.                             | 290          |
|                                                        |                         | Enzorema quod malum.                                   | 85           |
|                                                        |                         | Enchantidis curatio.                                   | 298          |
|                                                        |                         | Endemii morbi.                                         | 32           |
|                                                        |                         | Endivia.                                               | 106          |
|                                                        |                         | Ensis portio insignis in vulnere diu latens extracta.  | 575          |
|                                                        |                         | Enterocoele.                                           | 524          |
|                                                        |                         | Enterocoele desperata sectione curata.                 | 580          |
|                                                        |                         | Ephemera febris perpetuò maligna.                      | 55           |
|                                                        |                         | Ephidrosis in apoplexia mala.                          | 165          |
|                                                        |                         | Epialæ febris essentia & causæ.                        | 427          |
|                                                        |                         | signa.                                                 | 428          |
|                                                        |                         | cur calor & frigus in eadem parte sentitur.            | ibid.        |
|                                                        |                         | Epidemii morbi.                                        | 32           |
|                                                        |                         | Epidemica febris potest esse sine obstructione.        | 446          |
|                                                        |                         | Epidemicus Catharrus.                                  | 191          |
|                                                        |                         | Epidemica dysenteria aëris peculiari vitio excitatur.  | 301          |
|                                                        |                         | Επιζυρόμενα signa.                                     | 44           |
|                                                        |                         | Epilepsia unde excitatur.                              | 41           |
|                                                        |                         | Epilepsiz definitio.                                   | 175          |
|                                                        |                         | imperfectæ historia.                                   | ibid.        |
|                                                        |                         | duplex est, idiopathica & sympathica.                  | 176          |
|                                                        |                         | ab imperfecta ventriculorum cerebri obstructione       |              |
|                                                        |                         | generari probatur contra neotericos.                   | ibid.        |
|                                                        |                         | imminentis & præsentis signa.                          | ibid.        |
|                                                        |                         | post 25. annum non semper incurabilis.                 | 177          |
|                                                        |                         | vehemens paroxysmo sæpe lethalis.                      | ibid.        |
|                                                        |                         | Epilepsiz quartana superveniens cur eam solvit.        | ibid.        |
|                                                        |                         | idiopa:                                                |              |

### E

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| <b>E</b> Buli decoctum sudorificum est.                 | 171   |
| Ebullitio sanguinis in variolis & morbillis alia perfe- |       |
| ctiva, alia corruptiva.                                 | 481   |
| Ecchymosis.                                             | 576   |
| Eclegma.                                                | 155   |
| Eclegmata, vide Looch.                                  | ibid. |
| Εκλυσις qui differat è syncope.                         | 265   |
| Εγκαυμα & επίκαυμα quid.                                | 210   |
| Electuarium cyphoides ad roborandum hepar in hydro-     |       |
| pe.                                                     | 330   |
| aliud calculum minuens.                                 | 350   |
| caryocottini usus in arthritide.                        | 415   |
| triasantali quadruplicato rheo ad roborandum in rheu-   |       |
| matismo.                                                | 421   |
| Elementa quid sint.                                     | 2     |
| Qualitates & numerus.                                   | ibid. |
| Elephantiasis perpetuò maligna.                         | 55    |
| Elixatio.                                               | 19    |
| Elixir proprietatis in paralyfi.                        | 172   |
| in ventriculo frigido.                                  | 270   |
| in singultu.                                            | 281   |
| Elleborastri vis in casu dentium promovendo.            | 237   |
| Elodes febris qualis.                                   | 427   |
| signa.                                                  | 421   |
| Emollientium medicamenta.                               | 148   |
| Emplastica medicamenta.                                 | 147   |
| Emplastica medicamenta quomodo calefaciant.             | 377   |
| Emplastrum.                                             | 159   |
| Emplastrum caput roborans.                              | 262   |
| attrahens & resolvens.                                  | ibid. |
| supra spatam dorsi applicandum in paralyfi.             | 171   |



## Index Rerum

|                                                         |                     |                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| idiopathica curatio.                                    | pag. 177            | Excretionēs quæ pulmonem affectum indicant.             | p. 51       |
| sympathica curatio.                                     | 178                 | Excrementum quid.                                       | 19          |
| specifica.                                              | 177                 | Excrementa quot modis peccent.                          | 43          |
| Epileptici plerumque fiunt melancholici & contrā.       | ibid.               | causæ symptomatum in excrementis.                       | 44          |
| Epileptici paroxysmi curatio.                           | ibid.               | Excrementa morbum acutum indicantia.                    | 56          |
| Epilepsia ab utero.                                     | 380                 | Excrementa quæ ominosa.                                 | 73          |
| quomodo distinguatur ab hysterica suffocatione.         | ibid.               | Excrementitius humor quid.                              | 10          |
| Epilepsia.                                              | 513. 538            | Excrementitia bilis quid.                               | ibid.       |
| Epilepsia puerilis.                                     | 599                 | Melancholia excrementitia.                              | 11          |
| Epilepsia cum paralyfi.                                 | 567                 | Excrescentia carnea in faucibus.                        | 575         |
| Epinyctides.                                            | 555                 | Excretio quando salutaris.                              | 35          |
| Επιφανόμενα signa.                                      | 45                  | Excretio quæ periculosa.                                | 74          |
| Epiphora quid.                                          | 213                 | Excretio interdum pro crisi usurpatur.                  | 32          |
| causæ.                                                  | ibid.               | Exedentia medicamenta.                                  | 150         |
| signa.                                                  | ibid.               | Exercitatio quæ utilis.                                 | 118         |
| curatio.                                                | ibid.               | Exercitationis & corporis motus utilitas.               | 161         |
| Epiphoræ humor fluit per venas internas, vel externas,  | ibid.               | Expectorantia in asthma.                                | 247         |
| ibid. vesicatorio epiphora curata.                      | ibid.               | in pleuritide.                                          | 251         |
| Epispastica medicamenta.                                | 149                 | Expiratio quid efficit.                                 | 21          |
| Epithema.                                               | 158                 | Expulsio quomodo fiat.                                  | 19. & 20    |
| Epithemata refrigerantia.                               | 183                 | Expulatrix facultas quæ.                                | 191         |
| in mania.                                               | 187                 | Extenuationis in phthisicis causa.                      | 259         |
| in hæmoptoe.                                            | 258                 | Extenuatio non semper est cum sanguinis penuria.        | 371         |
| refrigerans in colico dolore.                           | 243                 | Extenuationi in febre hectica clysteres nutrientes con- | veniunt.    |
| in fluxu hepatico.                                      | 308                 |                                                         | 425         |
| refrigerans in hepatitis inflammatione.                 | 320                 | Extractum restaurans ex carne vervecina, & ex cordibus  | vervecinis. |
| resolvens.                                              | ibid.               |                                                         | 27          |
| in calida renum intemperie.                             | 351                 | Exulcerationem indicat dolor acer.                      | 54          |
| cordi & hepati admovenda in synocho simplici.           | 422                 | Exulcerationis intestinatorum causa in vera dysenteria. | 249         |
| in febre hectica.                                       | 425                 |                                                         |             |
| liquida & solida cordi & hepati admovenda in febri-     | bus continuis.      |                                                         |             |
|                                                         | 433                 |                                                         |             |
| in summo vigore febris tantum, aut potius ut decli-     | nationis principio. |                                                         |             |
|                                                         | 438                 |                                                         |             |
| cordi admovendum in febre maligna.                      | 458                 |                                                         |             |
| ad hæmorrhagiam sistendam.                              | 231                 |                                                         |             |
| in uteri inflammatione.                                 | 385                 |                                                         |             |
| Ad præservationem à calculo renibus admovendum.         | 351                 |                                                         |             |
|                                                         | 149                 | Facies hippocratica quid.                               | 423         |
| Epulotica medicamenta.                                  | 31                  | Facies quomodo defendenda à variolarum noxa.            | 465         |
| Erosio quomodo solvat continuum.                        | 377                 | an frequenter ablunda aqua rosacea, aliisque adstrin-   | gentibus.   |
| Eroticus affectus quid.                                 | 141                 |                                                         | ibid.       |
| Errrhina medicamenta.                                   | 158                 | Faciei tubercula retrocedentia.                         | 555         |
| Errhinorum compositio.                                  | 191                 | Facultas animalis quæ, & quotuplex sit.                 | 21          |
| Errhinorum formulæ.                                     | 223                 | Facultas auxilii.                                       | 20          |
| ad exsiccanda narium ulcera.                            | ibidem & 191        | Facultas concoctrix.                                    | 19          |
| quando utendum.                                         | 209                 | Facultas generatrix.                                    | 20          |
| Errrhina & sternutatoria in affectibus oculorum damnan- | tur.                | Facultas vitalis quid sit.                              | ibid.       |
| eorum formulæ.                                          | 250                 | Facultates minus principes quæ.                         | 23          |
| ad foetorem narium.                                     | 225                 | Facultas naturalis quid sit.                            | 19          |
| Eruca.                                                  | 166                 | Facultas expulatrix.                                    | ibid.       |
| Eryngii radice decoctum pro potu in calculo renum.      | 351                 | Facultas quid sit.                                      | 19          |
|                                                         | 503                 | Facultatium subjectum.                                  | ibid.       |
| Erysipelas.                                             | 599                 | Fames quæ ominosa.                                      | 73          |
| Erysipelas, herpes & lichenes.                          | 481                 | Fames canina magnum morbum arguit.                      | 55          |
| Escharæ calus quomodo procurandus.                      | 230                 | Fames canina.                                           | 274         |
| Escharotica an in hæmorrhagia sistenda adhibenda.       | 274                 | causæ.                                                  | ibid.       |
| Essentiæ chymicæ ventriculum calefacientes & robo-      | rantes.             | curatio.                                                | 276         |
|                                                         | 228                 | quomodo distinguantur à boulimia.                       | 274         |
| Evacuatio bona κατ' ἔξιν fieri debet.                   | 33                  | pinguia & oleaginosa obtundunt.                         | 275         |
| Evacuationis causa.                                     | 132                 | Farinacea sedimenta in urinis mala.                     | 83          |
| Evacuatio per sudores.                                  | ibid.               | Fasciæ seu lumbrici lati, an sint vermīs unicūs.        | 308         |
| Evacuatio per urinas.                                   | 125                 | Fascinus & incantatio an conceptionem impedire possint. | 395         |
| Evacuatio & illius differentię.                         | 127                 | signa.                                                  | ibid.       |
| Evacuatio particularis.                                 | 32                  | qua arte dissolvenda.                                   | 397         |
| Eventus morbi.                                          | 328                 | Fastidium cibi quando malum.                            | 393         |
| Ευπλάγχνος qui.                                         | 56                  | Fastidii ciborum causæ.                                 | 273         |
| Exanthemata in febribus maligna.                        | 450                 | quodnam magis funestum.                                 | 271         |
| Exanthemata quid differant à purpureis maculis in febre | pestilentī.         | cur in dysenteriis longis malum.                        | ibid.       |
| differentię.                                            | ibid.               | Faucium signa periculosa.                               | 90          |
| Excessus alimenti signa.                                | 96                  | Faucium ulcera.                                         | 239         |
| Excitationes feroces à somno quid significant.          | 93. & 94            | causa & differentię.                                    | ibid.       |
| Excitationes à somno graves quid notent.                | 66                  | curatio.                                                | ibid.       |
|                                                         |                     | narcotica interdum conveniunt.                          | ibid.       |



# & Verborum.

|                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Faucium ardor, siccitas & scabrities in febribus quomodo curanda.                                                                                                 | pag. 435                | in furditate.                                                                                                                                                                                                                                                                  | pag. 117 |
| Febres continuæ acutæ.                                                                                                                                            | 57                      | Fermentum acre admotum ventriculo, vomitum sedat.                                                                                                                                                                                                                              | 287      |
| Febres quæ periculosæ.                                                                                                                                            | 64                      | Fermentationes humoris melancholici quæ incommoda sequantur.                                                                                                                                                                                                                   | 334      |
| Febris alba quid.                                                                                                                                                 | 366                     | Fernelius improbatur circa sanguinem è naribus die critico fluentem.                                                                                                                                                                                                           | 228      |
| Febris apoplexiam solutura qualis esse debeat.                                                                                                                    | 165                     | ut in causa epilepsiæ. 176. circa ductus serosæ materiæ in capacitatem abdominis. 327. circa productionem hydropis ab urinæ suppressione. ibid. circa originem arthritidis. 421. circa calculi vesicæ rudimentum.                                                              | 352      |
| Febrem convulsioni supervenire cur melius quam febri convulsionem.                                                                                                | 173                     | Ferri scoria ad exsiccanda aurium ulcera.                                                                                                                                                                                                                                      | 222      |
| Febris catarrhalis unde.                                                                                                                                          | 290                     | Fibræ sanguinis quales.                                                                                                                                                                                                                                                        | 7        |
| Febris lactis ejusque symptomata.                                                                                                                                 | 408                     | Ficus.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107      |
| Febrium divisio in simplices, putridas & pestilentes.                                                                                                             | 321                     | Fici in quo differant ab hæmorrhoidibus.                                                                                                                                                                                                                                       | 314      |
| Febris unde excitetur in arthritidis principio.                                                                                                                   | 411                     | Figura partium quomodo pervertatur.                                                                                                                                                                                                                                            | 42       |
| unde febres catharrales.                                                                                                                                          | ibid.                   | Filamentorum in urinis causæ variæ secundum authores.                                                                                                                                                                                                                          | 310      |
| Febris simplex dividitur in ephemeram, synocham, simplicem & hecticam.                                                                                            | ibid.                   | Filiorum similitudo.                                                                                                                                                                                                                                                           | 24       |
| Febris ephemera.                                                                                                                                                  | 421                     | Finis Medicinæ quid.                                                                                                                                                                                                                                                           | 26       |
| causæ, signa.                                                                                                                                                     | ibid.                   | Fissura quid.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31       |
| curatio.                                                                                                                                                          | 421                     | Fistula lachrymalis quid.                                                                                                                                                                                                                                                      | 212      |
| Febris ab hepate corrupto signa.                                                                                                                                  | 421                     | si per annum perseverat cariem in osse producit. ibid.                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Febris hectica, vide hectica.                                                                                                                                     | ibid.                   | profunda & inveterata cum ossis carie, solo cauterio curari potest. 257. curatio. ibid. cum ossis carie solis medicamentis curata.                                                                                                                                             | ibid.    |
| Febrium putridarum differentia.                                                                                                                                   | 426                     | Fistulam in ano sæpe relinquunt hæmorrhoides suppuratæ aut exulceratæ.                                                                                                                                                                                                         | 314      |
| Febres putridæ continuæ.                                                                                                                                          | ibid.                   | Flatus discutientia medicamenta.                                                                                                                                                                                                                                               | 146      |
| causæ.                                                                                                                                                            | ibid.                   | Flatuum signa.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58       |
| tempora quomodo considerari debeant.                                                                                                                              | ibid.                   | Flatuum in tympanite causa.                                                                                                                                                                                                                                                    | 327      |
| Febrium continuarum differentia accidentales unde desumuntur.                                                                                                     | ibid.                   | materia magis ordinaria est humor melancholicus adustus & atrabiliaris.                                                                                                                                                                                                        | 419      |
| Febris lentæ essentia, causæ & differentia.                                                                                                                       | 427                     | Flatus quomodo in uteri cavitate contineantur.                                                                                                                                                                                                                                 | 390      |
| Febris à sanguine in stomacho putrescente excitatæ historia.                                                                                                      | ibid.                   | cum strepitu ex utero explosus suffitu nucis myristicæ.                                                                                                                                                                                                                        | ibid.    |
| putridarum continuarum diagnosi. ibid. curatio.                                                                                                                   | 428                     | Fluor uterinus.                                                                                                                                                                                                                                                                | 475      |
| diætâ in acutis. ibid. in minus acutis & longis. ibid.                                                                                                            |                         | Fluor muliebris.                                                                                                                                                                                                                                                               | 530      |
| cibus quo tempore exhibendus. ibid. quam sit utilis venæ sectio. 429. mittendi sanguinis temporis. ibid. ex quibus venis. ibid. cucurbitulis quomodo locus. ibid. | 428                     | Fluor muliebris quid.                                                                                                                                                                                                                                                          | 374      |
| potus qualis.                                                                                                                                                     | 428                     | causæ. ibid. & 375. signa causarum & partis affectæ.                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Febrium continuarum initio an purgantia convenient 431. an vomitoria. ibid. an aqua frigida. 432. quando debeatur purgatio. ibid. cur iterari debeat. ibid. & 434 |                         | 375. quomodo distinguantur ab ulcere uteri & gonorrhœa. ibid. quæ mala inducat, ibid. huic virgines sunt obnoxia. 375. vetulas ad mortem comitatur. ibid. Ei an conveniat venæ sectio. ibid. diuretica. ibid. & 376. caustica tibiæ. ibid. adstringentibus quando locus. ibid. |          |
| Febri lentæ ab obstructionibus frequens debetur purgatio.                                                                                                         | ibid.                   | lactis chalybeati usus.                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid.    |
| quæ diuretica & sudorifica convenient.                                                                                                                            | ibid.                   | Fluxio per attractionem.                                                                                                                                                                                                                                                       | 41       |
| Febris tertiana.                                                                                                                                                  | 470. 472. 538. 542. 549 | Fluxio per congestionem.                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.    |
| Febris tertiana, duplex.                                                                                                                                          | 469. 528. 545           | Fluxio quot modis fiat.                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid.    |
| Febris tertiana cum vomitu & alvi fluxu in paroxysmo.                                                                                                             | 503                     | Fluxiones è capite per quas vias fiant.                                                                                                                                                                                                                                        | 189      |
| Febris tertiana duplex cum hydropisi.                                                                                                                             | 520                     | excitantur à frigore comprimente.                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.    |
| Febris tertiana duplex.                                                                                                                                           | 528                     | causæ.                                                                                                                                                                                                                                                                         | ibid.    |
| Febris tertiana diuturna.                                                                                                                                         | 526                     | Fluxioni attrahendæ calor maximè idoneus.                                                                                                                                                                                                                                      | 190      |
| Febris tertiana maligna.                                                                                                                                          | 541                     | interna quomodo ab externa distinguatur.                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.    |
| Febris tertiana duplex in gravido septimestri.                                                                                                                    | 547                     | Fluxio in pulmonum in infante.                                                                                                                                                                                                                                                 | ibid.    |
| Febris tertiana notha.                                                                                                                                            | 569                     | Fluxus alvi imminentis signa.                                                                                                                                                                                                                                                  | 92       |
| Febris tertiana & lumbrici.                                                                                                                                       | 571                     | Fluxus hepaticus quid.                                                                                                                                                                                                                                                         | 307      |
| Febris quartana.                                                                                                                                                  | 474. 507. 532. 541      | differentia. ibid. curatio. 308. causa præter vulgarem intemperiem alia est. ibid. in quo differat à dysenteria.                                                                                                                                                               |          |
| Febris maligna cum parotidibus.                                                                                                                                   | 474                     | ibid. legitimus spurio periculosior. ibid. an locus sit clysteribus & medicamentis purgantibus.                                                                                                                                                                                | ibid.    |
| Febris maligna cum sopore.                                                                                                                                        | 589                     | Ei convenit tinctura rosarum destillatarum restaurans. 308                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Febris maligna cum exanthematis.                                                                                                                                  | 585                     | Fluxus alvi in febribus pestilentibus quomodo curandus.                                                                                                                                                                                                                        | 456      |
| Febris hectica.                                                                                                                                                   | 536                     | Fluxus hepaticus, dysenteria.                                                                                                                                                                                                                                                  | 486      |
| Febris hectica cum suspicionem phthiseos.                                                                                                                         | 525                     | Fluxus hepaticus.                                                                                                                                                                                                                                                              | 502      |
| Febris hectica cum putrida complicata.                                                                                                                            | 499                     | Fluxus hæmorrhoidum.                                                                                                                                                                                                                                                           | 548      |
| Febris purpurata.                                                                                                                                                 | 470                     | Fluxus mensium immodicus, cum hysterica suffocatione.                                                                                                                                                                                                                          | 490      |
| Febris elodes.                                                                                                                                                    | 588                     | Fluxus mensium inordinatus cum flore albo.                                                                                                                                                                                                                                     | 505      |
| Febres putridas comitantia symptomata.                                                                                                                            | 438                     | Fluxus sanguinis ex auribus.                                                                                                                                                                                                                                                   | 556      |
| eorum curatio.                                                                                                                                                    | ibid.                   | Fœcunditatem vel sterilitatem sceminae indicantia.                                                                                                                                                                                                                             | 396      |
| Febres subintrantes dictæ.                                                                                                                                        | 438                     | in sceminis quadraginta dierum spatio partes spermaticæ perficiuntur.                                                                                                                                                                                                          | 25       |
| Febres longæ ab obstructione pendentes decocto cichorii & chamedryos curantur.                                                                                    | 439                     | Fœminarum temperamentum.                                                                                                                                                                                                                                                       | 6        |
| tertianæ intermittens specifica.                                                                                                                                  | ibid.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Febres compositæ seu complicatæ.                                                                                                                                  | 444                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| earum differentia. ibid. horridæ malignæ.                                                                                                                         | ibid.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Febris pestilens & maligna differunt tantum secundum magis & minus.                                                                                               | 445                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| intermittentes non semper periculo carent.                                                                                                                        | ibid.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Febrifugium.                                                                                                                                                      | 435                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Fel catelli lactentis antepilepticum.                                                                                                                             | 479                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Fella piscium piaculis delendis inserviunt.                                                                                                                       | 304                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Laz. Riverii Opera.                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |



# Index Rerum

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fœminæ minus obnoxia anginae, quam viri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pag. 241 | Fructus esculenti.                                                                                                                                              | pag. 106 |
| Fœnugræci vires in ophthalmia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 208      | Fruges quomodo ab immodica aëris siccitate corrum-<br>pantur.                                                                                                   | 446      |
| Fœtor in ægrotante malum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88       | Fuligo candelæ ex cera rubra ulcera narium exsiccat.                                                                                                            | 233      |
| Fœtoris narium causa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 225      | Fuligo camini & ejus spiritus ad pleuritidem. 252. in pa-<br>roxismo hysterico exhibetur. 382. exterius admovetur                                               | 407      |
| curatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.    | ad fluxum lochiorum immodicum.                                                                                                                                  | 266      |
| Fœtum in utero Galenus comparat fructibus ac arbore<br>pendentibus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 399      | Fulmini miscetur interdum spiritus fixantes.                                                                                                                    | 377      |
| Fœtum enecantia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400      | Furor uterinus quid.                                                                                                                                            | 378      |
| Fœtum mortuum excludentia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 405      | causæ. ibid. signa. ibid. conveniunt remedia mania &<br>melancholiae hypochondriacæ propria.                                                                    |          |
| Fœtus quomodo sit causa abortus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400      |                                                                                                                                                                 |          |
| Fœtus debili existente, puerpera quomodo curanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 404      |                                                                                                                                                                 |          |
| Fœtus morbi causæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ibid.    |                                                                                                                                                                 |          |
| signa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 405      |                                                                                                                                                                 |          |
| Fœtus mortui ossa per umbilicum matris excreta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid.    |                                                                                                                                                                 |          |
| Is, frustra tentatis aliis præsiidiis, chirurgica operatione<br>educi debet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid.    |                                                                                                                                                                 |          |
| Fœtus mortui per longum tempus in utero servati hi-<br>storiarum plures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.    |                                                                                                                                                                 |          |
| Fœtus in partu morientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 494      |                                                                                                                                                                 |          |
| Fœtus mortuus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 586      |                                                                                                                                                                 |          |
| Fœtus vitalis editur septimo mense.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35       |                                                                                                                                                                 |          |
| Fomentum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 157      |                                                                                                                                                                 |          |
| Fontana aqua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112      |                                                                                                                                                                 |          |
| Forma nova introducta priorem corrumpit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 445      |                                                                                                                                                                 |          |
| Formatrix virtus ad similitudinem valet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24       |                                                                                                                                                                 |          |
| Formatrix virtutis defectus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42       |                                                                                                                                                                 |          |
| unde proficiscitur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 309      |                                                                                                                                                                 |          |
| Formicarum ova ad surditatem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217      |                                                                                                                                                                 |          |
| Fotus in suffusione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201      |                                                                                                                                                                 |          |
| in albugine. 210. surditate. 227. ophthalmia. 210. pro<br>stomacho in vomitu. 282. in dolore ventriculi. 290. in<br>lienteria. 298. adstringens in diarrhœa. 300. disente-<br>ria. 303. in tenesmo. 306. ad lumbricos. 311. in hæ-<br>morrhoidum fluxu immodico. 312. in hæmorrhoidum<br>dolore. 315. in obstructione hepatis. 322. in scirr-<br>ho hepatis. 325. in hydrope. 331. chalastici in renum in-<br>flammatione. 357. adstringens in mictu sanguineo. 357.<br>dolorem sedans in ulcere renium & vesicæ. 359. adstrin-<br>gens in diabete. 361. urinæ incontinentia. 362. sup-<br>pressionem mensium. 370. & seq. adstringens in fluxu<br>mensium immodico. 374. emolliens & resolvens. 388.<br>anodynus. 389. discutiens & roborans in hydrope ute-<br>ri. 392. sicci flatus discutientes. ibid. & 402. adstrin-<br>gens. ibid. emolliens. 404. valde roborantes in partu<br>difficili. ibid. adstringens in fluxu lochiorum immo-<br>dico. 406. emolliens & aperiens ad suppressionem<br>lochiorum. ibid. carminans in torminibus à partu. 407.<br>in doloribus arthriticis. 413. emolliens, attenuans,<br>& roborans in febre tertiana intermittente. 438. emol-<br>liens & attenuans ad curationem febris quartanæ spu-<br>riæ. 444. alexipharmaci in febre maligna. 451. & seq.<br>ad fœtum mortuum excludendum. 495. in uteri proci-<br>dentia. | 394      |                                                                                                                                                                 |          |
| Fractura ossis temporalis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 579      |                                                                                                                                                                 |          |
| Fractura quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31       |                                                                                                                                                                 |          |
| Fractura cranii in tempore sinistro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 572      |                                                                                                                                                                 |          |
| Frictiones partium extremarum in gutta serena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 197      |                                                                                                                                                                 |          |
| Frictiones in febre syncopali humorosa qua methodo ce-<br>lebrandæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 437      |                                                                                                                                                                 |          |
| Frictionum modus in hecticis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 424      |                                                                                                                                                                 |          |
| In febre pestilenti 473. in fluore muliebri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 375      |                                                                                                                                                                 |          |
| Frigiditas qualitas aquæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3        |                                                                                                                                                                 |          |
| Frigiditatis causæ in corpore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40       |                                                                                                                                                                 |          |
| Frigus in acutis quando malum?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86       |                                                                                                                                                                 |          |
| Frontale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 159      |                                                                                                                                                                 |          |
| Frontale in phrenitide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184      |                                                                                                                                                                 |          |
| Frontale in ophthalmia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 207      |                                                                                                                                                                 |          |
| in hæmorrhagia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230      |                                                                                                                                                                 |          |
| Frontalia repellentia in febre maligna ad capitis dolorem<br>& vigilias aut delirium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 479      |                                                                                                                                                                 |          |
| Frontis vena secunda in febre maligna, ad capitis dolorem<br>& vigilias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.    |                                                                                                                                                                 |          |
| Fructus recentes & sugaces multa aquea humiditate præ-<br>diri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5        |                                                                                                                                                                 |          |
| Fructus & olera serum generant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58       |                                                                                                                                                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | G.                                                                                                                                                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | G Agatinum oleum in paroxysmo hysterico confert.                                                                                                                | 382      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | & pulvis gagateus.                                                                                                                                              | 384      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Galbanetum Paracelsi, in colica, & ejus descriptio.                                                                                                             | 293      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Galenus ex pulsu furibundos mulierum amores cognos-<br>cebat.                                                                                                   | 377      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Galenus defenditur circa epilepsiæ idiopathicæ causam.                                                                                                          | 177      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | impugnatus circa causarum materialem & efficientem<br>calculi. 345. circa causam bullarum urinis innatan-<br>tium. 347. circa arenosam, in urinis subsidentiam. | 353      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Galli Indici.                                                                                                                                                   | 110      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gallinæ.                                                                                                                                                        | ibid.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Galli annosi decoctum ad asthma.                                                                                                                                | 248      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | reprobatur opinio eorum, qui ejus usum damnant. ibid.                                                                                                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | in obstructione hepatis. 320. melancholia hypochon-<br>driacæ. 316. in calculis renum.                                                                          | 350      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gallina viva, per spinam secta, lateri admota in pleuri-<br>tide.                                                                                               | 251      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gallarum ventriculi cur in pulveribus digestivis præ-<br>scribantur.                                                                                            | 278      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Ganglion in facie supra Zygoma.                                                                                                                                 | 572      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gangrænæ signa in urina.                                                                                                                                        | 78       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gangrænæ uteri curatio.                                                                                                                                         | 390      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gangræna.                                                                                                                                                       | 489      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gangræna ex vesicatorio.                                                                                                                                        | 511.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gangræna in vulva.                                                                                                                                              | 573      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | alia gangræna.                                                                                                                                                  | ibid.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | alia gangræna in pede.                                                                                                                                          | ibid.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gangræna perinæi, ani, & scroti.                                                                                                                                | 580      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gargarifina.                                                                                                                                                    | 156      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gargarisma ad expurgationem cerebri.                                                                                                                            | 163      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | discutiens & resolvens in linguæ paralyfi.                                                                                                                      | 235      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ad linguæ scabritiam & ardorem. 435. fauces & gut-<br>tur à variolis defendens. 464. refrigerans & repellens<br>in inflammatione linguæ.                        | 232      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gaudii effectus.                                                                                                                                                | 119      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gelatina pro hecticis instaurandis.                                                                                                                             | 424      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | cornu cervi ad febrem malignam.                                                                                                                                 | 458      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gemellorum abortus, cur frequentior.                                                                                                                            | 400      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gemelli in utero.                                                                                                                                               | 558      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gemmas cur puerpera in partu deponere debeat.                                                                                                                   | 404      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Genarum ruboris causa in peripneumonia.                                                                                                                         | 253      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Generatrix facultas quid sit?                                                                                                                                   | 210      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Generatio quid sit, & quotuplex.                                                                                                                                | ibid.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | univoca Generatio.                                                                                                                                              | ibid.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Generationis primæ defectus.                                                                                                                                    | 42       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Genitalium fœtus in febre maligna.                                                                                                                              | 478      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gentilitii morbi.                                                                                                                                               | 37       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gibbositas.                                                                                                                                                     | 567      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gingivarum erosio in pueris aliquando vermium est in-<br>dicium.                                                                                                | 238      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gingivarum erosio & exulceratio. ibidem curatio.                                                                                                                | ibidem.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gingivarum fluxus sanguinis aliquando criticus, ali-<br>symptomaticus.                                                                                          | 238      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gingivarum ulceribus maximè obnoxii.                                                                                                                            | ibid.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gingivarum putredinem arcet spiritus sulphuris & vi-<br>trioli.                                                                                                 | ibid.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gingivarum affectus in scorbuto.                                                                                                                                | 339      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Gla-                                                                                                                                                            |          |



# & Verborum.

|                                                                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Glaciales aquæ.                                                                                                                                 | pag. 115 |
| Glandes anodynæ ad dolores vesicæ leniendos.                                                                                                    | 36       |
| Glandulæ cur fluxiones faciliè recipiant.                                                                                                       | 194      |
| Glandulæ mesenterium obstruentes.                                                                                                               | 342      |
| Glaslea bilis quid.                                                                                                                             | 10       |
| Glaslea bilis unde proceretur & an præternaturalis.                                                                                             | 70       |
| Glaucoma quid? causæ & curatio.                                                                                                                 |          |
| Globulus plumbeus vulnere sclopeti calcaneo infixus.                                                                                            | 571      |
| Gluten humor secundarius.                                                                                                                       | 9        |
| Glutinantia medicamenta.                                                                                                                        | 160      |
| Gonorrhæa.                                                                                                                                      | 508      |
| Gonorrhæa antiqua.                                                                                                                              | 472      |
| Gonorrhæa contumax.                                                                                                                             | 501      |
| Gossypium ad exsicccandos oculos.                                                                                                               | 209      |
| Graciles quomodo purgandi.                                                                                                                      | 132      |
| Granatorum flores exsiccati præservant à calculo.                                                                                               | 351      |
| Gravativus dolor unde.                                                                                                                          | 55       |
| Gravedo quid, causæ, & curatio.                                                                                                                 | 225      |
| Gravidæ mulieres quomodo & quando purgandæ.                                                                                                     | 129      |
| Graviditas quomodo ab uteri tumore distinguatur.                                                                                                | 391      |
| Gravidis mulieribus cur familiaris pica.                                                                                                        | 376      |
| cur circa quartum mentem ea ut plurimum liberentur.                                                                                             | 277      |
| Falsa graviditas.                                                                                                                               | 515      |
| Gravitas, qualitas Elementorum.                                                                                                                 | 3        |
| Grumi sanguinis in utero à partu remanentes quomodo educendi. 406. ut agnoscantur.                                                              | 408      |
| Guaiaci decoctum in paralyfi.                                                                                                                   | 172      |
| in epilepsia. 177. in gutta serena. 197. an possit in febre terriana intermittente tutò exhiberi. 253. in ventriculo frigido. 273. in singultu. | 380      |
| Gurgulionis præcisio.                                                                                                                           | 327      |
| Gustatus vitia, causæ. 233. signa, & curatio.                                                                                                   | 234      |
| Gustus signa prava.                                                                                                                             | 66       |
| Gustus quid.                                                                                                                                    | 23       |
| Gutta serena.                                                                                                                                   | 160      |
| an curabilis. 162. an conveniat phlebotomia.                                                                                                    | 164      |
| Gypsea pituita.                                                                                                                                 | 13       |
| Gypsi cum aceto subacti usus in hæmorrhagia.                                                                                                    | 230      |
| Gypsum solum albumine ovi exceptum sanguinem fluentem potentissimè cohibet.                                                                     | 238      |

## H.

|                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>H</b> æmatites lapis in hæmoptoe.                                                                       | 258      |
| Hæmatosis ubi fiat.                                                                                        |          |
| Hæmoptisis quid propriè.                                                                                   | 256      |
| causæ. ibid. partis mandantis signa. ibidem. curatio.                                                      | ibid.    |
| Hæmoptoe.                                                                                                  | 489. 504 |
| Hæmorrhagia quando periculosa.                                                                             | 75       |
| Hæmorrhagiæ instantis signa.                                                                               | 93       |
| Hæmorrhagia febris ardens in juvene judicatur.                                                             | 33       |
| Hæmorrhagia quid.                                                                                          | 227      |
| differentiæ. ibid. causarum signa. ibid. imminentis signa. ibid. criticè apparet in morbis acutis.         | ibid.    |
| quæ è directo partis affectæ accidit bona.                                                                 | ibid.    |
| curatio.                                                                                                   | ibid.    |
| Hæmorrhagiæ sistendæ animi deliquium utile.                                                                | 229      |
| & cauterium actuale in utraque planta pedum appositum. ibid. contumacem sistunt narcotica.                 | 230      |
| Hæmorrhagia è naribus, in quartana febre superveniens, cur pessima. 440. salutaris & critica per gingivas. | 238      |
| Hæmorrhagia ex dente avulso.                                                                               | 557      |
| Hæmorrhagia ex vulnere.                                                                                    | 570      |
| Hæmorrhagia ex arteria vulnerata, ligatura cohibita.                                                       | ibid.    |
| Hæmorrhoidalium venarum apertio per hirudines in tenesmo.                                                  | 306      |
| Hæmorrhoidum fluxus moderatus à quibus morbis præservet.                                                   | 312      |
| fluxus immodici causæ. ibid. fluxum immodicum co-                                                          |          |

*Lazari Riverii Opera,*

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| hibentia.                                                    | pag. 313 |
| Hæmorrhoides ligandi, incidendi, & urendi modus. ibid.       | ibid.    |
| post curationem cautio adhibenda.                            | ibid.    |
| Hæmorrhoidum dolor.                                          | 545      |
| Hæmorrhoidum fluxus immodicus.                               | 546      |
| Hæmorrhoidum dolor. 313. causæ. 314. curatio. ibid.          | ibid.    |
| quæ purgatio conveniat. ibid. topica admovenda. ibid.        | ibid.    |
| ulceratarum curatio.                                         | 280      |
| Hæmorrhoides abstinentia. ib. quomodo aperiendæ. ibid.       | ibid.    |
| Hæmorrhoidibus obnoxio causticum ubiæ utilissimè ad-         | ibid.    |
| movetur.                                                     | ibid.    |
| Hæmorrhoidum apertio in febre pestilenti utilis.             | 454      |
| & in calculo renum. 347. in uteri scirrho. 216. in ischiade. | 457      |
| Hæctica febris inter omnes sola est in facto.                | 27       |
| Hæctica febris. 423. Ejus differentiæ & gradus. ibid.        | ibid.    |
| causæ internæ & externæ. ibid. sedes. ibid. quare habi-      | ibid.    |
| talis dicatur ibid. signa variorum graduum. ibid.            | ibid.    |
| curatio. ibid. cur frequentius accidit. ab 18. anno ad 35.   | ibid.    |
| ibid. quæ diæta conveniat. ibid. 2. an frigidus. ibid. an    | ibid.    |
| crassa & viscosa alimenta.                                   | ibid.    |
| Hæcticos instauranti alimenta. ibid. 2. aquæ frigidæ potus   | ibid.    |
| an conveniat. ibid. quæ debeatur purgatio. 425. lac &        | ibid.    |
| balneum maximè conveniunt. ibid. antiquorum bal-             | ibid.    |
| neandi modus. ibid. alterantia potius quam purgantia         | ibid.    |
| conveniunt.                                                  | ibid.    |
| Hederæ terrestris succus ad disenteriam.                     | 304      |
| Hellebori vis in mania.                                      | 187      |
| Hellebori extracto cancer incipiens sanatus. 211. & seq.     | ibid.    |
| Hemiorania quid. 193. arteriotomia curata.                   | 195      |
| Hemicrania.                                                  | 521      |
| Hemitritæus.                                                 | 588      |
| Hemitritæa febris plerumque ab intestinorum & mesen-         | ibid.    |
| terii inflammatione exoritur.                                | 342      |
| Hemitritæus quid. 444. Ejus differentiæ. ibid. signa dia-    | ibid.    |
| gnostica. ibid. motus inæquales à qua causa dependeant.      | ibid.    |
| ibid. cur periculosus. ibid. curatio.                        | ibid.    |
| Rara hemitritæi species.                                     | 540      |
| Hepar pars organica.                                         | 17       |
| Hepatica medicamenta.                                        | 143      |
| Hepatis affectus.                                            | 316      |
| Hepatis calida intemperies ibid. differentiæ & causæ. ibid.  | ibid.    |
| curatio. ib. inflammatio. 317. differentiæ & causæ. ib.      | ibid.    |
| signa.                                                       | ibid.    |
| Hepatis inflammatio à topicis calefacientibus præposterè     | ibid.    |
| admotis excitata. 318. & cucurbitulis regioni hepatis        | ibid.    |
| admotis. ibid. à musculorum abdominis inflammatione          | ibid.    |
| quomodo distinguatur. 319. à pleuritide & mesente-           | ibid.    |
| rio inflammato.                                              | ibid.    |
| Hepaticos solo faciei colore plurimos Galenus agnovit        | ibid.    |
| ibid. hepaticide Siculum Medicum tentari cognovit            | ibid.    |
| Galen. ex dejectionibus. ibid. quæ periculosior. ib. qui-    | ibid.    |
| bus modis terminetur. ibid. ad supurationem vergentis        | ibid.    |
| curatio.                                                     | 320      |
| Hepatis ulcus. 319. sine præcedenti inflammatione quo-       | ibid.    |
| modo dignoscatur.                                            | ibid.    |
| Hepatis obstructio. 320. est morbus in via & meatu ob-       | ibid.    |
| structio in causa materialis. ibid. signa.                   | ibid.    |
| Hepatis scirrhus. 324. differentiæ. ibid. causæ, signa. 325. | ibid.    |
| curatio. ibid. insensibilis curationem non recipit. ibid.    | ibid.    |
| Hepar gratiosi humoris fons est.                             | 380      |
| Hepate calido, cerebro frigido, ut plurimum sunt catar-      | ibid.    |
| rho obnoxii.                                                 | 394      |
| Hepatis atonia in hepatico fluxu pendet à causa supra        | ibid.    |
| primariam qualitatum excessum.                               | 307      |
| Hepar inflammatum dulcibus offenditur.                       | 319      |
| Hepar an semper afficiatur in hydrope. 326. sanguificatio    | ibid.    |
| an lædatur in hydrope.                                       | 326      |
| Hernia.                                                      | 582      |
| Hernia aquosa in infante.                                    | 494      |
| Hermeticorum opinio circa causam sitis morbosæ. 277.         | ibid.    |
| circa ventriculi concoctionem vitiatam. 279. circa cau-      | ibid.    |
| sam cholæræ morbi. 286. circa calculosas.                    | 34       |
| Hiera commendatur in morbis ventriculi.                      | 273      |



## Index Rerum

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I</b> Alappæ radix in fluxu muliebri seroso præstantissima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 370      |
| in Ictericis an color flavus sit morbus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27       |
| Ictericorum flavus color suffitu acetî discutitur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201      |
| Ictericis objecta flava apparent, si sit magna bilis effusio<br>in corneam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 204      |
| Icterus est symptoma qualitatis mutatæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 324      |
| Ejus differentia. ibid. causæ, signa causarum. ibid. cu-<br>ratio. ibid. an semper ante septimum lethalis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.    |
| specificæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.    |
| Icterus albus quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 367      |
| Icterus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 468. 529 |
| Icterus in grvida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 495      |
| Icterus serpentum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 553      |
| Ictus vespæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 555      |
| Idiopathicus morbus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33       |
| Idiopathici affectus continui sunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52       |
| Ignobiles partes organicæ quæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17       |
| Ileos Latinis volvulus, aliis χόλῆς ὄχλος, barbaris miserere<br>mei. 294. Ejus causæ, signa. ibid. curatio. 295. proprium<br>signum est, nihil per inferiora descendere. 294. non<br>semper lethalis, in quo faeces evomuntur. 296. ab in-<br>flammatione convenit venæ sectio. ibid. inedia. ibid. de-<br>sperato follis fabrilis & argenti vivi usus conveniunt.<br>296. ab intestini prolapsu quomodo curandus. ibid.<br>quibus signis distinguatur à colico dolore. | 295      |
| Ileos seu miserere mei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 561      |
| Iliaca passio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 522      |
| Illuminationis mensis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38       |
| Imaginatio quid sit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21       |



# & Verborum.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Imaginatix facultas ad similitudinem prolis cum parente multum confert.                                                                                                                                                                                                                                                                     | pag. 24. 25 | Intercales dies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pag. 36 |
| Imaginatio an lædi possit ratiocinatione illaesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 182         | Intercidentes dies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.   |
| Imperforatæ seu atretæ mulieres quæ dicantur.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 394         | Intermittens morbus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32      |
| curatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.       | Intermittentes febres an periculosæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63      |
| Impetigines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 658         | Intermittentes febres an semper periculo vacent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 446     |
| Impetigo & pruritus corporis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 557         | Internuntii dies, sive indices ad crisin, qui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35      |
| Inanimata quomodo calefiant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40          | Intestina lumbricis obnoxia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48      |
| Inanitiu quomodo singultum excitare possit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 279         | Intestinorum affectus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 291     |
| Inappetentia in biliosis frequens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47          | Intestinum lupi ad colicam, ejus præparatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 243     |
| Inappetentiæ causæ. 271. prognos. 272. à caloris nativi exsolutione lethalis.                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.       | Intestinorum motus naturalis peristalticus dictus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 294     |
| Inappetentiæ in febribus curatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 436         | quomodo invertatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.   |
| Inappetentia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 554         | Intestina tenuia an crassa efficiantur ulcere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300     |
| Incessus ad dysenteriam. 217. in tenesino. 306. hæmorrhoidum dolore.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 315         | eorum inflammatio in dysenteria quomodo curanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 301     |
| Incisiones quotuplices.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31          | Intestinorum exulcerationis causa est qualitas maligna, specifica. 300. curatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 301     |
| Incontinentiæ urinæ causæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 361         | Intestina à variolarum noxis defendentia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 404     |
| Incrassans blandum, humoremque acrem demulcens.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192         | Inventio remedium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125     |
| Incrassantia humoris in catarrho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid.       | Ira calefacit corpus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41      |
| Indicans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121         | Ira effectus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220     |
| Indicata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid.       | Irrepentes dies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36      |
| Indicatio à morbo communi, seu solutione continui.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 133         | Ischiadici doloris à causa calida curatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 418     |
| Indicatio à morbo organico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ibid.       | Ischuria quid. 363. causæ ischuriæ legitimæ & nothæ. ib. & 364. signa casarum utriusque. ibid. curatio. ibidem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ib.     |
| Indicatio, & illius differentia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120         | cur valde periculosa. 365. à grumo sanguinis quomodo curanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.   |
| Indicatio à morbo simili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 132         | Judicium temperamentorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6       |
| Indices dies, seu contemplabiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35          | Judicio crisis comparatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37      |
| Individui similitudo unde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24          | Jugulares venæ in angina aperiri possunt. 243. modus secandi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.   |
| Inedia quomodo exsiccet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41          | Julepus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152     |
| Inedia bilem generat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47          | Julepi refrigerantes in phrenitide. 183. in mania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107     |
| Infantium quis esse victus debeat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102         | in catarrho. 191. in pleuritide. 284. ad hæmoptoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 257     |
| Inflammationes interiorum partium acutæ sunt semper.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56          | Julepus cardiacus. 270. leniens in calculo renum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 349     |
| Inflammatorius dolor quid notet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54          | in vomitu bilioso. 283. in vomitu sanguinis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234     |
| Inflammatiæ testium cum urinæ suppressione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 246         | in dolore ventriculi. 289. Phlegmone. 260. fluxu hepatico. 390. vermium curatione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 311     |
| Influens spiritus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13          | Julepus Alexandrinus, & varii Julepi hepar refrigerantes. 317. in renum inflammatione. 356. calculos imminuens. 349. leniens & detergens in ulcere renum & vesicæ. 359. consolidantes in ulcere renum & vesicæ. ibid. adstringentes in diabete. 362. aperientes in ischuria. 364. refrigerantes & lenientes. 366. incrassans & leniter adstringens. 376. ad leniendos humores biliosos acres. 408. refrigerans in febre hectica. | 435     |
| Influxus syderum, quomodo sint causæ morborum.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 447         | Julepus Alexandrinus pro potu in febribus putridis biliosis, ejus compositio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450     |
| Ingenium, effectus bilis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46          | Julepi in febribus biliosis. 432. incrassantes in bile valde acri & tenui. ibid. in febribus pituitosis, & melancholicis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid.   |
| Inguinis dolor ex utero in illo conglobato quomodo curandus.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 407         | Julepus cardiacus gustui gratissimus. ibid. movens sudores in febre tertiana intermittente. 438. aperiens, abstergens, & incidens in febre tertiana contumaci. 437 variolarum eruptionem adjuvans. 464. motum sanguinis & ebullitionis frænans & modicè refrigerans. ibid.                                                                                                                                                       | ibid.   |
| Injectiones vesicæ ulcera detergentes & consolidantes. 360. quo instrumento immittendæ. 361. ad vesicæ dolores. ibid. ad dysuriam.                                                                                                                                                                                                          | 336         | Julepi alterantes in febribus malignis ex quibus componendi. 455. eorum formulæ. 479. præparantes humorem melancholicum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 441     |
| Injectio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 156         | Juli nucis juglandis ad suffocationem hysterica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 349     |
| Injectiones in uterum in mensium suppressione. 372. fluxu mensium immodico. 373. fluxu muliebri. 377. furore uterino. 379. uteri inflammatione. 385. ad ulcus uteri. 387. detergentes, exsiccentes, & consolidantes. ibid. in cancro uteri. 372. hydrope uteri. 392. adversus sterilitatem à frigida causa. 397. ad excludendam secundinam. | 406         | Juniperi granorum decoctum ad diarrhœam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300     |
| Injectio in anum ad fluxum hæmorrhoidum immodicum.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 357         | Juscula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154     |
| Innominatus humor quis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10          | Jusculum in adstrictione alvi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 296     |
| Inquietudines, febricitantium signa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 435         | Juscula medicata ad hepar refrigerandum. 356. ad suppurationem accelerandam in hepaticide. 319. ad obstructions hepatis. 321. & 335. in calculo renum. 349. in melancholia hypochondriaca. 335. in dysuria. 366. in fluxu mensium immodico. 373. aperiens diureticum & menses movens.                                                                                                                                            | 391     |
| Inquietudines, morbi maligni indices.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55          | Juscula cur ægrotantibus in morbis quantumvis acutissimis concedantur. 429. medicata in contrivis putridis usurpanda. 433. lentis & diuturnis. ibid. ex decocto cichorii & chamædryos mira præstant in febribus longis, ab obstructione pendentibus.                                                                                                                                                                             | 48      |
| Insalubris status quis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48      |
| Inspida pituita quæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| In situs spiritus quis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Insomnia phreneticorum salutaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Insomnium quid?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| A qua causa oriuntur ut plurimum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Insomnia pituitosorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Inspiratio quid efficiat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Instaurantia alimenta pro hecticis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 624         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Instrumenta Medica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 235         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Intemperies quid; & earum divisio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Calida intemperies an detur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Intemperies quomodo corrigenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 132         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Intemperantia, Medicorum nutritrix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Intemperaturæ calidæ causæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Intemperaturæ frigidæ causæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Intemperaturæ siccæ causæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibid.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Intemperies simplices, tum etiam immateriales raro inveniuntur.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |



# Index Rerum

Jusculum in quo exhibentur trochisci de absinth. de rhabarbaro. pag. 48

## K.

**K**itta quid. 276  
*Kolowma.* 210  
*Kritikon* temperamenti quid. 5  
*Kaphosis.* 215

## L.

**L**aborum signa. 90  
**L**ac esculentum. 109  
 Lac generantia aut trinentia medicamenta. 146  
 Lactis usus. 153  
 Lactis muliebris usus in ophthalmia. 209  
 Lactis usus in phthysicis. 262. in dysenteria. 134. & 304  
 Lac muliebre omnibus aliis præferendum. 262  
 Lacte solo interdum phthysici nutriuntur. 31  
 Lac non omnibus siticulosis interdici debet. 278. putrescens cur non generet vermes. 309  
 Lactis serum hepar refrigerat. 356  
 Lac albidum corpus emaciatur restituit. ibid. interdum convenit in melancholia hypochondriaca. 336. in ulcere renum & vesicæ. 359. in dysuria. 367  
 Lac ovillum commendatur ad mictum sanguinis. 357  
 vaccinum maxime confert ad solidationem ulcerum, renum & vesicæ. 360. ovillum, bubulum aut asinum conveniunt in diabete. 362. chalybatum maxime confert in fluore muliebri. 376. asinum in ulcere uteri. 387  
 Lac tepens recenter multum, anodynum præstantissimum in ulcere vesicæ. 360. in arthrico dolore. 412. asinum ad præcavendam arthritidem biliosam. 416  
 heclicis maxime conveniens. 425  
 Lac calens gargarizatum dolorem lenit. 479  
 Lacertæ caput, auri ad modum, corpuscula auri inserta extrahit. 221  
 Lactuca oculis infensa. 197  
 Lactuca. 105  
 Lactuca refrigerat. 187  
 Læsiæ actionum ut primum sentitur, incipit computatio dierum criticorum. 33  
 Lapidescens succus causa materialis calculi. 346  
 Lapidifico spiritu hominum corpora aliaque infusa convertit. ibid.  
 Lapidis sub lingua. 576  
 Larynx & pharynx propter viciniam in angina ut plurimum afficiuntur. 240  
 Laryngis usus & officium. ibid.  
 Laryngotomia utrum in angina celebranda. 245  
 Lateralis dolor quid significet. 94  
 Laudani usus in clysteribus phreneticorum. 183  
 Laudani usus in catarrho calido 193. in hæmorrhagia. 230  
 in dolore dentium. 232. in faucium doloribus & ulceribus. 239. in vomitu. 282. in pleuritide, sed exigua dosi. 252. in cholera morbo. 287. in dysentericorum clysteribus. 303. in tenesmo, etiam per os in calculo renum. 350. in ischiadico dolore acerbior. 418  
 Lavendulæ flores in mensium suppressione commendantur. 370  
 Legitimus morbus. 27  
 Legumina melancholiam generant. 49  
 Lentæ febris essentia, causa, & differentia. 427  
 Lentæ. 150  
 Lentium decoctum, an ad variolarum expulsionem conveniat. 105  
 Lenticini ligni decoctum ad cerebrum exsiccandum. 191  
 in fluxu hæmorrhoidum immodico. 313. pro potu in mictu sanguinis. 357  
 Lentores dentium in febre quid notet. 90  
 Leporina caro. 108  
 Lethalis morbi signa. 61

Lethalis morbus. pag. 31

Lethargi differentia ab apoplexia, caro, & comate. 264  
 parotides supervenientes salutare. 165. Et qualis purgatio conveniat. 165. & 166  
 Lethargici quomodo empyici fiant. 155. scammonium cum castoreo exhibitum perutile. 166  
 Leucoma quid. 204  
 Leucophlegmatia unde dicta. 328. quando salutaris diarrhæa. ibid.  
 Levitas unde oriatur. 41  
 Libidinis sensus deperditus quid arguat. 54  
 Lien obstructionibus obnoxius. ibid.  
 Lienis novus usus ex hermeticis. 279  
 Lienosis gingivarum ulceribus obnoxii. 238  
 Lien majorem consensum habet cum ventriculo, quam hepar. 842  
 Lienis inflammatio. ibid. signa & curatio. 332  
 Lienis morbi. ibid. inflammatio criticè solvitur per hæmorrhagiam naris sinistra. ibid.  
 Lienis dolor. ibid. quomodo ab inflammatione & colico dolore distinguatur. ibid. curatio. ibid.  
 Lienis obstructio seu inflatio. ibid. causæ & signa. ibid. fuit sublata decocto radices chinæ. 333  
 Lienis scirrhus. ibid. quomodo distinguatur à tumore flatuoso, seu inflatione. ibid. curatio. ibid.  
 Lienis cura specialis habenda est in febre quartana. 443  
 Lien per ramos splenicos cum onento communicat. 344  
 Lien potulentam materiam ad se trahit. 327  
 Lienosis dysenteria superveniens, quæ bona. 302  
 Lienteria unde significetur. 297  
 Lienteria quomodo fiat. 28  
 Lienteria quid. 297. causæ. ibid. signa, curatio. 298  
 fit potius vitio retentricis ventriculi concoctricis. 297  
 quid differat à coeliaca passione. ibid. lævitas intestinorum appellatur. ibid. & 298. qualia enemata conveniant. ibid.  
 Ligni nephritici infusio facta pro potu ordinario in obstructione hepatis. 324. melancholia hypochondriaca. 336  
 Limacum liquor ad arthritidem. 414  
 Limaturæ chalybis varius usus in obstructionibus referendis. 322  
 Limonum succi cautus debet esse usus. 349  
 Limonum aqua à calculis renes liberat. 352  
 Linariæ herbæ decoctum hæmorrhoidum dolores sistit. 315  
 Linguae signa lethalia. 90  
 Linguae affectus. 232. tumores, & magnitudo valde excedens. ibid.  
 Linguae humorum diagnosi. ibid. curatio. ibid.  
 Linguae scarificationes profundæ, ad curationem tumoris oedematosi linguae. 233  
 Linguae paralyfis. 234. causæ. ibid. curatio. ibid.  
 Linguae paralyfis ex profunda cucurbitularum scarificatione. 235  
 Linguae siccitas, ardor, & scabrities, quomodo curanda in febribus. 479. in febre maligna. 506  
 Linguae tumor. 563  
 Linguae frigiditas lethalis. 567  
 Linimentum. 158  
 Linimenta in convulsione usurpari solita. 174. & 175. ad pleuritidem. 252. & 253. refrigerans & leniens in phthysi. 264  
 Linimentis ad pleuritidem cera & mucilagines non conveniunt. 251  
 Linimentum in palpitatione cordis. 269. ad ventriculi inappetentiam. 273. ad ventriculum calefaciendum. ibid. in vomitu sanguinis. 283. ad lumbricos. 312. in dolore hæmorrhoidum. 315. & 316. in hepatide. 320. in obstructione hepatis. 321. scirrhus hepatis. 325. ventriculo admovendum in hydrope. 331. & 332. hepatis. ibid. calculo renum. 348. & 349. renum calida intemperie. 352. adstringentia in mictu sanguinis. 357. consolidationem adjuvantia in ulcere renum & vesicæ. 360. dolorem sedans. ibid. adstringens in



& Verborum.

in diabete. p. 371. adstringens in urinæ incontinentia. 362. aperiens in suppressione mensium. & 372. fluxu mensium immodico. 373. detergentia, exsiccanda, cicatricem inducentia. 387. in cancro uteri. 389. adversus sterilitatem à frigida causa 398. ad fluxum lochiorum immodicum. 466. ad dolores arthriticos sedandos. 412 ad roborandos articulos. 416. resolventia ad dolorem ischiadicum. 418. refrigerantia hepati & lumbis admo-  
venda in synocha simplici. 422. hepati admo-  
vendum in febribus putridis continuis. *ibid.* dissolutio-  
nem corporis impediens. 437. emolliens post. *scitum*.  
438. roborans ventriculum. *ibid.* ad inungendam spi-  
nam dorsi in quartana. 443. in febre quartana spuria  
444. ad frictiones totius corporis. 454. ad maximè car-  
diacum in febre maligna. 457. & 458

Linimentum. 158

Linteamina & indusia an sint frequenter in morbis im-  
mutanda. 429

Lipothymia cur pulsus minuat. 43

Lipothymia quid differat à syncope. 265

Lipothymia & alia symptomata ex utero. 546

Lippitudo quid. 205

Lipyria febris adest in inflammatione ventriculi erysipe-  
latosa. 289

Lipyria febris quid. 427

Liquida faciliùs vel difficiliùs deglutiuntur in angina. 241

Liquores cardiaci ad palpitationem. 268. & 269

Lithonriptica. 145

Lividitas ubi mala. 165

Lixivium discutiens in tumore œdematoso tibiæ &  
pedum. 332

Loca quædam cur pestifera labe tententur. 448

Lochiorum fluxus immodicus unde æstimandus. 406

causæ, signa. *ibid.* curatio. *ibid.* cur periculosus. *ibid.*  
victus ratio qualis esse debeat. *ibid.* cur somnus ar-  
cendus. *ibid.*

Lochiorum suppressio. *ibid.* causæ, signa, *ibid.* curatio. *ibid.*

Lochiorum suppressionem quæ mala sequantur. *ibid.*  
quando debeatur ei purgatio. *ibid.* unde mittendus  
sanguis. *ibid.*

Lochia suppressa. 488

Lolium visui inimicum. 197

Looch. 155

Looch in angina. 162. in asthma. 247. pleuritide. 251.  
empyemate. 255. in hæmoptisi. 258. ad linguæ sca-  
britiem & siccitatem. 434. & 479. pulmonem à va-  
riolis præservans. 494. ad fluxionem in pulmone jam  
excitatam. *ibid.* fauces & guttur defendens à variola-  
rum noxis. *ibid.* Loquelæ instrumentorum cum audi-  
torii instrumentis consensus. 215

Lotiones pedum in phrenitide. 183. coxarum & tibiæ  
ad excludendam secundinam. 233. manuum & pedum  
in febribus continuis. 433

Lues venerea semper maligna. 55

Lues venerea. 488

Lues venerea in puero curata. 513

Lues venerea inveterata. 540

Lues venerea antiqua. 541

Lues venerea in puero nuper in lucem edito. 573

Lues venerea in puero quinque annorum curata. 576

Lumborum dolor in febribus quibus remediis curandus. 344. & 345

Lumbrici excreti quid indicent. 51

Lumbrici enecantia medicamenta. 146

Lumbrici ad quod genus affectum præter naturam re-  
ferendi. 309

Lumbricorum tria genera. *ibid.* causa efficiens. *ibid.*  
materialis. *ibid.* signa. *ibid.*

Lumbricorum excretio quo morbi tempore salutaris. 310

Lumbrici lati an unus vermis, an ex pluribus conflatus. 310.  
an ex melle & saccharo possint generari. 309  
quæ mala accerfant. *ibid.*

Lumbricis cur maximè infestentur pueri lactantes, qui-  
bus carnes exhibentur. *ibid.*

Lumbrices enecantia. p. 425. quæ purgantia convenientia,  
quales clysteres. 310  
Lumbrici in febre maligna quibus remediis curandi &  
educendi. 480. interdum alvi fluxum excitant. 289  
quibus figuis dignoscantur. ibid.  
Lumbrici. 472. 491. & 468  
Luna in crisi bus maximè dominatur. 33  
Lunares radii cerebro infensî. 161  
Lupia. 568. 573. & 577  
Lupi sanguis surditatem curat. 217. hepar, specificum in  
fluxu hepatico. 308. hepar exsiccatum epilepsiam hy-  
stericam præcavet. 384. caro exsiccata amuletum in  
suffocatione hysterica. ibid. intestinorum pulvis in  
colico dolore. 293  
Luxationem coxæ cur ischiadicus dolor inferat. 417  
Lysis quid. 32

M.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>M</b> Acies etiam à sanguinis copia.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 260      |
| Macies summa cur una ex sterilitatis causis.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 396      |
| Maculae præcipuè in cruribus unum ex scorbuti signis.                                                                                                                                                                                                                                                            | 338      |
| Macula quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 205      |
| Maculae purpurea symptomata febris pestilenti proprium<br>& peculiare. 446. sed non verè pathognomonicum. 449<br>non malignæ in corpore apparentes quid indicent. ibid.                                                                                                                                          | 446      |
| Macula in cornea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 573      |
| Magnitudinis vitia quæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41       |
| Mala persica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107      |
| Armeniaca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.    |
| Malacia quid. 276. causæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid.    |
| Malignus morbus quis.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31. & 55 |
| Maligna febris quæ. 454. cur carbunculi & parotides<br>eam significant. 450. Maculae purpureæ.                                                                                                                                                                                                                   | ibid.    |
| Malignæ febris symptomatum curatio.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 478      |
| Maligna febris cum parotidibus quibus remediis ab au-<br>thore curata.                                                                                                                                                                                                                                           | 480      |
| Malignitas quomodo à putredine distinguatur.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 429      |
| Malignis & pestilentibus morbis purgatio in principio<br>instituta maximè noxia.                                                                                                                                                                                                                                 | 464      |
| Malvæ florum conserva leniendo arenulas expurgat.                                                                                                                                                                                                                                                                | 351      |
| Malvæ decoctum & florum conserva ad dysuriam.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230      |
| Mammarum extenuatio in prægnante cur abortum por-<br>tendat.                                                                                                                                                                                                                                                     | 401      |
| Mammæ inflammatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 548      |
| Mammillarum inflammatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 474      |
| Mammillarum fissuræ.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 551      |
| Mammillarum fissuræ & hircus alarum.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 552      |
| Mandragora refrigerat.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40       |
| Mania quid. 185. signa præsentis & imminētis mania.<br>286. in quo differat à phrenitide & melancholia. 185.<br>cur non habeat febrem comitem. ibid. fit à maligna &<br>venenata qualitate. ibid. & 186. qua anni tempestate<br>sæpius contingat. ibid. curatu difficillima. ibid. cura-<br>tio. ibid. amuletum. | 287      |
| Mania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 579      |
| Manus est instrumentum dignoscendi temperamentum.                                                                                                                                                                                                                                                                | 5        |
| Manuum ac pedum præcipuè in urinis calor signum cali-<br>dioris hepatis.                                                                                                                                                                                                                                         | 316      |
| Manuum & pedum refrigeratio maximè juvans in febris<br>continuis.                                                                                                                                                                                                                                                | 433      |
| Marasmus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33       |
| Marasmus quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 422      |
| Marcoris variæ causæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260      |
| Margaritarum & corallorum laus in febribus malignis.                                                                                                                                                                                                                                                             | 456      |
| Marium temperamentum.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7        |
| In maribus triginta dierum spatium partes spermaticæ<br>perficiuntur.                                                                                                                                                                                                                                            | 24       |
| Marrubii succus ad morbi regii curationem. 326. conser-<br>va ad scirrhi hepatis curationem.                                                                                                                                                                                                                     | 327      |
| Martis vitrioli usus in menstruis fluentibus. 373. in epi-<br>lepsia hysterica.                                                                                                                                                                                                                                  | 384      |
| Massa sanguinea quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8        |
| Massæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Massæ    |



# Index Rerum

|                                                             |                 |                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Masticatorii compositio.                                    | pag. 16         | Mercurius quomodo præparandus ad epilepsiam.                | p. 178     |
| Masticatoria medicamenta.                                   | 141             | Mercurii dulcis usus in colico dolore. 293. in obstructio-  |            |
| Masticatoria ad expurgandum cerebrum.                       | 191. & 185      | nibus commendatur, sicut & mercuriales purgatio-            |            |
| in dolore dentium.                                          | 237             | nes. 329. in hydropo. 386. ulcerat, mundificat, & con-      |            |
| Mastiche sumpta vomitum compescit.                          | 281             | solidat. 360. cum scammonio exhibitus in dolore             |            |
| Mastiche usus in hydropo ad hydropem fallendam.             | 329             | ischiadico. 418. in rheumatismo. 420. contra vermes.        | 311        |
| Materia vitæ in corpore quotuplex.                          | 41              | Mercurius diaphoreticus in diarrhœa exhibendus.             | 300        |
| Materia præparatio & inductio formæ ab eodem agente         |                 | in curatione hydropis. 332. ulcera mundificat.              | 360        |
| proficiscitur.                                              | 307             | Mercurius vitæ ad curationem hydropis. 328. an possit       |            |
| Materia in thoracis capacitate contenta qua transeat &      |                 | exhiberi ab curationem foetus mortui.                       | 405        |
| expectoretur.                                               | 249             | Mercurii inunctione curata cataracta. 202. ophthalmia       |            |
| Maturatio.                                                  | 18              | desperata. 210. an exhibendus contra vermes crudus.         | 312        |
| Maxillarum tumoris curatio per resolutionem.                | 238             | Mercurius præcipitatus rubeus, ad polypum & sarcoma.        | 225        |
| adstringentia non inter pessivè applicanda.                 | 236             | Mesaraicæ venæ quibus obstruantur.                          | 342        |
| Meatus sunt ductus parentes, per quos serosa materia in     |                 | Mesenterii & ventris inflammatio hepatis communicatur.      | 320        |
| abdominis capacitatem defertur.                             | 327. & 328      | Mesenterii tumor quomodo ab hepatis inflammatione di-       |            |
| Medendi methodus.                                           | 120             | stinguatur.                                                 | ibid.      |
| Medici Parisiensis notati de sanguinis missione in pueris.  | 462             | Mesenterii morbi.                                           | 341. & 342 |
| Mel rosaceum cum guttis aliquot spiritus vitrioli ad oris   |                 | Mesenterium medicorum nutricula vocatur. ibid. obstru-      |            |
| & faucium ulcera.                                           | 240             | ctio. ibid. causæ. ibid. signa. ibid. intestinis & lumbis   |            |
| Mel & saccharum an lumbricos generent.                      | 308             | alligatur.                                                  | 328        |
| Mellis aqua ad albuginem.                                   | 390             | Mesenterii inflammatio. 342. causæ, & signa. ibid. quo-     |            |
| Mel.                                                        | 111. & 112      | modo à musculorum abdominis inflammatione distin-           |            |
| Melancholia hypochondriaca.                                 | 590             | gnatur. ibid. à diaphragmatis tumoribus.                    | ibid.      |
| Melancholici humoris redundantis signa.                     | 179             | Mesenterii abscessus, nlcus, & scirrhus quomodo digno-      |            |
| Melancholicis hæmorrhoides supervenientes salutare.         | 124. & 189      | scantur. ibid. curatio. ibid. abscessus non semper fit ab   |            |
| Melancholia alimentaria quid.                               | 9. & 18         | inflammatione. ibid. cur semper periculosus.                | 343        |
| unde generetur, & qui illius sint effectus.                 | ibid.           | Mesepilorum usus frequens in diarrhœa.                      | 300        |
| Melancholia excrementitia quid, & ejus usus.                | 10              | Metrenchyta, seu clysteres uterini ad mensium suppressi-    |            |
| Melancholicis unde oriantur insomnia.                       | 22              | onem. 371. non præscribendi virginibus.                     | ibid.      |
| Melancholicorum signa.                                      | 48              | Mictus sanguinis. 357. causæ. ibid. curatio. ibid. interdum |            |
| Ingenios.                                                   | 49              | criticus. ibid. signa partis affectæ. ibid. topica conve-   |            |
| Melancholia morbus. 188. in quo differat à phrenitide       |                 | nientia. 358. lac ovillum utile. 357. à calculo & are-      |            |
| & mania. ibid. varii gradus. ibid. signa. ibid. morbus      |                 | nulis quomodo curandus.                                     | 358        |
| contumacissimus, opprobrium medicorum dictus. ibid.         |                 | Millefolii decoctum ad hæmoptoën. 258. in hæmorrhoi-        |            |
| & 336. curatio.                                             | ibid.           | dum dolore. 372. sanguinem sistit.                          | 308        |
| Melancholia hypochondriaca inter morbos lienis colloca-     |                 | Mille florum aqua, seu ex stercore vaccino, variolarum,     |            |
| ri debet. 333. focus & causæ. 334. cur pueri & ado-         |                 | cicatricibus implendis idonea.                              | 465        |
| lescentes ei minimè obnoxii. ibid. cur affectio flatuosa    |                 | Millepedum laus in calculo renum. 344. calculo vesicæ. 356  |            |
| ab antiquis vocata.                                         | ibid.           | eorum præparatio. ibid. ad asthma. 247. aselli nominan-     |            |
| Melancholicorum vaporum varia symptomata.                   | 336             | tur.                                                        | ibid.      |
| curatio. ibid. an conveniat aquarum thermalium potus.       | 338             | Missio sanguinis.                                           | 117        |
| Melancholiæ symptomata scorbutis similia.                   | ibid.           | Mixtio elementorum quid sit, & quid ad eam requira-         |            |
| Melancholicus humor duplex, naturalis & præternatura-       |                 | tur.                                                        | 3          |
| lis.                                                        | 269             | Moderatio victus quæ esse debeat.                           | 91         |
| Melicratum quibus non conveniat.                            | 416             | Modus secundum unguentum parandi ad consolidandum.          | 498        |
| Melones.                                                    | 107             | Mollities cutis quando mala.                                |            |
| Membranam affectam quid indicet.                            | 50              | Mollities quid sit.                                         |            |
| Memoria quid.                                               | 23              | Morborum differentia accidentales ratione magnitudinis,     |            |
| Memoria infida pituitosis.                                  | 48              | motus, temporum, &c.                                        | 31. & 32   |
| firma Melancholicis.                                        | 49              | Intentio in morbo differentiam constituit.                  | ibid.      |
| Mensium instantium signa.                                   | 93              | Morbus quid.                                                | 26         |
| Mensium fluxus qualis esse debeat.                          | 119             | Collocatur in prædicamento qualitatis.                      | ibi 1.     |
| Mensium suppressio. 369. causæ. ibid. causarum signa. ibid. |                 | Permanentiam habet.                                         | ibid.      |
| quæ graviditas contingit, quomodo distinguatur ab ea        |                 | Actio læsa per morbum.                                      | 26         |
| quæ à causis præternaturalibus procedit. 374. multo-        |                 | Morbi communes differentia.                                 | 31         |
| rum ac gravissimorum morborum causa est. ibid. post         |                 | Morbum inter & sanitatem datur medium.                      | 25         |
| sextum mensem an sit incurabilis. ibid. cauteria tibiis     |                 | Morbi causæ, eorum differentia.                             | 39. & 40   |
| admota, an conveniant. 371. curatio. 370. præcepta          |                 | Morborum accidentalium differentiarum causæ.                | 41         |
| observanda in usu remedium.                                 | 371             | Morborum similiarum causæ.                                  | 40         |
| Mensium fluxus immodicus. 371. causæ, signa. ibid. causa-   |                 | Morbi in conjunctione quotuplices.                          | 30         |
| rum diagnosi. ibid. curatio. 372. sanguis magna copia       |                 | Morbi in situ & in connexion.                               | ibid.      |
| tractus sistit. ibid. specifica.                            | ibid.           | Morborum genera & differentia.                              | 27         |
| Mensibus ac lochiis fluentibus in præcipiti angina an       |                 | Morborum divisio à Fernelio inducta rejicitur.              | 30         |
| mittendus sanguis.                                          | 242             | Morbi longi aut brevis signa.                               | 60. & 61   |
| Mensium suppressio.                                         | 467             | Morbi essentia.                                             | 52         |
| Mensium fluxus immodicus.                                   | 523. 551. & 568 | Morbus magnus quis.                                         | 54         |
| Mensium fluxus immodicus cum principio hydropis.            | 520             | Morbi conformationes quot.                                  | 29         |
| Menstruus sanguis an ad generationem concurrat, quid sit    |                 | Morbi maligni & benigni signa.                              | 54         |
| & ejus effectus.                                            | 22              | Morbum sequitur necessario actionis læsio.                  | 26         |
| Menstrua alba, sive fluxus muliebris.                       | 374. 564        | Morbi                                                       |            |



## & Verborum.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Morbi partim à diætâ, partim à spiritu. 25. ab occulta quadam vi, & aërorum influxu. pag. 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Morbilorum à variolis differentia. 461. an sint morbi novi. ibid. eorum descriptio cur ab Hippoc. & Galen. omiffa. ibid. causa. ibid. per ebullitionem sanguinis à causa procatartica excitantur. ibid. ebullitio talis duplex. ibid. cur non generentur in matre, sicut in foetu, à sanguine menstruo. 462. eruptio cur interdum tamdiu differatur. ibid. differentia. ibid. signa diagnostica & prognostica. ibid. curatio. 463 |  |
| Morbilli. 503. & 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Morbi chronici & diuturni. 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| De morbo lento à syderatis pulmonibus orto, quo virgo nihil mali sentiens, interit mense Febr. ann. 1643. 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Morbus epidemicus coqueluche vulgo dictus. 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Modus quo morbus finiatur. 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Magnitudinis morbi. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Morbi calidi breviores. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Mors morbi. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Motus morbi. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Morsuli ad exsiccandum cerebrum. 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| lenientes in mictu sanguinis. 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Moschi usus in epilepsia puerorum. 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Motus lædi potest, illaeso sensu, & contra. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Motus depravati symptomata inter se quomodo distinguantur. 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Motus convulsivus fit ab irritatione. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Motu in omni quinque consideranda. 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Motus Lunæ in crisi observandus. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Motus immoderatus calorem dissipat. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Motus quis utilis. 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Motus quando periculosus. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Movens facultas quid. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Mucilaginosâ materia è vesica prodiens, in quo distinguatur ab ea, quæ ab aliis partibus procedit. 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Mucosa pituita in calculosis, à qua causa fiat. 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Mucosum & album in dysenteria excretum quid, & unde. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Mulieres quædam purgationes menstruas per vomitum sanguinis periodicum passæ sunt. 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Mulierum morbi. 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Mulieres an habeant semen prolificum. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Mulieres miserrimæ, multis & incomprehensibilibus fere affectionibus premuntur. 379. illis venæ sectio venarum inferiorum cur utilissima. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Musica instrumenta quando melius audiantur. 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Mutationes in morbis contingentes. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Muti cur surdi ab ortu. 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Mutus casu curatus. 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Mydriasis quid. 203. causa. ibid. curatio. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Myopia non fit à paucitate spirituum. 238. sed à crystallini situ vitiato. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Myrobalani conditæ visum clarificant. 198. ad inappetentiam. 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Myrobalanorum decoctum in dysenteria. 302. in mictu sanguinis. 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

### N

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>N</b> Api. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Narcotica medicamenta. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Narcoticorum imprudens usus lethalis. 177. cautè usurpanda. 193. 220. quando usurpanda in calido catarrho. 201. in ophthalmia. 207. in dolore dentium. 237. in cholera morbo. 287. admixta purgantibus ad singultum. 282. ad dolorem ventriculi. 289. colicum dolorem. 293. & in nephritico dolore pertinaci. 349. & 413. in febre maligna. 457. instante crisi non usurpanda. 434. in dolore aurium. 206. in hæmorrhagia. 238. in clysteribus ad dysenteriam. 303. in tenebrismo & per os sumpta & admota. 222. in fluxu hepatico. 308 |  |
| Narcotica quædam vis inest vaporibus in hysterica passione. 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Narium signa lethalia. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

*Lazari Riverii Opera.*

|                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Narium affectus. p. 223. factor. 225. causa. ibid. curatio. ibid.                                                                                                                                |  |
| Nasalia virginibus, non autem pessaria præscribenda. 377                                                                                                                                         |  |
| Nasturtium. 105                                                                                                                                                                                  |  |
| Naturalis spiritus. 13                                                                                                                                                                           |  |
| An detur. ibid.                                                                                                                                                                                  |  |
| Nautiosis venarum quid. 319                                                                                                                                                                      |  |
| Nephriticum lignum. vide Lignum nephriticum.                                                                                                                                                     |  |
| Nephritica medicamenta. 144                                                                                                                                                                      |  |
| Nephriticus dolor cur vulgo colica nephritica vocetur. 344. causa. ibid. venæ popilitis sectio aut malleoli convenit, & apertio hæmorrhoidum. 349. venarum inferiorum sectio miranda præstat. 40 |  |
| Nephriticus liquor celeberrimus. 355                                                                                                                                                             |  |
| Nephritis. 530                                                                                                                                                                                   |  |
| Nephriticum arcanum. 592                                                                                                                                                                         |  |
| Nervi cur cerebro compatiuntur. 37                                                                                                                                                               |  |
| Nervi cordis, citraris comparantur. 173                                                                                                                                                          |  |
| Nervi punctura convulsionem parit. 174                                                                                                                                                           |  |
| Nervi quintæ conjugationis rami communes linguæ & auribus. 215                                                                                                                                   |  |
| Nervosæ partes cur humoribus imbutæ in arthritide convellantur. 409                                                                                                                              |  |
| Nicotianæ tincturæ in lethargo. 166. syrupus in epilepsia. 177. tabaci fumus. 178. extractum in catharro. 191                                                                                    |  |
| cinis dentes abstergit & dealbat. 238. fumus per tubulum haustus asthmatis paroxysmum cohibet. 246                                                                                               |  |
| aqua ad deturbandos calculos. 351                                                                                                                                                                |  |
| Nivales aquæ. 113                                                                                                                                                                                |  |
| Nodosa & tophacea arthritis quomodo curanda. 413                                                                                                                                                 |  |
| Noduli anodynii ad vesicæ dolores. 356                                                                                                                                                           |  |
| Nózi qualia ulcera. 239                                                                                                                                                                          |  |
| Nuclei pinei. 107                                                                                                                                                                                |  |
| Morbi in numero. 30                                                                                                                                                                              |  |
| Nutritio quid sit, & quomodo à generatione distinguatur. 18                                                                                                                                      |  |
| Nutrix facultas in quo consistat. ibid.                                                                                                                                                          |  |
| Nutritionis perfecta munia: bene ingerere, digerere, & egerere. 291                                                                                                                              |  |
| Nux moschata. 111                                                                                                                                                                                |  |
| Nuces avellanæ. 107                                                                                                                                                                              |  |
| Juglandes. ibid.                                                                                                                                                                                 |  |
| Nux moschata cerebrum roborat. 196. & 197.                                                                                                                                                       |  |
| Nucis moschatae suffitus inflationi uteri à flatibus medetur. 390                                                                                                                                |  |
| Nux juglans & moschata conditæ, ventriculum calefaciunt & roborant. 274                                                                                                                          |  |

### O

|                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>O</b> blivio subita in acutis quid portendat. 94                                                     |  |
| Obstetrix partum, præpostero modo exeuntem, quomodo dirigere debeat. 404                                |  |
| Obstructio quid. 28                                                                                     |  |
| Obstructio unde proveniat. 41                                                                           |  |
| Obstructio ægritudinum mater, ex Avicenna. 320                                                          |  |
| Obstructionis hepatis causa & signa. ibid. maxime conferunt remedia ex tartaro, vitriolo & chalybe. 322 |  |
| Obstructiones infimi ventris inter causas catarrhi recensentur. 193                                     |  |
| Obstructæ cystidis felleæ causa. 324                                                                    |  |
| Obstructiones graves & contumaces, præcipuæ causa hydropis. 316. & 320                                  |  |
| Obstructionibus lien cur obnoxius. 332                                                                  |  |
| Obstructionum in melancholia hypochondriaca causa, 333                                                  |  |
| Obstructiones partium infimi ventris, præcipuè venarum circa uterum, chloroseos causa. 367              |  |
| Oculorum affectus. 194                                                                                  |  |
| Oculus ex quibus partibus componatur. 195                                                               |  |
| Oculi prominentes suffusioni obnoxii. 200                                                               |  |
| Oculi ablatio in suffusione. 202                                                                        |  |
| Oculos à variolarum noxa defendentia. 465                                                               |  |
| Oculi amica & adversa. 196                                                                              |  |

K k k k

Oculo



# Index Rerum

Oculo uno tantum inflammato, majores dolores cur fiant quam utroque. pag. 206.  
 Oculi cancer, ut curetur. 210  
 Oculi album inter dormiendum apparens, quid notet. 89  
 Oculi perversi, tenebrosi, aut turbidi quid significant. ibid.  
 Oculi macula. 525. & 558  
 Oculorum ulcera periculosa & difficilia curatu. 210  
 Oculorum rubor pertinax. 468  
 Oculorum inflammatio cum fordibus. 581  
 Odoramenta ad restaurandas vires. 271  
 Odoratus signa prava. 66  
 Odores pravi unde oriantur. 44  
 Odores suaves, naribus admoti, hystericos affectus excitant. 379. & graves, paroxysmum epilepticum. 381  
 Oesophagi obstructio. 528  
 Officialis actio quæ. 19  
 Olea. 158  
 Olea in dolore capitis inungenda. 194  
 Olea non miscenda clysteribus phrenitide laborantium. 183  
 Olea resolventia in arthritide. 472. ex ossibus humanis ad arthritidem, ejus præparatio. 415  
 Olea clysteribus non addenda in febre intentiore. 432  
 Olei scorpionum Matthioli laus in febre maligna. 457  
 Oleta. 105  
 Olèum ligni heraclei commendatur in epilepsia. 179  
 ad dolorem dentium. 237  
 Oleum ex linteis combustis ad albuginem. 290  
 ophthalmiam. ibid.  
 Oleum caryophyllorum, camphoræ buxi, ad dolores dentium. 237  
 Oleum vermes enecat. 310. item oleum ex ligno coryli exsiccat, oleum etiam juniperinum. ibid.  
 Oleum ex vitellis ovorum, in mortaria plumbeo agitaturn, ad uteri ulcus. 387  
 ad cicatrices variolarum implendas. 465  
 Oleum carminans & aperiens in torminibus à partu. 408  
 ejus compositio. ibid.  
 Oleum ex pedibus vituli extractus ad dolores arthriticos 413. ejus præparatio. ibid.  
 Oleum cranii humani quomodo paretur. 164  
 Olfactus quid. 23  
 Olfactu prorogata vita. 112  
 Olfactus morbi. 224. imminuti, aboliti & depravati olfactus causæ, signa. ibid.  
 Omentum in mulieribus quomodo conceptionem impediat. 41  
 Omentum castrati aut vervecis, ventri admotum, in dysenteria. 305. adversus abortum. 397  
 Omenti affectus. 343. observationes variæ de morbis omenti. ibid. per ramos splenicos cum liene communicat. ibid.  
*Ophthalmitis* ubinam sint. 20  
 Ophthalmica medicamenta. 142  
 Ophthalmia. 204. Ejus differentiæ. 205. causæ, signa, alvi fluxus salutaris. ibid. curatio. 206  
 Ophthalmiæ ab hepate. ibid. curatio. 205  
 Ophthalmiæ sola phlebotomia intra horam curatæ. ibid.  
 Ophthalmia. 522  
 Opiata. 155  
 Opiata cephalica roborans. 160. in hæmoptoe. 258. in epilepsia. 178. in mania. 187. in catharrho. 193. in gutta ferena. 198. in palpitatione cordis. 269  
 Cardiaca & restaurans. 272. ad inappetentiam à calida causa. 271. à frigida causa. ibid. ad suum morbosum. 278. roborans in vomitu. 283. in vomitu sanguinis. 285. purgans in alvi adstrictione. 297  
 roborans in lienteria. 298. in dysenteria. 304. in fluxu hepatico. 307. hepar refrigerans. 318. ad obstructions hepatis. 278. deobstruens ex chalybæ. ibid. emolliens & laxans in scirrhus lienis. 333  
 roborans in melancholia hypochondriaca. 337  
 adstringens in mictu sanguinis. 358. purgans in ulcere

re renum. p. 359. adstringens & exsicans in ulcere renum & vesicæ. ibid. Consolidans. ibid. diabete. 361. in urinæ incontinentia. 362. refrigerans in furore uterino. 378. proprietate specifica conceptionem adjuvans. 402. ad præcavendum abortum. 397. ad fluxum lochiorum immodicum. 406. ad præcavendum arthritidem. 416. roborans in febre hectica. 425. ad vires reficiendas in febribus continuis. 428. in febre synco-pali humorosa. 364. aperiens & roborans in febre quar-tana. 184. roborans & hysterica. 435  
 Opisthotonos, convulsionis species. 173  
 Opium tinnitui auris adhibendum. 219  
 Opus partium quid. 18  
 Organicæ partes quomodo à dissimilaribus differant. 165  
 causæ morborum organicorum. 41  
 à Morbo organico indicatio. 132  
 Organici morbi species. 29  
 Orgasmus materiæ morbificæ quibus signis dignoscatur 430. Et cur phlebotomia potius, quam purgatio adhibenda. ibid.  
 Oris collutiones variæ dolore dentium. 236  
 Oris tortura, convulsionis species, spasmus cynicus, & convulsio canina nominatur. 173  
 Oris ulcera. 239. curatio. ibid.  
 orthopnoea quid. 246  
 Oris inflammatio ex hydrargyrosi. 557  
 Oryza. 104  
 In osse ægrotante livor, quid notet. 87  
 Orium corpus refrigerat, & quomodo. 40  
 Ova quæ utilia. 111  
 Ovilla caro. 209  
 Ovorum vitelli in calido catarrho. 188  
 albumen commendatur in ophthalmia. 207  
 Ovum ad duritiem coctum in declinatione ophthalmiæ convenit. 209. in ulceribus corneæ. 210  
 Ovis induratis aceto, authoris alvi fluxus inveteratus curatus. 332  
 Oxycratum sanguini dissolvendo idoneum. 258. in cohibenda hæmorrhagia. 229. in vomitu sanguinis. 200  
 in cholera morbo. 286. in iliaco affectu. 295  
 ad sanguinis grumos dissolvendos. 356. sanguinis pro-fluvium sistit. 373  
 in hysterica passione. 382  
 Oxydorcica medicamenta. 142  
 Oxyssel simplex & scilliticum in obstructionibus lienis. 333  
 Oxyrrhodina in phrenitide. 183  
 cautiones usurpandæ in eorum usu. ibid.  
 an convenient in dolore capitis in febribus malignis. 462  
 Ozæna seu narium ulcus. 223  
 Ejus causæ, signa, & curatio. ibid.

## P

**P**alatum expurgando cerebro cur commodius. 167  
 Pallida bilis quid. 11  
 Pallidi virginum colores. 367  
 Palpebrarum signa lethalia. 88  
 Palpitatio cordis malè tremor cordis nominatur. 268  
 Palpitatio quid significet. 267  
 Palpitatio cordis & arteriarum ab aliarum partium pal-pitatione multum differt. ibid.  
 Palpitatio quid. ibid.  
 Ejus causæ. ibid.  
 signa, curatio. 268  
 Palpitationis exemplum in Antipatro medico. ibid.  
 Palpitatio cordis, cujus causa fuit osseum quiddam in eo deprehensum. ibid.  
 Palpitationis lethalis ab ea historia. ibid.  
 Palpitationis quæ exaudiebatur historia. 263  
 Palpitationi obnoxii ante senectutem moriuntur. 269  
 venæ sectio maximè convenit. 268  
 Idiopathica sympathicâ periculosior. ibid.  
 ab utero. 380

Palustres



## & Verborum.

|                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palumbes.                                                                                                                                                                                                                   | pag. 110   | Pathematum animi vis præcipuè iræ & tristiæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | p. 249                                                                                                          |
| Palustres aquæ.                                                                                                                                                                                                             | 113        | sanguinem furtim impellunt. 63. quantum conferant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| Pancreatis humor in scorbuticis plerumque repetitur.                                                                                                                                                                        | 340. & 413 | Pastinaca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108                                                                                                             |
| Pancreatis actio ex anatomicis recentibus.                                                                                                                                                                                  | ibid.      | Pathemata animi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114                                                                                                             |
| & affectus. ibid. scirrhus à Riolano observatur.                                                                                                                                                                            | ibid.      | Pathognomonica signa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46                                                                                                              |
| & ab autore in scorbutico, cujus historiam descripsit.                                                                                                                                                                      | 539        | Pathologia in corpore humano quid consideret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29                                                                                                              |
| Pandiculatio quid indicet?                                                                                                                                                                                                  | 40         | S. Paulus, eremita abstinentissimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97                                                                                                              |
| Panis valdè calens per medium sectus, aquâ vitæ irrotatus, & admotus, ad dolorem ischiaticum.                                                                                                                               | 418        | Pavonis stercus specificum in vertigine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180                                                                                                             |
| Panis optimus quis.                                                                                                                                                                                                         | 103        | Pectoris ardor in febribus, quibus remediis curandus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 435                                                                                                             |
| Papaver refrigerat.                                                                                                                                                                                                         | 58         | Pedum refrigeratio sympathicè per nervos cerebro communicatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 193                                                                                                             |
| Papaveris rhœados aqua maximè commendatur in rheumatismo.                                                                                                                                                                   | 420        | Pedum & manuum refrigerationes, quomodo febrium incendium temperet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 425                                                                                                             |
| Paracentesis an celebranda in hydrope.                                                                                                                                                                                      | 329        | Pelles ventriculæ calefacientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 266                                                                                                             |
| Παράλυσις quid.                                                                                                                                                                                                             | 217        | Pellis recens mactatæ ovis, vino meraciore candido irrotata, & ventri calidè admotæ, in hydrope uteri.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 390                                                                                                             |
| Paralyfis, chronicus morbus.                                                                                                                                                                                                | 56         | Pellis vervecina calens ad convulsionem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175                                                                                                             |
| Paralyfis quid, ejus differentia.                                                                                                                                                                                           | 169        | ad puerperarum tormina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 407                                                                                                             |
| non tantum ab humore pituitoso, sed etiam bilioso & melancholico generatur. 170. ex marore. ibid. scorbutica. ibid. causæ omnes.                                                                                            | ibid.      | Peracutus morbus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32                                                                                                              |
| Paralytica partis dignotio ex anatome desumitur.                                                                                                                                                                            | 171        | Peragrationis mensis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33                                                                                                              |
| curatu cur difficilis. ibid. tremor superveniens cur salutaris. ibid. crurum & pedum facilius curatio, quam partium superiorum.                                                                                             | ibid.      | Perdices.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120                                                                                                             |
| Paralyfi febris valida superveniens bona, sicut & diarrhœa.                                                                                                                                                                 | 171        | Pericardium sæpe palpitatiois causas continet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 267                                                                                                             |
| an conveniat phlebotomia.                                                                                                                                                                                                   | ibid.      | Periculosus morbus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32                                                                                                              |
| Paralytica in parte sudores quomodo eliciendi.                                                                                                                                                                              | 172        | Peripneumonia, morbus Idiopathicus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31                                                                                                              |
| Paralyfi biliosæ quæ institui debeat curatio.                                                                                                                                                                               | ibid.      | Peripneumonia quomodo notetur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54                                                                                                              |
| Paralyfis febribus tertianis nothis succedens.                                                                                                                                                                              | 170        | Peripneumonia frequentius fit à pituita quàm à bile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 252                                                                                                             |
| Paralyticis frictions & cucurbitulæ applicatæ, utiles.                                                                                                                                                                      | 672        | causæ internæ & externæ. ibid. signa. ibid. cur pleuritide periculosior. 253. curatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.                                                                                                           |
| Paralytica partes pellibus muniantur.                                                                                                                                                                                       | ibid.      | Peripneumonice muliebri unde sanguis mittendus, si menstrua profluant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.                                                                                                           |
| Paralyfis.                                                                                                                                                                                                                  | 537        | Peripneumonice præcipua causa aër frigidus & aquilinus, austrino & tepido subito succedens.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 252                                                                                                             |
| Paralyfis, & convulsio, affectio hypochondriaca.                                                                                                                                                                            | 571        | Peripneumonice dolor minor sentitur quam pleuritidis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 253                                                                                                             |
| Paralyfis spuria.                                                                                                                                                                                                           | 513        | Permanentia morbi quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27                                                                                                              |
| Paralyfis linguæ.                                                                                                                                                                                                           | 585        | Perpiratione insensibili quàm copiosa fiat evacuatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 193                                                                                                             |
| Paraphrenitis quid differat à phrenitide.                                                                                                                                                                                   | 181        | Pessaria in mensium suppressione. 372. fluxu mensium immodico. 374. detergens in fluxu muliebri. 377. in furore uterino. 378. purgans in hysterica passione. 383. in hydrope uteri. 390. ad uteri procidentiam. 394. uteri inflammatione. 386. abscessus ruptionem procurans. 385. & 386. pessaria contra sterilitatem à frigida causa. 398. causa foetum mortuum excludens. | 404                                                                                                             |
| Parenchymatum affectus, quo signo indicentur.                                                                                                                                                                               | 51         | Pestilens morbus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32                                                                                                              |
| Parentes ad temperamentum multum influunt in biliosis.                                                                                                                                                                      | 48         | Pestilens febris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 445                                                                                                             |
| in pituitosis. 47. in sanguineis.                                                                                                                                                                                           | 48         | ut plurimum est popularis & epidemica, interdum sporadica contagiosa, ibid. quid à peste differat. ibid. differentia. ibid. causæ internæ. 446. externæ. ibid. signa.                                                                                                                                                                                                        | 449                                                                                                             |
| Parietariæ succus in expressione urinæ commendatur.                                                                                                                                                                         | 364        | Pestis dari potest sine febre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 445                                                                                                             |
| Paronychia.                                                                                                                                                                                                                 | 546        | Pestifera labe cur certa loca non tenentur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 447                                                                                                             |
| Parotides in febribus malignitatem indicat.                                                                                                                                                                                 | 56         | Pestilentium morborum quomodo causæ sint prava alimenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 438                                                                                                             |
| Parotides quæ periculosa.                                                                                                                                                                                                   | 86         | Pestis cur post famem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 449                                                                                                             |
| Parotides in febribus malignis è purpuratis quando lethales.                                                                                                                                                                | 452        | Pestilentium febrium causæ externæ sunt res non naturales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 446                                                                                                             |
| Earum curatio.                                                                                                                                                                                                              | 289        | Pestilentes febres animi pathemata quomodo excitent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 447. futuræ signa. ibid. duæ frequentiores causæ, molestissima animi pathemata, & immodicus veneris usus. ibid. |
| Paroxysmus epilepticus aliquando perimit. 178. curatio.                                                                                                                                                                     | ibid.      | Pestilentium febrium calor ad tactum mitis & blandus ut vix ægrotantes febrile videantur.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450                                                                                                             |
| Paroxysmum hystericum solventia.                                                                                                                                                                                            | 382        | præservatio. 452. curatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid.                                                                                                           |
| Paroxysmum in quartana cohibentia.                                                                                                                                                                                          | 443        | Pestilenti aëris constitutione existente, quomodo mittendus sanguis ad præservationem.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.                                                                                                           |
| Pars inandans & recipiens considerandæ in catharro.                                                                                                                                                                         | 189        | Pestilenti febri vihum aliquando proficuum. ibid. venæ sectio. 452. quo tempore febris. ibid. ex quibus venis. 454. an purgatio conveniat. 455. alexipharmaca varia.                                                                                                                                                                                                         | 454                                                                                                             |
| Partes læsæ, quæ lethum importent.                                                                                                                                                                                          | 64         | Pestilentes febres variis exulcerationibus curatæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid.                                                                                                           |
| Partis corporis definitio.                                                                                                                                                                                                  | ibid.      | Pestilens febris in cadaveribus post mortem quomodo dignoscatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| Partium differentia.                                                                                                                                                                                                        | 16         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| Partus difficilis.                                                                                                                                                                                                          | 403        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| causæ, signa. ibid. curatio. 404. quomodo fiat obstetricis errore. 403. naturalis juxta viginti quatuor horas perfici debet. ibid. quando conveniat apertio venarum inferiorum. 404. specifica proprietate partum juvantia. | ibid.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| Partus quid, & quænam ejus tempora.                                                                                                                                                                                         | 24         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| Partus difficilis.                                                                                                                                                                                                          | 492        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| Parulis cancrosa.                                                                                                                                                                                                           | 575        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| Passiones biliosorum.                                                                                                                                                                                                       | 47         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| Pituitosorum.                                                                                                                                                                                                               | 48         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| Pasta reg. tis ad hæcticos instaurandos.                                                                                                                                                                                    | 424        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| Pastilli singultum.                                                                                                                                                                                                         | 282        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |



# Index Rerum

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| gnoscat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pag. 450      | Piss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pag. 104                  |
| Pestis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 554           | Pitces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111                       |
| alia Pestis curatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 574           | Pituita alimentaria quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                         |
| Petroselinum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106           | quæ alimenta, quæ aëras, & quod temperamentum eam generet. ibid. quos effectus habeat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                         |
| Pharynx quomodo afficitur in angina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240           | Pituita excrementitia quæ, & ejus differentiæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173                       |
| Phlebotomia in omni sanguinis fluxu est remedium revulsorium. 313. in phrenitide cur amplo foramine fieri non debeat. 183. liberalissima in ophthalmia facienda. 206. an dysenteria conveniat. 312. an conveniat hydropi. 329. scirrhus lienis. 333. in omnium partium infra renes positarum affectibus à venis inferioribus ad derivationem celebrandum. 366. ejus utilitates in febribus continuis. 431. usque ad deliquium in synocha à putrida causa, an facienda. ibid. iterandæ indicationes in febribus continuis. ibid. phlyctænæ.                                                          | 381           | Pituita præternaturalis signa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57                        |
| Phlegmagoga medicamenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 138           | Pituitam alterantia medicamenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 136                       |
| Phlegmonem indicat rubor intensus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54            | Pituitosis unde oriantur insomnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22                        |
| de Phlegmone cerebri, partem posticam obsidente, & symptomatibus inde consequentibus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 565           | Pituitosi humoris signa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47                        |
| Phrenitis quando salutaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64            | Pituitæ metropolis cerebrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160                       |
| Phrenitidos acutæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56            | Pituitæ exuberantis signa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180                       |
| Phrenitidis respiratio magna & rara. 183. in ea cur interdum urina supprimatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184           | Pituita quomodo attrahatur à capite & pulmone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 261                       |
| Phrenitidi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 578           | Pituita putris quomodo distinguatur a pure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.                     |
| Θρίσις & πρίσις qui dicantur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260           | Pituita acris & salsa, catarrhi ferini causa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ibid.                     |
| Phthisis propriè quid. 359. Ejus causæ. ibid. signa. 261. curatio. 262. est morbus contagiosus. ibid. imminents signa & causæ. 260. & incipientis signa. ibid. & sequentia Hipp. 261. confirmata signa & causæ. ibid. curatio prophylactica. 262. balneum aquæ tepidæ quando conveniat. 264. qualis aër conveniat.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibid.         | Pituita salsa siticulosos, acida famelicos dulcis somnolentos in insipida appetentes facit.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400                       |
| Phthisici conserva rosarum & saccharo rosato curati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 264           | Pituitam producentia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160                       |
| Phthisis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 509. 543. 552 | Pituitæ an conveniat venæ sectio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162                       |
| Phthisis incipiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 473. 493      | purgantia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid.                     |
| Physiologia corporis humani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2             | Pituita paralyfin efficiens, in quo differat ab ea, quæ convulsionem facit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 173                       |
| Pica seu <i>ultra</i> quid. 276. ejus causæ. ibid. quæ mala sequantur. 277. virginibus & gravidis familiaris. 276. in mulieribus hysteriis à certa malignitatis specie dependet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 552           | Plantaginis succo nihil præstantius ad quodlibet sanguinis profluvium cohibendum. 285. in mictu sanguinis exhibendus. 374. fluxu mensium immodicum. 358. commendatur in febre tertiana contumaci.                                                                                                                                                                                         | 439                       |
| Pica & chlorosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid.         | Plethora vena sanguineorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49                        |
| Pichrocolis <i>aria</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 282           | Plethora quoduplex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128                       |
| Pili an sint pars corporis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16            | Pleura quare frequentius inflammatione quàm aliæ membranæ afficiatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 248                       |
| Pilulæ. 155. Pilul. antivener. 592. ad morbos desperatos ibid. Catholic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.         | Pleuritis morbus idiopathicus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31                        |
| Pilulæ pituitam expurgantes. 162. 173. cerebrum roborantes. 167. in catarrho falso. 200. ad dolorem capitis. 202. ad phthisin. 264. purgantes in gutta ferent. 197. usuales. ibid. resolventes & discutientes in linguæ paralyfi. 223. sublinguales ad hæmoptoën. 258. ad singultum à causa frigida. 283. à causa calida. ibid. ad inappetentiam à frigida causa. 316. in colica pituitosa. 292. de bdellio celebratæ in fluxu hæmorrhoidum immodico. 311. usuales ad obstructions hepatis. 322. ex chalybe. 254. in scirrhus hepatis. 316. purgantes & deobstruentes. 250. in obstructione lienis. | 253           | Pleuritidis signa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44                        |
| in melancholia hypochondriaca. 337. consolidantes in ulcere renum & vesicæ. ibid. in calculo renum efficacissimæ. ibid. purgantes in fluore muliebri. 390. in mentium suppressione. 371. 372. hysterica. 283. purgantes. 367. in ulcere uteri. ibid. in hydrope uteri. 391. in gravidis est suspectus usus.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 357           | Color plumbeus, alique quid significet in corpore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51                        |
| purgantes in arthritide. 357. ad aperiendas obstructions, & hepar roborandum in febre tertiana intermittente. 438. usuales ad diurniorem febrem quartanam. 442. sublinguales ad linguæ siccitatem & nigredinem in febre maligna, 479. in tumore molli & laxo linguæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232           | Pleuritidis. 248. differentiæ. ibid. causæ. ibid. 450. humida & sicca. ibid. peripneumonia in quo differat.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148                       |
| Pilularum de cynoglossio usus in clysteribus ad dysenteriam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134           | Pleuritidis materia per quas vias à pleura ad pulmones transeat. 249. spuria quomodo distinguatur à legitima, diarrhœa superveniens quando mala.                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.                     |
| Pimpinella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105           | Pleuritis densa & exercitationi debito corpore ut plurimum lethalis. 249. signa funesta & salutaria. ibid. & 250. non semper convenit usque ad mutationem coloris. ibid. narcotica an conveniat. 251. specifica sunt rasura dentis apris, cinis priapi tauri, vel cervi, flores papaveris rubri, corallus præparatus. ibid. & diarrhœa superveniens quando curanda. 252. purgatio quando. | 251                       |
| Pingues quomodo purgandi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150           | Pleuritidi epidemica sudorifica & diaphoretica conveniunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252                       |
| Pinguedo anguillæ surditati confert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117           | Pleuritis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 483. 506. 509. 524. & 552 |
| Piper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116           | Pleuritis & synochus febris cum putredine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 439                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Pleuritis maligna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 486                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Pleuritis in empyema degenerans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 488                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Pleuritis spuria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 539                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Pleuritico octava die missus sanguis apud Hippocratem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Pleuritidis ab hepatide signa distinctiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 319                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Plumbi lamina perforata, supra renes gestata, in calculo renum. 351. in mictu sanguinis. 358. in furore uterino.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 378                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Podagra quæ curabilis. 411. an semper podagrici morbi quadraginta diebus terminentur. ibid. an vomitus conveniat. 412. dysenteria superveniens cur bona.                                                                                                                                                                                                                                  | 302                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Pœoniæ semen radix ad epilepsiam specifica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 178                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Polypus quid. 233. in quo differat à sarcomate, ibid. causa ibid. curatio. ibid. si medicamenti non auferatur, chirurgiâ curari debet.                                                                                                                                                                                                                                                    | 234                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Polypus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 588                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Poma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Porcellorum caro quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Porracea bilis quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Porracea bilis præternaturalis, & unde procreetur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Porrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Portulaca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Portulaca pituitam generat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Potio purgans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 252                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Potio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |



## & Verborum.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Potio corroborans.                                                                                                                                                                                                                                                              | pag. 133 | Pulsus cordis & arteriarum quid sit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pag. 21 |
| Potio vulneraria in empyemate.                                                                                                                                                                                                                                                  | 254      | Ex quibus partibus componatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibid.   |
| Potiones variae conceptionem adjuvantes. 398. partum accelerantes. 404. aperientes ad solvendam suppressionem menstruum.                                                                                                                                                        | 406      | Quid ad pulsum requiratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibid.   |
| Potio purgans in reumatismo. 420. purgans primam corporis regionem in febribus putridis continuis.                                                                                                                                                                              | 431      | Pulsus magnus & frequens in biliosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43      |
| purgans bilem in ventriculo. 434. cordialis exhibenda in febre syncopali minuta. ibid. in syncopali humorosa. 435. purgans in febre. 441. cardiaca in febre maligna. 457. 458. purgans in declinatione febris malignae.                                                         | 458      | Pulsus quando malum signum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41      |
| Potus.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111      | Pulsatio dorsi & hypochondriorum ab utero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 380     |
| Potus astringens in fluxu mensium immodico.                                                                                                                                                                                                                                     | 374      | in melancholia hypochondriaca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 336     |
| qualis in continuis usurpandus. 429. in tertiana notha.                                                                                                                                                                                                                         | 437      | Pulsus ferratilis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250     |
| Potus febricitantibus quando concedendus. 434. actu frigidus pectori nocet.                                                                                                                                                                                                     | 251      | durus in phrenitide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.   |
| Praegnantium morbi. 399. cur periculosi. ibid. praecipue primis & ultimis gestationis temporibus. ibid. diæta ibid. an mittendus sanguis. ibid. tutius purgantur quam tempore Hippocr. 400. Eis non ita convenit pilularum, clysterum diureticorum & menses moventium usus. ib. |          | Pulsus scorbuticum saepe medicis imponit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 340     |
| Priapismus quid.                                                                                                                                                                                                                                                                | 173      | Pulsus in principio febris malignae febris connaturalis & sanorum pulsui simillimus. 450. cur valde periculosus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Procidencia uteri, vide uteri procidentia.                                                                                                                                                                                                                                      |          | 451. intermittens an semper lethalis in juvene, febre pestilenti laborante. ibid. magnus languidus, & mollis in peripneumonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 353     |
| Prognosis lethalis.                                                                                                                                                                                                                                                             | 557      | Pulvis digestivus utilis in cerebri frigida humida intemperie. 164. 167. 168. cerebrum roborans. 178. granorum actus in epilepsia ab utero. 178. de guttera in epilepsia puerorum, ejus descriptio. 179. capiti inspergendus in dolore capitis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202     |
| Prognosis ex anni constitutione.                                                                                                                                                                                                                                                | 560      | Pulv. aperiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 592     |
| Prognosis in febre continua.                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.    | cephalicus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid.   |
| Pruritus à variolis excitatus quomodo curandus.                                                                                                                                                                                                                                 | 465      | diaphoreticus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibid.   |
| Ptisana pro potu in phrenitide.                                                                                                                                                                                                                                                 | 184      | Pulverum usus in amaurosi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibid.   |
| Ptisana, & potus varii gustui gratissimi. 317. in calculo renum.                                                                                                                                                                                                                | 349      | ad sputum sanguinis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 257     |
| Ptisana ex fenna cum sale tartari potentius purgat quam ptisana vulgaris.                                                                                                                                                                                                       | 322      | ad phthisin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 263     |
| Pueri quomodo purgandi.                                                                                                                                                                                                                                                         | 129      | Pulvis dulcis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 273     |
| Pueritiae temperamentum.                                                                                                                                                                                                                                                        | 6        | digestivus. ibid. ad singultum à causa frigida. 281. ad vomitum. 283. ad ventriculi ulcus. 201. ad vomitum purgantes & roborantes. 383. in vermium curatione. 310. ex chalybe deobstruens. 322. hidragogus. 331. purgans in melancholia hypochondriaca. 337. calculum imminuentes. 349. purgantes & praeservantes à calculo. 350. imminuentes calculum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ibid.   |
| in puerpera febricitate quandonam computatio dierum decretoriorum fieri soleat.                                                                                                                                                                                                 | 32       | Pulveres in dysenteria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 304     |
| Pueri comate affecti, sale vitrioli vomitivo liberantur.                                                                                                                                                                                                                        | 164      | fluxu hepatico. 307. sanguinis fluxum cohibentes. 358. adstringentes in diabete. 362. ad menses suppressos. 371. ad fluxum immodicum. 377. hysterici. 383. ulcus uteri exsiccantes. 384. sarcotici. 387. 394. adstringens ad uteri procidentiam. 394. glutinans & leviter adstringens. ibid. conceptionem adjuvans. 397. ad praecavendum abortum. 402. foetum mortuum excludentes. 403. ad fluxum lochiorum immodicum. 404. in torminibus à partu. 406. purgantes in arthritide. 417. permiscendus ptisanæ pro potu ordinario. 429. adstringens. 439. purgans in febre quartana. 453. alexipharmacus. 443. alexipharmaci varii. ibid. ad vires reficiendas in febribus continuis. 432. epilepticus de gutteta. 178. 179. ad convulsiones in febribus continuis. | 434     |
| Pueris achores ulcera, & aquosi humoris per aures effluxus contingunt.                                                                                                                                                                                                          | 307      | Punctura quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31      |
| Pueri lactantes, quibus carnes exhibentur, cur à lumbricis maxime infestentur.                                                                                                                                                                                                  | 309      | Punctura apum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 514     |
| Puerorum lentæ febris ab obstructione rhabarbarum praestantissimum.                                                                                                                                                                                                             | 291      | Punctura nervi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 564     |
| Pueris qua ætate in variolis mittatur sanguis.                                                                                                                                                                                                                                  | 463      | Pupillæ dilatatio seu mydriasis. 202. ejus causa. ibid. angustia. ibid. causa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibid.   |
| Pueris inappetentia gravior, quam in alia ætate.                                                                                                                                                                                                                                | 272      | Purgatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129     |
| Puerperarum morbi.                                                                                                                                                                                                                                                              | 408      | Purgationes variae ad dysenteriam. 302. ad mictum sanguinis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 357     |
| febres unde oriantur. ibid. in morbis critici dies an à partu computandi. ibid. febre & morbo acutis laborantibus an mitti sanguis ex partibus superioribus, cautiones adhibendæ. 409. in morbis acutis quando exhibenda purgatio. ibid. gemmas deponere debent.                | 404      | Purgatio quænam sit minorativa & quæ eradicativa. 431 in turgentia materiae cur in praxi ordinaria non observetur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.   |
| Pulli columbini per medium secti, cordi admoventur in febribus continuis.                                                                                                                                                                                                       | 433      | Purgantia an possint tuto exhiberi in principio accessionis febris quartanæ. 442. ad cohibendum febris quartanæ paroxysmum una hora ante illius invasionem leviora purgantia exhibentur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 443     |
| Pulmo cur facile capiti compatiatur.                                                                                                                                                                                                                                            | 32       | Purgatio in gravidis cur hodie frequentior & tutior. 400 & praecipue mediis gestationis mensibus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.   |
| Pulmo cur fluxionem facile recipiat. 189. in angina saepe afficitur. 241. in pleuritide.                                                                                                                                                                                        | 249      | Purgatio in canicula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 518     |
| Pulmonis affectus, tum in substantia, tum in vasis.                                                                                                                                                                                                                             | 246      | Ad puris attractionem ex abscessu pectoris, & aliis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 559     |
| Pulmonis hydrops ab Hipp. graphicè descriptus. 575. per pulmonein transsumpta materia per quas vias expurgetur.                                                                                                                                                                 | 250      | Purpuratæ febres seu petechiales quæ dicantur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 446     |
| Pulmonum excrecentia.                                                                                                                                                                                                                                                           | 259      | Purplearum macularum in febre pestilenti differentia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid.   |
| Pulmones ad tabem proclives. ibid. vitiosa constitutio. ib. tuberculum.                                                                                                                                                                                                         | ibid.    | ab exanthematis. ibid. & 450. malignæ in quo differant ab aliis. ibid. aliquando criticæ, aliquando symptomaticæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.   |
| Pulmones vervecini calentes applicati in convulsione. 175 in phrenitide. 184. in abscessu cerebri declinatione. 185. in mania. 189. in dolore capitis. 195. in fluxu hæmorrhoidum podici admoti.                                                                                | 313      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Pulmo hædinus calens, admotus in dolore hæmorrhoidum.                                                                                                                                                                                                                           | 316      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Pulmonem defendentia à variolarum noxa.                                                                                                                                                                                                                                         | 464      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Pulsatorius dolor quid notet?                                                                                                                                                                                                                                                   | 51       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |



# Index Rerum

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| frequentissimè in lumbis, cervice & pectore apparent.<br>p.450. si retrocedant postquam apparuerunt, pessimum.<br>453. cur in pectore & dorso præcipuè appareant. 461.<br>in quo differunt à variolis. <i>ibid.</i> | unde nomen sumpsit. <i>pag.</i> 233<br>ad quod genus tumorum referri debeat. <i>ibid.</i><br>rarò sine operatione chirurgica curatur. <i>ibid.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Purpureis maculis apparentibus an celebranda venæ se-<br>ctio. 453                                                                                                                                                  | Rapæ. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pustulæ variæ in febre maligna. 49                                                                                                                                                                                  | Raparum usus frequens oculos acutiores reddit. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pustulæ quæ periculosa. 137                                                                                                                                                                                         | jusculum quartanæ utilissimum. 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pustulæ faciei. 588                                                                                                                                                                                                 | Raphanus. <i>ibid.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Præparatio humorum. 132                                                                                                                                                                                             | Raphani syrupus ad ischuriam & stranguriam. 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Principes partes organicae quæ. 17                                                                                                                                                                                  | Raritas, qualitas elementorum. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Principium morbi quid. 31                                                                                                                                                                                           | Raritas calorem dissipat. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Procatartica causa. 40                                                                                                                                                                                              | Ratiocinatio quid. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protopathicus morbus. 32                                                                                                                                                                                            | Ratiocinatio an lædi possit, non læsa imaginatione. 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ad procreationem hominis utrum sexus uterque requi-<br>ratur. 23                                                                                                                                                    | Raucedo. 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Provocatorii dies. 36                                                                                                                                                                                               | Raucedinis curatio. <i>ibid.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pruna. 107                                                                                                                                                                                                          | Rebus creatis an insit malum. 447. 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Purulenta materia in abscessibus mesenterii per quas vias<br>excernatur. 344                                                                                                                                        | Recidivæ futuræ signa. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pus à renibus procedens cur melius coctum quam quod<br>à vesica. 358                                                                                                                                                | Recidivæ in febribus continuis præcautio. 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pus in pyricorum quæ expurgatur. 274                                                                                                                                                                                | Recocta. 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pustularum pestilentium ore apparentium noxæ. 451                                                                                                                                                                   | Refrigerantia & repellentia medicamenta. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Putealis aqua. 113                                                                                                                                                                                                  | Refrigerantia topica in phrenitide caute adhibenda. 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Putredo vulgaris differt à venenata qualitate febris pesti-<br>lantis. 447                                                                                                                                          | Regio frigida & humida, pituitosi humoris ferax. 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Putredo quid sit. 41                                                                                                                                                                                                | Regius morbus quando malus. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pyra. 107                                                                                                                                                                                                           | Regius morbus: vide icterus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                     | Remediorum inventio. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                     | Reminiscencia quid. 21. & 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                     | Renum ardoris medicamenta. 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                     | Renum affectus. 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                     | connexio cum ventriculo. 347. caliditas temperanda<br>lamina plumbea. 352. inflammatio. 354. causæ. 355.<br>signa. <i>ibid.</i> curatio. <i>ibid.</i> inflammatio renum quomodo<br>ab inflammatione coli intestini distinguatur. <i>ibid.</i> cur<br>periculosa, cur in principio non conveniat purgatio. 256<br>topica quæ admovenda. <i>ib.</i> suppurationis. <i>ibid.</i><br>scirrhus ut curandus. <i>ibid.</i> |
|                                                                                                                                                                                                                     | Renum ulcus. 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | curatio. 359. ulceri vomitus convenit. <i>ibid.</i> ulceri dolo-<br>res supervenientibus quibus anodynus mitigandi. 360                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                     | Renes purulenti. 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                     | Rheumatica affectio. 479. 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                     | Rheumatismus. 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                     | Repellentia medicamenta: vide Refrigerantia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                     | Repellentia in ischiadico dolore cur non convenient. 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                     | Repletionis signa. 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                     | Repletio & inanitio convulsionis causæ. 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                     | Resipiscencia subitanea in phrenitide lethalis. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     | Resolventia medicamenta. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                     | Resolventia exsiccant. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                     | Respirationis læsæ causæ. 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                     | cur cesset in mulieribus hysteris. 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                     | Respiratione deficiente an vita consistere possit. <i>ibid.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                     | Respirandi difficultas in virginibus chlorosi laborantibus. 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                     | Respiratio quando malum signum. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     | Respiratio quid sit, quot partes, ad efficiendam quæ<br>sint necessaria. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                     | Respiratio rara quid portendat. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     | Restaurans vulgo dictum, & restaurans destillarum. 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                     | Restaurantia alimenta pro hæcticis. 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                     | Retentio humorum humectat. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                     | Retentio unde juvetur. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                     | Retentrix facultas quænam sit. <i>ibid.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                     | Retentiones & evacuationes nimia, quomodo sint causæ<br>pestilentium morborum. 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     | Revulsio. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                     | Revulsoria phlebotomia, quando iteranda. 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                     | Rhabbarbari usus in vomitu sanguinis. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                     | in dysenteria. 302. vermium curatione. 310. in hydrope.<br>328. torrefactum utrum in dysenteria conveniat. 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                     | in valde biliosis febribus suspectum. 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                     | juvat maximè in febre lenta ab obstructione. <i>ibid.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                     | Rhabarb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Q

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Quadragesimus dies criticus. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Qualitates Elementorum primæ & secundæ. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Mixtiones Elementorum. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Qualitatis mutatae differentiæ. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Causæ qualitatis mutatae. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Qualitatum primarum excessus corruptionis causa in<br>aëre. 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Quantitas victus in morbis. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Quartanæ in continuas conversæ lethales. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Quartana febris epilepsiam aliquando solvit. 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| mania solvit. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Quartanæ febris essentia & causæ. 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| continua signa diagnostica. 428. intermittens. 440. dif-<br>ferentiæ signa. <i>ibid.</i> spuria periculosior legitima. <i>ibid.</i><br>senibus ut plurimum lethalis. <i>ibid.</i> intermittens in con-<br>tinuam mutata cur periculosa. <i>ibid.</i> quæ dysenteria salu-<br>taris. <i>ibid.</i> cur hæmorrhagia à naribus pessima. <i>ibid.</i> le-<br>gitimæ curatio. <i>ibid.</i> & seq. victus ratio. <i>ibid.</i> raparum<br>jusculum utilissimum. 441. cur blandis & benigniori-<br>bus medicamentis tractanda. <i>ibid.</i> an conveniens venæ<br>sectio. <i>ibid.</i> in plenilunio celebrata maximè prodest. <i>ibid.</i><br>apertio salvatellæ an aliquid conferat ad curationem<br>quartanæ. <i>ibid.</i> cor hæmorrhoidum fluxus salutaris. <i>ibid.</i><br>curandæ discutientia & diaphoretica maximè conve-<br>niunt. 443. theriaca quando exhibenda. <i>ibid.</i> specifica<br><i>ibid.</i> curatio. 535. 550. & passim in Obs. |  |
| Quartanæ spuria curatio. 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| balneum aquæ tepida maximè proficuum. 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| parcè bibendum. 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Quartus dies index est septimi. 36. & 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Quotidianæ continuæ essentia, & causæ. 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| signa diagnostica. 428. intermittens. 439. causæ. <i>ibid.</i><br>signa. <i>ibid.</i> curatio. <i>ibid.</i> diurna cur nocturna periculo-<br>sior. <i>ibid.</i> morbi supervenientes. <i>ibid.</i> curatio peculia-<br>rem ventriculi curam expostulat. <i>ibid.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

## R

|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| Radices. 105                                                       |  |
| Ramenta egesta quid notent. 54                                     |  |
| Ranarum combustarum suffitus ad fluxum mensium im-<br>modicum. 374 |  |
| Ranula Græcis Βάτραχος quid. 232                                   |  |



## & Verborum.

|                                                          |           |                                                            |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Rhabbari bochetum.                                       | p. g. 442 | Saliva copiosa serum copiosum indicat.                     | pag. 51      |
| an conveniat in febrium continuarum principio.           | 431       | Salsa pituita quid.                                        | 13           |
| Rhagades in quo differant ab hæmorrhoidibus.             | 314       | Salvatella an tundenda in lienis inflammatione.            | 333. in      |
| Rhamni cathartici syrupus ad hydropem.                   | 329       | quartana legitima.                                         | 440          |
| Rheumatismus in quo differat ab arthritide.              | 418       | Salvatellæ apertio in quartana.                            | 558          |
| à catarrho. ibid. ad Hippocrat. & Galen. delineatus.     | 419       | Salutaris morbus quis.                                     | 26           |
| causa immediata ferotus humor. ibid. ejus origo. ibid.   |           | Salutaris & lethalis morbi signa.                          | 61           |
| an fiat à flatibus. ibid. signa.                         | 420       | Sanguis quid & quotuplex.                                  | 8            |
| Rheumatismi dolores in quo differant à doloribus vene-   |           | An detur sanguis propriè dictus.                           | ibid.        |
| reis.                                                    | ibid.     | Sanguis meiando excretus quid notet.                       | 51           |
| Interdum longitudine sua maximè molestus. ibid. san-     |           | Sanguis menstruus quid sit, & an ad generationem fœtus     |              |
| guinis missio prodest sæpiùs iterata. ibid. cur vires in |           | concurrat.                                                 | 241          |
| frequenti venæ sectione non deiciantur.                  | ibid.     | quo tempore excernatur.                                    | ibid.        |
| Rhyadis curatio.                                         | 213       | quo tempore desinat, & cur.                                | ibid.        |
| Rigor creber quid notet.                                 | 54        | Sanguis per os rejectus quid notet.                        | 51           |
| Rigor quando periculosus.                                | 70        | Sanguinis missio.                                          | 127          |
| Rigores frequentes sine typo in phthisicis unde.         | 161       | Sanguis an cibus utilis.                                   | 150          |
| Rilus sardonius convulsionis species.                    | 173       | Sanguinem sistentia medicamenta.                           | ibid.        |
| Roborantia partes principes in rheumatismo.              | 421       | Sanguinei quid somnient.                                   | 22           |
| Ros humor secundarius.                                   | 10        | Sanguineorum signa.                                        | 48           |
| Rosarum conservæ usus in phthisi.                        | 263       | Sanguineorum natura.                                       | ibid.        |
| tinctura præstantissima in fluxu hepatico.               | 308       | Melancholicorum.                                           | ibid.        |
| ad hepar refrigerandum.                                  | 317       | Sanguinis redundantis signa.                               | 219          |
| quomodo paranda.                                         | 429       | Sanguinis missio frequenter usurpata in manis salutaris.   | 186          |
| Rosarum tinctura, & ejus præparatio in rheumatismo.      | 421       | Sanguis columbinus ad suffusionem.                         | 201          |
| Rubor oculorum quando malus.                             | 74        | in oculi vulneribus & contusionibus.                       | 202          |
| Rubor in vultu ægrotantis, morborum acutum indicat.      | 87        | sugillatione.                                              | 205          |
| Rubor intensus quando malus.                             | ibid.     | Sanguis guttatim effluens, cur purus appareat.             | 228          |
| Rubor nimius in genis quid notet.                        | 52        | stillæ è naribus cur malæ. ibid. non intempestivè sisten-  |              |
| Ruboris genarum in peripneumonia causæ.                  | 253       | duus in hæmorrhagia.                                       | 229          |
| Rubra bilis Galeni quid.                                 | 11        | Sanguinem fluentem cohibentia.                             | ibid. & 317. |
| Ructus acidus Melancholicis familiaris.                  | 49        | per nares effluens in sartagine fixus & specificus ad      |              |
| Ructus nidorosus quid indicet.                           | 54        | sistendam hæmorrhagiam.                                    | ibid.        |
| Ructus quando boni ominis.                               | 74        | Sanguinis fluxum cohibet chalcitis usta, pulvis gummi      |              |
| Ructus acidus.                                           | 592       | Arabici, Galeni emplastrum, gypsum albumine ovi ex-        |              |
| Ruptio quid sit.                                         | 31        | ceptum.                                                    | 238          |
| Ruptura quid.                                            | ibid.     | sanguis spumofus an tantum à pulmone.                      | 256          |
|                                                          |           | raro concrevit in venis.                                   | 266          |
|                                                          |           | illius concretionis causæ.                                 | ibid.        |
|                                                          |           | Sanguis concretus oxycrato exhibito dissolvendus.          | 285          |
|                                                          |           | Sanguinis grumus ischuriam pariens, quomodo dissol-        |              |
|                                                          |           | vendus.                                                    | 364          |
|                                                          |           | Sanguis fervide injectus in dysenteria.                    | 306          |
|                                                          |           | In fluxu hæmorrhoidum immodico.                            | 312          |
|                                                          |           | Sanguinis missio obstructions à bile solvit.               | 316          |
|                                                          |           | Sanguis quomodo excitetur à calculo in renibus.            | 347          |
|                                                          |           | mensium suppressione interdum per pulmonem perio-          |              |
|                                                          |           | dicè rejicitur, aut per alias vias.                        | 369          |
|                                                          |           | Sanguinis penuria non à quavis extenuatione indicatur.     |              |
|                                                          |           | 370. Galen. experimento comprobatur.                       | ibid.        |
|                                                          |           | Sanguis menstruus retentus putrescit.                      | 378          |
|                                                          |           | Sanguis prodiens ex cancro ulcerato, quomodo cohiben-      |              |
|                                                          |           | duus.                                                      | 389          |
|                                                          |           | Sanguinis grumi in utero subsistentes, quomodo dissol-     |              |
|                                                          |           | vendi.                                                     | 406          |
|                                                          |           | qua arte dignoscantur.                                     | 408          |
|                                                          |           | Sanguinis partes considerandæ.                             | 422          |
|                                                          |           | Sanguinis detrahendi quantitatem indicantia.               | 441          |
|                                                          |           | non mittendus usque ad animi deliquium.                    | ibid.        |
|                                                          |           | ex vena guttatim effluens cur purissimus.                  | ibid.        |
|                                                          |           | detrahendus usque ad caloris mutationem in febribus        |              |
|                                                          |           | continuis.                                                 | 432.         |
|                                                          |           | Sanguinis fluxui copioso superveniens, convulsio lethalis. | 174          |
|                                                          |           | Sanguinis profluvium moderatum die critico, an salutare.   | 228          |
|                                                          |           | Sanguis criticè & symptomaticè fluit interdum ex gingi-    |              |
|                                                          |           | vis.                                                       | 238          |
|                                                          |           | Sanguis mittendus initio pleuritidis senibus, pueris, græ- |              |
|                                                          |           | vidis, puerperis, in mensibus purgationibus.               | 250          |
|                                                          |           | Sanguis hircinus ad dissolvendum calculum renum.           | 349          |
|                                                          |           | Sanguinis mictus causæ: vide mictus sanguinis.             |              |
|                                                          |           | Sanguis per venæ sectionem eductus in febre pestilenti     |              |
|                                                          |           | si purus, periculosus. 452. en mittendus ad febris         |              |
|                                                          |           | pesti-                                                     |              |

### S

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Sabinæ aqua arenulas & calculum expurgat.                | 358        |
| Sabulosa in urinis quid significant.                     | 352        |
| Saccharum tantum maculas oculi delet.                    | 200        |
| Sacchari oleum ad asthma.                                | 248        |
| Saccharum & mel an lumbricos generent.                   | 309        |
| rosarum utilissimum phthisicis.                          | 263        |
| Sacculus.                                                | 158        |
| Sacculi exsiccantes.                                     | 163        |
| discutientes in mania. 187. gestandi in epilepsia.       | 177.       |
| 178. cerebrum exsiccantes. 192. in palpitatione cor-     |            |
| dis. 201. ventriculorum calefacientes. 274. discutientes |            |
| in hysterica passione. 382. resolventes & carminantes    |            |
| in dolore ischiadico.                                    | 418        |
| in tenebris.                                             | 307        |
| Sale conditi cibi.                                       | 111        |
| Salis spiritus seu oleum in conclusionem.                | 175        |
| Salis vitrioli usus in comate puerorum.                  | 166        |
| in epilepsia.                                            | 177        |
| Sal compositum ad condiendos cibos.                      | 273        |
| absinthii ad inappetentiam.                              | ibid.      |
| Saturni in ophthalmia.                                   | 207        |
| absinthii in vomitu.                                     | 284. & 515 |
| Saturni in dysenteria.                                   | 303        |
| absinthii, juniperi, &c. ad hydropem.                    | 329        |
| Sal diureticum.                                          | 592        |
| Sales cur terrea quadam portione permixti statuuntur ab  |            |
| aliquibus causa proxima calculi.                         | 345. 346   |
| Sales ad calculorum exclusionem.                         | 358        |
| tartari & stipium fabarum ad ischuriam.                  | 365        |
| Salis spiritus in præservatione à calculo.               | 351        |
| Salis prunellæ laus in febribus malignis.                | 458        |
| tartari in scorbuto.                                     | 341        |
| absinthii in febre tertiana intermittente longiore.      | 483        |



# Index Rerum

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| pestilentis præcautionem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pag. 453    | Semicupium.                                                                                                                                                                                                                                                            | pag. 158 |
| Santalorum decoctum ad stillationes falsas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 262. & 263  | Semitertiana, vide Hemitritæus.                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Saphanæ apertio in dolore capitis à calida causa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195         | Senes cur dysenteria sæpius pereant quam in media ætate constituti.                                                                                                                                                                                                    | 339      |
| Sapores alieni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44          | Seneſtutis temperamentum.                                                                                                                                                                                                                                              | 7        |
| Sarcoma quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 223         | Senum victus.                                                                                                                                                                                                                                                          | 102      |
| Ejus causæ & curatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibid.       | Senes quomodo purgandi.                                                                                                                                                                                                                                                | 129      |
| Sarcotica medicamenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149         | Senilis ætas pituitæ proventum facit.                                                                                                                                                                                                                                  | 161.     |
| Sassafras decoctum ad ventriculum frigidum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 273         | Sensatio quid sit, & quid ad sensationem requiratur.                                                                                                                                                                                                                   | 23       |
| Saturnus causa infelicis partus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 251         | Sensus dividuntur in internos & externos. 21. interni sunt imaginatio, ratiocinatio, & memoria, tum etiam somnus & vigilia. ibid. externi statuuntur quinque, visus, auditus, olfactus, gustus & tactus.                                                               | ibid.    |
| Satyriasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173         | Sensus communis quid efficiat.                                                                                                                                                                                                                                         | 21       |
| Satyriensis essentia & sal adversus sterilitatem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 397         | Sentiens facultas quid.                                                                                                                                                                                                                                                | 102      |
| Scabies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 485         | Serosus humor præcipua doloris dentium causa.                                                                                                                                                                                                                          | 235      |
| Scabies tibiarum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 557         | immediata arthritidis causa. 410. rheumatismi.                                                                                                                                                                                                                         | 419      |
| Scabies pruriginosa in fene octuagenario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 560         | Serosa materia quibus ductibus ab hepate in abdominis capacitatem feratur.                                                                                                                                                                                             | 327      |
| Scabies fœda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 586         | Serum cur majorem, vel minorem acrimoniam habeat.                                                                                                                                                                                                                      | 410      |
| Scammonium rarò in febribus continuis usurpandum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 428. & seq. | Seri lactis usus in calida hepatis intemperie. 318. in melancholia hypochondriaca. 334. ejus præparatio. ibid. in ulcere renum & vesicæ. 359. in dysuria. 366. farore uterino. 378. in ulcere uteri. 388. in biliosis febribus. 431. in præſervatione à calculo renum. | 351      |
| Scarificationes in hydropse cur non celebrandæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 329         | Septenarii tres dies critici.                                                                                                                                                                                                                                          | 35. & 36 |
| Scirrhus lienis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 559         | Septimus dies, Rex à Galeno vocatur.                                                                                                                                                                                                                                   | ibid.    |
| Scorbuticis gingivarum erosio. 238. & sanguinis fluxus è gingivis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ibid.       | Serum quid sit, & ejusdem usus.                                                                                                                                                                                                                                        | 347      |
| Scorbutus quid. 338. causæ. ibid. signa. 339. curatio. 340. & 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Seri lactis usus.                                                                                                                                                                                                                                                      | 154      |
| Scorbuti & melancholiæ hypochondriacæ magna similitudo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 338         | Setacei laus in epilepsia. 178. in gutta serena. 197. in ophthalmia. 209. fistula lacrymali. 213. ad phthisin.                                                                                                                                                         | 263      |
| Scorbuti articulorum dolores in quo differant ab iis, qui lue venerea infectos affligere solent. ibid. & 339. quomodo ab arthritide distinguantur.                                                                                                                                                                                                                                                         | 340         | Sevum hircinum variolarum cicatrices implet.                                                                                                                                                                                                                           | 465      |
| Scorbutus cur curata difficilis. ibid. specifica. 341. eorum vis dependet à sale volatili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ibid.       | Sextus dies in crisiſibus pessimus.                                                                                                                                                                                                                                    | 36       |
| Scorbuticis febre in omnibus pancreatis tumores generantur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341         | Sexus similitudo unde pendeat.                                                                                                                                                                                                                                         | ibid.    |
| Scordium adversus malignitatem & lumbricos æqualiter confert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 314         | Sexuum temperamentum.                                                                                                                                                                                                                                                  | 7        |
| Scorpionum cinis & oleum ad calculum. 349. ischuriam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 364         | Siccitas qualitas aëris & ignis.                                                                                                                                                                                                                                       | 3        |
| Sectio quomodo solvat continuum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31          | Siccæ intemperaturæ causæ.                                                                                                                                                                                                                                             | 41       |
| Secundina mulieris exsiccata adversus sterilitatem specificum. 383. liberat à paroxysmo hysterico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 398         | Signum quid sit.                                                                                                                                                                                                                                                       | 44       |
| Secundinæ retentiæ causæ. 405. diagnosi. ibid. quæ symptomata sequatur. ibid. remedia specifica. ibid. manu chirurgi extrahi debet.                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid.       | Differentiæ.                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid.    |
| Secundina retenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 579         | fontes signorum generales.                                                                                                                                                                                                                                             | 45       |
| Secundinarum retentio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 562         | Signa critica quæ.                                                                                                                                                                                                                                                     | 35       |
| Sedimentum urinæ quod malum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83          | Signa partis affectæ.                                                                                                                                                                                                                                                  | 49       |
| Semeiotica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44          | Signa pituitæ præternaturalis.                                                                                                                                                                                                                                         | 57       |
| Semen humanum quid? & quot ejus sint partes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23          | Signa morbi acuti & chronici.                                                                                                                                                                                                                                          | 54. & 55 |
| Non est actu animatum, sed potentia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.       | Signa partis primariè vel per consensum laborantis.                                                                                                                                                                                                                    | 51. & 52 |
| Semen mulierum an sit prolificum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24          | Signa speciei morbi.                                                                                                                                                                                                                                                   | 52       |
| Seminis excretio quando noxia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110         | Signa temporum morborum.                                                                                                                                                                                                                                               | 58       |
| Semen generantia aut minuentia medicamenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146         | Signa morbi lethalis & salutaris.                                                                                                                                                                                                                                      | 61       |
| Seminis contra vermes laus & utendi modus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310         | Signa longitudinis morbi.                                                                                                                                                                                                                                              | 60. & 61 |
| Semen retentum corrumpitur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 378         | Signa morbi maligni & benigni.                                                                                                                                                                                                                                         | 55. & 56 |
| Semen dum corrumpitur, cur in majorem venenositatem degeneret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ibid.       | Signa superventurorum ægrotis.                                                                                                                                                                                                                                         | 95       |
| Semen hominis oculo impositum, albuginis curationi conducit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 205         | Signa flatuum.                                                                                                                                                                                                                                                         | 58. & 59 |
| Seminis copia, acrimonia & fervor supra modum furorem uterinum excitant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 377         | Similares partes quæ.                                                                                                                                                                                                                                                  | 13       |
| Semen calefacientia. 377. refrigerantia, & extinguentia proprietate specifica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ibid.       | Ad earum functionem quid requiratur.                                                                                                                                                                                                                                   | 14       |
| •Seminis excretio in furore uterino an procuranda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 378         | Similaris morbus.                                                                                                                                                                                                                                                      | 28       |
| Semen cur ab utero non recipiatur. 395. non retineatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 395         | à morbo simili indicatio.                                                                                                                                                                                                                                              | 133      |
| ibid. corrumpatur. ibid. non conformetur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 395         | Sinapi.                                                                                                                                                                                                                                                                | 106      |
| Seminis virilis & fœminei improporſio, conceptionis impedimentum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.       | Sinapismorum usus in paralyſi.                                                                                                                                                                                                                                         | 171      |
| Semicupium in hepatis scirrho. 325. in calculo renum. 349. dysuria. 367. in suppressione mensium. 372. mensium in modico fluxu. 375. hysterica passione. 384. in scirrho uteri. 389. hydropse uteri. 392. in uteri procidentia an conveniat. 394. ad sterilitatem à frigida causa. 498. in dolore ischiadico resolvens. 417. melancholia hypochondriaca. 427. urinæ incontinentia. 362. in furore uterino. | 378         | Sincipitis perforatio in epilepsia.                                                                                                                                                                                                                                    | 178      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Singultus. 280. curatio. ibid. & 281. in quo differat à vomitu & nausea. 280. motus convulsivus est, non vera convulsio.                                                                                                                                               | 173      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Singultus quando malus.                                                                                                                                                                                                                                                | 74       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Singultus quis perniciosus. 280. cur fiat in jecoris inflammatione.                                                                                                                                                                                                    | ibid.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Singultus remedia apud Platonem. 281. vomitus confert.                                                                                                                                                                                                                 | 280      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ibid. quomodo excitetur ab inanitione.                                                                                                                                                                                                                                 | ibid.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Singultus curatus aqua nucum viridium.                                                                                                                                                                                                                                 | ibid.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Singultus cur malus in hepatis inflammatione. ibid. in febribus sæpe sequitur intemperatum refrigerantium usum. 436. ejus curatio.                                                                                                                                     | ibid.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Singultus. 525. 548. de portentoso & insolenti singultu.                                                                                                                                                                                                               | 564      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Sitis                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |



# & Verborum.

|                                                              |            |                                                               |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Sitis ingens morbi acuti index.                              | pag. 56    | Spiritus seu liquor acidus, præcipuum digestionis instru-     |            |
| Sitis quando mala.                                           | 74         | mentum.                                                       | 275. & 278 |
| Sitis magna bilem indicat.                                   | 47         | Spiritus salis, tartari, & vitrioli laus in hydrope.          | 329        |
| Sitis nulla, signum pituitosi.                               | 48         | Spiritus salis, vitrioli, sulphuris, & terebinthinæ prædi-    |            |
| Sitim non sentiunt phrenitici.                               | 29         | cantur in ischuria.                                           | 464 & 365  |
| Sitis morbofa. 277. duplex, idiopathica, sympathica.         |            | Spiritus vitrioli in obstructionibus. 322. in scorbutica      |            |
| ibid. curatio.                                               | 278        | affectione. 341. in calculo renum. 374. contra vermes.        |            |
| Sitis depravatæ differentia. ibid. causæ.                    | ibid.      |                                                               | 392        |
| Siticulosis lac balneum.                                     | ibid.      | Spiritus diureticus.                                          | 308        |
| Sitis quæ à gravibus & periculosis morbis dependet,          | ibid.      | Spiritus salis in calculo renum.                              | 349. & 265 |
| periculosa.                                                  | ibid.      | Spiritus vini ad fœtum in ileo à flatibus. 246. famem ca-     |            |
| Sitis in febribus quomodo sedanda.                           | 434        | ninam solvit.                                                 | 273        |
| Sitis inexhausta in diabete causa.                           | 360        | Spiritus sitibundus ex hermeticis causa sitis morbofa.        | 178        |
| Sitis inextinguibilis.                                       | 522        |                                                               | 275        |
| Sitis intensa.                                               | 556        | Spiritus dissolvens causa bulimiæ ex hermeticis.              | 275        |
| Situs ventriculi monstruosus.                                | 546        | Spirituum defectus causæ in syncope.                          | 265        |
| Smaragdus insignem vim habet in morbis venenatis.            | 457        | Spiritus vini helleboratus singularis in furditate.           | 217        |
| Sobrietas magni momenti in morbis.                           | 162        | Spiritus flatuosus convulsionis causa.                        | 173        |
| Sobrii cur parum dormiant.                                   | 47         | Spiritus unde maligna qualitate afficiatur.                   | 181        |
| Sollicitudines quomodo exsiccent.                            | 40         | Spiritus, cum magna copia ad partem aliquam deferatur,        |            |
| Solida cur facilius deglutiantur.                            | 240        | sanguinem secum transfert.                                    | 242        |
| Solutionum continui quot species.                            | 30         | Splenetica medicamenta.                                       | 144        |
| Somni præternaturalis differentia.                           | 169        | Splenis bovis decoctum ad suppressos menses.                  | 371        |
| Somnium quid.                                                | 12         | Sporadici.                                                    | 32         |
| unde fiat.                                                   | ibid.      | Spuma quando ominosa.                                         | 76         |
| Somnia frigoris & aquarum pituitæ dominium indicant.         | 160        | Sputosus sanguis aq tantum à pulmone.                         | 256        |
| Somni definitio: causa ejusdem proxima: quando & à           |            | Spurius morbus.                                               | 32         |
| quo impediatur finis ejusdem.                                | 22         | Sputum quando malum.                                          | 75. & 76   |
| Somni longi, præsertim à cibo, pituitam generant.            | 161        | Sputum cruentum an sit signum pathogmonicum pleu-             |            |
| oculis infanti. ibid. longioris incommoda. 196. bre-         |            | ritidis.                                                      | 249        |
| vioris & longioris.                                          | 424        | Sputatores Melancholici.                                      | 49         |
| Somnus quando malum signum.                                  | 65. 66     | Stagnantes aquæ.                                              | 113        |
| Somnus qui utilis.                                           | 118        | Status morbi.                                                 | 31         |
| Somnum conciliantia.                                         | 184        | Stercus porcinum & asinum in hæmorrhagia sistenda.            |            |
| Somnus gravis ac profundus in virginibus chlorosi la-        |            | 230. stercus album gallinæ & equinum ad pleuri-               |            |
| borantibus unde.                                             | 367        | tidem.                                                        | 272        |
| Sonitus aurium causæ, & differentia.                         | 217. & 218 | Stercus pavonis specificum in vertigine.                      | 181        |
| Sonus per apertum os quomodo excipitur.                      | 223        | Stercus equinum ad colicam.                                   | 294        |
| Soni præternaturales.                                        | 43         | Stercus anserculi, & stercus album gallinæ, quare in icte-    |            |
| Soporosi affectus, & eorum causæ.                            | 169        | ro commendetur.                                               | 325        |
| Soporosi affectus tumore orti historia. 165. sæpe à va-      |            | Stercus bubulum exterius grumos sanguinis dissolvit           | 365        |
| poribus elevatis ad cerebrum excitantur.                     | ibid.      | Stercorosus fluxus.                                           | 299        |
| curatio.                                                     | ibid.      | Sterilitatem fluxus inducit balneum decoctionis aluminis.     |            |
| Spasmus cynicus quid.                                        | 200. 173   |                                                               | 374        |
| Specilla visum conservantia.                                 | 202        | Sterilitas quid. 395. causæ. ibid. signa. 396. curatio. ibid. |            |
| Spermatice partes quæ.                                       | 52         | Sterilitatem inducentia alimenta & venena.                    | ibid.      |
| Spermaticarum partium prima rudimenta quandonam              |            | Sterilitas ab improportione seminum quomodo dignos-           |            |
| apparere incipiant.                                          | ibid.      | catur.                                                        | 395        |
| Spermatice partes quando in maribus & quando in fœ-          |            | Sterilitatem vel fœcunditatem fœminæ probantia.               | 396        |
| rcinis perficiantur.                                         | ibid.      | Sterilitatem viri indicantia, ibid. curatio à frigida & hu-   |            |
| Sphacelus cerebri.                                           | 185        | mida intemperie. 397. ad sterilitatem curandam spe-           |            |
| Sphincteris vesicæ affecti causæ.                            | 362        | cifica.                                                       | ibid.      |
| Spica nardi specifica ad hæmorrhagiam sistendam.             | 250        | Sternutatoria. 168. in principio apoplexiæ non conve-         |            |
| Spinæ inunctiones ad rigorem leniendum, in febre quar-       |            | niunt.                                                        | 166        |
| tana utilissimæ.                                             | 443        | Sternutatio quid. 225. causæ.                                 | 226        |
| Spirandi difficultas.                                        | 482        | Sternutationis symptomaticæ curatio.                          | ibid.      |
| Spirandi difficultas cum pulsu valde inæquali.               | 508        | adventitiis, qui se aëri frigido exponunt.                    | 225        |
| Spirandi difficultas cum tussi & rauedine.                   | 525        | à qua facultate edatur.                                       | ibid.      |
| Spiritus congelandi vim habens.                              | 169. 266   | hystericæ cur salutaris.                                      | 382        |
| Spiritus vitrioli specificus ad epilepsiam. 177. contra flu- |            | parti difficili.                                              | 404        |
| xiones. 192. utiliter julepis admiscetur.                    | 183        | Sternutatio quando mala.                                      | ibid.      |
| Spiritus vitrioli aut sulphuris ad curationem ulcerum oris   |            | Sternutatorii compositio.                                     | 72         |
| & faucium. 385. ad asthma. 248. in vomitu. 284. in           |            | Sternutatoria medicamenta.                                    | 141        |
| febribus. 319. quibus morbis noxius. ibid. in febribus       |            | Sternutatorium.                                               | 373        |
| malignis præstantissimus.                                    | 456        | Sternutatio in pestilenti an salutaris.                       | 451        |
| Spiritus sulphuris cum aqua portulacæ in æstu tertianæ       |            | Stertor in acutis quid notet.                                 | 88         |
| intermittentis.                                              | 438        | Stertoris causæ.                                              | 421        |
| Spiritualis mixtura ad febrem malignam. 458. commenda-       |            | Subii calcinati usus in epilepsia.                            | 178        |
| tur in epilepsia.                                            | 178        | Stomachica medicamenta.                                       | 143        |
| Spirituum tenebrositas in melancholia unde.                  | 188        | Stomacho admoventur remedia supra cartilaginem xi-            |            |
| Spiritus tartari in paralyfi. 172. in obstructionibus.       | 322        | phoidem, posteriùs supra 13. vertebam.                        | 274        |
|                                                              | 273        | Strabismus convulsionis species.                              | 172        |
| Spiritus mastiches descriptio.                               |            | Strangulationis sensus in hysteris unde.                      | 35         |
| Laz. Riverii Opera.                                          |            | Stranguria quid.                                              | 36         |



# Index Rerum

|                                                            |                 |                                                           |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| causas easdem habet, quas ischuria.                        | pag. 363        | ad tumores scirrhusos dissolvendos. p. 387. ad uteri pro- |             |
| curatio.                                                   | 364             | cidentiam. 294. adversus sterilitatem, à frigida causa,   |             |
| quibus topicis curetur.                                    | ibid.           | 397. coryza. 225. in auris surditate. 217. ad uteri fla-  |             |
| lixivio ex ovorum testis in cinerem redactis curata.       | 364. 365        | tus explodendos. 392. ad foetum mortuum excluden-         | 405         |
| Strumæ morbus endemius in Hispania.                        | 32              | Suffumigia cephalica.                                     | 163         |
| Strumis pueri laborantes cur alvi fluxu chyloso, eoque     |                 | in paralyfi.                                              | 172         |
| diuturno sensim contabescant.                              | 271             | in surditate.                                             | 217         |
| Strumis laborantes cur macilenti.                          | 260             | ad ulcera profunda.                                       | 387         |
| mesenterium plurimum glandulis refertum.                   | ibid.           | Suffusio quid.                                            | 199         |
|                                                            | & 298           | causæ.                                                    | ibid. & 200 |
| Strumæ.                                                    | 570. 582. & 587 | duplex, vera & spuria.                                    | ibid.       |
| Stultitia.                                                 | 558             | aliæ differentię.                                         | ibid.       |
| Stupha humida ad sudores provocandos.                      | 412             | quomodo distinguatur à gutta serena.                      | 207         |
| Stupidus dolor quid notet.                                 | 54              | signa.                                                    | ibid.       |
| Stupor cruris è directo laborantis renis calculi signum.   |                 | quando punctione curanda.                                 | ibid. & 202 |
|                                                            | 347             | curatio.                                                  | 201         |
| ut & inflammati renis.                                     | 184             | Suffusio & cataracta.                                     | 554         |
| Subeth, Avicennæ quid.                                     | 164             | Sugillatio quid.                                          | 205         |
| Subeth puerorum.                                           | 571             | curatio.                                                  | ibid.       |
| Subligaculum, quod vulgò Zona Hippocr. nominatur,          |                 | Suilla caro.                                              | 108. 191    |
| ad procidentiam uteri.                                     | 394             | Sulphuris lac & flores ejusdem ad catarrhum.              | 191         |
| Subsequentia signa criseos.                                | 36              | Sulphuris oleum in oris & linguæ ulceribus.               | 234         |
| Subtilitas quid sit.                                       | 3               | ad dentes dealbandos.                                     | 238         |
| Succini oleum hysterico paroxysmo confert.                 | 382             | Sulphuris flores & lac ad asthma.                         | 248         |
| Succini albi oleum in epilepsia.                           | 179             | ad phthisim.                                              | 264         |
| ad partum difficilem.                                      | 409             | Superpurgationis curatio.                                 | 18          |
| ad dolorem capitis.                                        | 194             | Suppositoris alvus proritetur, si clysteres injecti non   |             |
| Succus lapidescens causa materialis.                       | 346             | reddantur.                                                | 167         |
| Suctionis in ventriculo sensum impediencia.                | 271             | Suppositoria ad tenesmum.                                 | 306.        |
| Sudatiunculæ quid notent.                                  | 167             | ad fluxum immodicum hæmorrhoidum.                         | 319         |
| Sudores quid periculosi.                                   | 84              | ad dolorem hæmorrhoidum.                                  | 316         |
| Sudores frigidi quid notent.                               | ibid.           | in vesicæ inflammatione.                                  | 357         |
| Sudoris imminantis signa.                                  | 92. & 93        | Suppositoria.                                             | 356         |
| Per sudores evacuatio.                                     | 132             | Suppressio omnimoda alvi aut urinæ, morbi acuti indi-     |             |
| Sudorifica medicamenta.                                    | 140             | ces.                                                      | 57          |
| Sudoribus eliciendis decoctum ebuli vel radicis bardanæ    |                 | Suppurantia medicamenta.                                  | 148         |
| feu lappæ majoris commendatur.                             | 172             | Suppurationis in thorace causæ & signa.                   | 254         |
| Sudoris immodici curatio.                                  | 267             | Suppurati qui evadant.                                    | ibid.       |
| Sudorificum ex baccis Juniperi paratum, ad hydropem.       |                 | Surarum dolor quid significet.                            | 94          |
|                                                            | 330             | Surditas quando salubris.                                 | 66          |
| Sudores quomodo provocandi in fluxu muliebri.              | 375             | Surditas.                                                 | 215         |
| Sudorifica ad arthritidem. 412. in febre tertiana longiori |                 | causæ.                                                    | 216         |
| exhibenda.                                                 | 429             | curatio.                                                  | ibid.       |
| Sudores symptomaticos in febribus cohibentia.              | 436             | Surdi ab ortu cur muti sint.                              | 215         |
| Sudorificorum utilitas ad cerebri intemperiem frigidam     |                 | Surdastrî cur aperto ore melius audiant.                  | ibid.       |
| & humidam.                                                 | 162             | Surdî biliosæ dejectiones profunt.                        | ibid.       |
| in cephalæa.                                               | 194             | maximè conferunt sternutatoria.                           | 216         |
| in epilepsia.                                              | 178             | spiritus vini helleboratus.                               | 217         |
| in gutta serena.                                           | 197             | Surdastrî in constitutione austriana graviozem auditum    |             |
| in hydropo pulmonis.                                       | 256             | habent.                                                   | 216         |
| Sudoribus nocturnis phthisici ut plurimum divexantur.      |                 | Surditas in febribus malignis cur non adeò periculosa.    |             |
|                                                            | 261             |                                                           | 451         |
| Sudores in febre pestilentî qui pravi, qui salutare.       | 452             | Suspiria quando mala.                                     | 72          |
| Sudorifica an usurpanda in prægnantibus. 399. & 400        |                 | Syderum influxus quomodo sint causæ morborum pesti-       |             |
| rheumatismis.                                              | 420             | lentium.                                                  | 447         |
| an hydropicis convenient.                                  | 329             | Symphatici affectus, an morbi.                            | 27          |
| ad ulcus renum.                                            | 359             | Symphaticus morbus quis, & quas causas habere soleat.     | 31. & 32    |
| ad urinæ incontinentiam.                                   | 362             | Symphyti radicis syrupus in diabete commendatur.          | 361         |
| in chlorosi.                                               | 368             | Symptoma quid sit, unde pendeat, illius differentię.      |             |
| qualia in febrium continuarum declinatione conve-          |                 |                                                           | 42          |
| niant.                                                     | 433             | Symptomatum causæ.                                        | 43          |
| Sudores nocturni.                                          | 530. & 557      | Symptomata notificant morbos.                             | 27          |
| Suffusus moderatus, & non graveolens, frigidam & hu-       |                 | Symptomata hysterica & hypochondriaca.                    | 496         |
| midam cerebri intemperiem emendat.                         | 161             | Syndesmosis signa.                                        | 45          |
| Suffusus acerrimi apoplecticis conferunt.                  | 167             | Syncope pulsus abolet.                                    | 47          |
| gummi tamahaca cerebrum exsiccant. 192. asthmatis-         |                 | Syncope morbi maligni index.                              | 55          |
| cis nocent. 247. in diarrhœa biliosa. 300. dysente-        |                 | Syncope quid.                                             | 265         |
| ria. 303. tenesmo. 306. in fluxu hæmorrhoidum im-          |                 | in quo differat ab apoplexia.                             | ibid.       |
| modico. 313. ad dolorem hæmorrhoidum sedandum.             |                 | signa.                                                    | 266         |
| 316. in mensium suppressione. 272. mensium fluxu           |                 | causæ.                                                    | 265. & 266  |
| immodico. 374. exsiccans & roborans in fluore mu-          |                 | Syncope cardiaca & stomachi.                              | 266         |
| liebri. 376. ex verrucis quæ tibiis equorum adnascuntur,   |                 | Syncopes lethalis historia in nobili virgine Monspeliana. |             |
| in hysterica passione. 382. ex lapide pyrite,              |                 |                                                           | pag         |



## & Verborum.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| pag. 266. & in alia virgine & sanguine circa cor congelato.                                                                                                                                                                                                                                         | ibid.      |
| Syncope in quo differat ab epilepsia, apoplexia, & uteri suffocatione.                                                                                                                                                                                                                              | 267        |
| curatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.      |
| Syncope hæmorrhagia cohibita.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 229        |
| Synopalis febris essentia, causæ, & differentia.                                                                                                                                                                                                                                                    | 434        |
| curatio synopalis minutæ.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 435        |
| Synopalis humorosæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ibid.      |
| Syncope à liene.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 585        |
| Synochum significat sanguis è naribus fluens.                                                                                                                                                                                                                                                       | 55         |
| Synochus simplex.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 422        |
| causæ, & signa.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid.      |
| differentia, & curatio.                                                                                                                                                                                                                                                                             | ibid.      |
| Synochi simplicis duo remedia, sanguinis missio ad animi deliquium, & aquæ frigida potus.                                                                                                                                                                                                           | 422        |
| Συνόχης, & συνέχης febres quænam sint.                                                                                                                                                                                                                                                              | 425. & 427 |
| Synochi putridæ essentia.                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid.      |
| differentia, & causæ.                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.      |
| signa.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 427. & 428 |
| Synodicus mensis.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33         |
| Syntecticæ diarrhœæ causæ.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 299        |
| Syrupi.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156        |
| Syrupus Magistralis in dolore capitis. 202. ad sanguinem mundificandum.                                                                                                                                                                                                                             | 258        |
| Syrupi ad asthma.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 247        |
| ad phthisim.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 273        |
| Syrupus de absinthio.                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.      |
| ejus descriptio.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.      |
| restaurans.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 270        |
| in diarrhœa biliosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300        |
| Syrupi de cichorio compositi quadruplicato rheo doses.                                                                                                                                                                                                                                              | 516        |
| Syrupus purgans in calida hepatis intemperie.                                                                                                                                                                                                                                                       | 317        |
| ad obstructions inveteratas.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 321. & 322 |
| ex chalybe decostruens & purgans.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 323        |
| hydragogus.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 320        |
| rhamni cathartici, hydropicorum aquas educens.                                                                                                                                                                                                                                                      | 329        |
| Syrupi sancti Ambrosii.                                                                                                                                                                                                                                                                             | ibid.      |
| descriptio & usus. ibid. purgans in melancholia hypochondriaca. 337. purgans & præservans à calculo. 350. de alihæa simplex in calculo renum. 399. roborans, adstringens & refrigerans in fluore muliebri. 375. hysterici purgans. 384. magistralis purgans. 421. refrigerans, roborans, & purgans. | 386        |
| Syrupus violaceus, alique dulciores, soli non exhibendi.                                                                                                                                                                                                                                            | 432        |
| Systoles effectus.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21         |

### T

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>T</b> Abaci fumus hystericis mulieribus prodest.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 382      |
| cinis dentes abstergit & dealbat.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 238      |
| Tabellæ cerebrum confortantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 167      |
| in mania. 187. ad diarrhœam. 300. exsiccentes cerebrum. 191. hepar refrigerantes. 317. roborantes in melancholia hypochondriaca. 338. calculum immunes. 350. roborantes & leniter purgantes ad præcavendum abortum. 402. ad asthma. 248. in hæmoptoë. 489. in ventriculo frigido. 457. ex chalybe decostruentes hepar. | 322      |
| Tabellæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155      |
| Tabes à quo humore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 259      |
| Tabis differentia variæ ab Hipp. propositæ.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260      |
| Tabidis autumnus cur malus.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.    |
| Tabifica conformatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 261      |
| Tabes morbus endemius in Lusitania.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32       |
| Tabula signorum, partem primariæ, vel per consensum affici indicantium.                                                                                                                                                                                                                                                | 51       |
| Tabula signorum magni vel pravi morbi.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55       |
| Tactus signa parva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66       |
| Tactus quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23       |
| Tactus symptomata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161      |
| Tamarindi ad immodicum fluxum hæmorrhoidum cohibendum commendatur.                                                                                                                                                                                                                                                     | pag. 312 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tapfi barbati usus in hæmorrhoidum dolore.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 315         |
| Ταρξίς quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 206         |
| Latinis conturbatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid.       |
| curatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 207         |
| Tartari crystallus quomodo fraudetur ab impostoribus.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 322         |
| ex tartaro remedia fiunt ad obstructions inveteratas.                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.       |
| sal tartari & spiritus tartari maximè commendantur ad obstructions hepatis.                                                                                                                                                                                                                                              | 321         |
| ex tartaro remedia ad hydropem.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 332         |
| in scorbutica affectione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341         |
| in suppressione mensium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 371         |
| Tartari cremor in hysterica passione exhibendus.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 384         |
| Tartari vitriolati compositio & usus.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 322         |
| in suppressione mensium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 371         |
| in calculo renum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 348         |
| Temperamentum quid sit, & temperamentorum differentia.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4           |
| Temperamentorum κριτήριον.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5           |
| Temperamentum ætatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6           |
| Temperamentorum judicium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid.       |
| Temperamenta sexuum & temporum anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7           |
| Temperies calida & sicca viscerum, biliosum humorem prædominari arguit.                                                                                                                                                                                                                                                  | 47          |
| Temporum inæqualitates malignarum febrium causæ.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 447         |
| Temporum anni temperamenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7           |
| Temporum morbi signa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45          |
| Temporum anni qualitates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216. & 217  |
| Tempus victus exhibendi ægrotis.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 390         |
| Tenesmus cum mingendi cupiditate cur adfit in vesicæ calculo.                                                                                                                                                                                                                                                            | 353         |
| Tenesmus quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 305         |
| • In quo differat à dysenteria. ibid. gravis abortum facit. ibid. curatio.                                                                                                                                                                                                                                               | ibid. & 307 |
| Tenus pituita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          |
| Terebellum extremum remedium in epilepsia.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177         |
| Terebinthinæ usus in asthma.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 247         |
| Aperit, urinam movet, & alvum emollit in scirrho hepatis. 338. in melancholia hypochondriaca. 337. in præservatione à calculo renum. 351. pilulæ ex terebinthina in mictu sanguinis à calculo. 358. in ulcere renum, vesicæ & uteri. 333. in empyemate. 360. in ventriculo expurgando. 275. in inflammatione ventriculi. | 209         |
| Terminus accretionis quidnam sit.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20          |
| Tertiana febris quandonam vera & legitima dicatur.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 433         |
| Tertianæ continuæ essentia & causæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 427         |
| signa diagnostica. 428. quomodo à syncho biliosa distinguatur. ibid. venæ sectio maximè utilis.                                                                                                                                                                                                                          | 430         |
| Tertianæ intermittentis sedes ac differentia.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 436         |
| causæ. ibid. exquisitæ signa. ibid. notæ signa. 437. an semper periculi expertes ibid. solutio certior per alvi fluxum.                                                                                                                                                                                                  | ibid.       |
| curatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ibid.       |
| victus ratio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.       |
| Tertiana febre laborantes, quando cibandi.                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.       |
| etiam in accessione, urgente necessitate cibum offerri potest.                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid.       |
| medicamentum purgans quando exhibendum.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 438         |
| cur vomitoria convenient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid.       |
| Tertianæ intermittentis longioris causæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ibid.       |
| malignæ signa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 448         |
| Tertianus quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51          |
| Θερμεινική quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120         |
| Τέτανος convulsionis species.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173         |
| prognosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174         |
| Theriaca recens ratione opii soporosis affectibus non convenit.                                                                                                                                                                                                                                                          | 167         |
| Trachea fluxionibus obnoxia.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54          |
| Tremor quomodo funestus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69          |



# Index Rerum

|                                                        |            |                                                            |             |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Trigesimus quartus dies criticus.                      | pag. 27    | Vapor malignus & venenatus hystericae suffocatio is        | pag. 379    |
| Tristitiae effectus.                                   | 119        | causa.                                                     | 186         |
| Trochisci.                                             | 155        | Varices Melancholicis supervenientes salutare.             | 164         |
| Trochisci fluxioni sistendae idonei.                   | 191        | Variolae in quo differant, an sint morbi novi.             | ibid.       |
| in calido catarrho.                                    | 192        | Variolarum causa.                                          | ibid.       |
| Trochisci Gordonii & de carabe ad mictum sanguinis.    | 358        | eruptio cur tandiu differatur.                             | ibid.       |
| ad renum ulcus & vesicae.                              | 377        | cur majori copia in facie, pedibus, & manibus appa-        | ibid.       |
| de myrrha ad mensium suppressionem.                    | 370        | rere soleant.                                              | ibid.       |
| alkekengi in dysuria.                                  | 367        | in quo differat à maculis purpureis.                       | ibid.       |
| Trochisci in ulcere renum & vesicae.                   | 360        | aliquando pestis prodromi & nuntii.                        | 462         |
| in febre quartana maxime utiles.                       | 443        | Variolarum & morbillorum expulsio fit per sanguinis        | ibid.       |
| sublinguales ad linguae scabritiem & siccitatem.       | 435        | ebullitionem.                                              | ibid.       |
| albi Rhafis in cancro uteri.                           | 389        | talis ebullitio duplex, una perfecta, & alia corrup-       | ibid.       |
| Trochisci ad ulcus ventriculi.                         | 291        | tiva.                                                      | ibid.       |
| de Rhabarbaro ad hydropem.                             | 329        | duo habent tempora, unum ebullitionis, aliud eruptio-      | ibid.       |
| viperini ad febrem pestilentem.                        | 457        | nis.                                                       | ibid.       |
| Tuba Fallopiana quid.                                  | 379        | imminentium signa.                                         | 462         |
| Tuberculum pulmonis duplex.                            | 259        | quae salutare.                                             | ibid.       |
| ejus causae.                                           | ibid.      | lethales sanguinis excretiones quid indicent.              | ibid.       |
| Tuberculum in pulmonum arteriis prope cor, palpitatio- | 267        | curatio.                                                   | 463         |
| nis & interitus causa in Antipatro medico.             | 267        | victus ratio.                                              | ibid.       |
| Tumor oedematofustibiarum & pedum quomodo discen-      | 332        | erumpentibus cur diuturnior somnus noxius.                 | ibid.       |
| tiendus.                                               | 332        | curatio à venae sectione inchoanda.                        | ibid.       |
| Tumor magnus & contumax, genus occupans, emplastro     | 414        | quo morbi tempore maxime proficua.                         | ibid.       |
| vesicatorio admoto curatus.                            | 480        | an purgatio conveniat.                                     | ibid.       |
| Tumor lienis.                                          | 487. & 505 | Eruptionem adjuvantia.                                     | 464         |
| Tumor strumofus.                                       | 519        | quando usurpanda.                                          | ibid.       |
| ex tumore in genu aperto, loco puris ventus egredi-    | 529        | malignitas alexipharmacis oppugnanda.                      | ibid.       |
| tur.                                                   | 530        | foliis incrassantibus curae.                               | ibid.       |
| Tumor pedis dextri diuturnus.                          | 504        | quas partes afficiant.                                     | ibid. & 465 |
| Tumor pancreatis scirrhusosus cum affectione hypochon- | 544        | ab earum noxis quomodo defendendus pulmo.                  | 464         |
| driaca.                                                | 552        | intestina, oculi, nares, facies.                           | 465         |
| Tumor canerosus in hepate cum dolore ischiadico.       | 553        | Variolarum foveae & cicatrices in facie quomodo delenda.   | ibid.       |
| Tumor in genu contumax, & diuturnus.                   | 555        | Variolae an acu aurea vel argentea perforandae.            | ibid.       |
| Tumor mammarum.                                        | 567        | Variolae.                                                  | 493. & 557  |
| Tumor hepatis spurius & decipiens.                     | 576        | Variolae cum dysenteria.                                   | 486         |
| Tumor cruris.                                          | ibid.      | Variolae cum alvi fluxu.                                   | 494         |
| Tumor & dolor in genu.                                 | 576        | Variolarum prognos.                                        | 560         |
| Tumor scroti.                                          | ibid.      | Vas breve, quos usus habeat.                               | 284         |
| Tumores strumosi in digitis.                           | 576        | Venarum jugularium secandi modus.                          | 166         |
| Tumor suppuratus resolutione curatus.                  | ibid.      | aperiri possunt in angina.                                 | 184         |
| Tumor oedematofus.                                     | 584        | Venae sectio frontis, in comate vigili idiopatico celebra- | 178         |
| Tumor in crure.                                        | 131        | branda.                                                    | 184         |
| Turgere humorum quid sit.                              | 446        | in phrenitide.                                             | 195         |
| Turgentia in humoribus quid.                           | ibid.      | dolore capitis.                                            | 198         |
| quomodo dignoscatur.                                   | ibid.      | in gutta serena.                                           | 184         |
| In turgentia cur phlebotomia potius quam purgatio      | ibid.      | Venae narium utilissime aperiuntur in phrenitide.          | 198         |
| usurpetur.                                             | 110        | Venae sectio temporum, earum, quae sunt in angulis         | 206         |
| Turtures.                                              | 51         | oculorum juxta nasi radicem in gutta serena.               | 243         |
| Tussis excrementa quid indicent.                       | 215        | ophthalmia.                                                | 329         |
| Tussis cur excitetur dum auris interior vellicatur.    | 483        | Vena secunda sub mamma in curatione anginae.               | 329         |
| Tussis & catarrhus infantis.                           | 523        | sub lingua.                                                | 404         |
| Tussis & difficultas spirandi cum doloribus humerorum  | 210        | Venae plurimo sanguine refertae omnes vias anteriores      | 330         |
| brachiorum.                                            | 326        | angustiores efficiunt.                                     | 32          |
| Tuthia in ulceribus oculorum commendatur.              | ibid.      | Venas per epiploicas & gastrepiploicas serofus humor è     | 276         |
| Tympanites quid.                                       | 329        | venis in abdomen fertur.                                   | 378         |
| causae.                                                | 427        | Venofus sanguis.                                           | 292         |
| causa efficiens. ibid. an solus efficiat.              | 168        | Veneni hausti curatio.                                     | 451         |
| in corpore atrabiliario lethalis.                      | ibid.      | Venenata qualitates in hysterica passione agnoscendae.     | 185         |
| Typhodes febris quid.                                  | ibid.      | Venenata febrium qualitas à qua causa dependeat.           | 447         |
| Typhomania quid.                                       | 335        | Venenatum quid in inania.                                  | 270         |
|                                                        |            | Ventis non defflatus aër facile corrumpitur.               | 272         |
|                                                        |            | Ventriculi affectus.                                       | 29          |
|                                                        |            | Ventriculi coctio à quibus causis laedatur.                | 288         |
|                                                        |            | curatio.                                                   | ibid.       |
|                                                        |            | Ventriculi coctio laesa cum alvi fluxu curata in authore   | ibid.       |
|                                                        |            | usu aceti acerrimi cum ovis induratis.                     | ibid.       |
|                                                        |            | Ventriculi dolor.                                          | ibid.       |
|                                                        |            | causae.                                                    | ibid.       |
|                                                        |            | curatio.                                                   | ibid.       |
|                                                        |            | Ventriculi tres praecipuae partes.                         | ibid.       |
|                                                        |            | Ventriculi doloris causa extraordinaria.                   | ibid.       |
|                                                        |            | Ven-                                                       |             |

## V.

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| V Acui dies.                                              | 36  |
| Vacuatio suppressa quid efficiat.                         | 45  |
| Valerianae sylvestris radice laus in epilepsia.           | 178 |
| Vapor occulta qualitate molestus inter causas palpitatio- | 266 |
| nis cordis.                                               | 169 |
| Vapor melancholicus ut plurimum causa catalepticos.       | 335 |
| Vaporum melancholicorum, qui ab hypochondriis ele-        |     |
| vantur, varia symptomata.                                 |     |



## & Verborum.

|                                                                                          |            |     |                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Ventriculi phlegmones causæ & signa.                                                     | pag. 189.  | 290 | branda.                                                            | pag. 356   |
| curatio.                                                                                 |            | 290 | è vesica pus procedens quale.                                      | 356        |
| quando in abscessum degenerat.                                                           | ibid.      |     | Vesicatorii formula usitatio apud Monspelienses.                   | 163        |
| Ventriculi ulcerum causæ & prognosis.                                                    | ibid.      |     | apoplecticis profunt maxime cum euphorbio.                         | 167        |
| Ventriculi inflammationi quando purgatio conveniat.                                      | ib.        |     | convulsioni.                                                       | 174        |
| Abcessus quomodo rumpendus.                                                              | 291        |     | epilepsiæ.                                                         | 177        |
| ulceris curatio.                                                                         | ibid.      |     | toti capiti admotum in dolore capitis.                             | 196        |
| Ventriculus quomodo sit causa melancholiæ hypochondriacæ.                                | 308. & 309 |     | incipiti in ophthalmia.                                            | 209        |
| Ventriculi calida intemperie laborantis curatio.                                         | 273        |     | posteriori parti cervicis in amaurosi.                             | 197        |
| Ventriculum calefacientia & roborantia.                                                  | ibid.      |     | toti capiti rafo.                                                  | 410        |
| Ventriculi motus expulsi triplex.                                                        | 279        |     | incipiti lippientibus oculis.                                      | 213        |
| Ventriculi motus naturalis fit versus pylorum & intestina, motus præternaturalis contra. | 281        |     | in angina.                                                         | 243        |
| Ventriculus cur <i>αγρία</i> à veteribus vocatus.                                        | 288        |     | asthmate.                                                          | 247        |
| Ventriculus quid conferat ad generationem calculi.                                       | 346        |     | arthriticis doloribus.                                             | 410        |
| Ventriculi aphthas facit succi limonum incautus usus.                                    | 349        |     | ischiadico dolore.                                                 | 418        |
| Ventriculus quomodo ex utero in hysterica passione afficiatur.                           | 378        |     | Vesicarium emplastrum.                                             | ibid.      |
| Ventris dolor.                                                                           | 313        |     | Vesicatoria in pestilenti admovenda.                               | 454        |
| Ventriculi dolor.                                                                        | 468. & 470 |     | quibus corporis partibus.                                          | ibid.      |
| Ventris temperamentum.                                                                   | 7          |     | quo morbi tempore.                                                 | 458        |
| Ventris impotentia.                                                                      | 547        |     | in peripneumonia.                                                  | 253        |
| Venus immoderata una ex præcipuis arthritidis causis.                                    | 411        |     | Vesicar. in catharro, scapulis, cervi.                             | 191. & 92  |
| Venus immodica calculus generat.                                                         | 54         |     | Vetulis quandonam menstrua excernantur.                            | 24         |
| ad venerem proclives biliosi.                                                            | 42         |     | Vibices in cadaveribus defunctorum quid indicent.                  | 450        |
| Venus languida.                                                                          | 556        |     | Vicina calidarum rerum calefacit.                                  | 40         |
| Veris victus.                                                                            | 103        |     | Vicina frigidarum rerum refrigerat.                                | ibid.      |
| Veris qualitates.                                                                        | 116        |     | Victus moderatio quæ necessaria.                                   | 98         |
| Vermes quando malum signum.                                                              | 79         |     | Victus singulis ætatibus congruus.                                 | 102        |
| Vermes inter causas convulsionis & epilepsiæ numerantur.                                 | 176        |     | Victus singulorum temporum.                                        | 103        |
| in dentibus cariosis sæpissimè generantur.                                               | 235        |     | Vigessimus dies est criticus.                                      | 36         |
| Vermium genera.                                                                          | 222        |     | Vigessimus septimus dies, criticus.                                | 37         |
| non raro exitiosi sunt,                                                                  | 310        |     | Vigilia quid.                                                      | 22         |
| excreti in morbis an salutare.                                                           | ibid.      |     | Vigilia quæ utilis.                                                | 119        |
| an ex lacte in infantibus lactentibus generentur.                                        | 302        |     | Vigiliæ quomodo calefaciant.                                       | 122        |
| quibus expurgandi.                                                                       | 310        |     | Vigiliæ quando malum signum.                                       | 65         |
| Vernaculi morbi.                                                                         | 33         |     | Vigiliæ post mediam noctem cur plerumque infestare soleant.        | 335        |
| Verrucæ.                                                                                 | 574        |     | in febribus quomodo curandæ.                                       | 434        |
| Verrucæ manuum.                                                                          | 599        |     | in febre malig.                                                    | 458. & 459 |
| Vertebrarum luxatio paralyfin efficit.                                                   | 171        |     | Vigiliarum noxæ.                                                   | 191        |
| Vertigines unde oriuntur.                                                                | 180        |     | Villensium aquarum laus.                                           | 83         |
| Vertigo quid, ejus differentiæ.                                                          | 179        |     | Vini qualitates.                                                   | 112        |
| proxima causa est circumvolutio spirituum, quæ est morbus in situ.                       | ibid.      |     | Vinacea autumnii tempore membris paraliticis profunt.              | 172        |
| una idiopathica, & alia sympathica.                                                      | 180        |     | valent ad præcavendam arthritidem.                                 | 416        |
| Vertigo idiopathicæ epilepsiæ aut apoplexiæ prænumbia.                                   | ibid.      |     | Vini immoderatus usus stuporem & paralyfin inducit.                | 165        |
| Vertiginis sympathicæ signa distinctiva.                                                 | ibid.      |     | Vinum euphrasiatum in gutta serena.                                | 197        |
| Vervicis omentum & pulmo ad pleuritidem.                                                 | 251        |     | purgans in asthmate.                                               | 247        |
| Vesicatoria medicamenta.                                                                 | 150        |     | Vinum in ophthalmia quando conveniat.                              | 209        |
| Vesicatorium.                                                                            | 158        |     | Hippocraticum ad calefaciendum stomachum.                          | 274        |
| Vesicæ effectus.                                                                         | 344        |     | chalybeatum in obstructionibus contumacibus solvendis.             | 322        |
| Vesicæ excrementum proprium materia mucilaginosâ.                                        | 345        |     | hydragogum ad hydropis curationem & diureticum.                    | 326        |
| Vesicæ calculus.                                                                         | 352        |     | Vini aciduli laus in præservatione à calculo.                      | 351        |
| Vesicæ inflammatio.                                                                      | 355        |     | Vinum omnium fluxionum vehiculum est maximum.                      | 436        |
| causæ.                                                                                   | 356        |     | medicamentum ad febrem quartanam.                                  | 442        |
| signa, ibid. curatio.                                                                    | ibid.      |     | omnium cardiacorum potentissimum.                                  | 458        |
| solvitur aliquando erysipelate in cute oborto.                                           | ibid.      |     | Vinum helleboratum in mania.                                       | 187        |
| topica quæ admovenda.                                                                    | ibid.      |     | alkekengi ad calculum.                                             | 349. & 350 |
| in principio non convenit purgatio.                                                      | ibid.      |     | ad suppressionem urinæ.                                            | 365        |
| Vesicæ ulcus.                                                                            | 358        |     | Vini calidi usus in intemperie ventriculi frigida.                 | 275        |
| signa.                                                                                   | ibid.      |     | an conveniat in gutta serena.                                      | 196        |
| curatio.                                                                                 | 359        |     | meracum famem caninam solvit.                                      | 276        |
| in senibus non curatur.                                                                  | 360        |     | Viperæ caro, cor & hepar exsiccata, virtute pollent alexipharmaca. | 457        |
| exsiccantia adstringentia, & glutinantia, & consolidantia quomodo conveniant.            | ibid.      |     | Virgæ caruncula.                                                   | 488        |
| injectiones peculiariter conveniunt.                                                     | 361        |     | Virgines quomodo effœminandæ, ut aptæ reddantur generationi.       | 397        |
| Vesicæ calculo pueri, senes calculo renum cur magis obnoxii.                             | 352        |     | Virginibus chlorosi laborantibus cur familiaris pica.              | 367 & 368  |
| Vesica inflammata cur phlebotomia è parte dextra cele-                                   |            |     | Virginibus pessaria, nec clystères uterini præscribendi.           | 200        |
|                                                                                          |            |     | Viri magis obnoxii angina, quam fœminæ.                            | 241        |



# Index Rerum

|                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Virium imbecillitas in quo differat à syncope.                                                                                                        | pag. 269    | Voluntarii motus symptomata.                                                                                                                                                                                                                                                                  | pag. 166   |
| causæ, & curatio.                                                                                                                                     | ibid. & 270 | Volvulus quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 295        |
| Viscerum obstructorum signum, hypochondriorum gravitas, seu satietas.                                                                                 | 321         | Vomica pulmonis derepente rupta multos è medio sustulit.                                                                                                                                                                                                                                      | 259        |
| Viscus quercinus specificus in epilepsia.                                                                                                             | 177         | Vomitória in affectibus soporis.                                                                                                                                                                                                                                                              | 166        |
| Visibilia objecta cur duplicia appareant.                                                                                                             | 198         | in paralyfi.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172        |
| cur inversa aut curva appareant.                                                                                                                      | ibid.       | asthinate.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 246        |
| cur fenestrata appareant.                                                                                                                             | ibid.       | Vomitus quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 281        |
| Visio læditur imminutè, abolitè, & depravatè.                                                                                                         | 197         | in quo differat à nausea. ibid. differentia. ibid. lethalis ab esu fungorum. 282. ex caleo putri magna copia comesto. ibid. imminentis signa. ibid. alvi profluvio laboranti superveniens salutaris. ibid. bonus vel malus quibus signis dignoscatur. ibid. biliosi curatio. ibid. pituitosi. | 284        |
| Visioni lumen necessarium in mediocri quantitate receptum.                                                                                            | 40          | Vomitui vehementissimo narcotica admixta purgantibus profunt.                                                                                                                                                                                                                                 | 282. & 283 |
| Visus quid.                                                                                                                                           | 23          | Vomitus sanguinis. 283. causæ. ibid. curatio.                                                                                                                                                                                                                                                 | 282        |
| Visu signa lethalia.                                                                                                                                  | 66          | quæ victus ratio conveniat. ibid. purgantia.                                                                                                                                                                                                                                                  | 286        |
| Visum conservantia specilla.                                                                                                                          | 203         | Vomitorium blandum in calculo renum. 338. in diabete.                                                                                                                                                                                                                                         | 361        |
| Vitalis facultas quid sit.                                                                                                                            | 21          | Vomitus utilitas in renum & vesicæ ulceribus.                                                                                                                                                                                                                                                 | 359        |
| Quid eidem ministret.                                                                                                                                 | ibid.       | in menstruis immodicè fluentibus.                                                                                                                                                                                                                                                             | 372        |
| Vitalis spiritus quis, & ubi generetur.                                                                                                               | 14          | fluore muliebri.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 376        |
| Vitam quomodo definiat Aristoteles.                                                                                                                   | 14          | Vomitorium in hysterica passione.                                                                                                                                                                                                                                                             | 383        |
| Vitellina bilis quid.                                                                                                                                 | 10          | in uteri inflammatione minimè convenit.                                                                                                                                                                                                                                                       | 385        |
| Vitellina bilis unde procreetur.                                                                                                                      | 57          | ad purgandam bilem in ventriculo.                                                                                                                                                                                                                                                             | 434        |
| Vitrea pituita.                                                                                                                                       | 12          | in principio accessionis in febre quartanâ exhibenda.                                                                                                                                                                                                                                         | 446        |
| Vitrei humoris affectus.                                                                                                                              | 198         | Vomitorium triplex gradus.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 431        |
| Vitriolum album hæmorrhagiam potenter cohibet.                                                                                                        | 230         | Vomitorium.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153        |
| Vitrioli oleum ad phthisim commendatur.                                                                                                               | 264         | Vomitória medicamenta.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139        |
| Vitriolum album, & sal ex vitriolo ad vomitum.                                                                                                        | 284         | Vomitus in prægnantibus, sanguinis missione curandus.                                                                                                                                                                                                                                         | 399        |
| oleum seu spiritus ad obstructions contumaces.                                                                                                        | 312         | in arthritidis prophylaxi usurpandus.                                                                                                                                                                                                                                                         | 417        |
| Vitrioli martis usus in melancholia hypochondriaca, illiusque præparatio.                                                                             | 337         | quando melius succedat. ibid. ex quibus componendus.                                                                                                                                                                                                                                          | 431        |
| in hysterica passione.                                                                                                                                | 383         | ibid. utilitas in febris putridis continuis.                                                                                                                                                                                                                                                  | 438        |
| Vitrioli oleum & spiritus, vide Spiritus vitrioli.                                                                                                    |             | intermittente.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 438        |
| Vitriolum album & sal vitrioli vomitoria in tertiana intermittente.                                                                                   | 437         | Vomitus in febre maligna, & curatio.                                                                                                                                                                                                                                                          | 288        |
| Vitriolorum laus in omni putredine & malignitate.                                                                                                     | 456         | Vomitus sanguinis.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 474        |
| Vitulina caro.                                                                                                                                        | 108         | Vomitus in febre maligna.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 470. & 515 |
| Ulcus quid.                                                                                                                                           | 51          | Vomitus contumacissimus.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 504        |
| Ulcus in corde.                                                                                                                                       | 490         | Vomitus antiquus.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 332        |
| Ulcus gingivarum.                                                                                                                                     | 507         | Vomitus sanguinis ab hausta in potu hirudine.                                                                                                                                                                                                                                                 | 641        |
| Ulcus cum ossis carie.                                                                                                                                | 508         | Vomitus ad cholera morbum accedens.                                                                                                                                                                                                                                                           | 543        |
| Ulcus cancrosum.                                                                                                                                      | 520         | Vomitus horrendus.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 559        |
| Ulcus fistulosum.                                                                                                                                     | 562         | Vomitus frequens quid arguat.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54         |
| Ulcus sinuosum.                                                                                                                                       | 571         | Vomitus mali signa.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77. & 78   |
| Ulcus renum.                                                                                                                                          | 581         | Vomitus instantis signa.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92         |
| Ulcus verminosum.                                                                                                                                     | 591         | Voraces melancholici.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49         |
| Ulceræ circumglabra maligna.                                                                                                                          | 56          | Urinæ signa.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54         |
| Ulceris à variolis in faucibus excitati curatio.                                                                                                      | 464         | Urinæ morbi acuti indices.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57         |
| Ulceræ phagedænica quæ.                                                                                                                               | 275         | Urinæ sanæ in febre non levi malignæ.                                                                                                                                                                                                                                                         | 56         |
| Ulcus narium curatio.                                                                                                                                 | 222. & 223  | Urina quæ mala.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80. & 81   |
| Ulceræ narium exsiccantia.                                                                                                                            | 223         | per urinas evacuatio.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132        |
| variolarum cicatricibus impleendis. 464. ad ulceræ maligna à variolis excitata. 465. ad scirrhum uteri.                                               | 388         | Urinæ medicamenta.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144        |
| foetum mortuum excludens.                                                                                                                             | 405         | Urinæ suppressio.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 467. & 490 |
| in hæmorrhoidum fluxu immodico.                                                                                                                       | 312         | Urinæ suppressio à caruncula virgæ.                                                                                                                                                                                                                                                           | 488        |
| Unguentum.                                                                                                                                            | 138         | Urina cur in phrenitide aliquando supprimatur.                                                                                                                                                                                                                                                | 184        |
| Unguenta ad spinam dorsii inungendam in paralyfi.                                                                                                     | 126         | Eam provocantia.                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.      |
| in ophthalmia.                                                                                                                                        | 172         | Urinarum critica profusio quibus contingat.                                                                                                                                                                                                                                                   | 298        |
| in suffusione.                                                                                                                                        | 202         | Urina crassa & rubra cur appareat. 280. crassæ, rubræ & turbidæ causa in melancholia hypochondr.                                                                                                                                                                                              | 335        |
| Unguentum resolvens ad arthritidem.                                                                                                                   | 244         | suppressa à calculo quid agendum.                                                                                                                                                                                                                                                             | 356        |
| Ad dolorem ischiadicum.                                                                                                                               | 418         | Urinarum bullæ à qua causa fiant.                                                                                                                                                                                                                                                             | 341. & 348 |
| detergens.                                                                                                                                            | 410         | filamenta ad quid referri debeant.                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.      |
| Unguento mercuriali catacacta curata.                                                                                                                 | 202         | Urinæ paucitas in hydropicis mala. 329. cruentarum causæ.                                                                                                                                                                                                                                     | 357        |
| ophthalmia desperata.                                                                                                                                 | 209         | Urinæ incontinentia.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 362        |
| Unguentum ventriculum roborans.                                                                                                                       | 272. & 273  | causæ. ibid. signa causarum. 361. incontinentia, & suppressio quomodo ab eadem causa producantur. ibid.                                                                                                                                                                                       | ibid.      |
| in alvi fluxu.                                                                                                                                        | 308. & 309  | specificæ. ibid. potus conveniens. ibid. in senibus incurabilis.                                                                                                                                                                                                                              | ibid.      |
| hepar deobstruens.                                                                                                                                    | 311         | Urinæ suppressio si septimum diem excedat, lethalis.                                                                                                                                                                                                                                          | 364        |
| de artanita pro inunctione totius ventris in verminibus. 310. hepar refrigerantia. 318. & 319. ad lienis scirrhum. 334. ad renum ulcera consolidanda. | 359         | à calculo quomodo auferenda.                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibid.      |
| ad abortum præcavendum. 402. ad sudores symptomáticos cohibendos.                                                                                     | 436         | Urinæ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Unguis oculi in quo differat à panniculo.                                                                                                             | 214         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| causæ differentia. ibid. curatio. ibid. aucta & jam inveterata, sola manuali operatione curatur.                                                      | ibid.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Vocem articulatam cur non edant surdi ab ortu.                                                                                                        | 215         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |



## & Verborum.

|                                                               |       |                                                             |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Urinæ ardor. pag. 365. causæ. ibid. signa causerum. ibid.     | 366   | Uteri hydrops duplex.                                       | ibid. |
| curatio.                                                      | 366   | in uteri cavitate quomodo flatus & humores continen-        | ibid. |
| Urinæ acrimonia interdum inducitur à materia alba &           | 365   | tur. ibid. & 391. inflationis & hydropis causæ. ibid.       | 391   |
| quasi lactea cum urina copiosè emissa.                        | ibid. | quomodo ab hydrope universali, aliis uteri tumoribus        | 391   |
| ejusdem materia, & causa.                                     | 411   | graviditate & mola distinguatur.                            | ibid. |
| Urinarum copiosa profusio ab insolatu unde.                   | 450   | Uterus qualis in muliere, tale est ut plurimum reliquum     | ibid. |
| Urina in febre pestulenti aliquando urinæ sanorum similis.    | 453   | corpus.                                                     | ibid. |
| ex urinis in eadem febre prognosis increta.                   | 430   | Uteri hydrops qui periculosior. ibid. vomitoria cur con-    | ibid. |
| Urinæ nigra in quartana bonæ.                                 | 433   | venient. 392. inflationi suffitus nucis moschatæ maxi-      | ibid. |
| Urinam provocantia in febri continuæ declinatione.            | 230   | me conducit.                                                | 394   |
| Urticæ succus in sistendo sanguine.                           | 325   | Uteri procidentia. ibid. differentiæ, & causæ. ibid. & 393. | ibid. |
| fluxu hepatico. 308. in ictero.                               | 373   | signa. ibid. quæ incommoda sequatur. ibid. quomodo          | 394   |
| Urtica mortua specifica lieni scirrhuso. 333. urticæ suc-     | 248   | reponendus.                                                 | ibid. |
| cus fluxum mensium immodicum sistit.                          | 172   | quomodo continendus.                                        | ibid. |
| Urtica contusa, maxillæ admota, cito dentium dolorem          | 374   | Uteri clausura. 395. causæ dignotio. ibid. curatio. ibid.   | 395   |
| solvit. 249. radices decoctum ore detentum.                   | 119   | quæ curabilis. ibid. curatio à Chirurgia maxima ex          | ibid. |
| Urticis viridibus membrum resolutum percutiendum.             | 18    | parte petitur.                                              | ibid. |
| Urtica cocta in sartagine pubis regioni admota, ad fluxum     | 347   | Uterus disruptus ex partu laborioso. 405. cur semen non     | 395   |
| mensium immoderatum.                                          | 370   | excipiat.                                                   | 395   |
| Uusus veneris quibus magis noceat.                            | 378   | Uteri acetabula dissolventia. 401. roborantia, exsiccantia, | 398   |
| Uusus partium quid.                                           | 379   | expurgantia.                                                | 107   |
| Uterus quomodo crassescat in prægnantibus.                    | 473   | Uvæ.                                                        | 212   |
| proprium excrementum est fluor albus. ibid. corporis          | 557   | Uvæ tunicæ affectus. 202. & 203. procidentia, differen-     | 387   |
| totius sentina ac cloaca à nonnullis nominatus. 370           | 578   | tia, signa, curatio.                                        | ibid. |
| sexcentarum ærumnarum innumerarumque calamita-                | 384   | Vulnerarium decoctum.                                       | 147   |
| tum author est. 378. utrum ad umbilicum & partes              | 386   | Vulnerarium decoctum, aqua catapultarum dictus. ibid.       | 30    |
| superiores ascendat.                                          | ibid. | Vulneraria medicamenta.                                     | 33    |
| Uteri scirrhus.                                               | 387   | Vulnus quid sit.                                            | 520   |
| Uteri dolores.                                                | 386   | in Vulneribus computatio dierum quando fieri debeat.        | 524   |
| Uteri prolapsus.                                              | ibid. | Vulnus contusum.                                            | 556   |
| Uteri inflammatio.                                            | 386   | Vulnus in brachio curatu difficile.                         | 569   |
| differentia. ibid. causæ. 375. signa & curatio. ibid.         | 387   | Vulnerum prognosis.                                         | 571   |
| & quomodo distinguatur à velicæ & intestini recti in-         | 386   | Vulnus contusum.                                            | 576   |
| flammatione. ibid. ut plurimum lethalis. ibid. suppu-         | ibid. | Vulnus capitis cum contusione.                              | 577   |
| rans ægram lenta febre absumit.                               | 388   | Vulnus in pectore.                                          | 579   |
| Uteri ulcus.                                                  | ibid. | Vulnus sclopeti.                                            | ibid. |
| causæ. ibid. differentiæ. ibid. signa. ibid. curatio.         | 387   | Vulnus contusum in oculo.                                   | 680   |
| quando præcipuè conveniat sanguinis missio.                   | 386   | Vulnus cariosum in flerno.                                  | 681   |
| qua methodo fuerit curatum. ibid. detergentia, exsic-         | ibid. | Vulnus asperæ arteriæ ex sclopeto.                          | 584   |
| cantia & consolidantia.                                       | 388   | Vulnus thoracis curatu difficile.                           | 190   |
| Uteri ulceris, cui succedit fistula, curatio. ibid. à lue ve- | ibid. | Vulnus vesicæ ex sclopeto.                                  | 240   |
| nerea curatio.                                                | 388   | Vulturis pellis ventrem calefacit.                          | ibid. |
| Uteri scirrhus.                                               | 389   | Uvulæ relaxatæ causæ & curatio.                             | ibid. |
| causa, signa. ibid. differentiæ. ibid. curatio.               | ibid. | cautiones.                                                  | ibid. |
| quomodo à mala distinguatur.                                  | ibid. |                                                             |       |
| Uteri cancer.                                                 | 389   |                                                             |       |
| causa, signa. ibid. curatio. ibid. cur incurabilis.           | ibid. |                                                             |       |
| curatio palliativa. ibid. specifica.                          | ibid. |                                                             |       |
| Uteri gangrena & sphacelus. ibid. causæ, signa.               | ibid. |                                                             |       |
| curatio. 390. curatæ exemplum insigne.                        | ibid. |                                                             |       |
| Uterus auferri potest cum incolumitate mulieris.              | ibid. |                                                             |       |
| Uteri inflatio in quo differat ab hydrope.                    | ibid. |                                                             |       |

Y

Y

Z

Z Edoaria ventriculum roborat.  
Zinziber.

274  
111

F I N I S.

SIT GLORIA DEO.

F E R D.








FERD. CAROLI  
WEINHART  
MEDICUS  
OFFICIOSUS,  
*Cum INDICIBUS necessariis.*



W E I N H A R T  
M E D I C I N E  
D E P O S I T  
C O M M I S S I O N E R  
P H I L A D E L P H I A





## TYPOGRAPHI AD LECTOREM.



**C**REDIDIMUS, Nos Medicorum Filiis non parum gratificaturos; si Clariss. Lazari Riverii accuratissimis Operibus, Celeberrimi Ferdin. Caroli Weinhart, Medici Cæsar. Medicum Officiosum adjungeremus: Quò scilicet, ab Illò Medicinæ Theoriam ac Praxim edocti, ab Hòc continuò ediscere possent, quomodo in Doctrinæ conquisitæ exercitiò, se gerere deberent; tum ratione Sui Ipsorum; tum ratione Aegrorum sibi commissorum; tum ratione eorum qui Aëgris, pro variis ministeriis adsunt; tum ratione Medicorum in curâ adjunctorum, aut aliorum in Consultationes advocatorum: Ac præterea instruerentur de Cautionibus observandis, in exhibitione ac administratione omnis prorsus generis Medicamentorum; ut & de examine Morborum, eorumque Diagnosi, Prognosi &c. Quibus etiam adjunctas reperirent non paucas remediorum Formulas præstantiores, unde ipsis eligere liceret quod accommodatius videretur in casibus, quibus curandis insudant. De his omnibus plenius, quamvis paulò modestius, Autor noster in Præfatione Operi præfixâ; ut & splendida adprobationes Theologicæ & Medicæ, quibus largè præmunitum prodit. Illud tantum desiderandum fuisset; quòd omnes Remediorum Signaturæ, Latinè conscriptæ, non verò Germanicè, exhiberentur; quòdque hæ Formulæ emaculatiores productæ fuissent. Verum primo articulo mereri potest, ab unâ parte, ipsius Remedii Titulus latinus; ab alterâ, compositionis ejusdem attenta consideratio. Secundo autem articulo abundè providimus, per correctiones accuratissimas, à Medicis Doctissimis, magnò studio, ac amicissimè institutas. Vale Lector Humanissime; utilissimòque, ut præmemoratis Medicis Doctissimis visus est, thesaurò, frui, ac eò nitidiore, quàm prius fuerat, jam redditò, non mediocri cum emolumentò, utere.



### APPROBATIO THEOLOGICA.

**O**fficiosus hic Medicus tantæ est excellentiæ, ut Methodo, & doctrinæ claritate publicam omnino lucem mereatur: præsertim cum nihil orthodoxæ fidei, aut bonis moribus contrarium contineat, sed aphorismos & arcana medica debita cum modestiâ ita proponat, ut, dum prodesse quærit corpori, animo nihil interim periculi, sed multum potiùs honestæ asserat delectationis, tam eruditâ lectione hauriendæ. Ita censeo

GEORGIUS TONAUER S. J. S. S. Theol. Doct. & Profess. Ord. p. t. Decan.

### APPROBATIO MEDICA.

**U**T sedulus virtutum sectator, vitiorumque exstirpator Medicus, in morborum debellatione pariter ac sanitatis conservatione, Officio suo ritè defungatur, hunc sub Medici Officiosi titulo Tractatum accipiat ductorem comitemque fidelissimum. Venerabitur certe ejus Autorem, Prænobilem & Magnificum Incl. Facultatis Medicæ Seniore, utpote plurimis, quibus claro Eruditorum orbi innotuit, scriptis clarissimum. Quæ uti multis jamdudum prælucent, ita præsentem Tractatum veris innixum principiis, scientiâ firma, fidaque rerum experienciâ roboratum, judicio exin solido, accuratâ methodò, & gratâ concinnitate compositum, censeo dignissimum, qui cunctis, per impressionis lucem, salutem cedat certissimæ.

THEOD. FRID. STATLENDER, Med. D. & Prof. Ord. ac Phys. Qenipont.

PRÆ





## P R Æ F A T I O.



Q TAVUS propemodum effluxit annus, quo publicam in lucem edidi Enchiridion Novum, continens Systema seu Nucleum universæ Medicinæ Practicæ, quod præter meritum apud Philiatros gratiam invenit, ut exemplaria ejus jam passim hinc inde distracta, adhuc avidè à me expetantur. Cum verò in prædictis The-  
sibus nonnulli desiderarent remediorum Formulas, quoad Dosis expressas (quod à me tunc omis-  
sum, ne Enchiridion in librum excre-  
sceret, cum Artis Medicæ summa per-  
fectio sit, concinna & debita formularum compositio, ac plurimum difficile sit, semper ex  
tempore Medicamentum gratum, ac debitè compositum & aptum præscribere, præsertim  
Neo practicis, & qui in Praxi Medicinæ non diu & multùm exercitati fuerunt, vel memo-  
riam minùs firmam ac felicem obtinuerunt) ideò, ut & his satisfaciam, ac cunctis me offi-  
ciosum exhibeam, præsentibus his Thesis selectas remediorum Formulas proponere volui,  
non quidem dubias & incertas, sed diuturna experienciâ & longo usu veluti canonizatas,  
quas tum propria viginti septem annorum, tum peritissimorum Classicorum & in arte Me-  
dica consummatorum Authorum praxis suppeditavit. Inter vivos, honoris ac filialis gratitu-  
dinis ergo, nomino, Colendissimum Dom. Parentem meum *Paulum*, olim Serenissimi Ar-  
chiducis Ferdinandi Caroli &c. &c. Archiatrum, nunc Excelsorum Dicasteriorum Physicum,  
quem Deus post 80. ætatis annum feliciter ac sanè consummatum, ulteriùs sospitem & in-  
columem, quàm diutissimè conserve-  
ret. Inter defunctos D. Patrum meum *Casparum Wein-  
hart*, olim Serenissimi Archiducis Sigismundi Francisci &c. &c. Personæ Medicum: hinc patiter  
& Excelsorum Dicasteriorum Physicum, post 68. ætatis annum è vivis ereptum. Item Avum  
meum *Paulum* quoque nomine, olim Marchionis Burgaviensis, hinc Serenissimorum Princi-  
pum Ferdinandi Caroli, Sigismundi Francisci, Claræ Isabellæ, & Leopoldinæ Protomedi-  
cum, post 75. ætatis annum piissimè in D. defunctum. Tandem etiam Avum meum Mater-  
næ lineæ, *Gerardum Schlaarmacher*, olim Serenissimi Archiducis Leopoldi, ac Claudie Aulæ  
Medicum, post 64. circiter ætatis annum è vita decedentem. Ne autem prædicta remedia  
Empyricè & promiscue in usum trahantur, addidi Cautelas ac generalem & aphoristicam  
Methodum, quâ cuncta remediorum genera ex fonte chirurgico, pharmaceutico & diæte-  
tico derivata, decenter, & juxta normam artis, pro circumstantiarum varietate ac morbo-  
rum depulsione usurpari possint. Non enim hic expectare oportet arcana & secreta (nomi-  
na apud Medicos rationales, quibus apertæ & candidæ Musarum januæ, exosa & incognita)  
sed vulgaria, & in praxi trita, quæ tamen, si debitè ac Methodicè applicaveris, & morbum  
cognoveris, in quibus duobus verum Medicinæ arcanum continetur, abundè sufficient, ad  
morbos quoscunque depellendos. Præmisi tandem in principio Generalia quædam ad Medici  
Officium spectantia, quæ passim in libris Medicis haud obvia, à me tamen tum per expe-  
rientiam, tum per frequentem lectionem, in proprium usum conscripta & annotata, quæ-  
que singulariter virtutem, scientiam & prudentiam Medici, in quibus perfectio artis consi-  
stet, respiciunt, ut ad illam pro viribus aspirarem, ac in statu meo me perficerem. Cum au-  
tem ab eadem quàm longissimè me adhuc abesse, ingenue fateri necesse habeam, aliis inter-  
rim conatum hunc meum communicare volui, ut saltem

---- *fungar vice cotis, acutum*

*Reddere quæ ferrum solet, excors ipsa secandi.*

Cedat qualiscunque hæc mea industria, ad DEI solius Gloriam, Medicæ Juventutis uti-  
litatem, ac Proximi ægrotantis unicam salutem.





# M E D I C U S O F F I C I O S U S.



## C A P U T I.

### De Officiô Medici in genere.

#### A R T I C U L U S I.

##### De Religione & Virtutibus Medici.

###### I.

**U**m, teste *Ecclesiast.* c. 38. à Deo omnis medela, & Medicus quidem ægrum curet, sed Deus sanat: sit etiam Medicina peculiare Paracleti donum, teste Divô Paulô ad 1. Cor. c. 12. alii quidem per Spiritum datur sermo Sapientiæ: alii autem sermo Scientiæ secundum eundem Spiritum: alteri Fides in eodem Spiritu: alii gratia Sanitatum in eodem Spiritu &c. Medicus inprimis Divini Numinis cultor sit, per veram & orthodoxam Religionem catholicam.

###### II.

Unica ejus cynosura sit gloria Dei, ac salus proximi; lemma & suprema lex sit: *Deum colere, neminem ledere, ac omnibus velle prodesse.* Provinciam suam Medicus à Divina providentia, per legitimam vocationem humeris suis impositam, attentâ sollicitudine, ac sollicitâ attentione administret, & Divinum spectando obsequium salutis ac perfectionis suæ céntrum, in officii ac muneris sui partibus, ad divinæ voluntatis amissum, purâ intentione peractis collocet, cogitans, se redditurum aliquando desuper severissimam rationem, in magnô totius orbis conventû, ac sabbathô sempiternô.

###### III.

Veneretur ac imitetur Medicus pro Viribus, S. S. Coelites Medicos, & quidem mense Januariô die XXXI. S. Cyrum Alexandrinum, Februariô die XXV. S. Cæsareum, B. Gregorii Nazianzeni fratrem. XXVIII. S. Dionysium Diaconum. Martiô die X. S. Codratum Corinthium. XV. B. Joachimum Japonensem. April. die XII. S. Papilum Diaconum. Majô die III. Juvenalem. VI. S. Joannem Damascenum. Juniô II. S. Alexandrum Martyrem. XIX. S. Ursinum. XXVI. S. Samsouem Presbyterum. Juliô XV. S. Antiochum. XVII. S. Pantaleonem. Augustô die XVI. S. Diomedem. XX. S. S. Leontium & Carpophorum. XXII. S. Philippum Benitium Florentinum. XXV. S. Genadium. Septembri die XXVI. S. S. Cosinum & Damianum. Octobri die XVIII. S. Lucam Evangelistam. XXX. S. Zenobium. Novembri

die II. S. Theodotum. IX. S. Orestem. Decembri die VI. S. Æmilianum &c.

###### IV.

Loquendô de Virtutibus cardinalibus, ac inprimis de *Temperantiâ*, Medicus sit 1. *castus*, præsertim gynæcei, sequiorisque sexûs curam gerens; hinc apud Lacedæmonios Æsculapii simulachrum ex agno casto fuit. 2. Sit *sobrius*, ut ad invisendos ægros, eisque opem ferendam, quâcunque diei ac noctis horâ promptus, paratus, ac sui juris sit. 3. *Taciturnus*, ne vel occulta artis mysteria, vel secretiora ægrorum mala, aut alia extra limen minimè evulganda, plenis buccis ubique effutiat; hinc Medicina *nuta* dicitur, ac Ægyptii in *Isidis* & *Serapidis* templis præsidium Deorum Medicinæ, apud ipsos *Harpocratem* silentii Deum, labia digito comprimentem adorarunt. 4. Sit *modestus*, ac moribus honestis elegans, cui pietas curæ, dilectio cordi, compassionis sensus carus, ac præcipuè *Manfuetudo* familiaris, ac humanus affectus suavis sit. Hinc in Delô, simulachro Apollinis Charites additæ sunt, citharam, tibias & fistulam manibus tenentes; non tantum ad Musices & carminis inventionem denotandam, verum etiam, quod deceat, Medicum esse humanum, gratiosum & affabilem.

###### V.

Loquendo de *Fortitudine*, Medicus 1. Sit *fortis* ac intrepidus ad labores quoscunque tolerandos, utpote ægotantium salutis totus mancipatus. 2. Sit *fortis* ad Momorum calumnias, ad artis osorum & contemptorum scommata, sarcasmos, ac commentitias cavillationes, aliâque Medicum ferientia ab infirmis, adstantibus, aut aliis subinde prolata, æquô animô ferenda: gnarus celare cordis æstus, invitumque multa dissimulare. 3. *Fortis* & cordatus in debellandis morbis, ut non agat vel nimis tumidè, vel nimis timidè, ut nec temerè audeat, nec inconsultè timeat: ut ingruentes difficultates ac periculorum & impedimentorum Iliadem generosè vincat. 4. *Fortis* tandem, ut sit communis Utilitatis amator, privatae oblitus, Patientes vel sæpius impatientes visitando patiens, adversus mollia durus, in arduis fidens, in gerendis magnanimus, in gestis modestus, in adversis constans, in secundis temperatus, ac in omnibus invictus.

###### VI.

Loquendo de *Justitia*, Medicus quoque æquitatis fidissimus sit custos, suum cuique tribuens; sitque 1. Erga omnes comis, cunctis officiosus, nulli onerosus, affinis facilis, fociis amabilis, reliquis urbanus, languentibus placidus, ad similes familiaris. 2. Sit de-

A

votus



votus ad Deum, benignus in proximum, liberalis in egenos, promptus ad concordiam, sobrius ad mundum. 3. Sit Domini servus, proximi socius, ac mundi Dominus, superiora habens ad gaudium, æqualia ad consortium, inferiora ad servitium. 4. Laudet bonos, malos toleret, minori indulgeat, majori cedat, studeat omnibus prolesse, nocere nulli.

## VII.

Loquendo tandem de *Prudentia*, *Galen. l. 8. meth. med. c. 9.* Medicum natura prudentem desiderat. Cum autem à peritissimis Sophiæ cultoribus duplex statuatur prudentia, quarum una ad vitam juxta virtutum ac rationis normam legitime instituendam: altera verò ad artem præcepta prudenter, ac debito modo loci, temporis, ac personarum circumstantiis, singulisque eventibus rite accommodanda, habilem ac idoneum reddit, utraque planè in Medico Practico quàm maximè expetit: prima, quia Virtutum ceterarum dux, princeps, moderatrix ac architecta, & quia quasi complexus, omnis perfectionis, ac compendium omnis felicitatis: altera, quia hâc duce, & luce utendum in difficili planè Microcosmi imperio, ne ceteroquin, per vias tot occasionum variarum præcipitiis infestas, tot difficultatum sentibus obductas, tot arduarum quæstionum gurgitibus intercasas, tot millenarum circumstantiarum labyrinthis implicatas, frequentius laborare, hærare, cespitare ac labi, necesse habeat Medicus. Unde haud immerito apud Syros mos obtinuit, ut Apollo pingeretur barbatus, ad innuendam nempe prudentiam, quæ in Medico requiritur, ac ætatis decursu inprimis possidetur, in quem finem etiam veneranda antiquitas, simulachro Apollinis serpentem addidit, pro symbolo nimirum prudentiæ.

## VIII.

Præter Vicia, Virtutibus supra dictis opposita, Medicus inprimis vitare studeat *invidiam*, cavendo, ne alterius ingenium, doctrinam, eruditionem, praxin uberiores, feliciores inibi successus, frequentius auditorium, favorem civium, superiorum gratiam, fiduciam ægrorum, honores ac exultationem canino dente rodât: de libris ac thesibus sinistrè ac frivole judicet, Collegæ sui votum præ livore singillet, remediâ formulam prudenter & ex lege artis præscriptam, calumniosè improbet: eum morbum non intellexisse, in causâ hallucinatum, nec legioni à utrum fuisse curandi methodo, ægris & adstantibus clanculariè & nefandè instillet, sicque famam ejus, virulentâ detractatione laceret. Item, ne arcana sua, earumque singularem chyrotechniam, invidiosè celet.

## IX.

Vitet insuper *avaritiam*, cavendo, ne non tam Medici, id est, artis Medicæ gratiâ, quàm propter velut aureum vela faciat, ne Vulturis instar lucris ac rapinæ inhiantis, ægros continuis suis peritionibus, exactionibus, & pactis ab insigni vel sorditie, vel pluriophilia profectis, friget ac exhauriat: ne lucri cupidine in extremam turpitudinem adactus, largiora præmia ac stipendia sperans, morbos ægrotantium protrahat, vel morbum levem ita periculosum exaggeret, extendat ac amplificet, ut sub facie auxiliandi, praxin depilandî; loculosque emungendi exerceat: ne experienciolas aliquas nullis forsitan rationibus innixas, vel secreta opinativa & imaginaria, empiricò supercilio ac hyperbolicò præconiò decantans, perquam studiosè veler, celet ac custodiat, ut ægri, etiam datò copiosò aurò, ab eò talia remedia velut ex captivitate redimere necesse habeant: ne cum Pharmacopœis concors, partiatur lucrum, levissimò in morbo pretiosissima præscribens medicamenta: ne tandem auri fulgore excæcatus, eò protervitas, petulantia ac perversitatis perveniat, ut venena propinet, abortum procuret, sterilitatem inducat, falsimonium fide jurata probet, aliaque christianò Medico indigna & scelestâ committat.

## X.

Tandem detestetur Medicus *superbiam*, cavendo, nè eò deveniat arrogantia, ut alios suos Collegas tanquam volitantes umbras ex altò despiciat, ac se solum ceterorum exemplum, artis Hippocraticæ canonem & archetypum, vanâ ostentatione arbitretur, ne aliorum curationes, vel consultationes reprehendendo, gloriam, ac rixis & altercationibus unicam sibi laudem, ac pompam comparare studeat: ne remedia, levis licet pretii, nec adeo difficilis compositionis, pro secretis, singulari studio, diuturnis laboribus, vigiliis ac sudoribus, maximisque sumptibus comparatis jactet, vendat, sicque popularem plausum ac fumum captet: ne statulento superbiæ halitu distentus, omnia celet, & non nisi arcana arcanissima crepet: ne plurimarum felicissimarum & inauditarum curationum à se factarum, proprius ac vanus sit buccinator: ne tandem se uberiores naturæ, animi, fortunæque muneribus præcellere, veram Palladis artem agere, neque censore, neque alterius ope indigere, falsò sibi persuadeat: sicque nimirum sibi fidens, etiam in gravioribus periculis, alios sibi adjungi, non modò non possulet, verum etiam oblatos repudiet.

## ARTICULUS II.

*De Scientiis ac Disciplinis Medico necessariis.*

## I.

**L**ingua latinâ, quæ fidissima scientiarum interpret, basis ac radix, Medicus nec sine magna turpitudine, nec sine artis dispendio, carere potest, cui, si comitem addiderit *græcam*, ut saluberrimas doctrinæ Medicæ undas ex *Hippocr. Galenò, Aëtio, Alexandrinò, Aeginetâ, Oribasio, Dioscoridè &c.* aliisque velut ex originariis fontibus haurire, gustare, ac vim vocis, dictionis nucleum, latentemque energiam melius percipere valeat, imitabitur ingeniosissimum illum virum, qui Romanam & Græciam dissidentes, manus tamen invicem jungentes pinxit, additò lenitate; *conspirant amici.*

## II.

Ad *Poesin*, non quidem lascivam illam turpium morum illicem, quæ venenum melle conditum lectitantibus nefandè instillat, sed castam & eruditam, Medico subinde divertere licebit, horis præcipuè succisivis, eamque non quidem ut civem, sed peregrinam tractare, tum, ut animi laxandi causâ delectabile ejus viretum peragrandò, moralium flores & fructus carpat: tum, ut apud ægros, atque etiam in Regum, Principum, Magnatumque sinu, ac sapientiorum quorumque congressu, quin & in disceptatione sacrorum, moralium, profanorumque & philosophantium sermone, sententias ejus magna cum laude, ac præsigni & efficaci ad bonam frugem exhortatione, vel honestâ delectatione proferre possit: tum ut eloquentiam suam, quæ *Marcò Tullio* teste, absque Poësificâ & imperfecta est, uberrimis Poëtarum fontibus irrigare, sermonemque suum sententiis verbisque Poëticis, non quidem affatim & ad nauseam, sed condimenti loco tantum appositis, ac in tempore prolatis, quasi luminibus ac stellulis illustrare possit.

## III.

*Eloquentia* eruditione munita, non tam decora & elegans est in Medico, quàm etiam suo modò necessaria, tum in Cathedris ad artis decorem ostentandum, ad opes ejus amplissimas in mediam lucem proferendas, & salutem ac sanitatem ægrotantium promovendam: tum in consultationibus publicis ineundis, ad mentis concepta ornatè proferenda, ad sententiam suam argumentis acerrimis & exquisitis rationibus stabiliendam, ac adversarios, erroneâ ac falsa hypothese innixos, de ponte dejiciendos;



ciendos; tum ad ægros, Medicis haud in paucis contradicentes persuadendos, ad pœnitentiam contumaces, propositò dextrâ cum facundiâ prognosticò de morbi periculò, ad eam disponendos, ad ægros mæstos consolandos, iimentes erigendos, diffidentes excitandos, iratos placandos, furentesque coërcendos.

## IV.

*Philosophia* Medicinæ soror germana & uterina est, faciem ei præferens. Sine hâc Medicina est potius cadaver quoddam exsangue, quàm corpus vivens, est ramus divulsus ab arbore, hinc Medicina rationalis dicitur, à ratione nempe & dialecticâ, ac Medici Physici ob *Philosophiam* denominantur, cùm Medicinæ principia sint intimiora *Philosophiæ* arcana, eaque aliud non sit, quàm particularis quædam *Philosophia*, ac specialis & experimentalis *Physica*, causas & affectiones corporum naturalium in specie exponens, easque ratione & experienciâ examinans. Sine *Philosophiâ* enervis est omnis doctrina Medica, omnis disquisitio à veritate recedit, oriuntur monstrosa opinionum portenta, novitatum quisquiliæ & palææ, ac sententiæ vigilantium formis haud abfimiles, descriptiones sunt muulæ, & detruncatæ, aut omnino nullæ, axiomata vix probabilia, propositiones obscuræ, probationes difficiles vel erroneæ, ordo confusus, ac methodus curativa innumeris penè errorum laqueis irretita. Cùm enim curatio fundetur, vel in *indicatione*, quæ aliud non est, quàm syllogismus, seu unius ex alterò per rationem illatio, vel in *experienciâ*, aut *analogisimò*, quorum primum suppeditat modum argumentandi ab inductione, alterum ab exemplò, clarè elucescit, quòd ille meliùs noverit curare, qui meliùs noverit *Philosophari*, hinc necessariò oporteat, ut Medicus sit vel *Philosophus*, vel stultus, cùm tertium, si detur, crassi bubulci vel asini genus sit.

## V.

*Astrologiam* etiam Medico convenire, nullus est, qui ambigit, nisi cui auriculas ignorantia, & peritinaia commodavit coriua, nemo enim inficiari potest, jucundum illud & sæcundum cæli cum inferioribus conjugium, ac commercium, viresque ac influxus lunarium in Vegetabilia, Mineralia, imò & ipsum Hominem; quod testantur melancholici, maniacy, epileptici, aliique circa constellationes graviores lunarium, & lunæ imprimis, quæ non immeritò astrorum omnium speculum & infundibulum appellatur, peiùs habentes. Videmus etiam paulò plenius radiante Dianâ, humidiorum morborum sævitiam exasperari, ac in peiùs ruere paralyfes, apoplexias, lethargos, hydropes, & sexcenta alia symptomata. Idem testantur epimenia, ad easdem lunæ phases recurrentia, dies critici, vulnera luminaribus conjunctis, vel oppositis inflicta, difficiliùs tardiùsque coalescentia, pericula ex V.S. in violentis aspectibus celebrata, dysenteria, febres malignæ, pestilentiales, aliaque mala epidemica, quorum ex astris origines, non maximus tantum *Hippocrates*, sed & complures alii tradidere: imò etiam ex astrorum secuturis aspectibus prævifos prodiderunt.

## VI.

*Botanices & Anatomia* maximè peritus sit Medicus: illius non tam ad decorem, ut remediorum suorum actualem habeat notitiam, quàm ad necessitatem, pro visitandis *Pharmacopoliis*: hujus, cum sit oculus Medicinæ, in cimmeriis difficultatum præluens tenebris, sit lumen, quò homo in homine quæritur & invenitur: sit fenestra illa, quam Momus in humanò corpore desiderabat, ut abditi morborum, causarum, partiumque affectarum recessus patefierent: sit prima ac firmissima basis, super quam erigitur medendi methodus. Medicus enim sine Anatomia est cæcutiens, qui viam baculò examinans, huc atque illuc miserabiliter cespitat.

## VII.

*Chymia* Medico non minùs necessaria: non quidem illa, quæ pro lapide omnia dilapidat, & ut aurum coquat, omnia decoquit; sed illa, quæ utpote fidissima rationalis Medicinæ ministra & socia, tum ad utilitatem, tum ad splendorem ac amplitudinem Reipublicæ Medicæ multum confert; parando ac suppeditando lectissima omnis generis medicamenta, sapore etiam, dosis exiguitate, ac vi energetica commendatissima, quibus immanes morborum hydræ potentissimè expugnantur, quorum contumacia Galenicorum auxiliorum vim haud rarò satis superbè eludit; hinc plures cum *Matthiol.* in epistolâ quâdam audent dicere: neminem Medicum absolutum esse, imò ne mediocre quidem, qui in hâc nobilissimâ scientiâ non sit exercitatus.

## VIII.

Medico honorificum est, si partem Medicinæ *Chirurgicam* ita mente calleat, ut urgente necessitate etiam Ministrum & operatorem agere queat. Sicuti enim boni Imperatoris est, militis gregarii partes sustinere, si necessitas instet: ita dedecori non erit Medico, si pro re natâ, pro rei gravitate ac datâ occasione, ministrum agat, cum submissio hâc & humilitas pro salutè ægri, in necessitatibus angustiis constituti suscepta, existimationis jacturam minimè inferat. Si verò aîsint Ministri, & artis peritiâ & manus dexteritate insignes, præsidem agat Medicus, atque inter eos splendeat, ut Dux inter milites, operationes eorum dirigendo, tradendo præcepta, rescindendo errores, ac cavendo, ne solennis hâc Medicinæ pars abeat in carnificinam.

## IX.

Medicum *Pharmacopœum* agere, ac parare clysmata, facere potiones, & quævis magmata, vel etiam cataplasmata, unguenta, aliaque levissima ægris porrigere, phylargyriam, lucrumque sapit, ac Medici famæ maculam haud levem inurit; cùm sublimius atque excellentius Medicorum munus sit, quam ut ad manuales has operationes, vilesq; mercaturas sese demittat, præsertim si adsint artis Pharmaceuticæ periti, qui pharmaca decenter ac ritè paraverint ac dispensaverint. Interim unum vel alterum sibi peculiare ac reservatum remedium, cujus usum & enchiresin ille solus novit, dispensare haud indecens erit; præsertim si non lucrum, sed honorem, artis laudem & amicorum gratiam aucupari, eorumque sanitati prospicere intendat.

## X.

Fallacissima est *Praxis*, quæ valida non est *Theorie* basi munita; nam solida priùs, exquisita & firmissima principia jacienda, antequam ad Practicæ perfectionis culmen assurgatur, crassis semper ignorantia tenebris sepultus jacebit Theoreticorum face destitutus, exercitandus priùs Medicinæ Tyro in Theoriæ Palæstra, antequam Athleta Medicus in Praxeos descendat arenam; nec audeat ægritudinis monstrum aggredi ac devorare, nisi priùs dente meditationis seu studio Theoriæ detriverit principia, ac mentis in ore volverit generalia Medicinæ dogmata. Utilius est priùs cum mortuis, hinc cum vivis tempus terere, præsertim etiam, cùm singula ferè præcepta & recondita, quæ in praxi observantur, affluentius in Practicæ Medicinæ libris ac scriptis elucescant; quare animus priùs Theoriâ probè imbuendus, investiganda humani corporis elementa, principia, humores, temperamenta aliæque ejus proprietates & affectiones, perpendenda insignis affectuum varietas, numerusque penè infinitus; considerandus ægritudinum mos, motus, magnitudo atque eventus: ruminandæ causæ sapiùs abditiæ ac pervestigatû difficillimæ, utendum signis diagnosticis, ac generali medendi methodò; quæ omnia non sicco pede & per transfennam peragenda, sed pluribus annis solida & eximia horum acquirenda eruditio. Nam teste *Hippoc. Vita brevis, ars longa.*



## XI.

*Theoriâ* probe instructus Medicus noverit, non satis esse consulam animo tenere medendi effigiem, & generales de arte medicâ contemplationes & notiones habuisse, sed ad tecmarfin & particularia descendendum esse, cum non homini, sed Calliæ vel Socrati Medicina fieri debeat: noverit etiam Praxin à Theoria distare, quantum ara lupinis: in Practica occurrere sæpius aliquid, quod nec dici, nec scribi potest; omnes etiam penè morbos curari in cathedrâ & libris: non omnes verò in lectis, in quibus ægri sæpius moriuntur. Experientiam igitur, quæ est anima & mater Medicinæ: iudex etiam & lapis lydius; ad cuius obrussam pleraque examinanda, sibi comparet Medicus, ægrotantium lectulos indefessâ diligentia frequentando, juvantia & lædencia exactè considerando, cum Medicis practicis, & præcipuè senioribus conversando, & consultando, pharmacopolia adeundo, librosque practicos, ac præcipuè eorum observationes perlustrando.

## ARTICULUS III.

*De Officiò Medici, in Ægris assumendis & visitandis.*

## I.

**N**on decet Medicum, haud rogatum sua offerre officia, nam teste *Hippoc.* promptitudo & facilitas medendi effusè oblata, ab ægris contemnitur; atque turpe est, imperium & potestatem in corpus, ab ipsis ægris emendicare. Accedit contemptui non tam minor confidentia, quæ tamen haud modica est bonæ curationis circumstantia, quàm suspicio haud exigua, vel quæsti lucris, vel jactantiæ, & nimix ambitionis. Præstat igitur in suæ dignitatis cultum, in debitam sui, artisque medicæ venerationem, atque decorem, propriâ virtute meritisque inclarescere Medicum, & vocatum assistere ægrotanti, quàm se ipsum obtrudere, ac mulierculas, pharmacopæos, chirurgos, consanguineos, amicos, aliòsque agrorum assistentes, ad id conductos habere, ut operam alicujus veluti buccinis undique prædicent, ac patientes per fas & nefas procurent.

## II.

Sicuti *Rudolphus* Primus Imperator asseruit: melius esse benè imperare, quàm Imperium ampliare; ita melius est pauciores infirmos suo Regimini commissos, magnâ cum animi applicatione, diligentia, studiò, artisque præceptis regere, quàm plurimis unò eòdemque tempore non posse satisfacere: cum enim, docente *Celsò*, optimus ac maximè idoneus sit artifex, qui non diu ab ægrò recesserit, & qui ad omnes circumstantias sedulò attenderit, easque ritè percontatus fuerit; impossibile erit, tot ægris decenter invigilare posse, & ferè non obvium accommodare medicamentum, sine ulla percontatione, cognitione causæ, & cum discrimine.

## III.

Ægros deploratos & conclamatos, solo prognostico relinquendos, eorùmque curam minimè suscipiendam esse, *Hippoc.* jubet l. de art. dum ait: *Medicinæ est, vehementes morborum impetus retardare, & eorum, qui morbis victi sunt, curationem non aggredi*, ne teste *Galen.* fidiissimo Hippocratis interprete, infamentur apud vulgus remedia, quæ multis fuere salutis; quod tamen intelligendum esse judico de illis tantum morbis desperatis & conclamatis, qui per se & revera tales sunt, nulla arte aut ope curabiles, vel ipsâ naturâ immedicabiles, ut v. g. cæcitas & sorditas congenita, hæctica marasmodes, sphacelus, phthisis consummata &c. non de his, qui plerumque saltem interimunt, & ex quibus aliquos ægros convaluisse observatum est, horum enim curatio gene-

rosò animò tentanda; præmissò tamen in spe difficili prudenti præfagiò, vel prædictò mortis periculò: cum melius sit anceps experiri remedium, quàm nullum, ac *Celsò* teste, temeritas subinde restituit, quos ratio non sanat. Nam sicuti in bellò sæpè longè violentius ex necessitate, quàm virtute pugnatur; ita satius est aliquid cum periculò facere, quàm spe ademptâ certò perire, præsertim cum etiam monstra in arte subinde contingant, & monente *Philone*, auxilium divinum maxime plerumque adfit, cum deficit humanum.

## IV.

In Medicam potestatem haud recipiendos esse, qui confessionem Sacramentalem renuunt, jubet supremum Ecclesiæ caput *Innocent. III. in concil. Lateranens. tit. 37. c. 15.* quod jussum repetit *Pius V.* in suâ bullâ 8. Mart. 1566. in lucem edita; cum *Medici*, inquit, *ad infirmos in lectò jacentes vocati sunt, ipsos ante omnia moneant, ut confessori omnia peccata sua juxta ritum S. R. E. confiteantur, nec teriò die ulterius eos visitent, nisi longius tempus confessor ob aliam causam infirmo concesserit.* Quòd eò intelligendum, ut Medicus teneatur ægrotantem periculi, vel per se, vel per alium, prout necesse videbitur, admonere, eumque ad exomologesin sacrumque Viaticum suscipiendum adhortari, minis etiam erga reculantem, quod deferere eum velit, adhibitis. Eum autem nihilominus renuentem, omnino non invisere, sed ex toto deferere, non suadent *Sanchez, Villalob. Barbof. Sylvest. Dian.* aliique ab eodem citati, cum Medicus divinæ Pietatis æmulus, tentatis omnibus, quæ ipsi præcepta sunt, & quantum ex se est, pietatis opus ulterius prosequi adhibitisque præsidis, ut forsitan æger adhuc resipiscat, vitam prolongare possit, præsertim etiam, si metuendum, ægrum à Medico ex toto derelictum, magis obstinatum fore, & obsequia, quæ jam fortè parabat, omnino negaturum esse.

## V.

Medicum paulò gravius periclitantem seipsum curare, minus tutum est, ob judicium in re propriâ, densâ Philantiæ, ac affectuum inordinatorum nube magis obtenebratum; infirmis etiam frequentius sensualitati magis, quàm rationi obedientibus; hinc præstat, vel alios simul in consilium adhibere, qui citra animi perturbationem de morbo judicent, & absque pavore remedia suggerant, vel si Medicus ægrotans adeo sit debilis, ut mens etiam langueat, iis omnem medendi provinciam concedere.

## VI.

Medicum non teneri, cum extremo vitæ periculo, peste correptis succurrere, nisi pacto se obligaverit, vel salario ad id conductus fuerit, in confesso est. Hostes & inimicos suos in curam medicam assumendos esse nonnulli dubitant, ne si quid humanitùs accideret, eosque mori contingeret, suspicionem incurreret. Verum sicuti Medicina etiam inimicis opem non denegat, sed odium benevolentia, damnum beneficentia, ac pessima quæque humanitate vincendo, medelam adhibere non recusat: ita majori hóc in passu utendum cautelâ, ut etiam si fieri possit, alter adfit Medicus, vel alius doctus Virorum, rationes curationis intelligens, receptis quoque in pharmacopoliò sedulò asservatis, utpote incorruptis candoris & sedulitatis testibus.

## VII.

Nonnulli Medicis inobedientes, gulosos, qui Medicum & Medicinam infamant: ut etiam Ingratos, qui jam olim vitæ discrimine erepti, detestandâ ingratitude beneficentiam Medici contempserunt, eumque denuò ad opem ferendam impudenter accerfunt, operâ Medicâ haud dignos censent; verum intemperantes ac inobedientes, qui vivunt, prout volunt, debent curari



curari prout possunt : nequiquam verò omnino derelinquendi, quod enim, teste *Galen.* intemperantiæ dediti, nullis possunt juvari præsiidiis, potius de curâ prophylacticâ quàm actuali morborum curatione intelligendum : præsertim etiam, cum aliis remediis & nova temperantiâ, quam infirmitate oppressi sæpius sectantur, juvari possint. Ingratos quoque haud omnino negligere oportet, ne avaritiæ aut crudelitatis acculent Medicum, cujus suprema debet esse cura, ut nihil committat, quod vel Christianæ charitatis jura frangere, vel nobilem & præclaram facultatem, turpi pecuniæ exactione sædare possit.

## VIII.

Cum salus ægri suprema Medico lex sit, eaque non minimum dependeat à legitimâ Medici visitatione, quæ est veluti anima felicitis curationis, hinc plurimum interest, ut à Medicò decenter instituat, multum enim præstat ad morbi cognitionem; plus ad ejus curationem: plurimum ad errorum plurimorum, quia ab ægris & assidentibus in absentia Medici committuntur, evitacionem. Sic etiam quod vox viva Præceptoris: quod præsens Magistri auctoritas apud discipulos, hoc Medici præsentia apud ægros; ac tantum hoc ævò valet remedium, quantum de Medicò sperat æger, quantumque in eo est opinionis & auctoritatis; hinc promptum semper habens juvandi animum, rogatus omnibus domi sit oportet, neque tristem à se quemque patiat, abire, laturus omnibus visitando auxilium, vel quantum in se est, non denegaturus.

## IX.

Medicus ægrotum accedat opportunè, semperque illorum, qui periculosius decumbunt, prius: reliquorum verò posterius curam gerat. Matutinum imprimis tempus eligat visitationi aptissimum, sæpius etiam vespertinum huic labori impendat, interdum bis de die, si morbus præsertim acutus urgeat: subinde ter vel quater, si morbus chronicissimus, & præsertim rogatus; in levioribus & chronicis quotidie semel, vel alternis diebus, immò quandoque post 3. 4. vel plures dies demum, prout opus esse videbitur, ita tamen, ut semper quid ad reditum usque suum faciendum sit, reliquerit. Optimè faciet, si accessum moderatus fuerit juxta morbi conditionem, ægrotantisque affectionem. Sunt enim ægrorum aliqui, qui crebrò invisi maximopere lætantur, & Medici non aliter quàm Angeli cujusdam aut Numinis cælitus delapsi adventum expectant; alii è contra, à sæpius invidentibus afficiuntur molestia, Medicumque quærendi lucri, se ipsos verè detestandæ arguunt avaritiæ.

## X.

Ad ægrum placidè ingressus, lætabundus eum salutet Medicus, ac monente *Hippoc.* meminerit auctoritatis & sessionis, anima enim teste *Philosopho* 7. *Phys.* 2. sedendo sapientior fit, & prudentior, ac Intellectio assimilatur quieti & statui magis, quàm motui; unde olim quoque sedere tenebantur consultantes & judicantes. Sedeat ex adverso vultus ægrotantis, ut ex eodem velut ex speculò mala tum præsentia, tum futura intueri valeat, & quidem paulò remotius, præsertim in ægritudine malignâ, vel quod tutius, ex latere, ne miasmate venenatò, cum halitû ab ægrotantis corpore emissò, inficiatur & ipse Medicus; quò in casu etiam ad ingressum suffitum parari, fenestras aliquatenus aperiri, ad spatium aliquod jubebit, seque tum odoramentis, tum in ore detentâ Myrrhâ, vel masticatâ rad. Zedoar. Angel. Cort.cit. rotul. aut morsell. aliisque alexipharmacis, & breviori præcipuè visitatione, ab imminente contagiò, immunem reddet.

## XI.

Sedens, pacatè ac modestè, hilari facie ad ægrum conversâ, gravitateque comitati & humanitati con-

juncta, cognita, visuque necessaria inspiciat, ea quoque, de quibus fas & opus est, interroget, ægrumque vel adstantes morbi Historiam referentes patienter, ac attentè audiat, sermocinetur de rebus; Medico non naturalibus dictis, de cibò & potù, eorumque variò præparandi & administrandi modò & usù, de ægrò ad confidentiam & obedientiam disponendò, de remediis debitò tempore & modò exhibendis, de aliis etiam rebus indifferentibus, ac opportunis, juxta ægrotantium conditionem, capacitatem & genium, quibus Medicus Prothei instar se conformet, omnesque lucretur, modò à civilitatis ac modestæ gravitatis limitibus non secedat.

## XII.

Ab initio Visitationis, præsertim de morbi essentiâ, causis vel exitu, oraculorum more dubius respondeat, neque ordinatorum semper rationem reddat, præcipuè coram vulgò & ignaris, aut ægris quibusdam hæsitantibus & omnia secunda metuentibus, ne majorem hæsitandi occasionem nanciscantur: benè tamen coram peritis & scientificis agendorum, morique causæ sæpius manifestandæ, ut præceptis medicis magis obtemperant, & non respondeant, quod Aristoteles Medico suo multa vetanti, & non pauca circa morbi causam edicenti, scitè respondisse fertur: *ne me cures, ut bubulcum vel fessorem, sed prius causam edisserere, atque ita præceptis tuis me facile morigerum reddideris.*

## XIII.

Ægris non nimium familiaris sit Medicus, ne ipsum, ejusque remedia parvi pendant, & contempnant, nec ministros sibi faciat socios, nisi debitam in se venerationem posthabeant: non tamen iniucos, sed benevolos potius, eorumque acta collaudando ac celebrando, sibi devinctos reddat. Procuret etiam, quantum ex se est, ut ægrotis adstantes & assidentes munere suo ritè fungantur, ut sint infirmis grati, gnari morum & consuetudinis & naturæ ægrorum, sint mundi, gratiosi, urbani, seduli, fideles, patientes, dociles, ac Medico obtemperantes; cavendo etiam, ne ægris vel iram concitent, vel tristitiam ex intempestivis nunciis, vel aliam offensam causentur.

## XIV.

Visitando, Medicus diutius ægris, quàm par est, non adstet, vel saltem rarò & quidem non nisi familiaribus: mulieres etiam non nisi cum aliorum adstantium præsentia, & brevi intervallo visitet, illisque quasi transeunter accessionem, quodammodo fugitivam exhibeat: neque tamen etiam, nisi coactus nimium properet, in omnes circumstantias diligenter inquirens, & imprimis, quomodo tulerint medicamenta, attentè notans, cum ex juvantibus & lædentibus tutissima sumantur morborum remedia, hinc maxime hallucinantur, qui statim ac ægros intuiti sunt, pulsùmque tetigerunt, rigorosò, ut decet, morbi causarumque examine neglectò, inconsultò statim medicamenta dictant, & Andabatarum more agenda præcipitant.

## XV.

Medicus ægrotos visitans, honestè & decorè vestitus sit, sicuti enim sumptuosus valde vestitus arrogantiam sapit, ac lividi dentis scommata vix evitat, ut taliter vestiti, vel luxu perdita, levia, otiosa ac prodiga audiant ingenia, vel incurrant suspicionem ampullosi circulatoris & agyrtæ, ita fordidos aut nimium vilis vestitus, vel quæstum exilem, vel egestatem, vel avaritiam denotat. Videat igitur, ut vestitus gravis sit, honestè elegans, mundus, non lacerus, aut spurcitie inquinatus, ut omnia ad optimam exilimationem, prudentiam ac animi moderationem sint composita. Ad cultum & munditiam corporis quoque spectat, ut Medicus manus quàm maxime purissimas habeat, faciemque



mundam, & pilos in barba & capite decenter compositos, cavendo quoque, ne tetrô odore ex quâcunque parte corporis emissô, vel ex sorditie oriundô, a grotantibus molestiam, vel econtra etiam odoribus molchatis vel ambratis, foeminis hystericos excitet paroxysmos.

## XVI.

Tandem Medicus visitans, artem Medicam adversus ejus osores & contemptores acriter tueatur, eam malè tractantes semel bisve tacitè correptos, & non emendatos palam arguat: agros inobedientes blandè primùm, hinc severè corripiat, vel omninò deferere commineatur, præsertim verò apud potentiores sciat, vi virtutis patientiæ & mansuetudinis, Medico quàm maximè necessaria, multa connivere, ferre, dissimulare, ac calumnias, aliâque innocenter, ac injustè sæpius illata, vitæ sinceritate, & oppositis actionibus, aut amicorum, vel proborum aut eruditorum, potentumve laude abolere.

## ARTICULUS IV.

*De Officiò Medici, in dignoscendis Morbis eorûmque Causis.*

## I.

**Q**Uò quis Medicus accuratior est in morbi cognitione, eò felicior in ejusdem curatione, asserente enim *Hippoc. de art. si suffecerit Medicus ad cognoscendum, sufficiet etiam ad curandum*, ut adeo non mirum, complures tantùm in Medicinæ operibus aberrare, quantum in cognitione morbi falluntur. Cum igitur prima basis curandorum Morborum sit recta eorundem cognitio, atque debitum unius ab aliô discrimen; Medicum planè percontatorem esse oportet, qui necessariis interrogationibus non parcere, sed artificiosâ inquisitione morbi essentiam ejusque causam investigare debet, antequam curationis methodum aggrediatur.

## II.

Haud malè agunt illi Medici, qui in curatione morborum, moram aliquam admittunt, ac primâ die toti sunt in examinandô ad amussim agrô, circa causas occasionales, omnesque morbi antecedentes ac præsentis circumstantias, quò tempore nihil remediorum impèrant, ne per illorum usum ordinaria morbi periodus signorûmque constantia perturbetur, aut morbus alienâ facie sistatur, vel saltem generale aliquod & innoxium præscribunt Medicamentum. Secunda die, diligentius consideratis rebus ante dictis, morbi speciem tandem decernunt, & exinde remedia opportuna præscribere incipiunt; latent enim sæpius in puteô Democriti profundissimè sepulta, prima morborum stamina, densâque caligine circumfusa delitescunt, ut non nisi magnô labore, summâque industriâ erui possint.

## III.

Antesignanus noster *Hippoc. l. de affect. tit. 36.* quinque interrogata Medico, cum ad ægrotum devenit, proponenda injungit, inquirendo: 1. *Quid doleat?* 2. *Ex quâ causâ?* 3. *Quot diebus?* 4. *An alvus secedat?* 5. *Quò victû utatur?* plurimi quæstionum harum limites paulò angustiores agnoscunt, hinc etiam celeri cogitatione, linçâque mentis acie percurrere, examinare & perpendere jubent, ægrotantis temperamentum, ætatem, sexum, & quoad hunc, sciscitando, an mulier gravida, & quot mensibus uterô gerat? an menses in virginibus vel non gravida, vel lochia in puerperis ritè fluant? item quale anni tempus, aëris constitutio, loci ac regionis mutatio, consuetudo in victu, exercitia, idiosyncrasia, ac singulares, occultæque nonnullorum proprietates. Item quærendo: an & quibus hætenus usus fuerit re-

mediis? qualis eorum fuerit effectus? an prioribus jam annis tali morbo laboraverit, vel Parentes simili morbo detenti fuerint? an consuetam aliquam evacuationem neglexerit? &c.

## IV.

Prædictis similibus quæstionibus pro re natâ propositis, observatis simul ægri moribus, discursû, facie, oculis, ac linguâ, præsertim in morbis acutis, pulsus tanget Medicus, ex eoque virium vel robur aut debilitatem, vel effervescentiam febrilem, aut naturalem œconomia corporis dispositionem dignoscet; ita tamen, ut, sicut in civilibus non uni testi, ita neque in forô Medicô huic soli signo, tanquam fallaci subinde & incerto, præsertim in affectibus capitis, ut apoplexiâ, lethargô, febribus etiam malignis, facilliquè ex causâ mutabili, & in variis individuis variô, non fidat.

## V.

Idem dicendum de Urina, quæ post pulsus cognitum inspicienda, quoad substantiam, colorem & contenta scitè examinanda, in morbis præsertim, qui Uroscopia subjacent, ac quorum causa in genere venoso, epate, liene, renibus, ureteribus vel vesicâ delitescit. Hinc exhibendi sordidi illi Vromantes & lotio Physici, qui, nescio quod vaticinium, omni ratione carens, levi popello vendunt, & quidem non ut Apollo ex tripode, sed ex matulis oracula edunt, ac turpem lucri odorem venantur. Noverit autem Medicus, urinam æquè ac pulsus, ut signum coindicans tantùm considerandum esse: ita, ut cætera quoque signa diagnostica ex aliis fontibus desumpta, ad partes vocari debeant, ut ex omnibus simul certi quid decerni possit, cum sola Protei instar mutabilior sit, tum pro diversa individuorû varietate sanguinisque ac spirituum crasi, tum pro diverso vitæ genere, pro vigiliarum vel somni, repletionis vel inedia, motûs vel quietis, regionis, anni temporis, assumptorum, aliarumque circumstantiarum variâ conditione.

## VI.

Sicuti autem Urinæ, ita etiam pro varietate affectuum, excretorum alvi, sputi ac sudoris habenda ratio; præterea quoque tam in morbis chronicis, quàm acutis, *Hippoc. in cognoscendô hypochondriorum statû*, num eadem mollia, æqualia & sine dolore, Medicum quotidie diligentissimum esse jubet, cum ibi non tam potissima facultatis naturalis sit sedes, quàm etiam veluti Palæstra quædam, in quâ omnes propemodum naturæ, morbi que fiant conflictus, ut adeo non tantùm multum inserviant pro morborum diagnosi, verum etiam non leve futuri præfagii evadant argumentum.

## VII.

Cum ex dictis facilè elucescat, quantâ solertiâ, ingenii perspicacitate, & vigilantia egeat Medicus, ad ægritudinis ideam, speciem, causamque detegendam, ut adeo veteres haud frustra Palladis ac Æsculapii simulacro, draconem veluti vigilantia symbolum, & quem acutissimâ pervigilique oculorum acie præditum esse tradunt, apponerent, fontes signorum partis affectæ morbi causarumque quàm diligentissimè trutinandi & delibandi, quales sunt. 1. Essentialiter inhærentia, quo spectant partis temperies, magnitudo, situs, figura, morbus ipsè sensibus obviis. 2. Cognitio causarum procatacticarum & dispositivarum, vel hæreditariarum. 3. Actiones læsæ, & quidem vel naturales, vel vitales, vel animales. 4. Excreta, eorûmque substantia, qualitas, quantitas, sapor, modus ac ordo excretionis. 5. Qualitates mutatae quoad colorem, frigus, colorem, saporem, sonum. 6. Examen juvantium & lædentium. 7. Mutatio unius morbi in alium.

## VIII.

Quòd si verò, ut subinde etiam, omni adhibitâ diligentia, & ab initiô inprimis contingit, planè obscura fuerit



fuerit morbi species, ut penitus cognosci & perspicere nequeat, præsertim si quis vocetur ad curationem morborum vel complicatorum, vel obscurè procedentium, vel similitudinem cum aliis morbis habentium, ut Medicum confundant, ac anxium & dubium reddant, ad magna saltem remedia non accedendum, sed inviolabile illud præceptum Hipp. 6. epid. sect. 2. text. 50. observandum: *si non potes prodesse, vide saltem ne noceas.* Hinc vel urgenti symptomati prospiciendum, vel debilia aut communia tentanda præsidia, ex quorum administratione nullum ægroto imminet periculum, vel res tota naturæ committenda, confortantibus interim insisterendo, tenuerque victum imperando, usque dum natura vel vincat, vel morbum detegat; cavendo tamen, ne æger aut adstantes propositum tuum agnoscant, ac te ex incertâ conjecturâ remedia tentare, eaque cum alienæ vitæ discrimine experiri, malè & perperam accusent.

## ARTICULUS V.

*De Officiò Medici, in Prognosticandò.*

### I.

**V**ix ulla Medicinæ pars est, quæ excellentiam artis, & Medici præstantiam adeò ostendit, quàm ea, quæ eventus prælagendi rationem tenet. Hæc enim maximam medenti conciliat auctoritatem, cum Numinis instar,

1. *Quæ sint, quæ fuerint, quæ mox futura sequantur,* prænoscat. Futuris docet tempestivè occurrere, cum oculati Argi instar, veluti ex specula futuras affectiones, imminetiaque gravissimorum symptomatum pericula prævideat & præcaveat. 3. Apud ægros & adstantes parit admirationem: hinc admiratio fiduciam, fiducia obedientiam, ac obedientia sanitatem. 4. Medicum infamiâ, calumniis, ac crimine internecionis liberat. Cum enim omnes sanari non possint, ac plurimi, vel ob ægritudinis contumaciam, vel ægri inobedientiam, vel ejusdem debilitatem, vel adstantium errores, vel rerum necessariarum defectum, vel fati necessitatem, vitali luce priventur: Medicus prudenti prælagio ab omni mortis culpâ se reddet immunem. Officium enim ejus est, morbos sanabiles sanare, & insanabiles prædicere, ne, si fortè ars victa malò fuerit, vel ignorasse, vel fessellisse videatur.

### II.

Sicuti etiam scientia Prognostica nobilissima ac utilissima, ita pariter quoque obscurissima & difficillima, ut plures, vel peritissimi Medici, subinde in prælagiendo vacillent. Difficillima est. 1. Ob subitam crismum mutationem, quæ prædictionem multoties inturbat. 2. Ob velocissimum urgentis morbosæ causæ impetum, nunc ad penitiora partis alicujus principis penetralia, nunc ab his ad ignobiliorem corporis partem, ut vel repentina salus, vel inopinatus sequatur interitus. 3. Ob plures morbos ex humoribus diversis & contrariis scaturientes. 4. Ob causas procacitè inopinatò supervenientes, crismum certitudinem corruptentes. 5. Tandem ob peculiare hominum proprietates & idiosyncrasias, Medico sæpè numero haud conpertas.

### III.

Cum igitur tanta Prognoseos difficultas, ut etiam Hippoc. prælagendi artis magister peritissimus 2. aph. 19. pronuntiaverit, *acutorum morborum non esse certas Prædictiones, neque ad salutem, neque ad mortem;* cautum semper Medici sit prælagium, ne, si res aliter ac prædixit, succedat, ægro & adstantibus risui & contemptui habeatur, vel commissi in curationis negotiò erroris infimuletur, *nihil enim juxta effatum Hippoc. 2. prorrhct.*

& lib. prænot. ineptius est, quàm Medicum in prognosi morborum frequenter falli. Sicuti enim nunquam hallucinari, ferè supra captum hominis: ita rarissimè solius artificis, prout ingenuè fateatur Celsus noster prænot. 41. & Galen. in Commentar.

### IV.

Medicus nunquam sanitatem, nisi infallibilis sit, certò promittat, vel ejusdem certos præfigat terminos: multò minùs agyrtarum & scurrarum more, turpis captandi lucri causâ, certitudinem talem juramentò confirmet, cum nunquam certus sit de supremâ causâ, à quâ cuncta hæc inferiora diriguntur, neque etiam de obedientiâ ægri, vel diligenti applicatione, aut operatione remediorum, vel naturæ cooperatione, aliisque pluribus casibus subitaneis atque fortuitis, temerarias ejusmodi pollicitationes evertentibus, ut adeò non mirum, tales sui dedecore, infamiæque dolore meritis errorum suorum poenas luere.

### V.

Pari ratione nunquam mortem certam, nisi certissima & infallibilia fuerint indicia, vel eam absque spei, si aliqua affulserit, mentione prædicat, ne fortè, quem moriturum infallibiliter falsò præfenserit, magnâ cum nominis sui calumniâ, non ita longè post, quasi à malâ sententiâ provocaret, supervivat. Non enim omnia adeò manifesta sunt circa ægros, ob specialem uniuscujusque individui idiosyncrasiam, quin interdum hujus ratione miracula in Medicina fieri videantur, & ii, qui conclamati putantur, præter spem subinde convalescant.

### VI.

Ægritudine incipiente, aut parùm invalescente, judicium suum suspendat Medicus, oraculorum more, ambigè de morbi exitu fermocinetur, illudque Galen. 1. De dieb. decret. 12. observet: *si nihil in morbo firmiter prælagire possimus, satius est tacere, quàm temerè pronuntiando falli*, quia 1. nonnulli videntur morbi ab iniuriâ salutes, latente malignitate, qui postmodum ex insidiis erumpentes ad occasum insperatò tendunt, cum dedecore benè prælagientium. 2. Medici nonnulli minùs cauti facilè decipiuntur, dum vel subitis ægrorum alleviationibus, absque ratione & causâ manifestâ repentinè factis, cecâ decepti fiduciâ, & ab omni suspitione remoti, salutem statim spondent, dum non rarò, insperata supervenit mors, ac spei gaudium inopinatò vertitur in marorem, cum artis ignominia, & Medici infamiâ; vel mala pertimescunt, quæ tamen, sicuti præter rationem ac temerè eveniunt, ita non sunt formidanda, utpote instabilia; vel tandem magnum & acutum pronuntiant morbum, qui dein repentinè evanescit, superfluit solum Medici amari & in experti infamia. Nihil igitur temerè affirmandum: nihil etiam contemnendum.

### VII.

Medicus in Prædictionibus Hippoc. utpote hæc in arte cautissimè & exercitatissimè, apprime versatus sit, & nocturnâ diurnâque manû eas versans, illius lethale, malum, periculosum, & perversum probè norit distinguere. Sciat etiam interdum à multis bonis indicis unum malum vinci, & rursus è contrariis, à multis malis, unum bonum, noverit quoque fundamentum legitimum prognoseos cujusunque consistere, in circumspectâ consideratione roboris naturæ, & violentiæ morbi, & utriusque mutuâ collatione; imprimis etiam ægri decubitus & faciem, veluti corporis & animi speculum, & oculos, in quibus elucet vitæ nostræ radius & Virium præcipuus character, & nares, & linguam, quæ humorum qualitates ac inflammationes internas siccitate suâ exprimunt, & manus & pulsum & urinam, reliquaque excreta, ac præsertim signa coctionis in iis apparentia, vel deficientia, lincea mentis acie contempletur, quæ cum Galen. accuratissimè semper observaverit, se nunquam in prædictione deceptum fuisse gloriatus est; unde etiam 3. epid.



3. *epid. comment. ult.* doctum in arte, non valde in prædicendo falli posse, affirmat.

## VIII.

Si Medicus dubiam naturæ victoriam sagaci conjecturâ prævideat, periculum adstantibus maturè insinuet, ut patiens prospiciat conscientiam, domuique suæ disponat, & affines curæ suæ & hæreditati cogitent, ipsæque Medicus à mortis subsecuturæ culpâ fiat immunis; nihil interim omittendo, quod ad opem naturæ ferendam, ad ægrotantis solamen, assidentium gratificationem, suæque operationi ultimum posse tribuendum, accommodatum videbitur: spei etiam, si aliquod adsit lumen ostendendum, salusque à remediis & à viribus, si hæc constiterint, ac nullus obtingat error, speranda.

## IX.

Si Medicus nullam superesse spem, ægrumque prorsus conclamatum viderit, post exitum è cubiculò abique terrore, submissâ voce & apparenti saltem visus & animi tristitiâ, assidentibus iudicium suum aperiat, nullatenus autem ægrotantem omnino deferat, cum multi sæpè mirabiliter sanentur, ac monstra non tantum in natura, sed etiam in arte contingant, ac interdum in desperatis casibus benedictio Divina præter omnem spem, dum ex officio sæpius extremò laborantibus succurrimus, nobis affulgeat, hinc sæpius à Medicis prognostico derelicti, vel sponte, vel obviis oblatis remediis convalescant.

## X.

Medicus animum decumbentis præsertim timidiorem, quantum fieri potest, & animæ salus concedat, erigat, consoletur, spemque ejus dulciter nutriet, cum ejusmodi confidentiâ, spiritibus recreatis & in motum concitatis, sæpius humores corporis facilius corrigantur, hisque benè se habentibus, viscerum damna quoque promptius deleri possint; ita tamen, ne periculosis in morbis ægrum nimis hilarem ac bonæ spei plenum reddendo, in multò majorem hinc conjiciat tristitiâ, cum in pejus ruit morbus, vel ultra ejus promissa producit, aut in futura salute nimium confusus, Medico, ut fas est, non obtemperet.

## XI.

Caveat Medicus, ne coram infirmis, qui oculis & auribus intenti in cubili detinentur, ac gestus, vocesque Medici nondum claras, & vix dum in labiis hærentes, circumspiciunt, mussitet, vel gestû assidentibus, ac multò minùs ipsis ægris, ægritudinis periculum & acutiem manifestet, nisi vel occurrat æger animo fortis & prudens, qui plùs magni fecerit scire eventûs morbi veritatem, quàm exitum adversus extimuerit, vel ægri morosi ac protervi, remedia ad salutem utilia ac necessaria respuant, & ea lubentius admittant, vel exposcant, vel Patientes permaneant ad poenitentiam contumaces, & monita salutaria spernentes, cras in crastinum differant, quo in casû Medicus zelò charitatis accensus, suavi primùm cum dexteritate, hinc etiam hæc vana existente, indignabundus propinquam iis mortem apertè præfagiat, ut saluti suæ provideant, & licèt malevolentiam incurrat, generosè tamen eam temnat, pro certò habens, gloriæ palmam sibi comparari, si quidquam adversum in rectâ muneris executione procedat.

## ARTICULUS VI.

*De Officiò Medici, in Consultandò.*

## I.

**C**onsultatio Medica non tantum ægroto maximè utilis, sed etiam Medico honorifica. Utilis, quia

1. cum in rebus alioquin omnibus pluralitas, tum votorum, tum consiliorum, tam sollicitè quærat & expectatur, eadem minimè rejicienda in re maximi momenti, qualis est sanitas & vita nostra, thesaurus longè omnium præstantissimus; ut adeò æger bonam recuperandæ valetudinis spem, ac singulare emolumentum sperare possit, ex plurium Doctorem virorum colloquiò, qui magnâ vigilantia & curâ, sapienti consiliò, fide egregiâ, mirâ dexteritate, & accuratissimâ providentiâ eidem assunt, ac de ejus affectû curandò differunt. 2. Quia curatio & cognitio morborum, utpote sæpius res arduæ & intricatæ, multorum judiciò ac votò magis enodantur, ut unus solus in tantâ judiciorum difficultate, in tam magnâ experimentorum incertitudine, in tam præcipiti occasionum lubricitate, in tot millenis rerum circumstantiis, sæpius haud sufficiat.

## II.

Honorifica Medico est Consultatio, cum in eâ Medicorum doctrina, iudicium, modestia, aliæque virtutes præcipuè cognoscantur, sicuti enim plures ob consultationem indignè institutam, famam via indirecta acquisitam, derepente amiserunt; ita è contra multi rarâ eruditione conspicui, qui ob taciturnitatem & modestiam, vel aliorum invidiam diutissimè latuerunt, factò sermone, doctrinâ & eruditione plenò, emerferunt, hominûque benevolentiam & amorem magneticè ad se rapuerunt. Præterea labores & curæ æquis inter se partibus dividuntur, ut vel plùs laudis, si ex communi voluntate res bene geratur, vel minùs invidiæ, si consilii dexteritatem speratus successus fefellerit, in Medicos redundet, sicque vulgi calumniæ, imperitorumque detractorum tela magis evitentur.

## III.

Si igitur morbi gravitas id exigat, atque æger vel adstantes, aut consanguinei alios pro consiliò proponant, Medicus alacriter eos admittet, neque per hoc prout venerandus *Senex l. de præcept.* ait, indecorè quidquam aut contra auctoritatem suam facturum aliquid unum illum affirmat, qui plures advocaverit. Siquidem hominem se fateri, nec unum omnia posse agnoscere, apud sapientes nihil omnino præjudicat, aut de jam præconceptâ exilimatione diminuit, cum præsertim cuicunque, etiam doctissimo, id evenire possit, ut, dum alterius curam peragit, continuus ipse etiam curis & sollicitudinibus obrutus, & quibusdam quasi tenebris circumfusus, eò ipsò reddatur perplexus, minùsque perspicax ad discernenda ea, quæ in præsentia casû magis forent necessaria, magisque conducibilia. Hinc etiam laudabile hoc institutum habendi consultationes, etiamnum viget in non paucis Hispaniæ, Galliæ, & Italiæ locis, Parisiis imprimis & Patavii, ac modò etiam Viennæ, ubi perrarò morbus gravis curandus suscipitur, quin conjunctis plurimorum consiliis de agendis deliberetur, si res postulare videatur.

## IV.

Ut ægro utilis, ac Medico honorifica sit Consultatio, primo consulentes sint eruditi, perspicaces, providi, curarum præsertim feliciûs experientiâ insignes, ac pacis præcipuè amantes; hinc olim Romani Medicos in templo pacis congregari jubebant, ut de ægri salute placidè, & absque altercatione conferrent, & ab execrabili, foedâque magis, atque lernâ contentione abstinerent. Ad ægrotantis enim salutem, veritatisque centrum unicè collimandum: non ad gloriam, non ad lucrum, non ad privata commoda aliòsque affectus, qui pessimi sunt Consilarii; plures enim ægrotantes; ob exorta inter Medicos dissidia, dum privatis inter se gliscunt odiis, aut æstuant simultatibus, videntes quomodo calamitatem, aut maledicta alteri afferant, vel affingant, infausissimam sortiri sortem per eunt, dum occasio nunquam reditura præterit, pessumdâ restat natura, morbus invalescit, ægerque inter-

necone



necione deletur. Sicuti igitur Medicorum æmulatio, contentio ac dissidentia, in ægrotantium periculum ac perniciem, adstantiùmque confusionem, ita eorum consensus ac concordia, in maximum ægrotantis & reip. Medicæ emolumentum & honorem cedit.

## V.

Secundò, Consultatio maturè instituat, antequam prosteruat, conculcet, vires atterat, ac prorsus enervet morbus, ægérque symptomatum violentiâ ac sævitiâ succumbens agonizet. Numerus consulentium ad evitandam confusionem non sit nimius; hinc cum in ore duorum vel trium stet omne verbum, ac trium viro- rum unio, sit quasi symbolum perfectionis, adeò ut cognitio, quæ à tribus eruditis non habetur, vix è pluribus obtineri queat, gemini vel tres sufficiunt, licet etiam in aulis Principum quatuor, vel ad summum sex, non improbentur.

## VI.

Tertiò, Consultatio non sit imparata, omnia enim subita probantur incauta, nisi subinde necessitas, ob repentina, graviâque ac urgentia symptomata supervenientia, gladiatorum more in arena ex tempore consilium capiendum esse jubeat; hinc maximè ægrotis consultum atque proficuum & exoptandum foret, ut Medicus ordinarius prius casum, seu speciem facti, cum omnibus circumstantiis cæteris futuris consiliariis scriptò mitteret, ut tantò paratiores, majorique eruditione instructi accederent, *sana enim Consultatio*, ut inquit *Bias apud Laert. ex eruditione rerùmque peritiâ & experimētō contingit.*

## VII.

Quartò, Consultatio sit ordinata, ita Medicus ordinarius omnium primò Historiam morbi, ejusque originem, vehementiam, durationem, adhiberiâque præsidia, fide rectâ, mentèque sincerâ proponat: hinc doctoratû junior ascendendo ad seniorems usque, conclusum ultimato formantem graviter, eruditè, liberè, benignè tamen ac modestè, absque ullò existimationis suæ nævò, de morbi genere, differentiis, causis, signis, indicationibus, ac materia remediorum, & quidem omnia lynceò mentis acumine penetrando differat, sententiam suam validissimis rationibus stabiliat, præstantium & authenticorum scriptorum auctoritate fulciat, experimentis atque exemplis, quibus res clarior evadit, confirmet, aliorumque opiniones, si minùs idoneæ & rationi consentaneæ videantur, modestè & absque zelò refutet, atque aliam magis tutam curationis viam persuadeat.

## VIII.

Sicuti *Galen.* non reprobatur Medicorum dissensum, sed amicitia plenum, ac doctam duorum Medicorum contentionem, honestum consultantium certamen appellavit, quæ etiam in medicina, ubi multa conjecturabilia, quia ambiguitate & controversiâ non carent, inevitabilis: immò sæpius cotis instar ferrique mutuò attriti veritatis ignem elicit, atque ex dissonantium vocum opinionumque discordiâ, gratissima, ægròque utilissima emergit harmonia; ita prudentis erit Medici, sententiam adversariam, si necessitas urgeat, benevolè revelare, non prorsus eam negando, vel directè vehementius impugnando, sed placidè distinguendo, ac contrariorum argumentorum vi modestè retundendo. Cordati enim Medici est, revelli sine pertinaciâ, & revelle- re sine iracundiâ, cavendo insuper vel maximè, ne dicta & facta Ordinarii vel alterius, ad ejus oppressio- nem & contemptum, suique ad aucupandum honorem carpat, sua meliora importunè obtrudat, peccata in medendo obtendat, & omnia crebris contradictionibus pessumdet.

## IX.

Quintò, Consultatio talis sit, in qua superflua omnia vitentur, nihil ad pompam, nihil ad ostentationem proponatur, nihil etiam necessarium ad sanitatem ægro redimendam, omittatur. Exulent igitur. 1. Qui loquacitate suâ, dum de ægroti salute, vel saltem de rebus ad eam pertinentibus fermocinari deberent, turpissimè in devia, ac inanum & importunarum quæstionum labyrinthum incidunt, vel de non entibus prolixâ verbositate discurrunt. 2. Qui eloquentiam suam ostendentes, magnificis verbis, superbisque nominibus de morbo, ejusque causis pronuntiant, hincque vel curam alii prorsus morbo accommodant, vel in remediis omnino jejuni & steriles frigescunt; cum tamen laudabilis sit fideliter curare, quàm subtiliter de morbo disputare; & admirari morbos, non autem curare, sit hominis suâ arte & ingenio abutentis. 3. Qui, ut boni Practici videantur, remediis onerati, ut mendicus laciniis, & asinus faccis prodeunt, ac morbos eorumque causas sicco pede transeuntes, nescio quibus secretis, non tam è tripode Apollinis aut Jovis cerebrò depromptis, quàm propriâ speculatione inventis, morborum sanatu- ros sese, promissis potius magnificis aures scalpunt magis, quàm effectû præstant.

## X.

Quoad locum Consultationis, Patavii habetur in publicò, ubi coram plurimis auditoribus, consanguinitate junctis, aliisque, magna cum gravitate, de naturâ affectûs differitur, & plerumque in potissimis consensu, in parvis dissensu, sed amicitia plenus reperitur. Ali- bi semotis arbitris, aliisque affinis ac ægrotum dom- esticis peragitur, ut sic liberius proferantur senten- tiæ, factaque à primò Medico, si correctione indi- geant, liberè sine omni notâ ignorantie, corrigi pos- sint, in quem alias creduli adstantes, si mors subsequeretur, ejus causam referent. Sive autem in publico, sive in privatò instituat locò, nunquam tamen in præsentia ægri, periculosò valdè, vel incurabili morbo laboran- tis, ne auditâ mentione infelicitis exitus turbetur animo, qui corpore jam antè languebat infirmo; vel prius saltem de simulatò prognosticò conveniendum, ut ejus animus in bonam spem erigatur, veritate rei interim amicis insinuatâ.

## XI.

Facta Consultatione, Medicus ordinarius peritorum consultorum exequatur consilia, eorumque decretis obtemperet, necesse est; sæpe enim accidit, ut hic consultorum dicta contemnat, laceret, & præscripta eorum, postquam abierunt rejiciat, lividis coloribus depingat, ad sua redeat, in sententiâ ac erroribus suis obstinate perseveret, ægròque persuadeat, eos multa quidem dixisse, sed scopum non attigisse, se melius ægri naturam noscere, sicque melius sanitati suæ consulere posse. Sed sicut talis, dum consultores ægro sunt præsentibus in eodem locò, summè arrogans ac præsumptuosus, in socios perfidus & ægrotanti summè perniciosus, jure meritò habetur: ita si consulentes ab- sint, scriptoque tantum sua communicent consilia, Me- dici adstantis ac domestici potior habenda ratio, tum quia autopsia Medicum docet & confirmat, tum quia, licet è longinquò expertissima præsidia Medica præscri- bantur, sæpius tamen vel eorum mentem non semper rectè percipiunt ægroti, vel dubii sunt, an hæc ferre possint, vel nova inexpectata, nec prævisa superveniunt symptomata, vel remedia non statim eam, quàm ægro- ti sibi pollicebantur, præstant operam, ut jam desere- re sit animus; quibus in casibus necessarium est, ut ordinarius præscriptæ curæ clavum teneat, ac dirigat, & pro ratione loci, temporis, ægri ac morbi, nunc addat, nunc demat.

## B

## XII.



## XII.

Quisquis igitur vitam summo opere zelans morbo peritaci, ancipiti, periculosô aut ex totô, vel ex parte insanabili corripis, & ad medicam consultationem, velut ad anclioram & asylum confugis, ut vel levamen, vel integram exinde spes valetudinis restitutionem, ut eadem ritè & dictô modô peragatur, cura; vel si perniciofa consulentium dissidia & turbas timeas, eos seorsim accerse; vel ut separatim sententiam, atque rationes suas scriptis mandent, jube, eaque Medico tuo adstanti & ordinario approbanda vel rejicienda, vel ex parte vel ex integrô committe. Si enim vir probus sit & honestus, in cujus animo Charitas, medicæ virtutes ac peritia conspirant, excitatus præsertim fiduciâ tuâ ad majorem curam & sollicitudinem, nihil quidquam in votis optatisque habebit, quàm ut boni principis instar, vel amantissimi patris aut tutoris, valetudinem tuam regat, vitamque pro viribus tueatur; si autem ejus scientiam ac peritiam suspectas habeas, eum prorsus cum emeritô soltro dimittas, aliique, cui libentius fidas, salutem tuam concredas, consulo.

## ARTICULUS VII.

## De Officiô Medici, in Methodo medendi.

## I.

**R**ogatus olim à non nemine *Cappivaccius*, magni nominis & immensæ eruditionis, præclare de universa Medentum republica meritis, ut arcana & secreta sua communicare vellet, scitè respondit: *Disce meam Methodum, & habebis mea secreta*. Hæc enim est arcanorum summum arcanum, hæc est basis ac firmissimum artis medicæ fulcrum, hæc est lapis lydius, quô veri rationales Medici à spuris & adulterinis, empiricis nempe & agyrtis discernuntur, hæc est vera ars, quâ per indicationes auxilia inveniuntur ad sanitatem tum conservandam, tum redimendam. *Nemo enim ut Parens Medicinæ Galen. 9. method. 8. testatur, artis Medicæ scientiam nancisci potest, nisi & Methodum quandam habuerit per universalia Theoremata, & in particularibus se exercuerit.*

## II.

Medici Methodici est, curare *citò, tutò, & jucundè*. Citò quidem, tum ob celerem fugacitatem occasionis, quæ citatis alis properat, ac fulguris instar fugit: tum ob corporis humani œconomiam variis mutationum vicissitudinibus obnoxiam, tum ob celerrimos haud rarò causæ morbificæ motus, ut medicamenta, quæ antea erant proficua, hinc reddantur inutilia, tum ob vires, quæ modò validæ ad remedium perferendum, postea diminutæ & languidæ, illud ipsum admittere nequeunt. Rectè igitur magnus *Hippoc. in epist. ad Crater.* meminit: *Ab omni quidem arte aliena res est procrastinatio; verum maximè in Medicina, in qua vitæ periculum parit: præcipuè autem occasio attendenda in morbis acutis, qui vehementissimis stipati symptomatibus, occyssimè citatò cursû ad stitum properant.*

## III.

Caveat igitur Medicus, ne agyrtarum, & Pseudomedicorum instar, turpissimi lucri causâ morbos prolonget, ac momentum illud occasionis, quod est anima curationis, turpiter negligat: neque etiam imitetur meticulosos illos & superficialios Medicos, qui famæ suæ nimis sollicitè consulentes, ac mulierculas, imperitum vulgus, subinde etiam magnates, nescio quid ultra artem sibi sapere visos, timidè respicientes, nullum

magnæ efficacæ præsidium administrare audent, quod non ipsis adstantibus, vel approbatum, vel concessum fuerit, ne ex minus prospero eventû, nocuisse potius, quàm profuisse visi, agri incurrant contemptum; neque timidos illos lepores, quorum timore plures agrotorum è vitâ discedunt, vel chronicos incurrunt affectus, dum vel ab initio, non satis validè mox revelunt materiam aliquam in partem affluentem, vel purgationem, faburrâ cacochymicâ, in primis viis hærente, differunt, usque dum præternaturale præpullulet fermentum, totam inficiens massam sanguineam, ac reliquias viscerum digestionis corrumpens; vel dum ebullitiones febriles, prætermisiss venæ sectionibus non restinguunt, vel in morbis gravibus quibuscunque, ad generosum aliquod auxilium descendere reformidant, non perpendentes illud *Massaria: vix ullos magnos curari morbos, quia raro se expediunt Medici à lenientibus*; vel illud *Celsi: satius est, experiri anceps remedium, quàm nullum.*

## IV.

Non tantum *citò* curabit Medicus, cum elapsa occasione causæ morbificæ repentè sumant aliam ideam, motum, ac morem, humores noxii dominantur, morbus invalescat, symptomata sæviant, vires collabascant, natura que oppressa succumbat; sed etiam celeritati jungenda est *securitas* veluti media, & inter duas reliquas condiciones præstantissima. Licet enim, in morbis chronicis felices inducias concedentibus, festinatio nimia sæpius periculum minetur, Medicus tamen eò semper intentâ mentis acie colliminare debet, ut *tutò* saltem medeatur.

## V.

*Tutò* curabit Medicus, si utatur remediis velut amicis, paucis nempe sed expertis, ac longissimâ annorum serie approbatis, & quasi canonizatis. Certa enim dubiis & incertis præferenda, hinc dum *Cels. l. 3. c. 9.* temerariis subinde remediis utendum esse innuit, asserendo: *quos ratio non juvat, temeritas subinde sanat*; intelligendum hoc de morbis planè conclamatis & desperatis, in quibus melius est anceps remedium experiri quàm nullum. *Tutò* curabit, qui noverit remedia vulgaria præ foribus nascentia, viribus integris, facillique pretio ubivis habenda, sæpius præstare exoticis & peregrinis, incertam subinde profapiam mentientibus, suspectis, mangonizatis, nec rarò sitû, tere dine, sentinâque corruptis.

## VI.

*Tutò* curabit, qui noverit, æquè feliciter & faciliter curari morbos remediis simplicissimis, euporistis ac vulgaribus, selectis tamen, ac circumspèctè, & cum judicio adhibitis, quàm per stupendam illam, & sesquipedalem receptarum molem, aut per abstrusissima nonnullorum secreta. Hinc, teste *Helmont.* pauca sunt, quæ Medicum nobilitant; ac aureum illud *Arnoldi de Villâ novâ* dictum probè observandum: *Dolus est, uti compositis, ubi simplicia sufficiunt*; sicuti enim simplex victus saluberrimus ac naturæ convenientissimus, ita pariter & pharmaca, cum in utrisque natura paucis contenta sit. Pro re natâ igitur Medicus, nec solis euporistis & simplicibus, nec semper compositis uti sciet.

## VII.

*Tutò* curabit, qui didicit abstinere remediis chymicis propriâ manû haud paratis, aut quorum experientiam nondum habet, præsertim si Galenica sufficiunt. Item qui purgantibus violentis, præcipuè Mercurialibus & antimonialibus haud usus fuerit, præsertim in jam senescentibus, lactantibus, cachecticis, & debilibus; aut venæsectione nimis prodigâ in ætate jam in gravescente, in non assuetis, in morbo inveteratò, viriumque defectû; vel Opiatis in asthmate, hydrope, infantibus,



infantibus, extremâque spirituum inopiâ exhaustis; vel Dulcibus, in affectibus tartarô-acidis.

## VIII.

*Tutò* curabit, qui omnes causæ morbificæ reliquias è corpore ad pulvisculum usque expellit, ne iis relictis, massa cruoris subinde ebulliat, fermentescat, sicque recidivam radice suâ pejorem patiatur æger; qui insuper maximè studuerit eradicandæ causæ morbificæ, exsiccandoque fonti, unde tot symptomatum scaturigines propullulant, ita tamen, ut subinde à regiâ viâ divertere, & symptomatibus præsertim urgentioribus occurrere possit, vel causæ simul & symptomatibus prospicere. Item qui morbis debilibus debilia, valentibus valentia adhibet remedia. Sicuti enim, quæ longò tempore sunt contracta, lentè curare oportet, ita quæ brevi breviter, ut creationis morbi & curationis, paria quodammodo sint temporum momenta.

## IX.

*Tutò* curabit, qui auream illam venerandi *Coi* observaverit regulam: *Si non potes prodesse, saltem ne noceas.* Sæpius enim, dum chronicas ac profundâ radice inveteratas ægitudines curare præsumimus, hydram lernæam ostendimus, ac non solum non juvamus, sed magis lædimus: hinc noverit, optimum sæpè medicamentum esse, non uti medicamentò. *Quiete* namque & *abstinentiâ*, præcipiente *Celso*, *gravissimi curantur morbi*: immò *neglecti subinde morbi*, teste *Acilio*, *sunt leviores*: frustranea enim sunt medicamenta, exhaustâ naturâ, vel obtentò jam fine, vel ubi ipsa natura sufficit. *Tutò* etiam curabit, qui topica, nisi aliquid adfit, quod curationem pervertere possit, ante universalium remediorum usum non applicaverit: qui medicamenta temerè non mutaverit, cum crebrior eorum mutatio, vel ignorantiam vel diffidentiam innuat; qui tandem vel diætâ subinde solâ, vel saltem nunquam sine illâ medebitur, nam sine clavis & remis navigat, qui nullâ victus ratione observatâ, Medicinam facere conatur. Hinc verum illud magni *Sennerii* effatum: *Medicamenta vel efficacissima, incassum propinquantur, ubi justum & conveniens diætæ regimen fuerit neglectum.*

## X.

*Jucundè* tandem, quæ ultima medendi conditio, medebitur Medicus, si remediis utatur suavis, & quoad fieri potest colore, odore & sapore gratis; lubentiùs enim tinctura vel essentia dulcis & odorata, vel paucæ & insipidæ pilulæ, vel exiguus assumitur pulvisculus, quàm longum & ingratum apozema, aut potiones amaræ, vel prodigiosæ, & theriacales compositiones, & nauseabunda variorum simplicium commistio, quæ insuper certa ignorantiae filia, periculosa etiam & sumptuosa.

## XI.

*Jucundè* curabit, qui sine dolore vel absque insigni molestiâ ægrotum tractaverit, vitando omnia, quæcunque, vel animum vel sensus ejus offendere possunt: concedendo è contra, quæ visui jucunda oculos delectant; quæ tactui grata & attingenti mollia, quæ in cibò & potû palato suavia, in iis præsertim, quæ parùm nocere valent, aut quorum levis illata noxa, faciliè reparari potest, curando etiam ut omnia sint munda, mundisque vasculis excipiantur. Nullus adsit ministrorum, nisi quem æger libenter viderit: nemo adstantium vel amicorum cubiculum introëat, nisi cujus adventus & præsentia ægro fuerit gratissima. Jucunditatem augebit per omnia Medicus, si lenitatis, dilectionis & beneficentiæ affectibus excitatus, erga ægrum fuerit humanus, affabilis, suavis & gravis.

## XII.

Dum autem ægrotum genio gratificari conatur Medicus, caveat, ne nimia promptitudine in præstandis

ægro obsequiis excedat; quemadmodum enim facilitas mediocris jucunda est, & nihil detrahit de autoritate Medici, ita, si nimia, non tam sæpè cedit in Medici contemptum, quàm ægrî perniciem, si præsertim concedantur, quæ curationis cursum retardare, vel morbi periculum augere possunt, ut medicastri adulatoribus haud infrequens, dum vel in gratiam ægrotum, causâ morbificâ multum adhuc in corpore luxuriante, dolores Narcoticis sedant, sicque ut cum *Rhase* loquar, rem magni terroris componunt; vel appetitui ægrotum unice lenocinantes, nunc frigidam, nunc vinum, nunc cibos solidiores, ubi non deberent, porrigunt: nunc servorum ritu quibuscunque jussis parent, cum tamen Medici, ex *Æsculapii* progenie exorti, ægris dominari, iisque præesse debeant, sicuti duces exercituum militibus ac Reges subditis. Certè, quàm multi blandâ aurium gargarizatione, per deceptorios hos susurrone instituta, ad superlunares ablegati fuerunt, qui sub rigidis verorum Medicorum præceptis, convalescent.

## XIII.

*Jucundè* tandem curabit Medicus, qui minoribus; quoad fieri potest, medebitur expensis; haud imitando illos, qui ægros in maximas inutiles ac supervacaneas expensas præcipitant, præscribendo ad ostentationem potiùs, vel inscitiam suam, multitudine & pretiò medicamentorum tegendo, vel Pharmacopolas, cum quibus subinde pacta quædam circumventiosa instituunt, ditando, præscribentes remedia tam cara quàm rara, quæ ægrum è morbò convalescentem, in novas pro tot debitis persolvendis angustias & ægitudines deturbant, ut deinceps mori potiùs cupiat absque medicamentorum ope, quàm cum tantâ pharmacorum suppellectile, ac hæredum suorum dispendio, perire.

## XIV.

Felix igitur ille Medicus, qui *tutò*, *citò* ac *jucundè* medebitur. Licet autem reperiantur quidam casus, in quibus hæc 3. requisita in curatione conjungi nequeunt, non enim in morbis chronicis semper citò, nec in illis, qui vomitum desiderant, aliisque, semper jucundè mederi valemus, unde spectandum ad id, quod magis urget, anteponendâque securitas celeritati & jucunditati, maximè ubi mortis impendet periculum: satiùs tamen est, morbum cum minori jucunditate citò curare, quàm ægrotum palato & voluntati ablandiendo, affectum prolongare & asperare.

## ARTICULUS VIII.

*De Officiò Medici, in petendò & recipiendò Sostro.*

### I.

**M**edicis ac Præceptoribus non rei, quam communiant, sed operæ quam locant, pretium solvi, elegantissimo loco exprimit *Senec. l. 6. de benefic. c. 34. emis*, inquit, à *Medicò rem inæstimabilem, vitam ac valetudinem bonam: à bonarum artium præceptore studia liberalia & animi cultum, itaque, bis non rei pretium, sed operæ solvitur: quòd deservium, quòd à rebus suis advocati nobis vacant, mercedem non meriti, sed occupationis suæ fuerunt.* Meritò igitur Medico convenit Honorarium, tam pro visitationibus, quàm itineribus, formularum præscriptionibus, tædio, labore, lectione ac meditatione &c. cum illud *honora Medicum*, non de verbali tantum, ut ita dicam, sed reali etiam honore intelligendum sit; si enim Juris Consultus non tenetur gratis consilium ferre, nisi pauperibus, si Advocatus pro labore honorarium postulare potest, multò minùs Medicus gratis haud mederi tenetur, utpote salutis hominum unice intentus.



## II.

Licet verò Medico competat honorarium pro suo labore & diligentia, etsi etiam moriatur æger, dummodo juxta artis præcepta medicinam fecerit, ut nihil ipsi imputari possit, quod vel maximè observavit *Socrates*, cujus morientis ultima vox erat: *O Crito Crito! Æsculapio gallum debemus, quem reddite, nec negligatis*; tamen de mercede cum ægrò pacisci, præsertim in morbis dolorificis & acutis, videtur esse res, nobilissimâ arte medicâ indignissima, ac mos potius Empiricorum & agyrtarum, qui, dum dolor est & occasio viget, quidquid possunt, arripiunt, quod tamen, sicuti impium, ita arti potissimum ignominiosum, Pacta hujusmodi honestis viris avaritiam & sorditiem: Jurisconsultis extorsionem sapiunt; quid enim non largiretur in periculo constitutus? *pellem propelle*, ut legitur in lib. *Job. & omnia, quæ possidet homo, dabit pro animâ suâ*, Sicuti igitur de mercede cum ægrò pacisci indignum, de illâ deliberare durante morbo indecorum & avarum, ita impium, urgente eodem magnò & acutò.

## III.

Caveat ingenuus Medicus, ne tacitò quòdam postulandi genere, apud ægrotum hanc aut illam vestem, clinodia, equum, libros aliâve suppellectilem domesticam nimium commendet, nevé ab eodem, si mercator fuerit, quidpiam emere tentet, ne aliquam inferat cogitationem hominibus alioquin suspiciosus, & de lucro semper cogitantibus, velle, ut sibi offeratur id, quod emit aut collaudat, & artificio quòdam id extorquere, quod ipsum oblaturum non confidit, multò minùs quidquam ex domo Patientis assumere, detestandæ avaritiæ indicio, quàm summopere improbat divinus *senex*, dum lib. de dec. ornat. sapientem Medicum argenti contemptorem debere esse dicit. Idem innuit *Seneca* ac laudatissimò exemplò re ipsâ testatus est *Hippoc. Abderites*, qui nunquam se pro usû medicinæ accepisse mercedem scribit, quia Medicina libera est & Deorum inanus; quam laudis partem Patri quoque suo Medico attribuit hoc disticho *Ausonius*:

*Obtuli opem cunctis poscentibus artis inemptæ;  
Officiumque meum cum pietate fuit.*

## IV.

Sicuti laudabilis mos est nonnullorum locorum, quò certum pretium certis Medicorum laboribus determinatur: ita si nihil certi statutum sit, æquum exigere potest sostrum Medicus, cavendo, ne vel nimio rigore incurrat suspicionem avaritiæ, vel abjectò nimis pretiò suspicionem negligentia, quasi non adhibuisset ea omnia, quæ è re ipsius ægri fuissent, cum contemptu etiam nobilissimæ artis; potissimum autem illuc respiciet, quid conditio ægrotum ferat, quid mores postulent, & quid morbi essentia conveniat. Sunt enim alii morbi periculosiores malignitate sua, alii divurnitate tædiosi: alii curatù magis jucundi &c.

## V.

Cui Medico honor curæ est, cautum se gerat in hoc negotiò, neque facile Sostrum ab ægrò exigat, quia grati spontè dant, ingrati verò ne coacti quidem; est enim longè satius, ut asserit *Hippoc.* à morbo servatis ingratitudinem exprobrare, quàm malè habentes emungere, aut miseros sine ope relinquere. Nullus enim Medicorum est, qui non experiatur multos etiam gratos: subinde autem horridam illam, terribilemque faciem, si præmia laboris poscat, vel ægros, qui vanò verborum sacculò, & turgidis promissionum, gratiaque ampullis Medicum dimitunt: hinc verborum oblii, elegantissimum *Balbas. Zabnii* tractatum de mendaciis, capite, vel paragraphò adaugent, quasi Jure quòdam divinò vel naturali obstrictus teneretur Medicus, ut largos illos, non in unum sed complures studiorum annos, in libros cariores, in peregrinationes quoque impensas sumptus, in gratiosi

tantum aspectus spem, aut vanæ promissionis expectationem, summo privata rei cum danuò impenderit, & tandem id lucri habeat, ut inferrimum servorum servum se exhibeat.

## VI.

Non decet Medicum esse mercenarium, sed nobilem & ingenuum, ut ejus liberalitatem & promptitudinem studiorum, officiorumque, ægri magis experiantur, quàm decollatis in illum beneficiis, aut largâ beneficentiâ eidem exhibitâ, gloriari possint. Sublimior, & supernaturalis medentis debet esse intentio, ac spes æternæ Mercedis, ex obsequiò exinde Deo præstitò. Stolidus enim jure meritiò haberetur ille Medicus, qui in morbis præcipuè malignis, sub vili forsân unò vel alterò imperiali, totâ die venalem circumferret animam: qui dum per annum, sæpè etiam complures, plurima præstitit officia, vel nihil, aut vix & ne vix quidem imperialium aliquot munusculum, ex rejectæ non rarò monetæ quifquiliis accipit; qui pro exiguo subinde salariò, tot aëris excretorumque corruptelas, tot itinerum pericula, tot ællus, tot algores, nimbos, nives, inundationes, tot agrorum visitationes in varias partes distributorum, aut longâ locorum intercapedine diffitorum, tot prandiorum interruptiones, tot juges vigilias, somni interruptiones, vel maturas ad gallicinium expurgationes, tot sollicitudines & curas sustineret, nisi perenne quoddam officio suo ritè functis, superesset præmium.

## VII.

In accipiendò Sostrò Medicus eam moderationem observare potest, quam *Severus & Antoninus* Imperatores prudentibus & advocatis ex publicò, ut moris olim erat, salariatis, in acceptandis xeniis & donativis, à clientibus præscripserunt: *neque omnia, neque semper, neque ab omnibus*. Nam valde inhumanum est à nemine accipere, passim vilissimum, omnia avarissimum. Præcipuè autem pauperibus gratis succurrere studeat, non enim lucri, sed sanitatis & charitatis causâ medendum: immò lucrum tunc maximum esse credendum est, si lucrum negligatur in tempore; quod enim ad superos transit, nos ne sentientes quidem divites reddit & locupletes, hinc placet quod summo cum laudis & honoris titulo, de *Hieronymo Fabricio ab Aquapendente* refert *Polyhistor. Rhod.* in elogiis virorum Illustrum, laudatum Medicum constantissimè omne oblaturum munus recusasse, seque eodem planè animò erga pauperes, quò erga divites se exhibuisse: id verò eò ipsò effecisse eum, ut tot muneribus aureis aliisque pretiosis & rarioribus ornatus fuisset, ut amplum satis cubiculum iis exornare potuerit, quibus inibi omnibus benè dispositis, hanc foribus addidit inscriptionem: *Lucri neglecti lucrum.*

## CAPUT II.

De Officiò Medici in specie, & primò quidem, in Affectibus requirentibus Venæsectionem.

## ARTICULUS I.

Quibus in morbis Medici officium sit, secare Venam?

## I.

**V**ENÆsectio, cum sanguinis plenitudinem ad mediocritatem reducat, corpus gravi onere liberet, illudque calorem nativum liberius ventilando, arctioresque vias & meatus referando, alacrius & expeditius reddat: ejus



ejus etiam orgasmum & effervescentiam sistat: humores ipsi permixtos per effervescentiam, conflagrationem & aduersionem corruptos, vel omnino in putredinem degenerantes evacuet, ulterioremque putredinem arceat, sanguinem ventilando, circulationemque liberiores reddendo: præterea sanguinem è vasis p. n. elabentem, vel ferociori impetû in partem aliquam irruentem, vel potius in parte quâdam stagnantem, revellat, derivet, eum promptius ad partem ab affectâ distantiorē moveat, stagnationis incrementum inhibeat, sanguinemque pristino motui & circulationi restituat; clarè elucescit, eam indicari in morbis excitatis à vitio sanguinis vel *in quantô*, vel *in quali*, vel *in motu*.

## II.

His præsuppositis officium Medici erit, eam, ceu primarium, maximè necessarium & utilissimum remedium administrare, in omnibus inflammationibus, tam internis, ut *phrenitide*, *anginâ*, *ophthalmiâ*, *pleuritide*, *peripneumoniâ*, *hepatitide*, *inflammationibus ventriculi*, *intestinarum*, *mesenter. lien. ren. vesic. uteri &c.* quàm etiam externis: neque sanguis tantum mittendus ratione præsentis, sed etiam ratione futuræ inflammationis præcavendæ, ut in *fracturâ*, *luxatione*, *contusione magnâ*, *vulneribus majoribus*, *ictu*, *casu*, *doloribus cujuscunque partis vehementioribus*, in quibus *Galen.* se nullum majus invenisse remedium fatetur, quàm Venæsectionem usque ad animi deliquium administratam, nisi viribus jam collapsis & debilitatis.

## III.

Venæsectionem quoque administrari curabit in *febris continuis*, ubi nimius urget, vel metuitur æstus, aut nimia turgescencia, vel impetus sanguinis ad caput, pulmones vel alia membra, præsentibus præsertim coincidentibus; cum depletis hæc ratione vasis, laxatæque quasi sanguinis massa, via sternatur diaphoreticis, purgantibus, aliisque præcipitantibus in statu morbi exhibendis. In *Intermittentibus*, præsertim sub hoc climate, non adeo necessariam judicabit, nisi adsit plethora, vel urinæ rubræ, crassæ, ingens cephalalgia, vel metuatur futura febris continua, vel inflammatio alicujus visceris.

## IV.

In *featribus malignis* quàm cautissimè procedet Medicus, observando præcipuè statum sanguinis febricitantis, an ad dissolutionem, orgasmum, & nimiam ebullitionem inclinet; an verò ad coagulum, lentorem ac majorem malignitatem: in posteriori casu parcè adhibenda, vel eadem omnino supersedendum, præsertim etiam, si ab experientiâ pluribus nocuisse quàm profuisse constiterit: in priori verò, ubi malignitas mitior, cum febre ardente vehementiori juncta, in subjecto præsertim juvenili vel plethoricò, si visceris inflammatio adesse vel imminere videatur, confidentius & largius administrabit.

## V.

Apparentibus *petechiis*, *bubonibus* vel *parotidibus*, intermittit Medicus Venæsectionem, si ex hisce evacuationibus natura potentior reddita sit, ac vitæ signa deprehendantur, ut pulsus æqualitas, vehementia, dilatatio plenior, febris ac symptomatum remissio, cum veris coctionis signis: cautè tamen & parcius administrabit, si erumpant symptomaticè, ex ingenti sanguinis ebullitione, & humorum malignorum ac putrescentium fervore, admotis paulò post V. S. cucurbitulis, cum levatâ sic subinde naturâ, post talem V. S. copiosos sudores, eosque criticos erumpere observemus. Idem ferè observabit Medicus in *variolis*, abstinendo à V. S. eisdem erumpentibus, si eruptio fiat per ebullitionem *depurgativam*, & ex eorum eruptione febris & symptomata remittant: administrando è contra,

si sit eruptio per ebullitionem *corruptivam* cum febre intensiori, anxietate, difficultate spirandi, urina rubra, crassa aliisque gravioribus symptomatibus, ac minor etiam adsit malignitas. Ante eorum eruptionem Medicus eam administrabit, si sanguis nimium ferveat, ebulliat, copia turgescat, cum impetu caput petat, immineant inflammationes viscerum, adsint deliria &c. Nam hæmorrhagiarum in principio copiosa, morbum imminuit, ac natura oneris parte levata, reliquum facilius expellit, & vincit.

## VI.

Medicus V. S. quoque instituet in omni fluxu & evacuatione sanguinis copiosiori, ut *hæmorrhagiâ narium*, *vulnere*, *hæmoptysi*, *vomitû sanguinis*, *miellu cruento*, *disenteria nimium cruenta*, *immoderatò fluxu mensium*, *hæmorrhoidum &c.* viribus nondum extremè debilitatis, maximè etiam si oriantur ex copiâ & orgasmò sanguinis. Idem faciet, in affectibus ex consuetâ sanguinis suppressione exortis, ut in *suppressione mensium*, *hæmorrhoidum &c.* nisi affectus jam sint omnino invertati.

## VII.

Sanguinem præterea mittet in *catarrhis* ac *defluxionibus calidioribus*, serò cum cruoris massâ ebulliente & turgescente, affectibus *rheumaticis*, *arthritide universalis*, *maniâ*, *melancholiâ*, *apoplexiâ sanguineâ*, id est, à stagnatione sanguinis circa capitis vasa productâ, cum faciei rubore & venarum turgescentiâ, quæ nullò aliò remediò citius curatur, quàm per V. S. in ipsò curationis vestibulò statim institutam. Item in *palpitatione cordis*, in quâ *Galen.* 5. de loc. affect. c. 2. fatetur, se nunquam inutiliter in hoc affectu venam secasse. In *dyspnœâ*, quæ fit sine stertore, & unò verbò in omnibus aliis affectibus, qui vel à sanguinis copiâ, vel ejusdem vitiosâ qualitate, vel præpostero ejus motu oriuntur: sicuti è contrariò nullò horum urgente, omittitur, ut in *phibisi*, *hæticâ*, *paralyti*, *ascite*, *tympanitide &c.*

## VIII.

Ultimò tandem pro curâ prophylacticâ Venæsectionem suadebit Medicus, semel vel bis in annò administrandam, qui sanguine abundant, & quibus nec integrum, nec commodum est, exactam fervare diætam, & clinicam agere vitam, cum nulla alia suppetat ratio valetudinem suam tuendi, & vitam in longam senectutem producendi, quàm, vel per exactissimam diætæ rationem, vel per purgationem, & V. S. semel vel bis in annò, vere nempe & autumnò institutam. Qui enim sobriè haud vivunt, singulis diebus aliquid crudi humoris addunt, qui sensim & sensim adauctus, ac putrescens, lethales excitat affectus, ut adeo plures ferè hac de causâ pereant.

## ARTICULUS II.

### De Officiò Medici, in observandis Coincidentibus, & Contraindicantibus Venæsectionem.

#### I.

IN Venæsectione præcipuè observabit Medicus permittentia vel prohibentia, cum thesaurus vitæ in sanguine sit reconditus, ac *Helmontiò* teste, vires vitales & sanguis sint correlativa; hinc oculus dexter præcipuè ad vires, sinister ad morbum dirigendus. Intelliguntur autem per vires præcipuè vitales, quæ sunt debiles, vel per *resolutionem*, seu ab immodicâ evacuatione, seu à morbi diuturnitate vel doloris atrocitate, vel labore, inediâ, vigiliis &c. & cognoscitur per pullum continuum, parvum, languidum ac valdè frequentem;



vel per *suffocationem* seu *oppressionem*, ab humorum copiâ, & cognoscitur ex pulsû variô, confusô & inaquâli, & quod nulla causa externa resolvens præcesserit. Sicuti igitur viribus non resolutis, sed suffocatis & oppressis, convenit V. S. & quidem larga: ita viribus nonnihil imbecillibus, mediocris: resolutis vero & planè prostratis, nulla; cum non deceat exhaustos spiritus vitales magis exhaurire.

## II.

Cum vires insignem à rebus secundum naturam, præter naturam, & non naturalibus mutationem patiantur, de iis etiam considerationem instituet Medicus, & primo quidem *de ætate*. Ex ætatum numerô sanguinis missionem coindicat *ætas florens*, inter pueritiam & extremam senectutem media. Pueris *Galen.* Venæ sectionem prohibet, eamque ante 14. annum non vult administrari; Medicus tamen in septennibus, octennibus, decennibus &c. detentis morbis acutis à sanguinis copiâ, ejusque effervescentiâ exortis, tutam & necessariam judicabit, præsertim si validiores, venis amplis ac copiâ sanguinis præditi. In admodum natû parvis tutius est abstinere his in locis, quia vires in tam tenellâ ætate debiles, fermenta viscerum in primô flore, unde faciliè exhauriuntur, habitus corporis tener ac faciliè resolvable, & perspirabilis, ac aliud est in Galliâ, aliud in Italiâ, aliud in Germaniâ Medicinam facere.

## III.

In Senibus idem *Galen.* post annum 60. Venæ sectionem prohibet, qui senes frigidi, ficci, debiles, & ob sanguinis ac spirituum penuriam, ejus noxam vehementer sentiunt. Interim tamen eam admittet Medicus, morbo acutô id exigente, ac validioribus viribus existentibus, quæ non semper dependent ex numerô annorum, sed ex musculosô, & benè habitô corpore, cum pulsû magnô & venis amplis; cavendo tamen ne decipiatur Medicus, inflatis in senibus venis, cum sæpè à flatibus oriri possit talis venarum distensio. Sicuti autem permittitur V. S. morbis acutis eam exigentibus, ita eadem in senibus limitatur, ut parciore fiat ejusdem evacuatio.

## IV.

Mulier, molliore habitû & frigidiori temperie prædita, V. S. minùs tolerat, quàm Vir. In Gravidis fœtus in uterô etiam non impedit V. S. urgentibus præsertim morbis acutis, vel aliis abortum minitantibus, eam tamen moderatur, ratione quantitatis. Ex *Hippoc.* enim 5. *aph.* 31. *Mulier uterô gerens, venâ sectâ abortit.* (intellige venæ sectionem largiorem, & antiquis ad libras consuetam, ut fœtui alimentum subtrahatur) Sicuti autem urgentibus morbis acutis venæ sectio in gravidis permittitur, & teste experientiâ, innoxie administratur, præcipuè à primô mense usque ad 5tum: cautiùs verò mediis & postremis, & quidem in partibus superioribus, ut medianâ vel salvatellâ; ita eam pro præcavendô abortû, circa medium gestationis tempus, vel ultimis temporibus pro facilitandô partû, non temerè & ex consuetudine tantum, sed consideratis probè indicantibus & prohibentibus, administrandam curet Medicus: nempe in plethoricis tantum, & copiosos aliàs menses habentibus, ubi abortûs periculum imminet à copiâ sanguinis, fœtum obruente & suffocante, quo in casû præsentissimum est remedium V. S. sæpius etiam quandoque repetita, hinc etiam accidentia gravidis supervenientia, ut inappetentia, vomitus &c. cum ex sanguine retentô, impurô, & cacochymô (meliore fœtui in alimoniam cedente) oriantur, à Venæ sectione sublevantur: immò in totum auferuntur, si usque ad solutionem symptomatum, singulis mensibus iteretur, cum è contra à purgatione magis exacerbentur.

## V.

Quoad *temperamentum*, V. S. magis coindicat *sanguineum*, minùs *biliosum*: omnium minime *melancholicum* & *pituitosum*; quod ad *habitu corporis*, eum magis coindicat *carnosus*, venisque latis præditus: sicuti è contra difficulter V. S. sustinet *præpinguis* & obæsus, uti & habitus omnino raræ & *gracilis* naturæ, cum venarum exilitate. Gracilitas enim corporis, cum venarum latitudine magis permittere solet V. S. Quoad *anni tempus*, eam magis coindicat *vernum*: hinc *autumnale*, minus *hyemale*, ac omnium minime *æstivum* ac caniculare. Quoad *regiones*, largiorem V. S. tolerat *temperata*, hinc *calida* & *secca*, minime autem *frigidior*, unde in Germaniâ cautiùs, quàm in Italia, Galliâ, Hispaniâ, &c. vena secanda, quâ copiosiori, homines etiam apparenter robustos, in animi deliquium, cachexiam, hydropem, vel alios morbos incidere, observamus.

## VI.

Quoad *consuetudinem* alacriùs & leviùs Venæ sectionem perferunt *assueti*, quàm non assueti & hæmophobi. Licet autem non tanta sit vis consuetudinis, ut semel detractus sanguis, necessariò dein singulis annis subtrahi debeat: præsertim si alterô annô non adsit idem indicans, ac causa venæ sectionis sublata sit; tamen ejusdem multa habenda ratio, cum experientiâ constet, V. S. affuetos statim vicibus in venâ pungi solitâ, titillationem sentire, naturâ quasi ad solitas evacuationes monente. Quoad *viçtum*, magis evacuandi utentes eodem *pleniori* & liberaliori: parciùs *frugaliter* viçtantes. Quoad *animi pathemata*, Venæ sectionem impediunt *ira*, *tristitia*, *timor*, quò etiam reducuntur *vigiliæ* ac nimius *venercorum* usus; sicuti è contra eam indicat *terror* subitaneus, pro suffocatione cordis ex cruoris stagnatione impediendâ.

## VII.

*Evacuationes*, tempore V. S. coincidentes, si sint *sanguinis*, & accedant pro quantitate causæ, ut sint veluti criticæ *perfectæ*, nihil innovandum, teste *Hippoc.* 1. *aph.* 20. si *diminutæ*, adjuvandæ, & V. S. administranda, evacuando tantum, quantum conjunctis evacuationibus causa morbifica requirit. Si nimix, priùs sistendæ, in quem finem etiam locum habere posset V. S. revulsoria. Si sint evacuationes *aliorum humorum*, seu per *alvum*, vel *vomitum*, vel *habitu corporis*, vel *abscissum* &c. eodem ferè modò procedendum, & criticæ *perfectæ*, naturæ relinquendæ: *diminutæ*, per loca conferentia adjuvandæ: hinc pro exigente necessitate Vena secanda.

## ARTICULUS III.

## De Officiô Medici, in considerandô Locô, &amp; Quantitate Venæ sectionis.

## I.

**L**ocus Venæ sectionis administrandæ specificatur, tum ab affectû, exigente vel revulsione, vel derivationem vel evacuationem, tum à sitû partis affectæ, hujus vel illius, Venæ apertionem requirentis. *Revulsio*, quæ est sanguinis in quadam parte stagnantis, in contraria, vel opposita evacuatio, si sit *universalis*, contrarietatem observat respectu totius corporis, & in eo contrarios terminos respicit, vel à capite ad pedes, vel à dextris ad sinistram & vicissim: ita tamen, ut non simpliciter pars distantissima requiratur, sed attendenda origo fluxionis, tum vasorum communio cum parte affectâ. Si *particularis* & *localis*, in unô membrô contrarios terminos respicit, & quidem vel à parte posteriore ad anteriorem, vel ab internâ ad externam & vicissim, si èt



hæc potius ad derivationem referenda, nec facile in principio, corpore plenò instituenda. Sicuti autem revulsio sanguinem stagnantem in contraria distantiori evacuat, dum reliquus sanguis promptius ad venam apertam fluit, & imminutà ejus quantitate, sanguis stagnans à vicinis vasibus depletis reforescit, ac motui circulari restituitur: ità derivatio in proximiori, & evacuatio ex ipsâ parte affectâ evacuat.

## II.

Circa Venarum electionem, stante circulari sanguinis motu; non amplius superstitiosus fit Medicus. Nulla enim hîc ordinis prerogativa specialis, neque ulla Vena datur, cujus sectio specialiter medeatur determinatæ alicui parti vel morbo. Communiter in praxi, pro evacuatione in febribus secatur *mediana*, *die Median-Ader*, utpotè tutissima, cui arteria non subjacet; vel *Basilica die Leber-Ader*, cui tamen arteria subjacet. *Cephalica brachii die Haupt Ader auf den Arm*, ramus ceteris exilior est, minùsque in praxi observabilis; interim unâ vel alterâ non apparente, altera magis conspicua aperienda, cum omnes hæ Venæ æquales sint rivuli, ex eodem flumine sanguinem haurientes: eadem Mediana vel Basilica evacuationis causâ secatur, in affectibus omnium illarum partium, quæ sunt sitæ inter claviculas & renes, ut *Cor-dis*, *pulmonum*, *epatis*, *lienis*, *ventriculi*, *renum* &c. uti etiam *revulsionis* gratiâ in omnibus affectibus partium inferiorum, ac etiam superiorum supra claviculas, ut *Colli*, *faciei*, *capitis* &c.

## III.

An *dextra* vel *sinistra* secanda, desumitur ex habitâ ratione vel revulsionis, vel derivationis vel evacuationis; sic v. g. in pleuritide dexteri lateris, ut vera fiat revulsio, si Medicus in principio vocetur, & adsit insignis plethora, in sinistro latere, utpote parte oppositâ Vena secanda. Secus & ordinariè per derivationem potius ex brachiò partis affectæ, unde statim insigne doloris emergit levamen. Evacuationis causâ dextra magis aperiiri solet, nisi in affectibus lienis, ubi sinistra præfertur, ut servetur rectitudo & vasorum communio. In Venæ sectione præservativa, vernò tempore dextri: autumnò sinistri brachii vena tundi solet, non autem necessariò debet.

## IV.

*Vena cephalica manûs*, *die Haupt-Ader auf der Hand*, & *Salvatella*, *die Salvatell*, incidi solent, si vel in brachiò nulla Vena sit conspicua, quæ tundi possit, vel virium adsit minus robur, cum tardiùs, & minori cum debilitate evacuent, aut majus immineat periculum ex V. S. largiori, ut in graviditate. Apertio Salvatellæ in febre quartanâ pluribus experimentis laudata, solidò caret fundamentò, & nullâ ratione fulciri potest. *Vena frontis*, *die Stirn-Ader*, derivationis gratiâ secari solet in affectibus capitis, ut *phrenitide*, *maniâ*, *dolore capitis*, *ophthalmiâ* &c. *Venæ sublinguales* seu *raninæ*, *die Aderen unter der Zungen*, ejusdem causæ gratiâ aperiuntur, præsertim si turgidæ sunt, in *dolore capitis*, *prunellâ*, seu *inflammatione* & *ardore linguae*, in qua maturè aperiendæ; item in *anginâ*, in quâ etiam, ubi febris haud admodò magna, nec corpus plethoricum, vel solæ apertæ, præcavent faucium angustiam, dum *anginæ* sentitur principium.

## V.

*Vena sub genû* utriusque cruris, *die Brand-Ader*, secari solet in pedibus ulceratis. *Saphæna*, *die Rosen-Ader*, in suppressione mensium, & exinde oriundis affectibus, licet in plethoricis & suppressione antiquiori, plures priùs ex brachiò, hinc ex pede mittant Medici. *Ischiatica*, *die Gicht-Ader*, in coxendicum dolore. *Cephalica pedis* ad pollicem, *die Haupt-Ader auf dem Fuß*, vel quæ est *ad minimum pedis digitum*, *die Vier-*

*tel Ader*, in affectibus capitis pro revulsione, in febribus quoque continuis, si adsit æstus & dolor lumborum, cum urinis rubris crassis, vel materia caput petat cum cephalgiâ, vigiliis, imminentibus deliriis, quò in casu, post unam vel alteram Phlebotomiam in brachiò administram, hæc Vena pedis secanda. Convenit etiam derivationis gratia, in affectibus renum ac partium infra eos existentium, ut vesicæ, uteri &c. Interim quod de Venis brachii, hoc etiam de Venis pedis dicendum, parùm nempè interesse, vi sanguinis circulationis, quæcunque tandem tangatur, cum omnes sint ramuli unius trunci, licet Medicus subinde accommodare se debeat vulgari praxi.

## VI.

*Quantitas* emittendi sanguinis desumitur ex morbi magnitudine ac virium robore, tantumque evacuandum, quantum morbus exigit, & vires tolerant. Ratione *magnitudinis morbi*, *Galen.* in febribus ardentissimis, maximis phlegmonibus, & doloribus vehementissimis, sanguinem ad animi deliquium mittendum esse suadet, modò vires sint validæ, quod tamen hòc tempore obsoletum, ejusque locò repetita commendatur V. S. præsertim in paucitate sanguinis, debilitate corporis, & ubi magis revellendum; abstinendum etiam à V. S. *Neronianâ* dictâ, seu apertione duarum vel trium venarum simul & semel, eodem tempore.

## VII.

In *Inflammationibus*, *Hippoc.* sanguinem ad coloris mutationem usque mittendum esse jubet, si in primâ vel secundâ V. S. appareat crudus, pituitosus & aquosus, eadem continuanda usque dum appareat rubicundus, & vicissim; cujus præcepti observatio, licet in praxi sæpè optimè succedat, pertinaciter tamen coloris mutatio expectanda non est, cum vires priùs deficere possint. Nonnulli sanguinis emittendi quantitatem, ex labascente fluxionis impetû ac pulsûs mutatione colligunt, quæ tamen non semper expectanda, cum in robustioribus non nisi plurimâ sanguinis jacturâ factâ, succedant.

## VIII.

Tutò procedet Medicus, in quantitate sanguinis emittendi detrahendi, si largiorem adhibeat, vel eam pro necessitate repetat, ubi major sanguinis effervescencia, major sanguinis copia, ætas florens, temperamentum sanguineum, venæ latæ & amplæ, regio ac tempus anni calidius: parcius è contra, & præsertim in Germaniâ licentiosa illa & prodiga venarum apertio, nonnisi urgente admodum indicatione instituenda, idque saltem permittentibus, nec contraindicantibus viribus, cum sanguis sit vitæ thesaurus, & copiosior V. S. spiritus exhauriat, calorem innatum dissipet, viscera languefaciat, cruditatesque generet; hinc testatur experientia, aliquos ex phlebotomia copiosa in morbos incidisse longos, nonnullos in reliquum vitæ tempus frigidos, aut decoloratos ac cachecticos redditos fuisse: alios incidisse in morbos exitiales ut hydropem, dispnoeam, epatis ac ventriculi imbecillitatem vel tremorem, paralytin, apoplexiam. Tutissimum igitur est, à Mediocritate non recedere: & in ventilatoria V. S. *ein Luft-Lâssl.* ad Unc. 4. 5. & in evacuatoria, ad Unc. 6. 8. 9. &c. pro una vice emitte.

## ARTICULUS VI.

### De Officiò Medici, in considerandò Tempore Venæ sectionis.

#### I.

Cum tempus V. S. aliud sit *commoditatis*: aliud *necessitatis*, vel aliud ratione *therapeutica*: aliud ratione *prophylactica*:ambo quàm maximè consideranda. Ratione



Ratione curæ therapeuticæ, urgente necessitate, ut in anginâ, pleuritide vehementi, contusione magnâ, casû, hæmorrhagiâ enormi, apoplexiâ, catarrhò suffocativò &c. nulla habenda ratio diei, horæ & temporis, sed quantocyus administranda, etiam neglectò præviò clystere vel laxativò, cum hi morbi ita sint comparati, ut nisi iis V. S. subito occurratur, æger in præsentaneum conjiciatur vitæ periculum.

## II.

Eòdem modò acceleranda V. S. in febribus continuis, ac ab initio statim, vel secunda aut tertiâ die sanguis detrahendus est, modò ventriculus vel primæ viæ nullâ humoris corruptelâ, vel cruditate refertæ sint, quo in casu clyster vel laxativum præmittendum. Nam 2. *aph.* 29. *incipientibus morbis, si quid movendum videatur, move; cum verò consistunt ac vigent, quiescere melius est.* Principiò neglectò, etiam in augmentò Venam secare licet, modò absit malignitas, viresque non sint resolutæ, nec proximè immineat crisis. In febribus intermitentibus, ut v. gr. tertianâ, etiam post tertium, immò quantum paroxysmum & ultrâ, commodè ac tuto Venam secabit Medicus, quia in his febribus interdum cacochymia multa & sanguis paucus; interdum sanguis à principiò copiosus, & cacochymia in malsâ sanguineâ cum urinâ rubrâ crassâ, turbidâ: interdum è contrâ; unde pro horum varietate Vena nunc citius, nunc tardius secanda: nunc prorsus V. S. intermittenda.

## III.

In febribus continuis legitimum tempus V. S. est remissio febris, si autem nulla sit, ut in febribus synochis, eligenda hora matutina, quia tunc omnia corpora magis vegeta. In Intermitentibus tempore apyrexiae Vena secanda. Si V. S. sit reiteranda, & quidem evacuationis causâ, præcipuè in acutis & morbis universâlibus, eadem die fiat. In his enim subito corpus in alium statum transferendum, ac sæpè evenit, ut morbus mox principium percurrat, ac postmodum V. S. ambigua fiat: si revulsionis causâ, diversis diebus repetenda est, ut natura contrario motui diversis vicibus, & intervallò interjectò affuescat magis. Si in unò eodemque affectû, & purgatione, & V. S. opus sit, præstat V. S. purgationi (intelligitur autem radiativa, non lenitiva) præmittere.

## IV.

Ratione curæ prophylacticæ, seu in V. S. electâ, in quâ commodum tempus expectare possumus, inter anni tempora, ob temperatam ejus qualitatem opportunissimum est *vernum*, teste *Hippoc.* 7. *aph.* 53. ubi ait: *Quibus sanguinem è venis detrahere convenit, iis vere secanda est vena*, hinc *autumnale*, quod etiam aliquid de calore remittit. Eligenda dies serena, minimeque turbida. Horæ etiam antepomeridianæ aptissimæ, quia tunc temporis perfecta concoctio, & solis ortus animum reddit hilariorum. Eligendi dies, in quibus non occurrit violenta quædam constellatio, aut ipsum novilunium vel plenilunium, aut quadraturarum aliqua. Quoad lunam, in augmentò ejus instituta efficacior, & commodior est, quàm in ejusdem decrementò, quia natura pristinas tunc temporis vires citius recolligit.

## V.

Vulgò etiam attenditur ad signa *Zodiaci*, ex quibus pro administrandâ V. S. faventia ponunt, *arietem*, *libram*, *arcitenentem* & *amphoram*, minus faventia, *taurum*, *geminos*, *leonem*, *virginem* & *caprum*; mediò modò se habentia, *cancerum*, *scorpionem* & *pisces*. Sed multis præstantibus viris, hæc signa ne minimùm quidem valent ad legitiuum Phlebotomiæ usum, cum jam aliquot viginti gradus à pristina sua statione recefferint, in quò olim Venæ sectionis usui fuerunt destinata. Sic pariter partitio corporis humani in diversa *Zodiaci* signa, dum *arietem* capiti, *taurum* collo &c. adscribunt,

absurda et phantastica; hinc metus, in V. S. in di-  
ctis signis contrariis celebrata, de nihilo est, cum omnia  
sint contra rationem & experientiam.

## VI.

Non approbet Medicus Tabellam hanc infra appositam phlebotomicam, *den Juden-Calender*, mendacissimam & impostoriam, principio stolidissimo, numerorum nempe delirio & chimæricæ calculationi innixam, ac plurimum penè inanibus, & multorum calculis oberrantem. Sicuti autem Medicus, Tabellæ hujus fautoribus fungum pro cerebrò, ac peponem pro corde relinquit; ita subinde connivere potest, ne ob validam nonnullorum impressionem, solus metus idem efficiat, quod in morione illò aulicò, qui per jocum à lictore sic institutò, virgâ percussus, gladium tamen esse ratus, nihilominus exanimatus cecidit.

## TABULA GENERALIS

Secundum quam V. S. pro receptâ superstitiosâ vulgi consuetudine instituitur; ubi prima dies à novilunio numeranda, ita tamen, ut si novilunium horis ante meridianis incidat, illa dies pro primâ accipiat: si autem horis pomeridianis, insequens pro prima numeretur.

| Dies   | Dies                | Dies            |
|--------|---------------------|-----------------|
| 1      | 11 bona, aliis mala | 21              |
| 2      | 12 bona             | 22              |
| 3      | 13 mala             | 23 bona         |
| 4      | 14 mala             | 24              |
| 5      | 15 bona             | 25              |
| 6 bona | 16 mala             | 26              |
| 7      | 17 bona, aliis mala | 27 extremè mala |
| 8      | 18 bona             | 28 bona         |
| 9 mala | 19 mala             | 29 mala         |
| 10     | 20                  | 30 mala         |

## ARTICULUS V.

## De Officiò Medici, in, ante, &amp; post V. S.

## I.

UT Venæ sectio ritè instituat, quædam ante, quædam in, & quædam post eam consideranda. Præparatio eam præcedens consistit in hoc, ut 1. præcedentibus aliquot diebus, vires crapulâ aut forti exercitatione non opprimantur. 2. Primarum Viarum præcedat evacuatio, morbo inducias ferente, vel si ventriculus ciborum ingluvie aut crapulâ obrutus, vel alvina regio excrementis onusta. 3. Animus patientis excitetur, ne per mœrorem vel conslernationem motus sanguinis impediatur. 4. Pateriens reficiatur, cui præsertim eximius oris ventriculi sensus, per succum acidiusculum *limon. granat.* vel ovum recens sorbile, haustò desuper vinò generosò, vel jusculum eupeptum, non tamen longè à Venæ sectione assumptum. 5. Moderata fiat deambulatio & commotio membri, in quò V. S. instituitur. Sic præsertim altiores & profundiores habentes venas, brachium prius commoveant, frictiones in eò instituant, vel grave quoddam pondus manû gestent.

## II.

Præterea 6to. Si in manibus vel pedibus instituat Phlebotomia, partes hæ in aquam calidam imponendæ, ut probè incalescant, rubescant, & venæ magis conspicuæ evadant. 7. Venæ brachii ordinariè ante prandium, nisi aliud suadeat necessitas: sublinguales & pedum



pedum 3. vel 4. horis post prandium secari solent. 8. Non fiat V. S. statim à somnò : sed horâ antepomeridiana eligenda, nona nempe vel roma, &c. 9. Situs ægri supinus sit sedens, vel decumbens in valdè languidis vel debilibus, aut nimium meticulosis, vel animi deliquiò obnoxiiis.

### III.

In ipsâ V. S. 1. Pars incidenda prona collocanda. 2. Eadem pars liganda tribus supra locum incidendum digitis, (in sublingualibus ac Venâ frontis, collum moderate constringendum,) ligaturâ nunc leviori, venâ satis apparente, nunc strictiori in casû contrariò, nunc dupla, ita ut una etiam infra locum incidendum instituat, vena existente tremula ac inconstanti. 3. Vena oculis haud apparens, mollitie & digitorum tactû præterfluentem sanguinem sentiente exploranda, notanda, ac modestè ferienda, per transversum in Venis brachii & sublingualibus: per rectitudinem in Venâ frontis & reliquis. 4. Major fiat apertura, ubi sanguis copiosior & crassior evacuandus, ut in melancholicis & pituitosis: minor, ubi subtilior, tenuior & magis biliosus. Instrumentum Phlebotomicum venarum varietati, situi, & foramini, nunc ampliori, nunc minùs amplo faciendo respondeat. Tutissimè aperiatur vena scalpello, *mit der Lanzett*, hinc *mit der Flieden oder Schnapperlein*.

### IV.

Præterea 5. antequam Vena aperiatur, cavendum, tactû præcipuè ante ligaturam explorando, ne vel Arteria sub basilica latens secetur, & sanguis arteriosus, tenuis, rubicundus saltatim egrediatur, cum maximâ virium debilitate, ac metû aneurismatis, vel Nervus sub medianâ, vel tendo sub utrisque, unde dolor ingens, tumor, stupor, resolutio, convulsio &c. 6. Venâ apertâ superius vinculum laxandum, sanguinis segnior fluxus, pugnò arctius adductò, vel compressò haliù, aut excitatâ tussi vel sreatû, promovendus. 7. Sanguis viribus constantibus, unâ vice: eis non constantibus, iteratis vicibus, oppressò, interdum venarum osculò emittendus. 8. Si sanguis crassus, niger, putridus effluat, fluxus minùs impediendus & sistendus, quàm subtilior, tenuior, & colore magis rubicundus, virium tamen semper habitâ ratione.

### V.

Insuper, 9. dum Sanguis emittitur, 3. saltem pelvulis, stanneis, terreis, vel vitreis excipiendus, reponendusque locò, quò nec ventus, nec fumus, nec pulvis, aut sol eum afficere possit. 10. Imminens quandoque animi deliquium, ex timore, vel majori evacuatione oriundum, & cognoscibile, ex remissione sanguinis fluxu, pallidò faciei colore, oscitatione, oculorum vertigine, aurium tinnitû, pulsûs mutatione, singultû, nausèa &c. tum prohibendum, venâ digito subinde obturatâ, *sal ori indendo*, labia eodem fricando, vel *aquam frigidam* ore gestando, eamque sæpiùs expuendo; tum præsens removendum, supinò decubitò, ac injectâ ex insperatò in faciem *aquâ frigidâ*, vel *acet. ros.* suaveolentibus nari adhibitis, exhibitione *jusculi*, vel *vin. genoros.* cum *confect. alk.* vel *julep. vit.* parati ex 2. vitell. ov. cum unc. 6. vin. alb. & sacch. fin. unc. 8. & 3. gutt. ol. dest. cinam. vel cochl. aqua cinam. buglos. vel cum vin. parat.

### VI.

Si locò Venæ, casû aperiatur Arteria, illicò foramen claudendum, ac *lamina saturni*, vel *nummus argenteus* inter 2. linteola apponatur cum forti ligatura, vel applicetur Catapl. stegnot. *Galen.* ex *thur. aloë pil. lepor.* cum *album. ov.* hinc membrum diu extensum servandum, ac in oppositâ parte pro revulsione Vena secanda. Si Nervus vel tendo lædatur, mox *ol. destillat. terebinth.* vel *ol. destill. cer.* calidum vulnuscule instillandum, vel accipiendo

ad unc. 1. *ol. dest. tereb. spirit. vin. drach. 1. & euphorb. dr. 8.* apposito desuper Emplast. ex *tereb. cer.* & modico *euphorb.* Si Vena pertusa intumescat, apponatur *ol. rut.* vel *ruta oleo cocta*, vel *vin. calid.* cum *sal. mixt.*

### VII.

Post Sanguinem sufficienter emissum, vinculum enodandum, manus dilatanda, brachium extendendum, vulnus detergendum ac deligandum, superimpositò *gossypiò oleò tintò*, si V. S. ex eodem vulnere eâ die reiteranda, *Wann man die Ader noch sprengen soll*; vel *spleniò vinò madidò*, si Vena magis coarctanda, vel etiam *nummò argenteò* inter 2. linteola applicatò, si Sanguis difficulter sistatur; quò in casû etiam prodest, *crepit. lup. viuriol. ust. gossyp. ust. lanug. cydon. &c.* Factâ deligatione, brachium in mediâ figurâ detinendum, quiescendum, omnisque tam animi, quàm corporis contentio vitanda. Vulgus post V. S. somnum totâ die prohibet, tum ne foramen nondum coalitum in somnò aperiatur, tum ne calor exiguus interiora petens, in somnò suffocetur; sed quia primum diligenti adstantium curâ, & probè factâ deligatione præcaveri potest: posterius verò verum non sit, nisi forsân immodica fuerit sanguinis evacuatio, aut timiditas accesserit, quæ animi deliquium inferre possit; ideò nihil obstat, quin saltem post cibum, vel paucis à V. S. horis somnus iniri possit.

### VIII.

Horâ unâ aut alterâ elapsâ, alimentum euchymum temperanter sumendum, ne coctio lædatur, & ansa novæ vitiosorum humorum saburræ administretur. Brachium eò die vehementi motû haud agitandum, vitetur aër intemperatus, moderentur animi pathemata; animus sit hilaris, tranquillus, seponantur labores, & seria negotia, ac judicium sanguinis, pro conservatione ulteriori sanitatis, non negligatur.

## ARTICULUS VI.

*De Officiò Medici, in Sanguine per V. S. emissò, judicandò.*

### I.

**Q**Uoad judicium de Sanguine missò ferendum, officium Medici est, considerare ejus colorem, consistentiam, ac serum. Optimus erit sanguis, qui benè fibrosus, æqualis ac unius substantiæ, epatis parenchyma repræsentet, ruborem cum splendore floridum exhibens, supernatante serosâ materiâ, in debitâ ac proportionatâ quantitate & qualitate.

### II.

Quoad colorem, *ruber & floridus*, paucâ aquâ superflusus, bonam valetudinem indicat. Interim in acutis sanguinem impensè coloratum, morbi maligni signum esse plures asserunt; hinc etiam, teste *Baglivò* olim Romæ observatum, omnes ferè ab acutis morbis evasisse, quorum sanguis V. S. extractus, crustâ albâ atque glutinosâ præditus erat; è contra mortuos, quorum sanguis valdè rutilans erat, cum superficie nimium rubicunda. *Ruber & spumofus*, nisi spuma per accidens ex defluxu sanguinis excitetur, copiam, fervorem, orgasmum ac ebullitionem sanguinis denotat. *Nigricans*, vel *maculis nigris* spectabilis, ejus per lentam phlogosin adustionem ac humorem melancholicum, *albus* pituitam, & si simul *spumofus*, multam ejus progeniem, tussis, raucedines, & catarrhos excitantem innuit. *Flavesceus*, *viridis*, flavam aut retorridam bilem; *lividus*, & *cæruleus*, dolores circa lienem, ac humoris melancholici, aliorumque peccantium abundantiam; *variegatus*, instar marmoris, insignem humorum in M. S. confusionem putredini obnoxiam significat. Color *cinereus* extremam adustionem arguit.

### C

### III.



## III.

Quoad *consistentiam*, Sanguis, qui lente effluit (quod nonnunquam etiam provenit, vel ob foramen non satis amplum, vel sanguinis copiam aut paucitatem, vel timorem, aut venas flatu turgidas) & picis instar digitis adhærescit, uti & fundo pelvicularum, ac celerrimè concrefcit, concretusque difficulter finditur, *crassior* est, ac obstructions indicat. *Tenuior* è contra, qui tardius concrefcit, faciliusque finditur, & ad bacilli contactum diffuit; hic imperfectam hæmaphosin, viscerumque eidem interventum debilitatem significat. Qui *variegatus* mulum, pelliculam duntaxat de se emittit tremulam & mobilem, sub eâ continens substantiam fibris prorsus destitutam, vel minus coherentem, ut contactus in partes diffuat, *putridus* est, ac sanguinis corruptelam denotat. Qui *crusta albâ, glutinosâ, viscidâ*, & quandoque *densâ ac diaphanâ*, ruptâ & fissâ difficili præditus est, *crudior* est, denotans portiones fermentibiles in M. S. in statu cruditatis existentes, perfectamque coctionem nondum adeptas.

## IV.

Quoad *serum*, illud *modicum* & colore *pallidum*, conveniens est ac naturæ proportionatum. *Nimis copiosum*, malsâ sanguinis veluti Insulâ circumdata eidem supernatante, arguit, vel prægressum potum liberaliorem, vel obstructionem aut imbecillitatem renum, vel viscera sanguificationi dicata infirma, vel insufficientem per urinas aut intensibilem transpirationem excretionem: *paucissimum* aut *nullum*, causas contrarias indicat. *Nimis flavescens*, bilem vel salium lixivorum copiam denotat. *Ceruleum* & *lividum*, splenis affectuum comes. *Album* & *lacteum*, vel alimenta intempestivè & præproperè ante V. S. assumpta, & in chylum conversa, vel viscerum hæmaphosi dicatorum, & sanguinis intemperiem ac debilitatem innuit. Sanguis *malè olens*, licet rarus sit, putredinis ac corruptionis index, ac mortis prodromus. Probitas sanguinis in pedis vel manus sectione in calidam effusi, dignoscitur, tum ex laudabili ejus colore, tum ex fibris, sanguine virgula conquassato apparentibus, & quidem inter se coherentibus, neque tractû faciliè dirumpendis.

## ARTICULUS VII.

De Officiô Medici, in præscribendis Remediis post  
judicium V. S. pro Curâ Vernali, vel  
Autumnali.

## I.

**S**anguine probè consideratô, officium Medici erit, pro variâ ejus constitutione curam prophylacticam instituere, & si humores pituitosi, biliosi, melancholici, putridi abundant, eos per epicrasin evacuare per Decocta, vel Nodulos laxativos; si obstructions adsint, eas tollere per Brodia alterantia, & deobstruentia. Si fervor bilis aut sanguinis, eum temperare per usum Acidularum, aut feri lactis vel Brodiorum alteratorum; si debilitas viscerum sanguificantium, ea roborare, prout ex sequentibus magis apparebit Remediorum formulis.

Brodiû alterans. R. Herb. acetos. endiv. cichor. petrosel. cum tot. chæresol. fl. borrag. pimpinell. sanguisorb. an. q. pl. M. S. Species zur Kräuter-Brühe, darvon eine gute Hand voll in einer Fleisch-Brühe zu kochen, alsdann durchzußeichen, und entweder mit einem Limoni-Safft feuerlicht zu machen, oder folgendes Pulver darein zu zertreiben.

R. Pulv. epat. rub. vel cryst. tart. unc. β. subinde etiam addi potest aliquid, de sal. absinth. vel aliis salibus digestivis S. Pulver zur Kräuter Brühe, darvon 3. gute Messer-Spitz voll darein zu thun. Continuentur hæc Brodia, ad unc. vj. per 14. circiter dies.

Species pro Vino. R. Herb. recent. acetos. chæresol. draunc. hort. pimpin. sanguisorb. fl. borrag. meliss. an. q. pl. absinth. parum M. S. Species oder frische Kräuter zum Wein, darvon 2. Hand voll in ein Maß Krug weissen Wein darein zu thun, eine Zeit darinnen stehen lassen, und jederzeit den ersten trunck den May hindurch zu thun.

Nodulus laxativus. R. Fol. sem. f. unc. β. agar. crud. incif. & conquass. rad. mechoac. crasè pulverif. an. unc. β. z. z. incif. drach 1. β. herb. card. ben. agrim. ceterach. summit. absint. fl. borrag. anth. an. p. 1. cort. cit. incif. drach. 1. β. M. incif. & contuf. dentur ad Nodul. ex find. alb. S. Kräuter Laxier Säckl auf anderthalb Maß weissen Wein, und ein halb Maß Brunnen oder distillirt Cichori oder Boratsch-Wasser anzusezen, darvon Morgens ein Fraggele (Achtelein) zu trinken, nachdem man zuvor etlich Löffel voll Fleisch-Brühe oder Dotter-Suppen genommen.

Alius. R. Rad. cichor. dr. iij. fenic. enul. polyp. q. an. dr. ij. herb. absinth. Rom. card. b. chamæd. cent. min. adiant. aur. an. p. 1. fol. senn. f. unc. 1. β. rhab. el. agar. troch. an. dr. ij. passul. min. unc. 1. cinam. vel galang. min. dr. j. sem. anif. scrup. iv. crem. tart. dr. ij. β. M. incif. & contuf. ad Saccul. ex find. rub. S. Kräuter-Laxier-Säckl, daran anderthalb Maß weissen Wein und ein halb Maß Wasser siedheißer daran zu gießen, und in einem warmen Orth 12. oder 24. Stund stehn zu lassen: Alsdann in einen Keller oder Gewölbe zu thun, und täglich Morgens ein Fraggele (Achtelein) oder was minders darvon zu trink n.

Decoct. laxativum. R. Pulp. tamarind. unc. 1. rhab. fol. sen. f. an. dr. vj. passul. min. unc. iij. sem. fenic. contuf. dr. i. β. coq. in aq. font. lib. iv. ad lib. ij. Col. detur ad usum. S. Laxier-Tranck das Blut zu reinigen, darvon Morgens ein Fraggele (Achtelein) oder des Tags zweymahl etwas mehr als ein halbes Fruggele zu nehmen.

Pulvis digestivo-laxativus. R. Crem. tart. vel pulv. epat. rub. scr. 1. sal. absinth. gr. vj. scam. sul. h. gr. viij. x. xij. & c. ol. dest. mac. gut. ij. M. f. Pulv. dentur 4 doses. S. Auflösende Laxier-Pulverlein, darvon täglich, oder ein Tag um den andern, morgens nüchtern in einer Brühe, oder Glafs-Saur-Brunnen, ein Flaschen darvon nachzutrinken, eines zu nehmen.

Alius. R. Fol. senn. f. tart. alb. an. unc. 1. sem. anif. caryoph. cinam. galang. an. dr. j. diagryd. dr. ij. M. f. Pulv. S. Blut-reinigendes Laxier-Pulver, ein halb oder ganzes Quintl. schwer darvon zu Zeiten zu nehmen. Potest etiam vino infundi & assumi.

Serum lactis. R. Ser. lact. cum succ. cit. vel tamarind. vel crem. tart. vel acet. parat. depur. & clarif. unc. vj. viij. x. lib. 1. & c. essent. cit. q. s. pro grato odore. Detur per 14. dies vel 3. septim. S. Gaifs-Juten (Schotten) des Morgens nüchtern zu trincken, und ein Stund darauf spazieren zu geben.

Serum lactis magis compositum. R. Rad. cichor. scorz. herb. endiv. acetos. fumar. cusc. cochlear. beccabung. chæresol. pimpin. sanguif. fl. borrag. an. q. pl. M. S. Species zur Kräuter-Gaifs-Juten, (Schotten) darvon 1. oder 2. Hand voll in einem Trinckl. Gaifs-Milch zu kochen, und mit einem Essig oder Limoni-Safft zu rinnen, und durchzußeichen.

Serum lactis Fonsæ, Magnatibus familiare, & gustû gratum. R. Tamarind. unc. iij. aq. frag. (vel altius distillat. vel aq. font. lib. 5.) terantur in mort. lapid. ut nuclei denudentur, & auferantur, aquam sensim affundo: hinc R. lact. caprill. lib. iv. ebull. tum affund. dilutum tamarind. coque simul parum sine agitatione olla in vase terreo vitreaceo, donec partes caseosæ sequestrenur, hinc refriger. col. per lim. depur. 2. album. ov. ac ultimò filiretur per chart. aromatiz. eff. cit. q. s. ad grat. odor.



CAPUT III.

De Officiò Medici, in Affectibus requirentibus Arteriotomiam, Cucurbitulas, Scarificationem, Hirudines, Vescicatoria, & Fonticulos.

ARTICULUS I.

De Officiò Medici, in adhibenda Arteriotomia, & Cucurbitulis, sine & cum scarificatione.

I.

**L**icet aliàs ex communi Practicorum experiètià assuetum tantum sit, aperire Venas, factum tamen, ut etiam aperirentur arteriæ, sic *Galen.* earum incisionem commendat, in Capitis calidis affectibus, ut v. g. in diuturnis Capitis doloribus calidis, & spirituosos, ut cephalalgia hemicrania, in calidis & acerbis oculorum defluxionibus, ac ophthalmiis contumacibus, in vertiginosis, phreniticis, in fluxionibus à temporibus ad dentes, & à dentibus vicissim ad tempora, præsertim si adsint dolores temporum fixi, cum pulsu arteriarum notabili.

II.

Ut autem Medicus hòc in passu cautus sit, ac ritè suò fungatur officio, cum res periculo non careat, tum ob metum insignis hæmorrhagiæ, tum ob difficilem ratione pulsus consolidationem, & aneurismatis superventum, observabit. 1. Arteriotomiam nonnisi in difficillimis, & inveteratis morbis, qui aliis non cedunt auxiliis, esse exercendam, & non nisi urgente necessitate, ac præmissis universalibus. 2. Arterias tantum minores aperiendas esse, ut v. g. propè aures, vel in temporibus, cum in majoribus prædicta pericula magis metuenda sint. 3. Eam non instituendam in debilibus, quos præstat aliis auxiliis curare, quàm partibus sanguine & spiritu privatis, in certum periculum deducere. 4. Tantum ex sectâ arteriâ emittendum sanguinis, quantum effluit, nisi sit nimium, hinc vulnus consolidandum appposito Emplasti. *ex aloë, thur. sarcocoll. bol. Arm. pil. lepor. cum album. ov. except. vel terra vitriol. dulc. cum terr. fig. album. ov. except.* 5. Arteriotomiam inveteratos, aliòsque præternaturales affectus citius curare, quàm V. S. tum quia arteriæ omnem omnino distribuunt sanguinem, sicque natura omnem farcinam per arterias expellit, & quidem multò velocius; tum quia à flatulentò & calidò sanguine arteriofò plurimi producuntur, & foventur morbi.

III.

*Cucurbitulæ* vel applicantur cum scarificatione, incisâ cute, vel integræ, sine scarificatione. Sine hac locum habent 1. in nimio fluxu mensium, infra mammas appositæ; ex *Hippoc. 5. aph. 50. mulieri si placet menstruasistere, cucurbitulam quàm maximam ad mammas appone.* 2. Ad femur & crura pro ciendis mensibus, in quem finem etiam frequentius scarificatæ simul profunt. 3. Contra urinæ suppressionem realem, & in calculò jam in ureterem delapsò, ubi juxta ductum ureterum applicatæ, & versus inguina tractæ, calculum subinde transferunt, dolores leniunt, & urinæ fluxum cient.

IV.

Præterea 4. locum habent in hæmorrhagiâ narium, hypochondriis applicatæ, sed cautè, ne sequatur inflam-

matio; item pedibus, ex observat. *Forest.* Usitatâ etiam admodum, & proficuâ in hòc casu ventosâ magnâ ad nucham applicatâ. 5. Valent ad dolorem stomachi, & intestinorum afflatibus oriundum, quò in casu, teste *Galen.* incantamenti instar subinde juvant. 6. Ad motum ciendum stagnanti sanguini, ut dum in apoplexiâ futuræ coronali applicantur. Affigi solent aquâ calidâ prius madidæ, & ad ignem candelæ calefactæ, præmissâ frictione partis per lintea calida.

V.

*Cucurbitulæ* cum scarificatione, cum sanguinem ex cute evacuent, eoque effuso, alius è vasis majoribus in capillaria effundatur, hòc modò totum quoque corpus evacuant, sicque haud immeritò V. S. vicaria appellantur, & applicari solent. 1. Ubi V. S. locum non habet; vel ratione virium ægri, ut in pueris, gravidis, senibus, aut morbo longinquò vel acuto fractis, cum non confertim, sed paulatim & sensim evacuent; vel ratione lipothymia imminens, vel ratione difficultatis secandi venas. 2. In partibus gangrenâ affectis pro humoribus impactis, & corruptis eliciendis. 3. In partibus acri fluxione tentatis. 4. Pro venenò à cane rabidò, aut aliis animalibus venenatis immisso extrahendò. 5. Pro mensibus ciendis. 6. Pro oculis fluxione tentatis. 7. In febribus malignis petechialibus.

VI.

Loca frequentiora applicandarum Cucurbitularum, sunt in dorso, regio interscapularis & lumbi. In brachio, humerò, in pedibus femori & suris affigi solent. Quantitas sanguinis extrahendi variat pro morbi vehementiâ, & causæ morbificæ ratione. Parva & minima est, ad unc. ij. vel iij. mediocris, ad unc. iv. v. summa, ad unc. x. xij. Ubi morbi maenitudo urget, applicandæ cucurbitulæ copiosiores & majores, & jamdum sanguine repletæ, iterum removendæ, ac denuò post repetitas scarificationes imponendæ, & foramina altius infligenda: in minori affectu, minores & paucæ cucurbitulæ sufficiunt, nec eas cum scarificatione repetere opus est.

VII.

*Scarificatio* nunc est superficialis, nunc profundior. Quando crassior ipsa cutis, sanguisque evacuandus profundius delitescit, perficitur phlebotomò seu scalpello, parte prius fomentatâ aquâ tepidâ, aut propè fornacem calefactâ, admotis postmodum cucurbitulis vel solum calefactis, vel juxta Belgas cum flammâ, quæ potentiùs quidem trahunt, sed majorem ægris causant timiditatem. Eadem peractâ, loca scarificata abluenda aquâ tepidâ, & plagulæ paucò sevo obliniendæ.

VIII.

Sicuti Scarificationem mensuatim ex consuetudine tantum institutam, tam prodigaliter vitæ nostræ inæstimabilem thesaurum, Sanguinem nempe profundentem, Medicus nullatenus approbet: ita moderatum ejus usum, urgente præsertim necessitate, minimè damnet, cum experientia testetur, multos provectæ ætatis homines, sine ullò damnò, hòc præsidii genere usos fuisse; neque verum est, ut vulgo dici solet, illum scil. qui semel scarificaverit, per totam vitam illud continuare necesse habere, nisi in vitæ periculum se præcipitare velit, cum experientia contrarium testetur. Hinc etiam *Mæb. in hist. de feb. petech.* affirmat, puerum 8. annorum crebrioribus ophthalmiis, & fluxionibus oculorum obnoxium, suassu periti cujusdam Medici, Scarificationibus per singulos menses bis usum fuisse, easque ad 10. ætatis annum feliciter continuasse: cessantibus autem his affectibus, eundem cessasse etiam ab ipsarum usu, absque ulla morborum invasione.



## ARTICULUS II.

## De Officiô Medici, in præcipiendâ applicatione Hirudinum.

## I.

**H**irudines seu Sanguisuga, die Blut-Oegel, non fecus, ac Scarificationes, capillaria pariter venarum & arteriarum aperiunt vasa, sicque sanguinem evacuant; eas tamen in hoc antecellere videntur, quod paulatim & sensim evacuando, minorem creent molestiam, plus insuper afferant emolumenti, cum hirudines sanguinis sint appetentes: cucurbitulæ verò sæpè locò sanguinis, aquosos tantum & serosos humores evacuent.

## II.

Applicari solent Hirudines, vel totius corporis evacuandi gratiâ, vel ob morbum membri alicujus privati. Quoad primum, veteres præsertim in gravidis, pueris, senibus, acutò morbo detentis, venæsectionis usû contraindicatò, applicabant eas ad venas majores, ut medianam, basilicam &c. Quoad alterum, Hirudinibus usi fuerunt tanquam verò topicò remediò, hinc præmissis universalibus, imponebant has in omni arthritide, supra locum affectum, coxæ, in doloribus Ischiaticis, in abscessibus, cutis fæditatibus, malignis tumoribus, vulneribus, moribus venenatis; item ad illas partes, ubi V. S. & cucurbitulæ nequeunt applicari, ut v. g. naribus, labiis, pudendis &c.

## III.

Hodie usus earum non adeò frequens, cum, si sanguis universaliter sit evacuandus, id fiat per V. S. si particulariter, per scarificationem, nisi applicatio ad venas hæmorrhoidales, quæ frequentissima, ad imitationem naturæ, in nonnullis corporibus eas spontè & periodicè, summò cum sanitatis emolumentò aperientis. Ex Hippoc. enim in *epidem.* ij. quibus Hæmorrhoides profluunt, neque pleuritide, neque pulmonis phlegmone, neque phagedænâ, neque furunculis, neque terminthis, neque leprâ, neque vitiliginibus albis corripuntur, immò ex eodem 6. *aph.* ij. *Melancholicis & nephriticis hæmorrhoides supervenientes, bonum sunt,* & 6. *aph.* 21. *Infans, si varices, vel hæmorrhoides appareant, infanti fit solutio.* Præterea præservare dicuntur à morbis à Melancholiâ vulgò derivatis, ac dantur etiam exempla, plurium virorum longævorum, ex periodicò hæmorrhoidum fluxû, ut adeò venæ Hæmorrhoidales non sine ratione quibusdam dicantur *venæ auræ*.

## IV.

Cum igitur natura sponte sua venas Hæmorrhoidales cum emolumentò referet, æquum est, ut ars imitatrix id ipsum efficiat, quare earum apertio, cum utilitate præscribenda erit à Medico, in maniâ, melancholiâ, affectione hypochondriacâ, scorbuticâ, palpitatione cordis, scirrhom lienis, affectione arthriticâ, nephriticâ, affectibus etiam pectoris, cum suppressos illos excitet, teste Hipp. 6. *aph.* 12. dum ait: *diuturnas curanti hæmorrhoides, nisi una quæpiam servetur aperta, periculum aquæ inter cutem, aut tabis impendet.* Item in suppressione mensium, dum sanguinem in vasis uteri, propter copiam & crassitiem infarctum, ad orificia venarum sedis trahunt, vi vacui.

## V.

Sicuti autem ex Galen. non adeò tutum est, naturam evacuationi per hæmorrhoides assuefacere, cum periculosus sit excessus, seu sanguis supra modum excernatur, seu supprimatur; ita, licet earum apertio in multis magnis morbis profit, nunquam tamen eadem temerè ten-

tanda, sed diligenter advertendum, num prius fluere consuetæ fuerint, & modò suppressæ morborum causa existant, vel sanguis aliàs affectet vias & exitus, vel an natura eò tendat, quod per earum intumesceniam, dolorem, pruritus, vel aliquot guttulas sanguinis effluentis innotescit, quo in casu earum apertio majori cum emolumentò celebrabitur.

## VI.

Pars, cui applicandæ Hirudines, linteis aquâ nitrosâ madidis abstergenda, hinc aquâ dulci eluenda, & siccanda, denique aliquot guttulis sanguinis columbini irroranda, vel saccharò pulverisatò fricanda; postmodum Hirudines, & quidem non venenosæ, sed præparatæ, & ritè electæ, seu per fistulam, seu per cucurbitulam, seu manû ipsâ mediante linteò albò, & mundò comprehensæ, parti applicantur, & quidem in anò posteriùs coccygem versùs, in affectibus lienis: exterius verò magis, ubi venam cavam deplere animus. Applicatæ Hirudines prius non removendæ, nisi per se decidant, maturatò tamen, si placet earum casu per asperisionem niri, salis, vel cineris. Postquam ceciderunt, pars spongiâ aquâ calidâ imbutâ fovenda, vel in vapore aquæ continenda, ut sanguis per foramen apertum fluere possit, per 2. vel 3. horas, pro viribus ægroti, collocando v. g. patientem supra solum ferventis aquæ, cui vasculum innatet sanguinem desillantem recipiens.

## VII.

Evacuandus sanguis ad unc. iv. v. si mediocriter agendum: ad unc. x. si ad summum. Si foramen casu ante tempus coalescat, fluxus promovendus, vel per alias substitutas Hirudines, vel Cucurbitulam anò affixam, cujus ope sanguis in debitâ copiâ excerni possit, si nimium fluat, sistitur *linteò combustò* parti benè abstersæ applicatò, vel *gallis ust.* aut *gossyp. combust.* Vulnusculum quandoque consolidatû difficile, *theriac. vino commistâ* crebriùs detergendum; Hirudo, si fortè casualiter in anum irreperit, digitò statim eruenda, vel aquâ falsâ calidâ, clysteris modò aliquoties injectâ, eluenda & elicienda.

## ARTICULUS III.

## De Officiô Medici, in præcipiendâ administratione Fonticulorum.

## I.

**C**auteria, Fonticuli seu Fontanellæ, Fontanell, licet per se tantum plus plorent, ex sanguine & nutrimento roridò loci fonticulò exulcerati in pus mutatò, nihilominus tamen præter hoc etiam varia salia, sanies, ac sordes, vitiò, vel læsæ in sanguine fermentationis, vel depravatæ cujusdam partis nutritionis emergentes, simul evacuant, & revellunt, idque non rarò cum sensibili, in morbis Chronicis, præsertim ex colluvie ferosâ, ac lymphæ vitiis natis, ægrorum levamine, materiâ ichorosa & ferosâ acri sale imbutâ, sensim educta.

## II.

Conveniunt igitur Fonticuli, in cephalæâ, epilepsia, præservatione ab apoplexiâ, & affectibus soporosis, vertigine, paralyti, læsione visûs, auditûs, defluxionibus catarrhalibus ad oculos, nares, palatum, dentes, fauces, pulmones, unde etiam in thoracis affectibus, ut raucedine, asthmate, tussi, perniciem minitantibus com-modè excitantur, uti etiam in phthisi incipiente, prophylacticè pro humorum salforum, & acrium affluxû, capite divertendo. Præterea in morbis lienis vulgò adscriptis, teste experientiâ, ut maniâ, melancholiâ, palpitatione cordis, affectione hypochondriacâ, scorbuticâ, affect-



affectibus hæmorrhoidum, summum afferunt levamen, ut si hujus tetri humoris motum è cerebro ad inferiores partes ignobiles revellere volueris, Fontanella in lævò crure aperienda sit.

### III.

Licet Cauteria maximè profint, ubi serum seu latex plus nimium abundat, cum archæus à restagnante latice oppressus, ab evacuatione per cauteria melius vivificatus, vires insperatò reassumat, sicque etiam in hydrope videantur esse proficua, nihilominus cautè his utendum. Nam ex *Hippoc. 6. aph. 8. aqua inter cutem laborantibus, exorta in corpore ulcera, non facile sanantur*; hinc iis utendum, ubi crura nondum sunt tumida. Præterea conveniunt in affectu Ischiadicò, in affectibus uterinis, vitiò mensium exortis, fluore albò, passione hystericà, pedibus ulcerosis, pro affluxu intercipiendò, ac unò verbò, omnibus aliis affectibus, in quibus vel totalem cruoris massam, vel laticem minuere, aut revellere, vel derivare decretum est.

### IV.

In horum administratione, observet Medicus. 1. Fonticulos sensim, & sensim operari, sicque magis tantum convenire in morbis Chronicis. 2. Cum ustio sit inter remedia extrema, non deveniendum esse ad Fonticulos, nisi ubi præsidia mitiora nihil profecisse videmus, aut non profutura existimamus. 3. Corpus prius per purgationem, & V. S. si opus disponendum, & præparandum esse. 4. Ratione anni temporum, si morbus inducias ferat, vnum esse omnium maximè aptum, & quidem declinante lunâ. 5. Ratione ætatis pueros tenellos, & senes decrepitos non facile tolerare fonticulos, nisi urgeat morbus valde gravis, ut Epilepsia, Apoplexia, Catarrhus suffocativus. 6. Eisdem minùs convenire emaciat, & morbo depressis, magis verò obesis, edacibus &c.

### V.

Quoad loca Fonticulorum, demonstrantur hæc à scopò, vel evacuationis, vel revulsionis, vel derivationis; observatà tamen ubique rectitudine vasorum, partis affectæ cum locò fonticuli. Sic v. g. in nuchâ inter 2. & 3. vertebra, locò molestissimi veterum setacei poni solet, pro capite & oculis. In brachiò, & quidem in Interstitiò inter musculum deltoideum, & bicipitem, 5. Digitis, è flexurâ pro affectibus capitis, vertigine, apoplexiâ, affectibus oculorum, aurium, faucium & laryngis &c. In Cruribus, vel suprâ, vel infrâ genu, in parte interna, ubi fasciæ cruales ligantur, in affectibus uteri, mensium, lienis, hæmorrhoidum malò Ischiadicò, aliarumque partium mediæ & infimæ ventris R. R. etiam in bregmate, seu fincipite aliquem ponunt, pro humoribus à cerebro ad exteriora evocandis, item intrâ scapulas. Item intrâ septimam thoracis vertebra, intrâ costas, pro vomica pulmonum; sed hi minùs usitati.

### VI.

Excitatur Fonticulus, vel ferro, dum simpliciter cutis elevata scalpellò inciditur, foramen debitæ magnitudinis faciendo, quod ad suppurationem deductum, fonticulum suggerit, vel igne actuali, per ferramentum ignitum ad debitam profunditatem intrusum, vel igne potenciali, seu medicamentò corrosivò, vel alcalinò, ex cineribus, quod tamen non ita commodum, quia facile liquefciendo, locum exulcerationis mutat, vel acidò, v. g. per *crystallos lunares*, quantitate pisi, vel *butyr. antimon.* ad gut. v. vel vj. pennæ anserinæ, loco ubi excitandus est Fonticulus, impositò, vel *globulò ligneò*, horâ unâ ante fonticuli parationem *aquâ forti* imprægnato.

### VII.

Excitatò Fonticulò, eschara & caro mortificata, bu-

tyrò, vel unguentò digestivo separanda, & si exciderit, ac ulcus satis dilatatum fuerit, globulus ex lignò hederæ, vel cerâ, vel radice Ireos, vel pisum majus, aut galerus argenteus aut inauratus imponendus, superimposito Empl. diapalm. vel sparadrapo: hinc locus deinceps laminâ *Fontanell-Blech*, subditò minùs pulvinari arctius constringitur, quò profundior fiat Fonticulus. Si non sufficienter ploret, globulus indi potest ex *rad. gentian.* vel fortior ex *rad. elleb. nig.* vel ex *hederâ* inunctâ *Bals. sulph.* vel ex *cerâ* & paucò *Mercur. præcipit.* quò etiam nihil melius sordidos, & putridos Fonticulos mundificat; vel ex *cerâ* & *cantharid.* caro in Fonticulis luxurians, optimè absumitur, inspersò *alumine ustò*.

### VIII.

Fonticulus nunc excitatur unus tantum, nunc simul duo, in affectibus præsertim contumacibus, ubi Practicorum aliqui asserunt: *ein Fontanell, kein Fontanell*, quò in casu communiter observant, ut vel decussatim applicentur, id est, v. g. unus in brachiò dextrò: alter in crure sinistrò, vel vicissim. Præstant subinde etiam duo in quovis latere, ne unum magis exinde debilitatum, totum humorum impetum eò irahat. ac hemiplexia quandoque excitetur. Ad Cauterii diu jam gestati clausuram, non facile Medicus consentiat, nisi vel æger ætatis magnum habeat adminiculum, vel membrum fonticulum generens gracilescat, vel fluxione copiosiori tentetur, ac ulcus evadat sordidum, aut malignum, vel si supra articulum descendat, vel spontè exsiccet. Tum vicariæ singulis mensibus subrogandæ evacuationes, seu per purgationem, seu per sudorem, seu per alia loca.

## ARTICULUS IV.

*De Officiò Medici, in præscribendis Remediis pro usu, & administratione Fonticulorum, usitatis.*

### I.

**L**apis septicus ruptorius. R. *Ciner. clavellat. calc. viv. ciner. sag. vit. an. p. æq. F. lixiv. fort. & inspiss. ad formam lapid. S. Corrosiv-Stein zum Fontanell.*

Lapis infernalis, seu CrySTALL. lunar. R. *Limat. argent. unc. ij. aq. fort. duplum vel triplum, solve, solutio abstrahatur in cucurbita, caput mortuum quod formam salis representat, calcinetur in crucibulo amplo, donec materia non amplius ebulliat, hinc ignis parum augeatur, ac materia effundatur in vas calidum. Refrigerata quasi lapidem representat, sed friabilem aservandum in locò calidò & siccò. S. ut supra.*

Lapis causticus *Heurnii*, selsqui horæ spatio cutem perforans. R. *Vitriol. ust. unc. ij. sal. armon. unc. i. calc. viv. ciner. è sæce vin. an. unc. iij. tritis atque permixtis, affunde lixivium ficulneum, vel tithymalinum, quod subinde colatur, dum istorum materia ferè dissoluta sit. Lixivium dein in ollâ novâ apertâ coquitur, ac ferveat, dum crassescat ac lapidescat. Recondatur in locò siccò, in ampullâ vitreâ & obturatâ.*

Unguent. digestivum. R. *Tereb. Venet. unc. 6. vitelli ov. dr. ij. croc. orient. scr. 6. M. S. Maturier-Salb, in Anfang des Fontanells zu gebrauchen, bisz der Butzen heraus gefallen.*

Sparadrapum. R. *Cer. flav. unc. ij. ol. oliv. unc. i. 6. tereb. unc. i. fluant in tigillo, inspergendo ceruss. dr. 6. observando, ne materia nimis ferveat. S. Durchzug, oder Fontanell-Pflaster.*

Aliud. R. *Ol. ros. unc. ij. 6. cer. alb. vel citrin. unc. ij. sev. cerv. dr. x. M. F. Sparadrap.*

Aliud. R. *Ol. oliv. lib. i. min. ij. lib. 6. coq. super leni igne, semper agitando, donec incipiat fuscò colore tingi: hòc factò, in aliò cacabò liquefiat cer. citrin. lib. 6. M. cum priori materiâ, & coq. omnia ad justam consistentiam,*



amotis ab igne, add. camph. rasæ unc. ʒ. tege, donec camphora liquefiat, nec odor evanescat. Ultimo scindantur portiones chartæ papiracæ, 3. digitos longæ ac latæ; quæ ducuntur per dictum cerat. liquid. & f. cum forfice Emplast. debite magnitudinis.

Aliud viride. ʒ. Sev. hirc. cer. cit. an. unc. 1. ʒ. ol. ros. dr. vj. coloph. unc. ʒ. virid. ær. scrup. 1. M. intingatur telæ quartarium latæ. Quidam locò Sparadrapî utuntur Empl. Noribergenſi. alii solâ cerâ albâ, & si fonticuli fordes & putredinem contrahant, addita cerâ viridi.

Globuli caustici Fonticulos apertos servantes, eorumque fluxum promoventes. ʒ. Virid. ær. gr. xxij. rad. gent. canthar. pulv. an. gr. xvj. cum cer. alb. dr. 1. ʒ. f. Globuli ut Pisa majora. S. Sondere Fontanell-Küglein, solche offen und mehr fließend zu machen.

Cerat. Sculteti, Fonticulos ab omni symptomatum injuriâ vendicans. ʒ. Cerat. de ceruss. seu alb. coct. unc. xij. pulv. ceruss. unc. iv. thur. tragac. an. dr. vj. Ir. flor. benz. an. dr. v. styrac. liq. ol. spic. odorat. an. dr. ij. sapon. Ven. unc. ij. cer. unc. M. S. Besondere Fontanell-Pflaster, solche von allen Zufall zu bewahren.

Aliud Magni Ducis Hetruriæ. ʒ. Succ. heder. lib. 1. nicotian. unc. iv. tereb. resin. pin. ung. ros. Mes. cer. cit. an. un. iv. pulv. cyper. odorat. drach. ij. ʒ. ceruss. unc. iv. M. f. Cerat. S. ut supra.

## ARTICULUS V.

### De Officiô Medici, in præcipiendâ applicatione Vescicatoriorum.

#### I.

Quod fonticuli pedetentim, hoc Vescicatoria faciunt confertim, adeoque ferè urgentiori in malò, & ubi præsentaneum magis indicatur auxilium, hæc ipsa in usum vocantur. Exserunt vim suam tum revellendo, tum evacuando, & quidem tum excitando dolorem, quatenus acribus suis particulis, fibras irritant, unde ex fibrarum concitatore tremulatione & fibratione, provocatur eò, ac citius fertur spirituum impetus, unde in locò priùs malè habente, per spirituum à dolore vescicante aliò avocatorum motum, fit alteratio, & successiva correctio causæ morbificæ, atque ita per accidens prioris symptomatis curatio; tum evacuando, quatenus salinæ Cantharidum particulæ hinc inde pungunt, vellicant, & rorem partis nutritium, aut etiam M. S. penetrant, attenuant & colliquefaciunt, sicque etiam particulas heterogeneas & excrementitias, eidem non ritè permiscibiles, ibidem ex arctatis poris & constrictis meatibus hærentes, evacuant.

#### II.

Quàm maximè igitur conveniunt Vescicatoria in diathesi sanguinis crassâ, viscidâ, & ad coagulationes & stagnationes dispositâ, ac affectibus inde oriundis, veluti in cephalalgia, apoplexiâ, & affectibus soporosis, paralyſi, epilepsiâ, in morbis convulsivis, & affectibus nervosis sine febre, ad ardentem inclinante, in oculorum pathematibus, ut suffusione, guttâ ferenâ, ophthalmiâ &c. In dolore dentium, in catarrhis ac defluxionibus, irruptionem comminantibus in pulmones, vel aliam nobiliorem partem; vel in nares, oculos, fauces, pectus &c. in doloribus fixis, chronicis, & acriter partem aliquam divellentibus, ut v. g. dolore ischiadicò. Item in petechiis, vel variolis retrocedentibus.

#### III.

In Febribus continuis & malignis, non promiscuè statim applicanda, sed observandus status sanguinis. Sicuti enim in diathesi ejus crassâ, viscidâ & ad coagulationes, stagnationesque dispositâ, quæ exilissimò pulsû, extrematibus frigidis, anxietate, ad morbos soporosos propensione, aliisque coagulationis indicibus stipata est, ma-

ximè proficuos afferunt effectus, & quidem multò magis, si tempus hyemale, temperies ægri ad humidum inclinans, habitus pinguis &c. Ita è contra in constitutione sanguinis acris, & colliquativâ, ubi febris plùs minùs ardens, ac magna adest sanguinis agitatio, & impetus, quàm maximè nocent: dum accedunt convulsiones, deliria majora, febris maximum incrementum, ac tandem mors, eoque magis, si habitus ægri gracilis, ac tempus adfit æstivum; hinc delirantes cum febre acutâ, & linguâ aridâ, ex usû Vescicatoriorum plerique moriuntur, & quidem convulsi.

#### IV.

Ex observatione Georg. Bagliv. de usû & abusû vescicant. c. 3. in Pleuritide, ubi circa quintum vel septimum, vel aliis intermediis diebus apparet magna spirandi, & expectorandi sputi difficultas, patientem in summum vitæ discrimen conjiciens, irritis aliis, duo Vescicantia tibiis, vel cruribus admota, non solum expectorationem (quæ primaria crisis morborum pectoris) promovent ad stuporem ferè, sed etiam spirandi difficultatem leniunt, cum morbi mutatione in melius, acris cantharidum sale incipientes coagulationes solvete, ac humores pristina circulationi restituente. Idem sentire videtur Hippoc. l. 2. progn. 67. dicens: in Pulmonitis, quicunque tumores sunt ad crura boni, nec potest aliud quidquam melius accidere, præsertim si mutatio sputi sic appareant. Fatetur prædictus author, ex centenis ejusmodi ægrotantibus vix paucissimos obiisse, præfarâ methodò tractatos, ac insuper observasse, post adhibita pleuritide vescicantia, diarrhoeam, si aliqualis aderat, imminutam, vel prorsus suppressam esse, atque subinde copiosiores successisse urinam.

#### V.

Locus applicationis Vescicatoriorum, est vel universum caput, juxta Willisum, quod tamen rarò usu venit, nisi in apoplecticis, vel ponè aures in cephalalgia, dolore oculorum, dentium, aurium, vel ad nucham seu intrâ scapulas, in iisdem affectibus, uti & soporosis minoribus, aut supra carpum, in parte musculosâ brachii, & in cruribus seu prope inguina, seu quod frequentius, 4. digitis supra malleolum anteriorem in febribus malignis, affectibus soporosis majoribus &c. Prout animus vel revellendi, vel derivandi, vel evacuandi. Parantur vel ex Emplast. vescicator. vel ubi fortius agendum, in subjectis præcipuè durioribus, ex ferment. vet. acetò forti & pulv. cantharid.

#### VI.

Applicata Vescicatoria, parte priùs acetò calidò fricatâ & rubificatâ, (plùs minùs prout leviùs vel fortius agendum, cum acidum figat sal vol. cantharidum) 7. 8. vel ordinariè 12. horis relinquenda, hinc removenda, vescicas forfice inscindendas, locumque leniendum folio brassicæ per aquam bullientem priùs tracto, vel in eam intincto, & butyro non salito incrustato, vel diachylo simplici, singulis 8. horis illud renovando. Si animus, diutius vescicatoria in fluore conservandi, cum aliàs vix ultra 4. vel 6. dies ita humida observentur, utile est Empl. de sperm. ran. vel alb. coct. 3. partes & unam Emplast. vescicator. exactè mistas applicare vel Empl. diachyl. cum pingued. leporin. vel addere parùm pulv. cantharid. Si verò locus exulceratus nimis doleat, aut inflammationis metus adsit, aut animus consolidandi, optimum usum præstat Emplast. de sperm. ran.

#### VII.

Vescicatoriis applicatis, sitis, & linguæ ariditas supervenit: subinde etiam observantur motus tendinum veluti subsultorii, & convulsivi, quandoque sudores plùs minùs copiosi, pulsus etiam veluti obscurantur, quæ tamen omnia, si res benè succedat, per triduum circiter durant, usque dum acres cantharidum sales sanguini inhærentes,



rentes, eliminati: subinde mictum sanguineum, vesicæ inflammationem, urinæ ardorem, aliaque gravia excitant symptomata, præsertim dorso applicata, vel in gracili habitû, æstivô tempore, sub ardore caniculæ, non nisi multis emulsionibus ex seminibus frigidis majoribus, cum aliqua sem. fenic. cantharidum alexipharmaci, quantitate curabilia. Subinde ulcera à vesicatoriis excitata, desinunt in gangrænam, vel in difficillimam eorum cicatrizationem, præsertim si maligna aëris accedat constitutio, vel in subjectis cachecticis, atro-melancholicis, valetudinariis, & lue gallicâ detentis; quô in casû, pro mundificatione commendatur mel. ros. si bis vel ter de die eodem obliniantur, & pro cicatrizatione inspersus pulvis tutiæ, in subtilissimum alcohol redact. vel fila carpta in decoct. alum. crud. ebullita, exsiccata, atque hinc applicata.

VIII.

Vesicatoria non conveniunt, sed contraindicantur, à summâ virium resolutione, in gravidis, instante fluxû menstruo, in urinæ ardore, incontinentiâ, mictû sanguinis, ulcere sphincteris vesicæ, item iis, qui lue venereâ semel laborârunt, cum ab adhibitis vesicantibus summo- rere lædantur, in quocunque tandem morbo adhibean- tur, hinc nonnisi in maximis coagulationibus & morbis soporosis præscribenda. Item non conveniunt, ubi acrior & colliquativa sanguinis constitutio, præsertim in habitû corporis gracili. In febribus acutis nonnulli aliqua signa coctionis expectant, antequam applicentur: in chronicis verò morbis nervosi generis phases lunæ, ut die unô vel alterô ante novi- vel plenilunium applicentur. Lethale signum est, si in gravioribus morbis nullam faciant ope- rationem vesicationis, cum etiam in cadavere nihil ope- rentur.

ARTICULUS VI.

De Officiô Medici, in præscribendis Vesicatoriis.

**E**Mplastr. Vesicator. R. Emplast. Vesicat. Augustan. dr. 1. S. ij. iij. unc. S. detur ad chart. S. Pflaster vor ein vesicatori, auf ein Leder in der größe eines grossen Tha- lers oder Handflache aufzustreichen, und aufgelegter, mit Heft-Pflastern wohl zu verwahren.

Aliud pro 4. Vesicator. R. Emplast. vesicat. August. unc. 1. vel. R. Empl. de melil. de mucilag. an. unc. S. canthar. pulv. dr. ij. M. S. Vesicatori-Pflaster auf Hand und Fuß, wie bewußt aufzulegen.

Aliud in Dolore dentium valde proficuum, R. Can- tharid. præp. pulv. dr. ij. therebinth. dr. j. myrrh. mast. camph. an. gr. xv. ol. ros. dr. ij. cer. dr. iij. M. f. Emplast. S. Zahn Vesicatori-Pflaster, darvon, so viel vonnöthen, hinter die Ohren, oder auf das Genick aufzulegen.

Cataplasma pro 2. Vesicat. R. Canth. præp. scrup. iv. euphorb. scr. j. ferment. acerrimi unc. 1. acet. squill. q. s. M. f. pasta pro 2. vesicat. S. Blatter ziehende Pflaster für 2. Vesicator.

Aliud. R. Canth. præp. scr. iv. sinap. pyreth. an. scr. j. ferment. dr. v. acet. squill. q. s. M. f. Mass. inducenda corio pro 2. vesicat.

Aliud pro uno. R. Ferment. parum, caricam ping. No. 1. canth. præp. gr. vj. cum acet. squillit. f. q. M. f. Massa.

\*\*\*\*\*

CAPUT IV.

De Officiô Medici, in Affectibus indicantibus Balnea & Acidulas.

ARTICULUS I.

De Officiô Medici, in considerandis differentiis Balneorum, tam in genere quàm in specie.

I.

**B**alneum. 1. aliud est aëreum, quod laconicum Schwitz- Bad vocant: aliud aqueum, de quo in præsentî. Aqueum 2. aliud est naturale & simplex: aliud artifice- le, quod arte ex incoctis pluribus ingredientibus ad di- versos fines ordinatur. 3. Naturale, vel est Balneum aquæ dulcis, vel solius, vel additi subinde simul butyri, olei, lactis &c. ad majorem humectationem, qui liquo- res subinde etiam seorsim apud ditiores balneum consti- tuunt, in doloribus partium nervosarum, dolore iliaco, nephritico, convulsione à siccitate, urinæ suppressione &c. vel Balneum aquæ mineralis virtute mineralium im- prægnatæ. 4. Balneum minerale, vel est actu frigidum vel calidum è sua scaturigine profluens, ut statim sine aliô ignis adminiculô usurpari possit, propriè thermale dictum, quale v. g. Fabariense, seu Piperinum das Pfeffer- Bad, Castaneense das Kasteiner-Bad, Badense Baden- Baden. Utrumque pro varietate ingredientum minera- lium, quorum vires & naturam æmulantur, aureum, argenteum, ferratum, plumbeum, salsum, nitrosum, alu- minosum, sulphureum, bituminosum, vel ex variis hisce mixtum.

II.

Probantur Aquæ minerales, eas probè considerando, vel quatenus manent integræ, contemplando saporem, odorem, colorem, qualitatem tactilem, contenta, vires atque effectus, perpendendo quoque simul extra aquam loci naturam, ostium scaturiginis, canales, ahenum; vel quatenus consumuntur, seu per insolationem, seu per evaporationem in locô calidô, seu destillationem, seu de- coctionem; vel examinantur per præcipitationem, pon- derando ac trutinando postmodum residuum, præcipue gustû & olfactu. Ut autem Aquæ mineralis probatio ritè instituatur, eadem haurienda recens ac pura ex sca- turigine, & quidem m. vel v.

Aquæ sulphureæ v. g. tam calidæ quàm frigidæ, di- gnoscuntur. 1. Ex odore sulphureo notabiliter nares fe- riente. 2. Ex pinguedine quâdam in superficie innatante, 3. Quod in defluxû talium Aquarum, dum aëris injuriæ subjiuntur, cernatur corpus aliquod viscosum, album & læve, inter se cohærens simile lacti sulphuris. 4. Quod omnes tales Aquæ argentum in iis suspensum instar com- munis sulphuris, jam citius, jam tardius denigrent. 5. Quod æstuentes præbeant flores sulph. inflammabiles, in cryptis reperibiles.

III.

Balneum aquæ dulcis. 1. Mundificat, & sordes strigo- sas à sudore, pulvere & excrementis massæ sanguineæ ad peripheriam latis, abstergit atque eluit, hinc in scabie præsertim siccâ, fœtore alarum, inguinum & pedum, aliisque impuritatibus corrigendis, atque abigendis utile. 2. Poros aperit, per eos sese insinuat, transpirationem promovet, & excrementa in ambitû corporis hærentia discutit. 3. Totum corpus refrigerat, ac viscerum, & epatis præsertim fervorem, atque intemperiem calidam corrigit: humectat quoque ac serum restituit, hinc ari- dis, squalidis, strigosis ac tabidis maximè convenit, & præsertim Melancholicis à totius corporis habitu talibus. 4. Fibras tensas laxat, emollit, ac paregoricum est, hinc quoque utile in doloribus colicis, nephriticis, facilitan- dô partû, ultimô præsertim mense gestationis usurpa- tum.

IV.

Balnea mineralia, & præsertim Thermae agunt in no- strum corpus calefaciendo, humores pituitosos, conge- latus quasi, aut ad minimum gelatinosos, & segnes ca- lore suô colliquando, fluxiles, & ad motum quemcun- que non solum circularem, sed & fermentativum. Cum activas eorum particulas caliditate sua excitant. Inutiles dissipant: singulariter verò spiritus vitales serenant, ac à particulis excrementitiis expurgant, aptos reddendo, su- persuas



perfluas quoque serositates extirpando, ut natura postmodum sic adjuta, mediante circulatoriô sanguinis mori, & sedes movere, & urinam pellere, ac sudores elicere valeat. Partium etiam laxitatem, remissumque fibrarum tonum contrahendo, firmando ac roborando, ut adeo pateat, Aquas thermales potissimum convenire cacochymia pituitosâ ac serosâ, affectibusque frigidis pituitosis & serosis, sine omni intemperie calidâ; hinc etiam in universum mulieribus magis quàm viris salutare existunt, utpote frigidioribus, & magis pituitosis.

## V.

A Generalibus ad specialia deveniendo, conveniunt *Thermæ* in Paralyfi, modò affectus non sit nimis radicans in cerebrô, pessimè dispositiô, ac spiritus animales adhuc sint activi, nec omnino superabundanti humiditate absorpti, aut nimia visciditate irreti, item quàm maximè in Paræsi, quæ etiam balneatione acidularum tollitur. In Chiragrâ, Podagrâ &c. non conveniunt, & quidem nec in paroxysmo, in quô motus veluti criticus, neque extra eum, cum causam ac radicem ejus in stomacho ac liquore gastrico hærentem, non tollant; hinc teste *Timæo*, *Thonerô*, pluribusque aliis, vix ullus horum usû ab insultibus podagricis liberatus: plures tamen in vitæ periculum, vel graviora incommoda præcipitati fuerunt, humoribus vel magis attenuatis, fluxilibusque redditis, vel iis ad partes nobiles ex robore articulis conciliato refluentibus, vel articulis magis exinde laxatis, emollitis, & ad receptionem magis dispositis.

## VI.

Profunt ulterius *Thermæ* quàm maximè in mulierum sterilitate, ortâ ex intemperie frigidâ, & humidâ, in chlorosi, in mensium suppressione, vasis uteri obstructis à mucilagine pituitosâ, vel dependente à cruditate M. S. In nimio etiam eorum fluxû, si oriatur à sanguinis fluxibilitate serosâ, aut etiam nimia ejus aquositate: non verò si à sanguine biliosiori, & acriori, item in fluore albô, nephritide, ischuriâ, laxando, emolliendo spasmos, & contracturas ureterum sistendo, sicque vias, & meatus patientiores reddendo, ut calculi, atque alia postmodum excerni valeant. Item in urinæ incontinentia, ubi unicum & summum sunt remedium. Quoad affectus externos, conveniunt *Thermæ* in corpulentia nimia, tum potatæ, tum pro Balneô adhibitæ, in scabie quâcunque, & omnibus affectibus cutaneis, omni tandem cutis immunditie, inveteratis atque exedentibus ulceribus, fistulis, vulneribus & læsionibus minùs ritè curatis, leprâ incipiente Arabum, tumoribus pedum œdematosi &c.

## VII.

Sicuti autem in paulò ante memoratis affectibus apprimè conveniunt: ita nocent è contra Phthificis, Empyicis, Vomica, aut aliò abscessû internò laborantibus, corporibus etiam nimium repletis sanguine, vel cacochymia ob humorum colliquationem, ac fusionem varios excitantem morbos; catarrhosis etiam, ac varias fluxiones patientibus, ictericis quoque, hydropicis, viscerum scirrhus, vel ulcere detentis, obnoxiiis quoque suffusioni, erysipelati, ac abundantibus humoribus acribus, biliosis, scorbuticis &c. Prægnantes etiam à quam plurimis excluduntur, quia ex usu *Thermarum* sæpius moventur catamenia, vel supervenit purgatio, aut alvi fluxus foetui nocivus, unde difficulter *Thermarum* fontes adeunt, quin aliquâ molestia fatigantur; quæ tamen etiam omnia intelligenda de gravidis jam longò tempore, nempe 7. vel 8. mensium, vel gracilibus, macris, vel jam ante abortui obnoxiiis, cum experientia contrarium testetur, gravidas primis saltem mensibus, *Thermas* sine ullò damno usurpasse, licet cautelâ hic opus, & mulieres tales constitutionis pituitosæ, aut serosæ sint, necesse sit. Metuitur quidem nimia prolis accretio, vel ejusdem suffocatio,

cum tamen contrarium exempla probent, & absque hóc aquæ innatet foetus.

## VIII.

Deveniendò tandem ad *Aquas minerales*, in specie hic loci circa tractum Oenipontanum reperibiles, caremus quidem *Thermis* propriè sic dictis, & per se calidis, & æfluantibus, ut ignis adminiculò non indigeant; sulphureas tamen frigidas, & limpidas habemus, & primò quidem extra civitatem Hallensem *Balneum ad S. Crucent*, *das Bad bey H. Creuz*, quod æstate præsertim haud exiguum sulphuris odorem spirat; fortius est, *Minsterense* infra Schwazium, *das Münster-Bad*. His efficacius, & ad *Thermas* proximè accedens, utpote tepidum, & nonnihil fumosum, quod in monte *Brenner* invisitur, *das Brenner-Bad*, in affectibus præcipuè externis ulcerosis, nempe fistulosis maximè præcellens. His balneis sulphureis omnes prædicti effectus plus minùs conveniunt, in subjectis tamen magis pituitosis & serosis, quàm calidis, siccis & biliosis. Minùs etiam commodè hæ aquæ potantur, viscera interna nimis calefacientes, siccantes, & finim Tantaleam excitantes. Balneum etiam minerale habemus in *Seilrain* ad fontem rubrum, *das Seilrainer-Bad bey rothen Brunnen*, copiosò crocò martis imprægnatum. Hoc mulieribus eorumque affectibus præcipuè dicatum, utilissimum in suppressione mensium, nimio eorum fluxû, obstructionibus viscerum, & uteri passione hysterica, abortûs præcautionè, debilitate & laxitate uteri, fluore albô &c. Interim minùs convenit, admodum calidis, gracilibus, siccis & biliosis. Aliud Balneum frequentatur in *Valle Volders*, *das Bad im Volder-Thal*, nitro, alumine, vaporibus martialibus, & paucissimò sulphure imprægnatum; hinc calefacit, siccatur, roboratur, effectusque jam ante in genere propositos edit. Temperatiora, minora subjectis debilioribus, ac calidioribus magis apta Balnea sunt, illud quod est in *Eggerbach*, & illud in *Pamkirchen* infra Halam, nephriticis, & hypochondriacis multum proficua. Reliqua Balnea, in *dem Venusberg*, in *dem Offenloch*, in *dem Kerschen-Thal* minùs de mineralibus participant, sicque magis ad dulcia accedunt.

## ARTICULUS II.

*D. Officiô Medici, in, ante, & post Balneorum usum.*

## I.

UT Balnea utiliter instituantur, quædam ante, quædam in, & post illius usum observanda sunt Medico. 1. Igitur pro exigente necessitate corpus purgandum, & quidem magis per epicrasin lenioribus, ut v. g. nodulò laxativò, quàm fortioribus & drastis, ac vena, si opus fuerit, secanda. 2. Quoad tempus anni, commodissimum præbent menses non errati, quia & dies magis protracti, tempus hilarius, ac homo ipse ad omnes curas magis dispositus, hisque temporibus nocentissima illa antiperistasis, ne ex balneô calidò exeuntes, lædantur frigidò immediatò, præcavetur. 3. Lunâ decrescente, si fieri possit, illud inchoandum.

## II.

Ratione temporis diei, optimum est tempus matutinum: non exclusis tamen horis pomeridianis. Ante prandium jejune si fieri possit balneandum: secus jusculum, ex decocto carnis vel gallinæ in aqua thermali concedendum. Post prandium aquis non inidendum, nisi 3. vel 4. horis à prandiò, ne lædatur digestio, & variæ cruditates generentur. Consultum est, mane horâ quartâ vel quintâ surgere, balneum frequentare horâ quartâ vel quintâ, ac post prandium horâ tertiâ. In principiò nec calidè, nec profundè insidendum, ita tamen, ut calor successivè ali-



aliqua-  
liter intendi possit, cavendo semper ne quid nimis. Ex intensiori enim calore balnei, succedunt vigiliæ, sitis, dolor capitis, defluxiones, lassitudines, appetitus prostratus, asthmata &c. Dignoscitur autem calor intensior si corpus ad introitum quasi aduratur, si facies more galli Indici excandescens rubeat, aut corpus ipsum quasi sudore diffuset, intendatur sitis &c.

### III.

Infessus non sit nimis profundus, ac pluribus ad umbilicum tantum usque suadet, in quo tamen certa haud potest dari regula. Profundius enim insidere possunt seniores, melancholici, phlegmatici, ventriculorum frigidiores habentes, qui etiam majorem calorem ferunt; vel affectionibus colli, scapularum vel brachiorum detenti: minus Juvenes cholericæ, æstuantem habentes ventriculorum. Labrum semper sit mundum, tegendum mediâ parte versus collum asserculis ligneis: ex alterâ verò parte tapete, vel aliis integumentis; caput etiam linteis mundis circumligandum, & à calidis balnei ascendentibus vaporibus defendendum. Si Aqua mineralis non per se sit calida, per trihorium prius spumosa ebullitione coquatur, & singulis infussionibus renovetur.

### IV.

Longitudinem & horas Balneandi quod attinet, communiter balneum primò die per horam: alterò per duas, vel unam & dimidiam, & sic singulis diebus per horam, vel dimidiam crescendo pergatur, usque ad horas 5. 6. 7. tum per 12. 15. vel etiam 20. dies in eodem consistendum, vel eousque, donec quis se alleviatum sentiat, & balneum quasi nauseaverit, quod signum perfectæ curæ, atque hinc denuo eò, quò ascensum est modò & tempore, descendendum. Ante prandium semper plus temporis infumendum, adeò, ut si de die per 5. horas balneatur, balneum manè per 3. cum dimidia: vespèri per 2. & dimidiam partem horæ balneandum sit. Alii sequentem observant Tabellam.

## INSTRUCTIO FUNDAMENTALIS,

*Qua ratione Horæ infessus Balnei sint observandæ.*

Die. Horis antemeridianis. Horis pomeridianis.

|                                  |    |   |   |    |   |   |   |   |    |
|----------------------------------|----|---|---|----|---|---|---|---|----|
| Modus ascendendi, & descendendi. | 1  | - | - | 1  | - | - | - | - | 1  |
|                                  | 2  | - | - | 1½ | - | - | - | - | 1  |
|                                  | 3  | - | - | 2  | - | - | - | - | 1½ |
|                                  | 4  | - | - | 3  | - | - | - | - | 2  |
|                                  | 5  | - | - | 3  | - | - | - | - | 2  |
|                                  | 6  | - | - | 3  | - | - | - | - | 2  |
|                                  | 7  | - | - | 3  | - | - | - | - | 2  |
|                                  | 8  | - | - | 4  | - | - | - | - | 3  |
|                                  | 9  | - | - | 4  | - | - | - | - | 3  |
|                                  | 10 | - | - | 4  | - | - | - | - | 3  |
|                                  | 11 | - | - | 4  | - | - | - | - | 3  |
|                                  | 12 | - | - | 4  | - | - | - | - | 3  |
|                                  | 13 | - | - | 4  | - | - | - | - | 3  |
|                                  | 14 | - | - | 4  | - | - | - | - | 3  |
|                                  | 15 | - | - | 3  | - | - | - | - | 2  |
|                                  | 16 | - | - | 3  | - | - | - | - | 2  |
|                                  | 17 | - | - | 3  | - | - | - | - | 2  |
|                                  | 18 | - | - | 3½ | - | - | - | - | 2  |
|                                  | 19 | - | - | 1½ | - | - | - | - | 1  |
|                                  | 20 | - | - | 1  | - | - | - | - | ½  |
|                                  | 21 | - | - | 1  | - | - | - | - | ½  |

Interim tamen hæc Tabula non est universalis, sed habenda est ratio naturarum, sexus, ætatis, temperamenti &c. multi enim de die ultra 4. vel 5. horas non tolerant,

præsertim biliosi, sicci, melancholici: alii plures, ut robustiores, & durioris texturæ homines, ut etiam ad 4. 5. vel 6. septimanas Balneum continuare possint. Quilibet pro regulâ habeat vires, earumque conservationem, ac balnei tolerantiam; qui enim læditur balneò, ac cui appetitus dejicitur, abdomen inflatur, ac alia perversa accidentia, quæ ordinariò à balneò non procedunt, patitur, satius est, ut vel abstineat, vel cautè balneò utatur. Interim nephriticæ, colico dolore laborantes, hysteri-  
cæ, in principiò Balnei alterationem sentientes, non statim desistere debent, sed cum certiori spe valetudinis pergere, juxta vulgare illud: *Was das Bad bringt, nimbt das Bad wieder hinweg.*

### V.

Finitâ lotionem corpus detergendum, lecto per dimidiam saltem horam committendum, ac sudor foris superveniens non impediendus. Si durante balneatione superveniat exco-  
riatio, pruritus, maculæ, scabies &c. quod tamen non est necessarium, balneum tam diu continuandum, donec cutis lavigata priorem formam receperit; sit autem aqua tepidior, neque diutius eidem immoretur, sed sæpius de die in & exeat, oportet. Consultum etiam est, si nimis diu hoc malum protrahatur, indusia quædam in aqua thermali sæpius intincta, & per se exsiccata, peractâ balneatione perpetuo gestare, ac m. & v. partes exco-  
riatas vinò calidò lavare.

### VI.

Aër vitetur frigidus, & si talis sit, hypocaustum moderatè calefaciendum, vel corpus sufficientibus vestimentis etiam pelliceis tegendum, neque tamen etiam radiis solaribus exponendum; prandium & cæna semper æqualibus instituantur horis, ac quò parcius comeditur, & bibitur thermarum tempore, eo melius est. Extra passus vini usus vitandus, Urgente siti, vel aliàs etiam circa medium balneandi tempus, potus aquarum thermalium frigidarum, post prandium, vel calidarum ante prandium, cum incoctione *sem. fenic. coriand.* vel *cinam.* concedendus est. Longa mensa in prandiò nocet: minus in cænâ. Caveatur à varietate ciborum, à satietate, ab acetariis, infumatis, fructibus horariis, lacticiis, frixis, ex pasta coctis, nimium aromatizatis, saccharatis, salinis, flatulentis; cibi sint boni succi, ac laudabilis concoctionis, & paucorum excrementorum, ut carnes vitulinæ, hædinæ, capreol. leporin. juniores, capon. pull. gallinac. gallin. galli indic. avicul. mont. ex piscibus trut. thymal. gobii, fundul. lucii minores, hordeacea, ova forbilia &c. Pro potu utendum vinò albò dilutò, pro cujusque natura, & consuetudine. Alvus fervetur laxa. Vitandi vehementiores corporis & animi motus.

### VII.

Tandem etiam accidentium morbosorum, usui Ther-  
marum subinde supervenientium habenda ratio, & 1. *cephalalgia*, per clyster. lotiones pedum, laxantia, frontalia, & unguenta. *Vigiliarum*, per hordeata, emulsi-  
ones, pediluvia, frontalia. *Somnolentia*, per clysteres ac-  
criores, frictions, caput purgantia, vel cessationem à balneo, si notabilis sit. *Defluxionum*, per diætam exqui-  
sitam, & aëris correctionem, vel cessationem à balneò, si gravis, donec remittat. *Febris*, per cessationem à bal-  
neò, & abstinentiam vini. *Sitis*, per julepos acidulos, emulsi-  
ones &c. *Inappetentia*, per evacuationem, appe-  
titum excitantia. *Alvi constipationis*, per spinachium, pruna dulcia, poma cocta, ova forbilia, pilulas Franco-  
furt. vel Emanuel. clyst. vel suppositor. *Exulcerationis* seu *efflorescentiæ cutis*, per continuationem balnei blan-  
dioris & tepidioris, vel si etiam major, per V. S. purga-  
tionem, sudorifera &c. *Mensum*, per cessationem, si ve-  
hementius fluxus instaret: secus non.

### D

### ARTI-



## ARTICULUS III.

## De Officiô Medici, in præscribendis nonnullis Balneis artificialibus.

**B**alneum Thermale expertissimum, Paul. de Sorbait. *℞. Sulph. viv. apyr. calcis viv. an. lib. i. M. f. Pulv. qui aliquot ebullitionibus coq. cum aq. font. mens. viij. hinc ab igne removeatur, ut subsideat & refrigescat per noctem, alterò die fiat Balneum plenum ex aquâ font. calida, ad cuius refrigerium decantetur lixivium pridie ex speciebus extractum, remanente in fundò ollæ pulvere. Post usum Balnei ex ejusdem aquâ tantundem reasfundatur ad ollam, in quâ pulvis ille subsedit, serventurque reliqua Balnei aqua in cupâ bene testâ. Alterò die eadem aqua calefiat, & altera in ollâ existens iterum ad refrigerium reasfundatur per decantationem, remanente semper in fundò pulvere. Taliter, quater procedi potest, hinc novæ species recipiendæ. Balneum hoc euporiston Thermis vix cedit, omnibus nervorum, & articulorum doloribus, matricis affectibus, paralyfi, calculo &c. accomodatissimum. Ab experientiâ arthriticis eximias exco-riationes creat, quibus copiosus evacuatur ichor cum levamine.*

Balneum in Nephritide. *℞. Herb. veron. pariet. mercurial. malv. cum tot. saxifrag. ononid. an. m. ij. fl. cham. m. iij. sambuc. m. ij. rad. alt. petrosel. fœnic. an. un. j. B. sem. lin. unc. iij. fœnugræc. unc. j. bacc. Junip. unc. iij. M. incis. dentur S. Species zum Bad.*

Aliud. *℥. Stramin. aven. flor. calend. an. q. s. Miscè.*

Balneum in Scabie. *℞. Rad. oxylap. unc. ij. enul. camp. malv. an. unc. j. herb. saponar. nepeth. fumar. agrim. veron. an. m. ij. fl. chamom. m. ij. herb. s. emoll. an. m. j. bacc. laur. unc. ij. sulph. viv. nit. alum. an. unc. ij. M.*

Aliud. *℥. Rad. bryon. unc. j. oxylap. irid. flor. an. unc. j. enul. camp. unc. ij. herb. fumar. scabios. mercurial. an. m. j. alum. dr. xj. sulph. dr. x. tart. unc. j. B. M. S. Kräuter und Species zum Bad.*

Balneum in Fluore albô. *℞. Herb. arthemif. calamint. puleg. meliss. ment. satur. hyssop. serpill. thym. orig. absinth. ros. rub. cham. melil. an. m. j. rad. cyper. long. calam. arom. an. unc. B. Irid. flor. unc. j. Gumm. ladan. unc. j. sacculo inclus. coq. in f. q. aq. pro Baln. Herbae singulis tribus diebus renoventur; ut sinum muliebrem inimiùs penetret, per syringam, annexâ vesicâ suillâ, aqua introPELLATUR, vel lanâ, eadem aquâ benè madidâ, in uteri collum intrudatur.*

Balneum in suppressione Mensium. *℥. Rad. aristol. lil. alb. arthemif. alib. rub. tincl. aa. unc. iij. sem. lin. unc. vj. fœnic. unc. j. carv. cumin. petrosel. an. unc. j. B. bacc. laur. unc. iij. Juniper. unc. vj. herb. malv. melilot. puleg. meliss. mercurial. an. m. ij. sol. sabin. m. iv. fl. cham. m. iij. cent. min. mij. incis. & conqass. includ. saccul. qui ex aq. f. q. coq. pro infesû & fotû muliebrum. Prodest etiam hoc Balneum in partû difficili, foetû mortuô, retentis secundinis &c.*

Aliud efficacissimum, teste Riveriô. *℥. Rad. alib. lil. alb. enul. camp. bryon. cucum. agrest. an. lib. ij. sol. malv. violar. mercurial. puleg. matricar. meliss. an. m. iv. sem. lin. fœnugræc. leviter contus. an. unc. ij. coq. in aq. f. q. pro Baln. Usû hujus Balnei, aliquando in tertiô vel quartô balneô profluxerunt menses, per longum tempus retenti.*

Balneum adstringens, in procidentia Uteri. *℥. Fol. beton. agrim. salv. laur. roris. myrt. puleg. orig. fl. stech. arab. balauft. an. m. j. rad. consolid. maj. unc. iij. bistort. torment. aristol. long. an. unc. B. alum. roch. unc. ij. M. incis. dentur ad chart. coq. in aq. fabr. pro Balneô.*

Aliud. *℥. Herb. ment. puleg. orig. hyssop. ruth. meliss. serpill. salv. major. lavend. an. mij. nuc. cupress. ros. rub. spic. nard. cort. gran. capul. gland. an. unc. j. mespil. immat. acac. an. m. j. scob. lig. Juniper. guajac. an. unc. iv. sal. nit. sal. commun. an. lib. B. alum. lib. i. M.*

Balneum contra Atrophiam Hæticam. *℥. Amygd. cum cortic. gross. mod. contus. lib. ij. farin. bord. lib. vj. indantur sacco ampliori, & coq. in ahen. cum aq. plur. f. q. tertiô die renovetur.*

Baln. Hordeaceum Gersten-Bad. *℥. Hord. crud. si simul abstergendum, vel excorticat. si magis refrigerandum, & humectandum 2. oder 3. grosse Mässl. saccul. indit. coq. in f. q. aq. pro Baln. Tertiô vel quartô Balneô renovetur hordeum.*

Balneum articulos, nervos & ligamenta roborans. *℥. Herb. absinth. arthemif. orig. hyper. serpill. lavend. an. mij. roris. major. an. m. j. rad. alib. asar. lil. alb. an. unc. B. fl. cham. summit. aneth. an. mij. turion. abiet. conor. seu strobil. ejusdem an. mij. sem. lin. fœnug. an. lb. B. M. incis. & conus. pro Balneô.*

Aliud in hunc finem parari solet, ex folis summitatibus, & baccis Juniper.

Balneum formicarum. *℥. Formicarum integrum cutile, quod sacculô inclus. coq. in f. q. aq. pro Baln. addendo subinde alias herbas vel etiam Mineralia. Prodest in Paralyfi, dolore Ischiadicô &c.*

Balneum antiparalyticum. *℥. Alum. sulph. bacc. laur. an. lib. j. bacc. & summit. Juniper. an. mij. vel iij. salv. nob. m. j. M.*

Aliud. *℥. Herb. major. chamæd. chamæpyth. fol. primul. ver. an. mij. roris. salv. an. mij. fl. lavend. primul. ver. an. m. j. bacc. Juniper. mij. sulph. lib. iij. nit. lib. j. M. pro Balneô.*

Balneum expertum in Sterilitate. *℥. Rad. bryon. imperat. valerian. Ireos, enul. camp. an. unc. iij. fol. major. arthemif. nepet. puleg. mercurial. salv. laur. an. m. j. bacc. laur. Juniper. an. unc. j. coq. in f. q. aq. pro semicup. Alii etiam addunt acervum formicarum. Sedeat in hoc Balneô, noctû cubitum itura per i. horam: hinc egressa, & absterfa calidis pannis in fellam perforatam sedeat, ac fumum excipiat ex thur. mast. succin. benz. gumm. taca-mah. gumm. anim. troch. alipt. mosch. &c.*

Balneum carminativum, & anodynum, in Colicâ. *℥. Herb. orig. calam. ruth. an. mij. fl. chamom. mij. malv. cum tot. m. j. B. melil. m. j. summit. aneth. mij. sem. lin. unc. ij. fœnug. unc. j. aneth. unc. j. B. bacc. Juniper. unc. iij. incis. & conqass. coq. in f. q. aq. pro Balneô.*

## ARTICULUS IV.

## De Officiô Medici, in considerandâ vi &amp; effectû Acidularum, tam in genere, quàm in specie.

## I.

**A**cidulæ (quæ nihil aliud sunt, quàm vitriolum martis dissolutum: fit autem vitriolum martis, quando minera martis dissolvitur, à spirit. sulph. acido) variis etiam modis probari solent, ut suprà dictum de Thermis. Optimus est per præcipitationem: fallax è contra, qui fit per destillationem & evaporationem, tum quia multum de volatili substantiâ evanescit, tum quia remanens mediante igne alteratur, ac aliam acquirit texturam. Decoct. gallar. infusum, acidulas nigrore tingit, si de marte participant. Infusâ aquâ falsa turbantur, & quasi lactescunt, si de nitro quid participant. Si quid de alumine, optimè evaporatione dignosci potest. Nobis hîc Oeniponti in usû practico sunt Bruzenses, der Brutzer-Saurbrunnen, & Egrana seu Egrenses, der Eger-Saurbrunnen. Illæ martiales, vitriolicæ, sulphureæ & aluminosæ: hæ, prioribus magis efficaces, licet minùs gratæ, nitrosa salinâ sulphureâ aciditate præpollent.

## II.

Vim suam in corpore exercent Acidulæ, suaviter calefaciendo, humiditates superfluas absumendo, & exsic-cando;



cando, salia sylvestria sanguinis contemperando, hinc æstum viscerum corrigendo, scorias tartareas ex latice & totâ mafsâ fanguineâ evertendo & elutriando, tum per alvum, tum per urinam & sudores, viscerum ac vasorum infarctus detergendo, discrasiam viscerum emendando, ac partibus tandem debitum tonum restituendo; præterea salia acida vitiosa in corpore absorbendo, & per inferiora eliminando. Dum enim potatur aqua acidula, fermentum stomachi acuit atque exaltat, unde singularis fames: hinc ventriculum à quisquiliis elutriat, tonum fibrarum restaurat, & dum ad intestinum duodenum defertur, vi bilis alcalinâ pars metallica martis præcipitatur, quæ postmodum iterum apta est, ab omni acidô præternaturalem alterationem suscipere, acidum in tertium quasi falsum immutare, illud destruere, absorbere; & hinc excrementa nigrô colore plerumque tinguntur, ut illud postmodum per alvum, sæpè etiam per urinam & sudorem eliminetur.

III.

Ex dictis patet, quòd sicuti Thermae magis profunt in cacochymia pituitosâ & ferosâ, ita Acidulae magis in cacochymia biliosâ, & melancholicâ. Ut autem ad specialia deveniamus, sciat Medicus, Acidulas prodesse, 1. In affectibus capitis, non quidem essentialibus, sed per sympathiam partium inferiorum excitatis, à corruptis & vitiosis humoribus ibidem stabulantibus, ut v. g. in catarthiis calidis, acris, falsis, vigiliis, vertigine, tremoribus, convulsionibus, ac epilepsiis, si fomes morbi sit mesenterium, lien, uterus, ventriculus, vel causæ sint lumbrici. Item in cephalalgiiis & hemicraniis, ex vitiô sanguinis aut chylicationis oriundis. In metû apoplexiæ cautè iis utendum. Pareses & contracturas, si non omninò inveteratæ fuerint, radicibus extirpant, tam potatæ quàm balneô adhibitæ.

IV.

Præterea quoque auferunt ruborem faciei oculorumque: singulariter verò fermentum ventriculi erigunt, unde appetitum procurant, digestionem promovent, ructus ejiciunt, cardialgias, sodas & vomitum maximè matutinum materiæ pituitosæ & aqueæ, quam vulgò, *das Hertz-Wasser* appellant; compescunt, inflationes ejus sopiunt, & mineram flatuum evacuant. Præterea profunt in Veterum antipraxia, vel R. R. chylosi læsâ, obstructionibus viscerum, icteritiâ, chlorosi, & specialiter in colicâ convulsivâ vomitibus infestante, ac malo hypochondriaco, cujus sunt quasi sacra anchora, ac alter Rhizotomus.

V.

Item maximè conducunt, in nephritide, gonorrhœâ, arthritide, rheumatismô, scabie, fluore albô, suppressione mensium, eorum superfluitate, vermibus quoque, quorum certissima sunt antidotus; sterilitatibus quoque multoties opitulantur, febres omnis generis intermittentes tollunt, non tam potæ, diluendo cruditatem nidorofam, ac infringendo acidum volatile oleosum atque corrosivum, verum etiam, si in iis balneetur, præsertim imminente rigore. Malignis quoque febribus profunt diluendo, inflammatos spiritus potenter ligando ac pacando, eosque suâ vitriolaceâ, ac quadantenus anodynâ vi sopiendo, & causam occasionalem irritantem emendando.

VI.

Quoad affectus externos, juvant Acidulae præsertim omnis generis arthriticos, Ischiadicos, podagricos, ophthalmicos, & singulariter paralyticos ex colicâ, per modum Balnei adhibitæ. Tollunt calidè gargarizatæ, scorbutum oris. Virtus quoque illis adscribitur medendi ozanæ, vermiculis aurium &c. Balneô usurpatæ, conducunt etiam in pruritû, scabie, serpigine, ulceribus fordidis, corrosivis, rheumaticis, phagædenicis, & disepuloticis, fluore albô, sterilitate, suppressione mensium &c.

VII.

Sicuti autem Acidulae in modò dictis affectibus profunt, ita necesse est, bibentes præditos esse stomachô robustô, pulmonibusque validis, cum omnibus ad phthisin pulmonalem inclinantibus Acidulae insensibilis hostis sint, hydropici quoque ex eorum usû plerumque intereant; nocent etiam magis, quàm profunt, ubi viscera haud integra, ac vel scirrhô vel abscessû, aut tuberculis detenta. Omnia igitur prius benè examinanda, causæque morborum perpendendæ; antequam ægroto Acidularis cura præscribatur.

ARTICULUS V.

De Officiô Medici, in, ante, & post usum Acidularum.

I.

**A**Nte usum Acidularum corpus evacuandum, non quidem fortioribus, M. S. exagitantibus & turbantibus, partesque solidas lædentibus; sed *potione* quâdam *mannatâ*, vel *rhobarbarinâ*, vel *pilul. Emanuel.* aut *nodulô laxativô*, & si opus, licet ut plurimum necesse non sit, vena secanda. Tempus optimum bibendi Acidulas, est *Majus, Junius, Julius, Augustus*, nam: *Mensibus in quibus R. non debes bibere Wasser.*

Licet urgente necessitate etiam hyeme concedi possint, dummodo vasculum aquæ potabilis adhuc obturatum, lente ad fornacem calefiat, vel per noctem in hypocaustrô calidô steterit, vel aquæ calidæ immergitur, vel dum scyphus argenteus retinetur in aquâ ferventi, & infunduntur unc. iij. vel iv. pro vice mox exhauriendæ.

II.

In loco scaturiginis bibens, manè hora 4. vel 5. surgere debet, excrementa per meatus convenientes excernere, ac unâ vel alterâ horâ post solis exortum, fontem sine violentô motû frequentare, & quidem jejunos, nisi esset tenerioris constitutionis, ac humoribus præditus tenuibus, fibrisque fatis raris & exilibus; quò in casû vel jusculum carnis, aut ovum forbile, si confortantia ex officinis non videantur sufficere, concedi potest: immò in hóc passû, ne ventriculus ita debilis à frigore fontis lædatur, conducibilis est, calidiusculè modò supra dictô, lymphas potare.

III.

Bibiturus ac prædispositus, dum ipsum fontem adiit, vel eò vectus est, aquarum potum incipiat, inchoando à 2. 3. vel pluribus vitris successivè ebibitis, prout appetitus exigit, ac natura non gravatur, hinc singulis diebus unum, 2. vel 3. vitra addendo, usque dum deveniatur ad eam quantitatem, quam quis haurire poterit absque ullô incommodô, ut v. gr. gravitate, dolore, flatibus, vomitû &c. habitâ tamen semper ratione ætatis, sexûs, constitutionis fortis vel debilis, capacitatis ventriculi, ac consuetudinis, maximè autem respiciendum ad tolerantiam. In Acidulis Bruzensibus 4. 5. 6. 8. &c. mensuræ bibuntur. In Egranis quotidie ampulla terrea, *Ein Eger-Sauerbrunnen-Flaschen* ebibitur, eorumque vel 8. 9. *ein halbe Kisten, ein halbe Cur* vel 15. aut 18. *ein ganze Kisten ein ganze Cur* absumentur. Non autem unâ vice Acidulae actû frigidæ affatim, & præcipitanter ingurgitandæ, sed 2. vel 3. vitra pro unâ vice, interpositis dein discursibus, levibus deambulationibus, assumptis stomachicis, ut *confect. sem. anis. fenic. condit. z. z. vel calam. arom. cort. cit. aurant. morsell. &c.* ita tamen, ut tota mensura intra horam & dimidiam ebibatur.

D 2

IV.



Potus Acidularum continuandus per dies 10. 15. aut 20. immò per mensem, & ultra, pro morbi magnitudine & longitudine. In morbis contumacibus etiam annò sequenti frequentandæ: secùs in levioribus, & prophylacticè tantùm bibitis: sicuti autem in summâ dosi, quæ intra triduum haberi potest, per aliquot dies perseverandum, & præsertim eò usque, donec quis sese alleviatum (quod signum erit perfectæ curæ) sentiat; ità rursùs gradatim denuò descendendum, nisi quis unam vel alteram tantùm biberet mensuram, descensione opus non est; olim etiam vesperi Acidulæ methodicè bibebantur: hodiè verò ad sitim duntaxat, si fortè urgeat tollendam, unum vel alterum vitrellum potatur, vel in affectibus externis Acidulæ ante prandium potari, post prandium pro Balneo usurpari solent.

## V.

Operatio Acidularum diversa, & pro variâ corporis complexione, ac humoribus in eò prædominantibus, hinc motus naturæ observandus, ac per convenientia loca adjuvandus. Optima est operatio, si primò per alvum, hinc per urinam, ac tandem per sudorem operentur. Si per alvum, ut meliùs operentur, consultum est, ut æger noctû, hora 1. ante coenam sumat, vel *pilul. aloëicas*, FF. vel *Emanuel.* vel in primò vitrò Acidularum dissolvat, *syr. ros. sol.* vel *fl. persic.* vel ità simpliciter in majori quantitate, vel *pulv. syr.* aut *rad. gial.* acuat. vel *crem. tart.* vel sumatur manè *morful. purg.* &c.

## VI.

Haustris Acidulis, neutiquam violentis exercitiis utendum, cum etiam in lectò subinde non sine fructu sumantur, sed reliquum tempus ad prandium usque, levibus deambulationibus, discursibus, ludis &c. transigendum, ad aliqualem lassitudinem, & eruptionem sudoris. Prandium non accedendum, nisi hora xj. vel saltem 4. horis ab assumptò potû, donec tota vel potissima ejus pars sit excreta, ac urina priùs alba, hinc nonnihil colorata fiat. Interim aquas initiò potûs vel etiam in ascensû, ægrè reddens, non tamen statim desistere debet, sed animosè perseverare, & summitatem curæ expectare, modò etiam intra 2. horas transeant.

## VII.

Efficaciores sunt Acidulæ, sudò serenòque, quàm nubilosò & pluviosò cœlò, hinc etiam aliò transportandæ, hauriri debent tempore serenò existente, & quidem omni anni tempore, Bruzenses nostræ mense Martiò collectæ optimæ, antequam nix colliquefcens intimiora terræ penetrando, fontem inquinet. Vitandus igitur in curâ acidulari aër intemperatus, frigidus, pluviosus, nebulosus; hinc tali existente, Acidulæ domi in hypocaustis calidis bibendæ, aut lectus petendus. Interim etiam vitandi radii solares.

## VIII.

In Diætâ vitanda satietas, multa ciborum varietas, edulia falsâ, nimis aromatizata, crassa, viscosa, dura, lactinia, legumina, acetaria, fructus horarii, caro suilla, infumata &c. è contra convenit bubula junior, caro vitulina, vervecina, leporina, hædina, volucres montanæ, caro pull. gallinac. capon. columb. pisces saxat. &c. Pro potû vinum alb. merum, vel rubellum tenue, non tamen Acidulis dilutum. Fugiantur somnus meridianus, exercitia violenta, ludi intensi, moeror, tristitia, ira, venus; alvus quotidie sit aperta, secùs vel enemate ferò injectò, vel *infusione sennæ* ante potum sumpta, vel *crem. tart.* acuatò, in primò cyathò sumptò laxanda.

Tempore curæ Acidularum, symptomatum emergentium quoque habenda ratio, ut v. g. *retentionis aquarum*, per laxantia, ut rhab. gial. crem. tart. syr. ros. sol. acuat. vel per cessationem curæ. *Vomitûs*, per clysteres, roborantia interna & externa, vel cessationem curæ. *Colicæ*, per clysteres, vel cessationem curæ. *Suppressionis alvi*, per passulas, pruna, poma cocta, spinach. bet. pilul. Emanuel. clyst. crem. tart. acuat. *Diarrhææ vires diminuentis*, per abstersiva, tam per os assumpta, quàm clysteres injecta, & roborantia. *Commotionis humorum*, excitantis quandoque dolores dentium, lumborum, podagram &c. per continuationem curæ, & abstinentiam à vinò. *Fluxus mensium*, per defensionem genitalium à frigore, & potationem Acidularum calidarum.

## X.

Finitâ Acidularum curâ, mediantibus conviviiis & poculis non valedicendum, iter domum versus citra festinationem instituendum, diætâ deinceps exactè servanda, aliquid Acidularum domi adhuc, si placet, bibendum, purgatio, si quis ex retentis aquarum reliquiis gravatum se sentiret, instituenda: secùs eadem abstinentium. Sicuti autem Acidulæ efficaciores sunt ad scaturiginem potæ, quàm aliò delatæ: ita etiam Acidularis cura domi instituta, (quod nonnulli faciunt, vel ut sumptibus parcant, vel quod iter exhorrescant, vel ob occupationes urgentes domò abesse nequeant) rarò singulari cum fructû instituitur; præsertim in iis, qui manè Acidulas ad plures libras ingurgitant: postmodum seriis negotiis hinc inde irretiti, spiritibus aliò avocatis & dissipatis, ventriculorum debilitant, vel ante prandium lymphis, post prandium verò Baccho litant; unde his magis consultum, ut omisâ solenni curâ, manè lib. 1. vel 1. β. bibant, leviter desuper obambulando, & exactam diætam servando: post prandium etiam rursùs vitrum Acidularum hauriant, atque sic curam ad 30. dies, & ultra continuent.

## ARTICULUS VI.

De officiò Medici, in præscribendis Remediis pro debiò usû Acidularum.

**R.** Confect. sem. anis. vel fœnic. aut coriand. præp. lib. 1. detur ad scatul. S. Anis - Fânchel - oder Coriander - Zucker unter dem Trincken des Saurbrunnens zu gebrauchen.

Morsell. R. Spec. diarrhod. Abb. aromat. ros. complet. an. dr. ij. cort. aurant. condit. minutim incis. citr. an. dr. iij. nuc. mosch. in Ind. condit. dr. ij. confect. sem. anis. fœnic. coriand. an. scr. 1. β. cardam. min. scrup. ij. sacch. in aq. ceras. nig. & cinam. dissol. q. f. M. f. Morsul. S. Magen - Strüzelen, unter den Saur - Brunnen trincken, ein oder anders zu gebrauchen.

Aliud. R. Spec. pro morsul. Imperat. unc. 1. condit. z. z. Chinenf. cort. cit. nuc. Ind. condit. an. unc. β. cardam. dr. j. β. cubeb. dr. ij. ol. dest. cinam. gut. v. mac. gut. vij. caryoph. gut. iv. cit. gut. iij. sacch. albiss. in aq. sassaf. cum cinam. destill. solut. lib. 1. M. f. Morsell. S. ut supra.

Alii magis temperati pro hypochondriacis. R. Cort. cit. recent. minutissimè quadratim incis. dr. iij. sacch. albiss. in aq. spirituos. cinam. dissol. unc. iv. M. f. Morsul.

Tragæa. R. Spec. aromat. ros. diaxyloal. diarrhod. Abb. an. scr. j. cinam. elect. dr. j. nuc. mosch. dr. β. mac. caryoph. an. scr. β. sacch. albiss. unc. iij. M. f. Trag. S. Magen - Trisanet unter vvehrenden Saurbrunnen - Cur nach dem Essen mit Wein und Brod zu nehmen.

Pilulæ laxativæ. R. Mass. pilul. FF. vel Emanuel. dr. ij. formentur ex scr. 1. No. vij. aspergantur cinam. S. Franck-



S. Franckfurter - oder Emanuel - Pillulen, darvon 7. ein Stund vor dem Nacht - Essen zu nehmen.

Pulvis pro transitu Acidularum promovendo, R. Crem. tart. dr. β. rad. gial. scr. j. M. f. Pulv. dentur 8. dof. S. Laxier - Pülverlein, darvon eines in dem ersten Glafs Saur-Brunnen zertribner einzunehmen.


Alius. R. Pulv. epat. rub. scrup. j. diagryd. rosat. vel sulphurat. gr. viij. (plus minus) M. dentur 8. vel 10. dof. vel R. Crem. tart. dr. j. tart. vitriolat. sal. absinth. an. dr. β. ocul. canc. præp. dr. j. β. sacch. albiss. dr. ij. M. f. Pulv. ad scatul. S. Vermischter Weinstein, darvon ein halb Quinl. in dem ersten Glafs Saur-Brunnen zu nehmen.

Syrupus pro eadem intentione. ℞. Syr. ros. sol. aur. vel fl. persic. lib. β. detur ad fistil. S. Rosen- oder Pfersich-Blüh-Safft, darvon 3. oder 4. Löffel voll in den ersten Glafs Sauer-Brunnen zu nehmen.

Alius. R. Syr. ros. sol. unc. iv. crem. tart. scr. j. β. pulv. syr. sem. mel. subact. scr. j. M. f. a. vel R. Syr. de cich. cum rhab. ros. sol. aur. an. unc. j. pulv. rad. gial. dr. ij. M. S. Laxier - Safft, darvon zuvor vobhl aufgerührter 1. oder 2. Löffel vol in den ersten Glafs Sauer - Brunnen zu nehmen.

Morselli, pro eadem intentione. R. Mag. gial. gr. xiv. gum. gutt. gr. viii. conf. cit. borrag. cort. cit. condit. an. scr. i. ol. cinam. gutt. ii. sacch. albiss. in aq. borrag. & cinam. dissol. q. f. M. f. Morsul. N. 2. vel R. Pulv. rad. gial. dr. ii. spec. pro morsul. Imperat. crassiusculè incis. flaved. cort. cit. rec. an. dr. i. sacch. in aq. ros. solut. unc. ij. f. Morsul. N. iij. equal. magnitudinis. S. Purgier-Morsellen, davon eine vor Trinckung des Sauer-Brunnens zu nehmen.

Electuar. ad eundem finem. ℞. Pulp. tamarind. unc. i. cass. extract. dr. vi. conf. ros. unc. j. rad. gial. dr. ij. magist. scammon. dr. β. M. S. Purgier - Latwergen, einer kleinen Nufs grofs mit den Sauer-Brunnen zu nehmen.



## C A P U T V.

De Officiò Medici, in Affectibus indicantibus Purgationem.

### ARTICULUS PRIMUS.

De Officiò Medici, in Humoribus evacuandorum Præparatione.

#### I.

Cum experientia testetur, ac Medicis in praxi notum sit, in quartanâ, scorbutô, affectione hypochondriacâ, cachexiis, aliisque morbis chronicis & lentis, Purgationes fieri quandoque graves, cum torminibus, variis spasmodis, violentâ humorum agitatione, intestinorum exulceratione, deliquiô, passione hysterica &c. quæ omnia symptomata, cum contingere soleant, vel ex acrimoniâ nimia, & corrosivitate humorum evacuandorum, vel quod iidem nimium crassi, viscosi, fixi, immorigeri & archæo resistentes sint, factis etiam viarum impedimentis, ac exinde natis obstructionibus; indicant remedia Præparantia, quæ nempe alterando, vitiosas humorum qualitates apparant, & quasi præparant subsecuturæ educationi. Nam ex Hippoc. 2. aph. 9. corpora ubi quispiam purgare vult, fluida faciat oportet. Vocantur etiam digestiva, quasi pepasum, & coctionem humoribus inducentia.

#### II.

Præparantia seu digestiva, alia dicuntur universalialia, quæ generaliter motui humorum promovendo, conveniunt, quæ sunt polychresta, & maximè infimi ventris cruditatibus corrigendis dedita, ut v. g. crem. tart. vi-

triat. &c. Alia particularia seu specialia, quæ diversos humores peccantes respiciunt, & quadrumque lici cacoehymia corrigendæ destinata sunt. Sic bilem præparant, quæ sal. vol. urinolum plus minus oleosum temperant, amaritatem ejus ac acrimoniam infringunt, obtundunt, saliaque diluunt, qualia sunt nitrata, aquea, acidula, & subamaricantia. Melancholiam, quæ acidum fixum absorbent, in falsum mutant, obtundunt, diluuntque, qualia sunt terrea, urinosa, martialia, antiscorbutica, aquea, humoresque adustos diluentia. Pituitam, quæ ejus visciditatem corrigunt incidendo, attenuando, eamque fluxilem reddendo, qualia sunt aperientia, falsa, acida, amara, acria, aromatica. Serum, quæ falsum & acre ejus corrigunt, illudque nimis tenue incrassant, qualia sunt glutinosa, mucilaginosa, oleosa, dulcia, terrea, & papaveracea.

#### III.

Pro legitima præparantium administratione, Medici officium erit, observare 1. Ea potius convenire in morbis chronicis quàm acutis. 2. Ex præparantibus seligenda, vel saltem admiscenda esse specifica, & appropriata, quæ vel huic aut illi visceri specifica, ut v. g. in suppressione mensium, hysterica, in inappetentiâ, stomachica, in affectibus capitis, cephalica &c. 3. Vel texturam fomitis morbifici specificam, contrariâ specificâ texturâ destruant, ejusque saporem p. n. emendant, ut v. g. sic acidum non in genere, sed austerum, acerbum &c. corrigatur. 4. Sensim ac sensim à debilioribus ad fortiora progrediendum esse.

#### IV.

Præterea, 5. Notabit Medicus, præparantia non nimis diu continuanda esse, & subinde interpolanda purgantia, ut, quod separatim ac digestum, capitis mortui instar abstergetur & evacuetur, unde in Germaniâ, ubi longiores curæ haud tolerantur, præparantia & purgantia simul miscentur, ut contingit in nodulis laxativis, ut unâ fideiâ duo dealbentur parietes. 6. Dulcia, ut syrupos, qui in Italiâ præsertim præparantium vices obeunt, in brodiô carnis vel aquis destillatis dissolutos, plus nocere quàm prodesse, cum saccharata sint fermentativa, erodentia, stomacho hostilia, ac quosvis etiam succos corporis viscidiores, & minus activos reddant, hinc utiliora sunt digestiva in forma pulv. decoct. succ. essent. &c. 7. In ægris calidioribus, siccioribus vel atrophiciâ laborantibus, temperatiora, humidiora & liquidiora eligenda, ut brodia alterantia, serum lact. decocta &c.

### ARTICULUS II.

De Officiò Medici, in præscribendis Præparantibus, seu digestivis.

#### I.

Pulvis digestivus in affectu Hypochondriacô. ℞. Crem. tart. dr. i. cryst. tart. dr. β. sal. absinth. scolopend. frax. an. scr. i. ol. mac. scr. β. M. f. Pulv. S. Digestiv-Pulver darvon ein grosser Messer-Spitz voll ein Stund vor dem Mittag-und Nacht-Essen aus einer Petersilgen Suppen zu nehmen.

Alius ℞. Cryst. tart. vel pulv. epat. rub. scr. iv. sal. absinth. cich. an. scr. i. pulv. mac. scr. β. M. f. Pulv. divid. in 4. p. æq. S. Digestiv-Pülverlein auf 4. mahl.

Alius in Febribus intermittentibus. ℞. Crem. tart. dr. i. β. sal. absinth. cent. min. tamarisc. an. scr. i. β. frax. scr. ii. flor. armon. cum Marte sublimat. scr. i. M. f. Pulv. divid. in ix. p. æq. S. Fieber-Digestiv-Pülverlein. Detur unus ex brodiô, decoct. rad. petrosel. cichor. foenic. &c.

Alius in Cachexiâ. R. Crem. tart. dr. i. tart. vitriolat. sal. absinth. an. dr. β. ocul. canc. præp. scr. i. M. f. Pulv. divid. in 4. p. æq.

Alius in Scorbuto. R. Tart. vitriolat. sal. genist. absinth.



*finib. an. scr. i. β. ocul. can. scr. i. eleofacch. cit. anis. an. gutt. ii. cinam. gutt. i. M. f. Pulv. divid. in 4. p. æq. detur una dos. ex seq. Brodiō. R. Herb. rec. cochlear. nasturt. aquat. acetos. Hispan. an. p. j. contusis affund. Brod. carn. non salit. & fervid. unc. iv. Coletur.*

Pulvis absorbens Wedelii. *℞. Vitriol. mart. gr. vj. conch. præp. ocul. can. corall. rub. præp. antim. diaph. cinab. antim. an. scr. β. laud. op. gr. j. ol. dest. caryoph. gutt. j. M. f. Pulv. divid. in 6. p. æq. S. Abscis-Pulverlein auf 6. mahl. Utiles sunt in cardialgiâ, affectû hystericô, hypochondriacô &c.*

Julepus digestivus in affectibus Capitis frigidis. *℞. Aq. fœnic. hyssop. an. unc. iv. beton. salv. an. unc. ij. syr. de hyssop. unc. ij. de stechad. de beton. an. unc. j. oxymel. squillit. unc. j. β. essent. rorism. dr. ij. M. S. Digestiv-Tränckl, davon Morgens und Abends ein halbes Fraggel zu nehmen.*

Alius in affectibus Mulierum frigidis. *℞. Aq. hyssop. fœnic. arthemis. meliss. puleg. an. unc. iv. cinam. unc. ij. syr. aperit. Minderer. unc. iij. de arthemis. compos. unc. ij. spirit. sal. gutt. xxx. M. S. Digestiv - Julep auf 6. oder 7. mahl einzunehmen.*

Alius anti - Scorbuticus. *℞. Syrup. scelotyrb. Forest. unc. iij. syr. de cort. cit. de pom. f. an. unc. ij. aq. scorz. q. f. clarif. & aromatiz. cum aq. cinam.*

Apozema digestivum in affectibus Pectoris frigidis. *℞. Rad. fœnic. enul. glycyrr. an. unc. β. Ir. flor. dr. ij. herb. marrub. capill. ven. hyssop. agrim. beton. an. m. β. sem. fœnic. dr. ii. artic. dr. i. ficus. N. v. passul. min. dr. vi. incis. coq. in f. q. aq. font. in col. lib. i. β. dissol. syr. de prass. de hyssop. de liquir. an. unc. i. oxymel. f. unc. j. β. squillit. unc. β. aq. asthm. unc. j. β. cinam. dr. vi. M. S. Digestiv-Tränck auf 6. oder 8. mahl.*

Aliud in Affectibus Melancholicis. *℞. Rad. cichor. bugloss. an. dr. vi. polyp. q. unc. β. liquir. dr. ii. herb. terrag. bugl. an. mij. capill. ven. meliss. ceter. an. m. β. fol. fenn. dr. x. sem. cit. fœnic. anis. coriand. præp. an. scr. j. fl. Borrag. anth. an. p. ii. passul. unc. i. β. coq. in f. q. aq. font. ad unc. xv. in Col. dissol. syr. de fumar. de lupul. de cort. cit. an. dr. vi. M. f. apoz. pro 3. dos.*

Succi digestivi cum brodiis alteratis, in affectû hypochondriacô. *℞. Succ. depurat. & per setac. trajeet. cichor. borrag. endiv. vel agrimon. an. unc. i. Juris pulli vel gallin. in quo coct. sint malv. endiv. meliss. lupul. unc. iv. M. pro una dosi & sic pro ceteris interjectis subinde lenitivis.*

Mixtura & Essentia in obstructionibus. *℞. Spirit. sal. spirit. tart. an. scr. ii. Elix. vit. Matth. propriet. Par. an. scr. i. M. ad vit. S. Digestiv-oder eröffnende Mixtur oder Essenz, davon Morgens und Abends bey 15. oder 20. Tropfen auf einer Petersilgen-Brühe zu nehmen. Vel R. Elix. prop. Par. scr. ii. spirit. tart. aperit. Penot. sal. armon. an. scr. i. M. S. ut suprâ.*

Alia. *℞. Mixt. simpl. unc. β. Essent. cent. min. cochl. an. dr. iii. scolopend. dr. ii. tinct. mart. dr. i. β. M. S. ut suprâ.*

Atque hæ formulæ sufficiant, ut pro varietate Affectuum, mutatis paulisper mutandis, Neopracticus has imitari possit.

### ARTICULUS III.

#### De Officiō Medici, in evacuatione corporis Lenitivâ.

##### I.

Cum catharsis, seu evacuatio per alvum, alia dicatur *selectiva*, quæ è secundâ vel tertiâ regione humores vi selectivâ evacuat: alia *lenitiva*, quæ leniter, & sine vi primæ regionis quoscunque humores educit, de hac præsentî locô mentio faciendâ. Intelligitur autem per primam regionem ventriculus, intestina, mesenterium, pancreas, lien, & pars concava epatis, sicuti per secundam, epatis pars convexa, vena cava, arteria aorta, & quidquid

inter alas, & inguina situm est: per tertiam verò musculi, ossa, omnisque corporis moles ad extimam usque superficiem.

##### II.

Indicantur medicamenta *lenitiva*, in quâvis cacochoymiâ, vel potius cacochyliâ primæ regionis, succis vitiosis jam à sanguinis commixtione separatis, præsertim ubi alvus non est aperta, & quando vel ob virium debilitatem, vel ob acidi excessivi copiam, aliorumque humorum fermentescibilem qualitatem, & effrænam spirituum excandescentiam, ipsa purgantia vera exulare jubentur, ut v. g. in colicâ hypochondriacâ, affectû hystericô, scorbuticô, pathematibus convulsivis, spasmodicis, morbis acutis, febribus inflammatoriis, morbis acutis puerperarum, gravidarum, hæmorrhagiis, tabe, hæcticâ, phthili &c.

##### III.

Medicamenta *lenitiva*, (dicta etiam laxativa, minorativa, eccoprotica, benedicta) virtutem suam in corpore exerunt, vel emolliendo & lubricando, qualia sunt *aquea, mucilaginosâ, oleosa, unctuosâ, & pinguis*; vel sordes detergendo, qualia sunt *salina, acidula, terrea ut tartarea, nitrosa, salsa*, vel leniter irritando & stimulando, qualia sunt *purgantia tum leniora tum alia minori dosi exhibita.*

##### IV.

Pro debitô usû remediorum *lenitivorum* observet Medicus, 1. Ea semper exhiberi posse, ubi alvum apertam esse bonum est, sine etiam præcedente coctione. 2. Ea vel per os assumi vel per clysteres infundi. 3. Lenitiva lubricantia magis convenire, in siccitate intestinorum: stimulantia & detergentia, in eorum repletionem. 4. Lenientia à multis commodissimè exhiberi horâ unâ ante prandium, v. g. *pruna cocta*, superbibendo parùm vini lymphati: ab aliis horâ unâ ante cœnam, ut v. g. *pilula Francofurt.* 5. Pilulas lenientes aloëticas obesis magis convenire, quàm gracilibus, & hypochondriacis, in quibus pro nunc quidem juvant, alvum aperiendo: in futurum autem nocent, nimium exsiccando & calefaciendo, hinc major postmodum alvi stipticitas.

##### V.

Præterea 6. notabit, cavendum esse, ne natura frequentioribus clysteribus assuescat. 7. Remedia passulata in alvi siccitate cum viscerum fervore & calore ceteris omnibus præferenda esse. 8. Pruna subinde ob acidum occultum, præsertim in colicis affectibus minùs profuisse. 9. Purgantia seu lenitiva plantis pedum, vel umbilico illita, incerta & infida esse, tormina sæpius excitantia. 10. Huc quoque spectare suppositoria, vel mellea, *die Hönig-Stul-Zäpflein*, vel globuli, *die Wind-Kugeln, Bisam-Kugeln*, irritando alvum moventia.

### ARTICULUS IV.

#### De Officiō Medici, in præscribendis formulis Remediorum Lenientium.

**P**runa laxativa facilè parabilia. *℞. Fol. fenn. sc. ii. z. z. incis. scr. i. sacch. unc. β. ligata in linteolo coq. cum prun. dulc. N. xiii. in f. q. aq. addendo in fine mann. dr. vi. M. S. Laxier-Zwetschen 1. Stund vor dem Essen zu nehmen.*

Alia. *℞. Fol. fenn. unc. ii. z. z. cinam. an. scr. ii. aq. endiv. vin. alb. an. unc. vii. infund. per hor. 10. bull. ad consupt. 3. part. in express. prun. Hungaric. enucleat. ad lib. β. coq. ad syrup. consist. cum sacch. unc. ii. add. syr. ros. sol. unc. i. β. aq. cinam. dr. ii. M. S. Laxier-Pflaumen.*

Alia. *℞. Prun. damascen. enucleat. lib. β. coq. ex f. q. aq. simpl. de Colat. ferventiss. ℞. lib. i. β. fol. fenn. sol. unc. i. crem.*



crem. tart. dr. ii. β. cinam. acut. dr. ii. stent in infus. per hor. 4. in locò calidò, hinc ebull. semel atque iterum, ex-prim. & col. Colatura affundatur prunis. S. ut suprà.

Passulæ laxativæ paratû faciles. ℥. Passul. Corinth. vin. alb. lot. unc. vi. fol. fenn. in linteolò ligat. unc. i. vel i. β. affund. aq. q. s. ut tegantur passul. leniter ebulliant, stent vase probe testò in locò calidò 5. vel 6. horis, hinc abjectò sacculò, utere passulis, pro ætate & viribus patientis S. Laxier-Weinbeerlein.

Aliæ. ℥. Fol. fenn. f. unc. ii. coq. in aq. lib. i. ad consumpt. 3. part. in colat. infund. passul. min. exacinat. lib. β. coq. ad mollit. add. syr. ros. fol. dr. vi. M. S. Laxier-Weinbeerlein, darvon 2. Löffel voll 1. Stund vor dem Nacht-Essen zu nehmen.

Aliæ. ℥. Fol. fenn. f. unc. ii. 2. 2. dr. ii. cinam. mac. galang. an. sc. ii. coq. in aq. font. lib. ii. ad consumpt. med. stent in locò calidò per noct. manè col. cum express. dissolv. sacch. alb. unc. vi. coq. ad consist. Julep. cui injiciantur passul. vin. alb. lot. unc. vi. repone in vase stili. S. Laxier-Weinbeerlein, darvon 2. grosse Löffel voll gleich vor dem Mittag-Essen zu nehmen.

Aliæ fortiores. ℥. Passul. min. mund. lib. β. vin. alb. opt. lib. i. stent in infus. per noct. m. adde sacch. albiss. unc. iv. coq. ad consumpt. vin. hinc insperge resin. gial. subtiliss. pulv. scr. iii. M. exactissimè.

Vinum passulatum Timai. ℥. Passul. maj. min. an. unc. iii. fol. fenn. f. unc. i. cinam. acut. dr. iii. contund. in mortar. ad past. affund. vid. Rhen. opt. lib. iv. stent in infus. per diem & noct. Colat. exprim. & col. per chart. emporct. S. Weinbeerlein Laxier-Wein, darvon ein Stund vor dem Essen ein gutes Tisch-Glas voll zu trincken.

Aqua passulata ejusdem. ℥. Passul. min. mund. unc. ii. ceras. nig. exsicc. una cum nucleis unc. i. contund. in mort. marmor. ut fiat quasi pasta, affundendo aq. fluv. lib. iv. β. coq. ad remanent. lib. iii. in colat. ferventiss. infund. fol. fenn. f. dr. vi. fl. viol. p. i. cinam. acut. dr. ii. stent in loco calido per hor. iv. Col. & filtretur per chart. emporct. S. ut suprà.

Alia vulgaris, & facile parabilis. ℥. Fol. fenn. f. unc. i. passul. min. unc. iv. cinam. dr. iii. fl. viol. m. i. crem. tart. dr. ii. his superaffunde aq. fervent. lib. iii. stent per noctem, hinc colentur.

Decoct. Prunor. cum fol. fenn. crem. tart. sem. anis. cinam. &c. idem præstant.

Brodium Mannatum. ℥. Mann. el. ab unc. i. ad 2. succ. cit. rec. express. dr. i. β. vel ii. vel crem. tart. dr. i. M. dissol. in f. q. Brod. carn. vel gallin. Col.

Aqua laxativ. Viennensis. ℥. Aq. laxat. Vienn. unc. iii. vel iv. succ. cit. rec. express. dr. ii. vel crem. tart. dr. β. aq. cinam. bugl. vel fl. nymph. dr. ii. M. S. Wienerisches Laxier-Wasser auf einmahl einzunehmen.

Alia vulgaris. ℥. Aq. laxat. commun. lib. β. nit. præp. gr. xii. M. vel ℥. Aq. laxat. vulg. unc. iv. muchar. vel syr. ros. fol. unc. i. β. crem. tart. scr. i. nit. præp. Scr. β. M. S. Gemeines oder vermischtes ordinari Laxier-Wasser auf einmahl einzunehmen.

Julepus laxativus. ℥. Fol. fenn. f. scr. iv. liquir. ras. scr. i. cinam. scr. ii. contus. affund. aq. fervent. lib. i. stent per horam dimidiam, Colat. sine express. add. syr. viol. unc. β. M. bibantur unc. iii. vel iv. subfrigide.

Pilul. laxat. ℥. Mass. pilul. F. F. vel Emanuel. dr. ii. formentur ex scr. i. N. viii. vii. vel ix. S. suo nomine. Darvon 7. 8. oder 9. ein Stund vor dem Nacht-Essen zu nehmen. Ad idem valent, pilul. Clariss. D. Greimbii, vel Aqua pendent.

Pulvis laxativ. ℥. Crem. tart. dr. ii. divid. ad 2. p. æq. S. Präparirter Weinstein, darvon ein Pulverlein auf einmahl ein Stund vor dem Essen aus einer Brühe zu nehmen.

Alius. ℥. Crem. tart. dr. ii. diagryd. scr. i. M. f. Pulv. S. Geschäpffter oder vermischter Weinstein, darvon ein oder anderer grosser Messer-Spitz voll, aus einer Fleisch-Brühe zu nehmen.

Alius. ℥. 2. 2. tart. alb. an. dr. i. sacch. albiss. fol. fenn. f. an. dr. ii. M. f. Pulv. in jusc. carnis vel haustii vini exhibendus.

Alius Rhabarbarinus. ℥. Crem. tart. dr. iii. rhab. el. dr. ii. cort. flav. aurant. dr. i. M. f. Pulv. cujus Dosis dr. i.

Bolus. ℥. Cass. rec. extr. unc. β. vel dr. vi. Deur semel vel bis in septimanâ.

Electuar. lenitiv. Burrhi. ℥. Mann. el. unc. iii. syr. de alth. Fernel. rosar. sol. violar. solut. pom. redol. cass. extract. pulp. tamarind. fol. fenn. fel. pulv. an. unc. i. Manne confuse immisce syrup. & his adde reliqua. S. Laxier-Lavvergen, darvon 2. oder 3. Quinl, oder einen halben Löffel voll zu nehmen.

Aliud. ℥. Cass. rec. extr. pulp. tamarind. an. dr. vi. mann. el. cum aq. viol. dissol. unc. i. β. pulv. fol. fenn. dr. ii. β. cum f. q. syr. viol. M. f. Elect. moll. vel R. Pulp. passul. min. mund. tamarind. fl. cass. an. unc. β. condit. cort. aurant. dr. iii. pulv. rad. gial. dr. i. β. cum syr. de cich. cum rhab. f. q. M. f. Elect. S. ut suprà.

Clyster Domesticus simplicissimus. R. Brod. carn. lib. i. mell. crud. cochl. v. ol. oliv. cochl. vi. sal. comm. dr. i. M.

Alius. ℥. Brod. carn. non salit. lib. i. sacch. rub. unc. ii. ol. oliv. vel lin. unc. ii. vel iii. cum vitell. ov. & paucâ sale M. f. Clyster.

Alius magis compositus. ℥. Herb. malv. mij. fl. chamom. mj. sem. carv. dr. ii. coq. in f. q. aq. font. in Col. lib. i. dissolv. sacch. vel mell. crud. vel mell. ros. aut mercurial. unc. ii. ol. oliv. vel sem. lin. violar. chamom. lib. alb. unc. ii. vel iii. vel locò horum butyr. rec. sal. scr. j. M.

Alius lacteus. ℥. Lact. vaccin. rec. mult. lib. i. vel iβ. sem. carv. dr. ii. subinde & fl. cham. m. i. coq. ad lib. i. add. sacch. rub. unc. ii. ol. sem. lin. unc. ii. butyr. rec. unc. i. vitell. ov. N. 1. M. f. Clyst.

Alius. ℥. Decoct. emoll. lib. i. dissolv. cass. extr. pro clyst. dr. vi. sacch. rub. unc. i. β. ol. amygd. lib. alb. chamom. an. unc. i. vitell. ov. dr. i. sal. scr. i. M. f. Clyst.

Suppositorium. ℥. Suppositor. ex melle parat. N. 2. S. Hünig-Stuhl-Zäpflein, eines nach dem andern zu gebrauchen.

Aliud fortius. ℥. Vitell. ov. ad durit. coct. N. i. fell. bov. liquid. q. s. M. f. Supposit. quod Viennæ das Kayser-Zäpfel appellant, vel paretur ex sapone, alumine, &c.

Plura vide infra de Purgantibus.

## ARTICULUS V.

### De Evacuatione per Alvum selectivâ.

#### I.

**P**urgatio per alvum propriè sic dicta, ex secundâ & tertiâ regione evacuans, indicatur à cacochymia, quæ est redundantia humorum vitioforum, à sanguinis confortiò separatorum, vel eidem supernatantium, ut adeò pateat, Purgantia in omnibus morbis convenire, qui dependent à saburrâ vitioforum humorum sanguini haud intimè commixtorum. Sicuti autem non tantum indicantium, sed etiam coindicantium, vel contraindicantium habenda ratio; ita etiam in Purgatione hæc consideranda: vires nempe, temperamentum, habitus corporis, ætas, sexus, consuetudo, clima, &c.

#### II.

Quoad Vires, sint hæc ad purgandum semper validæ, vel saltem mediocres; præsertim autem à vehementibus purgantibus cautè abstinendum, nam ex Hippoc. i. aph. 3. Evacuaciones, quæ ad extremum ducunt periculosæ; & 2. aph. 51. plurimum & repente evacuare periculosum. Habent enim fortiora purgantia virulentiam quandam nocivam, ac malignitatem absconditam, quâ indiscriminatim, tam recrementosi, quàm alimentitii corporis succi resolvuntur, colliquantur, ac in sordes convertuntur; hinc vires maximè debilitant, tormina spasmodica, subinde in manifestas convulsiones terminantia excitant, hypercathartes tetras & perniciosas creant, ac mortem sæpè inferunt.

#### III.



## III.

Quoad *Temperamentum*, facilius purgationem ferunt, qui sunt temperamenti calidi & humidi, habitusque eufarchi & carnosi, quam corpora calidiora, sicciora, graciliora, vel nimis pingua. Quoad *Ætatem*, facillime fert purgationem ætas media, difficillime infantia & senectus, & non nisi benigniorem. Tempore *Menstruationis*, mulieres minime purgandæ, neque etiam, si mox instet. *Gravidæ*, ex *Hippoc. 4. aph. 1.* tutius à mense 4. ad 7. evacuantur, dum ait: *Pregnantes purgabis, si materia turgeat, quadrimestres, & usque ad septimum mensem, sed has parcius.* Quia tunc temporis fœtus utero fortius adhæret, sumptâ similitudine à fructibus arborum, primò & ultimò tempore facilius decidentibus. Hòc seculò Purgationes lenitivæ, & blandiores, quolibet ferè graviditatis mense exhiberi solent, in morbis à cacochymia oriundis, seu turgente, seu concoctâ materiâ, ubi majus impendet periculum ex parte cacochymicæ morbum producentis, quam ex commotione à purgante excitatâ, licet tutius mediis, cautiùs verò primis & ultimis mensibus procedendum sit: immò, nisi cacochymicæ quædam gravidæ evacuentur, sæpiùs statim à puerperio in morbos graviores incidunt. *Puerperæ*, lochiis naturaliter fluentibus nunquam purgandæ, benè tamen, si quantitate diminutâ, vel qualitate viciosa peccaverint, non tamen in principiò, sed materiâ coctâ, transactis 8. 10. vel 12. diebus à partu, & quidem eò tutius, quò longiùs puerpera distat à partu. Telle enim experienciâ, mulieres laborantes suppressione lochiorum, si post septimum, vel nonum fluxu alvi corripiantur, ut plurimum liberari: si verò primis diebus, puta 2. 3. vel 4. ut plurimum interire solent.

## IV.

Quoad *Aëris statum*, Purgationi maximè conveniens est *temperatus vernalis*, hinc *autumnalis*. De priore *Hippoc. 6. aph. 47.* ait: *quibus venæsectio, aut medicamentum purgans confert, iis verno tempore sanguinem detrabere, aut medicamenta purgantia exhibere oportet.* Minus frigidior & æstivus, ex *Hipp. 4. aph. 5.* ubi ait: *sub caniculâ & ante caniculam, difficiles ac molestæ sunt purgationes.* Feliciori successu etiam exhibentur lunâ decrescente quàm crescente, in quâ humores & tumores augentur; interim hæc coindicatio aut contraindicatio desumpta ab astris, vel anni temporibus, attendenda tantum absente urgentiâ, in purgatione præservativâ. Quoad reliqua, *assueti* facilius purgantur, quàm *inassueti*: morbi *calidi* etiam minus tutè admittunt purgantia validiora. Qui pravò etiam utuntur alimentò, in purgationibus faciliè in animi deliquium incidunt, ex *Hippoc. 2. aph. 36.* Tandem quibus *alvus* nimis *suppressa*, catharticum exhibere minus tutum est, nisi præmissò enemate.

## V.

Quoad *Tempus* morbi purgationi aptissimum, illud est ejus principium vel declinatio. Nam ex *Hippoc. 2. aph. 29.* in principiò morborum, si quid morendum videtur, move, eum verò consistunt, ac vigent, quiescere melius est. Item 2. aph. 30. circa initia & fines morborum, remissiora sunt omnia, in vigore vehementiora.

Ut autem Medicus hòc in passu ritè suò fungatur officio, observabit 1. Purgationem lenitivam, utpote evacuantem succos primæ regionis, à sanguinis commixtione jam f paratos, semper fieri posse etiam sine præcedente coctione. 2. Purgationem selectivam etiam fieri posse, non expectatâ coctione, in principiò omnium morborum descendendum, ex verâ cacochymia, humoribus pravis à sanguine, vel jam omnino separatis, vel eidem saltem supernatantibus, dummodò absit febris continua. 3. In morbis acutis cum febre, ut v. g. febribus continuis, malignis, viscerum inflammationibus, purgationem non convenire, nisi existente materiâ coctâ, vel turgente, &

de his præcipuè intelligendus est *aphorif. Hippoc. 1. aph. 22.* quæ cocta, maturaque sunt, medicamentò purgante educere convenit, non cruda, nec per initia morborum, nisi humores turgeant; plurimi verò non turgent.

## VI.

Ut autem allegatus *aphorismus* ritè intelligatur, sciendum, materiæ *cruditatem* in aliò non consistere, quàm in tali humorum statu, quò sanguini uniti, & intimè permixti, naturalem ejus fermentationem turbant, & eam in effervescentiam febrilem concitant: *coctionem* seu *pepasmum* è contra, in debitâ separatione, & quasi præcipitatione, per motum fermentativum, quò recrementa, & heterogenea salia ceu fœta, instar capitis mortui à serò imbibita, per viscerum cribra, & quasi filtra secerni, & per consuetas vias evacuari solent. Sicuti enim cerevisia novella, seu mustum turbidum, per quæcunque instrumenta colatum, non reddetur clarum, benè tamen quod fermentando depuratum fuit; ita quamdiu fæces recrementosæ, per fermentationis motum separatæ, aut præcipitatæ non sunt, tam diu inutilis, immò perniciofa erit purgatio, nihil aut parùm educens, vel humores simul utiles evacuans, corpus liquefaciens, humores magis turbans; hinc tormina, animi deliquia, vertigines, convulsiones ac sudores syncopicos excitant. *Turgescentia* tandem, seu *orgasum* materiæ, consistit in humoribus impetuosè in corpore discurrentibus, partésque laceffentibus, & in vias evacuationis vergentibus, seu in impetuosâ effervescentiâ, dum materia morbifica abundans, immoderatè nimis effervescit, & rapidè per vasa movetur, instar musti ex vinò generosò impetuosè nimis ebullientis, & vasa nimis arctè conclusa rumpentis; hinc observamus in tali casu, in principiis, vel augmentis morborum, quandoque excitare vomitus, diarrhœas, aut hæmorrhagias symptomatिकास. In tali turgescentiâ *Hippocrat.* purgationem admittit statim instituendam, dum 4. aph. 10. ait: *purgandum in valde acutis, si ad sui excretionem invitet materia, eodem ipso die, differre enim in talibus, malum est.* Cum periculum sit, ne humores mobiles, impetû illò concitati, in partem aliquam principem ruant; interim & hîc magnâ cautelâ, & circumspectione opus est, ne intempestivè irritentur crabrones, hinc multi in hoc casu præferunt purgationi, venæ sectionem.

## VII.

Sicuti verò materia morbifica febrilis cruda, de curâ regulari evacuari non debet; ita de curâ coactâ eam subinde tollere oportet, per purgationem *minorativam*, dum nempe humores pravi ita copiâ luxuriant, ut venæsectione tolli nequeant omnes, & à naturâ sint veluti incoctiles vel insuperabiles, immineatque magnum vitæ periculum, nisi per minorativum aliqua portio prius tollatur, & natura allevietur. Vomitoria hòc in passu optima sunt, sequente dein leni absterisivò cathartico, de quibus infra. Præterea quoad tempus purgationis, in morbis exacerbationes vel paroxysmos habentibus, convenit purgatio die remissionis, vel intermissionis, vel ipsò die paroxysmi; ita tamen, ut effectum suum ante paroxysmi invasionem compleat, quâ ratione *Pet. Monav. apud Craton. l. 2. consil. fol. 417.* apparente aliquâ coctione, plurimas febres intermittentes sustulit.

## VIII.

*Locus*, per quem instituenda Purgatio, demonstratur tum à naturâ humorum, tum ab eorum subsistentiâ seu vergentia. Nam ex *Hippoc. 1. aph. 21.* quæ educere oportet, quò maximè vergunt, eò ducto per loca conferentia. *Quantitas* purgationis, ostenditur à quantitate humoris peccantis, cum omnis sit evacuandus: nec si minus, camarina tantum commoveatur, vel si plùs, hypercatharsis excitetur. Evacuandus simul & semel totus humor, si materia pauca & vires robustæ, vel levioribus æger non



non moveatur, vel assuetus sit purgantibus, aut corpus habeat durius, & laboribus exercitatum: è contra partitis vicibus, & per epicrasin, si materia multa, & si vires robustæ, vel si vires debiles, aut æger à quovis assumptò facillè purgetur, vel sit inassuetus, aut habitû corporis molli præditus. In dubiò, præstat naturam, haud satis perspectam & cognitam, mitioribus explorare, quàm valentioribus temerè aggredi.

## IX.

Signa perfectæ purgationis sunt, appetitus rediens, urina denudò naturalis reddita, corpusque insigniter alleviatum. Sic Hippoc. quoque duo proponit signa, & quidem primum, 1. *aph.* 23. si talia evacuentur, qualia oportet, & si plurima sint, & æger benè ferat, (id est, utilitatem ex purgatione recipiat.) Alterum, 4. *aph.* 19. ubi ait: qui potione medica, dum purgantur, non sitiunt, ipsorum purgandi finis non fit, donec sitiverint. Oritur autem sitis non ob calorem, sed ex aliquali humiditate ventriculi, partiumque vicinarum absorptione.

## X.

Medicamenta Purgantia, licèt ab humoribus, quos evacuare credebantur, Veteribus alia dicantur Phlegmagoga, quæ pituitam, alia Cholagoga, quæ bilem, alia Melanagoga, quæ melancholiam, alia Hydragoga, quæ humores serosos, alia Mischlagoga, quæ mixtos, alia Panchymagoga seu catholica, quæ omnes humores evacuant; probabilius tamen est juxta RR. nullum catharticum selectivè purgare, id est, specialem aliquem humorem educere; sed ab omnibus, primò per irritationem fæces alvi ordinarias, seu scybala crassiora, hinc aquosa vel saltem liquida, bilem nempe, ac succum pancreaticum, tandem mucosa, variæque heterogenea, quæcunque in sanguine contenta eliminari, ita tamen, ut fæces seu sordes tam variæ, & subinde tam horridæ & foetentes, non semper formaliter in corpore ita existant, sed tales evadant, nunc ex actione medicamenti colliquativâ, & quasi putrefactivâ, nunc ex ipsis remediis tingentibus, & nauseosum aspectum excrementis conciliantibus, nunc etiam ex mutuâ sordium miscelâ, tum inter se, tum etiam cum bile & succo pancreatico.

## XI.

Licèt autem purgantia nullum selectivè humorem purgent, nihilominus tamen non promiscuè usurpanda, sed distinctio inter eadem facienda, tum quia purgantia nonnulla præter vim laxativam, alias proprietates certas conjunctas habent, tum quia subiectum purgandum, nunc facilius, nunc difficilius est laxationis, nunc certis affectibus obnoxium, qui per purgantia vel irritantur, vel exasperantur, tum quia materia evacuanda nunc plùs, nunc minùs obsequens, variùmque situm, & substantiam habet.

## XII.

Vim suam cathartica exerceant purgantia, tum suâ acrimoniâ salino-sulphureâ, irritando tunicam membranaceo-glandulosam ventriculi & intestinorum, ac orificia ductûs pancreatici, & choledochi, ac vermiculationes crebriores, & repetitas spasmodicas contractiones, atque contentorum excretiones concitando, tum vi fermentativa humores, seu massam sanguineam resolvendo, ejusque contenta nunc excrementitia, nunc etiam quandoque alimentitia alterando, eorumque texturam dissolvendo, fundendo, ac in liquaminis serosi consistentiam colliquefaciendo, ut adeò actus purgationis, sit instar actus cujusdam febrilis, cum sanguis in suâ mixtione turbetur, nova & insolita inducatur fermentatio, contextus glandulosi & fibrillæ intestinales irritentur, humores quasi à febre colliquativâ, colliquentur, symptomata febrilia, ut sitis, nausea, inappetentia,

lassitudo; dolor capitis &c. excitentur: immò per abusum etiam horrendæ convulsiones, ac ipsa quandoque mors.

## XIII.

Quoad usum & regimen purgationis, observet Medicus. 1. In liberâ & electivâ purgatione, eligendam diem temperatam, ac vitandas esse lunæ quadraturas. 2. Assumendum esse purgans manè jejune, nisi vel paroxysmus manè infestet, vel urgens impellat affectus, vel animus sit sumendi pilulas, quæ, si leviores, commodius horâ unâ ante cænam, si fortiores duabus post cænam assumuntur. 3. Purgantia potulenta calidè, vel potius tepidè propinata, citius operari: difficilius autem sumi & retineri, ob nauseam, pro quâ tollendâ, & Vomitu impediendò, nares obstruendæ, linteolum vel panis tostus acetò madidus, naribus adinvenendus, buccella cydoniati sumenda, vel cortex cit. aut amygdalæ, aut aliud saporem medicamenti obscurans masticandum, vel vinò ac spiritû ejus, os colluendum. 4. Aërem ac potum frigidum hoc tempore cane pejus & angue vitandum. 5. Si purgans nullam vel parciorem post 4. vel 5. horas operationem eliceret, eadem promovenda erit suppositoriis, clysteribus, exhibitâ desuper aquâ laxativâ, moderatâ deambulatione, & commotione; uti constat ex Hipp. 4. *aph.* 14. & 15. sicuti è contra, si modum excedat purgatio, eadem sistitur somnò, quiete, frictionibus, sudore, applicatis & exhibitis adstringentibus, theriacalibus atque opiatis.

## XIV.

Præterea considerabit Otto, sumptò benigniori & mitiori cathartico, non desuper dormiendum esse: benè tamen quandoque post fortiora, quæ difficulter in actum deducuntur, ac vim purgantem fixius & tenacius inhaerentem habent. 7. Duabus vel tribus horis post assumptum purgans, Brodium abstergens & abluens, additò, si libet, crem. tart. immò ad secundam vel tertiam operationem, cochlear unum vel alterum brodii assumendum esse. 8. Purgantia in formâ liquidâ, præsertim ex infusione paratâ, citius & cum minori molestiâ operari, ac inprimis convenire in temperamentis, naturis, & affectibus biliosis, ac melancholicis, uti etiam in tollendis obstructionibus. 9. Purgantia in formâ pulveris vel pilularum, minùs convenire in siccioribus, tabidis, heclicis, melancholicis, febre detentis &c. è contra felicius operari in obesis, succulentis, torosis & carnosis subiectis, utpote humidioribus. 10. Vinum generosum, purgantium vim cohibere, hinc etiam utile est, post purgationem circa noctem assumere parùm theriac. cum haustu vini generosi, ut omnia iterum in pacatum statum redeant.

## ARTICULUS VI.

### De Officiò Medici, in præscribendis variis Remediorum Purgantium formulis.

#### In formâ Potionis.

**M**Anna Julepata. ℞. Crem. tart. dr. ii. dissolv. in aq. tarax. vel viol. unc. vi. hinc lentò igne dissolv. Mann. el. unc. iii. col. per pann. lin. hinc clarif. cum alb. ov. addendo parùm aq. cinam. vel fl. naph. M. est Potiuncula visu & gustu suavis, Magnatibus familiaris. S. Klares Laxier-Manna-Wasser, auf einmahl einzunehmen.

Alia acuata & fortior. ℞. Crem. tart. dr. i. coq. in aq. font. unc. vi. in col. unc. iv. dissolv. Mann. el. unc. ij. vel ii. s. clarif. cum album. ov. & colat. add. pulv. syr. cum sem. melon. subact. gr. v. vi. succ. cit. aq. fl. naph. an. dr. i. s. M. S. Stärckers Manna-Laxier-Wasser, Morgends nüchtern einzunehmen, und in 2. Stund hernach ein Brühe zu nehmen.

E

Potion



Potio lenitiva ex Manna. ℞. Mann. el. dr. vi. vel unc. 7. dissolv. in aq. destill. vel laxat. f. q. add. syr. ros. sol. aur. de cich. cum rhab. duplic. ana unc. i. ℞. vel horum loco syr. diaser. de mann. laxat. Horst. aq. cinam. bugl. dr. i. ℞. M. f. Pot. irroranda vapore cort. cit. rec. S. ut suprâ.

Alia utilis in Febribus. ℞. Mann. calab. unc. i. syr. ros. sol. unc. ii. elect. lenit. Flor. dr. ii. crem. tart. scr. ii. cum f. q. aq. scorz. vel laxat. M. f. Potio, aromatizanda, cum succ. express. cort. cit.

Alia ubique ferè usualis. ℞. Fol. fenn. f. dr. ii. agar. vel mechoac. dr. i. ℞. (Rhabarb. etiam si placet dr. ℞. vel tamarind. unc. ℞. ) sem. anis. z. z. an. scr. i. rad. liq. dr. i. passul. unc. ℞. coq. in aq. f. q. ad unc. iii. m. in col. dissolv. mann. cl. unc. i. ℞. vel unc. ii. aq. cinam. parùm M.

Potio Mannata cum extractis. ℞. Mann. el. unc. i. ℞. extract. diacarth. scr. ii. vel dr. i. mag. gial. gr. iii. aq. laxat. unc. iii. cinam. dr. i. M. Utilis est in affectibus catarrhalibus. Vel ℞. Mann. el. unc. i. vel dr. x. extr. diacarth. scr. ii. de rhab. vel de citrô solut. scr. i. M. f. Potio brevis aspergenda ol. cort. cit. rec.

Aqua laxativa Viennensis acuata. ℞. Aq. laxat. Vienn. unc. iii. vel iv. crem. tart. dr. i. vel ℞. aut hujus loco succ. cit. rec. express. dr. iii. Pulv. syr. à gr. v. ad x. xii. aq. cinam. bugl. vel fl. naph. dr. ii. M. f. Pot. loco pulv. syr. etiam sumi possent mag. gial. vel spec. diagialap. Mins. ad dr. i. dr. ℞. vel scr. i. Est Potio suaviter, & energeticè purgans.

Alia vulgaris. ℞. Aq. laxat. vulg. unc. v. much. ros. unc. i. vel much. ros. syr. ros. sol. an. dr. vi. Pulv. syr. à gr. vi. ad x. nit. præp. gr. xii. M. f. a.

Potio ex infusò. ℞. Fol. fenn. sel. dr. ii. agar. vel mechoac. dr. i. ℞. rhab. dr. i. cinam. opt. scr. ii. mac. scr. ℞. F. infus. in f. q. aq. tot. cit. in Col. dissolv. syr. ros. sol. aur. mann. calab. an. dr. vi. vel unc. i. M. f. Potio.

Potio phlegmagoga. ℞. Crem. tart. dr. i. rad. mechoac. dr. ii. vel iii. sem. fenic. vel cit. ex. ort. dr. ℞. incis. bull. in f. q. aq. ad consumpt. 3. p. in colat. infund. fol. fenn. f. dr. iii. rhab. dr. i. schæn. scr. i. in Col. dissolv. mann. el. unc. i. extr. diacarth. scr. iv. vel dissolv. (si bilis magis evacuanda) elect. de tamar. de succ. ros. an. dr. ii. syr. ros. sol. unc. i. mann. el. unc. ℞. vel dissolv. mann. cl. syr. ros. sol. an. unc. i. scam. sulph. gr. iv. M.

Potio cholagoga. ℞. Tamarind. unc. ℞. fol. fenn. f. dr. ii. rhabarb. dr. ℞. vel dr. i. sem. anis. scr. i. Coq. in f. q. aq. font. ad unc. iii. in Col. dissolv. mann. cl. syr. ros. sol. an. unc. i. elect. de succ. ros. dr. ii. (si serum simul evacuandum) syr. de spin. cerv. unc. ℞. vel dr. vi. M.

Potio phlegma-hydragoga. ℞. Rhab. el. dr. i. agar. troch. dr. i. ℞. spic. z. z. calam. aromat. an. gr. vii. inf. per noct. in f. q. aq. font. vel destill. appropriata, manè facta levi ebullit. & express. dissolv. mann. el. unc. i. Pulv. mechoac. scr. ii. vel dissolv. mann. cl. & syr. de spin. cerv. an. dr. vi. vel unc. i. pulv. gial. cryst. tart. an. scr. i. aq. cinam. bugl. dr. ii. M.

Potio melanagoga. ℞. Fol. fenn. f. dr. ii. ℞. agar. opt. dr. i. fibr. elleb. nig. scr. ii. sem. anis. z. z. an. scr. i. mac. cinam. an. gr. vii. fl. cord. an. p. i. passul. unc. ℞. coq. in f. q. aq. borrag. ad consumpt. 3. p. stent per noct. in col. express. dissolv. mann. el. unc. i. ℞. vel ii. cryst. tart. scr. ii. M. vel mann. el. syr. ros. sol. an. unc. i. M.

Potio micstagoga, ex Electuariis & Extractis, procurâ vernali vel autumnali usitata. ℞. Elect. de succ. ros. dr. iii. diacarth. dr. ii. extr. rhab. scr. i. vel enicopharm. scr. ii. mann. el. unc. i. aq. lax. q. f. M. f. Pot. irror. vap. cort. cit. rec.

Alia. ℞. Elect. hier. cum agar. diacarth. an. dr. ii. vel elect. diacathol. aut lenit. Florenz. de succ. ros. an. dr. iii. mann. el. vel much. ros. aut. syr. ros. sol. vel de Cich. cum rhab. duplic. unc. i. extr. diacarth. & de cit. solut. Zwelf. an. scr. i. M.

Potio-purgans, in fluxibus alvi. ℞. Aq. lax. Vienn. unc. iii. rhabarb. leviter tost. & pulv. dr. ℞. syr. de cich. cum rhab. triplicat. vel de mirobal. cum rhab. unc. i. aq. cinam. bugl. dr. ii. M.

Alia. ℞. Rhab. cl. pulv. & vino albo irrorat. dr. i. ℞.

vel ii. inf. in f. q. aq. plantag. manè in col. cum express. dissolv. mann. el. unc. i. vel i. ℞. pulv. rhab. scr. i. vel dr. ℞. syr. de myrob. cum rhab. vel de cichor. cum rhab. 4. druplic. dr. vi. M.

Alia in Diarrhoea & Dysenteria utilis. ℞. Tamarind. dr. ii. fol. fenn. f. dr. iii. cort. aurant. dr. ℞. passul. min. p. ii. mac. scr. ℞. coq. in f. q. aq. ad 3. in colat. inf. per noct. rhab. opt. dr. i. ℞. spic. gr. iii. mane colat. dissolv. mann. cl. unc. i. syr. de myrob. cum rhab. dr. vi. aq. cinam. dr. i. M.

Potio in fluxibus sanguinis. ℞. Mann. el. unc. i. ℞. dissolv. in aq. plantag. unc. iii. add. rhab. pulv. dr. ℞. vel scr. ii. syr. de cich. cum rhab. vel de myrob. unc. i. M. hæc eadem usurpari potest in gravidis.

Potio cholagoga. ℞. Rhab. el. cort. myrob. cit. an. dr. i. ℞. pulp. tamarind. unc. ℞. fol. fenn. sel. dr. iii. inf. per noct. in f. q. aq. destill. cich. mane facta levi ebullit. in col. dissolv. mann. el. unc. ii. fl. nit. gr. vi. crem. tart. dr. ℞. M.

Alia. ℞. Mann. el. unc. i. ℞. elect. de succ. ros. dr. ii. iii. pulv. gial. cryst. tart. an. scr. i. aq. lax. q. f. M. f. Potio.

Potio micstagoga. ℞. Agar. rec. troch. mechoac. an. dr. ii. rhab. cl. dr. i. ℞. fol. fenn. f. dr. iii. z. z. scr. ii. mann. el. unc. i. ℞. bis superassund. aq. bull. unc. v. stent in infus. per noct. manè facta levi ebull. in colat. cum album. ov. clarif. dissolv. elect. de succ. ros. dr. ii. vel i. ℞. crem. tart. scr. i. spirit. mac. vel essent. cit. scr. ℞. M.

Alia. ℞. Tamarind. unc. ℞. fol. fenn. f. dr. iii. rhab. mechoac. an. dr. j. ℞. cort. aurant. dr. ℞. crem. tart. scr. iv. fl. cord. an. pi. sem. anis. dr. ℞. Coq. in f. q. aq. font. stent in infus. per noct. in col. express. dissolv. mann. el. dr. x. pulv. mechoac. scr. i. aq. cinam. cochl. ℞. M.

Atque hæc formulæ selectæ sufficiunt, ut mutatis pro varietate circumstantiarum mutandis, millenæ formulæ ex arte concinnari possint.

### In formâ Pulveris.

**P**ulvis Cornachinus cholagogus. ℞. Crem. tart. à scr. i. ad ii. scammon. sulph. à gr. viii. ad xii. xv. antim. diaph. gr. vi. viii. M. f. Pulvis. S. Gall-Purgier Pulver Morgens nüchtern in einer Brühe zu nehmen, und 2. Stund darauf zu fasten.

Est pulvis in omni cacoehymia summè utilis. Si simul vomitum conciliare animus, add. gr. i. vel i. ℞. tart. emet. Minsich.

Pulvis hydragogus. ℞. Rad. gial. rec. pulv. scr. i. ℞. vel scr. ii. scam. sulph. vel gumm. gutt. scr. ℞. vel magist. gumm. gutt. gr. v. vi. tart. viuriol. gr. vii. M. fiat Pulvis. S. ut suprâ.

Alius micstagogus. ℞. Rad. gial. rec. pulv. vel spec. de gialapp. Mins. scr. i. diagryd. sulph. gr. ix. crem. tart. scr. ℞. ol. destill. cinam. vel fenic. gutt. iii. M. f. Pulvis. S. ut suprâ.

Pulvis Arthriticus. ℞. Rad. kermodaet. turb. alb. gummos. gial. scam. sulph. an. scr. i. gumm. gutt. gr. xvi. sal. prunell. gr. xii. M. f. Pulv. divid. in 4. p. aq. S. Glieder-Purgier-Pulver auf 4. mahl.

Alius. ℞. Off. human. calcin. vel rasur. cran. hum. turb. hermodaet. gial. fenn. crem. tart. diagryd. caryoph. an. dr. i. M. f. Pulv. subtiliss. cujus dos. à dr. i. ad scr. iv.

Pulvis purgans Anthelminticus. ℞. Spec. diaturb. cum Rhab. scr. ii. scam. sulph. gr. ix. vel troch. alband. gr. vi. vii. crem. tart. gr. xii. ol. destill. cort. aurant. gut. iv. M. f. Pulvis. S. Purgier Wurm-Pulver in cinem Meth einzunehmen.

Alius. ℞. Rad. gial. rec. pulv. scr. i. vel dr. ℞. mercur. dulc. gr. xv. sal. absinth. gr. iv. sacch. fin. vel cand. scr. i. M. f. Pulv. S. ut suprâ.

Pulvis cholagogus. ℞. Sal. absinth. crem. tart. an. scr. i. diagryd. sulph. gr. xii. ol. destill. mac. gutt. ii. M. f. Pulvis.

Pulvis laxativus. ℞. Pulv. fenn. Montagn. scr. ii. spec. diaturb. cum rhab. scr. i. diagryd. gr. iii. magist. gumm. gutt. gr. i. ii. ol. cinam. anis. an. gut. i. M. f. Pulvis.

Pulvis



Pulvis antihydricus. ℞. Rhab. opt. scr. ii. pulv. exter. cort. gial. scr. i. gumm. gutt. gr. xiii. sp. vitriol. gutt. v. M. f. Pulv.

Alius. ℞. Rad. gial. pulv. dr. β. mercur. dulc. rite præp. gr. xvi. vel magist. gial. gr. xii. ol. dest. mac. gutt. ii. M.

Pulvis purgans, in fluxibus alvi. ℞. Rhab. leviter tost. à dr. β. ad dr. i. myrob. citr. scr. β. nuc. mosch. vel lign. aloës pulv. gr. viii. ol. dest. mac. gutt. i. M. f. Pulv.

Pulvis purgans carminativus. ℞. Pulv. cort. flav. aurant. rhab. cryst. tart. an. dr. ii. ol. mac. gutt. v. sacch. ros. tabul. ad pondus omnium. M. f. Pulvis. S. Laxier-Wind-Pulver darvon 2. oder 3. grosse Messer-Spitz voll, ein Stund vor dem Essen zu nehmen.

Pulvis solutivus usualis. ℞. Resin. gial dr. ii. sem. melon. excort. scr. iv. misceantur exactissime in mortario lapideo, add. crem. tart. unc. β. confect. alk. dr. i. M. f. Pulv. cujus dos. dr. β. ex brodio carnis.

## In formâ Pilularum.

**P**ilulæ Cephalicæ. ℞. Extr. coch. dr. i. troch. alband. gr. xii. pulv. syr. gr. vj. ol. destill. fœnic. gutt. iv. cum f. q. aq. beton. M. f. Pilul. No. xxxij. S. Haupt-Pillulen, darvon xj. auf einmahl 2. Stund nach dem Nacht-Essen in ein Löffel voll Wein, oder gebratenen Apffel, oder Panatell, oder in einem Safft, Saltzen, ausgeholten Zwetschen, oder nassen Oblat eingewickelter zu nehmen.

Aliæ usuales. ℞. Extract. pilul. coch. aur. panchym. Croll. an. scr. β. troch. alband. gr. v. cum. ol. succin. f. q. M. f. Pilul. No. xix. deaur. S. ut suprâ.

Pilulæ Catarrhales. ℞. Mass. pilul. de succin. Craton. dr. i. magist. gial. gr. xii. ol. destill. succin. gutt. iv. cum f. q. aq. beton. M. f. Pilul. No. xxxiii. deaur. S. ut suprâ. dos. N. xi.

Aliæ usuales. ℞. Mas. pilul. de succin. Crat. dr. i. β. marocost. Minderer. dr. β. troch. alband. scr. β. cum ol. succin. M. f. Pilul. No. c. xxx. deaur. dentur ad scatul. cum pulv. ros. rub. S. Catharr, oder Fluss-Pillulen, darvon die Woche ein oder zweymahl N. xi. auf einmahl einzunehmen.

Pilulæ Ophthalmicæ. ℞. Extract. coch. vel luc. major. scr. i. panchym. scr. β. troch. alband. vel magist. gial. gr. iv. v. sal. euphras. gr. iij. ol. destill. fœnic. gutt. ii. cum f. q. aq. beton. M. f. Pilul. No. ix. deaur. S. Augen-und Haupt-Pillulen auf einmahl.

Pilulæ Catholicæ. ℞. Extract. panchym. vel catbol. scr. i. troch. alband. pulv. syr. magist. gial. (vel unius ad duorum simul commixiorum) à gr. vi. ad viij. ol. destill. fœnic. vel lig. Rhod. gutt. ij. cum syr. ros. sol. f. q. M. f. Pilul. N. xi. deaur. S. Purgier-Pillulen.

Pilulæ simul Anthelminticæ. ℞. Mass. pilul. de nit. Trall. scr. i. β. extract. colocynth. gr. vi. vel mercur. dulc. scr. β. ol. destill. sabin. gutt. ij. cum f. q. aq. vel succ. absinth. M. f. Pilul. No. xi. deaur. S. ut suprâ.

Pilulæ anti-Hypochondriacæ. ℞. Mass. pilul. tartar. Querc. scr. i. de ammoniac. ejusdem scr. β. extr. elleb. nig. gr. vi. resin. gial. vel scam. sulph. gr. vi. cum f. q. aq. fumar. vel inct. tart. M. f. Pil. N. xiii. deaur. S. Miltz-Purgier-Pillulen auf einmahl einzunehmen.

Aliæ. ℞. Mass. pilul. tartar. Schröd. scr. i. extr. cent. min. croc. an. gr. iv. gumm. ammon. gr. viii. pulv. syr. gr. iv. v. cum f. q. syr. de fumar. vel de pom. M. f. Pil. No. xi. deaur. S. ut suprâ.

Aliæ usuales. ℞. Aloës succotrin. scr. i. β. gumm. ammon. croc. mart. aperit. an. scr. i. mag. gial. gr. xv. cum elix. prop. f. q. M. f. Mass. f. Pilulæ No. c. inaur. pro pluribus dosibus.

Pilulæ hydragogæ. ℞. Magist. gumm. gamand. resin. gial. à gr. vii. extr. enul. gr. vi. ol. dest. mac. gutt. ij. M. f. Pil. ix. deaur. ac sumantur ex aq. cinam.

Aliæ. ℞. Magist. gial. gr. x. elater. gr. v. ol. mac. gutt. ij. cum f. q. syr. de cinam. M. f. Pil. N. vij. deaur.

Pilulæ melanagogæ. ℞. Extract. panchym. vel mela-

nagog. Quercet. vel mass. pilul. tart. Quercet. aut Schröd. scr. i. extr. elleb. nig. scr. β. ol. dest. cit. gutt. ii. cum syr. de fum. f. q. M. f. Pilul. N. xi. deaur.

Pilulæ purgantes in lue Venereâ. ℞. Extr. panchym. Croll. elleb. nig. an. scr. β. resin. gial. gr. vij. vel mercur. dulc. scr. β. ol. destill. cit. gutt. iij. cum f. q. syr. de fumar. M. f. Pilul. N. xi. deaur.

Pilulæ anti-Arthriticæ. ℞. Extr. panchym. scr. i. hermodact. gr. diagryd. sulph. gr. iii. ol. fœnic. gutt. iv. cum f. q. syr. ros. sol. M. f. Pil. N. xxi. deaur. vel ℞. Mass. pil. de hermodact. diagryd. sulph. an. gr. vij. troch. alband. gr. ij. extr. calam. arom. gr. i. tart. vitriol. gr. ii. ol. anis. gutt. ii. cum f. q. aq. arthrit. M. f. Pilulæ, N. ix. deaur.

Aliæ usuales. ℞. Extract. pil. coch. extr. troch. alband. extr. turb. an. scr. i. extr. elleb. nig. gr. xxv. extr. lign. aloës, pœon. an. gr. vi. tart. vitriol. scr. i. ol. nuc. mosch. sal. anis. an. gutt. iv. cum f. q. aq. epil. Lang. M. f. Pil. ex scr. i. N. vi. Sumantur 3. diebus ante & post novilunium, ita ut prima die duæ, secunda tres, & tertia 4. manè jejune assumantur.

Pilulæ sanguinem mundificantes, in Scabie, & similibus affectibus. ℞. Extract. panchym. Croll. mercur. dulc. an. scr. β. mag. gial. gr. vii. ol. dest. mac. gutt. ii. cum. f. q. aq. ceras. nig. M. f. Pilul. N. xxi. deaur.

Pilulæ Emanuelis uterinæ. ℞. Mass. pilul. Emanuel. dr. iii. extr. croc. gr. ix. castor. gr. iii. cum f. q. aq. meliss. M. f. Pilul. N. LX. dentur ad scatul. cum pulv. cinam. dos. N. vii. vel viii. Si lubet, potest addi stimulus, de pulv. syr. vel magist. gial.

Pilulæ Stomachicæ. ℞. Mass. pilul. aggreg. vel angel. vel Emanuel. dr. i. mag. gial. vel pulv. syr. gr. xii. ol. dest. absinth. gutt. vi. cum f. q. aq. absinth. M. f. Pil. N. xxxix. deaur. dos. N. xii.

## In formâ Boli.

**B**olus Melanagogus. ℞. Conserv. fumar. dr. ii. confect. alker. scr. i. extr. elleb. nig. scr. i. resin. gial. gr. iv. M. f. Bol. aspergendus sacchar. S. Laxier-Brocken auf einmahl einzunehmen.

Bolus hydragogus. ℞. Rob. sambuc. vel ebul. dr. ii. confect. alker. scr. i. resin. gial. gr. ix. xii. ol. destill. cit. gutt. ii. M. f. Bol. asperg. sacch. S. ut suprâ.

Alius. ℞. Confer. ros. vel viol. vel fl. persic. dr. i. vel i. β. resin. gial. gr. ix. vel xii. vel pulv. rad. gial. gr. xv. gumm. gutt. gr. vii. vel viii. ol. destill. anis. vel fœnic. gutt. ii. cum sacch. f. q. M. f. Bol.

Bolus cholagogus. ℞. Conf. ros. vel pulp. tamarind. aut passul. vel cass. dr. ii. iii. pulv. syr. gr. viii. ol. dest. anis. gutt. i. M. f. Bol.

Bolus in lue Venereâ & Gonorrhœâ. ℞. Conf. fumar. dr. i. vel scr. iv. pulv. gial. dr. β. mercur. dulc. gr. viii. syr. de cich. cum rhab. parum. M. f. Bol. vel ℞. Pulp. cass. rec. extr. unc. β. vel dr. vi. rhab. el. pulv. scr. ii. vel hujus locô pulv. syr. vel mag. gial. gr. vii. mercur. dulc. scr. β. ol. dest. fœnic. gutt. iv. M.

Bolus purgans & Anthelminticus. ℞. Conf. fl. persic. dr. i. mercur. dulc. à gr. xv. ad scr. i. scam. sulph. vel mag. gial. g. v. vel rad. gial. aut spec. de gial. Minf. gr. ix. x. cum f. q. syr. fl. persic. M. f. Bolus.

Bolus purgans minutissimus. ℞. Extr. diacarth. dr. β. resin. scammon. scr. β. sacch. q. f. M. f. Bolus.

Alius. ℞. Rad. gial. rec. pulv. scr. i. gr. v. vel dr. β. Essent. cit. vel aq. aut syr. cinam. q. f. M. in mort. plano in Bolum minutulum, involvendum nebulis, in einer nassen Oblat.

His Bolis apud Principes & Magnates delicatulos & nauseosos, Rolsinkius magnam obtinuit sui commendationem. Idem fieri potest cum spec. hier. pic. Galen. spec. diagialap. Minf. &c.

Bolus purgans ex Electuariis. ℞. Elect. de tamarind. vel lenit. vel diaprun. laxat. aut cass. dr. ii. pulv. syr. tart. vitriol. an. gr. vii. cum f. q. syr. viol. M. f. Bol. Vel si ferum magis evacuandum, adde Electuar. pulv. gial.



gial. scr. i. gut. gamand. gr. iv. ol. dest. anis. vel cinam. vel cit. gut. i. M.

## In formâ

## Julepi, Syrupi, Spiritus vini, Morsellorum, Emulsionis &amp;c.

**J**ulepus purgans. ℞. Mag. gial. gr. xii. pulv. syr. gr. iv. nucl. pin. N. ii. probe subact. add. Jul. ros. dr. iii. aq. cinam. vel ceras. nig. unc. ℞. M. f. a. S. Purgier-Julep auf einmahl einzunehmen.

Syrupus purgans ℞. Syr. de cinam. vel rib. dr. iii. pulv. syr. a. gr. viii. ad xii. aq. cinam. bugl. dr. i. ℞. M. f. a. S. Purgier-Safft auf einmahl nüchtern einzunehmen.

Alius. ℞. Syr. rub. idæ. dr. ii. confect. alk. compl. scr. i. mag. gial. vel pulv. syr. sem. mel. subact. vel in sp. vin. dissolut. gr. viii. xii. & c. aq. cinam. bugl. dr. i. ℞. M. S. ut supra.

Spiritus vini purgans. ℞. Mag. gial. gr. xii. spirit. ceras. nig. dr. ii. Jul. ros. vel viol. dr. ℞. M. S. Purgier-Brandwein auf einmahl.

Alius. ℞. Elix. vit. Matthiol. dr. ii. mag. gial. gr. xii. vel pulv. syr. mag. gial. an. gr. vii. Jul. ros. scr. ii. M. S. ut supra.

Morsuli purgantes. ℞. Pulv. rad. gial. dr. ii. diagryd. dr. i. crem. tart. unc. ℞. sem. anis. dr. ii. sacch. in aq. cinam. dissol. unc. iii. M. f. Morsul. obliniendi ol. cinam. caryoph. an. gut. ii. M. S. Purgier-Morsellen, darvon ein halb Loth, oder 6. Quintl. auf einmahl zu nehmen.

Alii magis hydragogi. ℞. Magist. gumm. gutt. dr. i. lavigetur in marmore cum ol. destill. mac. add. resin. gial. f. a. solut. dr. ii. cinam. acut. scr. iv. caryoph. scr. ii. mac. scr. i. aromata grossô modô incif. & cum Sacch. in aq. cinam. sol. q. f. M. f. Morsell.

Morsuli Imperatoris purgantes. ℞. Sem. melon. excort. unc. ℞. aq. ros. opt. unc. iiij. ℞. M. f. Emuls. in qua dissolv. Sacch. albiss. lib. i. resin. gial. dr. v. add. spcc. pro morsul. Imperat. dr. vi. M.

Morsulus purgans pro una vice ℞. Spec. diagial. Mins. vel rad. gial. rec. pulv. gr. xv. magist. gumm. gutt. scammon. an. gr. ij. condit. cort. cit. minutim incif. sc. i. ℞. vel conserv. cit. borrag. an. scr. i. ol. cinam. gut. ii. Sacch. canar. in aq. cinam. dissolv. q. f. vel dr. vi. M. f. Morsulus. S. Purgier-Morsell auf einmahl.

Emulsio purgans. R. Sem. melon. excort. à dr. ℞. ad dr. i. resin. gial. à scr. ℞. ad gr. xii. scammon. sulph. gr. ii. M. in mort. marmoreo, assundendo sensim Jul. ros. unc. i. M. f. Emuls. S. Purgier-Milch auf einmahl.

Alia. ℞. Amygd. excort. N. iij. resin. gial. gr. viii. x. xii. conterantur simul, hinc affunde aq. ros. unc. ℞. syr. de cinam. dr. i. M.

Alia. ℞. Amygd. excort. dr. i. nuc. pinear. dr. ℞. resin. gial. gr. ix. aq. ros. ceras. nig. an. dr. vi. cinam. bugl. dr. i. ℞. M. f. Emulsio.

Atque hæ formulæ maximè inserviunt pro delicatis, & nauseosis, cæteras Purgantium formulas respuentibus.

## In formâ

## Noduli, aut Sacculi laxativi.

**N**odulus laxativus v. gr. in Febris intermittentibus. ℞. Rad. cickor. dr. iij. fœnic. polypod. q. an. dr. ii. Herb. absinth. Rom. card. b. cent. min. chamæd. adiant. utriusque an. pi. fol. senn. f. unc. i. ℞. agar. rec. troch. rhab. el. an. dr. iij. gial. dr. ij. passul. min. unc. i. cinam. vel galang. min. dr. j. sal. tart. dr. ij. M. incif. & contus. ad saccul. ex sind. alb. S. Laxier-Kräuter-Sackl auf anderthalb Maafs vveiss n Wein, und ein halb Maafs destillirtes Cickori Wasser anzusetzen.

Nodulus in obstructionibus viscerum Hypochondria-

cis. ℞. Rad. gram. cickor. bugloss. vel filic. asparag. vincetox. &c. an. dr. ii. herb. meliss. m. i. cuscut. adiant. alb. philirid. ceterach. vel chamædr. nob. agrim. alsinth. ponu. cent. min. an. M. ℞. fol. senn. f. unc. ii. rhab. el. fibr. elleb. nig. an. unc. ℞. agar. troch. dr. vi. cinam. acut. dr. i. sem. anis. fœnic. cit. an. scr. ii. cort. flav. aurant. dr. ℞. crem. tart. dr. ii. M. incif. & contus. ad Nodul. S. Kräuter-Laxier-Säckl, daran anderthalb Maafs vveissen Wein, und ein Maafs Wasser, siedheisser zu gießen, zudeckter in einem vvarmen Orth 12. oder 24. Stund stehen zu lassen, alsdann in einen Keller oder Gevvölbe zu thun, und täglich ein Fraggele (Achtelein) oder anders darvon nüchtern zu nehmen.

Nodulus in suppressione Mensium. ℞. Rad. bryon. dr. iii. aristol. rot. hirundinar. asar. an. dr. ii. Herb. meliss. matricar. puleg. chamæd. nob. an. mi. fol. senn. f. unc. ii. rhab. el. unc. ℞. agar. troch. dr. vi. fibr. elleb. nig. dr. iii. croc. orient. mac. an. scr. ii. sem. anis. fœnic. an. dr. i. cort. flav. aurant. dr. ii. cinam. acut. scr. iv. passul. unc. i. sal. tart. dr. iii. interdum etiam addi potest limat. mart. aut chalyb. præp. unc. ℞. vel i. M. incif. & contus. ad Nod. für anderthalb Maafs vveissen Wein, und ein Maafs Wasser. Dos. unc. v. vel vi. post aliquot cochlearia assumptæ offæ.

Vinum medicatum purgans ordinarium. ℞. Fol. senn. f. unc. ii. agar. troch. unc. ℞. turpeth. opt. pulv. dr. ii. z. incif. dr. i. ℞. nuc. mosch. ras. dr. i. herb. beton. card. b. agrim. ceterach. summit. absinth. fl. borrag. anth. an. pi. incisa excipiantur sindone pro ℞. iii. vin. alb. & lib. i. aq. borrag.

Vinum hydragogum probatissimum. ℞. Fol. senn. f. unc. ii. rad. gial. unc. ℞. troch. de eupat. de rhab. an. dr. ii. cort. ebul. median. sambuc. an. dr. i. ℞. rad. Ir. nost. lapp. maj. an. dr. ii. scyll. præp. dr. j. fol. gratioll. soldanell. an. mi. tart. crud. Venet. unc. ℞. passul. min. mund. unc. i. M. incif. & contus. ad Nodul. pro mens. ii. vini.

Aliud antihydopicum. ℞. Herb. absinth. card. b. cent. min. agrim. veron. epat. nob. an. M. ℞. cort. tamarisc. median. frax. an. dr. i. bacc. laur. Juniper. an. dr. ii. rad. raph. mar. bryon. ebul. asar. elleb. nig. Irid. nost. polyp. gialap. an. dr. ii. rhab. nost. fol. senn. f. an. dr. vi. z. z. alb. dr. i. crem. tart. dr. ii. chalyb. cum sulph. præp. unc. ℞. sem. anis. fœnic. an. dr. ℞. dentur ad Nodul. pro mens. i. & dimid. vel 2. vin. Neccarin.

Nodulus laxativus antiasthmaticus. ℞. Herb. salv. rorism. majoran. hyssop. veron. marrub. capill. ven. an. pi. rad. enul. fœnic. calam. aromat. caryophyllat. an. dr. ii. rhab. el. dr. iii. fol. senn. f. unc. j. agar. troch. turb. el. scammon. elleb. nig. præp. polyp. q. an. dr. ii. cinam. opt. dr. i. ℞. mac. scr. i. tart. alb. crud. dr. iii. sem. anis. fœnic. an. dr. ℞. M. incif. dentur ad Saccul. pro lib. iii. vin. alb.

Nodulus in affectibus Capitis. ℞. Rad. pæon. calam. arom. Ir. flor. caryophyllat. an. dr. ii. herb. absinth. Pont. card. b. beton. salv. meliss. puleg. major. rorism. an. pi. fl. anth. til. stech. an. pi. rhab. cl. dr. iii. fol. senn. f. unc. i. gial. agar. troch. turpeth. polypod. an. dr. ii. cinam. opt. dr. i. mac. nuc. mosch. an. scr. j. cubeb. cardam. an. scr. ℞. incif. dentur ad Nodul. pro lib. vi. vin. alb.

Nodulus in affectibus Uteri. ℞. Rad. enul. camp. rub. tinct. atist. rot. an. dr. j. herb. absinth. puleg. meliss. summit. cent. min. an. m. ℞. fl. cordial. calend. an. pi. fol. senn. f. unc. i. ℞. rhab. el. mechoac. an. dr. ii. agar. troch. dr. i. sem. anis. fœnic. an. scr. iv. mac. scr. i. passul. min. mi. incif. & contus. dentur ad Nodul. pro mens. ii. vin. alb.

Nodulus ante-Cachecticus. ℞. Rad. cich. enul. fœnic. an. dr. i. bryon. dr. ii. herb. meliss. hyssop. card. b. an. pii. fl. calend. m. ℞. cordial. cent. min. an. pii. rhab. mechoac. turb. agar. troch. an. dr. ii. chalyb. præp. unc. i. crem. tart. dr. ii. ℞. cinam. scr. ii. z. z. zedoar. sem. anis. fœnic. coriand. præp. an. scr. i. M. ad. Saccul. pro lib. iii. vini.

Nodulus



Nodulus ante-Ictericus. ℞. Rad. cich. asparag. an. dr. ii. chelidon. maj. polypod. querc. an. dr. i. β. fol. fenn. f. unc. ii. rhab. sel. dr. vi. fibr. elleb. nig. turb. alb. gummos. an. dr. iii. herb. tusc. chamæd. nob. chamæpyth. cent. min. marrub. an. pii. β. curcum. dr. ii. sem. cit. scr. ii. coriand. præp. anis. an. scr. i. galang. min. cinam. cl. an. scr. i. β. croc. scr. i. tart. crud. dr. iii. M. incis. & contus. ad Nodul. pro mens. i. β. vin. alb. & mens. β. aq. font.

Nodulus ex solô Rhabarbarô. ℞. Rhab. cl. unc. β. vel dr. iii. cort. flav. aurant. dr. β. contusa grossô modô ac Nodulô ligata inf. in aq. destill. cichor. & vin. alb. an. lib. β. vel lib. i. vin. alb. Dos. unc. iv. vel v.

Bocchetum Rhabarbarinum. ℞. Aq. font. mens. ii. ebull. per med. quadrant. horæ infund. rhab. cl. dr. i. fant. cit. dr. β. cinam. & sacch. parum. Col. pro potu ordinario. Utile hoc præsertim Infantibus in cachexiâ, contumacibus obstructionibus viscerum, morbisque chronicis exinde oriundis.

Nodulus pro Infantibus. ℞. Rad. gram. fol. fenn. f. an. dr. i. tamarind. unc. β. in pctiâ ligatis superaffund. aq. calend. lib. iv. detur pro potu ordinariô infantibus 4. 5. vel 6. annorum, quô plurimos cachecticos, & hydropicos restituit Sorbair.

### Formulae

#### Clysterum & Suppositoriorum.

Cum purgantia per os assumpta sæpè contraindicentur, eorum locô Clysteres evacuantes præscribi solent nunc lenitivi, nunc mediocriter, nunc fortiter purgantes & revellentes, quorum aliqua selectæ hîc proponuntur formulæ, ad imitationem.

Clyster lenitivus. ℞. Decoct. emoll. lib. i. vel emoll. & carmin. an. lib. β. sacch. rub. unc. ii. elect. diacathol. vel cass. pro clyst. dr. vi. ol. viol. chamom. an. unc. i. cum sale & vitell. ov. M. f. Clyst.

Alius in Febris usualis. ℞. Herb. malv. alth. mercur. violar. acetos. an. mi. bord. m. β. fl. viol. chamom. an. pii. sem. anis. dr. ii. coq. in. f. q. aq. ad 3. in Col. unc. x. dissolv. elect. lenit. unc. i. cass. pro clyst. unc. β. ol. viol. chamom. an. unc. i. β. vitell. ov. No. i. cum paucô sale M. f. Clyst.

Alius. ℞. Rad. alth. dr. iii. herb. malv. violar. pariet. an. mi. sem. lin. fœnug. an. dr. ii. fœnic. dr. i. β. bord. excort. m. i. incis. & contus. coq. ad consumpt. 3. p. in col. lib. i. dissolv. sacch. rub. unc. i. β. elect. lenit. vel diacathol. dr. vi. ol. viol. amygd. d. an. unc. i. cum sal. & vitell. ovi. M. f. Clyst.

Clyster paulo fortior. ℞. Fol. rut. branc. urs. mercurial. parietar. malv. cum tot. an. m. β. fl. cham. mi. summit. aneth. fl. melil. an. m. β. Rad. alth. unc. β. sem. aneth. carv. an. dr. ii. coq. ex aq. f. q. in Col. unc. x. dissolv. elect. lenit. dr. vi. bened. laxat. unc. β. hier. f. vel elect. de succ. ros. dr. ii. ol. aneth. rut. an. unc. β. salis gemm. dr. i. M.

Clyster mediocriter à Capite revellens. ℞. Rad. alth. dr. vi. lil. alb. dr. iii. herb. meliss. beton. rut. hyssop. salu. rorisin. an. m. β. fl. cham. malv. cum tot. an. mi. cent. min. pi. sem. carv. fœnic. an. dr. ii. coq. in. f. q. aq. f. in. Col. unc. x. dissolv. elect. diaphæn. hier. f. an. unc. β. mell. anthos. dr. vi. ol. rut. chamom. an. unc. i. sal. gemm. dr. i. M. f. Clyst.

Alius fortior. ℞. Herb. mercurial. orig. cent. min. puleg. calaminth. bethon. an. p. β. sem. caribam. in pet. lig. dr. vi. agar. in pet. lig. dr. ij. fl. stœch. Arab. dr. ii. incis. coq. in. f. q. aq. font. in col. unc. x. dissolv. elect. hier. f. logad. vel hier. cum agar. bened. laxat. an. dr. iii. ol. rut. unc. i. cham. aneth. an. unc. β. sal. gemm. dr. i. M.

Alius clyster acris, utilis in affect. Soporosis. ℞. Herb. absinth. cent. min. rut. an. mi. rad. pyreth. dr. vi. pulp. colocynth. in pet. lig. dr. ii. incis. & conquass. coq. ex f. q. aq. in col. unc. x. dissolv. elect. hier. f. logad. bened. lax.

an. dr. iii. ol. rut. unc. i. cham. aneth. an. unc. β. sal. gemm. dr. i. M.

Clyster simplicissimus fortiter revellens, ac utilissimus in affectibus Soporosis, Asthmate, Colicâ contumaci &c. ℞. Pulp. colocynth. in pet. lig. à dr. i. ad dr. iii. coq. in. f. q. brod. carn. in col. lib. i. dissolv. sacch. rub. unc. ii. vitell. ov. No. i. si mitius agendum, add. ol. viol. vel chamom. unc. i. β. M.

Clyster in Gravidâ. ℞. Brod. gallin. vel carn. alterat. malv. pariet. unc. viii. vel x. ol. amygd. d. cham. an. dr. vi. vel unc. i. mell. anthos. unc. i. β. sacch. rub. dr. vi. vitell. ov. No. i. M.

Clyster laxativus anti Colicus. ℞. Herb. 5. emoll. an. m. β. fl. chamem. summit. aneth. an. m. β. rad. alth. lil. alb. an. dr. ii. sem. lin. fœnug. an. dr. iii. f. decoct. in. f. q. brod. carn. in Col. unc. x. dissolv. elect. lenit. diacathol. an. dr. vi. mell. ros. sol. unc. i. vitell. ov. No. i. salis parum. M.

Suppositorium acre in affectibus Soporosis. ℞. Pulv. euphorb. scr. β. colocynth. gr. iv. elleb. gr. ii. sal. dr. β. mell. coct. unc. β. M. f. Supposit. S. Starck ziehendes Stuhl-Zäpfel.

Aliud. ℞. Spec. hier. pic. Gal. scr. i. troch. alband. scr. ii. sal. gemm. scr. β. mell. coct. q. f. M. pro Supposit.

Aliud mitius. ℞. Spec. hier. pic. dr. i. sal. comm. scr. i. mell. coct. q. f. pro Supposit.

### ARTICULUS VII.

#### De Officiô Medici, in evacuandis humoribus per Vomitum.

##### I.

Cum humores pravi, vitiosi & cacochymici non tantum per alvum, sed etiam per vomitum evacuari soleant, observet Medicus, Vomitum non tantum indicari a materiâ vitiosâ in primis viis, ventriculô nempe, duodenô, mesenterio, pancreate, liene, cavâ epatis parte existente, verum etiam & quidem potissimum ab ejus tenuitate, proclivitate ac mobilitate sursum versus. Nam teste Coo I. aph. 21. quô natura vergit, cò ducenda est; non autem solum humores tenues, biliosi, spumescientes, aquei, volatiles ac facillè mobiles evacuantur, sed phlegma quoque viscosum, & tunicis ventriculi firmiter impactum excutitur, unde Emeticorum ope, contumaces morbi ad miraculum sæpius eradicantur, & cum impetû frequentius evellitur, quod communia purgantia non attingunt. Hinc teste Galen. vomitus omnium purgantium saluberrimus, modò facillè fiat, & moderatè. Licet autem principaliter primam: tamen mediatè, & consecutivè etiam secundam & tertiam regionem expurgat.

##### II.

Conveniunt igitur Vomitoria, 1. In continuarum & malignarum Februm principiô, vel etiam augmentô, si vires nondum attritæ fuerint; præsertim si adsit nausea, vel inanis vomenti conatus, sapor & ructus amari, cardialgia, præcordiorum anxietates, vel haustum contagium, prodens se nausæa & anxietatibus, cum per hæc non tantum æger præmuniatur à diarrhœa, anxietatibus, deliriis, aliisque gravissimis symptomatibus, sed etiam sæpius morbus in ipsis incunabulis suffocetur, & unâ quasi falce demetatur. 2. In Febris intermittentibus, & præcipuè quartanâ, duabus vel tribus horis ante paroxysmum exhibita. 3. In Inappetentiâ, cardialgiâ, affectû Hypochondriacô, & morbis chronicis ex acidô primarum viarum exortis, præsertim si bilis acido jungatur, aut acidum tenuius ac mobilius sit, & quidem non tam præservativè, quam etiam curativè.



## III.

Præterea, 4. Profunt in capitis dolore sympathicô, vertigine biliosâ, si primi ejus natales in ventriculô, & partibus vicinis delitescant. In Apoplexiâ positivâ, aut ex ingluvie ortâ, dum nervorum oscula validè concutiant, ac impedimenta spirituum, & causam morbificam tollunt. 5. In Maniâ, Melancholiâ, Asthmate humerosô, & præcipuè stomachali, cum per ea magna pituitæ copia rejiciatur tum ex stomachô, tum ex pulmonibus per constrictionem pectoris simul concurrentem, vel saltem concussione illâ humor isle tenax è tubulis pulmonum, & aliis partibus abraditur, ejicitur, fluxilis redditur, ut denuò cum sanguine circulari, corrigi, vel ad ignobilem partem deponi possit. 6. Tandem conveniunt in præcautione Arthritidis, Podagræ, Nephritidis, ac irritis etiam aliis, in Partu difficili &c.

## IV.

Coindicatur Vomitus. 1. Ab habitû corporis, unde Hippocrates 4. aph. 6. ait: *Graciles*, (intellige naturâ tales, ob humores magis mobiles, vias patulas, ac fibras magis fluxiles,) & *ad movendum faciles*, per superiora purgare convenit, nisi hyems adsit. 2. A tempore anni; hinc præservativè verum magis & æstivum eligendum; unde etiam prædictus Senex 4. aph. 4. ait: *Æstate quidem superiorem magis ventrem, hyeme inferiorem purgare convenit*. 3. A consuetudine, à naturâ ad vomitum pronâ ac facili. 4. A ventriculi & viscerum robore, ac præcipuè à viribus, cum in hóc viscera validè concutiantur, ipsæque fibræ non rarò insigniter convellantur, ut spiritus animales in impetus inordinatos adacti, gravissima sæpè inducant symptomata. 5. Ab ætate, juvenili nempe & virili; ac ultimò tandem, à symptomatibus quibusdam & accidentibus, de quibus Hippoc. 4. aph. 17. ait: *non febricitanti, cibi fastidium, cordis dolor, vertigo tenebrosa, & oris amaritudo, per superiora purgandum opus esse significat*.

## V.

Contraindicatur Vomitus, 1. A constitutione corporis ineptâ, ut v. g. gibbosâ, scrophulosâ, aut quibus pectus angustum, vel depressum, vel qui obesi, aut aliâs ad vomitum difficiles; unde Hippoc. 4. aph. 7. ait: *ægrè comentes, & modicè carnosos, quos Græci eusarcos appellant, per inferna purgato &c.* 2. A procidentia quâdam corporis in abdomine, ut Intestinorum, uteri &c. 3. A graviditate. 4. A capitis affectione per essentiam, systemate præsertim nervosô debili existente. 5. Ab oculorum affectû, & præsertim inflammatione. 6. In pulmonum læsione essentiali, ac præsertim hæmoptisi, nam ex Hippoc. 4. aph. 8. *Tabi obnoxios, supra ne purgato*. 7. Ab affectibus abdominis convulsivis ac dolorificis, tumoribus abdominis inveteratis, abscessibus internis, mensium defectu ex vitiô uteri, atrophia, virium languore, ægris præsertim lypothymia obnoxiiis existentibus.

## VI.

Medicamenta Emetica alia sunt primaria, & propriè talia, quæ vim suam exerunt irritando, dum nempe acrimoniâ suâ salinô-sulphureâ, & quidem volatiliori, quàm habent purgantia per inferiora, particulisque suis aculeatis, profundius sese insinuant, ac fibrillas nervorum per ventriculum copiosè disseminatorum, tractô etiam in consensum intestinô duodenô, cum ductû choledochô & pancreaticô, inordinatè movent ac vellicant, ut spiritus animales copiosius in fibras irruant, motum peristalticum invertant, & veluti motû convulsivô contenta in ventriculô sursum expellant: Alia secundaria, improprie vomitoria dicta, quæ laxando, lubricando, & ventriculum gravando, & resupinando vomitum cient, ut v. g. ol. commun. vel amygd. cum sperm. cet. & butyr. liquefact. cum cerevisia, Juscule pingui &c. ad locum tantum

habent in excernendis per vomitum venenis corrosivis, vel ubi vomitus vomitû curatur, ut v. g. in Cholera.

## VII.

Quoad regimen & usum Emeticorum, observet Medicus, 1. Ea exigente necessitate quovis anni tempore exhiberi posse, præservationis tamen gratiâ maximè vernali. 2. Melius etiam suam operationem exercere, assumpta in formâ liquidâ. 3. Antimoniata & Mercurialia tutius in infusô, colando ea per chartam emporiticam, quàm in substantia exhiberi; cum secus ventriculi tunicis ac plicis adhærescentia, subinde cieant lethales hypercatharSES, vel enormes vomitus, qui tonum ventriculi destruunt, ac viscera impensè debilitant. Hinc licèt talia exempla, & formulæ apud Rolsink. & Willis. proflent, non tamen faciliè & tutò imitandæ. 4. In horum infusione non tantum considerandum esse, quantum sumatur de vomitoriô, quàm quantum accipi debeat, de menstruo nempe ab unc. β. ad unc. i. vel i. β. ad summum. 5. Eadem etiam tutius præscribi in dosi refracta, præsertim in febribus malignis, in quibus aliâs fluidiora sunt contenta. 6. Vomitoria liquida tepidè sumenda esse, cum sic facilius nauseam concitent, & expultricem ad expulsionem molestant. 7. Si formâ Boli exhibeantur, post dimidiam vel integram horam elapsam, liquorem aliquem tepidum desuper bibendum esse. 8. Horam exhibendi vomitivi in morbis chronicis esse matutinam, jejunô ventriculô: in febribus intermittentibus subinde exhiberi unâ horâ ante paroxysmum; in noxiâ quâvis re assumptâ, vel exhibitô venenô, quamvis horam idoneam esse. Si humores sint crassi, viscosi, lenti, post cibum expeditius & minori cum labore evomuntur.

## VIII.

Subinde Vomitus ab assumptô emeticô nullus vel parvus nimis excitatur, quod contingere potest, vel ob mucum viscidiorum parietes ventriculi incrustantem, ac sic eum, quasi sensus expertem reddentem, vel ob vomitorium acidis nimis fixum redditum: hinc quartanarii ac melancholici difficulter vomunt; vel ob robur ventriculi omnia deorsum potius promoventis, vel ex sensus defectû in morbis lethalibus. Si igitur subinde non operentur, vel non satis, formidandum non est, cum subinde utiles sequantur salivationes, vel purgationes per alvum; interim promoveri potest, si consultum videatur, assumptô Juscule calidô benè salitô, vel intrusione digiti in fauces, vel extremitatis plumosæ calami scriptorii oleô imbutæ; sicuti è contra, si nimius fiat, sistendus vinô generosô tepidè propinatô, & si primâ vice rejiciatur, reiteratô cum buccellâ panis, opiatâ aromaticis sociatis, & speciatim theriac. cum laud. op. in vinô assumptô, uti etiam exterius cum spirit. vin. crocatô applicata.

## ARTICULUS VIII.

De Officiô Medici, in præscribendis Emeticorum formulis.

Potio Emetica ex vitriol. mediocriter sine multâ molestia vomitum ciens, & ex solô ventriculô evacuans. Nam Vitriolum, ob mitem agendi operationem, Manna vomitoriorum à nonnullis intitatur. ℞. Vitriol. alb. præp. dr. β. vel. scr. ii. oxymel. f. dr. ii. aq. dest. cich. vel ment. unc. i. M. S. Brech-Wasserlein auf einmahl einzunehmen.

Pulvis Emeticus maximè usualis. ℞. Crem. tart. vel sal. armon. gr. xv. sal. absinth. gr. v. tart. emet. Minf. gr. i. ii. iii. M. f. Pulv. S. Brech-Pulv. Si simul per inferiora purgandi animus, add. scam. sal. ph. gr. viii. x. ol. dest. mac. gutt. ii. M. Notandum est, hodie apud selectiores Practicos, optimum & utilitissimum vomitorium constituere, tart. emet. qui rarò fallit, adeò ut etiam



etiam infantibus, quarta vel sexta pars grani à nonnullis exhibeatur.

Potio Emetica, ex infuso Croc. Metall. valida, sed tuta satis. *℥. Croc. metall. risè præp. à gr. vi. ad viii. xii. ebull. parumper in f. q. vin. alb. Col. per Chart. empor. S. Brech-Wein.*

Alia ex Vitro Antimon. vel Mercur. vit. *℥. Mercur. vit. vel vitr. anim. vel croc. metall. gr. v. infund. in vin. Rhen. q. f. stent in locò tepidò per noct. manè. ℥. de filtraturâ per chart. empor. facta unc. β. vel i. β. Eòdem modò procedi potest cum numis, annulis, globulis, & scyphis ex regulò antimonii paratis.*

Potio ex Syrup. Emet. *℥. Syr. emet. Angel. Sal. dr. ii. iii. unc. β. Julep. ros. unc. β. aq. cinam. dr. ii. vel ℥. Aq. card. b. syr. emet. Ang. Sal. ritè præp. an. dr. iii. aq. cinam. dr. ii. M.*

Bolus Emeticus. *℥. Conf. fl. tunic. à ser. i. ad dr. β. tart. emet. Mins. gr. ii. iii. crem. tart. gr. v. M. f. Bol. S. Brech-Zucker.*

Pilulæ Emeticæ. *℥. Extr. asar. vel panchym. gr. vi. tart. emet. gr. ii. ol. destill. zedoar. gut. i. M. f. Pilul. No. vii. S. Brech-Pillulen auf einmahl.*

\*\*\*\*\*

## CAPUT VI.

De Officiò Medici, in Affectibus indicantibus sudorifera, diuretica, salivantia, errhina, sternutatoria, apophlegmatizantia, & expectorantia.

### ARTICULUS I.

De Officiò Medici, in præscribendâ evacuatione per Sudorem.

#### I.

Cum Sudor in corpore humanò soleat contingere, dum occasione vel causæ externæ, ut v. g. exercitii, caloris ambientis &c. vel medicamenti interni, attenuatur sanguis, magis fluxilis redditur, plusque minùs liquescit & resolvitur, hincque velociùs circulatur, intensius fermentatur, & incalcescit, cum sanguine etiam serum, à calore attenuatum, imbibit copiosè particulas minùs reliquis cohærentes, seu permixtas, & in specie salinas, ac cum illis varias sordes, & fermenta, quæ simul abstergentur; hinc successivè circa corporis habitum subintrat copiosissimè glandulas intercutaneas, ex quibus per vasa excretoria, corporis poros constituentia, emanat. Cum igitur Sudor tali modò contingat, Medicus exinde colliget. 1. In Sudore sanguinem, & omnes humores attenuari, in motu suò debitò ac circulatione optimè conservari, stagnationes tolli, ac partes heterogeneas, & fermenta peregrina optimè sic eliminari, atque adeò Sudorem esse universale sanguinis, & partium solidarum purificativum, absterisivum, uti etiam particulare peripheriæ ipsius corporis, morborum nempe cutaneorum. Colliget 2. Sudorem sæpè maximè necessarium esse, quod elucescit, tum ex ipsâ cutis, quæ tot millibus spiraculorum abundat structura, ad sudores elicandos aptissimâ, tum ex plurimis morbis, quos sudoribus criticè solvuntur, tum ex sensibili transpiratione, quæ aliis evacuationibus, teste *Sanctor. in suâ staticâ* copiosior est; unde ex hac impeditâ, tot morborum oriuntur genera, quæ omnia tolluntur Sudore, ut adeò nonnulli censeant, tertiam morborum partem curari sudoriferis, quæ etiam purgantibus magis tutiora.

#### II.

Ex præsuppositis patet, Sudorem convenire, 1. In

omnibus febribus, exceptâ hecticâ, & quidem tam intermittentibus, quàm continuis, ac præcipuè malignis, quarum nulla ferè sine sudore perfectè curata dicitur. 2. In inflammationibus, doloribus, tumoribus, tanquam effectibus circulationis impeditæ. 3. In cruoris extravasatione, vel revera tali, in vulneribus, contusionibus, vel quasi tali, ut in pleuritide, erysipelate, arthritide, affectu ischiadicò &c. 4. In morbis omnibus ex humoris serosi colluvie oriundis, ac in specie defluxionibus catarrhalibus. 5. In grumescentiâ & coagulatione sanguinis, ut in palpitatione cordis, scabie, scorbutò &c. 6. Tandem non tam evacuationis, quàm alterationis gratiâ, ut nempe viscida attenuent, aut humores coagulati, & stagnantes resolvantur in morbis chronicis, & contumacibus, quorum causæ altiores egerunt radices, ut v. g. epilepsia, paralyti, arthritide, malò Ischiadicò, lue venereâ, doloribus ac fluxionibus capitis inveteratis, catarrhis, cachexiâ &c. qui purgantibus atque aliis alterantibus curari haud potuerunt.

#### III.

Sicuti autem coindicantur Sudorifera à viribus constantibus, ætate habili, & locò calidò: ita contraindicantur ab aère & locò frigidiori, ac viribus præcipuè exsolutis; cum per sudores præcipuè largiores spiritus exhauriantur, corpus emacietur, colliquetur, rosque nutritivus nimis resolvatur. Item subjecta calida & biliosa minùs, & non diu ferunt sudores, præsertim à sudoriferis calidioribus excitatos; item contraindicantur, ubi vel serum deficit, in maniacis, cholericis, gracilioribus, senibus, squalidis, ad marasum & phthisin inclinantibus; vel ubi serum nimis abundat, ut in hydropicis, ubi simul est extravasatum.

#### IV.

Medicamenta sudorifera, nonnullis etiam dicuntur diaphoretica & hydrotica, licet ad invicem distinguantur; Illa enim sensibilem magis humidam, & rivulosam feri evacuationem perficiunt: hæc udorem vel madorem potius cient, evacuando magis insensibilem materiam vaporosam, & halituosam. Vim autem suam exerunt Medicamenta sudorifera & diaphoretica, vel *positive*, calore, & tenuibus suis particulis humores M. S. attenuando, incidendo, colliquefaciendo, ac ad cutis glandulas cum aliis obviis propellendo, in guttas ibidem condensando, vel insensibiliter evaporando; vel *privative*, acidum coagulativum absorbendo, imbibendo, & quod serum ligat, ac fixius reddit resolvendo: & sic per accidens sanguinem attenuando. Hæc locum magis habet, ubi resolutio virium timetur, & frænò potius eget sanguis & serum, quàm stimulo: illa ubi sanguis ad motum & fermentationem magis ciendus. Motus igitur naturæ observandus, quæ, si ipsa officio satisfaciatur, & in sudores promptè solvatur, modicè juvanda est, non pellenda: si deficiat, stimulanda; si excedat, refrænanda.

#### V.

Pro debitò usû sudoriferorum, sequentes Medicus observabit cautelas: 1. Primas vias debere esse emundatas, & à vitiosorum humorum illuvie liberatas. Nam in materiâ nimis copiosâ, minùs tuta sunt sudorifera, cum metus sit, ne vel cutis spiracula occludantur, vel commoti ad partes principes ruant humores. 2. Exhibenda esse ventriculo jejuno existente, seu propinquantur in formâ liquidâ, quæ citius, seu solidâ, quæ tardius operantur. 3. Sumptis sudoriferis corpus plùs solitò esse tegendum, ut pori magis pateant, humoresque magis fundantur, ac tegumenta circumcirca potius, quàm suprà ponenda, cum pori cutis, ab onere stragulorum & tegumentorum nimis pressi, sudores difficillimè transmittant. Nonnulli, ut agri in lectò melius sudent, sudorem lagenis aquâ calidâ plenis, vel lateribus calidis



calidis linteò involutis, sub axillas ad latera ægri positis, promovent. In Diætâ sudorifera, in der Holz-Schwitz-Cur, sic dictâ per synecdochen, quod in ejus usu exacta & accurata vivendi ratio sit observanda, Decoctum lignorum exhiberi solet in robustioribus, corpore in stuphâ seu laconicò existente, ac excitatò vaporosò calore per affusionem alicujus decocti vel spirit. vin. super lateres vel filices ignitos, ut sudor magis proliciat. 4. Melius esse, si ægri non violenter cogantur ad sudorem, præsertim si corporis textura, & sanguinis diffusio non respondeant. Minus enim sudant, quibus sanguinis status magis condensatus, ac fibræ, pori & meatus cutanei adstricti, & contracti; hinc præstat sæpè, præsertim etiam in febribus malignis & expellendis variolis, diaphoresin continuare, & naturæ tempus concedere, quàm eandem cogendo pessumdare, cum sic feri proportio nimis absumatur, sanguis ipse ad fermentationem magis cieatur, & naturæ benè agentis conatus interrumpatur. Præstat igitur naturam sequi, & ducere, quàm pellere, cum præstat sæpè tenuis odor, quod non præstat sudor.

## V I.

Præterea, 5. Observabit Medicus, sudorem ad horam unam vel dimidiam, raròque ultra duas horas continuandum esse, præsertim si satis rivulosè fluat, cum ad vires maximè respiciendum sit. In curâ lignorum sudorifera, unâ vice de die frequentius, & quidem mane ad unc. vi. calidè ebibitò decoctò, sudor prolicetur, licet subinde in robustis, valdè pituitosis & copiosis excrementis refertis, etiam circa vesperam ideam usus decocti repeti possit. In febribus continuis, malignis, variolis, bis vel etiam ter de die, si magna adsit malignitas, sudorifera exhiberi possunt. 6. Cavendum esse, ne fluente adhuc vel etiam abstersò sudore, aer frigidus per poros adhuc patulos admittatur; hinc post sudorem linteamina & indusia (calidè prius corpore abstersò) mutari, & alia tepida indui possunt. 7. Durante sudore, si æger sitiat, potum largiorem concedi posse, cum sudorem coadjuvet, præsertim si calidus sit, frigidus autem magis eum impediatur, maximè confertim haustus, licet magis recreet. Post sudorem, moderatè acidula conveniunt, ut sanguis attenuatus & resolutus, blandè iterum coëat.

## V I I.

Item advertet Medicus, 8. In diætâ sudoriferâ, pro majori vel minori morbi vehementiâ & contumaciâ, per dies 15. 20. 30. & ultra persistendum (nisi vires deficient) ac talem victûs rationem observandam esse, ut æger utatur assis potius quàm elixis, aviculis, nempe montanis, pullis columbinis, gallinaceis &c. pane bis coctò, passul. amygd. tost. &c. pro potû Bocchetò, id est, Decoctò lignorum secundariò, ut alvus, si fuerit obstructa, clystere emolliatur, & quod optimum, singulis 6. vel 8. diebus purgatio instituat, omittâ illâ die portione sudoriferâ, ut etiam crassior materia, quæ absumptis partibus tenuioribus restagnare solet, per alvum deturbetur. 9. Decoctum hoc sudoriferum etiam usurpari citra sudorem, pro solò scopò alterativò, in affectibus chronicis, & præsertim exulcerationibus internis, additis vulnerariis, ut quotidie bis vel ter haustus de eò sumatur. 10. Tandem quoad tempus in febribus notandum, quòd, nisi febres nimis sint malignæ, aut erysipelati, vel pleuritidi junctæ, melius sit coctionis signa expectare, ut materia excrementitia non cruda sit, ac vitiosè in sanguine ebulliat, sed præcipitata & separata, aliàs enim vel nullus sequitur sudor, vel nudus latex aquosus, cum spirituosus halitibus tantum exhalat, sine euphorîæ ægri, & cum insigni potius ejusdem damno, nam nihil separari potest ex liquore, cujus porulis intimè unitum est. Hinc ad invitationem naturæ, vel in declinatione universali morborum, vel particulari paroxysmorum tantum sudores movet, ac eadem variolas & petechias, non nisi post aliquot dierum se-

brim, salubriter & sufficienter expellere solet; ut adeò aphorismus Hippoc. de coctis evacuandis, non tantum de purgantibus, sed etiam sudoriferis & diureticis intelligendus sit.

## ARTICULUS II.

## De Officiò Medici, in præscribendis formulis Remediorum Sudoriferorum.

## I.

**D**ecoctum Sudoriferum famosum in lue venereâ, multis pro arcanò habitum. ℞. Rad. chin. s. l. sarsapar. non carios. an. lib. ʒ. sassafr. unc. ii. animum. crud. pulv. & aq. font. prius lot. ad separationem pulveris nigricantis, unc. i. aq. font. lib. iv. Coq. ad consumpt. mediet. post refriger. col. S. Holz-Schwitz-Wasser, darvon ein Fraggel Morgens nüchtern warm zu trincken, und darauf zu schwitzen.

Aliud Zwölfferi. ℞. Lign. guajac. tornò deraf. unc. vi. sassafr. rec. unc. iii. rad. chin. sarsapar. an. unc. ʒ. liq. ras. unc. i. passul. min. unc. iv. mercur. viv. antim. crud. contus. in pet. ligatorum an. unc. iii. aq. font. lib. xxiv. incis. infund. per 14. horas, post coq. s. a. ad remanent. lib. xvi. Colat. detur ad vas vitreum vel terreum, nullò modò autem metallicum. Dentur quotidie unc. v. vel vi. manè horâ sextâ & vesperi horâ quartâ, unc. iv. calidè.

Pro potu. ℞. Chin. opt. sarsapar. an. unc. ii. lign. sassafr. rec. unc. i. ʒ. rad. liq. ras. unc. i. passul. min. unc. iii. aq. font. lib. xxiv. incis. stent per hor. 24. hinc coq. s. a. ad reman. lib. xviii. Col. S. Nachwasser zum trincken in der Schwitz-Cur.

Aliud in Gonorrhœâ virulentâ. ℞. Rasur. lign. guajac. sarsapar. an. unc. iiij. cort. lig. sanct. dr. vi. infund. in aq. puriss. lib. vj. stent in locò calidò per 24. horas, coq. in diplom. ad consumpt. 3. p. add. in mediò coct. rad. liq. enul. an. unc. ʒ. cinam. acut. dr. iij. sem. anis. fœnic. an. dr. ij. Col. Dos. unc. vi. provocatis in laconicò sudoribus.

Aliud. ℞. Lign. sanct. unc. x. cort. ejusdem unc. i. sarsapar. unc. iii. inf. in aq. lib. xii. decoq. ad mediet. col. resident. affund. lib. xii. coq. ad consumpt. 3. part. add. passul. unc. ii. liq. dr. ii. M.

Diætâ sudorifera in Paralyfi verâ. ℞. Lign. guajac. unc. iv. cort. ejusdem dr. ii. lig. sassafr. dr. vi. rad. paon. enul. Ir. an. unc. ʒ. incis. stent in infus. in locò calidò per 24. horas. Coq. ad remanent. lib. iv. ʒ. add. in fine fl. salv. primul. ver. anth. lavend. stœch. Arab. an. dr. ii. cinam. acut. unc. ʒ. ebull. semel atque iterum col. sudetur in laconicò, suscitato vapore ex decoctò herbarum cephalicarum, scoris vel lapidibus ignitis affusò.

Alia in Suffusione. ℞. Rad. sarsapar. unc. ii. lign. sanct. unc. i. sant. rub. unc. ʒ. rad. liq. dr. vi. asperge sp. sulph. scr. i. inf. per hor. 24. in aq. lib. vi. add. passul. min. unc. iii. cubeb. unc. i. ʒ. herb. euphras. cum fl. mi. fl. cyan. beton. an. m. ʒ. sem. coriand. fœnic. an. dr. i. ʒ. coq. s. a. ad reman. lib. iv. Col. Dos. unc. iv. vel v.

Decoctum sudoriferum temperatum, in Catarrhis & affectibus Capitis. ℞. Rad. chin. sel. incis. unc. i. sarsaparill. vinò purgat. à pulvere & contus. unc. i. ʒ. sassafr. limat. dr. i. ʒ. inf. in lib. xii. aq. font. stent per horas 24. coq. ad consumpt. medietat. Col. addi etiam posset aliquid de viscò querc.

Decoctum sudoriferum in Podagrâ. ℞. Scob. lig. guajac. rad. sarsapar. an. unc. ii. lig. sassafr. crasse limat. dr. i. ʒ. affund. aq. font. lib. vi. coq. in B. M. per hor. 6. col. Subinde Decoctum fieri potest, ex solò lignò sassafr.

Decoctum sudoriferum in Scabie. ℞. Scob. lig. sassafr. guajac. an. unc. vi. rad. chin. sarsapar. an. unc. ʒ. cinam. acut. dr. i. sic. liq. an. unc. ʒ. passul. min. unc. iii. sem. anis. fœnic. an. dr. ʒ. coq. in aq. font. lib. xv. ad tertias. Col.

Decoctum



Decoctum alterans, putredinem inhibens, exsicicans & consolidans, in Ulceribus & Abscessibus internis usuale, sine sudoris provocatione. R. Rasur. lign. sanct. unc. iij. rad. sarsapar. unc. ij. scorz. unc. i. s. fragur. consolid. maj. min. glycir. an. dr. vi. herb. veron. m. ii. sem. coriand. præp. dr. ii. passul. min. unc. iv. Coq. in aq. lib. xv. ad med. col. S. *Aushaylender Wund-Tranck, darvon Morgends, Abends und Nachtz, 4. oder 5. Unzen zu nehmen.*

Aliud magis temperatum. R. Rad. chin. ponderos. unc. iij. sarsapar. unc. i. s. scorz. unc. ii. caryophyllat. unc. i. macerata per noct. bull. m. in f. q. aq. font. add. herb. scabios. alchimill. heder. terrest. an. m. i. fl. ros. rub. m. i. violar. m. s. sem. fœnic. dr. i. passul. unc. ii. decoct. trajic. per manic. Hippoc. Col. S. ut supra.

Brodium columbinum, exsicicans & sudoriferum, in Catarrhis, & incipiente Phthisi utile, vulgò die Tauben-Cur. R. Rad. chin. sel. in talcol. sciss. dr. ii. lig. lentiss. dr. ii. mac. ser. s. M. ad chart. S. Species zur Tauben-Brühe, mit einer halben Tauben in zudeckten Geschirr kochen zu lassen, bis das Fleisch von den Beinlein fällt. Et sic pro ceteris dosibus, per 14. vel plures dies.

Aliud Brodium Catarrhale, suave & proficuum in Catarrhis diuturnis, viscera corroborans, & materiam ferosam absumens. R. Chin. sel. unc. i. lign. lentisc. dr. vi. rad. Rhod. dr. ii. incid. & infund. aliquamdiu, hinc coq. cum gallin. juvene in lib. v. vel vi. aq. font. ad debitam cocturam, cap. m. unc. vi. vel viii. aromatiz. cum pauco mac. Singulis tribus diebus paretur recens.

Potio sudorifera in Febris continuis & malignis. R. Elect. diascord. Fracast. ser. iv. pulv. rub. pannon. vel spec. de hyac. aut liberant. ser. i. lap. bez. orient. vel sal. vol. C. C. gr. vi. syr. acetos. cit. unc. s. aq. card. b. vel scorz. unc. ii. s. acetos. vel tot. cit. aut cordial. frig. unc. s. M. S. Gist-austreibendes Schvütz-Tranckl, auf einmahl einzunehmen.

Alia. R. Aq. scabios. card. b. scord. an. unc. i. acet. bezoart. dr. iii. diascord. Fracast. dr. i. mithrid. confect. alk. an. ser. i. C. C. phil. præp. anim. diaph. terr. sig. vel unicorn. fossil. an. ser. i. nit. perlat. gr. vi. syr. de scord. vel rub. idæo, dr. vi. vel unc. i. M.

Alia. R. Mixt. f. ser. ii. anim. diaph. C. C. phil. præp. an. ser. i. aq. fumar. card. b. an. unc. i. s. syr. acetos. cit. unc. s. M.

Emulsio sudorifera in Variolis & Febris malignis. R. Semin. equileg. nap. cit. an. dr. ii. pœon. dr. j. aq. fumar. card. b. galg. scorz. an. unc. i. cordial. frig. dr. vi. M. f. Emuls. add. C. C. phil. præp. ser. i. anim. diaph. ser. s. sacch. perlat. parum. S. Schvütz-Milch auf einmahl einzunehmen.

Alia. R. Sem. mel. dr. ii. card. b. aquileg. an. ser. ii. aq. acetos. fl. calend. fumar. an. unc. i. vel decoct. C. C. rasp. unc. iii. add. C. C. phil. præp. ser. i. vel dr. s. Jul. ros. unc. s. M. S. ut supra.

Bolus sudoriferus, in Erysipelate, Scabie &c. R. Rob. sambuc. unc. ii. C. C. phil. præp. ser. i. bezoart. mineral. vel antim. diaph. gr. xv. vel pulv. rub. pannon. ser. i. lap. bez. gr. v. M. S. Schvütz-Latwergen auf einmahl einzunehmen, und ein oder 2. Löffel voll Holler-Blutwasser darauf zu trincken.

Alius. R. Theriac. vel mithrid. opt. ser. i. s. confect. alk. ser. i. C. C. phil. præp. ser. i. anim. diaph. ser. s. syr. de card. b. parum. M.

Bolus sudoriferus, in Febris malignis. R. Diascord. Fracast. ser. ii. confect. hyacinth. ser. i. C. C. phil. præp. ser. s. lap. bez. orient. gr. vi. M. S. Austreibende Schvütz-Latwergen auf einmahl.

Electuarium sudoriferum pro pluribus dosibus. R. Rob. Juniper. diascord. Fracast. an. unc. i. s. ther. Androm. mithrid. an. dr. ii. terr. sigill. silef. dr. i. syr. acetos. cit. q. s. M. f. Elect. S. Schvütz-Latwergen darvon ciner Nuss groß auf einmahl einzunehmen.

Pulvis sudoriferus & expulsivus, in Variolis & Febris malignis. R. Pulv. rub. pannon. dr. s. spec. de hyac. ser. i. lap. bez. occident. gr. xv. vel orient. gr. vi. vel locò bez. sal. vol. C. C. gr. xv. M. f. Pulv. divid. in 3. p. aq.

S. Austreibende Schvütz-Pulverlein auf dreymahl einzunehmen.

Alius. R. Spec. liberant. de hyac. unicorn. foss. an. ser. s. sal. vol. C. C. vel lap. bez. orient. gr. vi. M. f. Pulv. subinde unum vel alterum gr. camphoræ addi potest.

Alius. R. Unicorn. ver. antim. diaph. cinnab. antim. sal. vol. viper. vel C. C. an. gr. viii. M. f. Pulv. detur ex aquis e typh. cerv. card. b. scorz. fumar. &c.

Pulvis alexipharmacus & sudoriferus Mindereri. 24. Sacch. cand. dr. iij. z. z. alb. dr. ii. camph. dr. j. M. f. Pulv. cujus Dos. dr. j.

## ARTICULUS III.

De Officiò Medici, in instituendâ evacuatione per Urinam.

### I.

Cum cacochymia curatio, non tantum purgantibus & sudoriferis, sed etiam quandoque perficiatur evacuatione per Urinam, quod clarè patet ex perfectis crasibus, quas natura subindè in pleuriticis, empyicis, aliisque morbis detentis instituit per urinam, ea hinc etiam inter evacuationes universales consideranda; dum remedium diureticorum ope, salia massæ sanguineæ, aut superflua, aut vitiosa, tartarea & peregrina, sub lixivii urinosi formâ, per renum tubulos in eorum pelvim præcipitant, ac per vias urinarias eliminant, quæ evacuatio eò jucundior & tutior, quod nec vires proflernat, nec sanguinem aut corpus conturbet, sed cum ephoriâ humores, ex secundâ aut etiam tertiâ regione evacuet.

### II.

Cum igitur hæc sanguinis depuratio per Urinam locum sibi vindicet, ubi vel tartarea, salinæque particulae in corpore abundant, ac massam sanguineam, & speciatim serum inquinant, vel colluvies serosa hinc inde in visceribus, seu etiam in insigni aliquâ corporis cavitate delitescit, in usum trahenda erunt diuretica, 1. In vitiis urinæ, ut ejus defectui Ischuria, dysuria &c. 2. In sero peccante, in quantitate vel motu, ut in cachexia, hydrope, & præsertim ascite, anasarca &c. 3. In sero in qualitate peccante, ut Ictero, scorbuto, affectione hypochondriacâ, & quibuscunque aliis lienis affectibus, vel revera talibus, vel ipsi saltem attributis, in quibus urinæ quandoque atramento similes, vel cum copiosis arenulis, vel potius salibus concretis & præcipitatis, cum insigni levamine rejiciuntur. 4. In gonorrhœâ, fluore albo, arthritide, nimia obesitate, calculo, declinatione febrium, aliisque pluribus affectibus.

### III.

Operationem suam exercent diuretica, vel abstergendo, qualia sunt tum aquea & liquida, serum substantialiter augmentia, ac uberem aquosamque materiam suppeditantia, ut Acidulæ, Serum lactis, Thermae &c. tum aquosa mucilaginosa, acrimoniam feri temperantia, ut glycyrr. althæa, sem. 4. frigid. m. &c. quæ diuretica frigida & improprie talia, vel potius uretica dicuntur, vel sanguinem attenuando, resolvendo, & speciatim laticem ferosum in eò fundendo, ac ita lotii copiam e totò corpore proliciendo, qualia sunt sale volatili prædita, ac omnia salia, tartarea & nitrosa; hinc sal primum esse diureticum, rectè scribunt chymici. Proinde etiam acida & terrea alcalina, in alium saporem plus minus salum convertuntur, ut fiant diuretica, vel serum acius, indeque abstergivum, & viscidorum plus minus attenuativum, ac nonnihil colliquefactivum, & hinc renum stimulativum reddendo, qualia sunt herbæ diureticiæ, alcalinæ, ocul. canc. &c. vel acrimoniam volatili renes irritando, & ad frequentiore excretionem stimulando, qualia sunt cantharid.



tharid. & raphanacea. Vel tonum renum conservando, & vim transcolatoriam non absque aliquali stimulo promovendo, qualia sunt juniperina, terebinthinata; vel tandem præcipitando, & sic separationem partium serosarum à sanguineis facilitando.

## I V.

In usu remedium diureticorum Medicus observabit, 1. Ante eorum usum præmittenda esse universalia, tum quia in principio plerumque materia crassior & copiosior est, ut frustra per urinam duci possit, tum quia metus est, ne copiâ suâ, dum ad angustas vias ruit, eas obstruat, ac sibi & aliis viam intercludat. 2. Diuretica magis convenire in morbis chronicis quàm acutis & calidis, ut v. g. in febribus ardentibus, hecticâ, phthisi &c. nisi aquea sint & temperantia. 3. Eadem in genere magis convenire in subjectis eufarchis, & succulentioribus, phlegmaticis nempe & sanguineis, quàm acrioribus, cholericis & melancholicis, cum in talibus continuò usû ad atrophiam & tabem disponant. 4. Eadem magis locum habere in statu & declinatione, quàm in principiò & incrementò.

## V.

Præterea, 5. observabit, eadem jejuno ventriculò longè ante passum exhibenda, nec cibis tam facilè permiscenda esse, cum citius quàm par est, chylum in vasa præcipitent. 6. Ipsi vasis & visceribus urinæ excretioni velificantibus, affectis ac detentis, v. g. inflammatione, ulcere &c. cautius danda esse diuretica, vel non nisi terrea, alcalina, vel temperantia & simul traumatica usurpanda esse. 7. Eadem in calculò renum, præsertim etiam in paroxysmò Nephriticò minùs tuta esse, nisi præmissis emollientibus, lubricantibus, ac oleosis, cum vel impuritates corporis deducant ad partem affectam, vel iisdem calculus præcipitetur, ac deturbetur in vasa, cum lethali sæpè Ischuriâ.

## ARTICULUS IV.

*De Officiò Medici, in præscribendis formulis Diureticorum.*

**D**Ecoctum Diureticum, experienciâ probatissimum. R. Sem. malv. alth. an. dr. iij. cic. rub. unc. iij. 4. fr. m. an. dr. ij. bord. mund. m. j. caric. ping. No. viii. sebest. No. vii. rad. liq. ras. dr. vi. incisa indantur Nodul. ex ferico alb. & coq. in aq. font. lib. iiii. S. ad tertias. Col. S. Harn-treibendes Wasser, darvon Morgends, Abends und vor dem Schlaff, ein Frägele zu trincken.

Subindè uno haustu indi possunt: spirit. sal. gut. vi. vel vii. Forestus huic decoct. addit rad. ononid. sænic. petrosel. an. unc. s.

Julepus Diureticus. R. Decoct. Forest. lib. s. vel aq. ononid. fragor. petrosel. an. unc. ii. syr. de alth. Fern. unc. i. s. sp. sal. q. f. M. possit etiam addi: ocul. canc. dr. s. S. Harn-treibendes Wasserlein, darvon Löffel-voll-veifs zu nehmen.

Terebinthina liquida. R. Tereb. cyp. cum vitell. ov. dissolut. dr. v. brod. card. vel vin. Rhen. opt. unc. iiii. M. super lento carbonum igne. Alii etiam addunt succ. lim. dr. vi. vel unc. i.

Alia. R. Resin. terebinth. cyp. unc. s. dissolv. cum vitell. ov. f. q. addendo paulatim syr. de alth. Fernel. unc. ii. vin. malv. unc. vi. M. Dos. unc. i. s.

Potio Diuretica suavis & efficax. R. Succ. limon. succ. express. ex corticibus raph. acut. vin. malv. aq. frag. an. unc. ii. sacch. q. f. pro dulcorat. R. vin. alb. unc. iiii. succ. lim. unc. i. spirit. tereb. scr. ii. M.

Mixtura Diuretica. R. Aq. ononid. petrosel. saxifrag. an. unc. i. spirit. juniper. dr. ii. ocul. canc. præp. scri. Bals. sulph. tereb. scr. i. syr. de alth. Fernel. unc. s. M. detur

cochleatim cum gutt. xv. sequentis Balsami Diuretici. R. Spirit. sal. tart. Bals. sulph. terebinth. an. scr. ii. sal. vol. succin. gr. vi. M.

Lixivium Diureticum, Hydropicis perquam proficuum. R. Ciner. genist. vel summit. Juniper. lib. i. vin. Rhen. lib. iv. infund. frigide addendo sal. absinth. vulg. p. i. vel p. ii. de colatura mane & sero unc. iv. potentur, usque dum tumor diminutus sit. vel R. de colat. unc. iv. succ. cit. dr. vi. syr. de alth. Fernel. unc. i. M.

Vinum Diureticum. R. Gr. alkek. unc. i. rad. eryng. ononid. an. unc. s. bacc. juniper. matur. unc. s. incis. & in sindone ligat. affunde vin. alb. lib. iiii. Dos. unc. v. præmisso Jusculò ex decoct. petrosel. cic. rub. cum butyr. & modicò sale.

Brodium Diureticum. R. Cic. rub. cochl. i. rad. petrosel. alth. an. dr. ii. balicacab. gr. x. coq. cum quartâ parte Gallin. vel mediâ pulli columbin. Col. subindè additur succ. lim. vel cum eò sumantur gut. viii. vel x. spirit. terebinth.

Emulsio Diuretica. R. Sem. violar. unc. s. lithosperm. contus. dr. ii. aq. fragor. q. f. M. f. Emuls. dulcor. sacch. S. Harn-treibende Milch auf einmahl einzunehmen.

Alia. R. Sem. melon dr. vi. papav. alb. dr. i. violar. dr. i. s. nucl. persic. unc. s. aq. petrosel. alkek. frag. an. unc. iiii. M. f. Emuls. add. ocul. canc. præp. dr. i. sacch. cand. q. f. pro edulcorat.

Boli ex Terebinthina. R. Terebinth. cyp. aq. malv. sæpius lot. unc. s. troch. de alkek. f. opiò, scr. j. pulv. subtiliss. glycyrr. gr. xv. cum sacch. f. q. M. f. Boli 3. minores, m. v. & nocte sumendi.

Pilulæ Diureticæ. ℞. Ocul. canc. præp. dr. s. sal. ononid. scr. i. vol. succin. scr. s. tereb. aq. malv. lot. & coct. dr. iiii. M. f. Pilul. pisi magnitudine, dentur ad scatul. cum pulv. glycyrr. S. Harn-und Griefs-treibende Pillulen, darvon 10. oder 12. auf einmahl einzunehmen.

Pulvis Diureticus. ℞. Cryst. tart. dr. iiii. magist. ocul. canc. sal. ononid. an. scr. iv. M. f. Pulv. S. Vermischter Harn-treibender Weinstein 3. Messer-Spiizen voll auf einmahl zu nehmen.

Alius. ℞. Ocul. canc. præp. dr. i. sem. mil. sol. scr. i. s. tart. vitriolat. gr. xv. M. f. Pulv. divid. ad 3. p. æq. sumendas ex brodio cic. rub. vel aq. ononid. petrosel. malv. cum spirit. sal.

Alius fortior. ℞. Milleped. præp. scr. i. ocul. canc. gr. xv. sal. vol. succin. gr. v. vel vi. M. f. Pulv.

Clyster Diureticus terebinthinatus. ℞. Herb. malv. parietar. mercurial. beton. an. m. i. fl. chamom. melilot. summit. aneth. an. m. s. sem. anis. sænic. carv. an. dr. ii. lin. dr. iiii. coq. in aq. f. q. ad 3. in col. unc. x. dissolv. elect. lenit. vel cass. pro clyst. dr. vi. hier. f. bened. lux. an. dr. ii. ol. scorp. chamom. an. unc. i. tereb. vitell. ov. dissol. unc. s. mell. anthos. dr. vi. sal. parum. M. f. Clyster.

Unguent. ad renes & vesicam. ℞. Ung. de alth. rosac. infrigid. Gal. an. unc. s. ol. scorp. unc. i. succ. limon. dr. vi. M. S. Lenden-Salbl.

Aliud. ℞. Ung. de alth. dr. vi. ol. amygd. scorp. an. dr. ii. pingued. cunic. dr. ii. petrol. dr. i. ol. destill. spic. Juniper. an. dr. s. M.

Cataplasma Foresti, expertum in Ischuriâ vesicali. ℞. Pariet. m. ii. charcol. m. i. s. incis. coq. in f. q. aq. vel lact. ad mollit. Alii etiam addunt cep. sub cineribus coct. add. butyr. rec. unc. ii. ol. scorp. unc. i. s. M. applicetur calidè.

Aliud fortius. ℞. Cep. alb. crud. No. vi. capit. alli No. ii. contus. in mortar. add. pingued. anser. & ol. scorp. q. f. cum guttis paucis ol. destill. Juniper. M. pro Catapl. applicando renibus & vesicæ.



## ARTICULUS V.

*De Officiò Medici, in evacuatione salivali, ac ordinandis Remediis Salivantibus.*

### I.

**I**Nter hætenus dictas universales corporis evacuationes, postrema est *salivatio*, seu universalis *ptyalismus*, quò mediante per copiosorem salivæ effluxum, veluti per universalem apophlegmatismum, universa massa sanguinea serò suò, unà cum vitiosis fermentis in eò contentis liberatur. Indicatur hæc evacuatio principaliter à lue venereâ, & eâ præsertim, quæ sudoriferis non cedit, ossa tamen nondum exesit; sed ubi ulcera, serpigines, tubercula faciei, aut penis & corporis totius sicca, membrorum laniationes. Secundariò verò etiam ab aliis morbis rebellibus & contumacibus, ex vitiò graviore feri oriundis, ut v. g. leprâ seu elephantiasi Græcorum, epilepsiâ, arthritide contumaci, scabie malignâ, ulceribus crurum cacoëthicis, affectibus cutaneis gravioribus, asthma humeroso, cancrò, scorbutò frigidò, idque magis, quando in his malis aliquid venerei intercurrit.

### II.

Materia remedii salivatorii, est potissimum *Mercurius*, qui ob partes suas volatiles, elasticas ac summe evaporabiles, & sulphur peregrinum arsenicale, succum alimentosum, seu massam sanguineam lymphaticam colliquefaciendo, ac coagulata fluxilia, serumque turgescens reddendo, ut torulis suis consistere haud valens exitum affectet, in causâ est, ut illud cum absorptis vitiosis fermentis venereis, aliisque ad os & fauces continuò confluens & affluens, sub fornâ salivæ evacuetur. Modus hunc *ptyalismum* excitandi duplex est, unus, qui per interna peragitur, dum in usum trahitur *mercur. dulc.* vel *turbith. mineral.* Croll. vel *arcanum corallinum*: alter, qui per externa, ut *unguenta*, *suffitus*, qui tamen periculosi, *emplastra*, quæ tamen, sicuti gummata, dolores ac tumores venereos potenter resolvunt, ita ad salivationem excitandam segniora sunt, licet eam promovendi gratiâ; subinde in usum trahi queant. Idem ferme dicendum, de *cingulò sapientiæ*, quod nihil aliud est, quam *pannus laneus mercur. vivo cum pingued. porc.* subactò imprægnatus, qui dein lumbis per modum cinguli applicatur, cum in levioribus tantum malis, scabie nempe & phthiriasi, ubi salivatione opus non est, adhibetur, ut interdum eam excitet. Supra dictis igitur Mercurialibus in usum tractis, fluxus salivæ succedit primò tenuis, hinc mucilaginosæ, tertio denique viscidioris, & foetidæ, quæ finis est perfectæ salivationis.

### III.

Sicuti autem coindicant evacuationem salivalem vires constantes, ætas Juvenilis & Virilis, tempus vernum & æstivum, regio magis calida, quam frigida; ita contraindicant corpus debile, emaciatum, vires exhaustæ, malum nimis radicatum, ætas puerilis & senilis, ulcera ac inflammationes viscerum, phthires, nervorum nativa debilitas, scorbutus biliosus, hæmoptysis, nimis hæmorrhagiæ, tempus autumnale; tum ob frigus, tum ob humores tunc temporis magis lentos, & minus fluxiles, hyemale; præsens quoque vomitus, diarrhœa, sudor vehemens; illa tandem subjecta, quæ ante morbum galli-cum ulceribus oris, vel anginâ, tremore, paralyfi, convulsione, macie &c. fuerunt detenta &c.

### IV.

Pro debitâ hujus curæ administratione, Medici officium erit observare. 1. Cautum debere esse ejus usum,

cum *mercurialia* plerumque post se relinquunt characterem indelebilem, adeoque non administranda, nisi urgente necessitate, morbo nempe ita pertinaci existente, ut decoctò lignorum non cedat, vel illud ob alias circumstantias exhiberi non potuerit. Hinc etiam utile erit, ut Medicus ante hujusmodi curam præmuniat se prognosticò, prædicendo, quæ fieri solent seu bona seu mala; subinde enim efficacissima hæc cura deprehensâ, ut mox exsiccantur ulcera, crustæ evanescant, tubercula, calli destruantur, ac omne seminum morbosum perfecte eximatur, sine metu recidivæ, & quidem tutò, si cum debitis cautelis instituat. 2. Nonnullos corpus prius ad hanc curam per V. S. & purgationem disponendum esse jubere: immò balneum aquæ dulcis, cui æger ante curam quotidie semel vel bis infideat, adhibere, ut humores attenuentur, & pori magis patuli, faciliorem penetranti Mercurio aditum concedant: nonnullos è contra omittere has præparationes, ut ægri nullis evacuationibus debilitati, salivationis impetum multò melius sustinere valeant. 3. Ægrum nudatum collocari debere ad fornacem calidam, inungendo propriis manibus unguentò Mercuriali plantas pedum, talos, genua, carpos, & in malò urgentiori etiam cubitum: immò etiam in pertinaciori affectu, sed rarissimè, spinam: ac continuando aliquandiu hanc inunctionem, donec labia intumescant, parotides doleant, lingua infletur, ac salivatio prodire incipiat. 4. Instituendam manè jejuno stomachò, vel nocte, nam rarò bis eodem die fit inunctio in locò conclusò. 5. Peractâ inunctione (cui simul inter inungendum concinna frictio jungatur) ægrum lecto calido committendum esse, ut sic transpirabili servatò corpore, magis actuetur vis mercurialis.

### V.

Præterea 6. notabit Medicus, inunctionem, si citius labore defungi velimus, vel æger robustus sit, alterò die statim repeti posse: alias interpolationem unius diei faciendam, ac tertio demum die reassumendam esse. Non enim præscribi potest certus inunctionum numerus, cum subinde primò vel alterò statim die incipiat salivatio: ordinariè verò circa quartum vel quintum superveniat, ac ut plurimum per se intra dies 15. finiatur. Interim ubi malum valdè contumax, tardius, & 14to. demum die subinde supervenit. 7. Desistendum esse ab hac curâ, si non sequatur salivatio, sed hujus locò superveniant ventris tormina, dysenteria, dolores ventriculi, sudores frigidi &c. 8. Unicè in hac curâ procurandum esse, ut salivationis actus moderetur ad euphorbiam naturæ, id est, ne vel initium evehatur cum ægri vitæ periculò, neque plus æquò deprimatur, ut elanguescat, antequam symptomata penitus disparuerint. Prius fit per mutationem linteorum & indusiorum, post quartum diem à statû salivationis, uti etiam per alvum ducentia, quæ eam ad oculum diminuunt; hinc si eadem conservanda, non nisi quartò die levis clyster injiciendus; præterea eam cohibent opiata, & theriacalia: posterius fit, tenendo in ore globulum ex *Mercur. dulc. cum tragac.* parat. vel juncturis & volis manuum ac plantis pedum, applicando *Emplast. Vigon. cum Mercur.* vel intus etiam fumendo *Mercur. dulc.*

### VI.

Insuper 9. sub ipsâ salivatione, quàm maximè debitum diætæ regimen observandum esse, jubebit Medicus, præscribendo diætam tenuem, pro potù *decoct. lignorum*, non tamen nimis forte, ne sequatur sudor salivationem impediens, cavendo quàm maximè aërem, vel potum etiam frigidum, ne materia cumulatim ad fauces ruens, repercutiatur cum metu suffocationis, vitando insuper vinum, utpote noxium, ac graviores animi affectus, prospiciendo etiam symptomatibus, quæ cientur à salivatione, qualia ordinariè sunt febris longa, uliginosus & fastidiosus foetor, dentium vacillatio, nigredo &c. Sic dum salivantes tribus vel quatuor primis diebus acerbos sufferunt dolores, ob gingivarum & colli inflammationem, lacte



tepido gargarizatô adjuvandi, & dentes hâc tempore unctuosus non illinendi, ne à mercuriô denigrentur, difficulter vel rursus nunquam dealbandi; præterea etiam si tempore salivationis magna succedat gingivarum hæmorrhagia, ea non statim sistenda, nisi limites excedat.

## VII.

Tandem 10. notandum, salivationem, quæ convalescente ægrô in dies minuitur, leniter adhuc promovendam esse *Mercuriô dulci*, semel adhuc in septimanâ exhibitô, immô etiam postquam convaluit æger, & sub diô rursus versatur. Cessante autem omnino fluxû, ægrum denuò purgandum, ac *decoct. lign. sudoriferum* propinandum esse nonnulli suadent, ad eliminandas fordes, hinc inde forsân restitantes, uti & penitus extirpandum è corpore Mercurium. Alii è contra id præstant, per *flores sulph.* cum foliis auri assumptos, vel auri frequenter in ore gestationem, rursus, si albescit, per ignem depurandi, frictions, Balnea sulphurea &c. 11. Sciendum, curationem hujus luis per *suffumigia* magis periculosa esse, quàm per inunctionem, sicque non adhibendam, nisi omnibus reliquis frustra tentatis. Sunt autem duplicia, & quidem vel *universalia*, totô corpore excepta, dum æger per dies 4. 5. vel 6. sub labrô stragulis cooperitô, ut caput superemineat, vel etiam eodém inclusô, si pustulæ & ulcera sint in eodém, uti etiam in fronte, temporibus & collô, itâ tamen, ut per fistulam foris prominentem aërem hauriat, ignitabulo vivis carbonibus instructô, & infra sellam patientis positô, pulvereque suffutis insperitô, sumum excipit per quadrantem, aut dimidiam horam, hincque in lectum se confert, expectando operationem Mercurii; vel *particularia*, quæ magis in usu, certisque partibus, ut cruribus, vel brachiis, topis aut ulceribus malignis divexatis, adhibentur.

## Formulæ

*Salivantium internorum.*

℞. *Mercur. dulc. ritè præp. gr. x. dentur cum vitell. ov. ascendendo quotidie cum unô granô, usque dum deveniatur ad gr. xxx. & ultra. Vel*

℞. *Mercur. dulc. dr. v. vel scr. ii. extract. scorz. scr. i. M. f. Pilul. No. xxx. dentur pro Dos. vi. vel x. ascend. cum grano quotidie.*

℞. *Turb. mineral. Croll. cum spirit. sulph. parat. vel Mercur. præcipitat. speciatim cum spirit. nitr. aliàs Arcanum corallinum dictum gr. iij. vel iv. sequenti die v. hinc vi. &c. donec omnes doses simul 15. vel 20. grana compleverint, cum raro plûs requiratur.*

## Formulæ

*Salivantium externorum.*

Unguentum simplicissimum. ℞. *Mercur. crud. unc. i. axung. porc. unc. ii. M. in mortar. S. Queck-Silber-Salben, wie bewußt, zu gebrauchen.*

Aliud. ℞. *Mercur. viv. cum s. q. tereb. extinct. & inviscat. ab unc. i. ad ii. ung. pomat. ab unc. iii. ad iv. ol. laur. unc. s. ol. destill. lig. Rhod. scr. s. M. S. ut supra.*

Aliud magis compositum. ℞. *Axung. porc. lib. s. ung. Agripp. martiat. ol. laur. tereb. an. unc. i. s. Mercur. viv. extinct. unc. iii. sublim. dr. i. s. thur. myrrh. an. dr. i. lytharg. dr. vi. M. f. Ung.*

Suffitus. ℞. *Cinnab. unc. iii. antim. unc. i. s. thur. benz. storac. an. dr. iii. succin. myrrh. an. dr. ii. M.*

Alius. ℞. *Mercur. cinnab. antim. oliban. sulph. an. unc. s. M.*

Cingulum sapientiæ magis compositum. ℞. *Argent. viv. unc. ii. ol. vitriol. unc. s. caryoph. dr. i. pic. sulphur. an. dr. ii. album. ov. No. xii. sal. gemm. cor. an. q. s. M. f. Massa.*

## ARTICULUS VI.

*De Officiô Medici, in evacuatione particulari, per Errhina, Sternutatoria, Apophlegmatizantia, & Expectorantia.*

## I.

Inter particulares evacuationes, & præsertim capitis, principalem locum habet illa, quæ fit per *errhina*, & *sternutatoria*; quorum illa lympham seu pituitam per nares proliciunt sine sternutatione, hæc autem, quæ etiam *ptarmica* dicuntur, id præstant cum sternutatione; hinc majori vel minori tantum acrimonia, & gradibus inter se differunt, sique operatio *errhinorum*, dum serum liquant, & fundunt, è papillis glandosis narium, illudque salinis suis spiculis irritant, & titillant glandulosam seu spongiosam carnem, quâ nares intus vestiuntur, & hinc successivè lympham seu pituitam per eam excerni solitam, versus illam proliciunt, ejusque excretionem faciunt, tenuioribus etiam earum partibus, uti juxta veteres haud improbabile est, cerebrum per os cribrosum, & nervos olfactorios penetrantibus, in eoque humores attenuantibus, & serum ad nares deducuntibus, vi particularum acriorum salmarum nitrosarum, aquearum, & detergentium. *Sternutatio* verò fit, dum interior membrana narium, majori particularum suarum acrimoniâ & acutie, irritatur & vellicatur, hinc spiritibus vehementius commotis, ac meningibus in consensum tractis, cerebrum cum membranis se per vices contrahit, & explosis unâ spiritibus in nervos paris vagi, vel juxta alios per consensum irritatis intercostalibus, cum membranâ narium, mediantibus nervis consentientibus diaphragma quoque, & musculi thoracis expirationi inservientes, veluti spasmodicè convulsivè contracti, subitanè impetû aërem elidunt, quousque res irritans excutitur.

## II.

Conveniunt igitur, 1. Motum feri promovendo, illudque evacuando, tum mediâtè ex cerebrô, tum immediâtè ex naribus; hinc etiam vulgò caputpurgia appellantur, ac profunt in affectibus catarrhalibus, ac morbis capitis diuturnis, in excretionem muci per nares abolitâ, vel imminutâ, ut in coryzâ, amisso odoratu, obstructione narium &c. 2. Non tam profunt humores liquando, liquidolique deplendo, vel materiam morbificam displo-dendo, quàm vel maximè sopitum archæum, aut spiritus excitando, ut in apoplexiâ, affectibus soporosis, hysteriis, secundinâ retentâ, & partû difficili, musculis abdominis quoque versus inferiora compressis. Sic Hipp. 5. aph. 35. ait: *Mulier hysterica, aut difficulter parienti, sternutatio superveniens, bona est.* Singultû etiam, teste eodém Hipp. 6. aph. 13. *Singultû fatigante, sternutatio superveniens liberat.* 3. Caput quoque simul virtute suâ cephalicâ, subtili, volatili, aromaticâ, roborando, ut in memoriâ debili, torpore ac defectu spirituum animalium, capite & cerebrô debili, vertigine &c. 4. Profunt abster-gendo atque exsiccando, ut in ozænâ, polydô &c. Huc quoque spectant Medicamenta Ichæmatica, seu sanguinem sistentia, in narium hæmorrhagiâ, naribus intrusâ.

## III.

Sicuti igitur errhina vel sternutatoria in prædictis affectibus indicantur: ita contraindicantur præsertim *sternutatoria*, 1. Organis sensuum affectis, ac imprimis debilitatis, ut in ophthalmiâ, auditus difficultate, tinnitû, aurium dolore &c. 2. In infantibus, senibus, mulieribus gravidis. 3. Partibus, quæ ad sternutationem necessariò concurrunt malè habentibus, ut in doloribus capitis, fracturis vel luxationibus costarum, phibisi, hæmoptysi, stillicidiô



fillicidiô sanguinis, procidentia ani, uteri, Intestinorum &c. 4. In nimium siccis, biliosis, melancholicis; cum magis convenient pituitosis, quibus serum est copiosius, ac cujus coagulationem plurimum prohibent.

## IV.

Pro legitimâ harum administratione Medicus observabit, 1. Ea ordinariè non convenire, nisi præmissis universalibus. 2. Minus ea administranda esse, ubi serum peccat in nimio motu explosivô. 3. Ptarmica nec nimis frequenter, nec aciora convenire, cum commotio cerebri majoris sæpè mali causam præstare soleat, ex conatu ad expellendum fortiori factô. 4. Moderatè usurpata, præsertim si simul sint confortantia & cephalica, vegetam reddere naturam, excitare sensus, roborare cerebrum, serumque abundans evacuare; immoderatè è contra partes à tonô decipere, serumque nimis evacuare, idque non tantum superfluum, sed etiam utile, ptarmica enim purgantium more, humores aliàs etiam laudabiles corrumpunt, & quasi tales prius corrupti fuissent, evacuant; hinc faciliè patet, quid de usu vel abusu tabaci per nares attrahendi sentiendum, ac qualis distinctio adhibenda sit, habitâ etiam consideratione subjecti siccioris vel humidioris. 5. Nimiam sternutationem sisti, lacte vel ol. amygd attractô; sic e iam ex observat. *Frid. Hoffmanni*, oculi angulo compresso sternutationem impediri. 6. Errhina vel præscribi in formâ liquidâ, & de his ægrum tepidè, manè duabus horis ante prandium, vel etiam ante coenam, ex volâ manus aliquid per nares attrahere, ore aquâ plenô, idque ter vel quater, vel formâ linimenti, quod digito vel pennâ naribus, vel ad radicem nasi ad oculi angulum majorem illiniur, vel formâ pulveris, de quô vel vapor tantum, aut parum aliqui attrahendo inspiratur, vel mediante calatrô unum vel alterum granum in nares insufflatur.

## V.

Tandem particularis capitis evacuatio fit per palatum, mediante salivatione particulari, dum saliva moderatè è glandulis oris, locisque vicinis evacuatur, indeque consequenter caput, lymphâ præternaturali onustum liberatur; unde etiam medicamenta hæc præstantia dicuntur *apophlegmatizantia*, à phlegmate scil. eliciendô, uti & salivantia, eò quôd serum sive coagulatum, quod phlegma dicitur, sive fluidum, quod salivæ nomine comprehenditur, illuc trahant. Dicuntur & *masficatoria* ab effectu, quod masficata, affluxum ad fauces promoveant, & resistentem ibidem lympham, vel serum eliminant. Sic v. g. mastix masficata, intra paucas horas ad uncias aliquot sputum elicit. Vim suam exerunt hæc medicamenta, cum glandulas miliares faucium in motum ciendo, ac earum poros, & motu & calore aperiendo, sicque dilatando, tum particulis suis salinis, aculeatis, incisoriis & fundentibus, humores serofos proximius circa faucium isthmus resistentes fundendo, liquando & incidendo.

## VI.

Conveniunt prædicta remedia, atque indicantur, 1. Tam præservatoriè quàm curatoriè, in catarrhalibus capitis, & vicinorum locorum affectibus, ut dentium, maxillarum, gingivarum &c. 2. In vertigine, memoriæ debilitate, affectibus soporosis, suffusione, surditate, auditu difficili, tinnitu, oris foetore, & aphonîâ. 3. Prophylacticè, pro evitandô malignô, & contagiosô miasmate, quod plerumque salivæ se associat; hinc masficata myrrha, zedoaria, vel rad. angelic. cort. cit. &c. optimè malignorum morborum sunt præservativa. Contraindicantur è contra à serô fluxili, tenuiori & salsô; hinc apophlegmatismi in phthisi, tussi, pulmonumque affectibus, cane pejus & angue fugiendi: item ab ipsis oris affectibus, ut uligine gingivarum scorbuticâ, cum laxitate & putredine, ac uvulæ lapsu, nisi adstringentibus maritata,

nunquam enim per locum affectum evacuandum. Præscribuntur apophlegmatismi, vel in formâ siccâ, dum aut simplicia, vel pulvis horum cum mastiche, pannô lineô raro, sed forti per modum noduli exceptus masficatur, aut exinde fiunt trochisci lupinares, quorum unus masficatur, & sæpius in ore volutatur manè jejuno stomachô, vel etiam duabus horis ante coenam per semihoram, ac capite pronô sæpius exspuitur, quod dissolvitur, ablundo postmodum os vinô vel aquâ tepidâ, vel in formâ liquidâ, per modum gargarismi.

## VII.

Tandem ultima evacuatio particularis fit ex pulmonibus, per *anacatharsin* seu *expectorantia*, quæ è pectore mediante tussi superfluos humores ejiciunt. Circa hæc observabit Medicus, 1. Ea pro humoris expectorandi qualitate esse duplicia, & accuratam inter ea esse faciendam distinctionem; alia enim humores crassos, viscidos & lentos incident, attenuant, detergunt, atque membranam interiorum, fibrasque pneumonicas ad contractionem, & excretionem irritant, maximè utilia, in tussi humidâ, asthmate, phthisi, pleuritide, catarrhô suffocativô; unde etiam audiunt *beckica*, *arteriaca*, & *pneumonica*. Alia, quæ agunt humores tenues, acres, salios, ritillantes & rodentes incrassando, pepasimum inducendo, orgasimum tollendo, & acrimoniam fluxilem retundendo, moderando ac figendo; unde etiam audiunt *intercipientia*, quod in viâ ituros ad pulmones humores quali remorentur, utilia quàm maximè in tussi ferinâ, hæmoptysi, catarrhis falsis; ubi materiam acrem tenuem, quæ aërem circum fluendo ab illô fursum ferri nequit, temperant & incrassant. 2. Ea præscribi ut plurimum, vel formâ syrupi & linctus, qui pituitando, seu sensim ac sensim blandè lambendo, seu lingendo assumitur, ut in ore dissolutus paulatim defluat; in quem finem sæpius etiam præscribitur *baculus Glycyrrhizæ*, id est, particula radicis hujus, ut alterô extremô leniter contusô intingi, & in ore sugi possit; vel formâ rotularum, quæ subinde aliis expectorantibus præferuntur, tum quia gratiores, tum quia sensim liquefcentes, magis ingredi censetur laryngem, ac pulmones; vel formâ aq. destillat. sacch. cand.edulcoratâ.

## VIII.

Præterea circa hæc notabit, 3. Expectorantia longius à passu, vel ante eundem m. & v. sumenda, nequiquam verò cum cibo, vel mox ab illô; cum sic adhibita coctionem turbent, lacteas obstruant, & chylum viscosiorem reddant: immo nec potum desuper statim capiendum, ne rosicidum illud parietibus bronchiorum allidens, abluatur. 4. Eadem præsertim dulcia, minus prodesse in subjectis, quæ iisdem abhorrent, ut sceminis hysteriis, hypochondriacis &c. 5. In continuatione horum medicamentorum, aureum illud monitum *Cratonis* observandum esse: ne nimis sæpè & diu utamur dulcibus expectorantibus, cum non tam illabantur pectori, quàm ventriculum & epar lædant; dulcia enim, præsertim continuatô usû, parietes ventriculi laxant, calorem obtundunt, fermenta deiciunt, coctionem & appetitum diminuunt, epar inflant, ac obstructions generant.

## ARTICULUS VII.

*De Officiô Medici, in præscribendis Remediis Errhinis, Sternutatoriis, Apophlegmatizantibus & Expectorantibus.*

### Formulæ

*Errhinorum & Sternutatoriorum.*

### I.

**E**rrhinum liquidum. ℞. Fol. salv. major. bet. av. mi. contus. affund. aq. destill. majoran. vel vin. alb. q. s. exprim.



exprim. per linteum. S. Schnupff-Wässerlein, darvon Morgends nüchtern 2. oder 3. Löffel voll in die Nasen zu schnupffen.

Aliud. ℞. Aq. majoran. unc. i. mann. calab. dr. ii. vel vitriol. alb. gr. v. M. vel simul addē sem. nigell. scr. i. fol. beton. scr. v. ambr. gr. iii. M. S. ut suprà.

Aliud fortius in affectibus Soporosis. ℞. Sal. vitriol. alb. dr. ii. aq. major. unc. i. spirit. lil. convall. dr. i. M. S. Niefs-Wässerlein mit einem Spritzel in die Nasen zu spritzen. Hoc injectum per syringam in nares, insignem quantitatem muci per os, nares, oculos & palatum extrahit.

Balsamus pro Naribus obstructis. ℞. Pingued. anis. cum aq. majoran. ter lot. unc. β. ol. dest. major. gut. v. salu. beton. an. gutt. iii. M. S. Nasen-eröffnender Balsam, darvon einer Erbsen-groß in ein Nasen-Loch zu thun.

Aliud Linimentum. ℞. Ung. ros. pomat. de alib. an. scr. β. ol. major. gut. vi. lavend. gut. i. M. S. ut suprà.

Aliud fortius. ℞. Rad. elleb. alb. clater. an. dr. v. succ. bet. dr. ii. ol. major. & cer. an. q. f. M. f. Linim. cujus portuncula instar ciceris naribus admoveatur.

Pulvis Sternutatorius Timai, expertus in affectibus soporosis. ℞. Elleb. alb. piper. alb. castor. an. scr. i. ol. destill. rut. majoran. salu. an. gutt. ii. M. f. Pulvis subtiliss. S. Starckes Niefs-Pulver, darvon ein oder anderes Gran, durch ein Feder-Kiel in die Nasen zu blasen.

Alius Hartmanni, in Apoplexia usualis. ℞. Fol. major. dr. ii. sem. nigell. dr. i. rad. elleb. nig. scr. ii. mosch. opt. scr. β. amb. gr. v. M. f. Pulv. de quo magnitudo pisi calamò fortiter insuffletur in utramque nares.

Alius tam curativè, quàm præservativè proficiuus. ℞. Herb. major. fl. anib. an. dr. ii. sem. nigell. dr. i. rad. elleb. alb. scr. β. mosch. gr. v. amb. gr. iii. ol. lign. Rhod. gut. v. major. cinam. an. gut. iii. caryoph. gut. ii. Bals. apoplect. scr. v. M.

Alius in Catarrhis. ℞. Fol. lil. convall. p. iii. herb. major. basilic. an. p. ii. tabac. dr. i. M. f. Pulv. tenuiss. cui add. amb. mosch. an. gr. ii. ol. anis. major. an. gut. iii. M.

Alius in Coryza. ℞. Pulv. lil. convall. major. tabac. brasil. an. gr. xv. ol. anis. gutt. ii. Bals. apoplect. gr. iv. ambr. gr. iii. M. f. Pulv. S. Niefs-Pulver.

Alius. ℞. Tabac. ind. unc. β. major. lil. convall. an. dr. ii. ol. destill. anib. gut. vi. caryoph. gut. iii. amb. gr. iii. mosch. gr. ii. M.

Tabacus præstans, Cerebrum simul corroborans. ℞. Herb. major. lavend. rorism. an. dr. ii. rad. Ir. flor. dr. ix. herb. basilic. dr. i. Pulv. tabac. opt. dr. ii. cinam. mac. caryoph. an. scr. i. lig. Rhod. simul. cit. an. scr. iv. ol. lig. Rhod. gut. xxx. mosch. opt. gr. xv. amb. gryf. gr. iii. zibeth. gr. ii. M. f. Pulv. S. Haupt-stärckender Taback.

Alius Catarrhalis & simul corroborans, colore albus. ℞. Sacch. albiss. unc. vi. rad. Ir. flor. dr. v. elleb. alb. dr. vi. Bals. apoplect. scr. β. peruvian. gr. vii. mosch. gr. v. amb. gr. iii. ol. lig. Rhod. gut. v. cinam. caryoph. an. gut. ii. M.

Pulvis Sternutatorius Helmont. ℞. Rad. elleb. nig. Pulv. sacch. an. p. æq. f. Pulvis.

Alius Papalis dictus. ℞. Rad. Ir. fl. part. 2. major. part. i. M.

Pulv. Sternutatorius Mülleri. ℞. Flor. beton. paralyf. salu. lavend. an. scr. i. lil. convall. dr. β. spec. diamosch. d. dianth. an. scr. β. diatr. scr. ii. sacch. cand. ad pondus omnium, add. ol. mac. succin. anis. an. gut. iii. M.

Plures formulas addere superfedeo, cum ex his variè mixtis, infinitè concinnari possint.

### Formulae

#### Remediorum Apophlegmatizantium.

Masticatorium in Catarrhis. ℞. Nuc. mosch. dr. i. mastic. gumm. Arab. an. dr. β. redig. in Pulv. & cum f. q. aq. ros. M. f. Troch. S. Zehlein, darvon ein oder anders in dem Mund zu zerkaen.

Aliud v. g. in difficultate Auditus. ℞. Rad. pyreth. dr. i. Ir. dr. β. agar. troch. scr. ii. cubeb. nuc. mosch. an. dr. β. cardam. dr. i. ex subtiliss. pulverisat. cum f. q. mastic. in mor-

tar. calid. dissol. f. Pastilli, quorum quilibet pendeat. scr. i.

Aliud in metu Paralyfis vel Apoplexiâ. ℞. Mast. dr. ii. β. rad. pyreth. nuc. mosch. cubeb. mac. sem. anis. an. dr. ii. majoran. scr. β. alipt. mosch. gr. iv. cum cer. & mell. inspiss. f. q. M. f. Troch. masticator. pondere gr. xxv. teneat unum vel alterum in ore, masticetur, & collecta pituita exspuatur.

Aliud in dolore Dentium. ℞. Mac. nuc. mosch. an. scr. i. cubeb. gr. xxv. rad. Ir. flor. pyreth. sem. sinap. an. gr. viii. piper. z. z. an. gr. v. pulverisat. subtiliss. excipiantur pauxillâ cerâ & f. Troch. lupinar.

Apophlegmatismus liquidus. ℞. Rad. Ir. Flor. unc. β. fol. orig. salu. stœch. rorism. an. m. β. cubeb. dr. iii. liq. dr. i. β. coq. in æq. partibus aq. & vin. alb. sub finem additi ad lib. i. in Col. dissolv. oxymell. squillit. unc. ii. M.

Alius. ℞. Scob. lign. guajac. unc. β. rad. pyreth. dr. iii. herb. salu. nob. pi. alum. sal. nit. an. dr. i. sem. urtic. sinap. an. scr. i. acet. vini opt. unc. iii. aq. mulf. unc. vi. M. f. Decoct. quò os calidè eluendum, quod magnam copiam phlegmatis extrahit.

Alius in amissâ Loquelâ. ℞. Acor. ver. unc. i. galang. cyper. cost. an. unc. β. mosch. dr. ii. herb. majoran. salu. an. mi. f. Decoct. cum aq. & vin. add. mell. anibos. q. f. M.

Alius in dolore Dentium. ℞. Rad. pyreth. unc. β. fol. nicotian. cord. rad. mandrag. an. d. ii. fol. sabin. persicar. serpill. an. m. β. cubeb. unc. β. alum. scr. i. coq. in vin. & aq. p. æq. ad 3.

Alius. ℞. Rasur. lign. sanct. unc. i. coq. in aq. f. q. vel ℞. Mastic. dr. i. camph. dr. β. coq. in vin. vel acet. lib. β.

Alius. ℞. Origan. majoran. serpill. an. mi. fol. nicotian. p. iii. pyreth. unc. β. sem. nigell. dr. β. cardam. cubeb. an. scr. i. β. mast. dr. i. coq. in aq. f. q. in Col. unc. viii. dissolv. syr. de Nicotian. unc. i. de beton. unc. β. oxymell. squill. dr. iii. M.

Huc quoque spectat Suffitus Nicotianæ per tubulum, vel simplex ejus masticatio.

Rotulæ in fœtore Oris. ℞. Troch. de gall. mosch. dr. i. myrrh. zedoar. an. scr. ii. cort. cit. cubeb. caryoph. cinam. an. scr. i. extr. acor. galang. an. gr. iii. cum sacch. in aq. ros. & fl. cit. solut. M. f. Rotulæ.

### Formulae

#### Remediorum Expectorantium, in materiâ tenui.

Linctus. ℞. Ol. amygd. d. rec. unc. ii. sacch. cand. subtiliss. pulv. q. f. M. f. Linct. S. Mit Zucker-Candi vermischtes süßes Mandel-Oehl, öfters darvon zu nehmen. Utilis præcipuè in infantibus.

Alius. ℞. Ol. amygd. d. unc. iii. syr. viol. unc. i. M. alii etiam addunt conf. ros. vel ℞. Ol. amygd. d. unc. i. sperm. cet. dr. i. syr. viol. de hyssop. an. dr. ii. M. S. Brust-Schleckerlein.

Alius. ℞. Syr. jujub. papav. errat. vel de liquir. an. unc. i. β. M. S. Brust-Staff, darvon zu Zciten in Löffele voll langsam hinab zu lassen.

Alius in Pleuritide usualis. ℞. Mucilag. sem. psyll. aq. violar. extr. unc. i. ol. amygd. rcc. f. igne express. unc. ii. ( apud pauperiores ol. lin. depur. ) syr. viol. sacch. cand. alb. an. q. f. M. f. Linct. detur cum bacul. glycyrrh. S. Husten-Säffil.

Alius. ℞. Syr. de liq. unc. ii. jujub. unc. i. β. oxymell. squill. unc. i. M.

Rotulæ. ℞. Rotul. diacod. alb. vel de succ. violar. vel succ. liquir. inspiss. rotulat. unc. i. dentur ad scatul. S. Husten-Zehlein.

Aliæ in Tussi & Raucedine expertæ. ℞. Spec. diatrag. fr. diatr. f. an. scr. ii. extract. rad. enul. vel liq. scr. i. sacch. fin. in aq. scabios. & tussilag. dissol. q. f. vel unc. iv. M. f. confect. in Rotul. S. Brust-und Husten-Zehlein sich dero zu Zeiten zu bedienen.

Aliæ Catarrhales. ℞. Spec. diatrag. diamarg. fr. an. dr. i. Bol. armen. orient. dr. ii. confect. alk. complet. dr. β. conf. ros. rub. unc. β. cum sacch. in aq. fl. acac. f. q. dissol. M. f. confect. in Rotul. S. ut suprà.

Aliæ.



Alia. ℞. Succ. glycyrrh. inspiss. unc. ℥. spec. diatr. diatrag. fr. gum. arab. rad. Ir. flor. an. dr. i. sacch. cand. alb. unc. iii. cum mucilag. gum. tragac. M. f. Trochisc.

Aqua Claretæ pectoralis. ℞. Aq. tarax. scabios. an. unc. iii. sacch. cand. alb. unc. i. M. & filt. Vel ℞. Aq. tarax. scabios. tussilag. veron. an. unc. i. cinam. dr. ii. sacch. cand. dr. v. M. S. Husten-Wasserlein Löffel-voll zweifs darvon zu nehmen.

Alia. ℞. Aq. scabios. veron. tussilag. tarax. an. unc. i. ℥. cinam. bugloss. unc. ℥. fl. arant. dr. ii. sacch. cand. alb. unc. i. fl. sulph. scr. i. lact. sulph. scr. ℥. elæosach. anis. dr. i. M. ad vitr. S. Lufft-und Husten-Wasserlein.

In materiâ crassâ & viscidâ.

Linctus. ℞. Oxymell. squill. unc. i. ℥. syr. viol. unc. i. extr. croc. scr. ℥. Balf. sulph. anis. gutt. vii. M.

Item. ℞. Oxymell. squill. unc. ii. aq. cinam. vel spirit. ceras. nig. dr. iii. M. Utiles sunt in Asthmate.

Alius Wepferi. ℞. Syr. de erysn. Lobel. unc. i. ℥. oxymell. cileb. Gesner. dr. ii. gum. ammon. in acet. squill. dissol. dr. i. essent. croc. scr. ℥. ol. destill. anis. gut. iii. aq. hyssop. unc. i. ℥. M. f. Linct.

Alius expectorans. ℞. Oxymell. squill. syr. de hyssop. an. unc. ii. extr. croc. scr. i. fl. sal. armon. gr. xxiv. M. dos. coch. i. cum sperm. cet. scr. ℥.

Alins. ℞. Oxymell. squillit. pectoral. Crat. vel looch. san. & expert. an. unc. i. syr. de marrub. unc. i. ol. sulph. acid. gut. vi. M. Vel ℞. Syr. de prass. de hyssop. an. dr. vi. viol. oxymell. squill. an. dr. vii. aq. asthmat. unc. ℥. M.

Rotulæ. ℞. Rotul. diatr. usitat. unc. i. ℥. dentur ad scatul.

Alia. ℞. Looch. san. & expert. unc. ℥. spec. diatr. dr. ii. fl. benz. gr. v. sacch. albiss. in aq. fœnic. dissol. unc. iv. M. f. Rotulæ.

Alia. ℞. Antim. diaphoret. ex regulo dr. i. fl. benz. dr. ℥. succin. alb. prap. mastich. subtiliss. pulv. spec. diatrag. fr. an. scr. iv. croc. orient. gr. xv. Essent. amb. sicc. gr. xvi. ol. anis. gut. vi. fœnic. gut. iv. sacch. albiss. in aq. ceras. nig. dissol. unc. ii. M. f. confect. in Rotul.

Aqua pectoralis. ℞. Aq. ceras. nig. hyssop. an. unc. ii. epilept. Lang. asthmat. an. unc. v. spirit. cephal. Anhalt. complet. vel clix. vii. Matib. dr. ii. spirit. anis. opt. dr. ii. sacch. cand. alb. unc. ℥. M.

Alia expertissima. ℞. Condit. rad. enul. unc. i. ℥. cort. arant. cit. an. unc. ℥. incisa contund. in mortar. affunde aq. hyssop. unc. vi. fœnic. unc. ii. exprim. fortissimè Colat. add. aq. asthmat. unc. i. cinam. unc. ii. looch. san. & expert. unc. ℥. M.

Alia. ℞. Aq. asthmat. unc. vi. ℥. cinam. dr. iii. sacch. cand. rub. unc. ℥. M. f. ebullit. ut sacch. dissolvatur, sumantur 2. Coch. pro libitu. Vel ℞. Aq. asthmat. unc. ii. ℥. spirit. anis. unc. ii. sacch. cand. rub. unc. ℥. M.

Plura vide de Medicamentis Thoracis.

\*\*\*\*\*

## CAPUT VII.

De Officiò Medici, in Affectibus exigentibus curam Lactis, Chalybis, usum Thee, Caphæe, Chocolatæ & Laudani opiat.

### ARTICULUS I.

De Officiò Medici, in ordinandâ curâ Lactis, vel Seri Lactis.

#### I.

**L**Ac, cuius utilitas & necessitas, tum in usu cibariò, tum Medicinali verbis vix exprimi potest, è 3. constitutum est substantiis; quarum prima pinguis, & oleosa

sive butyrosa, quæ ærea. Secunda crassa, sive caseosa, quæ terrena; & tertia tenuis seu serosa. Pinguis temperata est, caseosa frigida & sicca, serosa frigida & humida. Lac ergo totum in activis qualitatibus temperatum, potius tamen ad frigidum inclinans: in passivis verò humidum, ratione pinguis & serosæ substantiæ. Quoad secundas, & reliquas facultates, ratione butyri est epicerasicum, & contemperatorium, sive mitigatorium, ratione feri, absterforium, ratione substantiæ caseosæ, emplasticum & incrassans.

#### II.

Lac illud optimum esse, ex Galen. & Dioscoride colligat Medicus, quod colore candidum, clarum, purum ac sincerum; sapore dulce, omnisque amaritudinis, acrimoniæ, fædædinis & aciditatis expers; odore suaveolens, aut boni saltem odoris exiguum quid spirans; consistentiâ moderatum, hoc est, neque nimis crassum & caseosum, neque nimis tenue & serosum, sibi ipsi continuum, & ungui instillatum coharens, neque diffuens, recens n. ultum, & ab animali benè passò & habitò petium. Inter ejus differentias in usû Medicò usuales, 1. Vaccinum, quod omnium pinguisimum & crassissimum est, substantiæ caseosæ habens plurimum, serosæ minimum; hinc magis quidem nutrit: minus tamen alvum subducit. Sic etiam ob substantiæ crassitiem ægrius concoquitur, citius in ventriculò coagulatur, tardius desendit, difficilius distribuitur, magisque viscera obstruit. 2. Asininum priori contrarium, feri habens plurimum: casei & butyri minimum; hinc alvum magis movet: minus autem alit, concoquitur facile, descendit velociter, ac distribuitur promptè & expeditè. 3. Caprinum, quod mediæ est consistentiæ, neque ita tenue & serosum ut asininum, neque ita crassum ut vaccinum. 4. Ovillum, caprinò crassius, minus usitatum est. Lac vernum dilutius est aslivò, alvumque magis emollit. Hoc in medio suæ naturæ consistit, ac post id tempus sensim crassescit, & evanescit.

#### III.

Hippoc. 5. aph. 64. curam Lactis 1. præscribit tabidis, non admodum valdè febricitantibus, id est, pulmonum ulcere detentis, si non adsit febris putrida, & quidem tum, quia acrimoniam salinam sanguinis contemperat, eamque edulcorat, tum quia parte ferosâ abstergit, caseosâ glutinat, ac butyrosâ reficit: præterea Lac assumptû suave, potû facillimum, nutritû solidum, & quâlibet escâ à pueritiâ familiarius; insuper visui colore delectabile, medicamen arteriam non asperans, guttur lævigans, ad ejiciendam pituitam spiritum facilem reddens, ac inferiorem exitum lubricum efficiens; maxime autem tunc convenit in Phthisi, si dolor molestus cum phlogosi in gutture percipiatur. Curâ hâc Ludovicus XIII. Rex Galliæ phthisicus diu sustentatus fuit. 2. Idem Hippoc. locò citatò lacteam diatram commendat, in præter naturam extenuatis, ac atrophîâ quâcunque detentis, dummodo nullum adsit prohibens, aut contraindicans. Est enim Lac ex omnibus ferè ferculis optimi succi, quod facile digeritur, levique negotiò in sanguinem vertitur, sufficienter quoque alit, corpus roborat, atque impinguat.

#### IV.

Præterea 3. Convenit in hypochondriacis, hysteriis & scorbuticis, præsertim calidioribus, & emaciatis, ac ad talem inclinantibus. 4. Prodest in renum exulcerationibus, ac præcipuè mictû cruentò. 5. In dysenterîâ, ubi non tantum per os assumptum, præsertim coctum cum fern. plantag. & rad. torment. aut symphyt. vel silicibus igniis, aut ferro candenti ustulatum prodest, sed etiam per alvum injectum, adeò ut Sydenham testetur, se plurimos curâsse dysentericos solò lacte, vel ejus ferò tepidè inferiùs injectò, & frigidè superiùs in copiâ propinatò. 6. Hippoc. lib. de morbis. Lac itidem commendat in affectû podagricò præservandò, quod testatur etiam experientia



perientia & ratio, cum non tantum Lac præbeat alimentum simplex optimum, naturæ summè familiare, sed insuper sanguinem dulciorem mitiorèque reddat, particulas in eò aciores contemperet, ac humorum turgescientiam reprimat; licet Podagræ causæ originali, concoctionum nempe ac fermentorum debilitati non contrarietur, sicque etiam omnem paginam non absolvat.

## V.

Sicuti autem in prædictis affectibus Lactis usus maximè proficuum censetur; ita haud raro etiam contraindicatur. Hippoc. allegatò aphorism. 64. sect. 5. ait: *Lac præbere, capite dolentibus, febriculosis, & quibus elata hypochondria murmurant, ac siticulosis, malum. Item quibus febres acutæ, biliosæ defectiones, ac copiosa sanguinis evacuatio facta est &c.* Non igitur convenit, 1. Capite dolentibus, quia halituosum est, ac faciliè corrumpitur. 2. Acutè febricitantibus, cum in his ob acrimoniam caloris depravetur, ac nidorosum evadat. 3. Quibus hypochondria elata, id est, suspensa ob tumorem aliquem, vel abscessum, aut murmurantia ob flatuum inclusorum copiam; In his enim faciliè acefcit, ac in flatum vertitur. 4. Siticulosis, eò quòd tales bile ut plurimum abundant, in quam faciliè lac verti solet. 5. Biliosâ diarrhœâ correptis, ob eandem causam. 6. Quibus copiosa sanguinis evacuatio facta, cum calore nativò depauperati, naturales facultates habeant infirmas, ut lac faciliè vitari, & acefcere possit; licet enim lac alimentum sit euechymum, faciliè tamen etiam corrumpitur, & quidem in ventre præcalidò in nidorem; in frigidò autem in acorem. Dioscorides his addit epilepticos, vertiginosos, & nervorum vitiò detentos. 8. Minus etiam prodest, præsertim assiduus ejus usus, dentibus & gingivis; has enim flaccidas, illos cariei obnoxios reddit; hinc post ejus usum, vinò dilutò aut meracò, aut cui mellis quid admixtum, os colluendum.

## VI.

Cura Lactis alia potest dici *levis*, alia *stricta*, alia *mediocris*. Levis est, in qua solum quotidie manè horâ circiter sextâ vel septimâ, recenter ex asinâ vel caprâ emulctum Lac, vel etiam bubulum, additâ dimidiâ parte aquæ, adjectò quoque saccharò, ne coaguletur, ita tepidum assumitur, vel citra ascendendum & descendendum, ad unc. vj. x. xij. & ultra, vel ascendendo, ab unc. vj. per æuctas quotidie unc. ij. usque ad lib. i. r. s. ij. non exclusis tempore prandii & cœnæ, aliis alimentis boni succi & facilis coctionis. Stricta diætâ lactea est, in qua exclusio omni aliò cibi potûsque genere, æger solò lacte, vel saltem additâ solâ medullâ panis albilimi contentus vivere debet, eâ quantitate illud sumendo, quam stomachus, vires ac ipsa necessitas videtur exigere; ita tamen, ut tota quantitas, quæ singulis diebus bibitur, in 3. partes divisâ, una manè, altera in prandio, & tertia cœnæ locò accipiat. Mediocris est, in qua lactis usus tempore matutinò ritè adhibetur, in prandio verò, parçâ licet manû conceduntur, quæ cum lacte analogiam habent, ac naturam pro necessitate, & rerum circumstantiis corroborare, stomachi tonum conservare, ac inappetentiam arcere valent, ut v.g. pulli gallinac. gallin. capon. solò lacte & furfuribus nutriti, caro vitulina, hœdina, ova tremula, oryza, lacticia, pulmenta lactea, amygdalat. hordeata &c. In cœna hæc eadem non prohibentur, longè tamen parçiori quantitate, quàm in prandio; vel si pro ratione circumstantiarum ægro consultius sit, solum etiam lac in cœnâ assumendum, in potû ab omni vinò, in cujus abstinentia plurimum situm, abstineat æger, contentus aquâ simplici, vel coctâ cum china, lentisc. vel mixtâ cum lacte.

## VII.

Ex triplici hâc lacteâ methodò, prima & ultima, præsertim veluti via media, & magis secura, à plurimis tenetur. Stricta verò, quæ in podagricis plerumque præ-

scribitur, multis suspecta est, & ob sequentes rationes minus tuta censetur. Nam 1. Experimentâ teste, prout refert Sydenham, licet hæc cura multis profuerit, quandiu ne latum unguem ab eâ recesserunt, tamen quàm primum ad sanorum diætâ, utut lenem mitemque sese receperunt, podagrâ confestim reversâ, ægrum longè pejus, quàm antea vexavit, labefactatis nempe naturæ principis, morbo pellendò minus sufficientibus, ut adeò periculosius & diuturnius infestaret; hinc plurimi vel doloribus recenter ingruentibus ab hâc curâ desistere coacti fuerunt, vel podagricos dolores intercurrentes lubentius tolerare, quàm perpetuam & molestissimam solius lactis potationem sustinere maluerunt. 2. Si post continuatam aliquot mensibus lacteam curam, febris, vel morbus aliquis magnus cum virium jacturâ ægrum prehenderit, vel universalis inappetentia, & languor supervenerit, à lacte abstinendum erit, cum tamen periculum sit, ne ventriculus tantò tempore lacti assuetus, omne aliud genus ciborum respuat, aut difficilimè sustineat, atque adeò imbecillis pariens viribus prius deficiat, quàm ad alia assuefacta natura iterum refocilletur; unde etiam aliquos, postquam diu strictioris lactis curæ sese subjecerant, atque paulò melius exinde habere videbantur, magnò tandem aliquò morbo deprehensus, citò interiisse observaverunt nonnulli; hinc meritò hæc atque alia, cautum in hâc curâ reddere debent Medicum, eligendo potius viam mediam utpote magis tutam.

## VIII.

Pro debitò Lactæ Diætæ regimine Medicus notabit, 1. Corpus prius debitè evacuandum, obstructionesque, si quæ adsint, referendas esse. 2. Lac vel asinum, ubi refrigerandum & detergendum, vel caprinum, ubi magis nutriendum, vel vaccinum in podagricis recenter ex ubere emulctum, calidum quatuor horis ante cibum sumendum esse, ita ut æger ab ipsò assumptò neque dormiat, neque corpus validius exerceat. 3. Ne Lac in ventriculò corrumpatur aut acefcit, ad unc. viij. x. addendam esse unciam sacch. vel mell. 4. Signum boni eventus curæ Lactis esse, si urina cocta, nec valdè tincta, nec nimis aquosa, si fæces alvi non crudæ, copiosæ, foetidæ, si nullam sitim causetur. Secus, si stomachus infletur, hypochondria tendantur, alvus indurescat, accedat vomitus, vel diarrhœa, sitis magna &c. quæ signa sunt corrupti Lactis; hinc vel corpus melius evacuandum, vel ab ejus usu cessandum. 5. Antequam æger strictæ se addicit curæ Lactis, natura paulatim ad eam assuefacienda, utendo lacticiis, cibisque cum lacte analogiam habentibus, ut oryzâ in lacte coctâ, amygdalat. hordeat. pineat. avenatis, ovis forbilibus, pullis gallin. capon. carne hœdin. vitulin. &c. usque dum tandem solò Lacte, pro totali alimentò uti possit æger, seu etiam frigidò, in quantitate stomacho & gustui tolerabili, abstinendo à vinò & omnibus aliis. Prædictis cibis uti etiam æger potest, in diætâ lacteâ leviori & mediocri.

## IX.

Præterea 6. Observabit, primò & secundò mense, corpus subinde blandò medicamentò Rhabarbarinò vel aloëico evacuandum, & quidem, quò natura Lactis magis assuevit, majoribus interpositis intervallis: quò minus, minoribus. 7. Si Lac acefceret, vel coagularetur, uti supra dictum, addendum sacch. alb. si corpus exinde calefieret, osque & fauces accenderentur, addendam quartam partem aq. simpl. vel hordei. Si ventrem nimis fluidum faceret, ebulliendum, eique addenda salis communis aliquot grana, si constipetur, Rhabarb. pulverisat. in primò haustu sumendum. 8. Si sitim exciet, extra passum aq. f. vel coctam cum sacch. permitti, tam solam, quàm lacti permixtam. 9. Ab usû Lactis non desistendum esse, nisi febris, aut gravis dolor podagræ supervenerit, neque etiam ob accidentia à lacte causata tam facile cessandum, nisi vomitus & dolor capitis accedant.



10. Quantitatem Lactis assumendi, assignari à tolerantia ventriculi, in curâ leviori ad unc. vi. lib. i. ii. in mediocri, totidem etiam cænæ locò, in strictâ, finitis diætæ diebus, manè unc. 10. 18. 20. & totidem etiam locò prandii & cænæ sumendæ, augendo dosin ad unc. 40. usque. 11. Tempus continuandi diætam lacteam esse ad mensem 1. 2. vel 3. immò in affectibus contumacibus, præsertim podagricis ad annum, vel plures extendendam esse, nisi recidivam experiri velint; quibus tamen ex supra dictis suadendum, ut prandii saltem tempore ad cibos boni succi, & facilis coctionis successivè transeant, ita tamen, ut nec varietas ciborum corruptelam, nec satietas cruditates generet; abstinendo simul à vinò, quod melius, vel non nisi lymphatò parcissimè utendo.

X.

Quibus Lactis usus quandoque contraindicatur, vel ob febrem, aut borborygmus in hypochondriis, aliaque causas, vel epatis ac renum ardor, per veris & æstatis decursum temperandus, humorésque adusti melancholici, ardores vagos & phlogoses præsertim excitantes, uti etiam varios fluxus sanguinis, maniam, scabiem, scorbutum, aliosque affectus ex acidò melancholicò oriundos, temperandi ac evacuandi, quique plus contemperatione, quàm nutritione indigent. Serum lactis, *die Jutten, oder das Käse-Wasser*, vel cum succò cit. vel acet. aut crem. tart. vel tamarindis paratum, & quidem vel simplex vel herbis alteratum, usurpare possunt. Hoc enim non tam bilem flavam quàm atram, exustosque ac falsos humores temperat, vi suâ nitrosâ abstergit, obstructions referat, ardores compescit, atque acria & peregrina salia per Urinam educit. Sumitur quotidie per mensē ad unc. vi. viii. lib. i. quatuor horis ante cibum, vel etiam ascendendo quotidie per unc. ii. ad lib. i. ij. iij. Hinc præposterâ serie sensum ad primam dosin redeundo.

Sequuntur nunc pauca formulæ remediorum Lactis, aut Seri lactis alterati.

Formulæ

Lactis, vel Seri lactis alterati.

**S**erum Lactis in Scabie proficuum. ℞. Ser. lact. cum succ. cit. parat. lib. i. col. bulliat. (tum quia flatulentum, tum ut quidquid adhuc inest casei subsideat) hinc infund. per noct. fumar. m. i. cichor. vel acetos. m. ℞. Col. add. sacch. unc. i. M.

Serum Lactis anti-Scorbuticum. ℞. Herb. rec. nasturt. aquat. cochlear. an. m. ii. rad. raph. rust. unc. i. contus. & conquas. in mortar. marmor. affund. lib. ii. vel iii. ser. lact. depur. stent in locò tepidò per noctem vase clausò. Coll. add. aq. cinam. unc. ℞. M.

Aliud. ℞. Herb. rec. cochl. m. i. rad. helen. armorac. an. unc. i. bacc. juniper. dr. iii. passul. min. unc. i. contus. affund. ser. lact. cap. l' b. ii. vel iii. Col. dulcor. paucò sacch. vel syr. de succ. cit. vel scelytyrb. Forest. Dos. unc. iv.

Serum Lactis destillatum anti-Scorbuticum. ℞. Herb. rec. beccabung. m. iij. cochl. nasturt. an. m. ij. acetos. cichor. a. m. i. Pom. cit. N. 3. vel 4. incid. & pist. in mortar. marmor. affund. ser. lact. q. s. destill.

Serum Lact. Tamarind. Fons. item aliud alterat. herbis pro curâ vernali, vid. superius de Remediis post V. S. præscribendis.

Lac Caprinum anti-Scorbuticum. ℞. Lact. caprin. unc. viii. lib. i. ebull. in eò sol. cochlear. nasturt. beccabung. endiv. cich. ā. p. ii. Col. add. sacch. puriss. parum, ne coaguletur.

Lac anti-Dysentericum. ℞. Lact. rec. lib. i. sem. plantag. dr. i. rad. torment. vel symph. dr. ℞. contus. coq. & Col. dentur subinde 2. vel 3. cochl. alii addunt terr. sigill. ser. i.

Lac in Mictû cruentò. ℞. Lact. ovill. rec. mult.

lib. ℞. mell. ros. purif. dr. ij. bull. leniter, add. Bol. arm. ser. i. Eximium est in hóc affectu ex observat. Forest.

Lac Cancrivam, in Phthisi incipiente proficuum. ℞. Cancr. viv. N. ii. contus. in mortar. affund. lact. vaccin. lib. i. ℞. coq. hinc atque col. Vel ℞. Lact. vaccin. lib. i. ℞. cancr. elix. N. ij. contund. unà cum chel. & test. f. Col. vel per pannum, in delicatis, & ubi mitius agendum, vel Colatorium ferreum durch ein Seichgatze, ut pulvis præcipitans simul transeat, si efficacius agendum, licet minus gratum sit.

Lac artefactum, si fortè Lac naturale vel Serum lactis contraindicaretur. ℞. Sem. melon. mund. unc. i. sem. cucurb. angur. an. unc. ℞. jur. pull. unc. vii. M. F. Emuls. adde si placet, julep. viol. unc. i.

Aliud anti-Hæcticum. ℞. Chin. sel. unc. i. rasur. ebor. dr. ii. repleatur his pullus benè saginat. coque in lib. vi. aq. ad debitam cocturam lento igne. De Col. ℞. unc. vi. add. sem. melon. rec. amygd. d. excort. an. unc. ℞. nucl. pin. rec. dr. ii. M. F. Emuls. aromatizanda modicò mac. Alii accipiunt Decoct. carnis Gallin. Das Henmenbrat-Wasser, & cum eo faciunt prædictam Emulsionem.

ARTICULUS II.

De Officiò Medici, in ordinandâ curâ Chalybis.

I.

**C**halybs, qui aliud nihil est, quàm ferrum artificia-liter magis depuratum & induratum, duplicem juxta Veteres obtinet virtutem, *aperitivam* unam, *adstringentem* alteram. Illam adscribunt particulis volatilibus; hinc non exiguum præstat usum in morbis ab obstructione oriundis: hanc terrestribus atque fixis; unde crocum martis adstringentem paraturi, Chalybem eoque calcinant, usque dum absumptis partibus volatilibus, remaneant fixiores, eoque utuntur in diarrhoeâ, dysenteria, aliisque fluxibus sanguinis p. n. R. R. considerantes Martis corpus homogeneous, quod sub æquali tenore in ignis torturâ perseverat, & quòd mars semper adstringat, ac omnia etiam ex marte parata gustui saporem adstringentem subministrent: fundamentaliter asserunt, eum per se semper adstringere, aperire verò tantum per accidens, quatenus nimirum intra corpus assumptus, reperta in corpore salia sylvestria acida & facile coagulabilia, à quibus induci solent obstructions, absorbet, absorptaque secum per alvum educit, ut adeò hóc modò sublatâ causâ, tollantur obstructions.

II.

Ex dictis facile elucescit, Martem 1. optimum esse Melancholiæ digestivum. Cum enim materialis ejus causa modernis statuatur, acidum vitiosum in primis viis hærens, illud ad martem assumptum accurrit, eumque corrodendo sua amittit spicula ac acrimoniam, & postmodum simul cum marte per secessum eliminatur; hinc post ejus assumptionem faeces ut plurimum nigrò colore tinguntur, præcipitatò per bilem marte cum absorptis acidis in colorem subnigrum. Non male igitur à Zacut. Lusit. Melancholiæ, & mali Hypochondriaci verum alexipharmacum, ac rhizotomus appellatur, quod idem dicendum de affectu hysterico. 2. Insignis panacæa est Cachexiarum, tam virorum, quàm etiam mulierum, & virginum in chlorosi, fluore albò, suppressione mensium; quæ si inveterata, citra materialia vix curari potest, in Cachexiâ ictericâ &c. Hinc etiam omnes pulveres cachecticos mars ingreditur. Non enim tantum, dum humor acidus, ac veluti causticus chalybeata aggreditur, & in substantiam eorum operatur, ferociam & acrimoniam suam propriò veluti ense jugulat, infringit, ac retundit; sed



fed infuper sublatô coagulô massæ sanguineæ jam effœtæ & languescenti, quasi calcar suggeritur, spiritus sopiti & penè emortui, ac pondere pressi, rursus eriguntur, excitantur ac restaurantur, quod vel maxime in puellis cachecticis observatur, dum assumptô chalybe, pulsum nanciscuntur celeriore, validiore, facièmq; magis rubicundam & vividam.

## III.

Pro legitimâ ejus administratione Medicus notabit, 1. Curam chalybis commodissimè administrari vere & autumnô. 2. Ejus præparationem, quò simpliciore, eò meliorem esse. 3. Haud immeritò daminari, & explodi ejus præparationes nimis acidis factas, cum Mars acidô saturatus, nullas amplius in corpore exferat virtutes, sed potius ventriculum oneret, utpote calx fixissima nullô liquore solubilis. 4. Cæteris præparationibus palmam præferre, quæ fit cum alcalinis, aut blandis acidulis. 5. Etiam limaturam Martis crudam intus exhibitam, fructû suô non destitui, dummodô ventriculus non adsit admodum debilis, vel dosi majori exhibeatur. In his enim periculum est, ne Mars in ventriculi fundô subsistens vim ibi vitriolicam & vomitivam acquirat, aut ructus nauseamque cieat, vel appetitum deiciat; hinc etiam refert *Panarel.* se post mortem eorum, qui usi fuerint Martialibus, in ventriculô limaturam Martis adhuc crudam reperisse, ob ventriculi debilitatem.

## IV.

Præterea 6. notabit Medicus, corpus prius ad hanc curam per universalialia disponendum esse. 7. Martialia exhiberi, vel in formâ siccâ, ut v. g. pulv. elect. pilul. &c. vel in humidâ, ut vini, tinctur. essent. &c. In formâ liquidâ ceteris præferuntur ex eô, quod in iis Mars magis solutus: in illis autem magis compactus, majores in ventriculô pariat molestias. Nonnulli hæc ita distinguunt, ut in complexionibus humidioribus eum exhibeant magis in formâ siccâ: in siccoribus verò, & quorum stomachus sensibilibus, in formâ humidâ. 8. Post ejus assumptionem manè jejunô stomachô factâ, deambulatione per unam vel duas horas corpus exercendum esse, capiendò postmodum Brodium carnis vel gallinæ, alteratum rad. petrosel. vel rad. aperit. & passulis. 9. Signum Chalybis ritè operantis esse, fæces nigras per alvum excretas: è contra malum, si post assumpta Martialia non tingantur colore nigrô, cum signum sit, Martem non absorpsisse salia vitiosa corpori noxam minitantiâ. Item si superveniant vomitus, nausea, inappetentia, dolores stomachi &c.

## V.

Infuper 10. Observabit in hac curâ, tertiô vel quartô die clysterem injiciendum, vel lenitivum exhibendum, aut pilulas aloëticas. Aliqui quartô die horâ quartâ pomeridianâ, magnitudinem castaneæ exhibent de Elect. paratô ex rob. sambuc. vel ebul. aut pulp. tamarind. unc. iij. cum diagrydii rosar. scr. ij. Alii & præfertim *Sydenham*, præcipuè in affectû Hystericô Martialia exhibent, sine interjectâ purgatione, ne unâ die destruantur, quod per plures ope chalybis refarcitur. 11. Curam hanc nunc 15. nunc 20. nunc etiam 30. diebus & ultra continuandam esse, pro majori, vel minori contumacia affectûs. 12. Durante hac curâ, legitimam esse instituendam Diætâ, & præcipuè omnia acida, seu in cibô, seu in potû, vitanda esse, quia Martem saturant, ut postmodum saturatus, vitiosa salia relinquat intacta.

## ARTICULUS III.

## De Officiô Medici, in præscribendis formulis Remediorum Chalybeatorum.

**V**inum Chalybeatum. ℞. *Croc. mart. aperit. unc. iij. spec. aromat. caryoph. dr. ij. dentur ad saccul. ex sind. alb. S. Stahlsäckel*, daran 2. *Mafs alten weissen Wein zu gießen*, und 2. *Täg stehen lassen*, alsdann 3. oder 4. *Unzen darvon nüchtern zu trincken*.

Aliud. ℞. *Chalyb. præp. unc. 1. caryoph. dr. j. mac. dr. ʒ. inde saccul. oblong. instar digiti*, assund. *vin. mens. ij. &c.* Quantum de hoc bibitur, tantum semper reasfundatur.

Aliud ex spuma Chalybis. ℞. *Spum. chalyb. dr. j. vin. alb. unc. ij. M. & sic pro reliquis dosibus*.

Vinum chalybeat. Riverii. ℞. *Chalyb. cum sulph. præp. unc. j. rad. enul. cort. med. tamarisc. an. unc. ʒ. fol. fenn. ʒ. unc. iij. epithym. unc. j. fæcul. bryon. cinam. an. dr. ij. spec. diatrion. sant. dr. j. aq. dest. agrim. vin. alb. an. lib. j. inf. per trid. in B. M. de col. sumantur unc. iij. vel iv.*

Vinum chalybeatum attenuans & deobstruens. ℞. *Rad. levist. unc. ʒ. rhab. el. unc. j. chalyb. cum acct. tamarind. præp. unc. j. sal. tart. dr. ij. ment. crisp. m. ʒ. cort. flav. aurant. dr. ij. galang. min. dr. j. incis. & contus. indantur in vas vitreum*, assundendo *vin. malvat. lib. iij. digerantur locô calidô*, movendo aliquoties, per biduum. *Factâ dein remotione à locô calidô*, ne accescat, bibendo quotidie *unc. iij.*

Claretum Martiale Minsicht. probatissimum. ℞. *Vin. alb. opt. lib. iij. chalyb. cum acet. tamarind. præp. unc. j. rad. scorz. acid. tart. an. unc. ʒ. galang. min. cass. lig. caryoph. an. dr. i. M. indita in vas vitreum digere locô calidô*, movendo aliquoties, per biduum. *Dein col. per manic. Hippoc.*

Aliud Vinum Martiale Anti Cachecticum. ℞. *Herb. salv. rorism. an. m. ʒ. absinth. mi. fl. cent. min. p. iv. rhab. el. unc. j. ʒ. cinam. galang. ʒ. 2. an. dr. ij. limat. mart. rec. unc. j. ʒ. incis. dentur ad Nodul. cui superassund. vin. alb. lib. iij.*

Syrupus chalybeat. ℞. *Chalyb. præp. unc. iij. assund. acct. vin. ad eminent. 4. digit. transvers. stant. in locô calid. donec extrahatur tinctura*, tum inclinâtô vase separatur liquor, cui add. *sacch. albiss. q. j. coq. lentô igne ad consist. Syrup. S. Stahl Safft*, darvon ein Löffel voll in einer Brühe oder weissen Wein zu nehmen.

Essentia Martis Hartmanni. ℞. *Limat. mart. candefact. lib. ʒ. extingue semel atque iterum in lib. iv. vin. malv. Dos. ab unc. ʒ. ad unc. ij. ex juscul. vel haustul. aq. cichor.*

Tinctura Mart. ℞. *Tinct. mart. Zwelff. vel Vitriol. mart. Ludovic. vel cum succ. cit. parat. Sorbait. &c. unc. ʒ. detur ad Vitr. S. Stahl Tinctur*, darvon 15. bis gegen 30. *Tropfen aus einer Brühe zu nehmen*.

Bolus chalybeat. ℞. *Chalyb. præp. dr. j. caryoph. gr. vj. cum vin. ʒ. q. M. f. Bol. qui nebulis involutus devoretur, superbibendo 3. vel 4. cochl. vin. absinthit. vel malvat. & sic pro cæteris dosibus*.

Electuarium Chalybeat. ℞. *Limat. chalyb. præp. unc. j. ʒ. conserv. fumar. unc. iij. ʒ. condit. cort. cit. dr. vj. confect. alkerm. unc. ʒ. syr. de cort. cit. q. ʒ. S. Vermischte Stahl-Latwergen*, einer Kesten groß darvon zu nehmen, und ein wenig Wein oder Malvasier darauf zu trincken.

Aliud. ℞. *Limat. mart. acet. præp. unc. vj. cinam. nuc. mosch. an. dr. iij. rhab. dr. ij. spec. arom. ros. dr. iij. mell. opt. sacch. alb. an. unc. xij. cum lentô igne F. Elect. Dos. unc. ʒ. v. horis ante prandium, superbibendo unum vel 2. cochl. vin. Malv. vel absinth.*

Morselli



Morselli chalybeat. ℥. Chalyb. præp. unc. i. cass. lig. scr. iv. croc. scr. β. mac. scr. ii. caryoph. scr. i. sacch. fin. in aq. cinam. dissol. unc. iii. F. Morsel. N. viii. c. piat m. unum.

Tabellæ chalybeat. ℥. Chalyb. cum sulph. præp. vel pulv. cachect. Quercet. unc. β. confect. alk. dr. ii. ambr. gryf. scr. i. sacch. fin. in aq. ros. & naph. dissol. unc. iv. f. Tabell. capiat. dr. ii. quotidie manè.

Pilulæ chalybeatæ Sydenham. ℥. Limat. mart. subtiliss. gr. viii. cum f. q. extract. absinth. M. f. Pilul. No. viii. sumantur summo manè, repetanturque horâ quintâ pomeridianâ per dies 30. superbibendo haustum vini absinth. vel malvat.

Utiles quàm maximè in affectû hytericô, chlorosi, ac omnibus morbis chronicis, ex acidô oriundis.

Aliæ in morbis Chronicis usuales. ℥. Limat. mart. subtiliss. gr. xv. rhab. pulv. scr. i. cum succ. absinth. q. f. M. f. Pil. No. xv. vel xxi. superbibendo brodium amarum & diureticum.

Aliæ chalybeatæ Riverii. ℥. Chalyb. cum sulph. præp. unc. β. alcës opt. senn. f. agar. troch. rhab. el. an. dr. i. spec. diarrhod. Abb. dr. β. croc. scr. β. cum syr. ros. sol. f. mass. Pilul. de cuius dr. i. form. Pilul. No. xxiii. deaur. quas capiat æger m. singulis diebus, 3. horis ante pastum, continuando per 15. dies.

Pulvis chalybeatus anti-Cachecticus. ℥. Pulv. cachect. Quercet. dr. β. S. Stahl-Pulver fünffzehn Tag lang Morgens nüchtern aus einer Brühe zu nehmen.

Alius. ℥. Chalyb. præp. dr. vi. sal. absinth. tamarisc. card. b. an. scr. i. saccul. aron. dr. i. ocul. cancr. præp. scr. iv. cryst. tart. unc. β. Pulv. caryoph. scr. iv. M. f. Pulv. sumatur omni manè dr. i. ex brod.

Alius. ℥. Chalyb. præp. unc. i. β. cass. lig. opt. faccul. aron. cryst. tart. an. dr. ii. ol. caryoph. gut. xx. cinam. gut. vii. sacch. rosat. tabul. dr. vi. M. Dos. dr. i. m. ex Jusculô.

Alius simplex in suppressis Mensibus utilis. ℥. Mart. cum sulph. præp. dr. vii. cass. lig. dr. i. M. f. Pulv. divid. in xvi. p. æq. de his una quotidie sumatur, obambulando desuper per 1. vel 2. horas, & terciô quolibet die 4. horis à pastû, magnitudinem castaneæ de Elect. laxat. fumendo. Cura hæc, teste Sorbait, intra 16. dies plerumque hunc tollit affectum.

## ARTICULUS VI.

### De Officiô Medici, in suadendô usû Thee, Caffè & Chocolatæ.

#### I.

**T**hee & Thea, folium fruticis cujusdam, quem plures inter species *sumach* referunt, in Chinâ & Japoniâ nascens, atque inde siccando involutum, & conglomeratum in Europam delatum; quoad qualitates primas, calidum est in primô gradu, & siccum serè in secundô; duplicem possidet substantiam, quarum una volatilis & spirituosâ, odore suô suavi & jucundô, aquæ communicatur; altera verò fixa & terrestris, sapore suô amarô, & nonnihil adstringente se prodit. Commendatur hæc Herba, 1. Ad somnum pellendum, à cænâ præsertim assumptum, quod præstat, tum quia calor actualis, quô potatur, spiritus agitatur, tum quia spirituosâ, volatili, & odoriferâ parte, spiritus dissipatos reparat: amarâ verò & diureticâ, alimentorum humiditatem somno necessariam absorbet, & per urinam pellit, tum quia superius orificium, constringendo vapores ad somnum necessarios, frænâ & impedit. Ob easdem causas prodest etiam in vertigine, affectibus soporosis, & catarrhis. 2. Medetur doloribus capitis, impediendo cruditates, ac vapores discutiendo. 3. Solvit ebrietatem, corpusque nimis Baccho pessumdatum, integritati suæ restituit. 4. Moderatè siccatur, cerebrum purgat, memoriam fir-

mat, mentem purificat, ac alacriorem reddit. 5. Stomacho, digestionique juvenandæ inservit, aciditatem nimiam corrigendo, ac slipticitate fibras constringendo. 6. In Nephritide, calculô, & arthritide, cæteris paribus præservat, cum experientia testetur, Chineses hujus potui indulgentes, hisce affectibus non esse obnoxios. 7. Alii etiam commendant ad lumbricos, vapores hypochondriacos & hystericos, phthisin quoque, si lactis vaccini calici, quod leviter prius ebullit, aquæ duos cyathos, in quibus dr. 1. Thee infusa, admiscueris, cum sacch. unc. β. & calidè per menses 2. propinaveris.

#### II.

Modus utendi Thee in hoc consistit, ut accipiatur cyathus aquâ plenus, qui immittitur in vas peculiare ad hunc usum destinatum, quod igni apponitur, & dum aqua effervesceat, ab eodem removetur, & dr. β. vel dr. i. fol. Thee injicitur, hinc vas tegitur, ac foliô fundum petente, in vasculum porcellanum, vel faventinum effusum, calidè sorbillatur, additô, si placet, paucô saccharô. Quod in fundô remansit folium, etiam secundâ vice adhiberi potest, sed tum cum aquâ coquatur necesse est. Japonenses, pulverem foliorum aquæ ferventi injectum, simul hauriunt. In Persiâ parum anis. fœnic. vel caryoph. injiciunt. Sumitur plerumque manè, vel in affectibus stomachi ac capitis, per consensum Ventriculi, statim à prandiô, vel quâcunque horâ, ac pro somnô impediendô, à cænâ.

#### III.

Sicuti autem usus hujus herbæ Thee subindè maximè proficius; ita ejus abusus, ac frequentior compotatio improbat, præsertim in subjectis calidioribus & siccioribus, dum humidum nativum citò nimis absument, caloremque ac vitam instar flammæ lampadis oleô consumptô extinguit, ut adeò extrema non solum in morali Philosophiâ, sed & in Medicinâ, vitiosa sint. Cæterum plures his temporibus proprietates Thee adscriptas, tribuunt quoque simplicibus sub nostrô cœlô crescentibus, quæ substitui haud immeritò possunt, si eodem modô præparata sumantur. Sic in affectibus capitis uti possumus *Roremarinô*, *betonicâ*. In affectibus pectoris *salviâ*, *Veronicâ*, *pulmonariâ*. In affectibus renum *Veronicâ*, *gran. Juniper*. In arthriticis *chamædry* &c.

#### IV.

*Coffè*, vel *Capheè*, est leguminis peregrini species, magnitudinis nostratum fabarum, à quibus non admodum abludit, orta ex arbore *Evonymô* vel *cerasô* simili, ex Arabiâ felici in Europam delata, quæ debitô modô pulverisatur ac torretur, ut phlegma spiritus ejus irretiens exhalet, usque dum semiuista & colore castaneô, vel subnigrô tincta appareat, ac panis veluti adusti odorem referat. Coctio ejus paratur, dum accipitur olla ansata stannô obducta, illique infunduntur aq. unc. x. vel lib. i. quibus, cum super igniculô carbonariô efferverint, injiciuntur pulv. dr. iij. sedulô cavendo, ne quidquam effundatur, cum pulvere aquæ immisso illic celeriter in spumam agatur, unde, quamprimum aqua ollæ labia attingit, igne amovenda rursusque admovenda, usque dum duodecies circiter ebullierit; hinc cineribus calidis imponenda, donec magma fundum petierit & decoctio flava & limpida supersit, tunc calici porcellano vel faventino infusa, calidè sorbillatur, additô si placet pro delicatis, paucô sacch.

#### V.

Qualitates primas quod attinet, *Coffè* calidum & siccum statuitur, prius deducitur ex amaritie & acutô sapore, posteriùs ex tostione, reliquæ exinde emergentes qualitates, cum sulphure & sale volatili sceateat, sunt



roborare stomachum, detergere, obstructions referare, urinam movere, vapores in cerebrum ascendentes retundere, somnum avertere &c. Quoad affectus, convenit illud, 1. In adjuvandâ coctione stomachi, ubi vinum locum non habet, ut v. g. in abstemiis, cephalalgia detentis, laborantibus stomacho ex prægressâ ebrietate, idque præstat, tum volatili ac subtili suâ substantiâ, nimiam fermenti stomachici aciditatem obtundendo, ac terrestri adstringendo & humiditates exsiccando, tum alcali suo acidas cruditates absumendo, & corruptioni resistendo. 2. In necandis lumbricis. 3. In referandis obstructionibus, in chlorosi, suppressione mensium. 4. In præservandâ hydrope, calculo, podagrâ. 5. In febris intermittentibus diuturnis. 6. In cephalalgia per consensum stomachi. 7. In somno arcendô, poros cerebri apertos tenendo, liberumque spiritibus transitum sternendo. 8. Cum lacte decoct. vel cum aquâ paratum, & cum æquali vel majori parte lactis mixtum, vel ante vel post lac assumptum, prodest in Phthisi.

## VI.

De hâc decoctô *Coffeæ* sumitur manè unus vel alter crater. Qui ad stomachi invaletudinem eò utuntur, sumunt immediatè post prandium, additis *caryoph. contus.* vel *cinam.* vel *cardam.* vel *sacch. ambrat.* Sicuti autem in prædictis affectibus suo modò locum habet, atque indicatur usus *Coffeæ*, ita minùs idoneus ac contraindicatur, in nimium macilentis, biliosis, stomachis nimium calidis, eisque, quibus vasa sanguine subtili, rapidiusque circulante sunt repleta. Item quibus tussis, & sputum frequens, ab acriori sanguine oriundum, uti & Phthificis consummatis.

## VII.

*Chocolata* seu *Succolata*, est species solidæ Pastæ Americanis frequens, & formâ Pastillorum vel Tabellarum ad nos delata, ac ex variis ingredientibus, quorum præcipuum est *Cacao*, quæ est fructus cujusdam arboris, ac species quædam amygdalarum composita. Ex hâc fructu exprimitur succus, inspissatur, additurque *cinamom.* *piper mexican.* *caryophyll.* *Vanilli.* *achiota* & *sacch.* Alii etiam addunt *aq. naph. amb. mosch.* alii alia, ut adeò inter authores pro locorum usu, vel pro cuiusque sapore, aliqua discrepantia in ejus compositione observetur. Bonitatis signum est, ne mucidum oleat, nec vermiculis erosa sit, nec masticando quid displicens, aut nimis aromaticum sapiat. Modus ejus bibendi vulgarissimus est, dum aqua bulliens infunditur crateri, quem ebibere cupis ad medietatem: inde Chocolatæ tabella una aut altera dissolvitur, donec inspissata satis appareat, mox probè lignò denticulatò agitatur & in spumam vertitur: tandem reliqua crateris medietas aquâ calidâ cum saccharò repletur, ac calidissimè forbillatur. Aliqui dissolvunt eam in aquâ frigidâ, lignò denticulatò agitant, spumam elevatam in aliò reponunt vase, reliquum cum .l. q. sacch. igni apponunt, & ubi adhuc calidum est, spumæ prius separatæ affundunt, totumque epotant. Nonnulli citò eam parantes aquam calefaciunt, ei derafam Chocolatæ tabellam admiscunt, dissolvunt, lignò agitant, & necdum separatâ spumâ hauriunt. Sunt, qui ante ejus haustum aq. frigidæ haustum sumunt, aut biscoctorum par intingunt. Alii eam glaciæ refrigeratam potant, quæ palato potius quam valetudini conveniens est. Si sanitatis gratia bibatur, sufficit ad duas vices quotidie ad summum, & potius horis matutinis eam sumere. Diebus canicularibus eadem abstinere melius est.

## VIII.

Qualitates ejus quod attinet, temperata est, si præcipuè piper & caryophylli exinantur, prout nonnulli faciunt, frigidis cacao particulis ab ingredientibus calidis temperatis. Bibitur à plurimis potius ex consuetu-

dine & deliciis, quàm morbi curandi aut præcavendi gratia, interim utilis est stomacho debili, exhausto & flatulento. Utilis iter facientibus, & quidem tam iranè, antequam itineri se committunt, quàm vesperi, absolutò diei pensò. Item Prædicatoribus, seu ante, seu post sermonem. Ante eum enim, pectoris & vocis vires diutius quàm Jusculum suslinet, post verò exhaustas corporis vires reparat. Utilis etiam ob vim ejus unctuosam ac nutritiam Hæcticis & atrophici laborantibus: præterea semen auget, ac in scorbutò acidum salum temperat, imprimis si cum lacte sumatur. Abstineant ab ejus usu Juvenculæ chlorosi laborantes, alique omnes obstructionibus detenti, ac chylò corruptò, & crudis indigestisque humoribus in stomacho itabulantibus præditi; tollendus etiam abusus, ac nimia ejus potatio, cum pingues ac butyrosæ ejus partes, quibus abundat, non ritè ubique per corpus distribuuntur, & necessariò in venarum angustiis hæreant, ac obstructions & infarctus generent.

## ARTICULUS V.

## De Officiò Medici, in præscribendô Laudanò Opiatò.

## I.

**L**audanum Opiatum, sic dictum, quasi Laudatum ex Opiò Medicamentum. Paratur enim ex Opiò, quod est succus expressus & condensatus, vel capitum papaveris cujusdam peregrini, præsertim Thebaici, thyrsis seu scapis vulneratis, vel ex totâ plantâ, & hoc à nonnullis dicitur *Meconium*. Præparationes ferè tot sunt, quot authores. Optima ejus correctio consistit in ejusdem depuratione, in leni sulphuris foetidi, inflammabilis, immaturi evaporatione, ac virtutis extractione per mensuram, qualia nonnulli accipiunt *salina*, *lixiva*, ut v. g. alcahest. vel tinct. tart. alii *sulphurea*, ut spirit. vin. quia opium abundat sulphure, quod vappidæ & halituosas opii particulas naturæ amicas reddit, neque vires ejus obtundit; alii *aquea*, ut v. g. aq. destillat. vel destill. ror. majal. quia opium non privant virtute salina, ut acida, nec illam secum auferunt, ut spirit. vin. alii tandem *salina acida* adhibent, ut v. g. acet. destillat. succ. cydon. &c. tum quia acidum ejus correctivum venenis adversatur, tum quia acrimoniam & caliditatem ejus corrigit, tum quia sal volatile ab acidis fixatur, ac acida etiam stomachum roborant. Nobis hîc in usu est *Augustanum*, & quod priori multò præstantius, minùsque caput turbat, Laudanum cydoniatum *Helmont.*

## II.

Qualitates ejus quod concernit, statuunt aliqui illud esse *frigidum*, quia effectus producit frigidos, ut stuporem, somnum profundum, ac quia corrigitur calidis, & propinantur calidissima, si periculum ab assumptò opiò immineat. Alii *calidum* pronuntiant, quia frigiditate in tam modicâ quantitate nocere non posset, quòd odore grave, sapore amarum, atque inflammabile; sudorem etiam excitat, pruritus & sitim causatur. Alii vim ejus Narcoticam occultæ adscribunt qualitati, alii in eodem partes heterogeneous agnoscunt, calidis tamen prædominantibus; alii juxta principia ejus chymica, (cùm constet sulphure copiosò vaporosò cum sale volatili, præsentibus etiam partibus aqueis & terreis, unâ cum salinis fixis in capite mortuò residuis) vim agendi adscribunt effluviis vaporosis, quæ poros cerebri apertos & dilatatos obstruunt, spirituum animalium effrænem influxum impediunt, eosdem volatili sulphureâ visciditate figunt, ad invicem agglomerant, ligant, sopiunt, & quasi torpidos reddunt.

## III.



## III.

Ufus generalis *Laudani Opiati* est, ut sit veluti *Panacea* omnium dolorum, fluxionum, evacuationum nimiarum & vigiliarum. Specialem quod attinet, convenit. 1. In febribus intermittentibus, præmissis emeticis & purgantibus, mixtum pulveribus antifebrilibus. 2. In continuis malignis cautè cum eò mercandum, nec usurpandum, nisi mixtis alexipharmacis, ac in minori dosi, & inprimis vel in augmentò morbi, tum quia spiritus, ne tam citò resolvantur, quasi coërcet, tum quia graviora mitigat symptomata, vel præcipuè in declinatione, si jungantur dolores intensi, vel excretiones humorum quæcunque impetuosa, ac in specie catharhi, tussis, vomitus, diarrhœæ. Instante crisi vel die criticò non temerè dandum, ne natura in conatù suò impediatur. In variolis & morbillis dandum mixtis expulsi-  
vis, tum pro sistendò alvi fluxû & præcavendis nervosi generis symptomatibus, tum pro mitigandis urgentioribus symptomatibus, & promovendâ excretionem cutaneâ. Cum etiam sudorem moveat, hinc *The-riaca* & *Mithridatium* demptò opiò, nullum vel par-  
cum excitant sudorem. Videtur autem excitare sudorem, vel quòd natura refocillata excretionem per sudorem moliatur, vel quòd somnus fluxiones omnes sistat exceptò sudore; vel quòd sulphur ejus tenuius à sale volatili propulsum, per cutim expiret.

## IV.

Quod ad affectus *Capitis*, prodest *Laudanum Opiatum* in *Cephalalgia* & *Hemicrania*, mixtum præcipuè cum specificò cephalicò, in *Vertigine* per consensum, figendo humores ac subtiles spiritus, in *Maniâ*, sanguinis fervorem, ejusque inordinatum motum spirituumque effrænem impetum sistendo, somnûmque, à cujus defectû delirium augetur, procurando, *Epileptici* mixtum quoque prodest, acrimoniam humorum vellicantium sistendo, vel eos in centrò ligando & partem roborando, maximè in infantibus ac adultis, ubi simul tormina & partium membranarum vellicationes adsunt. Videndum tamen, ut cautè procedatur, ne si natura ad exteriora contendat expellere causam morbificam, hæc motû inhibitiò circa cor reſtitet, & suffocationem excitet. *Catarrhos* tenues & acres ad miraculum usque sistit, eosque ad pepsimum deducit.

## V.

Quoad affectus *Pectoris*, optimè prodest *laud. opiat.* in *Tussi*, exortâ à materiâ tenui & acri, si thorax non est infarctus à materiæ copiâ. Sunt, qui nullam tussim sine opiaris feliciter tolli posse putant; unde licet minus convenient, ubi viscosi, crassi & glutinosi humores in Bronchiis pulmonum continentur, tamen & in hoc casû convenire possunt, dosi refractâ & secundariâ, cum incidentibus maritata, vel interposita, cum archæum sopiant, naturam robovent, tussim sedent, ac materiam concoquant. Prodest quoque in *Asthmate hypochondriacò*, non verò in *Asthmate hydropicorum*, vel ubi restagnans ichor, spiritualibus partibus jam intentat periculum. In *Pleuritidis* initio, specificis volatilibus misceri potest parcius, sicuti in declinatione fixioribus. Expectoratio enim sic melius succedit, vires confortantur, & ipse morbus longè felicius ad finem decurrit. In *Phthisi*, optimum est, si oriatur ex defluxu humorum acrium & salforum ad pectus, vel à spûtò sanguinis: non verò, si ab ulcere pulmonum, cum sic spurum sistat, & ægros suffocet, maximè, si dosi ordinariâ exhibeatur, dosi verò refractâ commodè etiam hic in usum vocari, & cum aliis misceri potest.

## VI.

In affectibus *Cordis*, à resolutione spirituum oriundis, cordialibus parciſſimè admixtum, maximè prodest; sic

quoque in *palpitatione Cordis*, *Lipothymia*, aliisque symptomatibus *hystericis* & *hypochondriacis* nihil præsentius *Laudanò opiatò*, resolventibus & præcipitantibus mixtò, hinc additum pulv. absorb. *Wedel.* plurima in his affectibus, eòdem teste, præſtitit. Quoad affectus *Ventriculi*, utilissimum est in *Cholerâ*, dummodò non intempestivè exhibeatur, cohibendo causam morbificam. Solatur etiam *Cardialgia*, mixtum carminativis vel præcipitantibus. In *Singultû* quoque prodest, mixtum castoreatis. In *Vomitu* etiam, seu ab hypercatharsi, seu ab aliis causis excitatò, mixtum cum *The-riac.* & *conſect. alk.* vel datum in pilul. cum *ol. ment.* vel *cinam.* In *Appetitû nimio* valet, datum cum absorbentibus. In *hypochondriacorum* & *scorbuticorum* quibusdam affectionibus, inquit *Willis*, se malle quovis medicamentorum genere, quàm opiatorum usû destitui, non enim solummodo contra Dolores & Vigili-  
as pertinaces, verum in paroxysmis *Asthmaticis*, in *Vomitû*, *Diarrhœâ*, quin etiam in *Vertigine* & pathematibus *Convulsivis*, nullum præstantius expertus est remedium.

## VII.

Quoad symptomata *Intestinorum*, prodest in *doloribus Colicis*, modò non adsit humorum in intestinis infarctus, cui prius medendum, tam per se exhibitum, præſertim in colicâ biliosâ, quàm cum purgantibus dosi refractâ mixtum. In *Ileò* est sacra anchora & extremum solatium, vel mixtum cum purgantibus, ut unâ fideiâ & dolor & materia morbifica tollatur, vel quod magis in praxi & usû, primò doloribus succurrendum per opiatum, hinc purgante alvinæ fæces exſtimulanda. In *Diarrhœis*, statim sæpè fluxum sedat, magnâ cum ipsius ægri & adstantium admiratione. In *Dysenteriâ*, licet opiata quibusdam malè audiant, & narcotica necrotica dicantur, tamen sine iis vix vera dysenteriae curatio fieri potest; neque enim tam fluxum sistit Opium, quàm eum moderatur & corrigit, dolores minuendo, morbumque in centrò detinendo. Datur optimè maritatum cum bezoarticis, præſertim in epidemicâ. Si dolor & fluxus urgeat, majori dosi opus est. In *Dysenteris indolentibus*, & ex inflammatione intestinorum ortis, cautius eodem utendum. Prodest etiam in *Hæmorrhoidibus* immodicis & dolentibus.

## VIII.

Quod affectus *Renum* & *Articulorum*, prodest quoque in *Calculò*, dextrè adhibitum, id est, si dolor & vigilie urgeant, additum temperatioribus, lithontrip-  
ticis & nervinis, v. g. *ocul. canc. succin. cinnab. &c.* præſertim si calculus nondum è renibus fuerit egres-  
sus, vel saltem leviter inde motus: immò dum jam hæret in ureteribus, datò *Laudanò*, non in totum sopitur expultrix facultas, ut nihil ampliùs agat, sed dolores sopiuntur, ut facultas expultrix roborata eò valentiùs insurgere possit. In *Podagrâ*, si diri ac diurni dolores ac vigilie infestent, ut causæ vestem induant, & urgendo ad se curationem trahant, ad *Laudanum* ceu asy-  
lum confugiendum, aliàs cautè procedendum, cum malum contumacius reddere, motumque naturæ impedire possit. Maximè potest in *Arthritide* vagâ scorbuticâ p. p. Exteriùs quoque in articulari morbo prodest, mixtum cum *spirit. formic. lumbric. & sal. ammon.* Cavendo tamen, ne opiat, humor pec-  
cans in tophaceam duritiem transeat.

## IX.

In affectibus *Hystericis*, *hysteralgia*, mensibus immodicis, fluore albò, divinum est auxilium, seu mixtum castoreo, seu aliis appropriatis vel absorbentibus. Cum ambratis maritatum, *aphrodisiacum* evadit non contem-  
nendum. An in amputatione crurum *spacellatorum*, narcotica sint adhibenda, dubitatur, aliis id negantibus,



cum levia non juvent, & valida sint periculosa: aliis affirmantibus, ut sanguinis fervor, motus ac inflammatio inhibeantur. Alii, circumstantias omnes bene attendendas esse jubent, neque obstare arbitrantur, quò minus præcedente operationem nocte opiatum moderatâ dosi propinari possit, cum æger hinc animò sit alacriori, & multa præcaveantur symptomata. Par ratio est in sectione calculi.

## X.

Quoad usum externum, variis dolorum generibus auxiliatur opium. Sic in doloribus capitis, mania, phrenitide, vigiliis, unguentis additur, illinendis temporibus & naribus, vel epithematibus. Ad Podagram opium cum lacte muliebri dilutum commendatur. Agit autem extrinsecus, non stuporem partis excitando, prout credebant veteres, sed quatenus per poros subtilior pars sulphurea & mercurialis sanguini communicatur, & hinc vires suas ordinarias, licet remissiori longè gradû, & refractè exferat. Sissit etiam extrinsecus hæmorrhagiam à vulnere, narium, ab exulsò dente oriundam. Item prodest in dolore dentium, pilula ejus denti excavato indita. In clysteribus id etiam nonnulli addunt, si extremi urgeant dolores, sed non in magnâ dosi, v. g. Philon. Rom. vel theriac. rec. ad dr. i. vel laud. opiat. gr. v. vel vii. sed cautè, cum usus internus longè tutior sit. Suppositoriis additum, prodest exulcerationi intestinorum, quod tamen ultra quadrantem horæ non detinendum.

## XI.

Pro debitò Regimine ac legitimò hujus usû, sequentes Medico observandæ sunt cautelæ. 1. Laudanum opiatum exhiberi posse formâ solidâ, mediâ & liquidâ; in formâ solidâ vel in electuar. cum confect. alk. vel in Pilulis cum aliquò extract. vel in trochisc. vel in pulv. cum sacch. cand. vel magist. mat. perlar. immò omnibus pulveribus misceri potest. Sic mixtum cum CC. phil. præp. & cinnab. nat. laudatum est medicamentum, in arthritide vagâ, vel miscetur cum pulv. cephalicò, bezoarticò, adstringente &c. Potest etiam talis pulvis misceri emulsionibus. In forma liquida exhibetur, sub titulò tincturæ anodynæ, essent. aut tinct. opii. Dissolvitur etiam laud. opiat. in syrup. aq. destill. emuls. vino, brod. aliisque liquidis. 2. Dosis laud. opiat. vel esse ordinariam vel extraordinariam. Ordinaria est infima, media & summa. Infima in adultis est gr. dimid. vel i. Media gr. ij. vel iij. Summa gr. iv. v. quæ tamen non facilè exhibenda, nisi præcedentes doses absque effectû jam sint exhibitæ. Præterea notandum ex praxi medicâ, laudanum opiatum præscribi, vel intentione primariâ, v. g. dolores vel vigilias, vel excreta, aliæque symptomata urgentia attendendo, & sic ad gr. i. ij. iij. præscribendum, vel intentione secundariâ, v. g. ad roborandum, sanguinem fluxilem concentrandum, addendum illud aperientibus, hysteris, cephalicis &c. Et sic in dosi refractâ & remissâ, quarta nempe, tertia vel dimidiâ pars grani miscenda, prout in formulis Sylvianis videre est. Dosis extraordinaria variat, tum ex consuetudine, tum ex morbi urgentiâ, tum ob temperamentorum diversitatem; hinc si adsit urgens indicatio, nec dosis minor juvet, ad gr. viij. vel sc. ß. ascendendum. Interim in omni dosi perpetuò observandum, tutius esse infra subsistere, vel repetitâ vice voti compotem fieri, quàm peccare in excessu, & extrema tentando, opprobrium sibi accersere.

## XII.

Insuper 3. Notabit, ubicunque materia peccans in majori quantitate reperitur, quàm ut subigi & vinci possit, illud locum primùm habere, præmissis universalibus, vel saltem tutius ac felicius tunc operari, nisi dolorum, aliorumque symptomatum nimia adsit urgentia; quò in casu etiam citra illa præmissa exhiberi valet.

4. Non exhibendum esse viribus valde imbecillibus existentibus, sed in tempore usurpandum, si vires adhuc consent. In rebus enim desperatis, & ubi æger vix non agonizat, & viribus penè ecclipsantibus, mortem accelerat. 5. Illud etiam contraindicari in Phthisicâ ulcerosâ dispositione, asthmate humoroso, hydropicis &c. cum in talibus sit viaticum ad vitam æternam, dosi primariâ præsertim datum. 6. Quod ad tempus exhibendi, si detur primariâ intentione, tempus nocturnum optimum esse 2. vel 3. horis à cæna, sin secundariâ, etiam manè & post meridiem. In dosi primariâ, unâ die bis non facilè dandum. 7. Post assumptum Narcoticum, purgationem alterò desuper die institutam, debitâ operatione destitui. 8. Cavendum esse, ne exhibeatur in ipsis paroxysmis, v. g. hæmicranis, febrium & epilepsiæ, ne natura à pugnâ susceptâ revocetur. Interim tamen hoc ipsum limitari potest ab urgentibus circumstantiis, illudque concedi in dosi succisâ. Idem dicendum de aliis motibus criticis, ut diarrhœâ, variolis, morbillis &c. Item de partu instante, cum dolores necessarios inhibeat.

## XIII.

Præterea, 9. Observabit, illud minùs convenire in affectibus frigidis quàm calidis, item in humoribus crassis, pituitosis & viscidis. In affectibus ventriculi, nisi urgente dolore inflammatoriò, fugiendum esse Opium, monet Septal. prout etiam in iis, quibus debilis appetitus, qui facilem habent alvum, & infirmum ventriculum, in his enim appetitum prostermit, & alvum solvit; vel etiam prout subindè observatur, vomitum ciet, quod videtur contingere, vel à relictò sulphure foetidò ventriculum relaxante, præsertim si ritè non fuerit præparatum, vel à cacochymiâ humorum in ventriculò existentium. 10. Damnari quoque ab aliquibus Opium in doloribus aurium, & oculorum lipitudinibus, cum ob amarorem mordeat, & dolores augeat. In odontalgia quoque, meliùs esse idem interius assumere, quàm dolentibus partibus applicare. 11. Ratione ætatis infantibus & pueris rariùs, & parciùs illud dandum esse, licet, dum indicatur, exhibitum dosi ipsis proportionatâ, non multum noceat, testante quotidianâ experientiâ. Senibus quoque non adeò convenit, ac aliis ætatibus; interim si moderatè detur, usus ejus tutissimus. 12. Cum Narcotica plerumque corpus exsiccent, nunquam offerenda esse sine humectantibus, vel ante vel post ejus assumptionem exhibendis. Ultimò videndum, ut Opium ritè sit præparatum, neque statim desperandum esse, si legitimâ observatâ Methodò, datis opiatibus æger per longum tempus dormiat, præsertim si vigilie continuatæ præcesserint.

## XIV.

Ex dictis patet, quòd Laudanum Opiatum ritè exhibitum, sit manus quasi Divina, & sacra vitæ anchora: cymba autem Charontis in manû imperiti, & gladius in manû furiosi. Nonnulli, præsertim misochymici illud damnant, quia 1. Odorem habet virosum. 2. Quòd sit venenum. 3. Quòd multi ex ejus usû interempti fuerint. 4. Quòd tutiora sint hypnotica. 5. Quòd Opium sæpius adulteretur. 6. Quòd palliativam solum præbeat curam, nec tollat causam morbificam, hincque ad exiguum tantum tempus prodest. Verum Respond. ad 1. odorem virosum corrigi & tolli, neque omnia foetentia virosa esse. Ad 2. non esse venenum propriè dictum, quod peculiari vi cordi infestum, & vitæ omnibus modis insidiatur, sed posse dici venenum impropriè dictum, quod nimia copiâ assumptum, enecare possit. Ad 3. abusum non tollere usum. Ad 4. hypnotica sæpius nihil proficere. Ad 5. observandas esse notas bonæ electionis Opii. Ad 6. subinde etiam ipsam causam tollere; sæpius verò urgenti occurrere symptomati; satius enim est, cum Galen. symptomatibus occur-



occurrenti, ad causæ continentis ablationem roborare naturam, quàm cum morbo ægrum de mediò tollere. Non igitur solis utendum opiat, sed causæ simul invigilandum, stultum tamen est, semper causæ ablationi intentum esse, neglectò urgentiori symptomate. Redit quidem sæpè dolor, redit excretio, simul ac evanuit vis medicamenti, sed interim natura per has inducias confortatur, ut promptius dein contra causam morificam insurgat.

## ARTICULUS VI.

### De Officiò Medici, in præscribendis formulis Remediorum Opiatorum.

**S**yrupus Narcoticus. ℞. Syr. fl. papav. errat. unc. 8. confect. alk. dr. 8. laud. Opiat. Helm. gr. ij. aq. cinam. bugl. dr. iij. vel violar. dr. vj. M. S. Ruhe-Saffil. auf einmahl, 2. oder 3. Stund nach dem Nacht-Essen einzunehmen.

Emulsio Opiata. ℞. Sem. mel. excort. dr. ij. sem. papav. alb. dr. iij. aq. nymph. viol. solan. an. unc. j. 8. M. F. Emuls. add. magist. perlar. cum gr. ij. laud. op. in mortar. subact. scr. j. spirit. ros. gut. vij. man. christ. perl. dr. j. M. S. Schlaf-Milch vor der Schlaf-Zeit einzunehmen.

Bolus Narcoticus in nemiò Vomitu, Hypercatharsi & Singultu. ℞. Theriac. dr. 8. confect. alk. scr. i. laud. op. gr. i. vel ii. M. S. Stoll-Latwergl oder Zucker. Vel ℞. Theriac. Androm. scr. ii. lig. albès ver. scr. 8. ol. destill. mac. gut. ii. laud. op. gr. i. M. F. Bol.

Alius. ℞. Conf. ros. viriol. dr. i. confect. alk. vel de hyac. dr. 8. terr. sig. scr. i. laud. op. gr. i. vel ii. ol. destill. cinam. gut. i. cum f. q. miv. cyd. M. F. Bol.

Alius in Diarrhœa. ℞. Conf. ros. rub. dr. i. ther. And. scr. i. laud. op. gr. ii. magist. coral. perlar. an. gr. v. M. F. Bol.

Bolus Narcoticus. ℞. Laud. op. Helm. gr. iii. mi-brid. opt. confect. alk. an. scr. i. M.

Bolus Stegnoticò anodynus. ℞. Conf. symphyt. dr. i. pulv. stipt. Croll. vel stegnot. Guttman. scr. i. laud. op. gr. i. 8. M.

Electuar. Opiatum Anti-Dysentericum, usù & praxi P. P. probatissimum. ℞. Conf. ros. vet. unc. i. theriac. vet. diascord. an. dr. i. terr. sigill. corall. rub. præp. sem. plantag. an. scr. j. 8. C. C. philos. præp. scr. i. lap. bez. occident. gr. v. laud. op. Helm. gr. iv. cum f. q. syr. de ros. sic. M. F. Elect. S. Stoll-Latwergen, darvon jede 4. Stund einer Kösten gross zu nehmen.

Pilul. Opiat. in Tussi & Catarrho tenui. ℞. Mass. pilul. de cynogloss. gr. vii. ol. sem. coriand. gut. ii. M. F. Pilul. N. iv. vel ℞. Mass. pilul. de cynogloss. dr. i. 8. succ. glyc. inspiss. scr. i. 8. succin. alb. præp. scr. 8. M. F. Pilul. N. xxiv. asperg. pulv. ros. rub. S. Husten und Catarrh stillende Pillen, darvon Achte, 2. oder 3. Stund nach dem Nacht-Essen zu nehmen.

Aliæ in Phthisi incipienti utiles. ℞. Antihæst. Poter. scr. i. sacch. sat. scr. 8. extr. croc. gr. iv. laud. op. Helm. gr. ii. vel iii. cum f. q. Bals. peruv. M. F. Pilul. N. xx. pro 2. dosibus.

Pilulæ opiatæ in Colicâ. ℞. Extr. castor. gr. iv. laud. op. gr. iii. M. F. Pilul. N. v. ℞. Extr. lig. aloès, castor. zedoar. laud. op. an. gr. iii. cum syr. de papav. M. F. Pilul. N. vi. vel ix.

Aliæ anodynæ, in doloribus Podagricis. ℞. Extract. papav. errat. dr. i. castor. gr. vi. sal. vol. C. C. vel succin. gr. iv. cinnab. nativ. scr. 8. laud. op. gr. ii. M. F. Pilul. N. xxx. dos. à gr. vi. ad scr. 8.

Pilulæ opiat. Anti-Dysentericæ & contra Hypercatharsin. ℞. Extr. theriac. gr. vi. torment. scr. 8. laud. op. gr. ii. M. F. Pilul. N. ix.

Pulvis absorbens opiat. Wedel. videatur de præparantibus.


Alius. ℞. Cinnab. nat. scr. i. corall. rub. præp. C. C.

phil. præp. an. gr. xv. marg. præp. gr. x. laud. op. Helm. gr. ii. ol. caryoph. gut. iii. M. F. Pulv. cujus dos. scr. i.

Pulvis Diaphoretico-anodynus in Arthritide. ℞. Ocul. can. præp. conch. præp. an. gr. xv. cinnab. nat. scr. 8. laud. op. gr. ii. vel iii. M. F. Pulv. pro 2. dos.

Alius Nephritico-anodynus. ℞. Ocul. can. præp. scr. i. cinnab. nat. vel antim. scr. 8. laud. op. gr. i. vel ii. M. F. Pulvis.

Mixturis quoque quibuscunque, unum vel alterum gr. Laud. opiat. pro indicatione misceri potest, ut necesse non sit plures hîc subnectere formulas.



## CAPUT VIII.

### De Officiò Medici, in Affectibus exigentibus Alexipharmaca, Antifebrifuga, Anthelmintica, Carminativa & Lithontriptica.

## ARTICULUS I.

### De Officiò Medici, in ordinandis Remediis Alexipharmacis.

#### I.

**M**edicamenta Alexipharmaca sunt, quæ venenis & malignitati humorum resistunt, dicta etiam Alexiteria & bezoartica. Est autem venenum illud, quod particulis machinæ humanæ peregrinis & destructoriis, citrà aliam causam manifestam corpus humanum, ejusque principia vitalia violenter destruere, ac in vitæ periculum vel mortem conjicere valet. 1. Venenum hoc vel corpori infertur, & propriè dicitur venenum, vel in eodem producit, & dicitur malignum, seu veneno analogum. 2. Aliud venenum lædit inspiratû, ut seminaria pestis & febrium malignarum. Aliud hau-sû, quod ore sumitur, aliud solò contactû, iclû vel morsû. 3. Aliud est externum, aliud internum. 4. Aliud magis citum & activum, quod exiguo temporis spatîo interimit, aliud lentum & temporarium, quod efficacîæ remissioris, post multos demùm dies necat. 5. Aliud est soli homini tale, aliud brutis, multa enim homini sunt venena, quæ aliis animantibus in alimoniam cedunt, & vicissim, ob diversum nexum principiorum vitalium. 6. Aliud est universale, quod omnibus ac singulis animalibus adversum, ut v. g. arsenic. mercur. sublim. aliud particulare, cujus in homine aliud nervis & spiritibus animalibus inimicum, ut solanum furiosum, aliud pulmonî, ut lepus marinus, aliud ventriculo, ut omne corrosivum, aliud vesicæ, ut cantharides. 7. Aliud magis afficit partes spirituosas, aliud humidas, aliud solidas. 8. Aliud est vegetabile, ut aconitum, cicuta, napellus; aliud animale, ut scorpius, vipera, canis rabidus; aliud minerale, ut arsenicum, mercur. sublim. cobaltum.

#### II.

Venena non tam occultis, quàm manifestis quoque agunt qualitatibus, adeò ut sint vel corrosiva, vel fermentativa, vel vaporosa, vel mixta. Corrosiva, ventriculo escharam & necrosin inducunt, atque talia plerumque sunt mineralia, hinc si statim revomantur, delicatiori Archæi sensû & naturæ robore, non nocent, uti etiam si ingerantur in ventriculum plenum, vel pinguibus præsumptis repletum, acrimoniâ nempe obtusâ & faciliori, consequente vomitû. Fermentativa, motum in M. S. præternaturalem, eumque vel absolute lethalem, vel summè periculosum inducunt, unde calor febrilis, ætus, deliria &c. Atque tali vi fermentativâ peregrinâ, agunt potissimum venena animalia, quatenus cum salivâ



salivâ ejusmodi sal peregrinum, iratô præsertim animali, in vulneratam partem illatum, mox serum & sanguinem immutat, ut corrumpantur, ac fermentationem præternaturalem & necrosin patiantur; hinc factâ statim exsuctione, vel destructione hujus fermenti peregrini, vel non nocent planè, vel citius debellari possunt. Vaporosa, spiritus præsertim animales obnubilant, suffocant & destruant, atque hujusmodi vaporositatem peregrinâ, agunt potissimum venena vegetabilia, quatenus sulphure, v. g. impurô, mucilaginoso, ac nervis inimicô pollent. Mixta, pluribus vel omnibus nunc recensitis modis nocent. Sic v. g. venenum in corpore genitum, in febribus malignis, nunc fermentationis peregrinæ soboles, nunc simul etiam irritatione & vaporositatem nocet; sic pestis venenum corrosivum, demonstrant carbunculi, dysenteria, cardialgia; fermentativum, febres, bubones, anxietates &c. Vaporosum, deliria, sopores, vertigines.

## III.

Sicuti igitur diversus agendi modus in *Venenis*, ita etiam *alexipharmacorum* diversa est agendi ratio. Nam 1. præter occultam qualitatem, aliqua horum putredini resistunt, ac balsamô nativô roboratô, calore item exsiccitatô, circulatione ac motu sanguinis & lymphæ restitutô, fermentum peregrinum excludunt. 2. Alia Veneni particulas acutas & corrosivas involvunt, & obtundunt. 3. Alia in Venenô vaporosô poros cerebri referant, illamque volatilem & figentem glutinositatem attenuant, & in halitus resolvunt. 4. Alia fermentativum despumant, & orgasmum massæ sanguineæ invertunt. 5. Alia ichorescentiam, resolutionem & rarefactionem sanguinis nimiam impediunt. 6. Alia tandem sanguinis ac feri motum promovent, ejus coagulationem resolvunt, ac fermentum malignum per sudores eliminant. Sicuti igitur diversa sunt Venena, ita etiam diversa sunt Bezoartica, cum nullum sit alexipharmacum, quod omnibus æquè venenis ex affe conveniat.

## IV.

Circa usum & legitimam horum administrationem, Medicus notabit: 1. *Alexipharmaca* alia dici *universalia & communia*, quæ ubique exhibentur, si veneni natura specialis haud sit cognita, ut v. g. *Theriac. Orvietan. tinct. bezoart. &c.* Alia *particularia* seu *antidota*, quæ huic vel illi veneno speciatim adversantur. 2. Venenis mineralibus generalem præbere antidotum, quæcunque corrosivitati sunt opposita, qualia sunt, tum pingua, quibus inviscari & obtundi solent particulae salinae acres, ac obliniri & defendi parietes ventriculi, ut v. g. ol. amygd. d. butyr. rec. &c. Tum præcipitantia, & acorem corrosivum infringentia, ut crysall. præpar. 3. *Alexipharmaca* in malignis præcipuè febribus usurpanda, alia esse fixa, & quidem vel mineralia, ut v. g. *antim. diaph. unicorn. foss. &c.* Vel animalia, ut v. g. *lap. bez. unior. ver. &c.* Alia *volatilia*, & quidem vel *macra salina*, ut v. g. *sal. vol. C. C. viper. succ. cit. &c.* Vel *aromatica & sulphurea*, ut v. g. *theriacalia*. Item alia simul esse *opiata*, ut *Theriac. diascord. &c.* alia *Camphorata*.

## V.

*Fixiora* locum magis habent in statû & declinatione, ubi alteratione & præcipitatione opus, conquiescente jam tumultû, & devictâ per præmissa potentiora malignitatis atrociam. In statû enim violentiora exhibere, esset novas turbas ciere in massâ sanguineâ, æstum intendere, ac varia capitis pathemata inferre. Item profunt, ubicunque volatilia contraindicantur, ut in infantibus, quorum sanguis ex texturæ tenuioris, ut faciliè nimis efferrari possit, vel in gravidis, ne in orgasmum ruat sanguis, & menses cum abortus & vitæ periculô superveniant; vel in fluoribus sanguinis, ob nimiam ejus rarefactionem, vel in debilibus cum pulsû frequenti, qui aliàs in malignis, si à principiô talis sit, plerumque funestus.

## VI.

*Volatilia salina macra*, locum habent, ubi calor febrilis paulò est intensior. *Aromatica* verò & *sulphurea*, in principiô & incrementô morbi, dum adhuc sudare possunt ac solent ægri. Activiora enim & magis Heroica primò hosti sunt opponenda, ad majorem penetrationem & citiorem discussionem, præsertim ubi mitior urget æstus, intimior est malignitas, ac febris mitis vel nulla adest; hinc principiis, si ullibi, sanè in Peste & similibus febribus obstandum, maturè sumendo antidotos, antequam cibus capiatur, vel somnus ineatur. Sic enim sæpius in ipsâ radice morbus jugulatur, cum aliàs promptè vitalia subeat malum, radicisque figat vix nisi cum morte finiendas. Præterea conveniunt, ubi natura ab expulsiōe v. g. petechiarum, variolarum vel morbillorum cessat, vel hæc exanthemata retrocedere videntur, neque hōc in passû timendus calor, utpote productum seminii morbofi, brevi comescendus, modò exclusum sit peregrinum hunc motum excitans.

## VII.

Remedia *Camphorata* tum maximè conveniunt, cum adsunt inquietudines, deliria, vigiliae &c. Cum præter vim veneni correctivam, simul aliqualem vim spirituum quasi fixativam obtineant, hinc *Etmullero* teste, Medicus in Peste absque camphorâ, est miles in præliô sine gladiô; unde cautius iis utendum in illis ægrotis, quibus caput debilius, vel aliàs camphora inimica existit. *Alexipharmaca*, quæ simul *opiata* sunt, locum præcipuè habent in augmentô morbi, tum quia sudorem magis promovent, tum quia spiritus, ne tam citò resolvantur, quasi coercent, tum quia potissimum graviora mitigant symptomata, ut vigilias, inquietudines, imminetia deliria &c. Interim sciendum, Medicamenta hæc *Alexipharmaca* varianda, & subinde fixiora volatilibus interpolanda, ac variè invicem miscenda esse, pro variô malignitatis aut putredinis gradû, pro variâ febris intensiōe vel remissione, pro variô ægrorum temperamentô, aliisque circumstantiis.

## VIII.

Præterea, 4. observabit Medicus, potentiora *sudorifera* tutius usurpari posse, si corpus perspirabile sit, & ad sudorem inclinet, secus mitioribus utendum esse, ne turbetur & magis exagitetur massa sanguinea. 5. Corpora impura volatilibus magis agitari & lædi, unde hōc in casû præmittenda vomitoria. 6. *Alexipharmacis* aromaticis & sulphureis, interponenda esse subinde acida, ac in specie compositiones theriacales, in vehiculô acidô propinatas, melius & citius operari. 7. Quò major est malignitas, eò frequentius & copiosius provocandum esse sudorem, adeo, ut in malignioribus ter sint propinanda intra 24. horas. Interim cavendum, ne nimius excitetur sudor, cum ex hōc ultrâ euphoriam imperatô, sæpè pejûs habeant ægri; hinc prudenter agunt, qui virium habitâ ratione, ægrum linteis aut stragulis non opprimunt, sed tolerabiliter saltem tegunt, vel primâ tantum vice sudorem imperant: non verò amplius sequentibus præbitis, cum plûs sæpè præstet odor. 8. Ne serum nimium exauriatur, illud potu largiori refarciendum esse, & pro viribus conservandis, post sudorem, vel etiam eodem actu fluente, blandis acidulis utendum; hinc malè agunt, qui continuô sudore cruciatis, etiam potum denegant, cum potû & levetur sitis, ac simul etiam magis promoveatur sudor.

## IX.

Item, 9. Notabit: sudorem continuandum esse per horam dimidiam, integram, vel etiam ultrâ, habitâ tamen



tamen ratione sedulâ naturæ ægri, raræ vel densæ, virium infirmarum vel validarum, malignitatis majoris vel minoris. 10. Sudorifera etiam continuanda esse, licet maculæ, bubones vel anthraces cum levamine appareant, ut saltem impediatur recidiva. 11. Ægrum sudantem à somnô arcendum esse, utpote impediante, convenientem veneni per sudorem expulsionem, hinc eodem infestante, spongiâ acetô camphoratô imbutâ, naribus applicanda. 12. Post sudorem, ægrum nonnihil leviter abstergendum esse, linteis probè calefactis & fumigatis, maximè cavendo, ne frigidior aer eum offendat. 13. In Peste, conjunctâ cum febre ardente, uti jam supra insinuaturn, theriacalia, exceptô diascord. Fracast. minùs tuta esse, vel saltem non nisi acidis temperata; sicuti è contra si febris nulla vel mitis adsit, illico naturæ suppetiæ ferendæ, eaque spirituosis volatilibus, multum ignem vitalem foventibus adjuvanda, quæ fermentum stomachicum resuscitant, sanguinem vigorant, ejus coagulationem impediunt, spiritusascentiam promovent, ac vacillantem vitæ flammam multiplicant. 14. Acida in his febribus nunquam omittenda, atque nunc sudoriferis addenda, nunc in sudoris declinatione, vel post eum usurpanda, cum ægrum reficiant & simul malignitati resistent: Ipsi tamen etiam semper aliquid sudoriferi addendum, ut corpus si non in perpetuô sudore, saltem in perpetuâ diaphoresi, plus minùs auctâ contineatur.

## ARTICULUS II.

### De Officiô Medici, in præscribendis Remediis Alexipharmacis.

**P**Otio Alexipharmaca. ℥. Elect. diascord. Fracast. scr. iv. pulv. rub. pannon. aut spec. de hyac. vel spec. liberant. scr. i. sal. vol. C. C. lap. bez. an. gr. vi. aq. card. b. scabios. an. unc. i. s. syr. acetos. cit. unc. s. M. S. Giff- aus-treibendes Schwitz-Tränkl, auf einmahl einzunehmen.

Alia. ℥. Aquæ scabios. unc. ii. s. scord. unc. s. succ. cit. rec. expr. dr. vi. theriac. vel diascord. Fracast. scr. iv. vel dr. ii. antim. diaph. vel spec. liberant. dr. s. camph. gr. v. syr. card. b. unc. s. M. S. ut supra.

Alia fortior. ℥. Aq. card. b. è typh. cervor. an. unc. i. s. sal. vol. C. C. gr. xv. vel spir. C. C. dr. s. Elect. diascord. theriac. opt. vel elect. de ov. an. dr. i. acet. theriac. camph. dr. i. M.

Emulsio Alexipharmaca Craton. ℥. Sem. card. b. dr. i. s. cit. dr. s. nap. dr. i. aq. card. b. q. s. M. F. Emuls. add. syr. acetos. cit. unc. s. possunt quoque addi, C. C. phil. præp. ocul. canc. terr. sig. lap. bez. S. Aus-treibende Milch.

Bolus Alexipharmacus. ℥. Diascord. Fracast. scr. ii. confect. de hyac. scr. i. C. C. phil. præp. scr. s. lap. bez. orient. gr. vi. M.

Alius. ℥. Theriac. confect. hyac. an. scr. i. s. lap. bez. or. gr. xii. vel hujus locô spec. liberant. aut antim. diaph. scr. i. vel s. sulph. dr. s. camph. gr. iv. M.

Electuar. Bezoardicum. ℥. Spec. liberant. dr. i. theriac. diascord. an. dr. i. s. confect. de hyac. scr. ii. condit. cort. cit. arant. rob. rib. an. dr. iii. syr. acetos. cit. q. s. M. f. Elect. S. Aus-treibende Schwitz-Lattwergen, darvon Morgends, Abends und Nachts einer Kösten oder Nuss groß zu nehmen, und darauf zu schwitzen.

Electuar. præservativum a Peste & Febribus malignis. ℥. Pom. cit. rec. N. iv. incid. una cum cort. & semin. coq. ex s. q. aq. ros. ad consist. pulv. & trajic. per cribr. add. spec. liberant. s. alcë, de hyac. de gemm. fr. cordial. temperat. an. dr. i. confect. alk. dr. ii. s. spirit. rub. id. dr. i. syr. acetos. cit. q. s. M. f. Elect. S. Præservativ-Lattwerg, Morgends nüchtern einer Nuss groß darvon zu nehmen.

Morselli præservativi in Malignis. ℥. Spec. liberant.

dr. ii. de hyac. dr. i. Bol. armen. terr. sig. lign. aloë an. dr. s. rad. zedoar. contrayerv. an. dr. i. s. condit. rad. scorz. enul. angel. an. dr. iii. cort. cit. dr. vi. confect. alk. dr. ij. sacch. in aq. bezoard. sol. lib. i. M. f. Morsell. S. Præservativ-Morsellen, darvon einen Morgends zu nehmen.

Alii. ℥. Condit. nuc. Jugl. unc. i. cort. cit. rad. scorz. an. dr. iii. confect. alk. dr. ii. spec. de hyac. dr. i. liberant. dr. i. s. diatrion. sant. dr. s. extr. angel. zedoar. an. scr. i. sacch. albiss. in aq. cort. cit. sol. unc. x. M. f. Morsul. S. ut supra.

Trochisci Alexipharmacis præservativi. ℥. Cort. cit. sic. dr. i. s. cubeb. dr. i. cardam. dr. s. zedoar. scr. iv. cass. lign. acutiss. dr. i. ol. dest. angel. cit. an. gut. vi. sacch. albiss. lib. s. mucilag. tragac. cum aq. bezoard. extract. q. s. M. f. Troch. S. Præservativ-Zelilein, darvon eines wann man aus dem Haufs, oder zu solchen Kranken gebet, unter der Zungen zu halten, und zergehen zu lassen.

Pulvis Alexipharmacus. ℥. Spec. de hyac. vel pulv. rub. Pannon. C. C. phil. præp. an. scr. i. lap. bez. orient. vel sal. vol. C. C. gr. vii. M. f. Pulv. S. Giff- und Hüt- aus-treibendes Pulver auf einmahl einzunehmen.

Alius. ℥. Spec. liberant. dr. s. camph. gr. v. fl. sulph. scr. s. M. f. Pulv. S. ut supra.

Alius. ℥. Flor. sulph. ter. sublim. spec. liberant. corall. rub. præp. bez. orient. an. scr. s. croc. vel camph. gr. iii. M. f. Pulv.

Alius pretiosus. ℥. Spec. de hyac. dr. ij. C. C. phil. præp. scr. iv. unicorn. ver. off. de cord. cerv. lap. bez. marg. præp. an. scr. i. M. f. Pulv. dos. scr. ij.

Acetum Alexipharmacum præservativum Timæi. ℥. Orvietan. unc. i. diascord. Fracast. dr. iii. ther. Androm. unc. s. rad. angel. contrayerv. enul. torment. pimpinell. scorz. dictamn. alb. petasit. an. dr. iii. fol. scord. rut. millesfol. an. p. ii. fl. calend. tun. an. p. i. cort. cit. frax. an. dr. ii. bacc. juniper. unc. i. mac. zedoar. an. dr. i. s. camph. scr. i. croc. dr. s. myrrh. dr. ii. acet. opt. vel rub. idai, q. s. mixta stent infusa in locô calidô, bene testâ, donec extrahatur Tinctura Col. S. Præservirender Giff-Essig, darvon des Morgends ein Löffel voll nüchtern, oder nach genommener Suppen, oder ein Schnütlein Brod darein eingedunckt, zu nehmen.

Vinum præservativum. ℥. Rad. enul. pimpinell. scorz. an. unc. i. cort. cit. frax. an. dr. vi. fol. card. b. scord. dictamn. Cret. an. m. i. comar. absinth. m. ii. grossô modô incisa indantur saccul. ex sind. alb. suspendendo in vin. alb. lib. xxxviii. optimè clausô doliolô. De hoc aliquid manè in jenuculô vel prandiô bibendum.

Balsamus anti-Pestilentialis. ℥. Ol. destill. angel. cit. an. scr. s. rut. scr. i. lavend. caryoph. an. gut. vii. cinam. gut. iv. lig. Rhod. gut. xv. theriac. Androm. scr. iv. confect. alk. scr. s. mosch. & amb. in sp. ros. sol. an. gr. iii. M. f. Balsam. S. Præservirender Giff-Balsam, in huzigen Kranckheiten, die Nasen und Puls zu bestreichen.

## ARTICULUS III.

### De Officiô Medici, in usurpandis Febrifugis, & præcipue, cortice Chinâ Chinæ.

#### I.

**R**emedia febrifuga seu antipyretica dicuntur, quæ febriles paroxysmos sistunt, sicque Febres intermittentes, quæ rarò solis evacuantibus cedunt, ex integrô tollunt. Exercent autem suam vim, vel cruditates minuendo, ac aciditatem infringendo & absorbendo, sicque fermentum febrile corrigendo, vel effervescentiam ejus præcipitando, aut vi sliptica humores densando & figendo, vel fomitem febrilem alterando, per diaphoresin discutiendo, ac vitiatam crasin massæ sanguineæ emendando, vel sanguinis compagem firmiorem reddendo, ut minùs in febriles effervescentias sit concitabilis.

#### H

#### II. Pro



## II.

Pro debitâ horum administratione & usû Not. 1. Ea non exhibenda esse, nisi corpore prius sufficienter expurgatô, ac universalibus præmissis, cum secus vel recidiva, vel multiplicatio febrilis, vel colicæ, hydropes, cachexiæ, vel pedum saltem tumores superveniant. 2. Eadem exhibenda esse, unâ, duabus, vel tribus horis ante paroxysmi invasionem, ita ut junctis viribus cum naturâ operentur. 3. Desuper sudorem imperandum esse, cum teste experientiâ, febres, quarum paroxysmi singuli cum sudore fiunt, longè breviores, & facilioris curationis sint, quàm illæ, quæ absque eô desinunt; unde multis Febris intermittens nulla tutò curata esse dicitur, nisi per sudorem successivè finita fuerit. 4. Si æstus multum urgeat, abstinendum esse à nimis calidis, volatilibus, aromaticis, & theriacalibus. 5. Ubi frigus magis urget, salia fixa convenientiora esse. 6. Fixis calcinatis & aluminosis, minùs fidendum esse, cum faciliùs recidiva superveniat. 7. Opiata febrifugis usitatis mixta, locum habere, vel quando paroxysmi potius ex consuetudine naturæ febrienti sapiùs recurrunt, quàm ex fomite morbosô, vel quando durante paroxysmô, graviora quædam vel etiam molestiora contingunt symptomata, usû laud. opiat. corrigenda. 8. Etiam exterius Carpis quædam applicari antifebrifuga, quæ vel febrilem fermentationis modum sedando, vel particulas in massam sanguineam evibrando, cruditatem ejus imminuunt, vel ipsâ ligaturâ, aut dolore aliquo excitato, effectum hunc producant. 9. Inter *febrifuga*, maximè specificum ac decantatum esse, *cort. chin. chin.* de quo in sequentibus.

## III.

*Cortex china chinæ*, est cortex arboris cujusdam, quam aliqui *gentianam Indicam* vocant, in America peruviana crescens, dictus etiam ideò *Peruvianus*, & à virtute, *febrifugus*. Olim etiam Pulvis adm. R. R. P. P. Soc. Jes. appellabatur, cum hi ex Peru redeuntes, eum secum attulerint, ac Anno salutis 1649. non tantum per Hispaniam, verum etiam Italiam, Romam usque, eorum ope, ac conatibus imprimis Reverendissimi *Joan. Cardinal. de Lugo Soc. Jes.* usus ejus pervenerit. Usitatus quàm maximè in Febribus intermittentibus tollendis, ac imprimis tertianâ & quartanâ, tam simplici quàm duplici. Vim suam exercet, juxta nonnullos, facultate slipticô-amarâ cruditates minuendo, aciditatem infringendo, fermentationes & effervescentias sistendo, ac sanguini compagem firmiorem, roburque conciliando: juxta alios, fermentum febrile deleterium, in spiritibus existens, qui dein M. S. agitant & fermentant, vi quasi Alexipharmacâ, antidotorum more infringendo ac figendo. Ut autem hoc præstet, oportet eum esse genuinum & sincerum, non fucatum, supposititium, spurium, effoetum & putidum, Ille, colore cinamomi, sapore aromaticè amaro, odore mucidum quid, licet suave & aromaticum spirante, qui etiam dentibus attritus, vel aliò modò fractus, friabilis existit: hic, colore nigricans, injucundè amarus, vel intensè acerbus, nihil mucidum spirans, viscidus etiam, glutinosus, crassus, ligneus, & putidus.

## IV.

Circa illius usum & exhibitionem Nota: 1. Eum efficacius operari, exhibitum in substantia, modò in pollinem seu alcohol arte prius redactus fuerit, ut melius deglutiri, ac per habitum corporis trajici valeat. 2. Eum primâ vice in majori dosi exhibendum, ac ordinariè ad dr. ij. infus. in vin. malvat. absque colaturâ duobus circiter horis ante paroxysmum, cum sic plùs operetur talis dosi, quàm decem aliæ. 3. Eum non faciliè exhibendum, ubi magna adhuc cruditatum congeries, & corpus debite haud evacuatum, nisi ob labascentes, fractâsque vires, & febris acerbitem, ægri in summum vitæ discrimen conjiciantur, ut ad Corticem hunc, ceu

sacram anchoram, per curam saltem palliativam confugiendum sit; præmittenda igitur universalia & præcipuè vomitoria. 4. Fugatis à Cortice paroxysmis, febrem post dies 8. 14. vel aliquot septimanas recrudescere ut plurimum, nisi ejus usus continuetur; hinc suadendum adultis in usu & praxi, ut Corticem adhuc, ablata jam febre, per dies 8. vel 14. ad unc. unam vel alteram continuent, exhibendo 3tiâ vel 4tiâ aut 6tiâ horâ, dr. i. prædicti Corticis, jubendo etiam, ut æger ab injuriis aëris & diætæ erroribus abstineat. 5. Cum pharmacum hoc naturâ suâ non admodum gratum sit, & sapiùs exhibendum, Medicum instructum esse debere, variis formulis hujus febrifugi, haustus nempe, boli, electuarii, pilul. tinct. &c. ut æger nauseabundus, vel præjudiciis in Corticem præoccupatus, honestè decipi possit. 6. Operari hoc Medicamentum sapiùs per sudorem, interdum per vomitum, rarò per sedem, subinde etiam sine omnibus hisce febrem profligare.

## V.

Præterea observandum, 7. In Febribus diutiùs & perspicuè intermittentibus, ejus usum esse tutissimum, ac præcipuè in tertianis & quartanis autumnalibus, nec non vernalibus minùs exquisitis: è contra minùs tutum in Febribus magis æstuosis, & calidioribus, obscurius intermittentibus, præsertim si temperies & anni tempestas calidior; hinc etiam, si nullum exinde sentiat levamen, sed febris potiùs incandescat, ab ejus usû desistendum. 8. Post ejus exhibitionem, propinata vel vomitoria, paroxysmos prius abactos revocare, unde si catharsis à Corticis usû exigatur, nonnulli etiam instituunt lenioribus cataractis, cum laudanô & Cortice mixtis. 9. Si præsertim ab appetitû minùs vigente, recidivam mox futuram præfagire liceat, saltem ad spatium unius lunæ, intervallô nempe 8. vel 10. dierum, unciam unam Corticis repetendam esse, ita ut dr. i. in formâ quavis gratissimâ, ter in die assumat æger, superbibendo vinum Malvaticum, vel aliud album generosum. 10. Cortici china chinæ ab aliis admixtis medicamentis febrifugis vix ullam accedere virtutem: multam è contra sæpè detrahi. Interim si simul Febri jungatur cholera, vomitus, vel diarrhœa præsertim torminosa, colica &c. aliquid laudani opiat. eidem admisceri potest. 11. Regimen calidum, decubitus in lectulô, vinorum & cardiacorum generosiorum usum, Corticis operationem eludere aut remorari; sic ulcus quoque internum, pulmonum nempe, renum &c. non solum ejus affectum protelare, sed nonnunquam exacerbare, & paroxysmos prius abactos, paucis diebus revocare. 12. Paroxysmum ab ejus usu vehementiorem observari, qui tamen febris discessum plerumque præfagit, quod etiam significant paroxysmus ab ejus usû diminutus, aut in melius conversus; item sudores liberiores, aut urina copiosa & limpida, quæ plerumque, teste *Sydenham*, ejus usum sequitur. 13. Corticem hunc non tantum febrem, sed nonnunquam etiam hydropem inde exortum depellere, ac hæcticis puerorum febribus occurrere, cruditates absumendo, & effervescentias reprimendo.

## VI.

Ulterius 14. Observandum, Febres intermittentes subinde obscuras ac protheiformes esse, alios quandoque simulantes morbos, quæ tamen etiam Corticis usui cedunt, præsertim si urina intensè rubra, sedimentum lateritium præcipitaverit, quæ febrilis fermenti delitescens haud obscurum indicium. 15. Si in Febribus calidioribus obscurè remittentibus, ac continuas redolentibus, urgenti aliquâ de causâ Corticem usurpare visum fuerit, eum exhibendum esse in vehiculô frigidô & acidiusculô, accedente potù ordinariô frigidô, præmissa V. S. & clyst. aëre quoque ad frigidum magis vergente, nec ægrô nimis integumentis oneratô. 16. Corticem in liquore infusum & decantatum, convenire magis in ventriculô delicatô & sordescente: citiùs verò & certiùs operari, in substantiâ sumptum, licet diutiùs moretur in ventriculô,



triculô; interim tinctura saturata multoties repetita, substantiæ ferè æquivalet, vel infusio simplex locò Potûs ordinarii. 17. Ex observatione *Adriani Helvet.* Chinam Chinæ à dr. ij. ad unc. i. aquæ ferventi benè mixtam, frequentius in enematis adhibitam, easdem exercere vires, ac per os assumptam, quod pueris, aliisque Corticem, & medicamenta nauseantibus, commodum foret.

VII.

Licet Corticis hujus magna in febribus tollendis sit efficacia, & modò vix non ab omnibus ejus usus receptus; olim tamen plures, & modò paucissimi ex modernis ejus usum improbant: quia, 1. Fæces deleterias & fermenta morbosa in corpore relinquit, unde novæ tragœdiæ & funesta symptomata repullulant; hinc paucos ab ejus usû per septennium supervivere asserunt. 2. Febres tollit absque sensibili evacuatione, sicque non fidendum. 3. Cortex hic est nimis calidus, siccus, æstuosus, febrem augens, ac crassâ & terrestri substantiâ humores magis coagulans ac incrassans. 4. Quia ab ejus usû febres plerumque recidunt, hinc Medicamentum infidum, & febrem potius suspendens, quam tollens censendum. Sed hisce Respondetur, ad 1. Nihil metuendum, si debitis cum cautelis exhibeatur, cum insuper quoad omnia reclamet quotidiana experientia. Ad 2. Operari per sudorem, interdum per vomitum: rariùs per sedem, neque semper sensibilem evacuationem requiri in tollendis morbis, qui sæpiùs per specifica & antidota expugnantur. Ad 3. Multa alia febrifuga esse calidiora, quàm hunc Corticem terreò salinum; immò febrem tollere, non augere, neque humores incrassare, sed acidum infringendo emendare potius humores viscosos, crudos, coagulatos. Ad 4. Febris recidivam (quæ sæpiùs etiam fit, quòd Cortex non sit genuinus) impediri per continuatum ejus usum; & licet etiam febris denuò redeat, tamen induciæ interim procurantur, ut natura assiduitate paroxysmorum attrita, se recolligat, & robustior evadat.

ARTICULUS IV.

De Officiò Medici, in præscribendis Remediis Antifebrilibus.

**D**Ecoctum amarum febrifugum. ℞. Fol. *matric. card.* b. *corn. absinth. summit. cent. min. fl. chamom. an. m. i. sem. card. b. cit. an. dr. ii. sal. absinth. dr. i. β. coq. in f. q. aq. ad lib. i. β. Col. Dos. unc. iii. vel iv. S. Fieber-Tranck, alle 4. Stund außer den Fieber ein halbes Fraggel zu trincken: si laxare simul animus, add. fol. *semm. a dr. i. ad iii. in decoctò calidò infundenda.**

Mixtura antifebrilis Crollii. ℞. *Sal. absinth. dr. β. spirit. sulph. scr. i. aq. card. b. unc. iij. M. S. Fieber-Wässerlein, vor dem Fieber einzunehmen, und wohl zugedecket, darauf zu schwitzen. Teste River. rarò ter sine effectû repetitur.*

Alia Potio antifebrilis. ℞. *Aq. card. b. unc. i. β. spirit. sal. armon. à dr. β. ad dr. i. ocul. canc. præp. scr. i. ol. destill. caryoph. gut. ii. syr. card. b. dr. iii. M. S. ut supra.*

Infusum ordinarium Cort. Chin. Chin. expertissimum. ℞. *Cort. Chin. Chin. subtiliss. pulv. dr. ii. infund. (2. horis ante paroxysmum) in vin. malvat. f. q. per 2. hor. detur absque colut. S. China Chinæ Tranck, 2. Stund vor dem paroxysmo zu nehmen, und darauf zu schwitzen. Rarissimè fallit, præsertim si Cortex genuinus.*

Vinum antifebrile. ℞. *Cort. Chin. Chin. subtiliss. pulv. unc. i. sal. tart. scr. ii. herb. absinth. card. b. an. p. i. vin. Rhen. seu alterius albi opt. lib. i. β. infund. per noct. in locò calidò per horas ix. Col. per chart. S. Fieber-Wein, davon den besseren Tag Morgens, und vor dem Schlaf 4. Unzen zu nehmen, wie auch 2. Stund vor dem Fieber.*

Aliud. ℞. *Cort. Peruv. subtiliss. trit. unc. i. irror. spirit. vin. rectif. f. q. addidit etiam ol. sulph. campanat. digerantur in vase clausò per horas aliquot, hinc add. vin. matur. mens. i. digeratur rursus per dies aliquot, & Col.*

Aliud. ℞. *Cort. Chin. Chin. dr. vi. cort. guajac. dr. ii. summit. cent. min. m. i. cinam. dr. ij. caryoph. scr. ij. ocul. canc. præp. dr. i. sal. tart. dr. iij. M. F. Pulv. infund. in vin. absinth. vel Rhen. mens. i. β. subinde agitando, Usus tempore omnibus benè commixtis, capiat bonus haustus in qtanâ, quartâ quavis horâ, in tertianâ, tertîâ.*

Tinctura antifebrilis. ℞. *Cort. Peruv. crassè pulv. unc. iij. coq. leniter in aq. font. lib. i. ad dimid. Col. reliquiis decocti rursus affund. eandem aquæ quantitatem, coq. & col. iterum ut supra, idque tertîâ vice repete, donec tota corticis vis extracta, hinc omnes colaturas misce, adde si lubet, syr. fl. unic. unc. iv. De hac tincturâ æger unc. iv. v. vi. qta quâque horâ extra paroxysmum, vel sæpiùs ad libitum assumat.*

Bolus febrifugus. ℞. *Cort. Peruv. subtiliss. trit. dr. i. syr. de rub. idæd. vel fl. tun. q. f. M. f. Bol. mollis, repetendus qta vel 6ta quâque horâ ad 8. 10. vel 12. vices extra paroxysmum, superbibendo vin. alb. vel julep. cordial. Electuar. Febrifugum. ℞. Cort. Peruv. in subtiliss. pulv. redact. unc. i. vel i. β. syr. de rub. id. vel alterius gravioris q. f. Bals. Peruv. scr. i. M. f. Elect. de quo sumat æger quantitatem juglandis vel nucis mosch. qta vel 6ta quâque horâ.*

Aliud. ℞. *Cort. Peruv. subtiliss. trit. unc. i. sal. tart. dr. ii. pulv. viperin. antim. diaph. an. scr. v. rob. juniper. q. f. M. f. Elect. cujus usus ut supra.*

Pilulæ febrifugæ. ℞. *Pulv. Cort. Chin. subtiliss. trit. unc. i. vel i. β. succ. absinth. vel mucilag. gumm. tragac. in aq. plantag. extract. q. f. M. f. Pilul. mediocres deaurandæ, quarum viii. x. vel xii. qta vel 6ta quâque horâ intermissionis deglutiat, superbibendo vin. alb. vel malvat. partim.*

Pulvis antifebrilis specificus. ℞. *Antim. diaph. C. C. phil. præp. ocul. canc. præp. corall. rub. præp. pulv. antifeb. Corall. pulv. stomach. Poter. an. scr. i. sal. absinth. cent. min. card. b. an. scr. β. M. f. Pulv. Detur ad scatul. S. Fieberstillendes Pulver, davon 2. Scrupel 2. Stund vor dem Fieber einzunehmen.*

Alius. ℞. *C. C. phil. præp. corall. rub. præp. ocul. canc. præp. chor. f. igne præp. magist. sacch. satur. an. dr. i. β. M. F. Pulv. S. ut supra.*

Alius. ℞. *Fl. chamæm. subtiliss. pulv. scr. i. antim. diaph. sal. absinth. an. scr. β. M. f. Pulv. sumendus ex aq. destill. cent. min.*

Alius Pulvis antipyreticus. ℞. *Cinnab. nat. vel antim. sal. vol. C. C. an. dr. ii. Chin. Chin. unc. i. M. f. Pulv. in vase clausò asservandus, cujus dos. dr. i. ante paroxysmum.*

Alius ex alumine. ℞. *Alum. crud. scr. i. vel dr. β. nuc. mosch. scr. β. M. Vel ℞. Alum. crud. nuc. mosch. an. dr. i. oliban. piper. an. gr. vi. ol. caryoph. gut. i. M. f. Pulv. dos. dr. i.*

Pulvis antifebrilis, ubi æstus prævalet. ℞. *Sal. armon. scr. i. vel dr. β. antifeb. Poter. vel arcan. duplic. Mins. scr. v. M. f. Pulv.*

Alia simul opiatas. ℞. *Corall. rub. præp. sal. absinth. an. gr. xv. ol. dest. caryoph. gut. ii. laud. op. gr. dimid. vel i. M.*

Unguentum antifebrile. ℞. *Ung. popul. dr. vi. tel. aran. dr. i. β. op. thebaic. cum acet. fl. sambuc. dissol. gr. iv. ol. ranar. parum. M. Imponatur pulvis ante paroxysmum.*

Emplast. simile. ℞. *Fulig. fum. splendid. unc. i. β. tereb. dr. vi. tel. aran. unc. i. camph. scr. ii. ol. aran. q. f. M. f. Empl. Carpis manuum applicandum.*

Cataplasma. ℞. *Ungul. allii N. iii. contund. pistill. dein add. sal. commun. dr. β. croc. pulv. scr. i. acct. parum M. f. Catapl. alligandum parvo digito sinistrae manûs, ac per 9. dies ibidem relinquendum. Alii id parant ex fulig. allio, & cepis cum album. ov. & paucò acct. atque carpis applicant.*



## ARTICULUS V.

*De Officiò Medici, in præscribendis Remediis Anthelminticis, eorumque formulis.*

## I.

**M**edicamenta anthelmintica sunt, quæ lumbricos enecant, quod præstant vel focum & mineram vernium destruendo, ac putredini resistendo, qualia sunt, tum *amaricantia* & *Balsamica*, tum *acida*, tum *nitrosa*, partim ob amaritiam, partim ob acidum in iis emicans, partim quod putredini resistent: tum *acria*, & sale volatili, vel sibi relicto vel oleoso imprægnata, tum *terreo-alcalina* & *lixiva salina*, vel eos suffocando, & transpirationem, in quâ vita vermium & insectorum consistit, impediendo, per *oleosu* & pingua omnia, poros obstruendo, vel eos specificâ virtute interimendo, aut si malis per manifestas qualitates explicare, substantiam eorum mucosam & glutinosam liquando, resolvendo, annihilando, & corrumpendo; qualia inprimis sunt *mercurialia*, vermibus & cuius seminio animato summè inimica, vel tandem eos exturbando per purgantia, amara, acria & resinosa, qualia sunt *aloës*, *colocynth*, *rhab.*, *agar.*, *spec. diaturb.* cum *rhab.*

## II.

Circa horum exhibitionem & usum, Not. 1. Anthelmintica præcipuè propinanda esse lunâ decrescente. 2. Eadem optima esse, quæcunque simul expellunt & necant vermes; nam & nidi, & inibi nidulantes vermes exturbandi sunt. 3. Dulcia, ut saccharata & mellita per se vermes non generare, tum quia putredini resistent, aliaque à corruptione præservant, tum quia facile bilefcunt, eos tamen agitare & commovere, cum vermium illecebræ existant; maritanda igitur anthelminticis, ut his ipsis inescati, pro melle fel, ac pro lacte venenum hauriant; hinc optimè exhiberi solent cum lacte, vel mulla, aut panatella saccharata, vel in formâ rotul. 4. Eadem propinanda esse jejuno ventriculo, neque statim desuper aliud comedendum. 5. Eadem aliquando mutanda & varianda esse, ne vermes hisce affuescant. 6. Eadem quoque ad tempus continuanda, cum lumbrici sæpius, præsertim lati, contumaces sint, & à mitioribus sensim ad fortiora progrediatur.

## III.

Præterea 7. Not. plures, præsertim agyras pro potentissimò remediò exhibere ipsos lumbricos, vel etiam terrestres torrefactos & pulverisatos, cum plures exinde lumbrici deiciantur, cui tamen non fidendum, dum semina vermium hòc modò propagari, & lumbricos produci potius, quàm enecari, experientiâ plurimorum Authorum certum fit. 8. *Mercurium dulcem* maximè utilem esse, additò præsertim stimulo *scamm.*, *sulph.* vel *resin. gial.* in infantibus autem minùs tutum esse, nisi robustioribus, cum omnia in hâc ætate fluxilia & laxa sint, atque inprimis ossa & nervi, quibus Mercurius inimicus. 9. Clysteres ex anthelminticis paratos non convenire, cum lumbrici eos averfantes superiora petant, ac gravissima excitent symptomata, nisi magna adsit præsumptio eos morari in intestinis crassis, cum sic vix amplius in intestina tenuia ascendere possint; hinc præferendi *clyst.* ex *lacte*, *melle* & *sacch.* parati, ut eos inferiora versùs alluciant. 10. Anthelmintica & purgantia etiam exterius umbilico applicari, quia est centrum abdominis, ac pars magis perspirabilis, & quidem præcipuè in subsidium remedium internum, ac pro solamine symptomatum, ut v. g. ad dolores, tormina &c. 11. Vermes ascarides magis curari Balneis, suppositoriis, clysteribus & unguen-

tis. 12. Anthelmintica etiam se extendere ad quævis animalia p. n. corpus affligentia, ut pediculos, lentes, hausta bufonum vel serpentum semina, ulcera verminosa &c.

## Formulæ

## Remediorum Anthelminticorum.

Decoctum amarum Vermifugum.  $\mathcal{L}$ . Summit. cent. min. fl. chamom. agrim. an. m. s. sem. card. b. cit. an. dr. i. s. fl. calend. p. ii. rad. gent. dr. ii. sem. dr. vi. Rhab. dr. i. aq. font. lib. ii. coq. ad dimid. f. Col. pro 3. vel 4. dof.

Vinum Anthelminticum.  $\mathcal{L}$ . Rad. filic. dr. vi. diſtamm. cret. unc. s. angel. Zedoar. an. dr. ii. cort. cit. frax. an. dr. iii. sem. santon. dr. v. citr. portul. an. dr. ii. incif. & conquass. affunde vin. absinth. lib. ii. stent in infus. per hor. 24. Col. demur m. & v. aliquot uncia.

Aqua Vermifuga Helmontiana.  $\mathcal{L}$ . Mercur. crud. ritè purgat. unc. i. aq. gram. portulac. an. unc. iv. maceretur per 2. horas, sepe ac fortiter agitando, hinc aquam decanta & cola, relicto in vase Mercurio. S. Wurm-lötlendes Wasser, darvon dreymahl den Tag 3. Löſſel voll zu nehmen.

Electuar. Vermifugum.  $\mathcal{L}$ . Fol. elleborast. pulv. unc. i. mell. despum. unc. iii. M. f. Elect. cujus dof. à scr. iv. ad dr. ij.

Rotulæ Anthelminticæ.  $\mathcal{L}$ . Sem. santon. dr. ii. turb. el. dr. i. Rhab. opt. dr. i. s. resin. gial. f. a. fol. scr. s. corallin. dr. s. ol. cit. gut. iii. sacch. albif. in aq. fl. persic. sol. q. f. M. f. Rotul. S. Wurm-Zeltlein.

Alia.  $\mathcal{L}$ . Corallin. sem. santon. plantag. C. C. phil. præp. an. scr. i. rhab. agar. troch. an. scr. ii. rad. diſtamm. scr. i. sacch. in aq. gram. dissol. unc. iii. M.

Alia non purgantes.  $\mathcal{L}$ . Pulv. C. C. crud. chor. an. dr. vi. corallin. dr. ii. sacch. alb. unc. iv. mucilag. tragac. q. f. F. Rot. pond. dr. s. dentur N. iii. bis in die.

Alia.  $\mathcal{L}$ . Rad. gent. dr. s. agar. albif. zedoar. tanacet. an. scr. i. C. C. ust. mercur. dulc. an. dr. s. sacch. in aq. gram. dissol. q. f. M. f. Rotul. quæ ab infantibus & pueris facile assumuntur.

Pulvis Anthelminticus.  $\mathcal{L}$ . Sem. santon. unc. s. fol. card. b. fl. tanacet. rad. filic. an. dr. i. viriol. calcin. scr. ii. M. in mortar. marmor. f. Pulv. Dentur scr. ii. decrescente lunâ ex hydromelite.

Alius.  $\mathcal{L}$ . C. C. ust. rhabarb. corallin. sem. santon. an. p. aq. M. f. Pulv. S. Wurm-Pulver, darvon 20. gran. oder ein halb Quintl zu nehmen.

Alius.  $\mathcal{L}$ . Myrrh. zedoar. cort. cit. an. dr. s. cinnab. antim. scr. i. camph. scr. s. ol. destill. succin. rut. an. scr. s. M. f. Pulv. dof. scr. i. ex aq. zedoar.

Alius.  $\mathcal{L}$ . C. C. ust. corallin. an. dr. i. rad. gent. sc. ii. myrrh. sc. s. ol. ejusdem gut. iii. tanacet. gut. v. sacch. alb. unc. i. M. f. Pulv. dof. scr. i.

Unguentum ad Vermes.  $\mathcal{L}$ . Ung. de arthan't. seu contra verm. unc. s. elix. prop. P. dr. i. M. Vel  $\mathcal{L}$ . Ung. contra verm. August. unc. i. fellis taur. inspiss. dr. i. ol. dest. absinth. tanacet. an. gut. vi. M.

Cataplasmata.  $\mathcal{L}$ . Farin. lupin. unc. ii. myrrh. aloë an. dr. ii. fell. bov. q. f. ol. absinth. unc. ii. M. f. Catapl. admo- vendum ventri.

Aliud.  $\mathcal{L}$ . Colocynth. dr. vi. tere & cum felle bov. aa vin. mixt. impone umbilico. Vel  $\mathcal{L}$ . Fol. persicar. vel absinth. contus. q. f. adde fell. bov. liquid. q. f. pro Catapl.

Emplast. Vermifugum.  $\mathcal{L}$ . Pulv. aloë unc. s. colocynth. myrrh. an. dr. i. s. fol. sabin. rut. absinth. tanacet. rad. bryon. an. dr. i. cer. resin. an. unc. ii. ol. rut. unc. i. M. f. mass. Empl. pro umbilico.



ARTICULUS VI.

De Officiò Medici, in præscribendis Remediis Carminativis, eorumque formulis.

I.

**M**edicamenta carminativa dicuntur, quæ flatum tollunt ac discutunt, utilia in affectibus quibuscunque à flatuum copiâ oriundis, v. g. inflatione stomachi, lienis, epatis, tympanitide, colicâ flatulentâ, vertigine, cardialgiâ &c. Exercent autem vim suam diversimodè, nonnulla resolvendo & discutendo humorem stagnantem & vitiosè rarefactum, hinc plurima sunt diaphoretica, quæ & carminativa existunt, & quidem tantò excellentiora, quod & resolvant, & per sudorem vel diaphoresin dispellant. Hæc quoque calorem debilitatum restitunt, & halituosâ suâ virtute undique penetrant, ac vaporositatem suâ subtili & volatili exhalationem vaporum crassiorum adjuvant. Alia id præstant per fermentationem, ex quâ flatus suscitantur, compescendo, acidumque fermentativum absorbendo, invertendo, & præcipitando, sicque phlogoses impediendo, bilem quoque, si unâ simul rarefacta concurrat, domando & infringendo. Alia id efficiunt, vel coctionem & calorem ac menstruum ventriculi corruptum roborando, hinc stomachica pleuræque carminativa; vel viam flatibus laxando, aut partium, quibus continentur, poros aperiendo, ut transpirare possint, vel denique visciditate suâ illos captivando, ligandoque ad se invicem, vel etiam dolores leniendo.

II.

Circa usum & debitam horum administrationem, Medicus notabit: 1. Carminativa displosiva, seu calidiora resolventia, præsentem calorem præternaturali minus comoda esse, sic v. g. in hypochondriacis, in quibus sæpè viscerum phlogoses concurrunt, ut plurimum temperatiora magis conveniunt. Sic Mercatò monente, si calidiora carminativa in tympanitide non prosint, ad frigidiora transeundum esse. Sicuti igitur calidiora non conveniunt, in flatibus conjunctis cum æstû & ardore, ita nec temperatiora, humoribus crassis, viscidis & pituitosis existentibus. 2. Non convenire carminativa, si adsit copia materiæ, si fæces duriores obstructions causentur, hoc enim in passû, nisi prius evacuatio fiat materiæ, & sufficiens depletio, frustra non solum sunt omnia, sed etiam in flatum longè peiorem ægrum præcipitant. 3. Carminativis viam sternere non tantum purgantia, sed & imprimis bonam dietam, vitando cruditatem, legumina, olera, humidò excrementò abundantia, dulcia, pingua, crassa, lenta, fæculenta, fructus horarios &c.

III.

Præterea 4. Not. in discutiendis flatibus magis causam, quàm effectum respiciendum esse. 5. Pauciores flatus disploendos: copiosiores educendos esse. 6. In flatibus semper respiciendum esse ad ventriculum. 7. Flatibus dolorificis maximè obtemperare carminativis, opiatibus seu anodynis & evacuantibus. 8. Clysteres carminativos maximè quoque usuales esse mixtis emollientibus, quibus & fæces emolliuntur, & flatus simul discutuntur. 9. Sicuti carminativa interiori præstant in formâ humidâ & liquidâ, ita exterius in formâ siccâ, ut sacculorum &c.

Formulæ

Remediorum Carminativorum.

Mixtura Carminativa. ℞. Aq. ment. unc. iii. nuc. mosch. dr. vi. spirit. vin. vel elix. vit. Matthiol. sp. sal. an. scr. i. M. S. Wind-Wasserlein, darauf zu schwizen.

Alia. ℞. Aq. ment. chamom. an. unc. iv. physagon. unc. i. spirit. anis. unc. s. vel hujus locò elix. vit. Matth. dr. ii. spirit. sal. dr. i. s. sacch. cand. rub. unc. i. M. S. ut supra.

Alia. ℞. Aq. ment. cort. arant. an. unc. i. s. spirit. nit. dulc. gut. xv. syr. de cort. arant. dr. ii. M. Vel ℞. Aq. zedoar. unc. ii. physagon. unc. iii. spir. mac. dr. i. M.

Aqua carminativa & simul anodyna. ℞. Aq. dest. cinam. physagon. carminat. an. unc. i. s. tinct. cort. arant. dr. i. s. laud. op. Helm. gr. iv. ol. dest. mac. gut. ii. M. dentur 2. Cochl. urgente dolore.

Alia. ℞. Aq. ment. chamom. zedoar. an. unc. i. essent. castor. d. iii. spirit. sal. armon. dr. i. s. essent. op. scr. i. syr. de cort. arant. dr. iii. M.

Balsam. carminat. ex Brodiô. ℞. Ol. dest. anis. scr. ii. fœnic. scr. i. cort. arant. gut. xii. chamom. gut. x. cit. gut. iii. M. ad vitr. parvum. Dos. gut. v. vel vi. ex Brod. carn. Vel ℞. Ol. dest. mac. dr. i. succin. scr. i. M. Vel ℞. Ol. dest. cort. arant. anis. carv. an. scr. s. M. dos. 6. guttæ.

Electuar. Carminativum. ℞. Conserv. rad. cich. unc. iii. ros. rub. unc. ii. confit. cort. arant. unc. i. citr. unc. s. spec. aromat. ros. dr. ii. diarrhod. Abb. dr. i. conf. alk. dr. i. s. sp. cit. vel mac. dr. i. syr. de cort. arant. q. s. M. f. Elect.

Bolus Carminativus. ℞. Theriac. vel mihrid. scr. i. pulv. cort. arant. dr. f. castor. pulv. gr. viii. ol. cort. arant. gut. ii. M.

Tabellæ Carminativæ. ℞. Cardam. crassè pulv. unc. s. flaved. cort. arant. minutim incis. dr. x. sacch. opt. in aq. ros. & cinam. dissol. unc. viii. M. f. Tabell.

Alia. ℞. Pulv. cort. arant. recent. spec. aromat. ros. an. dr. ii. sacch. alb. in aq. fl. arant. sol. unc. iv. M. f. Tabell.

Pulvis Carminativus. ℞. Cort. flav. arant. scr. iv. mac. scr. s. ol. dest. cit. gut. vi. M. F. Pulv. divid. ad 2. p. æq.

Alius simul præcipitans. ℞. Conf. flav. arant. unc. i. s. maxill. lucii pisc. ocul. canc. an. dr. i. s. tal. lepor. succin. zedoar. an. dr. ii. M. F. Pulv. cujus dos. à dr. s. ad dr. i.

Alius simul laxativus. ℞. Pulv. cort. arant. dr. ii. card. b. scr. iv. fol. sen. f. dr. iii. fœcul. aron. scr. ii. ol. fœnic. gut. xv. sacch. ros. tabul. ad pondus omnium. M. F. Pulv. S. Wind-Pulver, darvon 2. oder 3. Messer-Spiz voll vor dem Essen zu nehmen.

Alius. ℞. Pulv. cort. arant. Rhab. el. cryst. tart. an. dr. ii. ol. mac. gutt. x. sacch. ros. tab. ad pond. omn. M. F. Pulv.

Elæosaccharum carminativum. ℞. Sacch. alb. unc. ii. ol. nuc. mosch. express. dr. i. ol. dest. chamom. scr. i. fœnic. anis. an. scr. s. cort. arant. gut. iii. M. dos. dr. ii. cum aq. carminat.

Tragæa carminativa. ℞. Spec. aromat. ros. dr. ij. cass. lig. acutiss. dr. i. s. cardam. min. scr. ij. sacch. ros. tabul. unc. iv. ol. dest. carv. fœnic. an. gut. ix. cinam. gut. vi. caryoph. gut. iij. M. F. Trag. S. Sonderlich Wind-Trisenet.

Alia. ℞. Coriand. præp. dr. ij. sem. anis. fœnic. an. dr. i. cinam. acut. dr. ij. cort. cit. dr. i. cardam. min. dr. ii. sacch. ros. tab. unc. i. sacch. fin. q. s. M. F. Tragæa.

Sacculus Carminativus extra applicandus. ℞. Aven. in sartag. calefact. & tost. ac vinò irrorat. q. pl. vel cumin. milii, furfur. &c. inde saccul. calidè applicando.

Alius. ℞. Fl. sambuc. chamom. aneth. an. m. i. mel. m. i. s. sal. m. i. sem. aneth. carv. cumin. an. dr. ii. bacc. laur. dr. ii. includ. saccul. vin. in coq. & applic. aut calefacta ind. saccul. calidè applic.

Fomentum Carminativum. ℞. Fili crudi cin. ungeblachten Strang-Garn coq. in lixiv. vel aq. vel lact. addendo simul cumin. unc. s. expressum applicetur calidè.

Placenta Carminativa, utilis in dolore Colicò. ℞. Vitell. ov. N. vi. agitat. fortiter add. pulv. anis. fœnic. cumin. an. dr. i. vel fol. majoran. vel ment. absinth. incis. ol. laur. vel chamom. q. s. M. F. Placenta.

Unguent. Carminat. ℞. Ung. popul. unc. s. ol. laur. dr. iii. ol. carv. scr. iv. M. Vel ℞. Ung. carminat. Minf. unc. ii. ol. dest. caryoph. gut. ii. lig. Rhod. gut. iij. M. S. Wind-Salben zum schmieren.



Emplast. Carminat. ℞. Empl. de bacc. laur. gumm. *sacamah.* an. p. æq. *malax.* cum ol. *chamom.* & *aneth.* ac extind. super alut. obduclâ sindone.

Clyster carminativus. ℞. Herb. *calam. rut. puleg.* an. m. i. fl. *chamom. sambuc. summit. aneth.* an. M. ℞. sem. *anis. carv. cumin. aneth. scfel.* an. dr. ii. bacc. *laur. unc.* f. incis. & conquss. coq. ex f. q. aq. in Col. unc. x. dissolv. vin. *malv. unc. iii. elect.* de bacc. *laur. unc.* ℞. *bencd. lax.* unc. i. ol. *ruth. aneth.* an. unc. i. M.

Alius hypochondriacis plurimum utilis. ℞. Caput. i. castrat. seu vervec. sem. *cumin. unc.* ℞. coq. in aq. lib. iii. ad 3. p. consumpt. add. fl. *chamom. melilot. aneth.* an. p. i. coq. rursus per mediam horam in Col. lib. i. dissolv. sacch. *rub. unc. ii. elect. hier. f. dr. iii. ol. chamom. cheir.* an. unc. i. s. sal. dr. ii. M. F. Clyst.

Alius. ℞. Decoct. carmin. lib. i. dissolv. elect. diaphan. unc. i. ol. *cham. laur. an. dr. vi. carv. dr. i.* ℞. mell. *anthos.* unc. ii. sal. comm. p. i. M.

Alius simul anodynus. ℞. Lact. *Vaccin. lib. i.* ℞. sem. *carv. m. f. fl. cham. m. i.* coq. usq. ad lib. i. coll. add. mell. crud. vel *anthos.* unc. i. s. ol. *chamom. aneth. lin. an. unc. i.* sal. dr. ℞. M.

## ARTICULUS VII.

De Officiô Medici, in ordinandis & præscribendis Remediis Lithontripticis, eorumque formulis.

### I.

**M**edicamenta lithontriptica ea dicuntur, quæ salinis suis particulis, amurcam & coagulum resolvunt, ac calculum exturbant, vel incidentibus, rigidisque suis particulis, in calculum continuò impellendo, eum paulatim atterunt & abradunt, vel appropriatam proportionem cum poris calculi habentia, texturam ejus penetrant, quæ propriè dicuntur calculum frangentia, seu lithontriptica, necessaria in calculis renum & vesicæ, qui ob magnitudinem aut viarum angustiam excludi nequeunt.

### II.

Circa usum & naturam horum remediorum, Medici officium erit, Not. 1. ea locum magis habere, dum calculus saltem mollior, sabulosus, & tephaceæ magis naturæ, quàm siliceæ. 2. Dari talia medicamenta, probari ab ipsâ experientiâ subinde factâ, licet rara ac paucissima sint, neque omnia in omnibus præstent, cum nimis multæ reperiantur conditiones, ad medicamentum calculum dissolvens constituendum, nempe, ut locum affectum tangat, ut habeat vim solvendi repagula calculi, sitque nec acidum, nec alcalinum, sed compositum ex utroque, prout est calculus, ut longô transitu ad vesicam vi suâ lithontripticâ non infringatur, ut sit amicum naturæ, nec corrosivum, ut sit subtile ac quaquaversum distribui possit. 3. Talia remedia non tantum per os propinari, sed etiam in calculo vesicæ injici per syringam Catheteri applicatam. 4. Exhibenda hæc esse quotidie manè, injectio prius clystere emolliente & refrigerante. 5. Usû horum sequi subinde febrem, calorem, sitim, dolores circa pubem; hinc succurrendum diætâ convenienti, abstinentiâ à vino, julep. frigid. &c. 6. Boni effectûs signum esse, si ab eorum usû primis diebus urina prodeat crassa & exigua, hinc copiosior, cum remissione caloris, doloris, ac excretionem fragmentorum calculi. 7. Interdum unum vel alterum diem quieti concedendum, nec ab usû eorum cessandum.

### III.

Præterea sciendum, 8. In defectu remediorum lithontripticorum, tentanda esse diuretica selectiora, quæ etiam prophylacticè usurpanda, non tamen adeò frequenter, cum sæpius malum augeant, vel cruditates ad renes de-

vehendo, vel renes magis intemperatos reddendo, vel pituitam calculum obvolvuntem abstergendo, eumque sic exasperando, vel eum majorem in ureteres cum periculo deturbando. 9. Remedia terebinthinata pro calculi præservatione ceteris præstantiora esse, cum alvum simul laxent & humores crassos evacuent. 10. Remediorum horum vim & efficaciam adjuvare clysteres, balnea, unguenta, facculos &c. 11. Si lithontripticis nihil efficiatur, atque æger in calculo vesicæ lithotomiæ se subicere nolit, curam palliativam institui debere: per sola epicerastica & anodyna, ut v. g. Clyst. ex lacte bub. cum dr. i. phil. Rom. ol. amygd. dr. per os exhibitum, cum paucò succ. lim. ex brod. decoct. malv. item aq. scr. lact. destillatam cum syr. de alib. Ferncl. vel Emuls. cum prædicta aq. vel decoct. Forest. addit. troch. alkek. inject. in vesicam ex lact. vel decoct. malv. vel Emuls. sem. papav. cum aq. solan. semicup. vel foment. cum magnâ spong. imbut. decoct. emoll. sequente inunctione cum ung. alib. ros. popul. cum ol. viol. nymph. hyosc.

## Formulæ

### Remediorum Lithontripticorum.

Decoct. lithontript. ℞. Rad. *sænic. petrosel. eryng. pimpinell. ononid. rub. inct. enul.* an. dr. iii. *heder. terrest. veron. saxifrag. absinth. matrisylv. an. m. ℞. fl. genist. p. ii. gr. juniper. unc. i. cic. rub. unc. i. ℞. fruct. alkekeng. N. vii. sem. anis. urtic. sænic. dauc. petrosel. 4. frig. maj. an. dr. i. incis. & conquss. coq. ex f. q. aq. font. in Col. lib. iv. dissolv. mell. puriss. unc. ii. bull. semel atque iterum & cum album. ov. clarif. S. Griefs- und Sand-treibender Tranck, darvon dreymal den Tag 4. Unzen zu nehmen.*

Julepus anti-Nephriticus. ℞. Decoct. prædict. vel ad calculum Forest. lib. i. syr. de alib. Ferncl. acetos. cit. an. unc. i. spirit. sal. dr. ℞. M. S. Griefs-Julep auf 2. oder dreymal.

Alius utilis in paroxysmò Calculosò. ℞. Aq. frag. *saxifrag. an. unc. ii. vin. alb. generos. unc. vi. ol. amygd. d. unc. ii. spirit. viuriol. dr. i. M. pro 3. dos. prima detur calide, quantum ferre potest æger, post horas 6. secunda, & si hæc etiam inefficax, quod teste Riveriò raro contingit, detur tertia.*

Elixir anti-Nephriticum. ℞. Sal. tart. albiss. unc. i. solv. in aq. petrosel. lib. i. diger. cum cort. cit. arant. an. unc. i. per 3. dies, filtratur per chart. add. ol. destill. cer. arant. mac. an. gut. viii. M. diger. iterum per aliquot dies. S. Elexier wider den Stein, darvon ein halben Löffel voll Morgens und Abends aus einen Mosch-Wcin zu nehmen.

Nodulus vino vel cerevisiæ infundendus. ℞. Bacc. *juniper. contus. unc. i. fruct. cynosbat. sicc. & crassè pulv. unc. ii. fol. heder. terrest. veron. pariet. an. m. i. absinth. m. ℞. rad. eryng. ononid. an. dr. vi. lig. nephrit. unc. ℞. uv. pass. enucleat. unc. iii. M. incis. & contus. ad Nodul. infund. in vin. vel cervis. lib. viii.*

Infusum Diureticum. ℞. Raph. acerrimi deraf. unc. ii. vin. alb. unc. iv. macerentur per aliquot horas, hinc fortiter exprim. & Col. valet etiam rad. armorac. vino infusa aliquoties hausta.

Aliud Præservativum. ℞. Heder. terrest. m. i. capit. allii N. ii. vel iij. disceptis in frustula affund. sp. vin. lib. i. stent per dies aliquot bene clausa, hinc de agitato liquore detur cochl. i. singulis noviluniis.

Emulsio anti-Nephritica. ℞. Sem. 4. frigid. maj. an. dr. ij. violar. dr. i. s. nucl. persic. dr. vi. decoct. bord. cum sem. dauc. fact. unc. vi. aq. petrosel. liq. betule destill. an. unc. i. f. Emuls. add. lapid. canc. præp. dr. i. sacch. cand. q. f. ad gratiam.

Brodium Lithontripticum. ℞. Cic. rub. cochl. i. rad. petrosel. unc. ℞. coq. cum f. q. aq. vel brod. carn. col. unc. v. add. succ. lim. unc. i. sang. hirc. præp. scr. ij. myrrh. el. scr. i. Vel ℞. Jur. cic. rub. unc. x. spirit. juniper. scr. ii. asell. præp. à scr. i. ad dr. i. M.

Bolus



**Bolus Nephriticus.** R. Tereb. venet. coct. & pulv. dr. z. ocul. canc. præp. scr. i. tart. citriol. scr. β. sal. vol. succin. gr. iv. syr. de alib. Fernel. q. f. M. F. Bol. sumatur mane, superbibendo liquorem aliquem diureticum.

**Electuar. lithonripticum.** R. Sem. urtic. milu sol. bardan. an. dr. β. lap. Judaic. præp. magist. ocul. canc. crysall. mont. an. scr. i. farin. lycop. d. virg. aur. sem. dauc. pulv. an. scr. ii. conf. cring. unc. i. β. cass. unc. i. cum s. q. syr. de limon. f. Elect. S. *Lanzwergen wider den Stein alle Morgens einer Kösten groß darvon zu nehmen.*

**Aliud Præservativum.** R. Pulv. sem. hyperic. juliô vel autumnô collect. & exsicc. unc. i. β. conf. ros. vel viol. lib. i. M. Dof. unc. s. quâlibet septimanâ 2. vicibus.

**Pilulæ anti-Nephriticæ.** R. Ocul. canc. præp. dr. i. farin. semin. lycopod. scr. i. sal. fin. columb. gr. xij. volat. succin. gr. xv. tereb. cyp. aq. malv. lot. & coct. q. f. M. F. Pilul.

**Pulvis Nephrocatharticus.** R. Lap. lync. præp. Judaic. præp. an. dr. j. s. ocul. canc. præp. dr. iij. sal. juniper. dr. i. asell. præp. dr. s. sem. lithosperm. dr. i. s. ol. succin. rectif. gut. iv. sacch. alb. unc. i. s. M. F. Pulv. S. Griefs-und Sand-Pulver 1. *Quintl. schwer auf einmahl einzunehmen.*

**Alius.** R. Magist. cryst. mont. sem. mil. sol. lapp. maj. an. scr. s. borrac. venet. glaciæ Mariæ, pulv. priap. cerv. an. gr. v. M. F. Pulv. pro i. dos.

**Clyster usualis in paroxysmô Nephriticô.** R. Rad. alib. dr. iij. malv. melilot. pariet. bord. an. m. i. sem. lin. fenug. an. dr. iij. fenic. dr. j. incisa bull. in s. q. aq. ad consumpt. 3. part. in Col. lib. i. dissolv. sacch. rub. unc. ij. tereb. clar. vitell. ov. dissol. dr. iij. vel unc. s. ol. viol. chamom. an. unc. j. cum paucô sale. M. F. Clyst. vel dissolv. cass. pro clyst. elect. leuit. an. unc. s. vel diacathol. dr. vj. hier. s. bened. laxat. an. dr. ij. M.

**Alius.** R. Spec. decoct. carmin. fl. verbasc. an. m. j. pariet. m. ij. coq. in s. q. brod. carn. in col. lib. j. dissolv. cass. pro clyst. unc. j. tereb. vitell. ov. dissol. unc. s. sacch. rub. ol. chamom. an. unc. i. s. M. F. Clyst.

**Alius lacteus anodynus.** R. Lact. vaccin. rec. mult. lib. i. sacch. rub. unc. ij. ol. chamom. unc. i. scorp. dr. ij. ung. rub. potab. unc. i. vitell. ov. No. i. M.


**Alius ex folis oleis.** R. Aneth. chamom. an. lib. s. amygd. d. unc. ij. rutac. unc. i. Vel R. Butyr. rec. ol. amygd. d. an. unc. iv. calefiant & loco Clyst. injiciantur.

**Unguentum.** R. Ung. de alib. unc. s. ol. amygd. d. dr. iij. scorp. dr. i. s. petrol. alb. dr. i. M. vel R. Ung. popul. vel infrig. Gal. ros. Mcf. de alib. an. dr. vi. ol. scorp. simp. succ. lim. an. unc. s. camph. gr. iv. M. S. Lenden-Salbl.

**Cataplafina.** R. Fol. malv. pariet. an. m. ij. petroscl. cum rad. m. j. raph. dr. ij. coq. in aq. vel lact. ad purilag. & contus. adde cep. sub. cin. coct. No. ij. ol. amygd. an. lil. alb. butyr. rec. an. unc. ij. vel vitell. ov. N. j. ol. scorp. unc. i. ung. de alib. unc. i. s. M.

**Sacculi anodynii.** R. Herb. malv. alib. pariet. saxifrag. fl. chamom. melil. aneth. an. m. iv. rad. alib. unc. iv. herb. chercfol. m. ij. sem. lin. fen. græc. an. m. j. anif. dr. ij. M. incif. dentur ad chari. pro 2. Saccul. in aquâ vel lacte coq. & alternatim applicandis.

**Balnea vide supra de usu Therm. & Balneorum.** Atque hæc, ex infinitis hæc de materiâ conceptis remediorum Formulæ, pro praxi sufficiunt, uti & illa, quæ supra de Diureticis insinuavimus. Sicuti enim illa & huc quoque spectant, ita etiam pleraque horum ad illa reduci possunt.



## CAPUT IX.

De Officiô Medici, in considerandis & præscribendis Appropriatis & Confortantibus.

### ARTICULUS I.

De Officiô Medici, in ordinandis & præscribendis Remediis Cephalicis.

#### I.

**M**edicamenta Cephalica dicuntur, quæ cerebro magis amica, ejûque affectibus tollendis magis destinata sunt, hinc etiam pro varietate affectuum, varia sortiuntur nomina, ut *antapoplectica*, quæ contra apoplexiam, *antiepileptica*, quæ contra epilepsiam, *antispasmodica*, quæ contra motus convulsivos, *antidynica*, quæ contra vertiginem, *antilethargica*, quæ contra lethargum, *antiephalica*, quæ contra incubum specifica & appropriata existunt; idem dicendum de *antiparalyticis*, *antimelancholicis*, *anticatarrhalibus* & similibus. Agunt hæc medicamenta, vel respiciendo membranas & nervos, quorum irritationem, tensionem ac vellicationem demulcent, acrimoniam causæ absorbent, eamque discutunt; vel respiciendo humores & inprimis lympham, quam temperant, corrigunt, excedentem absumunt, vel deficientem reſtaurant; vel respiciendo spiritus, quos sopitos & deficientes excitant, reſtaurant, æstuentes & efferratos ligant & compescunt; vel respiciendo vapores & poros cerebri, dum illos discutunt: hos vel nimis oclusos & obſtructos aperiunt, præſertim volatilia & inprimis urinosa, vel nimis hiantes & dilatatos claudunt.

#### II.

In usu horum Not. 1. Medicamenta cephalica alia esse volatilia, & quidem vel sulphure oleosô aromaticô suavi pollentia, vel volatilia urinosa aut acida; alia fixa, & quidem vel terrea, vel acida, vel nitrosa: alia ex his mixta. 2. Nimis calida, oleosa, spirituosâ ac vaporosa, spiritus subinde nimis efferrare, turbare ac corpus ferire, præſertim in iis, quibus systema cerebri & nervorum sensibilis, spirituumque textura tenerior. 3. Ex his camphorata præcipuè iis nocere, quibus caput debile, & spiritus tenerioris ac laxioris compagis. 4. Cephalica hæc magis convenire & principaliter, capite per se & essentialiter affectô: minùs & non nisi restrictè, & secundariô, ubi per consensum. 5. Lympham in capite nec nimis absumendam, nec nimis fundendam vel concentrandam esse per cephalica. 6. Sicuti vitanda spiritus nimis efferos redentia, ita eos non nimium ligandos esse, per opiatâ incautiùs & frequentiùs data, præſertim in Infantibus. 7. Cephalica etiam nervis amica esse, ac symbolizare quoque cum stomachicis & uterinis.

#### Formulæ

##### Remediorum Cephalicorum.

**Julepus anti-Epilepticus.** R. Aq. ceras. nig. unc. v. epilept. Lang. unc. i. syr. fl. pæon. unc. i. conf. alk. compl. dr. β. sp. vitriol. q. f. pro grata aciditate M. S. rothes Vergicht-Wässerlein Löffel voll weiß zu gebrauchen. Suavis & utilis est, præſertim in infantibus.

**Mixtura anti-Apoplectica.** R. Elix. vit. Matthiol. unc. i. β. sp. ceras. nig. unc. iij. aq. cinnam. unc. ij. essent. rorism. dr. ij. man. Christ. perlat. unc. β. M. Vel R. Elix. vit. Matthiol. unc. vi. sp. ceras. nig. dr. vi. julep. ros. unc. i. s. essent. amb. dr. iij. M. S. Elixier wider den Schlag darvon ein Löffel voll so woll zu Verhütung, als auch in dem Paroxysmo zu nehmen.

**Alia.** R. Aq. ceras. nig. meliss. lil. convall. an. unc. i. s. apoplect. dr. vj. cinam. dr. ii. elix. vit. Matthiol. dr. i. s. conf. alk. dr. i. s. magist. corall. perlat. an. scr. i. man. Christ. perl. dr. ij. M. S. Schlag-Mixtur darvon aufgerührter 1. oder 2. Löffel voll zu Zeiten einzugeben.

**Aqua Cephalica confortativa.** R. Aq. apoplect. perlat. officinal. an. unc. ii. cinam. bugl. d. iij. marg. orient. præp. corall. rub. præp. an. scr. i. confect. alk. complet. dr. s. sp. lil. convall. ceras. nig. an. dr. ij. cephal. Anhalt. dr. i. sacch. perlat. dr. ij. M. S. Haupt- und Herz-stärckendes Wasser.

**Vinum anti-Catarrhale.** R. Lign. saffastr. juniper. lentisc. an. unc. ij. rad. caryophyllat. unc. i. herb. rorism. rec. hyssop. cent. min. an. m. j. serpill. m. β. cinam. dr. ij. cubeb. cardam. an. dr. j. Incisis affund. vin. opt. mens. iv. stent in infus. De hoc vinô bibatur haustus in principiô passus.

**Emulsio anti-Epileptica.** R. Sem. pæon. dr. ij. C. C. ust. præp.



præp. scr. iv. aq. ceras. nig. lil. convall. an. unc. ij. borrag. unc. i. & M. F. Emuls. add. lap. bez. orient. gr. vi. sacch. cand. alb. unc. & M. posset etiam addi pulv. March. antepilept.

Electuar. anti-Catarrhale. R. Conf. fl. anth. unc. iij. ros. rub. unc. j. nuc. indic. condit. dr. vj. medull. nuc. ind. condit. dr. ij. cubeb. dr. ij. s. coriand. præp. dr. j. & thur. oliban. an. scr. ij. essent. salv. dr. ij. syr. de ros. sicc. q. s. M. F. Elect. De quo v. sub horam decubitus magnitudo nuc. jugl. sumenda.

Electuar. confortans Cephalicum. ℞. Conserv. ros. damasc. fl. anth. salv. primul. ver. an. unc. i. s. cort. cit. condit. & incis. dr. x. calam. arom. condit. & incis. vel z. z. dr. vi. caryoph. incis. spec. arom. ros. an. dr. iij. syr. de cort. cit. q. s. M. F. Elect. S. Haupt-stärckende Latwergen, darvon Morgends und Abends einer Köstchen groß zu nehmen.

Electuarium anti-Epilepticum. ℞. Conf. fl. pæon. unc. j. nuc. mosch. condit. unc. ii. cort. cit. condit. unc. s. spec. aromat. ros. dr. j. s. syr. fl. pæon. q. s. M. F. Elect. Vel quod pretiosius. R. Pulv. epilept. unc. s. medull. nuc. ind. condit. dr. vi. conf. alk. de hyac. an. dr. ij. tincl. lun. dr. ij. sp. til. lil. convall. ros. an. scr. i. essent. amb. dr. ij. syr. de pæon. q. s. M.

Electuarium contra Vertiginem. R. Conf. ros. rub. unc. ij. majoran. beton. an. unc. s. nuc. ind. condit. dr. ij. confect. alk. compl. dr. i. s. spec. diamb. contra apoplex. an. dr. s. specific. cephal. scr. i. vel succin. præp. syr. de cort. cit. vel de stæchad. q. s. M. F. Elect. S. Latwergen vor den Schwindel, Morgends und Abends einer Nuss groß darvon zu nehmen.

Electuar. anti-Melancholicum. R. Conserv. fl. anth. borrag. nymph. bugloss. an. unc. s. myrob. condit. dr. vi. conf. alk. scr. iv. spec. lætif. Rhaf. de geminis frig. an. dr. i. Elix. vit. Maith. dr. i. syr. corall. q. s. Vel quod pretiosius. R. Confect. de hyac. unc. i. alkerm. dr. iij. lap. bez. scr. i. smaragd. præp. scr. ij. ung. alc. s. igne præp. dr. j. magist. succin. alb. perlar. corall. rub. præp. an. scr. i. sp. ros. rub. idæ. lil. convall. an. gut. xij. syr. fl. pæon. q. s. M. f. Elect.

Morsuli Cephalici. R. Spec. diamb. diamosch. d. an. dr. ii. cubeb. dr. ij. cardam. dr. i. nuc. ind. condit. unc. i. cort. arant. condit. dr. vi. medull. nuc. ind. dr. ij. macer. dr. i. sacch. albiss. in aq. lavend. solut. q. s. M. F. Morsul. ol. destill. nuc. mosch. aspergendi. S. Hauptstärckende Morsellen, darvon nach Belieben zu gebrauchen.

Tabellæ anti-Apoplecticae. R. Spec. diamb. dr. ii. pulv. rad. pæon. mar. zedoar. an. dr. i. s. marg. præp. dr. j. ol. succin. puriss. dr. s. sacch. albiss. in aq. pæon. sol. & ad tabulat. coct. unc. vj. M. F. Tabell. pond. dr. s.

Morselli pro confortandâ Memoria. R. Confect. alk. dr. i. s. thur. opt. dr. ii. smaragd. præp. dr. i. marg. præp. dr. s. ol. nuc. mosch. express. scr. ij. s. cinam. gut. iij. lig. Rhod. gut. ij. amb. mosch. an. gr. iv. sacch. in aq. ros. dissol. q. s. f. confect. in Morsell. S. Gedächtnis-stärckende Morsellen Morgends nüchtern zu nehmen.

Alia. R. Spec. diamb. diamosch. dulc. an. scr. ij. succin. alb. præp. scr. s. confect. alk. compl. scr. i. ol. carv. scr. s. ol. succin. gut. v. sacch. albiss. in aq. lavend. sol. q. s. M. Vel sequentes Horslii. R. Confect. anacard. dr. i. thur. el. dr. ij. piper. z. z. an. dr. s. sacch. in aq. major. sol. lib. i. add. ol. cinam. gut. vi. rorism. gut. iv. M. F. Tabellæ, de quibus dr. ij. dentur matutinò tempore.

Rotulæ gratissimæ Cephalicæ. R. Spec. diamb. dr. ij. confect. alk. compl. scr. ii. amb. grys. gr. vi. sacch. albiss. in aq. nuc. mosch. vel ros. & cinam. dissolut. q. s. M. F. Rotul. Alii addunt etiam succ. lim. q. s. S. Haupt-stärckende-Zeltlein.

Alia contra Vertiginem. R. Ol. destill. carv. scr. s. nucist. gut. vij. confect. alk. rad. doron. pulv. an. dr. s. extr. lig. aloë. gr. xv. sacch. in aq. salv. & beton. dissol. q. s. M. F. Rotul. quibus ad finem addi potest mosch. ad scr. s. amb. gr. iij. M.

Alia anti-Apoplectica. R. Spec. diamb. compl. diamosch. an. dr. i. succin. albiss. scr. i. ol. anis. gut. iij. sacch. in aq. lavend. sol. unc. iv. M. F. Rot.

Pulvis Cephalicus corroborans, Fabri. ℞. Confect. diamb. unc. ij. diamosch. dulc. unc. i. cubeb. mac. doron. cost. vcr. cass. lignæ succin. alb. præp. lig. aloës an. scr. i. amb. grys. scr. s. mosch. gr. v. ol. dest. cinam. scr. i. fol. aur. N. vi. sacch. seu manus Christ. tabul. ad pondus omnium. M. F. pulv. S. Haupt-stärckendes Pulver, darvon eine gute Messer-Spiß voll Morgends und Abends langsam in den Mund zergehen zu lassen.

Pulvis anti-Apoplecticus. R. Cinnab. nat. cinnab. antim. spec. contra apoplex. complet. an. unc. s. M. F. Pulv. de quo m. & v. sumatur scr. i. ex aq. ceras. nig.

Alius. R. Succin. alb. pulv. dr. ij. spec. diamb. dr. i. sem. carv. dr. s. M. F. Pulv. subtiliss. de quò sumatur cuspid. singulis mensibus, primò die post novilunium.

Pulvis anti-Epilepticus. R. Pulv. de Guaiac. vel March. epilept. dr. i. cinnab. antim. gr. xxiv. (subinde etiam lapid. bez. unicorn. an. scr. s.) M. F. Pulv. divid. in 3. p. æq. S. Vergicht Pulver auf dreymal.

Alius. ℞. Pulv. March. mirab. epilept. Mins. an. scr. ij. cinnab. nat. præp. cinnab. antim. an. scr. i. magist. cran. hum. magist. ungul. alc. an. scr. s. M. F. Pulv. dos. m. & v. cuspid. cultell. ex seq. aq. R. Aq. ceras. nig. fl. uil. pæon. an. unc. i. epil. Lang. unc. s. syr. fl. pæon. unc. s.

Tragæa specifica in Vertigine. R. Fl. euphras. dr. iij. mac. dr. i. corall. rub. præp. dr. i. succin. alb. præp. gr. xv. sacch. ros. tabul. unc. iv. ol. destill. carv. sænic. nuc. mosch. an. gut. vij. M. F. Tragæa.

Alia. R. Spec. diamosch. d. dr. ij. diamb. dr. s. mac. pulv. rad. doron. an. scr. iv. sacch. fin. unc. iij. M. F. Trag. cui add. amb. gr. xv. Vel R. Sem. carv. præp. coriand. præp. anis. sæn. an. unc. s. cardam. cubeb. an. dr. i. s. nuc. mosch. dr. i. mac. scr. s. caryoph. scr. s. sacch. q. s. M. F. Trag.

Tragæa confortans Cephalica. R. Spec. diamb. complet. diamosch. d. an. dr. s. diaxylo alcè scr. i. cinam. opt. dr. ii. succin. alb. præp. marg. præp. an. scr. i. nuc. mosch. dr. i. mac. cubeb. cardam. caryoph. an. scr. s. sacch. albiss. unc. iij. fol. aur. N. ii. M.

Cucupha in Catarrhis. R. Fol. meliss. majoran. orig. an. p. s. fl. ros. rub. dr. ij. lavend. stæch. Arab. rorism. pæon. tunic. an. dr. i. thur. nuc. mosch. cinam. caryoph. gr. kerm. vel succin. alb. præp. an. dr. s. gum. clem. benz. an. dr. i. storac. calam. dr. ii. grossò modò trita includ. sind. rub. frequentique filò interpassata in formam Cucuphæ redigantur.

Alia in Vertigine & Incubò. R. Herb. rorism. major. salv. an. p. iii. fl. ros. anth. pæon. chamom. an. p. i. storac. calam. mast. succin. an. dr. s. sem. coriand. præp. scr. ii. cubeb. caryoph. an. dr. s. nuc. mosch. dr. i. rad. Ir. flor. spec. diamb. an. scr. i. M. crassiusculè incid. & conquass. ac cum sind. rub. f. Cucupha.

Alia spiritus animales confortans. R. Herb. major. rorism. beton. meliss. puleg. an. m. & fl. ros. rub. lavend. anth. an. p. i. thur. mast. rad. Ir. flor. cort. cit. sandarach. an. scr. i. caryoph. mac. cubeb. cardam. an. scr. s. spec. diamb. complet. dr. i. s. sem. coriand. nigell. an. dr. s. succin. cit. scr. i. s. mosch. gr. vii. amb. gr. iii. M. S. Species pro Cucuphâ.

Pulvis Crinalis. R. Rad. cyper. long. calam. arom. ros. rub. an. dr. vi. benz. unc. s. xyloal. dr. iii. corall. rub. succin. an. dr. ii. farin. fab. unc. ii. rad. Ir. flor. unc. iv. M. f. Pulv. subtil. add. mosch. zibeth. an. gr. v. M. S. Besondere Haar Poudre, das Haupt und die Gedächtnis zu stärken: auch das Haar wachsen zu machen.

Odorament. in affectibus Soporosis. R. Sp. sal. armon. urinos. vel C. C. dr. i. s. indatur vitro angustî orificiî. S. Besonderer Geist zum riechen.

Odoramentum spiritus animales excitans. R. Aq. meliss. lil. convall. an. unc. i. apoplect. cum amb. & mosch. unc. s. acet. rutac. dr. i. M. S. Anstreich-Wasser an die Schläff und Nasen. Vel R. Aq. ros. in B. M. destill. unc. i. lavend. cinam. an. dr. vi. Elix. vit. Maithiol. dr. ii. acct. fl. tun. unc. i. ros. dr. vi. sp. arom. ros. dr. i. M.

Nodulus & Aqua odorifera. R. Fol. meliss. p. i. cinam. mac. galang. caryoph. an. scr. & M. incisa includ. 2. Nodul. ex sind. alb. in aquâ sequenti madefaciendis. R. Aq. ros.



ros. fragrant. unc. ii. odorif. Fuchsi unc. i. spirit. cephal. Anhalt. compl. dr. s. acet. ros. rub. id. an. unc. ii. mosch. gr. ii. M.

Balsamus Cephalicus. ℥. Ol. nuc. mosch. express. scr. iv. Bals. apoplect. scr. i. ol. rut. scr. s. succin. gut. vii. M. S. Haupt-stärckender Balsam.

Alius anti-Epilepticus & contra Vertiginem. ℥. Bals. rut. scr. i. mac. caryoph. ros. an. scr. s. ol. dest. succin. gut. v. caryoph. gut. iii. M.

Alius anti-Apoplecticus. ℥. Bals. apoplect. succin. majoran. nucist. an. scr. s. ping. castor. gr. i. M. S. Vermischter Schlag-Balsam an die Nasen, Schläff und Wirbel des haupts zu streichen.

Alius Memoriam confortans. ℥. Bals. apopl. scr. i. majoran. succin. an. gr. v. ping. castor. gr. ii. ol. succin. gut. ii. M.

Pediluvium anti-Catarrhale. ℥. Herb. absinth. orig. arthemif. serpill. salu. fl. chamom. ros. rub. an. mi. ciner. sal. mi. M. F. Decoct. in aq. f. q. vel in lixiv. ex cin. lig. juniper. parat.

Aliud. ℥. Herb. salu. hyssop. orig. thym. beton. major. an. mi. fl. cham. mi. s. stæch. summit. aneth. an. mi. bacc. juniper. unc. ii. sal. unc. iii. incid. grossô modô pro Pediluvio, à cuius abstersione plantæ pedum inungantur calidissimè medullâ cervinâ.

Aliud simplex in dolore Capitis. ℥. Aq. dulc. mens. viii. sal. comm. m. ii. salu. hort. m. iii. acet. lib. ii. coq. invicem & usurpentur pro Pediluvio.

## ARTICULUS II.

De Officiô Medici, in considerandis & præscribendis Remedis Ophthalmicis.

### I.

**M**edicamenta Ophthalmica dicuntur, quæ Oculis amica, affectibus eorum succurrunt, & quidem vel eos roborando ac visum acuendo, dum conjunctum spiritus, humores, nervos & caput respiciunt, atque hæc dicuntur oxydorcica ac propriè ophthalmica, suntque cephalica ferè, nervina ac balsamica, utilia in amaurosi, visus imbecillitate, & caligine; vel exsiccando & detergendo in Cataracta, ungue, excrescentiis &c. Vel demulcendo ac dolorem mitigando, in doloribus oculorum, vel vi traumaticâ eis subveniendo, in vulneribus; vel humores influentes repeliendo, ut in ophthalmiâ incipiente; vel consistentes ibi seu halitus & vapores, seu humores in coagulum abituros discutendo, ut in fugillatione, ophthalmiâ &c.

### II.

Circa usum horum haud immeritò cautelæ quædam observandæ, nam juxta vulgatam parœmiam

Non patitur lufum, fama, fides, oculus.

Not. igitur 1. in Oculorum affectibus non solum locum, sed & focus spectandum esse; nam licet locus sit Oculus, focus tamen sapissimè tum caput, tum hypochondria, tum tota M. S. acris, serosa & scorbutica. 2. Repellentia non debere esse nimis frigida, adeò quidem ut repellant, sed non impellant ac impingant, atque etiam locum magis habere capite evacuato, præsertim in ophthalmiis gravioribus. 3. Suppurationem interiorem oculis funestam esse, & sic arcendam frigidiusculis, discutientibus, V. S. & vesicatoriis; hinc etiam emollientia, enplastica ac anodyna oculis inflammatis magis nocent, quam profunt. 4. Opiata cautè quoque in doloribus ac inflammationibus oculorum usurpanda esse, utpote quæ magis obacrimoniam morficant, quam dolorem leniunt. Idem ferè dicendum de lacte muliebri, quod etiam tum ob unctuositatem suam, tum ob facilem acescentiam suspectum est in doloribus oculo-

rum, saltem illud non diu ibidem relinquendum, sed singulis horis mutandum.

### III.

Præterea 5. Notandum: acriuscula in tempore applicata optima esse ophthalmica. Observavit enim Plater. Cuidam ex casu mercurium sublimatum, loco sacchari inspersum fuisse sine noxa. Wedl. idem observavit de spirit. vitriol. ut adeò oculus aciora ferat medicamenta. Interim non promiscuè inferenda oculis aciora, cum morficatis fibris, & citatò affluxu, inflammatio augeri possit. 6. In affectibus oculorum vitanda esse sternutatoria, caput concutientia & lacrymas ex oculis cientia. 7. Remedia ophthalmica debere esse à fordibus optimè purgata, diligentissimè insuper trita & cribrata. 8. Topica in suffusione & guttâ ferenâ plus promittere, quam præstare: interim tamen aliqua tentari posse. 9. Topica in ophthalmiâ debere vergere ad frigiditatem, si repellendum; ad caliditatem, si discutiendum. 10. Topica adstringentia, temporibus, pro influxu interceptiendò, applicanda esse.

## Formulæ

Remediorum Oxydorcicorum & Ophthalmicorum.

**V**inum Euphragiatum. ℥. Rad. enul. unc. iv. fol. & fl. euphras. m. iii. sem. fœnic. filer. mont. an. unc. ii. inclusa Nodulo suspend. in musto, donec efferbuerit.

Electuar. Ophthalmicum, longò usû probatissimum, Timæi. ℥. Succ. euphras. unc. ii. fœnic. unc. i. chelidon. rut. lavend. ros. pallid. an. unc. s. mell. virg. probè despum. unc. ix. coq. ad consist. syrup. add. pulv. euphras. rec. siccat. unc. i. sem. fœnic. dr. ii. s. filer. mont. dr. ii. mac. cubeb. cinam. an. scr. i. s. M. F. Elect. S. Larvvergen, das Gesicht zu stärken und zu erhalten, darvon einer Kisten gross Morgens und Abends zu nehmen.

Aliud. ℥. Conf. fl. beton. anth. an. unc. ii. myrob. condit. N. ii. zher. vet. dr. ii. cubeb. dr. ii. sem. fil. mont. scr. ii. succin. alb. præp. scr. i. mac. scr. ii. spirit. euphras. dr. ii. Essent. rorism. dr. i. cum syr. de stæch. s. q. M. F. Elect.

Pulvis oxydorcicus. ℞. Sacch. cand. alb. canarienf. confect. sem. fœnic. an. unc. i. pulv. fl. euphras. dr. ii. sem. fœnic. dr. iii. rad. valerian. dr. vi. ol. destill. fœnic. gut. xi. major. gut. iv. M. F. pulv. S. Augen und Gesicht stärckendes Pulver.

Alius. ℥. Rad. pæon. unc. s. valerian. dr. iii. sem. pæon. dr. ii. fœnic. dr. i. sal. euphras. dr. i. s. C. C. phil. præp. ungul. alc. præp. an. dr. i. tart. chalyb. dr. ii. ant. tim. diaph. dr. i. s. cinab. nat. dr. i. cryst. præp. dr. iii. man. Christ. perlut. unc. i. s. M. F. Pulv.

Tragæa Visum corroborans. ℥. Fol. Euphras. cum fl. unc. s. sem. coriand. acet. præp. dr. iij. fœnic. dr. i. s. carv. scr. ii. s. cinam. acut. dr. i. nuc. mosch. scr. iv. pellicul. intern. ventric. Gallin. scr. ii. rotul. man. Christ. unc. iii. s. ol. fœnic. gut. xi. carv. gut. vii. nuc. mosch. gut. v. M.

Alia. ℞. Sem. coriand. præp. rapar. anis. fœnic. an. dr. ij. pulv. euphras. filer. mont. caryoph. cardam. min. cubeb. cinam. an. dr. i. nuc. mosch. dr. ii. sacch. rosat. tabul. ad pondus omnium. M. F. Tragæa.

Sal usualis oxydorcicus. ℞. Sal. comm. unc. ii. Euphras. sicc. dr. ij. nuc. mosch. dr. i. cinam. scr. ii. M. S. Besonders Gesicht stärckendes Saltz die Speisen darmit zu saltzen.

Fomentum ophthalmicum Plempii, utile in Guttâ ferenâ & Suffusione. ℥. Fœnic. rut. hyssop. euphras. chelid. verben. beton. puleg. an. m. s. sem. anis. fœnic. carv. ameos. filer. mont. an. dr. ii. euphras. unc. s. mac. cinam. caryoph. nuc. mosch. an. dr. i. incif. & conquass. coq. ex f. q. aq. vel si fortius agendum in vino, additò postmodum etiam sp. vin. applicetur cum petiis duplicatis, quotidie ter vel quater.

### I

Aqua



Aqua Ophthalmica *Quercet.* Visum clarificans, ac utilis in Suffusione incipienti. ℞. *Croc. metall. dr. i. aq. chelidon. maj. unc. vi. infund. hujus aq. tepidæ 3. vel 4. guttæ homine resupino jacente intra oculos, infunduntur ter vel quater de die, & quidem per multos dies.*

Alia. ℞. *Aq. fœnic. chelid. m. euphrag. an. unc. i. vitriol. alb. scr. s. aloës scr. i. M. F. Collyr.*

Collyrium anti-Ophthalmicum expertum. ℞. *Album. ov. N. i. agitur cum frusto aluminis in patinâ stannæ ad consistent. Unguent. quod extend. super linteum & tepidè oculis applicetur.*

Aliud in formâ aquæ expertissimum. ℞. *Aq. ros. plantag. an. unc. ij. solan. unc. i. vitriol. alb. scr. i. dissolv. & colat. a'd. tut. præp. scr. i. alii etiam addunt flor. zink. scr. s. vel sacch. sat. camph. &c. S. Augen-Wasserlein.*

Aliud. ℞. *Aq. ros. alb. fœnic. euphrag. an. unc. ii. sp. vin. rectif. dr. i. sacch. alb. tut. præp. an. dr. i. M. S. ut suprâ.*

Collyrium aliud anti-Ophthalmicum. ℞. *Ov. Gallin. ad duritiem coct. & demptâ testâ & vitello cavati, inde sacch. sat. gr. vi. camph. gr. ij. vitriol. alb. gr. iij. mell. ros. unc. s. postquam paulisper ita mixta steterint, fortiter exprim. & si liquor nimis crassus, add. aq. ros. q. s. Alii cavitatem replent vitriol. alb. hinc suspendunt ovum in cella, ut liquor in aquam rosar. suppositam defluat, & exprim. Colaturæ guttæ aliquot in oculos infunduntur, linteoque madidò teguntur.*

Collyrium in formâ Linimenti. ℞. *Butyr. recensiss. q. pl. lapid. calaminaris in alcohol redact. q. s. ut fiat Ung. Vel ℞. Butyr. rec. 9. aq. ros. lot. unc. s. tut. præp. dr. i. camph. dr. s. Vel ℞. Axung. porc. absque sale, vinò lot. unc. i. camph. scr. s. his mixtis add. sacch. satur. scr. i. tut. dr. s. ocul. can. præp. corall. rub. præp. marg. præp. an. gr. xv. M. f. de his ung. cujus tempore somni, magnitudo lenis immutatur cantho majori, & palpebræ inungantur.*

Cataplasmâ Anodynum, expertum in doloribus Oculorum, & præsertim in contus. & vulneribus. ℞. *Pom. dulc. N. iii. coq. ex aq. ros. & plantag. f. q. ad mollit. trahic. per crib. pulpæ add. sacch. albiss. dr. ii. camph. gr. xi. croc. gr. v. M. F. Catapl. applicandum tepide ac sæpius iterandum.*

Collyrium in Vulneribus. ℞. *Aq. ros. fœnic. euphrag. an. unc. i. tut. dr. i. camph. gr. iii. sief. alb. s. op. vel sacch. sat. scr. i. sacch. cand. alb. dr. i. M.*

Collyrium pro maculis & nebulis detergendis. ℞. *Croc. metall. subtiliss. pulv. dr. i. vitriol. alb. scr. s. aq. ros. rub. unc. s. flor. cichor. per deliq. unc. iii. macerentur tepidè per horas 6. filt.*

Aliud. ℞. *Tut. præp. dr. s. marg. præp. scr. s. camph. vitriol. alb. an. gr. ii. sacch. cand. alb. dr. i. M. F. Pulv. subtiliss. m. & v. oculo, pisi magnitudine inspergendus. Hòc absolutò, ℞. Pingued. Thymal. pisc. Aschen-Schmaltz scr. ii. fel. lucii pisc. scr. i. M. F. Mixt. m. & v. lentis quantitate oculi cantho majori indenda.*

Aqua experta Timæi in Epiphora. ℞. *Tormentill. grossò modò pulver. dr. i. alum. gr. v. aq. ros. plant. an. unc. i. stent in locò calidò per diem & noctem, filt.*

### ARTICULUS III.

De Officiò Medici, in considerandis & præscribendis Remediis Oticis.

#### I.

**M**edicamenta otica dicuntur, quæ Auribus amica, affectibus eorum succurrunt, & quidem vel intrinsecus cerebrum roborando spiritusque vigorando, ut influant, nec stationem suam deferant, qualia sunt cephalica; vel extrinsecus, seu detergendo, mundando, ac obstructions referando, vel humiditates superfluas exsiccando seu discutiendo, vel flatus resolvendo, vel dolorem leniendo.

#### II.

In usu horum Not. 1. in affectibus Aurium etiam semper magis respiciendum esse ad caput: immò ad alia viscera, quàm ad aurem ipsam. Sic in affectibus aurium quibuscunque, qui non oriuntur à solâ causâ externâ. Medicamenta martialia, splenetica & hypochondriaca sunt optima. Proinde etiam in otalgia diaphoretica unicè profunt, cum lymphâ plerorumque, si non omnium affectuum aurium potissima causa sit. 2. Cavenda esse in affectibus aurium, quæ spiritus vel nimis confundunt, ut sternutatoria, vel obtundunt, ut frigida nimis, actû vel potentiâ. 3. Tepida debere esse Otica auribus indenda, quæ blandè demulceant, cum frigida nervis & nervosis partibus sint adversa. 4. Priusquam topica applicentur, sordes aurium probè esse removendas, ut scil. aditus pateat, nec viscositate illâ sordidâ virtus remedii obtundatur. 5. Topica formâ suffutis magis exsiccare, vaporosa humida magis demulcere, oleosa & spirituosâ magis discutere; in singulis tamen cavendum, ne quid nimis, cum vaporosa frequentius usurpata, partem debilitent, & aquea, membranulam laxent.

#### III.

Præterea, 6. Not. præstare Iniectiones & decocta clysteris modò parata omittere, nisi urgeat necessitas. 7. Si emolliendum vel demulcendum, topica immediatè instillari posse: contrâ quando roborandum, cum bombace immitti. 8. Tres vel quatuor guttas de liquidis pro unâ dosi sufficere, neque enim consultum est, hunc angiportum obruere. 9. Immissis topicis in aurem oppositam cubandum esse, ut melius penetraret, & profundius illabatur medicamentum. 10. Valdè anctiosa & viscida, quæ meatum obviscant, non temerè auribus indenda esse, hinc non conveniunt olea crassâ, rancida, pinguedines, linimenta &c. si ol. amygd. & pingued. anguillæ vel serpent. excipias. 11. Acriora auribus nunquam instillanda esse, cum tenuis membrana lædi, & facile erodi possit, unde dolor & inflammatio. Valet id inprimis in oleis destillatis, quorum hæc est differentia, ut inprimis quædam possint ad paucas guttulas immitti, ut leniora, si præsertim refracta dispergantur; hinc commodissimè olea carminativa permiscuntur cum ol. amygd. amar. quædam verò bombace excepta, possunt saltem indi, ut v. g. ol. destill. anis. quædam verò planè vitanda sunt, vel non nisi parcè aliis remiscenda, ut v. g. ol. destill. juniper. succin. aliaque calidiora. 12. Immissis topicis, aurem obturandam esse gossypio moschato, quod solum subinde prodest. 13. Masticatoria in applicatione topicorum non esse negligenda, ut meatus auditorius, qui ab aure ad os tendit, magis aperiatur; hinc masticetur cinam. vel cubeb. vel mastix, &c.

#### Formulæ

##### Remediorum Oticorum.

**I**njectio auricularis in Surditate & dolore. ℞. *Anth. mij. coq. in urin. puer. lib. i. s. ad lib. i. Col. add. Rhodomell. unc. iv. M.*

Decoctum pro evaporatione in Aures. ℞. *Ment. salv. puleg. rorism. cent. min. cinam. abrot. an. mi. bull. in vin. alb. generos. s. q. ad 3. part. consumpt. Vel ℞. Sem. carv. dr. ii. bacc. laur. N. ij. fl. chamom. fol. salv. rorism. an. mii. coq. in s. q. aq. tempore decubitus excipiat vapor. Hinc ℞. Zibeth. gr. iv. mosch. gr. ii. ol. dest. salv. rorism. an. gut. iv. hæc mixturâ imbuatur gossypium, quò aures obturentur.*

Aliud. ℞. *Herb. serpill. major. meliss. rut. puleg. ab-sinth. tanacet. cent. min. an. mi. rosm. m. s. flor. lavend. beton. stach. salv. an. m. s. bacc. laur. unc. ij. Juniper. unc. i. coq. ex aq. & vin. alb. s. q. colatura servetur pro evapora-*



evaporatione, masticando sub ea mast. vel cinam. à fomentatione auribus imponatur gossypium madefactum Elix. vit. Matth. vel aq. apoplect. vel essent. aconist. Mins. vel spirit. Anbalt. aut aq. Regin. Hungar. vel pingued. anguill. aut serpent. cum paucis guttis ol. destill. anis. vel succin. vel cum Bals. peruv. Vel ʒ. Ol. amygd. amar. dr. iii. Bals. peruv. scr. iv. ol. destill. ro-rism. gut. iii. M.

Aliud fortius. ʒ. Elleb. alb. dr. ii. pulp. colocynth. scr. s. castor. dr. s. orig. serpill. rut. an. m. s. fol. laur. unc. s. cubeb. dr. s. coq. in vin. & aq. an. p. æq. excipia-tur vapor.

Suffitus siccus. ʒ. Thur. mast. succin. an. unc. s. ca-stor. scr. i. lign. guaiac. dr. i. s. ladan. benz. an. dr. ii. confract. & incis. dentur ad scat. S. Rauch zu den Ohren. Post suffitum. ʒ. Bals. peruv. gut. xv. ol. dest. anis. gut. ii. zibet. opt. gr. ii. M. inting. bombax ac particula ejus auribus imponatur.

Alius. ʒ. Lign. aloës dr. s. mast. thur. an. scr. iv. alipt. mosch. gr. iv. M. pro fundò, quem accipiat æger per infundibulum inversum ter de die. Hinc ʒ. Ol. dest. lig. Rhod. gut. iv. anis. gut. iii. succin. gut. ii. amb. grys. gr. iv. dissolv. s. a. & M. cum bombac. moschat. ad scr. ii. s. detur in Charta. S. Vermischte Bisam Baumwolle, dar-von ein Stick ins Ohr zu thun.

Alius. ʒ. Lig. alcës dr. i. thymiam. benz. an. scr. iv. mast. dr. i. M. pro Suffit. hinc ʒ. Ambr. gr. iii. mosch. gr. ii. rotul. man. Christ. N. ii. M. exactissime & insperge bom-bac. madefact. cum ol. anis. post suffitum immitte parti-culam auribus noctu, & repete aliquot diebus.

Mixtura experta Plateri, in Tinnitu aurium ex casu. ʒ. Aq. vit. cochl. i. succ. cep. cochl. dimid. ol. dest. spic. gut. iv. M. & auribus instill.

Turundæ acousticæ. ʒ. Gall. pic. naval. an. dr. ii. elleb. alb. pulv. scr. v. zibeth. gr. vi. M. divid. in p. viii. vel x. formâ instar caryophyllorum in sindone rarissimâ involvendas, filò ad extremitates majores appensò, ut ex aure extrahi possit.

Mixtura in Dolore aurium vehementi. ʒ. Ol. amygd. d. vel lact. mulieb. dr. ii. castor. croc. an. gr. i. s. pulv. op. gr. iii. cum gossypio indatur auri dolenti calidè.

Evaporatio anodyna. ʒ. Fol. plantag. solan. an. mi. fl. chamom. melilot. an. pi. coq. in lact. pro suffumig. Vel ʒ. Malv. bismalv. violar. lactuc. an. mi. sem. malv. cy-don. an. dr. i. s. fl. cham. melil. ros. an. pi. f. Decoct. pro evaporat. vel foment. Hinc ʒ. Lact. mulieb. unc. ii. al-bum. ov. in liquorem versi unc. s. instill. tepidè.

Cataplasma anodynum. ʒ. Herb. malv. bismalv. an. mi. medull. pan. alb. unc. iv. coq. in s. q. lact. vacc. vel capr. ad consist. pulv. adde vitell. ov. N. ii. ol. ros. unc. ii. croc. scr. i. M. F. Catapl. moderatè calidè applican-dum. Vel ʒ. Cep. sub cineribus coct. N. i. butyr. rec. unc. ii. ol. chamom. ros. an. unc. i. croc. scr. i. M. ap-plic. tepidè.

#### ARTICULUS IV.

De Officiò Medici, in prescribendis Remediis  
Odonticis, aliisque Oris & faucium  
affectibus destinatis.

##### I.

**M**edicamenta odontica sunt, quæ Dentibus amica, eos roborant, fordes detergendos dealbant, vitio-sum acidum gingivis & dentibus hostile absorbent, & blanda vi adstrictoria gingivarum tonum conservant & roborant. Ad hæc referuntur ea etiam remedia, quæ in affectibus linguæ, gingivarum, uvulæ ac faucibus conveniunt, ut ex infra annexis formulis videre est.

#### Formulæ

##### Prædictorum Remediorum.

**P**ulvis Dentifricius. ʒ. Off. sep. C. C. ust. pumic. præp. an. unc. iij. mosch. scr. i. asperge spirit. ros. unc. s. & sicca. Hinc ʒ. Gr. kerm. sant. rub. an. unc. s. sp. vin. q. s. pro extrahendâ tincturâ, quâ irrorata aliquo-ties prædictum Pulv. & sicca.

Aliud. ʒ. Mandib. luc. pisc. corall. alb. C. C. ust. alum. ust. rad. Ir. an. unc. s. sal. gemm. dr. i. M. Vel ʒ. Rad. bistort. alum. corall. alb. an. unc. i. M. F. Pulv. sub-tiliss. Vel ʒ. Lapid. pum. subtiliss. pulv. unc. i. pulv. Ir. dr. iii. Gall. mosch. vcr. dr. i. ol. ros. rosmar. salv. cinam. an. gut. vi. silic. fluv. albiss. calcin. & pulv. unc. iv. pan. sigil. tost. pulv. & crib. unc. ii. cin. rosmar. salv. juniper. tabac. an. dr. i. myrrh. alum. roch. an. dr. ʒ. M. f. Pulv. tingi possunt, si placet, hi pulveres vel tinct. santal. & gr. Kerm. vel coctioniglia in aq. aluminosa solut. & pul-veribus aspersa, qui exinde rubescunt, vel leni admo-ti igni, purpurascunt.

Aqua Dentifricia. ʒ. Aq. font. dilue in eâ spirit. vi-triol. vel alum. q. s. ne nimium accescat. Hòc lavamentò quotidie m. & v. cum lacinia laneâ fricentur dentes. Vel ʒ. Alum. ust. subtiliss. pulv. dr. ij. cinam. integ. dr. i. ʒ. aq. ros. fontan. an. unc. iv. bull. in phiala vitrea supra cineres calidos ad ʒ. p. consumpt.

Pasta Dentifricia Dominarum. ʒ. Cryst. præp. dr. i. ʒ. pulv. later. lap. pum. an. unc. ʒ. off. sep. corall. utr. an. dr. ii. margarit. caryoph. rad. Ir. fl. an. dr. i. Mosch. gr. iv. syr. de ros. sicca. vel mell. ros. q. s. ut fiat Pasta mollis pro dentibus fricandis, colluendo postmodum os inò.

Dentifricium Infantum dentientium. ʒ. Butyr. rec. unc. i. mell. despum. dr. vi. corall. rub. præp. unc. ʒ. f. mixt. quâ fricentur Gingivæ bis vel ter in die ad denti-tionem facilitandam.

Opiata Borelli, dentes mundificans, corroborans, ac carnem gingivarum restituens. ʒ. Parum alum. sol-ve in unc. i. sp. sulph. add. conf. ros. vel bugloss. unc. vi. M. & detersò Dentium tartarò admoveatur.

Alia. ʒ. Alum. dr. ʒ. dissolv. ad ignem in unc. iii. acet. hinc add. mell. unc. ii. coq. simul, donec redeant in formam Opiatæ mollis, Hæc mixturâ m. & v. gingivæ fricentur.

Dentiluvium scorbuticum. ʒ. Rad. bistort. sem. co-chlear. an. dr. ij. alum. dr. i. mast. dr. iii. coq. in aq. font. f. q. ad lib. i. col. add. mell. ros. unc. ii. M. f. Lot. S. Mund-Wasser effiers wuarm in den Mund zu halten.

Aliud in Gingivarum erosione. ʒ. Herb. cochlear. veron. salv. prunell. an. mj. polyp. q. unc. ʒ. mast. myrrh. an. dr. ij. alum. dr. ʒ. incis. & comus. coq. in aq. salv. lib. ij. Col. add. mell. ros. unc. iii. M. S. ut suprâ.

Gargarismus expertus in Prunellâ febrium. ʒ. Herb. semperviv. rec. miii. canc. viv. N. iv. aq. semperviv. maj. unc. iv. acetos. fl. nymph. an. unc. iii. M. comund. & exprim. add. acet. fl. sambuc. ros. an. unc. i. ʒ. dissolv. sal. nit. præp. scr. i. diamor. unc. i. M. S. Bevvàbrites Gur-gel Wasser in der Bräune.

Alius. ʒ. Aq. prunell. unc. iv. acetos. frag. plantag. an. unc. ii. semperviv. mai. unc. i. diamor. dr. vi. vel unc. j. vel mell. ros. diamor. an. unc. ʒ. troch. de nit. præp. scr. i. vel dr. ʒ. vel spirit. vitriol. gut. x. M. f. Garg. à cujus usû lingua & fauces illinantur diamor. unc. i. syr. viol. dr. vi. sp. vitriol. gut. iv. M. Vel ʒ. Aq. semper-viv. maj. prunell. an. lib. i. succ. semperviv. m. unc. i. sal. prun. vel armon. dr. i. M.

Gargarismus albus in Aphthis & Anginæ principiò. ʒ. Aq. plantag. ros. rub. spermat. ran. an. unc. iv. al-bum. ov. in aquam agitando redact. N. iii. sacch. cand. vel crystal. unc. i. M.

Gargarismus in dolore, ulcere & inflammatione Uvu-læ & Tonsillarum. ʒ. Decoct. hord. com. mi. vel ii. fl. malv. hort. aut ros. rub. lib. i. rob. diamor. mell. ros. an. unc. i. s. vel diamor. mell. ros. syr. de ros. sicca. an. unc. s.



sp. viuriol. scr. s. M. pro Gargarismate. S. Gurgel-Wasser zum einspritzen.

Alius in Anginâ. ℞. Aq. plantag. solan. ros. caprifol. vel equiseti an. unc. iii. vel ℞. Rad. biflort. dr. ii. cupul. gland. dr. i. fl. ros. rub. m. s. balaust. pi. herb. plantag. scabios. an. m. s. incis. & conquass. coq. ex aq. s. q. in Col. lib. i. dissolv. mell. ros. unc. s. diamor. unc. i. s. alii etiam addunt sp. sulph. q. s. ad notabilem acidit.

Alius simul anodynus, Foresto maximè usualis. ℞. Lact. capr. aq. plantag. an. lib. s. M.

Gargarismus suppurans fit, ex decoct. ficuum & malv. in lacte cum integrò crocò. vel ℞. Rad. alib. dr. vi. glyc. dr. ii. fl. malv. lil. alb. an. m. s. fic. arid. N. vi. coq. cum aq. malv. vel lact. ad 3. in col. lib. i. M. dissolv. mell. ros. unc. i. M.

Gargarismus in Faucium ac gulæ exulceratione, fisturis ac ardore utilis. ℞. Hord. mund. mi. C. C. rasp. unc. i. s. herb. prunell. fl. malv. arbor. an. m. s. fol. semperviv. m. mi. sem. cydon. plantag. an. dr. ij. gammar. fluv. contus. N. vi. incis. & contus. coq. ex aq. font. lib. iii. ad 3. p. consumpt. Colaturâ hac sæpius os colluatur, forbillando subinde unc. i. vel ii. Hinc de sequenti Mixturâ cochl. i. sensim frequenter lingat. ℞. Mucilag. sem. cyd. aq. ros. fact. mell. ros. an. unc. ii. succ. semperviv. rec. cochl. iv. M.

Gargarismus detergens, in ruptò Abscessû. ℞. Scabios. fl. ros. an. mi. coq. ex aq. hord. s. q. in col. lib. i. dissolv. mell. ros. unc. ii. M.

Alius in Ulceribus faucium. ℞. Herb. prun. cochlear. plantag. an. mi. coq. ad lib. i. in col. dissolv. diamor. mell. ros. an. unc. i. s. sp. sulph. scr. i. M. vel seq. in morbo Gallicò probatus. ℞. Ros. rub. balaust. an. mi. Gall. dr. ii. gland. unc. s. plantag. sicc. m. i. s. cort. aurant. alum. ust. an. dr. iii. coq. in aq. plant. ad consumpt. 3. p. add. mell. ros. col. unc. iii. M.

Collutio oris in Dentium vacillatione. ℞. Cort. gran. unc. i. s. balaust. dr. i. ros. rub. dr. s. alum. dr. i. s. herb. salu. mi. rorispn. dr. i. s. sem. coriand. dr. ii. incis. & contus. dentur ad chart. de his cochl. i. bull. in s. q. vin. aq. & acet. teneatur in ore.

Alia in Gingivarum laxitate. ℞. Fl. ros. rub. balaust. malv. arbor. an. dr. s. fol. nasturt. aquat. ment. satur. an. mi. hyssop. salu. an. m. s. f. Decoct. in aq. fab. ad lib. i. in colat. dissolv. alum. dr. i. diamor. mell. ros. col. an. unc. i. s. M. hinc fiat inunctio. ℞. Mell. ros. col. diamor. an. unc. i. sp. viuriol. q. s. M.

Linctus in Prunellâ. ℞. Mucilag. sem. psyll. cydon. malv. cum aq. rub. idæ. vel spermat. ran. extr. an. unc. s. succ. semperviv. maj. vel syr. viol. aut portul. dr. vi. nit. depur. dr. s. vel scr. ij. M. S. Saffil vor die Bräune.

Alius in Faucium & Palati excoriatione à calore febrili. ℞. Sem. psyll. cydon. an. dr. i. s. Gum. Tragac. dr. i. cum s. q. aq. ros. extrahatur mucilago satis liquida, add. syr. viol. parem quantitatem, f. instar Gelatinæ, quâ utatur ager frequenter ex cochl. diuq; in ore contineat.

Linimentum melluminatum ad Ulcera Faucium & Gingivarum. ℞. Pulv. aquileg. salu. ment. nuc. mosch. an. dr. ii. alum. ust. unc. s. mell. unc. ii. M. S. Mundheil-Salbl.

Aliud. ℞. Alum. crud. dr. i. s. fl. aquileg. fol. salu. an. dr. ii. rad. Ir. flor. dr. i. s. myrrh. el. scr. ii. mell. ros. cum sp. sal. acific. q. s. M. f. Linim. Vel ℞. Syr. de ros. sicc. mell. ros. an. dr. ii. s. mast. elect. pulv. dr. s. sp. viuriol. gut. iii. M.

Cataplatina in Anginâ. ℞. Rad. alib. unc. i. s. fol. malv. violar. an. mi. fl. cham. melil. an. pi. coq. in aq. ad mollit. pist. add. farin. sem. lin. fœnugrac. hord. an. unc. i. wd. hirund. in pulv. redact. unc. ii. ol. amygd. viol. butyr. rec. an. unc. ii. ol. cham. unc. i. M. f. Catapl. ab aure ad aurem per collum calidè applicandum.

Aliud. ℞. Farin. hord. fab. an. unc. iv. nid. hirund. unc. ii. sterc. canin. alb. exsic. unc. i. s. mell. unc. ii. ol. ros. q. s. M. f. Catapl. Vel ℞. Nid. hirund. N. i. stercor. can. alb. mi. coq. in vin. vel lact. ad consist. pult. vel pistentur cum mell. & axung. porc.

## ARTICULUS V.

## De Officiò Medici, in præscribendis &amp; considerandis Medicamentis Thoracicis.

## I.

**M**edicamenta Thoracica seu Pneumonica sunt, quæ pulmonibus appropriata, eorum tonum factum tectumque conservant, ac humores in iis contentos ad anacatharsin præparant. Actionem suam exercent, vel humores crassos viscidos incidendo, attenuando, & detergendo, ac membranam interiorem ad contractionem & excretionem irritando, atque hæc dicuntur præ cæteris *Bechica* & *arteriaca*, quæ conveniunt in tussi, asthma, expectoratione difficili, catarrhò suffocativò &c. de quibus supra. Vel humores tenues, acres, salios, titillantes & rodentes increassando, pepsimum inducendo, orgasmum tollendo, & acrimoniam fluxilem retundendo; atque hæc audiunt *intercipientia*, utilia in tussi ferinâ, hæmoptysi, catarrhis salis &c. Vel stagnantem sanguinem, serumque spissescens, & in coagulum abiturum, resolvendo & discutiendo, ut in asthma; vel pulmones læsos, erosos & ulcerosos, vi balsamicâ & vulnerariâ detergendo & consolidando, ut in Phthisi &c.

## II.

Circa usum horum Not. 1. In *Bechicis* semper humoris expectorandi qualitatem attendendam esse, ut inter incidentia & increassantia accurata fiat distinctio, neque dentur increassantia, ubi viscosi & tenaces peccant humores, nec incidentia & attenuantia, ubi tenues, salii & acres. 2. In affectibus thoracis subinde magis prodesse resolventia, quam expectorantia, cum sint quasi anima pectoralium. Sic in pleuritide & asthma magis resolventia: in tussi & Phthisi magis *Bechica* conveniunt, interim pro re nata hæc variè misceri possunt. 3. In pectoralibus vitanda nimis exsiccantia, vel saltem cum humidis miscenda. 4. Vitanda quoque nimis laxantia, tam interna, quam externa. Illa tonum debilitant, ventriculum deiciunt, ac inappetentiam cient, hinc bechicis linctibus in magnâ copiâ & continuo uti, non est consultum: hæc verò poros ampliando & magis dilatando, ad affluxum recipiendum magis disponunt, unde in unguentis pectoralibus etiam cautio esse debet. 5. *Bechica* sensim magis ac pedetentim, quam unâ vice deglutienda, piissando nempe & forbendo ut scil. pars ad asperam arteriam feratur & derivetur magis. 6. Decocta pectoralia præferenda sæpius esse linctibus dulcibus. 7. Pectori inimica esse frigida, acida, salina, nitrosa, & vitriolica; illa serum coagulando: reliqua partim irritando, partim fundendo. Intelligendo tamen hæc singula de pectore vel debili, vel erosò & essentialiter affectò; hinc acida in genere conveniunt aliquibus in casibus, sed ordinariè pulmonibus nullâ erosionem contaminatis, sic. v. g. profunt, in pleuritide, pro tussi juvanda & conservanda; in asthma, incidendi sine, mixta tamen & refracta cum dulcibus.

## Formulæ

## Remediorum Thoracicorum.

**D**ecoctum Pectorale in Pleuritide & Peripneumonia usuale. ℞. Rad. liq. unc. s. tussilag. dr. iii. herb. scabios. capill. ven. charcfol. heder. arbor. card. b. an. m. s. fl. bellid. papav. errat. an. pii. viol. p. i. fic. N. v. jujub. sebest. an. N. ix. passul. min. mund. unc. i. sem. melon. excort. malv. an. dr. ii. coq. ex aq. hord. s. q. in Col. lib. i. dissolv. syr. fl. rhæad. unc. i. s. de liq. de succ. card. b. an. unc. i. spirit. sulph. acid. gut. xv. M. S. Brust-Tranck auf 3. oder 4. mahl.

Decoct.



Decoct. ad Tussim, aliásque Pulmonum læsiones.  $\mathcal{L}$ . Rasur. lig. Sassafr. unc. i. maceretur in aq. font. lib. vi. add. rad. levist. unc. s. enul. dr. iii. herb. heder. terrest. scabios. pulmonar. an. mii. sem. anis. fœnic. an. dr. iii. coq. ad 3. addendo in fine rad. liq. unc. s. passul. min. conquass. dr. vi. Col.

Aliud ad Tussim.  $\mathcal{R}$ . Rad. enul. Ir. flor. an. dr. vi. herb. scabios. veron. hyssop. heder. terrest. an. mi. fic. ping. N. v. sem. anis. dr. iii. incisa coq. ex cerevis. Vel  $\mathcal{R}$ . Fic. N. vii. passul. mi. zibeb. unc. s. Jujub. N. z. filiq. dulc. dr. vi. mell. unc. ii. s. coq. in s. q. aq. ad 3. addendo sub finem acet. opt. unc. iii. Col. & clarif. dentur lib. iii. bibat quotidie bis lib. s.

Apozema antiphthificum.  $\mathcal{L}$ . Rad. chin. incif. dr. iii. rasur. ebor. dr. i. ras. C. C. dr. i. s. dactyl. N. vi. viij. infund. in aq. font. s. q. per noct. manè add. fol. arnogloss. bugul. agrimon. veron. virg. aur. capill. ven. an. p. ii. hord. pii. uv. pass. enucleat. m. s. coq. ad lib. ii. col. add. conf. ros. rub. unc. ii. stent simul per horas 3. Col. S. Brust - Trauck wider die Lungen - Sucht, darvon Morgends, Abends und Nachts ein Trunk zu thun.

Aliud.  $\mathcal{R}$ . Rad. chin. in taleol. incif. unc. i. Sassafr. sant. cit. an. unc. s. macerentur in aq. font. mens. ii. s. add. herb. hed. terrest. pulmon. scabios. an. mii. sem. anis. fœnic. an. unc. s. rad. liq. dr. iii. passul. min. unc. i. coq. ad 3. Col.

Aliud.  $\mathcal{L}$ . Rad. symph. maj. glyc. an. unc. s. fol. marub. tussilag. pulmonar. veron. fœnic. agrimon. bugul. an. m. s. fl. scabios. viol. an. p. ii. passul. min. dr. vi. sant. rub. dr. ii. s. coq. in s. q. aq. in Col. lib. i. s. dissolv. looch. de pulm. vulp. de symph. Fernel. de Jujub. an. unc. s. vel injice conf. ros. rub. rec. unc. i. s.

Julapium Pectorale.  $\mathcal{R}$ . Aq. farfar. scabios. veron. hyssop. an. unc. iii. syr. de jujub. de liq. an. unc. i. s. M. S. Brust-Julep auf 4. mahl.

Mixtura Pectoralis anti Asthmatica Timæi.  $\mathcal{L}$ . Looch. san. & expert. unc. i. aq. asthmat. unc. iv. cinam. unc. iii. fœnic. unc. ii. veron. scabios. an. unc. i. s. sp. card. b. angel. an. dr. i. M. S. Luft Wasser wider die Enge, Löffel voll weis zu gebrauchen.

Aqua Asthmatica.  $\mathcal{R}$ . Aq. ceras. nig. hyssop. veron. fl. acac. an. unc. i. asthmat. unc. i. spirit. anis. essent. sacch. an. dr. ii. Bals. sulph. anis. tercovint. an. scr. i. confect. alk. incompl. dr. s. extr. croc. gr. vi. sacch. perlat. unc. s. M.

Alia.  $\mathcal{L}$ . Pulv. Gumm. ammon. dr. i. aq. hyssop. vin. Rhen. an. unc. ii. M. Vel  $\mathcal{L}$ . Aq. ceras. nig. hyssop. an. unc. ii. epil. Lang. asthmat. an. unc. s. spirit. ceph. Anhalt. vel Elix. vii. Matth. dr. ii. anis. opt. dr. ii. s. mosch. amb. an. gr. i. sacch. cand. alb. unc. s. M.

Aqua Pectoralis & antiphthifica.  $\mathcal{L}$ . Aq. antiphthis. Mins. unc. ix. magist. corall. perl. an. scr. ii. lact. sulph. dr. i. fl. sulph. scr. i. s. sacch. cand. alb. pulv. unc. s. M.

Mixtura pleuritica.  $\mathcal{L}$ . Aq. card. b. scabios. chærefol. an. unc. i. s. ocul. can. præp. antim. diaph. an. scr. i. vel dent. apr. mandib. lucii pisc. spirit. sal. armon. an. scr. s. laud. op. gr. dimid. jul. viol. dr. vi. M.

Emulsio antipleuritica.  $\mathcal{L}$ . Sem. mel. excort. unc. s. card. Mar. card. b. an. dr. s. amygd. d. dr. iii. pinear. dr. ii. aq. scabios. fl. papav. rhæad. card. b. an. unc. i. s. M. f. Emuls. add. pulv. antipleurit. scr. i. vel ras. dent. apr. ocul. can. an. scr. s. man. christ. perl. dr. i. s. M.

Emulsio in Phthisi utilis.  $\mathcal{L}$ . Sem. melon. excort. dr. vi. papav. alb. dr. i. amygd. d. excort. N. xxx. pan. alb. probè tost. unc. i. s. aq. veron. scabios. hyssop. an. unc. iii. borrag. viol. an. unc. iv. sacch. alb. unc. i. M.

Brodium antiphthificum.  $\mathcal{L}$ . Pullum exenteratum ac in ventre pone sacch. ros. unc. iii. item veron. heder. terrest. vel aliam herbam antiphthificam, coq. lentò igne in ollâ coopertâ in s. q. aq. relinquatur per noctem suprâ cineres ciliidos, manè sumatur pullus contusus cum Brodið.

Aliud.  $\mathcal{L}$ . Succ. express. nasturt. bellid. chærefol. ad cochlear. ii. vel iii. cum pauxillò mell. ros. dissolv. in s. q. brod. carn. Vel  $\mathcal{L}$ . Herb. prædictas aut alias hujus

virtutis ad mil. vel iii. contus. affund. brod. carn. salini, ebulliant unc. iv. vel v. Col. add. mell. parum.

Brodium antiasthmaticum.  $\mathcal{L}$ . Sperm. cet. dr. i. dissolv. in s. q. brod. carn.

Aliud antipleuriticum.  $\mathcal{L}$ . Ol. depur. lin. unc. ii. ol. anis. gut. iv. dissolv. in s. q. brod. carn.

Decoct. Galli veteris, in affectibus Thoracis.  $\mathcal{L}$ . Rad. enul. tussilag. an. dr. vi. liq. unc. s. herb. heder. terrest. scabios. an. mii. veron. pulmon. tussil. an. mi. tart. alb. unc. i. agar. dr. ii. incisa indantur ventri Galli veter. exenterat. coq. in aq. s. q. tandiu, donec omnis caro ab ossibus abscedat, exprim. & col. dos. quotidie unc. iv. vel v. cum gut. ix. Bals. sulph. anis.

Electuarium Antiphthificum.  $\mathcal{L}$ . Conf. ros. veter. unc. ii. pulv. halyrec. præp. dr. ii. antihect. Peter. dr. s. Bals. sulph. anis. gut. vii. syr. de symph. Fernel. q. s. M. F. Elect. vel  $\mathcal{L}$ . Conf. ros. rub. fl. bellid. an. unc. i. looch. san. & expert. de pulm. vulp. de farfar. an. unc. s. pulv. anonym. an. dr. s. sulph. scr. i. spec. diatrag. fr. scr. ii. syr. viol. papav. errat. an. q. s. M. F. Elect. S. Besondere Latvergen wider die Lungen-Sucht, darvon dreymahl des Tags einer Nuss groß zu nehmen.

Electuar. Asthmaticum.  $\mathcal{R}$ . Fl. sulph. unc. i. s. cinam. dr. s. z. z. scr. ii. croc. dr. i. mosch. gr. vi. mell. despum. unc. iii. vel q. s. M. F. Elect. S. Brust - Latvergen wider die Enge, den Tag 2. mahl 3. Quintl. schwer darvon zu nehmen.

Eclegma antiphthificum ex succis.  $\mathcal{L}$ . Succ. symphyt. maj. lib. sanguisorb. veron. ros. rub. salu. min. heder. terrest. farfar. portul. an. unc. iv. depur. & s. q. sacch. albiss. redig. in formam Looch.

Looch album.  $\mathcal{L}$ . Ol. amygd. d. sacch. penid. an. p. æq. M. exacte, ut abeat in massam albiss.

Looch domesticum.  $\mathcal{L}$ . Ol. amygd. d. rec. unc. iv. syr. Jujub. capill. ven. an. unc. ii. sacch. alb. dr. ii. M. in mort. marmor. S. Brust-Safft.

Linctus contra Tussim, Pleuritidem & Asthma, vid. suprâ de expectorantibus.

Morselli Pectorales.  $\mathcal{L}$ . Looch. san. & expert. dr. v. spec. diatr. dr. ii. condit. rad. enul. unc. i. cort. aurant. dr. vi. fl. benz. gr. v. sacch. albiss. in aq. fœnic. sol. lib. s. M. F. Morsul. S. Brust-Morsellen.

Trochisci pectorales.  $\mathcal{L}$ . Extr. glyc. dr. ii. amyl. dr. vi. mosch. zibeth. an. gr. i. s. ol. anis. gut. vi. sacch. albiss. unc. vi. mucilag. gumm. tragac. q. s. M. f. Trochisci.

Rotulæ antiphthificæ.  $\mathcal{L}$ . Succ. glyc. inspiss. unc. s. spec. diatr. scr. iv. fl. sulph. spec. diatrag. frig. an. dr. i. sacch. penid. unc. i. s. ol. anis. gut. vii. cum s. q. mucilag. trag. f. Troch. majores. S. Besondere Brust-und Husten-Zeltlein darvon nach Belieben zu nehmen.

Alia.  $\mathcal{L}$ . Pulm. vulp. præp. dr. i. extr. enul. pulv. glyc. an. scr. ii. s. fl. sulph. scr. i. benz. gr. v. sacch. fin. in aq. tussilag. dissol. unc. ii. s. M. F. Rotul. add. ol. anis. gut. x.

Alia præstantes.  $\mathcal{R}$ . Antim. diaph. ex regul. dr. i. fl. benz. dr. s. succin. alb. præp. mastich. subtiliss. pulv. spec. diatrag. frig. an. scr. iv. croc. orient. gr. xv. essent. amb. sicc. gr. xvi. ol. anis. gut. vi. fœnic. gut. iv. sacch. albiss. in aq. ceras. nig. dissol. unc. iii. M. f. Confect. in Rotulis.

Pulvis antiphthificus.  $\mathcal{L}$ . Fl. sulph. unc. i. s. diatr. tabulat. unc. s. M. F. Pulv. S. Lungen-Pulver, darvon eines Ducaten schwer auf einem frisch-geformten Ey zu nehmen.

Alius.  $\mathcal{L}$ . Bals. sulph. dr. ii. impast. cum sacch. cand. alb. unc. ii. pulv. succ. glyc. rad. enul. Ir. flor. lact. sulph. an. scr. ii. spec. diatrag. frig. dr. i. M. F. Pulv. Vel  $\mathcal{L}$ . Fl. sulph. ter sublim. scr. ii. s. Pulv. anonym. pulm. vulp. præp. Haly. an. dr. i. sperm. cet. dr. i. sacch. penid. unc. i. M. F. Pulvis.

Alius.  $\mathcal{L}$ . Pulv. Haly. spec. diatr. diatrag. fr. an. dr. i. fl. sulph. ter sublim. scr. ii. benz. gr. xv. sacch. cand. alb. unc. ii. s. fol. aur. N. vii. M. F. Pulv. S. Lungen-Pulver, darvon i. Quintl mit dem Gersten-Schleim zu nehmen.



Alius. R. Visc. querc. herb. salv. an. unc. i. pulmon. veron. an. unc. s. rad. enul. pulm. vulp. præp. an. dr. ii. exsicc. & scorfm pulveris. add. sacch. albiss. ad pondus omnium. Datur ter in die ad cochl. i. super buccellâ pan. vi-  
nô madid.

Pulvis antipleuriticus. R. Sal. prun. dr. ii. Pulv. fl. papav. errat. corall. rub. an. dr. i. magist. dem. ap. vel mandib. luc. pisc. ocul. can. an. scr. i. sacch. viol. unc. s. M. F. Pulv. dos. à scr. i. ad ii. ex aq. papav. errat.

Pulvis antiasthmaticus. ℞. Fl. sulph. dr. i. benz. dr. s. M. Vel ℞. Spec. diamosch. d. compl. scr. s. Gummi. ammon. gr. v. benz. gr. iv. croc. Aust. gr. v. M.

Pulvis pectoralis Michaelis. R. Rad. aron. crud. pulv. unc. i. sulph. opt. commun. benz. pulv. an. dr. ij. antihæst. Poter. unc. s. sacch. q. s. vel pro libitu. M. f. Pulv. cu-  
jus dos. à dr. s. ad dr. i.

Tragæa in affectibus Pectoris. ℞. Liq. ras. dr. ij. sem. anis. fenic. an. dr. i. s. cass. lign. dr. ii. cubeb. dr. i. rad. Ir. flor. dr. s. i. sacch. ros. tabul. unc. iv. ol. destill. anis. vel fenic. gut. xi. M.

Lotio pedum in Asthmate. R. Herb. major. rorism. an. mj. hyssop. orig. lavend. serpill. fl. chamom. an. mij. ros. calend. an. mi. M. pro lavacrô pedum. S. Species zumi  
Fuss-Wasser.

Unguent. pectorale. R. Ung. pectoral. unc. i. de alth. unc. i. ol. irin. amygd. d. an. dr. ij. croc. scr. i. M. Vel ℞. Pulv. cep. sub cincribus coct. unc. iii. cui add. ol. viol. irin. lin. an. unc. s. ung. pectoral. unc. i. croc. orient. scr. i. M. S. Brust-Salben.

Aliud antipleuriticum. R. Ung. de alth. pingued. mur. mont. an. unc. i. ol. amygd. d. unc. s. camph. scr. i. M.

Cataplasma pectorale, expectorationem promovens. R. Hord. crud. ad mollit. coct. in aq. malv. lib. s. pistetur add. ol. viol. amygd. d. an. unc. i. croc. scr. i. M.

Aliud in dolore pleuriticô. R. Rad. alth. lil. alb. an. unc. ii. fol. malv. violar. parietar. an. m. i. sem. lin. sænu-  
græc. an. dr. iii. fl. chamom. melil. papav. errat. an. pii. coq. in f. q. lact. ad mollit. contus. add. ol. amygd. d. cha-  
mom. lil. alb. an. unc. i. s. ping. gallin. vel ung. rub. po-  
tab. unc. i. farin. sem. lin. q. s. M. f. Catapl.

Ex speciebus prædicti decocti, parari etiam possunt Sacculi & Fomenta &c. Plura de his vide superius in remediis expectorantibus.

## ARTICULUS VI.

De Officiô Medici, in considerandis & præscri-  
bendis Remedis Cordialibus.

### I.

**M**edicamenta cordialia seu cardiaca sunt, quæ cor-  
di familiaria, illud respiciunt, vel flammulam vi-  
talem depresso, nec satis enicantem instaurando, &  
particulis suis volatilibus sulphureis, seu oleosis & balsa-  
micis, seu spirituosus, alacriorem sanguinis in corde ra-  
refactionem, & in spiritus exaltationem promovendo;  
qualia conveniunt in languoribus cordis, lassitudine  
cum malignitate, senio, pallore, frigore, cachexiâ, vi-  
rium debilitate aliisque affectibus, ubi spiritus deficiunt,  
ac particulae sulphureæ volatiles & spirituosæ, vel ob-  
tusæ, vel non sufficienti quantitate vigorate sunt, vel  
illud respiciunt, eandem luculam vitalem p. n. exarden-  
tem, ut alienis quasi urât flammis, particulis suis aqueis,  
acidis, nitrosis, mucilaginosus & adstringentibus refræ-  
nando, sulphureasque, balsamicas & mercuriales vola-  
tiles particulas, nimis esseratas deprimendo, obtunden-  
do, & præcipitando, vel agunt sanguinis grumescen-  
tiam & coagulationem corrigendo, acidumque illud  
inspissans & coagulans absorbendo, vel nimis fusam &  
rarefactam M. S. ut spiritus suos vix contineat, con-  
stipando, firmando, ac sulphur concentrando, vel pe-  
regrinum malignum fermentum, calidum vitale oppug-

nans discutiendo, vel spiritus recreando, restaurando,  
vel eos veluti torpidos & sopitos excitando.

### II.

Quoad legitimum horum administrandi & applican-  
di modum. Not. 1. Alterationem excessivam in utram-  
que partem cordi non convenire, hincque cavendum  
esse, & à nimis refrigerantibus, quæ motum spirituum  
præpediunt, & ab excessivè calefacientibus, quæ eun-  
dem dissipant. 2. In debilitate virium non statim ad con-  
fortantia cordialia, nec ad illa quidem sola confugien-  
dum, sed causas insuper removendas esse, nisi urgeat in-  
dicatio vitalis: præterea convenire aërem liberiozem &  
diætam convenientem. 3. Cordialibus volatilibus, rare-  
facientibus & resolventibus, interponenda esse tonica,  
quæ calorem conservant, ac villos & fibras nerveas tuen-  
tur. 4. Cordialia debere esse quàm maximè penetrantia,  
tum præcipuè interna, tum etiam externa; hinc epithe-  
matibus acetum & camphora additur, ac eadem ex pe-  
netrantibus spirituosus composita, omissis fixioribus,  
quæ in poros non admittuntur, non sunt de nihilo. 5.  
Cordialia omnino non posse omnia, sed eadem ab invi-  
cem distinguenda, neque confundenda fixa cum vola-  
tilibus, generalia cum specialibus, neque alimenta cum  
medicamentis. Sic fixa præstantiora sunt, si humores  
acidi absorbendi; vel fermentatio & orgasmus biliosus  
sedandus: volatilia verò & aromatica, ubi spiritus magis  
intendendi & excitandi. 6. Moschatis & ambratis non  
abutendum esse, cum nimis rarefaciant, ac in motum  
cieant spiritus, eosque inquietos reddant, præsertim in  
febris, palpitatione cordis & hæmorrhagiis.

### Formulæ

#### Remediorum Cordialium.

**J**ulepus Cordial. ℞. Aq. borrag. bugloss. rub. idæ. an.  
unc. i. cinam. bugl. dr. ii. succ. cit. rec. dr. vi. confect.  
alk. dr. i. syr. de rub. idæ. unc. s. M. S. Hertz-Julep  
Löffel voll vveiß zu gebrauchen. Vel ℞. Syr. rub. idæ.  
unc. i. conf. alk. scr. ii. spir. ros. scr. i. aq. ceras. nig.  
unc. iii. sp. vitriol. q. s. M.

Julapium vitæ. R. Vitell. ov. rec. N. ii. sacch. albiss.  
unc. s. ol. cinam. gut. iii. vin. alb. vel Hispan. aut mal-  
vat. unc. vi. M. exactè. Si efficacius velis, add. amb. gr.  
ii. ol. dest. cit. gut. iii. conf. alk. scr. ii. M.

Julapium Perlatum. ℞. Aq. cit. borrag. meliss. ceras.  
nig. an. unc. iii. spirit. ceras. nig. unc. i. sacch. albiss. dr.  
vi. marg. præp. dr. i. s. M. agitenur optimè f. a. S. Per-  
len-Julep 3. oder 4. Löffel voll in der Schwachheit ein-  
zugeben.

Aqua cordialis in Febris malignis. ℞. Aq. borrag.  
bugl. an. unc. i. s. ceras. nig. acetos. an. unc. i. ros. ci-  
nam. an. dr. vi. marg. præp. à scr. i. ad dr. i. bez. orient.  
gr. vi. man. christ. perl. dr. vi. M. S. Hertz-und Perl-  
Wasser.

Alia. ℞. Aq. borrag. bugl. fl. cit. scorz. an. unc. i. s.  
card. b. card. M. an. unc. s. cinam. bugl. dr. ii. spec. de  
hyac. smaragd. præp. an. scr. i. s. bez. orient. scr. s. man.  
Christ. perl. q. s. ad gratiam saporis.

Aqua cordialis in Hypercatharsi & fluxibus alvi. ℞.  
Aq. cord. frig. unc. ii. s. rub. id. frag. ros. an. unc. i. cinam.  
bugl. unc. ii. carbunc. unc. i. marg. præp. scr. i. C. C. ust. scr.  
ii. corall. rub. præp. scr. i. smaragd. præp. scr. s. spirit.  
rub. id. dr. s. ros. scr. i. myv. cydon. unc. s. M. S. Beson-  
ders Krafft-Wasser zu stärken, und zu stillen.

Aqua perlata. ℞. Aq. q. cord. ceras. nig. an. unc. i. cit.  
ex totô naph. an. unc. s. cinam. bugl. unc. s. marg. orient.  
præp. scr. ii. magist. corall. scr. i. s. C. C. ust. præp. scr. i.  
man. christ. perl. dr. ii. M.

Aqua Confortativa cum confect. Alkerm. ℞. Aq.  
borrag. bugl. an. unc. i. s. ceras. nig. acetos. ros. an. unc.  
i. cinam. unc. s. conf. alk. compl. dr. i. marg. præp. scr. i.  
vel dr. s. man. christ. perl. unc. s. M.

Alia



Alia in fluxibus sanguinis. ℞. Aq. perlat. usitat. ceras. nig. cordial. temperat. borrag. bugl. an. unc. i. cinam. cydoniat. dr. iii. corall. rub. præp. marg. præp. an. scr. i. C. C. ust. præp. scr. i. s. lap. bez. orient. gr. iiii. syr. acc-  
tos. cit. unc. s. man. Christ. perl. dr. ii. M.

Aqua confortativa in Gravidis. ℞. Aq. perlar. usi-  
tat. ceras. nig. cord. temper. borrag. an. unc. ii. cinam.  
cydoniat. unc. s. Bals. embryon. unc. i. lap. bez. or. gr.  
vii. marg. præp. corall. rub. præp. C. C. philos. præp. an.  
scr. i. confect. alk. incompl. dr. i. syr. gran. man. Christ.  
perl. an. unc. s. M.

Emulsio perlata Montagnana. ℞. Aq. Borrag. à flor.  
in vit. destill. lib. i. marg. præp. dr. iii. aq. cinam. unc. i.  
M. in mort. marmor.

Alia Craton. ℞. Marg. orient. præp. vel magist. perl.  
dr. i. vel magist. matr. perlar. dr. i. perlar. præp. dr. s.  
aq. fl. borrag. unc. iii. cordial. frig. unc. i. cinam. bugl. unc.  
s. Jul. ros. q. s. M. S. Perlen-Milch.

Alia. ℞. Amygd. d. excort. dr. vi. sem. 4. fr. m. ex-  
cort. dr. i. aq. borrag. bugl. unc. i. s. typh. cerv. unc. i.  
M. f. Emuls. add. magist. perlar. dr. i. sp. ros. rub. idæ.  
an. gut. xi. man. Christ. perl. q. s.

Elektuarium Cordiale. ℞. Conf. ros. rub. vitriolat. unc.  
iv. pulp. cit. condit. unc. ii. condit. cit. unc. i. s. fl. cit.  
condit. unc. i. magist. perlar. corall. an. scr. ii. conf. alk.  
de hyac. an. dr. ii. syr. perlar. orient. & gran. dulc. an. q.  
s. M. f. Elekt. S. Herz stärckende Luvvergen.

Aliud. ℞. Conf. ros. rub. unc. iv. bugl. unc. ii. affund.  
sp. vitriol. gut. xii. M. in mortar. lapid. add. conf. alk.  
dr. ii. spirit. rub. id. dr. i. syr. fl. tun. q. s. M. F. Elekt.  
legend. fol. aur. S. ut supra. Darvon zu Zeiten einer  
Kösten groß zu nekmen.

Aliud in palpitatione cordis. ℞. Conf. ros. rub. unc.  
ii. meliss. cit. an. unc. i. conf. alk. de hyac. an. dr. i. spec.  
diamarg. fr. diarrhod. Abb. an. dr. s. corall. rub. præp.  
scr. i. syr. de limon. q. s. M. f. Elekt.

Morselli Cordiales. ℞. Confect. alk. de hyac. an. unc.  
s. pulv. cordial. Timai dr. ii. condit. cort. cit. unc. i. s.  
fl. cit. dr. vi. sp. ros. rub. id. an. dr. i. sacch. albiss. in succ.  
cit. sol. lib. i. M. S. Hertz-stärckende Morsellen.

Alii simul Stomachici. ℞. Confect. alk. compl. spec.  
pro morsul. Imperat. an. unc. s. cort. rec. cit. aurant. an.  
dr. iii. amygd. d. excort. unc. i. sacch. in aq. ros. sol.  
lib. i. M.

Tabulæ Cardiacæ. ℞. Cort. exter. cit. condit. dr. iii.  
limon. unc. s. aurant. dr. ii. confect. sem. fœnic. dulc. dr. i.  
s. coriand. dr. iii. carv. dr. i. incid. in pulv. & leviter con-  
tund. add. nuc. mos. b. pulv. dr. s. spec. aromat. ros. scr. iv.  
amb. gryf. scr. s. sacch. opt. unc. vi. mucilag. sem. cydon.  
aq. meliss. extract. q. s. M. F. Tabul. s. a.

Alia pretiosa. ℞. Marg. præp. dr. ii. corall. rub. præp.  
succin. alb. præp. dr. i. magist. C. C. chor. an. dr. i. s. sacch.  
alb. unc. ii. mucilag. sem. cydon. q. s. M. F. Tabell.

Rotulæ Cordiales. ℞. Magist. corall. perl. an. dr. i.  
conf. alk. dr. ii. ol. destill. cinam. gutt. iii. cit. gut. ij. sacch.  
albiss. in aq. carbunc. sol. unc. ii. vel q. s. M. F. Rotul.

Pulvis Cordialis. ℞. Corall. rub. præp. dr. vi. marg.  
præp. dr. ii. sacch. opt. unc. i. ol. destill. cinam. gutt. iii.  
M. F. Pulv. S. Hertz-Pulver.

Pulvis Cordialis analepticus. ℞. Corall. rub. præp. dr. ii.  
ocul. can. præp. dr. i. marg. præp. dr. s. pulv. analep. frig.  
Mind. dr. ii. mac. scr. i. sal. acetosel. gr. xv. sacch. albiss.  
unc. ii. M. F. Pulv. de quo post pastum cochleare minus,  
vel per se, vel cum pane vino imbutio sumatur.

Tragæa Cordialis. ℞. Marg. præp. succin. præp.  
corall. rub. præp. C. C. ust. præp. magist. ocul. can. matr.  
perl. an. scr. ii. man. Christ. s. unc. i. s. amb. gr. vii. ol.  
cinam. gutt. iii. caryoph. gutt. iv. fol. aur. N. vii. M. ad  
scat. S. Hertz-stärckendes Trisaneb, darvon nach dem  
Essen ein kleiner Löffel voll auf einer Schnitten Wein und  
Brod zu nehmen.

Alia pretiosa. ℞. Marg. orient. præp. corall. rub.  
præp. an. scr. iv. lapid. s. pretios. an. scr. i. C. C. ust. præp.  
scr. iv. amb. opt. scr. s. mosch. gr. v. man. Christ. s. unc.  
iii. s. fol. aur. N. vii. M.

Epithema Cordiale frigidum, in Febris utile. ℞.  
Aq. meliss. borrag. lavend. ros. an. unc. iii. acet. fl. tun.  
vel ros. aut fl. samb. vel rub. idæ. unc. i. vel ii. spec. pro  
epith. cord. dr. i. s. gr. kerm. pulv. vel spec. diatrion. sant.  
aut cordial. temper. vel lig. aloës aut cort. cit. dr. s. croc.  
camph. an. scr. i. album. ov. conquass. N. i. M. S. Hertz-  
und Puls-Uberschlag.

Aliud, quo Spiritus Vitales subito reficiuntur. ℞.  
Aq. meliss. lib. i. fl. cit. ros. an. lib. s. spec. cord. temper.  
dr. ii. diamb. diamosch. d. an. dr. i. succ. cit. unc. iii. acet.  
ros. unc. i. vin. alb. lib. s. M. pro Epithem.

Unguent. Cordiale. ℞. Ung. ros. unc. ij. spec. pro epi-  
them. cord. subtiliss. pulv. dr. i. diamb. dr. s. ol. lig. Rhod.  
vel Bals. ros. scr. s. camph. scr. i. M. possunt etiam addi  
ol. dest. cinam. gutt. vi. mac. scr. s.

Aliud. ℞. Ung. pomat. unc. s. ol. lig. Rhod. gutt. vij.  
caryoph. cit. an. gutt. iv. spec. cord. temper. scr. ii. mosch.  
gr. ii. M.

Sacculi Cordiales pro corde & pulsibus. ℞. Spec.  
cord. temper. dr. iij. fl. ros. rub. lavend. an. dr. i. mosch.  
gr. iv. M. f. 2. Saccul. cum sind. rub. pro pulsibus & unus  
pro Corde, madefiant seq. liquore. ℞. Aq. ros. lavend.  
an. unc. iij. aq. cinam. unc. s. acet. ros. dr. x. croc. scr. s.  
camph. gr. v.

Alii. ℞. Fl. borrag. bugl. viol. meliss. anth. an. pi.  
spec. cord. temper. pro epith. cord. an. scr. ii. cort. cit.  
rec. dr. s. M. f. 2. Saccul. madefac. aqua seq. ℞. Aq.  
Borrag. unc. i. s. cinam. meliss. an. unc. i. odorif. Fuchf.  
dr. vi. acet. ros. unc. i.

Aqua odorifera. ℞. Aq. odorif. Fuchfii unc. i. sp.  
cephal. Anhalt. camph. dr. i. aq. cinam. destill. dr. i. s. M.  
Vel ℞. Aq. ros. fragrant. odorif. Fuchf. an. unc. s. acet.  
rub. idæ. dr. ij. S. Anstreich-Wasser an die Nasen, Hertz  
und Puls.

Alia. ℞. Aq. ros. frag. unc. i. lavend. cinam. Elix.  
vit. an. dr. vi. acet. fl. tun. unc. i. ros. dr. vi. spirit. ros.  
dr. i. M.

## ARTICULUS VII.

De Officiô Medici, in considerandis & præscri-  
bendis Remediis Stomachicis.

### I.

**M**edicamenta stomachica sunt, quæ stomacho ap-  
propriata, illi succurrunt, & quidem, vel parti-  
culis suis volatilibus ignem vitalem adjuvando, & calo-  
rem stomachi promovendo & conservando, vel particu-  
lis incisivis cruditates liquando, vel illum seu fibras ejus  
constringendo, sicque sanguinem & spiritus ejus magis  
uniendo; atque talia locum habent in anorexiâ, dyslo-  
rexiâ, lassâ chylicatione, ructibus, singultibus, car-  
dialgiâ, inflatione stomachi, vertigine sympathicâ, aliis-  
que ventriculi à frigiditate oriundis symptomatibus,  
suntque vel aromatica, vel oleosa balsamica, vel sale vo-  
latili imprimis oleosâ referta, vel spirituosâ, vel carni-  
nativa, vel leniter adstringentia, quæ stomacho succur-  
runt, fermentum ejus iners & deficiens acuendo & in-  
staurando, qualia sunt omnia sale vel acidô, vel volati-  
li possimum referta, vel fermentum excedens acrimo-  
niâ, sive salinâ, sive biliosâ corrigendo, qualia conve-  
niunt in omni excessivâ acredine, ut Cholera, diar-  
rhœâ, cardiacâ, singultu, sodâ, aliisque ejusmodi af-  
fectibus.

### II.

In usû horum pro debito Regimine Not. i. In omni-  
bus remediis adhibendis videndum esse, quomodo se ha-  
beant erga ventriculum, ac ita semper corrigendum esse  
fermentum, ne calorem vel tonum ventriculi negligamus,  
ipsique noxam inferamus, & vice versâ ita calorem  
temperandum, ne negligamus fermentum: præ omnibus  
verò



verò ejus parietes, & villos moderatè adstringentibus firmandos esse. 2. Nimium refrigerantia ventriculo nocere, cum sit viscus naturâ suâ frigidum, uti etiam ni-  
rium laxantia, ut tepida, pingua, oleosa, &c. 3. Ità alterandum esse ventriculum, ne contrarius præternatu-  
ralis status inducatur. 4. Cavendum esse, ne in altera-  
tione ventriculi alia viscera lædamus, sic in externis providendum, ne lædatur epas, quod proximè incum-  
bit: in internis verò, ne vel nimis calefaciendo bilem acuamus, vel nimis refrigerando eam reddamus iner-  
tem. 5. Stomachicis calidis minùs ex totò resolu-  
bilis, non fidendum esse, quia grossiores particule re-  
manent, & ventriculum gravant, vel irritant. 6. Non obruendum esse ventriculum copiâ medicamentorum quorumvis, tum sibi, tum aliis dicaturum. 8. Roboran-  
tia magis vacuò ventriculò danda, exceptis alimentis medicamentosis, interim spirituosâ quædam, ventricu-  
lo à repletionem gravato, modicè concedenda esse. 8. Topica stomachica frequentius & usitatius parte anticâ applicari, ubi epate ex parte tegitur, aliquando tamen posticâ, ubi officium superius recumbit.

## Formulæ

## Remediorum Stomachicorum.

Decoctum amarum, vid. superius de Antifebrilibus.

Aliud in Anorexiâ proficuum. ℞. Fol. agrimon. absinth. cent. min. an. m. coq. in f. q. aq. font. ad lib. s. dissolv. sacch. unc. i. M. Vel ℞. Rad. cichor. herb. absinth. Rom. card. b. an. m. cent. min. m. s. coq. in vin. & aq. cichor. an. mens. dimid. ad 3. p. consumpt. Col. detur m. & v. bonus haustus.

Julapium Stomachale. ℞. Aq. cinam. opt. unc. vi. ment. meliss. an. unc. iii. ol. vitriol. ritè parat. gut. xii. cinam. gut. vi. syr. de ment. unc. i. s. M. S. Magen-Julep, darvon 2. oder 3. Löffel voll zu nehmen.

Aqua clareta Stomachalis. ℞. Cinam. crassiusculè trit. unc. i. maceretur in lib. i. aq. vit. per se in vase vitreò; in aliò vase vitreò per se & scorsim macer. sacch. albiss. unc. vi. aq. ros. lib. s. stent scorsim in infus. per 2. vel 3. dies, sæpius de die agitando, tandem simul misceantur, & per manicam transmittantur. Dos. cochl. i. vel ii. jejunò stomachò.

Vinum Hippocraticum. ℞. Cinam. acutiss. unc. iij. mac. caryoph. an. dr. ij. cardam. min. dr. i. s. cort. cit. extern. unc. i. infund. in vin. alb. generos. lib. vi. stent in locò tepidò per triduum. Colat. edulcor. Sacch. alb. unc. x. Col. iterum bis vel ter per manicam Hippoc.

Rosa solis. ℞. Ros. sol. rec. m. iii. nuc. mosch. coriand. anis. ros. rub. sicc. an. unc. s. galang. 22. caryoph. an. dr. ij. glyc. unc. i. cardam. zedoar. gr. parad. calam. arom. an. dr. s. sant. cit. dr. i. sant. rub. cinam. an. dr. vi. aq. vit. opt. lib. vi. infunde per dies aliquot. Col. per manicam Hippoc. add. sacch. opt. lib. i. M. Dos. Cochl. i. vel alterum.

Vinum absinthiacum. ℞. Herb. absinth. lib. ij. β. card. b. rorisin. an. lib. s. summit. cent. min. unc. iij. rad. caryophyllat. lib. s. fl. sambuc. cort. cit. aurant. an. unc. iii. M. incis. & contus. ad saccul. pro amphora musti. S. Species zum Wermuth-Wein. Mutata dosi, etiam in minori quantitate lib. aliquot vini infundi poterunt, vel solus spiritus absinthii in vinò dissolvi.

Aliud Vinum Stomachicum. ℞. Rad. enul. dr. vi. 22. vel zedoar. dr. iii. herb. ment. crisp. absinth. an. m. sem. anis. dr. iii. cinam. acut. dr. ii. incis. dentur ad Nodulum pro mens. ii. vin. alb.

Mixtura Stomachica. ℞. Elix. propriet. P. dr. ii. Es-  
sent. absinth. scr. ii. ol. mac. gut. vi. M. S. Magen-Es-  
sentz, darvon 20. oder mehr Tropffen aus einer Brühe zu nehmen: Alii etiam addunt unct. chalyb. Vel Sp. sol. armon. Alii solum Elix. prop. P. ad gutt. 20. vel 30. propinant.

Electuarium Stomachicum calidum. ℞. Conserv. ro-  
risin. unc. iii. fl. tunic. unc. ii. condit. 22. chinens. unc.

iii. cort. aurant. unc. i. s. spec. diacynam. arom. ros. an. dr. vi. cubeb. unc. s. cardam. dr. iii. syr. de cinam. q. s. M. f. Elecl. S. Magen-stärkende Larverg, darvon des Tags 2. oder 3. mahl einer welschen Nuss groß zu nehmen.

Morsuli Stomachici. ℞. Spec. pro morsul. Impera. unc. i. condit. 22. chinens. cort. cit. nuc. ind. an. unc. s. car am. dr. i. s. cubeb. dr. ii. ol. destill. cinam. gut. v. mac. gut. vii. caryoph. gut. iv. cit. gut. iii. sacch. albiss. in aq. sassaf. cum cinam. dissol. lib. i. M. f. Morsul. S. Magen-Morsellen.

Alii. ℞. Gr. paradif. dr. ii. assund. aq. cinam. unc. iv. stent in infus. per noct. manè col. in Col. dissolv. sacch. albiss. unc. ix. add. spec. arom. ros. dr. ii. diarrhod. dr. i. cardam. min. scr. ii. cubeb. dr. ii. condit. cort. cit. aurant. cydon. an. dr. vi. 22. Chin. dr. ii. Condit. & aroma-  
mata incidantur grossò modò f. s. a. Morsul. asperg. spi-  
rit. ros. in quò amb. gr. vi. dissolv.

Alii, vaporum ascensum ex stomachò prohibentes. ℞. Sem. Coriand. acet. præp. unc. s. spec. arom. ros. dia-  
trion. sant. an. dr. i. Condit. nuc. ind. unc. β. carn. cydon. dr. vi. nuc. mosch. an. scr. iv. conf. ros. vet. unc. i. sacch. albiss. in aq. ros. sol. lib. s. M. f. Morsell.

Alii contra Sodam. ℞. Spec. diacret. Mins. dr. vi. ebor. ust. dr. i. ocul. can. præp. unicorn. foss. corall. rub. præp. an. scr. ii. nuc. mosch. dr. i. cum sacch. in aq. portulac. f. q. solut. M. f. Morsul. S. Morsellen wider den Sood.

Rotulæ Stomachales. ℞. Rotul. man. Christ. f. unc. ii. ol. destill. cinam. gut. iv. caryoph. nuc. mosch. an. gut. iii. cit. gut. ii. M.

Aliæ etiam Bibitoria dictæ. ℞. Sem. Coriand. præp. scr. i. fœnic. anis. carv. an. dr. i. nuc. mosch. scr. ii. mac. scr. i. 22. cardam. cubeb. caryoph. an. scr. i. piper. alb. long. an. gr. xv. cum f. q. sacch. in aq. carminat. solut. M. f. Rotul. S. Magen-Zeltlein.

Aliæ contra Sodam. ℞. Succ. liquir. inspiss. sacch. cand. alb. an. unc. i. cret. colon. dr. ii. cum mucilag. gum. tragac. vel arab. ex aq. veron. fact. M. f. Trochisc. lupinar. S. Zeltlein wider den Sood.

Pulvis Stomachicus. ℞. Pulv. stomach. Birkman. unc. s. vel i. detur ad scatul. S. Magen-Pulver, darvon 3. Messer-Spitz voll aus einer Brühe oder Wein zu nehmen.

Alius. ℞. Pulv. cort. aurant. dr. ii. tart. vitriol. sal. absinth. an. unc. i. M. f. Pulv. Vel ℞. Rad. aron. sicc. pulv. unc. ii. sal. armon. unc. s. rad. calam. arom. dr. ii. cinam. mac. an. dr. i. caryoph. scr. i. M. f. Pulv.

Alius. ℞. Pellicul. interior. venuric. capon. unc. ii. nuc. mosch. mac. sem. coriand. anis. fœnic. an. dr. i. β. ment. dr. s. glyc. dr. i. rhodofacch. unc. i. M. f. Pulv. cujus dos. à dr. i. ad dr. ii.

Pulvis Pepticus. ℞. Flav. cort. exter. aurant. candefact. & minutim incis. unc. ii. confect. sem. coriand. unc. ii. anis. carv. fœnic. an. unc. i. spec. arom. ros. dr. ii. sal. absinth. dr. β. ment. pulv. scr. ii. sacch. cand. ad pondus omnium. M. f. Pulv. gross. dos. dr. i. post singulos pastus.

Tragæa Stomachica. ℞. Cubeb. dr. ii. cardam. 22. nuc. mosch. an. dr. i. caryoph. dr. s. cinam. acut. dr. ii. ol. cit. gut. ix. sacch. ros. tabul. ad pondus omnium. M. f. Trag. S. Magen-Triseneth, darvon ein Löffel voll nach jeder Mahlzeit entweder für sich selbst, oder auf einem Schnitl Wein und Brod zu nehmen.

Alia. ℞. Coriand. præp. unc. s. sem. fœnic. anis. an. dr. ii. cinam. caryoph. an. dr. i. s. sacch. ad pondus omnium duplum M. f. Pulv. de quò capiat cochl. i. post singulos pastus nihil desuper edendo vel bibendo.

Alia. ℞. Sem. anis. fœnic. coriand. an. dr. i. pan. bis-  
coct. Hispan. nuc. mosch. an. dr. ii. caryoph. scr. iv. ci-  
nam. opt. dr. ii. sacch. fin. unc. iii. M. f. Trag.

Alia. ℞. Sem. coriand. præp. unc. s. cinam. spec. arom. ros. 22. mac. sant. cit. rub. an. scr. i. confect. man. Christ. unc. iv. β. M.

Alia in ardore stomachi. ℞. Nuc. mosch. No. ii. magist. ocul.



ocul. cunc. mat. perl. succin. præp. C. C. uft. præp. an. scr. i. succ. cand. alb. unc. ii. fol. aur. No. vii. M. f. Pulv.

Lirimentum Stomachicum. ℞. Ol. nuc. mosch. per express. dr. i. ℞. succin. rellif. bals. Peruv. an. scr. i. M. Vel ℞. Bals. Peruv. ol. nuc. mosch. express. an. dr. ii. caryoph. scr. i. mastich. destill. scr. s. laurin. dr. ii. gumm. ladan. in ol. absinth. dissol. dr. vi. M. S. Magen-Salbl.

Balsamus stomachalis. ℞. Ol. dest. Juniper. dr. i. ment. absinth. an. dr. s. mac. caryoph. an. scr. ℞. cinam. gut. v. Bals. Peruv. scr. i. ol. nuc. mosch. q. s. M. f. Bals. S. Magen-Balsam, den Magen und das Hertz Griebel darmit warm zu schmieren, und ein warmes Tuch darauß zu legen.

Eroplast. stomachale Craton. ℞. Ladan. unc. ii. cer. unc. iv. ol. nuc. mosch. expr. dr. iii. M. S. Magen-Pflaster mit Zendl überzogen, aufzulügen.

Aliud. ℞. Empl. de mast. unc. i. spec. arom. ros. dr. i. ol. nuc. mosch. expr. q. s. M. f. Empl. Vel ℞. Cerat. stomach. Galen. unc. i. ladan. el. unc. s. ol. mast. vel nuc. mosch. q. s. M.

Aliud. ℞. Empl. de crust. pan. de tacamah. an. dr. iii. malax. cum ol. mastich. add. Bals. Peruv. parum. Vel ℞. Gum. tacamah. ladan. an. dr. iii. mast. dr. i. caryoph. dr. ℞. cer. flav. dr. iii. ℞. ol. destill. mast. gut. xv. ment. absinth. an. scr. ℞. Bals. Peruv. scr. i. M.

Cataplasma stomachicum, pro sistendô Vomitû. ℞. Fermet. pistor. unc. ii. vel iii. Pulv. ment. crisp. nucist. mastich. an. dr. i. theriac. Androm. dr. ii. acet. ros. q. s. M. pro Catapl.

Aliud stomachicum, corroborans. ℞. Panem mellit. Leb-Zelten, q. pl. coq. in vin. Hisp. vel Malv. s. q. ad consist. Catapl. add. mac. cinam. nuc. mosch. caryoph. q. pl. M. S. Magen-stärckendes Miesl warm darauß zu legen.

Sacculus stomachalis. ℞. Comar. ment. absinth. lavend. an. m. i. mast. nuc. mosch. tacamah. an. dr. i. fl. anth. lavend. ros. an. m. omnia incisa & sp. absinth. irrorata includ. Saccul. qui gestetur in regione stomachi.

Alius. ℞. Ment. absinth. an. m. bacc. laur. unc. s. rad. cyper. galang. caryoph. cort. cit. cinam. mac. an. dr. i. mixta & conquss. includ. Saccul. ex sindon. rub. vinô incoq. & calidè applicando.

Alius pro compescendô Vomitû. ℞. Herb. absinth. ment. crisp. an. m. rad. torment. unc. i. thur. mast. an. unc. s. coriand. dr. ii. ros. rub. nuc. mosch. mac. an. dr. s. incisa dentur pro Saccul. coq. in vin. & acct. an. p. æq. qui calidè ventriculo admoveatur.

## ARTICULUS VIII.

De Officiô Medici, in considerandis & præscribendis Remediis Hepaticis.

### I.

**R**emedia Epatica sunt, quæ respiciendo vel vasa, quibus refertissimum est Epar, vel humores & inprimis bilem, vel illos, tonumque fibrarum & robur acinorum glandosorum, eidem anica sunt, ac affectibus ejus succurrunt. Hinc agunt, vel vasa obstrueta aperiendo, eadem extricando, bilisque amurcam, ac viscedinem mucilaginosam expediendo, qualia sunt amara, aromatica, acria, acida, ac absorbentia salino alcalina & martialia; atque horum usus est in Ictero, cachexiâ, hydrope, affectû hypochondriacô &c. Vel agunt bilem inertem, aquosam, vel viscidam, aut particulis salinis & sulphureis volatilibus haud instructam, acuendo & restaurando, qualia sunt incidentia tum sulphurea, oleosa, aromatica, spirituosa, balsamica, tum inprimis sale volatili pollentia & acria, tum absorbentia humores austeros, acidos, figentes; atque horum usus est in cachexiâ, hydrope, anasarca, scirrhis, tumoribus pituitosis &c. Vel agunt bilem acriorem & copiosam, vel nimis mobilem temperando, ac refrænando, qualia sunt diluentia, acida, terrea, absorbentia, vel tonum roborando & villos firmando, qualia sunt leniter stiptica, cum partium tenui-

tate, ac inprimis amara, uti etiam absorbentia viriolata & martialia, quæ maxime sunt Epatica, Icteri, chlorosis, hydropis, scorbuti, affectus & Melancholiæ hypochondriacæ unicum & summum remedium; magis tamen in laxis & præhumidis, quàm siccis subjectis.

### II.

Circa horum usum Not. 1. Non esse aperiendum, citrà diluentia ac humores fluxiles reddentia, hinc acidulæ, asylum & extremum plurimum morborum sunt remedium, quod vires aperiennes Viriolicas & martiales, plurimò diluente humore habeant immerfas. 2. Acidulas, de quibus jam supra specialiter dictum, conducere, ubi falvis pulmonibus, & visceribus, diluendi ac temperandi humores præcipuè biliosi, ac laxitas villorum corrigenda, & quidem in habitu corporis magis sicciori & lualido: Thermas è contra, ubi humores acidi magis exsuperant, & corpus laxiori gaudet habitu. 3. Dulcia, exceptis passulis facilè bilefciendo hepar lædere. 4. In affectibus Epatis ita adstringentibus tonicis, utendum esse, ne obstruamus; hinc consultissimum, aperiencia moderari adstringentibus, & vicissim. 5. Etiam exterius Hepatica locum habere, quatenus mediantibus poris virtutes interius fibrant, licet refractè agant, inprimis in dolore vel ardore dextri Hypochondrii.

### Formulae

#### Remediorum Hepaticorum.

Decoctum ante-Ictericum Lindan. ℞. Rad. cich. aut tarax. unc. ii. chelidon. m. à dr. vi. ad unc. i. herb. endiv. aut cich. m. s. vel m. ii. fragar. m. s. marrub. m. s. tart. alb. ab unc. s. ad dr. vi. fol. fenn. dr. vi. coq. in aq. & vin. an. s. q. vase clauso; Hinc ℞. lib. ij. pro usu, addendo, si præstantius volueris, cuilibet dos. sp. tart. rellif. scr. i. M. præmissò Vomitû saluberrimum est.

Aliud. ℞. Stercor. anser. ras. eb. an. unc. i. chelidon cum tot. ling. cerv. fl. or. hyper. an. mii. croc. dr. ℞. vin. alt. aq. font. an. lib. i. coq. ad dimid. f. Col. add. sacch. alb. q. s. & clarif. iv. album. ov. dos. unc. v. bis in die.

Infusum ante Ictericum Riverii. ℞. Rad. rub. tint. unc. s. fol. chelidon. m. m. summit. absinth. pont. cent. min. an. pj. cinam. dr. s. croc. scr. s. inf. per noct. in vin. alb. unc. viij. Col. add. sacch. alb. unc. s. M. capiat. m. 3. horis ante Pastum. Hoc, p. p. Icterus recentem plerumque radicitus evellit, per 6. vel 7. dies usurpatum.

Decoct. anti-Hydropicum. ℞. Rad. tryon. rec. unc. i. asar. unc. s. sal. tart. dr. iii. infund. in s. q. aq. s. stent in loco tepidò per noctem, manè add. rad. vincetox. dr. iii. summit. absint. m. fl. bellid. m. s. bacc. Juniper. dr. iii. incif. & contus. confund. simul ac coq. in aq. s. q. de Col. ℞. lib. i. s. add. sp. sal. armon. dr. ii. de hoc Decoctò capiat ter in die bonum haustum.

Mixtura antihypochondriaca. ℞. Mixtur. f. unc. s. Essent. cent. min. cochlear. an. dr. iii. trifol. fibr. dr. ii. tint. mart. dr. i. ℞. M. S. Eröffnende Essentz, darvon 15. Tropfen aus einer Brûbe oder Wein zu nehmen.

Vinum anti-Cachecticum. ℞. Chalyb. præp. dr. vi. rad. enul. rec. unc. ii. fol. absinth. utriusque an. mii. passul. corinth. dr. vi. fol. fenn. unc. ii. vin. alb. lib. iv. infund. frigidè per 24. horas. dos. unc. iv. m.

Cerevisia medicata anti-cachectica & anti-hypochondriaca. ℞. Rad. cich. rec. lib. s. enul. rec. unc. ii. herb. scolopend. lib. s. card. b. m. iii. bacc. juniper. lib. iii. incif. & contus. dentur ad Saccul. pro 60. mensur. cerevisiæ, quæ in liquore relinquendus, donec ejus peracta fermentatione fiat transvasatio.

Alia Butleri. ℞. Beton. salv. agrim. cochlear. absinth. Rom. an. miii. rad. enul. raph. russ. an. unc. iv. M. f. Saccul. pro cerevis. cong. viii. mutatis mutandis, etiam ex his Vina alterantia fieri possunt.

Brodium aperitivum. ℞. Rad. cich. fenic. petrosel. an. unc. s. passul. exacin. unc. i. croc. scr. i. mac. scr. s. incid.



Et ventri Gallinæ a' liffis alis, collò & pedibus indantur, coq. in s. q. aq. donec caro ab ossibus separetur, servetur jusculum, pro pulv. aperitiuis in eò exhibendis.

Electuar. Epaticum. ℞. Conf. ros. cichor. cochlear. an. unc. i. spec. diatrion. santal. diarrhod. Abb. an. dr. i. arom. ros. dr. s. condit. rad. cich. unc. s. nuc. ind. dr. ii. syr. capill. ven. q. s. M.

Aliud. ℞. Conf. fl. absinth. capill. ven. tamarisc. an. unc. i. condit. rad. enul. cort. cit. an. unc. s. myrob. condit. N. x. nuc. mosch. condit. dr. iij. confect. alk. dr. ij. spec. diarrhod. Abb. dr. i. sal. absinth. tamarisc. an. scr. ii. croc. scr. i. amb. gryf. scr. s. cum syr. de cort. cit. M. f. Opiat. cuius dos. magnitudo Castan. per 15. dies.

Aliud. ℞. Passul. corinth. mund. lib. s. coq. in vin. vet. ad consist. pul. per setaceum trajectis add. conf. anth. cort. cit. condit. an. unc. i. cinam. acut. spec. arom. ros. diatrion. sant. an. scr. ii. aloës odorif. scr. i. croc. scr. B. M. S. Leber-stärckende Latwergen.

Pulvis aperitivus & digestivus. ℞. Sal. absinth. cent. min. card. b. magist. ocul. can. tart. vitriolat. an. scr. ii. M. f. Pulv. S. Digestiv-Pulver, darvon 2. oder 3. Messer-Spitz voll zu nehmen, auf einer Brühe.

Alius. ℞. Croc. mart. aperit. scr. iv. pulv. Epat. rub. sal. absint. chelidon. mai. cent. min. an. scr. i. divid. in viii. p. aq. sumendas ex brodiò aperitiuò. Pulveres Cachectici, videantur superius de Chalybeatis.

Pulvis ante-Ictericus expertus Timæi. ℞. Semin. aquileg. dr. vi. croc. oriental. dr. i. tart. vitriolat. dr. s. M. F. Pulv. divid. in 7. p. aq. sumendas ex vinò calidò per 7. dies continuos.

Pulvis præcipitans absorbens. ℞. Ocul. can. præp. corall. rub. præp. an. dr. ii. matr. perl. præp. C. C. ust. præp. an. dr. i. sol. aur. N. v. M. F. Pulv. dos. scr. ii. vel dr. i.

Alius specificus. ℞. Ocul. can. præp. corall. rub. præp. unicorn. ver. an. dr. i. antihect. Poter. dr. i. s. cinab. nat. cinab. antim. an. scr. s. extr. castor. scr. i. M. F. Pulv. vel cum solutione tragac. Pilul. potest pro re natâ etiam aliquid addi de laud. op. vel theriac. celest.

Tragæa Epatica. ℞. Spec. diarrhod. Abb. scr. iv. diatrion. sant. arom. ros. an. scr. ii. sacch. ros. tab. unc. i. s. sacch. cand. alb. unc. ij. ol. destill. anis. gut. xv. M. S. Leber stärckendes Trisuntb.

Alia, viscera abdominis roborans. ℞. Spec. diarrhod. Abb. diatrion. sant. an. scr. ii. diacurcum. diluac. an. scr. i. cinam. opt. dr. ii. nuc. mosch. dr. i. mac. caryoph. cubeb. cardam. an. scr. s. corall. rub. præp. dr. i. sol. aur. N. ii. sacch. albiss. unc. viii. M. F. Trag.

Ephema Epaticum frigidum. ℞. Aq. endiv. ros. portul. nymph. acetos. an. unc. i. s. acet. ros. unc. i. pulv. ros. sant. rub. spic. ind. an. scr. s. spec. diarrhod. Abb. diatrion. sant. an. dr. s. M. S. Leber-Überschlag.

Ung. deoppilativum. ℞. Ung. deoppilat. unc. i. s. ol. destill. carv. scr. ii. M. Vel ℞. Ung. deoppil. carmin. an. unc. i. s. ol. dest. caryoph. gut. v. mac. gut. iii. lig. Rhod. gut. ii. M. Vel ℞. Ung. santal. dr. x. deoppil. dr. v. ol. dest. lig. Rhod. scr. s. ol. absinth. q. s. M. S. Leber-Salben.

Aliud. ℞. Axung. molendinar. ping. capon. an. unc. i. ol. capp. rut. absinth. an. dr. iij. ung. de alib. popul. an. unc. s. cer. parum. M. S. Unterwachs-Salben.

Unguentum Hepaticum frigidum. ℞. Cerat. santal. unc. i. succ. cichor. rec. expr. unc. ii. bull. ad succ. consumpt. add. ol. ros. de capp. an. unc. s. acet. ros. dr. ii. M. Vel ℞. Succ. endiv. cich. portul. an. unc. i. mass. cerat. santal. unc. ij. coq. ad succ. consumpt. add. ol. ros. nymph. ung. infrigid. Galen. an. unc. s. M. S. Kühlende Leber-Salben.

Emplast. Hepaticum. ℞. Ung. santal. dr. vi. pulv. ros. dr. i. s. ol. dest. lig. Rhod. gut. xiv. campb. gr. iv. terreb. & ceræ parum. M. F. Emplast. inducendum corio coopert. sind. rub. S. Leber-Pflaster.

Plura de Hepaticis, vide de Præparantibus & Martialibus, quæ omnia huc spectant, & de quibus supra.

## ARTICULUS IX.

De Officiò Medici, in considerandis Remediis Spleneticiis, Antiscorbuticis, & Nephriticis.

## I.

**M**edicamenta splenetica sunt, quæ Lienii familiaria, affectibus illius succurrunt, & quidem vel morum sanguinis & feri in colatoriò hóc suò retardatum tollendo, ac humores ponticos, acidos & austeros, sanguinis partes volatiles figentes corrigendo, qualia sunt aquea, diluentia & temperantia, leniter amara & aromatica, alcalina fixa & volatilia, alcalina terrea & præcipuè Martialia, quæ meritò hypochondriacorum & scorbuticorum panacæa sunt ac dicuntur, atque hæc profunt in obstructionibus viscerum, initiò hydropis, cachexiæ, palpitatione cordis, doloribus & tumoribus hypochondriorum: Immo cum hypochondria sint fomes quasi omnium morborum, hæc ipsa quoque ad affectus capitis & nervorum sympathicos spectant; vel agunt feri statum volatiliorem, seu ejus acrimoniam & lixiviositatem respiciendo, unde phlogoses, ebullitiones, & rarefactio sanguinis major, dolores arthritici, scorbutici vagi, sudores colliquativi nocturni, vigiliæ, inquietudines, pavores &c. quibus medentur tum aquea diluentia, tum acidula, austerioruscula, stiptica, terrea; vel respiciendo obstructions, ac recrementa pituitosa, tartarea limosa sero immerfa, & faciliè in sabulum canosum, arenulas vel calculum ipsum fatiscientia, qualia sunt aperientia generosiora, ut acida, alcalina & enixa, aromatica, abstergentia, diuretica & nephritica.

## II.

Circa usum remedium splenetico, Not. 1. Ut jam supra dictum, acidulas & thermas unicum sæpè esse splenetico remedium. 2. Martialia hypochondriacorum panaceam esse & dici. 3. A præcipitantibus hypochondriacos & scorbuticos haud exiguum quoque accipere levamen. 4. Variare splenetica pro variò & diverso agrorum splenetico statu. Nam sicuti volatilia, tam salina quam spirituosissima aromatica, nocent in affectu lienis calidò, ita profunt in frigido. 5. Acida subinde etiam inter splenetica numerari posse, præsertim vi incisoriâ in humorum fixitate, vel fixatoria in nimia eorum rarefactione. 6. Diluentia, uti aperientium ita & splenetico actionem adjuvare, præsertim ubi serum non abundat, vel stagnat. 7. Lienem volatilibus, & magis activis gaudere medicamentis, quam Epar. 8. Dulcia etiam spleni minus amica esse, eò quòd vi fermentativâ potius exsuscitent fervidos, falsos & acres humores, adauctâ simul bile, quæ in omnibus Melancholicis simul peccat, unde hysterica, epileptica & similia symptomata, faciliè si non excitant, saltem exasperant.

## III.

Ad Medicamenta splenetica, reducentur etiam remedia antiscorbutica, scorbuto præcipuè dicata, quæ sale volatili abundantia, fermentationes corrigunt, crassos & crudos humores penetrant, eosque subtiles & tenues reddunt, acidum vitiosum destruunt, obstructions referant, humoresque peccantes hinc inde discutunt, & per urinas evacuant. Circa usum horum, Not. 1. Calidioribus & acrioribus cautè utendum esse, præsertim in corporibus rarioris texturæ, & calidioris temperamenti, vel saltem temperatis & blandè acidis miscenda, ut v. g. Cichor. acetos. succ. cit. vel quod optimum sero lactis. 3. Dulcia non faciliè exhibenda, ac præcipuè à saccharò nimio abstinendum esse. 3. Simplicia antiscorbutica recentia, & eorum succos aut conservas præferenda



renda esse, compositis artefactis, & præcipue decoctis vel extractis, cum sal volatile eorum facile dissipetur & evanescat. 4. In eorum usu per 14. dies & ulterius insistendum esse, & 5. vel 6. die lenitivum exhibendum.

Formulæ

Remediorum Spleneticonum, & Antiscorbuticonum.

Remedia Splenetica eadem ferè sunt, quæ Epatica, Martialia & præparantia Aperitiva, hinc suis locis videantur.

Vinum Antiscorbuticum. ℞. Rad. armorac. rec. testulatum incis. unc. iv. sem. eruc. conquass. unc. i. affund. vin. Rhen. lib. iv. stent in infus. per triduum hinc Col. dein ℞. Fol. rec. cochlear. nasturt. beccabung. an. mii. incid. & terantur in mortar. marmor. affund. colat. superiorem, stent per diem & noct. hinc exprim. sub prælo fortissimè, & col. per chart. empoet. addendo tantillum sacch. pro delicatioribus.

Aliud. ℞. Herb. rec. cochlear. nasturt. aquat. an. mij. beccabung. acetos. an. mj. contund. in mort. marmor. affundendo vin. Rhenan. in quò rad. armorac. testulatum incis. per triduum macerat. lib. iv. stent in Infus. per diem & noctem, hinc exprim. fortissimè & Colet. add. succ. cit. rec. unc. iv. sacch. parum. M. dos. ab unc. iij. ad vj.

Aliud. ℞. Herb. Cochlear. rec. nasturt. fumar. an. mj. rad. armorac. N. 1. enul. unc. i. passul. dr. vi. contus. & conquass. includ. Nodulo infundendo vinò, vel si phlogoses excitet, serò lact. vel lact.

Cerevisia Antiscorbutica. ℞. Fol. cochlear. cardamin. beccabung. trifol. fib. an. m. vi. epat. agrim. ling. cervin. an. mii. absinth. Rom. mi. rad. raph. rust. unc. iij. rad. 5. aperient. cichor. an. unc. ii. sem. carv. unc. i. f. cort. exter. limon. N. vi. xv. pass. exacinat. lib. ii. f. Saccul. pro cong. vi. cerevisia.

Mixtura Antiscorbutica. ℞. Mixtur. f. spirit. cochlear. nassurt. bacc. juniper. Essent. trifol. fib. an. dr. iij. M. S. Essenz. Wider den Scharbock, darvon von 20. bis 30. Tropfen einzunehmen.

Succi Antiscorbutici. ℞. Succ. rec. expr. cochlear. lib. f. nasturt. aquat. beccabung. an. unc. iij. fumar. cichor. acetos. an. unc. ii. mixta præcipit. cum succ. cit. S. Scharbocks-Safft, darvon 4. Unzen täglich in einer Brühe zu nehmen. vel per se cum dr. i. f. aq. cinam.

Alii. ℞. Succ. rec. expr. cich. fum. beccabung. nasturt. aquat. cochlear. an. dr. iij. feri lact. capr. unc. iv. M.

Brodium Antiscorbuticum. ℞. Beccabung. nasturt. aq. cochlear. acetos. Hispan. an. M. 6. raph. mar. unc. j. minutissimè concis. affund. brod. carn. ferv. lib. i. per pannum fortiss. exprim. dos. m. & v. unc. v. cum gut. xv. vel xx. Essent. trifol. fib.

Electuarium Antiscorbuticum. ℞. Pom. cit. rec. una cum cort. incis. N. iij. fol. cochlear. rec. mij. nasturt. aq. m. ij. acetosell. mi. Contund. in mort. marmor. & cum paucò sacch. f. Elect. S. Scharbocks-Latwergen.

Aliud. ℞. Conf. ros. antiq. unc. ii. fumar. cochlear. an. unc. i. f. pulv. troch. de viper. unc. f. syr. scelotyrb. Forest. dr. vi. vel q. f. M. ad fistil.

Pulvis Antispleneticus. ℞. Crem. tart. cryst. tart. an. dr. ii. scolopend. tamarisc. frax. juniper. an. dr. f. ol. mac. scr. 8. M. F. Pulv. S. Milzeróssnendes Digestiv-Pulver.

Unguent. Spleneticum. ℞. Ol. Chamom. laur. cappar. absinth. an. dr. ii. ung. carmin. Mins. unc. i. Cerat. de cicut. unc. 6. M. S. Miltz-Salben.

Emplastrum Spleneticum. ℞. Empl. de bacc. laur. dr. vi. tacamah. unc. f. Bals. peruv. dr. i. cer. dr. ii. M. F. Empl. sindone contegendum. Vel ℞. Empl. splenet. Cerat. de ammon. an. dr. vi. M. Vel ℞. Cerat. de Cicut. santal. de bacc. laur. an. dr. vi. malax. cum ol. capp. & F. Emplastrum.

Formulæ

Remediorum Nephriticorum,

Videantur de Diureticis & Lithonripticis.

ARTICULUS X.

De Officiò Medici, in considerandis & præscribendis Hystericis seu Uterinis.

I.

**M**edicamenta Hystericæ seu Uterinæ sunt, quæ utero appropriata, affectibus illius succurrunt, & quidem 1. Vel menses movendo, quatenus vel vias uteri oclusas referant, vel sanguinis qualitatem vitiosam, pituitosam, acidam, ad motum ineptam corrigunt, ut organum menstruum recipiat, vel sanguinem fundunt, & archæum uteri exstimulant, vel humores acidos, austeros, stipticos, sanguinem nimis figentes & concentrantes tollunt, uti maximè sunt chalybeata, sine quibus vix aliquid proficitur, vel uterum immediatè abstergunt, ac humores pituitosos, tartareos ac mucilaginosos, vasa obviscentes expediunt, poros dilatant, & unò verbò vias liberas & patulas reddunt, naturamque ad excretionem blandè sollicitant, atque hæc remedia dicuntur Emmenagoga, suntque vel volatilia oleosa, vel salina, volatilia, amara, aromatica, ac præsertim martialia. Vel 2. Foetus & secundinarum exclusionem promovendo, quatenus vel acrimonia irritante, foetum ad calcitrations & agitationes irritant, aut uterum stimulant, vel naturam roborant, aut vias emolliunt, aut spiritus animales majori copiâ ad fibras uteri proliciunt, atque hæc dicuntur partum facilitantia, suntque vel emollientia, vel confortantia, balsamica & nervina, vel stimulantia, tum salina, tum sulphurea. Vel 3. Agunt fibras uteri nerveas & membranosas roborando, per nervina, spirituosas, aromatica. Vel 4. Flatus & halitus, seu impuritates, circa & in uterò stabantibus discutiendo. Vel 5. Tandem humores extravasatos, circa uterum stagnantes resolvendo, aut humores, acidos, lancinantes, absorbendo, ac figendo.

II.

In usu horum Not. 1. Emmenagoga urgente & aurgante naturâ, non quietâ vel invitâ existente propinanda esse. 2. Eadem etiam esse foetum exturbantia, hinc gravidis nunquam exhibenda. 3. Eadem justò tempore, id est, ante solitum fluxum vel novilunium imprimis data, & sæpius repetita, felicissimè juvare. 4. Optimum tempus movendorum mensium esse vernum, hinc maximè consultum, illò tempore 6. vel 8. diebus ante mensium tempus operari. 5. In foetû excludendò, naturam malle duci, quàm pelli; unde talia medicamenta non propinanda, nisi constet de doloribus aperiivis portarum, & actuali nisu ad excernendum, sicque quò natura magis indiga, eò magis juvanda, ut in foetû mortuò, secundinâ retentâ. 6. Non exhibenda esse partum juvantia, nisi constet de situ Infantis naturali ad partum. 7. Tum puerperis in genere, tum speciatim in secundinis retentis, convenire bezoardica, putredini resistentia, & uterum purgantia. 8. Dulcia Hystericis exosa esse, & quidem illis maximè, quibus vel fermentum peregrinum uterum inquinat, vel nervosum genus affectum, vel vaporosa miasmata infestant; nam iis subinde conferunt, quibus vis fermentativa sanguini inducenda, ut in suppressione mensium. 9. Acida pariter vix non omnes lædere hystericas, fixatis humoribus & irritatis membranis, licet uterum non omnia lædant. 10. In casû dubiò, an menses sint suppressi, vel sæmina grava, vix ultra martialia ascendendum, cum hæc non noceant, sed simul robovent. 11. Clysteres uterinos egregiè quidem elutriare & abstergere uterum: virginibus verò & gravidis non convenire, velut & pessos ac similia topica.



## Formulae

## Remediorum Hystericorum &amp; Uterinorum.

Decoctum Emmenagogum. ℥. Rad. fœnic. ap. rub. tint. pimpinell. an. unc. s. herb. puleg. arthemis. serpill. calamint. mont. meliss. an. m. s. fl. cheir. calend. an. p. i. cic. unc. i. s. bacc. laur. unc. s. sabin. dr. iii. sem. mil. sol. anis. an. dr. iii. cinam. acut. dr. vi. incis. & conquass. coq. in s. q. aq. s. in Col. lib. i. s. dissolv. syr. de arthemis. unc. iii. mixta clarif. & filt. add. essent. croc. gut. xxx. M. S. Trank wider die verhaltene Monat-Zeit, Morgends und Abends ein Trunk davon zu thun.

Aliud. ℥. Fol. Arthemis. m. i. s. calamint. orig. meliss. mentast. puleg. an. m. s. rad. ostrut. fœnic. petrosel. pimpinell. cort. aurant. an. dr. ii. s. bacc. juniper. unc. i. sem. fœnic. petrosel. genist. hyper. an. dr. iii. coq. in vin. alb. s. q. Col. & bibatur m. bonus haustus.

Julepus Emmenagogus. ℥. Succ. limon. lib. s. cum s. q. sacch. f. instar Julapii ad ignem, addendo sub finem croc. q. s. ad saturatam flavedinem. S. Besonder-Zeit-treibender Julep, darvon 3. Löffel voll 2. mahl im Tag zu nehmen, und 4. Tag zu continiren.

Julapium Hystericum camphoratum. ℥. Camph. dr. ij. incende & sapè extingue in aq. font. lib. i. ad totalem camph. consumptionem Col. dentur cochl. 4. vel 5. sapè in paroxysmò Hystericò.

Julapium Hystericum foetidum. ℥. As. foetid. dr. i. s. solv. in aq. ceras. nig. unc. vi. sine calore in mortar. frig. ut lactescat; sumatur cochl. i. in initio & sine paroxysmi.

Julapium Hystericum moschatum. ℥. Aq. naph. unc. vi. mosch. scr. s. sang. drac. scr. i. M. pro 2. dos. in paroxysmò.

Potiuncula ad Dystociam vel centies experta. ℥. Aq. m. liss. arthemis. cinam. hyster. an. unc. i. myrrh. el. scr. i. s. succin. alb. præp. scr. i. croc. scr. 3. M. f. Potiuncula actû calidè haurienda & intra 4. horas repetenda, si primò non fortietur effectum.

Mixtura Hysterica. ℥. Aq. meliss. borrag. an. unc. ii. s. marg. præp. scr. i. s. Castor. gr. v. camph. gr. ij. M. S. Hertz-und Mutter-Wasser, Löffel-voll weifs zu gebrauchen.

Alia. ℥. Aq. Ceras. nig. rut. hysteric. alb. an. unc. iij. castor. in nodulo ligat. & in vitrò suspens. dr. s. Sacch. q. s. M. F. Julap. de quò capiat cochl. 4. vel 5. in omni languore, instillando primæ dosi, si Paroxysmus urgeat, sp. C. C. gut. xx.

Alia. ℥. Aq. meliss. puleg. fl. chamom. an. unc. i. s. tint. castor. cum sp. sal. armon. fact. dr. s. spirit. meliss. scr. i. ol. destill. succin. gut. iij. syr. de ment. vel cort. aurant. unc. 6. M.

Mixtura in suppressione Lochiorum. ℥. Elix. prop. P. dr. i. s. Essent. castor. dr. i. M. dos. gut. xv. ex vino calidò, in quò tantillum croc. mac. & cinam. ebullierit.

Alia. ℥. Aq. arthemis. hysteric. Minf. an. unc. i. s. cinam. unc. s. pulv. myrrh. el. scr. i. succin. alb. præp. castor. an. scr. s. M. pro unâ vice, & sic pro ceteris.

Potio ad expellendam Secundinam. ℥. Troch. de myrrh. dr. i. cinam. acut. testicul. eq. præp. an. scr. i. croc. orient. scr. s. Borrac. gr. v. aq. arthemis. unc. ij. M. pro unâ dosi.

Vinum Emmenagogum. ℥. Rad. Curcum. scr. ii. di-ctamn. alb. dr. s. cass. lig. cinam. acut. an. scr. iij. herb. meliss. puleg. an. mij. cort. flav. cit. aurant. an. scr. iv. croc. orient. scr. i. M. incisa dentur ad Nodul. pro mens. i. vin. alb. & mens. s. aq. m. liss. destillat. Dos. unc. iv. cum gut. vi. vel vii. tint. chalyb.

Aliud fortius, pro Secundinâ quoque aut Fœtû mortuò ejiciendò utilis. ℥. Fol. sabin. arthemis. di-ctamn. cret. rorisin. puleg. an. m. s. rad. aristol. rot. apii, Treos, rub. tint. an. unc. s. bacc. laur. dr. vi. borrac. venet. troch. de myrrh. an. dr. iij. cass. lign. acutiss. unc. s. croc. integ. dr. ij. incis. & conquass. affunde vin. generos. q. s. stent in infus. perpetuâ in locò calidò optimè clausa. Detur singulis matutinis haustus calidus.

Brodium Emmenagogum, fit ex Decoct. Rad. enul. petrosel. cic. rub. cum cinam. croc. & mac.

Electuarium Lochia provocans. ℥. Conf. absinth. Rom. rut. an. unc. i. troch. de myrrh. dr. ii. castor. croc. sal. vol. salis armon. as. foetid. an. dr. s. cum s. q. syr. de s. rad. M. F. Elect. de quò capiat magnitudo nuc. mosch. major. ter-tiâ quâque horâ superbibendo cochl. 4. vel 5. seq. Julepi ℥. Aq. rut. meliss. an. unc. iij. sacch. cand. q. s.

Pilulæ Hystericæ. ℥. Castor. dr. i. sal. vol. succin. dr. s. cum s. q. Bals. Peruv. M. F. Pilul. N. xxiv. capiat tres singulis noctibus, superbibendo cochl. ij. vel iij. aq. hyster.

Alia. ℥. Myrrh. el. galban. an. dr. i. s. castor. gr. xv. cum s. q. Bals. Peruv. M. F. Pilul. ex dr. i. N. xii. sumat 3. singulis noctibus.

Alia Camphorata. ℥. Camph. scr. ii. castor. dr. i. as. foetid. scr. iv. sem. dauc. sylv. dr. i. s. syr. de arthemis. q. s. M. F. Pilul. 6. ex dr. i. Vel ℥. Pulv. sem. vitic. unc. s. rut. as. foetid. camph. an. dr. i. castor. dr. ii. ol. succin. gut. xx. syr. de arthemis. q. s. f. mass. Pilular. Dos. à scr. s. ad gr. xv. 3. tiâ quâque horâ in paroxysmò Hystericò, & præ-terea horâ somni extra paroxysmum singulis noctibus.

Pilulæ in Mensium diminutione & conjunctò dolore. ℥. Extract. aloës, croc. myrrh. castor. an. gr. viii. laud. op. gr. vi. ol. sabin. gut. v. M. F. Pilul. N. xxviii. Dos. N. vii. vibus diebus ante eruptionem mensium, sub horâ decubitus.

Pulvis Hystericus expertus Timæi. ℥. Facul. bryon. scr. ii. marg. præp. scr. i. castor. gr. xxv. ol. dest. rut. suc-cin. alb. an. gut. v. M. F. Pulv. divid. in 3. p. aq. & repe-titis vicibus, si opus fuerit, ori infundatur cum vino cali-dò, in quò tantillum mac. & croc. bullierit.

Pulvis Partum provocans. ℥. Myrrh. el. scr. i. succin. alb. borrac. an. scr. s. cinam. gr. viii. M. F. Pulv. sumen-dus ex aquâ lil. alb. hyster. & puleg.

Alius. ℥. Epat. anguill. exsic. & pulv. vel agagropil. aut testic. eq. præp. à dr. s. ad dr. i. Borrac. venet. scr. i. M. detur ex aq. puleg. meliss. & hyster.

Pulvis Emmenagogus. ℥. Bacc. laur. massâ panis circumduct. & in clib. coct. unc. s. summit. cent. min. myrrh. rub. croc. an. scr. i. cinam. sabin. aristol. rot. di-ctamn. alb. an. gr. xxiv. M. F. Pulv. Dos. à dr. s. ad scr. ii.

Alius. ℥. Rhab. el. dr. ii. puleg. absinth. sabin. bacc. laur. an. dr. i. mac. dr. s. croc. scr. i. M. F. Pulv.

Alius. ℥. Rad. di-ctamn. alb. dr. iii. zedoar. calam. arom. cinam. mac. croc. cort. cit. an. dr. i. troch. de myrrh. borrac. venet. an. scr. iv. sem. nigell. dr. ii. fœnic. cumin. anis. bacc. laur. an. dr. i. M. F. Pulv. cujus dos. dr. i.

Alius. ℥. Crem. tart. Cryst. tart. an. dr. ii. sal. arthe-mis. absinth. puleg. meliss. spirit. sal. coagul. an. dr. s. pulv. agar. rad. asar. gial. an. dr. ii. Rhab. ver. dr. i. croc. orient. scr. i. troch. de myrrh. dr. i. s. ol. mac. sabin. an. scr. s. M. F. Pulv. subtiliss. cujus dos. dr. i. ex aq. meliss. pu-leg. &c.

Tragæa Emmenagoga. ℥. Spec. dianth. diarrhod. Abb. an. dr. i. pulv. asar. Rad. Ir. cyclam. di-ctamn. alb. aristol. rot. Cypcr. gentian. zedoar. an. scr. ii. succin. alb. myrrh. cinam. an. dr. s. sem. sesel. dauc. an. scr. i. Essent. cit. saccharin. ad pondus omnium f. Trag.

Pediluvium in suppressione Mensium. ℥. Herb. arthe-mis. meliss. puleg. rorisin. an. mii. s. fl. chamom. calendul. an. mi. bacc. laur. unc. i. s. M. incis. & contus. ad chart. S. Species zum Fuss-Wasser.

Emplastrum Matricale. ℥. Empl. matric. August. vel gum. caram. unc. i. extend. super alut. Vel ℥. Gum. Galb. tacamah. an. unc. s. dissolv. & extend. super alut. ac infra umbilic. applicetur. Vel ℥. Galb. in tint. castor. solut. & col. dr. iii. tacamah. dr. ii. M.

Suffitus humidus in suppressione Mensium vel Lochio-rum. ℥. Herb. matricar. puleg. an. mi. sabin. mii. bacc. laur. juniper. an. unc. i. pom. colocynth. unc. i. incis. grossò modò dentur ad chart. S. Species zur Bähung. ebull. in aq. commun. cujus vapor fervidus excipiat per infundibu-lum, in sellâ undique clausâ. Si citius liquor deferreat, in-jectione silicis vel chalyb. igniti denuò calefieri potest.

Suffitus



Sufftus fuccus in eundem finem. ℞. *Sabin. m. s. myrrh. dr. ii. asphalt. trech. alband. an. dr. i. M. F. Pulv. Vel ℞. Caryoph. cinam. mac. an. dr. ii. bacc. juniper. unc. s. sem. nigell. dr. i. Syrac. calam. dr. ii. M. F. Pulv. gross.*

Odoramentum in passione Hysterica. ℞. *Castor. as. fœtid. an. dr. s. ol. succin. scr. s. M. & in sericò involve f. Nodul. naribus admovendus. Vel ℞. Galb. as. fœtid. an. dr. ii. castor. dr. i. s. sal. vol. succin. dr. s. M. f. Nodul. vel sæpius olfaciat sp. sal. armon.*

Enema Hystericum. ℞. *Decoct. commun. vel Emoll. unc. x. campb. dr. i. ol. rut. unc. s. mell. mercurial. unc. iii. M.*

Aliud. ℞. *Herb. mercurial. pariet. arthem. puleg. rut. calam. an. mi. sem. carv. cumin. bacc. laur. an. dr. ij. coq. ad lib. i. in Col. dissolv. elect. hier. pic. benedict. laxat. an. unc. s. vel dr. vi. ol. rut. unc. ij. campb. scr. s.*

Aliud in Partu difficili. ℞. *Herb. mercurial. malv. arthem. fl. chamom. an. mi. fl. lil. alb. pi. rad. alth. bryon. arist. rot. an. dr. ij. coq. in f. q. aq. in Col. unc. viij. dissolv. Elect. lenit. dr. vi. ol. lil. alb. amygd. d. an. dr. vi. vitell. ov. N. i. Borrac. venet. dr. s. M.*

## ARTICULUS XI.

De Officiò Medici, in considerandis & præscribendis Remediis Arthriticis.

### I.

**M**edicamenta Arthritica seu articularia sunt, quæ articulis appropriata, affectibus eorum succurrunt, tum respiciendo serum, quod vel exsiccant, ejusque quantitatem absumunt, ut v. g. china, sassafras &c. Vel qualitatem ejus acrem diluunt & temperant, ut lac, emuls. &c. Aut invertunt & absorbent, ut martialia, antiscorbut. &c. Vel resolvunt, seroque fluxibilitatem fœnerantur, ut cinnabarina, tum respiciendo nervos, membranas, tendines & ligamenta per roborantia, qualia sunt, quæ sulphure balsamicò oleosò suavi & roscidò pollent, tum mitigando dolorem ipsum urgentem, à tensione & vellicatione membranarum oriundum, tum intus, per emuls. cinnabarina, tum extrinsecus, per paregorica ac nervina, spirituosà sulphurea & urinosa, ac præsertim è lumbricis & formicis parata.

### II.

Circa usum horum Not. 1. Sæpè optimum Medicamentum topicum arthriticum esse, non uti topicò, cum sanè præstet internis tollere causam morbificam, roborare genus nervosum, & acrimoniam demulcere, quam externis inhærere. 2. Cavendum esse, ne, dum per externa juvare intendimus, articularum tonum destruiamus, vel serum nimis exhauriendo, vel nimis laxando ut magis influat, vel ad partes principales repellendo. 3. Dextrò oculò corpus: sinistrò articulos respiciendos esse, nisi malum fuerit à causâ externâ. Videndum igitur, ne ipsi negligantur articuli, neque etiam ipsa viscera & massa sanguinea. 4. Topica, dum blandiuntur sensû, sæpe insidiosa esse motui, adeoque ita sensui tristi medendum esse, ne motum cum sensû auferamus. 5. Non constantem æquè effectum expectari posse à quocunque topicò, cum localia sæpè exasperent dolores & morbum, ac quæ unâ vice profunt, alterâ noceant, atque ex his seligenda, imprimis defensiva & roborantia. 6. Quæcunque magis impingunt & figunt humores, præ ceteris nociva esse articulis, ut repellentia. 7. Unctuosà quoque, pingua & emplastica, minùs competere certum est in arthriticis, hinc frequens docet experientia, unguenta, emplastra & similia, plùs damni dedisse podagricis: immò plures ex arthritide vagâ hòc modò fixam sibi accersivisse, plurimos etiam tophos, adeò, ut tales podagrici contracti & consummati revera

captivi fiant, ex intempestivò topicorum emplastrorum, aliorumque usû. Distinguenda igitur sunt articularia Medicamenta, pro distinctione morborum, quibus obsidentur articuli.

## Formulæ

### Remediorum Arthriticorum.

Vinum Arthriticum purgans. ℞. *Chin. sarsapar. an. unc. ii. polyp. querc. unc. iii. Rhab. sem. an. unc. i. gial. dr. vi. caryoph. dr. i. vin. alb. lib. vi. inf. f. a. & Col. dos. unc. iv. quotidie per dies viii. vere & autumnò, vel etiam imminente Paroxysmò.*

Vinum Arthriticum alterans. ℞. *Sarsapar. guajac. an. unc. i. visc. querc. dr. vi. fol. sic. chamad. chamapyth. salu. an. unc. iii. fl. primul. ver. rorism. lil. convall. an. unc. s. hyper. dr. vi. vin. alb. lib. x. inf. per dies 3. f. Col. dos. unc. ii. bis in die per dies 30. vel post usum vini prioris.*

Vinum Antipodagricum Paracelsi. ℞. *Rad. caryophyll. lat. acor. an. unc. i. fol. majoran. m. iv. fl. sambuc. p. iv. infund. in vin. lib. iii. stent in infus. per viii. dies sumatur ex hòc m. & v. haustus.*

Aliud. ℞. *Sarsapar. rad. chin. lig. sassafr. an. dr. i. s. rad. Pæon. irid. flor. an. dr. ii. caryoph. dr. i. herb. chamad. dr. ii. beton. salu. an. dr. i. fl. hyper. primul. ver. an. dr. s. mac. dr. s. sem. coriand. præp. scr. iv. incid. & contund. pro vin. alb. mens. iii. s. detur primus haustus ad pastum.*

Electuarium amarum Antipodagricum Sydenham. ℞. *Rad. angel. calam. arom. imperat. enul. fol. absinth. vulg. cent. min. marrub. alb. chamad. chamapyth. scord. calamint. hyper. virg. aur. serpill. ment. salu. rut. card. b. puleg. abrot. fl. cham. tanacet. lil. convall. croc. sem. thlasp. cochlear. carv. bacc. juniper. an. q. pl. mell. despum. & vin. Canariens. q. s. M. F. Elect. dos. dr. ii. m. & v.*

Aliud. ℞. *Sarsapar. unc. iv. sem. hyper. fol. chamapyth. chamad. an. unc. iii. arist. rot. dr. vi. angel. cinam. an. dr. ii. caryoph. scr. iv. croc. scr. ii. omnia in tenuissimum pulverem redacta incorpor. cum s. q. mell. Hispan. coct. f. Opiat. quâ utatur æger per integrum annum, sumendo quotidie diebus veris, hyemis & autumnii dr. i. s. astatâ dr. ii. diebus canicularibus omninò abstineat.*

Pilulæ Antipodagricæ. ℞. *Rad. aristol. rotund. long. an. unc. s. polyp. querc. dr. ii. C. C. phil. præp. sal. vol. lumbric. terrest. an. dr. s. cran. hum. præp. dr. s. cum gelat. C. C. M. f. Pilul. ex dr. i. N. xxxx. asperg. pulv. sant. cit. sumantur N. vij. m. & v. per integrum annum, si affectus radicans.*

Aliæ. ℞. *Pulv. castor. opt. unc. s. succin. alb. chamad. chamapyth. an. dr. vi. sal. succin. cerusj. antim. Bals. Tolut. an. unc. i. rad. petasit. dr. iii. ter eb. venet. unc. ii. Balf. sulph. tereb. q. s. M. F. massa pilularis dos. dr. s. bis in die, per menses duos vel tres, bibendo pro potu decoct. sarsapar. chin. rad. petasit. cum uv. pass.*

Pulvis Antipodagricus. ℞. *Pulv. fol. chamad. chamapyth. cent. min. major. salu. beton. rad. gent. aristol. rot. an. unc. i. sacch. lib. i. M. f. Pulv. Vel ℞. Pulv. fol. salu. vel chamapyth. lib. s. ocul. can. sacch. an. unc. ii. M. F. Pulv. alii etiam addunt ossa humana ped. calcinat.*

Pulvis Arthriticus Wepferi. ℞. *Lumbric. terrest. præp. unc. s. C. C. phil. præp. ungu. alc. præp. an. dr. ii. ol. nuc. mosch. expr. gut. iv. sacch. albiss. unc. i. s. M. dos. m. dr. i. & v. dr. s.*

Alius ejusdem. ℞. *Anim. diaphoret. cum triplo nit. deton. dr. i. s. sal. vol. lumbric. vel viper. scr. ii. cinnab. antim. ter cum cinnab. nat. sublimat. scr. i. C. C. phil. præp. dr. i. s. ol. cinam. gut. ii. M. F. Pulv.*

Pediluvium Podagricum. ℞. *Rorism. hyper. puleg. laur. arthem. an. miii. sal. nig. lib. i. sal. armon. unc. ii. surf. mac. unc. vi. Coq. in aq. cong. ii. add. sapon. venet. unc. ii. sp. vin. lib. ii. M.*

Aliud ad firmandos articulos podagrâ debilitatos, ac



Simul à crebriore recidivâ præservans. ℞. Bacc. Juniper. lib. f. herb. rorism. m. vi. serpill. salv. an. mii. M. S. Species zum Fuß-Baad. coq. in f. q. lixivii commun. non adeò acris. Decoël. decantatò cum vel sine Col. immittuntur pedes, coërcendo halitus integumentò vasi superimposuò, conservando æstum, vel novò decoëlò, vel silice candefactò immisò.

Aliud. ℞. Salv. rorism. chamom. arthemis. hyper. absinth. vulg. an. m. vi. sal. nig. m. iii. coq. in aq. cong. iii. ad ii. f. col. pro Fotù.

Fomentum in doloribus Arthriticis frigidioribus. ℞. Aq. Arthrit. vel Anhalt. unc. ii. spirit. juniper. unc. iv. spirit. vin. opt. lib. f. M. Vel ℞. Spirit. juniper. unc. iii. rorism. lavend. an. unc. i. alum. crud. dr. iii. M. S. Glieder-Brandenwein.

Aliud in dolore Dorfi. ℞. Aq. vit. unc. vi. quibus infund. fl. rorism. salv. lavend. majoran. an. pii. cardam. dr. i. castor. scr. i. stent in vitrò probè clausò in digestionè, vitrum quotidie agitando; de hâc aquâ ℞. Unc. ii. aq. salv. destill. unc. i. spic. scr. i. M. manus imbuatur hòc liquore & f. ex unc. s. ol. destill. Frictio supra dorsum.

Aliud expertum in dolore Ischiadicò. ℞. Bacc. juniper. unc. f. piper. nig. mast. el. an. dr. f. M. F. Pulv. gross. indendus vitro angust. orificii, superaffund. spirit. vin. alcohols. unc. iv. sp. juniper. unc. ii. stent in digest. per hor. 4. vel v. postea in Col. in mortar. frig. dissol. sapon. venet. dr. ii.

Fomentum in dolore Podagricò. ℞. Lapid. pum. dr. iii. medicamentos. Croll. dr. v. alum. dr. ii. sal. comm. dr. i. sulph. scr. ii. castor. mum. an. scr. i. myrrh. scr. iv. croc. gr. xii. infund. per hor. xii. in locò calidò in aq. spermat. ran. unc. viii. verbasc. unc. iii. vin. alb. unc. iv. acet. squill. unc. i. f. add. mell. despum. unc. i. bull. parum in duplici vase. Col. add. sp. tart. scr. iv.

Aliud. ℞. Tinct. croc. cum spirit. vin. parat. unc. iv. camph. opii. an. dr. i. diger. locò calidò ad dissolut.

Aliud. ℞. Spir. vin. rectif. unc. viii. sp. sal. armon. dr. iii. camph. dr. f. tinct. op. castor. an. scr. ii. M. Vel seq. Wepferi. ℞. Bnyr. antimon. dr. i. sp. vin. lib. f. M. Vel seq. Grulingii, quod intra 2. horas dolorem sedare dicitur. ℞. Capit. mort. vitriol. acet. destill. an. unc. f. opii thebaic. dr. i. aq. chelidon. maj. fl. sambuc. an. unc. viii. M.

Unguentum Antiparalyticum. ℞. Ol. lumbric. unc. ii. philosoph. unc. f. vulp. laur. rutac. an. unc. i. ol. dest. succin. scr. i. major. salv. rorism. an. gut. xv. pingued. castor. dr. ii. M. inung. spina & laus paralyticum bis in die præmissis frictionibus.

Unguentum Nervinum. ℞. Ung. nerv. unc. i. f. ol. laur. unc. f. lumbric. dr. iii. vel ℞. Ol. Juniper. petrol. an. unc. i. succin. dr. ii. vel ℞. Ung. nerv. unc. ii. ol. tereb. chamom. aneth. an. dr. ii. juniper. philosoph. petrol. an. dr. i. sem. urtic. scr. i. M.

Emplastrum Antipodagricum. ℞. Op. sapon. venet. an. unc. f. Emplast. diacalcit. unc. ii. M. f. a. Vel ℞. Sacch. saturn. rub. unc. ix. olei lib. i. sapon. alb. unc. ii. cer. unc. i. coq. f. a.

Emplastrum Ischiadicum. ℞. Gum. carann. vel apud vulgares pic. naval. unc. i. f. extend. super alut. Vel ℞. Pic. naval. unc. ii. sulph. commun. subtiliss. trit. dr. iii. mast. dr. i. tereb. unc. f. M. possit etiam addi castor. vel Gum. ammon. aceto dissol.


Aliud. ℞. Emplast. de melilot. diapalm. an. unc. f. vel Empl. diapalm. diaphoret. Mins. an. unc. i. sal. armon. scr. ii. malax. cum ol. chamom. & lumbric.

Cataplasma anodynum Antipod. ℞. Medull. pan. alb. unc. iii. macerentur in lact. ebull. ac coque parum, hinc adde vitell. ov. N. ij. pulv. fl. chamom. dr. i. croc. scr. i. M.

Aliud Domesticum. ℞. Das riebene Kraut, trucke solches aus von dem Wasser, röste es in der Pfannen, und lege es warm auf.

Suffitus in doloribus Articulorum. ℞. Succin. cit. unc. i. f. lign. juniper. unc. i. thur. dr. ii. myrrh. dr. iii. M. incis. & contus. dentur ad scatul. Vel ℞. Succin. flav. unc. ij. mast. el. unc. f. summit. rorism. lavend. fl. calend. an. dr. vi. bacc. juniper. unc. i. M. F. Pulv. gross. cujus suffi-

tus in limeò molli aliquoties complicatò excipiat, ac applicetur.



## CAPUT X.

De Officiò Medici, in Affectibus indicantibus Adstringentia, Stegnotica, Hypnotica, Anodyna & Vulneraria.

## ARTICULUS I.

De Officiò Medici, in considerandis & præscribendis Remediis Adstringentibus, & Sanguinem sistentibus.

## I.

**M**edicamenta Adstringentia sunt, quæ quidquid laxum est, adstringunt, utilia præsertim in vomitù, diarrhoeâ, lienteria, dysenteria, gonorrhoeâ, fluore albò, aliisque similibus affectibus; vim suam exercent vel villos seu fibras molliores, flaccidas & expansas cogen-do, roborando, contorquendo, & uniendo, vel poros cutis, vasorum, meatuum & viarum corrugando, crispando, colligando, incuneando, contrahendo, obliniendo, replendo, ac obstruendo; quò etiam spectant condensantia & emplastica, vel humores efferatos, fluxiles, tenues & impetuosè motos, in impetù suò coërcendò, ipsòsque increffando, inviscando, concentrando, cohibendo & refrænando. Inter adstringentia sunt, tum terrea exsiccantia & absorbentia, tum acerba & austera, tum acida humores fluxiles coagulantia & quasi figentia, tum emplastica, tum narcotica, martialia, tum etiam escharotica, non quidem propriè, sed quatenus & humorem fluentem absument, & crustam inducunt partibus propugnaculi locò, atque adstrictionem post se relinquunt. Huc etiam refero Medicamenta Ischema, seu stegnotica & sanguinem sistentia, ut intrà alveos suos commoretur, nec extravasetur; qualia iidem sunt, vel respicientia sanguinis orgasmum, rarefactionem, & ebullitionem ejus sistentia, ut præcipitantia, terrea, temperantia aquea, refrigerantia acida; vel respicientia sanguinem ferosiorum, fluxiliorem & acriorem, ut increffantia, adstringentia, opiata; vel vasorum oscula aperta, ut consolidantia, glutinantia, sanguinem imbibentia, coagulantia, & sanguinem in crustam quasi redigentia, cauterizantia, quæ torrefaciendo sanguinem, & vasa crispando ac occludendo, sanguinem sistunt.

## II.

In usù horum omnium, Not. 1. Adstringentia debere esse convenientia tum partibus, quibus debentur, tum humoribus & causæ; sic ventriculo magis conveniunt adstringentia aromatica vel acida: in affectibus pulmonum miscenda resolventia: in affectibus epatis penetrantia acida, in affectibus capitis balsamica, si materia fluxilis & acris, magis mucilaginosa, si maligna, quæ simul bezoardica. 2. Nunquam nimis adstringendum esse, ne subsidant nimis pori, & hinc vix relaxari queant, præsertim etiam, cum subinde fluxus moderari potius quàm sisti petant. 3. In affectibus pectoris in genere parcè adstringentibus utendum esse, tum quia tonus pulmonum laxitate gaudet, tum quia faciliè vitiosa materia ob viciniam ad cor repelli potest. 4. In usù adstringentium semper rationem habendam esse ventriculi, ne fermentum ejus destruat. 5. Adstringentium vim augere anodyna vel opiata, ac moderari resolventia, perpetuò miscenda in spurò ac vomitù cruentò, casu ab altò, &c. 6. Vim adstringentium, ubi paulò post remittit, novis dosibus juvandam esse.

## III.



III.

Præterea 7. Not. Adstringentibus liquidis, vel particulas laxiores habentibus, minus fidendum esse, ut v. g. dulcibus, syrupis, clysteribus, fomentis, balneis, unguentis &c. 8. Adstringentia non commodè dari cum cibis. 9. Fluxus sanguinis, oriundos vel ab obstructione vasorum, & ordinariò denegatò spatiò, vel humorum organis & copià, minus tolerare adstringentia: plùs verò, v. g. purgantia, aperientia & imprimis acidia. 10. Adstringentia alimentosa, ventriculum debiliorem habentibus, ante cibos reliquos assumpta, adstringere: post assumpta, alvum laxare, fibis nempe superioribus constrictis, & inferioribus laxatis. 11. Adstringentia externa actû frigida applicari, v. g. ubi repellendum, ubi sanguinis rarefactio, impetus & effusio sistenda, v. g. adhibita testibus, hypochondriis, & i primis fronti, unde anacollemata & frontalia, ex adstringentibus actû frigidis confici & adhiberi solent, cum cerebro nocere nequeant, obstante ossium vallò: minus frigida locum habent in thoracis, ventriculi, epatis & uteri affectibus, 12. Adstringentia uti & opiata, in dysenteria intrâ 6. vel 7. horas efficaciam suam deperdere; hinc repetenda, neque ab eorum usû cessandum. 13. Adstringentia longè efficacius adhiberi in formâ siccâ, ubi trochisc. pilul. quàm humidâ, utpote citius descente: extrinsecus etiam in formâ emplastr. cerat. front. quàm foment. Baln. clyst. unguent. &c. 14. Adstringentia non debere esse in usû, quibus alvus siccior, & quibus menses fluxuri sunt; observandum tamen in hoc casû, quid magis urgeat. 15. Aromatica adstringentia ut v. g. nucem mosch. mastich. terreis mixta, diarrhoe, dysenteris & vomitibus maximè amica esse. 16. Topia sanguinem sistentia, illis locis applicanda esse, ubi & immediatè id opus est, vel sanguis magis refrigerari test; sic applicantur bregmati, fronti, sub linguâ, nuch, naribus, collo, hypochondriis, testibus, plantis pedum, sub axillis &c. 17. Ligaturas leniores extremorum, pro remorando sanguine non esse inutiles, quò nomine quoque frigida, ut lapides & similia, præter effluvia, quorâstant, arctius manû vel sub axillis detenta, commendantur, in quibus tamen non excedendum, præsertim: impetuosis sanguinis motus conjunctus. 18. Causica corrosiva, ad hæmorrhagias sistendas, non æquè semper esse. Nam licet initio venas adstringant ob partes siccâs, corrodendo tamen postmodum & irritando, grâ symptomata inducere valent, hinc ignis actualis nior.

Formulæ

Remediorum Adstringentium & Sanguinem sistentium.

Decoctum Timæi comprobatissimum, ad hæmoptysin & reliquos fluxus sanguinis ℥. Rad. symphai. unc. i. s. plantag. pimpinell. an. dr. ii. tormentill. i. s. alib. liq. an. dr. iii. herb. burs. past. primell. polyg. chfol. consolid. med. sanic. an. mi. fl. ros. rub. hyper. belicium tot. an. m. s. sem. hyper. dr. iii. incis. grossò modò iter noct. in s. q. aq. manè coq. de Colat. cum album. ov. cl. ℥. Lib. ii. s. add. syr. de symph. unc. iii. de alib. unc. xymell. s. unc. i. s. M. S. Blut-still-und ausheilender Sack, 3. mahl den Tag darvon zu trincken.

Aliud. ℥. Rad. symph. torment. glyc. an. un. herb. veron. centinod. sanic. millefol. alchimill. agrim. q. s. fl. ros. balauft. bellid. min. an. pii. nuc. pin. unc. i. s. fl. rub. unc. s. coq. in s. q. aq. font. de Colat. ℥. Lib. ii. dr. syr. de ros. sicc. de symph. Fernel. an. unc. i. M.

Julepus in Hæmorrhagiis. ℥. Aq. frag. unc. burf. past. endiv. cich. ros. an. unc. iii. syr. corall. unc. frag. papav. errat. an. unc. i. s. succ. cit. acid. unc. ii. Vel ℥. Tinct. ros. cum s. q. sp. viriol. lib. ii. Vel Syr. pro tinct. ros. parat. unc. iii. aq. font. lib. ii. spriol. q. s. M.

Mixtura slegnotica Sylvi. ℥. Aq. plantag. unc. iii. cinam. dr. iii. acet. vin. dr. iii. corall. rub. præp. terr. sig. vel sing. drac. an. ser. i. laud. op. gr. iii. syr. myrt. dr. iii. M. Capiat cochleatim.

Alia. ℥. Aq. plantag. sol. querc. burf. pastor. centinod. an. unc. i. s. lapid. hæm. i. præp. corall. rub. præp. carneol. præp. an. ser. i. sperniol. Croll. ser. s. syr. corall. papav. errat. an. unc. s. M.

Emulsio adstringens, in Fluxibus sanguinis. ℥. Sem. papav. alb. dr. iii. 4. frig. m. excort. an. dr. i. amygd. d. unc. s. aq. plantag. portul. ros. an. unc. i. s. M. F. Emuls. a. d. pulv. slegnot. Guzman. ser. i. corall. rub. præp. ser. s. rotul. man. Christ. perl. dr. i. spirit. frag. gut. xi. M. S. Blutstillende Schlaff-Milch, vor den Schloffen geben zu nehmen.

Alia. ℥. Amygd. d. rec. unc. s. sem. melon. excort. dr. ii. papav. alb. dr. i. s. plantag. dr. s. aq. sol. querc. plantag. burf. past. an. unc. i. s. M. F. Emuls. add. lap. hæmat. præp. corall. rub. præp. an. ser. i. vel lap. chrysolit. sang. drac. nit. perl. an. ser. s. sacch. perlat. dr. ii. M.

Alia anti-Dysenterica. ℥. Amygd. d. non rancid. unc. i. s. aq. dysenter. Dornrell. unc. iii. ros. fol. querc. an. unc. ii. M. F. Emuls. cui add. C. C. ust. præp. dr. i. marg. præp. corall. rub. præp. an. ser. i. spirit. rub. id. rosar. an. ser. i. rotul. man. Christ. dr. ii. s. M. S. Stoll-Milch.

Alia. ℥. Amygd. d. excort. unc. i. s. aq. in quâ aur. ignit. ter extinet. vel decies chalybeat. lib. i. s. M. F. Emuls. add. man. Christ. perl. dr. vi. M. Vel ℥. Amygd. d. unc. i. sem. melon. dr. vi. papav. alb. dr. ii. C. C. ust. præp. ser. ii. aq. plantag. lib. i. M. F. Emuls. add. Jul. ros. unc. i. M.

Brodium anti Dysentericum. ℥. Pimpinell. sanguisorb. fol. cichor. millefol. plantag. an. mi. fl. ros. rub. p. i. cum frustò carnis f. Juscul. cui add. Rhab. tost. dr. s. vel ser. ii. M.

Electuarium in Hæmoptysi, longò usû probatum. ℥. Conserv. ros. vetustiss. unc. iii. s. pulv. rad. consolid. utriusque, sem. portulac. mastich. col. armen. tragac. an. ser. i. s. cum syr. de symph. F. Elect. molle.

Aliud. ℥. Conf. ros. rub. unc. iii. symphyt. unc. i. pulv. sem. hyosc. papav. alb. an. dr. i. spec. diarag. frig. dr. i. s. lap. hæmat. præp. carneol. præp. corall. rub. præp. croc. mart. adstrict. an. dr. s. vel bol. armen. terr. sig. sang. drac. &c. syr. papav. errat. q. s. M. F. Elect.

Electuar. adstringens in Diarrhoeâ. ℥. Conf. ros. rub. vet. unc. iii. diacydon. cum spec. unc. i. condit. cort. cit. unc. s. spec. arom. ros. dr. i. corall. rub. præp. ser. ii. lig. aloës ser. s. terr. sigill. ser. i. miv. cydon. q. s. M. f. Elect. possent etiam add. nux mosch. C. C. ust. pulv. rad. torment. rub. pannon. &c.

Electuarium pro sistendò Vomitu. ℥. Conf. ros. vet. unc. i. s. ment. unc. s. cort. cit. condit. unc. i. rad. acor. condit. unc. s. rob. rib. unc. i. diacydon. cum spec. dr. vi. corall. rub. præp. dr. ii. nuc. mosch. cinam. an. dr. s. ol. destill. caryoph. gut. ii. syr. acetos. cit. q. s. M.

Electuarium anti-Dysentericum. ℥. Conf. ros. vet. unc. ii. carn. cydon. condit. unc. s. condit. fl. cit. aurant. an. unc. s. Bol. armen. terr. sigill. an. dr. i. tragac. dr. s. corall. rub. præp. marg. præp. an. ser. i. smaragd. præp. ser. s. cum s. q. vin. granat. M. F. Elect. S. Stoll Latwergen.

Aliud comprobatissimum. ℥. Conf. ros. vet. unc. i. iberiac. vet. diascord. an. dr. i. terr. sig. corall. rub. præp. sem. plantag. an. ser. i. s. C. C. phil. præp. ser. i. lap. bez. oceid. gr. vi. laud. op. gr. iv. cum syr. de ros. sicc. s. q. M. f. Elect. S. Stoll-Latwergen, darvon jede 4. Stund einer Muscat-Nufs gross zu nehmen.

Electuarium adstringens in Gonorrhoeâ. ℥. Conf. ros. rub. vet. unc. iv. carn. cydon. condit. dr. vi. nuc. Ind. condit. unc. s. medull. nuc. Ind. condit. dr. ii. pulv. torment. balauft. an. ser. ii. terr. sig. corall. rub. præp. an. ser. i. C. C. ust. præp. ser. i. s. cum s. q. syr. gran. acid. M. F. Elect.

Aliud contra Abortum. ℥. Conf. ros. unc. ii. cort. cit. condit. dr. vi. pulp. daetyl. myrob. condit. an. unc. s. corall. rub. præp. marg. præp. rasur. ebor. an. dr. i. cum syr. cydon. s. q. M. F. Elect.

Electuarium in nimio Mensium fluxu. ℥. Conf. ros. sicc. unc. ii. troch. de terr. sig. dr. i. s. rad. torment. corall. rub.



rub. præp. an. scr. ii. lap. hemat. sang. drac. bol. arm. an. scr. i. cum s. q. syr. corall. M. F. Elect. de quò sumatur magnitudo nuc. mosch. majoris m. & v. superbibendo Coch. 3. vel 4. æq. burf. past. vel seq. Julipii. ℥. Aq. fol. querc. plantag. an. unc. iii. cinam. cydoniat. syr. de ros. sicc. an. unc. i. sp. viriol. q. s. ad gratiam aciditatem.

Aliud. ℥. Conf. ros. rub. vet. unc. iv. condit. cydon. unc. i. s. spec. aromat. ros. diarrhod. Abt. an. dr. i. croc. mart. adst. dr. iii. corall. rub. præp. scr. iv. marg. præp. smaragd. præp. an. scr. i. bol. armen. terr. sigill. an. scr. ii. syr. corall. q. s. M. F. Elect.

Tabulæ Corallinæ Timæi, in omnibus fluxibus sanguinis utiles. ℥. Corall. rub. præp. dr. ii. marg. præp. dr. i. extr. symph. scr. iv. torment. ros. an. scr. i. s. troch. de carrab. de terr. sigill. an. dr. i. Carneol. præp. scr. i. s. smaragd. præp. scr. i. carn. cydon. condit. unc. i. Conf. ros. rub. dr. vi. sacch. albiss. in succ. berber. & aq. hamopt. Dorncrell. sol. q. s. m. F. Morsuli.

Tabulæ contra Abortum. ℥. Sem. coriand. præp. dr. ii. rad. bistort. rasur. chor. corall. rub. an. dr. i. succin. crystall. præp. an. scr. i. coec. infect. scr. β. sacch. in aq. ros. sol. unc. iv. f. Tab. pond. dr. i. Capiatur una alternis diebus mane.

Pilulæ adstrictivæ, pro sistendâ Gonorrhœâ. ℥. Tereb. venet. aq. ros. lot. & coct. unc. i. Bals. peruv. dr. β. pulv. rad. consolid. maj. torment. an. dr. i. ocul. canc. præp. mercur. dulc. an. dr. s. M. F. mass. Pilul. dos. scr. s. m. & v. pro valetudine plenâ restituendâ, in fine gonorrhœæ.

Pulvis contra Abortum. ℥. Gr. Kerm. scr. i. sant. rub. dr. s. caryoph. nuc. mosch. an. scr. i. fol. aur. N. iii. M. F. Pulv.

Alius. ℥. Pulv. contra abort. August. dr. ij. mag. corall. chor. f. igne præp. mast. an. scr. ii. pellicul. ventric. Gallin. scr. i. M. F. Pulv. Vel ℥. Corall. rub. præp. scr. iv. Santal. omnium lig. aloë an. dr. i. spodi ex chore, magist. ungul. alc. an. scr. ii. C. C. ust. præp. dr. ij. magist. mat. perl. Succin. præp. an. dr. i. nuc. mosch. pulv. dr. i. s. lapid. 5. pretios. an. scr. i. spirit. sal. guttatim affus. scr. i. Sacch. ros. tabul. ad pondus omnium, fol. aur. N. viii. M. F. Pulv.

Pulvis specificus contra Fluorem album. ℥. Magist. ostecocil. dr. ii. carneol. præp. dr. i. s. corall. rub. præp. marg. præp. terr. sig. mastich. gum. Arak. torment. an. scr. i. taleol. porc. præp. dr. ii. M. F. Pulv. cujus dos. scr. ii. ex vinò rubrò.

Alius. ℥. Chalyb. cum acet. præp. dr. x. cass. lig. ver. dr. iii. sant. rub. spodi. ex chor. succin. alb. præp. an. dr. i. fœcul. tryon. scr. iv. croc. scr. s. camph. gr. iii. sacch. fin. unc. ii. cl. cinam. gut. iv. M. F. Pulv. cujus dos. scr. iv.

Pulvis contra Diarrhœam. ℥. Pulv. gr. æt. corall. rub. præp. terr. sigill. rub. C. C. ust. præp. an. scr. iv. M. F. Pulv. divid. in 4. p. æq. Vel ℥. Corall. rub. præp. dr. i. rad. torment. nuc. mosc. an. dr. ii. C. C. ust. præp. dr. i. s. M. dos. dr. i. vel scr. ii. bis in die, cum vinò rub. vel vin. cydon.

Pulvis anti-Dysentericus. ℥. Corall. rub. præp. gr. xxiv. C. C. ust. præp. gr. xviii. croc. mart. adstrict. dr. s. terr. sig. rad. bistort. gum. tragac. nuc. mosch. an. dr. s. M. F. Pulv. pro 3. dos. ex ovò sorbili sumendis. Vel ℥. Corall. rub. præp. dr. i. C. C. ust. præp. rad. torment. troch. de carab. sem. plantag. nuc. mosch. an. dr. s. terr. sig. croc. mart. adst. an. dr. i. M. F. Pulv. cujus dos. à dr. s. ad dr. i.

Pulvis specificus Americanus ad Dysenteriam. ℥. Ipecacanthæ pulv. à dr. s. ad dr. i. detur ad chart. sumatur ex unò vel alterò cochleari brodii, vel vin. lymph. jejunò stomachò, vel si necessitas exigat, 2. horis à pastu; detur per 3. dies continuos. Vires habet per superiora & inferiora purgandi & detergendi, ac simul roborandi & malignitati resistendi. Curare dicitur omnem diarrhœam & dysenteriam, nisi jam adsit gangræna, vel diarrhœa phthisica aut hydropica.

Pulvis Vomitus sistens. ℥. Sal. absinth. dr. i. vel scr. ii. detur cum cochl. i. succ. limon. Vel ℥. Xylol. dr. i. nuc. mosc. mast. an. scr. ii. magist. corall. scr. i. galang. scr. s. M. F. Pulv.

Pulvis flegnoticus, in nimio fluxu Mensium. ℥. Croc.

mart. adst. dr. s. bol. armen. lap. hemat. sang. drac. an. gr. xxx. mag. corall. scr. i. s. m. plantag. rad. torment. an. gr. xv. M. F. Pulv. subtiliss. Dos. dr. i. ex aq. squarri. ℥. Aq. torment. unc. ii. s. burf. pastor. plantag. an. unc. i. s. sp. viriol. gut. vi. M.

Alius ℥. Corall. rub. præp. scr. iv. lap. chrysol. præp. carneol. præp. marg. oriciu. præp. an. scr. ii. pulv. rad. torment. gr. Kerm. an. dr. s. M. F. Pulv. divid. in 6. p. æq.

Tragæa in Vomitu gravidarum. ℥. Spec. diarrhod. Abb. diatrion. sant. an. scr. ii. cinam. opt. dr. ii. nuc. mosch. dr. i. naac. caryoph. cubeb. cardam. an. scr. s. lig. alcës scr. i. corall. rub. præp. marg. præpar. an. scr. i. s. sacch. albiss. unc. iv. fol. aur. N. iii. M. F. Trag. cum pan. vinò madidò sumenda.

Unguentum in Diarrhœâ & Dysenteria. ℥. Ung. comitiss. unc. ii. ol. laur. unc. s. nuc. mosch. expr. dr. ii. cerat. santal. unc. s. ol. mastiq. f. M.

Unguentum contra Abortum. ℥. Ung. Comitiss. dr. vi. theriac. Androm. dr. i. vel iii. terr. sigill. dr. ii. ceræ parum. M. F. Emplast. umbilico applicandum. Vel ℥. Theriac. terr. sigill. an. unc. i. Mro Empl. ventri imponendo. Vel ℥. Empl. de crust. pan. unc. i. ung. Comitiss. dr. ii. ol. nuc. mosch. dr. iii. mastich. q. s. vel ℥. Empl. diaphan. calid. de crust. pan. an. dr. vi. max. cum ol. mastich.

Emplastrum præns in Vomitu. ℥. Pic. unc. ii. ol. cydon. unc. s. liquefit simul & f. Dropax.

Emplastrum contra Abortum. ℥. Rad. bistort. sem. coriand. an. dr. ii. m. cupress. sant. ul. rub. hypocist. an. dr. i. ladan. mastich. anunc. s. thur. bdell. an. dr. ii. corall. succin. an. dr. i. pulv. excip. ol. mast. & cum s. q. cer. & tereb. F. Empl. applicatum regioni lumborum.

Cataplasmata Abortum impediens. ℥. Thur. mascul. unc. ii. album ov. N. v. agitentur simul super prunas semper movendo, non crecant, addendo terebinth. excipiat stupp. & calissimè umbilico applicetur, bis in die, per triduum.

Aliud. ℥. Thur. gr. æt. unc. ii. cort. pan. nig. tost. lib. s. mast. thur. anunc. i. F. Pulv. in mortar. & cum vin. cydon. vel vinò rro F. Catapl. cujus pars dimidia inducatur linto, & appatur ventri inferiori.

Cataplasmata fluxu immodico Mensium. ℥. Pulv. bol. armen. vel sulcamin. q. pl. album. ov. & acct. acerrimi q. s. pro Catapl. lumbos & os sacrum applic.

Cataplasmata adstringens in Diarrhœâ & Dysenteria. ℥. Pan. sicca. unc. iii. cydoniat. unc. i. coq. in vin. rub. vel acet. ad dist. Catapl. add. pulv. torment. rad. consolid. m. an. dr. i. terr. sigill. unc. s. Nonnulli addunt mast. nuc. mosco. x. fl. ros. &c.

Aliud. ℥. Bol. arm. unc. i. alum. unc. s. farin. fab. unc. i. s. alb. ov. N. i. acet. vin. q. s. M. F. Catapl. ventri applicam.

Cataplasmata pro Vomitu sistendò. ℥. Ferment. acerr. unc. iii. mepulv. dr. ii. caryoph. mast. an. dr. i. M. pro Catapl.

Nasale Hæmorrhagiæ narium. ℥. Lacc. pictor. alum. an. p. æq. stercor. porc. dr. iii. pulv. ros. rub. dr. s. excip. cum an. ov. & cum gossyp. f. Turunda. Vel ℥. Thur. aloë. sangec. farin. vol. tel. aran. pil. lepor. minutim incis. an. dr. s. ℥. Lanug. cydon. tragac. mast. sang. drac. bol. arm. lap. cat. aloë. farin. vol. an. scr. i. M. F. Pulv. excip. cum m. ov. & gossyp.

Anacina seu Frontale in Hæmorrhagiæ narium. ℥. Aq. plant. sperm. ran. equiset. nymph. vel ros. an. unc. i. acet. fort. unc. iii. album. ov. conquss. N. ii. cret. Coloniens. vl. arm. unc. s. vel terr. sig. lap. hemat. an. dr. i. β. M. frontale frigide applic.

Aliud. ℥. Croc. mart. adstrict. bol. arm. sang. drac. terr. sig. dr. j. decoct. gallar. & cum m. i. millefol. ad unc. vii. aq. ros. plantag. an. unc. iii. acet. ros. unc. i. s. nit. prdr. s. M.

Sus in Diarrhœâ. ℥. Succin. thur. Mast. an. scr. iv. fl. laur. p. ii. ros. pi. tereb. coct. ad pondus omnium; confrudentur ad scat. pro Suffitu. Potest etiam addi lig. aloës ax. fl. verbasc. &c.



Enema adstringens & consolidans in Dysenteria. *℞. Rad. consolid. m. torment. an. unc. s. herb. polyg. plantag. sanic. an. m. i. fl. verbac. ros. balauft. an. p. i. sem. plant. dr. i. s. coq. ex lact. chalyb. f. q. in Col. unc. x. dissolv. sev. hirc. dr. vi. ol. ros. cydon. an. unc. s. bol. arm. terr. sig. an. dr. s. M. Posset etiam dissolvi theriac. Androm. ad dr. ii. vel Pilul. de cynogloss. scr. i. s. prius autem præmittantur Clyst. detergentes ex decoct. bord. cum mell. ros.*

## ARTICULUS II.

De Officiò Medici, in considerandis & præscribendis Remediis Hypnoticis & Anodynis.

### I.

**M**edicamenta Hypnotica sunt, quæ somnum conciliant; quod præstare videntur vel suaviter humectando, ac serum deficiens supplendo vel aquosa frigidaque humiditate suâ, aut crassitie spiritus gravando, vel fibrillosam cerebri compagem relaxato, vel sulphure vaporoso, blandô, ac resolubili cerebri replendo, vel spirituum vias ac nervorum initia non nil opplendo, vel vi peculiari ac volatili sulphureâ viscidite spiritus ungen-do, ad se invicem conglomerando, liqndo, ac quasi torpidos reddendo, quæ posteriora propè sunt & dicuntur *narcotica*, inter quæ principalissimum e Laudanum opiat. de quô superius peculiari paragrahò aundè dictum.

### II.

Medicamenta anodyna seu paregorica sunt, quæ dolorem mitigant. Cum autem dolor tribusmodis sedari soleat, & quidem vel causam dolorem efficientem auferendo, vel sensum stupefaciendo, per nartica, de quibus supra, vel causâ & morbo manentibus ex parte saltem eum liniendo, per ea, quæ vel vim suâ exserunt blandô & moderatô calore, quô pars affectiovetur, & ad quandam æqualitatem reducitur, cutis laxatur, fibræ plûs justô tensæ & contoriæ demulcen, vel quibus humores dolorifici discutuntur & resoluntur, vi digerendi, discutiendi & carminativâ prædi vel quæ repellunt & affluxum humorum prohibent atque ita sensum partis nonnihil obtundunt.

### Formulæ

Remediorum Hypnoticorum & Anodynorum.

Julepus Hypnoticus. *℥. Syr. de papav. unc. i. vel dr. vi. aq. nymph. unc. ii. hypnot. Lang. vii. M. F. Julep. S. Schlaff-Julep.*

Emulsio Hypnotica. *℥. Sem. papav. adr. iii. sem. melon. excort. unc. s. vel sem. 4. fr. m. an. d. aq. nymph. viol. solan. an. unc. i. s. M. F. Emuls. add. mlt. perl. scr. i. sp. ros. gut. vii. man. christ. perl. dr. i. M. S. Laff-Milch.*

Alia. *℞. Sem. melon. excort. unc. s. aq. g. nymph. rub. id. an. unc. i. M. F. Emuls. add. manrist. perl. dr. ij. sal. nit. perl. scr. s. C. C. phil. præp. scr. M.*

Alia. *℥. Amygd. d. excort. dr. iii. sem. 4. g. m. an. dr. ij. papav. alb. dr. i. s. aq. violar. unc. ij. bor. nymph. an. unc. i. s. M. F. Emuls. add. jul. ros. unc. sn. Christ. perl. dr. iij. M.*

Pediluvium Hypnoticum. *℥. Fol. lactuic. vit. malv. violar. fl. nymph. an. m. j. summit. anen. 8. capit. papav. alb. N. xvij. cort. rad. mandrag. d. coq. in s. q. aq. pro Pediluv.*

Aliud. *℥. Capit. papav. cum semin. contus. vij. fl. ros. rub. m. ij. chamom. m. i. herb. beton. sal. co an. m. i. s. M. incis. dentur ad chart. S. Stuck zum Fasser: Vel ℥. Capit. papav. alb. N. xx. sem. papav. alb. 2. fol. lactuc. m. iv. fl. nymph. m. vi. viol. m. i. s. bull. i. s. q.*

Unguentum somniferum. *℥. Ung. popul. unc. abast. ol. viol. papav. an. unc. s. op. theb. acet. fl. sambil. gr. xv. ol. nuc. mosch. expr. sc. i. croc. gr. viij. ceræ p. M. F. Linim. quo inung. tempora, nares & pulsus uum. Vel ℥. Ung. alabast. refrig. Gal. popul. an. unc. nucist. dr. j. nymph. papav. an. dr. ij. mandrag. dr. q.*

Oleum anodynum intus exhibendum. *℥. Oyg. d. rec. express. unc. i. s. spermat. cet. dr. s. vel sc. M. detur cum Brod. calid. vel cum vin. malvat. unc.*

Epithema cephalicum in dolore Capitis febrili. *℥. Nucl. persic. excessat. N. xi. sem. papav. alb. dr. ij. 4. frig. maj. an. dr. j. aq. fl. nymph. viol. an. unc. iij. fl. samb. unc. ij. acet. rutac. unc. j. M. F. Emuls. add. camph. scr. i. croc. orient. scr. ij. M.*

Aliud. *℥. Nucl. persic. unc. j. amygd. am. unc. s. sem. cannab. dr. iij. aq. verben. beton. ros. an. unc. iij. M. F. Emuls. add. acet. ros. fl. sambuc. an. unc. i. camph. croc. an. gr. v. M.*

Oxyrrhodinum. *℥. Album. ov. conquass. No. ij. aq. ros. lavend. an. unc. iij. acet. ros. vel fl. sambuc. dr. vi. ol. ros. vel nymph. unc. i. camph. scr. i. croc. gr. vi. M.*

Unguent. pro dolore Capitis. *℥. Ung. alabast. popul. an. dr. iij. op. gr. viij. croc. scr. j. ol. destill. aneth. gut. ij. M.*

Unguentum in dolore Dorsi & Renum. *℥. Ung. in-frig. Gal. rosat. Mes. anodyn. an. dr. vj. ol. scorp. succ. lim. an. unc. s. M.*

Liniment. in doloribus Suræ. *℥. Ol. hyosc. laur. de later. chamom. an. unc. s. M.*

Aliud in dolore ischiadicô. *℞. Ol. juniper. petrol. an. unc. i. succin. dr. ii. M.*

Unguentum in dolore Hæmorrhoidum. *℥. Ung. de linar. unc. i. de liq. unc. s. ol. ov. mast. an. dr. i. s. M.*

Aliud in eorum inflammatione. *℥. Mucilag. sem. psyl. cydon. aq. sperm. ran. extr. an. unc. i. sacch. sat. dr. i. camph. scr. s. M.*

Emplastrum in doloribus, ortis ex defluxione Catar-rhosâ. *℥. Gummi carann. p. i. tacamah. p. ii. cum paucâ creb. dissol. extend. super alut. Vel ℥. Oxyroc. Empl. diapalm. an. dr. vi. malax. cum ol. juniper. & f. Empl. applic. alii etiam addunt empl. diaph. Minsickt.*

Cataplasmata seu pulmentum in dolore Capitis. *℥. Fol. verben. rec. m. i. contund. in mortar. add. ferment. acerr. unc. ii. ol. ros. q. s. M. applicetur tepidè fronti.*

Aliud. *℥. Bacc. juniper. unc. i. nucl. persic. No. xx. sem. papav. alb. dr. ij. thur. scr. ij. 8. contund. cum aq. fl. sambuc. & verb. n. ac f. Pulment.*

Cataplasmata probatissimum, ad dolorem Hæmorrhoi-dalem. *℥. Porrorum cum tot. m. iv. v. mic. pan. lib. s. coq. in lact. capr. ad putrilag. contund. in mortar. addendo sub finem, croc. Austriac. dr. s. vel q. s. ad intensam flaved. Hoc, teste Sorbait, miraculi instar tollit dolores.*

Aliud expert. Grulingii. *℞. Fic. in mortar. ad pult. consist. contus. N. iv. vel v. mell. ros. unc. i. s. M. Illina-tur parvô linteo & applicetur.*

Cataplasmata anodynum generale, præsertim in Tumo-ribus & Abscessibus. *℞. Mic. pan. albiss. q. pl. coq. cum lact. s. q. ad consist. Catapl. add. ol. ros. vel simul etiam lil. alb. chamom. lumbric. & c. unc. i. vel i. s. croc. scr. s. vel scr. i. subinde & vitell. ov.*

Sacculus anodynus in Colicâ. *℥. Spec. decoct. emoll. carminat. an. m. iij. summit. orig. serpill. an. m. ii. fl. cha-mom. Rom. m. iii. sem. carv. unc. i. incis. grosdô modô & saccul. inclus. coq. in lact. & applic.*

Alius in Pleuritide. *℥. Violar. malv. fl. chamom. an. m. ii. fl. papav. errat. m. j. sem. lin. sænug. an. unc. i. fol. hyosc. m. 8. M. F. Sacculus.*

Alius in Nephritide. *℥. Herb. malv. alth. pariet. sa-xifrag. fl. cham. melil. aneth. an. m. iv. rad. alth. unc. iv. herb. arthemis. m. i. s. chærefol. m. s. sem. lin. sænug. an. unc. i. anis. dr. ii. f. ii. Saccul. in aq. decoq. & alternatim calidè applic.*

Clyster anodynus. *℞. Lact. vaccin. unc. x. sacch. rubr. unc. ii. ol. sem. l. n. unc. iv. sal. dr. s. M. Locô olei etiam sumi potest butyr. vel ung. de cynogloss.*

Enema oleosum, in Colicâ & Calculô egregium. *℥. Ol. lin. unc. iii. chamom. aneth. an. unc. ii. scorp. rutac. an. unc. i. ol. terebint. scr. i. M.*

## ARTICULUS III.

De Officiò Medici, in considerandis & præscribendis Remediis Vulnerariis, atque ad ea spectantibus.

### I.

**M**edicamenta traumatica seu vulneraria, sunt vel externa, vel interna. Interna sunt, quæ calorem innatum roborant, vi sua Balsamicâ, & sale suô volatili oleosô,

L



oleosô, quæ putredini resistunt, materiam probam pro generatione carnis suppeditant, sanguinis nimiam humiditatem absumunt, ejus tonum conservant, stagnationem, vappescientiam ac acescentiam, ferique ichorescentiam corrigunt & absorbent, affluxumque ad partem vulneratam, moderata adstrictione inhibent. Externa, vel sunt *suppurantia* seu *digestiva*, in vulneribus & ulceribus usualia, quæ sanguinem extravasatum, ac in poris hærentem in pus convertunt, vel *glutinantia*, quæ viscositate sua emplastica, vel adstrictoria, labiorum parietes firmant, & feri nativam coagulationem promovent; vel sunt *sarcotica*, seu carnem generantia, quæ moderatè exsiccando, ac superfluum humiditatem absumendo, sordes blandè & citrà acrimoniam detergunt, ac absorbent, leniterque adstringendo ac roborando, carnem firmant, sicque etiam partium calorem conservant; vel sunt *Epulotica*, quæ cicatricem inducunt, efficaciter desiccando, serum in superficie absumendo, & in pelliculam coagulando, cutemque contrahendo, densando & indurando; vel sunt *Porotica*, quæ callum generant, ac ossium alimentum vi siccandi & adstringendi, in callum & firmitudinem osseam convertunt. Huc quoque spectant remedia contra *ambusta*, quæ agunt extrahendo empyreuma, poros aperiendo, serosas & acres humiditates evocando, vel inflammationem sedando, vel calorem & ardorem leniendo ac demulcendo, vel exulceratas partes moderatè siccando & ad sanitatem perducendo.

## I I.

Huc brevitatis causâ etiam ea refero, quæ ad affectus externos in usum sunt, qualia sunt: 1. *Grumos resolutentia*, quæ sanguinem & serum in vasis suis, vel poris internis aut externis subsistentem, in motum cient, & coagulum ejus futurum impediunt, vel etiam factum disjiciunt, & resolvunt. 2. *Repellentia*, reprimentia, & reperiuntia, quæ extrinsecus applicata, materiam adhuc fluxilem, mobilem, volatilem, & ad partem fluentem, nondum tamen eidem impactam, vel extravasatam aliò repellunt, vel leviter saltem hærentem, in alveum suum redire faciunt. Horum alia sunt frigida terrea, ac adstringentia: alia actû & potentiâ frigida, aquea, mucilaginosâ, viscosa. 3. *Abstergentia*, quæ duris, asperis & acutis suis particulis, vel vi nitrosâ, falsâ, & saponariâ abradunt, & evertunt sordes, humoresque vitiosos in meatibus hærentes, uti etiam abscessuum raptorum, vel ulcerum fordidorum saniem, pus, aliaque excrementa abstergunt. 4. *Emollientia*, quæ emolliunt, tum humectando & laxando, fibras nerveas tensas & irritatas, tum poros adstrictos & angustatos, tum congelata & concreta resolutentia, fundendo ac per halitum digerendo. Talia sunt moderatè calida & humida. Humida, ut corrigatur siccitas, laxetur densum, & diluatur concretum. Calida, ut calor nativus roboretur, ac materia quasi coquatur. 5. *Discutientia* seu rarefacientia, quæ emollientibus calidiora, ac tenuioris substantiæ, unde facile penetrant, cutis poros dilatant, humores attenuant, & in vapores convertunt, ut per insensibilem transpirationem seu diaphoresin evacuentur. 6. Tandem *attrahentia*, quæ destinata sunt, vel ex altò evocandis humoribus, vel à parte affectâ avocandis & aliorum ducendis, vel advocandis utilibus.

## I I I.

In usum horum omnium, Not. 1. Vulneraria interna semper ea eligenda esse, quæ peculiarem cognationem habent cum parte affectâ. 2. Ea intrinsecus præcipuè convenire, cum vulnera vel ulcera ob vitiosam partis constitutionem non facile curam suscipiunt, synoviâque infestat. 3. Non usurpanda hæc in principiò, & ubi externa satisfaciunt, vel ubi adest febris, & inflammatio. 4. Respicendum simul esse ad ventriculum, ne exinde lædatur. 5. Suppurantia convenire præcipuè tumoribus sanguineis, quæ discutientibus & resolutentibus non cedunt. 6. In ulceribus, suppurantia non debere esse nimis humida, ne ulcera reddantur sordida. 7. Traumatica alcalinæ esse naturæ, & occultum alcali & quidem volatile in se continere, acidum vulnere vel ulcerum perimens. Item Emplastrum vulneraria ferè omnia in hoc convenire, quòd vulne-

ra ab aëre defendant, ac vi balsamicâ & modicè siccante, partem læsam demulceant. 8. In corporibus duris & siccis, & ubi caro durior generanda, convenire magis pulveres sarcoticos, uti etiam ubicunque ulcera superflua luxuriant humiditate. Item in vulneribus capitis: è contra in corporibus mollioribus formâ linimenti vel unguenti. 9. Epulotica usurpanda esse, ulcere carne non omnino repletò, ne cicatrix fiat eminentior. 10. In applicatione remedium ad ambusta, actû frigida esse cavenda, cum ob contrarietatem major oriatur ardor, fluxusque & dolor augeatur, hinc topica tepidè sunt applicanda. 11. Unguenta pro ambustis adhibenda, non debere esse dura, ne majorem dolorem exitent. 12. Interius quoque in ambustis ardorem refrigerandum, ut v. g. nitro, ac maxime partem affectam resiciendam.

## I V.

Præterea, 13. Notandum: Resolventia sipticis & traumaticis jungenda esse, eisque interius succenturiari universalialia, ut v. g. purgantia, diaphoretica: exterius emollientia & parotica. 14. Repellentia alia *propriè talia* esse, quæ ipsis artibus affectis applicantur: Alia *Interceptientia* dicta *u defensiva*, quæ viis, per quas humor defluit, applata, facultate frigidâ, siccâ, terrea, adstringente, humribus aditum intercludunt. 15. Repellentia non comtere in omnibus fluxionibus; non enim adhibenda: nec partibus nobilibus; nec quando fluxio parti principi vicinè est; nec partibus nimis profundò locò sitis; nec si meria maligna & venenata; nec ubi animalis venenati id vel morsu vulnus inflictum; nec si natura rectè agens criticè materiam in partem aliquam propellat; nec si humor sit multus, & corpus adhuc plenum; nec si humor jam parti impactus, & dolor adfit vehementis. 16. Ne tempus adhibendi repellentia, esse principium fluxionis: eodem versùs augmentum tendente, digerentia adhibenda, hinc sola resolutentia usurpanda. 17. Repellentia frigida & humida convenire, cum humor tenuis & paucus, aut superficiem corporis occupat, aut cum fluxionescidunt, ob nimium partis calorem aut dolorem: frigiderò sicca & adstringentia, cum dolor non ita urget, & fluxiones fiunt ob partium debilitatem. 18. In Erysipelate sub hoc climate, unctuosa, oleosa, immò omnia huda vitanda esse, cum tutiora sint in formâ siccâ applica. 19. Interceptientibus fortioribus utendum in habitu corporis duriore, ubi vasa ampliora, & influentis humoris fortior portio. 20. Repellentia apprimè convenire in casu, non omissis universalibus.

## V.

Hoc amps Not. 21. impropriè ad repellentia pertinere, quæ os obstruunt, & fluentem materiam vitiosam cum suis malsâ reduniunt, & sic retrocedere faciunt, ut v. g. Mercurialia in scabie. 22. Repellentia subinde semper dolorificum obtundere, ac convenire etiam dorpplicata, in sudoribus colliquativis. 23. Inter emollientia primis conducere Cataplasmata & Emplastrum, illa is ad suppurationem, hæc ad discussionem inserviuntque meliora, cum Cataplasmata facile frigeant, hinc materiam repellant. 24. Emollientia non conveniuntumoribus atrabiliariis, v. g. cancris & scirrhis malignis: acrimonia gaudent salina, instar Mercurii sublimatagis enim per emollientia dilatantur pori, ut & affluxum humorum procuretur, & acrimonia corrosiva, in eo detenta & coercita, latius expandatur.

## Formulæ

*Remedium Vulnerariorum, atque ad ea spectantium.*

Decem ad Casum. ℞. Rad. symph. maj. unc. s. plantag. alpinell. an. dr. iii. herb. veron. sanic. cheresol. prunell. arbor. bellid. cum tot. an. m. s. rad. liquirit. dr. iii. No. vii. coq. ex aq. & vin. rub. an. lib. i. s. Colat. clarif. syr. de symphit. de alib. an. unc. ii. oxymell. f. unc. ii.

Dum vulnerarium. ℞. Rad. symph. unc. i. rub. tint. ol. rot. an. unc. s. herb. millefol. veron. pyrol. sanicupimill. agrimon. an. m. s. fl. bellid. min. summit. virgin. p. ii. ocul. can. unc. s. nuc. mosch. dr. ii. coq. in. s.



q. aq. font. in Col. lib. iij. dissolv. syr. de symph. Fernel. unc. iij. M. Dos. unc. iv. S. Heilender Wund-Tranck 2. mahl den Tag 3. Stund vor dem Essen zu nehmen.

Aliud. ℞. Scob. lign. sassafr. rad. chin. symph. mai. an. unc. s. herb. veron. agrim pilosell. consolid. saracen. sanic. alchimill. an. m. s. cinam. liq. an. dr. ii. sic. N. v. passul. min. unc. ii. sem. anis. fœnic. an. unc. s. M. incis. coq. cum aq. font. lib. vi. & vin. alb. odorif. lib. ii. ad 3. de quô m. & v. bibantur unc. v.

Species pro decoctô Traumaticô. ℞. C. C. ust. unc. s. bord. integ. unc. i. s. kerb. agrim. veron. alchimill. sanic. an. p. i. rad. consolid. mai. liq. an. unc. s. spec. pro decoct. pectoral. unc. i. s. anis. fœnic. an. scr. i. M. incis. dentur ad chart. S. Species zum Wund Tranck mit 2. Mafs Wasser, oder anderthalb Mafs Wasser und 1. halbe Mafs Wein zu sieden.

Decoctum ad Herniam. ℞. Herb. sanic. salv. herniar. epat. nob. polyg. plantag. an. m. s. pyrol. p. iii. rad. symph. m. unc. s. bardan. dr. vi. torment. pentaph. an. dr. ii. sem. perfoliat. dr. iii. coriand. præp. dr. i. coq. in s. q. vin. & aq. chalyb. ad lib. ii. colat. dulcoretur sacch. albiss. ad gratiam.

Pulvis ad casum. ℞. Pulv. contra casum August. dr. i. detur ex aq. chærefol. Vel ℞. Ocul. canc. præp. rhab. sperm. cet. anim. diaph. sang. hirc. præp. an. dr. s. mum. scr. i. M. F. Pulv. cujus dol. dr. i.

Pulvis ad Erysipelas Mins. R. Farin. vol. unc. vi. plum. ust. bol. rub. an. unc. ii. Mastich. olib. ceruss. an. unc. i. M. F. Pulv. subtiliss. qui chartæ ceruleæ inspersus, parti affectæ applicetur. Vel ℞. Bol. arm. unc. ii. camph. unc. s. M. ad idem valet. farin. bord. cum bol. pulv. glyc. camph. &c.

Fomentum in Ulceribus contumacibus usuale, aqua Catapultorum vulgò dicta. R. Rad. aristol. rot. gent raph. zedoar. an. unc. i. coq. in vin. alb. lib. iii. ad mediet. dissolv. sacch. alb. unc. iv. foveatur hoc ulcus, & imponatur sol. Brassicæ rub. hœc madefactum.

Fomentum polychrestum ad Erysipelata, Inflammationes, exulcerationes humidas, metum Gangrenæ &c. R. Lytharg. lib. s. fl. ros. rub. m. ii. olib. myrrh. mast. an. unc. s. decoct. seu aq. calc. viv. rec. lib. iv. acet. lib. i. coq. simul, usque dum lytharg. solut. add. in fine camph. unc. s. Col. S. Umschlag, wvarn mit Pakschen oder zusammen gelegten Tüchern 2. 3. mahl oder öftters den Tag aufzulegen.

Aliud contra Gangrænam & Sphacelum, Aqua fusca dictum. ℞. Herb. rut. absinth. salv. sabin. fol. q. ierc. an. m. s. rad. aristol. rotund. dr. iii. enul. dr. ii. vitriol. Rom. unc. i. sal. armon. dr. i. s. gallar. unc. s. bacc. laur. unc. i. olib. mast. an. dr. ii. ceruss. lytharg. alum. crud. an. unc. iii. Bol. armen. unc. s. cort. virid. nuc. jugl. dr. vi. camph. dr. s. M. de his speciebus cochl. i. cum vin. alb. lib. ii. coq. & cum intinctis splenis vel linteis triplicatis, vel quadruplicatis calidè applicetur.

Fomentum pro Membrô fractô, luxatô vel distortô, ante vel post repositionem. ℞. Herb. beton. chamom. rorism. an. m. i. summit. hyper. cum fl. m. i. s. rad. aristol. rot. dr. vi. symph. mai. dr. s. sem. q. calid. m. an. dr. i. s. coq. in aq. s. q. Colat. lib. i. s. add. vin. infus. fl. hyper. lib. s. S. Glieder-Bähung.

Fomentum pro membris à Gelû sideratis. ℞. Spirit. vin. opt. rectif. lib. i. pulv. sal. armon. unc. i. camph. scr. i. M. ad viir. S. Überschlag zum Füssen.

Aliud pro rubedine, tumore & dolore Pedum. ℞. Bol. arm. alb. dr. iii. lytharg. unc. i. mast. myrrh. an. unc. s. olib. dr. vi. aq. planag. sperm. ran. fl. sambuc. an. unc. viii. coq. & Col. servetur ad usum.

Fomentum in tumore Pedum œdematosô. ℞. Spiritus vin. opt. rectif. mensur. i. sal. armon. unc. iii. M. inting. linteæ, ac sub horam decubitus in lectô, pedibus tepidè circumvolvuntur. Optima etiam est aq. calc. viv. sic paranda: ℞. Frustul. calc. viv. ad magnitud. nuc. jugland. immittatur in aq. ferventem donec dissolv. hinc calx cum aq. agitur, & postea residere sinitur. Deinde clarior aqua per inclinationem in aliud vas transfunditur, applic. cum intinctis linteis vel spongia novâ.

Aliud. ℞. Herb. absinth. salv. rut. hyper. orig. rorism.

lavend. major. an. m. i. rad. ebul. irid. cort. med. sambuc. an. dr. ii. fl. cham. samb. spic. stæch. ros. melil. an. m. s. bacc. laur. juniper. an. unc. s. M. concis. coq. cum aq. font. s. q. pro Fomentô pedum bis in die usurpandô.

Aliud in Tumore Manuum & Pedum. ℞. Lytharg. unc. vi. bol. arm. unc. i. sulph. viv. unc. i. s. alum. crud. dr. ii. gallar. unc. i. myrrh. el. unc. i. s. M. F. Pulv. de quo 2. vel 3. cochl. cum vin. alb. unc. xx. acet. vin. acerrimi unc. x. coq. ac cum intinctis linteis duplicat. vel triplicat. sæpius calidè applicentur.

Unguentum digestivum Chirurgorum. ℞. Tereb. cum vin. vel aq. ros. ad albed. lot. unc. i. serv. ccrv. unc. s. ol. ros. dr. ii. cer. alb. olib. mast. an. scr. ii. camph. scr. s. M. Vel R. Tereb. unc. ii. vitell. ov. N. i. myrrh. aloës an. dr. s. ol. cer. gut. x. M. in partibus nerveis additur etiam Bals. peruv. Vel ℞. Tereb. unc. i. vitell. ov. N. i. mell. ros. unc. s. ol. hyper. dr. i.

Linimentum ad Ambusta. ℞. Ol. oliv. vel lin. part. i. album. ov. conquass. part. ii. M. Illin. cum pluma Gallin. Vel ℞. Butyr. rec. 9. liquefact. & lot. in aq. sperm. ran. unc. vi. ol. de vitell. ov. unc. ii. M.

Unguent. ad Ambusta Fabricii. ℞. Butyr. rec. sine sale aq. ros. lot. unc. iii. ol. viol. de vitell. ov. amygd. d. an. unc. i. croc. scr. i. mncilag. sem. cydon. unc. i. cer. q. s. M.

Unguentum ad Scabiem expertissimum. R. Pingued. suill. antiq. unc. vi. liquefiant ad ignem. Coll. add. sulph. viv. subtiliss. pulv. bacc. laur. eodem modô pulv. an. dr. ii. s. caryoph. arom. dr. i. pulv. lapat. acut. dr. s. M.

Aliud certissimum & infallibile, in Scabie humidâ. ℞. Pulv. cort. laur. sulph. cit. an. unc. iv. enul. unc. ii. vitriol. alb. unc. i. s. styrac. liquid. q. s. M. F. Ung.

Aliud in Scabie siccâ & pruriginosâ. ℞. Succ. lapath. acut. plantag. an. unc. ii. solan. unc. i. s. citri unc. i. ceruss. unc. ii. lytharg. unc. s. fl. sulph. dr. i. s. ol. ros. viol. an. unc. ii. s. butyr. salit. unc. i. s. tereb. ccr. an. dr. vi. M. F. Ung. add. ol. dest. lig. Rhod. gut. xxv. alipt. mosch. scr. ii. M.

Aliud in Scabie vulgatissimum. ℞. Tereb. vulg. vitell. ov. dissol. unc. i. fl. sulph. dr. vi. butyr. rec. unc. iv. M.

Emplastrum infallibile in Clavis pedum. ℞. Galban. gum. ammon. acet. solut. an. unc. s. sal. armon. scr. i. Empl. diachyl. magn. unc. i. s. M. Vel ℞. Pic. naval. unc. i. galb. in acet. dissol. unc. s. sal. armon. scr. i. Empl. diachyl. magn. dr. s. M. cum panno super clavos ponatur, ac tertio vel quarto die mutetur.

Emplast. pro tumore Pedum. ℞. Empl. diaph. Minf. unc. i. s. oxycroc. unc. s. malax. cum ol. chamom.

Emplastrum diasulphuris Ruland. ℞. Bals. sulph. unc. iii. cer. unc. s. coloph. dr. iii. liquat. add. myrrh. opt. pulv. unc. iii. s. coq. s. a.

Emplastrum Mammillare, in omibus Mammarum tumoribus utilissimum. ℞. Sperm. cet. unc. i. cer. alb. unc. ii. galban. acet. sol. unc. s. ol. sambuc. q. s.

Balsamus sulph. Ruland. ℞. Fl. sulph. unc. i. ol. nuc. vel rap. unc. vi. vin. generos. unc. ii. maccrentur per dies 8. aliquoties agitando coq. leniter ad vini consumpt.

Balsamus sclopetarius. ℞. Ol. lin. tereb. an. lib. i. ærug. ær. unc. s. coq. parum s. a.

Cataplasma suppurativum. ℞. Rad. alib. lil. alb. an. unc. ii. herb. malv. alib. pariet. an. m. s. sem. lin. fœnug. an. unc. s. coq. in s. q. aq. ad mollit. per cribrum traject. add. farin. sem. lin. fabar. an. dr. vi. ol. viol. axung. porc. an. dr. v. M. F. Catapl. S. Maturier Pflaster auf ein Tuch zu streichen und warm überzulegen.

Aliud. ℞. Herb. malv. cum tot. mic. pan. alb. an. p. aq. coq. in lact. caprin. s. q. ad consist. Catapl. add. vitell. ov. croc. & ol. ros. vel etiam ol. lil. alb. chamom. amygd.

Insectio in Ulcera cava, mundificans, siccans, adstringens, putredinem arcens & consolidans. R. Herb. cent. min. scord. ros. rub. an. m. s. fl. balauft. dr. ii. pulv. mastich. myrob. olib. aloës an. dr. s. rad. Ir. flor. aristol. rot. torment. an. dr. s. Concis. coq. cum unc. xx. aq. font. & x. vin. rub. in ollâ bene tectâ, in Col. dissolv. mell. ros. col. unc. i. addi etiam potest Bals. peruv.

Plura non addo, cum hæc magis spectent ad Chirurgiam.





## CAPUT XI.

De Officiô Medici, in præscribendâ debitâ Diætâ.

## ARTICULUS I.

De Officiô Medici, in considerandâ Diætâ in genere.

## I.

**P**er Diætâ hîc aliud non intelligitur, quàm debita Victûs ratio, vel potius methodicus usus sex rerum non naturalium. Hæc non minimum est fundamentum sanitatis, tum conservandæ, tum restituendæ. Si enim utilitatem ejus brevibus descriptam verbis delideres, hæc illa est, quæ morbus pellit, corpus agile, sanum, parum à scelerore, ac sceditate alienum præstat, longævitatē inducit, somnos jucundos & placidos conciliat, epulas communes suaves & gratas efficit, sensibus incolumitatem, memoriæ vigorem, ingenio perspicaciam & claritatem confert, passionēs sedat, iracundiam & mærorem pellit, libidinis impetum frangit, denique corpus & animam maximis bonis replet, ut meritò mater trium S. sanitatis nempe, sapientiæ, & senectutis dici possit.

## II.

Diætâ alia spectat ad sanos: alia ad ægrotos. Illa in his præcipuè consistit Regulis. 1. Ut videntur, quantum fieri potest, aëris in qualitatibus vehementiores excessus & anomalix. 2. Ut in quanto non excedatur, quod cognoscēs, si ad satietatem non comedas, si post cibum nullum sentias torporem, gravitatem & lassitudinem corporis, cum antea cisses multò agilior, si post cibum etiam aptus sis actionibus mentis, si nulla appareant signa repletionis, qualia sunt v. g. capitis dolor & gravitas, somni longiores vel perturbati, insomnia turbulenta, somnus diurnus, segnities totius corporis, appetitus dejectio, cruditates, ructus, alvi stipticitas vel profluvium, copia flatuum, destillationes frequentes, multa narium emunctio & exspitio matutina &c. 3. Ut vitetur varietas ciborum, præsertim inter se valdè contrariorum in unò pastu, quæ est fons morborum uberrimus. 4. Ut cœna prandiò sit parcior. 5. Ut casu aliquo extraordinariò, v. g. in conviviò lautiori excessum faciens, sequentem patium præscindas, aut unicò haustu vini diluti vel tantillò cibò absolvas. 6. Ut vinum diluatur, præsertim meracum. Ut debita fiat corporis exercitatio, & motus moderatus, qui ad sanitatis conservationem, exceptâ sobrietate, maximè principalis est: immò etiam à Galeno ciborum parsimoniæ anteponi ut. 8. Ut graviora vitentur animi Pathemata. 9. Ut somnus sit moderatus, ac alvus debitè respondeat.

## III.

Diætâ ægrorum, de qua potissimùm hîc sermo, varia est, ejusque diversitas desumitur, à victûs formâ, quantitate, qualitate, utendi occasione seu opportunitate, & exhibendi modò. Formam victûs quod attinet, ea desumitur à modò substantiæ, estque pro variâ virium conservatione triplex apud Medicos. Crassa nimirum, valens seu firma, quæ concedit alimenta firma, solida, ac multum nutrientia, & proinde vires auget. Tenuis, quæ alimenta habet infirma, parum nutrientia, ac proinde vires nonnihil diminutas conservat. Mediocris, quæ inter victum crassum & tenuem media est, ideòque vires conservat. Victus crassus convenit corporibus sanis, robustis, ac benè se exercentibus; victus tenuis, morbis acutis; mediocris, morbis diuturnis & chronicis. Pro Victû tenui, modernò tempore conceduntur Brodia carnis gallin. vel sola, vel cum ovi luteò permixta, eaque ut plurimum tertiâ vel ad summum quartâ horâ, alterata etiam vel succ. cit. arant. gran. acid. vel herb. endiv. acetos. portul. lactuc. &c. Additur subinde paucum consummat. item crem. hord. & si morbus minùs acutus, panatell. vel pulment. cum ov. vitell. vel carne gallin. parat. Ein Dotter oder hennenbratmüßl. bis aut ter in

die, ov. forbile, contusum ex cane. vel carnibus volatiliū. In morbis longioribus Victus nonnihil plenior convenit, ex carnibus pullorum gallin. vitul. aliisque cibis exinde paratis. In morbis longis & periculosis, gravius est peccare in victû nimis tenui, quàm nimis crasso: è contra in morbis acutis gravius est peccare in nimis crasso, quàm nimis tenui.

## IV.

Quoad cibi quantitatem in morbis, plenius æger cibari potest in morbi principiò, dum utcumque melius se habet; propè statum verò, vel in ipsò statu valdè tenuiter, quò enim natura magis in morbo expugnandò occupata est, eò tenuior diætâ in peranda, & quò minùs, eò plenior; hinc etiam in quolibet victû triplex observatur dos, summa nimirum, media & infima. Prima convenit in morbi principiò, media in augmen. & ac ultima in statu. Interim hoc non perpetuò in omni morbo observandum, quia in initiis inflammationum, præsertim partium nobiliorum, durante adhuc sanguinis ad partem affectam affluxu, utile est, tunc minùs cibare, ne augeatur fluxio: immò etiam in aliis morbis, si cruditas aliqua in ventriculò vel intestinis lateat, quod rarissimè non accidit, præstat tum parum cibi assumere, eamque victûs parsimoniâ absumere. Man muß die Kranckheit aushungern, quod Italix inprimis frequens, qui morbi curationem ut plurimum ab inediâ incipiunt. Interim gravius delinqueret, qui morbi initiò nimis parum, quàm nimis multum ederet, quod tamen contrarium est in statu morbi.

## V.

Qualitatem Victûs quod attinet, præscribitur illa ab effectu, consuetudine & temperamento. Intelligitur autem hîc per qualitatem victûs non illa qualitas, quæ victui inest, ut alimentò, seu merè cibò, ut esse digestionis facilis vel difficilis, succi boni vel mali, crassi vel tenuis &c. Sed quæ inest ipsi, quatenus simul est medicamentoſus, calidus nempe, frigidus, humidus, siccus, laxans, adstringens, incidens, attenuans &c. Prout igitur est affectus, ita victum postulat contrarium, ut affectus calidus & siccus, victum frigidum & humidum &c. Ita tamen, ut consuetudinis & temperamenti simul habeatur ratio.

## VI.

Occasio seu opportunitas in Victûs ratione, desumitur ex ægri consuetudine, tempore sanitatis, ac virium tolerantia. Illo enim tempore debet æger cibari, quò minùs à morbo patitur, eaque potissimum horâ, quâ ante morbum cibari consuevit, nisi morbi vehementia in illâ hoc prohibeat, unde à solâ consuetudine sumitur idoneum tempus in morbis, qui continentur seu sine typis affligunt. In morbis verò, qui accessiones, paroxysmos, vel exacerbationes habent, nunquam cibus exhibendus, cum accessiones adsunt, vel proximè futuræ sunt, sed cum cessant, vel quieverunt, ne natura à pugnâ, pepasit & excretionē materiæ avocetur, nisi adsit magna virium jactura, vel accessio longior, vel corpus ægrotantis valdè calidum & siccum, picrocholum, gracile, ac raræ texturæ, vel humor acris ventriculū occupet, animi deliquium circa iniria paroxysmorum efficiens, in quibus casibus in Paroxysmi initiò, vel parum ante illum, aliquid cibi offerri potest. In intermittentibus subintrantibus, vel ubi saltem duæ vel tres horæ inter finem unius & principium alterius Paroxysmi intercedunt, æger cibandus in fine statûs primi Paroxysmi.

## VII.

Quod ad modum cibos exhibendi, hoc est, an paulatim, an repetitis vicibus? id deducitur ex viribus & morbo. Vires vel sunt debiles, vel mediocres, vel validæ. Debiles paucum, mediocres mediocrem, validæ copiosum postulant cibum. Morbus adjunctos habet humores multos, vel paucos, vel corruptos. Pauci cibum copiosum, multi paucum, corrupti pro eorum correctione copiosum exigunt cibum; hinc ubi in morbis vires validæ, & cum humorum copiâ conjunctæ, raro & parum alendum. Ubi vires validæ, cum humorum paucitate, ibi sæpius & multum cibandum, nisi obſtente morbi



morbi tempora aut Paroxyfmi. Ubi vires sunt debiles, cum humorum abundantia aut mediocritate, ibi raro & parum alendum; denique ubi vires sunt debiles, cum humorum paucitate aut corruptela, ibi parum ac sæpè cibandum. Interim juxta monitum Hippoc. 1. aph. 16. aliquid dandum consuetudini, tempori, regioni & aetati.

## ARTICULUS II.

*De Officiò Medici, in consideranda & præscribenda Diætâ Refrigerante.*

**M**orbi calidi, ut v. g. Febres cujuscunque generis, inflammationes, aliique ex materia calida & biliosa oriundi, Diætâ exigunt refrigerantem. Aër igitur sit naturâ frigidus, vel arte talis pareatur, per aquarum transvasationem, pavimenti cubiculi conspersionem cum aquâ & acetô, vel herbis refrigerantibus. Sicuti autem convenit aër frigidus inspiratione attractus, corporis æstum mitigans, ita nocet corpore denudatô exceptus, cùm diaphoresin maximè necessariam impediât, & fuligines ac sudores intrò repellat. Panis sit probè coctus & fermentatus. Ex carnibus conceduntur carnes Gallinæ, capon. pull. gallinac. columb. hædin. vitul. &c. magis tam eneliæ. Item carnes avium montan. & sylvest. condiri possunt acet. vel succ. cit. arant. granat. A Piscibus abstinendum, nisi agris gratificando, saxatiles quosdam excipias, ut fundulos, truttas, thymalos &c. Inter fructus concedi possunt fraga, poma acida, pyra cocta, mala citria, punica, cerasa acida, exsiccata & cocta, pruna cocta &c. Ex oleis, lactuca, endivia, cichorium, spinachium, acetosa &c. Legumina omnino vitentur, nisi juscula pisorum, uti & lacticia omnia. Prodest maxime Crem. hordei, qui sequenti modò optime paratur: R. Hord. mund. q. pl. coque in aq. commun. lentò igne, ita ut fervescentia abjiciatur, novaque reafundatur per horas 6. vel 7. donec in pulmentum abeat, postmodum in mortariò lapideò feratur, ac cremor per pannum coletur, & exprimatur, hinc in Jusculo Gallinæ dissolvitur, ac iterum coquitur, ad consistentiâ mediocrem instar tenuis contusi, aromatizatur subinde paucò macer. vel croc. Interdum etiam aliquid sacch. additur præferim candi, in affectibus pectoris. Hujus Cremoris summa est utilitas, in febribus ac affectibus pectoris, catarrhosis & hæcicis. Potus sit vinum oligophorum, nisi febris & alia obstant contraindicantia, aut alius refrigerans. uti in formulis annexis patet. Vitanda exercitia & affectus animi. Somnus sit consuetò longior, ac alvus quotidie laxa.

### Formulae

*Potuum ordinariorum Refrigerantium.*

Julepus. ℞. Aq. font. lib. iii. syr. herb. unc. i. rub. id. unc. ij. acetos. cit. unc. i. spirit. vitriol. q. s. M.

Alius. R. Decoct. C. C. vel aq. font. lib. ii. syr. de rub. id. unc. iii. spirit. sulph. per campan. q. s. vel nit. antimoniât. dr. i. M.

Alius. R. Rad. scorz. rec. unc. i. coq. in s. q. aq. s. in Col. lib. ij. s. dissolv. syr. de rub. id. viol. ceras. acid. an. unc. i. spirit. vitriol. q. s.

Tinctura rosarum. ℞. Tinct. ros. cum s. q. spirit. vitriol. acificat. lib. iii. vel ℞. Syr. pro tinct. ros. parat. unc. iii. aq. font. lib. ii. sp. vitriol. q. s.

Julepus Alexandrinus dictus. ℞. Aq. font. lib. i. aq. ros. succ. lim. sacch. alb. an. unc. iv. coque lentò igne, dum despumaverint.

Alius. ℞. Aq. font. lib. iv. sacch. alb. unc. iii. santal. cit. cinam. an. dr. i. coq. lentò igne, despum. & Col.

Julapium siccum. ℞. Succ. cit. berber. an. unc. ii. s. sacch. albiss. lib. i. ponderis civilis. M. super marmore per agnationem, donec induat formam Julapii sicci. De hoc 3. vel 4. Coch. in mensura aq. font. solvantur, pro compescenda siti.

Limonada. ℞. Aq. font. vel decoct. C. C. lib. iv. succ. lim. unc. iii. sacch. albiss. q. s. M. possent etiam addi nit. perlat. dr. ii.

Alia. R. Decoct. C. C. vel aq. font. mens. i. s. in hanc injiciantur 2. Poma citria in taleolas tenues secta, & cum sacch. fin. s. q. dulcorata, subinde dissolvi possunt seq. Syrupi. ℞. Syr. acet. cit. è succ. viol. an. unc. ii. spirit. vitriol. q. s. Vel ℞. Julep. ros. syr. acetos. cit. an. unc. ii. sp. vitriol. gut. vi. aq. cinam. dr. iii. M.

Decoctum Cornu Cervi, vix non omnibus morbis competens. ℞. Limat. C. C. unc. s. vel dr. vi. coq. in aq. font. mens. ii. tam diu, quamdiu ova duriora coqui solent. Post refriger. Col. interdum cort. cit. adduntur, & sacch. sub finem coct. interdum syrupi dissolvuntur.

Decoctum Hordei usuale in Febribus, affectibus Pectoris, & Renum calidis. ℞. Hord. crud. m. ii. rad. liq. dr. vi. aq. font. lib. vi. coq. ad consumpt. lib. ii. addendo in fine sem. fœnic. parùm contus. dr. ii. post refriger. Col. pro potu.

Aliud. ℞. Hord. integ. m. i. s. passul. min. unc. s. sem. anis. fœnic. an. dr. ii. fl. cord. an. p. i. aq. font. pur. lib. iv. coq. ad hordei crepat. addendo in fine sacch. cand. unc. i. Col. & cum album. ov. clarif.

Aliud. ℞. Hord. integ. m. ii. coq. in aq. font. mens. ii. ad dimid. adde sacch. alb. unc. i. s. crem. tart. dr. i. s. succ. lim. & sp. vitriol. q. s. ad gratum acorem; vel adde nit. præp. dr. i. s. sacch. alb. unc. i. s. cinam. in pet. lig. dr. i. s.

Decoctum Hordei, in Pleuritide. R. Rad. liq. dr. iii. sem. fœnic. dr. s. cinam. acut. scr. ii. sacch. cand. unc. ii. aq. hord. lib. vi. coq. ad 3. in Col. dissolv. Julep. viol. unc. ii. s. spirit. sulph. gut. xv. M.

Aliud. R. Rad. liq. dr. ii. passul. min. hord. mund. spec. decoct. pector. an. m. i. dentur incisa ad Chart. S. Stuck zum Trinck Wasser auf 2. Maß; bis eine halbe eingesotten.

Aliud pro anginâ. R. Hord. mund. & excort. coch. 2. passul. min. sacch. an. coch. i. Coq. in mens. i. s. aq. ad remanent. mensurâ.

Decoct. Hordei compositum, in Febribus ardentibus. R. Rad. acetos. scorz. an. unc. s. hord. mund. m. i. C. C. rasp. unc. i. pom. cit. N. i. ceras. acid. m. s. cinam. dr. i. s. coq. in s. q. aq. font. ad lib. ii. in Col. dissolv. si placet, syr. rib. berb. an. unc. i. s. sp. vitriol. q. s. pro gratâ aciditate.

Aliud. ℞. C. C. rasp. vel ust. unc. i. hord. integ. unc. i. s. anis. fœnic. an. dr. s. M. incis. & contus. dentur ad Chart. S. Species zum ordinari Tranck, mit 2. Maß Wasser abzusetzen.

Decoct. Tartari crud. R. Tart. alb. unc. i. vel i. s. coq. in aq. font. mens. i. vel i. s. remotâ subsidentia sit Potus limpidissimus.

Potus in Variolis. R. Limat. C. C. vel ust. præp. dr. vi. lent. excort. dr. iii. sem. fœnic. coriand. passul. min. an. dr. ii. rad. acetos. unc. s. coq. in aq. font. lib. iii. vel iv. ad consumptionem dimidiæ.

Potus refrigerans & præcipitans in Febribus. ℞. Sal. nit. præp. C. C. phil. præp. an. unc. s. sacch. albiss. unc. i. M. F. Pulv. cujus unc. 3. misceatur cum mensur. i. aq. font.

Alius. R. Decoct. hord. & liq. lib. ii. spirit. sulph. q. s. ad gratam aciditatem, C. C. ad albed. calcin. unc. s. vel dr. vi. M. utatur pro potu ordinariò, vas usûs tempore agitando.

Alius in Febre ardente, cum metu Prunellæ. R. Sal. nit. præp. unc. i. crem. tart. dr. ii. sulph. alum. crud. an. dr. s. sacch. opt. unc. ii. M. F. Pulv. de quò coch. parvum cum aq. font. mens. i. misceatur & agitur.

Alius. R. Nit. depur. C. C. phil. præp. vel Ebor. sine igne præp. an. dr. s. vel scr. ii. M. F. Pulv. dentur 4. doses, quarum una cum aq. font. vel decoct. hord. aut decoct. limat. C. C. mensura unâ misceatur, & transvasetur pro Potu ordinariò. Si Diarrhœa vel Fluxus sanguinis simul infestet, addi vel sumi potest C. C. ust. præp. terr. sigill. corall. &c.

## ARTICULUS III.

*De Officiò Medici, in consideranda & præscribenda Diætâ Calidâ.*

**M**orbi frigidi, exorti à materia viscidâ, pituitosâ & frigidâ, Diætâ exigunt calidam, quæ in hoc consistit, ut aër sit serenus, tenuis, purus, ac calidus, panis probè



probè fermentatus, ac modicò sale & semine carvi conditus. Ex *carnibus* concedantur carnes gallin. capon. pull. gallinac. & columb. vitul. hædin. avium mont. & sylvest. Condiri possunt *piper. z. z. mac. rorismar. thym. satur. salv. major. hyssop.* abstinendum à *piscibus*, nisi saxatilibus, *fructibus* horariis, *lacticiniis*, *leguminibus*. *Aromatum* usus sit frequentior. Ex *oleribus* conveniunt, petrosel. brass. bet. asparag. raphan. nasturt. &c. *Potus* sit vinum merum, aut modicè dilutum, vel si hoc contraindicetur, unus ex sequentibus; *exercitia* & *vigiliæ* sint moderatæ, *alvus* laxa, *animi* *Pathemata* præter gaudium vitentur.

## Formulæ

## Potuum ordinariorum Calescientium.

Aqua cocta sceniculi. *R. Sem. fœnic. dr. i. coq. in 2. mens. aq. font. per quadrantem, injectis inde cinam. opt. parum incis. unc. s. vel dr. vi. amove ab igne, vasque clausum reponè, donec frigescat, tandem 2. vel 3. frustula panis sil ginci impone, ibique permitte.*

Aqua cocta Cinamomi. *R. Aq. commun. lib. iv. sacch. alb. dr. x. coq. donec ebull. add. cinam. acut. contus. dr. iii. mox ab igne remove operculoque tegè, ac refrigerare sine & cola*

Aqua cocta Sassafras. *R. Lign. sassafr. crassè limat. dr. x. coq. in duplici vase in lib. xii. aq. 5. vel 6. horis, ubi refrigerit Col.*

Alia ex sassafras & cinam. *R. Aq. font. lib. ix. cinam. op. unc. s. lign. sassafr. rasp. dr. i. indantur in vas bene clausum, quod dein immergatur aquæ calidæ, in quâ horis 4. vel 5. ebulliat.*

Aqua cocta grata. *R. Sem. coriand. præp. dr. ii. liq. ras. dr. iii. sem. anis. scr. s. cinam. acut. dr. ii. decoq. in aq. mens. ii. s. aliquoties ebull. Col.*

Tragæa, Potum præbens gratissimum. *R. Lign. sassafr. dr. x. chin. opt. dr. vi. liq. dr. i. cinam. opt. unc. s. sent. anis. dr. ii. CC. præp. dr. ii. B. ocul. canc. præp. dr. i. M. F. Pulv. hujus unc. i. seu cochl. coq. in lib. iv. aq. font. post colaturam in cellam reponè, ut refrigeretur, sic enim subsidentibus speciebus in fundo vasis, aqua super atat clara & utilis.*

Alia. *R. Scob. lign. sassafr. rad. chin. an. unc. s. cinam. opt. dr. ij. f. m. anis. dr. i. C. C. præp. ocul. canc. præp. an. dr. i. s. M. F. Pulv. gross. de quò cochl. i. mensuræ aquæ fervidæ, statim post effusionem operculò tegendæ injiciatur. In affectibus Pectoris, unc. i. passul. addi potest.*

Alia. *R. Scob. Rad. chin. unc. i. lign. lentisc. sant. cit. an. dr. ii. cinam. opt. dr. i. sem. anis. dr. i. C. C. ust. ocul. canc. an. dr. iii. M. F. Pulv. gross. de quò Cochl. i. lib. iv. aq. font. fervid. injiciatur, ac urceus statim claudatur.*

Potus gustû & colore suavis, in Podagricis confirmatis. *R. Sarsapar. unc. vi. lign. sassafr. chin. C. C. an. unc. ii. glyc. unc. i. coq. in aq. font. cong. ii. per horam dimidiam, dein stent cooperta in cineribus calidis, per horas 12. Postea ebull. ad 3. part. consumpt. cum ab igne amovetur, add. anis. unc. s. post 2. horas Col. & depur. per residuum. ac liquor clarus reponatur in lagenis vitreis probè clausis ad usû.*

Bochetum in Arthritide. *R. Rad. sarsapar. unc. ii. liq. unc. i. cinam. anis. an. unc. s. M. F. Pulv. tenuiss. cujus Cochl. i. misceatur cum mens. i. aq. font. agitetur in 2. vasis ter vel quater, hinc Col.*

Aliud. *R. Sarsapar. unc. vi. lign. sassafr. chin. C. C. an. unc. ii. glyc. unc. i. sem. anis. unc. s. M. F. Pulv. tenuiss.*

Decoct. in eundem usum. *R. Chin. incis. unc. s. C. C. ust. unc. i. sacch. comm. unc. ii. coq. in aq. mens. ii. s. ad consumpt. dimidiæ add. sub finem cort. cit. rec. demptâ pulpâ albâ N. i. cinam. dr. ii. M.*

Potus ordinarius in Paralyti. *R. Rad. Chin. unc. i. s. sem. anis. unc. s. coq. in aq. font. mens. i. s. ad consumpt. 3. part. addendo circa finem cinam. cl. dr. ii*

Alius in Colicâ convulsivâ. *R. Rad. Chin. dr. ii. sem. anis. vel fœnic. dr. i. p. ssul. maj. exacinat. unc. ii. coq. per quadrant. horæ cum lib. iv. aq. font. Col.*

Species pro Potu ordinariò. *R. Rad. Chin. unc. s. sassafr. unc. s. passul. min. unc. iv. C. C. ust. unc. s. sem. anis. fœnic. tart. præp. cinamom. an. dr. ii. M. incis. & contus.*

dentur ad Chart. S. Stuck zum Trinck Wasser, darvon 2. hand voll in ein viertel Wasser zu sieden, bis ein halb Mass cingesotten.

Alia. *R. Sant. rub. unc. s. sassafr. chin. an. dr. iii. sarsapar. dr. ii. passul. min. sem. fœnic. an. unc. i. s. cinam. sacch. cand. rub. sal. nit. præp. an. unc. s. M. incisa dentur ad Chart.*

Alia. *R. Sem. anis. fœnic. an. unc. ii. cort. cit. dr. ii. sassafr. dr. vi. sarsapar. rad. chin. an. unc. i. santal. rub. polypod. an. dr. ii. Cinam. dr. vi. dentur incis. & contus. ad chart.*

Alia utiles in Hydrope. *M. Rad. Chin. unc. i. sassafr. sant. rub. citrin. an. unc. s. rad. glyc. sem. anis. fœnic. an. dr. iii. cinam. dr. s. passul. min. m. i. de his speciebus sumantur Cochl. iii. & coq. cum aq. font. lib. v. ad consumpt. 3. part.*

Potus ordinarius in Urinæ retentione. *R. Herb. agrim. m. i. rad. petrosel. unc. i. liq. dr. vi. bacc. juniper. unc. s. sem. carv. vel anis. fœnic. an. dr. i. s. coq. in 3. mens. aq. ad 3.*

Potus Juniperinus, der Kranewurtz-Tranck. *R. Bacc. juniper. lib. i. passul. min. lib. i. & unc. iii. (alii horum locò accipiunt berberes) tartar. vcnct. ab unc. s. ad unc. i. fruct. cynosbat. cum arill. m. i. fruct. acac. cum nucl. m. i. infund. in aq. commun. lib. xvi. in vase aptò ligacò, & pone fornacem vel locò quòdam calidò fermentare permittatur, hinc transvasetur. Potus hic in Austria familiaris, ac hypochondriacis inprimis & lumborum, renumque phlogosi ac aflu correptis, pro potu ordinariò utilis.*

## ARTICULUS IV.

## De Officiò Medici, in considerandâ &amp; præscribendâ Dietâ Siccante.

**D**ietâ exsiccante indigent morbi, exorti à superflua humiditate, item defluxiones catarrhales, fluxus alvi immodici, illique inprimis, qui Dietâ seu curâ sudoriferâ curari solent. Aer igitur sit naturâ siccus, vel arte talis redditus, per accensum ignem & suffumigium. Panis sit bis coctus, sale & semine carvi benè conditus. Carnes assæ potius, quàm elixæ, maximè sylvestres, ut turtur. turdor. perdic. attagen. urogall. lepuscul. capreol. damar. &c. A piscibus & carne suillâ abstinendum. Olera conveniunt ea, quæ in dietâ calidâ proposita. Ex fructibus profunt, amygdal. cost. nuc. avellan. castan. cydon. Ex frugibus oryza. Aromata utilia, ni quid obftet. Vitentur lacticinia & multa juscula, nisi chalybeata sint. Potus sit admodum parcus. Utendum vinò dilutò, aquâ chalybeatâ, vel aliò potu infra assignandò. Somnus sit consuetò brevior, motus & exercitium profunt, alvus sit laxa.

## Formulæ

## Potuum ordinariorum Exsiccantium.

Bochetum recens. *R. Chin. opt. sarsapar. an. unc. ii. lig. sassafr. rec. unc. i. s. rad. liq. ras. unc. i. passul. min. unc. iii. aq. font. lib. xxiv. incis. stent per 24. hor. hinc coq. f. a. ad remanent. lib. xviii. Col. deur pro Potu ordinariò.*

Aliud non recens. *R. Resident. decoct. primar. add. rad. chin. ponderos. scorz. an. unc. i. s. cinam. acut. dr. iii. passul. min. unc. iii. sem. fœnic. unc. s. coq. in lib. xxv. aq. f. ad remanent. lib. xvi. Col.*

Potus exsiccans in defluxionibus, & affectibus Capitis humidis. *R. Rad. chin. caryophyllat. pæon. an. unc. iii. ras. lign. sassafr. unc. s. cinam. unc. iii. incis. grossò modò dentur ad Chart. S. Species zum ordinari Tranck, darvon ein gute Hand voll in 2. Mass Wasser zu sieden, bis ein halbe cingesotten.*

Alius. *R. Lign. sassafr. rad. chin. an. unc. i. cinam. acut. unc. s. C. C. præp. ocul. canc. præp. an. dr. ii. M. ad Chart.*

Tragæa pro Potu exsiccante. *R. Scob. lign. lentisc. sant. cit. rad. chin. an. unc. s. cinam. opt. dr. ii. rasur. chor. unc. s. galang. min. dr. i. ocul. canc. præp. dr. iii. M. F. Pulv. gross. de quò Cochl. in urceò cum aq. ferventis mensurâ misceatur.*

Potus



Potus ordinarius in Vulneribus. ℞. C. C. ust. unc. i. hord. integ. unc. i. s. anis. fœnic. an. unc. s. M. Vel ℞. C. C. ust. unc. s. hord. integ. unc. i. s. herb. agrim. veron. alchimill. fœnic. an. p. i. rad. consolid. liquir. an. unc. s. sem. anis. fœnic. an. dr. i. M. incisa dentur ad Chart. possunt etiam addi passul. liquid. &c.

Potus in Dysenteria. ℞. Rad. torment. C. C. ust. an. unc. i. coq. in aq. chalyb. mens. i. s. ad 3. add. cinam. dr. ii. M.

Alius in Dysenteria maligna. ℞. Raf. C. C. unc. i. s. rad. torment. acetos. an. unc. iii. aq. puriss. lib. v. coq. ad remanent. lib. iii. s. in Col. dissolv. vin. gran. unc. ii. syr. acetos. cit. de rub. id. corall. an. dr. vi. M.

Potus in Diarrhœa. ℞. C. C. ust. rad. torment. carn. cydon. sicc. an. unc. s. cinam. opt. dr. iii. sem. fœnic. dr. iii. coriand. dr. ii. M. incis. dentur ad Chart.

Alius. ℞. C. C. ust. præp. terr. fg. vel Bol. Arm. spod. an. dr. s. vel scr. ii. M. F. Pulv. subtiliss. permiscendus mensur. aq. chalyb. vel Emuls. amygd. d. cum aq. chalyb. fact.

Potus gratus in Vomitu vel Diarrhœa. ℞. Mast. el. dr. ii. coq. cum unc. xxxx. aq. font. in ollâ bene testâ ad 3. cui post coctionem adhuc ferventi injiciatur flavedo cort. cit. rec. & cinam. integri digitis confract. an. dr. i. stent simul cooperta, donec refrigescant.

Huc pertinent formulæ quoque nonnullæ Potuum Calefacientium, supra propositorum.

## ARTICULUS V.

De Officiò Medici, in ordinandâ & præscribendâ  
Diætâ Humectante.

**D**ietam Humectantem exigunt morbi à siccitate, ac defectu nutrimenti & humidi radicalis oriundi, ut Febres Hæcticæ, Atrophiciæ &c. In hac aër sit humidior, panis mediæ ætatis. Ex Carnibus eligendæ euchymæ, ut gallin. capon. columb. perdic. phasian. attag. aliarum avium sylv. earumque contusa & consummata. Item caro hædina, vitulina, vervecina junior, agnina, porcell. lactant. inprimis etiam conducunt ex Cochleis, testudinibus & cancris parata. Elixia magis profunt, quàm assa. Gelatinæ quam maximè utiles, ut v. g. Gelatina Caponis, hunc in modum parata: R. Capon ping. deplum exenterat. & mundificat. incid. cum ossibus minutiss. indatur lagenæ stannæ, affundendo aliq. aq. font. addendo, parum mac. & croc. hinc lagena clavò cochleatò artissimè clausa, lucòque Philosophico munita, in ahena cupreâ aquâ ferventi repleta, per horas 6. ad ignem coq. postea lagenâ apertâ, brodium per inclinationem in vas terreum vitreatum effundatur, inque locum frigidum vel cellam reponatur & ad usum servetur. Vel sequens Gelatina analeptica. ℞. Carn. vitul. lib. i. pedum vituli N. ii. ickthyocoll. dr. ii. hepat. vitul. lib. s. cinam. opt. dr. i. s. mac. dr. s. hæc omnia grossò modò incisa, indantur lagen. stann. affundend. aq. font. lib. ii. ponatur lagena bene obturata in ahenum aquâ plenum, coq. per hor. 5. hinc f. fort. express. servetur in cellâ in locò frigidò ad usum. Vel ℞. Carn. vitul. vel vervec. mac. lib. i. Gallin. mundat. dimid. epat. vitul. vel agn. lib. s. ickthyocoll. dr. ii. mac. dr. s. incis. & lot. inde lagen. stannæ add. pom. cit. in 4. frusta divis. N. i. vin. alb. vet. lib. i. aq. font. lib. ii. lagena bene obturata indatur lebeti aquâ pleno coq. 5. vel 6. hor. Colat. exprim. fortiter. De hac Gelat. quoties Jusculum comeditur, immisceri poterunt Cochl. iii. vel iv. Sequens Sanguinem simul mundificat. ℞. Raf. C. C. unc. ii. s. raf. ebor. unc. i. s. aq. font. lib. iii. stent in infus. per noct. in locò calid. manè add. rad. scorz. rec. vel sicc. N. vi. fol. borrag. m. i. fl. 4. cordial. an. p. i. passul. min. unc. ii. coq. ad gelatin. consist. addendo sub finem coct. Conf. ros. unc. ii. & tandem Confect. alk. compl. dr. i. s. M.

Ex oleribus conveniunt, malv. bismalv. borrag. viol. nymph. Ex fructibus nuc. pineæ, pistach. amygdal. jujub. ficus, passul. poma dulc. prun. dulc. &c. Lactis usus, ni quid obstat, optimus; item ova forbilia, cremor hordei & hordeata, v. g. Hordeatum Imperatoris in Phthisi. ℞. Hord. integr. m. iii. coq. in aq. font. mens. i. s. per 10. horas ad perfectam mollitiem, semp r aliquid aq. calid. affundendo, ne aqua evaporet, & consumatur, exprime deinceps crem. per pannum & in vase mundò ad usum serva. Hinc ℞. Herb. pilosell. tussilag. endiv. an. m. s. rad. scorz. unc. s. Coq. in brodiò Gallin. infus. exprime per pannum; in hoc brodiò dissolv. crem. hord. cochl. i. vel alterum. Vel sequens Italis & Gallis consuetum, ad defluxiones tenues sistendas. ℞. Hord. mund. sel. q. s. maceretur per 6. horas, coque perfectè, ut dissolvi possit, post ℞. Amygd. d. excort. unc. iii. sem. cucurb. unc. i. s. melon. unc. i. papav. alb. lactuc. an. unc. s. contus. omnibus cum aq. hord. eliciatur lac, quod cum lib. ii. pulv. hord. permixt. coq. parumper, addendo parum sacch. Vel seq. refocillans. ℞. Hord. mund. lib. i. factâ ablutione coq. in s. q. aq. ad formam pult. dein. ℞. Crem. unc. vi. sem. melon. excort. amygd. an. unc. i. nucl. pineor. unc. s. contund. simul, f. Hordeat. sumat ad vespertas in principiò mensæ, solvendo in Jure Gall. cochl. iii. ex consummat. Capon. & aromatiz. cum modicò cinam. vel mac.

## Formulæ

### Potuum Humectantium.

Decocta Hordei varia, vid. suprâ de formulis Potuum Refrigerantium.

Aliud in Phthisi & affectibus Pectoris. ℞. Hord. mund. m. iiij. passul. min. unc. i. s. Jujub. N. xx. sem. anis. fœnic. an. dr. vi. cinam. unc. s. incis. & contus. dentur ad Chart. de his sume ad mensuras aquæ tres, totidem manipulos, coq. ad consumpt. 3. part.

Decoct. humectans Pectorale. ℞. Chin. sel. dr. iii. liquir. dr. ii. passul. min. mund. majorum exacinat. an. unc. s. fic. ping. daetyl. an. N. v. jujub. sebest. an. N. xii. sem. 4. fr. mat. anis. fœn. an. dr. i. concis. & conquass. bull. in 3. mens. aq. font. per horam dimid. Col.

Aliud. ℞. Fic. ping. N. vii. jujub. N. x. daetyl. f. nucl. N. viii. sem. anis. fœnic. an. dr. vi. vel unc. i. incis. grossò modò denuer ad chart. S. Species zum ordinari Tranck.

Emulsio pro Potu. ℞. Amygd. d. excort. unc. ii. sem. melon. excort. unc. i. subinde etiam pan. alb. tost. unc. i. aq. font. vel decoct. hord. lib. ii. vel iii. M. F. Emuls. edulcoranda sacch. s. q. Si magis refrigerare animus, adde nit. perlut. scr. ii. vel dr. i.

Alia anti-Hæctica. ℞. Chin. sel. unc. i. rasur. ebor. dr. ii. repleatur pullus bene suginatus, coq. in lib. vi. ad debitam cocturam; hinc col. de col. ℞. Lib. ii. sem. melon. rec. amygd. excort. an. unc. i. nucl. pin. unc. s. M. F. Emulsio.

Alia Epiceraistica. ℞. Sem. papav. alb. dr. iii. melon. unc. i. s. Contund. in mort. marmor. addendo amygd. excort. & per 3. horas in aq. lactuc. infus. N. xxx. Contund. & cum Jure pull. vel seq. decoct. lib. i. s. vel lib. ii. F. Emuls. ℞. Rad. liq. dr. iii. sebest. N. iv. jujub. N. vii. passul. unc. s. fl. viol. borrag. an. p. i. sem. portul. lactuc. dr. i. Coq. in lib. iii. aq. ad consumpt. 3. part.

Decoctum Pulli vel Carnis Gallinæ, das bennenbrat-Wasser, utile pro restauratione Virium, & in doloribus Colicis, ubi maxima ventriculi & intestinorum sensibilitas. ℞. Pullum dimidium, vel Carnem Gallin. ex alis & pectore, dempta omni pinguedine, Coq. cum 4. mens. aq. in duplici vase per 4. hor. Coletur; subinde pro gratiâ addi potest aliquid de cort. citr. vel cinam.


Diæta composita, calida & sicca, frigida & humida &c. desumi potest ex simplicibus.

Omnia ad majorem DEI Gloriam.





## INDEX CAPITUM.

|            |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPUT I.   |  | E Officiô Medici in genere. Pag. 1.                                                                                                  | Errhina, Sternutatoria, Apophlegmatizantia & Expectorantia. 38                                                                        |
| CAPUT II.  |                                                                                   | De Officiô Medici in specie, & primò quidem de Affectibus requirentibus Venæ sectionem. 12                                           | CAPUT VII. De Officiô Medici, in Affectibus exigentibus curam Lactis, Chalybis, usum Theè, Coffeè, Chocolatæ, & Laudani opiat. 47     |
| CAPUT III. |                                                                                   | De Officiô Medici, in Affectibus requirentibus Arteriotomiam, Cucurbitulas, Scarificationem, Hirudines, Vesicatoria & Fonticulos. 19 | CAPUT VIII. De Officiô Medici, in Affectibus exigentibus Alexipharmaca, Antifebrilia, Anthelmintica, Carminativa & Lithontriptica. 55 |
| CAPUT IV.  |                                                                                   | De Officiô Medici, in Affectibus indicantibus Balnea & Acidulas. 23                                                                  | CAPUT IX. De Officiô Medici, in considerandis & præscribendis Appropriatis & Confortantibus. 63                                       |
| CAPUT V.   |                                                                                   | De Officiô Medici, in Affectibus indicantibus Purgationem. 28                                                                        | CAPUT X. De Officiô Medici, in Affectibus exigentibus Adstringentia, Stegnotica, Hypnotica, Anodyna & Vulneraria. 78                  |
| CAPUT VI.  |                                                                                   | De Officiô Medici, in Affectibus indicantibus Sudorifera, Diuretica, Salivantia, 84                                                  | CAPUT XI. De Officiô Medici, in præscribendâ debità Diætâ. 84                                                                         |

## INDEX RERUM.

### A.

**A**bstergentia : vid. Vulneraria.  
 Acetum alexipharmacum præservativum 57.  
 Acidulæ : eas probandi varii modi 26. vires 27. usus *ibid.* seq. noxæ *ibid.* tempus bibendi *ibid.* dosis *ibid.* operatio 28. seqq.  
 Adstringentia : 78. quomodo agant *ibid.* notanda in eorum usû *ibid.* formulæ 79. seq.  
 Ægri prognostico relinquendi quinam 4.  
 Æsculapii simulacrum 6.  
 Alexipharmaca : 55. eorum diversa agendi ratio 56. usus *ibid.* formulæ 57. seq.  
 Anacatharsis quid 45.  
 Anacollema in hæmorrhagiâ narium 80.  
 Anodyna : 81. quomodo agant *ibid.* formulæ *ibid.*  
 Anthelmintica : 60. notanda circa eorum usum *ibid.* formulæ *ibid.*  
 Antiscorbutica : 74. notanda in eorum usû *ibid.* formulæ 75. seq.  
 Apollinis simulacrum 1. 2.  
 Apophlegmatismus liquidus 46. in amissâ loquelâ *ibid.* in dolore dentium *ibid.*  
 Apophlegmatizantia : 45. eorum indicantia & contraindicantia *ibid.* formulæ 46. seq.  
 Apoplexia sanguinea V. S. curata 13.  
 Apozema digestivum in affectibus pectoris frig. 30. in affectibus melancholicis *ibid.* antiphthysicum 69.  
 Aqua passulata *Timæi* 31. laxativa *ibid.* 34. errhina 45. clareta pectoralis 47. vermifuga *Helmontiana* 23. carminativa 61. odorifera 64. ophthalmica *Quercetani* 66. in epiphorâ *Timæi* *ibid.* dentifricia 67. asthmatica 69. pectoralis & antiphthysica *ibid.* cordialis in febb. malignis 70. in hypercatharsi *ibid.* perlata *ib.* confortativa

*ibid.* in fluxibus sanguinis *ibid.* in gravidis 71. odorifera *ibid.* clareta stomachalis 72. catapultorum 83. fusca *ibid.* cocta fœniculi 86. cinamomi *ibid.* sassafras *ibid.*  
 Aquæ minerales, circa tractum Oenipontanum quæ 24.  
 Aquapendente, inscriptio cubiculi 12.  
 Arcanum arcanorum 10.  
 Aristotelis Medico data responsio 5.  
 Arteria, si locò venæ aperitur, quid agendum 17. earum incisio commendatur 19. quando & quæ incidendæ *ibid.*  
 Arteriaca : vid. Thoracica.  
 Arthritica : 77. quomodo agant *ibid.* notanda circa eorum usum *ibid.* formulæ *ibid.* seq.  
 Astrologia Medica 3.  
 Attrahentia : vid. Vulneraria.

### B.

**B**alivus : ejus consilium in pleuritide 22.  
 Balnea : eorum differentiæ 23. probationes *ibid.* aquæ dulcis effectus *ibid.* quomodo utiliter instituentia 24. seq. instructio horarum in seffus 25. formulæ *ibid.* seq.  
 Balneum thermale *Sorbait* 26. in nephritide *ibid.* in scabie *ibid.* in fluore albô *ibid.* in suppressione mensium *ibid.* *Riverii* *ibid.* in procidentia uteri *ibid.* in atrophîâ hæcticâ *ibid.* hordeaceum *ibid.* articulos roborens *ibid.* formicarum *ibid.* antiparalyticum *ibid.* in sterilitate *ibid.* in colicâ *ibid.*  
 Balsamus pro naribus obstructis 46. antipeffilentialis 57. carminativus 61. cephalicus 65. antepilepticus *ibid.* antapoplepticus *ibid.* memoriam confortans *ibid.* stomachicus 73. sulphuris *Rulandi* 83. sclopetarius *ibid.*  
 Bechica : vid. Thoracica.  
 Benedictio Divina in morbis curandis omne fert punctum 8.

Bochettum



Bochetum rhabarbarinum 37. in arthritide 86. recens *ibid.* non recens *ibid.*

Bolus laxativus 31. melanagogus 35. hydragogus *ibid.* chalogogus *ibid.* in gonorrhœâ & lue venereâ *ibid.* anthelminticus *ibid.* purgans minutissimus *ibid.* emeticus 39. sudoriferus in erysipelate 41. in febribus malignis *ibid.* diuretici ex terebinthinâ 42. chalybeat. 50. narcoticus in nimio vomitû, hypercatharsi & singultû 55. in diarrhœâ *ibid.* flegnotico-anodynus *ibid.* alexipharmacus 57. febrifugus 59. carminativus 61. nephriticus 63.

Botanica Medicinæ oculus 3. ejus necessitas *ibid.*

Brodium alterans 18. mannatum 31. columbinum in catarrhis 41. diureticum 42. lithontripticum 62. antiphthysicum 69. antiasthmaticum *ibid.* aperitivum 73. antiscorbuticum 75. emmenagogum 76. antidyfentericum. 79.

## C.

**C**Amphorata ubi convenient 56.

*Capivaccii* arcana quænam 10.

Cardiaca : vid. Cordialia.

Carminativa quid 61. vis operandi *ibid.* notanda & usus *ibid.* formulæ *ibid.* seq.

Cataplasma pro vesicatoriis 23. in ischuriâ vesicali *Foresti* 42. antifebrile 59. ad vermes 60. nephriticum 63. ophthalmicum 66. oticum 67. in anginâ 68. pectorale 70. pleuriticum *ibid.* stomachicum 73. antipodagricum 78. domesticum *ibid.* contra abortum 80. in fluxû immodicò mensium *ibid.* adstringens in diarrhœâ & dysenterîâ *ibid.* pro vomitû sistendô *ibid.* in dolore capitis 81. hæmorrhoidali *ibid.* *Grulingii* *ibid.* anodynum generale in tumoribus & abscessibus *ibid.* suppurativum 83.

Cauteria ubi profint 21.

*Celsi* effatum in curandis morbis 11.

Cephalica : 63. eorum nomina varia *ibid.* notanda circa usum *ibid.* formulæ *ibid.*

Ceratum ad fonticulos *Sculteti* 22. Magni Ducis Hetrurîæ *ibid.*

Cerevisia anticachectica & antihypochondriaca 73. *Butleri* *ibid.* antiscorbutica 75.

Chalybs quid 49. vires & usus *ibid.* seq. notanda 50. formulæ *ibid.*

China Chinæ quid 58. ejus vires *ibid.* seq. usus & exhibitio *ibid.* seq. objectiones & responsiones 59.

Chirurgiæ necessitas 3.

Chocolata quid 52. modus bibendi *ibid.* qualitates & usus *ibid.*

Chymia necessitas 3.

Cibos exhibendi modus 84.

Cingulum sapientiæ 44.

Claretum martiale *Minicht.* 50.

Clyster domesticus 31. lenitivus 37. à capite revellens *ibid.* acris in affectibus soporosis *ibid.* in asthma & colicâ contumaci *ibid.* in gravidâ *ibid.* laxativus anticolicus *ibid.* diureticus 42. carminativus 62. hypochondriacus *ibid.* nephriticus 63. hystericus 77. in partû difficili *ibid.* adstringens & consolidans in dysenterîâ 81. anodynus *ibid.* oleosus in colicâ & calculô *ibid.*

Coffeè quid 51. ejus parandi modus *ibid.* qualitates & usus *ibid.*

Collutio oris in dentium vacillatione 68. in gingivarum laxitate *ibid.*

Collyrium ophthalmicum 66. in vulneribus oculorum *ibid.* pro maculis & nebulis detergendis *ibid.* in epiphorâ *Timai* *ibid.*

Condensantia 78. quomodo agant *ibid.*

Confectio ad acidulas 28.

Consultatio Medico utilis 8. honorifica *ibid.* alterius Medici familiaris *ibid.* quando & quomodo instituenda *ibid.* seq.

Cordialia : 70. eorum agendi ratio *ibid.* applicandi modus *ibid.* formulæ *ibid.* seq.

Cucupha in catarrhis 64. vertigine & incubô *ibid.* iiritus animales confortans *ibid.*

Cucurbitulæ, quando & ubi applicandæ 19.

Curationis fundamenta 3. anima 10.

## D.

**D**Ecoctum laxativum 18. sudoriferum in lue venereâ 40. aliud *Zuvelferi* *ibid.* in gonorrhœâ malignâ *ibid.* in catarrhis & affectibus capitis *ibid.* in podagrâ *ibid.* in scabie *ibid.* alterans in ulceribus & abscessibus *ibid.* diureticum 42. *Foresti* *ibid.* amarum febrifugum 59. vermifugum 60. lithontripticum 62. oticum 66. pectorale 68. ad tussim 69. galli veteris in affectibus thoracis *ibid.* in anorexiâ 72. anteictericum *Lindan.* 73. antihydopicum *ib.* emmenagogum 76. ad hæmoptysin *Timai* 79. ad casum 82. vulnerarium *ibid.* ad herniam 83. C. C. 85. hordei in febribus *ibid.* in anginâ *ibid.* in arthritide 86. phthisi 87. humectans pectorale *ibid.* pulli vel carnis gallinæ *ibid.*

Dei præsides Medicinæ 1.

Dentifricium infantum dentientium 67.

Dentilavium scorbuticum *ibid.*

Diæta quid 84. ejus utilitas *ibid.* regulæ *ibid.* refrigerans 85. calida *ibid.* exsiccans 86. humectans 87.

Diæta sudorifera in paralyfi 40. in suffusione *ibid.*

Diaphoretica : eorum distinctio 39. vis operandi *ibid.* cautelæ *ibid.* formulæ 40. usus 56.

Digestiva quid sint 29. formulæ *ibid.*

Discutientia : vid. Vulneraria.

Diuretica ubi convenient 41. operandi modus *ibid.* observanda 42. formulæ *ibid.*

## E.

**E**Clegma : vid. Linctus.

Elæosaccharum carminativum 61.

Estuarium ad acidulas 29. laxativum *Burrhi* 31. sudoriferum 41. chalybeatum 50. opiatum antidyfentericum 55. bezoardicum 57. in peste & febb. malignis *ibid.* febrifugum 60. carminativum 61. lithontripticum 63. anticatarrhale 64. confortans cephalicum *ibid.* antepilepticum *ibid.* contra vertiginem *ibid.* antime-lancholicum *ibid.* ophthalmicum 65. antiphthysicum 69. asthmaticum *ibid.* cordiale 71. in palpitatione cordis *ibid.* stomachicum calidum 72. epaticum 74. antiscorbuticum 75. lochia provocans 76. antipodagricum *Sydenham* 77. in hæmoptysi 79. adstringens in diarrhœâ *ibid.* pro sistendô vomitû *ibid.* antidyfentericum *ibid.* in gonorrhœâ *ibid.* contra abortum *ibid.* in nimio mensium fluxû *ibid.*

Elixir antinephriticum. 62.

Emeticorum usus & regimen 38. formulæ *ibid.*

Emollientia : vid. Vulneraria.

Emplastica 78. quomodo agant *ibid.*

Emplastrum vesicatorium 23. in dolore dentium *ibid.* antifebrile 59. vermifugum 60. carminativum 62. stomachale *Cratonis* 73. hepaticum 74. splenicum 75. matricale 76. antipodagricum 78. ischiadicum *ibid.* præfens in vomitû 80. contra abortum *ibid.* in doloribus catarrhosis 81. in clavis pedum 83. tumore pedum *ib.* diasulphuris *Rulandi* *ibid.* mamillare *ibid.*

Emulsio purgans 36. sudorifera in variolis & febribus malignis 41. diuretica 42. opiata 55. alexipharmaca *Cratonis* 57. antinephritica 62. antepileptica 63. antipleuritica 69. antiphthysica *ibid.* perlata *Montagnana* 71. *Cratonis* *ibid.* adstringens in fluxibus sanguinis 79. antidyfenterica *ibid.* hypnotica 81. humectans 87. antihæctica *ibid.* epiceraistica *ibid.*

Enema : vid. Clyster.

Epithema cordiale frigidum in febb. 71. epaticum frigidum 74. cephalicum 81.

Epulotica : vid. Vulneraria.

Errhina 44. eorum indicantia *ibid.* contraindiantia *ib.* observanda 45. formulæ *ibid.*

Essentia in obstructionibus 30. martis *Hartmanni* 50.

Evaporatio



Evaporatio anodyna in dolore aurium 67.  
Expectorantia, quomodo agant 45. notanda & usus *ib.*  
formulae in materiâ tenui 46. in crassâ & viscidâ 47.  
Experientia quid 4.

## F.

**F**ebrifuga : 57. observanda circa eorum usum 58.  
formulae 59.  
Fomentum carminativum 61. ophthalmicum *Plempii* 65.  
in doloribus arthriticis frigidioribus 78. in dolore dor-  
si *ibid.* ischiadicum *ibid.* podagricum *ibid.* in ulceri-  
bus contumacibus 83. ad erysipelata & exulceratio-  
nes *ibid.* gangrænam & sphacelum *ibid.* pro mem-  
bris fractis vel luxatis *ibid.* à gelû sideratis *ibid.* do-  
lore & tumore pedum *ibid.*  
Fonticuli quibus in morbis convenient 20. observanda  
21. loca *ibid.* quomodo excitandi *ibid.* iis excitatis  
quid agendum *ibid.*  
Frontale in hæmorrhagia narium 80.

## G.

**G**argarismus in prunella februm 67. in aphthis &  
anginâ *ibid.* in inflammatione uvulæ & tonsillarum  
*ibid.* anodynus *Foresti* *ibid.* in faucium exulceratione  
*ibid.* detergens in rupto abscessu 68.  
Gelatina caponis 87. analeptica *ibid.* sanguinem mudi-  
ficans *ibid.*  
Gl'buli caustici ad fonticulos 22.  
Gl'tinantia : vid. Vulneraria.  
Gramos resolventia : vid. Vulneraria.

## H.

**H**æmorrhoides quibus sint salutare 20.  
*Hippocrates*, silentii Deus 1.  
Hepatica : 73. eorum agendi modus *ibid.* notanda circa  
eum *ibid.* formulae *ibid.*  
Hippocras : vid. Vinum Hippocraticum.  
*Hippocratis* interrogata apud ægrotum 6. aphorismi de  
purgantibus explicatio 32.  
Hirudines ubi & quomodo applicandæ 20. quantum  
sanguinis per eas sit evacuandum *ibid.*  
Hordearum Imperatoris in phthisi 87. Italis & Gallis  
conluetum ad defluxiones tenues *ibid.*  
Hypnotica : 81. quomodo agant *ibid.* formulae *ibid.*  
Hypochondriorum status probè explorandus 6.  
Hysterica : 75. quomodo agant *ibid.* notanda in usû eo-  
rum *ibid.* formulae 76.

## I.

**I**nfusum cort. china chinæ 59. diureticum 62. anteic-  
tericum *Riverii* 73.  
Injectio auricularis in surditate 66. in ulcera cava 83.  
Interceptientia : vid. Thoracica.  
Ichæma : vid. Sanguinem sistentia.  
Italorum morbos curandi modus 84.  
Julepus digestivus in affectibus capit. frig. 30. in affec-  
tibus mulierum frig. *ibid.* antiscorbuticus *ibid.* laxati-  
vus 31. purgans 36. diureticus 42. antinephriticus 62.  
antiepilepticus 63. pectoralis 69. cordialis 71. vitæ  
*ibid.* perlatus *ibid.* stomachalis 72. emmenagogus 76.  
hystericus camphoratus *ibid.* foetidus *ibid.* moschatus  
*ibid.* in hæmorrhagiis 79. hypnoticus 87. refrigerans  
85. Alexandrinus *ibid.* ficcus *ibid.*

## L.

**L**ac : ejus substantia 47. bonitatis signa *ibid.* differen-  
tiæ *ibid.* usus *ibid.* noxæ 48. cura quatuorplex *ibid.*  
regimen & notanda *ibid.* formulae 49. caprinum anti-  
scorbuticum *ibid.* antidysentericum *ibid.* in mictû  
cruentâ *ibid.* cancrinum in phthisi *ibid.* arte factum  
*ibid.* anihæticum *ibid.*  
Lapis septicus ruptorius 21. infernalis *ibid.* causticus  
*Hurnii* *ibid.*  
Laudanum opiatum quid 52. ejus præparationes *ibid.*  
qualitates *ibid.* usus 53. cautela 54. objectiones &  
responsa *ibid.*

Lenitiva : eorum indicatio 30. operandi modus *ibid.* ob-  
servanda *ibid.* formulae *ibid.*

Limonata 85.

Linctus expectorans 46. in pleuritide *ibid.* *Wepferi* 47.  
in prunellâ 68. in faucium excoriatione *ibid.* antiph-  
thicus 69.

Linimentum pro naribus obstructis 46. ophthalmicum  
66. ad ulcera faucium & gingivarum 68. stomachicum  
73. in doloribus suræ 81. in dolore ischiadicô *ibid.*  
hæmorrhoidum *ibid.* ad ambusta. 83.

Lithontripica : 62. notanda circa eorum usum *ibid.* for-  
mulae *ibid.*

Lixivium diureticum 42.

Looch album 69. domesticum *ibid.*

Lotio pedum : vid. Pediluvium.

Lunæ appellatio 3. effectus *ibid.*

## M.

**M**anna julepata 34.

Masticatorium in cataractis 46. in difficili audi-  
tû *ibid.* in paralyfi & apoplexiâ *ibid.* in dolore den-  
tium *ibid.*

Medicamentum, vid. Remedium.

Medicina : ejus origo 1. soror germana 3. principia *ibid.*  
anima & mater 4. contemptores, quomodo refutan-  
di 6. Deorum munus 12.

Medicus : ejus religio 1. cynosura *ibid.* cælites Medici  
1. quando venerandi *ibid.* virtutes cardinales *ibid.*  
seqq. vitia 2. scientiæ ac disciplinæ *ibid.* Medici cur  
dicantur Physici 3. vocatio *ibid.* se ipsum non curet  
4. quomodo erga hostes gulosos & ingratos se gere-  
re debeat *ibid.* quid in visitatione apud ægrotos ei  
considerandum 5. vestitus *ibid.* defensio contra oso-  
res 6. causam morbi probè investiget *ibid.* quæstio-  
nes apud ægrotos quæ movendæ *ibid.* cautela in  
prognosi 7. timidos consoletur 8. Medicorum dissen-  
sus ægrotis sæpe utilis 9. methodicus 10. citò curare  
debet *ibid.* tutò *ibid.* jucundè 11. foftrum *ibid.* quæ  
ei circa V. S. observanda 13. judicium de sanguine  
miso 17. observanda in arteriotomiâ 19. in scarifica-  
tione *ibid.* in applicatione hirudinum 20. fonticulo-  
rum *ibid.* vesicatoriorum 22. in usû balneorum 23.  
seqq. acidularum 26. purgationum 29. 31. vomito-  
riorum 37. sudoriferorum 39. diureticorum 41. sali-  
vantium 43. sternutatoriorum 44. apophlegmatizan-  
tium 45. expectorantium *ibid.* in cura lactis 47. cha-  
lybis 49. in usû theæ, coffeæ & chocolatæ 51. lauda-  
ni opiat 52. alexipharmacorum 55. febrifugorum 57.  
anthelminticorum 60. carminativorum 61. lithontrip-  
ticorum 62. cephalicorum 63. ophthalmicorum 65.  
oticorum 66. odonticorum 67. thoraciorum 68. cor-  
dialium 70. stomachicorum 71. hepaticorum 73. sple-  
neticorum 74. antiscorbuticorum *ibid.* hystericorum  
75. arthriticorum 77. seqq. adstringentium & sangui-  
nem sistentium 78. hypnoticorum & anodynorum 81.  
vulnerariorum *ibid.* diætæ 84.

Methodi varia attributa 10.

Mixtura in obstructionibus 30. diuretica 42. antifebrilis  
*Crollii* 59. carminativa 61. antapoplectica 63. in tin-  
nitû aurium *Plateri* 67. dolore *ibid.* pectoralis *ibid.*  
pleuritica *ibid.* stomachica 72. antihypochondriaca 73.  
antiscorbutica 75. hysterica 76. in suppressione lochio-  
rum *ibid.* stegnotica *Sylvii* 79.

Morbus, quomodo dignoscendus 6. eorum fontes, sig-  
norum & causæ *ibid.* complicati 7. conclamati 10.

Morsuli ad acidulas 28. 29. hypochondriaci 28. purgan-  
tes 36. hydragogi *ibid.* imperatoris purgantes *ibid.*  
chalybeati 51. præservativi in peste 57. cephalici 64.  
pro confortandâ memoriâ *ibid.* pectorales 69. cordia-  
les 71. stomachici *ibid.* 72. contra sodam *ibid.*

Mulier M. S. minùs tolerat quàm vir 6.

## N.

**N**arcotica : 81. quomodo agant *ibid.*

Nasale in hæmorrhagiâ narium 80.

Nephritica :



Nephritica : vid. Lithontriptica.

Nodulus laxativus 18. 36. in obftructionibus viscem hypochond. *ibid.* in fuppreffione menfium *ibid.* ti-  
aſthmaticus *ibid.* in affectibus catiſ *ibid.* uteri *ibid.*  
anticachecticus *ibid.* anteictericus 37. pro infans  
*ibid.* antinephriticus 62. odoriferus 64.

## O.

**O**dontica : 67. eorum formulæ *id.* feqq.

Odoramentum in affectibus hororis 64. aritus  
animales excitans *ibid.* in paſſionibus hysterica 7

Oleum anodynum internum 81.

Ophthalmica : 65. cautela circa eorum uſum *id.* for-  
mulæ *ibid.*

Opiata 52. feqq. eorum formulæ 55.

Opiata dentes mundificans *Borelli* 6.

Otica : 66. notanda circa eorum uſum *ibid.* formulæ *ibid.*

Oxydorcica : vid. Ophthalmica.

Oxyrrhodinum 81.

## P.

**P**alladis ſimulacrum 6.

Paregorica : vid. Anodyna.

Paſſula laxativa 31. ſeq.

Pasta dentificia Dominarum 67.

Pediluvium anticatarrhale 65. in dolore catiſ *ibid.* in  
aſthmate 70. in fuppreſſione menſium 76. dagricum  
77. hypnoticum 81.

Pharmaciae neceſſitas 3.

Philophia Medicinæ ſoror 3.

Pilula laxativa 28. 31. cephalica 35. cathartica *ibid.*  
ophthalmica *ibid.* catholica *ibid.* arthritica *ibid.*  
antihypochondriaca *ibid.* hydragoga *ibid.* melanago-  
ga *ibid.* purgantes in lue venerea *ibid.* antiarthriti-  
ca *ibid.* mundificantes in ſcabie *ibid.* anuelis ute-  
rinæ *ibid.* ſtomachica *ibid.* emetica & diuretica 42.  
chalybeata *Sydenham* 51. *Riverii* *ibid.* opiate in tuſſi  
& catarrhō tenui 55. in phthiſi incipit *ibid.* in cho-  
licâ *ibid.* anodyna in podagrâ *ibid.* dyſenteria &  
hypercatharſi *ibid.* febrifuga 59. erica 76. in  
menſium diminutione *ibid.* antipodagæ 77. adſtric-  
tiva in gonorrhœâ 80.

Placenta carminativa 61.

Pneumonica : vid. Thoracica.

Porotica : vid. Vulneraria.

Potio lenitiva ex mannâ 34. in febris *ibid.* phlegma-  
goga *ibid.* cholagoga *ibid.* hydragoga *ibid.* melana-  
goga *ibid.* miſtagoga *ibid.* purgans in fluxibus alvi  
*ibid.* ſanguinis *ibid.* in diarrhœâ & dyſenteria *ibid.*  
emetica ex vitriolô 38. crocô melorum 39. vitriô  
antimonii *ibid.* ex ſyrup. emet. ſuſcipe in febris  
malignis 41. diuretica ſuavis 42. alexipharmaca 57. an-  
tifebrilis 59. antinephritica 63. ad pellendam ſecun-  
dinam 76. in variolis 85. refrigera in ebbo. *ibid.* in  
prunellâ *ibid.* in podagricis confirmis 88. ordinaria in  
paralyſi *ibid.* in colica convulſivâ *id.* in urinæ reten-  
tione *ibid.* juniperina *ibid.* exlicca in affectibus ca-  
pitis humidis 86. ordinaria in vulnibus 87. in dyſen-  
teria *ibid.* in vomitû & diarrhœâ *ibid.*

Potiuncula ad dyſtociam vel centieſiperta 16.

Potus : vid. Potio.

Præparantia quid ſint 29. quæ circa obſervanda *ibid.*  
formulæ *ibid.*

Praxis ſine Theoriâ fallaciſſima 3.

Prognofis : ejus commoda 7. difficiles *ibid.* ſeq.

Pruna laxativa 157.

Pulfus : quid indiget Medico 6. ſoli nonſidendum  
*ibid.*

Pulvis digeſſivo-laxativus 18. ad alulas 29. digeſſivus  
hypochondriacus *ibid.* in febris intermit. *ibid.* in  
cachexiâ *ibid.* in ſcorbutô *ibid.* ſorbens *Wedelii* 30.  
laxativus 31. 34. *Cornachinus* olagogus *ibid.* hy-  
dragogus *ibid.* miſtagogus *ibid.* arthriticus *ibid.* pur-  
gans anthelminticus *ibid.* antihypocis 35. in fluxi-  
bus alvi *ibid.* carminativus *ibid.* ſlutivus *ibid.* emeti-

cus 38. ſudoriferus & expulſivus in variolis 41. alexi-  
pharmacus *Mindereri* *ibid.* diureticus 42. ſternu-ato-  
rius 46. *Hartmanni* *ibid.* in catarrhis *ibid.* coryza *ibid.*  
cerebrum corroborans *ibid.* *Papalis* *ibid.* chalybeatus  
cachecticus 51. in fuppreſſione menſium *ibid.* diapho-  
retico-anodynus in arthritide 55. nephritico-anody-  
nus *ibid.* alexipharmacus 57. antifebrilis 59. anthel-  
minticus 60. carminativus 61. nephrocatharticus 63.  
cephalicus corroborans 64. antapoplecticus *ibid.* an-  
tepilepticus *ibid.* crinalis *ibid.* ophthalmicus 65. den-  
tificus 67. antiphthiſicus 69. antipleuriticus 70. pec-  
toralis *Michaëlis* *ibid.* cordialis 71. analepticus *ibid.*  
ſtomachicus 72. pepticus *ibid.* aperitivus & digeſſi-  
vus 74. anteictericus *Timæi* *ibid.* præcipitans & abſor-  
bens *ibid.* antiſpleneticus 75. hyſtericus *Timæi* 76.  
partum provocans *ibid.* emmenagogus *ibid.* arthriticus  
*Wepferi* 77. contra abortum 80. contra fluorem album  
*ibid.* contra diarrhœam *ibid.* antidyſentericus *ibid.*  
*Americanus* *ibid.* vomitum ſiſtens *ibid.* ſlegneticus in  
nimitu menſium fluxû *ibid.* ad caſum 83. ad eryſipelas  
*Mynſickii* *ibid.*

Purgantium formulæ varii generis 33. ſeqq.

Purgatio 29. ejus indicatio 31. obſervanda *ibid.* 32. ſeqq.  
33. ſeqq. tetapus 32. locus *ibid.* ſigna 33. differentiæ  
*ibid.* ſeq. operandi vis *ibid.* uſus *ibid.*

## R.

**R**emedia : quomodo iis utendum 10. vulgarium &  
ſimplicium præſtantia *ibid.* quibus abſtinendum  
*ibid.* ſeq. quando 11. temerè non ſunt mutanda *ibid.*

Reſſentia : vid. Vulneraria.

Rotâ ſolis 72.

Rotula in ſortore oris 46. expectorantes *ibid.* in tuſſi &  
raucedine *ibid.* catarrhales *ibid.* anthelminticae 60.  
cephalicae 64. contra vertiginem *ibid.* antapoplecticae  
*ibid.* antiphthiſicae 69. cordiales 71. ſtomachales 72.  
bibitoria *ibid.* contra ſodam *ibid.*

## S.

**S**acculus carminativus 61. anodynus 62. cordialis 71.  
ſtomachalis 73. anodynus in colicâ 81. in pleuritide  
*ibid.* nephritide *ibid.*

Sal uſualis oxydorcicus 65.

Salivantium formulæ 44.

Salivatio quid 43. ejus materia *ibid.* indicantia & con-  
traindicantia *ibid.* obſervanda *ibid.* ſeq.

Sanguinem ſiſtentia : 78. notanda in uſu eorum *ibid.* ſeq.

Sanguis optimus quis 17. color *ibid.* conſiſtentia 18. ſe-  
rum *ibid.* ſeq.

Sarcotica : vid. Vulneraria.

Scarificatio quomodo inſtituenda 19.

Serum lactis 18. compositum *ibid.* *Fonſeca* *ibid.* in ſca-  
bie 49. antiſcorbuticum *ibid.*

Signa : eorum fontes 6.

*Socratis* ultima verba 12.

ſoſtrum : quid de illô Medico conſiderandum 11. ſeq.

Sparadrapum 21. viride, 22.

Species pro vinô 18. pro decoctô traumaticô 83. pro  
potu ordinariô 86. in hydrope *ibid.*

Spiritus vini purgans 36.

Splenetica : 74. quomodo agant *ibid.* ſeq. notanda circa  
eorum uſum *ibid.* formulæ 75.

Stegnotica : vid. Adſtringentia.

Sternutatio quomodo fiat. 44.

Sternutatoria : vid. Errhina.

Stomachica : 71. eorum agendi modus *ibid.* ſeq. notanda  
in uſu *ibid.* formulæ 72. ſeq.

Succi antiſcorbutici 75.

Succi digeſſivi in affectu hypochond. 30.

Succolata : vid. Chocolata.

Sudor quomodo contingat 39. ubi conveniat *ibid.* coin-  
dicantia *ibid.*

Sudorifera : vid. Diaphoretica.

Suffitus oticus 67. humidus in fuppreſſione menſium vel  
lochiorum



lochiorum 76. fucus in eundem finem 77. in doloribus articulorum 78. in diarrhoeâ 80.  
 Suppositorium 31. acre in affectibus soporosis 37.  
 Suppurantia : vid. Vulneraria.  
 Sydenham : ejus cura dysenteriae 47.  
 Syrupus ad acidulas 29. purgans 36. chalybeatus 50. narcoticus 55.

## T.

**T**Abellæ chalybeatæ 51. carminativæ 61. antapoplecticæ 64. cardiacæ 71. coralliaæ *Timæi* 80. contra abortum *ibid.*  
 Tabula generalis pro V.S. instituendâ 16. pro balneô 25.  
 Terebinthina liquida 42.  
 Thee vires & usus 51. abulus *ibid.*  
 Theoriae necessitas ad Praxin Med. acquirendam 3.  
 Thermae : earum agendi modus 23. usus 24. noxæ *ibid.*  
 Thoracica : 68. eorum differentia & modus agendi *ib.* notanda circa usum *ibid.* formulæ *ibid.* seq.  
 Tinctura martis 50. antifebrilis 59. rosarum 85.  
 Tragæa ad acidulas 28. carminativa 61. in vertigine 64. confortans cephalica *ibid.* visum corroborans 65. in affectibus pectoris 70. cordialis 71. stomachica 72. hepatica 74. emmenagoga 76. in vomitu gravidarum 80. potum præbens gratissimum 86. pro potu exsiccante *ibid.*  
 Traumatica : vid. Vulneraria.  
 Trochisci alexipharmaci 57. pectorales 69.  
 Turundæ acousticae 67.

## V.

**V**enasectio, quando indicatur 13. ubi non admodum necessaria *ibid.* pro curâ prophylacticâ administranda *ibid.* quæ circa eam observanda 14. senibus prohibita *ibid.* abortum præcavet *ibid.* ejus impedimenta *ibid.* revulsoria *ibid.* locus *ibid.* quantitas 15. tempus *ibid.* seq. tabula generalis 16. cautela *ibid.* seq. judi-

ci de sanguine isse 17.  
 Verum distensio artibus 14. earum electio 15.  
 Venum quid 55. rum agendi modus 56.  
 Vestigia, ubi conrriant, 22. seq. locus applicationis *ib.* observanda *ib.* seq. contraindicationis 23. forma *ibid.*  
 Vici quatuorplex 82 quæ circa eum observanda *ibid.*  
 Vinum passulatum *imæi* 31. medicatum purgans 36. hycogonum *ibid.* antihypochondriacum *ibid.* diureticum 42. chalybitum 50. *Riverii* *ibid.* attenuans & deobuens *ibid.* anticheclicum *ibid.* alexipharmacum & reservativum 57. antifebrile 59. anthelminticum 60. anticatarrhale 63. euphragiatum ophthalmicum 64. *Hippocraticum* 72. absinthiacum *ibid.* stomachicum *ibid.* anticheclicum 73. antiscorbuticum 75. emnagogum 5. ad foetum mortuum ejiciendum *ibid.* anticum purgans 77. alterans *ibid.* antipodagricum *Paracelsi* *ibid.*  
 Visitatio ad aegros quomodo instituenda 5.  
 Unguenti digestum 21. ad renes & vesicam 42. antifebrile 49. ad venas 60. carminativum 61. nephriticum 63. pectorale 70. antipleuriticum *ibid.* cordiale 71. deollativum 74. hepaticum frigidum *ibid.* spleneticum. antiralyticum 78. nervinum *ibid.* in diarrhoeâ & dysenteria 80. contra abortum *ibid.* somniferum 81. ad dorem capitis *ibid.* dorfi & renum *ibid.* digestivum chingorum 83. ad ambusta *Fabricii* *ibid.* ad scabies *ibid.*  
 Vomitus : ejus indicatio 37. seq. contraindicationis 38.  
 Urina : quide in sentiendum 6. ejus mutabilitas *ibid.* evacuatio 4.  
 Uterina : vid. Hysterica.  
 Vulneraria quælicia & quomodo agant 81. seq. notanda in eorum usu 82. formulæ 83.

## Z.

**Z**odiaci signa V.S. quæ attendenda 16.

F I N I S.

















